

**UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN PAKIS GIWANG  
(*Euphorbia milii*) TERHADAP BAKTERI *Methicillin Resistant*  
*Staphylococcus aureus* (MRSA)**



Diajukan untuk Memenuhi Tugas Sarjana untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi

Oleh:

**NUR AZIZA PRATIWI**

NIM. 60300112024

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Maret 2016

Penulis

  
NUR AZIZA PRATIWI  
NIM. 60300112024

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara Nur Aziza Pratiwi, Nim 60300112024, mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama memeriksa dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul, "Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pakis Giwang (*Euphorbia Milii*) Terhadap Bakteri *Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA)". Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat digunakan untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Makassar, 28 Maret 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

  
Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes  
NIP. 19801216 200912 1 003

  
Hafsah, S.Si., M.Pd  
NIP. 19810912 200912 2 008

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pakis Giwang (*Euphorbia Mili*) Terhadap Bakteri *Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA)” yang disusun oleh Nur Aziza Pratiwi, NIM: 60300112024, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Maret 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan)

Makassar, 30 Maret 2016 M  
21 Jumadil Akhir 1437 H

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Eka Sukriwati	(.....)
Munaqasyah I	: Baiq Fathmahanik	(.....)
Munaqasyah II	: Eka Sukriwati	(.....)
Munaqasyah III	: Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Mashur	(.....)
Pembimbing II	: Hafsan, S.Si., M.Pd	(.....)



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

  
**Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag**  
NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pakis Giwang (*Euphorbia Milii*) Terhadap Bakteri**

*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai sekarang. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak hal-hal yang perlu dikoreksi dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sangat berarti dan berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si , selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

3. Dr. Mashuri Masri S.Si.M.Si., selaku Ketua Jurusan Biologi dan Baiq Farhatul Wahida, S.Si., M.S.i., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes dan Hafsan, S.Si., M.Pd, selaku pembimbing I dan II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi.
5. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si dan Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., selaku pembimbing I, II, dan III, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan yang membangun selama penyusunan skripsi.
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi dan pegawai Jurusan Biologi dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Keluarga besarku terimakasih dan saudara-saudaraku dan keluarga-keluarga yang telah memberikan Do'a, semangat, dukungan, dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan studi perkuliahan.
8. Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAM dan Pegawai Rumah Sakit Pendidikan Unhas yang telah banyak membantu selama melakukan praktikum dan telah memberikan dukungannya.



9. Teman-teman yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi, keluarga besar Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Kakanda Alumni IKA BIO FST UINAM
10. Terima kasih kepada Muh Ahsan Kadir atas dukungan, doa dan bantuannya.
11. Teman teman seperjuangan saya angkatan 2012 (Ranvier) terima kasih atas kenangan yang telah di ukir bersama selama berada di kampus dan terima kasih

atas dukungan dan doanya.

12. Terima kasih kepada sahabat dan adik angkatan 2014 Niyah, Husnul, Mutmainnah, Sri Damayanti, dan Sutriana yang telah banyak membantu selama melakukan penelitian dan memberikan dukungannya.

13. Terima kasih kepada teman-teman KKNP (Kuliah Kerja Nyata Profesi) dan keluarga besar Balai KKNP yang telah memberikan banyak pelajaran sebagai melaksanakan KKNP.

Semua pihak yang telah satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis baik berupa moril maupun materi mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amien.



Makassar, Maret 2016.  
**Penulis**

**NUR AZIZA PRATIWI**  
NIM. 60300112024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Dahulu .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kaktus Pakis Givata .....	9
B. <i>Staphylococcus aureus</i> .....	13
C. <i>Methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i> (MRSA) .....	18
D. Tinjauan Penyakit atas <i>Staphylococcus aureus</i> .....	20
E. Anti Mikroba .....	22
F. Ekstraksi .....	28
G. Tinjauan Pelarut .....	32
H. Senyawa Saponin .....	35
I. Pengobatan dalam Pandangan Al-Qur'an .....	39
J. Hipotesis .....	43
K. Kerangka Pikir .....	44



### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Variabel Penelitian .....	45
D. Definisi Operasional Penelitian .....	46
E. Instrumen Penelitian .....	46
F. Prosedur Kerja .....	47
G. Teknik Pengolahan Data .....	52

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan .....	53
B. Pembahasan .....	55

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

### KEPUSTAKAAN

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HID



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Urutan tingkat kepolaran .....	34
Tabel 3.1 Kriteria kekuatan zona hambat .....	51
Tabel 4.1 Zona hambat ekstrak <i>E. milii</i> terhadap bakteri MRSA .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Euphorbia milii</i> var. <i>Splendens</i> .....	10
Gambar 2.4 <i>Staphylococcus aureus</i> .....	13
Gambar 4.1 Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak <i>E. milii</i> dengan pelarut N-Heksan .....	55
Gambar 4.2 Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak <i>E. milii</i> dengan pelarut etil asetat .....	56
Gambar 4.3 Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak <i>E. milii</i> dengan pelarut metanol .....	56



## ABSTRACT

Nama : Nur Aziza Pratiwi

Nim : 60300112024

Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pakis Giwang (*Euphorbia milii*) Terhadap Bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA)

---

Pakis giwang (*Euphorbia milii*) is a shrub that is known to contain many compounds of antimicrobials in almost all parts of the plant. Saponin is one of antimicrobial compounds possessed this plant. Saponin known to almost present in all parts of the plant, but there are many on the leaves. This study uses a quantitative research with a completely randomized design (CDR) aims to determine the inhibition produced leaf extract with a variety of solvents and concentration with an incubation period of 3x24 hours. The best solvent is by the use of n-hexane (nonpolar), ethyl acetate (semipolar), and methanol (polar), while variations in the concentration used a different concentration of 5%, 10%, and 15%. This research was conducted with the first extraction is by the maceration method, followed by testing the inhibition by well diffusion method. The results showed that the best test results obtained with the presence of clear zone on a third variation of the concentration. Inhibition at concentrations as high as 10% and 15% with the same average zone. On ethyl acetate solvent showed that the concentration of 5% and 10% give a clear zone while at concentration of 10% and 15% give a clear zone. This indicates that the methanol and ethyl acetate solvent capable of dissolving the compounds found in the plant *Euphorbia milii*, whereas n-hexane solvent is not able to dissolve the compound.

**Kata Kunci :** *Euphorbia milii*, *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA), well diffusion method, completely randomized design (CDR), maceration method.



## ABSTRAK

Nama : Nur Aziza Pratiwi

Nim : 60300112024

Judul : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Pakis Giwang (*Euphorbia milii*) Terhadap Bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA)

---

Pakis giwang (*Euphorbia milii*) merupakan tumbuhan semak yang diketahui mengandung banyak senyawa antimikroba hampir di seluruh bagian tanaman. Saponin merupakan salah satu senyawa antimikroba yang dimiliki tanaman ini. Saponin diketahui hampir terdapat pada seluruh bagian tanaman, namun banyak terdapat pada bagian daun. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan variasi pelarut dan konsentrasi dengan masa inkubasi 3x24 jam. Variasi pelarut yaitu dengan penggunaan n-heksan (non polar), etil asetat (semipolar) dan methanol (polar), sedangkan untuk variasi konsentrasi dengan perbedaan 5%, 10% dan 15%. Penelitian ini dilakukan dengan metode awal yaitu menggunakan metode maserasi, kemudian dilanjutkan dengan uji daya hambat dengan metode *well diffusion* (sumuran). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji terbaik diperoleh dengan penggunaan pelarut etil asetat dengan adanya zona bening pada ketiga variasi konsentrasi. Daya hambat terbaik terdapat pada konsentrasi yang tinggi yaitu 15% dengan rerata dalam tiga kali pengulangan yaitu 5 mm. Pada pelarut etil asetat diperoleh hasil bahwa konsentrasi 15% menunjukkan daya hambat, sedangkan pada konsentrasi 10% dan 5% tidak menunjukkan daya hambat. Pada pelarut n-heksan tidak menunjukkan adanya zona bening pada semua variasi konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelarut etil asetat mampu melarutkan senyawa saponin yang terkandung dalam ekstrak daun pakis giwang (*Euphorbia milii*), sedangkan pelarut n-heksan tidak mampu melarutkan senyawa saponin.

**Kata Kunci** : *Euphorbia milii*, *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA), well diffusion.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mencapai kondisi sehat maka kebersihan diri harus kita perhatikan. Jika kebiasaan bersih sudah ditanamkan sejak dini, maka dewasa akan bertingkah laku sesuai dengan norma kebersihan. Dengan menjaga kebersihan dengan baik akan rentan terkena penyakit yang terkena penyakit, baik itu ringan maupun berat. Penggunaan konsumsi antibiotik untuk menghilangkan rasa sakit yang tidak perlu (Sulawati Sri, 2012).

*Methicillin Resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) merupakan salah satu galur dari *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik metisillin. Bakteri MRSA tersebar di seluruh dunia. Biaya pengobatan untuk infeksi bakteri MRSA diperkirakan 6-10% lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pengobatan untuk bakteri *Staphylococcus* (Wise, 2003).

Bahaya dari resistensi bakteri dan biaya pengobatan yang cukup tinggi, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencari alternatif pengganti antibiotik dengan menggunakan obat tradisional yang berasal dari tanaman sebagai obat alternatif terhadap infeksi bakteri MRSA. Obat tradisional merupakan penunjang

dalam menjaga kesehatan yang mudah diperoleh serta harganya relatif murah, sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat (Aubrecht, 2003).

Resistensi timbul bila suatu antibiotik kehilangan kemampuannya secara efektif mengendalikan atau membasmi pertumbuhan bakteri, dengan kata lain bakteri mengalami dan terus berkembangbiak meskipun telah diberikan antibiotik dalam jumlah yang cukup untuk pengobatan. Beberapa faktor dapat menyebabkan

terjadinya peningkatan ini, diantaranya adalah salah pemilihan dan penggunaan dari agen antibiotik sehingga mengakibatkan mikroorganisme yang resisten. Hal ini akan menyebabkan peningkatan biaya perawatan (Mahomed, 2007).

Untuk mengatasi masalah resistensi bakteri diperlukan cara untuk mengatasi masalah infeksi yang cukup ampuh dalam mengatasi penyakit infeksi di kalangan masyarakat adalah dengan menggunakan tanaman obat alam pada umumnya sebenarnya yang baru. Obat-obat dapat ditemukan dari berbagai sumber bahan alam atau diciptakan secara sintesis dalam laboratorium (Alangaden, 1997).

Usaha untuk mencari sumber antimikroba baru, terutama yang berasal dari bahan alam atau tanaman indigenus yang terdapat di Indonesia terus dilakukan. Hal ini disebabkan karena pengobatan untuk infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme resisten lebih mahal dan sulit dilakukan sehingga diperlukan alternative lain untuk pengobatan (Ardiansyah dkk., 2008)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl, 16: 10-12 yaitu:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ  
وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ؕ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

"Dia-lah Yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang kamu gunakan untuk berkurban, dan sebagian dari air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, palem, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal." (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam tafsir al-Qur'an, dijelaskan bahwa ayat ini mengandung rincian argumentasi kekuasaan

Allah SWT dan tentang alam semesta. Diuraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang me-

Ayat 10 juga mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah agar mereka mensyukuri Allah

dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya, yakni air hujan untuk

dimanfaatkan bagi manusia. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian yang

lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Ayat 11 menjelaskan beberapa yang

paling bermanfaat dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya al-Qur'an,

dengan menyatakan bahwa Allah telah menumbuhkan tanaman-tanaman dengan

air hujan; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya





dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi (Shihab, 2002)

Berdasarkan ayat 10-12 mengingatkan manusia untuk selalu berfikir dan memanfaatkan apa yang Allah berikan di alam ini untuk di manfaatkan sebaik mungkin, karena semua itu terdapat tanda bagi orang yang berakal. Adanya

kesatuan langit dan bumi, pergantian musim, berkaitannya kehidupan di dunia dengan turunnya hujan, sanggah antar sesama manusia di bumi ini, dengan merenung atau berfikir akan akal akan hal-hal tersebut maka akan sampai kepada kesatuan. Kita tidak berdiri sendiri di alam ini, melainkan bahwa semua ini saling menyambung. Dengan demikian kita akan mengenal Allah melalui alam.

Di Indonesia lebih dari 3000 tumbuhan dan lebih dari 1000 jenis tumbuhan obat yang informasi tradisional, di mana ada beberapa simplisia atau digunakan dipakai (lebih dari 10 ton per tahun) oleh industri obat tradisional untuk memproduksi obat tradisional/obat bahan alam. Penggunaan obat herbal atau obat tradisional jauh lebih baik dibandingkan penggunaan antibiotik yang dapat menciptakan bakteri resisten (Badan POM, 2005).

Salah satu tanaman yang mempunyai khasiat obat adalah *Euphorbia milii* (Kaktus pakis giwang). Secara farmakologi *Euphorbia milii* mengandung beberapa gugus senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Batang tanaman

*Euphorbia milii* mengandung glikosida sianopora, glikosida antrakuinon, euphorbone, taraxerone, taraxenon, epifriedelanol, sterol, progesterone, karbohidrat, asam sitrat dan asam malat. Daunnya mengandung, peroksidase, saponin, kalsium oksalat, substansi peptic, dan amilum. Sementara itu getahnya mengandung euphorbol, euphol dan cycloartenol (Lingga, 2006).

Daun banyak digunakan sebagai obat bisul (*furuncle*), radang kulit bernanah (*piodermi*), tersiram air panas, luka bakar. Bisul merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Staphylococcus aureus* (Bakry fayes, 2011).

Senyawa glikosida banyak digunakan dalam pelarut non polar. Senyawa ini paling cocok untuk digunakan dengan memakai pelarut polar seperti etanol, methanol dan asam cuka dengan masing-masing konsentrasi 70% sampai 75%. Pemilihan pelarut tersebut akan memberikan efektifitas yang tinggi dalam melarutkan senyawa bahan alam dalam pelarut tersebut. Senyawa glikosida banyak digunakan dalam pelarut yang paling banyak digunakan dalam ekstraksi organik bahan alam karena dapat melarutkan golongan metabolit sekunder (Ganiswara, 1995).

Pada penelitian sebelumnya oleh I Made Agus Sunadi Putra telah disimpulkan bahwa *Euphorbia milii* mampu menghambat pertumbuhan MRSA dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Penelitian tersebut dilakukan dengan memberikan perbedaan konsentrasi yaitu 25%, 50%, 75% dan 100% serta membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi yang diberikan semakin besar pula daya hambat yang dihasilkan (Putra, 2012)

Berdasarkan hal tersebut dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kemampuan ekstrak daun *Euphorbia milii* untuk menghambat pertumbuhan MRSA secara in vitro pada konsentrasi dan pelarut yang berbeda.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan daya hambat antara ekstrak daun kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*) pada konsentrasi dan pelarut yang berbeda terhadap MRSA secara in vitro?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini dibatasi untuk mengetahui adanya daya hambat yang dihasilkan ekstrak *Euphorbia milii* terhadap MRSA serta perbedaan daya hambat yang dihasilkan pada konsentrasi dan pelarut yang berbeda pada masa inkubasi 5 jam.

### **D. Kajian Pustaka**

I Made Agus Sunadi Putra (2012) dalam penelitiannya yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Udayana Denpasar menunjukkan bahwa ekstrak daun kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*) mempunyai efek menghambat pertumbuhan *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) secara in vitro dengan menggunakan pelarut etanol 70% serta terdapat perbedaan daya hambat pada pemberian ekstrak daun kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*)

konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100%, yaitu diperoleh semakin besar konsentrasi semakin besar diameter zona hambat secara in vitro.

Pada penelitian Risa Nursanty dan Yunita (2012), mahasiswi di Jurusan FMIPA Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan judul penelitian *The Potent of Methanol Extracts of Cashew (Anacardium occidentale L) Against Methicillin Resisten Staphylococcus aureus (MRSA)* dengan perlakuan perbedaan

konsentrasi 10%, 20% dan 30% dengan pelarut methanol. Pada penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ekstrak batang dan daun jambu mete dapat menghambat MRSA. Uji fitokimia dilaporkan bahwa bagian batang jambu mete mengandung saponin dan tanin. Senyawa alkaloid, saponin, tanin dan fenol yang terdapat pada jambu mete memiliki kemampuan antimikroba.

Pada penelitian Kimia (2011) mahasiswa dari Universitas Airlangga melakukan uji antibakteri Ekstrak Kulit Buah dan Biji Manggis (*Garcinia mangostana*) pada Bakteri Penyebab Jerawat (*Staphylococcus epidermidis*) dengan Menggunakan Solven Etanol menyimpulkan bahwa senyawa saponin yang terdapat pada buah dan biji manggis mampu menghambat pertumbuhan bakteri tersebut dengan metode difusi kertas cakram (*disc diffusion method*).

Pada penelitian Noor dkk (2006) dengan judul Analisis Senyawa Kimia Sekunder dan Uji Daya Antibakteri Ekstrak Daun Tanjung (*Mimusops elengi L*)

terhadap Bakteri *Salmonella typhi* dan *Shigella boydii* di Balai Penelitian Veteriner Fakultas Farmasi ISTN Jakarta menyimpulkan bahwa senyawa saponin yang terdapat pada ekstrak daun tanjung mempunyai aktivitas aktibakteri.

### ***E. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan daya hambat antara ekstrak daun kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*) pada konsentrasi dan pelarut yang berbeda terhadap MRSA.

### ***F. Kegunaan Penelitian***

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna ilmu yang relevan sebagai referensi dalam mencari sumber antibiotik alami dari tanaman *Euphorbia milii*, khususnya dalam mengobati infeksi bakteri MRSA. Informasi dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai antibiotik.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Kaktus Pakis Giwang (Euphorbia milii)*

##### 1. Morfologi

*Euphorbia milii* merupakan tumbuhan semak dan tegak diatas tanah, yang tingginya dapat mencapai 180 cm. *Euphorbia milii* juga merupakan tumbuhan tahunan. *Euphorbia* tumbuh dekat dengan kastuba, sehingga *Euphorbia* juga adalah tanaman sukulenta. Tanaman ini tidak mau berbunga, tetapi akan memproduksi tunas samping. Umumnya tanaman ini ditanam sebagai tanaman pot, pekarangan dan taman-taman. Beberapa dibuat sebagai tanaman pagar dan dapat ditemukan di dataran rendah sampai ketinggian 3000 m di permukaan laut (Purwanto, 2006).

Secara morfologi, bentuk batang dari tanaman ini adalah persegi, warna coklat kelabu, berduri kasar, tajam, rapat dan bergetah. Daun tunggal, bertangkai pendek, berkumpul di ujung batang, bentuknya bundar telur sungsang, tepi rata dan berwarna hijau. Bunga majemuk, keluar dari ketiak daun, bentuk payung dengan warna yang berbeda-beda. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun. Buah kotak, bulat kecil berwarna putih kehijauan. Biji bulat kecil dan berwarna coklat (Dalimartha, 2003)

Tanaman ini memiliki beberapa varietas yang sangat memikat. Beberapa bisa dibedakan dari bentuk bunga atau daun yang berbeda seperti pada *Euphorbia milii* varietas *splendens* yang memiliki daun yang lebih lebar serta bunga yang lebih besar dari biasanya. Melalui campur tangan para petani bunga yang terampil muncullah berbagai jenis *euphorbia hibrida* yang tampil menarik (Kusumayani dan Andoko, 2004).



Gambar 2. Logo UIN Alauddin Makassar (Ingga, 2006)

2. Nama lain *Euphorbia*

Menurut Dalimartha (2003), beberapa nama lain dari *Euphorbia milii* adalah sebagai berikut:

- a. Nama umum : Kaktus pakis giwang
- b. Sulawesi Selatan : Bunga terkini
- c. Sulawesi Tenggara: Bunga kancing
- d. Jawa Tengah : Mahkota duri
- e. China : Tie hai tang

f. Inggris : Crown of thorns

g. Nama latin : *Euphorbia milii*

### 3. Kandungan, Sifat dan Khasiat

Tanaman ini memiliki beberapa bagian pada tubuhnya yang biasa dijadikan obat. Pada daun, batang dan bunga diketahui memiliki senyawa saponin dan tannin yang bersifat sebagai antimikroba pada beberapa bakteri.

Pada bunga juga diketahui mengandung senyawa flavonoid (Purwanto, 2006).

Sifat dan khasiat tanaman ini yaitu pahit, netral dan sedikit toksik. Bunga berfungsi untuk henti pendarahan (hemostatik), sedangkan batang dapat menghilangkan bengkak, antiradang dan antiseptic (Dalimartha, 2003).

### 4. Indikasi dan Cara Pemakaian

Hampir semua bagian tanaman ini dapat digunakan sebagai obat. Akan tetapi bagian yang digunakan harus segar. Beberapa penyakit yang dapat diobati yaitu pendarahan haid, bisul, radang kulit, luka bakar, kena air panas, hepatitis hingga tumor. Menurut Dalimartha (2003), beberapa indikasi dan cara pemakaian pada tanaman ini adalah:

- a. Bunga : *Funcional uterine bleeding* (Pendarahan menstruasi fungsional).
- b. Batang : Hepatitis.



c. Daun : Bisul, radang kulit bernanah (*Piodermi*), tersiram air panas, luka bakar.

d. Getah : Tumor

Cara Pemakaian:

a. *Functional Uterine Bleeding*: lima belas bunga segar, tambahkan daging, rebus sebagai sup.

b. Bisul dan radang kulit bernanah: Daun segar dilumatkan, tambahkan gula merah secukupnya, kompres pada tempat yang sakit.

c. Hepatistis: 9 – 15 g akar, rebus, kemudian airnya diminum.

#### 5. Klasifikasi

Sebagaimana halnya tumbuhan lain, *Euphorbia* juga diberi nama latin untuk mempermudah komunikasi. Nama ini berdasarkan *Binomial*

*Nomenclature* yang diperkenalkan oleh Carolus Lineaeus pada tahun 1750-an yang terdiri atas dua kata, yaitu *Euphorbia* dan *milii*. Sistem klasifikasi

*Euphorbia* adalah sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyta*

Kelas : *Dicotyledoneae*

Ordo : *Archichlamydeae*

Famili : *Euphorbiaceae*

Genus : *Euphorbia*

Spesies : *Euphorbia milii* (Dalimartha, 2003)

## B. *Staphylococcus aureus*

*Staphylococcus* merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat biasanya tersusun dalam bentuk menggerombol yang tidak teratur seperti anggur yang memungkinkan dirinya dapat terbagi dalam beberapa bentuk. *Staphylococcus* berwarna ungu dengan jumlah gerombol yang tidak beraturan (Brown dkk., 2005).

*Staphylococcus* bertambah dengan cepat pada beberapa tipe media dengan aktif melakukan metabolisme, terutama fermentasi karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam produk. Warnanya putih hingga kuning gelap. *Staphylococcus* cepat resisten terhadap beberapa antimikroba (Jawetz dkk, 2005).



Gambar 2.4 *Staphylococcus aureus* (Aubrecnt, 2003)

Klasifikasi *Staphylococcus aureus*:

Kingdom : *Protozoa*

Divisio : *Firmicutes*

Class : *Schyzomycetes*  
 Ordo : *Eubacteriales*  
 Family : *Micrococcaceae*  
 Genus : *Staphylococcus*  
 Species : *Staphylococcus aureus* (Gibson, 1996)

*Staphylococcus* tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di

bawah suasana aerobik atau mikroaerofilik. Tumbuh dengan cepat pada temperatur 20 - 35°C. Koloni pada media padat berbentuk bulat, lambat dan mengkilat. Saat diamati dengan mikroskop terlihat seperti anggur dengan gerombolan yang tidak beraturan (Gibson, 1996).

*Staphylococcus aureus* merupakan salah satu flora normal yang terdapat pada orang sehat, namun dapat menjadi patogen dan menimbulkan berbagai gejala yang membutuhkan pengobatan. *Staphylococcus aureus* dapat menimbulkan infeksi pada setiap jaringan atau alat tubuler dan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit bisul, postula, pemfigus neonatorum, hordeolum, mastitis, pneumonia, karbunkel, infeksi luka dan luka bakar, osteomielitis akut, abses perinefrik, keracunan makanan, dan enteritis (Gibson, 1996).

*Staphylococcus aureus* mempunyai 4 karakteristik khusus, yaitu faktor virulensi yang menyebabkan penyakit berat pada *normal host*, faktor differensiasi

yang menyebabkan penyakit yang berbeda pada sisi atau tempat berbeda, faktor persisten bakteri pada lingkungan dan manusia yang membawa gejala karier, dan faktor resistensi terhadap berbagai antibiotik yang sebelumnya masih efektif. *Staphylococcus aureus* menghasilkan katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen (Spicer, 2000)

Genom *Staphylococcus* terdiri dari kromosom melingkar ( $\pm 2800$  bp),

dengan prophages, plasmid, dan transposons (Holden *et al.*, 2004). Gen-gen yang akan menentukan virulensi dan resistensi terhadap antibiotik ditemukan pada kromosom ini. Lima puluh persen dari sel *staphylococcus* terdiri dari peptidoglikan. Peptidoglikan memiliki subunit polisakarida dari *N-acetylglucosamine* dan *N-acetylmuramic acid*. Rantai peptidoglikan ini akan terikat pada *N-acetyl* dan pentaglisin spesifik untuk *Staphylococcus aureus*. Beberapa faktor virulensi seperti endotoksin, yaitu merangsang pelepasan faktor komplemen, dan agregasi platelet. Perbedaan struktur *staphylococcus* memberikan kontribusi pada variasi kemampuannya untuk menimbulkan *disseminated intravascular coagulation* (DIC) (Lowy, 1998).

*Staphylococcus aureus* dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzim dan toksin, contohnya:

### 1. Katalase

Katalase adalah enzim yang berperan pada daya tahan bakteri terhadap proses fagositosis. Tes adanya aktivitas katalase menjadi pembeda genus *Staphylococcus* dari *Streptococcus* (Brooks *et al.*, 1995).

### 2. Koagulase

Enzim ini dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat, karena adanya faktor koagulasi aktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim tersebut. Esterase yang dihasilkan dapat meningkatkan aktivitas penggumpalan, sehingga fibrin pada permukaan sel bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan (Warsa, 1994).

### 3. Hemolisin

Hemolisin yang dihasilkan oleh bakteri dapat membentuk suatu zona hemolisis di sekitar koloni bakteri. Hemolisin pada *S. aureus* terdiri dari alfa hemolisin, beta hemolisin, dan delta hemolisin. Alfa hemolisin adalah toksin yang bertanggung jawab untuk membentuk zona hemolisis di sekitar koloni *S. aureus* pada medium agar darah. Toksin ini dapat menyebabkan nekrosis pada kulit hewan dan manusia. Beta hemolisin adalah toksin yang terutama dihasilkan *Staphylococcus* yang diisolasi dari hewan, yang menyebabkan lisis pada sel darah merah domba dan sapi. Sedangkan delta hemolisin adalah toksin yang dapat melisiskan sel darah merah manusia dan kelinci, tetapi efek lisisnya kurang terhadap sel darah merah domba (Warsa, 1994).



#### 4. Leukosidin

Toksin ini dapat mematikan sel darah putih pada beberapa hewan. Tetapi perannya dalam patogenesis pada manusia tidak jelas, karena *Staphylococcus* patogen tidak dapat mematikan sel-sel darah putih manusia dan dapat difagositosis (Jawetz *et al.*, 1995).

#### 5. Toksin eksfoliatif

Toksin ini mempunyai aktivitas proteolitik dan dapat melarutkan matriks mukopolisakarida sehingga menyebabkan pemisahan intraepithelial pada *Staphylococcus aureus* granulosum. Toksin eksfoliatif merupakan penyebab utama *Staphylococcus aureus* Skin Syndrome, yang ditandai dengan melepuhnya kulit (Jawetz *et al.*, 1995).

#### 6. Toksin Sindrom Syok

Sebagian besar toksin ini diisolasi dari penderita sindrom syok toksik mata. Pada manusia, toksin ini menyebabkan demam, gangguan multisistem organ dalam tubuh (Ryan, *et al.*, 1994).

#### 7. Enterotoksin

Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa di dalam usus. Enzim ini merupakan penyebab utama dalam keracunan makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein (Jawetz *et al.*, 1995).



### C. *Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)*

Antibiotik jenis *penicillin* dan *beta-lactam* lainnya merupakan agen yang paling sering digunakan dalam pengobatan infeksi *Staphylococcus aureus*. Penggunaan antibiotik dalam waktu yang lama akan memunculkan strain baru yang resisten terhadap antimikroba tersebut. Lebih dari 80% strain *Staphylococcus aureus* menghasilkan penicilinase, dan *penicillinase-stable*

*betalactam* seperti *methicillin*, *clavulanic acid*, dan *fluoxacillin* yang telah digunakan sebagai terapi utama dari infeksi *Staphylococcus aureus* selama lebih dari 35 tahun. Strain yang resisten terhadap *penicillin* dan *beta-lactam* ini muncul tidak lama setelah digunakan untuk pengobatan (Duckworth dkk., 1998).

*Methicillin* merupakan antibiotik *semisynthetic penicillin*, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959 (Kowalski dkk., 2005). *Methicillin* digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* resisten terhadap penicillin. Pada tahun 1961 telah dilaporkan adanya isolat *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap *methicillin*. Kemudian infeksi MRSA secara cepat menyebar di seluruh negara-negara Eropa, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan seluruh dunia selama berpuluh-puluh tahun serta menjadi infeksi yang *multidrug-resistant* (Samathkumar, 2007).

Antara tahun 1996-1999 dilaporkan bahwa 23 rumah sakit di Kanada terdapat 6% dari seluruh isolat *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap *methicillin*, dengan rerata 4,14 kasus MRSA per 1000 pasien yang dirawat dari



35% pasien dengan infeksi. Sebagian besar isolat diperoleh dari MRSA yang berasal dari ruang perawatan akut (72,6%), 7,2% diperoleh dari bangsal perawatan, 4,6% diperoleh dari komunitas masyarakat, dan sisanya (15,6%) tidak diketahui asalnya (*BC Center for Disease Control*, 2001). Selama tahun 2006 di Laboratorium Patologi Klinik RSUP (Rumah Sakit Umum Pusat) Dr. Sardjito Yogyakarta diperoleh 3729 isolat bakteri, yaitu 1128 dari spesimen darah, 825 dari spesimen urin, 957 dari spesimen sputum, dan 819 spesimen pus. Proporsi beberapa jenis bakteri Gram positif cukup signifikan. Spesies yang menonjol adalah *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus viridians*.

Gejala infeksi MRSA sering terjadi pada daerah kulit. Seperti luka atau bisul yang ringan. Tetapi bisa juga menjadi infeksi kulit serius atau menginfeksi luka bedah, luka operasi, kateter, atau saluran kemih. MRSA menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit, atau kontak pada medium yang terkontaminasi. MRSA banyak terjadi pada orang dengan daya tahan tubuh yang lemah seperti pasien-pasien di rumah sakit, homecare, dan layanan kesehatan lain. Bakteri ini hampir resisten terhadap semua jenis antibiotik, kecuali antibiotik tertentu dari golongan glikopeptida seperti vankomisin dan teikoplanin. Tetapi pada tahun 1998 telah ditemukan beberapa suku yang resisten terhadap vankomisin (Kirana dan Tjay, 2007).





#### ***D. Tinjauan Tentang Penyakit yang Disebabkan Oleh Staphylococcus aureus***

Infeksi kulit adalah jenis yang paling umum dari penyakit yang diproduksi oleh *Staphylococcus*. Infeksi *Staphylococcus* dari kulit dapat berkembang menjadi *impetigo* (pengerasan kulit dengan kulit) atau *cellulitis* (peradangan lapisan lebih dalam dari kulit dan jaringan ikat di bawah kulit, menyebabkan pembengkakan dan kemerahan). Dalam situasi yang jarang, komplikasi serius yang dikenal

sebagai *scalded skin syndrome* dapat berkembang. Pada wanita menyusui, bakteri ini dapat menyebabkan mastitis (payudara) atau abses payudara yang dapat mempengaruhi ASI (Munoz, 1998).

Ketika bakteri ini menyebar ke organ lain, sejumlah infeksi serius dapat terjadi. Organisme ke aliran darah yang dikenal sebagai bakteremia. Infeksi *Staphylococcus* terutama dapat menyerang orang-orang dengan luka-paru dan dapat menyebabkan pembentukan abses paru-paru dan dapat menyebabkan suppurasi jantung (*endokarditis*) dapat menyebabkan gigitan. *Staphylococcus* ke tulang dapat mengakibatkan peradangan parah tulang yang dikenal sebagai *osteomyelitis* (Warsa, 1994)

Infeksi *Staphylococcus* dapat ditularkan dari mana saja, mulai dari luka bernanah yang terinfeksi dan mengandung bakteri. Keracunan makanan *Staphylococcus* dapat menyebabkan radang usus seperti mual, muntah, diare, dan dehidrasi. Hal ini disebabkan oleh makan makanan yang terkontaminasi dengan racun yang dihasilkan oleh *Staphylococcus aureus*. Gejala biasanya berkembang

dalam waktu satu sampai enam jam setelah makan makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini biasanya berlangsung selama satu sampai tiga hari (Bagus, 2011).

*Furunkle* atau Bisul (bahasa Latin: *abscessus*) adalah sekumpulan nanah (neutrofil mati) yang telah terakumulasi di rongga di jaringan setelah terinfeksi sesuatu (umumnya karena bakteri atau parasit) atau barang asing (seperti luka tembakan/tikaman). Bisul adalah reaksi ketahanan dari jaringan untuk

menghindari menyebarkan barang asing di tubuh. Bisul merupakan peradangan yang terjadi pada daerah folikel rambut dan sekitarnya. Penyebab bisul yang paling sering dialami adalah infeksi bakteri *Staphylococcus aureus*, karena itu bisul dapat juga diartikan sebagai abses folikel rambut. Awalnya hanya folikel rambut yang terinfeksi, tetapi karena gesekan, iritasi, dan kurang bersihnya perawatan dapat menyebar ke jaringan sekitarnya, dan terjadilah bisul (Bagus, 2011).

Penyebabnya dapat tumbuh ke dalam luka, ataupun dikarenakan infeksi dalam kulit. Bisul biasanya berawal dari benjolan merah dan lunak di daerah kulit, yang lama kelamaan akan menjadi lebih keras. Kemudian di tengah benjolan tersebut akan terbentuk puncak berwarna putih yang akan memecah atau harus dikeluarkan oleh dokter (melalui prosedur bedah minor). Cairan yang keluar ini disebut nanah, berisi sel darah putih (yang dikirim tubuh untuk melawan bakteri yang menginfeksi daerah kulit tersebut), bakteri dan protein (Irianto, 2006).



### ***E. Antimikroba***

Antimikroba adalah senyawa-senyawa kimia kadar rendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Salah satu bahan antimikroba adalah antibiotik. Antimikroba dapat berupa senyawa kimia sintetis atau produk alami. Antimikroba sintetis dapat dihasilkan dengan membuat suatu senyawa yang sifatnya mirip dengan aslinya yang dibuat secara besar-besaran sedangkan yang alami didapatkan langsung dari organisme yang menghasilkan senyawa tersebut dengan melakukan proses fermentasi. Istilah-istilah yang berhubungan dengan antimikroba adalah bakteriosidal, bakteriostatik adalah sifat antibakteri yang menghambat perkembangbiakan bakteri, sedangkan bakterisida adalah antimikroba yang memiliki sifat mematikan bakteri. Kemampuan bakteriosidal dan bakteriostatik dalam hal tidak dapat dipulihkan lagi. (Jusuf dkk, 2010)

Zat aktif yang berasal dari tumbuhan jenis ekstrak tumbuhan diketahui dapat menghambat pertumbuhan organisme patogen maupun perusak makanan. Zat aktif tersebut dapat berasal dari bagian tumbuhan seperti biji, buah, rimpang, batang, daun, dan umbi. Kemampuan senyawa antimikroba untuk menghambat aktivitas pertumbuhan mikroba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, pH (keasaman), ketersediaan oksigen, dan interaksi/sinergi antara beberapa faktor tersebut (Ardiansyah, 2007).

Menurut Robinson (1995) senyawa antimikroba pada pangan dibedakan atas tiga golongan berdasarkan sumbernya, yaitu:



1. Senyawa antimikroba yang terdapat secara alami di dalam bahan pangan, misalnya asam pada buah-buahan dan beberapa senyawa pada rempah-rempah.
2. Bahan pengawet yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam pangan atau pangan olahan, misalnya: Nitrit untuk menghambat bakteri pada kornet sapi dan sosis, Garam natrium klorida untuk menghambat mikroba pada ikan asin,

Asam benzoat untuk menghambat kapang dan jamur pada selai dan sari buah, Asam cuka (asam asetat) untuk menghambat mikroba pada asinan, Asam propionat untuk menghambat kapang pada roti dan keju, Sulfat untuk menghambat kapang pada kacang-kacangan kering dan anggur.

3. Senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh mikroba selama proses fermentasi pangan. Asam laktat ( $C_3H_7O_2$ ), dan bakteriosin adalah senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat selama pembuatan produk-produk susu seperti yogurt, yakult, susu asidofilus, dan lain-lain. Bahan pengawet pikel dari sayur-sayuran seperti sayur asin.

Menurut Volk dkk. (1989) mekanisme kerja penghambatan senyawa antimikroba terdiri dari:

1. Mengganggu pembentukan dinding sel

Mekanisme ini disebabkan karena adanya akumulasi komponen lipofilat yang terdapat pada dinding atau membran sel sehingga menyebabkan

perubahan komposisi penyusun dinding sel. Terjadinya akumulasi senyawa antimikroba dipengaruhi oleh bentuk tak terdisosiasi. Pada konsentrasi rendah molekul-molekul phenol yang terdapat pada minyak thyme kebanyakan berbentuk tak terdisosiasi, lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah hidrofobik membran protein, dan dapat melarut baik pada fase lipid dari membran bakteri.



Komponen bioaktif dapat mengganggu dan mempengaruhi integritas membran sitoplasma, yang dapat mengakibatkan kebocoran materi intraseluler, seperti senyawa phenol dapat mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan deaturasi protein, menghambat pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat, dan menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel.

### 3. Menginaktivasi enzim

Mekanisme yang terjadi menunjukkan bahwa kerja enzim akan terganggu dalam mempertahankan kelangsungan aktivitas mikroba, sehingga mengakibatkan enzim akan memerlukan energi dalam jumlah besar untuk mempertahankan kelangsungan aktivitasnya. Akibatnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan menjadi berkurang sehingga aktivitas mikroba menjadi terhambat atau jika kondisi ini berlangsung lama akan mengakibatkan

pertumbuhan mikroba terhenti (aktif). Efek senyawa yang dapat menghambat kerja enzim jika mempunyai spesifitas yang tinggi akan membentuk kompleks yang menyusun struktur enzim dan dapat menghambat kerja enzim antimikroba. Corner (1995) melaporkan bahwa pada konsentrasi 0,001 M alisin (senyawa aktif dari bawang putih) dapat menghambat aktivitas enzim sulfhidril. Minyak oleoresin yang dihasilkan dari cengkeh, thyme, dan oregano dapat menghambat pertumbuhan mikroba, yaitu dengan menghambat perasi sel, dan sporulasi khamir dan kapang.



#### 4. Menginaktivasi fungsi material genetik

Komponen bioaktif dapat mengganggu pembentukan asam nukleat (RNA dan DNA), menyebabkan terganggunya transfer informasi genetik yang selanjutnya akan menginaktivasi atau merusak materi genetik sehingga terganggunya proses pembelahan sel untuk pembiakan.

Menurut Ansel (1989), uji resistensi bakteri oleh zat antimikroba dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

## 1. Metode Difusi Agar

Metoda difusi agar ini dicetuskan oleh Kirby-Bauer sehingga dapat pula disebut sebagai metoda Kirby-Bauer yang menjadikan diameter daya hambat yang terbentuk sebagai tolak ukur resisten atau tidaknya suatu mikroorganisme terhadap zat antimikroba. Metoda ini dilakukan pada medium padat yang diinokulasikan mikroorganisme atau patogen ke

dalamnya dan meletakkan cakram kertas yang telah mengandung zat antimikroba pada medium. Setelah 24 jam inkubasi, diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar cakram kertas tersebut menunjukkan resistensi mikroorganisme diinkubasikan selama 24 jam. Pada medium yang menunjukkan zona hambat menunjukkan bahwa bakteri tersebut bersifat resisten.

## 2. Metode Well Diffusion

Metoda ini dilakukan dengan membuat sumuran dengan diameter 10 mm pada medium yang kemudian diinokulasikan mikroorganismenya dan memasukkan zat antimikroba sebanyak 100µm ke dalam sumuran. Diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran diukur setelah mikroorganisme diinkubasikan selama 24 jam. Bagian sumuran yang terdapat zona bening menunjukkan bahwa zat tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme.



### 3. *Minimum Inhibitory Concentration (MIC) Test*

Metoda ini merupakan metoda yang akurat untuk mengetahui sensitivitas mikroorganisme terhadap pengaruh zat antimikroba. MIC adalah jumlah bahan antimikroba terkecil yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Metoda MIC dapat disebut pula *Broth Dilution Method*. Pada konsentrasi zat antimikroba yang paling efektif dapat diketahui dari

tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme pada medium setelah diinkubasikan.

### 4. Metoda Otomatis

Metode otomatis merupakan metoda yang dapat dengan cepat menentukan sensitivitas bahan antimikroba. Pada metode ini, digunakan alat khusus untuk mengukur pertumbuhan mikroorganisme yang dilihat dari kelambatan media cair. Jika zat antimikroba yang diujikan tidak efektif maka mikroorganisme akan tetap melakukan perbanyakannya pada media tersebut.



### 5. Metoda Antibiogram

Pada metode ini dilakukan pemilihan zat antimikroba untuk menghambat suatu mikroorganisme. Berbagai zat antimikroba diujikan pada suatu mikroorganisme, sehingga didapatkan salah satu bahan yang paling efektif dalam menghambat mikroorganisme tersebut. Antibiogram ini dapat meramalkan seberapa besar sensitivitas mikroorganisme terhadap suatu zat



antimikroba. Zat antimikroba yang efektif dapat dijadikan sebagai pilihan bahan yang tepat untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme sasaran.

#### ***F. Ekstraksi***

Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya (Mahmud, 2010).

Ekstraksi bertujuan untuk melarutkan senyawa-senyawa yang terdapat dalam jaringan tanaman ke dalam pelarut yang sesuai untuk proses ekstraksi tersebut.

Ekstraksi ini didasarkan pada perbedaan kelarutan komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan zat tersebut terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut. Ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam senyawa non polar (Dinda, 2008).

Menurut Dinda (2008) dalam memilih pelarut terdapat beberapa keadaan dalam menentukan tujuan ekstraksi.

1. Senyawa kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari tumbuhan. Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan dengan kebutuhan pemakai.
2. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya terpenoid, alkaloid, flavanoid atau saponin, meskipun struktur kimia

sebetulnya dari senyawa ini bahkan keberadaannya belum diketahui. Hal ini diikuti dengan uji kimia atau kromatografik yang sesuai untuk kelompok senyawa kimia tersebut.

3. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara apapun. Situasi ini (utamanya dalam program skrining) dapat timbul jika tujuannya adalah untuk menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau

didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa dengan aktivitas biologis.

Menurut Departemen Kesehatan (1989), jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan adalah:

1. Ekstraksi Cara Dingin

Metoda ini artinya menggunakan suhu rendah selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang dimaksud rusak karena pemanasan. Cara ini dilakukan dengan cara maserasi dan perkolasi.

2. Ekstraksi Cara Panas

Metode ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Metodanya adalah refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa.

Menurut Mahmud (2010), macam-macam metode ekstraksi yaitu:

1. Maserasi

Maserasi istilah aslinya adalah *macerare* (bahasal latin, artinya merendam), merupakan sediaan cair yang dibuat dengan cara direndam

menggunakan pelarut selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dengan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar

sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

Teorinya, ketika serbuk simplisia yang direndam dalam pelarut yang dipilih, maka ketika direndam dalam pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif dan karena ada pertemuan antara zat aktif dan pelarut ini akan membentuk larutan (zat aktifnya larut dalam penyari) sehingga zat aktif tersebut akhirnya akan menembus dinding sel yang mengandung zat aktif, zat aktif yang berada di luar sel belum terisi zat aktif (0%) akibat adanya perbedaan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel ini akan muncul gaya difusi, larutan yang terpekat akan didesak menuju keluar berusaha mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat aktif di dalam dan di luar sel. Proses keseimbangan ini akan berhenti, setelah terjadi keseimbangan konsentrasi. Dalam kondisi ini, proses ekstraksi dinyatakan selesai, maka zat aktif di dalam dan di luar sel akan memiliki konsentrasi yang sama, yaitu masing-masing 50%.



## 2. Metode Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu percolator. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan

melarutkan zat aktif sel-sel yang halus sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah disebabkan oleh gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapilaritas yang berlawanan untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi adalah ketahanan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adsorpsi, katalisis, daya geseran (friksi).

## 3. Metode Refluks

Salah satu metode penyarian organik adalah refluks, metode ini digunakan apabila digunakan pelarut yang volatil. Pada kondisi ini jika dilakukan refluks pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode refluks adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N<sub>2</sub> diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif.



#### 4. Metode Soxhlet

Soxhletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan

membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa tersebut akan dididihkan lagi dan dididihkan lagi dengan rotary evaporator sehingga pelarut tersebut akan dididihkan lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau menguap. Untuk isolasi suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan metode ini.



G. *Tinjauan Beberapa Pelarut*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

Kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman akan diperoleh melalui cara ekstraksi yang digunakan. Berikut adalah proses ekstraksi sangat berpengaruh karena menentukan jenis senyawa yang akan ditarik oleh pelarut tersebut. Jenis pelarut berkaitan dengan polaritas dari pelarut tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses ekstraksi adalah senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Berkaitan dengan polaritas dari pelarut, menurut Ganiswara (1995), terdapat tiga golongan pelarut yaitu:

### 1. Pelarut polar

Memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, cocok untuk mengekstrak senyawa-senyawa polar dari tanaman seperti fenol, flavonoid, saponin, serta senyawa glikosida lainnya. Pelarut polar cenderung universal digunakan karena biasanya walaupun polar namun tetap dapat menyari senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran lebih rendah. Adapun contoh pelarut polar

yaitu air, etanol, methanol, dll.

### 2. Pelarut semipolar

Pelarut semipolar memiliki tingkat kepolaran yang lebih rendah dari pelarut polar. Pelarut jenis ini memperoleh senyawa-senyawa semipolar dari tumbuhan. Contoh pelarut jenis ini yaitu aseton, etil asetat, kloroform, dll.

### 3. Pelarut nonpolar

Pelarut nonpolar memiliki tingkat kepolaran yang sangat rendah. Pelarut jenis ini baik digunakan untuk senyawa-senyawa nonpolar. Contoh pelarut nonpolar yang tidak larut dalam pelarut polar.

Senyawa ini baik digunakan untuk mengekstrak berbagai jenis minyak.

Contoh pelarut ini adalah eter dan n-heksan.

Proses ekstraksi didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Kelarutan suatu komponen tergantung pada derajat kepolarannya. Tingkat polaritas pelarut dapat ditentukan dari nilai konstanta dielektrik pelarut. Urutan tingkat kepolaran beberapa pelarut organik berdasarkan nilai konstanta dielektriknya dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:



Tabel 2.1 Urutan tingkat kepolaran beberapa pelarut organik berdasarkan nilai konstanta dielektrik (Ansel, 1989)

No	Pelarut	Rumus Kimia	Titik Didih	Konstanta Dielektrik
1	Heksan	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> - CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	69 <sup>0</sup> C	2,0
2	Benzena	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	80 <sup>0</sup> C	2,3
3	Toluena	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> -CH <sub>3</sub>	111 <sup>0</sup> C	2,4
4	Dietil eter	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> -O-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	35 <sup>0</sup> C	4,3
5	Kloroform	CHCl <sub>3</sub>	61 <sup>0</sup> C	4,8
6	Etil asetat	CH <sub>3</sub> -CO <sub>2</sub> -C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	77 <sup>0</sup> C	6,0
7	n-Butanol	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -OH	118 <sup>0</sup> C	18
8	n Propanol	C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -OH	97 <sup>0</sup> C	20
9	Etanol	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	79 <sup>0</sup> C	30
10	Metanol	CH <sub>3</sub> -OH	65 <sup>0</sup> C	33
11	Air	H-O-H	100 <sup>0</sup> C	80

## H. Senyawa Saponin

### 1. Pengertian Saponin

Saponin adalah suatu glikosida alamiah yang terikat dengan steroid atau triterpena. Saponin mempunyai aktifitas farmakologi yang cukup luas diantaranya meliputi: immunomodulator, anti tumor, anti inflamasi, antivirus, anti jamur, dapat membunuh kerang-kerangan, hipoglikemik, dan efek

hypokholesterol. Saponin juga mempunyai sifat bermacam-macam, misalnya: terasa manis, ada yang dapat berbentuk buih, dapat menstabilkan emulsi, dapat menyedimentasi. Dalam pemakaiannya saponin bisa dipakai untuk banyak tujuan, misalnya dipakai untuk membuat minuman beralkohol, dalam industri kosmetik, membuat obat-obatan, dan dipakai sebagai obat (Sari, 2010; dan Yustina, 2009).

Pada umumnya saponin adalah tumbuhan. Namanya diambil dari kata Saponaria, akar dari famili Caryophyllaceae. Saponin juga bisa didapatkan dalam beberapa famili tumbuhan yang lain (Barile, 2007).

### 2. Struktur Saponin

Saponin terdiri dari Sapogenin yaitu bagian yang bebas dari Glikosida yang disebut juga Aglycone. Sapogenin mengikat sakarida yang panjangnya bervariasi dari monosakarida hingga mencapai 11 unit monosakarida. Sapogenin (Aglycone) bisa berbentuk triterpenoid ataupun steroid. Sapogenin yang bersifat lipofilik serta sakarida yang hidrofilik menyebabkan saponin



bersifat amfifilik (*surfactant properties*). Dengan demikian Saponin dapat membentuk busa dan merusak membran sel karena bisa membentuk ikatan dengan lipida dari membran sel (Hamzah, 2009).

### 3. Distribusi Saponin

Saponin bisa ditemukan pada tanaman liar maupun tanaman peliharaan, pada binatang laut tingkat rendah (*lower marine animals*), dalam beberapa

bakteri, namun jarang ditemukan pada binatang tingkat tinggi (*higher animals*). Saponin Tritape, dapat dijumpai dalam lebih dari 500 spesies tanaman seperti, kedondong, kacang, bunga matahari, ginseng, alfalfa, quillaja, spinach, *Asparagus* dan banyak lagi. Sedangkan Saponin Steroid terdapat dalam 85 spesies dari Genus *Agave*, *Discorea* and *Yucca*, dan dalam 56 Genus *Asparagus*, *Asparagus*, ginseng, dan oat. Dalam saponin berikat protein, saponin bisa ditemukan dalam bagian tumbuhan yang berikat protein. Tipe dan macam saponin sangat banyak faktor, misalnya spesies, umur tanaman, dan bagian tanaman. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh cuaca, macam tanah, sinar matahari, tempat bercocok tanam dan banyak lagi. Dalam satu spesies mungkin mengandung lebih dari satu macam saponin (Rostinawati, 2008).

### 4. Aktivitas Biologi Saponin

Saponin mempunyai aktivitas biologi yang beragam. Aktivitas biologi ini dipengaruhi oleh kelas Aglycone, gugus polar pada Aglycone, macam

karbohidrat yang terikat pada Aglycone, posisi terikatnya pada Aglycone, bahkan orientasi Saponin setelah mengikat membran sel juga ikut mempengaruhinya (Barile, 2007). Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan senyawa ini menurut Wijayakusuma (1992) antara lain:

a. Aktivitas hemolisis

Saponin dapat menyebabkan sel darah merah pecah (lisis). Ini

disebabkan karena Saponin dapat berikatan dengan kolesterol dari membran sel. Akibatnya membran sel pecah kalau aglycone dibuang. Makin banyak karbohidrat yang terikat pada Aglycone makin kecil daya hemolisisnya. Saponin Steroid lebih besar dari Saponin Triterpenoid.

b. Mempengaruhi

Saponin dapat mempengaruhi produksi dari cytokine seperti interleukin yang mempunyai efek immunostimulan. Saponin juga telah terbukti meningkatkan respon imun melalui immunisasi oral.

c. Saponin sebagai anti kanker

Saponin Ginsenosides mempunyai efek anti tumor dengan menghambat penyebaran melalui pembuluh darah dengan mekanisme supresi inducer dalam sel endotel sehingga mencegah pelekatan (*adhering*), invasi, dan metastasis. Dioscin, suatu Saponin steroid dan

Aglycone diosgenin mempunyai efek anti tumor dengan menghentikan siklus sel.

d. Efek antioksidan

Satu kelas Saponin yang terdapat dalam soya (group B soya saponin) mempunyai efek anti oksidan dan radikal scavenger dengan membentuk hidroperoxida sebagai senyawa perantara.

e. Efek anti rematik

Yang termasuk saponin A misalnya Hedera genin glycoside dari kaldu saponin A menghambat "LPS-induced iNOS", menghambat "CO<sub>2</sub> synthase" dan menghambat produksi NO, PG E2 dan Th<sub>1</sub> cytokines. Saponin dapat menghambat timbulnya edem, proses aglutinasi

f. Menurunkan glukosa darah

Dengan lambung (escins, calendasaponins aktivitas seperti insulin, dapat menghambat lipolisis, meningkatkan glukosa up take oleh sel adipose.

g. Mempunyai aktivitas anti virus

Menghambat replikasi virus HIV-1, dengan menghambat aktivitas protease ( triterpenoid sapogenin asam oleonolat) dengan membunuh virus (virucidal).

### I. *Pengobatan dalam Pandangan Al Quran dan Hadis*

Islam memerintahkan agar dengan kemampuan akalnya manusia mengamati kelakuan alam, melalui observasi yang kritis dan sistematis sehingga akan terkumpul data penelitian yang empirik. Dari pernyataan ini, akal manusia akan bermanfaat penuh, untuk mengoptimalkan daya pikirnya. Karena Allah SWT. tidak menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali ciptaan itu

bermanfaat. Dengan demikian, manusia selalu berdzikir dan bertafakkur kepada Allah, maka akal manusia akan bermanfaat baginya. Beberapa ayat atau hadist yang relevan dengan

1. Surah Ali Imran, 3



terjemannya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Departemen Agama, 2007).

Pada ayat tersebut dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa orang yang berakal adalah orang yang melakukan dua hal yaitu *tazakkur* yakni mengingat Allah, dengan ucapan, dan atau hati dalam situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

berbaring, dan *tafakkur*, memikirkan ciptaan Allah, yakni kejadian di alam semesta. Dengan melakukan dua hal tersebut ia sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat (*tazakkur*) dan berfikir (*tafakkur*), yaitu mengetahui, memahami, menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta, Allah SWT. Muhammad Abduh mengatakan bahwa dengan merenungkan

penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam akan membawa manusia menyaksikan kekuasaan Allah, yaitu adanya aturan yang dibuat-Nya serta karunia-Nya yang banyak manfaat yang terdapat di dalamnya (Shihab, 2002)

Ayat diatas mengandung makna bahwa orang-orang yang beriman akan terus menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mencari tahu tentang seberapa besar ciptaan Allah SWT. Manusia diciptakan dengan akal sehatnya agar mampu memuji kebesaran Allah SWT.

Dengan ayat tersebut ada ciptaan Allah SWT yang sia-sia dan tanpa tujuan, dari benda hidup atau mati, dari yang kecil hingga besar memiliki manfaat tersendiri. Manusia diciptakan dengan pemikiran yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Orang-orang yang beriman akan selalu mengingat Allah SWT, baring, duduk, berdiri, sehat, sakit serta dalam keadaan apapun akan selalu mengingat betapa Besar, Kuasa-Nya Allah dengan apa yang diciptakan-Nya.



## 2. Surah Al-Isra', 17: 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

*“Dan Kami turunkan dari al-Quran suatu yang menjadi obat (penawar) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.”*

(Departemen Agama, 2007).

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Zâdul Ma'âd mengatakan bahwa:

“Al-Quran adalah obat (penawar) dari seluruh penyakit hati dan jasmani demikian pula obat dari seluruh penyakit dunia. Dan tidaklah tiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menemukannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengan Al-Quran, maka penyakit yang dideritanya dengan penuh kejujuran dan keimanan akan sembuh. Al-Quran adalah obat yang sempurna dan keyakinan yang kokoh dan mantap akan menyembuhkan penyakit apa pun akan menjadi tawar untuk penyakit apa pun. Al-Quran adalah obat-Nya. Bagaimana mungkin penyakit tersebut mampu menghadapi kehendak Dzat yang memiliki langit dan bumi (Allah) yang telah menciptakannya. Jika diturunkan kepada gunung maka ia akan menghancurkannya. Atau diturunkan kepada bumi maka ia akan membelahnya. Maka tidak satu pun jenis penyakit baik penyakit hati maupun jasmani melainkan dalam al-Quran ada cara yang membimbing untuk berobat dan

dan menghilangkan sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya (Al-Jauziah, 1990).

Dari Jabir Bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Terjemahnya:

“Setiap penyakit ada obatnya. Jika ada obat yang sesuai untuk suatu penyakit, maka dengan seijin Allah penyakit itu akan sembuh”. (HR. Muslim).

Beliau juga bersabda:



Terjemahnya:

“Allah tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan penyembuh”. (HR. Muslim).

Ibnu Qayyim al-Jauziah dalam kitab Zâdul Ma’âd mengatakan bahwa Allah telah menentang penyakit-penyakit yang memperhatikan penciptaan hal-hal yang berlawanan dengan yang lain, yang satu menolak yang lain, yang satu bercampur dengan yang lain, tentu dia akan mengetahui kesempurnaan ketentuan dan hidayah Allah SWT (Al-Jauziah, 1990).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang akan mengakibatkan seseorang akan memperoleh kesembuhan dari setiap penyakit dan rahmat dari Allah adalah “iman”. Semakin kokoh iman seseorang, maka dengan media/sarana al-Quran, seseorang akan lebih bisa berharap untuk mendapatkan kesembuhan dari setiap penyakit dan rahmat dari Allah. Dan sebaliknya, dengan

keimanan yang lemah, seseorang akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kesembuhan dari semua penyakit yang menimpanya dan harapan untuk memperoleh rahmat dari Allah SWT. Sebagai makhluk yang berakal kita hendaklah menghayati, memperhatikan, menyelidiki serta menggunakan seluruh isi alam ciptaan Allah ini dengan berpanduan kepada ilmu-ilmu-Nya untuk kita menajamkan akal kita.

Sesungguhnya akal begitu mulia dan besar sekali peranannya kepada kita dalam usaha untuk mengengadai diri kita kepada Allah swt. Jika akal dapat dikendalikan dengan baik, maka kita akan dapat berakal kepada kita. Jika tidak, maka sia-sialah Allah mengabdikan akal kepada kita. Bila kita tidak dapat memanfaatkan akal yang berakal, maka hidup kita tak ubahlah seperti makhluk lain yang nalar dan pemahaman di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akal diistilahkan sebagai bekal manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia yang berakal dalam jalur yang benar. Sebagaimana kita ketahui, Allah tetap memberi batasan-batasan terhadap akal.




#### ***J. Hipotesis***

Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu ekstrak daun *Euphorbia milii* mampu memberikan pengaruh berupa daya hambat yang dihasilkan terhadap bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA) dengan perbedaan konsentrasi ekstrak dan pelarut yang diberikan.



### K. Kerangka Pikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pengukuran daya hambat melalui Metode *well diffusion*. Penelitian ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu untuk ekstraksi daun kaktus basis giwang (*Euphorbia milii*) dilakukan di Laboratorium Farmasi Fakultas Sains dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, sedangkan untuk uji antibakteri dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian ini menghasilkan hasil berupa penelitian kuantitatif eksperimental dengan menggunakan prinsip penelitian laboratorium dengan menggunakan metode *well diffusion*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 - Desember 2015.

#### ***C. Variabel Penelitian***

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas terdiri dari tiga yaitu konsentrasi ekstrak *Euphorbia milii* yang berbeda (5%, 10% dan 15%), 4 pelarut berbeda yang diberikan (n-heksan, etil asetat dan metanol), serta 3 masa inkubasi (24 jam, 48 jam dan 72

jam), sedangkan variabel terikat yaitu daya hambat yang dihasilkan ekstrak *Euphorbia milii* terhadap MRSA.

#### **D. Definisi Operasional Variabel**

Adapun definisi operasional variabel antara lain:

1. Daya hambat adalah kemampuan ekstrak daun kaktus pakis giwang pada konsentrasi ekstrak berbeda yaitu 5%, 10% dan 15% serta pelarut berbeda

yaitu n-heksan, etil asetat dan metanol dalam menghambat pertumbuhan MRSA pada media *Natur* pada suhu inkubasi 3x24 jam pada suhu

37° C dengan metode *well diffusion*.

2. Daun kaktus pakis (*Euphorbia milii*) merupakan tanaman yang mengandung senyawa saponin dan alkaloid yang mampu menghambat aktivitas pertumbuhan MRSA. Daun kaktus pakis merupakan daun dari

*Euphorbia milii* varietas *pakis giwang* menggunakan daun dewasa.

3. *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (*M. aureus*) adalah *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik, termasuk *penicillinase-resistant penicillins* (*methicillin, oxacillin, nafcillin*) dan *cephalosporin*.

#### **E. Instrumen Penelitian**

1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf, batang pengaduk, cawan petri, labu *Erlenmeyer*, gelas ukur, vortex, inkubator, mikropipet, ose bulat, oven, pinset, rak tabung, *rotary evaporator*, spoit 1 ml dan spoit 10 ml, timbangan analitik, jangka sorong, kompor gas, lampu

spiritus, *Laminar Air Flaw* (LAF), lemari pengering sampel, tabung reaksi, toples kaca dan vial.

## 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*), Medium *Natrium Agar*, kultur murni bakteri MRSA, n-heksan, etil asetat, methanol, kertas saring, kapas, plastik tahan

panas, kertas label dan aluminium foil

## F. Prosedur Kerja

### 1. Sterilisasi Alat dan Bahan

Semua alat yang digunakan pada penelitian ini akan melalui proses sterilisasi yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan. Khusus alat-alat gelas disterilkan dengan autoclave pada suhu 121°C selama 2 jam, alat berupa ose dan pinset disterilkan dengan cara dipanaskan diatas api spiritus sedangkan alat yang mempunyai permukaan yang tidak tahan panas disterilkan dengan menggunakan alkohol 96%.

### 2. Pembuatan Ekstrak Kaktus Pakis Giwang (*Euphorbia milii*)

Sampel penelitian yang digunakan adalah kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*) varietas *splendens* yang diperoleh di sekitaran kompleks Minasaupa, Makassar. Sampel *Euphorbia milii* yang telah dikumpulkan ditimbang sebanyak 290 g kemudian dikeringkan dengan lemari pengering sampel sampai kering. Sampel kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*) yang



telah kering digerus kemudian dimasukkan ke dalam toples kaca kemudian ditambahkan pelarut n-heksan sebanyak 2 liter lalu ditutup menggunakan aluminium foil. Larutan tersebut dibiarkan (dimaserasi) selama 72 jam. Setelah itu, larutan disaring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian, hasil saringan tersebut diuapkan pelarutnya dengan menggunakan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak kasar. Serbuk daun hasil penyaringan dilarutkan

kembali dengan pelarut etil asetat sebanyak 1 liter dan dimaserasi kembali selama 72 jam. Larutan tersebut disaring dengan kertas saring dan diekstraksi dengan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak kasar. Ekstrak kasar tersebut diuapkan dengan menggunakan methanol 1 liter dan dimaserasi kembali selama 72 jam. Proses maserasi setiap pelarut dilakukan dengan cara yang sama. Ekstrak kasar yang diperoleh kemudian dikumpulkan dalam wadah yang bersih dan diuapkan dalam rotavapor dengan suhu 40°C kemudian didinginkan hingga memadat. Pada penelitian ini diberikan 3 macam konsentrasi ekstrak daun *Euphorbia milii* yaitu 5%, 10%, dan 15%. Adapun cara menentukan konsentrasi ekstrak daun *Euphorbia milii* adalah sebagai berikut:

Konsentrasi 5% = 0,5 gram ekstrak daun *Euphorbia milii* dalam labu ukur 10 ml kemudian ditambahkan aquadest hingga mencapai 10 ml.

Konsentrasi 10% = 0,10 gram ekstrak daun *Euphorbia milii* dalam labu ukur 10 ml kemudian ditambahkan aquadest hingga mencapai 10 ml.

Konsentrasi 15% = 0,15 gram ekstrak daun *Euphorbia milii* dalam labu ukur 10 ml kemudian ditambahkan aquadest hingga mencapai 10 ml



Untuk ekstrak n-heksan dan methanol ditambahkan *tween* 80 sebanyak 0,2 ml untuk melarutkannya kemudian dicukupkan hingga mencapai 10 ml. sedangkan untuk ekstrak etil asetat hanya dilarutkan dengan menggunakan aquadest kemudian dicukupkan pula hingga 10 ml.

### 3. Pembuatan Media *Natrium Agar*

Menimbang *Natrium Agar* 28 g, kemudian larutkan dalam 1 liter

aquadest dengan pemanasan dan diaduk secara konstan dan disterilkan dalam autoklaf pada 121 atm selama 15 menit. Setelah itu diamkan hingga dingin. Tuangkan ke dalam cawan petri dengan diameter 10cm. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Media yang menunjukkan zona hambat digunakan sebagai media uji terhadap MRSA. Media yang menunjukkan zona hambat diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam.

### 4. Pengujian koloni

#### a. Uji Bacitracin

Uji bacitracin dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar darah, kemudian pada media tersebut tempatkan bacitracin disk. Biakkan pada incubator pada suhu 36-37°C selama 24 jam. Amati zona hambat di sekitar bacitracin disk. Bakteri *Staphylococcus* resisten atau tidak menunjukkan zona hambat pada uji bacitracin.



b. Uji Cefoxitine

Menyediakan media perbenihan *Mueller Hinton Agar*. Membuat suspensi bakteri yang akan diuji dalam aquadest steril dengan tingkat kekeruhan yang sesuai dengan standar McFarland 0,5, setara dengan jumlah bakteri 10<sup>8</sup> CFU (*Colony Forming Unit*) pada tiap satu milimeter suspensi bakteri. Menggoreskan suspensi bakteri tersebut pada media

perbenihan yang disediakan dengan mengapuskannya menggunakan kapas lidi steril. Biarkan setiap petri dish mengering selama lima menit.

Meletakkan cakram antibiotik 30ug pada permukaan media.

Tekan dengan perlahan cakram tersebut dengan menggunakan kapas lidi steril untuk memastikan cakram melekat pada permukaan agar.

Jangan menelentahkan antibiotik ke dalam agar.

Menginkubasikan petri dish tersebut selama 24 jam. Mengamati zona hambat di sekitar cakram antibiotik. Interpretasi: sensitif bila zona hambat  $\leq 14$  mm,

intermediet bila zona hambat  $\geq 14$  mm, resisten bila zona hambat  $\geq 18$  mm.

5. Membuat suspensi MRSA setara dengan 10<sup>8</sup>CFU/ml

Membuat larutan NaCl 0,9%. Memasukkan koloni MRSA yang telah diuji biokimia tadi ke dalam tabung yang berisi NaCl 0,9%. Menyetarakan kekeruhan larutan NaCl 0,9% + MRSA dengan 0,5McFarland.

6. Pengujian Ekstrak Daun Kaktus Pakis Giwang terhadap MRSA.

Menggunakan lidi kapas steril., MRSA dioleskan merata pada media *Natrium Agar* pada cawan petri. Membuat media *Natrium Agar* sebanyak 9 buah. Memasukkan ekstrak ke dalam sumuran. Media uji tersebut kemudian diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam kemudian diamati dengan pengukuran zona hambat menggunakan jangka sorong, setelah itu diinkubasi kembali hingga 48 jam pada suhu 37°C hingga 72 jam dengan suhu yang sama

untuk mengamati perubahan pada perbedaan masa inkubasinya.

7. Penilaian kemampuan resistensi bakteri kaktus pakis giwang (*Euphorbia milii*)

terhadap pertumbuhan

Untuk membuat ekstrak daun kaktus pakis

giwang (*Euphorbia milii*) terhadap pertumbuhan MRSA dilakukan dengan

cara mengukur zona hambat menggunakan jangka sorong. Pengukuran zona

bening pada cawan petri menggunakan jangka sorong.

Tabel 3.1. Kriteria kualitatif (Anty dan Yunita, 2012)

Zona Benj	Peterangan
0	Resisten
< 5	Lemah
6 - 10	Intermedit
11-20	Sensitif
21-30	Sangat sensitif



## G. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan model penyajian dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. Hasil penelitian diperoleh dari pengukuran zona hambat terlebih dahulu dalam tiga kali ulangan yang ditunjukkan dalam bentuk tabel. Kemudian perbedaan yang dihasilkan pada masing-masing variabel akan ditunjukkan pada grafik. Untuk menunjukkan hasil penelitian ditunjukkan gambar pada lampiran.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

Penentuan besarnya rata-rata diameter zona hambat ekstrak daun pakis giwang (*Euphorbia milii*) terhadap bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* dengan beberapa pelarut dan konsentrasi yang berbeda dilakukan dengan mengukur zona bening yang terbentuk sekitar sumuran. Adapun hasil pengukuran zona bening dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Zona hambat ekstrak daun pakis giwang terhadap MRSA

Perlakuan				Rerata (mm)
A0B1C1				30
A0B1C2	30		30	30
A0B1C3	30			30
A0B2C1	30			30
A0B2C2	30			30
A0B2C3	30			30
A0B3C1	30	30	30	30
A0B3C2	30	30	30	30
A0B3C3	30	30	30	30
A1B1C1	0	0	0	0
A1B1C2	0	0	0	0
A1B1C3	0	0	0	0
A1B2C1	0	0	0	0
A1B2C2	0	0	0	0
A1B2C3	0	0	0	0
A1B3C1	0	0	0	0
A1B3C2	0	0	0	0

A1B3C3	0	0	0	0
A2B1C1	0	0	0	0
A2B1C2	0	0	0	0
A2B1C3	0	0	0	0
A2B2C1	15	0	0	5
A2B2C2	0	0	0	0
A2B2C3	0	0	0	0
A2B3C1	15	13	0	9.333333333
A2B3C2	0	0	0	0
A2B3C3	0	0	0	0
A3B1C1	0	0	17	5.666666667
A3B1C2	0	0	16	5.333333333
A3B1C3	0	0	14	4.666666667
A3B2C1	0	0	17	14.66666667
A3B2C2	0	0	16	5.333333333
A3B2C3	0	0	5	5
A3B3C1	0	0	15	15
A3B3C2	0	0	6	6
A3B3C3	0	0	5	5.333333333

Keterangan:

A0= Kontrol positif (Inang) B0= Konsentrasi 5%

A1= N-Heksan B1= Konsentrasi 10%

A2= Etil Asetat

B3= Konsentrasi 15%

A3= Metanol

C1= Masa inkubasi 24 jam

C2= Masa inkubasi 48 jam


C3= Masa inkubasi 72 jam



Perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak *E. coli* terhadap bakteri MRSA dengan variasi pelarut, konsentrasi dan masa inkubasi dapat dilihat pada grafik 4.1, grafik 4.2 dan grafik 4.3.



Gambar 4.1. Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak *E. coli* dengan pelarut N-Heksan terhadap bakteri MRSA dengan variasi konsentrasi dan masa inkubasi.



Gambar 4.2. Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak *E. milii* dengan pelarut etil asetat terhadap pertumbuhan bakteri MRSA dengan variasi konsentrasi dan masa inkubasi.



Gambar 4.3. Grafik perbandingan rata-rata diameter zona hambat ekstrak *E. milii* dengan pelarut metanol terhadap pertumbuhan bakteri MRSA dengan variasi konsentrasi dan masa inkubasi.

### B. Pembahasan

Senyawa dapat dikatakan bersifat antimikroba jika mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tanaman pakis giwang (*Euphorbia milii*) telah dilaporkan untuk tujuan medis sebagai agen *molluscicidal* ampuh digunakan dalam kontrol *schistosomiasis* dan alternatif yang menjanjikan untuk niklosamida (Moro

dkk., 2013). Daun *E. milii* diketahui mengandung senyawa saponin yang bersifat anti mikroba. Senyawa saponin merupakan senyawa polar yang hanya mampu larut dalam pelarut polar. Senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba dengan merusak membran sitoplasma sehingga menyebabkan sel mati (Robinson dkk, 2005).

Pada penelitian terdahulu oleh Herawati (2004), menunjukkan bahwa getah dari tanaman *Euphorbia milii* Des Moulins ternyata mengandung senyawa terpenoid dan saponin yang mempunyai efek toksik. Pada penelitian Putra (2012), juga dikatakan bahwa senyawa saponin yang ada pada daun *Euphorbia milii* mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja antibakteri ada lima di antaranya, menghambat pertumbuhan mikroba, menghambat sintesis dinding sel mikroba, mengganggu permeabilitas membran sel mikroba, menghambat sintesis protein sel mikroba dan menghancurkan asam nukleat sel mikroba (Caniswara, 1995).



Pada penelitian ini, metode maserasi, dimana maserasi dilakukan dengan pelarut yang berbeda, yaitu n-hexana, etil asetat dan methanol. Ketiga pelarut tersebut memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Berdasarkan tingkat kepolaran dengan nilai konstanta dielektriknya, methanol merupakan pelarut yang paling polar diantara ketiganya. Sifat kepolaran suatu pelarut sangat menentukan senyawa apa yang akan ditarik karena pada dasarnya prinsip maserasi adalah senyawa polar akan larut dalam pelarut polar. Menurut Guenther (1987), syarat pelarut yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Harus dapat melarutkan semua zat antimikroba pada daun tanaman dengan cepat dan

sempurna, dan sedikit mungkin melarutkan bahan seperti: lilin, pigmen, serta pelarut harus bersifat selektif. (2) Harus mempunyai titik didih yang cukup rendah, agar pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi. (3) Pelarut tidak boleh larut dalam air dan (4) Tidak mudah terbakar.

1. Pengaruh Ekstrak Pakis Giwang (*Euphorbia milii*) dengan Pelarut N-Heksan Terhadap Bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA)



Salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh N-Heksan sebagai pelarut adalah mampu melarutkan zat yang terdapat pada tanaman yang diketahui mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Ketaren (1985) pemilihan n-heksana sebagai pelarut dalam ekstraksi karena bersifat stabil dan mudah menguap, selektif dalam melarutkan lemak. Untuk meng ekstraksi sejumlah kecil lilin serta dapat mengekstrak zat yang terdapat pada tanaman. Proses pemurnian minyak bertujuan untuk memisahkan minyak atsiri dengan pelarut sehingga dihasilkan minyak atsiri yang murni. Dalam beberapa penelitian (Sari, 2017), kegunaan n-heksan sebagai pelarut harus diperhatikan. N-heksan dengan konsentrasi tinggi dapat menimbulkan toksisitas jangka panjang. Hal yang harus diperhatikan juga adalah pelarut yang digunakan tidak akan membentuk metabolit beracun. Toksisitas beberapa pelarut relatif rendah. Jika konsentrasi terlalu tinggi, maka akan menghasilkan keadaan euforia ringan, diikuti oleh mengantuk dengan sakit kepala dan mual. Toksisitas jangka panjang beberapa pelarut berbahaya pada manusia terkenal kegagalan system saraf perifer (Departemen Pendidikan RI, 1989).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengamatan selama masa inkubasi 3 hari, pemberian ekstrak pakis giwang dengan pelarut N-Heksan tidak menimbulkan adanya daya hambat yang dihasilkan. Dari hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa pemberian konsentrasi yang berbeda dengan tiga kali pengulangan tidak memberikan efek daya hambat pada bakteri MRSA.

Tidak terbentuknya zona bening (zona hambat) di sekeliling sumuran disebabkan oleh karena tidak adanya zat yang mampu menghambat bakteri MRSA. Sebagaimana yang diketahui bahwa daun pakis giwang mengandung peroksidase, katekinase, amilase, lipase, pepsinase, selulase, zat besi, substansi peptik, dan anilum. Zat yang mampu menghambat MRSA dalam daun pakis giwang adalah senyawa saponin. Senyawa saponin merupakan senyawa polar yang hanya dapat larut dalam pelarut polar. Methyl alcohol sendiri merupakan pelarut non polar yang hanya dapat melarutkan senyawa polar dan juga minyak.

Penelitian ini membuktikan bahwa senyawa polar yang terdapat dalam daun tidak mampu menghambat MRSA. Kemampuan pelarut N-heksan melarutkan senyawa pada tanaman dipengaruhi oleh tingkat kepolaran yang dimiliki. Berdasarkan nilai indeks kepolaran, pelarut ini hanya memiliki 0,0 sedangkan berdasarkan nilai konstanta dielektriknya memiliki 2,0. Rendahnya indeks kepolaran yang dimiliki menunjukkan bahwa pelarut N-heksan sangat selektif dalam melarutkan senyawa pada tanaman.

Hal ini ditegaskan pada penelitian sebelumnya oleh Dianursanti (2014) bahwa n-heksan digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan zat-zat seperti



minyak, lipid dan protein. Pelarut n-heksan dapat melarutkan zat minyak secara sempurna, namun tidak mampu melarutkan senyawa yang memiliki kepolaran lebih tinggi.

Pada penelitian sebelumnya juga oleh Ashraf dkk., (2015), telah dikatakan bahwa ekstrak heksan telah menjadi agen antimikroba yang terbaik dalam pengujian kadar logam. Ekstrak heksana menunjukkan aktivitas ampuh dalam

semua uji untuk penilaian sitotoksik. Hal ini membuktikan bahwa n-heksan dapat digunakan sebagai pelarut untuk mengekstraksi senyawa-senyawa antimikroba tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak heksan pada daun zat yang mampu menghambat pertumbuhan *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus*. Hal ini sesuai dengan teori bahwa ekstrak daun memiliki kandungan senyawa saponin yang merupakan senyawa polar dan tidak larut dalam pelarut organik non polar (Harwood dan Moody, 1989).

## 2. Pengaruh Ekstrak Daun *E. milii* Terhadap Bakteri *Methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA)

Ekstraksi dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang diinginkan dalam daun *E. milii*. Pemilihan pelarut yang tepat dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut diantaranya adalah selektivitas, toksisitas, kepolaran dan kemudahan untuk diuapkan (Hamzah, 2009). Etil asetat merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cairan tak berwarna, memiliki aroma khas. Etil asetat diproduksi dalam skala besar sebagai pelarut dan merupakan pelarut dengan toksisitas rendah

yang bersifat semi polar sehingga dapat menarik senyawa yang bersifat polar maupun nonpolar dari daun *E. milii* (Tensiska, 2007)

Hasil uji daya hambat menunjukkan bahwa ekstrak daun *E. milii* dengan pelarut etil asetat mampu menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Pada gambar 4.2 grafik tersebut menunjukkan bahwa pada konsentrasi 5% tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Sedangkan pada konsentrasi 10%,

ekstrak *E. milii* mampu menghambat bakteri MRSA sebesar 5 mm, kemudian pada konsentrasi 15% ekstrak mampu menghambat bakteri MRSA dengan rata-rata 9 mm dalam 3 kali ulangan. Uji difusi cakram pada inokulasi tidak menunjukkan adanya hambatan pada inkubasi 24 jam. Adanya zona bening di sekitar sumuran hanya ditunjukkan pada inkubasi 24 jam. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat senyawa yang larut dalam pelarut etil asetat.

Telah diketahui bahwa pelarut etil asetat digolongkan ke dalam pelarut semipolar, artinya memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa polar dan non polar. Adanya zona hambat menunjukkan bahwa pelarut etil asetat mampu melarutkan senyawa saponin. Seperti halnya pelarut N-heksan, kemampuan etil asetat dalam melarutkan senyawa pada tanaman dipengaruhi oleh tingkat polaritas pelarut. Urutan tingkat kepolaran beberapa pelarut organik dapat ditentukan berdasarkan indeks kepolaran ataupun nilai konstanta dielektrik pelarut. Etil asetat memiliki nilai indeks kepolaran 4,4 sedangkan nilai konstanta dielektriknya 6,0. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat kepolaran, baik dilihat dari indeks kepolaran maupun nilai konstanta dielektriknya, etil asetat



lebih tinggi, artinya pelarut etil asetat lebih kuat dalam melarutkan senyawa dibandingkan N-heksan.

Pada penelitian ini zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak etil asetat masih tergolong lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan etil asetat dalam melarutkan senyawa saponin masih tergolong lemah pula. Lemahnya zona hambat yang dihasilkan membuktikan bahwa komposisi senyawa saponin dalam

ekstrak masih kurang. Pada perbandingan masa inkubasi yang diberikan juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa saponin yang terdapat pada ekstrak tersebut masih tergolong lemah pelarut etil asetat bersifat bakteriostatik.

Penelitian ini semakin membuktikan bahwa senyawa saponin dalam daun *E. milii* mampu menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Pada penelitian Samsumaharto dan Yustina (2019) membuktikan bahwa ekstrak etil asetat daun Rosella (*Hibiscus* sp.) mampu menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa saponin serta flavonoid yang terkandung dalam ekstrak tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri MRSA.



### 3. Pengaruh Ekstrak Pakis Giwang (*Euphorbia milii*) dengan Pelarut Metanol Terhadap Bakteri *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus* (MRSA)

Jenis bahan sumber dan komponen yang akan diekstrak mempengaruhi besar kecilnya hambatan dalam ekstraksi. Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai daya melarutkan yang tinggi terhadap zat yang diekstraksi. Daya melarutkan yang tinggi berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang diekstraksi. Hal yang perlu diperhatikan dalam

proses ekstraksi adalah senyawa yang memiliki kepolaran yang sama akan lebih mudah tertarik atau terlarut dengan pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama. Methanol merupakan senyawa polar yang memiliki tingkat kepolaran yang tinggi, baik digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang polar dari tanaman. Pelarut polar cenderung universal digunakan karena biasanya walaupun polar, tetap dapat menyari senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran lebih rendah (Sylvia, 2008).

Hasil penelitian mengenai pengaruh variasi konsentrasi dan masa inkubasi memberi daya hambat pada zona bening tertinggi ditunjukkan pada konsentrasi 15% dengan zona bening sebesar 15 mm, kemudian disusul oleh konsentrasi 10% sebesar 4 mm dan konsentrasi 5% sebesar 6 mm. Untuk variasi masa inkubasi menunjukkan adanya penurunan zona bening setelah masa inkubasi. Konsentrasi 10% dan konsentrasi 15% menunjukkan adanya penurunan zona bening pada masa inkubasi 48 jam, yaitu dengan zona bening sebesar 4 mm dan 6 mm. Konsentrasi 5% pula dengan konsentrasi 5% memberikan penurunan daya hambat sebesar 5 mm. Pada masa inkubasi 72 jam, masing-masing konsentrasi mempertahankan zona hambat. Adanya zona hambat menunjukkan bahwa terdapat senyawa saponin dalam ekstrak methanol.

Telah diketahui bahwa pelarut methanol merupakan pelarut yang sangat polar. Kemampuannya dalam mengekstrak disebabkan oleh tingkat kepolaran yang sangat tinggi. Berdasarkan indeks polaritas, methanol memiliki nilai 5,1 sedangkan berdasarkan nilai konstanta dielektriknya 33. Hal ini menunjukkan

perbedaan yang sangat jauh dari kedua pelarut sebelumnya. Tingkat kepolaran yang tinggi menyebabkan kuatnya methanol dalam melarutkan komponen senyawa pada tanaman.

Berdasarkan hasil zona hambat yang dikategorikan sensitive, membuktikan bahwa komponen senyawa saponin dalam ekstrak methanol lebih banyak dibandingkan dengan ekstrak etil asetat sebelumnya. Hal ini menunjukkan

bahwa methanol lebih kuat dalam mengekstraksi senyawa saponin dibandingkan kedua pelarut sebelumnya. Adapun zona hambat yang dihasilkan pula menunjukkan bahwa ekstrak methanol dan ketiga konsentrasi mampu memberikan efek yang berbeda-beda pada bakteri uji. Kubasi juga memberikan zona hambat namun semakain hari semakin kecil ukuran yang dihasilkan. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak methanol memiliki efek bakteriostatik.

Metanol hanya dapat digunakan untuk zat tertentu. Umumnya pelarut yang baik untuk alkaloid, glikosida, saponin, jenis-jenis gom, gula dan albumin. Methanol merupakan pelarut yang banyak digunakan untuk proses ekstraksi, karena memiliki tingkat kepolaran yang tinggi sehingga untuk jenis ekstraksi tanaman sangat baik menggunakannya. Menurut Fraizer dan Westhoff (1998), efektifitas antimikroba dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: (1) jenis, jumlah, umur dan latar belakang kehidupan mikroba; (2) konsentrasi zat antimikroba; (3) suhu dan waktu; (4) sifat fisika-kimia substrat (pH, kadar asin, tegangan permukaan, jenis dan jumlah zat terlarut dan senyawa lainnya).



Pada penelitian Narendra dkk., (2015) menggunakan ekstrak bunga *E. milii* dengan menggunakan beberapa pelarut yaitu heksan, etil asetat, aseton, methanol and air, kemudian diujikan pada beberapa bakteri Gram positif termasuk *Staphylococcus aureus*, menunjukkan hasil bahwa pelarut n-heksan, etil asetat dan methanol memberikan pengaruh yang tidak jauh beda. Hal ini karena komponen yang diekstrak pada bagian bunga *E. milii* merupakan senyawa fenol

yang mempunyai tingkat keparahan rendah.

Bakteri MRSA merupakan salah satu *Staphylococcus aureus* yang telah resisten terhadap beberapa antibiotik. *Staphylococcus aureus* sendiri merupakan bakteri Gram positif yang memiliki struktur dinding sel yang sederhana. Volk (1989), menjelaskan bahwa struktur dinding sel bakteri Gram positif lebih sederhana sehingga membran sel mikroba untuk dapat masuk ke dalam sel. Sensitivitas suatu bakteri terhadap substrat dipengaruhi oleh lapisan yang menyusun dinding sel. Dinding sel akan semakin kuat sehingga sulit untuk rusak untuk merusaknya.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus yang disebabkan oleh MRSA telah meningkat dan menyebabkan penyakit yang lebih berat. Hal ini membuktikan bahwa bakteri ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerang tubuh. MRSA mampu memproduksi protein pengikat penicillin sehingga saat penggunaan antibiotic tersebut tidak akan mampu menghambatnya. *Staphylococcus aureus* memang merupakan bakteri Gram positif dan tidak terlalu rumit untuk beberapa zat antimikroba untuk menghambat pertumbuhannya,

namun jika sudah resisten terhadap beberapa antibiotic akan sulit menemukan senyawa antimikroba alami yang dapat menghambatnya (Louise dkk., 2010).

Pada penelitian ini ditambahkan *tween* 80 untuk melarutkan beberapa pelarut seperti n-heksan dan methanol. *Tween* 80 terutama digunakan dalam kosmetik dan produk kecantikan sebagai surfaktan dan emulsifier karena kemampuannya untuk membantu bahan-bahan lain larut dalam pelarut di mana

mereka biasanya tidak akan mampu melarutkan, khususnya dalam kasus minyak dalam air (Ketaren, 1985). Hal ini juga dapat membantu mengurangi tegangan permukaan zat yang perawatannya terlihat dalam berbagai formula, termasuk penyegar kulit, produk perawatan kulit, produk pembersih kulit, shampo, dan bubuk arang, serta pasta gigi.

Penggunaan koefisien ini juga sangat mempengaruhi hasil uji daya hambat bakteri Gram-positif yang digunakan yaitu Linezolid.

Linezolid adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati infeksi serius yang disebabkan oleh Gram-positif yang resisten terhadap antibiotik lainnya.

Linezolid aktif terhadap bakteri Gram-positif yang menyebabkan penyakit, termasuk *streptokokus*, resisten *vankomisin enterococci* (VRE), dan *methicillin-resistant Staphylococcus aureus* (MRSA). Penggunaan utama adalah infeksi pada kulit dan pneumonia meskipun mungkin menjadi digunakan untuk berbagai infeksi lainnya (Brown dkk., 2005).



## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pelarut yang paling baik digunakan dalam ekstraksi daun pakis giwang (*Euphorbia milii*) adalah methanol. Sedangkan untuk variasi konsentrasi, besar daya hambat tertinggi yang diperoleh adalah pada konsentrasi 15% pada masa inkubasi 24 jam. Sedangkan pada pelarut etil asetat konsentrasi yang memberikan daya hambat tertinggi adalah konsentrasi 10% dan 15%. Pada pelarut n-heksan, tidak memberikan daya hambat. Hal ini menunjukkan bahwa pelarut tersebut tidak menghambat aktivitas enzim saponin yang terkandung dalam daun *Euphorbia milii*.

#### *B. Saran*

Pada penelitian ini, disarankan untuk menggunakan media kultur seperti kertas saring (KLT) untuk lebih memperkuat kandungan pada ekstrak daun, jadi diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan uji tersebut.



## KEPUSTAKAAN

Aisha Ashraf, Raja Adil Sarfraz, Muhammad Abid Rashid, Muhammad Shahid. *Antioxidant, antimicrobial, antitumor, and cytotoxic activities of an important medicinal plant (Euphorbia royleana) from Pakistan*. Pakistan: Department of Chemistry, University of Agriculture, Faisalabad, 2015

Al-Jauziyyah Ibnu Qayyim. *Mukhtashar Zadul-Ma'ad*. Terj. Suhardi, Kathur. *Zaadul Ma'ad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Alangaden, G.J. *Overview of Antimicrobial Resistance National Foundation For Infection Diseases*. [http://www.nfid.org/publications/id\\_Archive/antimicrobial](http://www.nfid.org/publications/id_Archive/antimicrobial)

Ansel, Howard C. *Pengantar Farmakologi Dasar*. Jakarta: UI Press, 1989.

Ardiansyah. *Senyawa Antimikroba Tumbuhan*. Bagian Kedua. 2007. <http://kompas.com>

Ardiansyah, Lilis Nuraida. *Antimicrobial Activity of Be'untas (Pluchea Indica L.) Leaves with Different Concentration of the Activity at Different Concentration*. *Journal of Food Veterinary Science*. 2008; 1(1): 1-5.

Aubrecht, E. *What is Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus and How do we manage it*. 2003. (<http://www.wound.sa.edu.au/aug97pre.html>). (23 Agustus 2015).

Badan Pom Republik Indonesia. *“Standarisasi Ekstrak Tumbuhan Obat Indonesia Salah Satu Tahapan Penting Dalam Pengembangan Obat Asli Indonesia”*. InfoPOM Vol. 6. No. 4: 1-5

Bakry, Fayes. Mohamed, Raga. *Impact of Euphorbia milii Latex on Infectivity of Schistosoma mansoni Larvar Stages to Their Host*. *Journal of Evolutionary Biology Research*. 2011. <http://www.academicjournals.org/jebr> (20 Juni 2015)



Barile, *et al.* Saponins from *Allium minutiflorum* with Antifungal Activity. *Phytochemistry*. 2007. Vol. 68: 596 – 603.

BC Centre for Disease Control. *British Columbia Guidelines for Control of Antibiotic Resistant Organisms (AROs) [Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)]*, 2001.

Brooks, G. F., Butel, J. S. dan Morse, S. A. *Medical Microbiology*. New York: Mc Graw Hill, 2008.

Brown, D.F.J., Edwards, D.L., Hawkey, P.M., Morrison, D., Ridgway, G.L., Townner, K.J., Wren, M.W.D. *Guidelines for the laboratory diagnosis and susceptibility testing of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)*. *J Antimicrob Chemother* 2001; 48: 1018.

Dilimarta. *Atlas Tumbuhan Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara, 2003.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*. Bandung: Syaamil Quran, 2007.

Departemen Kesehatan RI. *Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengawasan Obat dan Makanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal

Departemen Kesehatan RI. *Farmakologi dan Terapi IV*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 131/Kep. Men/P/1989 tentang Pengawasan Obat dan Makanan*. Jakarta: Penerbit Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan, 1989.

Devanaboyina Narendra, A. Mounisha, B. Bhavani, G.Sireesha, K.Vijaya Kamari and M. Sri Ramavenkata Reddy. *Antimicrobial studies on flowers of Euphorbia Milii*. India: Department of Pharmacognosy & Phytochemistry, 2015, 7 (3):196-204.

Dianursanti, Pijar Religia, Anondho Wijanarko. *Utilization of n-Hexane as Co Solvent to Increase Biodiesel Yield on Direct Transesterification Reaction from Marine Microalgae*. Indonesia: Laboratory of Bioprocess Engineering, Department of Chemical Engineering, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI, 2014.

Dinda. 2008. *Ekstraksi*. Available from: <http://medicafarma.blogspot.com/2008/11/ekstraksi.html> (26 oktober 2015)

Duckworth, G., Cookson, B., Humphreys, H., Heathcock, R. *Revised Methicillin resistant Staphylococcus aureus Infection Control Guideline for Hospitals, Report of a combined working party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy, the Hospital Infection Society and the Infection Control Nurses Association. Brit Soc Antimicrob Chemother.* 1998.

Dwiatmojo, Bagus. *Deteksi Strain Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) Pada Unit Ambulans RSUP Dr. Hasan Sadikin.* Bandung, 2011. Hal 48–49.

El PIC. *Apakah organisme multibakterial dan bagaimana timbulnya?* in *Essential Practices in Infection Control*, 2:1-6.

El right, M.C., Robinson, D., Grundmann, H., Spratt, B.G. *The evolutionary history of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA).* PNAS, 2

Frazier, W. C. dan D. C. *Food Microbiology.* 4<sup>th</sup> edition. Mc graw-hill international edition, 1996.

Ganiswara, S.G. *Farmakologi dan Toksikologi.* Baru, 1995.

Gibson, J.M. *Modern Medicines for Nurses.* Terj. I.K.G. Soma Prasada. *Mikrobiologi untuk Perawat.* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1996.

Guenther, E. *Minyak Atsiri Jilid 1.* Jakarta: UI Press , 1987.

Hamzah, Baharudin. *Fitokimia 1.* Palu: STIFA PM, 2009

Hapsari, B. dan Budiana, N.S. *Euphorbia milii.* Jakarta: Penebar Swadaya, 2007.

Haryana, A. *Obat Herbal dan Obat Tradisional Bisul.* 2011. <http://www.tanaman-obat.com/jual-obat-herbal/259-obat-herbal-dan-obat-tradisional-bisul> (23 Agustus 2015).

Holden, M.T.G., Feil, E. J., Lindsay, J. A., Peacock, S. J., Day, N. J. P., Enright, M. C. *Complete Genomes Of Two Clinical Staphylococcus aureus Strains: Evidence for The Rapid Evolution of Virulensi and Drug Resistence*. PNAS, 2004.

Irianto Koes. *Mikrobiologi Menguk Dunia Mikroorganisme* Jilid 1. Bandung: CV. Yrama Widya, 2006.

Jawetz, M., Adelberg's. *Medical Microbiology*. Terj. *Mikrobiologi Kedokteran*. Huriwati Hartanto dkk. Edisi 23. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2005.

Karsinah, Lucky H.M., Suharto, dan Marliastuti H.W. *Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 1994.

Kowalski, T.J., Berbari, B.F. *Microbiology, Treatment, and Prevention of Community-Acquired Infections*. Mayo Clinic, 2005.

Lawrence, G. H. M. *Taxonomy of Vascular Plant*. New York: The Macmillan Co, 1959.

Lingga, L. *Sukses Menanam & Merawat Euphorbia milii*. Jakarta: 2006. Hal. 14-16.

L.P. Moro, H. Cabral, L. Juliano, L. Juliano, G.O. Bonilla-Rodriguez. *Cloning, Mapping and N-terminal sequence of miflin from the latex of Euphorbia milii*. Brazil: State University of Sao Paulo, Sao José do Rio Preto, 2013.

Louise Kruse Johansen, Dorte Frees, Bent Aalbek, Janne Koch, Tine Iburg, Ole Lerberg Nielsen, Pall Skuli Leifsson and Henrik Elvang Jensen. *A porcine model of acute, haematogenous, localized osteomyelitis due to Staphylococcus aureus na pathomorphological study*. Denmark: Department of Veterinary Disease Biology, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen Frederiksberg, 2010.

Lowy, F.D. *Staphylococcus Aureus Infections*. USA: NEJM, 1998.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 2 dan 7

Maharani Krisnina, Supriyanto Agus dan Nurhayati Tri. “Uji Antibakteri Ekstrak Kulit Buah dan Biji Manggis (*Garcinia mangostana*) pada Bakteri Penyebab Jerawat (*Staphylococcus epidermidis*) dengan Menggunakan Solven Etanol”, dalam *Jurnal Ilmiah Biologi*. Vol. 2 No. 3: 48-57.

Mahmud, R. 2010. *Prinsip Ekstraksi Maserasi*. Available from: <http://kumpulilmu.blogspot.com/2010/04/prinsip-ekstraksi-maserasi.html> (26 oktober 2015)

Noor,S., Poeloengan, M. “Analisis Senyawa Kimia Sekunder dan Uji Daya Antibakteri Ekstrak Daun Tanjung (*Mimusops elengi* L) terhadap *Salmonella typhi* dan *Shigella boydii*. *Medisمنتو* vol. 1 No. 1

Nirsanty Risa dan Yunita. “The Effect of Ethanol Extracts of Cashew (*Anacardium occidentale* L) Against *Staphylococcus aureus* (MRSA)”. *Jurnal Natural* Vol. 12

Purwanto, A. W. *Euphorbia*. *Penelitian dan Seminar Berbunga* Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Putra, I Made Agus Sunaryo. “Uji Daya Antibakteri Ekstrak Kaktus Pakis G'wang (*Euphorbia milii*) terhadap Bakteri *Streptococcus pneumoniae* dan *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro*”. *Testis* Makassar: Universitas Udayana, 2012.

Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi*. Makassar: Alauddin Makassar, 2008.

Retnoningrum, D.S. *Mekanisme Resistensi Antibiotika pada Bakteri*. Bandung: Farmasi ITB, 1998.

Rostinawati, T. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol dan Ekstrak Air Kelopak Bunga Rosela (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap *Mycobacterium tuberculosis* Galur Labkes-026 (*Multi Drug Resisten*) dan *Mycobacterium tuberculosis* Galur H39Rv secara *In Vitro*. *Penelitian Mandiri*. Bandung: Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran, Jatinangoro, 2008.

Ryan, K.J., J.J. Champoux, S. Falkow, J.J. Plonde, W.L. Drew, F.C. Neidhardt, and C.G. Roy. *Medical Microbiology An Introduction to Infectious Diseases*. 3rd ed. Connecticut: Appleton&Lange, 1994.



Safaatul Munawaroh, Prima Astuti handayani. *Ekstraksi Minyak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix D.C.) Dengan Pelarut Etanol dan N-Heksana*. Semarang: Jurnal Kompetensi Teknik, 2010. Vol. 2 No. 1

Sampathkumar, P. *Methicillin Resisten Staphylococcus aureus (MRSA): The Latest Health Scare*. USA: Mayo Clin Proc, 2007.

Samsumaharto, R.A., dan Yustina, E.N.I.S., *Uji aktivitas antibakteri Ekstrak n-Heksan , Etil asetat, dan Etanol 70% Daun Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Staphylococcus aureus*. Jurnal Penelitian. Surakarta : Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi, 2009.

Stenis, Van, J.G.G.C. *Flora..* Jakarta: Penerbit Pradaya Paramitha, 1997.

Soedijono, B. dan Rudi H. *...Tampil Menawan*. Jakarta: Penerbit Swadaya, 2007.

Tensiska, M. Dan S. O. *...Pelarut Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasan dan Tempas Tahu*. Jurnal Penelitian, 2007.

Volk, Wesley A dan Wheeler *...Mikrobiologi Dasar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1989.

Wardhani, L. K. Dan N. *...Ekstrak Etil Asetat Daun Binahong (Annona ...)*

Wijayakusuma, H. *Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992.

Wijisaksono, D.P. *Terapi Optional "baru" untuk Infeksi Gram (+): Peran Vancomycin*. Dalam: M. Sja'bani, S. Nurdjanah, K. Widayati, M.R. Ikhsan, A. Widiatmoko (eds.) Naskah lengkap Pertemuan Ilmiah Tahunan IX Ilmu Penyakit Dalam FK UGM. Yogyakarta: PGTKI Press, 2007.

Warsa, U.C. *Staphylococcus dalam Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara, 1994.


Wise S. *Staphylococcus aureus dan Resistensi*. <http://www.netdoctor.comuk/disease/facts/mrsa.htm>. (September 2015)



## LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR















UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR





## RIWAYAT HIDUP

**Nur Azizah Pratiwi**, gadis yang biasa disapa “tiwi” ini dilahirkan di Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Juli 1994. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, hasil buah kasih dari pasangan Kamaruddin dan Subaedah. Mulai mengenyam pendidikan formal

dimulai dari Sekolah Dasar di SD Inpres Numpang dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Barombong dan lulus pada tahun 2009 dan dengan keinginan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungguminasa dan berhasil lulus SMA-nya pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 penulis mengikuti pendaftaran masuk perguruan tinggi, tepatnya Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan Alhamdulillah sekarang tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Jurusan “BIOLOGI Fakultas Sains dan Teknologi”.

**Nur Azizah Pratiwi**