

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN PARE
(*Momordica charantia* L.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DINI AMALIA
NIM. 70100112010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2016

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN PARE
(*Momordica charantia* L.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DINI AMALIA
NIM. 70100112010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Amalia
NIM : 70100112010
Tempat/Tgl. Lahir : Pandang-pandang, 04 Juni 1994
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa
Judul : Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pare
(*Momordica charantia* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 Juli 2016

Penulis,

DINI AMALIA

NIM. 70100112010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*” yang disusun oleh Dini Amalia, NIM: 70100112010, mahasiswa jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzul-Qa’idah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 23 Agustus 2016 M
20 Dzul-Qa’idah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Karim, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji Kompetensi	: Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji Agama	: Dr. Azman Arsyad, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.
NIP.19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL DAUN PARE (*Momordica charantia* L.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*) dapat diselesaikan. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar S1 FARMASI di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah akhir zaman Baginda Muhammad saw. yang telah membawa rahmat di dunia dan mengubah zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Pertama, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Ayahanda Drs. HM. Natsir AR dan Ibunda tersayang Hj. Nurmiala Tahir, BAE. atas dukungan yang tak henti-hentinya, nasehat yang selalu membangun, kerja keras dengan penuh rasa ikhlas, kasih sayang yang tiada terkira serta air mata dalam doa yang selalu menjadi penopang penyemangat saya. Dan untuk saudara-saudaraku tercinta Annisa Aulia, Aina Nashira, Fajrul Haq terima kasih atas dukungan dan semangat yang tulus diberikan di dalam setiap ikhtiar yang saya lakukan.

Dan tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si., Rektor UIN Alauddin Makassar yang memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun kampus tercinta UIN

Alauddin Makassar agar lebih berkualitas dan kompeteter dengan perguruan tinggi lainnya.

2. Bapak DR. dr. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan kesempatan dan dorongan dalam menyelesaikan Program Studi S1 Farmasi.
3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes. Wakil Dekan I, ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh amanah.
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah berupaya meningkatkan mutu dan kualitas Farmasi UIN Alauddin Makassar lebih baik.
5. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekaligus sebagai Pembimbing Pertama yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan motivasi, arahan dan sarannya agar penulis menyelesaikan skripsinya dengan baik.
6. Bapak Abdul Karim S.Farm., M.Si., Pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Ibu Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi.
8. Bapak Dr. Azman Arsyad, M.Ag., Penguji Agama yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.

9. Kepada teman peneliti inflamasi (Ayu Lestari Nusa & Wahyuni Sariaty), Kakanda Ifa, S.Farm, kakanda Agus, dan teman-teman seperjuangan “**ISOHIDRIS 2012**” yang telah banyak membantu pada proses penyelesaian studi saya dan rasa kekeluargaan yang hangat diberikan dari kalian selama menginjakkan kaki pertama kali di Fakultas tercinta hingga saat ini.
10. Kakak-kakak angkatan 2005 (Halogen), 2006 (Anastesi), 2007 (Injeksi), 2008 (Emulsi), 2009 (Hidrogenasi), 2010 (Corrigensia), dan adik-adik angkatan 2013 (Farbion) 2014 (Galenika) 2015 (pulvis) terima kasih atas kekeluargaan yang diberikan dengan penuh cinta dan kasih sayang.
11. Sahabat-sahabatku tempat mecurahkan segala suka duka yang sering memberikan bantuan, motivasi dan semangat yang luar biasa dan selalu menemani dan menolong saya dikala membutuhkan bantuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gowa, 30 Juli 2016

Penyusun

DINI AMALIA

NIM. 70100112010


DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Uraian Tanaman Pare	8
1. Klasifikasi	8
2. Nama Daerah	8
3. Morfologi	9
4. Kandungan Kimia	9
B. Uraian Hewan Percobaan	10
1. Klasifikasi Mencit	10
2. Karakteristik Mencit	10

C. Penyakit	12
1. Definisi.....	12
2. Klasifikasi	12
3. Mediator.....	13
4. Tanda-Tanda Pokok Inflamasi.....	14
5. Mekanisme Terjadinya Inflamasi	16
6. Mediator Kimia.....	19
D. Uraian Obat.....	21
E. Karagenin.....	26
F. Uraian Ekstraksi	27
1. Pengertian	27
2. Mekanisme Kerja.....	27
3. Tujuan Ekstraksi	28
4. Ekstraksi secara Maserasi	29
5. Rotary Evaporator.....	30
G. Tinjauan Islam	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian.....	37
1. Alat.....	37
2. Bahan.....	37
D. Prosedur kerja.....	38
1. Pengambilan Sampel	38
2. Pengolahan Sampel	38
3. Ekstraksi sampel.....	38
4. Penyiapan Bahan Uji	39
5. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji.....	39
6. Perlakuan Terhadap Hewan Uji	40
E. Pengamatan dan Pengumpulan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
KEPUSTAKAAN	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Fisiologis Mencit	11
2. Hasil Ekstraksi Daun Pare.....	42
3. Persentase rata-rata penurunan volume udem telapak kaki mencit	42
4. Penurunan volume udem telapak kaki mencit	43
5. Hasil pengukuran rata-rata penurunan volume udem	44
6. Analisis ragam dengan nilai F tabel.....	66
7. Hasil Uji BNJ Tukey	66



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
8. Nilai Fisiologis Mencit	11
9. Hasil Ekstraksi Daun Pare.....	42
10. Persentase rata-rata penurunan volume udem telapak kaki mencit	42
11. Penurunan volume udem telapak kaki mencit	43
12. Hasil pengukuran rata-rata penurunan volume udem	44
13. Analisis ragam dengan nilai F tabel.....	66
14. Hasil Uji BNJ Tukey	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Mekanisme terjadinya inflamasi	18
2. Daun pare	68
3. Proses maserasi	68
4. Rotavapor	69
5. Ekstrak 2%, 4% dan 6%	69
6. Penimbangan berat badan mencit	69
7. Pemberian oral sediaan uji	70
8. Pengukuran volume awal kaki mencit	70
9. Pengukuran volume kaki mencit 1 jam setelah diinduksi karagenin	70
10. Pletismometer model/series PANLAB LE 7500	71
11. Udem kaki kiri mencit	71

ABSTRAK

Nama Penyusun : Dini Amalia
Nim : 70100112010
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*).

Tanaman obat yang digunakan secara empiris dalam pengobatan diantaranya Daun Pare (*Momordica charantia* L.). Kandungan daun yang kaya akan senyawa kimia yakni vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavanoid, steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid. Flavanoid menunjukkan lebih dari seratus macam bioaktivitas antara lain antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh obat baru yang memiliki aktivitas antiinflamasi pada ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) terhadap mencit (*Mus musculus*).

Penelitian dilakukan dengan cara memberikan karagenin sebagai mediator radang pada telapak kaki mencit, lalu pemberian secara oral suspensi Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* L.) dengan konsentrasi dosis 2%, 4% dan 6%, Natrium CMC sebagai kontrol negatif dan Natrium diklofenak sebagai kontrol positif. Pengukuran dilakukan tiap-tiap 1 jam selama 6 jam setelah diinduksi karagenin.

Diperoleh persentase penurunan radang untuk ekstrak 2% berturut-turut yaitu 8,3%, 13% dan 7,7%, ekstrak 4% berturut-turut yaitu 8,3%, 10% dan 14% sedangkan ekstrak 6% berturut-turut yaitu 16%, 13% dan 14%. Berdasarkan hasil statistik dengan uji ANOVA-one way menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Pada uji lanjutan yaitu uji Duncan pada konsentrasi 2%, 4% dan 6% tidak terdapat perbedaan yang nyata dan terdapat perbedaan yang nyata dengan pembanding Natrium diklofenak dan Natrium CMC.

Kata Kunci : Ekstrak Daun Pare, Antiinflamasi, Natrium diklofenak

ABSTRACT

Author : Dini Amalia
Student Reg. Number : 7010112010
Title : **Anti-inflammatory Activity Test of *Momordica charantia* L. Leaves Etanolic Extract to White Mice (*Mus musculus*).**

Medicinal plant was used empirically in the treatment was Pare (*Momordica charantia* L.). The leaves contain chemical compounds namely vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponins, flavonoids, steroids / triterpenoids, phenolic acids, alkaloids, and carotenoids. Flavonoids showed more than a hundred kinds of bioactivity such as antipyretic, analgesic and anti-inflammatory. This research aimed to obtain a new drug that has anti-inflammatory activity in leaf extracts of bitter melon (*Momordica charantia* L.) on mice (*Mus musculus*)

Research has been done by giving karagenin as mediators of inflammation on the sole of the foot mice and oral administration suspension Leaf Ethanol Extract Pare (*Momordica charantia* L.) with dose concentration of 2%, 4% and 6%, sodium CMC as a negative control and sodium diclofenac as a positive control. Measurements were made in every 1 hour during 6 hours after induction karagenin.

The found percentage of inflammation reduction for extract 2% respectively was 8,3%, 13% and 7,7%, extract 4% respectively is 8,3%, 10% and 14%, than the extract 6% respectively is 16%, 13% and 14%. Based on statistical result which testing by *ANOVA (Analysis of varians) one way* the different significant in the treatment effect, then followed by *Duncan test* had no the different significant between ethanol extract concentrations 4%, 6% and 8% and the different significant in the diclofenac sodium comparison and CMC sodium.

Keywords: Bitter melon leaves extract, Anti-inflammatory, Diclofenac sodium

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang beriklim tropis menyebabkan tanahnya subur sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh. Di antara berbagai jenis tersebut beberapa jenis tumbuhan memiliki khasiat sebagai obat. Namun, sebagian besar dari tumbuhan obat itu tidak diketahui oleh manusia sehingga tidak pernah terawat dengan baik. Hal tersebut menyebabkan manusia semakin tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan obat dan akhirnya tumbuhan obat berkesan sebagai tanaman liar yang keberadaannya sering dianggap mengganggu keindahan atau mengganggu kehidupan tumbuhan lainnya (Hariana, 2013: 1).

Penggunaan bahan alam, baik sebagai obat maupun tujuan lain cenderung meningkat, terlebih dengan adanya isu *back to nature* serta krisis berkepanjangan yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Dibandingkan obat-obat modern, memang obat tradisional memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah efek sampingnya relatif rendah. Perlu disadari pula bahwa memang ada bahan obat tradisional yang berbahaya jika penggunaannya melewati dosis dan konsentrasi yang aman (Katno, 2005: 1-3). Namun hingga saat ini pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional belum optimal.

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat tradisional masih selalu digunakan masyarakat di Indonesia terutama di daerah pedesaan yang masih kaya dengan

keanekaragaman tumbuhannya (Saumantera, 2004). Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penggunaan obat tradisional, diantaranya harganya yang murah, terkait dengan kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, bahkan tanaman obat dapat ditanam sendiri di halaman rumah, efek samping yang ditimbulkan obat tradisional relatif kecil, sehingga aman digunakan (Susanty, 2003: 52). Obat tradisional Indonesia masih sangat banyak yang belum diteliti, khususnya yang sebagian besar berasal dari bahan tumbuhan (Azwar, 1992: 7).

Pare dikenal dengan rasa pahitnya. Rasa pahit pare tidak mengurangi khasiat yang dikandungnya sebagai obat berbagai jenis penyakit. Daun pare (*Momordica charantia* L.) dapat digunakan sebagai obat penurun panas. Selain itu, daun pare dapat digunakan untuk menyembuhkan mencret pada bayi, membersihkan darah bagi wanita yang baru melahirkan, mengeluarkan cacing kremi, dan dapat menyembuhkan batuk (Sudarsono, 2002: 114).

Inflamasi merupakan suatu proses protektif normal terhadap trauma fisik atau zat-zat mikrobiologik yang bisa menyebabkan terjadinya luka jaringan (Mycek, 2001: 280). Inflamasi merupakan proses yang sangat kompleks yang mengikutsertakan aktivitas banyak tipe sel dan mediator. P tersebut menimbulkan tanda inflamasi, berupa kemerahan, pembengkakan, panas, nyeri dan hilangnya fungsi (Subagyo, 2004)

Antiinflamasi adalah sebutan untuk agen/obat yang bekerja melawan atau menekan proses peradangan (Dorlan, 2002: 68). Antiinflamasi nonsteroid

menghambat siklooksigenase yang mengubah asam arakidonat menjadi PGG₂ dan PGH₂ (Nogrady, 1992: 412).

Daun pare mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid (Tati, 2004). Flavonoid menunjukkan lebih dari seratus macam bioaktivitas. Bioaktivitas yang ditunjukkan antara lain efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi (Wijayakusuma, 2001: 3). Flavonoid dapat menghambat siklooksigenase sehingga kemungkinan besar efek antiinflamasi disebabkan karena penghambatan siklooksigenase yang merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan (Robinson, 1991: 191). Penarikan senyawa kimia dalam daun pare tersebut dilakukan dengan ekstraksi. Maserasi merupakan proses ekstraksi dimana obat yang sudah halus direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut sehingga didapatkan ekstrak daun pare (Howard, 1989: 605).

Berdasarkan uraian di atas, daun pare yang mempunyai kandungan flavanoid yang tinggi diharapkan dapat dijadikan sebagai obat baru dalam pengobatan antiinflamasi. Penulis mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak daun pare pada mencit yang diinduksi karagenin.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) memiliki efek antiinflamasi terhadap mencit (*Mus musculus*)?

2. Bagaimana aktivitas antiinflamasi ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L) dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6% terhadap mencit (*Mus musculus*)?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a) Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.
- b) Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda ketebalannya sehingga diperlakukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu.
- c) Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya.
- d) Hewan coba hewan atau laboratorium adalah hewan yang sengaja dipelihara dan ditenakkan untuk dipakai sebagai hewan model, dan juga untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau pengamatan laboratorik.
- e) Dosis adalah takaran zat/obat yang dapat memberikan efek farmakologis.

- f) Konsentrasi adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat didalam suatu campuran dibagi dengan volume total campuran tersebut.
- g) Eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana (untuk membuktikan kebenaran suatu teori).
- h) Uji aktivitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan aktivitas suatu bahan yang akan diuji.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam yaitu ekstrak daun pare sebagai antiinflamasi yang diujikan pada hewan coba.

3. Kajian Pustaka

- a. Efek antipiretik ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) pada tikus putih jantan dan membandingkan efek antipiretiknya dengan parasetamol. Dosis yang dianggap efektif untuk menurunkan demam adalah dosis yang paling kecil yaitu dosis 2 (1,512 mg/100 gBB tikus). Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) mempunyai efek antipiretik.
- b. Uji Aktivitas Mukolitik Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica Charantia* L.) telah diteliti dengan membandingkan aktivitas mukolitik antara ekstrak etanol daun pare konsentrasi 5%, 10%, dan 15% dengan bromheksin serta menentukan konsentrasi yang paling baik terhadap aktivitas mukolitik dari

daun pare. Hasil menunjukkan bahwa pada konsentrasi 15 % menunjukkan potensi sebagai mukolitik, karena terjadi penurunan viskositas yang berbeda bermakna terhadap kontrol.

- c. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia dan efek antelmintik ekstrak daun pare (*Momordica charantia L*) terhadap cacing lambung domba.. Dapat disimpulkan bahwa fraksi n-heksana dan metanol daun pare mempunyai efek antelmintik yang lebih kuat jika dibandingkan dengan fraksi kloroform dan air.
- d. Uji antiinflamasi ekstrak umbi rumput teki (*Cyperus rotundus L.*) pada kaki tikus wistar jantan yang diinduksi karagen. Dari penelitian ini dapat dibuat kesimpulan, yaitu: Ekstrak umbi rumput teki (*Cyperus rotundus L*) 30% memiliki efek antiinflamasi paling baik dibandingkan dengan Ekstrak umbi rumput teki (*Cyperus rotundus L*) 10% dan Ekstrak umbi rumput teki (*Cyperus rotundus L*) 20%. Ekstrak umbi rumput teki (*Cyperus rotundus L*) 20% memiliki efek antiinflamasi lebih baik dibanding dengan aspirin sebagai kontrol positif.
- e. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anthelmintik ekstrak etanol daun pare (EEPL) pada *Ascaris suum* secara *in vitro*. Metode: Penelitian ini merupakan eksperimental nyata, dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Hasil: persentase cacing lumpuh / mati setelah diobati dengan EEPL 10%, 20%, dan 40% yang telah diinkubasi selama 3 jam adalah 75,33%, 82,67% dan 88.00.%. Hasil ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan kelompok perlakuan dengan NaCl 0,9%

($p < 0,01$). Simpulan: ekstrak etanol daun pare memiliki efek antelmintik terhadap cacing *Ascaris suum in vitro*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) terhadap mencit (*Mus musculus*)
- b. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun pare (*Momordica charantia* L.) dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6 % pada mencit (*Mus musculus*)

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi ilmu pengetahuan
Memberikan informasi untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional.
- b. Dapat menjadi sumber informasi tambahan pengetahuan tentang penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional khususnya bagi daun pare (*Momordica charantia* L.).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Pare

1. Klasifikasi Tanaman (Departemen Kesehatan RI, 1989).

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Subdivisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledonae</i>
Ordo	: <i>Cucurbitales</i>
Familia	: <i>Cucurbitaceae</i>
Genus	: <i>Momordica</i>
Species	: <i>Momordica charantia</i> L.

2. Nama Daerah (Dalimartha, 2008: 126).

Sumatera: prieu, peria, foria, pepare, kambah. Jawa: paria, pare, pare pahit, pepareh. Nusa Tenggara: paya, paria, truwuk, paita, paliak, pariak, pania, pepule. Sulawesi: poya, pudu, pentu, paria, belenggede, palia. Maluku: papariane, pariane, papari, kakariano, taparipong, papariano, popare, dan pepare. Buah pare di berbagai negara dikenal dengan nama: Ku gua, african cucumber, bitter cucumber, bitter gourd, bitter melon, balsam pear, maiden blush, karela, karvel, dan springkomkommer.

3. Morfologi (Sudarsono, 2002: 114).

Perawakan: semak, tumbuhan annual-perennial, liana (menjalar atau memanjat), berbau tidak enak. Batang: berusuk 5, panjang 2-5 m, yang muda berambut cukup rapat. Daun: tunggal, bertangkai, helaian; bentuk membulat, dengan pangkal bentuk jantung, garis tengah 4-7 cm, tepi berbagi 5-9 lobus, berbintik-bintik tembus cahaya, taju bergigi kasar hingga berlekuk menyirip, memiliki sulur daun, tunggal. Bunga: tunggal, tangkai bunga 5-15 cm dekat pangkalnya dengan daun pelindung bentuk jantung hingga bentuk ginjal. Kelopak: 5, bentuk lonceng, dengan banyak rusuk atau tulang membujur, yang berakhir pada 2-3 sisik yang melengkung ke bawah. Mahkota: 5, berdekatan, penampang bentuk roda; taju bentuk memanjang hingga bulat telur terbalik, bertulang, 1,5-2 kali 1-1,3 cm. Buah: tipe peppo (ketimun) memanjang, berjerawat tidak beraturan, oranye, pecah sama sekali dengan 3 katup, 5-7 cm (liar) hingga 30 cm (ditanam). Biji: coklat kekuningan pucat memanjang.

4. Kandungan kimia (Tati, 2004: 4)

Buah: saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, karbohidrat, momordisin, alkaloid, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan karantin. Daun: vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid. Biji: asam lemak, asam butirrat, asam palmitat, asam linoleat, dan asam stearat.

B. Uraian Hewan Percobaan

1. Klasifikasi Mencit (Arrington, 1972: 7).

Kingdom	: Animalia
Filium	: Chordata
Kelas	: Mamalia
Ordo	: Rudentia
Sub Ordo	: Odontoceti
Familia	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Karakteristik Mencit

Mencit (*Mus musculus*) adalah hewan pengerat (Rodentia) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologinya terkarakterisasi dengan baik (Malole, 1989: 94).

Mencit termasuk mamalia yang dianggap memiliki struktur anatomi pencernaan mirip manusia, mudah ditangani dan mudah diperoleh dengan harga relatif murah dibandingkan hewan uji yang lain (Smith, 1988: 18). Hewan ini bersifat fotofobik dan penakut. Mencit merupakan hewan *nocturnal* yang lebih aktif di malam hari. Aktivitas ini menurun dengan kehadiran manusia sehingga mencit perlu diadaptasikan terlebih dahulu dengan lingkungannya (Pamudji, 2003: 29).

Tabel 1. Nilai Fisiologis Mencit

Karakteristik	Ukuran
Berat badan: - Jantan	20 – 40 g
- Betina	25 – 40 g
Luas Permukaan Tubuh	20 g : 36cm ²
Temperatur tubuh	36,5 – 38,0 °C
Harapan hidup	1,5 – 3,0 tahun
Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari
Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
Siklus birahi	4 – 5 hari
Waktu pemeliharaan komersial	7 – 9 bulan/6 – 10 liter
Jumlah pernapasan	94 – 163/menit
Tidal volume	0,09 – 0,23 ml
Penggunaan oksigen	1,63 – 2,17 ml/g/jam
Detak jantung	325-780/menit
Volume darah	76 – 80 mg/kg
Tekanan darah	113 – 147/81 – 106 mmHg
Glukosa dalam darah	67 – 175 mg/dl
Kolesterol	26 – 82 mg/dl
Kalsium dalam serum	3,2 – 9,2 mg/dl
Phosphat dalam serum	2,3 – 9,2 mg/dl

C. Penyakit

1. Definisi

Inflamasi merupakan suatu proses protektif normal terhadap trauma fisik atau zat-zat mikrobiologik yang bisa menyebabkan terjadinya luka jaringan (Mycek, 2001). Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. Jaringan yang mengalami inflamasi tersebut melepaskan berbagai zat yang menimbulkan perubahan sekunder yang dramatis di sekeliling jaringan yang normal (Guyton & Hall, 1997).

2. Klasifikasi

a. Inflamasi Akut

Inflamasi ini ditandai dengan kemerahan dan panas yang terlihat jelas pada jaringan luar. Hal ini akibat pecahnya sel mast sehingga melepaskan mediator-mediator inflamasi dan enzim lisosom serta ditandai dengan banyaknya leukosit. Selain dari peristiwa tersebut, terjadi eksudasi cairan plasma ke tempat inflamasi yang terus meningkat sehingga terbentuk cairan eksudat yang ditandai dengan edema (Vogel, 2002; Alfi Inayati, 2010).

b. Inflamasi Kronik

Inflamasi ini ditandai dengan banyaknya eksudat jaringan granulomatosis, monosit, dan pengumpulan plasma sel. Akibat jaringan mengalami fibrosis dan timbulah hiperplasia di sekitar jaringan. Tetapi hal ini dapat terjadi tergantung dari

kedudukan dan inflamasi kronik. Elemen-elemen jaringan yang diserang akan menghasilkan reaksi imun antara suatu antigen dengan suatu antibody yang merangsang terjadinya inflamasi. Inflamasi kronik mempunyai waktu kerja yang lama (Vogel, 2002; Alfi Inayati, 2010).

3. Mediator

Inflamasi dimulai saat sel mast berdegranulasi dan melepaskan bahan-bahan kimianya seperti histamin, serotonin dan bahan kimia lainnya. Histamin yang merupakan mediator kimia utama inflamasi juga dilepaskan oleh basofil dan trombosit. Akibat pelepasan histamin ini adalah vasodilatasi pembuluh darah sehingga terjadi peningkatan aliran darah dan terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler pada awal inflamasi (Corwin.2008).

Mediator lain yang dilepaskan selama respon inflamasi yaitu faktor kemotaktik neutrofil dan eosinofil, dilepaskan oleh leukosit (neutrofil dan eosinofil) yang dapat menarik sel-sel ke daerah cedera. Selain itu, juga dilepaskan prostaglandin terutama seri E. Saat membran sel mengalami kerusakan, fosfolipid akan diubah menjadi asam arakhidonat dikatalisis oleh fosfolipase A₂. Asam arakhidonat ini selanjutnya akan dimetabolisme oleh lipooksigenase dan siklooksigenase (COX). Pada jalur siklooksigenase inilah prostaglandin disintesis. Prostaglandin dapat meningkatkan aliran darah ke tempat yang mengalami inflamasi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan merangsang reseptor nyeri. Sintesis prostaglandin ini dapat dihambat oleh golongan obat AINS. Leukotrien merupakan produk akhir dari metabolisme asam arakhidonat pada jalur lipooksigenase. Senyawa ini dapat meningkatkan permeabilitas kapiler dan

meningkatkan adhesi leukosit pada pembuluh kapiler selama cedera atau infeksi (Corwin, 2008).

Mediator inflamasi yang lain adalah sitokin, yaitu zat-zat yang dikeluarkan oleh leukosit. Sitokin bekerja seperti hormon dengan merangsang sel-sel lain pada sistem imun untuk berproliferasi atau menjadi aktif selama infeksi dan inflamasi. Sitokin terdiri dari dua kategori yaitu bersifat pro-inflamasi dan antiinflamasi. Sitokin pro-inflamasi antara lain interleukin-1 yang berasal dari makrofag dan monosit, interleukin-2, interleukin-6, *tumor necrosis factor*, dan interferon gamma berasal dari aktivasi limfosit. Sitokin pro-inflamasi berperan dalam merangsang makrofag untuk meningkatkan fagositosis dan merangsang sumsum tulang untuk meningkatkan produksi leukosit dan eritrosit. Sitokin antiinflamasi meliputi interleukin-4 dan interleukin-10 yang berperan dalam menurunkan sekresi sitokin pro-inflamasi. Selain itu juga terdapat kemokin yaitu sejenis sitokin, bekerja sebagai agen kemotaksis yang meregulasi pergerakan leukosit (Corwin.2008).

4. Tanda-Tanda Pokok Inflamasi

a. Rubor (Kemerahan)

Rubor atau kemerahan biasanya merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan, seiring dengan dimulainya reaksi peradangan, arteriol yang memasok daerah tersebut berdilatasi sehingga memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Kapiler yang tadinya kosong atau mungkin hanya sebagian meregang secara cepat terisi penuh dengan darah. Keadaan ini disebut hyperemia atau kongesti, menyebabkan kemerahan lokal pada peradangan akut (Price, 2006: 57-58).

b. Kalor (Panas)

Kalor atau panas terjadi bersamaan dengan reaksi kemerahan pada reaksi peradangan akut. Sebenarnya panas secara khas hanya terjadi pada permukaan tubuh yang secara normal lebih dingin dari 37°C yang merupakan suhu inti tubuh, daerah peradangan menjadi lebih hangat dari sekelilingnya karena lebih banyak darah (pada suhu 37°C) dialirkan dari dalam tubuh ke permukaan daerah yang terkena dibandingkan dengan ke daerah yang normal (Price, 2006: 57-58).

c. Dolor (Nyeri)

Dolor atau nyeri pada suatu reaksi terjadi akibat perubahan pH lokal atau konsentrasi lokal ion-ion tertentu yang dapat merangsang ujung-ujung saraf. Juga dapat timbul jika rangsang mekanik, termal, kimia (pelepasan zat-zat kimia tertentu seperti histamin atau zat-zat kimia bioaktif lain dapat merangsang saraf) atau listrik melampaui nilai ambang tertentu (nilai ambang nyeri). Selain itu pembengkakan jaringan yang meradang menyebabkan peningkatan tekanan lokal yang menimbulkan nyeri (Price, 2006: 57-58).

d. Tumor (Pembengkakan)

Pembengkakan dihasilkan oleh cairan dan sel-sel yang berpindah dari aliran darah ke jaringan interstisial. Campuran cairan dan sel-sel ini yang tertimbun di daerah peradangan disebut eksudat. Awalnya eksudat ini hanya terdiri dari cairan kemudian leukosit meninggalkan aliran darah dan ikut tertimbun sebagai bagian eksudat (Price, 2006: 57-58).

e. Fungsi laesa (Gangguan Fungsi)

Perubahan fungsi merupakan bagian yang lazim pada reaksi peradangan, bagian yang bengkak, nyeri disertai sirkulasi abnormal dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal otomatis akan memicu fungsi jaringan menjadi abnormal (Price, 2006: 57-58).


Tanda-tanda di atas merupakan akibat dari gangguan aliran darah yang terjadi akibat kerusakan jaringan dalam pembuluh pengalir terminal, eksudasi dan perangsangan reseptor nyeri. Radang dapat dihentikan dengan meniadakan noksi atau dengan menghentikan kerja yang merusak. Walaupun demikian, seringkali pada gangguan darah regional dan eksudasi terjadi emigrasi sel-sel darah ke dalam ruang ekstrasel serta proliferasi histiosit fibroblast. Proses-proses ini juga berfungsi primer pada perlawanan terhadap kerusakan serta pemulihan kondisi asalnya, walaupun demikian juga dapat bekerja negatif. Reaksi ini disebabkan oleh pembebasan bahan-bahan mediator (histamin, serotonin, prostaglandin, dan kinin) (Mutschler, 1991: 177).

5. Mekanisme terjadinya Inflamasi

Terjadinya inflamasi adalah reaksi setempat dari jaringan atau sel terhadap suatu rangsang atau cedera. Setiap ada cedera, terjadi rangsangan untuk dilepaskannya zat kimia tertentu yang akan menstimulasi terjadinya perubahan jaringan pada reaksi radang tersebut, diantaranya histamin, serotonin, bradikinin, leukotrin dan prostaglandin. Histamin bertanggung jawab pada perubahan yang paling awal yaitu menyebabkan vasodilatasi pada arteriol yang didahului dengan

vasokonstriksi awal dan peningkatan permeabilitas kapiler, hal ini menyebabkan perubahan distribusi sel darah merah. Oleh karena aliran darah yang lambat, sel darah merah akan menggumpal, akibatnya sel darah putih terdesak kepinggir, makin lambat aliran darah maka sel darah putih akan menempel pada dinding pembuluh darah makin lama makin banyak. Perubahan permeabilitas yang terjadi menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah dan berkumpul dalam jaringan. Bradikinin bereaksi lokal menimbulkan rasa sakit, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler. Sebagai penyebab radang, prostaglandin berpotensi kuat setelah bergabung dengan mediator lainnya (Mansjoer, 1999).





Gambar 1 : Mekanisme Terjadinya Inflamasi

Asam arakhidonat merupakan prekursor dari sejumlah besar mediator inflamasi. Senyawa ini merupakan mediator inflamasi. Senyawa ini merupakan komponen utama lipid seluler dan hanya terdapat dalam keadaan bebas dengan jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipid membran sel. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka enzim fosfolifase diaktivasi untuk mengubah menjadi asam arakhidonat, kemudian sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase atau COX dan seterusnya menjadi prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Bagian lain dari asam arakhidonat diubah oleh enzim lipooksigenase menjadi leukotrin. Siklooksigenase terdiri dari dua iso enzim, COX 1 dan COX 2. Iso enzim COX 1 terdapat kebanyakan di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna sedangkan COX 2 tidak terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Leukotrin yang dibentuk melalui alur lipooksigenase yaitu LTA_4 yang tidak stabil yang kemudian oleh hidrolase diubah menjadi LTB_4 atau LTC_4 yang terakhir bisa diubah menjadi LTD_4 dan LTE_4 , selain pada rema, leukotrin dibentuk digranulosit eosinofil dan berkhasiat vasokonstriksi di bronkus dan mukosa lambung. Khusus LTB_4 disintesa di makrofag dan bekerja menstimulasi migrasi leukosit. Mediator-mediator ini dinamakan *slow substance of anaphylaxis* (SRS-A) (Tjay, 2002).

6. Mediator Kimia

Inflamasi dicetuskan oleh pelepasan mediator kimiawi dari jaringan yang rusak dan migrasi sel. Mediator kimiawi spesifik bervariasi dengan tipe proses peradangan dan meliputi amin, seperti histamin dan 5-hidroksitriptamin: lipid,

seperti prostaglandin; peptida kecil, seperti bradikinin; dan peptida besar, seperti interleukin-1 (Mycek, 2001: 404).

Apapun penyebab radang (inflamasi) selalu menimbulkan perubahan jaringan yang sama sehingga dianggap perubahan ini timbul melalui proses yang sama yaitu melalui zat-zat perantara yang dilepaskan dan dinamakan mediator.

a. Histamin

Histamin mempunyai peran modulasi dalam berbagai inflamasi dan respon imun. Histamin juga memainkan sebagai peran pada respon inflamasi akut. Pada jaringan, rilis histamin menyebabkan vasodilatasi lokal dan kebocoran plasma yang mengandung mediator inflamasi akut (komplemen, protein C reaktif), antibodi, dan sel-sel inflamasi (neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit) (Katzung, 2001: 469).

b. Serotonin

Serotonin (5-hidroksitriptamin) disintesis dari L-triptofan dalam sel enterochromaffin pada mukosa saluran cerna. Serotonin secara menyebabkan kontraksi otot polos, terutama melalui reseptor 5-HT₂. Pada manusia, serotonin merupakan vasokonstriktor yang kuat kecuali pada otot rangka dan jantung, karena pada daerah tersebut serotonin melebarkan pembuluh darah. Pada inflamasi, serotonin dapat meningkatkan permeabilitas vaskular namun tidak sekuat histamin (Heinz Lulmann, 2000: 116).

c. Bradikinin

Bradikinin memainkan peranan penting dalam proses peradangan. Bradikinin dapat menyebabkan kemerahan, panas setempat, bengkak, dan nyeri. Bradikinin menyebabkan vasodilatasi yang hebat di dalam beberapa rangkaian vaskular, termasuk jantung, ginjal, otot rangka, usus, dan hepar. Dalam hal ini, bradikinin 10 kali lebih kuat dari pada histamin (Katzung, 2001: 526).

d. Prostaglandin

Prostaglandin merupakan senyawa *eucosanoid* yang disintesis dari asam arakhidonat oleh enzim *cyclooxygenase* II yang aktif selama peradangan. Prostaglandin meningkatkan sensitivitas sensor saraf terhadap rangsangan nyeri, juga meningkatkan permeabilitas vaskular dan bertindak sebagai vasodilator (Heinz Lullmann, 2001: 196).

e. Leukotrien

Leukotrien disintesis sebagai respon terhadap antigen dan tidak disimpan secara intraselular. Leukotrien merupakan produk dari metabolisme asam arakhidonat melalui jalur *lipooxygenase*. Salah satu efek sistemik dari leukotrien inflamasi kulit dan kemotaksis. Leukotrien juga meningkatkan permeabilitas vaskular (Jense B, 2005: 1617).

D. Uraian Obat

Antiinflamasi adalah sebutan untuk agen/obat yang bekerja melawan atau menekan proses peradangan (Dorlan, 2002: 68). Obat-obat inflamasi adalah golongan obat yang memiliki mekanisme kerja umum berupa penghambatan

sintesis prostaglandin via penghambatan enzim siklooksigenase. Siklooksigenase bertanggung jawab atas biosintesis prostaglandin. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat-obat antiinflamasi dibagi menjadi dua kelompok besar yakni: obat antiinflamasi golongan steroid yang terutama bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel sumbernya, dan obat antiinflamasi golongan nonsteroid yang bekerja melalui mekanisme yang lain seperti inhibisi siklooksigenase yang berperan pada biosintesis prostaglandin (Katzung, 2001).

Pengobatan antiinflamasi mempunyai 2 tujuan utama yaitu, meringankan rasa nyeri, yang seringkali merupakan gejala awal yang terlihat dan keluhan utama yang terus menerus dari pasien dan kedua memperlambat atau membatasi perusakan jaringan (Katzung, 2001).

Penggunaan obat antiinflamasi dibedakan menjadi 2 jenis yaitu non steroid dan kortikosteroid. Pada obat antiinflamsi non steroid mempunyai efek analgetik pada dosis rendah dan antiinflamasi pada dosis besar (Priyanto, 2009: 21). Mekanisme kerja obat golongan non steroid adalah melalui penghambatan prostaglandin (Tjay, 2006). Prostaglandin diproduksi oleh mukosa lambung dan diduga mempunyai efek sitoprotektif dan mekanisme kerja utama prostaglandin adalah menghambat sekresi lambung (Katzung dan Trevor, 2004). Hambatan sintesis prostaglandin menyebabkan sekresi asam yang berlebih, sehingga meningkatkan keasamannya yang berpotensi menimbulkan tukak (ulser) (Mutschler, 1986).

Yang termasuk obat antiinflamasi steroid antara lain adalah kortison asetat, hidrokortison, prednisone, deksametashon, betametashon dan sebagainya.

Yang termasuk obat antiinflamasi nonsteroid antara lain asam asetil salisilat, natrium diklofenak, indometasin, ibuprofen, fenilbutason dan lain-lain (Wibowo, 2001).

Mekanisme obat antiinflamasi nonsteroid pada umumnya menghambat biosintesa prostaglandin terutama pada perubahan asam arakidonat menjadi PGG₂, kebanyakan obat-obat antiinflamasi nonsteroid juga mempunyai aktifitas analgetik, antipiretik dan hampir semua menyebabkan efek samping gangguan saluran cerna berupa tukak lambung (Ganiswara, 1995).

Natrium diklofenak merupakan obat AINS golongan sama karboksilat kelas asam asetat derivat asam fenil asetat (Wilmana, 2003). Obat ini mempunyai dosis sekali pakai 25 mg atau 50 mg, dua sampai tiga kali sehari, sedangkan dosis pemakaian tablet lepas lambat adalah 100-200 mg perhari (Martindale 28th ed., 1982; AHFS Drug Information, 1997). Natrium diklofenak memiliki waktu paruh yang pendek, antara satu sampai dua jam (Martindale 28th ed., 1982).

Diklofenak adalah derivat sederhana dari asam fenilasetat yang menyerupai flurbiprofen dan melofenamat, obat ini adalah penghambat *cyclooxygenase* yang relatif nonselektif dan kuat serta mengurangi aktifitas asam arakidonat obat ini mempunyai waktu paruh 1-2 jam. Obat ini dilaporkan dapat mengurangi sintesis prostaglandin dan leukotrien. Efek-efek yang tidak diinginkan bisa terjadi pada kira-kira 20% dari pasien dan meliputi distress gastrointestinal, pendarahan gastrointestinal yang terselubung dan timbulnya ulserasi lambung, sekalipun timbulnya ulkus lebih jarang terjadi daripada dengan beberapa AINS lainnya

(Katzung, 2002). Walaupun waktu paruhnya singkat, diklofenak diakumulasikan di cairan sinovial yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang dari waktu paruh obat tersebut (Wilmana, 2007: 230-246).

a. Uraian Kimia (Windholz, 1976)

Nama Resmi : DICLOFENAC SODIUM

Nama Lain : Natrium Diklofenak

Rumus Kimia : 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino] acid monosodium salt, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino] aetic acid sodium salt, sodium 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino] phenyl acetat GP 458450, Volteran, Voltarol.

Rumus Molekul : $C_{14}H_{10}Cl_2NNaO_2$

Berat Molekul : 318,13

Rumus Bangun :



Kearutan : Mengkristal dalam air

Penggunaan : Antiinflamasi

b. Mekanisme Kerja

Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim *fosfolipase* diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakhidonat. Asam lemak poli-tak jenuh ini kemudian untuk sebagian diubah oleh ezim *cyclo-oksigenase* menjadi endoperoksida dan seterusnya menjadi

prostaglandin. *Cyclo-Oksigenase* terdiri dari dua *iso-enzim*, yaitu COX-1 (*tromboxan* dan *prostacyclin*) dan COX-2 (*prostaglandin*). Kebanyakan COX-1 terdapat di jaringan, antara lain dipelat-pelat darah, ginjal dan saluran cerna. COX-2 dalam keadaan normal tidak terdapat di jaringan tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Penghambatan COX-2lah yang memberikan efek anti radang dari obat NSAIDs. NSAID yang ideal hanya menghambat COX-2 (peradangan) dan tidak COX-1 (perlindungan mukosa lambung) (Tjay dan Rahardja, 2002: 303).

c. Farmakokinetik

Natrium Diklofenak diabsorpsi secara cepat dan sempurna dalam lambung, bertumpuk pada cairan sinovial. Kadar plasma tertinggi dicapai dalam 2 jam. Urin merupakan jalan utama ekskresi obat ini dan metabolitnya.

d. Farmakodinamik

Natrium Diklofenak mempunyai aktivitas antiinflamasi yaitu menghambat aktivitas dari enzim siklooksigenase yang mengurangi produksi prostaglandin oleh jaringan.

e. Efek Samping

Toksisitas Natrium Diklofenak serupa dengan toksisitas obat AINS lain, misalnya masalah saluran cerna dan obat ini juga dapat meningkatkan kadar enzim hepar.

E. Karagenin

Iritan yang digunakan untuk pengujian efek antiinflamasi beragam jenisnya, satu diantaranya adalah karagenin. Karagenin merupakan polisakarida hasil ekstraksi rumput laut dari family Eucheama, Chondrus, dan Gigartina. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih hingga kuning kecoklatan, ada yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk halus, tidak berbau, serta memberi rasa berlendir di lidah. Karagenin juga memiliki sifat larut dalam air bersuhu 80°C (Rowe et al., 2009: 1198).

Karagenin berperan dalam pembentukan edema dalam model inflamasi akut (Singh et al., 2008: 57). Karagenin dipilih karena dapat menstimulasi pelepasan prostaglandin setelah disuntikkan ke hewan uji. Oleh karena itu, karagenin dapat digunakan sebagai iritan dalam metode uji yang bertujuan untuk mencari obat-obat antiinflamasi, tepatnya yang bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin (Winter et al., 1962: 111).

Ada tiga fase pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenin. Fase pertama adalah pelepasan histamin dan serotonin yang berlangsung hingga 90 menit. Fase kedua adalah pelepasan bradikinin yang terjadi pada 1,5 hingga 2,5 jam setelah induksi. Pada fase ketiga, terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelah induksi, kemudian edema berkembang cepat dan bertahan pada volume maksimal sekitar 5 jam setelah induksi (Morris, 2003: 115). Berdasarkan penelitian terdahulu, yang berperan dalam proses pembentukan edema adalah prostaglandin yang terbentuk melalui proses biosintesis prostaglandin. Senyawa ini dilepaskan lalu bereaksi dengan

jaringan di sekitarnya dan menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang merupakan awal mula terjadinya edema (Vinegar et al., 1976: 228).

F. Uraian Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian atau penarikan komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut dengan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 1986: 4).

Dari hasil ekstraksi diperoleh ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Dirjen POM 1979: 9).

2. Mekanisme Kerja Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Larutan dengan konsentrasi tinggi akan berdifusi ke luar sel dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antar konsentrasi zat aktif di dalam sel dan di luar sel (Dirjen POM 1986, 5).

Pada proses ekstraksi dapat dibedakan menjadi 2 fase yaitu:

- a. Fase pembilasan. Pada saat cairan ekstraksi kontak dengan material simplisia maka sel-sel yang rusak atau tidak utuh lagi akibat proses penghalusan langsung

bersentuhan dengan bahan pelarut. Dengan demikian komponen sel yang terdapat di dalamnya lebih mudah diambil atau dibilas. Oleh karena itu, dalam fase pertama ekstraksi ini, sebagian bahan aktif telah berpindah ke dalam bahan pelarut.

- b. Fase ekstraksi. Yang lebih kompleks adalah proses selanjutnya oleh karena bahan pelarut untuk melarutkan komponen dalam sel harus mampu mendesak masuk lebih dahulu ke dalamnya. Membran sel yang mengering, mengkerut di dalam simplisia mula-mula harus diubah kondisinya sehingga memungkinkan bahan pelarut masuk ke dalam sel. Hal itu terjadi melalui pembengkakan, dimana membran mengalami pembesaran volume akibat masuknya sejumlah molekul bahan pelarut. Dengan mengalirnya bahan pelarut ke dalam ruang sel, protoplasma akan membengkak dan bahan kandungan sel akan terlarut sesuai dengan tingkat kelarutannya. Bahan kandungan sel akan terus masuk ke dalam cairan di sebelah luar sampai difusi melintasi membran mencapai keseimbangan yakni pada saat konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel sama (R.Voight 1995: 969).

3. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut, dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel

mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif ke luar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, 1987: 152).

4. Ekstraksi secara Maserasi

Maserasi adalah cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung zat yang mudah mengembang dalam cairan penyari. Pada penyarian dengan cara maserasi, perlu dilakukan pengadukan. Pengadukan diperlukan untuk meratakan konsentrasi larutan di luar butir serbuk simplisia, sehingga dengan pengadukan tersebut tetap terjaga adanya derajat perbedaan konsentrasi yang sekecil-kecilnya antara larutan di dalam sel dengan larutan di luar sel (Dirjen POM 1986: 10). Hasil maserasi (maserat) diuapkan pada tekanan rendah pada suhu tidak lebih dari 50°C hingga konsistensi yang dikehendaki (Dirjen POM 1979: 9).

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Sedangkan kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna.

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserakai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya diaduk dan diserakai, sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Benjana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya, selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan (Depkes RI, 1986).

Waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks dan lilin.

5. Rotary Evaporator

Vacum Rotary Evaporator adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan suatu larutan dari pelarutnya sehingga dihasilkan ekstrak dengan kandungan kimia tertentu sesuai yang diinginkan. Cairan yang ingin diuapkan biasanya ditempatkan dalam suatu labu yang kemudian dipanaskan dengan bantuan penangas, dan diputar. Uap cairan yang dihasilkan didinginkan oleh suatu pendingin (kondensor) dan ditampung pada suatu tempat (receiver flask). Setelah pelarutnya diuapkan, akan dihasilkan ekstrak yang dapat berbentuk padatan atau cairan (Nugroho et al., 1999).

Kecepatan alat ini dalam melakukan evaporasi sangat cepat, terutama bila dibantu oleh vakum. Terjadinya bumping dan pembentukan busa juga dapat dihindari. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah diperolehnya kembali pelarut yang diuapkan.

Prinsip kerja alat ini didasarkan pada titik didih pelarut dan adanya tekanan yang menyebabkan uap dari pelarut terkumpul di atas, serta adanya kondensor (suhu dingin) yang menyebabkan uap ini mengembun dan akhirnya jatuh ke tabung penerima (receiver flask) (Mutairi dan Jasser, 2012).

. Namun sering juga digunakan pada padatan yang larut karena efektivitasnya.

G. Tinjauan Islam

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Allah berfirman dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?”

Kaum musyrikin enggan percaya, bahkan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, sebagaimana diuraikan ayat-ayat yang lalu. Mereka enggan percaya karena bersikap keras kepala. Di sini keadaan mereka dipertanyakan, yakni adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran mereka padahal telah sekian banyak bukti dipaparkan dan terhampar? Apakah mereka enggan memperhatikan gugusan bintang-bintang di langit dan apakah mereka tidak melihat ke bumi banyak yakni mengarahkan pandangan sepanjang, seluas dan seantero bumi berupa banyak Kami

telah tumbuhkan di sanan dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat? Sesungguhnya pada yang demikian itu hebatnya benar-benar terdapat suatu ayat yakni tanda yang membuktikan adanya Pencipta Yang Maha Esa, serta membuktikan pula kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan siapa yang telah mati. (Shihab, 2002: 11).

Kata (إِلَى) ila/ ke pada firman-Nya di awal ayat ini: (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) awalam yara ila al-ardh/ apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2002: 11).

Kata (زَوْجًا) zauj berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan

yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Shihab, 2002: 11).

Dalam Q.S. Al An'aam/6: 99 disebutkan pula bahwa:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ
مِنَ طَلْعِهَا قِنَوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”

Ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji atau benih atau yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang. Bermula dengan menegaskan bahwa dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu kami, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2002).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih.

Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir yaitu bahwa dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dari kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkan dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase diwaktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman (Shihab, 2002).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab al-Muntakhab fi al-tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002).

Dibagian akhir ayat ini disebutkan **أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ** (buahnya diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya). Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botanik) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organ dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2002).

Firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syu'araa/ 26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”

Firman-Nya: **وَإِذَا مَرِضْتُ** wa idza maridhtu/ dan apabila aku sakit, berbeda dengan redaksi lainnya. Perbedaan pertama adalah penggunaan kata idza/apabila dan mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya apa yang dibicarakan, dalam hal ini adalah sakit. Ini mengisyaratkan bahwa sakit – berat atau ringan, fisik atau mental – merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Perbedaan kedua adalah reaksi yang menyatakan “Apabila aku sakit” bukan “Apabila Allah menjadikan aku sakit”. Namun demikian, dalam hal penyembuhan – seperti juga dalam pemberian hidayah, makan dan minum – secara tegas beliau menyatakan bahwa Yang melakukannya adalah Dia, Tuhan semesta alam (Shihab, 2002: 69).

Nabi Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Muhammad Ibnu Mutsanna berkata kepada kami dari Abu Ahmad Azubairi dari Umar Ibnu Sa’id bin Abi Husain berkata: berkata kepada saya Ato’ bin Abi Rabah dari sahabat Abi Hurairah RA dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari).

Dari ayat-ayat dan hadits di atas dapat dipahami adanya perintah kepada manusia untuk memperhatikan bumi, yang mana dapat diartikan sebagai perintah untuk meneliti dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan yang merupakan anugerah Allah SWT yang harus dipelajari dan dimanfaatkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat eksperimental laboratorium.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia dan Farmakologi Toksikologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmakologi Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental, berdasarkan permasalahan dan penjabaran pada latar belakang.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat

Gelas piala, Gelas ukur, Timbangan analitik, Panci, Plathysmometer model/series PANLAB LE 7500, Seperangkat Alat Maserasi.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah aquadest, daun pare (*Momordica charantia* L.), karagenin 1%, etanol 70%, Na-CMC, NaCl 0,9%, tablet Natrium Diklofenak.

D. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Daun pare (*Momordica charantia* L.) yang diambil dari Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, daun yang dipilih adalah daun yang masih muda dan segar yang diambil pada pukul 08.00-10.00 WITA.

2. Pengolahan Sampel

Daun dipetik sebanyak 500 gram kemudian disortasi kering (dibersihkan dari kotoran) dan disortasi basah (dicuci dengan air mengalir), lalu dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung. Setelah itu, sampel yang telah dikeringkan kemudian diserbukkan selanjutnya disimpan dalam toples dan sampel siap untuk diekstraksi.

3. Ekstraksi Sampel

Sampel ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian dimasukkan ke dalam wadah maserasi. Pelarut etanol 70% dituang secara perlahan-lahan ke dalam wadah maserasi yang berisi sampel sambil diaduk sampai pelarut merata. Pelarut etanol dibiarkan sampai 1 cm diatas permukaan sampel, ekstraksi dilakukan selama 3 x 24 jam dan setiap 24 jam pelarut etanol diganti sambil sekali-kali diaduk, filtrat hasil penyaringan diuapkan menggunakan Rotary Evaporator sampai diperoleh ekstrak kental dan dikeringkan.

4. Penyiapan Bahan Uji

a. Pembuatan Larutan Koloidal Na-CMC 1%.

Sebanyak 1 gram Na-CMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia 100 ml yang berisi 50 ml air suling (70°C) sambil diaduk dengan batang pengaduk hingga terbentuk larutan koloidal, lalu volumenya dicukupkan dengan air suling hingga 100 ml.

b. Pembuatan Suspensi Karagenin 1%.

Karagenin 1% diperoleh dengan mensuspensikan 1 gram karagenin dalam Natrium klorida 0,9% sampai 100 ml dalam beker gelas.

c. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak

Sebanyak 10 tablet Natrium Diklofenak (setiap tablet mengandung natrium diklofenak 25 mg) ditimbang, kemudian dihitung bobot rata-rata lalu digerus. Natrium diklofenak ditimbang kemudian disuspensikan dengan dalam larutan Na-CMC 1% sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen kemudian dimasukkan ke dalam labu tentu ukur 100 ml kemudian volumenya dicukupkan sampai 100 ml.

5. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit (*Mus musculus*), berat badan 20-30 gram, umur 2-3 bulan. Kondisi hewan sehat. Jumlah mencit putih (*Mus musculus*) yang digunakan sebanyak 15 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok terdiri atas 3 ekor.

Mencit diadaptasikan dalam kandang kurang lebih selama 1 minggu untuk proses aklimatisasi. Selama proses tersebut, dijaga agar kebutuhan makan dan minum tetap terpenuhi. Mencit dipuasakana selama 8 jam sebelum perlakuan, namun air minum tetap diberikan (*ad libitum*) (Parveen dkk, 2007). Setiap mencit diberi tanda dengan spidol pada sendi belakang kiri agar pemasukan kaki ke dalam platysmometer air raksa setiap kali selalu sama.

6. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Sebelum pengujian, mencit ditimbang terlebih dahulu kemudian masing-masing mencit diinduksi dengan karagenin 1% secara intraplantar lalu diukur volume awal kaki mencit. Setelah itu, diukur volume edema kaki mencit 60 menit setelah penyuntikan karagenin 1% dengan cara mencelupkannya ke dalam alat platysmometer. Kemudian sediaan diberikan peroral dengan volume pemberian pada mencit sebanyak 1 ml sesuai dengan kelompok perlakuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I : 3 ekor mencit diberi suspensi Na-CMC 1% b/v peroral sebagai kontrol negatif
- b. Kelompok II : 3 ekor mencit diberi ekstrak daun pare konsentrasi 2% b/v sebanyak 1 ml/gr BB secara peroral
- c. Kelompok III : 3 ekor mencit diberi ekstrak daun pare konsentrasi 4% b/v sebanyak 1 ml/gr BB secara peroral
- d. Kelompok IV : 3 ekor mencit diberi ekstrak daun pare konsentrasi 6% b/v sebanyak 1ml/ gr BB secara peroral

- e. Kelompok V: 3 ekor mencit diberi larutan natrium diklofenak secara peroral (kontrol positif)

Kemudian diukur volume udem telapak kaki mencit setelah perlakuan setiap selang waktu 15 menit selama 3 jam. Volume udem ditentukan berdasarkan kenaikan raksa pada alat plathysmometer.

E. Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data berdasarkan hasil pengamatan dilanjutkan dengan analisa dan secara statistik menggunakan regresi dan Rancangan Acak Lengkap (RAL).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstraksi Daun Pare

Tabel 2. Hasil Ekstraksi Daun Pare (*Momordica charantia* L.)

No.	Sampel	Berat sampel	Berat Ekstrak	Volume Pelarut (Etanol 70%)	Lama perendaman
1.	Daun Pare	500 gram	18,03gram	3 liter	3 x 24 jam

2. Data Pengukuran Volume Udem

Tabel 3. Persentase rata-rata Penurunan volume udem telapak kaki mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji, dibandingkan dengan sediaan kontrol.

Perlakuan	Penurunan udem rata-rata (ml)
Kontrol negatif (Na-CMC)	0
Kontrol Positif (Na-diklofenak)	0,04
2%	0,01
4%	0,01
6%	0,02

Tabel 4. Penurunan volume udem telapak kaki mencit yang diberi perlakuan dengan pemberian peroral sediaan uji dan kelompok kontrol (ml)

Perlakuan	Hewan Uji	Pengukuran Volume Udem (ml)								
		Awal	Induksi	Jam ke-1	Jam ke-2	Jam ke-3	Jam ke-4	Jam ke-5	Jam ke-6	Penurunan Udem (ml) Vt-V6)
Na-CMC	1	0.09	0.18	0.21	0.20	0.25	0.23	0.21	0.21	-0.03
	2	0.08	0.16	0.20	0.23	0.24	0.23	0.21	0.20	-0.04
	3	0.09	0.20	0.09	0.23	0.21	0.23	0.25	0.26	-0.06
Rata-rata		0.09	0.18	0.17	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	-0.04
Natrium Diklofenak	1	0.06	0.17	0.18	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.05
	2	0.08	0.15	0.20	0.21	0.19	0.17	0.15	0.11	0.04
	3	0.06	0.15	0.18	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.05
Rata-rata		0.07	0.16	0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.04
Ekstrak Pare 2%	1	0.06	0.12	0.15	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.01
	2	0.08	0.15	0.23	0.21	0.17	0.15	0.14	0.13	0.02
	3	0.10	0.13	0.18	0.20	0.17	0.15	0.14	0.12	0.01
Rata-rata		0.08	0.13	0.19	0.18	0.15	0.14	0.13	0.12	0.01
Ekstrak Pare 4%	1	0.06	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.01
	2	0.06	0.10	0.16	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.01
	3	0.10	0.14	0.18	0.2	0.17	0.15	0.14	0.12	0.02
Rata-rata		0.07	0.12	0.16	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.01
Ekstrak Pare 6%	1	0.07	0.12	0.19	0.22	0.17	0.12	0.11	0.10	0.02
	2	0.10	0.15	0.18	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.02
	3	0.07	0.14	0.15	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.02
Rata-rata		0.08	0.14	0.17	0.20	0.17	0.14	0.13	0.12	0.02

Tabel 5. Hasil pengukuran rata-rata penurunan volume udem telapak kaki mencit awal, setelah induksi, terapi dan persen penurunan

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran Volume Udem (ml)				
		Awal	Induksi	Terapi	Penurunan Volume Udem setelah perlakuan (Vinduksi-Vterapi)	Persentase Penurunan (%)
Na-CMC	1	0.09	0.18	0.21	0	0
	2	0.08	0.16	0.20	0	0
	3	0.09	0.20	0.26	0	0
Natrium Diklofenak	1	0.06	0.17	0.12	0.05	29%
	2	0.08	0.15	0.11	0.04	26%
	3	0.06	0.15	0.10	0.05	33%
Ekstrak Pare 2%	1	0.06	0.12	0.11	0.01	8,3%
	2	0.08	0.15	0.13	0.02	13%
	3	0.10	0.13	0.12	0.01	7,7%
Ekstrak Pare 4%	1	0.06	0.12	0.11	0.01	8,3%
	2	0.06	0.10	0.09	0.01	10%
	3	0.10	0.14	0.12	0.02	14%
Ekstrak Pare 6%	1	0.07	0.12	0.10	0.02	16%
	2	0.10	0.15	0.13	0.02	13%
	3	0.07	0.14	0.12	0.02	14%

3 *Pembahasan*

Inflamasi merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan agen asing yang masuk ke tubuh, tidak hanya itu inflamasi juga bisa disebabkan oleh cedera jaringan oleh karena trauma, bahan kimia, panas, atau fenomena lainnya. (Guyton dan Hall, 1997).

Gejala-gejala terjadinya respon peradangan adalah kemerahan (rubor) yang merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah mengalir kedalam mikrosirkulasi lokal. Pembuluh-pembuluh darah yang sebelumnya kosong dan sebagian saja meregang dengan cepat dan terisi penuh oleh darah. Panas (kolor), terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan. Panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh yakni kulit. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah dengan suhu 37°C yang disalurkan tubuh ke permukaan daerah yang terkena radang lebih banyak disalurkan dari pada ke daerah normal. Rasa sakit (dolor) terjadi karena pelepasan mediator-mediator nyeri (histamin, kinin, dan prostaglandin). Pembengkakan (tumor) terjadi akibat adanya peningkatan permeabilitas dinding kapiler serta pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein dari pada biasanya yang kemudian

meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak. Perubahan fungsi (fungsi laesa) merupakan konsekuensi dari suatu proses radang. Gerakan yang terjadi pada daerah radang baik yang dilakukan secara sadar ataupun secara reflek akan mengalami hambatan oleh rasa sakit, pembengkakan yang hebat secara fisik mengakibatkan berkurangnya gerak jaringan (Price dan Wilson, 1995).

Jika suatu obat dapat menurunkan edema yang diinduksikan dengan karagenin berarti obat tersebut mempunyai efek antiinflamasi. Derajat efektivitas obat antiinflamasi tergantung pada besarnya penurunan edema oleh obat tersebut.

Daun pare mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, saponin, flavonoid, steroid/triterpenoid, asam fenolat, alkaloid, dan karotenoid (Tati, 2004). Flavonoid menunjukkan lebih dari seratus macam bioaktivitas. Bioaktivitas yang ditunjukkan antara lain efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi (Wijayakusuma, 2001: 3). Flavonoid dapat menghambat siklooksigenase sehingga kemungkinan besar efek antiinflamasi disebabkan karena penghambatan siklooksigenase yang merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan (Robinson, 1991: 191).

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstraksi secara maserasi. Metode maserasi merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan), dan cocok untuk sampel yang bertekstur lunak. Selain itu, pemanasan dapat menyebabkan kerusakan kandungan kimia dalam simplisia. Metode ini memiliki keuntungan yaitu semua bagian sampel dapat kontak dengan larutan.

Maserasi dilakukan dengan cara merendam simplisia sebanyak 250 g dalam cairan penyari etanol 70% . Etanol digunakan sebagai cairan penyari karena mampu menarik komponen senyawa polar dan non polar. Selain itu, dipilih sebagai larutan penyari karena etanol sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal, kapang dan kuman sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas dan relatif tidak toksik.

Pengujian antiinflamasi dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) jantan sebagai hewan uji karena mencit (*Mus musculus*) jantan kondisi biologisnya stabil bila dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa siklusnya (estrus). Pengujian antiinflamasi pada mencit berdasarkan metode Rat hind paw edema, yaitu pembengkakan radang buatan pada telapak kaki kiri hewan uji yang diinduksi karagenan.

Sebelum perlakuan, masing-masing mencit dipuasakan selama 8 jam. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan berkhasiat pada ekstrak etanol daun pare yang dapat mempengaruhi efek antiinflamasi yang ditimbulkan. Kemudian ditimbang berat badannya, untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, lalu diukur volume awal kaki kiri mencit dengan menggunakan *Pletismometer Panlab LE 7500*, untuk mengetahui volume kaki sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Setelah itu, tiap kelompok perlakuan diinduksi karagenan dengan cara disuntikan secara intraplantar pada bagian kaki kiri mencit. Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-jam pertama dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan udem. Fase

kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam- 2,5 jam. Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelahnya. Kemudian udem berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan ditunggu selama 1 jam. Hal ini karena 1 jam setelah pemberian karagenan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian diukur volume kaki kiri mencit setelah diinduksi. Setelah itu, diberikan ekstrak 2%, 4%, 6%, kontrol positif dan kontrol negatif sesuai kelompok perlakuannya. Diukur volume penurunan udem tiap 1 jam selama 6 jam. Diamati 1 jam selama 6 jam untuk melihat penurunan volume udem dari tiap kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa pemberian larutan koloidal Na-CMC tidak mempengaruhi penurunan persentase radang kaki mencit. Pada kelompok Na-CMC persentase radang yang dihasilkan meningkat dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Hal ini karena Na-CMC hanya sebagai pelarut media obat sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema sehingga edema akan terus meningkat dan proses penghilangan mediator-mediator inflamasi dalam tubuh mencit hanya terjadi secara alamiah, sehingga persentase penurunan udemnya 0%.

Pada pemberian ekstrak etanol daun pare 2%, 4% dan 6% rata-rata radang meningkat perlahan dan terus berlangsung sampai pada jam ke-2 dan mulai mengalami penurunan pada jam ke-3 dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Pada ekstrak etanol daun pare 2% terjadi penurunan volume udem rata-rata sebesar

8,3%, 13% dan 7,7%. Ekstrak etanol daun pare 4% terjadi penurunan sebesar 8,3%, 10% dan 14%, sedangkan pada ekstrak etanol daun pare 6% terjadi penurunan sebesar 16%, 13% dan 14%. Dari persentase penurunan volume udem terlihat adanya aktivitas antiinflamasi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena kemungkinan adanya kandungan senyawa flavanoid yang terkandung dalam daun pare yang diketahui berperan penting dalam penghambatan prostaglandin (PGE) dan lipooxygenase (LOX). Mekanisme flavanoid dalam menghambat proses terjadinya inflamasi melalui 2 cara, yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler dan menghambat metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial. Flavanoid terutama bekerja pada endothelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hipermeabilitas dan radang. Beberapa senyawa flavanoid dapat menghambat pelepasan asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari membran dengan jalan memblokir jalur siklooksigenase. Penghambatan jalur siklooksigenase dapat menimbulkan pengaruh lebih luas karena reaksi siklooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju ke hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan.

Pada kelompok pembanding (natrium diklofenak) radang meningkat perlahan dan terus berlangsung sampai pada jam ke-2 dan mulai mengalami penurunan pada jam ke-3 dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Persentase penurunan volume udem kelompok pembanding lebih besar dibandingkan dengan larutan uji dengan persentase penurunan volume udem sebesar 29%, 26% dan 33% artinya potensi penghambatan natrium diklofenak lebih besar dibandingkan larutan uji. Hal ini

karena natrium diklofenak bekerja dengan cara menstabilkan membran lisosomal, menghambat pembebasan dan aktivitas mediator peradangan (histamin, serotonin, prostaglandin), menghambat migrasi sel ke tempat peradangan dan menekan rasa nyeri.

Hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% yang mana faktor hitung lebih besar dari faktor tabel yang menunjukkan nilai signifikan yang artinya ada perbedaan efek antara perlakuan, sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh pemberian ekstrak pare terhadap efek antiinflamasi mencit jantan.

Aktivitas antiinflamasi ekstrak etanol daun pare dapat dilihat pada hasil analisis uji BNJ Tukey (beda nyata jujur) ternyata pada konsentrasi 2%, 4% dan 6% menunjukkan efek antiinflamasi yang tidak beda nyata/pengaruh tidak nyata dan adanya pengaruh nyata/beda nyata dengan pembanding natrium diklofenak. Sedangkan kelompok kontrol negatif yakni Na-CMC menunjukkan perbedaan yang nyata pada semua kelompok yaitu ekstrak etanol daun pare 2%, 4%, 6% yang berarti ekstrak etanol daun pare menunjukkan adanya efek antiinflamasi.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi pengukuran volume telapak kaki mencit dengan pletismometer diantaranya sulitnya mengkondisikan hewan uji pada saat pembacaan skala. Kedua banyaknya zat-zat pengotor yang bercampur pada larutan NaCl 0,9%, dimana NaCl sebagai indikator pembengkakan, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran.

Penelitian ini mengingatkan kita tentang adanya tanda-tanda kekuasaan Allah swt. dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang memang penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan keagungannya dan keperkasaannya. Seperti pada hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat tanaman yang baik untuk dijadikan sebagai obat yaitu tanaman pare yang berkhasiat sebagai antiinflamasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

- B. Ekstrak etanol daun pare (*Momordica charantia L.*) dapat memberikan efek antiinflamasi.
- C. Ekstrak etanol daun pare (*Momordica charantia L.*) 2%, 4% dan 6% memiliki efek antiinflamasi dan efek antiinflamasi yang paling besar adalah 6% diantara konsentrasi yang digunakan.
- D. Hasil analisis data secara statistik dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada taraf kepercayaan 5% dan 1% menunjukkan terdapat perbedaan efek antara perlakuan. Pada uji lanjutan yaitu Uji Beda Nyata Jujur Tukey (BNJ) pada konsentrasi 2%, 4% dan 6% menunjukkan hasil tidak signifikan dengan kontrol positif natrium diklofenak.

E. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan dosis ekstrak etanol daun pare (*Momordica charantia L.*) agar diketahui dosis ekstrak etanol daun pare yang memberikan aktivitas antiinflamasi yang lebih baik.
2. Dapat dilakukan pemisahan senyawa agar diketahui senyawa metabolit yang lebih berperan memberikan aktivitas antiinflamasi.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an.

Arrington, L. Introductory Laboratory Animal. *The Breeding, Care, and Management of Experimental Animal Science*. New York: The Interstate Printers and Publishing, Inc. 1972.

Azwar A. *Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I Pengobatan Tradisional*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1992.

Corwin, E.J. *Handbook Of Pathophysiology*, 3th Edition. Philadelphia :Lippincott Williams dan Wilkins.2008.

Dalimartha S. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Bunda. 2008.

Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 1979.

Ditjen POM. *Materia Medika Jilid IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1989.

Ditjen POM. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1986.

Dorland, W.A.N. *Kamus Kedokteran Dorland Edisi 29*. Jakarta: EGC. 2002.

Ganiswara, S. G. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: Gaya Baru. 2005.

Guyton A. C., Hall J. E. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 9*. Jakarta : EGC. 1997.

Hall, J. B., Gregory A. S., and Lawrence D. H. W. *Principles of Critical Care*. Third Edition. New York: Mc Graw Hill. 2005.

Harbone, J.B. *Metode Fitokimia*. Bandung: ITB. 1987.

Hariana Arief. *Tumbuhan Obat & Khasiatnya Seri I*. Jakarta: Penebar Swedaya Grup. 2013.

Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: Penerbit UI Press. 1989.

Katno, Pramono S. *Tingkat Manfaat dan Keamanan Tanaman Obat dan obat Tradisional*. Balai Penelitian Tanaman Obat Tawangmangu Fakultas Farmasi, UGM. Yogyakarta. [Http/www.Google.com](http://www.Google.com) [10 Januari 2016]. 2005.

Katzung, B.G. *Farmakologi Dasar dan Klinik Edisi VIII*. Alih Bahasa: Dripta Sjabana dkk. 1998.


- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media Bandung. 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. PT. Syaamil Cipta Media Bandung. 2010.
- Lulmann, H., Klaus M., Albercht Z., and Detlef B. *Color Atlas of Pharmacology*. Second Edition. New York: Thieme. 2000.
- Malole. M.B.B. dan Pramono, S.C.U. *Penanganan Hewan Percobaan di Laboratorium Bioteknologi*. Bandung: ITB. 1989.
- Mansjoer, S. *Mekanisme Kerja Obat Antiradang*. Jakarta : Media Farmasi Indonesia. 1999..
- Morris, C.J. *Carrageenan-Induced Paw Edema in the Rat and Mouse*. *Methods Mol Biol*. 2003.
- Mutairi and Jasser. *Effect of using Rotary Evaporator on Date Dibs Quality*. *Journal of American Science*. 2012.
- Mutschler, Ernst. *Dinamika Obat Farmakologi dan Toksikologi*. Edisi kelima. Bandung: Unstitut Teknologi Bandung. 1991.
- Mycek, Mary J. *Farmakologi Ulasan Bergambar*. Jakrta: Widya Medika. 2001.
- Nogrady, T. *Kimia Medicinal: Pendekatan Secara Biokimia*. Bandung. ITB. 1992.
- Nugroho, B W., Dadang, dan Prijono, D. *Pengembangan dan Pemanfaatan Insektisida Alami*. *Pusat Kajian Pengendalian Hama Terpadu*. Bogor : ITB. 1999.
- Pamudji G. *Petunjuk Praktikum Farmakologi*. Surakarta: Bagian Farmakologi Universitas Setia Budi. 2003.
- Price, S. A & Wilson, L. M. *Patofisiologi Konsep Klinik Proses-Proses Penyakit* .(Edisi 4). Jakarta: EGC. 2005.
- Priyanto. *Farmakoterapi dan Terminologi Medis*. Leskonfi: Depok. 2009.
- Robinson T. *Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi*. Edisi 6. Bandung: Penerbit ITB. 1991.
- Rowe, R.C., Paul, J.S., and Marian, E.Q. *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. London: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. 2009.
- Saumantera I. Wayan. *Pemanfaatan Obat Penurun Panas oleh Masyarakat Angkah, Tabanan Bali, dalam Prosiding Seminar Nasional XXV Tumbuhan Obat Indonesia*. Pokjanas, Tawangmangu. 2004.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta. 2002.
- Singh, A., Maholtra, S., dan Subban, R. *Antiinflammatory and Analgesic Agents from Indian Medicinal Plants*. International Journal of Integrative Biology. 2008.
- Smith dan Mangkoewidjojo. *Pemeliharaan, Pembiakan dan Penggunaan Hewan Percobaan pada Daerah Tropis*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1988.
- Subagyo, R. L. *Pemilihan NSAID Untuk Berbagai Situasi Klinik*. [online]. <http://www.pabmi.Com> [8 Januari 2016]. 2004.
- Sudarsono D.G., Subagus W. *Tumbuhan Obat II. Hasil Penelitian, Sifat- Sifat dan Penggunaan*. Yogyakarta: Penerbit PSOT UGM. 2002.
- Susanty D.W. *Cara Bijak Menggunakan Obat Herbal*. Meditek. 2003.
- Tati Subahar. *Khasiat & Manfaat Pare, si Pahit Pembasmi Penyakit*. Jakarta: Agromedia Pustaka. 2004.
- Tjay, T. H., dan Raharja. *Obat-Obat Penting. Khasiat, Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya Edisi V*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2002.
- Vinegar, R., Truax, J.L., dan Selph, J.L. *Quantitative Studies of The Pathway to Acute Carrageenan Inflammation*. Federation Proceefing. 1976.
- Vogel, H. G., *Drug Discovery dan Evaluation : Pharmacological Assays, 2nd Edition*. New York : Springer. 2002.
- Voight, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, Diterjemahkan oleh Soendani N. S*. Yogyakarta: UGM Press. 1995.
- Wibowo, Somekto & Abdul Gofur. *Farmakoterapi Dalam Neurologi*. Yogyakarta: Salemba Medika. 2001.
- Wijayakusuma H. *Penyembuhan dengan Bawang Putih dan Bawang Merah*. Jakarta: Penerbit Milenia Popular. 2001.
- Wilmana, P.F., dan Sulistia G.G. *Analgesik-Antipiretik Analgesik AntiInflamasi Nonsteroid dan Obat Pirai. Dalam: Sulistia G.G. Farmakologi dan Terapi Edisi V*. Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2007.
- Windholz et al. *The Merck Index An Exycyclopedia of Chemical And Drugs Ninth Edition*. Rahway USA: Merck & CO. Inc. 1976.


Winter, C.A., Risley, E.A., dan Nuss, G.W. *Carrageenin-Induced Udem in Hind Paw of the Rat as an Assay for Antiinflammatory Drugs*. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1962.



Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Daun Pare (*Momordica charantia* L.)



Lampiran 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pare (*Momordica charantia* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)



Lampiran 3. Perhitungan Dosis dan Volume Pemberiaan sediaan Uji

1. Perhitungan Dosis

Natrium Diklofenak

$$\text{Dosis lazim diklofenak} = 25 \text{ mg/kgBB}$$

$$\text{Faktor konversi dari manusia ke mencit} = 0,0026$$

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk mencit 20 gram} &= \text{FK} \times \text{DL} \\ &= 0.0026 \times 25 \\ &= 0.065 \text{ mg/kgBB} \end{aligned}$$

Untuk pemberian oral digunakan standar volume maksimal 1 ml untuk mencit 30 gram

$$\begin{aligned} \text{Dosis untuk mencit 30 gram} &= \frac{30 \text{ g}}{20 \text{ g}} \times 0,065 \text{ mg/kgBB} \\ &= 0,0975 \text{ mg/kgBB} \end{aligned}$$

Perhitungan larutan stok

$$\begin{aligned} \text{Larutan stok 10 ml} &= 0,0975 \times 10 \text{ ml} \\ &= 0,975 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat 10 tablet diklofenak} &= 1,83 \text{ g} \\ &= 1830 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 10 tablet}}{10} \\ &= \frac{1830 \text{ mg}}{10} \\ &= 183 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{\text{berat yang diinginkan}}{\text{berat etiket}} \times \text{berat rata-rata} \\
 &= \frac{0,975 \text{ mg/kgBB}}{25 \text{ mg}} \times 183 \text{ mg} \\
 &= 7,137 \text{ mg/kgBB}
 \end{aligned}$$

2. Volume Pemberiaan sediaan Uji

Volume pemberian sediaan secara oral pada mencit (*Mus musculus*) adalah 1 ml.

$$\text{Hewan Uji BB tertinggi} = 30 \text{ g}$$

$$\text{Volume pemberian sediaan} = 1 \text{ ml}/30 \text{ g}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{\text{Berat yang ditanya}}{\text{berat max}} \times V_{p\text{max}}$$

a. Na-CMC (Kontrol Negatif)

$$1) V_{p1} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.86 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.83 \text{ ml}$$

b. Natrium Diklofenak (Kontrol positif)

$$1) V_{p1} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

c. Ekstrak etanol daun pare 2%

$$1) V_{p1} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{24 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{21 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.7 \text{ ml}$$

d. Ekstrak etanol daun pare 4%

$$1) V_{p1} = \frac{26 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.86 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{24 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.8 \text{ ml}$$


$$3) V_{p3} = \frac{21 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.7 \text{ ml}$$

e. Ekstrak etanol daun pare 6%

$$1) V_{p1} = \frac{25 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.83 \text{ ml}$$

$$2) V_{p2} = \frac{20 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0.6 \text{ ml}$$

$$3) V_{p3} = \frac{23 \text{ g}}{30 \text{ g}} \times 1 \text{ ml} = 0,76 \text{ ml}$$



Lampiran 4. Analisis Statistik Inflamasi

Kelompok	Hewan	Penurunan Volume Udem (ml)							
		t ₁	t ₂	t ₃	t ₄	t ₅	t ₆	Σ	Rata-rata
A	1	0.21	0.20	0.25	0.23	0.21	0.21	1.31	0.22
	2	0.20	0.23	0.24	0.23	0.21	0.20	1.31	0.22
	3	0.09	0.23	0.21	0.23	0.25	0.26	1.27	0.21
Jumlah		0.50	0.66	0.70	0.69	0.67	0.67	3.89	
Rata-rata		0.17	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	1.3	0.22
B	1	0.18	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.77	0.13
	2	0.20	0.21	0.19	0.17	0.15	0.11	1.03	0.17
	3	0.18	0.17	0.15	0.13	0.12	0.10	0.85	0.14
Jumlah		0.56	0.51	0.45	0.42	0.38	0.33	2.65	
Rata-rata		0.19	0.17	0.15	0.14	0.13	0.11	0.88	0.15
C	1	0.15	0.13	0.11	0.12	0.11	0.11	0.73	0.12
	2	0.23	0.21	0.17	0.15	0.14	0.13	1.03	0.17
	3	0.18	0.20	0.17	0.15	0.14	0.12	0.96	0.16
Jumlah		0.56	0.54	0.45	0.42	0.39	0.36	2.72	
Rata-rata		0.19	0.18	0.15	0.14	0.13	0.12	0.91	0.15
D	1	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.76	0.13
	2	0.16	0.17	0.15	0.13	0.11	0.09	0.81	0.14
	3	0.18	0.20	0.17	0.15	0.14	0.12	0.96	0.16
Jumlah		0.48	0.51	0.45	0.40	0.37	0.32	2.53	

Rata-rata		0.16	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.84	0.14
E	1	0.19	0.22	0.17	0.12	0.11	0.10	0.91	0.15
	2	0.18	0.20	0.18	0.16	0.14	0.13	0.99	0.17
	3	0.15	0.18	0.16	0.15	0.13	0.12	0.89	0.15
Jumlah		0.52	0.60	0.51	0.43	0.38	0.35	2.79	
Rata-rata		0.17	0.20	0.17	0.14	0.13	0.12	0.93	0.16
Jumlah total								14,58	
Rata-rata jumlah total									0,16

- Keterangan:
- A : Kelompok I Na-CMC
 - B : Kelompok II Natrium Diklofenak
 - C : Kelompok III Ekstrak Etanol Daun Pare 2%
 - D : Kelompok IV Ekstrak Etanol Daun Pare 4%
 - E : Kelompok V Ekstrak Etanol Daun Pare 6%
 - t₁ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-1
 - t₂ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-2
 - t₃ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-3
 - t₄ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-4
 - t₅ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-5
 - t₆ : Pengukuran volume kaki pada jam ke-6

A. Derajat Bebas (DB)

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Derajat Bebas Total (DBT)} &= \sum n-1 \\
 &= (5 \times 3 \times 6) - 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 89 \\
 2. \text{ Derajat Bebas Perlakuan (DBP)} &= \text{Total banyaknya perlakuan} - 1 \\
 &= 5-1 \\
 &= 4 \\
 3. \text{ Derajat Bebas Galat (DBG)} &= \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan} \\
 &= 89-4 \\
 &= 85 \\
 4. \text{ Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{\text{Jumlah}^2}{\text{Banyak perlakuan} \times \text{jumlah replikasi} \times t} \\
 &= \frac{(14,58)^2}{5 \times 3 \times 6} \\
 &= \frac{212,5764}{90} \\
 &= 2,36196
 \end{aligned}$$

B. Jumlah Kuadrat (JK)

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Jumlah Kuadrat Total (JKT)} &= \sum(Y_{ij})^2 - \text{FK} \\
 &= [(0,21)^2 + (0,20)^2 + \dots + (0,12)^2 - \\
 &\quad 2,36196] \\
 &= 2,5272 - 2,36196 \\
 &= 0,16524 \\
 2. \text{ Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)} &= \frac{(T_{ij})^2}{r} - \text{Faktor Koreksi} \\
 &= \frac{[(1,31)^2 + (1,31)^2 + \dots + (0,89)^2]}{3} - \text{FK}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{14,6924}{6} - 2,36196$$

$$= 2,448733 - 2,36196$$

$$= 0,086773$$

$$3. \text{ Jumlah Kuadrat Galat (JKG)} = \text{JKT} - \text{JKP}$$

$$= 0,16524 - 0,086773$$

$$= 0,078467$$

C. Kuadrat Tengah

1. Kuadrat Tengah Perlakuan

$$= \frac{\text{Jumlah Kuadrat Perlakuan}}{\text{Derajat Bebas Perlakuan}}$$

$$= \frac{0,086773}{4}$$

$$= 0,021693$$

2. Kuadrat Tengah Galat

$$= \frac{\text{Jumlah kuadrat galat}}{\text{Derajat Bebas Galat}}$$

$$= \frac{0,078467}{85}$$

$$= 0,000923$$

3. F Hitung perlakuan

$$= \frac{\text{Kuadrat Tengah Perlakuan}}{\text{Kuadrat Tengah Galat}}$$

$$= \frac{0,021693}{0,000923}$$

$$= 23,50$$

Tabel 6. Analisis ragam dengan nilai F tabel

Sumber Keseragaman	DB	JK	KT	F hitung	F Tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	0,123	0,0307	23,50*	2,48	3,56
Galat	85	0,038	0,0004			
Total	89					

Keterangan :

FH > FT 5%, 1%

* = signifikan

Ns = non signifikan


F hitung signifikan pada taraf kepercayaan 1% dan 5%. F hitung dinyatakan signifikan jika F hitung > F tabel artinya terdapat perbedaan yang nyata dari setiap perlakuan.

Untuk menentukan perlakuan yang signifikan, dilakukan Uji Tukey sebagai berikut.



Tabel 6. Hasil uji BNJ Tukey

Persentase Penurunan				
Perlakuan	N	Subset for alpha = 0,05		
		1	2	3
Na-CMC	3	00000		
Ekstrak 2%	3		9.6667	
Ekstrak 4%	3		10.7667	
Ekstrak 6%	3		14.3333	
Natrium Diklofenak	3			29.3333
Sig.		1	0.55	1

Efek ekstrak etanol daun pare (*Momordica charantia* L.) 2%, 4% dan 6% memiliki aktivitas yang tidak berbeda nyata dan berbeda nyata dengan pembandingan kontrol negatif Na-CMC artinya ekstrak daun pare memiliki potensi sebagai antiinflamasi



Lampiran 5. Gambar

Gambar	Keterangan
	<p>Gambar 2. Daun Pare <i>(Momordica charantia L.)</i></p>
	<p>Gambar 3. Proses maserasi menggunakan etanol 70%</p>



Gambar 4.
Rotavapor




Gambar 5.
Ekstrak kental etanol daun
pare 2%, 4%, dan 6%



Gambar 6.
Penimbangan berat badan
mencit




Gambar 7.
Pemberian oral sediaan uji



Gambar 8.
Pengukuran volume awal
kaki mencit



Gambar 9.
Pengukuran volume kaki
mencit 1 jam setelah
diinduksi karagenin



Gambar 10.
Pletismometer Model/series
PANLAB LE 7500



Gambar 11.
Udema kaki kiri mencit

RIWAYAT HIDUP



Dini Amalia, Lahir di Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Juni 1994 merupakan putri keempat dari pasangan suami istri Drs. H. M. Natsir AR dan Hj. Nurmiala Tahir, BAE. Pendidikannya diawali di TK. Kartika Jaya Wirabuana Kodim 1409 Somba Opu pada tahun 1999 dan dilanjutkan ke jenjang SDN. 1 Sungguminasa pada tahun 2000 hingga 2006. Lalu penulis melanjutkan ke tingkat menengah pertama dan menengah atas di PP. Abnaul Amir selama 6 tahun sejak 2006 hingga 2012. Dan masih diberi kesehatan dan kesempatan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai mahasiswa pada tahun 2012 dan diterima di Jurusan Farmasi Fakultas Kesehatan. Dan Alhamdulillah dapat menyelesaikan studinya selama 4 tahun dengan bergandengkan gelar Sarjana Farmasi (S.Farm).

ALAUDDIN
M A K A S S A R