

**PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI
WORTEL (*Daucus Carota L.*) TERHADAP PENINGKATAN
KADAR HEMOGLOBIN REMAJA PUTRI ANEMIA
DI MTs GUPPI SAMATA KABUPATEN GOWA
TAHUN 2019**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan
Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ANDI NURHANA MAGFIRAH

NIM: 70200115004

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nurhana Magfirah
NIM : 70200115004
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 21 Januari 1998
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/Gizi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pondok Puri Samata
Judul : Pengaruh Pemberian Brownies Tempe (*Daucus carota* L.)
Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Remaja Putri Anemia di
MTs Guppi Samata

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata- Gowa, 02 November 2019

Penyusun,



Andi Nurhana Magfirah
NIM: 70200115004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Pemberian Brownies Tempe Substitusi Wortel (*Daucus carota* L.) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin Remaja Putri Anemia di MTs Guppi Samata”, yang disusun oleh **Andi Nurhana Magfirah**, NIM: 70200115004, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 Oktober 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 21 Oktober 2019 M
22 Safar 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Hasaruddin, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Brownies Tempe Substitusi Wortel (*Daucus carota L.*) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin (Hb) Remaja Putri Anemia di Pesantren Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata” guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun kekurangan dalam skripsi ini, merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah, dimana kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah SWT. Namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai hasil usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Alm) Drs Sapril H. Muchtar M.Sc dan Ibunda Wahida Makka SPd serta adik-adikku Andi Nursafirah Mutmainnah, Andi Muhammad Nastain dan Andi Nurhalizah Khumairoh yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II dan III.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Djalaluddin , S.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Bapak Abd Madjid HR. Lag SKM, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Suktifrianty Syahrir SKM, M.Kes selaku Sekertaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Syarfaini, SKM., M.Kes, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sukfitrianty Syahrir SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Irviani A Ibrahim selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. H. Hasaruddin S.Ag., M.Ag selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini
7. Kepala Sekolah MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata, Para guru, serta para adik-adik responden yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata.

8. Saudara-saudaraku terkasih Andi Nursafirah Mutmainnah, Andi Muhammad Nastain dan Andi Nurhalizah Khumairoh yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil dan semangat sehingga penulis merasa kuat menjalani kehidupan ini.
9. Keluarga Besar Peminatan Gizi 2015, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Twelvesb1 (Nadilah, Putri, Andah, Julia, Ayu, Icha, Dhea, Nadhira, Dwi, Meylan, Rhisa, Cindy, Balgis, Abay, Aceng, Angga, Annas, Hikam, Kim, Darul, Hafizh, Muchlis, Gheri) dan Sahabat Misqueen (Fira, Fahira, Oliv, Rahma dan Adila) atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan NyetNyot (Ekki, Nadhilah, Amaliah dan Fira) dan 9irls (Marlina, Reski, Nurinzana, Ridha, Aisyah, Iffah, Vika dan Cibe) yang selalu ada menemani dalam suka maupun duka sehingga penulis bisa merasakan manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
12. Partner mengerjakan skripsi Muh. Rizal Ramli yang selalu memberi semangat ketika penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis dari awal menempuh pendidikan di Universitas hingga penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikan serta doa dan harapan semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bagi semua.

Samata, Januari 2019

Penulis

Andi Nurhana Magfirah

NIM 70200115004

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Tentang Remaja	13
B. Tinjauan Tentang Anemia	22
C. Tinjauan Tentang Hemoglobin	28
D. Tinjauan Tentang Zat Besi	31
E. Tinjauan Tentang Tempe.....	40
F. Tinjauan Tentang Wortel.....	44
G. Tinjauan Tentang Brownis Tempe Substitusi Wortel.....	46
H. Kerangka Teori	49
I. Kerangka Konsep.....	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel.....	52

D. Metode Pengumpulan Data.....	54
E. Instrumen Penelitian.....	55
F. Validasi dan Reliabilitasi.....	56
G. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	60
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
2. Gambaran Umum Responden.....	62
3. Hasil Analisis.....	69
B. Pembahasan.....	76
1. Asupan Protein.....	78
2. Kadar Vitamin A.....	82
3. Asupan Zat Besi (Fe).....	86
4. Kadar Hemoglobin (Hb).....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Kematangan Seksual Remaja Wanita
Tabel 2.2	Angka Kecukupan Gizi pada Remaja Usia 13-15 Tahun
Tabel 2.3	Angka Kecukupan Zat Besi yang di anjurkan (Perhari)
Tabel 2.4	Batas Anemia (menurut Departemen Kesehatan) Kelompok Hemoglobin (gr / 100 dl)
Tabel 2.5	Komposisi Kimia Kedelai dan Tempe per 100 gram
Tabel 2.6	Rata-Rata Kandungan Zat Gizi Dalam 100 Gram Brownies Tempe Subtitusi Wortel (<i>Daucus Carota L</i>)
Tabel 4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Umur di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata Tahun 2019
Tabel 4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata Tahun 2019
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata Tahun 2019
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata Tahun 2019
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata Tahun 2019
Tabel 4.6	Distribusi Responden Terhadap Status Anemia Berdasarkan Status Anemia di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019
Tabel 4.7	Jumlah Konsumsi Produk pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Kasus Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019
Tabel 4.8	Jumlah Konsumsi Produk pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Kasus Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A dan Kadar

Hemoglobin Sebelum Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi
Ulum Samata Tahun 2019

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi,
Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A dan Kadar
Hemoglobin Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi
Ulum Samata Tahun 2019

Tabel 4.11 Rata-Rata Perubahan Asupan Protein Berdasarkan Metode Re-Call
24 Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi
Ulum Samata Tahun 2019

Tabel 4.12 Rata-Rata Perubahan Asupan Vitamin A Berdasarkan Metode Re-
Call 24 Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata Tahun 2019

Tabel 4.13 Rata-Rata Perubahan Asupan Zat Besi (Fe) Berdasarkan Metode Re-
Call 24 Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata Tahun 2019

Tabel 4.14 Rata-Rata Perubahan Kadar Hemoglobin (Hb) Berdasarkan Metode
Re-Call 24 Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had
Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Penyebab Anemia
- Gambar 2.2 Kerangka Konsep
- Gambar 3.1 Kerangka Pikir
- Gambar 4.1 Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi
- Gambar 4.2 Grafik Perubahan Asupan Vitamin A Sebelum dan Setelah Intervensi
- Gambar 4.3 Grafik Perubahan Asupan Zat Besi (Fe) Sebelum dan Setelah Intervensi
- Gambar 4.4 Grafik Perubahan Kadar Hemoglobin Sebelum dan Setelah Intervensi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Kuesioner Identitas Responden
- Lampiran 3 Lembar *Food Recall* 24 Jam
- Lampiran 4 Form Data Pemeriksaan Kadar Hb
- Lampiran 5 Form Pemantauan Konsumsi Brownies Tempe Substitusi Wortel
(*Daucus Carota L.*)
- Lampiran 6 Bahan Untuk Membuat Brownies Tempe Dan Brownies Tempe
Substitusi Wortel
- Lampiran 7 Hasil Pemantauan Konsumsi Produk (Brownies Tempe)
- Lampiran 8 Hasil Pemantauan Konsumsi Produk (Brownies Tempe Substitusi
Wortel)
- Lampiran 9 Master Tabel Kelompok Kontrol Di Mts Ma'had Manahilil Guppi
Ulum Samata Tahun 2019
- Lampiran 10 Master Tabel Kelompok Kasus Di Mts Ma'had Manahilil Guppi
Ulum Samata Tahun 2019
- Lampiran 11 Lampiran Foto
- Lampiran 12 Foto Hasil Food Recall 24 Jam Menggunakan Aplikasi Nutri Survey
2007
- Lampiran 13 Analisis Dengan Menggunakan Aplikasi SPSS 25

**PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL
(*Daucus carota* L.) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN
REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTs GUPPI SAMATA
KABUPATEN GOWA TAHUN 2019**

¹Andi Nurhana Magfirah, ²Syarfaini, ³Sukfitrianty Syahrir
^{1,2,3}Bagian Gizi, Jurusan Kesehatan Masyarakat, FKIK UIN Alauddin Makassar
andinurhana43997@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu masalah gizi yang utama di seluruh dunia terutama di negara berkembang adalah anemia. Diperkirakan 30% populasi manusia di seluruh dunia mengalami anemia. Anemia merupakan keadaan dimana kadar hemoglobin kurang dari batas normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) remaja anemia di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian studi eksperimen semu (*quasi eksperimen design*) dengan rancangan *non randomized control grup pre-test post-test design*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 24 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis menggunakan paired test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh asupan protein terhadap kelompok kontrol ($p=0.003$) dan tidak terdapat pengaruh pada kelompok kasus ($p=0.111$), tidak terdapat pengaruh asupan vitamin A pada kelompok kontrol ($p=0.852$) dan terdapat pengaruh pada kelompok kasus ($p=0.002$), terdapat pengaruh asupan zat besi pada kelompok kontrol ($p=0.000$) dan kelompok kasus ($p=0.000$) serta terdapat pengaruh kadar hemoglobin pada kelompok kontrol ($p=0.000$) dan kelompok kasus ($p=0.000$). Pemberian brownies tempe substitusi wortel dan brownies tempe mampu meningkatkan kadar hemoglobin (Hb) remaja putri anemia selama 30 hari ditandai dengan rata-rata kadar hemoglobin >12 gr/dL.

Kata Kunci : Anemia, Remaja Putri, Brownies Tempe Substitusi Wortel, Kadar Hemoglobin

**THE EFFICACY OF CARROT (*Daucus carota* L.)
SUBSTITUTED TEMPE BROWNIES IN INCREASING THE
HAEMGLOBON LEVEL OF FEMALE ADOLESCENTS IN
MTs GUPPI SAMATA IN GOWA REGENCY IN 2019**

¹Andi Nurhana Magfirah, ²Syarfaini, ³Sukfitrianty Syahrir

^{1,2,3} Nutrition, Public Health Department, Faculty of Medicine and Health
Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar

andimurhana43997@gmail.com

ABSTRACT

Anaemia has become a common nutritional problem in the world including developing countries like Indonesia. Statistics show that around 30% of human population in the world are anaemic. It occurs when the haemoglobin level is below the normal threshold. This research investigates the efficacy of serving carrot substituted Tempe brownies to female adolescents in MTs Guppi Samata in increasing their haemoglobin level. It uses quasi experimental research design and non-randomised control group pre-test post—test design in examining the issue. The samples consist of 24 students who are selected using purposive sampling technique. Moreover, this research uses paired test to analyse the research data. The findings indicate that there is an influence in the protein intake of control group ($p=0.003$) but no influence in the protein intake of case group ($p=0.003$). This research also discovers some influences in the vitamin A intake of both control group ($p=0.852$) and case group ($p=0.002$), in the iron intake of both control group ($p=0.000$) and case group ($p=0.000$), as well as in the haemoglobin level of control group ($p=0.000$) and case group ($p=0.000$). Thus, this research concludes that serving carrot substituted Tempe brownies to female adolescent in MTs Guppi Samata is effective in increasing their haemoglobin level, as indicated by final haemoglobin level of >12 gr/dL.

Keywords: *Anaemia, female adolescents, carrot substituted Tempe Brownies, Haemoglobin level*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah gizi yang utama di seluruh dunia terutama di negara berkembang adalah anemia. Diperkirakan 30% populasi manusia di seluruh dunia mengalami anemia. Menurut WHO (2015) Prevalensi anemia di negara-negara maju sebesar 9% dan di negara-negara berkembang sebesar 43%. Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika merupakan wilayah yang memiliki rata-rata hemoglobin (Hb) terendah dan prevalensi anemia tertinggi di dunia, prevalensi anemia tertinggi berada di benua Afrika sebanyak 44.4%, benua Asia sebanyak 32% dan prevalensi terendah berada di benua Amerika sebanyak 7.6% (WHO, 2015)

Anak-anak dan *wanita usia subur* (WUS) adalah kelompok yang paling berisiko, dengan prevalensi anemia pada balita sebesar 47%, pada wanita hamil sebesar 42% dan pada wanita yang tidak hamil usia 15-49 tahun sebesar 30%. *World Health Organization* (WHO) menargetkan penurunan prevalensi anemia pada WUS sebesar 50 % pada tahun 2025 (WHO, 2015)

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara memiliki prevalensi anemia pada wanita usia subur sebesar 28.8% dan pada remaja putri sebesar 42% (WHO, 2016). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, prevalensi anemia di Indonesia sebesar 14.8% dengan proporsi menurut karakteristik usia 5-14 tahun sebanyak 6.9% kemudian terjadi peningkatan prevalensi anemia menjadi 21.7% pada tahun 2013 dengan proporsi menurut karakteristik usia 5-14 tahun sebesar 26.4% dan yang tertinggi berada di pedesaan (22.8%) dibandingkan dengan perkotaan serta lebih tinggi prevalensi perempuan (23.9%) dibandingkan dengan prevalensi laki-laki (18.4%). Hal ini tentu menjadi masalah yang sangat besar

mengingat bahwa wanita usia subur termasuk remaja putri merupakan aset bangsa yang akan menentukan generasi yang baik dimasa depan.

Remaja putri rentan mengalami anemia karena berada dalam usia reproduksi yang setiap harinya memerlukan zat besi tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan remaja putra. Hal ini disebabkan karena remaja putri telah mengalami menstruasi setiap bulannya dan diperparah dengan pola konsumsi remaja putri yang terkadang melakukan diet sehingga lebih sedikit asupan zat besi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka (Martini, 2015).

Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) tahun 2012 menyebutkan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 45.5%. (Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, 2012). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Azhari (2011) di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Gowa, ditemukan sebanyak 57.6% siswi menderita anemia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kejadian anemia pada remaja di Kabupaten Gowa masih tergolong tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumarni (2016) menunjukkan bahwa kejadian anemia pada remaja putri sering ditemukan dilingkungan sekolah maupun lingkungan pondok pesantren. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 57.5% remaja putri di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang mengalami anemia. Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di MTs Ma'had Manahiil Guppi Ulum Samata pada tanggal 18 Januari 2019, pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) yang dilakukan pada 47 pelajar putri, terdapat 24 (51.2%) remaja putri yang mengalami anemia. Dari hasil observasi tersebut maka peneliti berupaya untuk memperbaiki asupan makanan dengan memberikan makanan tambahan yang tinggi akan zat besi melalui pemberian brownies tempe substitusi wortel.

Dampak dari kejadian anemia pada remaja yaitu dapat menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar serta memengaruhi produktifitas dikalangan remaja (Poltekes Depkes Jakarta I, 2014). Akibat dari jangka panjang anemia pada remaja putri yang nantinya akan hamil, maka remaja tersebut tidak mampu memenuhi zat-zat gizi pada dirinya dan pada janinnya sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko kematian maternal, prematuritas, BBLR dan kematian perinatal (Hayati, 2012). Melihat dampak yang terjadi akibat anemia yang sangat merugikan, maka perlu dilakukan pencegahan maupun penanggulangan masalah kesehatan yang menyangkut tentang anemia.

Salah satu solusi dalam penanggulangan anemia defisiensi besi yaitu fortifikasi makanan. Peneliti menggunakan tempe sebagai pangan yang difortifikasi karena merupakan sumber protein, sedangkan sumber protein dan zat besi sangat diperlukan dalam pembentukan kadar hemoglobin. Protein yang terdapat pada tempe tergolong mudah dicerna sehingga memudahkan terbentuknya hemoglobin bersama dengan besi atau senyawa yang lain. Dalam 100 gram tempe mengandung protein 46,5 g, lemak 19,7 g, karbohidrat 30,2 g, serat 7,2 g, abu 3,6 g, kalsium 347 mg, fosfor 724 mg, zat besi 9 mg, vitamin B1 0,28 UI, vitamin B12 3,9 UI (Sutomo, 2008).

Wortel memiliki warna jingga yang menarik, rasa yang manis, aroma khas wortel yang segar sehingga dapat menutupi warna, rasa dan aroma khas pada tempe yang timbul pada saat fermentasi. Kandungan gizi wortel dalam tiap 100 gram diantaranya yaitu energi 42 kal, protein 1,2 g, karbohidrat 9,3 g, lemak 0,3 g, kalsium 39 mg, fosfor 37 mg, zat besi 0,8 mg, vitamin A 12.000 SI, vitamin B 0,06 mg, vitamin C 6 mg, air 88,2 g (Rukmana, 1995).

Firman Allah SWT dalam Q.S Abasaa : 24-32 yang berbunyi

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
 شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَخَلًّا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ
 غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٣٢﴾

Terjemahan: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumput untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu”

Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan makanannya, dengan memasang akalunya kepada makanannya, bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuk manusia. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan air dari langit agar bumi yang ditempati manusia menjadi subur dan Allah tumbuhkan segala bentuk tanaman untuk kepentingan manusia dan makhluk Allah dimuka bumi.

Pada zaman yang modern ini, banyak upaya diversifikasi pangan yang dapat dilakukan dengan memodifikasi bahan dasar tepung terigu dengan pangan lokal yang ada di Indonesia. Salah satu produk olahan pangan yang dapat dijadikan alternative pangan adalah brownies. Menurut Suhardjito (2006), Brownies merupakan kue bertekstur lembut dan padat yang digemari masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang tua.

Penambahan tempe dan wortel ke dalam pembuatan brownies merupakan salah satu bentuk pengolahan makanan tambahan atau jajanan yang diharapkan akan dapat memberi sumbangan zat gizi lainnya terutama zat besi bagi penderita

anemia. Kandungan gizi brownies tempe substitusi wortel (1:1) dalam tiap 100 gram di antaranya yaitu karbohidrat 13.11 %, protein 7.88 %, lemak 20.07 %, vitamin A 4.56 µg/g dan fe 77.86 µg/g (Rabiatul, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mansyur, Wahyuni (2016) di wilayah kerja Puskesmas Mariso tentang pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) ibu hamil anemia, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rata-rata asupan Fe dan kenaikan kadar Hemoglobin (Hb) pada ibu hamil anemia yang diberikan brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel selama 4 minggu.

Dari beberapa uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pemberian Brownies Substitusi Wortel Terhadap peningkatan kadar Hemoglobin(Hb) Remaja Anemia di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu "Bagaimana pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin (Hb) pada remaja putri anemia di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata"

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) pada remaja putri anemia di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata
- b. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) pada remaja putri anemia di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata

2. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) pada remaja putri anemia di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata
- b. Tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Anemia :

Definisi Operasional : Anemia merupakan keadaan dimana kadar hemoglobin kurang dari batas normal.

Kriteria Objektif :

- a. Anemia : Apabila kadar Hb < 12gr/dL
- b. Normal : Apabila kadar Hb ≥ 12gr/dL

2. Remaja

Definisi Operasional:

Remaja atau *adolenscence* merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu remaja yang berusia 12-14 tahun

3. Tempe

Definisi operasional:

Tempe yang dibuat murni dari fermentasi biji kedelai dan memiliki struktur yang kompak, tidak hancur pada saat tempe di potong, serta permukaan tertutupi oleh miselium kapang secara merata. Tempe yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tempe yang murni berbahan dasar kedelai dan telah dibuang kulit arinya terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi tempe, tempe diperoleh di tempat pembuatan tempe di jl. Tamarunang, Kabupaten Gowa.

4. Wortel

Definisi operasional:

Wortel (*Daucus carota L.*) adalah kelompok sayur-sayuran yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, wortel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wortel yang memiliki kontur kulit yang halus, memiliki warna orange yang cerah serta wortel yang masih muda karena rasanya yang lebih manis dan segar. Wortel digunakan adalah jenis chantenang karena wortel ini memiliki umbi akar yang berbentuk bulat panjang dan rasanya manis dan di peroleh dari petani wortel di Malino, Kabupaten Gowa.

5. Brownies Tempe Substitusi Wortel

Definisi Operasional:

Brownies yang dimaksud adalah brownies yang terbuat dari tempe dan wortel (*Daucus carota L.*). Pada penelitian ini, peneliti akan membuat brownies tempe substitusi wortel yang akan diberikan pada remaja anemia untuk peningkatan kadar hemoglobinnya.

E. Kajian Pustaka

Nama Penulis, Nama Jurnal, Edisi, Volume, Jumlah Halaman	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			Hasil Penelitian
		Variabel	Jenis Penelitian	Subjek/Objek	
Rabitatul Isma, Irviani A Ibrahim. <i>Media Gizi dan Pangan, Vol. XXIV, Edisi 2. 2017</i>	Analisis Kandungan Zat Gizi Brownis Tempe Substitusi Wortel (<i>Daucus corota L.</i>) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Terhadap Masyarakat	Brownis Tempe, Wortel, Perbaikan Gizi	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimentatif	Tempe, Wortel	Hasil penelitian dari keempat perlakuan produk brownis tempe substitusi wortel (<i>Daucus corata L.</i>) yang baik dari segi zat gizi dan uji organoleptic adalah perbandingan 1:1 dengan kadar karbohidrat 13.11%, protein 7.88%, lemak 20.07%, vitamin A 4.56 ug/g, zat besi 77.86 ug/g,

					dan uji organoleptic paling disukai dan bermutu baik
Sandra Fikawati, Ahmad Syafiq dkk. <i>Universa Medicina, Vol 24. No.4 2004</i>	Pengaruh Suplementasi Zat Besi Satu-Dua Kali perminggu terhadap Kenaikan Kadar Hb pada Siswa yang Menderita Anemia di SLTP Kota Tangerang	Suplementasi, Zat Besi, Kadar Hb, Siswa Anemia	Jenis penelitian Kuantitatif dengan Metode <i>experimental randomized non blinded</i>	81 Siswi yang mengalami Anemia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi efektifitas yang diukur melalui kadar kenaikan Hb, suplementasi mingguan (satu kali seminggu) ternyata sama efektifnya dengan suplementasi dua kali seminggu.
Sajiman Syahwal, Zulfiana Dewi. <i>Jurnal AcTion : Aceh Nutrition Jurnal, Vol 3 Nomor 1 Tahun 2018</i>	Pemberian Snack Bar Meningkatkan Kadar Hemoglobin (Hb) pada Remaja Putri	Snack Bar, Hemoglobin dan Remaja Putri	Jenis Penelitian Eksperimen dengan desain <i>Non-Equivalen Grup Desain</i>	45 Responden Remaja Putri	Pemberian Snack Bar Tepung Kacang Nagara dan Ikan Haruan dapat meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri.

<p>Damayanti Siallagan, Dudung Angkasa dkk. <i>Jurnal Gizi Klinik Indonesia.</i> <i>Vol 13 No. 2</i> <i>Tahun 2016</i></p>	<p>Pengaruh Asupan Fe, Vitamin A, Vitamin B12 dan Vitamin C Terhadap peningkatan kadar Hemoglobin pada Remaja Vegan</p>	<p>Asupan Fe, Vitamin A, Vitamin B12, Vitamin C, Kadar Hb Remaja Vegan</p>	<p>Jenis Penelitian Observasional analitik dengan desain <i>cross- sectional</i>.</p>	<p>31 Responden Remaja Vegetarian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan zat besi, vitamin b12 dan vitamin C berpengaruh terhadap peningkatan kadarHb remaja vegan.</p>
<p>Dea Indartanti, Apoina Kartini. <i>Jurnal of Nutrition</i> <i>Collage. Volume</i> <i>3 Nomor 2 Tahun</i> <i>2014.</i></p>	<p>Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri</p>	<p>Status Gizi, Anemia, Remaja Putri</p>	<p>Jenis Penelitian Kuantitatif dengan Desain <i>Cross- Sectional</i></p>	<p>90 Responden Remaja Putri</p>	<p>Tidak ada hubungan bermakna antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri</p>

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar Hemoglobin (Hb) remaja anemia di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Gowa

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan protein pada remaja putri anemia
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap asupan vitamin A pada remaja putri anemia
- c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap asupan zat besi (fe) pada remaja putri anemia
- d. Untuk mengetahui pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri anemia

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan utamanya dibidang gizi khususnya dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang manfaat pemberian brownies tempe substitusi wortel bagi kesehatan sehingga dapat digunakan dimasyarakat.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi remaja sebagai responden, diharapkan dapat memperluas pengetahuan terhadap pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang anemia agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya.

3. Manfaat Institusi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah gizi dalam meningkatkan dejarat kesehatan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Menurut *World Organization Health* (WHO), remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut *Peraturan Menteri Kesehatan* (Permenkes RI) no. 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.

Remaja atau *adolenscence* merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Soetjiningsih (2007) terdapat 3 tahapan masa remaja yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), masa remaja tengah (15-16) dan masa remaja akhir (17-20 tahun). Terjadi perubahan hormonal selama masa remaja sehingga mengalami percepatan proses pertumbuhan. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi saat masa remaja ditandai dengan penambahan berat badan dan tinggi badan, perubahan komposisi tubuh, perubahan organ reproduksi dan penambahan berat massa tulang. Selain itu remaja mengalami perubahan emosional, kehidupan sosial maupun kognitif (Brown dan Judith, 2005).

Masa remaja merupakan masa periode pertumbuhan dan perkembangan manusia dan merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, sosial dan intelektual. Pada umumnya masa remaja dimulai pada usia 10-14 tahun dan berakhir pada usia 18-24 tahun. (Kemenkes RI, 2016). Jumlah kelompok remaja usia 10-19 tahun di Indonesia menurut Sensus Penduduk 2010 sebanyak 43,5 juta atau sekitar 18% dari

jumlah penduduk. Di dunia dapat diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1,2 miliar atau 18% dari jumlah penduduk dunia (WHO, 2014).

2. Pertumbuhan Fisik Remaja

Periode pertumbuhan dan proses kematangan manusia terjadi pada masa remaja. Pada masa ini terjadi perubahan yang sangat unik dan berkelanjutan. Pertumbuhan fisik pada remaja terjadi secara bersamaan dengan proses matangnya organ reproduksi.

a. Pertumbuhan Tinggi Badan

Usia 10-11 tahun merupakan usia pertumbuhan yang sangat cepat pada perempuan mereka akan mengalami kenaikan tinggi badan sebesar 16 cm. Sebaliknya pada laki-laki, peningkatan tinggi badan terjadi pada usia 12-13 tahun, yaitu 20 cm. Pertambahan berat badan dan tinggi badan perempuan mencapai puncaknya pada usia masing-masing 12-13 tahun sementara pria pada 14-15 tahun (Badriah, 2014).

Permulaan periode pertumbuhan tinggi badan pada anak laki-laki dimulai rata-rata pada usia 12 tahun dan berakhir rata-rata pada usia 15 tahun dengan puncaknya pada 14 tahun kemudian setahun setelah dimulainya masa puber terjadi peningkatan tinggi badan yang terbesar setelah itu pertumbuhan menurun dan berlangsung lambat sampai usia 20-21 tahun. Kecepatan puncak (*growt spurt*) dalam pertumbuhan tinggi badan menyebabkan rata-rata tinggi akhir berbeda antara pria dan wanita sekitar 5,2 inci. Pada wanita pertumbuhan tinggi badan berhenti sekitar 4-5 tahun setelah *menarche* yaitu sekitar usia 21 tahun (Badriah, 2014)

b. Pertambahan Berat Badan

Lemak bukan satu-satunya yang menentukan pertambahan berat badan, tulang dan jaringan otot yang bertambah besar juga berperan dalam pertambahan berat badan, sehingga meskipun seorang anak memasuki masa pubertas dengan pesat

bertambah tetapi seringkali mereka terlihat kurus. Pada anak perempuan, penambahan berat badan terjadi sesaat sebelum atau sesudah *menarche*. Setelah itu penambahan berat hanya sedikit (Badriah, 2014).

Presentasi kecepatan kenaikan berat badan terjadi pada remaja laki-laki sebesar 95% atau 6-12,5 kg/tahun dan mencapai sekitar 9 kg/tahun puncaknya yaitu 3-6 bulan setelah puncak kecepatan pertumbuhan tinggi badan tercapai (Badriah, 2014).

Selama masa puber pada remaja dan pria, terjadi proses yang dinamakan kegemukan, hal ini tidaklah aneh karena pada masa ini permulaan pertumbuhan pesat terjadi yaitu pada usia antara 10-12 tahun, para remaja mengalami penumpukan lemak diperut, disekitar puting susu, dipinggul dan paha, dipipi, leher dan rahang dan berangsur-angsur hilang setelah kematangan masa masa puber dan pertumbuhan pesat tinggi badan dimulai meskipun ada yang menetap sampai 2 tahun lebih selama awal masa puber (Badriah, 2014).

c. Perubahan Proporsi Tubuh

Selain tinggi badan dan berat badan, perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja adalah perubahan proporsi tubuh. Proses kematangan terjadi lebih cepat pada daerah-daerah di dalam tubuh dari yang terlampau kecil menjadi terlampau besar. Contohnya tampak jelas pada hidung, kaki dan tangan. Perubahan yang mencolok lainnya terjadi pada tungkai dan lengan serta pinggul dan bahu. Tungkai kemudian akan lebih panjang daripada badan dan keadaan ini akan bertahan sampai sekitar usia 15 tahun. (Badriah, 2014)

d. Pertumbuhan Organ-Organ Reproduksi

Menurut Badriah (2014) pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi juga terjadi pada masa remaja. Worthington (2000) mengklasifikasikan

Sex Maturity Rate (SMR) atau tingkat kematangan seksual remaja wanita menjadi 5 tingkatan :

Tabel 2.1
Tingkat Kematangan Seksual Remaja Wanita

Tahapan	Rambut Pubis	Genitalia	Perubahan
Tahap 1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Tahap 2	Tumbuh sedikit di atas labia tengah	Payudara mulai tumbuh	Peningkatan aktivitas pada kelenjar keringat mulai terjadinya PHV (pertumbuhan cepat 3-5 inci) Akhir dari PHV, mulai timbul jerawat dan rambut pada ketiak
Tahap 3	Meningkat, berwarna gelap	Membesar tapi sebagian puting dan areola	Jerawat banyak, mulai menarache
Tahap 4	Banyak	Peningkatan ukuran areola dan puting	Peningkatan lemak dan masa otot
Tahap 5	Tipe dewasa, menyebar ke medial	Tipe dewasa, penyebaran jaringan payudara dengan batas jelas	

Sumber: Worthington, 2000

3. Kebutuhan Gizi Remaja

Kebutuhan gizi berperan sangat penting dalam tumbuh kembang pada masa remaja. Ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan menjadi penyebab masalah gizi pada remaja (Sharon et. al 2006). Menurut Soekirman (2006) masalah yang terjadi pada remaja akibat kekurangan zat gizi mengakibatkan daya tahan tubuh menurun sehingga meningkatkan angka penyakit (morbiditas), mengalami pertumbuhan tidak normal (pendek), tingkat kecerdasan rendah serta terhambatnya organ reproduksi, kemudian menurut Nikmawati (2009)

masalah yang terjadi pada remaja akibat gizi lebih berdampak pada kesehatan ketika dewasa seperti penyakit degeneratif contohnya diabetes dan stroke.

Menurut Kemenkes RI tahun 2013, Angka Kecukupan Gizi pada Remaja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Gizi pada Remaja Usia 13-15 Tahun

Zat Gizi	Wanita	Pria
Energi (Kkal)	2125	2675
Karbohidrat (gr)	292	368
Protein (gr)	59	66
Lemak (gr)	71	89
Fe (mg)	26	15
Asam Folat (mcg)	400	400
Vitamin B12 (mcg)	2.4	2.4
Vitamin A (mge)	600	600
Vitamin C (mg)	75	90

Sumber: Kemenkes RI tahun 2013

Untuk mencapai kesehatan yang optimal, maka diperlukan standar kebutuhan gizi sebagai pedoman dalam mencapai kesehatan yang optimal bagi individu secara rata-rata dalam sehari. Berkaitan dengan hal tersebut ada konsep kebutuhan zat gizi minimum sehari (*minimum daily requirement*) yaitu jumlah zat gizi minimal yang diperlukan seseorang dalam sehari untuk hidup sehat.

Zat gizi termasuk zat besi sangat penting bagi remaja untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan zat gizi yang diakibatkan oleh *growth spurt*. Misalnya pada remaja putri yang sedang dalam pertumbuhan, zat besi sangat berpengaruh pada kadar hemoglobin (Hb) karena terjadi peningkatan kebutuhan zat besi pada remaja

putri yang diakibatkan oleh menstruasi. Darah yang keluar saat menstruasi harus diganti dengan pembentukan atau produksi sel darah merah (Hemoglobin) dengan meningkatkan asupan zat besi sebagai salah satu komponen utamanya. Kadar Hb yang rendah dapat mempengaruhi tingkat perkembangan kognitif remaja (WHO, 2013)

Kebutuhan zat besi harian dihitung berdasarkan jumlah zat besi dari makanan yang diperlukan untuk mengatasi kehilangan massal, kehilangan karena menstruasi dan kebutuhan bagi pertumbuhan.



Menurut Kemenkes RI tahun 2013, Angka Kecukupan Zat Besi yang di Anjurkan perhari yaitu:

Tabel 2.3
Angka Kecukupan Zat Besi yang di anjurkan (Perhari)

Golongan Umur	Berat Badan (kg)	Tinggi Badan (cm)	Konsumsi Zat Besi (mg)
0-6 bulan	5.5	60	3
7-12 bulan	8.5	71	5
1-3 tahun	12	66	8
4-6 tahun	18	89	9
7-9 tahun	24	120	10
Pria			
10-12 tahun	30	135	14
13-15 tahun	45	150	17
16-19 tahun	56	160	13
20-45 tahun	62	165	13
46-59 tahun	62	165	13
≥60 tahun	62	165	14
Wanita			
10-12 tahun	35	140	20
13-15 tahun	46	153	26
16-19 tahun	50	154	26
20-45 tahun	54	156	14
46-59 tahun	54	156	14
≥60 tahun	54	154	+20
Hamil/Menyusui			
0-6 bulan			+2
7-12 bulan			+2

Sumber : AKG 2013

4. Perilaku dan Kebiasaan Makan Remaja

Kebanyakan dari remaja mempunyai rasa ingin tahu terhadap makanan dan telah memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi makanan yang disukainya. Biasanya remaja cenderung memilih jenis makanan yang sesuai dengan

perkembangan zaman dan terkadang mengikuti pola makan teman sebayanya. Faktor individu dan kondisi sosial di lingkungan tempat tinggal remaja merupakan faktor yang berpengaruh terhadap asupan makanan remaja. Faktor individu yang berpengaruh yaitu pengaruh biologis remaja, pola hidup serta kondisi psikososial, kemudian untuk faktor kondisi sosial yang berpengaruh yaitu pola makan keluarga dan lingkungan tempat tinggal (Ryoo, 2011; Proverawati 2010 dan Muwakhidaj, 2008)

Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan semua zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Sebaliknya, bila makanan tidak dipilih dengan baik, tubuh akan mengalami kekurangan zat-zat gizi esensial sedangkan zat gizi harus didapatkan dari makanan (Mitayani dan Wiwi Sartika, 2010).

Ketidakseimbangan antara kebutuhan energi terjadi ketika sedang mengonsumsi makanan yang berlebihan terutama yang mengandung karbohidrat dan lemak begitu juga sebaliknya dengan konsumsi makanan yang kurang, baik yang mengandung karbohidrat, lemak dan zat-zat gizi lainnya akan menyebabkan jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan.

Kebiasaan makan yang cenderung salah bisa memicu beberapa penyakit pada sebagian orang contohnya seringkali mengonsumsi makanan yang penuh kalori atau makanan siap saji terutama bagi anak sekolah, padahal anak sekolah memerlukan asupan gizi yang cukup.

Hampir 50% remaja terutama remaja yang lebih tua tidak sarapan. Penelitian lain membuktikan masih banyak remaja (89%) yang meyakini kalau sarapan memang penting. Namun, mereka yang sarapan secara teratur hanya 60%. Remaja putri malah melewatkan dua kali waktu makan dan lebih memilih kudapan. Sebagian besar kudapan bukan hanya hampa kalori, tetapi juga sedikit sekali

mengandung zat gizi, selain dapat mengganggu (menghilangkan) nafsu makan. Mengudap sebetulnya tidak dilarang, asal mengetahui cara memilih kudapan yang kaya zat gizi (Daniel, 1997)

Makanan yang semakin digemari oleh remaja biasanya adalah makanan sampah (*junk food*) mereka menjadikan makanan ini sebagai kudapan maupun makanan besar. Selain mudah diperoleh, *junk food* atau makanan sampah ini lebih bergensi karena pengaruh iklan, padahal kandungan gizi didalam makanan ini sangat sedikit (dan bahkan tidak ada sama sekali) yang mengandung kalsium, besi, *riboflavin*, asam folat, vitamin A dan vitamin C, sementara kandungan lemak jenuh, kolesterol dan natrium cukup tinggi. Proporsi lemak sebagai penyedia kalori lebih dari 50% dari total kalori yang terkandung dari makanan itu (Arisman, 2010).

Dalam beberapa survei yang mencatat ketidak cukupan asupan gizi pada remaja, ditemukan bahwa kesibukan menjadi alasan para remaja sering melewatkan waktu makan (terutama sarapan) kemudian mereka ini lebih senang mengonsumsi *junk food*. Rasa khawatir menjadi gemuk juga mereka utarakan sehingga membuat mereka mengurangi asupan pangan mereka dengan melakukan diet. Diet tersebut biasanya disusun berdasarkan data yang diperoleh dari teman sebaya, bukan hasil konsultasi dengan ahli dibidangnya. Dengan demikian jelaslah bahwa kebiasaan makan remaja tidak berkaitan dengan pengetahuan mereka tentang gizi (Arisman, 2010).

Snack mencakup hampir 40% kalori diet remaja. Es krim, es krim kocok (shake), hamburger dan pizza memberikan zat gizi yang penting, tetapi juga tinggi lemak, natrium dan kalori. Remaja sangat sering mengonsumsi makanan yang ada pada restoran makanan cepat saji yang mempunyai menu terbatas dan sering menekankan pada makanan yang tinggi kalori, lemak dan natrium.

Salah satu penyebab kebiasaan makan pada remaja adalah pengetahuan gizi yang rendah dan terlihat pada kebiasaan makan yang salah. Permaesih (2003) menyatakan bahwa pengetahuan dan praktek gizi remaja yang rendah tercermin dari perilaku menyimpang dalam kebiasaan memilih makanan. Remaja yang memiliki pengetahuan gizi yang baik akan lebih mampu memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya.

B. Tinjauan Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

Anemia dalam bahasa Yunani berarti *no blood*, penderita anemia memiliki darah yang banyak dalam tubuhnya, namun sel darah merahnya yang tidak mengangkut banyak oksigen. Terdapat berbagai jenis anemia namun yang paling sering diderita oleh beberapa orang diseluruh dunia adalah anemia defisiensi besi. Kurangnya zat besi merupakan salah satu yang menyebabkan anemia defisiensi besi. Zat besi diperlukan tubuh untuk mensintesis hemoglobin sehingga ketika kurang mengonsumsi zat besi atau terjadi gangguan absorpsi pada tubuh maka tubuh otomatis akan memerlukan zat besi dalam jumlah yang banyak dan jika itu tidak terpenuhi maka ia menjadi penyebab anemia defisiensi besi (Almatsier, 2006).

Menurut Raspati (2010) Bentuk anemia yang paling sering ditemukan di dunia, terutama di negara berkembang adalah anemia defisiensi besi, hal ini berhubungan dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, investasi parasite yang masih merupakan masalah endemik serta masukan protein hewani yang rendah. Di Indonesia, anemia defisiensi besi masih menjadi masalah gizi utama selain kekurangan kalori, protein, vitamin A dan yodium.

Kebutuhan zat besi pada perempuan 3 kali lebih besar dibandingkan pada laki-laki dikarenakan perempuan adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang mengalami menstruasi sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak untuk mengembalikan kondisi tubuh dalam keadaan semula. Kemudian pada keadaan hamil, mereka membutuhkan lebih banyak asupan zat besi untuk janin yang dikandungnya. Hal inilah yang mendasari perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan mengalami anemia (Raspati, 2010)

Mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan zat besi memerlukan beberapa upaya, diantaranya :

- a. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi terutama dalam bentuk hewani agar mudah diserap contohnya, hati, ikan, daging dan lain-lain. Selain itu tidak lupa mengonsumsi makanan yang membantu proses penyerapan zat besi dan proses pembentukan hemoglobin (Hb) seperti makanan yang mengandung vitamin C , vitamin A (buah-buahan dan sayur-sayuran).
- b. Penambahan zat besi, asam folat, vitamin A dan asam amino esensial pada bahan makanan yang akan dimakan dengan kata lain adalah *Fortifikasi* yang umumnya dilakukan pada makanan hasil produksi industri pangan.

2. Batasan Anemia

Wirakusumah (1998) mendefinisikan anemia sebagai suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) lebih rendah dari nilai normal. Batasan normal kadar hemoglobin menurut kelompok umur tertentu dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Batas Anemia (menurut Departemen Kesehatan)
Kelompok Hemoglobin (gr / 100 dl)

Kelompok	Hemoglobin
Anak Balita	11 g/dl
Anak Usia Sekolah	12 g/dl
Wanita	12 g/dl
Laki-laki	13 g/dl
Ibu Menyusui >3 Bulan	11 g/dl

Sumber : Supariasa, 2002

3. Tanda dan Gejala Anemia

Gejala anemia defisiensi besi menurut sudoyo (2009) digolongkan menjadi tiga (3) golongan, yaitu:

a. Gejala Umum Anemia

Gejala umum anemia yang disebut juga sebagai sindrom anemia (*anemic syndrome*) biasa dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin turun di bawah 7-8 g/dl. Gejala ini berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga berdenging.

Karena penurunan kadar hemoglobin yang terjadi secara perlahan-lahan, gejala anemia defisiensi besi tidak terlalu mencolok dibandingkan dengan anemia lain yang penurunan kadar hemoglobinnya terjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan kadar Hb berjalan dengan baik. Anemia bersifat simtomatik (menimbulkan gejala) jika hemoglobin telah turun di bawah 7 g/dl. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah kuku.

b. Gejala Khas Defisiensi Besi

Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai pada anemia jenis lain adalah:

- 1) *Koilonychia*: kuku sendok (*spoon nail*), kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip sendok.
- 2) Atrofi papil lidah: permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap karena papil lidah menghilang.
- 3) Stomatitis angularis (*cheilosis*): adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan.
- 4) Disfagia: nyeri menelan karena kerusakan epitel hipofaring.
- 5) Atrofi mukosa gaster sehingga menimbulkan akhloridia.
- 6) Pica: keinginan untuk memakan bahan yang tidak lazim. Seperti: tanah liat, es, lem, dan lain-lain.
- 7) Sindrom Plummer Vinson atau disebut juga sindrom Paterson Kelly adalah kumpulan gejala yang terdiri dari anemia hipokromik mikrositer, atrofi papil lidah, dan disfagia.

c. Gejala Penyakit Dasar

Pada anemia defisiensi besi dapat dijumpai gejala-gejala penyakit yang menjadi penyebab anemia defisiensi besi tersebut. Misalnya pada anemia akibat penyakit cacing tambang dijumpai dispepsia, parotis membengkak, dan kulit telapak tangan berwarna kuning seperti jerami. Pada anemia karena perdarahan kronik akibat kanker kolon dijumpai gejala gangguan kebiasaan buang air besar atau gejala lain tergantung dari lokasi kanker tersebut.

4. Penyebab Anemia pada Remaja Putri

Konsumsi zat besi yang rendah dari makanan serta proses penyerapan zat besi yang biasa terhambat menjadi penyebab utama anemia. Penyebab lainnya yaitu

kehilangan darah dalam jumlah yang besar karena pendarahan, terjadi kerusakan sel-sel darah merah serta produksi sel darah merah yang tidak mencukupi (Anwar dan Khomsan, 2009).

Walaupun kondisi individu sehat dan bergizi serta memiliki zat besi yang cukup di dalam tubuh, namun jika persediaan zat besi terus menurun dan keseimbangan zat besi terganggu yang berakibat kepada pembentukan hemoglobin terganggu maka itu akan menjadi penyebab seseorang dikatakan anemia. Dalam kondisi seperti itu jika hemoglobin darah seseorang diperiksa maka akan terlihat bahwa kadarnya berada dibawah normal (Anwar dan Khomsan, 2009).

Pengaruh cacing tambang juga bisa menyebabkan anemia pada daerah-daerah tertentu. Cacing tambang yang menempel pada dinding usus dan memakan makanan membuat zat gizi tidak dapat diserap secara sempurna. Akibatnya, seseorang menderita kurang gizi, khususnya zat besi. Gigitan cacing tambang pada dinding usus juga menyebabkan terjadinya pendarahan sehingga tubuh kehilangan banyak sel darah merah. Pendarahan dapat terjadi pada kondisi internal maupun eksternal, misalnya pada waktu kecelakaan atau menstruasi yang banyak bagi perempuan. Pendarahan dapat pula terjadi karena pendarahan kronis, yaitu pendarahan yang terjadi sedikit-sedikit akibat kanker pada saluran pencernaan, wasir dan lain sebagainya. Pendarahan yang terjadi secara terus menerus itulah yang menyebabkan anemia (Anwar dan Khomsan, 2009).

5. Pencegahan dan Pengobatan Anemia

a. Pencegahan Anemia

Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan memelihara asupan makan. Makanan yang mengandung zat besi sangat banyak dan beragam diantaranya adalah ikan, hati, daging, kacang-kacangan dan sayuran hijau. Tetapi ada beberapa jenis makanan yang dalam proses penyerapannya butuh bantuan vitamin C

sehingga memudahkan penyerapan zat besi di dalam tubuh (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2012).

Ada tiga program utama dalam menurunkan prevalensi anemia yang dilakukan oleh *World Health Organization* yaitu meningkatkan asupan zat besi, folat dan vitamin A, pemberantasan malaria dan menurunkan infeksi parasite (WHO, 2015). Di Indonesia, salah satu program penanggulangan anemia yang dilakukan pemerintah yaitu suplementasi. Kegiatannya yaitu memberikan suplemen yaitu sebanyak 60 mg zat besi dan 0.5 asam folat kepada wanita selama 7 bulan (30 tablet) secara efektif sehingga meningkatkan status zat besi yang didistribusikan melalui sekolah, klinik (puskesmas) dan organisasi remaja (Depkes, 2012).

b. Screening dan Pengobatan Anemia

Screening diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok wanita atau remaja yang harus di obati dalam mengurangi morbiditas anemia. *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) menyarankan agar remaja putri harus di-*screening* tiap 5-10 tahun. Melalui uji kesehatan, meskipun tidak ada faktor resiko anemia seperti perdarahan, rendahnya intake Fe dan sebagainya. Namun jika disertai adanya faktor resiko anemia, maka *screening* harus dilakukan secara tahunan (Depkes, 2012).

Screening dapat dilakukan dengan pemeriksaan antropometri, biomedik dan pemeriksaan biofisik. Pemeriksaan antropometri adalah pengukuran variasi berbagai dimensi fisik dan komposisi tubuh secara umum pada berbagai tahapan umur dan derajat kesehatan. Pengukuran yang dilakukan meliputi berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan tebal lemak kulit. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 pemeriksaan saja yaitu pemeriksaan berat badan, tinggi badan dan pengukuran lingkaran lengan atas. Pemeriksaan biokimia dapat dilakukan terhadap berbagai jaringan tubuh, yang lazim dilakukan adalah pemeriksaan darah

dan pemeriksaan biokimia dapat dilakukan terhadap berbagai jaringan tubuh, yang lazim dilakukan adalah pemeriksaan darah dan urine (Depkes, 2012).

Pemeriksaan biokimia pada kasus ini adalah pengambilan darah untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah remaja putri. Pemeriksaan biofisik dilakukan langsung pada fisik penderita untuk mengetahui gejala penyakit yang terjadi meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, auskultasi maupun perkusi. Namun pada kasus ini tidak lakukan pemeriksaan biofisik.

C. Tinjauan Tentang Hemoglobin

1. Definisi Hemoglobin

Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi serta memiliki daya gabung terhadap oksigen dan membentuk *oxihemoglobin* di dalam sel darah merah. Melalui fungsi ini maka oksigen dapat dibawa dari paru-paru ke jaringan-jaringan (Martini, 2015).

Hemoglobin dalam istilah lainnya adalah *conjugated protein* yaitu suatu senyawa protein dengan Fe. Sebagai intinya Fe dengan rangka protoperphyrin dan globin (tetra phirin) menyebabkan warna darah merah karena Fe ini. Eryt Hb berikatan dengan karbondioksida menjadi *karboxy hemoglobin* dan warnanya merah tua. Darah arteri mengandung oksigen dan darah vena mengandung karbondioksida (Depkes RI, 2015).

Hemoglobin berbentuk bulat dan memiliki berat molekul 64.500 dan terdiri dari 4 sub unit yang disebut α -globin, dan 2 lainnya disebut β -globin. Setiap subunit mengandung satu bagian grup heme yang dapat mengikat sebuah molekul oksigen (Indartanti, dkk 2015).

Menurut Hoffbrand (2013) salah satu indikator yang paling umum digunakan untuk mengetahui anemia gizi adalah nilai hemoglobin darah. Berkurangnya kadar hemoglobin dalam darah merah berbanding lurus dengan

banyaknya zat besi yang tersedia didalam sel darah merah. Bila asupan nutrisi yang dikonsumsi dari bahan pangan sedikit maka produktivitas hemoglobin akan menurun (Depkes RI 2015).

2. Cara Pemeriksaan Kadar Hemoglobin (Hb)

Terdapat bermacam-macam cara untuk menentukan kadar hemoglobin darah. Dalam laboratorium klinik biasanya menggunakan cara fotoelektrik dan kalorimetik visual dan cara yang banyak digunakan dilapangan penelitian adalah hemoglobinometer digital (Depkes, 2013).

Beberapa metode pemeriksaan kadar hemoglobin yaitu:

a. Metode Sahli

Metode *sahli* merupakan metode yang mengubah hemoglobin menjadi hematin asam kemudian warna yang terjadi dibandingkan secara visual dengan standar warna pada alat hemoglobinometer. Pada penetapan kadar hemoglobin, metode *sahli* merupakan metode estimasi kadar hemoglobin yang tidak teliti, karena alat hemoglobinometer tidak dapat distandarkan dan perbandingan warna visual tidak teliti. Hasil pemeriksaan menggunakan metode *sahli* masih dianggap kurang signifikan karena *karboksihemoglobin*, *methemoglobin* dan *sulphemoglobin* tidak dapat diubah menjadi hematin asam.

Hasil penelitian (Nadila, 2016) pemeriksaan kadar hemoglobin dengan Metode *Sahli* berbeda bermakna dengan *Autoanalyzer*, kalometrik visual atau *sahli*, hemoglobinometer dan *Tallqvist* namun cara ini tidak teliti dalam menentukan kadar Hb, persentase kesalahan antara 25-50%. Prinsip kerja cara ini adalah dengan membandingkan darah asli dengan suatu skala warna yang bertingkat-tingkat mulai dari warna merah muda sampai merah tua (Nadila, 2016).

b. Metode Cyanmethemoglobin

Metode *Cyanmethemoglobin* merupakan metode yang dilakukan dilaboratorium, sampai saat ini masih menjadi pilihan utama untuk menentukan kadar dari hemoglobin. Pada prinsip metode ini adalah darah diencerkan dengan larutan drabkin sehingga terjadi hemolisis eritrosit dan konversi hemoglobin menjadi hemoglobinsianida (*Cyanmethemoglobin*). Larutan yang terbentuk selanjutnya diperiksa dengan *spektrofotometer* atau *colorimeter*, yang absorpsinya sebanding dengan kadar hemoglobin dalam darah (WHO, 2013).

c. Metode HemoCue System

HemoCue System merupakan metode yang biasa dilakukan pada survei lapangan. Dengan menggunakan alat yang sudah ada, maka tidak diperlukan penambahan reagen untuk menghitung nilai hemoglobin (WHO, 2013). Metode ini dilakukan dengan pengukuran *optical density* pada microkuvet yang mempunyai kapasitas volume sebesar 10 mikroliter oleh sinar yang berasal dari lampu berjarak 0,133 milimeter sampai pada dinding paralel celah optis tempat kuvet berada. Pereaksi kering dimasukkan dalam kuvet pada dinding bagian dalam kuvet. Secara spontan, sampel darah akan bercampur dengan pereaksi kering. Kuvet dimasukkan ke dalam alat HemoCue Photometer untuk dilakukan pembacaan pada panjang gelombang 565 dan 880mm.

Alat akan menghitung sendiri sehingga angka yang muncul pada layar pembacaan adalah kadar Hb darah yang diperiksa. Alat penentu Hb dengan metode HemoCue ini juga mempunyai kelebihan ringan dibawa, prektis, dapat dimasukkan ke dalam alat HemoCue photometer untuk dilakukan pembacaan pada panjang gelombang 565 dan 880 mm. Alat akan menghitung sendiri sehingga angka yang muncul pada layar pembacaan adalah kadar Hb darah yang diperiksa. Alat penentuan Hb dengan metode HemoCue ini juga mempunyai kelebihan ringan

dibawa, praktis, dapat menggunakan baterai, tidak tergantung pada listrik dan hasilnya dapat langsung diketahui saat itu juga (WHO, 2013)

D. Tinjauan Tentang Zat Besi

1. Pengertian Zat Besi

Salah satu zat gizi yang penting bagi tubuh manusia adalah zat besi, selain berfungsi membawa oksigen dari paru-paru menuju seluruh jaringan tubuh, zat besi juga berperan dalam fungsi normal kekebalan tubuh. Seorang pria dewasa yang sehat memiliki zat sebanyak 40-50 mg per kilogram berat badan, sedangkan pada wanita dewasa yang sehat memiliki zat besi sebanyak 35-50 mg per kilogram berat badan. Dalam hal tertentu, wanita lebih rentan saat mengalami kekurangan zat besi. (Pangkalan Ide, 2007).

Kekurangan zat besi akan membuat badan kita mudah terkena penyakit. Selain itu, karena zat gizi besi (Fe) merupakan inti molekul hemoglobin yang merupakan unsur utama dalam sel darah merah, maka kekurangan pasokan zat gizi besi menyebabkan menurunnya produksi hemoglobin. Akibatnya, terjadi pengecilan ukuran (*microcytic*), rendahnya kandungan hemoglobin (*hypochromic*), serat berkurangnya jumlah sel darah merah (Pangkalan Ide, 2007).

Zat besi terkandung dalam berbagai makanan antara lain hati, daging sapi, kambing, ikan, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau dan susu. Daging ayam, hati, otak, dan usus merupakan sumber zat gizi yang paling kaya, dengan variasi kandungan antara 1,5 mg/100g sampai 6,6 mg/100 g. Sayuran hijau seperti sayur bayam dan kangkung merupakan sumber zat besi utama dalam makanan, dengan kandungan antara 2,5 sampai 5,6 mg/100 g. Bahan makanan nabati lainnya yang kaya akan zat besi adalah kacang-kacangan, misalnya kacang hijau, kedelai, kacang tanah dan kacang merah. Variasi kandungan zat besi dalam bahan makanan tersebut adalah antara 5,0 sampai 8,0 mg/100 g (Anwar dan Khomsan, 2009).

Kandungan zat besi yang tersedia dalam bahan makan tersebut harus diperhatikan agar kita tidak kekurangan zat besi. Selain itu, faktor-faktor yang memengaruhi absorpsi zat besi juga perlu diperhatikan. Salah satu faktornya adalah ragam bahan makanan itu sendiri. Jumlah zat besi yang dapat diserap dari tumbuh-tumbuhan atau bahan makanan nabati hanya sekitar 1-6 %. Sementara itu, jumlah serapan zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani dapat mencapai 7-22 % (Anwar dan Khomsan, 2009).

Zat besi dalam bahan makanan dapat berbentuk besi heme, yaitu senyawa besi anorganik atau besi non-heme. Jadi, ketersediaan besi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu besi heme dan besi non heme (Anwar dan Khomsan, 2009). Zat besi heme berasal dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat dalam darah bahkan makanan hewani. Sementara itu, umumnya, zat besi non-heme terdapat dalam bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan, seperti sayuran dan kacang-kacangan. Zat besi non heme terdapat dalam bentuk kompleks inorganik- Fe^{3+} (Anwar dan Khomsan, 2009).

Absorpsi besi non-heme sangat dipengaruhi oleh faktor yang mempermudah dan faktor yang menghambat yang terdapat didalam bahan makanan yang dikonsumsi. Sementara itu, zat besi heme tidak dipengaruhi oleh faktor penghambat. Karena itu, jumlah zat besi heme yang dapat diabsorpsi lebih banyak daripada zat besi dalam bentuk non-heme (Anwar dan Khomsan, 2009).

Dari berbagai penelitian dibuktikan bahwa zat besi heme yang dapat diserap hampir 30%, sedangkan besi non-heme hanya dapat diserap sebesar 5%. Namun, tingkat penyerapan zat non-heme yang rendah itu dapat ditingkatkan dengan penambahan faktor yang mempermudah, yaitu vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan, vitamin C dan besi non-heme hingga empat kali lipat. Didalam tubuh, vitamin C dan besi membentuk senyawa kompleks askorbat-besi sehingga

lebih mudah diserap oleh usus. Karena itu, sayuran hijau dan buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi sangat baik sebagai sumber zat besi (Anwar dan Khomsan, 2009).

2. Fungsi Zat Besi

Fungsi utama zat besi bagi tubuh adalah untuk membawa (sebagai *carrier*) oksigen dan karbondioksida dan untuk pembentukan darah.

- a. Pengangkut (*Carrier*) O₂ dan CO₂. Zat besi yang terdapat dalam hemoglobin dan mioglobin berfungsi untuk mengangkut O₂ dan CO₂ sehingga secara tidak langsung zat besi sangat esensial untuk metabolisme energi.
- b. Pembentukan Sel Darah Merah. Hemoglobin (Hb) merupakan komponen esensial sel-sel darah merah (eritrosit). Bila jumlah sel darah merah berkurang, hormone eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal akan menstimulir pembentukan sel darah merah. Eritrosit dibentuk dalam tulang sebagai sel-sel muda yang disebut *eritoblast* (masih mengandung inti sel/nukleus). Pada waktu sel menjadi dewasa, disintesis heme (protein yang mengandung zat besi) dari glisin dan Fe (dibantu oleh vitamin B12 atau piridoksin). Pada waktu yang sama disintesis juga protein globin. Heme tersebut digabungkan dengan globin membentuk hemoglobin yang mengandung sel darah merah muda (*retikulosit*). Dalam aliran darah sel-sel muda tersebut akan melepaskan intinya, sehingga terbentuklah sel-sel darah merah dewasa yang tidak mengandung inti sel.

Fungsi lain yaitu sebagian kecil Fe terdapat dalam enzim jaringan. Bila terjadi defisiensi zat besi, enzim ini berkurang jumlahnya sebelum jumlah Hb menurun. Zat besi diperlukan sebagai katalis dalam konversi beta karoten menjadi vitamin A, dalam reaksi sintesis purin (sebagai bagian integral asam nukleat dalam RNA dan DNA), dan dalam reaksi sintesis kolagen). Selain itu, Fe diperlukan dalam proses

penghilangan lipida dari darah, untuk memproduksi antibodi, serta untuk detoksifikasi zat racun dalam hati (Citrakesumasari, 2012).

Zat Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al Qur'an. Zat besi disebut 9 kali dalam Al Qur'an dalam ayat yang berbeda-beda salah satunya adalah QS.al-Hadiid 57: 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahan:

“Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (Depag RI, 1989).

Kami benar-benar telah mengutus para rasul yang Kami pilih dengan membawa beberapa mukjizat yang kuat. Bersama mereka juga Kami turunkan kitab suci-kitab suci yang mengandung hukum, syariat agama, dan timbangan yang mewujudkan keadilan dalam hubungan antarmanusia. Lalu Kami juga menciptakan besi yang dapat dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam peperangan di samping mempunyai banyak manfaat lain pada masa damai. Itu semua agar manusia memanfaatkan besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, dari alam gaib, mengetahui siapa saja yang membela agama dan rasul-rasul-Nya. Allah benar-benar Mahakuasa karena diri-Nya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan siapa pun.

Besi merupakan salah satu dari tujuh unsur kimia yang telah dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu yaitu emas, perak, air raksa, loyang, timah hitam (plumbum), besi, dan timah, serta logam yang paling banyak tersebar di bumi. Besi itu biasanya terdapat dalam komponen unsur kimia lain seperti dalam oksida, sulfida (sulfat), zat arang dan silikon. Sejumlah kecil besi murni juga terdapat dalam batu meteor besi. Ayat ini menjelaskan bahwa besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi, dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya, besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang, bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan sebuah peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup.

Komponen besi, misalnya, masuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan (terutama daun) yang terpenting dalam fotosintesis (proses pemanfaatan energi cahaya matahari) yang membuat tumbuh-tumbuhan dapat bernapas dan menghasilkan protoplasma (zat hidup dalam sel). Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya besi juga termasuk dalam komposisi kromatin (bagian inti sel yang mudah menyerap zat warna) dari sel hidup, salah satu unsur yang berada dalam cairan tubuh, dan salah satu unsur pembentuk hemoglobin (butir-butir darah merah). Dan dari situ, besi memegang peranan penting dalam proses penembusan dan peran biologis dalam jaringan. Selain itu semua, besi juga terdapat dalam hati, limpa, ginjal, anggota badan, dan sumsum merah tulang belakang. Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa

saja. Kurangnya zat besi akan menimbulkan penyakit, terutama anemia (kekurangan hemoglobin) (Tafsir Al-Misbah, 2007).

3. Metabolisme Zat Besi

Metabolisme zat besi dalam tubuh terdiri atas beberapa proses yaitu, penyerapan, pengangkutan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pengeluaran zat besi. Sebelum di absorpsi, besi non heme direduksi dari bentuk ferri (Fe^{3+}) menjadi bentuk ferro (Fe^{2+}) dengan bantuan asam askorbat agar mudah diserap, sedangkan besi heme langsung di absorpsi. Absorpsi zat besi dari makan terjadi di bagian proksimal duodenum dengan bantuan alat angkut protein khusus yaitu *transferin reseptor*.

Transferin mukosa mengangkut besi dari saluran cerna ke dalam mukosa. Transferrin mukosa ini kemudian kembali ke lumen saluran cerna untuk mengikat besi lain. Sedangkan transferin reseptor mengangkut besi melalui darah ke semua jaringan tubuh. Zat besi dari makanan yang diserap oleh duodenum kemudian masuk ke dalam plasma darah sedangkan sebagian yang tidak diserap keluar dari tubuh bersama feses. Di dalam plasma berlangsung proses *turn over*, yaitu proses pergantian sel-sel darah merah baru. Setiap hari *turn over* besi ini sejumlah 35 mg, tetapi tidak semuanya didapatkan dari makanan. Sebagian besar yaitu sebanyak 34 mg, berasal dari penghancuran sel-sel darah merah tua dan sel-sel yang telah mati.

Dari proses *turn over* tersebut zat besi disebarkan ke seluruh jaringan tubuh dengan menggunakan alat angkut yaitu transferin reseptor dan sebagian besi lainnya disebarkan ke dalam sumsum tulang untuk pembentukan sel darah merah yang baru. Kelebihan besi di simpan sebagai protein ferritin dan homosiderin di dalam hati sebanyak 30%, sumsum tulang belakang 30%, dan selebihnya di dalam limpa dan otot. Dari simpanan tersebut sejumlah 50 mg zat besi dapat dimobilisasi untuk keperluan tubuh dalam sehari, seperti untuk pembentukan hemoglobin.

Pengeluaran besi dari sel-sel yang sudah mati yaitu melalui kulit, saluran pencernaan, ataupun yang keluar melalui urin berjumlah 1 mg setiap hari, ini disebut dengan kehilangan basal (*Iron basal losses*) (Yuniarti, 2011).

4. Penyedia Absorpsi Zat Besi

Penyedia absorpsi zat besi yang paling terkenal adalah asam askorbat (vitamin C) yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi *non heme* secara signifikan. Buah kiwi, jeruk, jambu biji merupakan produk pangan nabati yang meningkatkan absorpsi besi. Faktor-faktor yang ada didalam daging juga memudahkan absorpsi besi *non heme* (Ridwan, 2012)

5. Penghambat Absorpsi Zat Besi

Polifenol (asam fenolat, flavonoid, dan produk polimerasi) terdapat dalam teh, kopi, anggur merah, kalsium fosfat, bekatul dan asam fitat (banyak terdapat dalam sereal dan kacang-kacangan) merupakan faktor utama yang bertanggung jawab atas buruknya ketersediaan hayati zat besi dalam jenis makanan ini, tanin yang terdapat dalam teh hitam merupakan jenis penghambat paling paten dari semua inhibitor diatas. Kalsium yang dikonsumsi dalam produk susu seperti susu atau keju dapat menghambat absorpsi besi (Ridwan, 2012)

6. Interaksi Zat Besi dengan Vitamin A

Kekurangan vitamin A dapat memperburuk anemia kurang zat besi. Pemberian suplementasi vitamin A memiliki efek menguntungkan pada anemia kurang zat besi. Kombinasi suplemen vitamin A dan zat besi untuk mengurangi anemia tampaknya lebih efektif daripada suplemen zat besi atau vitamin A secara terpisah (Ridwan, 2012).

Vitamin A mempunyai banyak peran di dalam tubuh, antara lain untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel *progenitor eritrosit*, imunitas tubuh terhadap infeksi dan mobilisasi cadangan zat besi dari seluruh jaringan (Semba, 2002).

Interaksi vitamin A dengan zat besi bersifat sinergis, hal ini terlihat ketika pemberian vitamin A dapat menurunkan prevalensi anemia dan memperbaiki utilisasi zat besi dibandingkan hanya dengan suplementasi vitamin A saja atau dengan zat besi saja (Suharno D, 1993). Kemudian seorang peneliti juga menemukan bahwa, bila tubuh dalam keadaan kekurangan vitamin A, maka transportasi zat besi dari hati dan atau penggabungan zat besi ke dalam eritrosit terganggu (Lonnerdal B, 1988).

Beberapa hasil penelitian yang di rangkum oleh FAO/WHO 2001 (WHO & FAO, 2004). mengungkapkan bahwa kekurangan vitamin A mempengaruhi metabolisme zat besi. Interaksi vitamin A dengan zat besi juga ditunjukkan dari hasil penelitian ketika suplementasi vitamin A diberikan pada anak sekolah yang menderita kekurangan zat besi dan vitamin A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi interaksi vitamin A terhadap zat besi yang ditandai dengan prevalensi anemia menurun, serum tranferin reseptor menurun, yang berarti memperbaiki *erythropoiesis* (Zimmermann MB, 2006).

7. Akibat Kekurangan Zat Besi pada Remaja

Gejalanya berkaitan pada kecepatan penurunan kadar hemoglobin. Awalnya sebagian besar akan mengeluh mudah lelah dan mengantuk yang semakin bertambah. Gejala yang lain timbul yang dapat timbul adalah sakit kepala. Semakin meningkatnya intensitas defisiensi maka akan memperlihatkan gejala pucat pada konjungtiva, lidah, dasar kuku dan palatum mole.

Pada anemia yang berlangsung lama, ditemukan atrofi papilaris pada lidah, dan bentuk kuku dapat berubah menjadi bentuk seperti sendok (*kolinkia*) pada keadaan ini juga dapat terjadi pembesaran limpa (*speinomegali*) dapat terjadi. Bila anemia terjadi pada anak dapat menyebabkan perubahan perilaku, tidak dapat berkonsentrasi dalam waktu yang lama dan menutup diri, mengganggu

pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, serta dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah sakit. Pada remaja putri yang mengalami anemia dapat mengganggu masa pertumbuhan dan perkembangan remaja putri.

Gangguan pertumbuhan tinggi dan berat badan akan mempengaruhi pula perkembangan dari organ reproduksi. Remaja putri yang pendek dan kurus pada umumnya mempunyai tulang panggul yang kecil akibat proses perkembangannya mengalami hambatan. Sehingga apabila mengalami kehamilan pada saat proses persalinannya nanti akan mengalami kesulitan. (Grantham et al. 2001, Citra, 2015 dan Nurrahmawati, 2016).

Dalam islam, perempuan sangat dihargai dan dijunjung tinggi sebagaimana dalam Hadist Riwayat Muslim yang berbunyi

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Terjemahan: Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. (HR Muslim: 3729)

Akibat dari jangka panjang anemia pada remaja putri yang nantinya akan hamil, maka remaja tersebut tidak mampu memenuhi zat-zat gizi pada dirinya dan pada janinnya sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko kematian maternal, prematuritas, BBLR dan kematian perinatal (Hayati, 2012).

E. Tinjauan Tentang Tempe

1. Pengertian Tempe

Tempe merupakan salah satu dari produk fermentasi yang bahan utamanya terbuat dari kedelai. Umumnya fermentasi pada tempe terjadi karena aktivitas kapang *Rhizopus Oligosporus* yang akan meningkatkan kandungan fosfor. Jenis kapang ini termasuk bagus karena tidak memproduksi toksin bahkan mampu melindungi tempedari aflatoksin. Kapang tempe memproduksi senyawa antibakteri selama proses fermentasi tempe (Koswara, 1995).

Menurut Tarwotjo (1998) Tempe merupakan makanan yang kaya protein. Dapat dibuktikan bahwa dalam 100 gram tempe, terkandung zat protein sebesar 18-20 gram dan zat lemak sebesar 4 gram. Kemudian menurut Koswara (1995), ada beberapa sifat unggul yang dimiliki tempe seperti lemak jenuh rendah, kadar vitamin B12 yang tinggi, mengandung antibiotik dan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan badan.

Kedelai sebagai biji-bijian di sebutkan dalam al-Quran, Allah swt.berfirman dalam QS. ‘Abbasa 27-30 yang berbunyi:

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

Terjemahan: Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27), anggur dan sayur-sayuran (28), zaitun dan kurma (28), kebun-kebun yang lebat (30).

Bumi yang tadinya kering dan keras sehingga tidak ada yang dapat tumbuh, dengan turunnya hujan maka lunaklah tanah tadi, menjadi luluk, menjadi lumpur. Di atas tanah yang telah lunak jadi lumpur atau luluk itulah kelak sesuatu akan dapat ditanamkan: “*lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27).*” Pada negeri-negeri yang makanan pokoknya ialah padi, tafsir ayat ini sangat lekas dapat difahamkan. Memang sawah itu dilulukkan lebih dahulu baru dapat ditanami benih.

Yaitu benih padi, benih gandum, benih kacang dan jagung: “*Dan anggur dan sayur-sayuran (28).*” Dengan mensejajarkan anggur sebagai buah-buahan yang dapat dimakan langsung dengan sayur-sayuran lain yang sangat diperlukan vitamin dan kalornya bagi manusia, nampaklah bahwa keduanya itu sama pentingnya sebagai zat makanan “*Dan buah zaitun dan korma.*” (29). Zaitun selain dapat dimakan, dapat pula diambil minyaknya. “*Dan kebun-kebun yang subur.*” (30). Dengan menyebutkan kebun-kebun yang subur maka tercakuplah di dalamnya buah-buahan yang lain yang sejak zaman dahulu telah diperkebunkan orang (Tafsir Al Azhar, 1984).

Tabel 2.5
Komposisi Kimia Kedelai dan Tempe per 100 gram

Zat Gizi	Kedelai	Tempe
Protein (gram)	30.2	18.3
Lemak (gram)	15.6	4.0
Karbohidrat (gram)	30.1	12.7
Air (gram)	20.0	64.0

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI

2. Kandungan Gizi Tempe

Di dalam tempe kandungan nilai gizinya lebih baik dibandingkan dengan kedelai dan produk turunan lainnya. Kandungan tersebut diantaranya adalah Vitamin B2, Vitamin B12, Niasin, dan juga asam pantorenat. Bahkan hasil analisis, gizi tempe menunjukkan kandungan niasin sebesar 1.13 mg/100 gram berat tempe yang dimakan. Kandungan ini meningkat 2 kali lipat setelah kedelai difermentasikan menjadi tempe. Karena kadar niasin pada kedelai hanya berkisar 0,58 mg/100 gram. Menurut LIPI kandungan gizi tempe seperti protein, karbohidrat, dan lemak tidak banyak berubah. Akan tetapi dikarenakan adanya kapang tempe, maka kandungan protein, karbohidrat, dan lemak menjadi lebih

mudah untuk dicerna oleh tubuh. Kandungan tempe baik untuk anak-anak, dewasa muda, maupun para lansia, sehingga tempe bisa dikatakan sebagai makanan semua kelompok umur. Selain itu tempe juga memiliki kandungan lain, diantaranya adalah:

a. Asam Lemak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, selama dalam proses fermentasi tempe, terdapat tendensi peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Sehingga asam lemak tidak jenuh majemuk polyunsaturated fatty acids (PUFA) pada tempe jumlahnya meningkat. Akan tetapi dalam proses ini asam linoleat dan asam palmitat mengalami degradasi, dan peningkatan juga terjadi pada asam oleat dan linolenat (linolenat tidak terdapat pada kedelai, hanya pada tempe). Asam lemak tidak jenuh ini memiliki efek hipokolesterolemik, sehingga mampu menetralkan efek negatif sterol di dalam tubuh (Astawan, 2004).

b. Vitamin

Menurut Dwinaningsih (2010) dalam (Dewi & Aziz, 2011), kelompok vitamin yang terdapat di dalam tempe terdiri atas dua jenis. Yaitu yang larut di dalam air (Vitamin B kompleks) dan larut lemak (Vitamin A, D, E, dan K). Tempe memiliki sumber vitamin B yang potensial. Jenis vitamin tersebut adalah, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), asam pantotenat, asam nikotinat (Niasin), Vitamin B6 (Piridoksin), dan Vitamin B12 (Sianokobalamin).

Tempe merupakan satu-satunya sumber nabati yang memiliki kandungan B12, di mana kandungan ini hanya dimiliki oleh produk hewani. Sehingga tempe memiliki potensial yang lebih baik dibandingkan produk nabati lainnya. Selama proses fermentasi dalam pembuatan tempe, terjadi peningkatan Vitamin B12 yang sangat mencolok, yaitu 33 kali lebih banyak dibandingkan kedelai. Riboflavin (Vitamin B2) meningkat 8-47 kali, piridoksin (Vitamin B6) meningkat 4-14 kali

lebih banyak dibanding kedelai. Niasin meningkat 2-5 kali, biotin mengalami peningkatan sebesar 2-3, asam folat 4-5 kali, dan asam pantotenat hanya meningkat 2 kali lipat dibanding dari kandungan kedelai sebelum difermentasi. Vitamin ini tidak dihasilkan oleh kapang *Rhizopus*, melainkan dari kontaminasi *Klebsiella pneumoniae*, dan *Citrobacter freundii*.

c. Mineral

Menurut penelitian LIPI, tempe memiliki kandungan mineral yang baik. Berupa mineral makro dan mikro dalam jumlah cukup. Jumlah mineral besi, zink, dan tembaga berturut-turut adalah 9,39, 8,05, dan 2,87 mg setiap 100 gram tempe yang dikonsumsi. Kapang yang ada dalam tempe mengandung enzim fitase yang mampu menguraikan asam fitat (pengikat mineral) menjadi fosfor dan inositol. Dengan terurainya asam fitat menjadikan mineral-mineral seperti zink, besi, maupun tembaga menjadi lebih siap untuk dimanfaatkan oleh tubuh (Muji et al, 2011).

d. Antioksidan

Di dalam tempe ditemukan suatu zat anti oksidan berupa isoflavon. Seperti antioksidan lain, isoflavon diperlukan sebagai penghenti pembentukan radikal bebas. Isoflavon yang terkandung adalah daidzein, glisitein, dan genistein. Selain itu, tempe memiliki isoflavon terkuat dibanding isoflavon kedelai, yaitu antioksidan faktor II (6,7,4 trihidroksi isoflavon). Antioksidan tercipta selama proses fermentasi. Yang dihasilkan dari fermentasi bakteri *Micrococcus luteus*, dan *Coreyne bacterium* (Muji et al, 2011).

F. Tinjauan tentang Wortel

1. Pengertian Wortel

Wortel (*Daucus carota* L) adalah jenis sayuran yang berwarna kuning kemerahan atau jingga kekuningan dengan tekstur yang mirip seperti kayu (Malasari, 2005). Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel memiliki batang yang pendek, akar tunggang yang bentuk dan fungsinya berubah menjadi umbi bulat dan memanjang. Kulit umbi wortel tipis dan jika dimakan mentah terasa renyah dan agak manis (Makmun, 2007).

Menurut Berlian dan Hartuti (2003) wortel termasuk dalam divisi Embryophyta siphonogama, sub divisi Angiospermae, kelas Dicotyledoneae, ordo Umbiliflorae, dan termasuk ke dalam famili Umbiliflorae, yaitu tanaman yang bunganya mempunyai susunan bentuk mirip dengan payung dan pertama kali ditemukan di Eropa bagian selatan, Afrika utara di perbatasan Asia.

2. Kandungan Gizi Wortel

Wortel merupakan sayuran yang memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat untuk semua umur, terutama untuk kalangan anak-anak. Anak – anak pada usia dini memerlukan asupan gizi yang cukup baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Wortel memiliki peranan penting bagi tubuh, karena wortel memiliki kandungan α dan β -karoten. Kedua jenis karoten ini penting dalam gizi manusia sebagai provitamin A. Senyawa β -karoten dalam tubuh diubah menjadi vitamin A yang berperan dalam menjaga pertahanan dan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, paru-paru, dan membantu pertumbuhan sel-sel baru. Wortel merupakan sumber makanan detoksifikasi yang mempunyai kemampuan untuk mengatur ketidakseimbangan dalam tubuh.

Wortel memiliki senyawa bioaktif seperti karotenoid dan serat yang cukup untuk meningkatkan kesehatan secara signifikan. Wortel segar mengandung air,

protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi anti kanker, pektin, mineral (kalsium, fosfor, besi, dan natrium), vitamin (β etakaroten, B1 dan C) serta asparagin. Sayuran berwarna hijau terutama bayam banyak mengandung β -karoten, demikian juga dengan wortel, brokoli, labu, pepaya, mangga, dan paprika merah. Semakin tua warna sayuran tersebut, maka semakin banyak kandungan β -karotennya. β -karoten merupakan anti oksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan (Winarno, 2008).

Wortel kaya akan zat antioksidan betakaroten, mampu mencegah radikal bebas menjadi kanker. Mengonsumsi wortel secara rutin dapat mengurangi keganasan dari radikal bebas. Sebaiknya tidak mengonsumsi terlalu berlebihan karena akan menyebabkan kulit menjadi kuning. Wortel selain dikonsumsi segar dapat pula dikukus terlebih dahulu kemudian dikonsumsi. Wortel adalah salah satu sumber makanan detoksifikasi yang mempunyai kemampuan untuk mengatur ketidakseimbangan dalam tubuh. Sayuran banyak mengandung betakaroten yang merupakan prekursor vitamin A. Wortel sebagai sumber vitamin A berfungsi untuk membantu proses penglihatan. Vitamin tersebut merupakan bagian yang sangat penting dari penerimaan cahaya mata. Wortel segar mengandung air, protein, karbohidrat, lemak, serat, abu, nutrisi anti kanker, gula alamiah (fruktosa, sukrosa, dekstrosa, laktosa, dan maltosa), pektin, glutanion, mineral (kalsium, fosfor, besi dan natrium), vitamin (betakarotein, B1 dan C) serta asparagine. Betakaroten merupakan anti oksidan yang menjaga kesehatan dan menghambat proses penuaan. Selain itu betakaroten bisa mencegah dan menekan pertumbuhan sel kanker serta melindungi asam lemak tidak jenuh ganda dari proses oksidasi. Jika tubuh memerlukan vitamin A maka betakaroten di hati akan diubah menjadi vitamin A. Fungsi vitamin A bisa mencegah buta senja, mempercepat penyembuhan luka dan

mempersingkat lamanya sakit campak. Sebuah wortel ukuran sedang mengandung sekitar 12000 SI betakaroten (Winarno, 2008).

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa dengan mengkonsumsi wortel yang dikukus sebentar akan memperbesar penyerapan betakaroten. Selain dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan pengobatan, umbi wortel juga dapat digunakan untuk keperluan kosmetik, yakni untuk merawat kecantikan wajah dan kulit, menyuburkan rambut, dan lain-lain. Karoten dalam umbi wortel bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit, dan memperlambat timbulnya kerutan pada wajah, sehingga wajah selalu tampak berseri (Cahyono, 2002).

G. Tinjauan tentang Brownies Tempe Substitusi Wortel

Brownies terdiri dari dua macam, brownies kukus dan brownies panggang. Struktur brownies sama seperti cake. Jika dimakan terasa lembut, lembab, dan menghasilkan flavor yang baik (Saragih, 2011). Telur, lemak, gula, dan terigu merupakan komponen pembentuk struktur utama brownies. Untuk memperbaiki tekstur, biasanya ditambahkan bahan pengemulsi (emulsifier) dan bahan pengembang (Saragih, 2011).

Brownies tempe substitusi wortel adalah kue (cake) dengan bahan utama tempe dan wortel. Brownies ini dibuat dengan cara tempe yang telah dipotong-potong dan wortel dikukus. Setelah dikukus tempe di haluskan dengan cara ditumbuk dan wortel diparut, kemudian setelah dikukus bahan utama tempe dan wortel di mixer dengan bahan tambahan tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, dan baking powder (bahan pengembang).

Tujuan dari pembuatan brownies tempe ini yaitu sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) remaja terkhususnya remaja yang mengalami kejadian anemia defisiensi besi. Adapun kandungan gizi brownies tempe substitusi wortel dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6
Rata-Rata Kandungan Zat Gizi Dalam 100 Gram Brownies Tempe Substitusi
Wortel (*Daucus Carota L*)

Perlakuan	Karbohidrat (gr)	Protein (gr)	Lemak (gr)	Vitamin A (µg)	Fe (mg)
1:0	11.88	11.52	24.29	0.77	46.65
1:1	13.11	7.88	20.07	4.56	77.86
3:1	12.59	9.32	23.42	2.36	77.7
1:3	13.78	6.87	19.30	5.17	64.09

Sumber : Rabitatul, 2016

Bahan yang diperlukan untuk membuat brownies tempe substitusi wortel yaitu:

1. Bahan utama

Bahan utama adalah bahan yang digunakan dalam jumlah yang besar dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh bahan lain yaitu tempe dan wortel

2. Bahan pendukung

a. Tepung Terigu

Tepung terigu merupakan hasil penggilingan biji gandum. Tepung terigu mengandung gluten (protein) yang dapat membuat adonan makanan menjadi tipis dan elastis. Tepung berfungsi sebagai pembentuk struktur dan tekstur brownies, pengikat bahan-bahan lain dan mendistribusikannya secara merata, serta berperan dalam membentuk cita rasa (Astawan, 2009).

b. Gula

Secara umum gula pasir ditambahkan pada produk untuk memberikan rasa manis. Fungsi gula dalam pembuatan brownies, selain untuk memberikan rasa manis, juga berpengaruh terhadap pembentukan strukturnya, memperbaiki tekstur

dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan cara mengikat air, serta merangsang pembentukan warna yang baik. Selain itu, gula yang ditambahkan dapat berfungsi sebagai pengawet. Gula dapat mengurangi kadar air bahan pangan, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Saragih, 2011)

c. Telur

Telur dalam pembuatan brownies berfungsi untuk membentuk suatu kerangka yang bertugas sebagai pembentuk struktur. Telur juga berfungsi sebagai pelembut dan pengikat. Fungsi lainnya adalah untuk aerasi, yaitu kemampuan menangkap udara pada saat adonan dikocok, sehingga udara menyebar rata pada adonan (Saragih, 2011).

d. Lemak


Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan brownies. Lemak yang biasanya digunakan adalah mentega atau margarin. Dalam pembuatan brownies, umumnya digunakan margarin karena harganya yang lebih murah dibandingkan butter. Penambahan lemak untuk memberikan rasa gurih, melembutkan, membuat produk tidak cepat menjadi keras dan lebih empuk. Selain itu, menambah nilai gizi dan rasa lezat brownies (Saragih, 2011).

e. Bahan Pengembang

Bahan pengembang (leavening agent) merupakan senyawa kimia yang akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan. Bahan pengembang dapat mengembangkan produk karena dapat menghasilkan gas CO₂. Bahan pengembang yang digunakan pada pembuatan brownies adalah baking powder (Saragih, 2011).

H. Kerangka Teori


Secara umum penyebab tidak langsung dan penyebab langsung dari anemia gizi besi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Soemantri, 2005

Gambar 2.1 Penyebab Anemia

I. Kerangka Konsep



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan:

- : Variabel Independent
- : Variabel Dependent I
- ⬡ : Variabel Perancu
- : Hubungan Antar Variabel

Tanin adalah senyawa fenolik dan mengganggu penyerapan zat besi melalui pembentukan kompleks dengan besi bila dalam lumen gastrointestinal yang menurunkan bioavailabilitas besi. Untuk mencegah masalah ini, disarankan untuk minum teh dan kopi yang mana keduanya mengandung tanin yang cukup tinggi di antara waktu makan. Untuk itu asupan tanin menjadi pengganggu dalam penelitian ini

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan, yaitu melihat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar Hemoglobin remaja putri anemia di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (*Quasi eksperimen*) yang merupakan jenis penelitian dengan menguji variabel satu dengan variabel lainnya. Pengujian dilakukan melalui intervensi pada Remaja Anemia, dengan desain penelitian yaitu *non randomized pre-post control design*. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (variabel independen) adalah brownise tempe substitusi wortel, sedangkan yang menjadi variabel terikatnya (variabel dependen) adalah Kadar Hemoglobin Remaja Anemia. Intervensi yang dilakukan pada remaja anemia adalah brownis tempe substitusi wortel, pada kelompok kasus, dan brownis tempe pada kelompok kontrol.


Pengelompokkan wilayah kelompok I dan kelompok II tidak diacak tetapi ditentukan oleh peneliti. Peneliti mengambil sampel pada siswa anemia sebanyak 24 orang yang terbagi masing-masing 12 remaja anemia kelompok kasus dan 12 remaja anemia lainnya sebagai kelompok kontrol. Kemudian dari hasil pemberian

brownies tersebut, peneliti kembali melakukan pemeriksaan Hb dan *recall* 24 jam untuk mengetahui asupan zat besi, baik pada remaja anemia kelompok kasus maupun kelompok kontrol.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata. Pada bulan Juni selama 1 bulan.

Kerangka Pikir:



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini seluruh remaja putri kelas 7 dan 8 yang berada di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata yang berjumlah 47 siswa.

2. Sampel

Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagian siswa kelas 7 dan 8 (13-15 tahun) yang menderita anemia dan bersekolah di MTs Mahad Manahilil Guppi Ulum Samata serta memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

a. Sampel merupakan sebagian objek yang diambil dari populasi penelitian, yang diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria inklusi :

- 1) Menderita Anemia
- 2) Kelas 7 dan 8
- 3) Umur 13-15 tahun
- 4) Tidak menderita penyakit infeksi
- 5) Tidak mengalami alergi tempe maupun wortel
- 6) Bersedia untuk diwawancarai dan bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan responden.
- 7) Bersedia mengikuti prosedur sebagai subjek penelitian selama penelitian berlangsung.
- 8) Menetap/tidak pindah daerah.

Kriteria eksklusi :

- 1) Tidak Menderita Anemia
- 2) Kelas 9
- 3) Umur berada dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun
- 4) Mengalami alergi terhadap tempe dan wortel
- 5) Tidak bersedia untuk diwawancarai dan menjadi subjek penelitian dengan tidak menandatangani lembar persetujuan responden.
- 6) Tidak bersedia mengikuti prosedur sebagai subjek penelitian selama penelitian berlangsung.
- 7) Pindah daerah atau meninggal dunia.

b. Besar Sampel

Perhitungan besar sampel dilakukan agar memenuhi jumlah syarat analisis, dengan menggunakan rumus Federer (1963) dimana sampel (n) dapat ditentukan berdasarkan total kelompok (t) yang digunakan dalam penelitian. Sehingga $t=2$ kelompok maka besaran sampel yang digunakan:

$$(n-1)(t-1) \geq 10$$

$$(n-1)(2-1) \geq 10$$

$$(n-1)(1) \geq 10$$

$$n-1 \geq 10$$

$$n \geq 10+1 = 11$$

$$n \geq 11$$

Dengan demikian, setiap kelompok perlakuan terdapat minimal sampel. Adapun sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah sebanyak 24 responden siswa anemia yang akan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok kasus sebanyak 12 orang dan kelompok kontrol sebanyak 12 orang untuk selanjutnya diintervensi brownies tempe substitusi wortel dan brownies tempe. Berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi besar sampel minimum. Sugiyono (2012) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian eksperimen sederhana yang menggunakan kelompok kasus dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10-20 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Hal ini diperoleh melalui pengujian nilai gizi serta organoleptik dari produk brownies, wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan alat ukur Hb berupa alat check (*easy touch*), kuesioner, dan formulir *recall* 24 jam. Data yang dikumpulkan pada saat penerimaan produk brownis tempe substitusi wortel adalah konsumsi zat besi dan kadar Hb remaja Putri

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. *Instrument Penelitian*

1. Form Pernyataan kesediaan menjadi responden.
2. Form identitas responden dan data pengukuran Hb
3. Form *Food recall* 24 jam yaitu untuk mencatat semua makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam. Dalam metode ini dimulai dari responden bangun pagi kemarin sampai istirahat tidur malam harinya, atau dapat juga dimulai dari waktu saat dilakukan wawancara mundur ke belakang sampai 24 jam penuh (Supariasa, 2002).
4. Form pemantauan konsumsi brownis tempe substitusi wortel dan brownies tempe oleh responden.
5. Foto-foto makanan berdasarkan Ukuran Rumah Tangga (URT), digunakan pada saat melakukan recall 24 jam untuk mempermudah responden mengingat makanan yang telah dimakan selama 24 jam berlalu dengan melihat foto-foto berbagai jenis makanan serta ukurannya dalam rumah tangga.
6. Pemeriksaan kadar Hemoglobin (Hb), Menggunakan:
 - a. Alat tes hemoglobin (*Easy Touch*)
 - b. Kapas Alkohol 70% (pembersih)
 - c. *Blood Lancet*
 - d. *Microcuvet*

Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) dilakukan dengan cara:

- 1) Oleskan kapas Alkohol 70% pada ujung jari (jari manis),

- 2) Tusuk ujung jari dengan Blood Lancet.
- 3) Darah yang pertama keluar dihapus tisu.
- 4) Darah yang keluar selanjutnya dihisap dengan menggunakan microkuvet yang kemudian dimasukkan kedalam Alat tes hemoglobin.
- 5) Baca dan catat kadar Hb yang muncul pada layar Alat tes hemoglobin, kemudian masukkan kedalam tabel

F. Validitas dan Reabilitas

1. Validasi

Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur benar-benar variabel yang hendak diteliti. Validasi juga diartikan instrument atau alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini, keseluruhan unsur validitas termasuk alat ukur, metode pengukuran dan pengukurannya sudah valid, artinya semua telah sesuai dengan standar operasional sehingga ke semua unsur dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Kesesuaian dilihat dari segi alat yaitu alat ukur kadar Hemoglobin (Hb) melalui pengecekan dan penggunaan baterai (sumber energi) yang digunakan dalam keadaan baik (baru) digunakan, lanset yang dalam keadaan baik digunakan sekali pakai.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2011).

Reliabilitas instrument dalam penelitian ini reabilitas yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan dan prosedur kerja. Untuk melakukan suatu tes

pemeriksaan, terdapat standar prosedur kerja untuk sebagai jenis pengujian. Untuk menguji reabilitasnya maka dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali untuk menunjukkan bahwa instrument yang digunakan secara berulang menghasilkan hasil yang sama.

Validasi dan reliabilitas dapat dinyatakan bermakna (berhubungan nyata) bila nilai *p value* sama dengan atau lebih kecil χ^2 tabel, standar pada nilai $\alpha=0,05$. Pada keadaan ini hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternative (H_a) diterima.

G. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan komputer dan dianalisis dengan menggunakan program nutri survey dan SPSS 21. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Editing dilakukan untuk menilai kelengkapan, kejelasan dan kesesuaian nilai Hb dalam lembar hasil pengukuran penelitian.

b. Coding

Setelah memperoleh hasil pemeriksaan Hb, dilakukan identifikasi, klasifikasi kemudian diberi kode.

c. Entry data

Memasukkan data yang telah diberi kode pada lembar hasil pengukuran untuk diproses secara komputerisasi.

d. Cleaning

Pembersihan data dari kesalahan-kesalahan selama mengentri data.

e. Tabulasi

Setelah instrument di isi dengan baik, maka data kemudian di tabulasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (Riyanto, 2011).

f. Nutrisurvey

Nutrisurvey digunakan untuk mengetahui kandungan gizi pada resep brownies tempe substitusi wortel.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi distribusi frekuensi persentase variabel baik variabel independen maupun variabel dependen. Selain itu dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dan variabel dependen.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 yang di sesuaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:


a. Analisis Univariat

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti

b. Analisis Bivariat

Dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Data yang diperoleh dalam ordinal di analisis menggunakan uji statistik yaitu uji T-berpasangan (*Paired T-Test*). Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel dan brownies tempe terhadap kenaikan kadar hemoglobin remaja putri anemia dan uji Independent (T-Test) untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah melakukan intervensi pada kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan tingkat kemaknaan semua uji yaitu 95% atau $\alpha=5\%$ (0.05).

Adapun alur penelitian pemberian brownis tempe substitusi wortel dan brownis tempe terhadap Siswa Anemia, ditunjukkan pada bagan berikut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel pada kelompok I (kasus) dan kelompok II (kontrol) di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata dalam meningkatkan kadar hemoglobin remaja putri guna memperbaiki status anemia remaja khususnya remaja putri. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2019 di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata berdasarkan kode etik nomor A.079/KEPK/FKIK/II/2019. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 24 orang. Sampel dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 12 orang pada kelompok kasus dan 12 orang pada kelompok kontrol. Dan terdapat responden yang drop out (pindah sekolah dan pindah daerah) selama proses penelitian berlangsung yaitu pada kelompok kontrol.

MTs Guppi Samata didirikan pada tahun 1976 setelah berdirinya MA Guppi Samata dan menyusul SMP serta SMA Guppi Samata yang masing-masing berada dibawah naungan Yayasan Pesantren Pembangunan Ma'had Manahilil Ulum Guppi TK. 1 Sul-Sel. MTs Guppi Samata terletak kira-kira 200 meter sebelah timur kampus II UIN Alauddin Makassar, tepatnya di Jalan H.M Yasin Limpo Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sekolah ini sulit untuk diakses masyarakat karena jauh dari kota dan tidak terakses angkutan umum, karena angkutan umum di daerah samata hanya sampai di kampus II UIN Alauddin Makassar, sehingga sebagian besar peserta didik adalah masyarakat sekitar atau tinggal di pondok pesantren Manahilil Ulum Guppi Samata Gowa.

b. Profil Sekolah

Nama Sekolah	: MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata
NSM	: 202190301009
Alamat	: Jl. H.M Yasin Limpo
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Otonomi Daerah	: Kabupaten Gowa
Desa/Kelurahan	: Romang Polong
Kecamatan	: Somba Opu
Kode Pos	: 92113
Daerah	: Pedesaan
Status Sekolah	: Swasta
Bangunan Sekolah	: Milik Sendiri
Kegiatan Belajar/Mengajar:	Pagi
Organisasi Penyelenggara	: Lembaga Swasta

c. Visi dan Misi**1) Visi**

Terwujudnya siswa-siswi yang unggul dalam prestasi dan teladan dalam perilaku.

2) Misi

- Menumbuhkan budaya gemar membaca
- Mengoptimalkan dan mengintegrasikan pembelajaran dan bimbingan dalam bingkai ajaran islam
- Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari
- Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bernuansa agama

- e) Menerapkan manajemen partisipatif seluruh warga sekolah dan warga masyarakat

2. Gambaran Umum Responden

Adapun gambaran khusus responden dari hasil penelitian terhadap remaja putri anemia adalah sebagai berikut:

a) Kelompok Umur

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok umur pada remaja putri yang mengalami anemia:

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur di MTs Ma'had Manahilil Ulum
Guppi Samata Tahun 2019

Umur Responden	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	N	%	N	%
13 tahun	6	60	-	-
14 tahun	4	40	7	58.3
15 tahun	-	-	5	41.7
Jumlah	10	100	12	100

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 10 responden pada kelompok kontrol, terdapat 6 responden (60%) yang berada pada kelompok umur 13 tahun dan 4 responden (40%) berada pada kelompok umur 14 tahun sedangkan pada kelompok kasus, terdapat 7 responden (58.3%) yang berada pada kelompok umur 14 tahun dan 5 responden (41.7%) yang berada pada kelompok umur 15 tahun.

b) Pendidikan Orang Tua

1) Pendidikan Ayah

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ayah
di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata
Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	N	%	n	%
SD	-	-	-	-
SMP	-	-	2	16.7
SMA	6	60	10	83.3
Sarjana	4	40	-	-
Jumlah	10	100	12	100

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 10 responden pada kelompok kontrol, terdapat 6 responden (60%) yang memiliki ayah dengan tingkat pendidikan SMA dan 4 responden (40%) memiliki ayah dengan tingkat pendidikan sarjana, sedangkan pada kelompok kasus, terdapat 2 responden (16.7%) yang memiliki ayah dengan tingkat pendidikan SMP dan 10 responden (83.3%) memiliki ayah dengan tingkat pendidikan SMA.

2) Pendidikan Ibu

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu
di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata
Tahun 2019

Pendidikan Ibu	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	N	%	N	%
SD	1	10	3	25
SMP	2	20	1	8.3
SMA	5	50	8	66.7
Sarjana	2	20	-	-
Jumlah	10	100	12	100

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 10 responden pada kelompok kontrol, terdapat 5 responden (50%) yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan SMA dan 1 responden (10%) memiliki ibu dengan tingkat pendidikan SD, sedangkan pada kelompok kasus, terdapat 8 responden (66.7%) yang memiliki ibu dengan tingkat pendidikan SMA dan 1 responden (8.3%) memiliki ibu dengan tingkat pendidikan SMP.

c) Pekerjaan Orang Tua

1) Pekerjaan Ayah

Tabel 4.4
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Ayah
di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata
Tahun 2019

Pekerjaan Ayah	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	N	%	n	%
PNS	3	30	-	-
Wiraswasta	4	40	2	16.7
Buruh	3	30	4	33.3
Petani	-	-	6	50
Jumlah	10	100	12	100

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 10 responden pada kelompok kontrol, terdapat 4 responden (40%) yang memiliki pekerjaan ayah sebagai wiraswasta, sedangkan pada kelompok kasus, terdapat 6 responden (50%) yang memiliki pekerjaan ayah sebagai petani.

2) Status Pekerjaan Ibu

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Status Pekerjaan Ibu
di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi Samata
Tahun 2019

Status Pekerjaan Ibu	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	n	%	N	%
Bekerja	3	30	-	-
Tidak bekerja	7	70	12	100
Jumlah	10	100	12	100

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 10 responden pada kelompok kontrol, terdapat 3 responden (30%) yang memiliki ibu yang bekerja dan 7 responden (70%) memiliki ibu yang tidak bekerja, sedangkan pada kelompok kasus, semuanya (100%) memiliki ibu yang tidak bekerja.

d) Status Anemia

Berikut hasil analisis univariat pada kelompok umur pada remaja putri yang mengalami anemia:

Tabel 4.6
Distribusi Responden Terhadap Status Anemia Berdasarkan Status Anemia
di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Status Anemia	Kelompok Kontrol		Kelompok Kasus	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Normal	0	8	0	11
Anemia	10	2	12	1
Jumlah	10	10	12	12

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa status anemia pada 10 responden kelompok kontrol, sebelum dilakukan intervensi terdapat 10 responden (100%) yang mengalami anemia dan tidak ada yang memiliki status anemia normal. Setelah dilakukan intervensi terdapat 8 responden (80%) yang mengalami peningkatan status anemia dari anemia menjadi normal dan 2 responden (20%) tidak mengalami peningkatan status anemia sedangkan pada 12 responden kelompok kasus, sebelum dilakukan intervensi, terdapat 12 responden (100%) yang mengalami anemia dan tidak ada yang memiliki status anemia normal. Setelah dilakukan intervensi, terdapat 11 responden (91.7%) yang mengalami peningkatan status anemia dari anemia menjadi normal dan 1 responden (8.3%) yang tidak mengalami peningkatan status anemia.

e) **Konsumsi Produk**

Tabel 4.7
Jumlah Konsumsi Produk pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Kasus
Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Kelompok	Jumlah Konsumsi Produk				
	Harus Dikonsumsi	Yang Dikonsumsi	%	Sisa	%
Kontrol	1000 gram	661.7	66.1%	338.3	33.9%
Kasus	1000 gram	969.3	96.9%	30.7	3.1%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi produk pada kelompok kontrol selama 30 hari intervensi yang dikonsumsi sebanyak 661.7 gram (66.1%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 338.3 gram (33.9%). Sedangkan jumlah

konsumsi produk pada kelompok kasus sebanyak 969.3 gram (96.3%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 30.7 gram (3.1%).

Tabel 4.8
Jumlah Konsumsi Produk pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Kasus
Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Kelompok	Harus Dikonsumsi	Jumlah Konsumsi Produk			
		Yang Dikonsumsi	%	Sisa	%
Kontrol	100 gram	66.17	66.1%	33.83	33.9%
Kasus	100 gram	96.93	96.9%	3.07	3.1%

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah konsumsi produk pada kelompok kontrol selama 30 hari intervensi yang dikonsumsi sebanyak 66.17 gram (66.1%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 33.83 gram (33.9%). Sedangkan jumlah konsumsi produk pada kelompok kasus sebanyak 96.93 gram (96.9%) dan yang tidak dihabiskan sebanyak 3.07 gram (3.1%).

3. Hasil Analisis

a. Analisis Univariat

Berikut hasil analisis univariat untuk melihat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin (Hb) remaja putri anemia:

- 1) Gambaran Asupan Energi, Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A, dan Kadar Hemoglobin Sebelum Intervensi

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A dan Kadar Hemoglobin Sebelum Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019

Rata-Rata	Kelompok Intervensi		Independent t-test
	Kelompok Kontrol	Kelompok Kasus	
Energi (Kcal)	1723.3 Kkal	1821.3 Kkal	0.109
Protein (g)	57.05 g	62.96 g	0.349
Vitamin A (g)	150.46 µg	126.79 µg	0.496
Zat Besi (mg)	5.27 mg	5.25 mg	0.979
Kadar Hemoglobin	11.27	11.33	0.735

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata energi, protein, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum intervensi. Untuk rata-rata energi protein, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin diperoleh hasil uji *independent t-test* pada masing-masing variabel pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum intervensi

pada kotak *t-test quality means* untuk kolom *sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.109 untuk rata-rata energi, 0.349 untuk rata-rata protein, 0.496 untuk rata-rata vitamin A, 0.979 untuk rata-rata zat besi dan 0.735 untuk rata-rata kadar hemoglobin. Karena pada semua variabel nilainya lebih besar dari pada $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, protein, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum intervensi.

- 2) Gambaran Asupan Energi, Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A, dan Kadar Hemoglobin Setelah Intervensi

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Sampel Berdasarkan Rata-Rata Asupan Energi, Asupan Protein, Asupan Zat Besi, Vitamin A dan Kadar Hemoglobin Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Tahun 2019

Rata-Rata	Kelompok Intervensi		Independent t-test
	Kelompok Kontrol	Kelompok Kasus	
Energi (Kcal)	1912.6 Kkal	2002.5 Kkal	0.036
Protein (g)	68.65 g	71.60 g	0.481
Vitamin A (g)	156.66 μ g	268.35 μ g	0.029
Zat Besi (mg)	8.43 mg	11.48 mg	0.000
Kadar Hemoglobin	12.39	13.22	0.040

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata energi, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dan kelompok kasus setelah intervensi. Untuk rata-rata energi, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin

diperoleh hasil uji *independent t-test* pada masing-masing variabel pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum intervensi pada kotak *t-test quality means* untuk kolom *sig. (2-tailed)* baris pertama terlihat angka 0.036 untuk rata-rata energi, 0.029 untuk rata-rata vitamin A, 0.000 untuk rata-rata zat besi dan 0.040 untuk rata-rata kadar hemoglobin. Karena pada semua variabel nilainya lebih kecil dari pada $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata asupan energi, protein, vitamin A, zat besi dan kadar hemoglobin antara kelompok kontrol dan kelompok kasus setelah intervensi.

Sedangkan perbedaan rata-rata protein antara kelompok kontrol dan kelompok kasus menunjukkan nilai 0.481 yang berarti nilainya lebih besar dari pada $\alpha = 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata asupan energi antara kelompok kontrol dan kelompok kasus setelah intervensi

b. Analisis Bivariat

Berikut hasil analisis bivariat untuk melihat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin (Hb) remaja putri anemia:

- 1) Pengaruh Pemberian Brownies Tempe dan Brownies Tempe Substitusi Wortel Terhadap Asupan Protein pada Remaja Putri Anemia

Tabel 4.11
Rata-Rata Perubahan Asupan Protein Berdasarkan Metode Re-Call 24
Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Asupan Protein	Rata-Rata (gram)		Mean (Selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Sesudah		
Kelompok Kontrol	57.05	68.65	11.60	0.003
Kelompok Kasus	62.96	71.60	8.64	0.111

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan protein pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.003$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan protein pada remaja putri yang mengalami anemia.

Pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.111$ ($\alpha > 0.005$) maka tidak terdapat pengaruh pemberian brownes tempe

substitusi wortel terhadap asupan protein pada remaja putri yang mengalami anemia.

Dari hasil uji statistik antara dua kelompok, terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus. Pada kelompok kontrol terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan protein pada remaja putri yang mengalami anemia. Berbeda dengan kelompok kasus dimana tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan protein pada remaja putri anemia.

2) Pengaruh Pemberian Brownies Tempe dan Brownies Tempe Substitusi Terhadap Asupan Vitamin A pada Remaja Putri Anemia

Tabel 4.12
Rata-Rata Perubahan Asupan Vitamin A Berdasarkan Metode Re-Call 24
Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Asupan Vitamin A	Rata-Rata (μg)		Mean (Selisih)	Paired t-test
	Sebelum	Sesudah		
Kelompok Kontrol	150.05	156.66	6.61	0.852
Kelompok Kasus	126.79	268.35	141.56	0.002

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan vitamin A pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.852$ ($\alpha > 0.005$) maka tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan vitamin A pada remaja putri yang mengalami anemia.

Pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.002$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan vitamin A pada remaja putri yang mengalami anemia.

Dari hasil uji statistik antara dua kelompok, terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus. Pada kelompok kontrol tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan vitamin A pada remaja putri yang mengalami anemia. Berbeda dengan kelompok kasus dimana terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan vitamin A pada remaja putri anemia.

3) Pengaruh Pemberian Brownies Tempe dan Brownies Tempe Substitusi Terhadap Asupan Zat Besi (Fe) pada Remaja Putri Anemia

Tabel 4.13
Rata-Rata Perubahan Asupan Zat Besi (Fe) Berdasarkan Metode Re-Call 24
Sebelum dan Setelah Intervensi di MTs Ma'had Manahilil
Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Asupan Fe	Rata-Rata (mg)		Mean (Selisih)	Paired T-Test
	Sebelum	Sesudah		
Kelompok Kontrol	5.27	8.43	3.16	0.000
Kelompok Kasus	5.25	11.48	6.23	0.000

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan zat besi (Fe) pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom

sig. (2-tailed) didapatkan nilai $p = 0.000$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan zat besi pada remaja putri yang mengalami anemia.

Pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan vitamin C pada remaja putri yang mengalami anemia.

Dari hasil uji statistik yang dilakukan pada dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok kasus didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata asupan zat besi (Fe).

- 4) Pengaruh Pemberian Brownies Tempe dan Brownies Tempe Substitusi Terhadap Kadar Hemoglobin (Hb) pada Remaja Putri Anemia

Tabel 4.14
Rata-Rata Perubahan Kadar Hemoglobin (Hb) Berdasarkan
Metode Re-Call 24 Sebelum dan Setelah Intervensi
di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata
Tahun 2019

Kadar Hemoglobin	Rata-Rata (gr/dL)		Mean (Selisih)	Paired T-Test
	Sebelum	Sesudah		
Kelompok Kontrol	11.2	12.4	1.2	0.000
Kelompok Kasus	11.3	13.2	1.9	0.000

Sumber: Data Primer 2019

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian brownies tempe terhadap kadar hemoglobin (Hb) pada kelompok kontrol setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom

sig. (2-tailed) didapatkan nilai $p = 0.000$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap asupan zat besi pada remaja putri yang mengalami anemia.

Pada kelompok kasus setelah dilakukan uji statistik *paired t-test* pada masing-masing variabel. Hasil uji tersebut pada kolom *sig. (2-tailed)* didapatkan nilai $p = 0.000$ ($\alpha < 0.005$) maka terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan vitamin C pada remaja putri yang mengalami anemia.

Dari hasil uji statistik yang dilakukan pada dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok kasus didapatkan hasil adanya pengaruh intervensi terhadap peningkatan rata-rata kadar hemoglobin (Hb).

B. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Juli-23 Agustus 2019 di MTs Ma'had Manalilil Ulum uppi Samata Kabupaten Gowa. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja putri yang berusia 13-15 tahun yang memiliki kadar hemoglobin $< 12 \text{ gr/dL}$. Dari hasil tersebut, diperoleh 24 orang remaja putri yang memenuhi kriteria inklusi. Selama penelitian berlangsung terdapat responden yang drop-out sebanyak 2 orang yang termasuk ke kelompok kontrol. Jadi jumlah sampel hingga penelitian selesai sebanyak 22 orang.

Sebelum dilakukan intervensi, peneliti terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada semua remaja putri SMP baik yang akan menjadi responden maupun yang tidak menjadi responden. Sosialisasi ini dilakukan agar para siswa khususnya remaja putri mengetahui pentingnya menjaga kesehatan tubuh terutama dalam masalah gizi. Adapun bentuk sosialisasi ini berupa pembahasan mengenai anemia dan bahan-bahan intervensi yang akan di berikan kepada responden. Setelah itu dilakukan pemberitahuan tentang persetujuan menjadi responden kemudian

dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin lalu diberikan obat cacing bagi responden yang belum pernah mengonsumsi obat cacing dalam 6 bulan terakhir dan dilanjutkan dengan recall 24 jam.

Dari 22 responden, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 10 orang pada kelompok kontrol yang diberikan asupan brownies tempe dan 12 orang pada kelompok kasus yang diberikan asupan brownies tempe substitusi wortel. Pemberiannya dilakukan di MTs Ma'had Manahilil Ulum Guppi antara selingan waktu sarapan dan makan siang, tepatnya pada jam istirahat.

Dalam penelitian ini, remaja putri SMP yang menjadi responden masing-masing tersebar di beberapa kelas yaitu kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Kelompok kontrol diberikan brownies tempe digunakan formula 1:0 sebanyak 100 gram dengan kandungan zat besi sebanyak 46.65 mg kemudian pada kelompok kasus diberikan brownies tempe substitusi wortel digunakan formula 1:1 sebanyak 100 gram dengan kandungan gizi sebanyak 77.86 mg yang diberikan setiap 3 hari sekali selama 30 hari.

Hal ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rabbitatul (2016) tentang “Analisis Kandungan Zat Gizi Brownies Tempe Substitusi Wortel (*Daucus carota L.*) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat” yang direkomendasikan 1:1 sebagai produk terbaik dalam hal kandungan karbohidrat, Vitamin A dan zat besi.

Di dalam al-Qur'an telah diperintahkan agar manusia tidak boleh mengonsumsi makanan secara berlebihan dan tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Firman Allah swt, dalam QS.alA'raf/7:31:

﴿ يٰٓبَنِي ٓءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ۙ ﴾

Terjemahnya : *...Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Depag RI, 1989).*

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini Karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002). Maka dari itu, kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk menjaga keseimbangan gizi kita agar terhindar dari berbagai macam penyakit sebagai akibat dari kelalaian kita untuk menjaga pola makan yang sehat.

1. Asupan Protein

Protein merupakan bagian terbesar tubuh setelah air. Seperlima bagian tubuh adalah protein. Separuhnya ada didalam otot, seperlima berada didalam tulang dan tulang rawan. Sepersepuluh didalam kulit dan selebihnya didalam jaringan lain dan cairan tubuh.


Protein mempunyai fungsi yaitu pertumbuhan dan pemeliharaan, pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh, mengatur keseimbangan air, pembentukan antibodi, mengangkut zat-zat gizi dan sebagai sumber energi dimana protein menyumbang energi sebanyak 4 kkal/gram. Apabila tubuh mengalami kekurangan energi maka protein terlebih dahulu akan menghasilkan energi untuk membentuk glukosa.

Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada asupan dan transportasi zat-zat gizi. Kekurangan protein yang terus menerus akan menimbulkan gejala yaitu pertumbuhan yang kurang baik, daya tahan tubuh menurun dan daya kreatifitas kerja menurun. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu seperti telur, susu, daging

unggas, ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu serta kacang-kacangan lainnya. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai nilai mutu atau nilai biologis tertinggi (Almatsier, 2001)

Gambaran asupan protein dapat diperoleh dengan melakukan survey asupan makanan yaitu recall 24 jam tanpa berturut-turut (Supariasa, 2002). Gambaran asupan zat gizi diperoleh dari hasil wawancara recall 24 jam selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi nutri survei 2007 untuk menggambarkan akumulasi asupan protein pada responden. Perubahan asupan protein responden sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 4.1
Grafik Perubahan Asupan Protein Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer 2019

Grafik 4.1 menunjukkan perubahan asupan protein pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum dan setelah intervensi. Pada uji paired t-test diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan protein responden pada kelompok kontrol yaitu 57.05 gram mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 68.65. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian

brownies tempe terhadap perubahan asupan protein pada remaja yang mengalami anemia dilihat pada $p=0.003$ ($p<0.005$) sedangkan pada kelompok kasus diperoleh rata-rata asupan protein sebelum dilakukan intervensi yaitu 62.96 dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi yaitu 71.60 gram hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan asupan protein pada remaja putri yang mengalami anemia dilihat pada $p=0.111$.

Jika dilihat secara keseluruhan pada kedua kelompok rata-rata asupan protein mengalami peningkatan setelah intervensi, namun peningkatannya jauh lebih tinggi pada kelompok kontrol yaitu sebesar 17.6 gram dibandingkan dengan kelompok kasus yaitu sebesar 8.64 gram. Hal tersebut dikarenakan protein yang dihasilkan pada brownies tempe substitusi wortel yang diberikan pada kelompok kasus memiliki protein yang lebih rendah yaitu 7.88 gram per 100 gramnya sedangkan pada brownies tempe yang diberikan pada kelompok kontrol menghasilkan protein sebanyak 11.25 gram per 100 gramnya.

Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun kelompok kasus mengalami peningkatan asupan protein tetapi secara statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan protein pada remaja putri anemia.

Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan proses penyerapan protein oleh masing-masing remaja yang menjadi sampel penelitian itu berbeda. Kemudian dilihat dari kebiasaan-kebiasaan remaja putri yang kurang mengonsumsi protein dan belum mencukupi AKG yang dibutuhkan oleh remaja tersebut. Terdapat 1 responden dari kelompok kasus jatuh sakit ketika penelitian berlangsung sehingga hal tersebut memengaruhi peningkatan asupan makanan dari anak tersebut. Responden yang sakit tersebut dikarenakan remaja tersebut sering mengonsumsi makanan jajanan

yang kurang sehat dibandingkan makanan pokok yang tersedia dirumah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayani (2016) yang mengatakan bahwa para remaja lebih memilih mengonsumsi jajanan diluar rumah dibandingkan dengan makanan pokok. Hasil ini sejalan dengan pendapat Shanon (2015) yang mengatakan bahwa asupan protein yang cukup menunjukkan bahwa konsumsi lauk pauk pada umumnya baik karena protein disuplai dari lauk pauk baik yang berasal dari hewani maupun nabati.

Firman Allah SWT dalam Q.S Abasaa : 24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahan: “Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada manusia agar memperhatikan makanannya, dengan memasang akal nya kepada makanannya, bagaimanakah makanan itu diciptakan dan diatur untuk manusia.

Menurut penelitian Maesaroh (2007) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi protein memiliki hubungan yang paling kuat dengan kadar hemoglobin. Hasil ini sejalan dengan teori Linder (2009) yang menyebutkan bahwa protein berperan penting dalam proses transportasi zat besi di dalam tubuh. dikarenakan tempe sebagai sumber protein sedangkan protein berperan penting dalam transportasi zat besi dalam tubuh, bila protein dalam tubuh tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka zat besi tidak dapat di distribusikan ke organ dalam tubuh. Protein yang berfungsi untuk transportasi zat besi yaitu transferin. Transferin ini sendiri adalah suatu glikoprotein yang disintesis di hati sehingga protein berperan sentral dalam metabolisme besi tubuh sebab transferin mengangkut zat besi dalam sirkulasi ke tempat-tempat yang membutuhkan zat besi seperti dari usus ke sumsum tulang belakang untuk membentuk hemoglobin yang baru. Oleh karena itu kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi

zat besi terhambat sehingga akan terjadi defisiensi besi dan mengalami kekurangan kadar hemoglobin.


2. Asupan Vitamin A

Vitamin A merupakan vitamin yang berupa kristal alkohol berwarna kuning dan larut dalam lemak atau pelarut lemak. Dalam makanan, vitamin A biasanya terdapat dalam bentuk ester retinil yaitu terikat pada asam lemak rantai panjang. Didalam tubuh, vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk ikatan kimia aktif yaitu retinol (bentuk alkohol) dan retinoat (bentuk asam). Retinol bila dioksidasi berubah menjadi retinal dan retinal dapat kembali di reduksi menjadi retinol. Selanjutnya, retinal dapat dioksidasi menjadi asam retinoat.

Kebutuhan vitamin A pada remaja putri usia 13-15 tahun yaitu sebesar 600 μg per harinya (AKG, 2013). Asupan vitamin A dapat diperoleh dengan melakukan survey konsumsi makanan yaitu recall 24 jam yang dilakukan beberapa kali, yaitu minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut (Supriasa, 2002). Perubahan asupan vitamin A remaja putri sebelum dan setelah intervensi dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 4.2
Grafik Perubahan Asupan Vitamin A Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer 2019

Grafik 4.2 menunjukkan perubahan asupan vitamin A pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum dan setelah intervensi. Pada uji paired t-test diperoleh hasil sebelum dilakukan intervensi rata-rata asupan vitamin A responden pada kelompok kontrol yaitu 150.05 µg mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 156.66 µg. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap perubahan asupan vitamin A pada remaja yang mengalami anemia dilihat pada $p=0.852$ ($p>0.005$) sedangkan pada kelompok kasus diperoleh rata-rata asupan vitamin A sebelum dilakukan intervensi yaitu 126.79 µg dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi yaitu 268.35 µg setelah dilakukan uji statistik paired t-test didapatkan hasil $p=0.002$ yang berarti bahwa terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan asupan vitamin A pada remaja putri yang mengalami anemia.

Meskipun sama-sama mengalami peningkatan setelah intervensi dari grafik diatas kita dapat melihat rata-rata selisih peningkatan asupan vitamin A yang lebih

tinggi adalah pada kelompok kasus yaitu sebesar 141.56 μg sedangkan pada kelompok kontrol memiliki selisih rata-rata sebesar 6.61 μg . Hal tersebut terjadi dikarenakan kandungan zat gizi vitamin A yang terdapat pada brownies tempe substitusi wortel lebih besar dibandingkan dengan brownies tempe. Jika dilihat secara keseluruhan dari rata-rata peningkatan asupan vitamin A masih belum mencukupi atau masih jauh dari AKG yang dianjurkan baik dari kelompok kontrol maupun kelompok kasus. Walaupun terdapat perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok kasus tetapi secara kuantitas, kelompok kontrol dan kelompok kasus berhubungan erat dengan kadar hemoglobin pada kedua kelompok intervensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) tentang Komposisi Zat Gizi Tempe yang di Fortifikasi Zat Besi dan Vitamin A. Rahayu (2014) mengatakan bahwa komposisi zat gizi tempe yang difortifikasi zat besi dan vitamin A mampu meningkatkan kadar hemoglobin (Hb).

Hasil tersebut sejalan dengan teori tentang fungsi vitamin A yaitu membantu proses penyerapan zat besi dan membantu proses pembentukan hemoglobin. Besi bersama retinol akan diangkut oleh *Retinol Binding Protein* (RBP) dan transferin yang disintesis dalam hati sehingga dampak apabila terjadi defisiensi vitamin A adalah terjadinya gangguan mobilisasi pada besi dari hati atau penggabungan besi ke eritrosit (Scatt, 2007). Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahana (2015) tentang hubungan asupan mikronutrien dengan kadar hemoglobin pada wanita usia subur (WUS) yang mengatakan bahwa asupan vitamin A berhubungan terhadap peningkatan kadar hemoglobin.

Firman Allah dalam Q.S Al-An'aam : 99 yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ... ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: “*dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau.... (Kementrian Agama 2010).*

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah SWT lah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Allah SWT mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dengan air itu, Allah SWT menumbuhkan berbagai macam kebun.: anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaan. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran.

Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan tentang proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, vitamin dan protein serta berbagai zat karbohidrat dan tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun dan di distribusikan kebagian bagian pohon yang lain termasuk biji dan buah. Kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan kemahaesaan Allah. Zat hemoglobin yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan sejumlah besar jenis hewan berkaitan sekali dengan hijau daun. Atom karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, mengandung atom zat besi didalam molekul hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri mengandung atom magnesium dan molekul klorofil. Dalam dunia

kesehatan, ditemukan bahwa klorofil ketika di asimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia memberikan tenaga dan kekuatan melawan berbagai macam penyakit. (Tafsir Al-Misbah, 2007)


3. Asupan Fe (Zat Besi)

Zat besi (Fe) merupakan mikronutrien yang esensial bagi tubuh, zat ini terutama diperlukan dalam hematopoiesis (pembentukan darah) yaitu dalam sintesa hemoglobin (Hb) (Moehji, 1998). Dalam tubuh, zat besi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan dan pemanfaatan oksigen dan berada dalam bentuk hemoglobin, mioglobin, atau *cytochrome*. Untuk memenuhi kebutuhan guna pembentukan hemoglobin, sebagian besar zat besi berasal dari pemecahan sel darah merah akan dimanfaatkan kembali lalu kekurangannya harus dipenuhi dan diperoleh melalui makanan. Taraf gizi besi bagi seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumsinya melalui makanan, bagian yang diserap melalui saluran pencernaan, cadangan zat besi dalam jaringan ekskresi dan kebutuhan tubuh (Adriani dan Wijatmadi, 2012).

Kebutuhan zat besi pada seseorang tergantung pada usia dan jenis kelamin. Khususnya pada wanita subur (wanita hamil), bayi, anak-anak dan para remaja lebih beresiko untuk mengalami anemia zat besi dari pada orang lain. Kebutuhan zat besi pada wanita lebih banyak dari pada laki-laki karena mereka mengalami menstruasi (Rahmi, 2014). Kekurangan zat besi terjadi karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau sudah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, tetapi terjadi gangguan absorpsi di dalam usus karena ada cacing atau gangguan pencernaan. Ditambah kebiasaan dengan mengkonsumsi makanan yang mengganggu penyerapan zat besi (seperti kopi dan teh) pada waktu yang sama dengan waktu makan sehingga menyebabkan absorpsi zat besi semakin rendah (Permatasari, 2016).

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil rata-rata asupan Fe responden pada kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi yaitu 5.2 mg dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 8.4 mg. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap rata-rata asupan Fe pada kelompok kontrol dilihat pada $p=0.000$ ($p<0.005$). kemudian pada kelompok kasus, diperoleh hasil rata-rata asupan Fe responden sebelum intervensi yaitu sebesar 5.4 mg dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 11.4 mg hal tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap rata-rata asupan Fe pada kelompok kasus dilihat pada $p=0.000$ ($p<0.005$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok kontrol dan kelompok kontrol sama-sama mengalami peningkatan secara signifikan. Meningkatnya asupan Fe dikarenakan kandungan dari brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel memiliki kandungan Fe yang cukup tinggi sehingga dapat memenuhi tambahan asupan Fe yang dibutuhkan oleh remaja putri.

Grafik 4.3
Grafik Perubahan Asupan Zat Besi (Fe) Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer 2019

Pada grafik 4.3 dapat dilihat perubahan asupan Fe pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum dan setelah intervensi. Kedua kelompok tersebut sama-sama mengalami peningkatan asupan zat besi (Fe) setelah intervensi. Namun, kelompok kasus mengalami peningkatan yang lebih pesat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Asupan zat besi (Fe) pada kelompok kasus sebelum dilakukan intervensi yaitu 5.4 mg dan setelah intervensi mengalami peningkatan menjadi 11.4 mg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian brownies tempe substitusi wortel dapat meningkatkan asupan zat besi (Fe) pada remaja putri anemia. Hasil ini sejalan dengan teori Arisman (2010) yang mengatakan bahwa anemia defisiensi besi dapat dicegah dengan cara pemberian suplemen zat besi terutama melalui makanan. Teori sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2019) tentang pengaruh pemberian susu tempe terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil TM III di Kota Bengkulu. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 39 ibu hamil dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok kasus (susu tempe dan tablet fe) dan kelompok kontrol (tablet fe) selama 30 hari. Hasilnya kelompok yang diberikan susu tempe ditambah dengan tablet fe lebih efektif meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil dibandingkan dengan kelompok yang diberikan tablet fe saja.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesti Permata Sari (2018) tentang Biskuit Mocaf-Garut yang tinggi zat besi mampu meningkatkan kadar zat besi (Fe) dan kadar hemoglobin pada tikus *Sprague Dawley*. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 32 ekor tikus yang dikondisikan menjadi anemia dengan cara memberikan pakan standar tanpa zat besi selama 7 hari sehingga tikus mengalami anemia. Setelah itu, tikus tersebut diberikan makanan tambahan berupa biskuit berbahan dasar tepung mocaf dan

garut dengan penambahan hati ayam dan bayam selama 14 hari. Hasilnya mampu menaikkan kadar zat besi (Fe) dalam darah dan kadar hemoglobin tikus anemia. Semakin tinggi jumlah yang diberikan maka semakin tinggi pula kadar zat besi (Fe) dan kadar hemoglobin yang terjadi.

Zat Besi adalah salah satu unsur yang dinyatakan secara jelas dalam Al Qur'an. Zat besi disebut 9 kali dalam Al Qur'an dalam ayat yang berbeda-beda salah satunya adalah QS.al-Hadiid 57: 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahan:

“Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”. (Depag RI, 1989).

Kami benar-benar telah mengutus para rasul yang Kami pilih dengan membawa beberapa mukjizat yang kuat. Bersama mereka juga Kami turunkan kitab suci-kitab suci yang mengandung hukum, syariat agama, dan timbangan yang mewujudkan keadilan dalam hubungan antarmanusia. Lalu Kami juga menciptakan besi yang dapat dijadikan alat untuk menyiksa orang lain dalam peperangan di samping mempunyai banyak manfaat lain pada masa damai. Itu semua agar manusia memanfaatkan besi dalam berbagai kebutuhan hidupnya dan agar Allah, dari alam gaib, mengetahui siapa saja yang membela agama dan rasul-rasul-Nya.

Allah benar-benar Mahakuasa karena diri-Nya sendiri, dan tidak memerlukan bantuan siapa pun.

Besi merupakan salah satu dari tujuh unsur kimia yang telah dikenal oleh ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu yaitu emas, perak, air raksa, loyang, timah hitam (plumbum), besi, dan timah, serta logam yang paling banyak tersebar di bumi. Besi itu biasanya terdapat dalam komponen unsur kimia lain seperti dalam oksida, sulfida (sulfat), zat arang dan silikon. Sejumlah kecil besi murni juga terdapat dalam batu meteor besi. Ayat ini menjelaskan bahwa besi mempunyai kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi, dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan, dan kerusakan, di samping juga lentur hingga dapat menampung daya magnet. Karenanya, besi adalah logam paling cocok untuk bahan senjata dan peralatan perang, bahkan merupakan bahan baku berbagai macam industri berat dan ringan yang dapat menunjang kemajuan sebuah peradaban. Selain itu, besi juga mempunyai banyak kegunaan lain untuk makhluk hidup.

Komponen besi, misalnya, masuk dalam proses pembentukan klorofil yang merupakan zat penghijau tumbuh-tumbuhan (terutama daun) yang terpenting dalam fotosintesis (proses pemanfaatan energi cahaya matahari) yang membuat tumbuh-tumbuhan dapat bernapas dan menghasilkan protoplasma (zat hidup dalam sel). Dari situlah zat besi kemudian masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan. Selanjutnya besi juga termasuk dalam komposisi kromatin (bagian inti sel yang mudah menyerap zat warna) dari sel hidup, salah satu unsur yang berada dalam cairan tubuh, dan salah satu unsur pembentuk hemoglobin (butir-butir darah merah). Dan dari situ, besi memegang peranan penting dalam proses penembusan dan peran biologis dalam jaringan. Selain itu semua, besi juga terdapat dalam hati,

limpa, ginjal, anggota badan, dan sumsum merah tulang belakang. Tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tertentu yang harus dipenuhi dari sumber apa saja. Kurangnya zat besi akan menimbulkan penyakit, terutama anemia (kekurangan hemoglobin) (Tafsir Al-Misbah, 2007).

Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak. Kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, letih, lemah, lelah bahkan cepat lupa. Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olahraga dan produktifitas kerja. Selain itu anemia gizi besi akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi. (Marizal, 2007)

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia yang telah dilakukan selama ini biasanya hanya ditujukan pada ibu hamil, sedangkan remaja putri secara dini belum terlalu diperhatikan. Agar anemia bisa dicegah atau diatasi, maka harus banyak mengonsumsi bahan makanan yang kaya zat besi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi anemia dalam penelitian ini yaitu memberikan makanan tinggi zat besi yaitu brownies tempe substitusi wortel.

Pemilihan tempe dalam penelitian ini dikarenakan tempe telah dikenal luas oleh masyarakat serta harga yang relatif murah dan diproduksi sesuai dengan selera konsumen. Menurut Karyadi (1996) makanan berbahan baku kedelai ini memiliki protein yang tinggi dan mengandung beragam vitamin dalam kadar yang cukup baik, termasuk diantaranya mengandung zat besi (Fe) yang berpeluang sebagai sumber Fe dalam sintesis sel hemoglobin darah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bastian dkk (2013) menunjukkan bahwa kedelai yang diolah melalui proses fermentasi memiliki nilai gizi yang lebih tinggi akibat adanya aktivitas berbagai enzim yang dihasilkan oleh kapang tempe. Aktivitas enzim-enzim tersebut menyebabkan karbohidrat dan protein dipecah menjadi fragmen-fragmen yang

lebih mudah dicerna dan diserap oleh usus dibandingkan dengan kedelai yang tidak difermentasi.

Maka dengan adanya pengaruh terhadap asupan zat besi (Fe) pada remaja putri yang menderita anemia setelah mengonsumsi brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel, diharapkan brownies ini dapat dijadikan sebagai makanan tambahan bagi remaja sehingga mampu memperbaiki asupan zat besi (Fe) yang dibutuhkan bagi remaja, meskipun dalam tempe terdapat zat besi, namun penambahan atau fortifikasi zat besi (Fe) dan vitamin A pada tempe yang dijadikan olahan brownies pada penelitian ini dilakukan agar meningkatkan kadar zat besi (Fe) dalam upaya program penanggulangan anemia defisiensi besi khususnya pada remaja putri.

4. Kadar Hemoglobin (Hb)


Status gizi seseorang dipengaruhi oleh asupan gizinya. Apabila asupan gizi sesuai dengan kebutuhan, maka status gizi seseorang akan baik. Tubuh manusia membutuhkan zat gizi diantaranya zat besi. Zat besi diperlukan oleh tubuh untuk memproduksi hemoglobin yang berfungsi mengantar oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh (Supariasa dkk,2002)

Hemoglobin merupakan protein majemuk yang tersusun atas protein sederhana yaitu globin dan radikal prostetik yang berwarna yang disebut heme. Protein ini terdapat dalam butir-butir darah merah. Berat molekulnya yang ditentukan dengan ultrasentrifuge sebesar 68.0000. Hemoglobin merupakan senyawa pembawa oksigen pada sel darah merah. Tiap liter darah mengandung kira-kira 150 gr hemoglobin. Kadar hemoglobin adalah jumlah $K_3Fe(CN)_6$ akan diubah menjadi methemoglobin yang kemudian diubah menjadi hemoglobin sianida ($HbCN$) oleh KCN dengan batas ambang berat bila $Hb < 8$ gram/dL, anemia ringan $> 8-11$ gram/dL dan normal pada ibu hamil > 11 gram/dL. Kadar hemoglobin

pada darah dikatakan anemia apabila kadar Hb dasar pada pria < 13 gram/dL dan pada wanita < 12 gram/dL (Agus, 2012)

Pada uji *paired t-test* diperoleh hasil rata-rata hemoglobin responden pada kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi yaitu 11.4 gram/dL dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 12.5 gram/dL. Hal tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh pemberian brownies tempe terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada kelompok kontrol dilihat pada $p=0.000$ ($p<0.005$), kemudian pada kelompok kasus, diperoleh hasil rata-rata kadar hemoglobin responden sebelum intervensi yaitu sebesar 11.1 gram/dL dan mengalami peningkatan setelah dilakukan intervensi menjadi 13.2 gram/dL hal tersebut menandakan bahwa terdapat pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada kelompok kasus dilihat pada $p=0.000$ ($p<0.005$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok kontrol dan kelompok kontrol sama-sama mengalami peningkatan secara signifikan. Meningkatnya kadar hemoglobin karena brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel memiliki kandungan fe yang cukup tinggi. Adanya pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin (Hb) menunjukkan bahwa pemberian brownies tersebut efektif untuk mencegah terjadinya anemia khususnya pada remaja putri. Hasil ini sejalan dengan teori Arisman (2010) yang mengatakan bahwa anemia defisiensi besi dapat dicegah dengan cara pemberian suplemen zat besi terutama melalui makanan.

Grafik 4.4
Grafik Perubahan Kadar Hemoglobin (Hb) Sebelum dan Setelah Intervensi



Sumber: Data Primer 2019

Pada grafik 4.4 dapat dilihat perubahan kadar hemoglobin (Hb) pada kelompok kontrol dan kelompok kasus sebelum dan setelah intervensi. Kedua kelompok tersebut sama-sama mengalami peningkatan asupan zat besi (Fe) setelah intervensi. Namun, kelompok kasus mengalami peningkatan yang lebih pesat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Asupan zat besi (Fe) pada kelompok kasus sebelum dilakukan intervensi yaitu 11.1 mg dan setelah intervensi mengalami peningkatan menjadi 13.2 mg.

Walaupun secara rata-rata terdapat peningkatan kadar hemoglobin pada kedua kelompok intervensi, namun terdapat 1 orang responden pada kelompok kontrol (brownies tempe) yang mengalami penurunan kadar hemoglobin dari 11.01 mg/dL menjadi 10.9 g/dL. Setelah dilihat form pemantauan konsumsi brownies tempe dan rata-rata asupan menurun dari recall pertama ke recall kedua oleh responden yang mengalami penurunan kadar hemoglobin tersebut peneliti

mengambil kesimpulan bahwa hal ini terjadi karena perbedaan jumlah brownies yang dikonsumsi masing-masing responden kelompok kontrol. Selama penelitian berlangsung, memang ditemukan beberapa responden pada kelompok kontrol tidak menghabiskan brownies yang diberikan. Hal ini disebabkan adanya rasa jenuh terhadap produk yang diintervensi apalagi pada kelompok kontrol diberikan brownies tempe yang memiliki tekstur yang bantet serta masih terdapat aroma tempe yang agak mengganggu responden. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abitatu (2016) tentang “Analisis Kandungan Zat Gizi Brownies Tempe Substitusi Wortel (*Daucus carota L.*) sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Masyarakat” yang direkomendasikan 1:1 yaitu brownies tempe substitusi wortel sebagai produk terbaik dalam hal cita rasa serta aroma pada brownies itu sendiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian brownies tempe substitusi wortel dapat meningkatkan kadar hemoglobin (Hb) pada remaja putri anemia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) tentang Pemberian Snack Bar Tepung Kacang Nagara dan Ikan Haruan pada hewan coba yang menderita anemia, menunjukkan hasil peningkatan kadar Hb berkisar antara 2.82 – 3.35 gram/dL. Hasil penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Syahwal (2018) tentang Pemberian Snack Bar untuk Meningkatkan Kadar Hemoglobin (Hb) pada Remaja Putri, dimana penelitian dilakukan terhadap remaja putri yang menderita anemia sebanyak 45 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu P1 (mendapat snack bar dan suplemen Fe), P2 (mendapat snack bar) dan kontrol (mendapat suplemen Fe) selama 30 hari. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kadar hemoglobin pada semua kelompok penelitian dan peningkatan kadar Hb lebih tinggi terjadi pada kelompok

perlakuan 1 yang mendapatkan snack bar dan suplemen zat besi (Fe) yaitu sebesar 1.75 gram/dL.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan hemoglobin dapat dilakukan oleh zat besi sebagai bentuk peningkatan kadar Hb. Menurut Guyton dan Hall (2007) , sintesis hemoglobin dimulai dalam proeritoblas dan kemudian dilanjutkan sampai tingkat retikulosit, karena ketika retikulosit meninggalkan sumsum tulang belakang, maka retikulosit tetap membentuk hemoglobin selama beberapa hari berikutnya. Tahap dasar kimiawi pembentukan hemoglobin adalah yang pertama, suksinil-KoA yang dibentuk dalam siklus krebs berikatan dengan klisin untuk membentuk senyawa pirol. Selanjutnya empat senyawa pirol bersatu membentuk senyawa protofirin yang kemudian berikatan dengan besi membentuk molekul heme. Akhirnya molekul heme berikatan dengan satu molekul globulin yang disintesis dalam ribosom retikulum endoplasma , membentuk hemoglobin.

Menurut Almatsier (2006) sebagian besar transferin darah membawa besi ke sumsum tulang bagian tubuh lain. Didalam sumsum tulang, besi digunakan untuk membuat hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah. Sisanya dibawa ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Kelebihan besi yang dapat mencapai 200-1500 mg, disimpan sebagai protein feritin dan homosiderin didalam hati (30%), sumsum tulang belakang (30%) dan selebihnya didalam limpa dan otot. Dari simpanan besi tersebut hingga 50 mg/hari dapat dimobilisasi untuk keperluan tubuh seperti pembentukan hemoglobin. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahwal (2018) yang mengatakan bahwa walaupun kelompok perlakuan sudah tidak mendapatkan intervensi selama 1 bulan, cadangan besi dalam tubuh masih cukup tinggi sehingga produksi hemoglobin masih terjadi.

Dengan adanya pengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada remaja putri yang menderita anemia setelah mengonsumsi brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel, diharapkan brownies ini dapat dijadikan sebagai makanan tambahan bagi remaja sehingga mampu memperbaiki asupan zat besi (Fe) yang dibutuhkan bagi remaja. Seperti yang kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar Hb pada remaja putri adalah kehilangan darah akibat menstruasi, pola makan, riwayat penyakit serta aktifitas fisik. Dengan pola makan sehari-hari yang seimbang dan aman, berguna untuk mencapai dan mempertahankan status gizi dan kesehatan optimal (Niken, 2013).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Kabupaten Gowa tentang pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin remaja putri anemia, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel terhadap asupan protein pada kedua kelompok tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada kelompok kasus
2. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap asupan vitamin a pada remaja putri anemia pada kedua kelompok tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada kelompok kontrol
3. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap asupan zat besi (fe) pada kelompok kontrol dan kelompok kasus serta menunjukkan hasil yang signifikan pada kedua kelompok
4. Terdapat pengaruh pemberian brownies tempe dan brownies tempe substitusi terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada kelompok kontrol dan kelompok kasus serta menunjukkan hasil yang signifikan pada kedua kelompok

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MTs Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata Kabupaten Gowa tentang pengaruh pemberian brownies tempe substitusi wortel terhadap peningkatan kadar hemoglobin remaja putri anemia, maka ada beberapa saran yang penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi dari pihak instansi kesehatan tentang seimbang dan bahaya anemia pada remaja puteri.
2. Perlu adanya pemeriksaan setiap bulan dari pihak instansi kesehatan baik untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan kadar hemoglobin dsb.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang waktu yang efisien untuk pemberian intervensi brownies tempe substitusi wortel guna mendapat hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S. 2006. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Qur'an, 1989. Departemen Agama R.I, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Jakarta, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: CV.Toha Putra Semarang.
- Adriani dan Wirjatmadi. 2012. *Peran Gizi dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Kencana
- Anwar, Faisal dan Khomsan, Ali. *Makan Tepat, Badan Sehat*. Jakarta: Hikmah PT. Mizan Publika. 2009.
- Arisman. 2010. *Gizi Daur Kehidupan*. Jakarta: ECG.
- Astawan, M. 2009. *Tetap Sehat dengan Produk Makanan Olahhan*. TigaSerangkai. Solo.
- Badriah, 2014. *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Bandung : PT Refika Aditama
- Bastian., E. Ishak., A.B Cawali., M. Bilang. 2013. *Daya Terima dan Kandungan Zat Gizi Formula Tepung Tempe dengan Penambahan Semi Carrageenan (SRC) dan Bubuk Kakao*. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. Vol. 2 (No.1)
- Berlian, N Hartuti. *Wortel dan Lobak*. Penebar Swadaya : Jakarta
- Brown, Judith E. 2005. *Nutritional Through the Life Cycle*. Wadsworth: USA
- Cahyono, B. 2002. *Wortel*. Kanisius.Yogyakarta.
- Citra kesumasari, 2012. *Anemia Gizi Masalah dan Pencegahannya*. Yogyakarta: Kalika.
- Daniel, Goleman. 1997. *Emotional Intelligence*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Depkes RI. 2012. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Depkes RI. 2013. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Depkes RI. 1999 *Pedoman Pemberian Tablet Besi-Folat Dan Sirup Besi Bagi Petugas*, Depkes RI, Jakarta.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. 2009. *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Bhratara Karya Aksara. Jakarta.
- Dwinaningsih, Erna Ayu, 2010. *Karakteristik Kimia dan Sensori Tempe dengan Variasi Bahan Baku Kedelai/Beras dan Penambahan Angka serta Variasi*

- Lama Fermentasi*. Skripsi: Fakultas Pertanian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Dewi, Permaesih. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Remaja*. Buletin Penelitian Kesehatan. Vol 33. No.4
- Hayati, 2012. *Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Ibu Serta Dukungan Tenaga Kesehatan terhadap Pemberian Makanan pada Balita di Puskesmas Bandat Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis: Medan: Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.
- Hesti, Permata. 2018. *Biskuit Mocaf-Garut Tinggi Zat Besi Meningkatkan kadar Fe dan Kadar Hemoglobin pada Tikus Sparague Dawley*. Jurnal Gizi Indonesia. Vol.7 No.1
- Hoffbrand, J.E Petit, P.A.H. Moss, 2013. *Kapita Selekta Hematologi Edisi 4*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Indartanti, Dea. 2015. *Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja*. Jurnal of Nutrition Collage, 3(2), 33-39
- Karyadi, 1996. *Kecukupan Gizi yang Dianjurkan*. Jakarta: PT Gramedia, Jakarta
- Kemenkes RI, 2007. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta : Balitbang Kemenkes RI
- _____, 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta : Balitbang Kemenkes RI
- _____, 2016 *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta :kemenkes RI
- Khomsan, A. 2000. *Teknik Pengukuran Pengetahuan Gizi*. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat antar Universitas Pangan dan Gizi, ITB
- Koswara, 1995. *Teknologi Pengolahan Kedelai Menjadikan Makanan Bermutu*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- LIPI. 2004, *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII*.
- Lonnerdal B, 1988. —*Vitamin-mineral Interactions*l. In: Bodwell CE, Erdman JW, editors. *Nutrient Interactions*. New York: Marcel Dekker Inc
- Malasari, 2005. *Sifat Fisik dan Organoleptik Nugget Ayam dengan Penambahan Wortel*. Skripsi : Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor
- Makmun, 2007. *Wortel Komoditas Ekspor yang Gampang Dibudidayakan*. Holtikultura: 32
- Mansyur, Wahyuni. 2016. *Pengaruh Pemberian Brownies Tempe Substitusi Wortel Terhadap Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Anemia di Wilayah Kerja Puskesmas Mariso*.Skripsi: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

- Marizal, 2007. *Anemia Defisiensi Besi*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, II (1): 140-145. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Unand
- Martini, 2015. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di MAN 1 METRO*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Mawai. Vol. 8(1) Edisi Juni.
- Mitayani, Sartika Wiwi. 2010. *Buku Saku Ilmu Gizi*. Jakarta: CV. Trans Info
- Muji et al. 2011. *Isoflavon Content and Antioxidant Properties Of Soybean Seeds*, 3, pp. 16-20
- Nadila, Febianty et al. 2016. *Perbandingan Pemeriksaan Kadar Hemoglobin dengan Menggunakan Metode Sahli dan Autoanalyzer pada Orang Normal*. Bandung: Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha
- Nikmawati Ellis et al. 2009. *Analisis Perilaku Gizi Remaja untuk Pengembangan Model Pendidikan Gizi yang Berintegrasi dengan Kegiatan Sekolah*. Artikel Penelitian, FPTK UPI. Jakarta: UPI
- Novianti. 2019. *Pengaruh Pemberian Susu Tempe Terhadap Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil TM III*. Bengkulu : JM Journal
- Pangkalan Ide, 2007. *Seri Diet Korektif: Diet Arkins*, Jakarta . PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 tahun 2014
- Permaesi, D. 2003. *Status Gizi Remaja dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Bogor: Puslitbang Gizi
- Proverawati, Misaro. S. 2011. *MENARCHE.Menstruasi Pertama Penuh Makna*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- _____, A. 2010. *Ilmu Gizi Untuk Keperawatan dan Gizi Kesehatan*.
- Rabitalul Isma, 2016. *Analisis Kandungan Zat Gizi Brownies Tempe Substitusi Wortel (Daucus Carota L.) Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Terhadap Masyarakat*, UIN Alauddin Makassar.
- Rahmi, Nur. 2014. *Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Infeksi Kecacingan Terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso. Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar
- Rahayu, Astuti. 2014. *Komposisi Zat Gizi Tempe yang Di Fortifikasi Zat Besi dan Vitamin A pada Tempe Mentah dan Matang*. Semarang: AGRITECH, Vol. 34, No. 2
- Raspati, Harry dkk. 2010. *Buku Ajar Hematologi-Ongkologi Anak*. Jakarta: IDAI.
- Ridwan, E. 2012 . *Kajian Interaksi Zat Besi dengan Zat Gizi Mikro Lain dalam Suplementasinya*. 1:49-50.

- Riyanto, 2011. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Jakarta: EGC
- Rukmana, R. 1995. *Bertanam Wortel*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Saragih, Indah P, 2011. *Penentuan Kadar Air Pada Cake Brownies Dan Roti Two In One Nenas Dan Es*. Universitas Sumatera Utara.
- Semba RD, Bloem MW, 2002. *The Anemia of Vitamin A Deficiency: Epidemiology and Pathogenesis*. Eur J Clin Nutr 56, 271-281
- Sediaoetama, A. J. 2008. *Ilmu Gizi*, Jilid 1. Jakarta: Dian Rakyat.
- Siallagan, Damayanti dkk. 2016. *Pengaruh Asupan Fe, Vitamin A, Vitamin B12 dan Vitamin C terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin pada Remaja Vegan*. Jurnal : Klinik Gizi Indonesia.
- Sharon Reeder et. al. 2011. *Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi dan Keluarga*. Jakarta: EGC
- Soekirman, 2006. *Hidup Sehat Gizi Seimbang dalam Siklus Kehidupan Manusia*. Primamedia Pustaka: Jakarta
- Soetjiningsih. 2007. *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta: CV Sagung Seto
- Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati, 2009. *Buku ajar ilmu penyakit dalam jilid II edisi V. Anemia defisiensi besi 1128-37. internal publishing pusat penerbitan ilmu penyakit dalam, jakarta;*
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno D, Muhilal, Karyadi D, West CE, Hautvast JGAJ. 1993. *Supplementation with vitamin A and iron for nutritional anaemia in pregnant women in West Java, Indonesia*. Lancet
- Suhardjito, 2006. *Pastry dalam Perhotelan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Supariasa, 2002. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Kedokteran EGC
- Sutomo, B. 2008. *Memilih Tepung Terigu yang benar untuk Membuat Roti, Cake dan Kue Kering*. Artikel Jakarta. Dalam: Pengaruh Pemberian Brownies Tempe Substitusi Wortel terhadap kadar Hemoglobin Ibu Hamil Anemia. Skripsi. UIN Alauddin Makassar. Makassar
- Syafiq, Ahmad dkk, 2004. *Pengaruh Suplementasi Zat Besi Satu-Dua kali perminggu terhadap Kenaikan Kadar Hb pada siswa Anemia di SLTP Kota Tangerang*. Jurnal : Universa Medica
- Syahwal, Sajiman dkk. 2018. *Pemberian Snack Bar Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Remaja Putri*. Jurnal : Aceh Nutrition Jurnal.
- Tarwotjo, C. Soejoeti, 1998. *Dasar-Dasar Gizi Kuliner*. Grasindo: Jakarta

- WHO, 2013. *World Health Statistic*. World Health Organization.
- _____, 2014. *Maternal Mortality*. World Health Organization.
- _____, 2015. *World Health Statistic*. World Health Organization.
- Winarno, F.G. 2008. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wirakusuma, Emma S. 1998. *Perencanaan Menu Anemia Gizi Besi*. Jakarta: PT. Pustaka Pengembangan Swadaya Nusantara
- Worthington, 2000. *Nutrition Throughout The Life Cycle*. The MacGraw-Hill International Edition: USA
- Yuniarti, Anita. 2011. *Kadar Zat Besi, Serat, Gula Total, Dan Daya Terima Permen Jelly Dengan Penambahan Rumput Laut Gracilaria Sp Dan Sargassum Sp*, Progam Studi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Zimmermann MB, Biebinger R, Rohner F, Dib A, Zeder C, Hurrell RF, et al, 2006. *Vitamin A supplementation in children with poor vitamin A and iron status increases erythropoietin and hemoglobin concentrations without changing total body iron*. *Am J Clin Nutr*; 84(3): 580-6.

L

A

M

P

I

R



N

Lampiran 1

PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL
(*Daucus carota* L.) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN
(Hb) REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTS MAHAD MANAHILIL GUPPI
ULUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2019

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama orang tua/wali siswa :

Nama siswa :

Tanggal lahir :

Alamat :

Memberi izin pada siswa yang namanya tertera di atas untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Andi Nurhana Magfirah dari Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan Gizi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan seperlunya dan apabila dalam penelitian ini ada perubahan/keberatan menjadi responden maka dapat mengajukan pengunduran diri.

Samata,2019

Mengetahui/menyetujui,
Orang tua/Wali Responden

(.....)

Lampiran 2

KUESIONER IDENTITAS RESPONDEN

PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL
(*Daucus carota* L.) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN
(Hb) REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTS MAHAD MANAHILIL GUPPI
ULUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2019

Tanggal Wawancara

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Orang Tua : Ayah.....,
Ibu.....
2. Pekerjaan Orang Tua : Ayah.....,
Ibu.....
3. Nama Siswa :
4. Tanggal Lahir : / /20
5. Jenis Kelamin :
6. Kelas :
7. Alamat :
8. No. Telp. :

II. DATA RESPONDEN

1. Riwayat penyakit :
2. Kadar Hb : gram/dL

Lampiran 3

LEMBAR *FOOD RECALL* 24 JAM

**PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL
(*Daucus carota* L.) .) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN
(Hb) REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTS MAHAD MANAHILIL GUPPI
ULUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2019**

NamaSiswa :

Umur :(Tahun)

Pengukuran hari/minggu ke :/.....

Tanggal :/...../2016

Waktu Makan	Nama Masakan/ Metode Pemasakan	Nama Bahan Makanan	Berat (URT)	Berat (g)	Ket
Pagi					
Selingan					
Siang					
Selingan					
Malam					

Lampiran 4

FORM DATA PEMERIKSAAN KADAR HB

PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL
(*Daucus carota L.*) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN
(Hb) REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTS MAHAD MANAHILIL GUPPI
ULUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2019

Nama Siswa :

Pengukuran Ke :	Hari/Tanggal	Jenis Pengukuran
	Pengukuran	Hb (gram/dL)



Lampiran 5

**FORM PEMANTAUAN KONSUMSI BROWNIES TEMPE
SUBSTITUSI WORTEL (*Daucus carota L.*)**

No	Hari/tanggal	Total yang dikonsumsi (gram)	Keterangan (masalah)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

FORM PEMANTAUAN KONSUMSI BROWNIES TEMPE

No	Hari/tanggal	Total yang dikonsumsi (gram)	Keterangan (masalah)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			



Lampiran 6

Bahan untuk membuat brownies tempe dan brownies tempe substitusi wortel



Wortel yang digunakan



Tempe yang digunakan

Brownies tempe wortel

Bahan

50 g tempe

50 g wortel

40 gula

40 g margarin

30 g terigu

1 butir telur

Baking Powder

Vanili

Brownies tempe

Bahan

100 g tempe

40 gula

40 g margarin

30 g terigu

1 butir telur

Baking Powder

Vanili

Cara pembuatan

1. Timbang semua bahan yang akan digunakan
2. Kukus tempe dan wortel selama 15 menit, kemudian haluskan
3. Cairkan mentega atau margarin
4. Telur, gula, powder dan vanili di mixer sampai res.
5. Turunkan tempe dan wortel, margarin sedikit demi sedikit. Terakhir campurkan terigu
6. Pindahkan adonan ke cetakan brownies yang sudah di olesi mentega
7. Masukkan ke oven, tunggu selama 20 menit.



Lampiran 7

HASIL PEMANTAUAN KONSUMSI PRODUK (BROWNIES TEMPE)

No.	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Rata-Rata
1	AH	100	100	100	100	74	80	100	100	100	100	95.4
2	AAM	100	100	60	80	83	70	60	57	50	45	70.5
3	FK	100	70	70	40	15	20	40	45	45	50	50
4	HW	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	ANH	100	100	100	70	80	80	40	50	50	50	72
6	NF	100	100	90	90	100	100	80	85	70	70	88.5
7	NI	100	100	100	100	50	50	45	20	20	40	62.5
8	NSA	100	100	100	100	40	56	77	50	60	40	72.3
9	HN	100	50	53	40	20	28	30	45	15	20	36.1
10	SSB	100	80	85	73	60	67	50	40	50	54	65.9

Lampiran 9

MASTER TABEL KELOMPOK KONTROL DI MTS MA'HAD MANAHILIL GUPPI ULUM SAMATA TAHUN 2019

No.	Nama	Tanggal Lahir	Umur	Pekerjaan Ayah	Pekerjaan Ibu	Pendidikan Ayah	Pendidikan Ibu	HB Sebelum	HB Setelah	Fe Sebelum	Fe Setelah	Energi Sebelum	Energi Setelah	Protein Sebelum	Protein Setelah	Vit A Sebelum	Vit A Setelah
1	AH	19-08-2006	13 tahun	Wiraswasta	IRT	S1	SMA	11.2	13.1	8.4	10.7	1606.7	1868.5	68.8	81.3	178.0	150.0
2	AAM	20-02-2006	13 tahun	PNS	PNS	S2	S2	11.9	12.1	4.7	7.9	1632.8	1893.7	72.4	65.3	152.4	521.3
3	FK	23-01-2006	13 tahun	PNS	Wiraswasta	S1	SMA	11.0	11.8	3.5	5.7	2130.7	1849.2	48.3	46.6	86.2	160.6
4	HW	19-08-2006	13 tahun	Petani	IRT	SMA	SMA	11.3	12.2	7.7	10.1	1535.1	1983.4	85.4	61.8	37.9	273.4
5	ANH	8/9/2006	13 tahun	Wiraswasta	IRT	SMA	SMP	11.4	12.9	5.5	8.7	1816.8	1968.3	68.7	64.1	232.6	139.6
6	NF	18-03-2006	13 tahun	Petani	IRT	SMA	SD	11.1	13.2	4.1	7.6	1686.7	1834.1	54.3	63.4	235.0	147.8
7	NI	19-12-2005	14 tahun	Wiraswasta	IRT	SMA	SMA	11.4	12.7	4.4	10.3	1611.6	1889.2	48.8	59.4	249.2	195.5
8	NSA	24-07-2005	14 tahun	Petani	IRT	SMA	SMP	11.4	12.1	4.0	7.0	1719.6	1964.8	66.1	64.7	352.6	127.2
9	HN	27-07-2005	14 tahun	Wiraswasta	IRT	SMA	SMA	11.1	10.9	5.4	5.2	1671.9	1807.6	38.9	48.8	65.6	60.0
10	SSB	27-09-2005	14 tahun	PNS	IRT	S1	S1	11.4	12.7	5.0	7.4	1821.3	2067.8	67.0	73.8	151.1	191.4

Lampiran 10

**MASTER TABEL KELOMPOK KASUS DI MTS MA'HAD MANAHILIL GUPPI ULUM SAMATA
TAHUN 2019**

No.	Nama	Tanggal Lahir	Umur	Pekerjaan Ayah	Pekerjaan Ibu	Pendidikan Ayah	Pendidikan Ibu	HB Sebelum	HB Setelah	Fe Sebelum	Fe Setelah	Energi Sebelum	Energi Setelah	Protein Sebelum	Protein Setelah	Vit A Sebelum	Vit A Setelah
1	AA	1/6/2005	14 tahun	Buruh	IRT	SMA	SMA	10.8	13.1	4.6	11.4	1708.7	2073.1	72.3	75.1	172.2	160.3
2	NFD	24-04-2004	15 tahun	Wiraswasta	IRT	SMA	SD	11.4	14.9	4.3	10.6	1696.9	1893.7	52.9	53.9	139.4	350.7
3	NIT	3/1/2005	14 tahun	Buruh	IRT	SMP	SD	11.8	14.8	8.9	15.1	2018.0	2024.3	90.2	76.5	135.8	125.1
4	NZI	26-07-2005	14 tahun	Wiraswasta	IRT	SMA	SMP	11.8	13.5	6.0	12.6	1851.5	2013.4	55.5	60.6	70.0	101.4
5	KK	16-09-2005	14 tahun	Buruh	IRT	SMA	SMA	11.4	13.7	5.8	11.4	1759.2	2196.8	71.1	71.7	237.9	476.0
6	NJ	6/4/2005	14 tahun	Buruh	IRT	SMA	SMA	11.4	12.3	3.8	9.7	1910.7	2059.1	49.9	70.2	189.4	38.8
7	PW	20-09-2004	15 tahun	Buruh	IRT	SMA	SMA	11.5	14.2	7.7	13.4	1867.9	2007.1	95.2	71.8	162.4	409.6
8	DWA	12/3/2005	14 tahun	Petani	IRT	SMP	SD	11.1	12.7	4.2	10.3	1749.1	1854.7	45.7	78.5	196.4	527.6
9	AASB	6/9/2005	14 tahun	Petani	IRT	SMA	SMA	11.3	11.9	7.1	13.1	1903.9	1539.6	81.8	18.0	292.9	176.6
10	NAK	9/5/2004	15 tahun	Petani	IRT	SMA	SMA	10.7	12.3	3.1	9.8	1866.7	1967.5	44.4	79.6	86.2	74.0
11	IM	5/5/2004	15 tahun	Petani	IRT	SMA	SMA	11.2	13.1	4.2	11.1	1924.0	2067.8	45.1	64.9	73.2	252.1
12	DW	26-12-2004	15 tahun	Buruh	IRT	SMA	SMA	10.9	12.2	3.3	9.3	1699.1	1834.1	52.4	74.6	132.6	261.1



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR KEPUTUSAN

Nomor : A.079/KEPK/FKIK/II/2019
Judul : Pengaruh Pemberian Brownies Tempe Substitusi Wortel (*Daucus carota* L) Terhadap Peningkatan Kadar Hemoglobin (HB) Pada Remaja Puteri Anemia Di MTS Ma'had Manahilil Guppi Ulum Samata
Nama Peneliti : Andi Nurhana Magfirah
No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	1	0	0	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian a. <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui b. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) c. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) d. <input type="checkbox"/> Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) e. <input type="checkbox"/> Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.



Makassar, 22 Februari 2019

Ketua

Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

NIP. 195502031983121001



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TSANAWIYAH
PESANTREN GUPPI SAMATA GOWA
(STATUS DISAMAKAN)

Alamat : Jln. H. M. Yasin Limpo Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Telp.081343962096

SURAT KETERANGAN

Nomor : MTs.21.02.27/ S7 /VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MTs. GUPPI Samata menerangkan bahwa:

N a m a : **ANDI NURHANA MAGFIRAH**
Tempat/Tgl.Lahir : Manado, 21 Januari 1998
NIM : 70200115004
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di MTs. GUPPI Samata kelas VII ,VIII dan IX dengan judul **"PENGARUH PEMBERIAN BROWNIES TEMPE SUBSTITUSI WORTEL (*Daucus Carota. L*) TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN REMAJA PUTRI ANEMIA DI MTs. GUPPI SAMATA"**.

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus 2019.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 16 Agustus 2019

Kepala,


DRA. Hj. HAERIAH
NIP. 19660414 199103 2 001

Lampiran 11

LAMPIRAN FOTO



Sosialisasi tentang Penelitian



Pemeriksaan Kadar Hemoglobin
Sebelum Intervensi



Pemberian Obat Cacing



Recall 24 Jam Sebelum Intervensi

LAMPIRAN FOTO



Responden Mengonsumsi Produk



Pemeriksaan Kadar Hemoglobin Setelah Intervensi



Recall 24 Jam Setelah Intervensi



Brownies Tempe Substitusi Wortel

3. Recall pertama setelah intervensi

File Edit Calculators Food Enter Help

Women 19-24 years DGE2888 Nutrition 1 Days

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohydr	dietary	alcohol	PUFA	cholester	Vit. A	caroten	Vit. B	Vit. C	Total analysis
1. telur	140	107.4	6.7	3.0	29.9	2.4		2.4	0.0	0.0					energy 107.4 kcal
2. nasi putih	200	280.0	4.8	0.4	67.2	0.8		0.2	0.0	0.0					protein (1%) 14.5 g
3. telur dadar	80	112.1	6.9	0.8	10.7	0.3		0.2	229.3	104.4					fat 12.0 g
4. nasi putih	240	312.0	5.8	0.5	68.4	0.7		0.2	0.0	0.0					carbohydr 120 g
5. ikan sepong	80	43.8	14.2	0.6	0.0	0.0		0.2	34.4	8.8					PUFA 17.1 g
6. sayur brokoli dimasak	60	18.9	2.7	0.3	4.2	0.9		0.2	0.0	392.0					cholesterol 28.0 mg
7. mie + bumbu (di + knal)	200	295.8	23.4	4.0	29.4	2.8		0.4	24.0	0.0					cholester - mg
8. roti sekiel	80	170.8	5.2	0.6	31.9	1.8		0.4	0.0	0.0					Vit. E (mg) 3.4 mg
9. nasi goreng	140	250.3	4.9	34.3	28.1	0.3		12.3	26.4	14.0					Vit. B1 0.4 mg
10. brokoli tauge wortel	90	110.5	3.0		6.4										Vit. B2 0.1 mg

Display options: TA, AN, FA, MA, NC

Activate Windows

4. Recall kedua setelah intervensi

File Edit Calculators Food Enter Help

Children 7-9 years DGE2888 Nutrition 1 Days

Food	Amount	kcal	water	protein	fat	carbohydr	dietary	alcohol	PUFA	cholester	Vit. A	caroten	Vit. B	Vit. C	Total analysis
1. nasi putih	90	117.0	2.0	0.2	25.7	0.3		0.1	0.0	0.0					energy 117.0 kcal
2. ikan kembung	80	67.8	12.8	3.4	0.0	0.0		0.4	19.8	87.8					protein (100) 44.6 g
3. sate	60	91.4	2.1	0.5	18.4	1.1		0.2	0.0	0.0					fat 13.0 g
4. kerupuk bawang putih	90	114.3	0.1	0.0	27.4	0.2		0.2	0.0	0.0					carbohydr 120 g
5.															PUFA 10.7 g
6. nasi putih	140	204.0	4.3	0.4	51.2	0.5		0.2	0.0	0.0					cholesterol 18.0 mg
7. sayur labu	200	28.5	1.0	3.0	4.9	1.8		0.2	0.0	20.3					Vit. A 139.5 mg
8. ikan beluga segar	80	84.8	9.6	0.9	0.0	0.0		0.2	13.2	17.2					Vit. B1 0.7 mg
9. tauge goreng	100	63.2	25.7	46.3	28.0	1.9		14.1	6.0	1.5					Vit. B2 0.4 mg
10. perkedai jagung	250	307.3	18.0	18.0	24.9	3.9		1.2	37.5	42.5					fat 12.0 g
11. telur ayam	140	89.8	0.0	0.0	6.8	0.0		0.0	0.0	0.0					cholesterol 202.0 mg
12. sayur labu	80	8.8	0.3	0.3	0.2	0.2		0.0	0.0	2.0					cholesterol 25.0 mg
13. nasi putih	140	204.0	4.3	0.4	51.2	0.5		0.2	0.0	0.0					cholesterol 18.0 mg
14. ikan kembung goreng	80	80.8	6.4	0.0	0.0	0.0		0.0	23.4	9.4					fat 8.0 mg
15. ikan kembung	80	82.8	1.8	0.8	17.2	0.2		0.1	28.8	12.0					fat 8.0 mg

Display options: TA, AN, FA, MA, NC

Activate Windows

Lampiran 13

Analisis dengan Menggunakan Aplikasi SPSS 25

KELOMPOK KONTROL

1. Umur

umur					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	13 tahun	6	60.0	60.0	60.0
	14 tahun	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

2. Pekerjaan Ayah

pkayah					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	wiraswasta	4	40.0	40.0	40.0
	Pns	3	30.0	30.0	70.0
	Petani	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

3. Pekerjaan Ibu

pkibu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	3	30.0	30.0	30.0
	tidak bekerja	7	70.0	70.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

4. Pendidikan Ayah

		pndayah			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	6	60.0	60.0	60.0
	Sarjana	4	40.0	40.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

5. Pendidikan Ibu

		pndibu			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	1	10.0	10.0	10.0
	SMP	2	20.0	20.0	30.0
	SMA	5	50.0	50.0	80.0
	Sarjana	2	20.0	20.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

KELOMPOK KASUS

4. Umur

		umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14 tahun	7	58.3	58.3	58.3
	15 tahun	5	41.7	41.7	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

5. Pekerjaan Ayah

		pkayah			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	wiraswasta	2	16.7	16.7	16.7
	petani	4	33.3	33.3	50.0
	buruh	6	50.0	50.0	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

6. Pekerjaan Ibu

		pkibu			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak bekerja	12	100.0	100.0	100.0

M A K A S S A R

7. Pendidikan Ayah

pndayah					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	2	16.7	16.7	16.7
	SMA	10	83.3	83.3	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

8. Pendidikan Ibu

pndibu					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	3	25.0	25.0	25.0
	SMP	1	8.3	8.3	33.3
	SMA	8	66.7	66.7	100.0
	Total	12	100.0	100.0	

**UJI INDEPENDENT
(INDEPENDENT T-TEST)**

1. UJI NORMALITAS

SEBELUM INTERVENSI

Tests of Normality							
	kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
E1	kontrol	.209	10	.200*	.847	10	.054
	kasus	.145	12	.200*	.938	12	.473
P1	kontrol	.183	10	.200*	.924	10	.393
	kasus	.168	12	.200*	.900	12	.157
Fe1	kontrol	.243	10	.097	.865	10	.086
	kasus	.221	12	.111	.910	12	.214
VA1	kontrol	.192	10	.200*	.912	10	.295
	kasus	.170	12	.200*	.959	12	.769
Hb1	kontrol	.227	10	.156	.880	10	.132
	kasus	.148	12	.200*	.936	12	.452

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

M A K A S S A R

SETELAH INTERVENSI

Tests of Normality							
kelompok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk			
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.	
E2	kontrol	.193	10	.200*	.944	10	.595
	kasus	.184	12	.200*	.943	12	.533
P2	kontrol	.121	10	.200*	.973	10	.916
	kasus	.182	12	.200*	.924	12	.318
VA2	kontrol	.137	10	.200*	.957	10	.751
	kasus	.119	12	.200*	.951	12	.647
Fe2	kontrol	.243	10	.097	.889	10	.164
	kasus	.186	12	.200*	.939	12	.484
Hb2	kontrol	.172	10	.200*	.912	10	.297
	kasus	.152	12	.200*	.929	12	.370

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction



2. UJI INDEPENDENT T-TEST

SEBELUM INTERVENSI

Group Statistics					
	kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
E1	kontrol	10	1723.320	169.3117	53.5411
	kasus	12	1821.308	102.1738	29.4950
P1	kontrol	10	57.050	9.9692	3.1525
	kasus	12	62.967	17.2009	4.9655
Fe1	kontrol	10	5.270	1.6000	.5060
	kasus	12	5.250	1.8506	.5342
VA1	kontrol	10	150.460	92.6049	29.2842
	kasus	12	126.792	59.3915	17.1449
Hb1	kontrol	10	11.270	.4498	.1422
	kasus	12	11.333	.4075	.1176

Independent Samples Test					
t-test for Equality of Means					
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower
E1	Equal variances assumed	.109	-97.9883	58.4605	-219.9348
	Equal variances not assumed	.131	-97.9883	61.1278	-228.9044
P1	Equal variances assumed	.349	-5.9167	6.1671	-18.7810
	Equal variances not assumed	.328	-5.9167	5.8817	-18.2704
Fe1	Equal variances assumed	.979	.0200	.7460	-1.5361
	Equal variances not assumed	.979	.0200	.7358	-1.5150
VA1	Equal variances assumed	.476	23.6683	32.6062	-44.3471
	Equal variances not assumed	.496	23.6683	33.9340	-48.7436
Hb1	Equal variances assumed	.733	-.0633	.1829	-.4448
	Equal variances not assumed	.735	-.0633	.1846	-.4504

SETELAH INTERVENSI

Group Statistics					
	kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
E2	kontrol	10	1912.660	80.9550	25.6002
	kasus	12	2002.600	102.4526	29.5755
P2	kontrol	10	68.650	11.0591	3.4972
	kasus	12	71.600	8.2136	2.3711
VA2	kontrol	10	156.660	24.8278	7.8512
	kasus	12	268.350	148.3406	42.8222
Fe2	kontrol	10	8.430	1.4476	.4578
	kasus	12	11.483	1.7513	.5056
Hb2	Kontrol	10	12.390	.6951	.2198
	Kasus	12	13.225	1.0163	.2934

Independent Samples Test					
t-test for Equality of Means					
		Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower
E2	Equal variances assumed	.036	-89.9400	39.9885	-173.3546
	Equal variances not assumed	.032	-89.9400	39.1163	-171.5450
P2	Equal variances assumed	.481	-2.9500	4.1101	-11.5234
	Equal variances not assumed	.495	-2.9500	4.2252	-11.8915
VA2	Equal variances assumed	.029	-111.6900	47.6412	-211.0678
	Equal variances not assumed	.025	-111.6900	43.5360	-206.7843
Fe2	Equal variances assumed	.000	-3.0533	.6944	-4.5018
	Equal variances not assumed	.000	-3.0533	.6820	-4.4760
Hb2	Equal variances assumed	.040	-.8350	.3795	-1.6266
	Equal variances not assumed	.034	-.8350	.3666	-1.6014

UJI T-BERPASANGAN (PAIRED T-TEST)

1. UJI NORMALITAS

a) Kelompok Kontrol

SEBELUM INTERVENSI

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P1	.183	10	.200*	.924	10	.393
VA1	.192	10	.200*	.912	10	.295
Fe1	.243	10	.097	.865	10	.086
Hb1	.169	10	.200*	.934	10	.486

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

SETELAH INTERVENSI

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P2	.121	10	.200*	.973	10	.916
VA2	.137	10	.200*	.957	10	.751
Fe2	.243	10	.097	.889	10	.164
Hb2	.211	10	.200*	.917	10	.329

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

b) Kelompok Kasus

SEBELUM INTERVENSI

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P1	.168	12	.200*	.900	12	.157
VA1	.170	12	.200*	.959	12	.769
Fe1	.221	12	.111	.910	12	.214
Hb1	.148	12	.200*	.936	12	.452

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

SETELAH INTERVENSI

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P2	.182	12	.200*	.924	12	.318
VA2	.119	12	.200*	.951	12	.647
Fe2	.186	12	.200*	.939	12	.484
Hb2	.152	12	.200*	.929	12	.370

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

2. UJI PAIRED T-TEST

a) Kelompok Kontrol

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	P1	57.050	10	9.9692	3.1525
	P2	68.650	10	11.0591	3.4972
Pair 2	VA1	150.460	10	92.6049	29.2842
	VA2	156.660	10	24.8278	7.8512
Pair 3	Fe1	5.270	10	1.6000	.5060
	Fe2	8.430	10	1.4476	.4578
Pair 4	Hb1	11.220	10	.4614	.1459
	Hb2	12.570	10	.4596	.1453

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	P1 & P2	10	.642	.045
Pair 2	VA1 & VA2	10	-.269	.453
Pair 3	Fe1 & Fe2	10	.881	.001
Pair 4	Hb1 & Hb2	10	.056	.879

Paired Samples Test						
		Paired Differences				
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pair 1	P1 - P2	-11.6000	8.9492	2.8300	-18.0019	-5.1981
Pair 2	VA1 - VA2	-6.2000	102.1127	32.2909	-79.2470	66.8470
Pair 3	Fe1 - Fe2	-3.1600	.7589	.2400	-3.7029	-2.6171
Pair 4	Hb1 - Hb2	-1.3500	.6329	.2001	-1.8027	-.8973

Paired Samples Test				
		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	P1 - P2	-4.099	9	.003
Pair 2	VA1 - VA2	-.192	9	.852
Pair 3	Fe1 - Fe2	-13.167	9	.000
Pair 4	Hb1 - Hb2	-6.745	9	.000

b) Kelompok Kasus

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviationz	Std. Error Mean
Pair 1	P1	62.967	12	17.2009	4.9655
	P2	71.600	12	8.2136	2.3711
Pair 2	VA1	126.792	12	59.3915	17.1449
	VA2	268.350	12	148.3406	42.8222
Pair 3	Fe1	5.250	12	1.8506	.5342
	Fe2	11.483	12	1.7513	.5056
Pair 4	Hb1	11.333	12	.4075	.1176
	Hb2	13.225	12	1.0163	.2934

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	P1 & P2	12	.233	.466
Pair 2	VA1 & VA2	12	.670	.017
Pair 3	Fe1 & Fe2	12	.973	.000
Pair 4	Hb1 & Hb2	12	.492	.104

Paired Samples Test						
Paired Differences						
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Pair 1	P1 - P2	-8.6333	17.2468	4.9787	-19.5914	2.3248
Pair 2	VA1 - VA2	-141.5583	117.1828	33.8278	-216.0127	-67.1039
Pair 3	Fe1 - Fe2	-6.2333	.4313	.1245	-6.5074	-5.9593
Pair 4	Hb1 - Hb2	-1.8917	.8898	.2569	-2.4570	-1.3263

Paired Samples Test					
		t	df	Sig. (2-tailed)	
Pair 1	P1 - P2	-1.734	11		.111
Pair 2	VA1 - VA2	-4.185	11		.002
Pair 3	Fe1 - Fe2	-50.059	11		.000
Pair 4	Hb1 - Hb2	-7.365	11		.000

BIOGRAFI PENULIS



Andi Nurhana Magfirah lahir di Manado, Sulawesi Utara 21 Januari 1998, anak pertama dari empat bersaudara. Memulai pendidikan di SD Muhammadiyah 2 Manado, kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di MTs Negeri Manado sampai ke tingkat menengah akhir di MAN Model Manado pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R