

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL
CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN HIPEREMESIS
GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 12 - 14 MINGGU
DI PUSKESMAS BULUKUNYI TAKALAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER –
02 NOVEMBER TAHUN 2022**



Karya Tulis Ilmiah

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Program Studi Kebidanan
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

SRIWAHYUNI

NIM :70400118001


**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 10 Mei 2023

Penyusun,



SRIWAHYUNI

NIM: 70400118001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Sriwahyuni
Nim : 70400118001
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi Pada Ny "U" Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 13 Minggu 6 Hari Di Puskesmas Bulukunyi Takalar Tanggal 17 September – 02 November Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Gowa, 10 Mei 2023

Pembimbing I


Zelna Yuni Andryani, A. S.ST., M.Keb.

NIP: 19890328 201903 2 018

Pembimbing II


dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

NIP : 19870407 201503 2 003

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi Pada Ny "U" Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 13 Minggu 6 Hari Di Puskesmas Bulukunyi Takalar Tanggal 17 September – 02 November Tahun 2022" Yang disusun oleh Sriwahyuni : 70400118001, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang di selenggarakan pada hari Selasa, 14 February 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 10 Mei 2023

19 Syawal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zena Yuni Andryani, A. S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Nadyah, M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Ag	(.....)

Di ketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP:19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunianya kepada kita semua sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisinya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-menderang seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi Pada Ny “U” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 12 -14 Minggu Di Puskesmas Bulukunyi Takalar Tanggal 17 September – 02 November Tahun 2022.”** Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak (Sulaeman) dan Ibu (Hamsina) serta saudara saya (Kakak Suriani, dan Adek saya Siska) atas dukungan moral, materi dan doa yang tak terhingga.

2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D sebagai Rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Kepada ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M. Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Kepada Ibunda Firdayanti, S.ST., M. Keb selaku ketua prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M. Keb selaku sekretaris prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Kepada Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
7. Kepada dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Kepada Dr. dr. Nadyah, M. Kes selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
9. Kepada Prof. Dr. Kasjim Salenda, M. Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada karya tulis ilmiah sehingga

penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.

10. Segenap dosen terkhususnya para dosen prodi kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
11. Kepada puskesmas dan petugas kesehatan puskesmas Bulukunyi Takalar yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
13. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2018 kelas A.

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Gowa, Februari 2023

Penyusun

SRIWAHYUNI

NIM : 70400118001

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Ruang lingkup	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat	6
E. Metode	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kehamilan	10
1. Defenisi	10
2. Tanda dan gejala	11
3. Proses Kehamilan	14
4. Perubahan Fisiologi dalam masa kehamilan	19
5. Perubahan Psikologi dalam masa kehamilan	25
6. Kebutuhan dasar pada ibu hamil	26
7. Pendapat Islam tentang Proses kehamilan	32
B. Hiperemesis Gravidarum	36
1. Defenisi	36
2. Etiologi	41
3. Patofisiologi	45
4. Gejala klinis	47
5. Klasifikasi	48
6. Komplikasi	50

7. Diagnosa	51
8. Pencegahan	52
C. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I	53
1. Definisi.....	53
2. Tanda dan gejala	53
3. Patofisiologi	54
4. Penatalaksanaan	55
5. Diagnosa	56
6. Kriteria	56
D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan.....	59
1. Pengertian	59
2. Proses Manajemen	60
3. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP.....	65
BAB III STUDI KASUS	
A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar)	68
B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual).....	73
C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial).....	79
D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan).....	79
E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan)	80
F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan)	82
G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)	83
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar)	110
B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)	112
C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)	113
D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)	114
E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan)	115
F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan)	117
G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)	119
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran II : Surat Keterangan Izin Meneliti
- Lampiran III : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran IV : Lembar Persetujuan Pasien Dan Wali
- Lampiran V : Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran VI : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 30 JANUARI 2023

Sriwahyuni, 70400118001

Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani. A

Pembimbing II : dr. Jelita Inayah Sari

“Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi pada Ny “U” dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 13 Minggu 6 Hari di Puskesmas Bulukunyi Takalar Tanggal 17 September – 02 November Tahun 2022”

Hiperemesis gravidarum adalah emesis gravidarum yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala klinis serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi.

Studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan asuhan kebidanan antenatal care pada Ny “U” dengan hiperemesis gravidarum tingkat I gestasi 12 – 14 Minggu di Puskesmas Bulukunyi Takalar tanggal 17 September – 02 November berdasarkan 7 langkah proses manajemen asuhan kebidanan Varney dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus menunjukkan bahwa setelah observasi dilakukan selama 7 minggu, dari hasil observasi menunjukkan bahwa Ny “u” dapat menerima asuhan dan menjalankan anjuran selama pemberian asuhan sehingga kondisi Ny “U” berangsur-angsur membaik. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi yang menunjukkan keadaan umum ibu yang mulai membaik pada kunjungan ke-5 namun mengalami mual tetapi sudah tidak muntah, keadaan ini terjadi sampai pada kunjungan ke-6. Kemudian hasil observasi terakhir pada kunjungan ke-7 keadaan ibu sudah baik ditandai dengan tanda vital dalam batas normal, nafsu makan ibu telah meningkat serta tidak mengalami mual dan muntah lagi.

Bedasarkan pada studi kasus ny “U” dapat disimpulkan bahwa hiperemesis gravidarum yang dialami ny “U” pada kehamilan pertama sudah tidak terjadi lagi mual dan muntah pada minggu ke – 20 kehamilan atau pada kunjungan ke – 7. Sehingga dapat kita pahami bahwa dengan Manajemen Asuhan Kebidanan Islami yang baik maka kasus hiperemesis gravidarum dapat teratasi pada kehamilan primigravida.

Kata Kunci : Kehamilan, Hiperemesis Gravidarum, 7 Langkah varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, JANUARY 2023

Sriwahyuni, 70400118001

Supervisor I : Zelna Yuni Andryani

Supervisor II : Jelita Inayah Sari

“Islamic Midwifery Care Management on Antenatal Pathology in Mrs “U” with Hyperemesis Gravidarum Level I with the Gestation Period of Week 13 and Day 6 at Bulukunyi Health Center of Takalar from September 17 to November 2, 2022”

Hyperemesis gravidarum is excessive emesis gravidarum causing clinical symptoms in pregnant women which may also interfere on daily basis. In most cases, patients will probably experience excessive nausea and vomiting which may worsen the patients' general condition and cause dehydration.

The major purpose of this case study was to investigate and carry out midwifery antenatal care for Mrs "U" with the case of hyperemesis gravidarum stage I, with the gestation period of week 12-14 at Bulukunyi Health Center of Takalar. The study was conducted from September 17 to November 2 based on the 7 stages of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this study revealed that after the observation which was conducted for 7 weeks, the patient (Mrs "U") was able to receive medical care, and thus her general health condition gradually improved. It was apparent that on the 5th visit, the patient which previously experienced excessive nausea was no longer vomited. This condition was also seen during the 6th visit. Eventually, the results of the last observation at the 7th visit showed that the patient was totally in good condition in which her vital signs were within normal limits. The patient's appetite had also increased, and she did not experience any nausea and vomiting.

Based on this case study on Mrs "U", it was apparent that the hyperemesis gravidarum that Mrs. "U" experienced in her first pregnancy could be solved at the week 20 of her pregnancy or at the 7th visit. Therefore, it could be concluded that with with good and proper Islamic midwifery care treatments, the case of hyperemesis gravidarum could be well resolved in primigravida pregnancies.

Key Words: Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan adalah suatu proses fisiologi yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki laki dan sel kelamin perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin (Ariantika dan Fatimah, 2019).

Ibu hamil biasanya dapat dikatakan mengalami hiperemesis gravidarum jika mengalami muntah beberapa kali dalam sehari, atau selalu muntah setiap kali makan atau minum, atau jika berat badan turun. Biasanya kondisi ini terjadi pada sekitar minggu ke empat dan ke tujuh, dan berangsur membaik pada minggu ke 14 dan 16 kehamilan (Atalya, 2018). Sementara menurut Amiruddin (2012) dalam artikel Umami Aiman, mual muntah secara berlebihan yang terjadi lebih dari 10 kali selama 24 jam disebut hiperemesis gravidarum. Pada kasus HEG cadangan karbohidrat dan lemak habis untuk energi. Hal tersebut dapat menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil yang akan mempengaruhi tumbuh kembang janin (Umami aiman, 2019).

Mual muntah berlebihan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, dimana kejadian ini dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan, mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I (Syamsuddin Syahril, 2018)

Hiperemesis gravidarum merupakan ibu hamil yang mengalami mual muntah yang berlebihan, dapat menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari sehingga membahayakan kesehatan bagi janin dan ibu, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, mual muntah juga berdampak negatif bagi ibu hamil, seperti aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Biasanya mual muntah sering terjadi saat pagi hari, bahkan dapat timbul kapan saja maupun terjadi kadang di malam hari. Gejala tersebut 40-60% biasa terjadi pada multigravida. Mual (nausea) dan muntah (emesis gravidarum) adalah suatu yang wajar pada ibu hamil trimester 1 (Cristiani & Andayani, 2019).

WHO (World Health Organization) memperkirakan setiap tahunnya 500.000 ibu meninggal sebagai akibat langsung dari kehamilan. Ironisnya sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan teknologi sederhana. Kesukaran dalam mengukur kematian ibu sudah lama menjadi kendala dalam menyadarkan para perencana kesehatan dan pihak lainnya akan besarnya masalah serta penyebabnya, sehingga menghambat intervensi yang efektif dalam porsi yang memadai. Lebih dari dua pertiga kejadian kehamilan masih berada dalam perlindungan/pertolongan para dukun yang mudah dimengerti mempunyai tingkat keamanan yang rendah (WHO, 2018).

Jumlah kejadian hiperemesis gravidarum mencapai 12,5 % dari jumlah seluruh kehamilan di dunia (WHO, UNICEF, 2015). Menurut (Masruroh & Retnosari, 2016) dalam (Arisdiani & Dwi. 2020) Ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum mencapai 12,5% dari seluruh jumlah kehamilan di dunia dengan angka kejadian yang beragam yaitu mulai dari 0,3% di Swedia, 0,5% di

California, 0,8% di Canada, 10,8% di China, 0,9% di Norwegia, 2,2% di Pakistan, dan 1,9% di Turki. Sedangkan angka kejadian hiperemesis gravidarum di Indonesia adalah mulai dari 1-3% dari seluruh kehamilan.

Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) terakhir tahun 2017, angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 telah turun keposisi 305/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai, AKI menunjukkan jumlah kematian perempuan saat hamil, melahirkan atau masa nifas (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia,2017).

Menurut Suyuti, dkk, (2021) dari 31 responden yang memiliki sikap positif di temukan 71% dari ibu yang hamil normal dan 29% ibu dengan hiperemesis gravidarum. Dari 18 responden yang pengetahuannya rendah terdapat 39% ibu yang hamil normal dan 61% dari ibu yang hiperemesis gravidarum. Dari hasil uji statistik chi square diperoleh X^2 4,851 dan p-Value $0.02 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap ibu hamil dengan terjadinya hiperemesis gravidarum.

Hiperemesis gravidarum jarang menyebabkan kematian, tetapi angka kejadiannya masih cukup tinggi. Hampir 25% pasien hiperemesis gravidarum dirawat inap lebih sekali. Terkadang kondisi hiperemesis gravidarum terus menerus dan sulit sembuh membuat pasien depresi. Pada kasus-kasus ekstrim, ibu-ibu hamil bahkan dapat merasa ingin melakukan terminasi kehamilan (Octavia, 2016: 42).

Dari data Puskesmas Bulukunyi Takalar ditemukan bahwa pada tahun 2018 dari 236 ibu hamil terdapat 97 ibu yang didiagnosis menderita hiperemesis gravidarum tingkat 1, pada tahun 2019 dari 264 ibu hamil terdapat 116 ibu yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 1, pada tahun 2020 dari 250 ibu hamil terdapat 132 ibu menderita hiperemesis gravidarum tingkat 1, pada tahun 2021 dari 276 ibu hamil terdapat 150 ibu hamil yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 1, dan pada bulan Januari hingga dengan bulan Maret tahun 2022 dari 77 ibu hamil terdapat 24 ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan bahwa masih tingginya kemungkinan ibu mengalami komplikasi kehamilan berupa hiperemesis gravidarum dan besarnya kemungkinan hiperemesis gravidarum tingkat I berubah menjadi hiperemesis gravidarum yang lebih berat maka penulis tertarik untuk melakukan “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar Tahun 2022”

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ruang lingkup pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar Tahun 2022”.

C. Tujuan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Dilaksanakan manajemen asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan pengumpulan data pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- b. Dirumuskan interpretasi data pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- c. Diidentifikasi diagnosa potensial pada Ibu hamil dengan Hiperemesis gravidarum Tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- d. Dilaksanakan antisipasi penanganan segera dan kolaborasi pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- e. Disusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- f. Dilaksanakan asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

- g. Dievaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.
- h. Didokumentasikan semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

D. Manfaat

1. Manfaat Institusi

Sebagai sumber informasi dan referensi baru sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa(i) kesehatan pada umumnya dan mahasiswi kebidanan pada khususnya mengenai kasus hiperemesis gravidarum tingkat 1.

2. Manfaat Diri sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman belajar dilapangan dan dapat meningkatkan pengetahuan peneliti tentang asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat 1.

3. Manfaat Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

Menjadi sumber informasi dan pengetahuan terkini mengenai kasus hiperemesis gravidarum, dan diharapkan dapat memberikan masukan atau saran dan bahan dalam merencanakan asuhan kebidanan di Puskesmas Bulukunyi Kabupaten Takalar.

E. Metode

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku literatur dan mengambil data-data dari internet antara lain: membaca buku dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hiperemesis gravidarum, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi 7 langkah Varney (2003) yaitu : Identifikasi dan analisa data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, antisipasi diagnosa/masalah potensial, emergency, kolaborasi dan rujukan, merencanakan asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi hasil tindakan terkait kasus hiperemesis gravidarum tingkat

I. Dalam mengumpulkan data serta pengkajian penulis menggunakan tehnik di antaranya:

a) Anamnesa/wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan pasien dan suami maupun keluarganya serta bidan dan dokter yang dapat membantu memberikan keterangan atau informasi yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

b) Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi dan pemeriksaan laboratorium serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) dan lain-lain terkait kasus hiperemesis gravidarum tingkat I.

c) Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

3. Studi Dokumentasi

Membaca dan mempelajari status yang berhubungan dengan keadaan pasien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan atau hasil pemeriksaan penunjang lainnya.

4. Kasus

Mengadakan konsultasi dengan bidan, dokter yang menangani pasien serta pembimbing karya tulis ilmiah mengenai masalah yang dialami pasien yakni hiperemesis gravidarum tingkat I.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, bab ini berisi latar belakang pengambilan kasus hiperemesis gravidarum, tujuan penulisan karya tulis ilmiah berjudul hiperemesis gravidarum, manfaat penulisan karya tulis ilmiah, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah.

BAB II, pada bab ini dibahas tentang tinjauan umum kehamilan (pengertian kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, proses kehamilan, Perubahan Psikologis dalam Masa Kehamilan, Kebutuhan Dasar Pada Ibu Hamil), hiperemesis gravidarum (pengertian, etiologi, patofisiologi, gejala, klasifikasi, komplikasi, diagnosa, pencegahan), hiperemesis gravidarum tingkat I (pengertian, tanda dan gejala, patofisiologi, dan penatalaksanaan), dan yang terakhir membahas tentang proses manajemen asuhan kebidanan (pengertian manajemen asuhan kebidanan, proses manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasiandalambentuk SOAP).

BAB III, membahas tentang langkah I pengkajian dan analisa data dasar, langkah II merumuskan diagnosa/masalah aktual, langkah III antisipasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan dan langkah VII evaluasi hasil asuhan kebidanan.

BAB IV, pada bab ini menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas kesenjangan antara teori dan hasil penelitian serta menjawab tujuan penelitian. Teori yang dikemukakan adalah teori (jurnal dan textbook) yang sudah termuat dalam Bab II.

BAB V, bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan yang disusun untuk menjawab tujuan penelitian kasus hiperemesis gravidarum dan saran sebagai implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi

Menurut Federasi Obsetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9-10 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi menjadi 3 trimester dimana trimester pertama berlangsung 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke 13-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke 28-40) (Prawihardjo, 2016).

Kehamilan adalah suatu proses fisiologi yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki-laki dan sel perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin (Ariantika dan fatimah, 2019).

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pembentukan plasenta, sampai tumbuh kembang hasil konsepsi (Indri Yasa Utami, 2020).

Kehamilan merupakan masa yang cukup berat bagi seorang ibu, oleh karena itu calon ibu membutuhkan dukungan dari banyak pihak terutama suami agar

dapat menjalani proses kehamilan hingga akhir kehamilannya dengan aman dan nyaman (Yuliana 2015: 1).

Masa kehamilan adalah masa mulai konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Setiawati, 2020)

2. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala kehamilan dapat dibagi dalam 3 bagian yakni :

a) Tanda pasti kehamilan

1) Gerakan janin yang dapat dilihat / diraba / dirasa, juga bagian-bagianjanin.

2) Denyut jantung janin

(a) Didengar dengan stetoskop monoralleanec.

(b) Dicatat dan didengar alat Doppler.

(c) Dicatat dengan foto elektrokardiogram.

(d) Dilihat pada ultrasonografi (USG).

3) Terlihat tulang-tulang janin dalam foto rontgen

b) Tanda tidak pasti kehamilan (persumptive)

1) Amenorea

Umur kehamilan dapat dihitung dari tanggal hari pertama haid terakhir (HPHT) dan taksiran tanggal persalinan (TTP) yang dihitung menggunakan rumus naegele yaitu $TTP = (HPHT + 7)$ dan $(\text{bulan HT} + 3)$.

2) Nausea and Vomiting

Biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga akhir triwulan pertama. Sering terjadi pada pagi hari, maka disebut morning sickness.

3) Mengidam

Ibu hamil sering meminta makanan / minuman tertentu terutama pada bulan-bulan triwulan pertama, tidak tahan suatu bau-bauan.

4) Pingsan

Bila berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat bisa pingsan.

5) Anoreksia

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan kemudian nafsu makan timbul kembali.

6) Fatigue

Salah satu tanda kehamilan berupa kelelahan berlebih yang kadang diikuti rasa pusing dan lemas. Tanda kehamilan ini biasanya muncul di minggu-minggu awal saat tubuh disibukkan dengan pembentukan plasenta untuk tempat tumbuhnya janin.

7) Mammae membesar

Mammae membesar, tegang dan sedikit nyeri disebabkan pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktus dan alveoli payudara. Kelenjar montgomery terlihat membesar.

8) Miksi

Miksi sering terjadi karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar. Gejala ini akan hilang pada triwulan kedua kehamilan.

9) Konstipasi / obstipasi

Konstipasi terjadi karena tonus otot usus menurun oleh pengaruh hormon steroid.

10) Pigmentasi kulit

Pigmentasi kulit oleh pengaruh hormon kortikosteroid plasenta, dijumpai di muka (Chloasma gravidarum), areola payudara, leher dan dinding perut (linea nigra grisea).

11) Epulis atau dapat disebut juga hipertrofi dari papil gusi.

12) Pemekaran vena-vena (varises).

Terjadi pada kaki, betis dan vulva. Keadaan ini biasanya dijumpai pada triwulan akhir.

c) Tanda kemungkinan hamil

1) Perut membesar.

2) Uterus membesar.

3) Tanda Hegar.

Ditemukan pada kehamilan 6-12 minggu, yaitu adanya uterus segmen bawah rahim yang lebih lunak dari bagian yang lain.

4) Tanda Chadwick

Adanya perubahan warna pada serviks dan vagina menjadi kebirubiruan.

5) Tanda Piskaseck

Yaitu adanya tempat yang kosong pada rongga uterus karena embrio biasanya terletak disebelah atas, dengan bimanual akan terasa benjolan yang asimetris.

6) Kontraksi-kontraksi kecil pada uterus bila dirangsang (braxtonhicks).

7) Teraba ballotement.

8) Reaksi kehamilan positif

3. Proses Kehamilan

Pertemuan sperma pria dan sel telur yang matang dari wanita dan terjadi pembuahan yang merupakan awal kehamilan. Untuk terjadi suatu kehamilan harus ada sperma, ovum, pembuahan ovum (*konsepsi*), implantasi (*nidasi*) yaitu pelekatan embrio pada dinding rahim, hingga plasentasi /pembentukan plasenta. Dalam proses pembuahan diperlukan dua faktor penting: sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh ovarium atau indung telur seorang wanita ketika ovulasi terjadi seorang wanita melepaskan satu sel telur yang matang yang kemudian ditangkap oleh rumbai –rumbai (*microfilamen fimbria*) dibawa masuk ke rahim melalui saluran telur (*tuba fallopi*) sel-sel ini dapat bertahan hidup dari hingga 12-48 jam setelah ovulasi. Berbeda dengan wanita yang melepaskan satu sel telur per bulan hormon pria testis dapat terus bekerja untuk menghasilkan sperma. Selama hubungan seksual (*coitus*) jutaan sperma (*spermatozoon*) memasuki rahim melalui saluran tuba untuk menemukan sel telur untuk dibuahi dan pada akhirnya hanya satu dari sperma terabik yang dapat membuahi sel telur.

a) Sel Telur (ovum)

Sel telur berada di dalam indung telur atau ovarium. Sel telur atau ovum adalah bagian terpenting di dalam indung telur atau ovarium wanita. Setiap bulannya, 1-2 ovum dilepaskan oleh indung telur melalui peristiwa yang disebut ovulasi. Ovum dapat dibuahi apabila sudah melewati proses oogenesis yaitu proses pembentukan dan perkembangan sel telur di dalam ovarium dengan waktu hidup 24-48 jam setelah ovulasi, sedangkan pada pria melalui proses spermatogenesis yaitu keseluruhan proses dalam memproduksi sperma matang. Sel telur mempunyai lapisan pelindung berupa sel-sel granulose dan zona pellusida yang harus di tembus oleh sperma untuk dapat terjadi kehamilan (Megasari, dkk, 2015: 25).

Ovarium dibagi menjadi dua, kiri dan kanan di antaranya terdapat folikel primer (folikel ovarium belum matang) dari sekitar 100.000 (Sunarti 2013: 24). Ovarium memiliki fungsi melepaskan sel telur/ovum setiap bulan dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium terletak di perut (*peritoneum cavitas*) dalam lekukan kecil di dinding posterior lebar ligamen/ligamen pelekatan kedua sisi rahim berukuran 3 cm x 2 cm x 1 cm dan berat 5-8 gram (Megasari dkk. 2015: 19). Di dalam ovarium terdapat siklus perkembangan folikel, dari folikel yang belum matang (*folikel degraft*). Selama siklus menstruasi folikel matang dipecah menjadi suatu korpus yang dikenal sebagai corpus rubrum yang melepaskan hormon estrogen, ketika hormon LH (hormon luteal) meningkat sebagai respons tubuh terhadap kadar estrogen yang

meningkat disebut corpus luteum /massa jaringan kuning pada ovarium akan menghambat kerja hormon FSH (*follicle stimulating hormone*) dengan menghasilkan hormon progesteron dan berdegenerasi, jika tidak terjadi pembuahan korpus ini akan berubah menjadi corpus albicans/ badan putih dan siklus baru pun dimulai.

b) Sel Sperma (*Spermatozoa*)

Sel sperma memiliki bentuk susunan yang sempurna yaitu kepala agak lonjong dengan inti (*nucleus*), ditutupi oleh akrosom dan membran plasma. Leher sperma menghubungkan kepala dan bagian tengah sperma. Ekorsperma mempunyai panjang kurang lebih 10 kali bagian kepala dan dapat bergetar untuk membuat sperma bergerak dengan cepat. Sama seperti sel telur mengalami pematangan sperma juga mengalami pematangan (*spermatogenesis*) yang terjadi di tubulus seminiferus testis. Meski begitu masih ada perbedaan yang jelas yaitu setelah duplikasi DNA dan pembelahan sel dengan jumlah kromosom yang sama (*mitosis*) dan meiosis tereduksi materi genetik pada sel anak yang dihasilkan (*meiosis*) yaitu untuk satu oogonium diploid menghasilkan satu ovum haploid matur\matang sedangkan untuk spermatogonium diploid menghasilkan empat spermatozoa haploid matur.

c) Konsepsi ovum (Pembuahan)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan sebagai campuran inti jantan dan betina pengertian lain dari pembuahan\fertilisasi yaitu bertemunya sel telur dan sperma (*spermatozoon*) dan membentuk. zigot (Sunarti 2013:31). Pembuahan terjadi sebagai hasil dari sejumlah peristiwa

kompleks termasuk pematangan akhir sperma dan oosit pengangkutan gamet melalui saluran reproduksi wanita, selanjutnya antara gamet jantan dan betina membentuk sejumlah kromosom diploid (Holmes 201:17). Dua proses penting juga terjadi sebelum pembuahan yang pertama adalah ovulasi runtuhnya\pelepasan sel telur dari ovarium diikuti dengan keluarnya folikel ke dalam ovarium yang matang(*matur*).

Ovum yang dilepaskan kemudian dimasukkan ke dalam rahim (*tuba fallopi*) dibantu oleh rumbai-rumbai (*microfilamen fimbria*) untuk memandunya kembali ke dalam tuba. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam (Sunarti 2013: 32). Inseminasi kedua adalah masuknya sperma (ekspulsi semen) dari uretra pria ke dalam alat kelamin\vaginawanita. Jutaan sperma masuk ke saluran reproduksi wanita setiap kali melakukan ejakulasi semen/melepaskan air mani. Dengan menggerakkan ekor dan menggunakan kontraksi muskular yang ada sperma terus berjalan di dalam tabung melalui uterus.Dari jutaan spermatozoa yang masuk hanya sekitar beberapa ratus yang mampu melakukan perjalanan dari uterus ke tuba falopi dan hanya beberapa ratus sperma saja yang mencapai ampula tuba (Sunarti 2013: 32).Bila ovulasi terjadi pada hari tersebut, ovum dapat segera di buahi oleh sperma yang memiliki cukup banyak enzim hialuronidase (enzim yang menembus selaput yang melindungi ovum).Hanya ada satudari ratusan sperma yang dapat membuahi ovum dan membentuk zigot.

d) Fertilisasi

Sebagaimana didefinisikan oleh Kamus Kedokteran Saku Dorlan fertilisasi (*fertilization*) adalah penyatuan gamet jantan dan betina untuk membentuk zigot diploid dan menghasilkan individu baru. Fertilisasi adalah proses dimana gamet jantan dan betina menyatu memakan waktu sekitar 24 jam, idealnya proses ini terjadi di tuba fallopi yang merupakan tuba kecil yang memanjang dari rahim ke ovarium di sisi yang sama sebagai jalan untuk oosit ke rongga uterus serta di mana fertilisasi biasanya terjadi. Sebelum keduanya bertemu, terdapat tiga fase yang terjadidiantaranya:

1) Fase Penembusan Korona Radiata

Dari 200c 300 juta hanya sekitar 300-500 yang sampai di tubafallopi yang bisa menembus korona radiata karena sudah mengalami proses kapasitasasi.

2) Fase Penembusan Zona Pellusida

Yaitu sebuah perisai glikoprotein di sekeliling ovum yang mempermudah dan mempertahankan pengikatan sperma dan menginduksi reaksi akrosom.

Spermatozoa yang bisa menempel di zona pellusida, tetapi hanya satu yang memiliki kualitas terbaik mampu menembus oosit.

3) Fase Penyatuan Oosit dan Membran Sel Sperma

Setelah menyatu maka akan dihasilkan zigot yang mempunyai kromosom diploid dan terbentuk jenis kelamin baru (Megasari, dkk, 2015: 27).

e) Implantasi (nidasi)

Pada hari keenam lapisan trofoblas blastosis bersentuhan dengan endometrium biasanya di dinding posterior superior dan mulai berimplantasi.

Di lapisan luar sel (*trofoblas*), enzim proteolitik (enzim kaya protein) dapat disekresikan untuk mendegradasi sebagian endometrium. Jaringan endometrium mengandung sel desidua yaitu sel besar yang menyimpan glikogen dan siap dihancurkan oleh trofoblas kemudian sel-sel trofoblas (*sinsitiotrofoblas*) mengeluarkan enzim yang mengikis endometrium untuk membantu memberikan nutrisi pada embrio yang sedang berkembang dan membantu perlekatan embrio keendometrium. Blastula mengandung massa sel di dalamnya yang akan dengan mudah menembus desidua, menyebabkan luka sembuh dan menutup. Selama nidasi ada sedikit pendarahan dari luka desidua (tanda Hartman) (Megasari et al. 2015: 28).

4. Perubahan Fisiologis dalam Masa Kehamilan

Banyak perubahan terjadi setelah fertilisasi dan berlanjut sepanjang kehamilan. Berikut ini beberapa perubahan anatomi dan fisiologis yang terjadi pada ibu hamil diantaranya adalah:

1. Perubahan Sistem Reproduksi

a) Vagina dan Vulva

Vagina sampai minggu ke 8 mengalami peningkatan pembuluh darah atau penimbunan pembuluh darah dan efek dari hormon estrogen menyebabkan vagina berwarna kebiruan yang dikenal dengan Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan penebalan mukosa vagina pelunakan jaringan ikat dan pembesaran (pertumbuhan jaringan abnormal) otot polos yang teregang akibat peregangan ini vagina menjadi lebih lunak. Respon lain terhadap pengaruh hormonal adalah peningkatan sekresi sel-sel vagina

keputihan yang berwarna putih dan sangat asam akibat peningkatan pH asam dalam kisaran (5,2 – 6). Keasaman ini berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen/ bakteri penyebab penyakit (Kumalasari, Intan. 2015: 4).

b) Uterus/ Rahim

Perubahan yang sangat jelas terjadi dirahim sebagai ruang untuk menyimpan anak yang sedang tumbuh di masa depan.

Perubahan ini disebabkan oleh hal-hal lain:

- 1) Peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah
- 2) Hipertrofi dan hiperplasia (pertumbuhan dan perkembangan jaringan abnormal) yang menyebabkan otot-otot rahim menjadi lebih besar, lunak dan dapat mengikuti pembesaran rahim karena pertumbuhanjanin.
- 3) Perkembangan desidua atau sel-sel selaput lendir rahim selama hamil. Ukuran uterus sebelum hamil sekitar 8 x 5 x 3 cm dengan berat 50 gram (Sunarti, 2013: 43). Uterus bertambah berat sekitar 70-1.100 gram selama kehamilan dengan ukuran uterus saat umur kehamilan aterm adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas >4.000 cc. Pada perubahan posisi uterus di bulan pertama berbentuk seperti alpukat, empat bulan berbentuk bulat, akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Pada rahim yang normal/ tidak hamil sebesar telur ayam, umur dua bulan kehamilan sebesar telur bebek, dan umur tiga bulan kehamilan sebesar telur angsa (Kumalasari, Intan. 2015: 5). Dinding – dinding rahim yang dapat melunak dan elastis menyebabkan fundus uteri dapat didefleksikan serta

bertambahnya lunak korpus uteridan serviks di minggu kedelapan usia kehamilan yang dikenal dengan tanda Hegar. Perhitungan lain berdasarkan perubahan tinggi fundus menurut Kusumawati (2008) dalam Sartika, Nita. (2016: 9) dengan jalan mengukur tinggi fundus uteri dari simfisis maka diperoleh, usia kehamilan 22-28 minggu : 24-26 cm, 28 minggu : 26,7 cm, 30 minggu :29-30 cm, 32 minggu : 29,5-30 cm, 34 minggu : 30cm, 36 minggu : 32 cm, 38 minggu : 33 cm, 40 minggu : 37,7 cm.

c) Serviks

Pada satu bulan setelah konsepsi serviks sudah mulai mengalami pelunakan dan sianosis yang signifikan. Perubahan ini terjadi karena peningkatan vaskularitas dan edema serviks keseluruhan (andina vita sutanto, 2018).

d) Ovarium

Selama kehamilan ovulasi berhenti dan pematangan folikel-folikel baru ditunda. Biasanya hanya satu korpus luteum yang ditemukan pada wanita hamil. Struktur ini berfungsi maksimal selama 6-7 minggu pertama kehamilan 4-5 minggu pascaevolusi dan setelah itu tidak banyak berkontraksi dalam produksi progesterone (Yuni fitriana, 2018).

e) Kulit

Pada kulit terjadi perubahan deposit pigmen dan hiper pigmentasi karena pengaruh Melanocyte Stimulating Hormone atau hormon yang mempengaruhi warna kulit pada lobus hipofisis anterior dan pengaruh kelenjar supra renalis (kelenjar pengatur hormon adrenalin). Hiper

pigmentasi ini terjadi pada daerah perut (*striae gravidarum*), garis gelap mengikuti garis diperut (*linianigra*), areola mammae, papilla mammae, pipi (*cloasma gravidarum*). Setelah persalinan hiper pigmentasi ini akan berkurang dan hilang.

f) Payudara

Payudara akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama masa kehamilan sebagai persiapan masa laktasi, ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan payudara yaitu hormon, estrogen progesteron, dan somatomammotropin. Estrogen memengaruhi sistem saluran kelenjar payudara (menimbulkan hipertrofi), progesterone menambah sel-sel asinus pada payudara, somatomammotropin mempengaruhi pertumbuhan sel asinus sehingga terjadi produksi kasein laktalbumin dan laktoglobulin, sedangkan gabungan progesterone dan somatomammotropin menyebabkan perubahan pada timbunan lemak sekitar asinus/alveolus, hiperpigmentasi areola mammae, penonjolan kelenjar montgomery dan pembuluh darah sekitar payudara menonjol (Himatulloh dkk, 2019).

2. Perubahan Sistem Sirkulasi Darah (Kardiovaskular)

Volume darah semakin meningkat karena jumlah serum lebih besar dari pada pertumbuhan sel darah sehingga terjadi hemodelusi atau pengenceran darah. Volume darah ibu meningkat sekitar 30%-50% pada kehamilan tunggal, dan 50% pada kehamilan kembar, peningkatan ini dikarenakan adanya retensi garam dan air yang disebabkan sekresi aldosteron dari hormon adrenal oleh estrogen. Cardiac output atau curah jantung meningkat sekitar 30%, pompa jantung

meningkat 30% setelah kehamilan tiga bulan dan kemudian melambat hingga umur 32 minggu. Setelah itu volume darah menjadi relatif stabil (Kumalasari, Intan, 2015: 5).

3. Perubahan Sistem Pernafasan (*Respirasi*)

Dengan bertambahnya usia kehamilan dan pembesaran rahim ibu hamil sering mengeluh sesak napas dan pendek napas yang disebabkan oleh tekanan usus pada diafragma karena rahim yang membesar. Selain itu kerja jantung dan paru-paru juga meningkat karena selama kehamilan jantung memompa darah baik untuk ibu dan janin paru-paru akan menyedot asam (pertukaran oksigen dan karbon dioksida) untuk kebutuhan ibu dan janin.

4. Perubahan Sistem Perkemihan (*Urinaria*)

Selama kehamilan ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring darah volume ini meningkat 30% sampai 50% atau lebih dan rahim yang membesar menekan kandung kemih sehingga menyebabkan sering buang air kecil (Sunarti, 2013: 8). Selain itu munculnya metabolisme air menyebabkan fungsi normal metabolisme air sehingga pembentukan urin juga meningkat. Penyumbatan pembentukan urin dan peningkatan faktor menyebabkan peningkatan jumlah hormon yang dihasilkan yaitu hormon penetralisir. Gejala ini akan menghilang pada trimester 3 kehamilan dan diakhir kehamilan gangguan ini akan muncul kembali karena turunnya kepala janin ke rongga panggul yang menekan kandung kemih.

5. Perubahan Sistem Endokrin

Plasenta adalah sumber utama setelah pembentukan menghasilkan hormon HCG (Human Chorionic Gonadotrophin) hormon utama akan merangsang

pembentukan estrogen dan progesteron disekresikan oleh korpus luteum berperan dalam mencegah ovulasi dan membantu menjaga ketebalan rahim. Hormon lain yang dihasilkan adalah hormon HPL (*Human Placenta Lactogen*) atau hormon yang merangsang produksi ASI hormon HCT (*Human Chorionic Thyrotropin*) atau hormon yang mengatur aktivitas tyroid dan hormon MSH (*Melanosit Stimulating hormone*) atau hormon yang mempengaruhi perubahan warna atau perubahan pada kulit.

6. Perubahan Sistem Gastrointestinal

Perubahan sistem pencernaan tidak lain adalah pengaruh faktor hormonal selama kehamilan. Kadar progesteron yang tinggi mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh yang dapat meningkatkan kolesterol darah dan memperlambat kontraksi otot polos menyebabkan penurunan pergerakan usus (peristaltik usus) dan persalinan lebih lama karena tekanan. kekuatan dari rahim yang membesar sehingga wanita hamil terutama pada trimester kedua. kehamilan sering mengeluh sembelit. Selain itu efek estrogen yang tinggi menyebabkan peningkatan sekresi asam di lambung dan sekresi kelenjar ludah (saliva) juga meningkat karena menjadi semakin asam. Menyebabkan rasa panas di perut bahkan sampai ke dada atau biasa dikenal dengan heartburn adalah suatu kondisi di mana makanan terlalu lama berada di perut karena sfingter anal di kerongkongan bagian bawah berelaksasi untuk memungkinkan zat-zat yang terkandung di dalam perut kembali ke kerongkongan (Kumalasari Intan. 2015:7). Kondisi lain yang menyebabkan mual dan pusing/sakit kepala pada ibu terutama pada pagi hari (*morning sickness*) jika disertai muntah yang banyak

sehingga mengganggu aktivitas ibu sehari-hari disebut Hiperemesis gravidarum (Sunarti, 2013: 7).

5. Perubahan Psikologis dalam Masa Kehamilan

a) Trimester I

Kehamilan membawa banyak perubahan dan adaptasi bagi ibu hamil dan pasangannya. Trimester pertama sering dianggap sebagai periode penyesuaian, penyesuaian wanita hamil dengan kenyataan bahwa dia hamil. Selama periode ini beberapa ibu hamil merasa sedih dan ambivalen. Ibu hamil mengalami perasaan kecewa penolakan kecemasan dan depresi terutama gejala yang sering terjadi pada ibu hamil yang tidak diinginkan. Namun tidak seperti wanita dengan kehamilan yang direncanakan dia akan bahagia dengan kehamilannya. Masalah hasrat seksual pada trimester pertama setiap wanita memiliki keinginan yang berbeda-beda karena banyak ibu hamil yang merasa perlu mencintai dan mencintai tanpa berhubungan seks.

b) Trimester II

Trimester kedua umumnya dikenal sebagai periode kesehatan yang baik ketika ibu hamil merasa nyaman dan bebas dari ketidaknyamanan. Pada trimester kedua ibu hamil akan melalui dua fase yaitu masa pra akselerasi dan masa pasca akselerasi. Selama fase pra-percepatan calon ibu akan mengalami dan mengevaluasi kembali semua aspek hubungan yang mereka miliki dengan ibu kandungnya. Selama trimester kedua beberapa ibu hamil mengalami peningkatan dalam seks. Memang pada trimester kedua mereka yang relatif bebas dari perasaan tidak nyaman, kecemasan dan kekhawatiran yang dulu

pernah menimbulkan konflik pada ibu hamil kini mulai mereda dan menuntut kasih sayang dari pasangan dan keluarga (Rustikayanti 2016: 63).

c) Trimester III

Kehamilan pada trimester ketiga umumnya dianggap sebagai masa tunggu dengan kewaspadaan penuh. Selama tahap ini ibu hamil mulai mengenali kehadiran bayi sebagai makhluk yang terpisah sehingga menjadi tidak sabar dengan kehadiran bayi. Ibu hamil merasa tidak nyaman karena merasa canggung, tidak lagi merasa menarik. Oleh karena itu dukungan mitra sangat diperlukan. Peningkatan gairah seks pada trimester kedua menurun seiring dengan bertambahnya perut menjadi kendala untuk berhubungan seks (Rustikayanti 2016: 63).

6. Kebutuhan Dasar Pada Ibu Hamil

Untuk perkembangan janin yang optimal dalam proses tumbuh kembangnya janin harus mendapat asupan gizi yang lengkap baik berupa vitamin, mineral, kalsium, karohidrat, lemak, protein maupun mineral. nutrisi karena pada dasarnya selama kehamilan nutrisi yang berbeda yang kita konsumsi akan berpengaruh langsung pada kesehatan dan perkembangan bayi yang dikandung ibu. Selain nutrisi yang tepat kebutuhan dasar kehamilan juga perlu diperhatikan karena hal ini sangat mempengaruhi kondisi ibu baik fisik maupun psikis karena respon terhadap perubahan tersebut diterima tidaklah sama. Menurut Romauli (2011) kebutuhan dasar ibu hamil meliputi:

1. Kebutuhan Ibu Hamil Trimester I

- a) Diet dalam kehamilan Ibu dianjurkan untuk makan makanan yang mudah dicerna dan makan makanan yang bergizi untuk menghindari adanya rasa mual dan muntah begitu pula nafsu makan yang menurun. Pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi (150 mg besi sulfat, 300 mg besi glukonat), asam folat (0,4 - 0,8 mg/hari), kalori ibu hamil umur 23-50 tahun perlu kalori sekitar 23000 kkal, protein (74 gr/hari), vitamin dan garam mineral (kalsium, fosfor, magnesium, seng, yodium). Makan dengan porsi sedikit namun sering dengan frekuensi sedang. Ibu hamil juga harus cukup minum 6-8 gelas sehari.
- b) Pergerakan dan gerakan tubuh selain menyehatkan badan, dengan bergerak secara tidak langsung hal ini meminimalkan rasa malas pada ibu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berat bagi ibu selama hamil, bergerak juga mendukung sistem kerja tubuh ibu selama hamil sehingga ibu yang memiliki nafsu makan yang tinggi dan berat badan yang lebih dapat terkontrol dan meminimalkan terjadinya obesitas/ kegemukan selama hamil. Pergerakan badan ibu sebagai bentuk olahraga tubuh juga bermanfaat melatih otot-otot dalam ibu menjadi lebih fleksibel/ lentur sehingga memudahkan jalan untuk calon bayi ibu saat memasuki proses persalinan.
- c) Hygiene saat hamil, Ibu hamil bisa melakukan pekerjaan sehari-hari tetapi tidak boleh terlalu lelah sehingga harus istirahat di sela-selanya.

Ibu membutuhkan 8 jam istirahat pada malam hari dan 1 jam pada siang hari. Disarankan ibu harus menjaga kebersihan tubuh untuk mengurangi risiko infeksi minimal 2-3 kali sehari ibu mandi, kebersihan mulut juga perlu dijaga kebersihannya untuk memastikan rencana yang sempurna.

- d) Koitus Secara umum koitus diperbolehkan selama kehamilan jika dilakukan dengan hati-hati. Menjelang akhir kehamilan harus dihentikan karena dapat menyebabkan rasa sakit dan pendarahan. Pada wanita dengan riwayat abortus sebaiknya ibu menunda hubungan seksual sampai 16 minggu karena plasenta sudah terbentuk. Pola seksual pada trimester ketiga menjelang persalinan biasanya libido turun lagi bahkan lebih buruk daripada trimester pertama. Perut semakin membesar membatasi gerakan dan posisi nyaman saat berhubungan seks. Nyeri di punggung dan pinggul penambahan berat badan yang cepat pernapasan lebih cepat (karena janin besar menekan dada dan perut). Selain faktor fisik penurunan gairah seks juga dikaitkan dengan peningkatan kecemasan dan kegugupan menjelang persalinan. Padahal tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika lahir mati tidak disertai komplikasi. Seks harus diprioritaskan untuk menjaga kedekatan emosional daripada hiburan fisik karena pada trimester terakhir kontraksi kuat pada wanita hamil karena orgasme dapat terjadi. Biasanya bisa berlangsung sekitar 30 menit sampai menjadi tidak nyaman. Jika kontraksi lebih lama menyakitkan lebih kuat atau jika ada tanda-tanda lain bahwa persalinan akan segera dimulai. Namun jika tidak ada penurunan libido pada trimester ketiga ini

normal. Wanita hamil berhak mengetahui pola seksual karena dapat terjadi kontraksi kuat pada wanita hamil yang disebabkan oleh orgasme.

e) Ibu di beriimunisasi TT1 dan TT2 (Sartika, Nita. 2016:16)

2. Kebutuhan ibu hamil trimester II

a) Pakaian

Selama kehamilan disarankan untuk mengenakan pakaian yang nyaman yang terbuat dari bahan katun agar mudah menyerap keringat. Anjurkan ibu untuk tidak memakai sandal atau sepatu hak tinggi karena dapat menyebabkan nyeri pinggang.

b) Pola makan

Nafsu makan meningkat dan pertumbuhan cepat Ibu harus mengonsumsi protein, vitamin serta zat besi. Selama kehamilan kebutuhan zat besi meningkat drastis. Ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi 90 tablet Fe selama kehamilannya. Prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar disebabkan karena kurangnya tablet Fe. Efek samping tablet Fe kadang-kadang mual karena bau tablet tersebut, muntah, sakit perut, sulit buang air besar, tinja berwarna hitam tetapi tidak berbahaya. Waktu yang dianjurkan untuk minum tablet Fe adalah pada malam hari sebelum tidur untuk mengurangi rasa mual yang terjadi setelah ibu meminumnya.

c) Ibu di beriimunisasi TT3.

3. Kebutuhan ibu hamil trimester III

a) Nutrisi

Kecukupan gizi ibu hamil diukur berdasarkan pertambahan berat badan. Kalori untuk ibu hamil 300-500 kalori lebih banyak dari sebelumnya. Pertambahan berat badan juga meningkat pada trimester ini sekitar 0,3-0,5 kg/minggu. Kebutuhan protein juga lebih tinggi 30 gram dari biasanya.

b) Seksual

Seks pada trimester ketiga tidak berbahaya kecuali ada Riwayat sebagai berikut yaitu:

- 1) Pernah mengalami abortus
- 2) Riwayat perdarahan pervaginam
- 3) Terdapat tanda infeksi dengan adanya pengeluaran cairan disertai rasa nyeri dan panas pada jalan lahir. Meskipun ada beberapa indikasi bahaya berhubungan seks pada trimester ketiga bagi ibu hamil faktor lain yang mendominasi adalah penurunan gairah seksual pada trimester ini menjadi alasan. Sebagian besar ibu hamil tidak tertarik berhubungan seks dengan mitra mereka sudah sangat mengurangi kenyamanan disertai rasa tidak nyaman seperti nyeri punggung kelelahan terkadang merasakan rasa mual. Kembali sebelumnya ini yang secara psikologis mempengaruhi ibu di trimester III.

c) Istirahat cukup

Istirahat dan tidur yang teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental bermanfaat bagi kesehatan ibu dan pertumbuhan serta perkembangan janin dalam kandungan. Kebutuhan tidur efektif adalah 8 jam/hari.

d) Kebersihan diri (personal hygiene)

Sangat penting bagi ibu untuk menjaga kebersihan diri selama kehamilan hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis ibu. Kebersihan lain yang juga penting dalam merawat adalah mempersiapkan menyusui dan menggunakan bra yang lebar dan mendukung untuk membantu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi ibu.

e) Mempersiapkan kelahiran dan kemungkinan darurat

Bekerja sama dengan ibu, keluarga mereka dan komunitas untuk menyiapkan rencana kelahiran termasuk mengidentifikasi bidan dan tempat kelahiran serta rencana tabungan untuk mempersiapkan biaya kelahiran. Bekerja sama dengan ibu, keluarga dan masyarakat untuk menyiapkan rencana untuk situasi yang kompleks termasuk Menentukan ke mana harus pergi dan transportasi untuk sampai kesana. Menyiapkan pendanaan Membuat pengaturan keuangan utama. Identifikasi penentu kedua Jika keputusan pertama tidak ada ditempat.

f) Memberikan konseling tentang tanda-tanda persalinan.

Beberapa tanda-tanda persalinan yang harus diketahui:

- 1) Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur.
- 2) Keluar lender bercampur darah (show) yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada servik.
- 3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya.
- 4) Pada pemeriksaan dalam servik mendatar dan pembukaan telah ada.

7. Pandangan Islam Tentang Proses Kehamilan

Al-Quran membahas berbagai hal dalam kehidupan manusia dengan sangat hati-hati dan tepat jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan mereka termasuk proses kehamilan terjadi. Dalam Islam, proses Perkembangan janin dijelaskan oleh Allah SWT dalam banyak ayat di Al-Qur'an, salah satunya diterangkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah SWT berfirman:

عَلَّمَ خَلْقَنَا ثُمَّ مَكَّنَ قَرَارِي فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ طِينٍ مِّن سُلَالَةٍ مِّنَ الْإِنسَانِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ أَنَّهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظْمِ فَكَسَوْنَا عِظْمًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةَ النُّطْفِ الْخَالِقِينَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ مَا آخِرَ خَلْقًا أَنش

Terjemahnya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. al-Mukminun ayat 12-14)”

Adapun Tafsir dari Surah Al-Mukminun dari ayat 12-14 yaitu :

1. Tafsir Al-Muyassar

(12) “Dan sungguh kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi.”

(13) “Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nuthfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam Rahim-rahim kaum wanita.”

(14) “Kemudian kami menciptakan nuthfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari, kami ciptakan alaqah itu menjadi mudhghah, yaitu gumpalan daging sebesar satu suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Mahaberkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu.”

2. Tafsir Al-Mukhtashar

(12) “Dan sungguh kami telah ciptakan ayah dari seluruh manusia, Adam, dari tanah. Tanah penciptaannya berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah.”

(13) “Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya.”

(14) “Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah, lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah, lalu gumpalan daging tersebut kami jadikan tulang-belulang mengeras, lalu tulang-belulang tersebut kami bungkus dengan daging, lalu kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkan kepadanya ruh, dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.”

3. Tafsir Al-Wajiz

(12) “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari tanah.”

(13) “Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim dalam perut perempuan.”

(14) “Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia janin yang berbentuk sempurna yaitu

berupa makhluk dengan bentuk lain. Kemudian kami tiupkan ruh kedalamnya sehingga lahir dalam keadaan hidup. Maha Agung dan Maha Suci Allah dalam kekuasaan dan hikmah-Nya. Pencipta dan penguasa yang paling baik. Alkhalq adalah berhubungan dengan pengadaan dan pentakdiran, yang dimaksud disini adalah makna kedua.

4. Tafsir Zabdatut

(12) “(dari suatu saripati (berasal) dari tanah) yakni dari air mani yang dikeluarkan oleh manusia yang berasal dari tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam.”

(13) “(Kemudian kami jadikan saripati itu). Dilihat dari sisi diri mereka yang merupakan keturunan Nabi Adam. (Air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh) yakni dalam rahim).

(14) “(Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah) Yakni Allah merubah air mani yang putih menjadi segumpal darah yang merah. (lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging) Yakni segumpal daging yang belum terbentuk, kemudian menjadi segumpal daging yang terbentuk, kemudian menjadi segumpal daging yang terbentuk pada fase selanjutnya. (dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang) Yakni tulang yang mengeras agar menjadi penopang badan dengan bentuk-bentuk yang tersendiri. (lalu tulang belulang-belulang itu kami bungkus dengan daging) Yakni Allah menumbuhkan daging pada setiap tulang sesuai dengan ukuran yang sesuai. (Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain) Yakni kami tiupkan ruh kepadanya yang

sebelumnya hanyalah benda mati, kemudian Allah mengeluarkannya ke dunia disertai dengan kemampuan yang telah diciptakan baginya. (Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik).

B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum

1. Definisi Hiperemesis Gravidarum

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena keadaan umumnya menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi. Hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan wanita hamil, namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir (Arisdiani & Dwi, 2020).

Hiperemesis adalah mual dan muntah yang terjadi pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 20 minggu (tim Fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran, 2017).

Hiperemesis gravidarum adalah gejala yang wajar atau sering terdapat pada kehamilan trimester pertama. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi ada yang timbul setiap saat dan malam hari. Gejala-gejala ini biasanya terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung kurang lebih 10 minggu (Nurul & Reza, 2018).

Hiperemesis gravidarum adalah emesis gravidarum yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala klinis serta mengganggu kehidupan sehari-hari (Arantika dkk, 2019).

Menurut verberg, Gillott Al-Fardan & Grudzinskas 2005, dalam buku Arisiani dan Hastuti 2020 Hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan wanita hamil. Namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat bayi rendah, kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir.

Ibu yang mengalami mual muntah biasanya cenderung malas makan. Padahal ibu hamil memerlukan asupan nutrisi yang lebih. Selain untuk kesehatan dirinya, juga untuk janinnya agar tetap sehat. Dalam batas- batas tertentu, keadaan ini masih fisiologis. Namun, bila sangat sering dan mengganggu aktifitas sehari-hari ibu hamil, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Hal inilah yang kemudian disebut dengan hiperemesis gravidarum (Rukiyah, Y, 2019: 79).

Ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum sebagian besar mengatakan mengalami kehilangan nafsu makan lemas dan panas hingga menjalani perawatan di rumah sakit (Triani & Hastuti, 2020).

Keadaan hiperemesis gravidarum yang tidak mendapatkan perhatian dari pihak keluarga maka dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi dari ibu hamil dan secara berkepanjangan akan menimbulkan resiko pada janin ibu (Susanti, Firdayanti & Haruna, 2019).

Dukungan anggota keluarga merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk membantu ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi ibu hamil, dukungan sosial yang utama dari pihak keluarga serumah (Rofi'ah, Widatiningsih & Arfiana, 2019).

Dukungan keluarga seperti dukungan sosial sangat membantu ibu hamil dalam menyesuaikan diri menghadapi tekanan dan konflik yang timbul akibat evolusi fisik serta psikologis semasa hamil, tinggi rendahnya penyesuaian ibu selama kehamilan relevan dengan dukungan keluarga yang di butuhkan (Astuti, Santosa & Utami, 2020).

Adapun pandangan islam tentang hiperemesis gravidarum. Allah berfirman dalam Q.S Luqman ayat 14 yang berbunyi :

كُرْآنِ عَامِينَ فِي وَفِصْلُهُ رُوْهِنِ عَلٰی وَهِنًا مُّهُرَحَمَلْتَهُ بِوَالِدِيْهِ الْاِنْسَانِ وَوَصِيْنَا
الْمَصِيْرُ اِلٰی وَلِوَالِدِيْكَ لِيْ اَشَدَّ

Terjemahnya :

“ Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Adapun Tafsir dari Surat Luqman ayat 14 yaitu :

i. Tafsir Al-Muyassar

(14) “Dan kami memerintahkan manusia agar berbakti dan berbuat baik kepada bapak ibunya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah diatas kelemahan, mengandungnya dan menyapihnya setelah menyusuinya selama dua tahun. Kami berfirman kepadanya, “bersyukurlah kepada Allah kemudian

berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku-lah kalian akan kembali, lalu aku akan membalas masing-masing sesuai haknya.”

ii. Tafsir Al-Mukhtashar

(14) “Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar menaati kedua orang tuanya dan berbakti kepada keduanya dalam urusan yang bukan maksiat terhadap Allah. Ibunya telah mengandungnya di dalam perutnya dengan berbagai kesusahan yang terus menerus, kemudian menyapihnya dari penyusuan setelah dua tahun. Dan kami katakan kepadanya. Bersyukurlah kepada Allah atas kenikmatan yang telah Dia berikan kepadamu, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu atas pendidikan dan perhatian yang telah mereka berikan kepadamu, hanya kepada-Ku sajalah tempat kembali kalian, kemudian masing-masing aku beri balasan sesuai dengan haknya.”

iii. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah

(14) “Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan bertambah lemah setiap harinya ketika kandungannya semakin besar dan mendekati kelahiran. Dan dia disapih dari susuan dalam waktu dua tahun. Dan kami perintahkan manusia untuk bersyukur kepada-Ku atas kenikmatan yang telah aku berikan, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu yang telah bekerja keras dalam mengasuhmu. Hanya kepada-Ku tempat kembali para makhluk pada hari kiamat untuk menjalani hisab.”

iv. Tafsir Zubdatut

(14) “(Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak), Allah menyandingkan rasa syukur bagi kedua orangtua dengan rasa syukur kepada Allah, dan ini menunjukkan bahwa hak kedua orangtua adalah salah satu hak yang paling besar yang ditanggung oleh seorang anak. (Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) yakni ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang lemah, kemudian bertambah lemah karena kehamilannya. (dan menyapihnya dalam dua tahun) Yakni penyapihannya. (Bersyukurlah kepada-Ku dan kedua orang ibu bapakmu) Ini merupakan isi dari wasiat Allah terhadap kedua orangtua. (hanya kepada-Kulah kembalimu) Dan tidak kepada selain-Ku, maka perhatikanlah apakah kamu telah menjalankan wasiat-Ku dengan sebenarnya?”

v. Tafsir Al-Wajiz

(14) “Juga kami perintahkan mereka para manusia untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.”

Ayat tersebut di atas menurut penulis sangat berkaitan dengan kasus hiperemesis gravidarum, karena pasien dengan hiperemesis gravidarum memiliki kondisi fisik yang sangat lemah, ibu terus mengalami mual muntah dan merasa enggan untuk makan sehingga mengakibatkan keadaan umum ibu

lebih buruk bahkan pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat III pasien dapat mengalami koma ataupun kematian (Shihab, 2002).

2. Etiologi Hiperemesis Gravidarum

Faktor yang dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum ini secara pasti belum diketahui. Ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil yaitu ibu hamil anak pertama (primigravida), hamil dengan riwayat mola hidatidosa serta hamil kembar/ganda (Kemenkes RI 2019, n.d.). Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik, juga tidak ditemukan kelainan biokimia. Perubahan-perubahan anatomik pada otak, jantung, hati, dan susunan saraf, disebabkan oleh kekurangan vitamin serta zat-zat lain akibat inanisi. Menurut (Khayati, 2013) terdapat beberapa faktor predisposisi dan faktor lain, yaitu :

a) Faktor predisposisi

Primigravida, overdistensi rahim (hidramnion, kehamilan ganda, estrogen dan HCG tinggi, mola hidatidosa).

b) Faktor organik

Masuknya vilikhorialis dalam sirkulasi maternal, perubahan metabolik akibat hamil, resistensi yang menurun dari pihak ibu dan alergi.

c) Faktor psikologis

Rumah tangga yang retak, hamil yang tidak diinginkan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dan kehilangan pekerjaan. Seperti pada ayat dibawah ini :

سَخَلَةَ جِدْعٍ إِلَى الْمَخَاضِ فَأَجَاءَهَا ﴿٢٢﴾ قَصِيًّا مَكَانًا بِهِ ؕ فَانْتَبَذَتْ فَحَمَلَتْهُ ﴿٢٣﴾
 فِي الْأُتْحَةِ آمِنٍ فَنَادَىٰ لَهَا ﴿٢٤﴾ مَنَسِيًّا نَسِيًّا وَكُنْتَ هَذَا قَبْلَ مِتُّ يَلِيَّتِي قَالَتْ أَلَمْ
 سَرِيًّا تَحْتِكِ رَبُّكَ جَعَلَ قَدْ تَحْزَنُ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya :

“Maka Maryam mengandungnya (hamil), lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: ‘Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan’. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: ‘Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu’. QS. Maryam/19: 22-24 .

Adapun Tafsir dari Surat Maryam ayat 22-24 yaitu :

1. Tafsir Al-Muyassar

(22) “Maka Maryam mengandung seorang anak lelaki sesudah Jibril meniup leher bajunya. Tiupan itu menuju rahimnya, maka terjadilah kehamilan dengan sebab tersebut. Lalu dia mengasingkan diri ditempat yang jauh dari manusia.”

(23) “Rasa kontraksi untuk melahirkan memaksanya berhenti pada sebatang pohon kurma. Lalu dia berkata, “aduhai, alangkah baiknya bila aku mati saja sebelum hari ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak dikenal juga tidak disebut-sebut, serta tidak diketahui siapa aku sebenarnya.”

(24) “Maka Jibril atau Isa memanggilnya, “janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu yang engkau bisa meminumnya.”

2. Tasfir Al-Mukhtashar

(22) “Maka diapun mengandung setelah malaikat meniupkan penciptaan janin padanya, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya tersebut ketempat yang jauh dari manusia.”

(23) “Kemudian ia pun ditimpa rasa sakit melahirkan, sehingga memaksanya untuk bersandar pada pohon kurma. Maryam berkata, “duhai, alangkah baiknya bila aku mati sebelum hari ini, dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan agar aku tidak disangka berbuat buruk”.

(24) “Maka Isa menyerunya dari bawah kedua kakinya, “Janglah engkau bersedih!! Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu yang engkau bisa meminum darinya.”

3. Tafsir Zubdatut

(22) “(Maka Maryam mengandungnya) Maka Jibril meniupkan kearah saku dari pakaiannya, sampai tiupan itu sampai ke perutnya, dan akhirnya dia hamil. (lalu ia menysihkan diri dengan kandungannya itu ketempat yang jauh) Menjauhkan diri ketempat yang jauh.”

(23) “(Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia) Yakni rasa sakit ketika melahirkan. ((bersandar) pada pangkal pohon kurma) Yakni memaksanya untuk menuju ke batang pohon kurma kering, berharap mendapat sesuatu yang dapat digunakan untuk bersandar sebagaimana orang

hamil yang bersandar karna rasa sakit saat melahirkan. (dia berkata : “aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini) Maryam berharap kematian karena takut akan dikira telah berbuat keburukan menurut agamanya. (dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan”) yakni sesuatu yang remeh yang terlupakan dan tidak menimbulkan kesedihan jika hilang, seperti barang semisal benang atau tali.”

(24) “(Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah) Yakni Jibril yang berada dibukit kecil menyeru Maryam setelah dia mendenagar perkataanya. Pendapat lain mengatakan bahwa Jibril berada dibawah pohon kurma. Dan pendapat lain mengatakan orang yang menyeru adalah Isa. (sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu) Maknanya adalah sungai kecil. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah Isa karna makna lain dari lelaki yang agung.”

4. Tafsir Al-Wajiz

(22) “Kemudian Jibril meniup saku baju Maryam, sehingga tiupannya sampai kepada perutnya. Maka Maryam menjadi hamil, lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ketempat yang jauh hingga tidak ada yang melihatnya.”

(23) “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, dia berkata : “aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, sebab malu dan takut atas cacian orang-orang. Sehingga aku menjadi orang yang tidak berarti, dan dilupakan”

(24) “Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah : “Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu yang bisa kamu gunakan untuk minum.”

5. Tafsir Ash-Shaghir

(22) “(Maka dia mengandungnya, lalu mengasingkan diri bersamanya) mengasingkan diri dengan keadaan hamil (ke tempat yang jauh) jauh dari manusia.”

(23) “(Rasa sakit melahirkan (memaksanya) memaksanya (pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, “alangkah sebaiknya aku mati sebelum ini dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan”) sesuatu yang diabaikan, tidak dikenal, dan tidak diingat.”

(24) “(Dia berseru kepadanya dari tempat yang rendah) lalu Isa menyerunya dari bawah kedua kakinya (“janganlah bersedih. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan dibawahmu anak sungai.)Anak sungai yang bisa kamu gunakan untuk minum).”

3. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum

Studi genetik yang lebih baru menghubungkan HG dengan sindrom muntah siklik karena hubungan dengan gen reseptor ryanodine, RYR2, yang diekspresikan di pusat muntah dan terlibat dalam fungsi tiroid. Juga terkait adalah gen plasenta IGFBP7 dan GDF Konsentrasi protein serum dari gen-gen ini meningkat secara signifikan pada usia kehamilan 12 minggu pada wanita yang dirawat di rumah sakit karena HG dibandingkan dengan wanita yang melaporkan NVP normal. Wanita dengan tingkat tinggi IGFBP7 lebih cenderung

memiliki gejala HG yang berkepanjangan, mungkin karena IGF1 yang menyebabkan keengganan terhadap makanan yang biasanya menarik, bahkan selama kelaparan. GDF15 adalah hormon yang mengatur berat badan dan nafsu makan, dan kelebihan produksi yang tidak normal GDF15 pada kanker adalah pendorong utama cachexia, penyebab utama kematian di antara pasien dengan kanker. Jadi, jika seorang wanita dengan HG mengatakan dia merasa seperti sedang sekarat, dia mungkin melakukannya. Pengembangan pengujian genetik untuk gen ini mungkin menawarkan alat skrining yang berharga untuk mengidentifikasi pasien HG yang paling membutuhkan perawatan proaktif (Kimber, 2020).

Hiperemesis gravidarum yang merupakan komplikasi mual dan muntah pada hamil muda terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak seimbangnya elektrolit dengan alkalosis hipokloremik. Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton-asetik, asam hidroksibutirik dan aseton dalam darah. Kekurangan volume cairan yang diminum dan kehilangan karena muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstra seluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida air kemih turun. Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah berkurang. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal menambah frekuensi muntah lebih banyak, dapat merusak hati dan terjadilah lingkaran yang sulit dipatahkan. Selain dehidrasi dan terganggunya

keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lender esophagus dan lambung (Sindroma Mallory Weiss) dengan akibat perdarahan gastrointestinal (Khayati, 2013).

Patofisiologi HG tetap menjadi bidang penelitian aktif. Tidak ada mekanisme tunggal yang diidentifikasi sebagai penyebab NVP atau HG. Beberapa etiologi, bagaimanapun, telah diusulkan sebagai faktor potensial yang berkontribusi. Kemungkinan kombinasi dari faktor-faktor ini bertanggung jawab atas timbulnya penyakit (Kerstin, 2019)

4. Gejala Klinis Hiperemesis Gravidarum

Tanda gejala Hiperemesis Gravidarum Menurut (Khayati, 2013), Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil, yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing, lemas, dan mengalami dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa :

- a) Sakit kepala
- b) Konstipasi
- c) Sangat sensitif terhadap bau
- d) Produksi air liur berlebihan
- e) Inkontinensia urine
- f) Jantung berdebar

Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis pakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan timbulnya asam seton-asetik, asam hidroksibutirik dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan karena muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang natrium dan klorida darah turun, demikian pula klorida air kemih. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah zat makanan dan oksigen jaringan berkurang pula dan timbulnya zat metabolik yang toksik (Rukiyah & Yulianti, 2019)

5. Klasifikasi Hiperemesis Gravidarum

Klasifikasi Hiperemesis Gravidarum Menurut (Khayati, 2013) :

a) Tingkat I

- 1) Ibu merasa lemah
- 2) Muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum
- 3) Nafsu makan tidak ada
- 4) Berat badan menurun, temperatur tubuh meningkat
- 5) Nadi meningkat sekitar 100 per menit dan tekanan darah sistolik menurun
- 6) Turgor kulit berkurang
- 7) Lidah mengering mata cekung
- 8) Merasa nyeri pada epigastrium

b) Tingkat II

- 1) Ibu tampak lebih lemah dan apatis
- 2) Berat badan turun
- 3) Tensi turun, nadi kecil dan cepat
- 4) Suhu kadang-kadang naik
- 5) Mata sedikit ikterik dan cekung
- 6) Turgor kulit lebih mengurang
- 7) Lidah mengering dan tampak kotor
- 8) Hemokonsentrasi, oliguria, konstipasi
- 9) Aseton tercium dalam hawa pernapasan, karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing

c) Tingkat III

- 1) Keadaan umum lebih parah
- 2) Muntah berhenti
- 3) Kesadaran menurun dari somnolen sampai koma
- 4) Nadi kecil dan cepat
- 5) Suhu meningkat
- 6) Tensi menurun
- 7) Mulut kering dan kotor, pernapasan bau aseton
- 8) Mata cekung dan timbulnya icterus

6. Komplikasi

Kondisi hiperemesis gravidarum seringkali dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam keluarga ibu hamil, sesungguhnya keadaan tersebut lebih

berbahaya atau parah dan lebih dari pada mornig sickness. Hiperemesis gravidarum bukan hanya memiliki resiko yang jauh lebih berbahaya karena akan berdampak langsung kepada janin hingga terjadi abortus atau keguguran, prematur, BB LR, dan yang paling ringan yaitu mal-formasi janin (Yusuf & Sri, 2018).

Menurut Setiawan (2007) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2019), Kemungkinan efek pada ibu dan janin seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan membuat tubuh ibu lemas dan lelah selain itu menyebabkan gangguan asam basa, pneumonia aspirasi, rupturesophagus, kerusakan hati danginjal mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang menyebabkan penurunan sirkulasi darah janin.

Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah Lia Yulianti (2019), mengatakan bahwa pada bayi baru lahir jika hiperemesis ini hanya terjadi pada tahap awal kehamilan tidak akan terlalu berpengaruh tetapi jika selama kehamilan ibu mengalami hiperemesis gravidarum kemungkinan bayinya mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), prematur hingga terjadi abortus. Seperti diketahui Hiperemesis gravidarum menyebabkan pengentalan darah (hemokonsentrasi) kemudian memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi O₂ dan makanan berkurang sehingga pertumbuhan janin akan terhambat, sehingga mendorong terjadinya terminasi kehamilan lebih dini. Pola makan ibu selama hamil dan status gizi ibu selama hamil sangat erat hubungannya dengan berat badan lahir

rendah. Jika makanan ibu kurang dan status gizi ibu buruk sangat mungkin terjadi BBLR (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2019).

7. Diagnosis

Diagnosis dibuat berdasarkan gejala klinis yang khas dan jika perlu hasil tes laboratorium. Muntah yang tidak membaik dengan pengobatan sering diduga karena penyakit lain seperti gastritis, kolesistitis, pankreatitis, hepatitis, ulkus peptikum, pielonefritis dan fatty liver (Marta adi soebrata dkk, 2013: 71)

Diagnosis hiperemesis gravidarum ditegakkan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang

a) Anamnesis

Dari anamnesis ditemukan adanya amenorea, tanda awal kehamilan, mual dan muntah. Kemudian selidiki kembali apakah mual dan muntah terus-menerus, dipicu oleh makanan tertentu dan mengganggu aktivitas sehari-hari pasien. Selain itu dari riwayat kesehatan juga dapat diperoleh informasi mengenai masalah yang berhubungan dengan terjadinya mual (hiperemesis gravidarum) seperti stres lingkungan sosial pasien asupan gizi dan riwayat kesehatan (hipertiroid, gastritis, penyakit hati, diabetes mellitus, dan tumor serebri).

b) Pemeriksaan Fisik

Selama pemeriksaan fisik perhatikan keadaan umum pasien tanda vital tanda dehidrasi dan besarnya kehamilan. Selain itu pemeriksaan tiroid dan abdomen juga harus dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis banding.

c) **Pemeriksaan Penunjang**

pemeriksaan penunjang dilakukan untuk membantu memastikan diagnosis dan menyingkirkan diagnosis banding. Pemeriksaan yang dilakukan adalah darah lengkap, urinalisis, glukosa darah, elektrolit, USG (pemeriksaan dasar), analisis gas darah, tes fungsi hati dan ginjal (Widayana, 2013: 6-7).

8. Pencegahan Hiperemesis Gravidarum

Pencegahan hiperemesis gravidarum harus dilakukan dengan memberikan informasi tentang kehamilan dan persalinan sebagai proses fisiologis, memastikan bahwa mual dan kadang-kadang muntah merupakan gejala fisiologis pada tahap awal kehamilan dan akan hilang setelah satu bulan kehamilan dianjurkan untuk mengubah pola makan sehari-hari dengan sejumlah kecil makanan. tapi lebih sering. Ketika Anda bangun di pagi hari Anda tidak boleh langsung bangun dari tempat tidur, tetapi makanlah roti kering atau kue kering dengan teh hangat. Makanan berlemak harus dihindari. Makanan dan minuman harus disajikan panas atau sangat dingin. Defekasi yang teratur perlu dipastikan menghindari kekurangan karbohidrat adalah faktor terpenting itulah sebabnya makanan tinggi gula dianjurkan.

C. Tinjauan Khusus Tentang Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

1. Definisi

Menurut Wiknjosastro (2005) dalam (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2019) Hiperemesis gravidarum tingkat 1 berhubungan dengan mual dan muntah berlebihan pada ibu hamil tetapi masih tergolong hiperemesis ringan, yang

ditandai dengan muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum pasien, penurunan berat badan dan nyeri epigastrium.

2. Tanda Dan Gejala

Gejala klinis Hiperemesis Gravidarum Tingkat I adalah kepalapusing pusing terutama pagi hari, disertai mual dan muntah sampai umur kehamilan berumur 4 bulan. Adapun gejala dan tingkat Hiperemesis Gravidarum Tingkat I sebagai berikut :

- a) Mual dan muntah membuat penderita merasa lemas
- b) Tidak mau makan
- c) Berat badan turun
- d) Terasa nyeri di epigastrium
- e) Nadi sekitar 100 kali/menit
- f) Tekanan darah turun
- g) Turgor kulit kurang
- h) Lidah kering
- i) Mata cekung.

3. Patofisiologi

Rasa mual disebabkan oleh banyak faktor yang berbeda, keluhan ini terjadi pada trimester pertama. Penyesuaian terjadi pada sebagian besar wanita hamil meskipun mual dan muntah dapat bertahan selama berbulan-bulan. Hiperemesis gravidarum tingkat I merupakan komplikasi mual dan muntah pada ibu hamil muda yang bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan ketidak

seimbangan elektrolit dengan alkalosis hipokloremik. Tidak diketahui mengapa gejala ini hanya terjadi pada sebagian kecil wanita, dimana faktor psikologis merupakan faktor utama selain, pengaruh hormonal yang jelas, wanita sebelum hamil mengalami lambung spastik disertai gejala keengganan untuk makan, dan mual akan mengalami morning sickness yang lebih parah selama kehamilan.

Hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan simpanan karbohidrat dan lemak Anda kehabisan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, ketosis terjadi ketika asam asetoasetat, asam hidroksibutirat, dan aseton menumpuk di dalam darah. Dehidrasi karena minum dan dehidrasi karena muntah menyebabkan dehidrasi, pengurangan cairan ekstraseluler dan plasma. Natrium klorida dalam darah serendah klorida dalam urin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan homokonsentrasi, yang mengurangi perfusi jaringan. Hal ini menyebabkan berkurangnya pasokan nutrisi dan oksigen ke jaringan dan akumulasi metabolit beracun. Kekurangan kalium akibat peningkatan muntah dan ekskresi dari ginjal, peningkatan muntah dapat merusak hati, selain itu dehidrasi dan kehilangan elektrolit, dan robekan pada mukosa esofagus dan lambung (sindrom Mallory-Weiss). Dapat terjadi perdarahan gastrointestinal. Secara umum, air mata ini ringan dan pendarahan jarang berhenti secara spontan. Sampai transfusi atau tindakan operatif.

4. Penatalaksanaan

Sebagai tenaga kesehatan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat bidan perlu mewaspadaai tanda dan gejala hiperemesis gravidarum agar dapat dicegah dan dideteksi sejak dini. Jika ibu ditemukan mengalami dehidrasi dengan

penurunan tingkat kesadaran lakukan penatalaksanaan awal dengan tujuan menstabilkan ibu sebelum melanjutkan. Tenaga kesehatan lain yang berwenang di unit layanan yang lebih tinggi akan menerima perawatan tambahan (Iriantietal. 2014: 70)

Pasien dengan mual dan muntah ringan disarankan untuk makan dalam porsi kecil. Tidak perlu menganjurkan makanan tertentu yang dianggap sehat karena bagi ibu hamil dengan komplikasi hiperemesis gravidarum makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang terbaik.

Meski begitu makanan berlemak tetap dilarang bagi penderita hiperemesis gravidarum karena seringkali bisa menyebabkan mual. Makanan tersebut diselingi dengan snack berupa biskuit, roti kering dengan teh sebelum bangun tidur siang hari dan sebelum tidur.

Menurut Manuaba (2012) Penggunaan obat untuk penderita hiperemesis gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Sebaiknya memilih obat yang tidak teratogenik (dapat menyebabkan cacat lahir – kelainan kongenital). Adapun komponen/susunan obat yang boleh diberikan adalah:

- a) Antialergi (AntiHistamin, Dramamin, Avomin)
- b) Obat antimual-muntah (Mediamer B6, Emetrole, Stimetil, Avopreg)
- c) Sedatif ringan (Fenobarbital [luminal] 30 mg, Valium)

5. Diagnosis

Diagnosis Hiperemesis Gravidarum Tingkat I biasanya tidak terlulusukar, karena penyakit ini berkaitan dengan gestose (gestatio-hamil) yaituhanya terdapat pada ibu hamil dengan Hipe dengan Hiperemesis Gravidarum Tingakt I

merupakan gestose yang masih ringan dan bertambahnya emesis dapat mengakibatkan gangguan kehidupan sehari-hari. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I yang berlangsung lama dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang janin.

6. Kriteria

a) Usia

Usia ibu dapat menjadi salah satu faktor terjadinya hiperemesis gravidarum, dimana pada usia yang kurang dari 20 tahun atau usia yang lebih dari 35 tahun lebih sering mengalaminya. Usia yang kurang dari 20 tahun dipengaruhi oleh keadaan psikologis pasien, sedangkan usia yang lebih dari 35 tahun merupakan kategori usia berisiko untuk ibu hamil.

Ibu hamil yang berusia dibawah 20 tahun lebih dikarenakan kematangan fisik yang belum mencukupi, belum matangnya mental dan fungsi sosial calon ibu sehingga menimbulkan keraguan dalam perawatan, pengasuhan, dan pemberian cinta kasih bagi anak yang akan dilahirkan nanti. Hal tersebut mempengaruhi emosional ibu dan terjadilah konflik mental sehingga nafsu makan menjadi berkurang. Akibatnya, terjadi iritasi lambung yang bereaksi pada impuls motorik yang merangsang pusat muntah, yaitu melalui saraf otak kesaluran cerna bagian atas dan melalui saraf spinal kediafragma dan otot abdomen sehingga terjadi muntah. Ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun juga dipengaruhi oleh kejiwaan ibu hamil, hal ini dikarenakan ketidaksiapan untuk hamil atau bahkan tidak menginginkan kehamilannya lagi sehingga ibu hamil merasa tertekan dan menimbulkan stres. Stres tersebut akan

mempengaruhi hipotalamus dan merangsang pusat muntah di otak sehingga terjadi kontraksi pada otot abdomen dan dada disertai penurunan diafragma menyebabkan tingginya tekanan dalam lambung, tekanan yang tinggi dalam lambung itu akan memaksa ibu untuk menarik nafas dalam-dalam sehingga membuat sfingter esophagus bagian atas terbuka dan sfingter bagian bawah berelaksasi, sehingga memicu mual muntah. Pada wanita yang berusia lebih dari 35 tahun juga akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh yang menjadi risiko bila ibu sedang hamil.

b) Paritas

Pada primigravida lebih banyak mengalami hiperemesis gravidarum dibandingkan dengan multigravida. Hal ini masih berhubungan dengan kondisi psikologi ibu hamil dimana pada kehamilan pertama ibu hamil cenderung mengalami stres yang akan berpengaruh pada lambung ibu. Suatu studi menunjukkan bahwa primigravida lebih berisiko mengalami mual dan muntah dibandingkan dengan multigravida dan grandemultigravida, yaitu 53,5% pada primigravida, 36,4% pada multigravida, dan 11,1% pada grandemultigravida.

Hal ini berkaitan dengan tingkat stres dan usia ibu saat mengalami kehamilan pertama. Pada ibu dengan primigravida, faktor psikologik sangat berpengaruh pada penyakit ini, adanya rasa takut akan kehamilan dan persalinan, rasa takut akan tanggungjawab menjadi seorang ibu yang dapat menyebabkan konflik mental sehingga memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai

pelarian kesukaran hidup. Penelitian yang lain menunjukkan bahwa kejadian hiperemesis gravidarum untuk paritas grandemultigravida disebabkan oleh terjadinya penurunan fungsi organ tubuh yang menyebabkan berkurangnya daya tahan tubuh dapat menimbulkan berbagai faktor risiko selama hamil.

c) Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang direncanakan untuk memberi pengaruh pada orang lain, baik itu individu, kelompok atau pun masyarakat, sehingga orang tersebut terpengaruh termasuk juga berperilaku dalam menerapkan pola hidup sehat. Pendidikan sangat berpengaruh pada setiap orang, terlebih mengenai perilaku pola hidup dalam memotivasi untuk siap berperan serta dalam perubahan kesehatan. Rendahnya pendidikan seseorang akan membuat seseorang memiliki keinginan yang kecil untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan serta menerima informasi, dan sebaliknya makin tingginya pendidikan seseorang, makin mudah untuk menerima informasi dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

d) Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini dihubungkan dengan keadaan status sosial ekonomi dan infeksi *Helicobacter pylori*. *Helicobacter pylori* merupakan jenis bakteri gram negatif yang berbentuk spiral dan banyak ditemui pada penduduk di negara-negara berstandar ekonomi rendah dan memiliki kualitas kesehatan yang buruk. Ibu hamil dengan status sosial ekonomi rendah menjadi faktor risiko untuk terinfeksi karena ibu yang tidak bekerja memiliki

pendapatan yang rendah dan dapat terjadi perubahan pada imun. Hal ini dikarenakan asupan nutrisi yang tidak cukup bergizi, sehingga mudah terinfeksi. Hal ini dikaitkan dengan aktivitas ke tempat kerja yang mungkin terburu-buru sehingga waktu untuk sarapan tidak cukup dan dapat menyebabkan mual dan muntah. Hal ini juga tergantung pada sifat pekerjaan, lingkungan, ada tidaknya aroma atau zat kimia yang dapat menambah rasa mual wanita dan menyebabkan mereka muntah dan juga dikaitkan dengan jenis pekerjaan ibu hamil. Beban pikiran untuk wanita pekerja juga berpengaruh ke kondisi psikologis yang memperberat gejala dari hiperemesis gravidarum.

D. Tinjauan Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh bidan untuk memberikan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

2. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Proses manajemen adalah proses pemecahan masalah menggunakan pendekatan terorganisir yang melibatkan pemikiran dan tindakan dalam urutan logis untuk kepentingan pasien dan pemberian asuhan.

Definisi manajemen asuhan kebidanan dan prosesnya harus diklarifikasi untuk memberikan pemahaman yang sama. Helen Varney (2003) menyatakan bahwa proses manajemen terdiri dari 7 langkah berurutan yang diselesaikan

secara berkala. Dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan evaluasi. Langkah 7 Varney adalah kerangka umum yang berlaku di semua situasi. Kemudian setiap langkah dapat dipecah menjadi tugas-tugas teratas yang berbeda tergantung pada kondisi pasien. Harus diakui bahwa langkah-langkah ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pasien atau keluarga pasien. Tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Helen Varney (2003) yaitu :

a) Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

Langkah pertama merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang pasien. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber diharapkan dapat memberikan informasi yang paling akurat dan dapat diperoleh dengan cepat serta upaya sekecil mungkin. Data secara garis besar diklasifikasikan menjadi data subjektif dan data objektif. Untuk kasus hiperemesis gravidarum, beberapa data yang diperlukan adalah : Data Subjektif (Identitas pasien, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat KB, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari).

Data Objektif (Keadaan umum, kesadaran, tinggi badan, berat badan, LILA (Lingkar Lengan Atas), pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik sistematis) selain itu pemeriksaan penunjang sangat membantu dalam menegakkan diagnosa yaitu pemeriksaan laboratorium, apabila ibu menderita

hiperemesis gravidarum maka akan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa protein, aceton, urobilinogen, porphyrin dalam urine bertambah, silinder+.

b) Langkah II (Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan penentuan terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi data yang terkumpul. Data yang mendasari yang telah dikumpulkan diinterpretasikan untuk menemukan masalah atau diagnosis tertentu.

Pada kasus hiperemesis gravidarum, jika telah mendapatkan data subjektif dari ibu berupa Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) ibu (agar dapat ditentukan usia kehamilan), ibu merasa mual dan muntah yang hebat, ibu memuntahkan segala apa yang ia makan, nyeri epigastrium dan pada data Objektif didapatkan KU ibu yang lemah, kesadaran masih composmentis, tekanan darah menurun, nadi meningkat, turgor kulit berkurang, mata cekung, ibu tampak pucat maka ibu didiagnosa mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I. Seorang ibu hamil yang memuntahkan segala apa yang dimakan dan diminum hingga berat badan sangat turun, turgor kulit kurang, diuresis kurang dan timbul aceton dalam air kencing, maka keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum dan memerlukan perawatan di rumah sakit.

c) Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Langkah ketiga ini bertujuan untuk mengantisipasi semua kemungkinan tidak diinginkan yang dapat muncul sewaktu-waktu. Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan

diagnosis yang sudah diidentifikasi. Pada kasus hiperemesis gravidarum, diagnosa potensial yang mungkin terjadi pada ibu dan janin adalah ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah dapat pula mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa pada hubungan gastroesofagi yang menyebabkan peredaran rupturesophagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang. Selain itu diagnosa potensial dari hiperemesis gravidarum tingkat I ialah antisipasi terjadinya hiperemesis gravidarum tingkat II.

d) Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Tindakan segera adalah tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan ataupun dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi pasien. Pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I tindakan segera dilakukan apabila di dapati ibu mengalami penurunan kesadaran menjadi apatis, kemudian pada pemeriksaan fisik didapati nadi cepat dan kecil lidah kering dan kotor, mata sedikit ikterik, aseton tercium dalam hawa pernafasan. Selanjutnya pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I kolaborasi dengan dokter dilakukan dalam hal pemberian obat-obatan dan vitamin.

e) Langkah V (Merencanakan Asuhan Kebidanan)

Langkah ini merupakan rencana asuhan menyeluruh terhadap langkah-langkah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori terbaru, evidencebasedcare, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan. Sebaiknya pasien dilibatkan dalam perencanaan asuhan karena pada akhirnya keputusan dilakukan atau tidaknya tindakan berada di tangan pasien. Pada pasien hiperemesis gravidarum langkah ini dilakukan berdasarkan tingkatan hiperemesis gravidarum yang dialami oleh pasien. Untuk pasien dengan hiperemesis gravidarum tingkat I, bidan berencana untuk memberikan health education dalam hal pemenuhan nutrisi ibu yakni anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering dan hindari makan makanan berlemak dan makanan yang baunya menyengat serta menganjurkan ibu memakan makanan yang halal dan halalan tayyiban, menganjurkan ibu senantiasa sholat 5 waktu lalu tadarus dan berdzikir dan menganjurkan ibu istirahat yang cukup, tidur siang \pm 2 jam dan tidur malam \pm 8 jam.

f) Langkah VI (Melaksanakan Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini seluruh rencana asuhan yang telah ditetapkan pada langkah V dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan sepenuhnya oleh bidan atau sebagian oleh pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Bidan dalam manajemen asuhan bagi pasien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang

menyeluruh tersebut. Pada pasien hiperemesis gravidarum bidan melaksanakan semua rencana asuhannya pada langkah V yakni memberikan Health Education tentang pemenuhan nutrisi ibu yakni menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering dan menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak, dan makanan yang baunya menyengat menyengat serta menganjurkan ibu memakan makanan yang halal dan halalannya tayyiban, menganjurkan ibu senantiasa sholat 5 waktu lalu tadarus dan berdzikir dan menganjurkan ibu istirahat yang cukup, tidur siang \pm 2 jam dan tidur malam \pm 8 jam.

g) Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

Pada tahap ini, kita perlu mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah kita berikan kepada pasien, untuk itu kita perlu melakukan evaluasi dengan cara mengacu pada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil yang diharapkan dari kasus hiperemesis gravidarum tingkat I adalah teratasinya mual dan muntah pada ibu, mengembalikan keadaan umum, tanda vital, dan kondisi ibu menjadi lebih baik.

3. Pendokumentasian Dalam Bentuk SOAP

Varney (2003), menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah, agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seseorang bidan melalui proses berfikir sistematis, maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

a) Subjektif (S)

Catatan ini berhubungan dengan masalah sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang berhubungan dengan diagnosa. Data Subjektif termasuk dalam langkah I pada tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Tahap ini dikumpulkan semua data yang diperlukan dari pasien ataupun keluarga pasien. Pada kasus hiperemesis gravidarum, yang perlu kita kaji yakni Identitas pasien, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat KB, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, riwayat psikologis dan spiritual dan pola kebiasaan sehari-hari.

b) Objektif (O)

Data ini memberi bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis. Data fisiologis, hasil observasi yang jujur, informasi kajian teknologi (hasil laboratorium, sinar X, rekaman CTG, USG, dan lain-lain) dan informasi dari keluarga atau orang lain yang dapat dimasukkan dalam kategori ini. Apa yang dimasukkan oleh bidan akan menjadi komponen yang berarti dari diagnosa yang akan ditegakkan. Data Objektif juga termasuk dalam langkah I pada tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Pada kasus hiperemesis gravidarum pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah memeriksa keadaan umum, kesadaran, tinggi badan, berat badan, LILA (Lingkar Lengan Atas), pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik sistematis selain itu pemeriksaan penunjang sangat membantu dalam menegakkan diagnosa

yaitu pemeriksaan laboratorium, apabila ibu menderita hiperemesis gravidarum maka akan didapatkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa protein, acetone, urobilinogen, porphyrin dalam urine bertambah, silinder+.

c) Assessment (A)

Masalah atau diagnosa yang ditegakkan berdasarkan data atau informasi subjektif atau objektif yang dikumpulkan atau disimpulkan. Untuk Assessment, merupakan gabungan dari beberapa langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yakni langkah II, III, IV. Dalam tahap ini ditentukan diagnosis masalah, antisipasi masalah potensial dan juga tindakan segera. Pada kasus hiperemesis gravidarum langkah ini kita sudah menegakkan diagnosa bahwa benar pasien menderita hiperemesis gravidarum berdasarkan dari data subjektif dan objektif yang didapatkan. Setelah menegakkan diagnosa hiperemesis gravidarum kita perlu mengantisipasi terjadinya dehidrasi pada ibu karena ibu yang terus memuntahkan apa yang dimakan dan juga diminum. Kemudian kita perlu pula untuk menegakkan diagnosa potensial yang mana pada pasien hiperemesis gravidarum tingkat I perlu dilakukan antisipasi terhadap terjadinya dehidrasi, kekurangan nutrisi, dan hiperemesis gravidarum tingkat II. Pada kasus ini kolaborasi dilakukan dengan dokter dalam hal pemberian obat-obatan dan vitamin.

d) Planning (P)

Membuat rencana tindakan saat itu atau yang akan datang untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien yang sebaik mungkin setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan rencana tindakan untuk mengatasi masalah

atau keluhan dan yang terakhir dilakukan evaluasi dari tindakan yang telah ditentukan. Plan termasuk dalam langkah ke V, VI VII dalam tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan menurut Varney. Pada kasus hiperemesis gravidarum di langkah ini kita telah merencanakan, mengimplementasikan serta mengevaluasi asuhan berupa pemberian health education (HE) yakni menganjurkan untuk makan sedikit tapi sering dan menganjurkan untuk menghindari makan makanan berlemak, selain pemberian HE kita perlu memberikan vitamin untuk mengatasi mual dan muntah. Pada pasien dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat I yang ditangani di rumah sakit dan telah dibolehkan untuk pulang maka tetap akan dilakukan rencana untuk melakukan kunjungan rumah terhadap pasien. Rencana asuhan yang akan dilakukan yakni mengkaji keadaan umum dan kesadaran ibu, pemeriksaan tanda-tanda vital, mengkaji apakah ibu masih merasakan mual dan muntah atau tidak, memberikan konseling kepada ibu dan menganjurkan ibu untuk tetap memeriksakan kehamilannya.



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL CARE

PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM

TINGKAT I GESTASI 13 MINGGU 6 HARI DI PUSKESMAS

BULUKUNYITAKALAR TANGGAL 17 SEPTEMBER –

02 NOVENBERTAHUN 2022

Nomor Regiter : 16xx

Tanggal Masuk : 17 september 2022, pukul 09.30 WITA

Tanggal Pengkajian : 17 september 2022, pukul 09.30WITA

Nama Pengkaji : Sriwahyuni

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “U” / Tn “B”

Umur : 19 tahun / 23 tahun

Nikah/Lamanya : 1x /± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani

Alamat : Bontomaka

B. Keluhan utama

Ibu mengeluh mual dan muntah yang berlebihan serta nyeri pada ulu hati.

C. Riwayat keluhan utama

1. Keluhan dialami ibu sejak diawal kehamilan yakni saat ibu memasuki bulan ketiga kehamilan.
2. Ibu lebih sering muntah di pagi hari.
3. Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati.
4. Frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak Ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali.
5. Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati.
6. Ibu malas makan selama Ia mengalami mual dan muntah.
7. Ibu memuntahkan segala apa yang Ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat.
8. Ibu dapat menoleransi air putih dengan tidak memuntahkannya.

D. Riwayat Kesehatan Yang Lalu & Sekarang

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat alergi makanan dan obat.

2. Ibu mengatakan tidak ada ketergantungan obat, alkohol dan rokok.
3. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit keturunan seperti asma DM, hipertensi, jantung, dan lain-lain.
4. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti HIV, Hepatitis & Syphilis.
5. Ibu mengatakan cemas BB mengalami penurunan BB sebanyak 3 kg dari sebelumnya adalah 50 kg.

E. Riwayat kesehatan keluarga

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit menular seperti HIV, Hepatitis, & Syphilis.
2. Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit menurun hipertensi, jantung, asma dan DM.

F. Riwayat reproduksi

1. Riwayat menstruasi
 - a. Menarche : 14 tahun
 - b. Siklus : 28-35 hari
 - c. Lamanya : 3-7 hari
 - d. Dismenorrhea : Tidak ada
2. Riwayat kehamilan sekarang
 - a. GI P0 A0
 - b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 12 Juni 2022
 - c. Hari tafsiran persalinan (HTP) : 19 Maret 2023

3. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

G. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola nutrisi, kebiasaan ibu makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, ibu mengatakan nafsu makan berkurang selama kehamilan disertai mual dan muntah, Minum 6-7 gelas sehari.
2. Pola eliminasi, kebiasaan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan berwarna kuning serta BAK 5-6 kali sehari berwarna kuning jernih. Selama hamil, saat BAB konsistensi keras dengan warna coklat kehitaman dan BAK warna kuning seperti teh.
3. Pola istirahat, kebiasaan tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur malam 6-8 jam. Selama kehamilan tidak mempengaruhi jam tidur.

H. Riwayat Ekonomi, Psikologis dan Spiritual

1. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.
2. Suami adalah pencari nafkah dalam keluarga.
3. Suami dan keluarga senang dengan kehamilan ibu.
4. Ibu tidak sedang memiliki masalah yang serius.
5. Ibu mengaku menjalankan sholat 5 waktu dan cukup memahami kewajiban beribadah dalam kondisi kehamilannya.

I. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan umum
 - a. Keadaan umum ibu lemah.
 - b. Turgor kulit kurang baik.

- c. Tinggi badan : 150 cm.
- d. Berat badan sekarang : 47 kg.
- e. Lila : 24 cm
- f. Tanda-tanda vital
 - a) Tekanan Darah 100/60 mmHg. c) Nadi 98x/menit.
 - b) Suhu 38°C. d) Pernapasan 22x/menit.

2. Pemeriksaan khusus

a. Mata

Inspeksi : mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus.

b. Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.

c. Leher

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan pembengkakan pada leher.

Palpasi : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar limfe dan thyroid.

d. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan.

Palpasi : reflex patella (+) kiri dan kanan, tidak ada oedema dan varises.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran sama.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan tampak striae livide.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan.

- Leopold I : 2 grasps

- Leopold II s/d IV : tidak dilakukan.

3. Pemeriksaan penunjang

a. Hb : 11,4 gr%

b. Plano test : (+)

c. Protein urine : -

d. Glukosa : -

e. Golongan Darah : "B"

f. HBsAg : Nr

g. HIV : Nr

h. Syphilis : Nr

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIP0A0, gestasi 13 minggu 6 hari, Intrauterin, Hidup,

Tunggal, Ballotement, Hiperemesis gravidarum tingkat I.

Masalah : Hiperemesis gravidarum tingkat I.

1. GIP0A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan ini adalah kehamilannya yang pertama dan tidak pernah keguguran.

b. Data Objektif

Tampak striae Livide dan linea nigra pada inspeksi abdomen, pembesaran perut sesuai usia kehamilan, puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola dan pada pemeriksaan USG terlihat janin.

Analisa dan interpretasi data :

Pada primigravida timbul garis-garis memanjang atau serong pada perut kadang pula terdapat pada payudara dan paha yang disebut striae gravidarum. Pada primigravida warnanya membiru disebut striae livide sedangkan pada multigravida warna garis putih agak mengkilat seperti jaringan perut yang disebut linea albicans atau striae alba. Sedangkan salah satu tanda pasti kehamilan adalah pemeriksaan dengan alat canggih seperti USG, (Manuaba, 2010).

2. Gestasi 13 Minggu 6 Hari

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan hari pertama haid terakhirnya adalah tanggal 12 Juni 2022.

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut sesuai usia kehamilan.
- 2) Hari taksiran persalinan tanggal 19 maret 2023.
- 3) Tanggal pengkajian Gestasi 13 Minggu 6 Hari.

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

1) Menurut rumus Neegle dari HPHT tanggal 12 juni 2022 sampai tanggal pengkajian 02 november 2022, maka usia kehamilan adalah 13 minggu 6 hari (Manuaba, 2008).

2) Pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Penentuan usia kehamilan dilakukan berdasarkan tabel data atau nomogram yang menggambarkan hubungan antara ukuran biometri janin dan usia kehamilan pada kehamilan tersebut (Prawirohardjo, 2014).

3. Intrauterin

a. Data Subjektif

Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan

b. Data Objektif

Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, tidak terdapat nyeri tekan, dan pada pemeriksaan USG didapati janin berada dalam uterus

Analisa dan Interpretasi Data :

Kehamilan Intrauterin sejak hamil muda dapat dipastikan, yaitu perkembangan rahim sesuai dengan usia kehamilan, janin teraba intrauterin, dan pada palpasi terjadi kontraksi Braxton Hicks dan janin di dalam rahim. sedangkan nidasi hasil konsepsi di luar endometrium normal disebut kehamilan ektopik uterin, kehamilan ini sebagian besar tidak dapat berlangsung sampai aterm, dan pecah pada usia kehamilan

muda dengan tanda hamil ektopik (terlambat datang bulan, terjadi nyeri perut mendadak, atau berkelanjutan, dan terjadi perdarahan per vagina) (Manuaba, dkk, 2013: 131).

4. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan belum merasakan pergerakan janinnya.

b. Data Objektif

Tinggi fundus sesuai dengan usia kehamilan yaitu 2 jrasps.

Analisa dan Interpretasi Data :

Jika janin hidup pada usia kehamilan muda dengan usia kehamilan di atas 13 minggu akan didapati tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan yaitu 2 jrasps, palpasi janin dalam rahim jelas, air ketuban janin tidak berkurang, tidak terdapat tanda Spalding pada kepala janin (Manuaba, dkk, 2013: 127).

5. Tunggal

a. Data Subjektif

-

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan.
- 2) Pada pemeriksaan USG didapatkan janin tunggal.

Aalisa dan Interpretasi Data :

Menetapkan kehamilan kembar ataupun tunggal pada usia kehamilan yang masih muda sulit dilakukan, kecuali dengan USG.

Dengan anamnesis dapat diduga hamil kembar (ganda) yaitu perut cepat membesar, gejala emesis gravidarum lebih hebat, perut dirasakan lebih berat, gerak janin lebih banyak, dan dapat disertai sesak napas (Manuaba, dkk, 2013: 129).

6. Ballotement

a. Data Subjektif

Menurut ibu usia kehamilannya adalah \pm 4 bulan

b. Data Objektif

Pada pemeriksaan palpasi abdomen teraba ballotement.

Analisa dan Interpretasi Data Dasar :

Teraba ballotement, pengapungan. Pada usia kehamilan di bawah 20 minggu, Ballotement terjadi karena perbandingan ukuran janin yang masih kecil dengan volume air ketuban yang banyak (Megasari, Mirato, dkk, 2014: 89).

7. Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mengeluh mengalami mual dan muntah yang hebat.
- 2) Ibu lebih sering muntah di pagi hari.
- 3) Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati.
- 4) Namun pada hari ini frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak Ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak $>$ 7 kali.
- 5) Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati.

- 6) Ibu malas makan selama Ia mengalami mual dan muntah.
- 7) Ibu memuntahkan segala apa yang Ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat.

b. Data Objektif

- 1) Keadaan umum ibu lemah.
- 2) Kesadaran composmentis
- 3) Tanda-tanda vital :
 - a) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b) Nadi : 98x/menit, teratur
 - c) Suhu : 36.7°C, aksila
 - d) Pernapasan : 20x/menit, teratur
- 4) Pemeriksaan fisik :
 - a) Ibu tampak pucat
 - b) Mata tampak cekung

Analisa dan Interpretasi Data :

Hiperemesis gravidarum tingkat 1 berhubungan dengan mual dan muntah berlebihan pada ibu hamil tetapi masih tergolong hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum pasien, penurunan berat badan dan nyeri epigastrium.(Wiknjosastro (2005) dalam (Rukiyah dan Lia Yulianti, 2019)).Ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum sebagian besar mengatakan mengalami kehilangan nafsu makan lemas dan panas hingga menjalani perawatan di rumah sakit (Triani & Hastuti, 2020).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah Potensial : Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

DS : Ibu merasa mual setiap makan.

DO :

- a. Keadaan lemah
- b. Tanda-tanda vital :
 - a) Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b) Nadi : 98x/menit, teratur
 - c) Suhu : 36.7°C, aksila
 - d) Pernapasan : 20x/menit, teratur

Analisa dan interpretasi data

Muntah berlebihan sehingga suplai cairan dan makanan kurang apabila berlangsung lama tanpa pengobatan menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dalam rahim dengan manifestasi klinisnya.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan Segera Rujukan dan Kolaborasi.

LANGKAH V : INTERVENSI

Tujuan :

1. Keluhan ibu teratasi
2. Tidak terjadi dehidrasi
3. Tidak terjadi kekurangan nutrisi bagi ibu dan janin
4. Tidak terjadi terjadi hiperemesis gravidarum lebih berat

Kriteria :

1. Mual dan muntah berkurang
2. Keadaan umum ibu baik
3. Kesadaran composmentis
4. Tanda-tanda vital dalam batas normal
5. Selera makan ibu pulih

Intervensi tanggal 17 September 2022, Pagi hari pukul 10.00 wita

1. Sampaikan hasil pemeriksaan pada ibu.

Rasional : Dengan memberitahu ibu mengenai kondisi yang Ia alami maka ibu akan merasa waspada sehingga bersedia mengikuti anjuran agar tidak terjadi kondisi yang lebih berat.

2. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.

Rasional : Istirahat dan tidur yang teratur dapat meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani untuk kepentingan ibu serta perkembangan dan pertumbuhan janin.

3. Anjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak.

Rasional : Dengan minum air putih yang banyak maka ibu akan terhindar dari dehidrasi.

4. Anjurkan pada ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat seperti, bakso, daging dan makanan yang bersantan.

Rasional : Pada umumnya makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat dapat merangsang ibu untuk mual.

5. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering.

Rasional : Makan dengan porsi yang banyak sekaligus dapat memicu terjadinya mual dan muntah.

6. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin.

Rasional : Makanan yang hangat atau benar-benar dingin dapat mencegah terpicunya mual dan muntah

7. Anjurkan ibu untuk tetap berdzikir seperti “Astagfirullaahal ‘adziim, Subhaanallaah, & Laa hawla walaa quwwata illa billah” sebanyak masing-masing 33x, berdo’a seperti membaca surah maryam dan melaksanakan sholat 5 waktu.

Rasional : Berdzikir, berdo’adan sholat 5 waktu dapat menenangkan pikiran dan mendekatkan ibu kepada Allah

8. Berikan vitamin B6 (pyridoxine) dengan dosis 10-25 miligram 3 kali dalam sehari.

Rasional : Vitamin B6 diperlukan dalam jumlah yang besar untuk melakukan metabolisme dengan peningkatan 100%., vitamin B6 dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu mengatasi mual dan muntah.

LANGKAH VI :IMPLEMENTASI

tanggal 17 September 2022, Pagi hari pukul 10.00 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu.
Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan.
2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup.
3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak.
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak.
4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat seperti, bakso, daging dan makanan yang bersantan.
Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran.
5. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering.
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.
6. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin.
Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.
7. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir seperti “Astagfirullaahal ‘adziim, Subhaanallaah, & Laa hawla walaa quwwata illa billah” sebanyak masing-

masing 33x, berdo'a seperti membaca surah maryam, dan melaksanakan sholat 5 waktu.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.

8. Memberikan vitamin B6 (pyridoxine) dengan dosis 10-25 miligram 3 kali dalam sehari.

Hasil : Vitamin telah diberikan.

LANGKAH VII :EVALUASI

tanggal 17 September 2022, Pagi hari pukul 10.00 wita

1. Hasil pemeriksaan telah disampaikan dan ibu merasa tenang.
2. Istirahat yang cukup telah dianjurkan dan ibu bersedia mengikuti anjuran.
3. Telah dianjurkan untuk minum air putih dalam jumlah yang banyak dan ibu bersedia mengikuti anjuran.
4. Telah dianjurkan untuk menghindari makanan berlemak serta makanan yang berbau menyengat dan ibu bersedia mengikuti anjuran.
5. Telah dianjurkan untuk makan sedikit tapi sering.
6. Telah dianjurkan untuk makan makanan yang hangat atau yang benar-benar dingin.
7. Telah dianjurkan untuk berdzikir, berdo'a dan melaksanakan sholat 5 waktu.
8. Telah diberikan vitamin B6 (pyridoxine) dengan dosis 10-25 miligram 3 kali dalam sehari.

PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL

CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN HIPEREMESIS

GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 12-14 MINGGU

DI PUSKESMAS BULUKUNYI TAKALAR

TANGGAL 17 SEPTEMBER

TAHUN 2022

Nomor Regiter : 16xx
Tanggal Masuk : 17 september 2022, pukul 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 17 september 2022, pukul 09.30WITA
Nama Pengkaji : Sriwahyuni

Identitas istri/suami

Nama : Ny “U” / Tn “B”

Umur : 19 tahun / 23 tahun

Nikah/Lamanya : 1x /± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani

Alamat : Bontomaka

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ini merupakan kehamilannya yang pertama & tidak pernah keguguran.
2. Hari pertama haid terakhir (HPHT) ibu adalah tanggal 12 Juni 2022.
3. Ibu mengeluh mengalami mual dan muntah berlebihan.
4. Keluhan dialami ibu sejak di awal kehamilan yakni saat ibu memasuki bulan ketiga kehamilan.
5. Ibu lebih sering muntah di pagi hari.
6. Pada hari-hari sebelumnya ibu hanya muntah sekitar 5 kali dalam sehari dan tidak merasakan nyeri ulu hati.
7. Frekuensi muntah ibu pada hari ini sejak ia bangun pukul 05.30 hingga pukul 11.00 adalah sebanyak > 7 kali.
8. Ibu mengeluh mengalami nyeri pada ulu hati.
9. Ibu malas makan selama ia mengalami mual dan muntah.
10. Ibu memuntahkan segala apa yang ia makan terutama pada makanan yang memiliki bau yang menyengat.
11. Ibu dapat menoleransi air putih dengan tidak memuntahkannya.
12. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan.
13. Berat badan ibu sebelum hamil adalah 50 kg
14. Riwayat Menstruasi :
 - a. Menarche : 14 tahun
 - b. Siklus Haid : 28-30 hari

- c. Durasi : 5-7 hari
 - d. Dismenorrhea : Tidak pernah
15. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB.
 16. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit menurun.
 17. Ibu tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius.
 18. Ibu tidak sedang menderita penyakit apapun.
 19. Ibu tidak memiliki alergi terhadap obat dan juga makanan.
 20. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.
 21. Suami adalah pencari nafkah dalam keluarga.
 22. Suami dan keluarga senang dengan kehamilan ibu.
 23. Ibu tidak sedang memiliki masalah yang serius.
 24. Ibu senantiasa berdzikir, berdo'a dan menjalankan sholat 5 waktu.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah.
2. Kesadaran composmentis.
3. Tinggi Badan : 150 cm.
4. Berat Badan Sekarang : 47 kg.
5. LILA : 24 cm.
6. Pemeriksaan tanda-tanda vital :
 - a. Tekanan darah : 100/60 mmHg
 - b. Nadi : 98 x/menit, teratur
 - c. Suhu : 36,7°C, aksila
 - d. Pernapasan : 20x/menit, teratur.

7. Pemeriksaan penunjang

- a. Hb : 11,4 gr%
- b. Plano test : (+)
- c. Protein urine : -
- d. Glukosa : -
- e. Golongan Darah : “B”
- f. HBsAg : Nr
- g. HIV : Nr
- h. Syfilis : Nr

8. Pemeriksaan Fisik Sistematis

- a. Kepala : Rambut bersih, tidak rontok, tidak ada kutu, tidak ada ketombe tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.
- b. Wajah :Tampak pucat, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan.
- c. Mata : Tampak cekung, konjungtiva pucat, sklera ikteris.
- d. Hidung : Tidak ada polip, tidak ada sekret, tidak ada pengeluaran darah, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.
- e. Telinga : Pada kedua telinga terdapat serumen namun sedikit, tidak ada nyeri tekan, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tarik.
- f. Mulut : Bibir lembab, tidak ada stomatitis, gusi merah muda, tidak ada gusi berdarah, tidak ada gigi berubang, hygiene mulut secara umum baik.

- g. Leher : Tidak ada benjolan, tidak pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis.
- h. Payudara : Puting menonjol, tampak hiperpigmentasi areola, tidak ada nyeri tekan, massa dan benjolan, pengeluaran ASI belum ada.
- i. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak striae alba, tampak linea nigra, DJJ belum terdengar dengan laenec, peristaltic usus terdengar.
- Leopold I :2 jrasps
- Leopold II – IV : Ballotement
- Terdapat nyeri tekan epigastrium, tidak teraba massa abdomen dan lien hepar tidak teraba.
- j. Genetalia : Tidak ada varices, tampak lembab, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, tidak ada pelepasan lendir dan darah, tidak ada oedema.
- k. Ekstremitas : Tidak ada varices, kaki kanan dan kiri simetris, tangan kiri dan kanan simetris, tidak ada pitting oedema, refleks patella (+/+).

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : GIP0A0, gestasi 13 minggu 6 hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis gravidarum tingkat I.

D. PLANNING (P)

Tanggal 17 september 2022, pukul 09.35 WITA

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu.

Hasil : Ibu mengerti dengan apa yang disampaikan.

2. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk beristirahat yang cukup.

3. Menganjurkan ibu untuk minum air putih yang banyak.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran untuk minum air putih yang banyak.

4. Menganjurkan ibu untuk menghindari makanan berlemak dan makanan yang berbau menyengat.

Hasil: Ibu bersedia mengikuti anjuran.

5. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.

6. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang hangat atau yang benarbenar dingin.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.

7. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir seperti “Astagfirullaah ‘adziim, Subhaanallaah, & Laa hawla walaa quwwata illa billah” sebanyak masing-masing 33x, berdo’a seperti membaca surah maryam, dan melaksanakan sholat 5 waktu.

Hasil : Ibu bersedia mengikuti anjuran.

8. Memberikan vitamin B6 (pyridoxine) dengan dosis 10-25 miligram 3 kali dalam sehari.

Hasil : Vitamin telah diberikan.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 26 SEPTEMBER 2022

Tanggal Pengkajian : 26 September 2022 pukul 14 : 30 wita

Nama Pengkaji : Sriwahyuni

Lokasi Pengkajian : Di rumah pasien

Identitas istri/suami

Nama : Ny “U” / Tn “B”

Umur : 19 tahun / 23 tahun

Nikah/Lamanya : 1x /± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani

Alamat : Bontomaka

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu masih mual dan muntah sejak kepulangannya dari puskesmas namun sudah mulai berkurang, biasanya dalam sehari ibu muntah sebanyak lebih dari 10 kali. Sejak 2 hari yang lalu mual muntah ibu sudah berkurang menjadi sekitar 5 – 6 kali sehari.
2. Frekuensi muntah ibu pada hari ini mulai dari pukul 05.30 wita hingga 16.00 wita adalah sebanyak 4 kali.
3. Ibu masih mengeluh nyeri pada ulu hati.
4. Ibu mulai bisa makan dalam porsi yang sedikit namun sering.
5. Ibu banyak mengonsumsi air putih.
6. Ibu merasakan pergerakan janinnya.
7. Ibu tetap mengonsumsi vitamin yang diperoleh dari rumah sakit.
8. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat, perdarahan, ataupun tanda-tanda bahaya kehamilan selain hiperemesis gravidarum

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 80/60 mmHg
 - b. Nadi : 98 x/menit, teratur
 - c. Suhu : 36.7°C, aksila
 - d. Pernapasan : 22x/menit, teratur

4. Turgor kulit mulai membaik
5. Wajah ibu tampak pucat.
6. Mata masih cekung.
7. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah masih agak kotor.

C. ASSESMENT (A)

Diagnosis : GIP0A0, gestasi 15 minggu 1 hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal, Ballotement, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

P. PLANNING (P)

Tanggal 26 September 2022, Jam 14:35 WITA

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah lebih baik dari sebelumnya.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Hasil : Ibu mengkonsumsi sayur dan buah buahan.

3. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

4. Menjelaskan kepada ibu tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama, yaitu :

- a. Perdarahan pervaginam.
- b. Demam tinggi.
- c. Keputihan dan gatal.

- d. Vagina perih dan panas saat buang air kecil.
- e. Sakit betis, bengkak di satu sisi, atau sakit kepala.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut

5. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

7. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

8. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 6 kali dalam sehari.

9. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ALLAH SWT.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 03 OKTOBER 2022

Tanggal Pengkajian : 03 Oktober 2022 pukul 14 : 30 wita

Nama Pengkaji : Sriwahyuni

Lokasi Pengkajian : Di rumah pasien

Identitas istri/suami

Nama : Ny “U” / Tn “B”

Umur : 19 tahun / 23 tahun

Nikah/Lamanya : 1x /± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA/SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / Petani

Alamat : Bontomaka

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang menjadi 4-5x dalam sehari.
2. Nafsu makan mulai membaik.
3. Masih sedikit pusing.
4. Masih nyeri ulu hati.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV
 - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 92x/menit
 - c. Suhu : 36,8°C
 - d. Pernapasan : 22x/menit.
4. Wajah ibu tampak segar.
5. Mata tidak cekung.
6. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah bersih.

C. ASSESMENT (A)

Diagnosa : GIP0A0, Gestasi 16 Minggu 1 hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal,
hiperemesis gravidarum.

D. PLANNING (P)

Tanggal 03 oktober 2022, jam 14:35 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 4 kali dan masih sedikit pusing.

3. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah : 100/70 mmHg. Nadi : 80x/menit. Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan contohnya seperti : ayam panggang atau rebus (tanpa kulit), ikan panggang atau rebus, daging tanpa lemak, telur, keju rendah lemak, sup dan yoghurt agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

5. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

7. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

8. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

9. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ayat ALLAH SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY "U" DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 10 OKTOBER 2022

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang menjadi 1-3x dalam sehari.
2. Nafsu makan mulai baik.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV
 - a. Tekanan Darah : 100/80 mmHg.
 - b. Nadi : 90x/menit
 - c. Suhu : 36,8°C.
 - d. Pernapasan : 22x/menit.
4. Wajah ibu tampak segar.
5. Mata tidak cekung.
6. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah bersih.

C. ASSESMENT (A)

Diagnosis : GIPOA0, Gestasi 17 Minggu 1 Hari, Intrauterin, Hidup,
Tunggal.

D. PLANNING (P)

Tanggal 10 Oktober 2022, jam 11:00 wita.

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 2 kali dan masih sedikit pusing.

3. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah : 100/80 mmHg. Nadi : 80x/menit. Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan contohnya seperti sayuran hijau yaitu : bayam, kol, kangkung, dan daun kelor agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

5. Memberitahu ibu waktu yang tepat untuk berhubungan dengan suami, yaitu pada saat usia kandungan sudah 16 minggu atau trimester kedua.

Hal ini disarankan karena berhubungan intim pada usia kehamilan yang rentan (trimester pertama) dikhawatirkan dapat mengganggu perkembangan pada janin.

Hasil : ibu mengerti dengan apa yang disampaikan.

6. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

7. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

9. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

10. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY "U" DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 18 OKTOBER 2022

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual.
2. Nafsu makan baik.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV
 - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg.
 - b. Nadi : 86x/menit.
 - c. Suhu : 36,8°C.
 - d. Pernapasan : 22x/menit.
4. Wajah ibu tampak segar.

C. ASSESMENT (A)

Diagnosis : GIP0A0, Gestasi 18 Minggu 2 Hari, Intrauterin, Hidup,
Tunggal dan keadaan ibu baik.

D. PLANNING (P)

Tanggal 18 Oktober 2022, jam 11:40 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa tenang.

3. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 86x/menit. Suhu : 36,6°C.

Pernapasan : 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan seperti tomat dan tahu agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

5. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

7. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

8. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

9. Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu:
 - a. Sakit kepala menetap.
 - b. Wajah dan tungkai oedema.
 - c. Mual dan muntah berlebihan.
 - d. Nyeri perut yang hebat
 - e. Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari.
 - f. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam.
 - g. Ketuban Pecah Dini (KPD).
 - h. Oedema
 - i. Kejang

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

10. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 24 OKTOBER 2022

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual.
2. Nafsu makan ibu baik.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV
 - a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg.
 - b. Nadi : 84x/menit.
 - c. Suhu : 36,6°C.
 - d. Pernapasan : 22 x/menit

C. ASSESMENT (A)

Diagnosis : GIP0A0, Gestasi 19 Minggu 1 Hari, Intrauterin, Hidup,
Tunggal dan keadaan ibu baik.

D. PLANNING (P)

Tanggal 24 Oktober 2022, jam 15:20 wita.

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada kehamilan, utamanya pada kehamilan muda.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa tenang.

3. Mengobservasi TTV Tekanan Darah: 100/70 mmHg. Nadi: 84x/menit. Suhu : 36,6°C. Pernapasan: 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengonsumsi buah-buahan saat kehamilan contohnya seperti : pepaya, mangga, melon, alpukat, stroberi, pisang dan semangka agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengonsumsi buah-buahan.

5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu untuk rajin mengonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

7. Menjelaskan kepada ibu tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester kedua, yaitu:
 - a. Perdarahan pervaginam.
 - b. Ketuban pecah dini (prematuur).
 - c. Inkompetensi serviks / insufisiensi serviks.
 - d. preeklamsia

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI

ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY “U” DENGAN

HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I

DI RUMAH PASIEN JLN. BONTOMAKA

TANGGAL 02 NOVEMBER 2022

A. DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak mual dan muntah
2. Nafsu makan ibu baik.

B. DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis
3. Observasi TTV
 - a. Tekanan Darah :100/60 mmHg.
 - b. Nadi :78x/menit.
 - c. Suhu :36,6°C.
 - d. Pernapasan :20x/menit

C. ASSESMENT (A)

Diagnosis : GIP0A0, Gestasi 20 Minggu 3 Hari, Intrauterin, Hidup, Tunggal
dan keadaan ibu baik.

D. PLANNING (P)

Tanggal 02 November 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Hasil : Tekanan Darah :100/60 mmHg. Nadi :78x/menit Suhu :36,6°C.

Pernapasan :20x/menit.

3. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

4. Memberitahu ibu untuk melakukan senam ibu hamil saat usia kandungannya diatas 24 minggu (6 bulan) karena jika usia kandungan dibawah 24 minggu pelekatan janin didalam rahim belum terlalu kuat.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehaamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

7. Memberi tahu ibu tentang gangguan yang sering terjadi pada kehamilan trimester kedua yaitu :

- a. Sembelit.
- b. Munculnya stretch mark di beberapa bagian tubuh.
- c. Tubuh mudah lelah dan pegal.
- d. Sering buang air kecil.
- e. Sulit tidur.

Hasil : ibu mengerti dan tidak merasa khawatir lagi dengan keadaannya.

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesesuaian dan kesenjangan antara teori hasil studi pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan. Teori yang dikemukakan adalah teori (jurnal dan text book) yang sudah termuat dalam bab II. Penulis akan membahas kesenjangan antara teori yang dimuat pada bab II dengan manajemen asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny “U” dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar tanggal 17 September sampai 02 November 2022. Dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan menurut Varney yang terdiri dari 7 langkah yaitu: langkah I (identifikasi dan analisa data dasar), langkah II (identifikasi diagnosa atau masalah aktual), langkah III (identifikasi diagnosa atau masalah potensial), langkah IV (tindakan segera, kolaborasi dan rujukan), langkah V (rencana tindakan asuhan kebidanan), langkah VI (melaksanakan hasil asuhan kebidanan), langkah VII (mengevaluasi hasil tindakan). Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

A. Langkah I (Identifikasi dan Analisa Data Dasar)

Pada langkah ini berisi semua informasi yang lengkap dan akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan klien. Yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah hasil pengumpulan data dengan melakukan anamnesa yang dapat menggambarkan keadaan klien. Sedangkan data objektif adalah data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan klien. Pada proses pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti,

karena pada saat melakukan anamnesa pada Ny “U” maupun keluarga serta bidan yang berada di dalam ruangan saat itu dapat memberikan informasi secara terbuka dan klien juga sangat kooperatif sehingga dapat memudahkan klien untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Pengkajian data dasar yang dilakukan pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I dilakukan pertama kali pada saat ibu memasuki ruangan anc. Pengkajian meliputi anamnesis yang langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajiannya berupa identitas ibu dan suami, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat keluarga berencana, serta data tentang psikologis, ekonomi, sosial, spiritual dan data pola kebiasaan sehari-hari. Pengkajian data objektif didapatkan melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan tinjauan pustaka yang menyatakan bahwa hiperemesis gravidarum tingkat I adalah mual muntah berlebih yang merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, dimana kejadian ini dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan, mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I (Syamsuddin Syahril, 2018). Penurunan nafsu makan akibat mual atau muntah yang merupakan akibat perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar progesteron, estrogen dan human chorionic gonadotropin (hCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan

otot polos pada system gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung menurun dan pengosongan lambung melambat. Refluks esofagus, penurunan motilitas lambung dan penurunan motilitas lambung serta penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap terjadinya mual dan muntah. Selain itu, ibu juga dianjurkan memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan dijauhkan dari masalah-masalah selama menjalani masa kehamilannya. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "U" didapatkan bahwa ibu mengalami mual dan muntah sejak sebulan lalu namun bertambah sering ± 8 x/hari selama 7 hari disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas ibu sebagai ibu rumah tangga. Hal ini juga mengakibatkan ibu mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kg. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan.

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Aktual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny "U" didapatkan data subjektif dan data objektif yang dapat dilihat untuk menegakkan diagnosa sebagai berikut: Ny "U" dengan GIP0A0, gestasi 13 minggu 6 hari, intrauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat I. Masalah yang dirasakan ibu adalah cemas karena mual dan muntah. Menetapkan diagnosa hiperemesis gravidarum tidak sukar, dengan menentukan

kehamilan, muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi.

Tanda gejala Hiperemesis Gravidarum tingkat I adalah mual dan muntah saat hamil, yang bisa terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil merasa pusing, lemas, dan mengalami dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa Mual dan muntah membuat penderita merasa lemas, tidak mau makan, berat badan turun, terasa nyeri di epigastrium, nadi sekitar 100 kali/menit tekanan darah turun, turgor kulit kurang, lidah kering, & mata cekung. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I masalah yang bisa saja terjadi adalah Antisipasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Teori menjelaskan muntah yang terjadi terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat.

Masalah potensial yang dapat terjadi pada kehamilan dengan hiperemesis gravidarum yaitu pada ibu dan janin sebagai berikut:

Pada ibu hamil dengan usia muda perlu tambahan gizi yang banyak karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga untuk berbagi dengan janin yang sedang dikandungnya. Sedangkan untuk ibu hamil dengan usia tua perlu energi yang besar karena fungsi organ yang semakin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung. Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang kehamilan si ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayinya mengalami BBLR, IUGR, Prematur hingga terjadi abortus. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kejadian hiperemesis gravidarum dengan BBLR pada ibu bersalin. Namun berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny "U" tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

D. Langkah IV (Tindakan Segera, Kolaborasi dan Rujukan)

Pada langkah ini bidan juga harus merumuskan tindakan segera untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I kondisi-kondisi yang harus diantisipasi seperti abortus, gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada

Ny“U” tidak ditemukan adanya data pendukung yang memerlukan tindakan segera, kolaborasi dan rujukan.

Selama melakukan pengkajian dan pemantauan kondisi ibu di peroleh hasil kasus hyperemesis gravidarum tingkat I dan tidak ada komplikasi yang menyertai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus yang dilakukan pada Ny“U” tidak ada ditemukan kesenjangan.

E. Langkah V (Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini direncanakan asuhan kebidanan yang ditentukan oleh langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Pada manajemen asuhan kebidanan suatu tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus di setujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial). Sasaran dalam perencanaan asuhan pada kasus Ny “U” berdasarkan pada diagnosa pada kasus ibu hyperemesis gravidarum tingkat I serta mencegah terjadinya masalah potensial yang kemungkinan bisa terjadi.

Untuk mencapai tujuan yaitu proses kehamilan berjalan normal, ibu dan janin dalam keadaan baik, hiperemesis gravidarum tingkat I teratasi, antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Pada kasus Ny “U” rencana asuhan yang diterapkan antara lain, pemantauan tanda-tanda vital,

pemantauan muntah dan ajuran pemenuhan nutrisi, zat besi serta beri motivasi untuk psikologis ibu.

Pada pengkajian kasus yang dilakukan pada Ny “U” yaitu kasus hiperemesis gravidarum tingkat I asuhan yang direncanakan untuk diimplementasikan kepada ibu harus sesuai dengan standar dan kebutuhan ibu. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I, dilakukan pemantauan rutin tanda-tanda vital ibu setiap melakukan kunjungan. Pemantauan tanda vital berfungsi untuk mengetahui keadaan umum ibu, selama berlangsungnya masa kehamilan diharapkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Selain itu, yang akan dilakukan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I adalah menganjurkan ibu untuk makan dan minum sedikit demi sedikit tapi sering agar tetap mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil, serta menghindari makan dan minum yang dapat memicu mual dan muntah. Seperti makanan yang berminyak dan pedas. serta konsultasi tentang pentingnya zat besi pada masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia.

Selain itu, sarankan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta hindari makan dan minum yang berbau menyengat, sarankan ibu untuk makan selingan seperti biskuit dan roti kering. Masalah psikologis ibu hamil harus menjadi perhatian khusus karena masa kehamilan merupakan masa dimana seorang ibu mempersiapkan dirinya untuk menyambut kelahiran calon bayinya sehingga membutuhkan mental dan jiwa yang siap untuk menerima perubahan-perubahan fisiologis selama masa kehamilan, oleh karena itu ibu dianjurkan untuk sering mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, berdzikir,

dan senantiasa berdoa dan melakukan hal-hal lain yang mendekatkan diri kepada ALLAH SWT. Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan selama proses pengkajian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana asuhan sesuai dengan teori memiliki persamaan dengan kasus yang telah dilakukan pengkajian.

F. Langkah VI (Melaksanakan Hasil Asuhan Kebidanan)

Pada langkah ini menerapkan semua rencana asuhan yang telah direncanakan pada langkah sebelumnya. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerja sama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan. Pada tinjauan kasus yang telah dilakukan pada Ny "U", implementasi asuhan yang telah direncanakan diberikan sejak ibu masuk ke dalam ruangan anc.

Dimulai dari kunjungan di Puskesmas pada tanggal 17 September 2022 hingga kunjungan ketiga dirumah pada tanggal 03 oktober 2022 ibu mengalami mual muntah yang berlebihan, dengan frekuensi 4-7 kali perhari. Dan keadaan ibu menjadi lemah, nyeri pada ulu hati, mata cekung, konjungtiva pucat, sklera sedikit ikterus, bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor, dan turgor kulit berkurang.

Pada kunjungan keempat dirumah pada tanggal 10 oktober 2022 muntah ibu sudah mulai berkurang dari yang dulunya frekuensi muntah ibu yaitu 4-7 kali setiap harinya tetapi kini sudah berkurang menjadi 1-3 kali dalam sehari karena ibu sudah diberikan edukasi tentang bagaimana cara menangani mual dan

muntah yang dialami oleh ibu. Dan ibu juga sudah menerapkan atau mengkonsumsi makanan dan buah-buahan yang bergizi yang telah disampaikan serta rajin mengkonsumsi obat yang telah diberikan dan menghindari makanan berlemak atau makanan yang baunya menyengat yang dapat memicu terjadinya mual dan muntah.

Kemudian pada kunjungan kelima pada tanggal 18 oktober 2022 hingga kunjungan keenam pada tanggal 24 oktober 2022 ibu sudah tidak mengalami muntah tetapi masih mual, kemudian memberitahu ibu bahwa apa yang dialami sekarang adalah suatu hal yang normal bagi ibu diawal kehamilannya.

Pada kunjungan ketujuh tanggal 02 November 2022 ibu mengatakan sudah tidak mual dan muntah lagi nafsu makan baik, ttv dalam batas normal, dan keadaan fisik ibu sudah membaik. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat, Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik, Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu: Sakit kepala menetap, Wajah dan tungkai oedema, Mual dan muntah berlebihan, Nyeri perut yang hebat, Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam, Ketuban Pecah Dini (KPD). Oedema dan Kejang. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dan lain sebagainya.

G. Langkah VII (Mengevaluasi Hasil Tindakan)

Teori menyatakan bahwa mengevaluasi hasil tindakan adalah penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang telah kita berikan kepada pasien, untuk itu kita perlu melakukan evaluasi dengan cara mengacu pada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektifitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Pada kasus hiperemesis gravidarum, diharapkan mual dan muntah teratasi, mengembalikan keadaan umum, tanda vital, dan kondisi ibu menjadi lebih baik.

Bedasarkan hasil manajemen asuhan yang telah dilakukan di puskesmas serta manajemen asuhan pada kunjungan rumah terakhir ditemukan bahwa mual muntah berlebihan telah teratasi, pada pemeriksaan fisik didapatkan mata ibu sudah tidak cekung, keadaan umum ibu telah membaik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital normal yaitu : Tekanan darah : 100/60 mmHg, Nadi : 78 x/menit, Suhu : 36.6°C & Pernapasan : 20x/menit.

Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut Wiknjosastro (2005) dalam Rukiyah dan Lia Yulianti (2019: 121), hiperemesis gravidarum tingkat 1 merupakan mual dan muntah berlebihan yang dialami ibu hamil namun masih masuk dalam kategori hiperemesis ringan, yang ditandai dengan muntah terus menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum penderita, berat badan menurun serta nyeri epigastrium. Sehingga apabila didapati ibu sudah tidak mengeluh mual dan muntah, ibu tidak mengeluh nyeri epigastrium, keadaan umum ibu telah baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, mata tidak cekung maka ibu dinyatakan sudah tidak mengalami

hiperemesis gravidarum tingkat I sehingga pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan juga kasus.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jabarkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran terakait penelitian Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Bulukunyi Takalar Tahun 2022 yang diharapkan mampu berguna dalam meningkatkan pelayanan dan perawatan terhadap ibu hamil dengan komplikasi kehamilan yaitu Hiperemesis Gravidarum.

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data pada Ny “U” dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. Hasil analisis yang diperoleh pada Ny “U” meliputi umur 19 tahun , G1P0A0 dengan hyperemesis gravidarum tingkat I.
2. Telah dilakukan identifikasi diagnose/masalah aktual pada Ny “U” dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. masalah aktual Hiperemesis Gravidarum tingkat I.
3. Telah dilakukan identifikasi diagnose/masalah potensial pada Ny “U” dengan Hyperemesis Gravidarun tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. Hasil yang di dapat dari interpretasi data pada Ny “U” masalah potensial gangguan perkembangan dan pertumbuhan janin.
4. Telah dilakukan identifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “U” dengan Hyperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. Didapatkan bahwa tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera, kolaborasi, dan rujukan.

5. Telah dilakukan perencanaan asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny “U” dengan Hiperemesis gravidrum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. Berdasarkan diagnose/masalah aktual dan potensial yang didapat yaitu intervensi yang diberikan adalah memberi tahu pada klien hasil pemeriksaan dan keadaan klien, menganjurkan klien makan makanan bernutrsi, pemantauan Tanda tanda vital, mengobservasi mual muntah, menganjurkan ibu makan sedikit sedikit tapi sering, menganjurkan ibu utnuak menghindari makanan yang terlalu berlemak atau berminyak, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, memberi tahu ibu tanda dan bahaya selama kehamilan, dan menganjurkan ibu untuk senantiasa beroda dan berdzikir kepada allah agara diberikan kesehatan.
6. Telah dilaksanakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan pada Ny “U” dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar. Dengan perencanaan asuhan kebidanan dapat dilaksanakan sebelumnya dengan baik dan tidak ada hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi dari hasil asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada Ny “U” dengan hyperemesis gravidarum tingkat I si puskesmas Bulukunyi Takalar. Adapun hasil dari semua perencanaan asuhan yang telah dilaksanakan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua hasil dari pengkajian dan tindakan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny “U” dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas Bulukunyi Takalar yang dibuat dalam bentuk 7 langkah varney dan soap.

B. Saran

Berdasarkan atas tinjauan dan pembahasan kasus penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pelayanan kebidanan yang baik.

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan kebidanan utamanya pada pelayanan antenatal care yang baik sehingga dapat diantisipasi terjadinya komplikasi-komplikasi kehamilan khususnya hiperemesis gravidarum yang dapat membahayakan kondisi ibu dan juga janin.

2. Bagi Intitusi

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi terbaru sehingga dapat membantu penulis ataupun mahasiswa lainnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah dan skripsi.

3. Bagi Profesi

Diharapkan dapat meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi ibu hamil dengan hyperemesis gravidarum secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, Vita. 2018. *Asuhan Kebidanan Nifas & Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Arantika Meidya, dan Fatimah. 2019. *Patalogi Kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ardani, T.A., 2013, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, 1 st ed, Bandung, CV Karya Putra Darwati, p. 16-17, 29.
- Arianti, Pertiwi & Fatimah (2019). *Patalogi Kehamilan Memahami Berbagai Penyakit & Komplikasi kehamilan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Arisdiani, Triani. & Dwi, Yuni, Hastuti. (2020). *Tingkat Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I Di Kabupaten Kendal*. Jurnal Kebidanan Malakbi. Volume 1/Nomor 2/Tahun 2020.
- Austin Kerstin, MD, Wilson Kelley, MS, RDN, CNSC, And Saha Sumona, MD, MS. 2019. *Hyperemesis Gravidarum*. Nutrition in Clinical Practice 34(2).
- Christiani, Ninik & Andayani, Ari. (2019). *Perbedaan Kadar Hormon Chorionic Gonadotrophine (HCG) Pada Ibu Hamil Trimester I Yang Mengalami Hiperemesis Gravidarum Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Hipnoterapi Di Rumah Sakit Umum Ungaran Kabupaten Semarang*. IndonesiaJournalOfMidwifery (IJM). Volume 2. No 2. September 2019.
- Fitriana, Yuni & Nurwiandani, Widy.(2018). *Asuhan Persalinan*. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Irianti.dkk. 2014. *Asuhan Kebidanan Berbasis Bukti*. Jakarta : Sagung seto.
- Isnaini, Nurul, & Refiani, Reza., 2018. *Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Trimester I Tentang Hiperemesis Gravidarum Di BPM Wirahayu Panjang Bandar Lampung Tahun 2017*. Jurnal Kebidanan. VOL 4/ NO 1/ Januari 2018.
- Kadir, I. N., Saleha, S., & Nadyah, N. (2019). *Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care pada Ny "N" dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat III di Rsud Syekh Yusuf Gowa*. Jurnal Midwifery, 1(2).
- Kemenkes RI 2019.(n.d.). Profil kesehatan indonesia 2018. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Kemenkes RI. 2017. *Profil Kesehatan Indonesia (Data Tahun 2015)*. Jakarta:Kementrian Kesehatan Indonesia.
- Khayati, N. (2013). *Asuhan Kebidanan Ibu dengan Hiperemesis Gravidarum*.
- Nita Norma & Mustika Dwi,. (2017). *Asuhan Kebidanan Patalogi Teori Dan Tinjauan Kasus*, Penerbit: Nuha Medika, 2017.
- Octavia, V. 2016.*Karakteristik Ibu Hamil dengan Anemia di Puskesmas Tegaltrejo Yogyakarta Tahun 2015*.Karya Tulis Ilmiah diploma tiga, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal A. Yani Yogyakarta, Yogyakarta.
- Prawirohardjo Sarwono (2016). *Buku Ilmu Kebidanan Edisi 4*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rofi'ah, S.,Widatiningsih, S.And Arfiana, A. (2019).*Studi Fenomenologi Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I*. Jurnal Riset Kesehatan. 8(1).
- Rukiyah, A. Y & Lia, Y. (2019). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Meternal Dan Neonatal*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Rustikayanti, R. Nety, Ira Kartika, Yanti Herawati. 2018. *Korelasi Perubahan Psikologis Ibu Hamil Dengan Tingkat Kepuasan Seksual Suami*. Jurnal Bidan "MidwifeJournal" Volume 2, No. 1, Januari 2016 pISSN 2477-3441.
- Setiawati, D. (2020). *Fisio Patologi Kehamilan, Persalinan dan Kasih Sayang Universal: Bagaimana Proses Setetes Sperma Menjadi Makhluk Hidup Baru?*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
- Sunarti, 2013.*Asuhan Kehamilan*. Jakarta: In media.
- Susanti, E., Firdayanti, F., & Haruna, N. (2019).*Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "S" dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di Rs TNI Angkatan Laut Jala Ammari*. Jurnal Midwifery, 1(2).
- Suyuti, S., Rosdianah,. Sahibu, S.,Syamsuriyati.(2021). *Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Kuprik Kota Marauke*.JurnalOfMidwifery,3(1).
- Syamsuddin, Syahril. (2018). *Hubungan Antara Gastritis, Stres, dan Dukungan Suami Pasien dengan Sindrom Hiperemesis Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari*. Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. Volume 2/ Nomor 2/ Tahun 2018.

- Triana, A. And Hastuti, Y. D. (2020). *Tingkat Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I Di Kabupaten Kendal*. Jurnal Kebidanan Malakbi. 1(2).
- Umami, Aiman. (2019). Hubungan paritas dengan kejadian hiperemesis gravidarum di rsud salatiga. Universitas Ngudi Waluyo, 8(5), 55.
- Varney, Helen dkk. *Varney's Midwifery*, America: Jones and Bartlett Publisher, 2003.
- Wakefield Kimber MacGibbon, BSN, RN. 2020. *Hyperemesis Gravidarum*. journalofinfusionnursing.com. VOL 43 | NUM 2 | MARCH/APRIL 2020.
- WHO, UNICEF, U. and the W. B. (2015). *Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015*, Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. WHO, Geneva.
- WHO. (2018). *Maternal Mortality*
- Yusuf, N., And Sri, w. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kejadian Hiperemesis Gravidarum (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh)*. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA)*. 1(2).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ALAUDDIN

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 26, Romang Potong-Gowa (0411) 841870 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: iik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1260/Un.06/FKIK/PP.00.9/03/2022
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 17 Maret 2022

Kepada Yth :
Kepala Puskesmas Bulukunyi Takalar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sriwahyuni
N I M : 70400118001
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Data : Tingkat Kejadian Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Pada Ibu Hamil

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Diploma. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Pada Ibu Hamil."

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk mengambil data awal .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Genny Nastity Handayani

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 15 September 2022

Nomor	: 423/IP-DPMPTSPTKTRANS/TX/2022	Yth.	Kepada
Lamp.	: -		Kepala UPT Puskesmas Bulukunyi
Perihal	: <u>Izin Penelitian</u>		Kab. Takalar
			Di-
			<u>Takalar</u>

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul-Sel Nomor : 9290/S.01/PTSP/2022, tanggal 13 September 2022, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/423/KBP/IX/2022 tanggal 15 September 2022, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama	: SRIWAHYUNI
Tempat Tanggal Lahir	: Takalar, 15 Juni 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar
Alamat	: Dusun Bilaya Kel/ Desa Pallantikang Kec. Pattallassang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**“MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL CARE PATOLOGI
 DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I DI PUSKESMAS BULUKUNYI
 TAKALAR TAHUN 2022”**

Yang akan dilaksanakan	: 13 September 2022 s/d 13 November 2022
Pengikut / Peserta	: -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Kepala Dinas,
RUSDI S. Sos., M. Si
 Pangkat Pembina Tk. I
 NIP : 19731220 200003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
4. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
5. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- **0065** /Un.06/LP2M/PP.00.9/8/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan
di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Sriwahyuni
NIM : 70400118001
Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2021-2022
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Alamat : pattallassang
No. HP. : 082151492204 & 088705589062

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL CARE PATOLOGI DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I DI PUSKESMAS BULUKUNYI TAKALAR TAHUN 2022.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **PUSKESMAS BULUKUNYI TAKALAR** dari tanggal **2 bulan.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Muhammad Ramli, M.Si.
NIP. 406005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan secara rinci dan telah mengerti mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh SRIWAHYUNI dengan judul "MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ISLAMI ANTENATAL CARE PATOLOGI PADA NY "U" DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT 1 GESTASI 12 - 14 MINGGU DI PUSKESMAS BULUKUNYI TAKALAR TANGGAL 17 SEPTEMBER - 02 NOVEMBER 2022." Saya memutuskan setuju untuk ikut berpartisipasi pada penelitian ini secara sukarela tanpa paksaan. Bila selama penelitian ini saya menginginkan mengundurkan diri, maka saya dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa sanksi apapun.


Sabtu, tanggal 17/09/2022

Sabtu, tanggal 17/09/2022

Mengetahui

Yang memberikan persetujuan

Peneliti



(.....Sriwahyuni.....)

(.....Ulnia.....)

Saksi

Sabtu, tanggal 17/09/2022



(.....Barodetung.....)


LEMBAR FOLLOW UP

N O	Hari/Tanggal Kunjungan	S	O	A	P
1	17 September 2022 Kunjungan pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran. 2. HPHT 12 Juni 2022 3. Mual dan muntah berlebihan. 4. Hari – hari sebelumnya muntah sekitar $\pm 5x$ dalam sehari 5. Hari ini sekitar $\pm 7x$. 6. Mengalami nyeri pada ulu hati 7. Malas makan selama ia mengalami mual muntah. 8. Tidak merasakan nyeri perut hebat pada saat kehamilan. 9. Dapat menoleransi air putih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan ibu lemah. 2. Kesadaran composmentis. 3. BB 47 kg. 4. LILA 24 cm. 5. TD 100/60 mmHg. 6. Nadi 98x/menit. 7. Suhu 36,7°C. 8. Pernafasan 20x/menit. 9. Wajah pucat, mata tampak cekung, konjungtiva pucat, bibir lembab, pada Leopold 1 yaitu 2 jrasps, sedangkan Leopold 2 belum teraba. 	G1P0A0, Gestasi 13 minggu 6 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan ibu istirahat yang cukup. 2. Anjurkan ibu minum air putih yang banyak. 3. Anjurkan ibu menghindari makanan yang berlemak atau baunya menyengat. 4. Anjurkan ibu untuk makan makanan hangat atau benar-benar dingin. 5. Anjurkan ibu makan sedikit tapi sering. 6. Anjurkan ibu selalu mengingat kepada Allah SWT. Berdzikir, serta sholat 5 waktu. 7. Memberikan vit. B6 (pyridoxine) dosis 10-25 miligram 3x dalam sehari.

2	<p>26 September 2022</p> <p>Kunjungan ke-2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mual muntah sudah berkurang menjadi 5-6x sehari. 2. Frekuensi muntah hari ini sebanyak 4x. 3. Masih mengeluh nyeri ulu hati. 4. Mulai bisa makan dalam porsi sedikit tapi sering. 5. Banyak mengkomsumsi air putih. 6. Tetap mengkomsumsi vitamin dari puskesmas. 7. Tidak merasakan nyeri perut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum masih lemah. 2. Kesadaran komposmentis. 3. TD 80/60 mmHg. 4. Nadi 98x/menit. 5. Suhu 36,7 °C. 6. Pernafasan 22x/menit. 7. Turgor kulit mulai membaik. 8. Wajah ibu tampak pucat. 9. Mata masih cekung, bibir tidak kering, dan sariawan membaik. 	<p>G1P0A0, Gestasi 15 minggu 1 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hipertensi Gravidarum tingkat 1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan makanan yang bergizi selama kehamilan. 2. Menjelaskan tanda bahaya pada kehamilan trimester pertama. 3. Anjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti. 4. Anjurkan istirahat yang cukup. 5. Anjurkan untuk meminum tablet Fe 1x sehari.
---	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	03 Oktober 2022 Kunjungan Ke-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mual muntah mulai berkurang menjadi 4-5x dalam sehari. 2. Nafsu makan mulai membaik. 3. Masih sedikit pusing. 4. Masih nyeri ulu hati. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadaan umum masih lemah. 2. Kesadaran composmentis. 3. TD 110/70 mmHg. 4. Nadi 92x/menit. 5. Suhu 36,8°C. 6. Pernafasan 22x/menit. 7. Wajah ibu tampak segar. 8. Mata tidak cekung. 9. Bibir tidak kering, sariawan membaik. 	G1P0A0, Gestasi 16 minggu 1 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hipertensi Gravidarum tingkat 1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan ibu untuk makan makanan bergizi. 2. Anjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering. 3. Anjurkan ibu makan selingan seperti biskuit dan roti. 4. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. 5. Anjurkan ibu untuk selalu mengingat Allah SWT. Dengan berdzikir dan sholat 5 waktu.
---	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	<p>10 Oktober 2022</p> <p>Kunjungan Ke-4</p>	<p>1. Mual dan muntah mulai berkurang menjadi 1-3x dalam sehari.</p> <p>2. Nafsu makan mulai membaik.</p>	<p>1. Keadaan umum masih lemah.</p> <p>2. Kesadaran composmentis</p> <p>3. TD 100/80 mmHg.</p> <p>4. Nadi 90x/menit.</p> <p>5. Suhu 36,8°C.</p> <p>6. Pernafasan 22x/menit.</p> <p>7. Wajah ibu tampak segar.</p> <p>8. Mata tidak cekung.</p> <p>9. Bibir tidak kering.</p>	<p>G1P0A0, Gestasi 17 minggu 1 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.</p>	<p>1. Anjurkan ibu untuk mengkomsumsi sayuran hijau.</p> <p>2. Menginformasikan kepada ibu dan suami tentang waktu yang tepat untuk berhubungan.</p> <p>3. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.</p>
---	----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5	18 Oktober 2022 Kunjungan Ke-5	1. Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual. 2. Nafsu makan membaik.	1. Keadaan umum membaik. 2. Kesadaran composmentis. 3. TD 100/70 mmHg. 4. Nadi 86x/menit. 5. Suhu 36,8°C. 6. Pernafasan 22x/menit. 7. Wajah ibu tampak segar.	G1P0A0, Gestasi 18 minggu 2 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.	1. Menjelaskan bahwa mual dan muntah adalah hal yang fisiologis terjadi pada ibu hamil. 2. Anjurkan untuk makan sedikit tapi sering. 3. Anjurkan makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan janin berlangsung dengan baik. 4. Anjurkan istirahat yang cukup. 5. Menjelaskan 9 tanda bahaya kehamilan.
---	---------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	24 Oktober 2022 Kunjungan Ke-6	1. Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual. 2. Nafsu makan ibu baik.	1. Keadaan umum baik. 2. Kesadaran composenti s. 3. TD 100/70 mmHg. 4. Nadi 84x/menit. 5. Suhu 36,6°C. 6. Pernafasan 22x/menit	G1P0A0, Gestasi 19 minggu 1 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.	1. Anjurkan ibu untuk mengonsumsi buah-buahan. 2. Anjurkan ibu istirahat yang cukup. 3. Anjurkan ibu untuk selalu mengonsumsi tablet Fe. 4. Menjelaskan tanda bahaya kehamilan trimester 2.
----	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	02 November 2022 Kunjungan Terakhir (7)	1. Sudah tidak mual dan muntah. 2. Nafsu makan baik.	1. Keadaan umum baik. 2. Kesadaran composmenti s. 3. TD 100/60 mmHg. 4. Nadi 78x/menit. 5. Suhu 36,6°C. 6. Pernafasan 20x/menit	G1P0A0, Gestasi 20 minggu 3 hari, Intrauterine, Hidup, Tunggal, Ballotement, Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.	1. Anjurkan ibu makan makanan yang bergizi agar pertumbuhan janin berlangsung dengan baik. 2. Memberitahu bahwa senam ibu hamil dapat dilakukan di atas usia kehamilan 24 minggu. 3. Anjurkan ibu istirahat yang cukup. 4. Memberitahu ibu tentang gangguan yang sering terjadi pada kehamilan trimester 2.
---	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
UPT PUSKESMAS BULUKUNYI
KEC. POLONGBANGKENG SELATAN**

Ling. Makammu I, Kelurahan Bulukunyi Telp. (0418) 2327266, Email : pkmbulukunyi@gmail.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 46/PKM-BK/TU-1/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKHSAN MUIS PUTRA, SKM
NIP : 19730122 200312 1 004
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Bulukunyi

Menerangkan bahwa :


Nama : SRIWAHYUNI
TTL : Takalar, 15 Juni 2000
Pekerjaan : Mahasiswi DIII UIN Alauddin Makassar
Judul Skripsi : *Manajemen Asuhan Kebidanan Islami Antenatal Care Patologi
dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas
Bulukunyi Takalar Tahun 2022*

Telah melakukan penelitian di Puskesmas Bulukunyi terhitung mulai tanggal 13
September s/d 13 November 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bulukunyi, 14 November 2022

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Bulukunyi


IKHSAN MUIS PUTRA, SKM
139 NIP. 19730122 200312 1 004