

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY
“S” DENGAN POST PARTUM BLUES DI RS BHAYANGKARA
MAKASSAR TANGGAL 08 NOVEMBER – 10 DESEMBER
TAHUN 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**
OLEH :
NURPIANA SAID
70400119004

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULISI LMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurpiana Said

Nim : 70400119004

Tempat/Tanggal lahir : Batujala, 10 Desember 2002

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, okagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa, 2022

Penyusun,

NurpianaSaid

70400119004

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurpiana Said

Nim : 70400119004

Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Nifas
Dengan Post Partum Blues Di RS Bhayangkara Makassar Tahun
2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Juli 2023

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pembimbing II

ALAUDDIN
MAKASSAR

Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb
NIP : 19870924201903 2 012

Dr.Bd.Hj. Sitti Saleha S.ST., SKM., M.Keb
NIP : 19760126 20060 4 2001

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Nifas Dengan Post Partum Blues Di Rs Bhayangkara Makassar Tahun 2022", yang disusun oleh Nurpiana Said Nim 70400119004 Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 19 Juni 2023**, bertepatan dengan **Tanggal 30 Dzulqad'ah 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Saminata, 03 Juli 2023
30 Dzulqad'ah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.ST.,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Ferawati Taherong S.ST.,M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Dr.Bd.Hj. Siti Saleha S.ST., SKM., M.Keb	(.....)
Penguji 1	: Zeina Yuli Andriyani A S.ST.,M.Keb	(.....)
Penguji 2	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatu

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan berkelanjutan pada Ny “S” dengan Post partum Blues di RS Bhayangkara Makassar”** Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.

3. Ibunda Firdayanti, S.ST.,M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibunda Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb selaku sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar
5. Ibunda Ferawati Taherong S.ST.,M.Keb sekaligus pembimbing I yang telah membimbing karya tulis ilmiah ini dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb selaku pembimbing II yang telah membimbing karya tulis ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Segenap dosen tekhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan Para Staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini berlangsung.
8. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Muh. Said dan Ibunda sugianti yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, membuna penulis dengan ikhlas dan penuh pengorbanan serta kekhusu'an doa yang

selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada mereka semua.

9. Teman-teman seperjuanganku Ligamen Angkatan 2019 serta Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak Amiin.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang DIII Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata-Gowa,

Agustus 2022

Penulis

NURPIANA SAID
70400119004

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
F. sistematika penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan umum tentang masa nifas.....	12
B. Tinjauan umum tentang post partum blues	25
BAB III	48
A. Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney	48
B. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	72

BAB IV PEMBAHASAN.....	99
1. Identifikasi Data Dasar.....	99
2. Identifikasi Diagnosa/Masalah aktualberdasarkan.....	102
3. Identifikasi Diagnosa/Masalah potensial	103
4. Tindakan Segera/Kolaborasi	103
5. Rencana Tindakan Asuhan.....	104
6. Implementasi Asuhan Kebidanan	106
7. Evaluasi Asuhan Kebidanan	108
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	109
DAFTAR PUSTAKA	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kunjungan Masa Nifas.....	24
Tabel 3.1 Pemeriksaan kehamilan.....	50
Tabel 7.1 Riwayat Persalinan Yang Terakhir.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I surat permohonan izin penelitian dari Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur SulaweSI Selatan (Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran II Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Kepala Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
- Lampiran III Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
- Lampiran IV Surat Keterangan Layak etik.
- Lampiran V Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2023**

Nurpiana Said, 70400119004

Pembimbing I : Ferawati Taherong, S.ST, M.Keb

Pembimbing II : Dr.Bid.Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Ibu Nifas Pada Ny ”S”
Dengan Post Partum Blues Di RS Bhayangkara Makassar Tahun 2022”**

Postpartum Blues adalah suatu sindroma gangguan efek yang ringan sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan, cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai kelima dan berlangsung dalam rentang waktu 14 hari atau dua minggu postpartum ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, lupa dan tidak bisa tidur.

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada ibu nifas dengan post partum blues pada Ny “S” di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sesuai dengan metode 7 langkah varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “S” dengan post partum blues, tidak ditemukan hambatan saat melakukan asuhan. mengajarkan ibu teknik relaksasi, melakukan komunikasi terapeutik, adaptasi dengan peran barunya menjadi seorang ibu, mobilisasi dini, menjaga personal hygiene, memberikan makanan yang bergizi, melakukan bonding attachment, dan menganjurkan ibu untuk mendengarkan al-Qur’an agar hati menjadi tenang.

Kesimpulan dari studi kasus ibu nifas dengan post partum blues pada Ny “S” di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Dengan hasil asuhan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada Ny “S” dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan.

Kata Kunci : Ibu Nifas, Post Partum Blues, 7 langkah varney

ABSTRACT**MIDWIFERY DEPARTMENT****UIN ALAUDDIN MAKASSAR****SCIENTIFIC PAPER, FEBRUARY 2023****Nurpiana Said, 70400119004****Supervisor I : Ferawati Taherong, S.ST, M.Keb.****Supervisor II : Dr.Bid.Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb.****“Continuous Postpartum Midwifery Care Management on Mrs. “S” with Postpartum Blues at Bhayangkara Hospital of Makassar in 2022”**

Postpartum Blues is a mild syndrome that often occurs within the first week after childbirth, typically worsening between the third and fifth day and lasting for a period of 14 days or two weeks postpartum. It is characterized by brief episodes of crying, feelings of loneliness or rejection, anxiety, confusion, restlessness, fatigue, forgetfulness, and hard sleeping.

This research aims to implement the continuous postpartum midwifery care management on Mrs. “S” with postpartum blues at Bhayangkara Hospital of Makassar, following the 7-step Varney method and SOAP approach.

The results of the case study conducted on Mrs. “S” with postpartum blues revealed no obstacles during the care process. The treatment included teaching her relaxation techniques, utilizing therapeutic communication, adapting to her new role as a mother, early mobilization, maintaining personal hygiene, providing nutritious meals, promoting bonding and attachment, and encouraging her to listen to the Quran for inner peace.

In conclusion, based on the case study of Mrs. “S” a postpartum mother with postpartum blues at Bhayangkara Hospital of Makassar, it showed positive outcomes. Her general condition was good. She was conscious and alert, and her vital signs were within normal limits without any physical abnormalities. Therefore, all findings and treatments on Mrs. “S” were documented without any gaps.

Keywords: Postpartum Mother, Postpartum Blues, 7-step Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu. Masa nifas (*puerperium*), berasal dari bahasa latin, yaitu *puer* yang artinya bayi dan *perium* yang artinya melahirkan atau berarti masa sesudah melahirkan (Saleha, 2013).

Postpartum Blues adalah suatu sindroma gangguan efek yang ringan sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan, cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai kelima dan berlangsung dalam rentang waktu 14 hari atau dua minggu postpartum ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, gelisah, letih, lupa dan tidak bisa tidur. *Postpartum blues* dapat menjadi masalah yang mengganggu keharmonisan pasangan suami-istri, tidak menyenangkan, serta menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman bagi ibu yang mengalaminya (Susanti, 2018).

Perubahan *mood* seperti sering menangis, lekas marah, dan sering sedih atau cepat berubah situasi seperti senang, merasa khawatir akan kondisi kehamilannya kelak, dimulai takut keguguran, takut

melahirkan, khawatir akan masa depan anaknya kelak, dan masih banyak hal lainnya (Wahyuni, 2015 :8).

Dari setiap 1000 wanita hamil, sekitar 17% wanita akan mengunjungi unit kejiwaan. Lima persen akan mengalami gangguan mood depresi ringan pada minggu pertama setelah melahirkan yaitu *post partum blues* dan 2 % akan berkembang menjadi psikosis pada masa nifas. Antara 10 sampai 15 % akan menjadi depresi setelah melahirkan. *Post partum blues* terjadi pada sekitar 50% wanita dalam waktu 4-5 hari setelah melahirkan Hanretty (2014) dalam Nurafifah (2015).

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2014) dalam Desfanita (2015) angka kejadian *post partum blues* diseluruh dunia cukup tinggi yaitu 26-85 %. Data tersebut menunjukkan 81 % angka kematian ibu (AKI) akibat komplikasi selama hamil dan bersalin, dan 25% kasus *post partum blues*. Angka kejadian *post partum blues* di Indonesia berkisar antara 50-70% pada ibu *post partum* (Desfanita, 2015). *Post partum blues* dialami oleh ibu *post partum* yang bersifat sementara dan terjadi pada minggu pertama setelah kelahiran (Yodatama, 2015).

Pada tingkat global, lebih dari 300 juta orang menderita depresi (WHO, 2018). Berdasarkan data dari badan Kesehatan Dunia prevalensi depresi *postpartum* secara global berkisar antara 0,5 % hingga 60,8% WHO (2017). Sedangkan di Negara Berkembang 10-50% ibu yang menjalani masa perinatal yang telah terdeteksi mengalami depresi (WHO, 2018)

Lebih dari 20% wanita yang mengalami *post partum blues* akan berkembang menjadi gejala depresi mayor dalam satu tahun setelah melahirkan (Reck et al.2009). Apabila *post partum blues* tidak ditangani secara serius, maka akan lebih berkembang menjadi depresi *postpartum* dan salah satu kondisi yang paling berat bisa sampai *postpartum psychosis*. *post partum blues* sering menyebabkan terputusnya interaksi antara ibu dan anak, mengganggu perhatian dan bimbingan yang dibutuhkan bayinya untuk berkembang dengan baik. (Ishikawa et al, 2011).

Beberapa penelitian mengungkapkan faktor penyebab terjadinya *postpartum*. Seperti pengambilan sampel dari penelitian ibu-ibu dengan usia dibawah 20 tahun. Dari penelitian tersebut, dapat mengungkapkan bahwa beberapa faktor terjadinya *post partum blues* yaitu dukungan sosial, pendidikan serta paritas. Individu yang mengalami persalinan dengan usia dibawah 20 tahun, namun memiliki dukungan sosial yang baik, tidak akan mengalami *postpartum blues* (Chasanah dkk, 2016). Tingkat pendidikan dari seseorang dapat mempengaruhi pola pikir dan selalu memandang situasi, termasuk *postpartum blues*. Beberapa orang memiliki pendidikan tinggi beda halnya dengan yang berpendidikan rendah, sehingga yang berpendidikan rendah cenderung berisiko akan mengalami yang namanya *postpartum blues* (Chasanah dkk, 2016).

Beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya *post partum* diantaranya faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal berupa kondisi biologis, psikologis, kepribadian, riwayat kehamilan, bayi berat badan rendah, hingga kondisi kesehatan ibu ketika perinatal. Sedangkan faktor eksternal

dapat berupa dukungan dari suami dan keluarga, pengalaman persalinan, serta kondisi lingkungan disekitarnya (Mansyur, 2014).

Persalinan rata-rata terjadi pada individu umur diatas 20 tahun. Dengan individu diusia tersebut diperkirakan sudah memiliki kematangan emosional, kesiapan fisik dan mental, serta kesiapan psikologis dalam membina suatu keutuhan rumah tangga. Apabila seorang individu mengalami persalinan dibawah umur 20 tahun maka akan berakibat terjadinya postpartum blues. (Chsanah dkk, 2016).

Masa nifas sangat mempengaruhi kesuksesan dan lancarnya menjadi orang tua. Sebagian perempuan harus berhasil menyesuaikan diri dengan baik dan bersemangat untuk mengurus bayinya, tetapi sebagian lagi lebih tidak mampu menyesuaikan dirinya dan akan mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang dialami berupa sering marah, lelah, sedih dan merasa putus asa. (Arfian,2012 : 2).

Ibu yang menderita post partum blues akan berdampak pada bayinya, seperti berat badan bayi turun karena tidak diberi ASI pada sang ibu. Anak adalah titipan dan anugrah yang di titipkan oleh kedua orang tua yang dipercaya oleh Allah. Sebagai orang tua harusnya menjaga, memberi nutrisi yang baik pada anaknya dan memberikan didikan yang baik agar menjadi anak yang bisa dibanggakan dikemudian hari .

Perhatian terhadap masalah post partum blues di Indonesia masih kurang. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa post partum blues syndrome hanya akan dialami oleh wanita diluar Indonesia. Banyak orang yang beranggapan

bahwa wanita di Indonesia tidak akan mungkin mengalami post partum blues syndrome karena masih banyak sikap kekeluargaan untuk membantu kerabat yang baru melahirkan. Ada hubungan yang signifikan antara kehamilan usia muda dengan postpartum blues (Yulisti, Yuni dkk 2018). Hasil ini sesuai teori Susanti (2018) bahwa usia merupakan salah satu faktor resiko postpartum blues.

Usia yang berisiko mengalami postpartum blues kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Faktor terjadinya postpartum blues adalah pada usia kurang dari 20 tahun (Yurike, Siti, 2019). Hal ini diperkuat dengan pengamatan penulis dari beberapa rumah sakit dan puskesmas yang telah diobservasi sebelumnya bahwa belum terdeteksi pasti kasus *post partum blues*. pada tahun 2021, penulis melaksanakan praktik kebidanan di Rumah Sakit Bhayangkara dan menemukan beberapa kejadian post partum blues yang dialami ibu, sehingga penulis sangat tertarik untuk memilih kasus asuhan kebidanan pada ibu yang mengalami post partum blues di rumah sakit bhayangkara Makassar.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan postpartum blues di Rumah Sakit Bhayangkara Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mampu melaksanakan Asuhan Kebidanan pada postnatal care tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis data *post partum blues* di RS Bhayangkara.

- a. Dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosis dan masalah aktual pada kasus *post partum blues* di RS Bhayangkara
- b. Dilakukannya pengkajian untuk menegakkan diagnosis dan masalah potensial pada kasus *post partum blues* di RS Bhayangkara
- c. Dilakukannya tindakan segera pada kasus *post partum blues* di RS Bhayangkara
- d. Direncanakannya tindakan asuhan kebidanan pada kasus *post partum blues* di RS Bhayangkara
- e. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada kasus *post partum blues* di RS Bhayangkara
- f. Dilakukannya evaluasi hasil tindakan asuhan kebidanan pada *post partum blues* di RS Bhayangkara
- g. Dilakukannya pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada kasus kasus pada *post partum blues* di RS Bhayangkara
- h. Dilakukannya penelusuran mendalam terhadap literature untuk mencari dan mendiskusikan kesenjangan antara teori dan fakta kasus di lapangan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pengolahan program kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara dalam mencegah dan penanganan post partum blues.

2. Manfaat Pengembangan Ilmu Pengetahuan

a. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan acuan bagi penulisan karya tulis ilmiah berikutnya.

b. Pelaksanaan asuhan kebidanan ini adalah pengalaman ilmiah yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang post partum blues.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi penulis karena meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang post partum blues.

4. Manfaat Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswi kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pelaksanaan asuhan kebidanan post partum blues.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca tentang post partum blues.

E. Metode Penulisan

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu peneliti mempelajari literatur dan media internet (scholar/cendikia), antara lain: mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Studi kasus yaitu penelitian melaksanakan metode pendekatan pemecahan masalah dalam kebidanan antara lain pengkajian, merumuskan diagnose/masalah aktual dan potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan, melaksanakan tindakan dan mengevaluasi asuhan kebidanan serta mendokumentasikan dengan post partum blues. Untuk mendapatkan data yang akurat peneliti menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Peneliti memberikan tanya jawab dengan klien yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Peneliti akan bertanya

tentang riwayat terkait pengalaman persalinan yang dialami atau pertanyaan lainnya yang relevan yang dapat memberikan informasi faktor apa yang menyebabkan ibu terkena post partum blues.

b. pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yang inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Pemeriksaan dignostik lainnya juga dilakukan dengan menggunakan format pengkajian. Pemeriksaan post partum blues peneliti melihat dan mendeteksi apakah ada masalah pada fisik klien yang membuat sang ibu merasa kesakitan dan akhirnya trauma yang menyebabkan terjadinya post partum blues.

c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan dan interaksi ibu dengan bayinya, apakah ibu ingin menyusui bayinya atau tidak.

3. Studi Dokumentasi

Studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya. Studi dokumentasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dan penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Peneliti mengadakan Tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan di Rumah Sakit Bhayangkara yang menangani langsung klien Ny "S" tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. sistematika penelitian

Penelitian ini disusun dalam bentuk laporan sistematis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan dijelaskan dalam uraian berikut.

BAB I berisi tentang pendahuluan. BAB ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematis penulisan. Dalam BAB ini, dirumuskan mengapa penting untuk mengkaji kasus *post partum blues* pada Ny "S" di Rumah Sakit Bhayangkara.

BAB II tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perubahan fisiologis dan psikologis ibu masa nifas, tinjauan khusus tentang *post partum blues*, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

BAB III yaitu studi kasus, akan menguraikan 7 langkah varnay terhadap klien Ny "S" dengan masalah *post partum blues*. ketujuh langkah varnay tersebut terdiri dari identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan

segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori mengenai *post partum blues* dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan pan Ny “S” di Rumah Sakit Bhayangkara dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu tersebut saat dalam masa nifas dengan *post partum blues*.

Pada BAB V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan terhadap Ny “S”. semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka. Bagian ini memutar daftar literatur ilmiah yang telah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang masa nifas

1. Masa Nifas

a. Pengertian

Masa Nifas atau masa puerperineum adalah masa setelah persalinan selesai setelah 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. perubahan organ reproduksi ini disebut involusi (Sulfianti,dkk 2021).

b. kebutuhan fisik ibu masa nifas

1) nutrisi dan cairan

Diet perlu dapat perhatian yang serius pada masa nifas oleh karena itu nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan meningkatkan kualitas komposisi Asi (Ambarwati dan wulandari, 2010).

2) istirahat yang cukup apabila bayi sedang tidur agar kondisi ibu bisa kembali normal.

c. Tujuan asuhan masa nifas

- 1) Membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal mengasuh anak
- 2) Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun fisiologis

- 3) Mencegah dan mendeteksi dini komplikasi pada ibu nifas
- 4) Merujuk ke tenaga ahli bila diperlukan
- 5) Mendukung dan memperkuat keyakinan diri ibu dan memungkinkan melaksanakan peran sebagai orang tua
- 6) Memberikan pelayanan KB

2. Perubahan fisiologis

Perubahan fisik pada ibu pada saat menjalani masa nifas adalah salah satu faktor yang membuat ibu cemas dan akan menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Perubahan fisik yang akan dialami ibu berupa rasa kram dan mules dibagian bawah perut akibat penciutan rahim (involusio), keluarnya sisa-sisa jaringan darah dari vagina (lochea) kemudian ibu merasa kelelahan karena proses persalinannya, pembentukan ASI sehingga payudara membesar dan perlukan dijalan lahir (Walyani, 2015:3).

Setelah menjalani masa kehamilan dan persalinan yang membuat postur tubuh ibu akan kembali seperti semula sebelum hamil, ibu akan mengalami perubahan fisiologis, perubahan yang akan terjadi yaitu :

a. Sistem kardiovaskuler

Curah jantung, volume dan denyut jantung meningkat segera setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah keplasenta yang mengakibatkan beban jantung meningkat yang dapat diatasi dengan haemokonsentrasi sampai

volume darah kembali normal, dan pembuluh darah kembali ke ukuran semula (Martalia, 2012: 26)

b. Sistem reproduksi

Perubahan fisiologi sistem reproduksi pada ibu masa nifas ada 5 yakni :

1) Uterus

Uterus secara berangsur-angsur menjadi kecil (invulasi) sehingga akhirnya kembali seperti sebelum hamil. Perubahan uterus 1 minggu pada ibu pasca melahirkan tinggi fundus uterus ibu teraba pertengahan pusat simpisis dengan berat uterus 500 gram. Dua minggu *post partum* tinggi fundus uteri tidak teraba diatas simpisis dengan berat uterus 350 gram. Enam minggu *post partum* fundus uteri bertambah kecil dengan berat uterus 50 gram (Martalia, 2014 : 17)

2) Lochea

Cairan sekret yang berasal dari cavum uteri dan vagina pada masa nifas biasa disebut dengan *lochea*. Beberapa macam *lochea* yaitu *Lochea rubra*. Lochea ini terjadi pada hari ke 1-3 setelah persalinan, warna merah terang sampai dengan merah tua yang mengandung desidua. Cairan *rubra* ini berupa cairan yang bercampur darah dan sisa-sisa selaput ketuban, berbau amis.

Lochea sanguinolental, *lochea* ini berwarna merah kuning berisi darah dan lendir karena pengaruh plasma darah, pengeluarannya pada hari ke 3-5 hari *post partum*. *Lochea serosa* yaitu pengeluaran sekret berwarna merah muda sampai kecoklatan terjadi pada hari ke-5 sampai hari ke-9 pasca persalinan, yang mengandung cairan serosa, jaringan desidua, leukosit, dan eritrosit. *Lochea alba* muncul lebih dari hari ke-10 *post partum*. Warnanya lebih pucat, putih kekuningan, serta lebih banyak mengandung leukosit, selaput lendir serviks dan selaput jaringan mati. *Lochiotosis* adalah *lochea* yang sudah tidak lancar keluar. *Lochea* yang tetap berwarna merah setelah 2 minggu ada kemungkinan tertinggalnya sisa plasenta atau karena involusi kurang baik (Marmi, 2012 : 89).

3) Serviks

Uterus dan serviks mengalami involusi bersama-sama. setelah persalinan, ostium eksterna dapat dimasuki oleh 2 hingga 3 jari tangan, setelah 6 minggu persalinan serviks menutup (Rukiyah, 2014 : 60).

4) Vulva dan vagina

Vulva dan vagina mengalami peregangan serta penekanan yang sangat besar selama proses

melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina sevara berangsur-angsur akan muncul kembali sementara labia akan menjadi lebih menonjol (Martalia, 2014 : 19).

5) Perineum

Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur akibat tekanan kepala bayi yang bergerak maju. pada hari ke lima pasca melahirkan perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya sekalipun tetap lebih kendur dari pada keadaan sebelum melahirkan Walyani (2015 : 66).

c. Payudara

Kadar prolaktin yang disekresi oleh hipofisis anterior meningkat secara stabil selama kehamilan, namun hormone plasenta menghambat produksi ASI. Setelah kelahiran plasenta, konsentrasi estrogen dan progesterone menurun, prolactin dilepaskan dan produk ASI dimulai. Pelepasan oksitosin kelenjar hipofisis posterior distimulasi oleh hisapan bayi. ASI yang pertama keluar pada awal nifas disebut kolostrum. Payudara ibu menjadi besar dan keras sebagai tanda mulainya laktasi Walyani (2015 : 69).

d. Sistem perkemihan

Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Ibu masa nifas terkadang takut untuk buang air kecil karena takut luka bekas jahitannya terlepas. Urine dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam sesudah melahirkan (Rukiyah, 2014 :65).

e. sistem grastointestinal

Faal usus dibutuhkan 3-4 hari untuk kembali normal. Walaupun kadar progesteron menurun setelah melahirkan, namun asupan makanan juga mengalami penurunan selama dua hari, gerak tubuh berkurang dan usus bagian bawah jika sebelum melahirkan diberikan edema. Rasa sakit didaerah perineum dapat menghalangi keinginan ke belakang (Rukiyah, 2014 : 63).

f. Sistem integument

Kloasma yang biasa muncul pada masa hamil biasanya menghilang pada saat kehamilan berakhir. *Linea nigra* dan hiperpigmentasi di *aereola mammae* tidak menghilang seluruhnya setelah bayi lahir. pigmentasi di daerah tersebut mungkin menetap pada beberapa ibu (Roito, 2013 : 73).

3. Adaptasi psikologis ibu masa nifas

Wanita masa nifas akan mengalami perubahan psikologis yang nyata sehingga memerlukan adaptasi. Sering menangis, lekas marah,

dan sering sedih adalah manifestasi dari emosi yang labil. Proses adaptasi psikologis sudah terjadi selama kehamilan, menjelang proses kelahiran maupun setelah persalinan. Masa nifas adalah masa dimana sangat rentan terjadinya perubahan psikologis pada ibu dimana seorang ibu memerlukan adaptasi. Dorongan dan perhatian dari keluarga dan suami adalah dukungan positif untuk ibu. Negara maju maupun Negara berkembang yang menjadi perhatian khusus bayi para ibu dan keluarga hanyalah tertuju pada masa kehamilan dan persalinan, sementara itu keadaan yang sebenarnya merupakan kebalikannya, sehingga resiko kematian dan kematian ibu dan bayi lebih sering terjadi pada masa pasca persalinan (Prawirohardjo, 2014 : 84). Fase-fase yang akan dialami ibu pada masa nifas yaitu *fase taking in, fase taking hold, dan fase letting go* (Teori reva rubin)

a. *Fase taking in*

Fase ini merupakan periode ketergantungan, yang berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada fase ini ibu lebih cenderung memperhatikan dirinya dan pasif terhadap lingkungannya. Hal tersebut dikarenakan ketidaknyamanan yang dirasakan ibu seperti luka jahitan, kelelahan, kurang tidur dan rasa mules. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini yaitu banyak istirahat, asupan nutrisi yang cukup dan komunikasi yang baik (Nugroho, 2014:116). Gangguan psikologis yang mungkin dirasakan

oleh ibu pada *fase taking in* menurut Wahyuni (2015 : 79-80) ada 4 yaitu:

- 1) Kekecewaan karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan tentang bayinya missal jenis kelamin tertentu, warna kulit, jenis kulit, jenis rambut dan lainnya.
- 2) Rasa bersalah karena belum menyusui bayinya
- 3) ketidaknyamanan sebagai akibat dari perubahan fisik yang dialami ibu missal rasa mules karena rahim berkontraksi untuk kembali pada keadaan semula, payudara bengkak, dan nyeri luka jahitan.
- 4) Suami atau keluarga yang mengkritik ibu tentang cara merawat bayi dan cenderung melihat saja tanpa membantu. ibu akan tidak merasa nyaman karena hal tersebut bukan hanya tanggung jawab semata.

b. *Fase taking hold*

Fase ini terjadi 3-10 hari pasca melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir tidak dapat merawat bayinya, ibu berupaya menguasai keterampilan perawatan bayinya. Perasaan ibu yang sensitife sehingga mudah merasa tersinggung. Ibu memerlukan dukungan dari keluarga maupun suami pada fase ini, karena pada fase ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat diri dan bayinya sehingga tumbuh rasa percaya diri (Nurjannah, 2013 : 76).

c. *Fase letting go*

Masa ini terjadi apabila ibu telah pulang kerumah dan fase ini melibatkan orang tua. Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu langsung mengambil keputusan untuk bertanggung jawab dalam merawat bayinya, dia harus menyesuaikan diri dengan segala keperluan dan kebutuhan bayinya serta interaksi sosial. Keinginan ibu untuk merawat diri dan bayinya untuk meningkat fase ini. Secara psikologis, seorang wanita yang baru saja melahirkan akan mengalami tekanan psikis (Martalia, 2014 : 32).

Banyak wanita yang merasa sangat bahagia dengan kelahiran bayinya, namun dengan seiring berjalannya waktu, maka akan ada gangguan yang muncul seperti perubahan suasana hati, perasaan sedih dan tekanan yang dirasakan oleh seorang wanita setelah melahirkan yang berlangsung pada minggu pertama, terutama pada hari ketiga hingga kelima. Gangguan psikologis tersebut disebut dengan post partum blues (Hasni, 2012 dalam Fitriana 2016).

4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas sangatlah berpengaruh pada kondisi psikologi dan fisiologi ibu pada masa nifas. Beberapa peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas

yaitu memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas, bidan sebagai promotor hubungan ibu dengan bayi serta keluarga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya sampai usia 6 bulan secara *on-demand*, mendeteksi komplikai-komplikasi yang mungkin terjadi dan apakah hal tersebut butuh penanganan segera atau rujuk, membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan administrasi (Rini, 2016 : 4-6).

5. Program Nasional dan kebijakan pada masa nifas

Kunjungan masa nifas bertujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir dan untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah kunjungan pada masa nifas memiliki keuntungan yang sangat jelas karena membuat bidan dapat melihat dan berinteraksi dengan anggota keluarga klien. Bidan mampu mengkaji kecukupan sumber yang ada di rumah. Semakin meningkatnya angka kematian ibu di Indonesia pada saat masa nifas (sekitar 60 %) mencetuskan pembuatan program dan kebijakan teknis yang lebih baru mengenai jadwal kunjungan pada masa nifas, dilakukan untuk menilai keadaan ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi dan menangani masalah-

masalah yang terjadi. Frekuensi kunjungan pada masa nifas menurut (Walyani 2015 : 129-131) adalah :

a. Kunjungan 1 (6-8 jam setelah persalinan)

Tujuan pada kunjungan pertama pada masa nifas ini yaitu untuk mencegah masa nifas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga, bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri. Pada kunjungan ini bidan juga mendukung ASI eksklusif, membina hubungan antara ibu dan bayi dengan dilakukannya rawat gabung, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah terjadinya hipotermi.

b. Kunjungan II (6 hari setelah persalinan)

Kunjungan kedua pada masa nifas bertujuan untuk memastikan involusio uterus berjalan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tidak ada perdarahan abnormal atau ada bau. Kunjungan 6 hari setelah persalinan ini juga bidan perlu menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau perdarahan abnormal serta memastikan ibu menyusui bayinya dengan benar, memastikan ibu mendapatkan makanan, cairan dan istirahat yang cukup serta memberikan konseling cara merawat bayi dan tali pusat.

c. Kunjungan III (2 minggu setelah persalinan)

Kunjungan 2 minggu setelah persalinan sama dengan kunjungan 6 hari setelah persalinan, bidan tetap memperhatikan involusi uterus, cara ibu menyusui, nutrisi dan istirahat ibu cukup dan juga memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari seperti mengganti popok bayi ketika basah, dan mengganti pakaian bayi ketika lembab.

d. Kunjungan IV (6 minggu setelah persalinan)

Kunjungan keempat pada masa nifas ini bertujuan menanyakan kepada ibu penyulit yang ia dan bayinya alami serta memberikan konseling tentang keluarga berencana (KB). jenis alat kontrasepsi apa yang ibu ingin gunakan apakah hormonal atau non hormonal. Kontrasepsi berasal dari dua kata yakni kontra mencegah/melawan dan konsepsi yakni pertemuan antara sel telur matang dari sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. jadi yang dimaksud dengan kontrasepsi yaitu upaya untuk menceah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara, dapat pula bersifat permanen (Firdayanti, 2012)

tabel 2.1 Kunjungan masa nifas

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah pendarahan karena atonia uteri b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut c. Memberikan konseling pada ibu dan salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri d. Pemberian ASI awal e. Melakukan hubungan ibu dan bayi baru lahir f. Menjaga bayi agar tetap sehat dengan caramencegah hipotermi g. Jika petugas kesehatan yang menolong persalinan ia harus tinggal dengan ibu dari bayi lahir untuk 2 jam pertama setelah melahirkan sampai ibu dan bayi dalam keadaan stabil.
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau b. Menilai adanya tanda-tanda infeksi, demam, infeksi dan oerdarahan abnormal c. Memastikan ibu mendapatkan cukup makan, cairan dan istirahat d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan kepada bayi dan cara merawat tali pusat, serta menjaga
3	2 minggu setelah persalinan	Sama dengan atas (6 hari setelah persalinan)
4	6 minggu setelah persalinan	Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alamidan memberikan konseling KB secara dini

Sumber : Pitriani, 2014 : 12-13

B. Tinjauan umum tentang post partum blues

1. Definisi

Post partum blues merupakan suatu sindroma gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan dan memuncak pada hari ke tiga sampai kelima dan menyerang dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan (Rini, 2016 : 92). Sedangkan menurut (Irawati, 2014) *post partum blues* adalah keadaan transien dari peningkatan reaktifitas emosional yang dialami oleh separuh dari wanita dalam jangka waktu satu minggu pasca persalinan. Postpartum blues dapat menjadi masalah yang mengganggu keharmonisan pasangan suami-istri, tidak menyenangkan, serta menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyaman bagi ibu yang mengalaminya (Susanti, 2018).

Gejala klinis dapat dilihat dari hari ke 3 sampai hari ke 5, kemudian menghilang beberapa jam hingga beberapa hari kemudian. Post partum blues umumnya terjadi 50% pada ibu baru (Rahayu, 2017).

Periode post partum menyebabkan stres emosional terhadap ibu baru, bahkan lebih menyulitkan jika terjadi perubahan fisik yang sangat hebat. Angka kejadian *post partum blues* di Asia cukup tinggi dan bervariasi antara 26-85%, sedangkan di Indonesia angka kejadian *post partum blues* antara 50-70% dari wanita pasca persalinan (Susanti, 2017).

2. Faktor penyebab *post partum blues*

Faktor penyebab terjadinya *post partum blues* dapat dilihat dari beberapa faktor, baik karena pengalaman persalinan, dukungan suami sampai dengan usia ibu saat melahirkan. Beberapa faktor penyebab terjadinya *post partum blues*, yaitu:

a. Faktor hormonal

Faktor hormonal berupa perubahan kadar estrogen, progesterone, prolaktine, serta estriol terlalu rendah. Kadar estrogen turun secara tajam setelah melahirkan dan ternyata estrogen memiliki efek supresi aktivitas non adrenalin maupun serotin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi (Arfian, 2012 : 3).

b. Ketidaknyamanan fisik

Ketidaknyamanan fisik yang dialami sehingga menimbulkan perasaan emosi pada wanita pasca melahirkan, seperti rasa sakit akibat luka jahitan, pengalaman persalinan yang kurang menyenangkan, atau bengkak pada payudara. Ibu dengan riwayat operasi *Caesar* juga memiliki resiko terkena *post partum blues* karena proses penyembuhannya lebih lama sehingga membuat ibu tidak nyaman (Irawati, 2014). Data yang diperoleh dari Azizah (2016) pada tanggal 1 sampai 28 februari 2013 didapatkan hasil dari 39 ibu bersalin post SC, didapatkan 55% ibu mengalami *post partum blues*.

c. Melahirkan dengan usia terlalu muda atau terlalu tua

Usia terlalu muda dan terlalu tua berarti ibu yang melahirkan dengan usia <20 tahun dan > 35 tahun. penelitian ini dilakukan oleh Yuliani (2013) menyatakan bahwa kejadian *post partum blues* lebih banyak dialami oleh wanita yang berusia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun (81,8%). Kehamilan dan persalinan pada remaja menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya *post partum blues*. Indonesia termasuk Negara dengan presentase pernikahan usia muda tertinggi didunia (Ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja (Chasanah, 2016).

d. Dukungan suami dan keluarga

Dukungan suami dan keluarga sangatlah penting bagi sang ibu apalagi pada saat proses persalinan. Dampingan yang dilakukan oleh suami dan keluarga pada saat ibu melahirkan merupakan hal yang penting karena ibu merasa aman dan juga merupakan salah satu aspek sayang ibu (Hidayah, 2017). Ibu yang ditunggu suami terlihat bahagia setelah melahirkan, sedangkan ibu yang melahirkan tanpa suaminya (2 orang) tetap terlihat bahagia sedangkan dua orang lagi terlihat kurang bahagia karena tidak ada suami disampingnya (Hidayah, 2016).

e. Persiapan kehamilan dan menjadi ibu

Persiapan kehamilan dan menjadi ibu adalah salah satu penyebab terjadinya *post partum blues*. Kehamilan yang tidak

diharapkan seperti hamil diluar nikah, kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan yang tidak direncanakan sehingga wanita tersebut belum siap menjadi ibu. Beberapa ibu mampu beradaptasi setelah melahirkan, tetapi banyak ibu-ibu yang tidak mampu beradaptasi sehingga muncul perasaan sedih, tidak ingin mengurus bayinya.

Sebagian wanita lain menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan pada beberapa wanita termasuk remaja, kehamilan merupakan akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu dirinya hamil, namun sering waktu mereka akan menerima kehadiran seorang anak (Rahayu, 2017).

f. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi juga sangat berpengaruh pada ibu yang terkena *post partum blues*. Ekonomi yang kurang akan menyebabkan ibu merasa khawatir tentang masa depan anaknya sehingga ibu mengalami tekanan yang mengakibatkan terjadinya *post partum blues*.

g. Keadaan bayi saat lahir

Keadaan bayi saat lahir juga berpengaruh pada ibu yang terkena *post partum blues*. Keadaan bayi yang cacat atau jenis kelamin yang tidak di inginkan membuat ibu sulit menerima keadaan bayinya.

Dalam Islam dianjurkan untuk bersabar menerima kondisi apapun yang diberikan oleh Allah, karena anak merupakan titipan atas amanah yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab. Anak yang Allah berikan kepada kita adalah titipan yang harus dijaga, dididik, dan dijaga agar tumbuh menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Ibu hendaknya harus terus bersabar dan menerima apapun kondisi bayinya. Allah Swt telah menyebutkan bahwa anak merupakan cobaan bagi orang tuanya hal tersebut disebutkan dalam Qs. an-Nahl/78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabi

Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian sesudah masa kehamilan sedang kalian tidak mengetahui apapun yang ada di sekitar kalian, kemudia Allah menjadikan bagi kalian sarana-sarana pengetahuan berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Mudah-mudahan kalian beryukur kepada Allah , atas nikmat-nikmat tersebut. Dan mengesakan Allah dengan ibadah.

h. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional, ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan memiliki cara berfikir yang lebih rasional, dan semakin mudah untuk menerima informasi. Ibu yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kehamilan dan persalinan umumnya akan sulit dalam menyesuaikan dirinya terhadap peran dan aktivitas barunya sehingga memungkinkan terjadinya gangguan psikologis seperti *post partum blues*.

3. Tanda dan gejala *post partum blues*

Post partum blues memiliki tanda gejala seperti sedih berlebihan, menangis tiba-tiba, mudah tersinggung, sulit tidur, nyeri kepala, dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Persiapan kehamilan, persalinan sampai dengan masa nifas yang baik, serta dukungan suami yang tinggi memiliki kecenderungan untuk tidak terjadinya *post partum blues* (Desfanita, 2015). *post partum blues* biasanya terjadi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa literatur dan penelitian menunjukkan bahwa depresi saat kehamilan dapat berkembang menjadi depresi pasca persalinan. Wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan akan mengalami peningkatan depresi dan stress yang akan berlanjut pada saat setelah melahirkan (Susanti, 2013 :26).

Selain gejala yang telah diuraikan pitriani juga mengatakan bahwa gejala post partum blues terbagi atas 2, yaitu gejala umum dan gejala medis.

a. Gejala umum

- 1) Perasaan negative terhadap bayi yang dilahirkannya(termasuk adanya keinginan untuk membunuh bayi tersebut)
- 2) Perubahan drastis berat badan
- 3) Adanya perasaan untuk membenci diri sendiri, perasaan bersalah dan merasa dirinya tidak berguna bagi orang lain
- 4) Sama sekali tidak bisa berkonsentrasi walaupun dengan masalah kecil
- 5) Mudah marah,mudah terhasut,kegelisahan secara mendalam dan kehilangan harapan
- 6) Merencanakan dan percobaan bunuh diri
- 7) Sering terganggu dalam waktu istirahat dan insomnia berat
- 8) Muncul perasaan malas untuk mengurus bayinya (Pitriani, 2014 : 82).

b. Gejala medis

Gejala post partum blues sampai sekarang belum ada tes khusus yang dapat mengdiagnosis gejala langsung *post partum blues*. Secara medis dokter menyimpulkan beberapa sistem yang dapat tampak disimpulkan sebagai depresi *post*

partum blues bila memenuhi gejala yang ada. Kekurangan hormon tiroid pada individu yang mengalami kelelahan yang luar biasa (*fatigue*) ditemukan juga pada ibu yang mengalami *post partum blues* jumlah kadar tyroid yang sangat rendah. (Pitriani, 2014 : 93).

4. penanganan post partum blues

a. Pendekatan spiritual

Manusia terdiri atas islam dan rohani yang bersikap spiritual, oleh karenanya dalam penyembuhan diperlukan hal-hal yang bersifat rohani atas spiritual seperti pendekatan kepada yang maha kuasa sebagai sumber segala sesuatu yang terjadi, baik melalui ibadah dalam bentuk shalat ataupun dalam bentuk bacaan Al-Qur'an. Dengan bacaan Al-Qur-an dapat menjadi penenang atau penyembuhan bagi orang-orang, firman Allah swt dalam Qs. Al-Isra/15:82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا

يُزَالِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya

“Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian (Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 2013 : 315)”

Obat yang dimaksud dalam ayat ini meliputi obat atas segala penyakit, baik rohani maupun jasmani dengan spesifikasi tertentu, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah didalam ayat ini dipahami sebagai bantuan dari Allah, sehingga ketidakberdayaan dalam bentuk apapun tertanggulangi. Rahmat Allah yang dilimpahkan kepada umat islam adalah kebahagiaan hidup sebagai akibat dari ridha-Nya, termasuk didalam kehidupan diakhirat kelak. Karena itu jika Al-Qur'an dipahami sebagai rahmat bagi umat islam, maka maknanya adalah sebagai limpahan karunia berupa kebajikan dan keberkatan yang disediakan oleh Allah bagi mereka (umat islam) yang memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Allah dan Al-Qur'an (Shihab, 2002 : 110)

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah obat dari penyakit hati, maka salah satu penanganan postpartum blues yaitu menganjurkan ibu untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar suasana hati ibu menjadi tenang. Ada beberapa ayat yang didengar oleh ibu yang membuat hati tenang yaitu surah Qs al-Zalzalah:7-8,Qs.Hud : 119,Qs-Al-Fajr:14,Qs. Al-A'la:17,dan Qs. Al- Baqarah: 261 dan 195. Qori yang disarankan ibu yaitu Syaik Mansur Al-Salmi.

Selain mendengarkan ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi tenang pada kasus *post partum blues* ibu juga dianjurkan untuk selalu bermunajah kepada Allah swt terdapat dalam Qs.surah Al-Ra'ad:28 yang artinya(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram, selain itu harus memperbanyak doa dan zikir.

b. Pendekatan medis

Menurut Marni (2014) dalam Pratama (2016) terdapat 3 penanganan post partum blues yaitu:

1) Komunikasi terapeutik

Komunikasi terapeutik bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara bidan dengan pasien dalam rangka kesembuhan klien dengan cara mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan dapat memahami dirinya sendiri.

2) Peningkatan *support* mental

peningkatan support mental dapat dilakukan oleh keluarga pasien diantaranya yaitu:

- a. Meminta suami untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu

- b. Memanggil nenek atau keluarga bayi agar bisa menemani ibu dalam menghadapi kesibukan merawat bayi
 - c. Suami lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya
 - d. Menyiapkan mental dalam menghadapi kelahiran anaknya
 - e. Suami menggantikan peran istri ketika istri kelelahan dan memperbanyak dukungan dan menemani istri dalam mengurus bayinya
 - f. Ibu dianjurkan sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga
- 3) Dilakukan pada diri klien sendiri

Penanganan post partum blues juga dapat dilakukan pada diri klien itu sendiri dengan cara anjurkan ibu belajar tenang dengan menarik nafas panjang, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan, ikhlas dan tulus dengan peran barunya menjadi seorang ibu. Bicarakan rasa cemas dan komunikasikan masalah yang ada, bersifat fleksibel dan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu baru. Pitriani (2014: 83-84) mengatakan bahwa terdapat 7 cara menangani post partum blues yaitu :

- a. Komunikasi segala permasalahan hal lain yang ingin diungkapkan
- b. Bicarakan raa cemas yang dialami dan belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi
- c. Bersikap tulus dan ikhlas dalam menerima aktivitas dan tugas baru pasca melahirkan
- d. Bersifat fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga
- e. Dukungan oleh tenaga kesehatan yang sangat membantu dan memberi semangat ibu ,dukungan suami,keluarga,teman,dan sesama ibu
- f. Memberikan motivasi pada ibu.

Terdapat 2 cara memberikan motivasi, yang pertama

yaitu motivasi langsung (*direct motivation*) yang

diberikan secara langsung kepada setiap individu yang sifatnya khusus seperti pujian. Motivasi yang kedua

yaitu motivasi tidak langsung (*indirect motivation*)

yaitu motivasi yang diberikan hanya fasilitas-fasilitas

yang mendukung dan menunjang gairah sang ibu

dalam merawat sang bayi,seperti ruangan yang bersih (

Donsu,2017 : 57)

Saat ini diindonesia, wanita dengan depresi post partum belum dilaporkan secara pasti insidensinya. Biasanya penderita baru akan dikenali

bila kondisinya sudah mengalami depresi berat (*post partum psycho*). Pentingnya petugas kesehatan untuk mengkaji kondisi psikologis ibu masa nifas dan menangani kasus *post partum blues* agar tidak berlanjut kepada depresi post partum.

5. Pencegahan yang dilakukan agar post partum blues tidak terjadi
 - a. Mempersiapkan diri sejak sebelum melahirkan bahwa masih ada perjuangan berat pasca persalinan nanti
 - b. Berkomunikasi dengan suami dan keluarga kemungkinan-kemungkinan terjadinya post partum blues pasca persalinan dan cara menanganinya jika hal tersebut benar-benar terjadi
 - c. Bergabunglah dengan kelompok ibu-ibu untuk saling tukar pengalaman dan tips untuk merawat buah hati
 - d. Berpikir positif atas semua hal yang terjadi
 - e. Cari yang bisa membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga jika memungkinkan. Jika tidak, sebaiknya komunikasikan dengan suami tentang pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan bayi
 - f. Menghindarimakanan yang manis serta makanan dan minuman yang banyak mengandung kafein karena kedua makanan ini berpotensi memperburuk depresi
 - g. Mengonsumsi makanan yang bernutrisi agar kondisi tubuh cepat pulih, sehat, dan segar.

A. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Konsep manajemen islam berkelanjutan menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya menjelaskan program atau rencana yang akan dilaksanakan untuk masa depan, agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Hal ini sudah diisyaratkan dalam QS. Al-Hasyr/ 59 : 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta perediksi masa yang akan datang. Karena perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan. (Kementrian Agama Republik Indonesia).

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah serta sistematis, mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana disetiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari

pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Proses manajemen asuhan kebidanan ini maka mudah kita dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

2. Tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan terdiri beberapa langkah yang berurutan yang dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Langkah tersebut membentuk kerangka yang lengkap yang bisa diaplikasikan dalam semua situasi. Akan tetapi, setiap langkah tersebut bisa dipecah-pecah kedalam tugas-tugas tertentu dan semuanya bervariasi sesuai dengan kondisi klien. Berikut langkah-langkah dalam proses penatalaksanaan menurut Varnay (2003). Adapun tahapan manajemen asuhan kebidanan menurut langkah Varnay adalah sebagai berikut :

a. Langkah 1 (pengumpulan data dasar)

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Langkah ini terdiri dari data *subjektif* dan data *objektif*.

Data *subjektif* adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Data *subjektif* antara lain biodata, riwayat kesehatan

pada riwayat kesehatan ditanyakan apakah ibu memiliki riwayat kesehatan pada riwayat kesehatan ditanyakan apakah ibu memiliki penyakit keturunan atau menular. Riwayat kehamilan, pada riwayat kehamilan ditanyakan pada ibu apakah kehamilannya direncanakan atau tidak direncanakan sehingga kelahiran bayi tidak diinginkan, kemungkinan ibu menjawab bahwa kehamilannya tidak diinginkan karena ibu sudah memiliki banyak anak.

Riwayat persalinan, pada riwayat persalinan ditanyakan pada ibu apakah ada penyulit yang dialami ibu pada saat bersalin seperti distosia bahu, persalinan lama, tindakan operasi *Caesar* atau masalah lainnya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan fisik pada ibu seperti luka jahitan, yang membuat ibu lelah dan tidak ingin mengurus bayinya pertanyaan terakhir yang dapat ditanyakan pada ibu yaitu kondisi psikologi ibu, dimana pada kasus *post partum blues* kemungkinan ibu mengatakan sulit tidur, mudah marah, cemas, tidak nafsu makan dan tidak ingin mengurus bayinya.

Data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium dan tes diagnostik lain yang di rumuskan dalam data fokus. Data objektif terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital,

pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi) pemeriksaan penunjang (laboratorium, cecatan baru dan sebelumnya). data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik pasien.

Pada kasus post partum blues pemeriksaan pada ibu yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital. pada pemeriksaan tanda-tanda vital kemungkinan pada tekanan darah tidak normal. Tekanan darah ibu bisa meningkat karena suasana hati ibu tidak stabil. tekanan darah yang rendah bisa terjadi karena ibu kurang tidur. Mata mungkin terlihat sembab karena sering menangis dan konjungtiva pucat akibat kurang tidur. payudara ibu kemungkinan mengalami bendungan ASI karena ibu tidak menyusui bayinya. pemeriksaan fisik yang mungkin didapatkan pada bayi ibu yang mengalami post partum blues yaitu dehidrasi, gizi buruk (berat badan bayi turun) dan rentan terhadap infeksi.

b. langkah II (merumuskan diagnosa actual)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan.

Pada khusus post partum blues dilakukan identifikasi diagnose kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengeluh sulit tidur, tidak dapat tidur, mudah marah, tidak ingin

mengurus bayinya dan merasa cemas. pada data objektif ditemukan tanda vital tidak normal, tidak ingin menyui bayinya sehingga kemungkinan terjadi bendungan ASI.

- c. langkah III (merumuskan diagnose/masalah potensial yang membutuhkan antisipasi masalah potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap-siap diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi.

Pada kasus *post partum blues* masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya pada ibu seperti gizi buruk, tekanan darah rendah, bendungan ASI yang akan berlanjut terjadinya abses payudara dan mastitis. Selain itu, juga masalah yang bisa timbul jika ibu tidak segera ditangani maka akan terjadi deperesi *post partum* dimana ibu memperlihatkan tanda ingin membunuh bayinya maupun dirinya sendiri.

- d. Langkah IV (Identifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera)

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter atau ada hal lain yang ingin dikonsultasikan atau

ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi ibu.

Pada kasus post partum blues diperlukan adanya tindakan segera atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain jika ibu menunjukkan tanda bunuh diri atau ingin membunuh bayinya atau terjadi masalah lainnya seperti bendungan ASI, mastitisi dan absen payudara. Apabila tanda tersebut tidak ditunjukkan ibu maka ibu cukup diberikan dukungan baik oleh bidan, keluarga dan suami. Dukungan suami dan keluarga tidak cukup dalam penanganan *post partum blues* ibu juga dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah swt dengan berzikir dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

e. Langkah V (Merencanakan asuhan yang menyeluruh)

Merencanakan asuhan menyeluruh secara rasional sesuai dengan temuan pada langkah sebelumnya. Adapun pelaksanaan post partum blues adalah dengan pendekatan spiritual dan pendekatan secara medis. Pendekatan secara spiritual yaitu ber'doa kepada Allah untuk diminta kesembuhan sambil membaca yang dianjurkan oleh Rasulullah saw yaitu letakkan tangan dibagian yang sakit dengan membaca Bismillah 3x.

Pendekatan secara medis dapat dilakukan dengan komunikasi terapeutik, peningkatan support mental yaitu dengan cara meminta suami membantu pekerjaan ibu, memanggil nenek atau keluarga untuk menemani ibu, dan ibu dianjurkan untuk sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga.

f. Langkah VI (Melaksanakan perencanaan)

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien, atau tim anggota kesehatan yang lain. *Post partum blues* dalam penanganannya dibutuhkan kerja sama yang baik antar bidan, klien dan keluarga/suami/pasien dalam memotivasi ibu untuk mengurus bayinya.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Mengevaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan hingga terjadi perubahan perilaku ibu yang mengalami *post partum blues*, mengulangi kembali proses manajemen dengan benar terhadap setiap aspek asuhan yang sudah dilaksanakan tapi belum efektif.

Melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu seperti kondisi psikis ibu seperti sudah ingin mengurus dan

memberikan asi pada bayinya. Evaluasi kondisi fisik ibu, dimana tekanan ibu sudah normal dan kondisi gizi ibu sudah baik. Kondisi spiritual ibu juga dievaluasi ibu dianjurkan untuk berzikir agar hati tenang. Firman Allah dalam Qs ar-Ra'd/13:28

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahan:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.

3. pendokumentasian asuhan kebidanan (SOAP)

Metode 4 langkah pendokumentasian yang disebut SOAP ini dijadikan proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan dipakai untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan klien dalam rekaman medis sebagai catatan perkembangan kemajuan yaitu:

a. subjektif (S)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh dari apa yang dikatakan, disampaikan dan dikeluhkan oleh klien melalui anamnee dengan klien. Analisis data subjektif yang didapatkan pada klien post partum blues didapatkan klien merasah mudah marah, tekanan darah naik, jantung berdebar-debar, tidak ingin menyusui bayinya dan sulit tidur.

b. objektif (O)

Merupakan ringkasan dari langkah I dalam proses manajemen asuhan kebidanan yang diperoleh melalui beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada ibu, melihat kondisi ibu sesuai dengan tanda dan gejala *post partum blues* serta melakukan pemeriksaan fisik inspeksi, palpasi, anuskultasi, perkusi apakah ada luka pada jalan lahir atau trauma yang dialami ibu sehingga merasa lelah dan enggan mengurus bayinya.

Data objektif yang mungkin didapatkan pada ibu yaitu tekanan darah yang tidak normal, gizi yang buruk, bendungan payudara akibat tidak menyusui bayinya yang mungkin akan berlanjut menjadi mastitis hingga abses payudara. Data objektif pada bayi mungkin akan didapatkan bayi mengalami dehidrasi dan gizi buruk.

c. Assesment (A)

Merupakan ringkasan dari langkah II, III dan IV dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana dibuat kesimpulan berdasarkan dari data subjektif dan objektif sebagai hasil pengambilan keputusan klinis terhadap klien, apakah ibu betul terkena *post partum blues*.

d. Planning (P)

Merupakan ringkasan dari langkah V, VI dan VII dalam proses manajemen asuhan kebidanan dimana planning ini

dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan dan evaluasi terhadap keputusan klien yang mengambil dalam rangka mengatasi masalah klien dan memenuhi kebutuhan klien. SOAP ini dilakukan pada asuhan terhadap ibu dengan postpartum blues pada tahap berikutnya.

Pada tahap terakhir ini melakukan kunjungan ulang dan mengkaji serta menanyakan keadaan umum dan TTV, memastikan sang ibu menyusui bayinya dengan memberikan ASI eksklusif, mengurus bayinya, serta ibu juga menjaga personal hygiene bayi maupun dirinya. Hari pertama sampai dengan hari ke-10 pada ibu yang mengalami post partum blues akan diberikan motivasi, dorongan dan dukungan baik dari keluarga, bidan dan suami.

Hari ke-10, dukungan psikologis tetap diberikan kepada ibu. Selain dukungan ibu juga diajari cara menyusui bayiny, merawat bayi dan menganjurkan ibu makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Minggu ke-2 akan dilakukan kunjungan lagi untuk memastikan kondisi psikologi ibu baik, involusio uterus berjalan normal, memastikan ibu menyusui dengan baik dan memberikan konseling cara merawat bayi dan tali pusat bayi. Minggu ke-6 memberikan konseling KB kepada ibu dan menanyakan penyulit apa saja yang dialami oleh ibu dan bayinya.

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM PADA NY

"S" DENGAN *POST PARTUM BLUES* DI RS BHAYANGKARA

MAKASSAR TANGGAL 08 NOVEMBER - 10 DESEMBER

TAHUN 2022

No Register : 08xxxx
Tanggal Partus : 8 November 2022 Jam : 10.00 wita
Tanggal Masuk Ruang Nifas : 8 November 2022 Jam : 01.25 wita
Tanggal Pengkajian : 9 November 2022
Pengkajian : Nurpiana Said

LANGKAH 1 : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny "S" / Tn "H"
Umur : 18 tahun / 18 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun
Suku : Makassar/ Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SD / SD
Alamat : JL. XXX

B. Data subjektif

1. Keluhan Utama

Ibu merasa terganggu karena bayinya rewel

2. Riwayat Keluhan Utama

- a. Ibu masih belum bisa beradaptasi dengan bayinya
- b. Ibu merasa nafsu makannya berkurang karena bayinya sangat rewel
- c. Jam istirahat ibu terganggu

3. Riwayat Kesehatan Ibu

Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, Diabetes Melitus (DM), hepatitis, tumor, hipertensi, Penyakit Menular Seksual (PMS), dan tuberkulosis (TBC). Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat, dan kejang.

4. Riwayat Kesehatan Keluarga

Ibu mengatakan tidak ada riwayat menular dan penyakit keturunan lainnya.

5. Riwayat Reproduksi

- a) Menarche : 15 tahun
- b) Siklus Haid : 28-30 hari
- c) Lamanya Haid : 3-5 hari
- d) Keluhan Haid : tidak ada

6. Riwayat Kehamilan

- a. Ibu mengatakan ini merupakan anak pertama dan tidak pernah keguguran
- b. Ibu mengatakan awalnya belum bersedia untuk hamil karena masih tinggal bersama mertua, ibu ingin mempunyai rumah terlebih dahulu atau tinggal bersama kedua orang tuanya
- c. Hari pertama haid terakhir : 20 Februari 2022
- d. Usia kehamilan saat melahirkan adalah 37 minggu 3 hari.
- e. Ibu pernah suntik TT sebanyak 2 kali

Tabel 3.1 pemeriksaan kehamilan

No	Tanggal	Usia kehamilan	Keluhan	Pendamping	Tempat
1	14-04-2022	18 minggu	Mual	Suami	PKM
2	08-06-2022	22 minggu		Mertua	PKM
3	07-07-2022	26 minggu	Pusing	Suami	PKM
4	04-08-2022	30 minggu		Suami	PKM

Sumber : Data Sekunder

7. Riwayat persalinan/ kelahiran sekarang

Tabel 7.1 Riwayat persalinan yang terakhir

No	Kala	Lama	Ket
1	Kala 1	7 jam	Normal
2	Kala II	15 menit	Ibu melahirkan secara normal dan terdapat ruptur tingkat II
3	Kala III	12 menit	Plasenta dan selaput lahir lengkap, dilakukan penjahitan laserasi tingkat 2 teknik jelujur secara mediolateral dengan benang catgut
4	Kala IV	2 jam	Normal, perdarahan 220 cc
Jumlah		9 jam 27 menit	

Sumber : Data sekunder

8. Data Bayi

- a. BBL : 3.250 gr
- b. PBL : 48 cm
- c. Jenis kelamin : Perempuan

- d. Apgar score : 8/10
- e. Kulit kemerahan
- f. Konjungtiva merah muda
- g. Sklera tidak ikhterus
- h. tali pusat masih basah dan terjepit dengan penjepit tali pusat, tidak ada tanda-tanda infeksi
- i. BAK : 1 kali, BAB : 1 kali (sejak kelahiran)
- j. Bayi kuat menyusui,refleks menghisap kurang baik
- k. Bayi terlihat tertidur sangat nyenyak
- l. Tanda-tanda Vital
 - 1) Suhu : 36,5 C°
 - 2) Pernapasan : 40 kali/menit
 - 3) DJB : 134 kali/menit

9. Riwayat KB  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
ibu tidak pernah menjadi akseptor KB jenis apapun

10. Data Psikososial
- a) Ibu mengatakan hubungan
 - b) nya dengan suaminya baik
 - c) Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami
 - d) ibu belum siap untuk hamil
 - e) Ibu mengurus rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah.
 - f) Hubungan ibu dan keluarganya baik

11. Data Ekonomi

- a) Pendapatan suami terkadang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang juga tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga

12. Data Spiritual

- a) Ibu jarang melakukan sholat 5 waktu, jika berpergian ibu kadang memakai jilbab dan kadang juga tidak
- b) Suami ibu menjelaskan sholat jika hari jumat saja
- c) Lokasi rumah ibu dengan mesjid sangat jauh

13. Status perkawinan

Ibu menikah dengan suaminya di umur 17 tahun dan menikah sudah 1 tahun lebih secara sah

14. Pola kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Sebelum melahirkan pola makan ibu teratur dengan frekuensi 3 kali sehari dengan menu makanan seperti nasi, sayur, dan lauk pauk. Ibu minum 7-8 gelas/hari.

b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 4-5 kali/hari, yang berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak. BAB sebanyak 1-2 kali/hari.

c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/hari

d. Personal Hygiene

Ibu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas setiap hari, rambut bersih dan sikat gigi 1 kali sehari.

C. Data Objektif

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Ekspresi ibu meringis setiap ibu bergerak
4. Pemeriksaan fisik terfokus

a. Mata

inspeksi : Konjungtiva pucat, sclera putih dan tidak ikhterus

b. Wajah

Inspeksi : Tidak ada cloasma gravidarum

Palpasi : Tidak ada oedema

c. Payudara

Inspeksi : Putting-susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan dan benjolan serta pada saat putting susu dipencet terdapat pengeluaran ASI

d. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU setinggi pusat, kandung kemih kosong

e. Genitalia

Inspeksi : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat 11(jumlah jahitan 6) dan masih basah,tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi

palpasi : Tidak ada oedema, terdapat nyeri tekan pada perineum

f. Ekstremitas

Inspeksi : Tidak ada varices, jari-jari ekstremitas atas dan bawah lengkap

Palpasi : Tidak ada oedema

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL

Diagnosa : P1A0, post partum hari kedua dengan gejala post partum blues.

Data subjektif (S)

- a. Ibu mengatakan ini anak pertama dan tidak pernah keguguran
- b. ibu merasa lelah dan sedih
- c. Ibu merasa terganggu karena bayinya rewel dan tidak nafsu makan. Ibu mengatakan belum makan hanya minum air putih saja
- d. Pertama kali melihat bayinya dan mengetahui jenis kelaminnya ibu merasa kurang bahagia dan terlihat acuh tak acuh dengan bayinya
- e. ibu menyusui bayinya disaat menangis dan hanya menyusui sebentar. ibu meminta suaminya untuk membelikan susu formula untuk bayinya karena ibunya sudah lelah dan ibu mengatakan ASI nya tidak lancar keluar.

Data Objektif (O)

- a. Tidak ada luka bekas operasi
- b. Ibu melahirkan secara normal (pervaginam)
- c. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU setinggi pusat, kandung kemih kosong.
- d. Ibu terlihat sangat murung dan menyusui bayinya hanya sebentar
- e. ibu terlihat sangat lelah dan terlihat fokus kedirinya sendiri ketimbang dengan bayinya
- f. ibu sangat acuh tak acuh saat ditanya dan menyuruh suaminya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dan ibu sangat cuek
- g. Ibu tampak sangat meringis karena terdapat luka jahitan
- h. Pengeluaran ASI masih sedikit
- i. Terdapat pengeluaran lochea rubra

Analisa dan Interpretasi data:

1. Post partum blues merupakan perasaan sedih yang dialami oleh seorang ibu berkaitan dengan bayinya (Maritalia 2014). Keadaan ini umumnya sering mengelayuti pada ibu pertama kali melahirkan. Post partum blues adalah bentuk depresi yang paling ringan yang biasanya timbul antara hari ke-2 sampai 14 (Sutanto, 2018).

Post partum blues merupakan kesedihan atau pengurangan setelah melahirkan yang muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu sejak kelahiran bayi (Handayani dan Puji hastuti, 2016).

2. Pada primipira, menjadi orang tua merupakan pengalaman tersendiri dan dapat menimbulkan stres apabila tidak ditangani dengan segera. Dalam menjalani adaptasi setelah melahirkan, ibu nifas akan melalui fase antara lain adalah sebagai berikut:

a. Fase Taking In

Fase ketergantungan yang berlangsung dari hari pertama sampai dua hari setelah melahirkan. Ibu terfokus pada dirinya dan pasif dengan sekelilingnya. Ketidaknyamanan yang baru saja dialami ibu lebih disebabkan karena persalinan yang dilaluinya.

b. Fase Taking Hold

Merupakan fase antara 3-10 hari setelah melahirkan. Ibu merasa khawatir ketidakmampuannya melaksanakan tanggung jawab, perlunya komunikasi yang baik dukungan atau pendidikan kesehatan ibu dan bayinya.

c. Fase Letting Go

Fase menerima tanggung jawab sebagai ibu, dan berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya dan siap menjadi pelindung bagi bayinya (Khasanah dan Sulistyawati, 2017).

3. Involusi atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 30 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus (Mulati, E 2015). Plasenta lahir karena kintraksi otot-otot polos, involusi

adalah perubahan retrogresif pada uterus yang menyebabkan berkurangnya ukuran uterus, involusi perineum terbatas pada uterus dan hanya terjadi pada organ dan struktur lainnya (Sri Winarsih, 2015).

4. Lochea adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas mempunyai reaksi basa/alkalis yang dapat membuat organisme berkembang lebih cepat. Lochea mempunyai bau amis (anyir), meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda pada setiap wanita. Lochea juga mengalami perubahan karena proses involusi (Asih Yusari dan Risneni, 2016).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL

1. Potensial terjadinya post partum blues : penurunan berat badan, tekanan darah rendah

Data Subjektif (S)

- a. Ibu melahirkan tanggal 08 November 2022
- b. Ibu merasa terganggu dengan bayinya dan bersifat biasa-biasa saja terhadap bayinya
- c. Ibu mengatakan ini kehamilan yang bukan direncanakan

Data Objektif (O)

- a. Ibu tampak lelah dan merasa nyeri pada luka bekas jahitan
- b. Ibu cuek saat ditanya dan tidak terlalu memperhatikan bayinya, saat bayi menangis ibu tidak menenangkan bayi
- c. Ibu terlihat sedih dan tampak lelah

Analisa dan Interpretasi Data :

1. Bidan mengenali tanda-tanda awal depresi post partum yang meliputi kecemasan dan kekhawatiran terhadap bayi. Perasaan tertekan menjadi seorang ibu dan memiliki bayi baru lahir merupakan salah satu hal penyebab terjadinya gangguan tidur pada ibu. Biasanya muncul perasaan sedih, tidak mampu, tidak berharga, kehilangan nafsu makan, merendahkan harga diri serta menurunnya suasana hati yang terus menerus dan hilangnya kegembiraan secara spontanitas (Sulfianti, dkk 2021).
2. Dukungan suami merupakan faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya *post partum blues*. Dukungan suami sangat diperlukan, karena ibu tidak akan merasa beban dengan apa apa yang terjadipada dirinya, baik dukungan saat hamil, saat bersalin ataupun saat masa nifas. Perhatian suami, komunikasi yang dijalani, sikap serta perilaku suami dalam membantu ibu baikdalam kehamilan, persalinan dan nifas akan mempengaruhi kondisi ibu (Desfanita, 2015).
3. Kehamilan yang tidak diharapkan seperti kehamilan diluar nikah, kehamilan akibat pemerkosaan, kehamilan yang tidak direncanakan sehingga perempuan tersebut belum siap secara fisik untuk menjadi seorang ibu. Beberapa ibu mampu beradaptasi setelah melahirkan, tetapi banyak ibu yang belum mampu beradaptasi sehingga muncul perasaan sedih, tidak ingin mengurus bayinya. Sebagian wanita lain

akan menerima kehamilan sebagai kehendak alam dan bahkan ada beberapa wanita termasuk remaja, kehamilan merupakan akibat percobaan seksual tanpa menggunakan kontrasepsi. Awalnya mereka terkejut ketika tahu dirinya hamil, namun seiring waktu mereka menerima kehadiran seorang anak (Rahayu 2017).

LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI

Tindakan segera/kolaborasi tidak dilakukan pada Ny''S''.Tindakan dilakukan dengan dokter spesialis kejiwaan atau psikiater jika ibu memang menunjukkan tanda-tanda ingin membunuh bayinya atau membunuh dirinya sendiri.

LANGKAH V: RENCANA/INTERVENSI

Tanggal 08 November 2022

1. Ibu sulit beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu
2. Luka bekas jahitan tidak merah dan infeksi pada luka jahitan perineum
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Kriteria

1. Ibu sulit beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu seperti sering menangis, lekas marah, dan sering sedih merupakan manifestasi dari emosi yang labil.
2. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi seperti: peningkatan suhu tubuh yang melebihi batas normal 37,5 C, luka jahitan perineum bengkak, berwarna merah dan pengeluaran lochea yang berbau.

3. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - a. Tekanan darah : sistol 110/130 mmHg, distol 70-90 mmHg
 - b. Nadi : 60- 90 kali/menit
 - c. Suhu : 36,5-37,5 C
 - d. Pernapasan : 16- 24 kali/menit
 - e. Kontraksi uterus baik : Teraba bundar dan keras
 - f. TFU turun 1cm/hari
 - g. Pengeluaran lochea rubra dan berbau normal (amis)

Rencana Asuhan

1. Masa nifas hari pertama dengan gejala *post partum blues*
 - a. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan
 Rasional :Tangan yang kotor dapat menjadi tempat berkembang
 baiknya mikroorganisme, dimana apabila menyentuh pasien dapat
 terkontaminasi
 - b. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa
 ibu mengalami gejala post partum blues
 Rasional: Ibu dapat mengerti dan memahami tentang keadaannya
 dan dapat mengurangi kecemasan ibu
 - c. Ajarkan ibu teknik atau cara komunikasi terapeutik
 Rasional: Dengan memberikan dukungan dan melakukan
 pendekatan kepada ibu membuat ibu merasa bahwa dirinya tidak
 sendiri dan ibu merasa lebih nyaman karena ada yang memberi
support.

- d. Berikan ibu dukungan agar ibu selalu menceritakan segala kendala dan masalah yang ia rasakan selama ini jika memang ada masalah

Rasional: Dengan menceritakan masalah ibu yang dihadapi membuat ibu sedikit lega dan bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik.

- e. Mengajarkan ibu teknik relaksasi kepada ibu, yaitu menarik nafas melalui hidung dan menghembuskan secara perlahan melalui mulut

Rasional: Relaksasi yang membuat ibu akan menjadi tenang

- f. Memberikan penjelasan kepada ibu untuk tidak stres karena akan mempengaruhi pada produksi ASI

Rasional: Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

- g. Anjurkan ibu untuk beristirahat yang cukup ketika bayinya tidur

Rasional: Kurang istirahat akan mengalami kurangnya produksi ASI dan memperbanyak perdarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidak mampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri .

- h. Anjurkan kepada suami untuk selalu memberikan perhatian kepada istri seperti jika bayi menangis pada malam hari gantikan fungsi istri untuk menenangkan bayi atau membantu istri dan memberikan dukungan penuh.

Rasional: Dengan perhatian yang lebih kepada istri dan membantu mengurus bayinya dapat membuat istri lebih ringan bebannya dan bisa mendapatkan istirahat yang cukup

i. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

j. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lohchia setiap hari

Rasional:

- 1) TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio berlangsung normal, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba keras dan bundar
 - 2) Dengan mengobservasi kontraksi uterus dapat mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak, karena apabila uterus kurang berkontraksi akan menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusio
 - 3) Perubahan warna, bau, banyaknya dan perpanjangan lohchia merupakan terjadinya infeksi yang disebabkan oleh involusio yang kurang baik
- k. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Rasional: Dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka yang terdapat pada diri ibu.

- l. Mengajarkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Rasional: Mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, sistem sirkulasi di dalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan aliran darah dapat menyebabkan terjadinya thrombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi (Marmi, 2012:137).

- m. Mengajarkan kepada ibu tentang perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersuh setiap habis BAK dan BAB dan dengan keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut setiap kali basah.

Rasional: Dengan cara ini ibu dapat mengerti dan melakukan sendiri perawatan perineum yang baik dan benar. Dengan menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen.

- n. Mengajarkan kepada ibu cara menyusui dan jangan khawatir dengan ASI yang masih sedikit karena ASI yang keluar memang masih agak sedikit karena ibu baru saja melahirkan

Rasional: Dengan sesering mungkin menyusui akan memacu hormon prolaktin yang akan memperlancar produksi ASI. Stres juga mempengaruhi produksi ASI pada ibu.

- o. Ajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta cara perawatan payudara

Rasional: Posisi menyusui yang benar bayi dapat lebih baik dan mudah menghisap ASI supaya payudara ibu tidak lecet, serta dengan payudara yang baik dan benar dapat menjaga kebersihan daerah payudaranya dan mencegah terjadinya bendungan ASI.

- p. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang

Rasional: Makanan yang bergizi mampu memulihkan tenaga dan pemenuhan nutrisi ibu selama proses pemulihan dengan luka persalinan dan tidak hanya itu pemenuhan gizi yang baik pada ibu akan berdampak positif terhadap produksi ASI ibu dan makanan yang mengandung serat dapat memperlancar BAB.

2. Nyeri Perineum

- a. Menjelaskan kepada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karena adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah terjahit

Rasional: Dengan menyampaikan kepada ibu penyebab nyeri yang dialami ibu akan mengetahui penyebab nyeri yang dialami

- b. Menganjurkan ibu untuk melakukan teknik relaksasi

Rasional: Teknik relaksasi dapat mengurangi ketegangan pada otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke jaringan

- c. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Rasional: Hal ini dapat mengurangi rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada ibu sehingga suasana hati ibu menjadi lebih baik dan bisa beradaptasi dengan kondisinya yang sekarang

- d. Memberikan ibu obat Analgetik, Antibiotik, dan Vitamin C

Rasional: Antibiotik berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi, analgetik untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh ibu, sedangkan Vitamin C berfungsi untuk mempercepat penyembuhan jaringan atau sel-sel yang rusak.

LANGKAH VI: IMPLEMENTASI

Tanggal 08 November 2022 Pukul 12:30 wita

1. Masa nifas hari pertama dengan gejala post partum blues

- a. Menganjurkan ibu agar mencuci tangan sebelum melakukan tindakan

Hasil: Tangan telah dicuci dan tangan dalam keadaan bersih

- b. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan dan menjelaskan keadaan yang dialami oleh ibu

Hasil: Ibu memahami dan mengerti dengan keadaannya

- c. Menganjurkan ibu untuk menceritakan masalah yang ia miliki dengan teman atau kerabat terdekat agar bisa diselesaikan dengan baik

Hasil: Ibu mengerti

- d. Memberitahu kepada ibu cara pendekatan terapeutik, memberikan dukungan kepada ibu, menganjurkan ibu untuk selalu berzikir, membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Quran agar ibu bisa menjadi tenang

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- e. Memberitahu suami untuk sering membantu ibu mengurus bayinya dan lebih sering memperhatikan ibu

Hasil: Suami bersedia melakukannya

- f. Menjelaskan kepada ibu cara mengetahui baik tidaknya kontraksi uterus

Hasil: Ibu mengerti bahwa kontraksi baik apabila perut teraba keras dan bundar

- g. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu

Hasil: 1) Tekanan darah : 120/70mmHg

2) Nadi : 80 kali/menit

3) Suhu : 36,5 C

4) Pernafasan : 20 kali/menit

- h. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokhea setiap hari

Hasil: TFU setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), pengeluaran lokhea rubra

- i. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya yaitu: mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan shampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

- j. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu sudah bisa untuk miring kanan dan kiri serta mulai duduk secara perlahan-lahan

- k. Menjelaskan kepada ibu tentang perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil: ibu mengerti dan ibu siap melakukannya

- l. Menjelaskan kepada ibu teknik menyusui yang benar dan baik serta menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa adanya jadwal (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu sedikit mengerti atas penjelasan yang diberikan dan masih terlihat enggan menyusui bayinya secara on demand

- m. Menganjurkan kepada ibu untuk makan makanan yang bergizi seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, daging, ikan, telur), vitamin (buah dan sayur) dan memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein untuk mempercepat penyembuhan luka episiotomi. Selain itu dengan pemenuhan nutrisi gizi seimbang mampu menambah tenaga ibu serta pemenuhan nutrisi untuk produksi ASI, serta makanan yang berserat.

Hasil: Ibu mengerti dengan anjuran yang diberikan

2. Nyeri Perineum

- a. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- b. Mengajarkan dan menganjurkan ibu melakukan teknik relaksasi

Hasil: Ibu mnegerti dan langsung melakukan teknik relaksasi yang telah dianjurkan

- c. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih untuk mengambil posisi menghadap kekanan

- d. Memberikan obat Analgetik, Antibiotik, dan Vitamin C

Hasil: Amoxicilin 3 x 1

Hermafort 1 x 1

Vitamin C 3 X 1

3. Memberikan ibu dukungan dan edukasi untuk beradaptasi menjadi orang tua baru

- a. Memberikan dukungan kepada Ibu untuk tidak terlalu cemas dengan keadaannya yang sekarang

Hasil: Ibu terlihat tidak nyaman atas penjelasan yang diberikan dan terlihat sangat cuek

- b. Melakukan pendekatan kepada ibu dan meminta ibu untuk menceritakan segala masalah yang dialami

Hasil: Ibu merasa lelah dan merasa nyeri pada luka bekas jahitan, setra merasa terganggu dengan bayinya yang rewel

- c. Memberitahu suami dan keluarga untuk memberikan dukungan kepada ibu dan membantu ibu mengurus bayinya

Hasil: Suami dan keluarga mendampingi ibu dan membantu ibu mengurus bayinya dan memberikan segala kebutuhan ibu

- d. Menganjurkan ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi lebih tenang

Hasil: Ibu bersedia untuk melakukannya

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 08 November 2022 Pukul: 12: 30 wita

1. Masa nifas dengan kasus post partum blues ditandai dengan:
 - a. Ibu merasa sedih dan mudah marah karena memang dari awal kehamilan belum direncanakan
 - b. Ibu merasa terganggu dengan bayinya yang sangat rewel
 - c. Ibu terlihat menyusui anaknya namun saat bayi menangis ibu tidak menenangkan bayi, seperti ibu pada umumnya
 - d. Ibu tidak nyaman dengan perubahan fisik yang dialami, ibu mendapatkan luka jahitan sebanyak 6 jahitan (ruptur tingkat 2)
 - e. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) dan TFU setinggi pusat
 - f. Lochea rubra tidak berbau busuk
 - g. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : 100/80 mmHg
 - 2) Nadi : 80 kali/ menit

3) Suhu : 36,7 C°

4) Pernafasan : 20 kali/ menit



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY''S''HARI PERTAMA DENGAN POST PARTUM BLUES
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 08 NOVEMBER 2022**

No Register : 08XXX

Tanggal partus : 8 November 2022 Pukul : 10.00 wita

Tanggal masuk ruang nifas: 8 November 2022 Pukul : 01.25 wita

Tanggal pengkajian : 9 November 2022 Pukul : 13.00 wita

Pengkajian : Nurpiana Said

Identitas istri/ suami

Nama : Ny "S" / Tn "H"

Umur : 18 tahun / 18 tahun

Nikah/Lamanya : 1 kali / 1 tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SD

Alamat : JL.XXX

Data Subjektif (S)

1. Ibu melahirkan pada tanggal 08 November 2022
2. Ibu merasa lelah setelah melahirkan dan merasa mudah marah
3. Ibu merasa sulit menyesuaikan diri dengan peran barunya dengan menjadi seorang ibu apalagi ketika reweldan menangis

4. Riwayat kelahiran sekarang.

Tabel 4.1 Riwayat kehamilan sekarang

No	Kala	Lama	Ket
1	Kala 1	7 jam	Normal
2	Kala II	15 menit	Ibu melahirkan secara normal dan terdapat ruptur tingkat II
3	Kala III	12 menit	Plasenta dan selaput lahir lengkap, dilakukan penjahitan laserasi tingkat 2 teknik jelujur secara mediolateral dengan benang catgut
4	Kala IV	2 jam	Normal, perdarahan 220 cc
Jumlah		9 jam 27 menit	

Sumber : Data Sekunder

5. Ibu mengeluh dengan luka jahitannya dan takut melakukan pergerakan
6. Riwayat Kehamilan
 - a. Saat hamil ibu merasa kurang diperhatikan dengan suaminya dan sempat cekcok diusia kehamilan ibu yang ke 5 bulan

- b. Saat hamil ibu pernah mendapatkan suntik TT
7. Ibu mengatakan bahwa kehamilan yang sekarang bukan kehamilan yang direncanakan, ibu bersedia hamil ketika ibu sudah memiliki tempat tinggal sendiri bersama suami
8. Ibu menyusui bayinya ketika menangis dan hanya sebentar dan ibu menyuruh ibunya untuk membelikan susu formula untuk bayinya
9. Hari pertama hari terakhir haid tanggal 20 Februari 2022
10. Ibu tinggal bersama orang tua suaminya beserta satu adik iparnya
11. ASI belum lancar
12. Ibu belum BAB dan BAK
13. Riwayat kesehatan ibu
Ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, DM, Hepatitis, tumor, hipertensi, PMS, dan TBC.
14. Riwayat kesehatan keluarga
Ibu tidak memiliki penyakit keturunan keluarga
15. Data psikososial
 - a. Hubungan dengan suami baik, namun pada usia kehamilan 5 bulan sempat cekcok dan sekarang sudah baik
 - b. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah dengan menggunakan sistem musyawarah
 - c. Ibu belum siap untuk hamil karena belum memiliki tempat tinggal sendiri bersama suami dan harus tinggal bersama mertua dan satu orang adik iparnya

- d. Ibu mengurus urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan membereskan rumah. Ibu juga pergi ke kebun untuk membantu suami bertani
- e. Hubungan ibu dengan tetangganya baik-baik saja

16. Data ekonomi

- a. Pendapatan suami terkadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga.
- b. Ibu mencuci pakaian suami, kedua mertuanya dan satu adek iparnya menggunakan tangan
- c. Ibu menggunakan HP android yang digunakan berdua dengan suaminya

17. Data spiritual

- a. Ibu jarang sholat dan ketika keluar rumah ibu tidak menggunakan kerudung
- b. Suami ibu menjalankan sholat jika hari jumat
- c. Lokasi mesjid dari rumah ibu sangat dekat

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : Apatis
3. Ekspresi ibu meringis tiap kali bergerak
4. Ibu bersikap acuh tak acuh saat ditanya dan terlihat tidak senang dan menyuruh ibunya yang menjawab
5. TFU setinggi pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar

6. Luka perineum masih basah
7. Kandung kemih kosong
8. Pengeluaran lochia rubra
9. Tanda-tanda vital:
 - a. Tekanan darah : 110/60 mmHg
 - b. Nadi : 82 kali/menit
 - c. Suhu : 36,5 C
 - d. Pernafasan : 20 kali/menit
10. Melakukan pemeriksaan fisik
 - a. Mata: konjungtiva pucat, sclera putih dan tidak ikhterus
 - b. Wajah : tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarumn dan tidak ada nyeri tekan
 - c. Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
 - d. Payudara : tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan serta putting susu menonjol
 - e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
 - f. Genitalia : tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum
 - g. Ekstremitas bawah : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada oedema dan refleks kiri dan kanan positif

Assesment (A)

P1 A0, Post partum hari kedua, dengan gejala post partum blues

Planning (P)

Tanggal 8 November 2022

Pukul : 12.30 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan menjelaskan keadaan yang dialaminya

Hasil: Ibu memahami dan mengerti dengan keadaan yang cuek

2. Memberitahu ibu bahwa dirinya adalah seorang ibu yang baik

Hasil: Ibu merasa tidak bisa menyusui bayinya dan masih terlihat bingung

3. Memberitahu suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurus bayinya, mengerjakan pekerjaan rumah, memberikan dukungan kepada ibu dan menyiapkan keperluan ibu

Hasil: Suami dan keluarga bersedia melakukannya

4. Memberitahu suami untuk lebih perhatian kepada istri dan lebih sering bercerita kepada istrinya tentang masalah apa yang istrinya rasakan

Hasil: Suami bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu teknik relaksasi agar ibu bisa menjadi lebih tenang yaitu menarik nafas lewat hidung dan menghembuskan lewat mulut secara perlahan

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tidur ketika bayinya tidur

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

7. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas dua kali seminggu menggunakan shampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

8. menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring kiri dan kanan diatas tempat tidurnya dan sudah bisa berjalan ke kamar mandi untuk berkemih

9. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

10. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

11. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih posisi miring ke kanan

13. Memberitahu ibu bahwa akan datang kembali lagi besok untuk memantau dan mendampingi ibu mengurus bayinya

Hasil: Ibu bersedia jika dikunjungi lagi



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
BLUES PADA NY “S” DENGAN POST PARTUM HARI KEDUA
TANGGAL 15 NOVEMBER 2022**

No Register : 08XXX
Tanggal partus : 8 November 2022 Pukul : 10.00 wita
Tanggal masuk : 8 November 2022 Pukul : 01.25 wita
Tanggal pengkajian : 15 November 2022 pukul : 15.00 wita
Pengkaji : Nurpiana Said

Data Subjektif (s)

1. Ibu mengatakan masih terganggu dengan bayinya yang rewel dan membuat ibu sulit untuk istirahat
2. Nafsu makan ibu sudah mulai membaik, ibu sudah makan 2 kali setelah melahirkan namun tidak banyak
3. Ibu masih takut melakukan pergerakan karena luka bekas jahitan
4. Ibu mengatakan menyusui bayinya ketika bayinya menangis
5. Ibu telah BAB dan BAK

Data Objektif (o)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran : Apatis
3. Ibu masih kelihatan murung dan kelelahan
4. Tanda- tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 82 kali/ menit
 - c. Suhu :36,7 °C
 - d. Pernafasan : 20 kali/ menit
5. Pemeriksaan fisik
- a. Mata : Konjungtiva sedikit pucat, sclera putih dan tidak ikhterus
 - b. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan
 - c. Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe dan vena jugularis
 - d. Payudara : Tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan serta putting susu menonjol
 - e. Abdomen : Tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, TFU 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
 - f. Genetalia : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lokhea rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum
 - g. Ekstremitas bawah : simetris kiri dan kanan, tidak ada varices, tidak ada oedema dan refleks kiri dan kanan positif

Assesment (A)

PI A0, post partum hari kedua dengan post partum blues

Planning (P)

1. Memberi tahu ibu hasil pemeriksaan

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberi tahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang sangat baik, dimana seorang ibu akan memberikan kebutuhan anak yaitu menyusui, merawat bayi, menenangkan bayi ketika menangis dan menyayangi bayinya sendiri

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan berjanji akan menyayangi bayinya

3. Mengajarkan ibu cara menyusui yang baik dan benar serta menjelaskan kepada ibu maka akan membuat hubungan ibu dan anak akan terjalin

Hasil : Ibu telah diajarkan teknik menyusui

4. Melakukan *bounding attachment* antara ibu dengan bayinya yaitu dengan menganjurkan ibu untuk melakukan kontak fisik dengan bayinya, seperti saat menyusui bayinya anjurkan ibu untuk mengelus kepala bayinya, melihat bayinya (melakukan kontak mata dengan bayinya), sehingga ibu akan beradaptasi dan menyayangi bayinya

Hasil : Telah dilakukan bounding attachment antara ibu dan bayi, yaitu ibu disuruh menggendong bayinya dan mengelus-ngelus kepala bayi

5. Menganjurkan ibu untuk menceritakan masalah yang ia miliki kepada kerabat terdekatnya

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

6. Memberi tahu suami dan keluarga untuk membantu ibu mengurus bayinya dan jika telah pulang kerumah tetap membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah agar ibu bisa beristirahat yang cukup

Hasil : Keluarga dan suami mengerti dan bersedia melakukannya

7. Memberitahu ibu untuk selalu berzikir kepada Allah, membaca dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi tenang

Hasil: Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

8. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas dua kali seminggu menggunakan shampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil: Ibu miring kiri dan kanan diatas tempat tidurnya dan sudah bisa berjalan ke kamar mandi untuk berkemih

10. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengn senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

11. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

12. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

13. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih posisi miring ke kanan

14. Memberitahu ibu bahwa akan datang kembali lagi besok untuk memantau dan mendampingi ibu mengurus bayinya

Hasil: Ibu bersedia jika dikunjungi lagi



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY “S” HARI KETIGA 22 NOVEMBER 2022**

No Register : 08xxx

Tanggal Partus : 8 November 2022 Pukul : 10.00 wita

Tanggal masuk : 8 November 2022 Pukul : 01.25 wita

Tanggal pengkajian : 22 November 2022 pukul : 14.35 wita

Data Subjektif (s)

1. Ibu mengatakan sudah mulai beradaptasi dengan bayinya yang rewel, ibu sudah mulai bisa untuk tidur
2. Nafsu makan ibu sudah membaik, ibu mengatakan sudah sarapan
3. Ibu masih takut melakukan pergerakan karena luka bekas jahitan
4. Ibu mengatakan menyusui bayinya namun ibu mengatakan ASInya tidak keluar dan tidak cukup untuk bayinya sehingga ibu berencana untuk memberikan susu formula kepada bayinya
5. Ibu mengatakan masih bingung untuk menyusui dan mengurus bayinya ketika dirumah
6. ibu berencana pulang hari ini

Data Objektif (o)

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran : composmentis
3. Ibu terlihat sedih, khawatir dan takut karena ingin pulang kerumah

4. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
- b. Nadi : 80 kali/menit
- c. Suhu : 36,7 °C
- d. Pernafasan : 20 kali/ menit

5. Pemeriksaan fisik

- a. Mata : Konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ada ikhterus
- b. Wajah : Tidak ada oedema, tidak ada cloasma gravidarum dan tidak ada nyeri tekan
- c. Payudara : Tampak pengeluaran ASI yang masih sedikit, tidak ada benjolan dan nyeri tekan dan puting susu menonjol
- d. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae lipid, TFU 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik
- e. Genetalia : Tidak ada varices, tampak pengeluaran lochea rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah, tidak merah dan tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada oedema, ada nyeri tekan pada perineum

Assesment (A)

P1 A0, post partum hari kedua dengan post partum blues

Planning (P)

1. Memberitahu hasil pemeriksaan

Hasil :Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberitahu ibu bahwa dirinya adalah ibu yang baik, dimana seorang ibu yang baik akan memberikan kebutuhan anak yaitu menyusui, merawat bayi, menenangkan bayi ketika menangis dan menyayangi bayinya

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan berjanji akan menyayangi bayinya

3. Mengajarkan kembali kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar serta menjelaskan kepada ibu bagaimana hubungan keluarga terjalin dengan baik

Hasil : ibu telah diajarkan teknik menyusui

4. Memberitahu ibu dan suami untuk tidak memberikan susu formula kepada bayi dan menganjurkan ibu menyusui sampai usia 6 bulan

Hasil: Ibu dan suami berjanji tidak memberikan susu formula kepada bayinya sampai usia 6 bulan

5. Melakukan kembali bounding attachment antara ibu dengan bayi yaitu dengan menganjurkan ibu untuk melakukan kontak fisik dengan bayinya, melihat bayinya, sehingga ibu beradaptasi dan menyayangi bayinya

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk menceritakan segala masalah yang ia miliki kepada kerabat terdekat atau dengan suami dirumah jika memang ada masalah selama ini yang ibu miliki

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini dan memberitahu ibu jangan takut untuk melakukan pergerakan karena dengan bergerak membuat proses penyembuhan akan lebih cepat

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

8. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas dua kali seminggu menggunakan shampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi

Hasil: Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

9. Mengajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dengan teratur, yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap habis BAK dan BAB dan dalam keadaan bersih dan kering yaitu mengganti pembalut tiap kali basah

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri

10. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (on demand) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil: Ibu menyusui bayinya sesering mungkin dan segera setiap bayinya ingin

11. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum, bahwa nyeri yang dirasakan karna adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

12. Membantu ibu untuk mencari posisi yang nyaman

Hasil: Ibu memilih posisi miring ke kanan

13. Mengajarkan ibu cara memandikan bayi

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

14. Mengajarkan ibu cara merawat tali pusat bayi yaitu tali pusat jangan sampai ditutupi popok, jangan memberikan obat apapun pada tali pusat, tali pusat dibiarkan terbuka agar cepat kering

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

15. Memberitahu ibu bahwa akan datang kembali lagi besok untuk memantau perkembangan kesehatan ibu

Hasil: Ibu bersedia jika dikunjungi lagi



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST**PARTUM PADA NY "S" HARI KEENAM****TANGGAL 29 NOVEMBER 2022**

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022 pukul : 10.00 wita

Tempat : Rumah Ny "S" pukul : 10.00 wita

Nama pengkaji : Nurpiana Said

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASInya sudah lancar
2. Ibu mengatakan nyeri pada luka jahitannya masih terasa namun sudah berkurang
3. Ibu mengatakan ibu mertuanya membantu mengurus bayinya jika rewel
4. Ibu mulai bisa beradaptasi dengan kondisinya sekarang dan mulai menikmati peran barunya menjadi seorang ibu
5. Ibu merasakan perih jika buang air kecil
6. Ada pengeluaran darah pada jalan lahir
7. Ibu mengatakan bayinya tidur dengan nyenyak dan aktif menyusui
8. Ibu sudah sering BAB

Data Objektif (O)

1. Ekspresi wajah ibu tampak bahagia
2. Keadaan umum baik
3. Keluar ASI saat putting susu dipencet
4. TFU pertengahan simpisis pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar

5. Luka perineum masih basah
6. Kandung kemih kosong
7. Pengeluaran lochea sanguilenta
8. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/ menit
 - c. Suhu : 35°c
 - d. Pernafasan : 22x/menit

Assesment (A)

P1 AO, post partum hari keenam, dengan sedikit nyeri luka perineum, ibu mulai bisa beradaptasi dengan peran barunya

Planning (P)

Tanggal 29 November 2022

Pukul: 10.05 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat
 Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang
2. Memberitahu ibu mertua ibu untuk tetap membantu ibu merawat bayinya
 Hasil : Ibu mertua mengerti atas penjelasan yang diberikan
3. Menganjurkan ibu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt agar hatinya menjadi tenang, seperti shalat 5 waktu, membaca Al-Qur'an dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an
 Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

4. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan diri, dan genitalianya mengganti pembalut bila merasa lembab, dan senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menyusui
Hasil : Ibu bersedia untuk melakukan anjuran yang diberikan
5. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa tanpa dijadwalkan
Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
6. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan rumahnya terutama tempat tidur bayinya
Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
7. Mengajarkan kembali teknik menyusui yang baik dan benar
Hasil : Ibu menyusui seperti yang telah diajarkan
8. Menjelaskan kepada ibu tentang perawatan payudara yaitu membersihkan tiap kali mandi
Hasil: Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
9. Menganjurkan kembali kepada ibu untuk melakukan teknik relaksasi apabila masih merasa nyeri pada luka jahitannya
Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang telah diberikan
10. Mengajarkan ibu mengenai perawatan luka perineum dan menganjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan vulva
Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya sendiri
11. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya
Hasil : Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY “S” TANGGAL 3 DESEMBER 2022**

Hari/Tanggal : Sabtu, 3 Desember 2022

Pukul : 10.45 wita

Tempat : Rumah Ny “S”

Pukul : 10.45 wita

Pengkajian : Nurpiana Said

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan keadaannya sudah agak membaik sudah menikmati perannya sebagai ibu
2. Nyeri yang dirasakan sudah berkurang dari sebelumnya
3. ASI sudah lancar dan banyak
4. Bayi sering menetek
5. Bayi tidak rewel dan tidur nyenyak
6. Ada pengeluaran darah dari jalan lahir berwarna merah dan berlendir

Data Objektif (O)

1. Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong
5. Luka perineum tampak kering dari sebelumnya
6. Pengeluaran lochea serosa
7. Mengukur tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 120/ 70 mmHg
 - b. Nadi : 81x/menit

- c. Suhu : 36°c
- d. Pernafasan : 20x/menit

8. Bayi kuat menetek, refleks menghisap dan menelan pada bayi baik

Assesment (A)

P1 AO, post partum 2 minggu dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 3 Desember 2022

Pukul :10.45 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dalam keadaan sehat

Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang

2. Memotivasi ibu agar selalu memberikan ASI pada bayinya tanpa diselingi susu formula atau makanan tambahan lainnya

Hasil : Ibu mengerti dan mau melakukannya

3. Memberitahu ibu tentang keuntungan ASI eksklusif yaitu sebagai imunitas bayi, bayi tidak mudah sakit, meningkatkan kecerdasan, membentuk ikatan batin antara ibu dan anak, mudah didapat, kandungan gizinya tidak disamakan dengan susu formula lainnya, serta mempercepat pemulihan rahim

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia memberikan ASI eksklusif pada bayinya

4. Mengajukan kembali pada ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya dan bayinya serta lingkungan sekitarnya

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

5. Mengajukan ibu untuk membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi jika bayi berusia 1 bulan

Hasil : Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

6. Memberitahu ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum masa nifas selesai yaitu 40 hari karena dapat membuat darah yang masih keluar masuk ke vagina ibu yang dapat membuat darah yang masih keluar masuk ke vagina ibu yang dapat menyebabkan penyakit

Hasil : Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

7. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah yang terakhir untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu

Hasil: ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST PARTUM
PADA NY "S" TANGGAL 10 DESEMBER 2022**

Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2022 Pukul : 15.00 wita
Tempat : Rumah Ny "S" Pukul : 15.00 wita
Pengkajian : Nurpiana Said

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang
2. Ada pengeluaran darah yang berwarna kuning dari jalan lahir
3. Ibu sudah aktif melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah

Data Objektif (O)

1. Ekspresi ibu mulai ceria
2. payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Kandung kemih kosong
5. Luka perineum sudah kering
6. Pengeluaran lochea alba
7. mengukur tanda-tanda vital
 - a. Tekanan Darah : 120/70 mmHg
 - b. Nadi : 80x/menit
 - c. Suhu : 35,6°c
 - d. Pernafasan : 22/menit

8. Bayi kuat menetek, refleks menghisap dan menelan pada bayi baik
9. ibu segera menceritakan jika ada masalah yang ia miliki atau jika ada hal yang tidak ia sukai baik dari suaminya atau ipar-iparnya serta orang lain

Assesment

P1AO , post partum 6 minggu, dengan keadaan umum baik

Planning (P)

Tanggal 10 Desember 2022

Pukul 15.00 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dan bayi dalam keadaan sehat
 Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang
2. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa tanpa dijadwalkan
 Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya
3. Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan lingkungan rumahnya terutama tempat tidur bayinya
 Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
4. Menganjurkan ibu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt agar hatinya menjadi tenang, seperti shalat 5 waktu, membaca Al-Qur'an dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an
 Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan
5. Menjelaskan kepada ibu jenis kontrasepsi yang tidak mengganggu proses menyusui
 Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan

6. Menganjurkan ibu untuk tidak menyimpan segala masalah yang dialami, ceritakan kepada orang terdekat dan merasa tertekan dan selalu bersyukur

Hasil : Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan.



BAB IV

PEMBAHASAN

Studi kasus ini dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

1. Identifikasi Data Dasar

Langkah satu bertujuan untuk mengumpulkan data objektif dan data subjektif. Pada studi kasus Ny''S'' hasil anamnesis pada hari pertama yaitu tanggal 8 November 2022 didapatkan bahwa pada ibu merasa terganggu dengan bayinya yang rewel sehingga ibu kurang nafsu makan dan susah tidur. Selain itu juga, didapatkan bahwa ibu memang dari awal tidak merencanakan kehamilannya karena kondisi tempat tinggal. Penyebab lain post partum blues selain usia persalinan dibawah usia 20 tahun adalah kesiapan remaja dalam perubahan perannya sebagai ibu, antara lain: kesiapan fisik, mental, finansial dan sosial. Ibu menyusui bayinya, namun tidak memperdulikan jika bayinya menangis dan tidak seperti pada ibu umumnya yang menyayangi dan memperhatikan bayinya.

Sehari-hari ibu mengatakan sering kekebun untuk membantu suaminya menanam sayur dan juga membereskan rumah serta mencuci pakaian. Ibu tinggal bersama kedua mertuanya dan satu orang adik iparnya. Pada saat pemeriksaan kehamilan ibu mengatakan lebih banyak melakukan pemeriksaan kehamilan sendiri daripada ditemani suaminya. Bahkan, ibu mengatakan tidak pernah ditemani oleh suaminya dan hanya satu kali ditemani oleh mertuanya.

Hal ini merupakan juga salah satu penyebab ibu mengalami post partum blues karena ibu cenderung dibiarkan melakukan hal apapun dengan sendirinya tanpa bantuan dari suaminya. Tingkat pendidikan ibu juga dapat menyebabkan

salah satu faktor ibu terkena post partum blues, dimana pada data subjektif didapatkan ibu memiliki pendidikan terakhir yaitu SD dan suaminya juga berpendidikan SD. Hal ini bisa membuat ibu kekurangan informasi dan edukasi.

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan kesiapan seorang ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan. Hal ini sejalan dengan Mariyatul 2018 faktor yang menyebabkan post partum blues diantaranya faktor dukungan keluarga, pengetahuan, status kehamilan, jenis persalinan, faktor hormonal (berupa perubahan kadar ekstrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol yang terlalu rendah. Kadar ekstrogen turun secara bermakna setelah melahirkan, ternyata ekstrogen memiliki efek supresi aktifitas enzim non adrenalin maupun serotin yang berperan dalam suasana hati dan kejadian depresi), faktor demografik (paritas dan usia), pekerjaan, latar belakang ibu post partum, faktor fisik, ketidakmampuan beradaptasi, pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan (Mariyatul,2018).

Kurangnya dukungan sosial keluarga atau suami akan berdampak ke keadaan psikis ibu yang tengah mengalami post partum blues. Ketidaktahuan ibu post partum dan keluarga tentang post partum blues juga akan berdampak pada kondisi ibu post partum yang mengalami gejala post partum blues. Kehamilan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan juga dapat menjadi penyebab ibu mengalami depresi post partum. Kehamilan yang tidak diinginkan berhubungan dengan depresi, kecemasan dan tingkat stres yang lebih tinggi.

Selain itu, wanita yang kehamilannya tidak diinginkan cenderung lebih rendah dalam memanfaatkan perawatan pada saat kehamilan dan memiliki risiko

lebih tinggi terjadi depresi post partum dibandingkan dengan wanita yang kehamilannya diinginkan. Bentuk dukungan suami yang biasa diberikan pada ibu yang mengalami post partum blues antara lain memberikan waktu luang agar istri beristirahat untuk menghilangkan kelelahan (Mariyatul,2018).

Setelah anamnesa dilakukannya pemeriksaan fisik pada ibu, dimana didapatkan tekanan darah ibu yang turun, terdapat luka jahitan sebanyak 6 (ruptur tingkat II), kontraksi uterus baik dan konjungtiva pucat diakibatkan susah tidur. Ibu sangat cuek saat dilakukan anamnesa. Ibu cenderung menyuruh suaminya menjawab dan merasa terganggu. Ibu terlihat menyusui bayinya, namun ketika bayi menangis ibu tidak memperhatikan anaknya dan mertua yang membantu menenangkan bayi. Ibu terlihat sedih dan murung.

Ibu takut melakukan pergerakan karena takut luka jahitannya terlepas. Menurut teori yang ada bahwa salah satu faktor yang membuat cemas dan menyebabkan terjadinya post partum blues. Perubahan fisik yang dialami ibu yaitu rasa keram dan mules dibagian bawah perut akibat penciutan rahim (involusio), keluarnya sisa-sisa darah dari vagina (lochea), kelelahan karena proses melahirkan, pembentukan ASI sehingga payudara membesar dan perlukaan jalan lahir (Walyani, 2015). Post partum blues yang disebabkan oleh faktor ketidaknyamanan fisik yang dialami sehingga menimbulkan perasaan emosi pada wanita pasca melahirkan, seperti rasa sakit akibat luka jahitan, pengalaman persainan yang kurang menyenangkan, atau bengkak pada payudara.

Kondisi depresi juga dapat terjadi pada periode setelah persalinan atau post partum. Depresi post partum diibaratkan pencuri yang mencuri kebahagiaan dan

kasih sayang dari seorang ibu yang nantinya akan diberikan kepada bayinya. Disamping itu, ibu yang mengidap depresi post partum juga mengalami kesulitan dalam melakukan atau menjalani aktivitasnya (America Psychonolical Association, 2017). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi depresi post partum ini diantaranya usia, status ekonomi, dukungan suami, dukungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, status obsetri, jenis persalinan, dan kesiapan merawat bayi (Ikada,dkk 2020).

2. Identifikasi Diagnosa/Masalah aktualberdasarkan

Langkah ini dilakukan identifikasi diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Dalam menegakkan suatu diagnosa atau masalah klien, harus berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data, baik data subjektif maupun data objektif dari hasil pengkajian. Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa terjadinya post partum blues karena ketidaknyamanan fisik, kondisi bayi saat lahir, penurunan hormon, kondisi ekonomi, dan usia yang terlalu muda dan terlalu tua.

Post partum blues merupakan keadaan atau kondisi ibu yang sedih dan murung setelah melahirkan dan bersifat sementara yaitu 2 hari sampai 2 minggu sejak kelahiran bayi dengan gangguan ringan seperti cemas dan gelisah. Seorang ibu yang mengalami post partum blues akan menunjukkan gejala psikis sebagai bentuk relaksasi dari rangsang tubuh dan lingkungan. Reaksi tersebut seperti mudah menangis, sedih, cemas, iritabilitas atau mudah tersinggung, tidak nafsu makan, dan tidak dapat tidur pulas (Farida dan Diah, 2019).

Pada kasus post partum blues masalah yang biasa timbul bisa saja terjadi tanda bahaya pada ibu seperti gizi buruk, tekanan darah rendah, bendungan ASI yang akan berlanjut terjadinya abses payudara dan mastitis. Selain itu, juga masalah yang bisa timbul jika ibu tidak segera ditangani maka akan terjadi depresi post partum blues dimana ibu memperlihatkan tanda ingin membunuh bayinya maupun dirinya sendiri.

Sedangkan studi kasus Ny ‘S’ terjadi penurunan tekanan darah pada ibu karena ibu sulit tidur dan tidak nafsu makan. Hal ini sejalan dengan teori yang ada sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

3. Identifikasi Diagnosa/Masalah potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen kebidanan adalah mengidentifikasi adanya masalah potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa post partum blues kemungkinan dapat terjadi depresi post partum apabila tidak ditangani dengan baik. Pada bab III ‘S’ pasien masih mengalami post partum blues dan belum mengalami bendungan payudara, mastitis hingga timbul perasaan ingin membunuh bayi ataupun ingin mengakhiri hidupnya sendiri yang dimana pada tahap ini disebut dengan depresi post partum.

4. Tindakan Segera/Kolaborasi

Pada langkah ini bidan atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien. Tetapi dari hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny ‘S’ tidak ada dan tidak didapatkan data

yang mendukung perlunya suatu tindakan kolaborasi atau segera. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera.

5. Rencana Tindakan Asuhan

Asuhan yang diberikan pada Ny "S" yaitu berupa dukungan psikologis yang dimana dilakukan oleh penelitian, suami dan keluarga. Selain itu dilakukan perbaikan keadaan umum, cara mencegah infeksi pada luka jahitan, cara menyusui yang benar, dan adaptasi menjadi seorang ibu. Jika depresi post partum terjadi maka peneliti akan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis kejiwaan. Jika bendungan payudara atau mastitis yang terjadi maka asuhan yang diberikan berupa asuhan pada kasus mastitis pada umumnya.

Pada kasus post partum blues asuhan yang dilakukan yaitu berupa pendekatan spiritual dan pendekatan medis. Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Qur'an dengan kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al-Qur'an hasil yang didapatkan 1 orang (6,7%) tidak mengalami post partum blues, 9 orang (60%) mengalami post partum blues ringan, 4 orang (26,7%) mengalami post partum blues sedang, dan 1 orang lainnya (6,7%) dari post partum blues berat.

Penelitian diatas menunjukkan bahwa terapi mendengarkan Al-Qur'an sangat membantu ibu masa nifas dalam mencegah kontruksi *post partum blues*. Salah satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Qur'an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah biasa menjadi penyembuh, termasuk penyembuh hati..

Menurut Marni (2014) dalam pratama (2016) terdapat 3 penangan post partum blues yaitu komunikasi terapeutik yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara bidan dengan pasien dalam rangka untuk kesembuhan klien dengan cara mendorong pasien mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan dapat memahami dirinya sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan support mental yang dapat dilakukan oleh keluarga pasien diantaranya yaitu meminta suami untuk membantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu mengurus bayinya dan menyiapkan susu, memanggil nenek atau keluarga bayi agar bisa menemani ibu dalam menghadapi kesibukan merawat bayi, suami lebih perhatian terhadap istri dan permasalahan yang dihadapi istrinya, menyiapkan mental dalam menghadapi kelahiran anaknya, suami menggantikan peran istri kelelahan dan memperbanyak dukungan dan memahami istri dalam mengurus anaknya dan ibu dianjurkan untuk sering berkumpul dengan teman-teman terdekat atau keluarga. Selanjutnya dilakukan pada diri klien sendiri yaitu dengan cara anjurkan ibu untuk belajar tenang dengan menarik nafas panjang, tidur ketika bayi tidur, berolahraga ringan, iklas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu. Bicarakan rasa cemas dan komunikasikan dengan masalah yang ada, bersifat fleksibel dan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu baru.

Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menangani hal tersebut yaitu dengan pengobatan medis, terapi psikologi, psikososial dan penanganan tanpa obat seperti latihan, akupuntur dan massage terapi. Terapi relaksasi lain juga dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan aromaterapi dari minyak sereh (*Cymbopogon citratus*) yang terbukti berpengaruh terhadap pencegah post partum

blues pada ibu primipara. Aromaterapi yang berasal dari tanaman sereh memiliki sifat anti depresan yang mampu untuk membantu menurunkan kegelisihan, ketakutan, dan kecemasan sehingga sirkulasi darah dan pernapasan menjadi lancar (Sari dan Widyaningrum, 2018).

Studi kasus pada Ny "S" dengan post partum blues, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, tidur ketika bayi tidur, anjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi, memberikan dukungan kepada ibu, menajurkan kepada ibu untuk membaca Al-Qur'an agar hatinya menjadi lebih tenang.

Menganjurkan suami dan keluarga membantu ibu mengurus bayinya, mengajarkan ibu teknik relaksasi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, berikan penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah/kotor, jelaskan penyebab nyeri, anjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin.

6. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada studi kasus Ny "S" dengan post partum blues, semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang nifas di RS Bhayangkara Makassar terkhusus kepada ruang nifas yang telah banyak membantu dan memberikan arahan.

Penjelasan telah disampaikan bahwa kondisi ibu saat ini baik, hasil didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, ibu sudah bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu, ibu menyusui bayinya secara on- demand, kontraksi uterus ibu baik teraba bundar dan keras, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan post partum yang diakibatkan dari atonia uteri. Nafsu makan ibu yang berkurang dan sulit tidur pada hari pertama dan kedua pasca melahirkan merupakan proses adaptasi ibu menjadi seorang ibu, ketidaknyamanan ibu karena adanya luka jahitan yang membuat ibu takut melakukan pergerakan dan juga ada beberapa masalah internal ibu yang berkaitan dengan suami.

Sesuai kasus Ny "S" asuhan yang diberikan kepada ibu sesuai dengan uraian langkah kelima. Hari pertama pasca melahirkan ibu memang berada pada tahap taking in dimana menurut Reva rubin, pada tahap ini ibu cenderung pasif terhadap lingkungannya dan fokus kepada dirinya sendiri. Apalagi, pada kasus ibu memang memiliki riwayat psikososial yang kurang baik dan persiapan kehamilan yang belum siap. Asuhan yang diberikan kepada ibu pada hari pertama yaitu berupa pendekatan terapeutik kepada ibu, menjelaskan kondisi fisik yang dialami ibu, melakukan kontak batin antara ibu dengan bayi dengan menyusui, menganjurkan ibu untuk sering mengelus dan memandang bayinya.

Asuhan lain yang diberikan kepada ibu yaitu pendekatan secara spiritual menganjurkan ibu untuk mendengarkan dan membaca ayat suci Al-Qur'an agar hati ibu menjadi lebih tenang. Selain dukungan psikologis pada asuhan ibu post partum blues juga dilakukan pendekatan spiritual. Ibu dianjurkan untuk

mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Qur'an agar hatinya menjadi lebih tenang.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah (2016), terdapat perbedaan antara kelompok ibu yang diberikan terapi Al-Quran dengan kelompok yang tidak diberikan terapi Al-Quran. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak diberikan terapi mendengar Al-Quran hasil yang didapat 1 orang (6,7%) tidak mengalami post partum blues, 9 orang (60%) mengalami post partum blues. Salah satu diantara sekian banyak mukjizat Al-Qur'an yang sudah terbukti sejak diturunkannya hingga saat ini adalah bisa menjadi penyembuh, termasuk penyembuhan hati.

7. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi: ibu menyusui bayinya secara on demand, mulai menyayangi bayinya, nafsu makan bertambah, tidak ada infeksi luka jahitan yang membuat kondisi psikologi ibu memburuk, ibu mulai terbuka dan menceritakan segala permasalahan yang ada. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny "S" secara garis besar tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus. Kunjungan yang dilakukan pada Ny "S" yaitu sebanyak 6 kali. Kunjungan dilakukan sebanyak tiga kali selama dirumah sakit dan 3 kali kunjungan dirumah.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny”S” dengan post partum blues di RS Bhayangkara Makassar, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Data Subjektif didapatkan sulit tidur, tidak nafsu makan, enggan menenangkan bayinya, enggan mengurus bayinya selama 3 hari. Ibu mengatakan bahwa kehamilannya memang bukan kehamilan yang direncanakan. Dimana pada data objektif didapatkan ibu terlihat cuek saat dilakukan anamnesa, tekanan darah ibu rendah dan juga ibu memang sering melakukan pemeriksaan kehamilan sendiri. Kunjungan ketiga yang dilakukan dirumah ibu, ibu mengatakan sudah menikmati peran barunya menjadi seorang ibu dan dari hasil data objektif keadaan ibu baik, terlihat bahagia dan keadaan bayi baik-baik saja.
2. Diagnosa yang ditegakkan pada Ny”S” berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan pada langkah I. Data subjektif didapatkan ibu tidak nafsu makan, sulit tidur, enggan menenangkan bayinya sesuai dengan tanda dan gejala post partum blues. Data objektif juga didapatkan bahwa tekanan darah ibu turun akibat kurang tidur dan ibu terlihat cuek pada bayinya dan juga tidak senang dilakukan

3. pemeriksaan. Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan pada Ny “S” maka dapat ditegakkan diagnosa bahwa ibu terkena *post partum blues*.
4. Perumusan masalah potensial pada Ny “S” Dengan post partum blues di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, berpotensi terjadinya depresi post partum, bendungan payudara yang akan terlanjur kepada mastitis, anemia dan juga berdampak pada bayi yang akan kekurangan nutrisi dan kasih sayang seorang ibu. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat. Kasus yang didapatkan pada Ny “S” tidak didapatkan tanda-tanda terjadinya masalah potensial.
5. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera/kolaborasi pada Ny “S” dengan post partum blues diRS Bhayangkara Makassar, dengan hasil bahwa kasus ini tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera. Tindakan segera/kolaborasi pada kasus Ny “S” dapat dilakukan jika ibu memperlihatkan tanda ingin membantu bayinya atau dirinya sendiri.
6. Hasil rencana tindakan asuhan kebidanan telah disusun pada Ny “S” dengan post partum blues di RS Bhayangkara Makassar, dengan hasil susunan asuhan berdasarkan diagnosa aktual atau masalah potensial yang dapat terjadi. Rencana tindakan yang dilakukan berupa dukungan *support* mental, pendekatan secara spiritual agar ibu dan bayi dalam keadaan sehat dan tidak terjadi masalah potensial.

7. Asuhan telah diberikan pada Ny "S" dengan *post partum blues* di RS Bhayangkara Makassar, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. Adapun asuhan yang diberikan pada Ny."S" yaitu melakukan komunikasi terapeutik.
8. Hasil valuasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny"S" dengan *post partum blues* di RS Bhayangkara Makassar, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan nafsu makan, yang semula kurang menjadi membaik, ibu terlihat ceria lagi, menyayangi bayinya, dan mulai bisa beradaptasi dengan peran barunya sebagai seorang ibu.

B. Saran

1. Bagi ibu (Klien)
 - a. Diharapkan pada setiap ibu dan calon ibu untuk senantiasa mempersiapkan kehamilannya baik secara materi, psikis, dan juga persiapan materi
 - b. Diharapkan kepada ibu untuk tidak menyembunyikan segala permasalahan yang ia miliki, hendaknya setiap masalah yang dimiliki diceritakan kepada suami atau kerabat terdekat.
 - c. Diharapkan ibu sering berkumpul dengan kelompok-kelompok ibu baru

2. Bagi suami dan keluarga ibu

- a. Diharapkan suami menemani istri jika melakukan pemeriksaan kehamilan
- b. Diharapkan suami lebih memberikan perhatian lebih kepada ibu hamil, pasca melahirkan dan di kehidupan sehari-hari
- c. Diharapkan suami sering membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu ibu mengurus bayinya
- d. Bagi keluarga diharapkan memberikan dukungan kepada ibu, jangan mengkritik dan menyudutkan ibu yang baru saja menjadi seorang ibu

3. Bagi bidan

- a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini *post partum blues*
- b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan ibu kepada keluarga ibu kondisi yang dialami oleh ibu serta diharapkan memberikan dorongan moral pada keluarga
- c. Petugas kesehatan hendaknya juga memperhatikan kondisi psikis ibu yang baru melahirkan jangan hanya berfokus kepada kondisi fisik pasien
- d. Tenaga kesehatan hendaknya lebih memberikan perhatian dan berlaku ramah kepada pasien agar pasien merasa lebih bahagia dan tidak segan menceritakan kendala dan masalah yang ibu alami.

4. Bagi institusi pendidikan

- a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.
- b. Perlu adanya persamaan persepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan diruang nifas di Rs Bhayangkara Makassar terkhusus kepada ruang nifas yang telah banyak membantu dan memberikan arahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfian, Sofiyan. Baby Blues Mengenai Penyebab,Gejala,dan Mengantisipasi. Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012
- Arfian.S.Baby blues. Solo :metagraf. 2012
- Azizah, Nur. *Terapi Mendengarkan Al-Qur'an Terhadap Pencegahan Blues Postpartum pada Ibu Nifas Di Rs Tk Iii 04.06.03 Dr. Soetarto Yogyakarta. 2016*
- Amseke,Victoria, dan Dian, Diarfah, Andi. *Teori dan Aplikasi Psikologi Perkembangan. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. 2021*
- Chasanah istiana,dkk."post partum blues pada persalinan dibawah usia dua puluh tahun. Dalam jurnal psikologi vol 15 no.2.Akademi kebidanan Yogyakarta. 2016
- Chasanah,Nur. post partum blues pada persalinan dibawah usia dua puluh tahun.Jurnal Akademik Kebidanan Yogyakarta Vol.14 No.2. 2016
- Desfanita dkk..*Faktor-faktor yang mempengaruhi postpartum blues. Jurnal program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Riau. 2015*
- Donsu, Tine. *Psikologi Keperawatan. Yogyakarta : Pustaka Baru Pres. 2017.*
- Firdayanti.Unmeet Need For Family Planning (kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi). Makassar : Alauddin University Press. 2012.**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
- Fitriana, Lisa dkk. *Gambaran Kejadian Postpartum Blues pada Ibu Nifas Berdasarkan Karakteristik di Rumah Sakit Umum Tingkat IV Sariningsih Kota Bandung.jurnal DIII Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas pendidikan indonesia.*
- Hanretty,K.P.Illustrasi obstetri.Edited by B.I.Santoso and E.Muliawan.Singapura: Elsevier:p.224. 2014
- Hidayah,Noor dkk. *Support Sistem, pengalaman persalinan dengan resiko post partum blues di Bpm Yayuk kalbariyanto Kudus Tahun 2015.*
- Irawati, Dian dkk.Pengaruh Faktor Psikososial dan cara Persalinan Terhadap Terjadinya Postpartum Blues pada ibu Nifas. Jurnal Dosen Poltekkes Majapahit. 2014

- Ishikawa,N.,Goto,S.,Murase,S.,Kanai,A.,Masuda,T.,Aleksic,B.,Usui,H.,Ozaki,N. Prospective Study of maternal Depressive symptomatology Among Japanese Woman. *Journal of Psychosomatic*. 2014
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019
- Mansur. H dan budiarti.T.psikologi ibu dan anak untuk kebidanan. Jakarta.Salemba. 2014
- Marmi. Asuhan kebidanan pada masa nifas. “Puerperium Care”. Yogyakarta : Pustaka pelajar.2012
- Martalia, Dewi. *Asuhan Kebidanan nifas dan menyusui*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Nugroho, Taufan.dkk. Buku Ajar Asuhan Kebidanan 3 Nifas.Yogyakarta : Nuha Medika.2014
- Nurjannah, Nunung.Asuhan kebidanan postpartum. Kuningan : Refika ADITAMA 2013
- Patricia A. Potter & Perry, Anne G.Fundamental of Nursing: Fundamental keperawatan Buku 3 edisi 7. Jakarta : EGC. 2010
- Pitriani, Risa dkk. *Panduan Lengkap Asuhan Kebidanan Ibu Nifas III*.Yogyakarta: Deepublish. 2015
- Pratama, Kristin. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas pada Ny. A umur 22 tahun PIA0dengan Postpartum Blues di RSUD Surakarta*. 2015.
- Rahayu, Puspa. *Karya Tulis Ilmiah Pengalaman Baby Blues*. 2017.
- Rahmandani,A,Karyono,Dewi,E.K.Strategi penanggulangan (coping) pada ibu yang mengalami post partum blues di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.Jurnal psikologi Undip,5(1). 2009
- Rini,Susilo dkk. Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practise.Yogyakarta : Deepublish. 2016
- Rukiyah, Aiyeyeh dkk. *Asuhan kebidanan III* Jakarta : Trans Info Media. 2014.
- Saleha, Sitti. *Asuhan kebidanan pada Masa Nifas*. Jakarta : Salemba Medika. (Dosen UIN Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan). 2009
- Shihab,Quraish.*Tafsir Al-Misbah Pesan,kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Katalog dalam Terbitan (KDT).
- Sulfianti, dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Yogyakarta : Yayasan Kita Menulis. 2021
- Susanti, Wahyu dkk. *Analisis Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Baby Blues Syndrom Pada Ibu Nifas*. Jurnal Akademi Kebidanan Citra Medika Surakarta Vol.7 No.2. 2017
- Susanti,Wahyu dkk. Analisis Faktor-faktor penyebab Terjadinya Baby Blues syndrom pada ibu Nifas.Jurnal Akademik Kebidanan Citra Medika Surakarta Vol.7. 2017
- Tindaon,Rotuna Lenawati,Anggeria,Elis. Efektifitas konseling terhadap post partum blues pada ibu primipara. *Jurnal Jumantik*,3(2).115-126. 2018
- Walyani,Dewi dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan menyusui*.Yogyakarta PT Pustaka Baru. 2015

Yodatama,dkk.” Hubungan Bonding Attachment dengan Resiko Terjadinya Postpartum Blues pada ibu post partum dengan Section Caesaria di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Srikandi IBI Kabupaten Jember (The Correlation between Bonding Attachmentand The Risk of Happen of postpar”. Dalam Jurnal Pustaka kesehatan vol 3 no.2. Universitas jember. 2015









KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.091/KEPK/FKIK/XII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURPIANA SAID
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 Name of the Institution

Dengan judul:
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA IBU NIFAS DENGAN POST
 PARTUM BLUES DI RS BAHAYANGKARA MAKASSAR TAHUN 2022"**

**"MANAGEMENT OF SUSTAINABLE MIDWIFERY CARE FOR POSTPARTUM MOTHERS WITH POST
 PARTUM BLUES AT BHAYANGKARA HOSPITAL MAKASSAR IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023

This declaration of ethics applies during the period December 13, 2022 until December 13, 2023

December 13, 2022
 Professor and Chairperson,


 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: iik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-4207 Un.06/FKIK/PP.00.9/08/ 2022 Gowa, 25 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penhal : Permohonan Izin Penelitian

Yth . Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurpiana Said
N I M : 70400119004
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Samata Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Nifas Dengan Post Partum Blues."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.
2. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Makassar terhitung mulai tanggal 25 Agustus – 24 September 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA

NOMOR : S.Ke/ 03 / II/KES.2.6/2022

TANGGAL : 03 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	NURPIANA SAID	70400119004	MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN DENGAN POST PARTUM BLUES DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 03 Januari 2023

a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

KASUBBAG BINFUNG

u.b.

KEPALA KAUH DIKLIT


 dr. ANGELINE, Sp.PK, M.Kes

IPDA NRP. 82121332

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 8547/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala RS. Bhayangkara Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4297/UN.06/FKIK/PP.00.9/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURPIANA SAID
Nomor Pokok	: 70400119004
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA IBU NIFAS DENGAN POST PARTUM BLUES DI RS BHAYANGKARA TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 September s/d 01 Oktober 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 01 September 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

RIWAYAT HIDUP



A. Idetitas Penelitian

Nama : NURPIANA SAID
 Nim : 70400119004
 TTL : Batujala, 10 Desember 2002
 Suku : Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Jenepono

B. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Alm. Muhammad Said
 Ayah : Sugianti
 Ibu : Sugianti

C. Riwayat pendidikan

SD negri 229 Batujala : 2007-2013
 SMP Negri 2 Bontoramba : 2013-2016
 SMA Negri 2 Jenepono : 2016- 2019
 UIN Alauddin Makassar : 2019-2023