

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL BERKELANJUTAN
PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK GESTASI
28-34 MINGGU DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. NURYATI
TANGGAL 29 AGUSTUS S/D 9 OKTOBER TAHUN 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

PUTRI SYAHRANI

70400119022

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Syahrani

Nim : 70400119022

Tempat/Tanggal lahir : polewali, 11 Agustus 2001

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa, 2023

Penyusun,

PUTRI SYAHRANI

70400119022

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Putri syahrani

Nim : 70400119022

Judul : Manajemen Suhan kebidanan Antenatal Berkelanjutan pada Ny"E" Dengan kekurangan Energi Kronik Gestasi 28-34 Minggu Di Praktek Mandiri Bidan Hj. Nuryati Tanggal 29 Agustus s/d 9 Oktober Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Firdayanti, S. Si.T.,M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

Ferawati Taherong, S.ST, M.Keb
NIP : 19870924201903301

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Suhan kebidanan Antenatal Berkelanjutan pada Ny"E" Dengan kekurangan Energi Kronik Gestasi 28-34 Minggu Di Praktek Mandiri Bidan Hj. Nuryati Tanggal 29 Agustus s/d 9 Oktober Tahun 2022", yang disusun oleh Putri Syahrani Nim 70400119022 Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Juni 2023, bertepatan dengan Tanggal 1 Dzulhijjah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 juni 2022
1 Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Anieq Mumti'ah Alkautsar, S.ST.,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Firdayanti, S.SiT,M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Ferawati Taherong S.ST.,M.Keb	(.....)
Penguji 1	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	(.....)
Penguji 2	: Dr. Wahyuddin G., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Rasa syukur dan bahagia yang tak akan habis penulis curahkan atas segala kebaikan Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kelancaran, pembimbingan, petunjuk serta kasih dan sayang yang telah dilimpahkan-Nya. Sholawat dan salam yang dihaturkan penulis sedalam-dalamnya kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Alhamdulillah akhirnya penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan *Antenatal* Berkelanjutan Pada NY”E” Dengan Kekurangan Energi kronik Gestasi 28-34 Minggu Di Praktek Mandiri Bidan Hj. Nuryati Tanggal 29 Agustus s/d 9 Oktober Tahun 2022” dengan bantuan Allah ta'ala dan Rahmat-Nya yang begitu luas.

Dengan segenap rendah diri dan sadar bahwa penulis begitu menyadari Karya Tulis Ilmiah ini, dalam konteks disiplin ilmu begitu jauh dari kata sempurna dan penyusunan serta rangkaian kata yang masih terbilang banyak kekurangan. Hal ini tentu disebabkan karena kemampuan, keuletan, serta pengetahuan penulis yang masih begitu minim dan terbatas. Namun, karena berkat bantuan dan petunjuk dari Allah Subhana Wa Taala, doa orang tua dan support dari semua pihak hingga penulis dapat menuntaskan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...

Penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tercinta saya, Ayahanda Beni Marzuki yang selalu mendoakan, mensupport dan memberikan saya semangat untuk menempuh pendidikan sampai sekarang ini dan Ibundaku tercinta Herawati yang telah memberi motivasi serta doa untuk lebih sabar dan semangat berjuang menempuh pendidikan. Dan untuk kaka saya Arembi Nelzy Darri dan adik saya Azka Aditya Naufal Darri yang selalu memberikan saya semangat untuk lebih giat lagi dalam pendidikan.
2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof.Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Hj. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes beserta seluruh staf administrasi
4. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan juga selaku Pembimbing I yang telah Membimbing saya menyusun Karya Tulis Ilmiah, yang selalu menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
5. Ibu Anieq Muntiah Alkautsar, S.ST.,M.Keb selaku Sekretaris Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Ferawati Taherong, S.ST.,M.Keb selaku pembimbing II yang telah membimbing saya menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah, yang selalu menuntun, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik dan benar
7. dr. Darmawansyih, M.kes selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
8. Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

9. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
10. Kepala PMB Hj, Nuryati Gowa yang telah memberikan izin serta membantu menulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan.
11. Kepada semua teman-teman kebidanan khususnya angkatan 2019 “li9amen” serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT.

Akhir kata penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagian kesehatan.



Makassar, Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	i
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB III.....	52
STUDI KASUS.....	52
Langkah i: identifikasi data dasar	52
Langkah ii :identifikasi diagnosa/msalah aktual.....	59
Langkah iii :merumuskan diagnosa/masalah potensial	64
Langkah iv: perlunya tindakan segera atau kolaborasi	67
Langkah v:rencanatindakan.....	67
Langkah vi:implementasi asuhan kebidanan	72
Langkah vii:evaluasi asuhan kebidanan	74
BAB IV.....	138
PEMBAHASAN	138
BAB V	157
PENUTUP	157
A.Kesimpulan	157
B.Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	163

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, MARET 2023

Nama : Putri Syahrani

Nim : 70400119022

Pembimbing I : Firdayanti

Pembimbing II : Ferawati Taherong

“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Berkelanjutan Pada Ny”E” Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Di PMB Hj. Nuryati Tahun 2022”

Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan kondisi dimana seorang ibu hamil menderita kekurangan asupan makanan dalam jangka waktu yang lama (menahun atau kronik) sehingga dapat mengakibatkan wanita hamil memiliki masalah kesehatan yang disebabkan peningkatan kebutuhan zat gizi tidak terpenuhi pada masa kehamilan

Oleh karena itu, karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Berkelanjutan pada Ny”E” Dengan Kekurangan Energi Kronik Gestasi 28-34 minggu di Praktek Bidan Mandiri tahun 2022 selama ± 6 minggu dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP

Pada Ny“E” dengan kasus Kekurangan Energi Kronik yang dilakukan dengan pemebrian konseling dan kunjungan rumah untuk pemantauan pola makan dan gizi untuk mencegah terjadinya komplikasi baik pada ibu maupun janin, keadaan umum ibu baik serta tidak terjadi komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan.

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa setelah dilakukan kunjungan asuhan sebanyak 8 kali maka didapatkan hasil yaitu berat badan ibu bertambah dari berat badan sebelumnya 44kg menjadi 50kg, LILA serta IMT dalam batas normal, kemudian terjadi perubahan pola makan lebih teratur, makan makan yang mengandung gizi, makan makanan pendamping, tidak mengonsumsi makanan instan. Dari hasil studi kasus tidak didapatkan kesenjangan dengan teori yang didapatkan dilapangan.

Daftarpustaka : 30 (2016-2022)

Kata kunci : Kekurangan Energi Kronik (KEK), Kehamilan, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, MARCH 2023

Name : Putri Syahrani

Reg. Number : 70400119022

Supervisor I : Firdayanti

Supervisor II : Ferawati Taherong

“Continuous Antenatal Midwifery Care Management of Mrs. ‘E’ with Chronic Energy Deficiency (CED) at PMB Hj. Nuryati in 2022”

Chronic Energy Deficiency (CED) is a condition where a pregnant woman suffers from insufficient food intake over a prolonged period (chronic) which can lead to health issues due to unmet increased nutritional needs during pregnancy.

Therefore, this scientific paper aims to carry out continuous antenatal midwifery care management of Mrs. ‘E’ with Gestation Chronic Energy Deficiency of 28-34 weeks in the Independent Midwife Practice of 2022 for approximately 6 weeks, by implementing the 7-step Varney midwifery care management approach and documenting it in SOAP form.

For Mrs. ‘E’ with the Chronic Energy Deficiency case, counselling and home visits were conducted to monitor eating patterns and nutrition to prevent complications for both the mother and the fetus. This approach ensured the general well-being of the mother and prevented complications during pregnancy and childbirth.

This case study conclusion indicates that after eight care visits, the mother's weight increased from 44kg to 50kg, and the arm circumference and body mass index (BMI) were within normal limits. Furthermore, there was a more regular eating pattern, consumption of nutritious foods, inclusion of complementary foods, and avoidance of instant foods. The case study's results align with the theoretical findings.

Bibliography: 30 (2016-2022)

Keywords: Chronic Energy Deficiency (CED), Pregnancy, 7-Step Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan penyatuan dari spermatozoa dan ovum kemuaadian dilanjutkan dengan nidasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 bulan menurut kalender internasional. Maka, dapat disimpulkan bahwa kehamilan merupakan bertemunya sel telur dan spermadi dalam ataudi luar rahim dan berakhir dengan keluarnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir. (Fatimah S.St & Nuryaningsih S.ST, 2017)

Pertumbuhan pada janin sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum hamil, jika calon ibu mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, berarti akan melahirkan anak yang sehat. Untuk mencapai kondisi yang ideal banyak ibu hamil merasa kesulitan dan bermasalah pada pemenuhan kebutuhan gizi ini. Sampai sekarang masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah pada gizi, khususnya gizi kurang seperti kekurangan Energi kronik (KEK) dan Anemia gizisehingg cenderung melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah. Ibu hamil yang mengalami gizi kurang beresiko terhadap komplikasi antara lain: Anemia, perdarahan, berat badan ibu tidak bertambah. Terhadap proses persalinan, secara tidak langsung dapat mempersulit persalinan sehingga terjadi partus lama, prematuritas, perdarahan pasca persalinan dengan tindakan bahkan kematian ibu meningkat. (Prita Muliarini, 2017)

Gizi berasal dari kata bahasa Arab "Ghidza" yaitu makanan. Ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan pada tubuh manusia. Selain itu kata gizi jugaberkaitan dengan kesehatan dan berkaitan dengan potensi ekonomi

keluarga seseorang, yang berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar dan produktifitas kerja. Dengan memahami gizi, maka akan memudahkan mahasiswa untuk memahami fungsi masing-masing zat gizi bagi metabolisme tubuh.

Peningkatan kebutuhan zat gizi saat masa kehamilan semakin meningkat baik zat gizi mikro maupun zat makro karena itu peningkatan jumlah konsumsi makan perlu ditambah terutama mengkonsumsi pangan sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan ibu dan janin, ketika pemenuhan nutrisi ibu dan janin kurang maka akan menyebabkan terjadinya malnutrisi atau biasa disebut (KEK), terjadinya (KEK) pada ibu hamil akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang janin yang dapat meningkatkan risiko BBLR. (Febriyeni, 2017)

Tercatat prevalensi ibu hamil dengan (KEK) sebanyak 17,3% dengan risiko dan komplikasi terhadap ibu hamil antara lain anemia sebanyak 48,9% perdarahan sebanyak 30,3%, infeksi 7,3% sedangkan pada bayi BBLR sebanyak 6,2%. (Permenkes RI, 2018). *World Health Organization* (WHO) menginformasikan bahwa prevalensi KEK terhadap kehamilan secara global 35,75% dimana secara bermakna tinggi pada trimester ketiga dibandingkan trimester pertama dan trimester kedua kehamilan, WHO juga mencatat 40% kematian ibu di Negara berkembang berkaitan dengan Kekurangan Energi Kronik. (WHO *Regional Nutrition Strategy* 2011-2015).

Kejadian kekurangan Energi kronik (KEK) tertinggi di wilayah Afrika 48,8%, Asia Tenggara 48% sementara pada Negara maju sekitar 30-40% Kekurangan Energi Kronik (KEK) pada Negara berkembang yaitu Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Srilangka, dan Thailand yaitu 15-47%

dengan BMI (Body Mass Index) <18,5 dan di Negara Bangladesh sebanyak 47% sedangkan Indonesia merupakan urutan terbesar ke 4 setelah india dengan prevalensi 35,5% dan yang terendah yaitu negara Thailand dengan prevalensi 15-25%. (Manik1 & Rindu2, 2017)

Berdasarkan dari data riset kesehatan dasar (Riskesdes) tahun 2018 memperlihatkan prevalensi risiko (KEK) pada wanita hamil di indonesia sebanyak 17,3% angka ini menurun ketika di bandingkan oleh Riskesdes 2013, sebesar 14,8% walau terjadi penurunan dalam waktu 5 tahun, namun dalam satu tahun terakhir prevalensi wanita hamil (KEK) di indonesia mengalami sebuah peningkatan, hal itu dibuktikan dalam hasil survey pada pemantauan status gizi (PSG) tahun 2017 yang menunjukkan presentase wanita hamil dengan resiko (KEK) sebesar 24,2%. (Kemenkes, 2018)

Berdasarkan hasil riset kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2018, terlihat 48,9% wanita hamil dengan anemia, yaitu ibu hamil dengan kadar *Hemoglobin* (hb) kurang dari 11,0 g/dl, dengan proporsi berdasarkan umur 15-24 tahun (84,6%) umur 25-34 tahun (33,7%) umur 35-44 (33,6%) dan umur 45-54 (24%) meningkatnya angka tersebut di sebabkan oleh kesehatan gizi ibu hamil yang rendah selama kehamilan. Berdasarkan hasil laporan Riskesdas tahun 2020 prevalensi (KEK) di provinsi Sulawesi selatan sebanyak 13,8% sedangkan dengan hasil pemantauan gizi di kota makasar tahun 2018,prevalensi (KEK) pada ibu hamil sebanyak 2.996 orang ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK). (Subriah et al., 2021)

Menurut Badan pusat statistic (BPS) Gowa, terlihat peningkatan prevelensi resiko (KEK) pada ibu hamil yang berada di kabupaten Gowa, pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Prevelensi resiko (KEK) pada ibu hamil di

Gowa pada tahun 2019 sebanyak 5,5% angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 9,9%. (BPS Gowa,2021).

Berdasarkan data yang di dapatkan di PMB Hj, Nuryati Gowa di temukan angka kejadian Kekurangan Energi pada tahun 2019 terdapat 99 ibu yang mengalami (KEK) dari 645 ibu hamil, pada trimester I sebanyak 30 ibu hamil di trimester II terdapat 28 ibu hamil dan di trimester III terdapat 41 ibu hamil yang menderita (KEK). Pada tahun 2020 terdapat 113 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik dari 668 ibu hamil, pada trimester I, terdapat 37 ibu hamil menderita (KEK), di trimester II,terdapat 35 ibu hamil Menderita (KEK) sedangkan pada trimester III, 41 ibu hamil yang mengalami (KEK), Kemudian tahun 2021 terdapat 142 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik dari 682 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) trimester I terdapat 45 ibu hamil, trimester II terdapat 44 ibu hamil, sedangkan trimester III terdapat 53 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik. (Data PMB Hj. Nuryati. Gowa.)

(KEK) pada ibu yang sedang hamil dapat menyebabkan masalah pada ibu dan janin dan beresiko komplikasi antara lain anemia, berat badan ibu tidak bertambah secara normal dan preeklamsia. Resiko pada ibu bersalin yaitu perdarahan dan mudah terjangkit penyakit infeksi. Ibu hamil dengan (KEK) sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan janin, sehingga dapat menyebabkan keguguran, bayi berat lahir rendah (BBLR), kematian neonatal, Anemia pada bayi dan Asfiksia intrapartum.

Ibu hamil beresiko mengalami(KEK) ketika nilai lingkaran atas (LILA) dibawah 23,5 cm. Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya (KEK) pada ibu hamil antara lain yaitu asupan makanan,pengetahuan dan

kesadaran ibu tentang gizi, penyakit kronis dan status ekonomi. (Mangalik et al., 2019)

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi yaitu berhubungan dengan (KEK) pada ibu hamil diantaranya yaitu keadaan sosial ekonomi yang mengakibatkan rendahnya pendidikan, jarak kelahiran yang sangat dekat yang dapat menyebabkan buruknya status gizi pada ibu hamil, banyak nya bayi yang dilahirkan (paritas), usia kehamilan pertama terlalu muda dan pekerjaan yang biasanya memiliki status gizi yang lebih rendah apabila tidak di iringi oleh asupan makanan dalam jumlah yang cukup.

Melihat dampak kekurangan gizi yang begitu luas, maka diperlukan upaya penanggulangan gizi pada ibu hamil. Melalui intervensi yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu dengan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan ibu selama masa kehamilan. (Chandradewi, 2015)

Berdasarkan informasi dan data-data kesehatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan terhadap gizi ibu hamil sangat mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang janin, serta banyak nya ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronik (KEK) maka peneliti tertarik untuk meneliti “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Berkelanjutan Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.

B. Ruang lingkup

Adapun ruang lingkup penulisan karya Tulis Ilmiah meliputi :
Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.

C. Tujuan penulisan

1. Tujuan umum

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022, dengan menggunakan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan khusus

- a) Dapat melaksanakan pengkajian dan analisis Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- b) Dapat merumuskan diagnosa/masalah aktual Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- c) Dapat merumuskan diagnosa/masalah potensial Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- d) Dapat mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi kepada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Konik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- e) Dapat menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.

- f) Dapat melaksanakan tindakan asuhan yang disusun Pada ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- g) Dapat mengevaluasi hasil tindakannya yang telah dilakukan Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.
- h) Pendokumentasian (SOAP) semua temuan dan tindakan yang telah diberikan pada Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) di PMB Hj, Nuryati. Gowa Tahun 2022.

D. Manfaat penulisan

Manfaat penulisan pada kasus tersebut yaitu :

- 1) Manfaat Teoritis
 - Untuk dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan serta bahan dalam penerapan Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK).
- 2) Manfaat praktis
 - a) Bagi institusi
 - Untuk menambah bahan bacaan bagi pembaca di perpustakaan dan informasi mengenai asuhan kebidanan mengenai pada ibu hamil khususnya dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK)
 - b) Bagi lahan praktik
 - Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat mempertahankan mutu pelayanan terutama dalam pemberian asuhan pelayanan kebidanan pada ibu hamil sesuai standar pelayanan minimal sebagai sumber data untuk meningkatkan penyuluhan pada ibu hamil dengan kekurangan energy kronik (KEK).

c) Bagi klien

Sebagai informasi dan motivasi bagi klien, bahwa pentingnya pemeriksaan dan pemantauan kesehatan khususnya dengan asuhan kebidanan dengan kekurangan energi kronik (KEK).

E. Metode penulisan

1) Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK)

2) Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah yang meliputi : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan emergency /kolaborasi, rencana asuhan, intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

3) Studi dokumentasi

Studi yang mempelajari status klien baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter dan bidan.

4) Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan klien, keluarga klien dan dosen pembimbing baik diluar maupun di institusi yang membantu untuk kelancaran penyusunan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka yang berisi tentang : Tinjauan teori yang meliputi tinjauan tentang kehamilan (ANC), tinjauan khusus mengenai kekurangan energi standar pelayanan kebidanan Serta Pendokumentasian Manajemen Asuhan Kebidanan (SOAP)

BAB III Metodologi penelitian yang berisikan Jenis Kasus, Lokasi Studi Kasus, Pada bab ini akan diuraikan tentang 7 langkah varney yang meliputi langkah I (Pengumpulan data Dasar dan pengkajian), langkah II Interpretasi Data: identifikasi masalah atau diagnosa), Langkah III mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV kebutuhan terhadap tindakan segera, Langkah V rencana asuhan yang menyeluruh, langkah VII Evaluasi hasil Asuhan

BAB IV Tinjauan kasus yang berisi tentang Pengkajian, Interpretasi Data, Diagnosa Potensial, Diagnosa Tindakan Segera, Perencanaan, Penatalaksanaan, Dan Evaluasi Serta Data Perkembangan Dengan SOAP, pembahasan tentang kesenjangan studi kasus antara nyata dan teori yang diambil pada BAB IV dasar teori yang diambil pada BAB II mulai Pengkajian Dengan Evaluasi.

BAB V Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah inti pembahasan dari asuhan kebidanan ibu hamil dengan Kekurangan energi Kronik. Saran adalah alternatif pemecahan

masalah dan tanggapan. Kesimpulan yang berupa kesenjangan pemecahan masalah hendaknya bersifat realistis dan operasioal yang berarti saran yang dapat dilaksanakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi

Kehamilan adalah bertemunya sel ovum dan sperma kemudian terjadi implantasi selama Sembilan bulan atau 40 minggu. Dalam kehamilan terdapat III trimester, trimester I pada usia kehamilan -0 sampai dengan 12 minggu, trimester II pada usia kehamilan 13 minggu sampai dengan 27 minggu, dan trimester ke III pada usia kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu.

Kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janin, lama hamil normal, 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) mulai dari ovulasi sampai partus. Dihitung dari HPHT atau hari pertama haid terakhir, dan tidak lebih 300 hari atau 43minggu, Kehamilan 40 minggu disebut matur, atau cukup bulan jika lebih disebut kehamilan postpartum, dan jika kurang 28 atau 36 minggu, disebut prematur. (Nadya Nadya, 2013)

Saat masa kehamilan nutrisi adalah pengaruh paling utama tumbuh kembang janin. Jika ada masalah pada nutrisi, maka akan sangat berdampak pada janin. Apabila nutrisinya seimbang dan tercukupi maka, janinnya akan sehat dalam kandungan maupun saat lahir, apabila nutrisinya tidak seimbang dan tidak tercukupi, maka janin yang dikandungnya akan berdampak tidak baik pula hingga kemungkinan terjadi kelainan. Untuk melihat nutrisi pada ibu hamil tidak hanya dilihat dari porsi makan yang dikonsumsi akan tetapi, juga dilihat pada kandungan setiap porsi makan yang dikonsumsi. (SamiatulMilah, 2018)

2. Tanda dan gejala kehamilan

Tanda dan gejala kehamilan di klasifikasikan menjadi dua bagian yaitu

a. Tanda dan gejala kehamilan pasti

Tanda dan gejala kehamilan pasti antara lain:

- 1) Ibu merasakan gerakan kuat bayi di dalam perutnya. Sebagian besar ibu mulai merasakan gerakan bayi pada usia kehamilan lima bulan.
- 2) Bayi dapat dirasakan dalam rahim. Semenjak umur kehamilan 5 atau 6 bulan
- 3) Denyut jantung bayi dapat terdengar. Saat usia kehamilan menginjak bulan ke 5 atau ke 6 denyut jantung bayi kadang dapat didengar dengan instrument, seperti stetoskop atau fetoskop.
- 4) Tes kehamilan medis menunjukkan bahwa ibu hamil. Tes ini dilakukan dengan perangkat tes di rumah atau di laboratorium dengan urine atau darah ibu. (Sutanto, Andina Vita & Yuni Fitriana, S.ST., 2018)

b. Tanda dan gejala kehamilan tidak pasti

1.) Ibu tidak menstruasi

Hal ini seringkali menjadi tanda kehamilan. Jika ini terjadi, ada kemungkinan ibu hamil, tanda sebab berhentinya menstruasi adalah pertanda di buahnya sel telur oleh sperma. Kemungkinan penyebab tanda lain adalah gizi buruk, masalah emosi atau menopause (berenti haid).

2.)Mual/muntah

Banyak ibu hamil yang merasakan mual di pagi hari, namun ada beberapa ibu yang mual sepanjang hari. Kemungkinan penyebab lain dari mual yaitu penyakit atau parasit.

3.)Payudara menjadi peka

Payudara terasa lebih lunak, sensitiv, gatal, dan berdenyut seperti kesemutan dan jika di sentuh rasanya nyeri, hal ini menunjukkan peningkatan produksi hormone estrogen dan progesteron.

4.)Ada bercak darah dan keram perut

Adanya bercak darah dan keram perut disebabkan oleh implantasi atau menempelnya embrio ke dinding ovulasi atau lepasnya sel telur matang dari rahim. Hal ini merupakan keadaan yang normal.

5.)Merasa letih dan mengantuk setiap hari

Rasa letih dan ngantuk umum dirasakan pada 3 atau 4 bulan pertama kehamilan. Hal ini diakibatkan oleh perubahan hormon dan kerja ginjal, jantung serta paru-paru yang semakin keras untuk ibu dan janin, kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah anemia, gizi buruk, masalah emosi, dan terlalu banyak bekerja.

6.)Sakit kepala

Sakit kepala terjadi karena lelah, mual, dan tegang serta depresi yang disebabkan oleh perubahan hormone tubuh saat hamil. Meningkatnya pasokan darah ke tubuh juga membuat ibu hamil pusing setiap ganti posisi.

7.)Ibu sering berkemih

Tanda ini terjadi pada 3 bulan pertama dan 1 hingga 2 bulan terakhir kehamilan. Kemungkinan penyebab lain tanda ini adalah stress, infeksi, diabetes, ataupun infeksi saluran kemih.

8.)Sembelit

Sembelit dapat disebabkan oleh meningkatnya hormone progesterone. Selain mengendurkan otot rahim, hormone itu juga mengendurkan dinding usus, sehingga memperlambat gerakan usus agar penyerapan nutrisi janin lebih sempurna.

9.)Sering meludah

Sering meludah atau hipersalivasi disebabkan oleh perubahan kadar esterogen.

3. Perubahan Fisiologis dan Anatomi Kehamilan

Perubahan fisiologi yang terjadi saat hamil memiliki dampak bersifat patologis, perubahan ini dimulai ketika saat terjadi proses nidasi oleh tubuh ibu hamil direpson sebagai benda asing. Ibu hamil muda, akan merasakan mual dan munta meriang dan lemas, rasa itu akan berkurang ketika trimester pertama berakhir dan pada trimester ke 2, tubuh mulai beradaptasi dan mual berkurang, tetapi pada trimester ke 3 keluhan disebabkan oleh perbesaran perut, perubahan anatomis dan perubahan hormonal yang menyebabkan munculnya keluhan-keluhan lain seperti: nyeri punggung bawah, sesak nafas, varices, haemoroid, gangguan tidur, nyeri velvis dan lain-lain.

Ketika memasuki trimester tiga atau usia kehamilan atau umur kehamilan bertambah, tidak jarang berbagai hambatan yang muncul saat hamil yang mempengaruhi asupan nutrisi ibu maka akan mempengaruhi

kesehatan dan janin ibu. (Olivia Anggraeny, 2017) Baik hambatan bersifat sikis maupu fisik berdanpak pada kualitas tidur wanita hamil, beberapa faktor seperti membesarnya ukuran perut, gerakan janin semakin aktif, yang membuat wanita hamil kesulitan untuk tidur di malam hari. Adapun perubahan anatomi pada ibu hamil yaitu:

a. Uterus

Uterus mengalami peningkatan ukuran dan perubahan bentuk. Pada saat kehamilan uterus akan membesar pada bulan pertama karena pengaruh dari hormone esterogen dan progesterone yang kadarnya meningkat. Pada wanita hamil berat uterus 1000 gram dengan panjang kurang lebih 2,5 cm.

b. Decidua

Decidua merupakan sebutan yang diberikan kepada endometrium pada kehamilan. Progesterone dan estrogen pada awalnya diproduksi oleh korpus luteum yang menyebabkan decidua menjadi lebih tebal , lebih vaskuer dan lebih kaya di fundus.

c. Myometrium

Hormon estrogen sangat berperan dalam pertumbuhan otot di dalam uterus. Pada usia kehamilan 8 minggu, uterus akan mulai menghasilkan gelombang kecil dari kontraksi yang dikenal dengan kontraksi Braxton Hicks.

d. Serviks

Serviks mengalami pelunakan dan sianosis. Kelenjar pada serviks mengalami proliferasi. Segera setelah terjadi konsepsi, mucus yang kental akan diproduksi dan menutup kanalis servikal.

e. Vagina dan perineum

Adanya hipervaskularisasi pada saat kehamilan mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan agak kebiruan (*livide*). Tanda ini disebut tanda *Chadwick*.

f. Ovarium

Pada awal kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditas kira-kira berdiameter 3 cm. kemudian, ia mengecil setelah plasenta terbentuk.

g. Payudara (*Breast*)

Payudara akan membesar dan tegang akibat stimulasi hormone somatomammotropin, estrogen, dan progesterone tetapi belum mengeluarkan air susu.

h. Kulit

Pada kulit terdapat deposit pigmen dan hiperpigmentasi alat – alat tertentu. Pigmentasi terjadi karena pengaruh melanophore stimulating hormone (MSH) yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormon yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisis. Kadang – kadang terdapat deposit pigmen pada pipi, dahi dan hidung, yang dikenal dengan kloasma gravidarum. (Sutanto, Andina Vita & Yuni Fitriana, S.ST., 2018)

4. Perubahan psikologis pada wanita hamil

Perubahan Adaptasi Psikologis Ibu Selama Hamil:

a. Trimester I (Periode penyesuaian terhadap kehamilan)

Pada awal kehamilan sering muncul perasaan ambivalen dimana ibu hamil merasa ragu terhadap kenyataan bahwa dirinya hamil. Ambivalen dapat terjadi sekalipun kehamilan ini direncanakan dan sangat diharapkan. Gambaran respon terhadap ambivalen ini yaitu selama

beberapa minggu awal kehamilan apakah ibu hamil atau tidak serta menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan kehamilan. Pada trimester I ini dapat terjadi labilitas emosional, yaitu perasaan yang mudah berubah dalam waktu singkat dan tak dapat diperkirakan. Dapat timbul perasaan khawatir seandainya bayi yang dikandungnya cacat atau tidak sehat, khawatir akan jatuh, cemas dalam melakukan hubungan seksual dan sebagainya.

b. Trimester II (Periode sehat)

Trimester ini ibu merasa lebih stabil, kemandirian mengatur diri lebih baik, kondisi ibu lebih menyenangkan, ibu mulai terbiasa dengan perubahan fisik tubuhnya, janin belum besar sehingga belum menimbulkan ketidaknyamanan. Ibu sudah menerima dan mengerti dengan kehamilannya. Secara kognitif, pada trimester II ibu cenderung membutuhkan informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayinya serta perawatan kehamilannya.

c. Trimester III (Periode menunggu dan waspada)

Pada trimester ini ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya. Kadang ibu khawatir jika bayinya akan lahir sewaktu-waktu ini menyebabkan meningkatkan kewaspadaannya akan timbulnya tanda terjadinya persalinan. Respon terhadap perubahan diri yaitu ibu merasa dirinya aneh dan jelek, ibu mulai merasa sedih karena akan berpisah dari bayinya dan kehilangan perhatian khusus selama hamil. Pada trimester inilah ibu memerlukan ketenangan dan dukungan yang lebih dari suami, keluarga dan bidan. Trimester ini adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi dan menjadi orang tua. (Sri Widatiningsih, 2017)

5. Deteksi Dini kehamilan Risiko tinggi

Deteksi dini kehamilan risiko tinggi adalah upaya penjarangan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan gejala kehamilan risiko tinggi sejak awal. Hal-hal yang termasuk dalam deteksi dini kehamilan risiko tinggi, yaitu usia ibu hamil ≤ 20 tahun, usia ≥ 35 tahun, jumlah anak 3 atau lebih, Jarak kelahiran ≤ 2 tahun ibu dengan tinggi badan ≤ 145 cm, Ibu dengan berat badan < 45 kg sebelum kehamilan, ibu dengan LILA $\leq 23,5$ cm, Riwayat kehamilan dan persalinan (perdarahan, kejang-kejang, demam tinggi, persalinan lama, melahirkan dengan cara operasi, dan bayi lahir mati).

6. Bahaya kehamilan resiko tinggi

Dampak yang akan ditimbulkan ibu hamil dengan resiko tinggi antara lain:

a. Keguguran (abortus)

Keguguran merupakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup, keguguran dini terjadi sebelum usia kehamilan 12 minggu dan keguguran tahap lanjut terjadi antara usia kehamilan 12 minggu-20 minggu.

b. Partus macet

Partus macet merupakan pola persalinan yang abnormal dimana terjadi fase laten dan fase aktif memanjang, bahkan ditandai dengan berhentinya dilatasi serviks atau penurunan janin secara total atau keduanya.

c. Perdarahan ante partum dan post partum

Perdarahan ante partum merupakan penyebab kematian terbesar pada ibu yang ditandai kehilangan darah lebih dari 500 ml, perdarahan yang terjadi setelah kehamilan 28 minggu biasanya lebih banyak dan lebih berbahaya dibandingkan perdarahan kehamilan sebelum 28 minggu, perdarahan postpartum merupakan perdarahan ≥ 500 ml dalam waktu 24 jam setelah bayi lahir. (Sahid & Darmawansyah, 2020). Menurut waktu terjadinya perdarahan postpartum dibedakan menjadi dua: Perdarahan postpartum primer (early postpartum hemorrhage) terjadi dalam 24 jam setelah anak lahir. Perdarahan postpartum sekunder (late postpartum hemorrhage) terjadi setelah 24 jam kelahiran, antara hari ke 5 sampai hari ke 25 postpartum

d. Intra Uterine Fetal Death (IUFD)

Intra Uterine Fetal Death (IUFD) merupakan kematian janin dalam rahim sebelum terjadi proses persalinan, usia kehamilan 28 minggu keatas atau berat janin 1000 gram dapat juga mengakibatkan kelahiran mati. Ibu yang mengalami kehamilan berisiko menyebabkan meningkatnya faktor risiko terjadinya Intra Uterine Fetal Death (IUFD). Bila janin dalam kandungan tidak segera dikeluarkan selama lebih dari 4 minggu dapat menyebabkan terjadinya kelainan darah (hipofibrinogemia) yang lebih besar.

e. Keracunan dalam kehamilan (Preeklamsia) & kejang (Eklamsia)

Preeklamsia adalah keracunan pada kehamilan yang biasanya terjadi pada trimester ketiga kehamilan atau bisa juga muncul pada trimester kedua. Preeklamsia serta gangguan tekanan darah lainnya

merupakan kasus yang menimpa setidaknya 5-8 % dari seluruh kehamilan. Dua penyakit ini tercatat sebagai penyebab utama kematian serta penyakit pada bayi dan ibu hamil di dunia, dan di Indonesia kematian ibu terbesar disebabkan oleh preeklamsia/ eklampsia.

7. Tujuan Pelayanan Antenatal

a. Tujuan Umum

Semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang komprehensif dan berkualitas sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan dan persalinan dengan pengalaman bersifat positif serta melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas. Pengalaman bersifat positif adalah pengalaman yang menyenangkan dan memberikan nilai tambah bagi ibu hamil dalam menjalankan perannya. (Kemenkes RI, 2020)

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus antenatal terpadu meliputi:

- 1) Menyediakan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif dan berkualitas, termasuk konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI.
- 2) Menghilangkan “missed opportunity” pada ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, komprehensif, dan berkualitas.
- 3) Mendeteksi secara dini kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil.
- 4) Melakukan intervensi terhadap kelainan/penyakit/gangguan pada ibu hamil sedini mungkin.

- 5) Melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada

8. Standar PelayananAntenatal

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil memenuhi kriteria 10 T. Pelayanan yang diberikan yaitu:

a. Pengukuran tinggi badan dan berat badan

Tinggi badan bila < 145 cm, maka factor risiko panggul sempit kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Penimbangan berat badan dilakukan setiap kali periksa. Sejak bulan ke-4 penambahan berat badan paling sedikit 1kg/bulan.

b. Pengukuran tekanan darah

Tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg, ada factor risiko hipertensi (tekanan darah tinggi) dalam kehamilan.

c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA)

Hasil LiLA bila $< 23,5$ cm menunjukkan ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK) dan berisiko melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

d. Pengukuran tinggi Rahim

Pengukuran tinggi Rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan.

e. Penentuan letak janin (presentasi janin) dan perhitungan denyut jantung janin Apabila trimester III bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 kali/menit atau lebih dari 160x/menit menunjukkan ada tanda gawat janin, segera rujuk.

f. Penentuan status imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Perlu mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran petugas Kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Jadwal pemberian imunisasi TT yaitu TT1 diberikan saat kunjungan pertama (sedini mungkin pada kehamilan), TT2 4 minggu setelah TT1 (pada kehamilan), TT3 6 bulan setelah TT2 (pada kehamilan, jika selang waktu minimal terpenuhi), TT4 1 tahun setelah TT3 dan TT5 1 tahun setelah TT4.

g. Pemberian tablet tambah darah

Ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah setiap hari minimal selama 90 hari. Tablet tambah darah diminum pada malam hari untuk mengurangi rasa mual.

h. Tes laboratorium

1. Tes golongan darah, untuk mempersiapkan donor bagi ibu hamil bila diperlukan.
2. Tes hemoglobin, untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah (anemia).
3. Tes pemeriksaan urine (air kencing).
4. Tes pemeriksaan darah lainnya, seperti HIV dan Sifilis, sementara pemeriksaan malaria dilakukan di daerah endemis.

i. Konseling dan penjelasan

Tenaga Kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, pencegahan kelainan bawaan, persalinan dan inisiasi menyusui dini (IMD), nifas, perawatan bayi baru lahir, ASI Eksklusif, Keluarga Berencana dan imunisasi pada bayi. Penjelasan ini diberikan secara bertahap pada saat kunjungan ibu hamil.

- j. Tata laksana atau mendapatkan pengobatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan antenatal diatas dan hasil pemeriksaan laboratorium, setiap kelainan yang ditemukan pada ibu hamil harus sesuai dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Sedangkan kasus-kasus yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan.

9. Jadwal Kunjungan Antenatal

Program pelayanan kesehatan ibu di Indonesia menganjurkan agar ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sesuai dengan frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), satu kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dua kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). (Kemenkes, 2018) Ibu hamil melakukan kunjungan antenatal care minimal empat kali yaitu:

- a. Kunjungan pertama/K1 (Trimester I)

K1 adalah kunjungan pertama ibu ke pelayanan kesehatan. Pemeriksaan pertama kehamilan diharapkan dapat menetapkan data dasar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dan kesehatan ibu sampai persalinan. Kegiatan yang dilakukan yaitu: Anamnesa, pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan khusus obstetri, penilaian risiko kehamilan, menentukan taksiran berat badan janin, pemberian imunisasi TT1, KIE pada ibu hamil, penilaian status gizi, dan pemeriksaan laboratorium.

b. Kunjungan kedua/K2 (Trimester II)

Pada masa ini ibu dianjurkan untuk melakukan kunjungan antenatal minimal satu kali. Pemeriksaan terutama untuk menilai risiko kehamilan, laju pertumbuhan janin, atau cacat bawaan. Kegiatan yang dilakukan pada masa ini adalah Anamnesis keluhan dan perkembangan yang dirasakan ibu hamil, pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, penilaian risiko kehamilan, KIE pada ibu, dan pemberian vitamin

c. Kunjungan ketiga dan ke-empat/K3 dan K4 (Trimester III)

Pada masa ini sebaiknya ibu melakukan kunjungan antenatal care setiapdua minggu sampai adanya tanda kelahiran. Pada masa ini dilakukan pemeriksaan: anamnesis keluhan dan gerak janin, pemberian imunisasi TT2, pengamatan gerak janin, pemeriksaan fisik dan obstetri, nasihat senam hamil, penilaian risiko kehamilan, KIE ibu hamil, pemeriksaan USG, pemeriksaan laboratorium ulang .(Wagiyo & Putrono, 2016)

10. Kebutuhan zat gizi pada wanita hamil

Status gizi yang baik pada ibu hamil sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan janin dan juga mempengaruhi kelancaran proses persalinan. Sayur dan buah-buahan sangat penting untuk ibu hamil karena merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan ibu hamil. ((Sagita et al., 2020)

Ketika asupan gizi tidak terpenuhi maka dapat mengalami anemia selama kehamilan, perdarahan dan kematian neonatal. Wanita hamil yang kekurangan gizi akan menderita Kekurangan Energi Kronik (KEK) hingga akan berakibat buruk pada keadaan fisik, selain itu, ibu hamil yang

mengalami kekurangan gizi beresiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar dua sampai tiga kali lebih besar dibandingkan ibu hamil yang tidak mengalami kekurangan gizi dan meninggal sebesar 1,5 kali lipat.

Sangat penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi ibu hamil karena makanan yang dikonsumsi bukan untuk dirinya sendiri namun juga untuk janin, sehingga ibu hamil sangat wajib memperhatikan kebutuhan gizi pada dirinya.

Gizi yang penting dalam proses kehamilan, dimana ibu di anjurkan memakan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, sebagai mana dalam firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (Makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, Setan itu musuh nyata bagimu.

Menurut tafsir Al-Mishbah, QS Al-Baqarah/2:168.

Ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman tetapi untuk seluruh manusia seperti yang terbaca di atas. Ini menunjukkan bahwa bumi disiapkan oleh Allah untuk manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya untuk memonopoli hasilnya, baik kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku bangsa, atau kawasan, dengan merugikan yang lain itu bertentangan dengan ketentuan Allah Swt. Oleh karena itu seluruh manusia di ajak untuk memakan makanan yang halal yang ada di bumi. Disiapkan oleh Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir.

Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, itu bertentangan dengan ketentuan Allah Swt. Karena itu semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada dibumi.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni tidak dilarang oleh agama. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selanjutnya, tidak semua sesuai dengan kondisi masing-masing ada halal yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik untuk yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang di perintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik.

Menurut pendapat penulis QS Al-Baqarah dan kasus yang diambil memiliki keterkaitan dimana didalam sunah tersebut kita semua dianjurkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Sama dengan ibu yang sedang hamil sebaiknya ibu mengkonsumsi makanan yang halal, baik dan mengandung gizi agar dapat memenuhi kebutuhan ibu dan janin yang dikandungnya seperti:

a. Kalori

Pada tiga bulan pertama kehamilan, asupan energi tidak perlu ditingkatkan jika mengkonsumsi makann yang bergizi, tetapi pada trimester dua akhir, tubuh ibu hamil sangat perlu tambahan 300 kalori per harinya di bandingkan waktu selama hamil.

b. Protein

Ibu hamil dan janinnya sangat membutuhkan banyak protein sebagai nutrisi untuk penunjang pertumbuhan jaringan. Wanita hamil sangat perlu mengonsumsi 60 gram protein sehari, yaitu 20-36% lebih meningkat dari kebutuhan normal. Beberapa protein hewani yang dapat dikonsumsi yaitu ikan, seafood, daging sapi, hati, dan telur sedangkan untuk sumber protein nabati yaitu: tahu, tempe, kacang polong dan kacang-kacangan lainnya.

c. Lemak

Lemak bisa membantu menyerap banyak nutrisi, lemak juga dapat menghasilkan energi dan menghemat protein untuk dimanfaatkan dalam fungsi pada perkembangan, namun, dalam keadaan hamil sekalipun ibu harus juga membatasi asupan lemak karena dalam lemak mengandung kalori yang tinggi, jika mengonsumsi lemak berlebihan, berat badan ibu hamil akan cepat naik. Makanan tinggi lemak yaitu: Daging berlemak, Susu, Keju, Mentega, Margarine dan minyak. Ketika mengonsumsi di antara makanan tersebut akan memperoleh energi cukup dari lemak.

d. DHA (*Docosahexaenoic Acid*)

Pada masa kehamilan asam lemak *docosahexaenoic Acid* (DHA) begitu penting untuk perkembangan pada otak janin, janin yang berada dalam kandungan sangat bergantung pada kecukupan asupan DHA yang dimiliki. Penelitian menunjukkan suplementasi DHA dari wanita hamil dapat meningkatkan status DHA pada janin. Para ahli menyarankan agar ibu hamil mengonsumsi 300mg DHA per harinya.

e. Karbohidrat dan serat

Karbohidrat dan serat yaitu sumber energi penting, Bahan makanan sumber karbohidrat antara lain Nasi,roti,sereal, gandum dan pasta, agar kebutuhan energi dapat terpenuhi,makanlah tiga porsi karbohidrat/ serat setiap hari (seiris roti sama dengan 1 porsi karbohidrat/serat makanan). Pilihlah makanan dari padi-padian,seperti gandum,makanan tersebut lebih kaya akan gizi dan serat di bandingkan produk yang telah diolah.

Serat sangat penting terutama untuk wanita hamil yang selalu mengalami konstipasi. Makanan yang berserat tinggi seperti padi-padian,buah segar, dan sayuran, dapat mengatasi kesulitan buang air besar yaitu (konstipasi).

f. Vitamin dan mineral

Wanita hamil membutuhkan vitamin dan mineral lebih tinggi dari sebelumnya. Sayuran dan buah-buahan memberikan vitamin dan mineral lebih banyak dibandingkan makan yang lain

Setiap hari wanita hamil dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan makanan yang berwarna hijau dan berwarna kuning, seperti apel, pear, anggur, pisang, nanas, berry, jagung, manga, papaya, kurma, melon, wortel, bit, tomat dan kembang kol, mengonsumsi sayuran lebih disarankan dibandingkan buah/sayuran kaleng atau yang sudah diolah, karena jumlah gizinya yang tinggi, serta tidak mengandung gula tambahan, garam, dan lemak.

Menu makanan yang dianjurkan dengan 1 porsi nasi kurang lebih seberat 100 gram, yang setara dengan $\frac{3}{4}$ gelas yaitu:175 kalori, 4 gram protein dan 40 gram karbohidrat seperti: Biscuit (4 buah

besar), Kentang (2 buah sedang), Jagung segar (3 buah edang), Roti putih (3 iris), Roti warna coklat(3 iris), Singkong(1 ½ potong).

Menu makanan yang setara dengan 1 porsi tempe sebanyak 2 potong sedang atau 50 gram adalah 80 kalori, 6 gram protein, 3 gram lemak dan 8 gram karbohidrat: Tahu(2 potong sedang), Kacang hijau (2 ½ sendok makan), Kacang kedelai (2 ½ sendok makan), Kacang merah (2 ½ sendok makan), Kacang tanah kupas (2 sendok makan), Petai segar (papan/biji besar).

Menu makanan yang setara dengan 1 porsi yang terdiri dari 1 potong sedang ikan segar sebanyak 40 gram adalah 50 kalori, serta 7 gram protein dan 2 gram lemak seperti: ikan asin (1 potong kecil), ikan teri kering (1 sendok makan), udang besar (5 ekor sedang), cumi-cumi (1 ekor kecil), Susu sapi (1 gelas)

Data sumber pangan protein hewani dengan 1 satuan penukar yang mengandung :7 gram protein, 5 gram lemak dan 75 kalori seperti: Telur bebek asin (satu butir), Telur ayam (1 butir), Telur puyuh (5 butir).

Data sumber pangan protein hewani dengan 1 satuan penukar yang mengandung :7 gram protein,13 gram lemak,dan 150 kalori seperti: Ayam dengan kulit (satu potong sedang), Belut (3 ekor), Telur ayam (4 butir), Telur bebek(1 butir)

Menu makan yang setara dengan satu porsi sayur bayam kurang lebih seberat 100 gram yaitu: 25 kalori, 5 gram karbohidrat,dan satu gram protein. Satu porsi sayuran kurang lebih satu gelas sayur setelah di masak seperti:Jagung muda, kangkung,

kol, Papaya muda, sawi, terong, kacang panjang, Labu siam, pare, taoge, wortel

Menu makanan yang setara dengan per porsi kurang lebih 100 gram 50 kal, 10 gram karbohidrat, dan 3 gram protein. Satu porsi sayur kurang lebih 1 gelas sayuran setelah dimasak seperti: Bayam merah, Daun singkong, Daun pepaya, Nangka mudah

Daftar menu buah yang setara dengan 1 buah pisang ambon ukuran sedang atau 50 gram, mengandung 50 kalori dan 10 gram karbohidrat seperti: Alpokat (1/2 buah besar), Anggur (20 buah sedang), Apel merah (1 buah kecil), Apel malang (1 buah sedang), Jeruk manis (2 buah sedang), Kurma (3 buah), Mangga (3/4 buah besar), Manggis (2 buah sedang), Melon (1 potong), Nangka masak (3 biji sedang), Papaya (1 potong besar), Pisang ambon (1 buah), Pisang kapok (1 buah), Pisang raja (2 buah), Semangka (2 potong)

Gizi yang cukup sangat penting dalam kehamilan, dimana ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan tubuh ibu hamil dan janinnya, tetapi tidak dianjurkan untuk berlebihan sebagai mana firman Allah Swt dalam QS Al-An'am/6:141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَسِبَهَا وَغَيْرَ مُمْتَسِبَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Tejemahnya:

“Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan tidak merambat, pohon kurma dan tanaman yang beraneka ragam rasanya, minyak zaitun dan delima yang serupa (Bentuk dan warna) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Menurut tafsir Al-Mishbah, QS Al-An’am/6:141

Ayat di Atas ditujukan untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah serta untuk melarang segala yang mengantar kepada yang melupakan nikmat-nikmatnya. Hanya Allah yang menciptakan pohon kurma, dan tanaman-tanaman dalam keadaan yang bermacam-macam rasa bentuk dan aroma-nya. Allah juga lah yang menciptakan buah-buahan seperti zaitun dan delima yang serupa dalam beberapa segi seperti bentuk dan warnanya, dan tidak serupa dalam beberapa segi yang lain seperti rasanya, padahal semua tumbuh diatas tanah yang sama dan disiram dengan air yang sama.

Makanlah sebagian buahnya yang bermacam-macam itu jika ia berbuah, dan tunaikanlah dari sebagian yang lain haknya dihari memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang butuh dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal, yakni jangan menggunakan sesuatu atau memberi maupun menerima sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak merestui dan melimpahkan anugrah kepada orang yang berlebih-lebihan dalam

segala hal karena tidak ada kebijakan dalam pemborosan, apapun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan dalam kebijakan.

Keterkaitan QS Al-An'am dengan kasus yang penulis ambil yaitu dalam surah kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang telah Allah berikan seperti buah kurma yang mengandung vitamin dan mineral sari kurma menghasilkan hormon sejenis oksitosin yang dapat merangsang kontraksi pada otot polos rahim pada saat menjelang kelahiran, pada buah delima juga termasuk buah yang kaya akan vitamin, persediaan delima untuk zat besi dalam darah akan membantu mengurangi gejala anemia termasuk kelelahan, kelemahan, pusing, gangguan pendengaran, kemudian pada buah zaitun juga mengandung antioksidan dan anti peradangan nutrisi tersebut dapat membawa manfaat bagi kesehatan ibu hamil. Dengan mengonsumsi buah diatas juga harus pada batasan tertentu yang tidak berlebih-lebihan dan senantiasa merasa cukup dalam segala hal.

Table 2.1 Angka Kecukupan Vitamin Yang Dianjurkan

Vitamin	Trimester I	Trimester II	Trimester III
Vitamin A (mcg)	+300	+300	+350
Vitamin D (mcg)	+0	+0	+0
Vitamin E (mg)	+0	+0	+0
Vitamin K (mcg)	+0	+0	+0
Vitamin B1 (mg)	+0,3	+0,3	+0,3
Vitamin B2 (mg)	+0,3	+0,3	+0,3
Vitamin B5 (pantotenat) (mg)	+4	+4	+4
Vitamin B6 (mg)	+1,0	+1,0	+1,0
Folat (mc g)	+0,4	+0,4	+0,4
Vitamin B12(mcg)	+200	+200	+200
Biotin (mc g)	+0,2	+0,2	+0,2
Kolin (m g)	+25	+25	+25
Vitamin C (mg)	+10	+10	+10

Table 2.2 Angka Kecukupan Mineral Yang Dianjurkan

Mineral	Trimester I	Trimester II	Trimester III
Kalsium (mg)	+20	+20	+20
Fosfor (mg)	+0	+0	+0
Magnesium (mg)	+40	+40	+40
Natrium (mg)	+0	+0	+0
Kalium (mg)	+0	+0	+0
Mangan (mg)	+0,2	+0,2	+0,2
Tembaga (mcg)	+100	+100	+100
Kromin (mcg)	+5	+5	+5
Besi (mg)	+0	+0	+0
Lodium (mcg)	+70	+70	+70
Seng (mg)	+2	+2	+2
Selenium (mcg)	+5	+5	+5

Tablet 2.3 Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan

Trimester	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak		Karbohidrat (g)	Serat (g)	Air (ml)	
			Total	n-6 n-3				
Trimester I	+ 180	+20	+6	+2, 0	+0, 3	+25	+3	+300
Trimester II	+300	+20	+10	+2, 0	+0, 3	+40	+4	+30
Trimester III	+300	+20	+10	+2, 0	+0, 3	+40	+4	+30

Kemenkes RI tahun 2019

Takaran makanan yang dimakan tiap kali makan yaitu: Nasi/pengganti 1 piring setara dengan 200 gr, Lauk-pauk hewani: (Ayam 1 potong sedang/daging 2 potong kecil/ikan 1/3 ekor sedang setara dengan 40 gr), lauk nabati: (Tempe 2 potong sedang setara dengan 50 gr, tahu 2 potong sedang setara dengan 100 gr, kacang-kacangan 2 sendok makan setara dengan 25 gr, sayuran: 1 gelas/1 piring/1 mangkok (setelah

masak ditiriskan) setara dengan 100 gr, buah-buahan: 2 ¼ potong sedang setara dengan 100 gr.

B. Tinjauan Khusus Tentang Kekurangan Energi Kronik pada ibu hamil

1. Definisi

(KEK) kekurangan energi kronik yaitu keadaan ibu hamil yang mengalami kekurangan makanan dan asupan gizi yang berlangsung sudah menahun atau biasa disebut (kronis) sehingga dapat mengakibatkan wanita hamil memiliki masalah kesehatan yang dapat membahayakan ibu dan janin yang dikandungnya. (Nisa et al., 2018)

Kekurangan energi kronik yaitu keadaan kekurangan asupan energi dan protein terhadap Wanita Usia Subur (WUS) dan wanita hamil yang berlangsung terus menerus dan menimbulkan gangguan pada kesehatan ibu. Kurangnya energi dan asupan protein tersebut terjadi pada waktu yang begitu lama sehingga menimbulkan ukuran indeks massa tubuh tidak berada pada batas normal. kurang dari 18,5 orang dewasa. (Meriska Cesia Putri, 2017)

2. Etiologi

KEK (Kekurangan Energi Kronik) yaitu keadaan dimana status gizi kurang pada ibu hamil, penyebab utamanya belum diketahui secara pasti, namun penyebab utama dikarenakan kurangnya protein dan energi dalam jangka yang cukup lama, (Chori, dkk. 2021)

Tiga faktor utama yang sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Salah satu indikator untuk dapat mengukur derajat kesehatan yang optimal diantaranya dengan melihat unsur kualitas hidup dan unsur-unsur kematian yang mempengaruhinya, seperti kesakitan dan status gizi

berkembang di pengaruhi oleh penyakit infeksi dan mengonsumsi makanan yang kurang, sedangkan pada tingkat ekonomi meliputi pendidikan dan penetapan tidak langsung merupakan penyebab dari masalah gizi. (Meriska Cesia Putri, 2017)

Proses terjadinya (KEK) diakibatkan oleh lingkungan dan manusia yang didukung oleh kurangnya asupan zat-zat gizi, maka simpanan zat gizi yang berada pada tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh jika keadaan ini berlangsung lama, maka simpanan akan habis dan terjadi kemerosotan jaringan. (KEK) terjadi karena tubuh kekurangan beberapa jenis gizi yang menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi yaitu: jumlah gizi yang dikonsumsi kurang, mutunya rendah ataupun keduanya. Zat gizi yang di konsumsi mungkin juga gagal untuk diserap dan digunakan untuk tubuh. Faktor-faktor ibu hamil mengalami (KEK) Kekurangan Energi Kronik yaitu:

a. Faktor pendapatan keluarga

Faktor pendapatan keluarga atau status ekonomi keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari berpengaruh pada daya beli seseorang sehingga dapat menghambat kecukupan gizi yang dibutuhkan ibu hamil dan keluarganya

b. Faktor pendidikan ibu

Keadaan sosial dan ekonomi, dikaitkan dengan kemiskinan akibat rendahnya pendidikan dan kemampuan berfikir, sehingga konsumsi makanan yang layak dan bergizi menjadi tidak tercukupi bahkan tidak terpenuhi dalam keseharian keluarga.

c. Faktor umur ibu

Ibu hamil yang berusia terlalu muda atau masih remaja cenderung memiliki berat badan kurang dari normal, umumnya tubuh remaja tersebut belum sempurna untuk menjalani proses kehamilan dan melahirkan bayi. Faktor usia mempengaruhi kemampuan Rahim untuk menerima bakal janin. Pada usia ≥ 35 tahun organ reproduksi mengalami penurunan, otot sudah lemah seiring bertambahnya usia, tidak mudah mengatasi komplikasi yang hebat, Sehingga usia ≥ 35 tahun beresiko mengalami berbagai penyakit.

d. Faktor Paritas

Paritas yaitu ketika seorang ibu telah melahirkan beberapakali, dimana pada keadaan ibu hamil di katakana terlalu banyak melahikan lebih dari 3 kali. Antara riwayat obsetri adalah membantu menenukan besaran kebutuhan zat gizi karena terlalu sering hamil dapat menguras cadangan nutrisi ibu hamil, untuk paritas yang baik yaitu 2 kali, jarak melahirka yang terlalu dekat dapat menyebabkn kualitas janin rendah dan dapat membahayaka kesehatan keduanya, ibu tidak berkesempatan memperbaiki bentuk tubuhnya karena membutuhkan energi yang cukup untuk memulihkan keadaan setelah bersalin.

e. Fator pola perilaku konsumsi makanan

Pada masa kehamilan zat gizi yang di perlukan wanita hamil untuk metabolisme tubuh baik ibu dan janin dalam kandungan meningkat, karena itu pada masa kehamilan asupan izi juga meningkat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan bertambah besarnya kandungan ibu hamil. Ibu yang mengalami kekurangan asupan gizi yang berstatus gizi buruk maka berpeluang melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). (Nurmila, 2017)Ketika kondisi

diatas berlangsung dalam kurun waktu yang lama maka terjadi ketidak stabilan asupan pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi sehingga dapat menyebabkan ibu hamil mengalam Kekurangan Energi Kronik (KEK).

f. faktor riwayat penyakit infeksi

Ada hubungan antara infeksi (bakteri, virus, parasit) dengan kejadian malnutrisi. Penyakit dan infeksi akan menyebabkan gangguan gizi dengan beberapa cara, yaitu dengan menghilangkan bahan makanan melalui muntah dan diare. Selain itu penyakit infeksi seperti, infeksi gangguan pernafasan dapat juga menurunkan nafsu makan sehingga mempengaruhi status gizi apabila terjadi masalah gizi yang berkelanjutan. (Dieny et al., 2019)

3. Patofisiologi KEK

Patofisiologi penyakit gizi kurang terjadi melalui lima tahapan adalah: pertama, apabila kecukupan zat gizi berlangsung lama maka cadangan jaringan akan digunakan untuk memenuhi ketidak cukupanitu. Kedua, jika ini berlangsung lama, maka akan menjdi kemerosotan jaringan, yang di tandai oleh penurunan berat badan. Ketiga, terjadi perubahan biokimia yang dapat terdeteksi dengan pemeriksaan laboratorium. Keempat, terjadi perubahan fungsi yang ditandai dengan tanda yang khas. Kelima, terjadi perubahan anatomi yang terlihat oleh munculnya tanda klasik. Terjadinya Kekurangan Energi Kronik adalah akibat lingkungan dan manusia yang didukung tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. (Nurmila, 2017)

4. Tanda dan gejala

Adapun tanda dan gejala (KEK) yaitu: Lingkar Lengan Atas (LILA) kurang dari 23,5 cm, Badan kurus, Terus menerus merasa letih, Konjungtiva tampak pucat, Muka tampak pucat, Tensi kurang dari normal :100 mmHg, Hb kurang dari normal :11gr%, Nafsu makan kurang, Mual/muntah Badan lemas, Mata berkunang-kunang. (fizza Doroh,2018)

5. Klasifikasi KEK

Terlihat batasan lain dalam membagi definisi Kekurangan Energi Kronis dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama didefinisikan sebagai underweight ringan (mild), kedua, sebagai underweight sedang (moderate), dan underweight berat (severe), dapat dilihat pada table:

Table 2.4 Klasifikasi KEK menggunakan dasar IMT (kg/m²)

Tingkatan KEK	IMT (kg/m ²)
Normal	> 18,5
Tingkat I	17,0-18,4
Tingkat II	16,0-16,9
Tingkat III	<16,0

Table 2.5 Klasifikasi KEK menggunakan dasar LILA (cm)

Klasifikasi	Batas Ukur
KEK	<23,5
Normal	23,5

Kemenkes RI tahun, 2019

a. Tinggi badan

Pada pengukuran tinggi badan ibu hamil dapat digunakan untuk mengukur status gizi sebelum kehamilan terjadi, tinggi badan ibu hamil

minimal:145cm yang dapat di jadikan sebagai syarat gizi ibu hamil yang tergolong baik.


b. Berat badan

Metode umum yang di pakai untuk memantau status gizi adalah mencatat pertambahan berat badan secara teratur selama hamil,dan membandingkan dengan berat badan sebelum hamil. Status gizi yang baik selama kehamilan, harus mengalami kenaikan berat badan sebanyak 10-12 kg,yaiu pada trimester I kenaikan kurang lebih 1 kg, trimester II kenaikan kurang lebih 3kg, Trimester III kenaikan kurang lebih 6 kg.

c. LILA

Cara mengetahui status Kekurangan Energi Kronik (KEK) Wanita Usia Subur (WUS), 15-59 tahun dengan mengukur (LILA) Lingkar Lengan Atas. Hasil pengukuran digunakan sebagai cara mengidentifikasi seberapa besar ibu hamil mempunyai risiko melahirkan anak memiliki berat badan lahir rendah (BBLR). Pengukuran (LILA) lingkar lengan atas digunakan untuk mengetahui status gizi bayi,balita, bumil,anak sekolah dan dewasa.

Indeks digunakan tanpa melihat umur. Lingkar Lengan Atas (LILA), sebagaimana dengan berat badan merupakan parameter yang labil, yang dapat beruba-ubah begitu cepat sebab itu (LILA) Lingkar Lengan Atas merupakan indeks status gisi sekarang. Salasatu cara menegtahui status indeks (KEK) Kekurangan Energi Kronik pada (WUS) Wanita Usia Subur yaitu mengukur Lingkar lengan stas (LILA) > 23,5 cm.



Sumber : Penilaian Status Gizi, 2018
Gambar 2.1 Pengukuran (LILA)

Cara pengukuran (LILA) adalah:

1. Menentukan titik mid point pada lengan, subjek diminta untuk berdiri tegak.
 - a) Mintalah pasien untuk membuka lengan pakaian yang menutup lengan kiri atas (bagi yang kidal gunakan lengan kanan)
 - b) Tekukan subjek membentuk 90 derajat, dengan telapak tangan menghadap keatas. Pengukur berdiri di belakang pasien dan menentukan titik tengah antara tulang atas pada bahu kiri dan siku.
 - c) Tandailah titik tengah dengan penah.
2. Mengukur lingkar lengan Atas (KEK).
 - a) Dengan tangan tergantung lepas dan siku lurus di samping badan, telapak tangan menghadap ke bawah
 - b) Ukuran lingkar lengan atas (LILA) pada posisi mid poin dengan pita ukur (LILA) menempel pada kulit, perhatikan jangan sampai pita ukur menyentuh kulit atau ada rongga antara kulit dan pita ukur.

- c) Lingkar Lengan Atas di catat skala 0,1 cm.
- d) Pengukuran Lingkar Lengan Atas tidak bisa digunakan untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. Pengukuran digunakan karena pengukurannya sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

d. IMT (Indeks Massa Tubuh)

Masalah kurang dan kelebihan gizi pada orang dewasa (usia 18 tahun keatas) merupakan masalah penting, karena selain mempunyai resiko penyakit-penyakit tentu, juga dapat mempengaruhi produktif kerja. Laporan FAO (*Food and agriculture Organization*) WHO (*World Health Organization*) UNU (*United Nation University*) Menyatakan bahwa batasan normal berat badan orang dewasa di tentukan oleh *Body Mass Index* (BMI)

Istila body mass indeks diartikan menjadi indekx masa tubuh IMT yaitu alat sederhana memantau status gizi orang dewasa terkhusus dengan orang yang mengalami kekurangan atau berlebihan berat badan, dengan mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang memiliki harapan bertahan hidup lebih lama.

Wanita hamil dengan berat badan kurang, selalu di hubungkan dengan keabnormalitas kehamilan, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), berat badan yang berlebihan, beresiko kesulitan dalam persalinan. Indeks Massa Tubuh (IMT) tdk dapat di pergunakan sebagai alat indikator ibu hamil karena perubahan berat badan yang terjadi selama hamil.

Table 2.6 Nilai IMT

Nilai IMT	Artinya
18,4 kebawah	Berat badan kurang
18,5-24,9	Berat badan ideal
25-29,9	Berat badan lebih
30-39,9	Gemuk
40 keatas	Sangat gemuk

6. Penatalaksanaan (KEK).

Penatalaksanaan yang akan dilakukan yaitu memberikan konseling pada ibu mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada ibu, perilaku pola hidup bersih dan sehat.

Menurut Depkes RI 2012 wanita hamil dengan (KEK) adalah menggunakan cara penyelenggaraan pemberian makanan tambahan (PMT) yaitu bukan sebagai makanan pengganti namun diutamakan sebagai sumber protein hewani maupun nabati misalnya: ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacangan dan tempe dan tahu. (PMT) berasal dari bahan lokal merupakan modifikasi dari (bahan makan campuran) menyumbangkan energi 326 kkl dan protein sebesar 7,2 gram, berdasarkan hal tersebut (PMT) telah memperhatikan aspek citarasa, kepraktisan, daya simpan dan penyajian. (Chandradewi, 2015)

Menghimbau agar ibu tetap meminum tablet penambah darah (Fe), vitamin, dan memakan pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan oleh bidan, sembari melakukan follow up mengenai perkembangan berat badan ibu.

7. Komplikasi

Keadaan gizi kurang pada ibu hamil dapat mengakibatkan infeksi, keadaan ini merupakan hubungan timbal balik. Penyakit infeksi dapat memperburuk dan dapat menimbulkan malnutrisi dan menimbulkan beberapa macam ancaman kesehatan, penurunan asupan gizi akibat kurangnya nafsu makan, menurunnya absorpsi dan kebiasaan mengurangi makanan pada saat sakit ialah mekanisme patologis infeksi, malnutrisi dan juga meningkatnya kehilangan cairan/zat gizi akibat penyakit diare, mual/muntah dan perdarahan terus menerus juga terjadi.

Kekurangan zat gizi dapat menimbulkan beberapa masalah yaitu:

a. Terhadap ibu

Gizi kurang pada wanita hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada wanita hamil: Anemia, Perdarahan, Berat Badan ibu hamil tidak bertambah secara normal, dan terkena penyakit infeksi.

b. Terhadap persalinan

Pengaruh gizi yang kurang terhadap persalinan dapat mengakibatkan persalinan yang sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya tiba, (premature), perdarahan postpartum dengan operasi cenderung meningkat.

c. Terhadap janin

Kekurangan gizi pada ibu hamil mempengaruhi perkembangan janin, abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, Asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan) lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang dilakukan bidan dalam proses pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. (Nurmila, 2017). Dengan adanya proses Manajemen Asuhan Kebidanan ini maka mudah mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan asuhan yang aman.

2. Tahapan Dalam Manajemen Kebidanan

Proses manajemen terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang dimulai dari pengumpulan data dasar dan diakhiri dengan evaluasi. Tahapan dalam proses asuhan kebidanan ada 7 langkah, yaitu:

a. Langkah I. Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah pertama ini bidan mengumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien baik dari hasil anamnesa klien, keluarga, hasil pemeriksaan dan dari dokumentasi pasien atau catatan tenaga kesehatan yang lain data secara garis besar di klasifikasi menjadi data subjektif dan objektif

Data subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data dasar ibu hamil melalui anamnesa (Identitas pasien riwayat keluhan, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikososial, ekonomi, dan spiritual serta riwayat pemenuhan kebutuhan dasar). Data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan terhadap ibu hamil seperti:

pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan fisik *head to toe*, dan pemeriksaan laboratorium.

Pada kasus ibu hamil dengan (KEK) saat dilakukan anamnesa ibu mengatakan nafsu makan kurang, mual/muntah, badan lemas, serta mata berkunang-kunang. Pada pemeriksaan antropometri lingkaran lengan atas (LILA) $\leq 23,5$ cm, pada pemeriksaan fisik *head to toe* pada mata: konjungtiva tampak pucat, serta pemeriksaan pada wajah pucat. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital tekanan darah kurang dari normal ≤ 100 mmHg dan pada pemeriksaan penunjang Hb kurang dari normal ≤ 11 gr%. (Fissa Doroh, 2018)

b. Langkah II. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data yang telah dikumpulkan diinterpretasi sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Rumusan masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena masalah tidak dapat diidentifikasi seperti diagnosis tetapi tetap membutuhkan penanganan

Kekurangan energi kronik (KEK) yaitu keadaan ibu hamil yang mengalami kekurangan makanan yang berlangsung lama (kronis) sehingga mengakibatkan menurunnya berat badan, LILA kurang dari 23,5 cm, dan IMT $< 18,5$ kg/m². Berdasarkan hasil pemeriksaan antropometri menggunakan buku KIA didapatkan berat badan menurun dari sebelumnya dengan IMT $\leq 18,5$ kg/m² dan LILA $\leq 23,5$ cm pada pemeriksaan fisik konjungtiva tampak pucat, wajah pucat, tekanan darah kurang dari normal, serta pemeriksaan Hb ≤ 11 gr%.

Berdasarkan hasil diagnosa pemeriksaan tersebut, diagnosa kebidanan yang ditegakkan adalah ibu hamil dengan (KEK)

c. Langkah III. Mengidentifikasi diagnosis atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang telah diidentifikasi, langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersip-siap bila diagnosis atau masalah potensial itu benar-benar terjadi.

Adapun masalah potensial yang dapat terjadi pada kasus (KEK), dapat menimbulkan keguguran (abortus), dan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). Berat bayi lahir rendah mempunyai resiko kematian, gizi kurang, gangguan perkembangan janin, serta dapat mengalami komplikasi lain sedangkan pada ibu sendiri seperti: Anemia, berat badan tidak bertambah, dan terkena infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, premature, perdarahan setelah persalilan, serta sectio caesarea.

d. Langkah IV. Melaksanakan tindakan segera

Pada langkah ini Bidan dan dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terjadi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi pasien dan mengevaluasi situasi pasien untuk menentukan asuhan yang paling tepat, pada langkah ini mencerminkan kesinambungan proses Manajemen Kebidanan.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari ibu untuk masalah (KEK) tidak memerlukan tindakan segera atau kolaborasi antara dokter dan bidan, terkecuali jika terjadi perdarahan atau komplikasi pada ibu

hamil maka dilakukan kolaborasi dengan dokter atau melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

e. Langkah V: Intervensi Perencanaan tindakan asuhan kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh di tentukan oleh langka-langka sebeumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalh yang telah diidentifikasi atau di adaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif.

Adapun perencanaan yang akan dilakukan yaitu memberikan konseling pada ibu mengenai pentingnya pemenuhan gizi pada ibu, perilaku pola hidup sehat. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacangan tempe dan tahu. Mengganti pola makan ibu agar lebih teratur. Menghimbau agar ibu tetap meminum tablet penambah darah (Fe), vitamin, dan memakan pemberian makanan tambahan (PMT) yang diberikan oleh bidan, sembari melakukan follow up mengenai perkembangan berat badan ibu.

Selain itu juga kita menganjurkan ibu untuk berzdikir dan sering membaca Al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar ibu merasa tenang dan tidak terlalu merasa cemas selama hamil serta pemenuhan gizi dapat tercukupi dengan baik, ibu juga terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang lain yang diakibatkan oleh (KEK).

f. Langkah VI. Implementasi/ pelaksanaan asuhan

Pada langkah ini tencana asuhan yang menyeluruh dilangkah lima dilaksanakan secara efisien. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan

sendiri, dia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya, memastikan langkah-langkah tersebut benar-benar terlaksana.

Implementasi yang diberikan pada ibu adalah hasil pemeriksaan kepada ibu dan dijelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama melayani antenatal.

g. Langkah VII. Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi apakah keefektifan asuhan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan telah dilakukan sesuai dengan masalah potensial atau aktual.

Pada langkah ke VII ini dilakukan evaluasi yaitu keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan pada berat badan, IMT, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang dibutuhkan.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien. Menurut Varney, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen kebidanan maka didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu:

a. S (Data Subjektif)

Data subjektif (S) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah pertama (pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui anamnesis. Data Subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien

menge-nai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis.

b. O (Data Objektif)

Data Objektif (O) merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney pertama (Pengkajian data), terutama data yang diperoleh melalui hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimaksudkan dalam data objektif ini.

c. *Assessment(A)*

Assessment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan intepretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Dalam pendokumentasian manajemen kebidanan, karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan, dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini juga menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis tersebut dalam rangka mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat.

Assessment merupakan pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kedua, ketiga, dan keempat sehingga mencakup hal-hal berikut ini: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera untukantisipasi diagnosis/masalah potensial dan kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi tindakan sendiri, tidndakan kolaborasi, dan tindakan merujuk klien.

d. *Planning(P)*

Planning adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bidan mencapai kriteria tujuan yang ingin di capai dalam batas waktu tertentu. Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain, antara lain dokter.

Meskipun secara istilah, P adalah planning saja, namun P dalam metode SOAP ini juga merupakan gambaran pendokumentasian implementasi dan evaluasi. Dengan kata lain, dalam SOAP meliputi pendokumentasian manajemen kebidanan menurut Helen Varney langkah kelima, keenam, dan ketujuh. Pendokumentasian dalam SOAP ini, adalah pelaksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun sesuai dengan keadaan dan dalam rangka mengatasi masalah pasien. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Sebanyak mungkin pasien harus dilibatkan dalam proses implementasi ini. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah, maka rencana asuhan maupun implementasinya pun kemungkinan besar akan ikut berubah.

Dalam planning ini juga harus mencantumkan evaluasi, yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektifitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan/asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk

mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk mendokumentasikan proses evaluasi ini, diperlukan sebuah catatan perkembangan, dengan tetap mengacu pada SOAP.

Perencanaan tindakan yaitu beritahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan berikan penyuluhan gizi, perlunya minum tablet zat besi, makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C, serta menghindari kopi atau susu dalam 1 jam sebelum/sesudah makan (kopi atau susu mengganggu penyerapan zat besi).

Beri contoh makanan setempat yang kaya zat besi. Melaksanakan perencanaan yaitu menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, jelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pelayanan antenatal. Jelaskan penyebab anemia agar ibu tahu cara mengatasi anemianya. Kemudian melakukan evaluasi kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh tercapainya rencana yang dilakukan. Untuk menilai keefektifan tindakan yang diberikan, bidan dapat menyimpulkan jumlah kadar Hb dengan melakukan pemeriksaan laboratorium kembali

BAB III

STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN *ANTENATAL* BERKELANJUTAN
PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK GESTASI
28-34 MINGGU DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. NURYATI
TANGGAL 29 AGUSTUS S/D 3 OKTOBER 2022**

No. Register : 04xxxx

Tanggal Masuk : 29 Agustus 2022 Pukul : 09.00 wita

Tanggal Pegkajian : 29 Agustus 2022 Pukul : 09.00 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

LANGKAH I: IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny"E" Tn"A"

Umur : 21 tahun/ 23 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali/ ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA/ SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Pakkato

B. Riwayat Keluhan

Keluhan utama: Ibu datang ke PMB hj. Nuryati Gowa untuk memeriksakan kehamilan karena mengalami keluhan kadang merasakan pusing serta nafsu makan yang berkurang.

C. Riwayat keluhan utama

Ibu mengatakan telah mengalami pusing sejak minggu lalu dan nafsu makan yang berkurang sejak \pm 7 bulan yang lalu.

D. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan yang pertama dan tidak pernah mengalami keguguran
2. HPHT tanggal 10 Februari 2022
3. Ibu mengatakan usia kehamilan \pm 7 bulan
4. Pergerakan janin mulai dirasakan sejak bulan Juni 2022
5. Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan pada kuadran kanan perut bawah ibu.
6. Ibu melakukan kunjungan ANC sebanyak 4 kali dan telah mendapat imunisasi TT sebanyak 2 kali.
 - a. Kunjungan I tanggal 12 Mei 2022 dengan keluhan ibu tidak ada, berat badan 40 kg dan tekanan darah 100/80 mmHg
 - b. Kunjungan II tanggal 23 Juni 2022 dengan keluhan kadang pusing dan kadang sakit kepala, berat badan 41 kg, tekanan darah 110/70 mmHg dan telah mendapat imunisasi TT I
 - c. Kunjungan III tanggal 28 Juli 2022 dengan keluhan sering pusing, sering mengalami sakit kepala dengan tekanan darah

100/70 mmHg dengan berat badan 42 kg dan telah mendapat imunisasi TT II.

d. Kunjungan IV tanggal 29 Agustus 2017 dengan keluhan pusing dan bengkak pada kaki dengan tekanan darah 90/60 mmHg dan berat badan 44 kg.

7. Ibu mengatakan mengkonsumsi tablet penambah darah, Fe (1x1), Vit.B com (3x1), Kalk (1x1).

E. Riwayat Menstruasi

Haid pertama ibu saat usia 14 tahun, siklus haid biasanya 28-30 hari, haid biasanya dialami 5-6 hari dan tidak mengalami *disminorhea* saat haid.

F. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB jenis apapun.

G. Riwayat kesehatan yang lalu

Ibu tidak memiliki riwayat hipertensi sebelumnya dan tekanan darah sebelum hamil dalam batas normal, tidak ada riwayat penyakit asma, DM serta jantung dan ibu juga tidak memiliki riwayat alergi terhadap makanan, minuman maupun obat-obatan.

H. Riwayat kesehatan keluarga

Tidak ada riwayat keturunan memiliki anak kembar dan tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarga.

I. Riwayat sosial budaya

Ini merupakan pernikahan yang pertama, keluarga sangat mendukung kehamilan ibu yang sekarang dan sangat diharapkan terutama suami. Pengambilan keputusan dalam keluarga adalah suami. Ibumerasa cemas dengan keadaannya dan keadaan bayinya ketika melakukan pemeriksaan kehamilan.

J. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Nutrisi

Sebelum hamil ibu memiliki pola makan yang teratur cukup teratur seperti makan 3 kali sehari namun kadang juga 2 kali dengan jenis makanan seperti nasi, sayur dan lauk, sering diganti dengan mengkonsumsi makanan instan dan frekuensi minum 6-8 gelas /hari. tidak ada masalah, Sedangkan selama hamil frekuensi makan ibu sebanyak 1-2 kali sehari dengan nasi, sayur dan lauk bahkan sesekali makan makanan siap saji seperti bakso, pangsit dan mie instan dengan frekuensi minum sebanyak 6- 8 gelas perhari dengan nafsu makan yang kurang.

2. Eliminasi

Sebelum hamil ibu BAK 2-3 kali sehari dengan warna bening, bau amoniak dan BAB 1-2 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua, sedangkan selama hamil ibu BAK 2-3 kali dengan warna bening dan BAB 2-3 kali sehari konsistensi padat dengan warna kuning tua tidak ada masalah

3. Kebutuhan istirahat/tidur

Sebelum hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam 6- 8 jam, sedangkan selama hamil tidur siang tidak teratur, tidur malam berkurang 5-6 jam

4. Aktivitas

Sebelum hamil ibu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, meyapu, mengepel, memasak dll. Sedangkan selama hamil melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, meyapu, mengepel, memasak dll, tidak ada masalah.

5. Personal *hygiene*

Sebelum hamil ibu mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan *shampoo*, ganti pakaian 2 kali sehari sedangkan selama hamil mandi 2 kali sehari dengan menggunakan sabun mandi, sikat gigi 2 kali sehari, keramas 3 kali seminggu dengan *shampoo* danganti pakaian 3 kali sehari.

K. Pemeriksaan fisik umum

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-tanda vital
 - Tekanan darah : 90/60 mmHg
 - Nadi : 77 x/menit
 - Pernafasan : 20 x/menit
 - Suhu : 36,8°C
4. TB : 155cm
5. LILA : 22,5 cm
6. BB sebelum hamil : 40 kg
BB sekarannng : 44 kg.
7. Pemeriksaanfisik *head to toe*

A. Wajah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*

Palpasi : tidak ada *oedema*

B. Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sklera putih

C. Mulut

Inspeksi : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada caries gigi

D. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar limfe

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis.

E. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada areola mammae puting susu menonjol

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

F. Abdomen

Inspeksi: terdapat linea nigra, striae livide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Palpasi: Leopold I: TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 70cm

TBJ : 24 x 70 = 1680gram

Auskultasi : DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/menit, teratur.

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak oedema

h. Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

i. Ekstremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : tidak terdapat oedema pada kedua kaki


Perkusi : reflex patella kiri dan kanan (+/+)

i. Pemeriksaan penunjang

1. Hb : 11 gr%

2. Albumin : Negatif

3. Reduksi : Negatif



LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MSASALAH AKTUAL

G1P0A0, gestasi 28-34 minggu, situs memanjang, intrauterin, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Knergi Kronik.

1. G1P0A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran dan ibu merasakan adanya pergerakan janin.

b. Data objektif

- 1) Terdapat linea nigra dan striae livide
- 2) Leopold I : TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 3) DJJ: terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/ menit, teratur.

Analisa dan Interpretasi Data:

Pada saat pemeriksaan kulit perut, tampak adanya linea nigra dan striae livide yang menandakan kehamilan pertama, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat palpasi merupakan salah satu tanda-tanda pasti kehamilan. Garis tengah kulit abdomen (linea alba) mengalami pigmentasi sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan (linia nigra). (Prawirohardjo, 2016)

2. Umur Kehamilan 28 minggu 3 hari

a. Data Subjektif

- 1) Ibu mengatakan HPHT tanggal 10 februari 2022
- 2) Ibu mengatakan umur kehamilannya sekarang \pm 7 bulan

b. Data Objektif

- 1) Tanggal pengkajian 29 agustus 2022
- 2) Pembesaran perut tidak sesuai masa kehamilan
- 3) TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 4) Tafsiran persalinan 17 November 2022

Analisa dan Interpretasi Data

Dari HPHT tanggal 10 februari 2022 sampai tanggal pengkajian tanggal 29 agustus 2022 maka usia kehamilan ibu sekarang 28 minggu 3 hari atau gestasi 28-34, Tinggi Fundus Uteri pada usia kehamilan 28 minggu didapatkan dengan hasil 1/2 diatas pusat atau 2 jari diatas pusat dengan lingkar perut 24 cm (Kemenkes, 2018)

3. Situs Memanjang

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dikuadran kanan bawah perut ibu.

b. Data Objektif

- 1) LeopoldI : TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong
- 2) LeopoldII : Puki
- 3) LeopoldIII : Kepala
- 4) LeopoldIV : BAP
- 5) DJJ terdenga rjelas dan kuat pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 ×/menit, teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong di fundus dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas pada kuadran kiri bawah dan gerakan janin yang dirasakan ibu pada salah satu sisi perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu.

4. Intrauterin

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat terutama di sebelah kanan bawah perut ibu dan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama masa kehamilan.

b. Data Objektif

- 1) Pembesaran perut tidak sesuai masa kehamilan
- 2) Pada saat dilakukan palpasi Leopold ibu tidak merasakan nyeri

Analisa dan Interpretasi Data

Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang yaitu kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk bisa bertahan hidup sampai aterm tanpa ada nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut kehamilan intrauterine. Uterus mengalami peningkatan ukuran dan perubahan bentuk pada saat kehamilan uterus akan membesar pada bulan pertama karena pengaruh dari hormone estrogen dan progesterone yang kadarnya meningkat. (Sutanto, Andina Vita & Yuni Fitriana, S.ST., 2018)

5. Tunggal

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan pergerakan janin kuat dirasakan di sebelah kanan bawah perut ibu.

b. Data Objektif

1) Leopold I : TFU2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong

2) Leopold II : puki

3) Leopold III : Kepala

Pada saat auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/menit, teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu.

6. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin aktif dan kuat pada usia kehamilan \pm 4 bulan sampai sekarang dan merasakan pergerakan janin 1x dalam sehari.

b. Data Objektif

Pada auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/ menit secara teratur.

Analisa dan Interpretasi Data

Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin DJJ), merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 x per menit dan pembesaran uterus menandakan janin tumbuh. (Prawirohardjo, 2016)

7. Keadaan Janin Baik

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat terutama pada perut sebelah kanan

b. Data Objektif

- 1.) Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/ menit, teratur.
- 2.) Tinggi fundus 2 jari diatas pusat, 24 cm teraba bokong

Analisa dan Interpretasi Data

Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dan bunyi jantung janin teratur dengan frekuensi 145x/menit yang menandakan bahwa janin dalam kondisibaik.

8. Kekurangan Energi Kronik

a. Data Subjektif

Ibu mengeluhkan mengalami pusing dan nafsu makan yang berkurang.

b. Data Objektif

- 1.) TFU : 2 jari diatas pusat, 24 cm teraba bokong
- 2.) Hb : 11 gr%

3.) LILA : 22,5 cm

4.) IMT : 18,0

Analisa dan Interpretasi Data

KEK adalah keadaan kekurangan gizi yang berlangsung lama atau menahun. Ditandai dengan pengukuran LiLA ibu hamil yang di bawah batasan normal (Yuliasuti, 2014). Kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil adalah suatu keadaan ibu hamil yang mengalami gizi yang berlangsung lama (menahun) dan ditandai dengan ukuran lingkaran lengan atas ibu hamil >23,5 cm (Bunga Astria Paramashanti, S.Gz., 2019).

LANGKAH III : MERUMUSKAN DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial kekurangan energi kronik pada masa kehamilan akan mengakibatkan terjadinya komplikasi pada ibu hamil adalah mempunyai risiko lebih besar untuk melahirkan bayi berat badan lahir rendah (BBLR), mengalami kematian saat persalinan, perdarahan, pasca persalinan yang sulit karena lemah, dan muda mengalami gangguan kesehatan. Bayi yang dilahirkan dengan BBLR umumnya kurang mampu meredakan tekanan lingkungan yang baru, sehingga dapat berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bahkan mengganggu kelangsungan hidup. (r. Siti Fathonah, 2016)

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh kadang merasa pusing dan nafsu makan yang kurang

b. Data Objektif

1.) Tekanan darah : 90/60 mmHg

2.) Hb : 11 gr%

3.) LILA : 22,5 cm

4.)Pemeriksaan Abdomen

Leopold I	: TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong
Leopold II	: Puki
Leopold III	: Kepala
LeopoldIV	: BAP
LP	:70 cm
TBJ	:24x70 = 1.680 gram

Analisa dan interpretasi data

LILA adalah antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu hamil dan untuk mengetahui resiko (KEK) atau gizi kurang. Dengan LiLA yang kurang beresiko untuk melahirkan berat badan bayi lahir rendah, karena nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil sebagai ukurannya adalah Lingkar Lengan Atas sehingga ibu hamil yang memiliki LiLA yang kurang beresiko memiliki bayi BBLR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamariyah pada tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat hubungan antara Lingkar Lengan Atas (LiLA) ibu hamil dengan kejadian Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Berat lahir ditentukan oleh dua proses yaitu lama kehamilan dan laju pertumbuhan janin. Berat lahir juga menjadi indikator potensial untuk pertumbuhan bayi, respon terhadap rangsangan, lingkungan, dan untuk bayi bertahan hidup. Berat lahir memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan anak, perkembangan anak dan tinggi badan pada saat anak dewasa. Bayi lahir dengan berat lahir rendah akan beresiko tinggi terhadap penyakit infeksi dan *stunting*. Anak yang mengalami *stunting* disebabkan karena pada saat dalam

kandungan janin mengalami retradasi pertumbuhan atau pertumbuhan yang terhambat selama dalam kandungan atau IUGR (*IntraUteriGrowthRetardation*). IUGR ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang baik selama kehamilan ibu, asupan yang tidak benar sejak awal kehamilan secara tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya *stunting* pada bayi halini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Swathma, dkk padatahun 2016 yang menyatakan bahwa berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan faktor resiko kejadian *stunting* pada balita. (Swathma et al., 2018)

Akibat bila ibu hamil kekurangan gizi yaitu ibu lemah dan kurang nafsu makan, perdarahan pada masa kehamilan, kemungkinan terjadi infeksi tinggi, anemia atau kurang darah. Pengaruh pada saat persalinan juga akan terjadi, antara lain persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya (prematuur) dan perdarahan setelah persalinan, sedangkan pengaruh pada janin yaitu keguguran, bayi lahir mati, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan berat badan lahir rendah (BBLR). Akibat lain dari KEK pada janin yaitu kerusakan struktur sistem saraf pusat terutama pada tahap pertumbuhan otak dalam masa kehamilan pada trimester ke 3 sampai 2 tahun setelah bayi lahir. (Holil M. Par'i et al., 2017)

LANGKAH IV: PERLUNYA TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Pada kasus Kekurangan Energi Kronik tidak membutuhkan tindakan segera hanya saja memerlukan tindakan kolaborasi dengan dokter ahli gizi.

LANGKAH V:RENCANATINDAKAN

1. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya asuhan atau tindakan kepada ibu agar kehamilan berlangsung normal dan keadaan ibu dan janin baik serta Kekurangan Energi Kronik yang dialami ibu dapat teratasi.

2. Kriteria

- a. Kehamilan aterm dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu
- b. Keadaan ibu baik
- c. Tanda-tanda vital normal
 - 1) Tekanan darah : Sistolik 100-300mmHg
: Diastolik 60-90 mmHg
 - 2) Nadi : 60-100x/menit
 - 3) Pernafasan : 16-24x/menit
 - 4) Suhu : 36,5-37,5°C
- d. DJJ dalam batas normal antara 120-160x/menit
- e. Tidak ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan
- f. Peningkatan berat badan dalam batas normal 0,45g/minggu
- g. Hemoglobin dan ukuran LiLA
- h. Keluhan ibu yang dirasakan menghilang atau berkurang.

3. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

a. Sampaikan hasil pemeriksaan

Rasional:

Penyampaian dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kepada ibu sangat penting agar ibu dapat mengetahui perkembangan kehamilannya serta merupakan tujuan utama pemeriksaan antenatal yang berkualitas.

b. Melakukan pemeriksaan TTV seperti Tekanan darah, Nadi, Suhu dan Pernapasan

Rasional:

Dilakukan pemeriksaan Tanda-tanda vital untuk memantau adanya perubahan pada sistem tubuh ibu dan untuk mempermudah melakukan tindakan.

c. Melakukan pengukuran berat badan dan LILA

Rasional:

Pengukuran berat badan pada ibu hamil bertujuan untuk mengetahui adanya perkembangan dan pertumbuhan pada janin dan pengukuran LiLA pada ibu hamil bertujuan untuk mengetahui tingkat status gizi ibu hamil.

d. Melakukan pemeriksaan Leopold dan DJJ

Rasional:

Pemeriksaan Leopold dilakukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin dan pemeriksaan DJJ dilakukan untuk memantau detak jantung janin.

e. Melakukan pemeriksaan hemoglobin

Rasional:

Dilakukan pemeriksaan haemoglobin untuk mengetahui tingkat kadar haemoglobin dalam darah ibu hamil yang sangat penting dalam masa kehamilan.

f. Memberikan HE pada Ibu tentang:

1) Istirahat yang cukup

Rasional:

Adanya peningkatan fungsi-fungsi fisiologis tubuh diperlukan istirahat yang cukup untuk memberikan relaksasi yang cukup pada otot serta mengurangi beban kerja jantung.

2) Pola makan yang teratur dalam kehamilan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang baik.

Rasional:

Ibu hamil dengan kekurangan energy kronis membutuhkan makanan yang bergizi, mengandung karbohidrat dan protein yang tinggi, dan sumber makan beragam yang kaya akan vitamin dan mineral.

3) Menjaga personal *hygiene* dalam kehamilan

Rasional:

Menjaga personal *hygiene* sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi pada klien dan dapat memberikan rasa nyaman pada ibu.

g. Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan bayinya.

Rasional:

Dengan mengajarkan ibu cara menghitung gerakan janinnya ibu dapat memantau sendiri kondisi janinnya secara objektif sekaligus meningkatkan pengetahuan ibu tentang kehamilan.

h. Jelaskan pada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan

Rasional:

Dengan memberitahu ibu tentang tanda bahaya pada kehamilan, ibu akan mengerti dan melaksanakan anjuran bidan sehingga jika ibu mengalami salah satu dari 9 tanda bahaya pada kehamilan itu, ibu dapat segera ketenaga kesehatan terdekat sehingga ibu bisa mendapatkan pertolongan pertama dan segala hal yang mengancam keselamatan ibu dan janinnya.

i. Diskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya.

Rasional:

Dengan adanya diskusi antara ibu dan keluarga baik secara fisik maupun psikis dan financial akan siap meghadapi persalinan dan kelahiran bayinya tanparasa cemas yang berlebihan

j. Menjelaskan kepada ibu untuk memperhatikan pola makan selama hamil dan memperbaiki konsumsi makanan dengan mengkonsumsi makan yang bergizi dan beragam.

Rasional:

Dengan Kondisi ibu yang Kekurangan Energi Kronis maka sangat penting untuk memperhatikan pola makan agar lebih teratur dan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang beragam dan lengkap yakni makan yang tinggi karbohidrat, protein, sayuran serta buah-buahan.

k. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG

Rasional:

Ultrasonografi (USG) merupakan suatu metode diagnostic dengan menggunakan gelombang ultrasonik, untuk mempelajari struktur jaringan berdasarkan gambaran ultrasonic yang dipantulkan oleh jaringan, yang manfaatnya untuk memantau keadaan janin.

l. Pemberian obat Fe, Vit C (1x1), Vit.Bcom (3x1), dan Kalk (1x1) dan PMT

Rasional:

Pemberian tablet tambah darah atau Fe bersamaan dengan Vit C, bertujuan pembentukan sel darah merah dalam tubuh untuk mencegah terjadinya anemia dan meningkatkan status besi. Vit.Bcom membantu produksi energy dalam tubuh, sedangkan Kalk bertujuan mendukung pertumbuhan janin serta pemberian makanan tambahan (PMT) berupa biskuit sebagai pendamping makanan. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC secara teratur untuk memeriksakan kehamilannya atau jika adakeluhan dan bila ada tanda-tanda bahaya kehamilan segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat.

Rasional:

ANC yang teratur dapat mendeteksi adanya komplikasi yang memperburuk keadaan ibu hamil. Di samping itu dengan menganjurkan ibu datang minggu depan ibu dapat mengetahui keadaannya serta keadaan janinnya sehingga bila ada hal-hal yang membahayakan ibu dan janinnya dapat segera diberi pertolongan.

LANGKAH VI:IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Agustus 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa ibu dalam keadaan kekurangan energi kronis
2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami dan keluarga dalam perawatan klien.
3. Memberikan HE pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan pada malam hari minimal 7 jam.
 - b. Menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan agar teratur selama kehamilan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan tinggi protein, serta makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup.
 - c. *Personal Hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam saat lembab
4. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya untuk memantau kesehatan janin.
 - a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
 - b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam.
 - c. Ibu harus segera memberitahu bidan/dokter jika gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam
5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan

- a. Sakit kepala menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
 - d. Mual dan muntah yang berlebihan
 - e. Nyeri perut yang hebat
 - f. Penurunan gerakan janin
 - g. Pendarahan pervaginaam
 - h. Demam yang hebat
 - i. Kejang
6. Memberikan konseling gizi kepada ibu untuk memngksumsi makanan yang bergizi dan teratur serta mengonsumsi makanan yang mengandung proteindan karbohidrat yang cukup seperti nasi dan umbi-umbian, protein hewani seperti daging, ikan dan protein nabati seperti tempe dan tahu, serta sayuran hijaudan buah.
 7. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya. Pemilihan tempat persalinan, penolong persalinan, biaya persalinan, kendaraan saat menuju tempat persalinan dan pendamping padasaat persalinan dan pakaian ibu dan bayinya.
 8. Menganjurkan ibu untuk melakukan USG.
 9. Memberikan obat tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin B complex (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT
 10. Menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ANC bila ada tanda bahaya pada kehamilan segera memeriksakan kefasilitas kesehatan terdekat.

LANGKAH VII: EVALUASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 29 Agustus 2022

1. Keadaan ibu dengan kekurangan energi kronis belum teratasi dan keadaan janin baik ditandai dengan
 - a. Tekanan darah :90/60 mmHg
 - b. Hb :11gr%
 - c. DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/meni tsecara teratur.
2. Ibu telah merasa tenang dengan kehamilan yang dialaminya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. *Health Education* telah diberikan pada ibu
4. Ibu telah mengerti apa itu kekurangan energy kronis yang sedang dialaminya
5. Ibu telah mengerti cara menghitung pergerakan janinnya
6. Ibu telah mengerti tanda-tanda bahaya pada kehamilan
7. Ibu telah mempersiapkan semua peralatan untuk persalinan dan peralatan bayinya.
8. Ibu telah mendapat FE, Vit C, Vit Bcom dan Kalk dan PMT berupa biskuit.
9. Ibu mau melakukan kunjungan ANC secara teratur dan akan memeriksakan kehamilannya tanggal 30 September 2022.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKELANJUTAN PADA NY "E" DENGAN KEKURANGAN
ENERGI KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI PRAKTEK
MANDIR BIDAN HJ. NURYATI GOWA**

TANGGAL 29 AGUSTUS 2022

No.Register : 04xxxx

Tanggal Masuk : 29 Agustus 2022 pukul 13.30 wita

Tanggal Pengkajian : 29 Agustus 2022 pukul 13.30 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu datang ke PMB hj. Nuryati untuk memeriksakan kehamilannya.
2. Ibu mengatakan akhir akhir ini mengalami pusing dan kurang nafsu makan.
3. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran
4. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat diperut sebelah kanan.

Data Objektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HTP 10 Februari 2022
4. Gestasi 28-34 minggu
5. Tinggi badan : 156 cm

6. Berat badan sebelum hamil: 40 kg

7. Berat badan sekarang : 44 kg

8. LILA : 22,5cm

9. IMT : 18,0

10. Tanda-tanda vital

a. Tekanan darah : 90/60 mmHg

b. Nadi : 77x/menit

c. Pernafasan : 20x/menit

d. Suhu : 36,8°C

11. Pemeriksaan terfokus

a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema dan *cloasma gravidarum*

b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sclera putih

c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi

d. Payudara : simetris kiri dan kanan, tidak ada benjolan dan nyeritekan, puting susu menonol, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*.

e. Abdomen : terdapat linea nigra, striae lipide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I : TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP :70 cm

TBJ :1.680 gram

Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit, teratur.

- f. Genetalia : tidak ada *oedema* tidak ada kelainan
- g. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak ada *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kiri positif, kanan positif.

Assessment(A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 28 minggu 3 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronik.

Planning(P)

Tanggal 29 Agustus 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik

Hasil:Ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang

2. Menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan agar lebih teratur serta mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tinggi akan karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi-umbian, protein seperti daging, ikan, telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah.

Hasil:ibu bersedia memperbaiki pola makan agar lebih teratur dan bersedia mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang.Memberikan Ibu *Health Education*

3. Pola istirahat yaitu tidur malam minimal 7 jam dan tidur malam minimal 1 jam serta tidak melakukan pekerjaan berat.
 - a. Pola konsumsi yaitu mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang
 - b. Personal Hygiene yaitu mandi minimal 2 kali sehari serta mengganti pakaian 2 kali sehari dan mengganti pakaian dalam jika merasa lembab

Hasil: Ibu bersedia memperhatikan pola istirahat pola konsumsi dan *Personal hygiene*

4. Mengajarkan ibu tidak khawatir terhadap persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya

Hasil: ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Menyampaikan pada ibu tentang tanda dan bahaya dalam kehamilan
 - a. Sakit kepala menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. Oedema pada wajah dan tungkai
 - d. Mual dan muntah yang berlebihan
 - e. Nyeri erut yang hebat
 - f. Kurangnya gerakna janin

- g. Perdarahan pervaginam
- h. Demam yang hebat
- i. Kejang
- j. Ketuban pecah sebelum waktunya

Hasil :ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

6. Mengajarkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau keaktifan janinnya dan mulai menyiapkan semua persiapan untuk persalinan seperti pakaian dan kelengkapan bayi.

Hasil :ibu menegrti terhadap penjelasan yang diberikan

7. Mengajarkan ibu untuk minum tablet FE, Vit C, Vit.B com dan Kalk setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan dan tetap mengkonsumsi PMT yang diberikan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah iredsepan sesuai jadwal yang telah diberikan.

8. Mengajarkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera kefasilitas kesehatan terdekat.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIK GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 01 SEPTEMBER 2022

Tanggal Masuk : 01 September 2022 pukul 13.30 wita

Tanggal Pengkajian : 01 September 2022 pukul 13.30 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan masih berkurang
2. Ibu mengatakan masih mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat diperut sebelah kanan.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. HPHT 10 Februari 2022
4. Gestasi 28-34 minggu
5. Tinggi badan : 156 cm
6. Berat badan sebelum hamil: 40 kg
7. Berat badan sekarang : 44 kg
8. LILA : 22,5cm
9. IMT : 18,0
10. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 77x/menit

Pernafasan : 20x/menit

Suhu : 36,8°C

11. Pemeriksaan terfokus

a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada *oedema* tidak ada *cloasma*

Gravidarum

b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva pucat, sclera putih

c. Mulut :bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi

d. Payudara: simetris kiri dan kanan, tidak ada benjolan dan nyeritekan, puting susus menonjol, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*.

e. Abdomen : terdapat *linea nigra*, *striae lipide* dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I : TFU 2 jari diatas pusat, 24 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP :70 cm

TBJ :1.680 gram

Auskultasi DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 145x/menit, teratur.

- f. Genetalia : tidak ada *oedema*, tidak ada kelainan
- g. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak ada *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kiri positif, kanan positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual : G1P0A0, gestasi 28 minggu 6 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan kekurangan Energi Kronis.

Planning(P)

Tanggal 01 September 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
Hasil: Ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang
2. Mengajukan ibu untuk memperbaiki pola makan agar lebih teratur serta mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, tinggi akan karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi-umbian, protein seperti daging, ikan, telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah.
Hasil: ibu bersedia memperbaiki pola makan agar lebih teratur dan bersedia mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang.
3. Memberikan Ibu *Health Education*
 - b. Pola istirahat yaitu tidur malam minimal 7 jam dan tidur malam minimal 1 jam serta tidak melakukan pekerjaan berat.
 - c. Pola konsumsi yaitu mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang

- d. Personal Hygiene yaitu mandi minimal 2 kali sehari sertamengganti pakaian 2 kali sehari dan mengganti pakaian dalam jika merasa lembab

Hasil: Ibu bersedia memerhatikan pola istirahat pola konsumsi dan *Personal hygiene*

4. Menganjurkan ibu tidak khawatir terhadap persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya

Hasil: Ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang MahaEsa.

5. Menyampaikan pada ibu tentang tanda dan bahaya dalam kehamilan

- a. Sakit kepala menetap
- b. Gangguan penglihatan
- c. Oedema pada wajah dan tungkai
- d. Mual dan muntah yang berlebihan
- e. Nyeri erut yang hebat
- f. Kurangnya gerakna janin
- g. Perdarahan pervaginam
- h. Demam yang hebat
- i. Kejang
- j. Ketuban pecah sebelum waktunya

Hasil :ibu mengerti dengan penjelasan yang di berikan

6. Menganjurkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau keaktifan janinnya dan mulai menyiapkan semua persiapan untuk persalinan seperti pakaian dan kelengkapan bayi.

Hasil :ibu menegrti terhadap penjelasan yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk minum tablet FE, Vit C, Vit.B com dan Kalk setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan dan tetap mengkonsumsi PMT yang diberikan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan.

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera kefasilitas kesehatan terdekat.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 05 SEPTEMBER 2022

Tanggal Kunjungan : 05 September 2022 pukul 15.20 wita

Tanggal Pengkajian : 05 September 2022 pukul 15.20 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan masih kurang baik dan pola makan masih kurang teratur
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat diperut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 29 minggu 3 hari
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 100/70 mmHg
 - b. Nadi : 84x/menit
 - c. Pernapasan : 20x/menit
 - d. Suhu : 36,5°C

5. Berat badan sebelum intervensi : 44 kg
6. Berat badan sekarang : 44 kg
7. LILA : 22,5cm
8. IMT : 18,0
9. Pemeriksaan terfokus
 - a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema, tidak ada *cloasma garvidarum*
 - b. Mata : konjungtiva merahmuda dan sclera putih
 - c. Abdomen : terdapat linea nigra dan striae lipide dan tidak terdapat luka bekas operasi
 - Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 25 cm, teraba bokong
 - Leopold II : Puki
 - Leopold III: Kepala
 - Leopold IV: BAP
 - LP : 70 cm
 - TBJ : $TFU \times LP = 1,750$

Auskultasi: DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/ menit, teratur
 - d. Eksremitas : tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kanan positif, kiri positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 29 minggu 3 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronik.

Planning (P)

Tanggal 05 September 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik

Hasil:ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang

2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya

Hasil: ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya

3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya

Hasil:ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. Menganjurkan ibu untuk lebih memperbaiki pola makan agar lebih teratur dan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, makanan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi umbian, protein seperti daging, ikan dan telur dan vitamin serta mineral dan sayuran hijau dan buah, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

5. Mengingatkan ibu tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan

Hasil: ibu mengerti tanda bahaya dalam kehamilan

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi Tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin B_{complex}, (3x1) Kalk (1x1) setiap hari dengan jadwal minum yang diberikan dan tetap mengonsumsi PMT 2 keping tiap hari yang diberikan.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi PMT dan obat yang dianjurkan.

7. Menyampaikan kepada ibu *Healt Education*

a. Pola istirahat yaitu tidur malam minimal 7 jam dan tidur malam minimal 1 jam serta tidak melakukan pekerjaan berat.

b. Pola konsumsi yaitu mengatur pola makan dan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang

c. Personal Hygiene yaitu mandi minimal 2 kali sehari sertamengganti pakaian 2 kali sehari dan mengganti pakaian

Hasil: Ibu bersedia untuk memperhatikan pola istirahat, pola konsumsi dan *personal hygiene*

8. Menganjurkan ibu untuk teratur melakukan pemeriksaan ANC dan segera kefasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, atau nafsu makan semakin memburuk

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukannya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022

Tanggal Kunjungan : 12 September 2022 pukul 16.20 wita

Tanggal Pengkajian : 12 September 2022 pukul 16.20 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan mulai membaik namun pola makan masih kurang teratur
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat diperut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 30 minggu 3 hari
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 100/ 80 mmHg
 - b. Nadi : 80x / menit
 - c. Pernapasan : 20x/ menit
 - d. Suhu : 36, 5°C

5. Berat badan sebelumnya : 44 kg

6. Berat badan sekarang : 45 kg

7. LILA : 22,5 cm

8. IMT : 18,49

9. Pemeriksaan terfokus

a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*, tidak ada *oedema*

b. Mata : konjungtiva merah muda dan sclera putih

c. Abdomen : terdapat linea nigra dan stria elivide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I : TFU 2 jari di atas pusat, 26 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP : 74 cm

TBJ : $TFU \times LP = 1,924$

Auskultasi: DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/ menit, teratur

d. Eksremitas : tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kanan positif, kiri positif

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 30 minggu 3 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Planning (P)

Tanggal 12 September 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
Hasil: ibu mengerti dengan keadaannya dan menerima atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
Hasil: ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya
Hasil:ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan agar lebih teratur dan makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang, makanan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi-umbian, protein seperti daging, ikan dan telur dan vitamin serta mineral dan juga sayuran hijau dan buah, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan dan makanan siap saji
Hasil:ibu menegerti

5. Menganjurkan ibu untuk tetap mengonsumsi Tablet Fe,Vit C (1x1) , Vitamin b *compelx*, (3x1) Kalk (1x1) dan PMT 2 keping perharinya yang diberikan

Hasil:ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi obat dan PMT yang telah diberikan.

6. Mengingatkan ibu tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Menyampaikan kepada ibu *Healt Education*

- a. pola istirahat yaitu tidur malam minimal 7 jam dan tidur siang minimal 1 jam dan tidak melakukan pekerjaan berat
- b. pola konsumsi yaitu mengatur pola makandengan gizi seimbang
- c. personal hygiene yaitu mandi minimal 2 kali sehari serta mengganti pakaian 2 kali sehari dan mengganti pakaian dalam saat merasa lembab

8. Menganjurkan ibu untuk teratur melakukan pemeriksaan ANC dan segera kefasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, nafsu makan menurun dan apabila meraskan salah satu dari 9 tanda bahaya di atas

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 19 SEPTEMBER 2022

Tanggal Kunjungan : 19 September 2022 pukul 17.20 wita

Tanggal Pengkajian : 19 September 2022 pukul 17.20 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan mulai membaik dan pola makan sudah teratur dan mengonsumsi makanan bergizi
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
3. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat diperut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 31 minggu 3 hari
4. Tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/70 x menit
 - b. Nadi : 80x menit
 - c. Pernapasan : 20x menit
 - d. Suhu : 36,5

5. Berat badan sebelumnya : 45 kg
6. Berat badan sekarang : 47 kg
7. LILA : 23 cm
8. IMT : 19,31
9. Pemeriksaan fisik

- a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak *oedema*, tidak ada *cloasma garavidarum*
- b. Mata : konjungtiva merah muda dan sclera putih
- c. Abdomen : terdapat linea nigra dan striae lipide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I :TFU 3 jari diatas pusat, 28 cm, terababokong

Leopold II : Puki

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BAP

LP :76 cm

TBJ :TFUxLP =2,128

Auskultasi:DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/ menit, teratur

- d. Eksremitas :tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kanan positif, kiripositif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 31 minggu 3 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Planning (P)

Tanggal 19 September 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu bahwa kehamilannya tidak normal dan keadaan janinnya baik
Hasil:ibu mengerti dengan kondisinya dan menerima atas kondisinya sekarang
2. Menganjurkan ibu atau keluarga menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
Hasil:ibu telah menyiapkan semua persiapan persalinan dan pakaian bayinya
3. Menganjurkan ibu tidak memikirkan persalinan yang akan dihadapi dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya dan kesehatan dirinya
Hasil:ibu bersedia melakukannya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola makan agar lebih teratur dan makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang, makanan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi-umbian, protein seperti daging, ikan dan telur dan vitamin serta mineral dan juga sayuran, mengurangi mengonsumsi makanan yang instan.
Hasil: ibu mengerti dan siap mengonsumsi makanan yang dianjurkan

5. Mengajukan ibu untuk tetap mengonsumsi Tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin Bcomplex (3x1) Kalk (1x1) dan PMT 2 keping tiap harinya.

Hasil: ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi obat dan biscuit PMT yang diberikan.

6. Mengingatkan ibu tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan

Hasil: ibu mengerti.

7. Menyampaikan kepada ibu *Health Education*

- d. pola istirahat yaitu tidur malam minimal 7 jam dan tidur siang minimal 1 jam dan tidak melakukan pekerjaan berat
- e. pola konsumsi yaitu mengatur pola makan dengan gizi seimbang
- f. personal hygiene yaitu mandi minimal 2 kali sehari serta mengganti pakaian 2 kali sehari dan mengganti pakaian dalam saat merasa lembab

Hasil: ibu bersedia memperhatikan pola istirahat, pola konsumsi dan personal hygiene

8. Mengajukan ibu untuk teratur melakukan pemeriksaan ANC secara teratur dan segera ke fasilitas kesehatan apabila mengalami pusing, nafsu makan kembali menurun dan apabila merasakan salah satu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 26 OKTOBER 2022

Tanggal Masuk : 26 September 2022 pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 26 September 2022 pukul 10,00 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan membaik dan pola makan telah teratur, mengonsumsi makanan bergizi dan mengurangi makanan instan
2. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 32 minggu 3 hari
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80x/ menit
 - c. Pernapasan : 22x/ menit
 - d. Suhu : 36,8
5. TB : 156 cm

- 6. BB sebelumnya : 47 kg
- 7. BB sekarang : 48 kg
- 8. LILA : 23 cm
- 9. IMT : 19,72

10. Pemeriksaan fisik *head to toe*

- a. Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*, tidak ada *oedema*
- b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
- c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi
- d. Payudara : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.
- e. Abdomen: terdapat *linea nigra*, *striae livide* dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 28cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III: Kepala

Leopold IV: BAP

LP : 78 cm

TBJ : $TFU \times LP = 2,184$

Auskultasi: DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/menit, teratur

- f. Genetalia : tidak ada kelainan, tidak *oedema*
- g. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kiri positif, kanan positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 32 minggu 3 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Diagnosa Potensial: Antisipasi terjadinya perdarahan, BBLR , cacat bawaan dan kematian janin.

Planning(P)

Tanggal 26 September 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga bahwa kehamilannya sekarang sudah mulai normal dan keadaan janin baik.

Hasil: ibu telah mengerti dan bersyukur dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya dan kesehatan dirinya.

Hasil: ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dan kesehatan

3. Memberikan *Healt Education* pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan malam hari minimal 7 jam
 - b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan

dengan makan makanan yang tinggi protein, karbohidrat serta vitamin dan mineral

- c. Personal *hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

- 4. Mengajarkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya

- a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
- b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam
- c. Ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

- 5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan seperti:

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Gangguan penglihatan
- c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
- d. Mual dan muntah yang berlebihan
- e. Nyeri perut yang hebat
- f. Penurunan gerakan janin
- g. Pendarahan pervaginaam
- h. Demam yang hebat

i. Kejang

Hasil:ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mendiskusikan pada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya

Hasil:ibu telah mempersiapkan semua perlengkapan persalinan dan perlengkapan bayinya.

7. Menyampaikan kepada ibu untuk tetap menjaga dan mempertahankan kan pola makan agar tetap teratur dan mengonsumsi makan bergizi dan seimbang,

makan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi umbian, protein seperti daging ikan dan telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan.

Hasil: ibu mengerti dan siap mempertahankan pola makannya

8. Menganjurkan ibu untuk minum Tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin B *complex* (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT 2 keping setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salahsatu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera kefasilitas kesehatan terdekat

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKELANJUTAN PADA NY "E" DENGAN KEKURANGAN
ENERGI KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI PRAKTEK
MANDIR BIDAN HJ. NURYATI GOWA
TANGGAL 30 OKTOBER 2022**

No.register : 4xxx
Tanggal Masuk : 30 Oktober 2022 pukul 10.00 wita
Tanggal Pengkajian : 30 Oktober 2022 pukul 10.00 wita
Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Data Subjektif (S)

3. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan membaik dan pola makan telah teratur, mengonsumsi makanan bergizi serta mengurangi makanan instan
4. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
5. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat di perut sebelah kanan
6. Ibu mengatakan merasa khawatir dengan kedekatan waktu persalinan

Data Objektif (S)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 33 minggu
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
- b. Nadi : 80x/ menit
- c. Pernapasan : 22x/ menit
- d. Suhu : 36,8
5. TB : 156 cm
6. BB sebelumnya : 48 kg
7. BB sekarang : 48 kg
8. LILA : 23 cm
9. IMT : 19,7
10. Pemeriksaan fisik *head to toe*
- Wajah : simetris kiri dan kanan, tidak ada *cloasma gravidarum*, tidak ada *oedema*
 - Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sclera putih
 - Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi
 - Payudara : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*, puting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.
 - Abdomen : terdapat *linea nigra*, *striae livide* dan tidak terdapat luka bekas operasi
 - Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 28 cm, teraba bokong
 - Leopold II : Puki
 - Leopold III: Kepala

Leopold IV: BAP

LP :79 cm

TBJ :TFUxLP =2,212

Auskultasi: DJJ terdengar kuat dan jelas dikuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/menit secara, teratur

f. Genetalia : tidak ada kelainan, tidak *oedema*

g. Ekstremitas : simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kiri positif, kanan positif.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 33 minggu, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Diagnosa Potensial: Antisipasi terjadinya perdarahan, BBLR , cacat bawaan dan kematian janin.

Planning(P)

Tanggal 30 Oktober 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga bahwa kehamilannya sekarang sudah mulai normal dan keadaan janin baik.

Hasil:ibu telah mengerti dan bersyukur dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga untuk ikut serta member dukungan dan semangat kepada ibu agar tidak khawatir menjelang persalinan dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya dan

kesehatan dirinya.

Hasil: ibu merasa tenang dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dan kesehatan

3. Memberikan *Health Education* pada ibu tentang:

- a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan malam hari minimal 7 jam
- b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, karbohidrat serta vitamin dan mineral
- c. Personal *hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila lembab

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya

- a. Waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari
- b. Dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam
- c. Ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan seperti:

- a. Sakit kepala yang menetap
- b. Gangguan penglihatan

- c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
- d. Mual dan muntah yang berlebihan
- e. Nyeri pe rut yang hebat
- f. Penurunan gerakan janin
- g. Pendarahan pervaginaam
- h. Demam yang hebat
- i. Kejang

Hasil:ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mendiskusikan pada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya
 Hasil:ibu telah mempersiapkan semua perlengkapan persalinan dan perlengkapan bayinya.

7. Menyampaikan kepada ibu untuk tetap menjaga dan mempertahankan kan pola makan agar tetap teratur dan mengonsumsi makan bergizi dan seimbang, makan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi umbian, protein seperti daging ikan dan telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan.

Hasil: ibu mengerti dan siap mempertahankan pola makannya

8. Menganjurkan ibu untuk minum Tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin B *complex* (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT 2 keping setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salahsatu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera kefasilitas kesehatan terdekat.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
BERKLANJUTAN PADA NY"E" DENGAN KEKURANGAN ENERGI
KRONIS GESTASI 28-34 MINGGU DI RUMAH KLIEN**

TANGGAL 09 OKTOBER 2022

Tanggal Masuk : 09 Oktober 2022 pukul 10.00 wita

Tanggal Pengkajian : 09 Oktober 2022 pukul 10.00 wita

Nama Pengkaji : Putri Syahrani

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny"E"/Tn"A"

Umur : 21 tahun / 23 tahun

Nikah/lamanya : 1x/± 1 tahun

Suku : Makassar/Makassar

Agama : Islam/Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT/Wiraswasta

Alamat : Pakatto

Data Subjektif (S)

- a. Ibu mengatakan merasakan nafsu makan membaik dan pola makan telah teratur, mengonsumsi makanan bergizi serta mengurangi makanan instan
- b. Ibu mengatakan sudah tidak mengalami pusing
- c. Ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada perut sebelah kanan

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Gestasi 34 minggu 2 hari
4. Pemeriksaan tanda-tanda vital
 - a. Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - b. Nadi : 80x/ menit
 - c. Pernapasan : 22x/ menit
 - d. Suhu : 36,8
5. TB : 156 cm
6. BB sebelumnya : 48 kg
7. BB sekarang : 50 kg
8. LILA : 23,5 cm
9. IMT : 20,5
10. Pemeriksaan fisik *headto toe*
 - a. Wajah : simetris kiri dsan kanan,tidak ada *cloasma gravidarum*, tidak ada *oedema*
 - b. Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda,sclera putih
 - c. Mulut : bibir tidak pucat, tidak ada sariawan, gigi tidak tanggal dan tidak ada *caries* gigi
 - d. Payudara : simetris kiri dan kanan, *hyperpigmentasi* pada *areola mammae*, putting susu menonjol, tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

e. Abdomen : terdapat linea nigra, striae livide dan tidak terdapat luka bekas operasi

Leopold I : TFU 3 jari di atas pusat, 29 cm, teraba bokong

Leopold II : Puki

Leopold III: Kepala

Leopold IV: BAP

LP :80 cm

TBJ :TFUxLP = 2,320

Auskultasi: DJJ terdengar kuat dan jelas di kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148 x/menit, teratur

f. Genitalia: tidak ada kelainan, tidak *oedema*

g. Ekstremitas: simetris kiri dan kanan, tidak ada varises, tidak terdapat *oedema* pada kedua kaki, reflex patella kiri positif, kanan positif.

11. Pemeriksaan Laboratorium

a. Hb :11gr%

b. Albumin: negatif

c. Reduksi: negatif

12. PemeriksaanUSG

Hasil USG: tunggal, hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 33-34 minggu, jenis kelamin: perempuan, TBJ: 2,256gram.

Assessment (A)

Diagnosa Aktual: G1P0A0, gestasi 34 minggu 2 hari, situs memanjang, intrauteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu dengan Kekurangan Energi Kronis.

Diagnosa Potensial: Antisipasi terjadinya perdarahan, BBLR , cacat bawaan dan kematian janin.

Planning(P)

Tanggal 09 Oktober 2022

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga bahwa kehamilannya sekarang sudah mulai normal dan keadaan janin baik.

Hasil:ibu telah mengerti dan bersyukur dengan penjelasan yang diberikan

2. Memberikan dukungan psikologis dan spiritual pada ibu dengan melibatkan suami atau keluarga untuk senantiasa berdo'a kepada Allah SWT untuk kelancaran persalinan dan kesehatan bayinya dan kesehatan dirinya.

Hasil: ibu merasa tenang dan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT agar diberi kelancaran dan kesehatan

3. Memberikan *Healt Education* pada ibu tentang:
 - a. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari minimal 1 jam dan malam hari minimal 7 jam
 - b. Menganjurkan kepada ibu tentang diet seimbang dalam kehamilan dengan makan makanan yang tinggi protein, karbohidrat serta vitamin dan mineral
 - c. Personal *hygiene* dalam kehamilan seperti mengganti pakaian dalam apabila

lembab

Hasil:ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Mengajukan ibu untuk menghitung gerakan janinnya untuk memantau kesehatan janinnya, waktu menghitung gerakan dilakukan sekali dalam sehari dihitung hingga 10 kali gerakan dengan sekurang-kurangnya 10 gerakan dalam 10 jam, ibu harus memberitahu bidan/dokter apabila gerakan janinnya kurang dari 10 kali dalam 10 jam

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan mengerti cara menghitung gerakan janinnya dalam sehari.

5. Menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya pada kehamilan seperti:
 - a. Sakit kepala yang menetap
 - b. Gangguan penglihatan
 - c. *Oedema* pada wajah dan tungkai
 - d. Mual dan muntah yang berlebihan
 - e. Nyeri perut yang hebat
 - f. Penurunan gerakan janin
 - g. Pendarahan pervaginaam
 - h. Demam yang hebat
 - i. Kejang
 - j. Hasil:ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mendiskusikan pada ibu tentang persiapan persalinan dan kelahiran bayinya

Hasil:ibu telah mempersiapkan semua perlengkapan persalinan dan perlengkapan bayinya.

7. Menyampaikan kepada ibu untuk tetap menjaga dan mempertahankan pola makan agar tetap teratur dan mengonsumsi makan bergizi dan seimbang,

makan yang tinggi akan sumber karbohidrat seperti nasi dan jenis umbi umbian, protein seperti daging ikan dan telur dan vitamin serta mineral dari sayuran hijau dan buah, serta mengurangi mengonsumsi makanan instan.

Hasil: ibu mengerti dan siap mempertahankan pola makannya

8. Menganjurkan ibu untuk minum Tablet Fe, Vit C (1x1), Vitamin B *complex* (3x1) dan Kalk (1x1) dan PMT 2 keping setiap hari dan teratur dengan jadwal minum yang telah diberikan

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan anjuran yang telah diberikan yaitu meminum obat yang telah diresepkan sesuai jadwal yang telah diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ANC secara teratur atau mengalami pusing dan nafsu makan semakin memburuk atau merasakan salahsatu dari 9 tanda bahaya kehamilan.

Hasil: ibu mengerti dan mau melakukan kunjungan ulang ada keluhan dan apabila ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan akan segera kefasilitas kesehatan terdekat.



No	Hari/Tanggal	Masa kunjungan	Hasil pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1	Senin 29 Agustus 2022 pukul 13.30 wita di PMB hj.nuryati	Kunjungan satu	<p>Ds :ibu mengatakan akhir-akhir ini mengalami pusig dan kurang nafsu makan</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik</p> <p>b. TB:156BB:44kg TD: 90/60 mmHg</p> <p>c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva tampak pucat, TFU 2 jari diatas pusat 24cm</p> <p>d. Pada pemeriksaan IMT kurang dari batas normal 18,0, KEK tingkat I</p> <p>e. Pada pemeriksaan LILA 22,5cm kuranga dari batas normal</p>	<p>1. Memberitahu kepada ibu bahwa kehamiannya tidak normal dan keadaan janin baik</p> <p>2. Menganjurkan untuk memperbaiki pola makan dengan makan yang lebih teratur</p> <p>3. Mejelaskan kepada ibu tentang jenis dan kandungan makanan bergizi seimbang, serta personal hygiene, istirahat yang cukup, memberikan dukungan psikologis pada ibu.</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk memngonsumsi tablet FE, Vit C, vit B com, kalk, mengonsumsi PMT yang diberikan.</p>	<p>a. Ibu mengerti dengan keadaannya</p> <p>b. Ibu menegrti dengan penjelasan yang di berikan mengenai gizi seimbang, personal hygiene, istirahat yang cukup dan ibu merasa sedikit tenang.</p> <p>c. Ibu bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberi</p> <p>d. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 01 september 2022</p>

2	Jumat 01September 2022 pukul 13.30 wita di rumah klien gowa	Kunjungan kedua	<p>Ds : ibu mengatakan nafsu makan masih berkurang, masih megalami pusing</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik</p> <p>b. TB:156BB:44kgTD: 100/70 mmHg</p> <p>c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva tampak pucat, TFU 2 jari diatas pusat 24cm</p> <p>d. Pada pemeriksaan IMT kurang dari batas normal 18,0, terdapat KEK tingkat I</p> <p>e. Pada pemeriksaan LILA 22,5cm kuranga dari batas normal</p>	<p>1. Memberitahu kepada ibu bahwa kehamiannya tidak normal dan keadaan janin baik</p> <p>2. Menganjurkan untuk memperbaiki pola makan dengan makan yang lebih teratur</p> <p>3. Mejelaskan kepada ibu tentang jenis dan kandungan makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene, dan istirahat yang cukup setra memberikan dukungan psikologis pada ibu.</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk memngonsumsi tablet FE,vit B com, kalk, dan mengonsumsi PMT yang diberikan.</p>	<p>a. Ibu mengerti dengan keadaannya</p> <p>b. Tidak ada perubahan pada kunjungan kedua</p> <p>c. Ibu menegrti dengan penjelasan yang di berikan mengenai gizi seimbang, personal hygiene, istirahat yang cukup.</p> <p>d. Ibu mengeri dan bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberikan</p> <p>e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 05 september 2022</p>
---	---	-----------------	--	--	---

3	<p>Senin 05 September 2022 pukul 15.20 wita di rumah klien gowa</p>	<p>Kunjungan ketiga</p>	<p>Ds : ibu mengatakan nafsu makan masih kurang baik, dan tidak mengalami pusing Do: a. Keadaan umum ibu baik b. TB:156BB:44kgTD: 100/70 mmHg c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 2 jari diatas pusat 25 cm d. Pada pemeriksaan IMT kurang dari batas normal 18,0, terdapat KEK tingkat I e. Pada pemeriksaan LILA 22,5cm kurang dari batas normal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada ibu bahwa kehamiannya tidak normal dan keadaan janin baik 2. Menganjurkan untuk memperbaiki pola makan dengan makan yang lebih teratur, dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu sukai 3. Menjelaskan kepada ibu tentang jenis dan kandungan makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene, dan istirahat yang cukup serta memberikan dukungan psikologis pada ibu. 4. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi tablet FE, Vit C, vit B com, vit C, kalk, dan mengonsumsi PMT yang diberikan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibu mengerti dengan keadaannya b. Tidak ada perubahan pada kunjungan ketiga c. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan mengenai gizi seimbang, pola makan, personal hygiene, istirahat yang cukup ibu senantiasa berdoa d. Ibu mengerti dan bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberi e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 12 september 2022
---	---	-------------------------	--	--	---

4	Senin 12 September 2022 pukul 16.20 wita di rumah klien gowa	Kunjungan Empat	<p>Ds: ibu mengatakan nafsu makan sudah mulai membaik, pola makan masih kurang baik, sudah tidak mengalami pusing</p> <p>Do :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. TB:156BB:45kgTD: 100/80 mmHg c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 2 jari diatas pusat 26 cm d. Pada pemeriksaan IMT kurang dari batas normal 18,49 terdapat KEK tingkat I e. Pada pemeriksaan LILA 22,5cm kurang dari batas normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada ibu bahwa kehamiannya tidak normal dan keadaan janin baik 2. Menganjurkan untuk memperbaiki pola makan dengan makan yang lebih teratur, dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu sukai 3. Menjelaskan kepada ibu tentang jenis dan kandungan makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene, istirahat yang cukup, memberikan dukungan psikologis pada ibu. 4. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi tablet FE, Vit C, vit B com, vit C, kalk, dan mengonsumsi PMT yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ibu mengerti dengan keadaannya b. Ada peningkatan BB, IMT dan TFU c. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan mengenai gizi seimbang, pola makan, personal hygiene, istirahat yang cukup dan ibu senantiasa berdoa d. Ibu mengerti dan bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberi e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 19 september 2022
---	--	-----------------	---	--	---

5	Senin 19 September 2022 pukul 17:20 wita di rumah klien gowa	Kunjungan lima	<p>Ds: ibu mengatakan nafsumaka mulai membaik, polamakan teratur, mengonsumsi makanan bergizi dan tidak mengalami pusing</p> <p>Do :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. TB:156BB:47kgTD:110/80 mmHg c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 3 jari diatas pusat 28 cm d. Pada pemeriksaan IMT dalam batas normal 19,31 e. Pada pemeriksaan LILA 23cm kuranga dari batas normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaannya mulai membaik dan janin baik 2. Menganjurkan ibu untuk mempertahankan pola makan dengan makan yang lebih teratur, dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu sukai 3. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan kandungan makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene, dan istirahat yang cukup setra memberikan dukungan psikologis pada ibu. 4. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi tablet FE, vit B com, vit C, kalk, dan mengonsumsi PMT 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ibu mengerti dengan keadaannya b. Ada peningkatan BB, IMT, LILA dan TFU c. Ibu menegrti dengan penjelasan yang di berikan mengenai gizi seimbang, pola makan, personal hygiene, istirahat yang cukup dan ibu senantiasa berdoa d. Ibu mengerti dan bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberi e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 26 september 2022
---	--	----------------	---	--	--

6	<p>Senin 26 September 2022 pukul 10.00 wita di rumah klien gowa</p>	<p>Kunjungan enam</p>	<p>Ds: ibu mengatakan nafsu makan membaik, pola makan teratur,tidak mengalami pusing Do : a. Keadaan umum ibu baik b. TB:156BB:48kgTD: 110/80 mmHg c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 3 jari diatas pusat 28 cm d. Pada pemeriksaan IMT dalam batas normal 19,72 e. Pada pemeriksaan LILA 23cm kurang dari batas normal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaannya mulai membaik dan janin baik 2. Menganjurkan ibu untuk mempertahankan pola makan dengan makan yang lebih teratur,dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu suka 3. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan kandungn makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene,dan istirahat yang cukup setra memberikan dukungan psikologis pada ibu. 4. Menganjurkan ibu untuk memngonsumsi tablet FE,vit B com, vit C, kalk, dan mengonsumsi PMT 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ibu mengerti dengan keadaannya b. Ada peningkatan BB, IMT c. Ibu menegrti dengan penjelasan yang di berikan mengenai gizi seimbang, mempertahankan pola makan, personal hygiene, istirahat yang cukup, ibu senantiasa berdoa d. Ibu mengeri dan bersedia meminum obat, vit, PMT yang diberi e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 30 september 2022
---	---	-----------------------	--	--	---

7	Jumat 30 September 2022 pukul 10.00 wita di PMB hj.nuryati	Kunjungan tujuh	<p>Ds: ibu mengatakan nafsu makan sudah membaik dan teratur, tidak merasa pusing, ibu mengatakan merasa cemas dengan kedekatan kelahiran anaknya</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik</p> <p>b. TB:156BB:48kgTD:110/80 mmHg</p> <p>c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 3 jari diatas pusat 28 cm</p> <p>d. Pada pemeriksaan IMT dalam batas normal 19,72</p> <p>a. Pada pemeriksaan LILA 23cm kuranga dari batas normal</p>	<p>1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaannya mulai membaik dan janin baik</p> <p>2. Menganjurkan untuk mempertahankan pola makan dengan makan yang lebih teratur,dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu suka</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan kandungan makanan yang bergizi seimbang, serta personal hygiene, istirahat cukup setra memberikan dukungan psikologis pada ibu.</p> <p>4. Menganjurkan ibu memngonsumsi tablet FE, vit B com, vit C, kalk, dan PMT</p>	<p>a. Ibu mengerti dengan keadaannya</p> <p>b. Tidak ada peningkatan pada kunjungan ke tujuh</p> <p>c. Ibu menegrti dengan penjelasan yang di berikan mengenai gizi seimbang, mempertahankan pola makan, personal hygiene, istirahat yang cukup, ibu senantiasa berdoa, ibu merasa tenang</p> <p>d. Ibu mengerti dan bersedia mengonsumsi, vit, dan PMT yang diberi</p> <p>e. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 09 oktober 2022</p>
---	---	-----------------	--	---	---

8	Minggu 09 Oktober 2022 pukul 10.00 wita di rumah klien gowa	Kunjungan delapan	<p>Ds: ibu mengatakan nafsu makan membaik, polamakan teratur, sudah tidak mengalami cemas</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik</p> <p>b. TB:156BB:50kgTD: 110/80 mmHg</p> <p>c. Pada pemeriksaan fisik pada mata konjungtiva merah muda, TFU 3 jari diatas pusat 29 cm</p> <p>d. Pada pemeriksaan IMT dalam batas normal 20,5</p> <p>a. Pada pemeriksaan LILA 23,5cm dalam batas normal</p>	<p>1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaannya normal dan janin baik</p> <p>2. Menganjurkan untuk mempertahankan pola makan dengan makan yang lebih teratur, dan menambahkan makanan selingan atau cemilan yang ibu sukai</p> <p>3. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan kandungan makanan yang bergizi seimbang serta personal hygiene, istirahat yang cukup, memberikan dukungan psikologis pada ibu.</p> <p>4. Menganjurkan ibu untuk memngonsumsi tablet FE, vit B com, vit C, kalk, dan PMT</p>	<p>a. Ibu mengerti dan merasa senang dengan keadaannya</p> <p>b. Ada peningkatan berat badan, IMT dan LILA</p> <p>c. Menganjurkan ibu untuk tetap meminum obat, vit, dan PMT yang diberikan.</p>
---	---	-------------------	--	---	--

Daftar Menu Makanan (*Meal Plan*)


Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
29/08/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur Tempe Susu hamil Air putih	1 porsi 2 butir 4 potong 1 gelas 1 gelas	200 kkal 100 kkal 160 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur tumis (sawi,buncis) Ikan Tumis tempe tahu Air putih	2 porsi 2sendok 2 potong 8 potong 2 gelas	350 kkal 75 kkal 50 kkal 320 kkal 440 ml
	Malam	19:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda)	2 porsi 3 gelas	350 kkal 150 kkal

			Ikan lele	1 ekor	150 kkal
			Telur bebek asin	1 butir	75 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah pisang raja	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2470



Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
01/09/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur Ikan pindang Tahu Susu hamil Air	1 porsi 1 butir 1potong 4 potong 1 gelas 1 gelas	200 kkal 50 kkal 50 kkal 160 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda) Telur Ikan goreng Tumis tempe tahu Air putih	2 porsi 1gelas 1 butir 3 potong 8 potong 1 gelas	350 kkal 100 kkal 50 kkal 150 kkal 320 kkal 220 ml
	malam	19:30	Nasi putih	2 porsi	350 kkal

			Sayur (bayam merah,jagung muda)	2 gelas	150 kkal
			Udang	5 ekor	50 kkal
			Ikan	2 potong	100 kkal
			Telur bebek asin	1 butir	75 kkal
			Air putih	2 gelas	440 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah pisang ambon	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	2 gelas	440 ml
Jumlah					2645



Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	kcal
05/09/2022	Pagi	07:30	Nasi Telur Roti Susu hamil Air	1 porsi 1 buah 3 iris 1 gelas 1 gelas	200 kkal 75 kkal 175 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi Sayur tumis kangkung dan toge Ikan Tahu Air putih	2 porsi 1 gelas 2 potong 4 potong 2 gelas	350 kka 100 kkal 100 kkal 160 kkal 440 ml
	malam	19:30	Nasi putih Sayur (bayam, labu siam, jagung) Ikan bolu	2 sendok 2 gelas 1 ekor	350 kkal 150 kkal 110 kkal

			Telur	1 butir	50 kkal
			Air putih	2 gelas	440 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Papaya	1x3 buah	3x150kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2610



Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
12/09/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur Ikan pindang Tahu Susu hamil Air	2 porsi 8 biji 5 ekor 4 potong 1 gelas 1 gelas	200 kkal 100 kkal 75 kkal 160 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda) Tempe tahu Ikan goreng Air putih	2 porsi 1 gelas 4 potong 2 potong 2 gelas	350 kkal 100 kkal 160 kkal 100 kkal 440 ml
	malam	19:30	Nasi putih Tumis kangkung, toge	2 porsi 2 gelas	350 kkal 100 kkal

			Ikan bolu	2 ekor	220 kkal
			Tahu	4 potong	160 kkal
			Kuning telur	2 butir	50 kkal
			Air putih	2 gelas	440 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah pisang ambon	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2615

Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
19/09/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur bebek Ikan Tahu Susu hamil Roti Air putih	1 porsi 1 buah 2 potong 1 potong 1 gelas 3 iris 1 gelas	200 kkal 155 kkal 100 kkal 80 kkal 150 kkal 175 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur (bayam merah, jagung muda) Ikan Tempe Air putih	2 porsi 1 porsi 1 potong 4 potong 2 gelas	350 kkal 100 kkal 100 kkal 160 kkal 440 ml
	malam	19:30	Nasi putih	2 porsi	350 kkal

			Sayur (bayam merah,jagung muda)	1 gelas	100 kkal
			Tahu	2 potong	80 kkal
			Ikan bolu	1 ekor	110 kkal
			Telur puyuh	6 butir	100 kkal
			Air putih	1 gelas	220ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah semangka	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2650



Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
26/09/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur Ayam Sosih Susu hamil Air	2 porsi 1 buah 1 potong 1 potong 1 gelas 1 gelah	200 kkal 75 kkal 50 kkal 300 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur bayam Ikan Kuning telur Air putih	2 porsi 3 ½ sendok 2 potong 2 butir 2 gelas	350 kkal 150 kkal 100 kkal 150 kkal 440 ml
	malam	19:30	Nasi putih Sayur kangkung buncis, toge	2 porsi 3 gelas	350 kkal 150 kkal

			Tempe	4 potong	160 kkal
			Udang	5 ekor	50 kkal
			Telur	1 butir	75 kkal
			Air putih	1 gelas	220ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah pisang ambon	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2650


Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
30/09/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Telur bebek Tahu Susu hamil Air	1 porsi 1 butir 4 potong 1 gelas 1 gelas	200 kkal 155 kkal 160 kkal 150 kkal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda) Telur bebek Ikan goreng Sosis Air putih	2 porsi 1 gelas 1 butir 2 potong 1 potong 2 gelas	350 kkal 100 kkal 155 kkal 100 kkal 300 kkal 440 ml
	Malam	19:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda)	2 porsi 1 gelas	350 kkal 100 kkal

			Udang	5 potong	50 kkal
			Ikan	1 potong	50 kkal
			Tempe	4 potong	160 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah pisang ambon	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2720



Tanggal	Jam		Nama masakan	Urt	Kkal
09/10/2022	Pagi	07:30	Nasi putih Ikan Tahu Telur bebek Susu hamil Air	1 porsi 2 potong 4 potong 1 butir 1 gelas 1 gelas	200 kkal 100 kkal 160 kkal 155 kkal 150 kal 220 ml
	Siang	12:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda) Bubur kacang hijau Tempe Air putih	2 porsi 1 gelas 2 gelas 4 potong 1 gelas	350 kkal 100 kkal 440 kkal 160 kkal 220 ml
	malam	19:30	Nasi putih Sayur (bayam merah,jagung muda)	2 porsi 1 gelas	350 kkal 100 kkal

			Tahu	2 potong	80 kkal
			Telur ayam	1 butir	50 kkal
			Air putih	2 gelas	440 ml
	Selingan		Biscuit PMT	2 keping	2x95 kkal
			Buah semangka	1x3 buah	150 kkal
			Air putih	1 gelas	220 ml
Jumlah					2735



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membandingkan antara konsep dasar dan tinjauan kasus dalam penerapan proses Manajemen Asuhan Kebidanan *Antenatal* berkelanjutan pada Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis yang dilakukan di PMB Hj. Nuryati tahun 2022.

Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu: langkah I pengumpulan data/Analisa data dasar, langkah II identifikasi diagnosa/masah aktual, langkah III identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV tindakan *emergency*/kolaborasi, langkah V rencana tindakan (merencanakan asuhn menyeluruh), langkah VI implementasi (melaksanakan perencanaan dan piñatalaksanaan), langkah VII evaluasi. Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut:

1. Langkah I Pengumpulan Data/Analisa Data Dasar

Pada langkah pertama ini, berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang.

Pengumpulan data di mulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dapat di kumpulkan dari berbagai sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat ekonomis

yang disebut sebagai sumber primer. Sumber alternative atau sumber data sekunder adalah data yang sudah ada.

Dalam tahapan pengakajian, penulis tidak mendapat hambatan. Hal ini dapat dilihat dari respon ibu yang dapat menerima kehadiran penulis saat pengumpulan data dan informasi dan menerima anjuran serta saran yang diberikan oleh penulis maupun tenaga medis lainnya dalam memberikan asuhan kebidanan.

Dalam pengkajian data subjektif pada Ny "E" usia 21 tahun, G1P0A0, datang ke PMB Hj. Nuryati Gowa pada tanggal 29 Agustus 2022. Dari hasil anamnesa didapatkan ibu mengatakan merasakan pusing serta nafsu makan berkurang, ibu mengatakan HPHT tanggal 10 februari 2022, ibu mengatakan usia kehamilannya ± 7 bulan, ibu mengatakan pergerakan janinnya kuat pada kuadran kanan perut ibu, serta ibu tiak pernah merasakan nyeriperut yang hebat, ibu mengatakan BB sebelum hamil yaitu 40 kg, ibu mengatakan melakukan kunjungan Antenatal sebanyak 4 kali dan telah mendapatkan suntik tetanus Toksoit sebanyak 2 kali di PMB. Diabetes mellitus, dan penyakit menular lainnya, pasien juga tidak memiliki riwayat alergi pada makanan, minuman maupun obat-obatan.

Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi jenis apapun, pasien tdk pernah mengalami penyakit yang serius dan tidak pernah dirawat di rumah sakit atau puskesmas, sebelum hamil frekuensi makan ibu teratur, tetapi ibu sering mengonsumsi makanan siap saji seperti bakso, pangsit, mie instan, dan selama hamil polamakan ibu kurang baik, pasien tidak makan dgn teratur, bahkan hanya makan 1-2 kali sehari, istirahat pasien kurang baik dikarenakan terlalu sibuk dnngan pekerjaannya.

Dalam pengkajian data Objektif pada Ny"E" ditemukan hasil pemeriksaan umum ibu baik, TD: 90/60 mmHg, N: 86x/menit, S: 36,8°C, P: 22x/menit, BB 44 kg, LILA 23cm, IMT 18,0. Pada pemeriksaan fisik konjungtiva pucat, tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak hiperpigmentasi areola mammae, pada pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu: TFU 2 jari di atas pusat, teraba bokong pada fundus dan tidak sesuai usia kehamilan 28 minggu 3 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP) pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145x/menit janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang hasil laboratorium Hemoglobin: 11 gr%, Albumin: Negatif, Reduksi: Negatif. Hasil usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagel, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 28 minggu 3 hari.

Pada pemeriksaan abdomen tampak linea nigra dan striae livide yang sering ditemukan pada kehamilan pertama, terdapatnya denyut jantung janin dan terabanya bagian-bagian janin pada saat dipalpasi merupakan salah satu dari tanda-tanda pasti kehamilan (Prawirohardjo 2014: 179). Pada auskultasi terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 146x/menit janin intra uterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hemoglobin: 11gr%, Albumin: Negatif, Reduksi: Negatif

Pada pemeriksaan Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri dilakukan pada uterus tidak sedang berkontraksi, dengan posisi ibu berbaring setengah duduk, lalu mulai melakukan pengukuran dengan menempelkan ujung pita dari tepi atas

simfisis pubis dan puncak fundus uteri, hal tersebut dilakukan untuk menilai tinggi fundus uteri apakah tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk menentukan presentase janin dilakukan dengan mempertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut, jika dalam perabaan pada fundus uteri bulat, keras dan melenting maka dapat dilakukan sebagai presentasi kepala karena kepala janin berada pada bagian fundus, atau jika pada bagian fundus uteri teraba lunak, kurang melenting, dapat dikatakan presentasi bokong.

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simfisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan (per lima), bagian diatas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP).

Pada kehamilan, janin dikatakan tunggal ketika pembesaran perut sesuai usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu bagian melenting/kepala dan satu bagian keras seperti papan/punggung, pada auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu. Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantung teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, kemudian tanda janin hidup juga dapat dilihat pada pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh.

Kekurangan Energi Kronis secara sfesifik di sebabkan oleh ketidak seimbangan antara asuhan untuk pememnuhan kebutuhan yang di perlukan tubuh

dengan pengeluaran pada tubuh seseorang yang berlangsung lama, resiko KEK dapat di tentukan dengan melakukan pengukuran LiLA dibawah batas normal 23,5 cm.

Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan disebabkan oleh beberapa factor yaitu kebanyakan dipengaruhi oleh pola konsumsi makan yang kurang baik dan kurangnya pengetahuan mengenai Gizi serta usia ibu yang masih muda. Pola konsumsi selama hamil sangat mempengaruhi kebutuhan zat gizi selama hamil, oleh karena itu pada masa kehamilan asupan gizi yang diperlukan juga meningkat, untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmaniar A, dkk pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pola konsumsi makanan adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan kejadian Kekurangan Energi Kronis.

Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, factor usia ibu yang masih muda. Faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi dapat dilihat dari pola konsumsi ibu yang kurang baik serta frekuensi makan tidak sesuai kebutuhan Ny "E" maka denan frekuensi 1-2 kali perharinya selama kehamilan jenis lauk pauk: nasi, sayur dan lauk bahkan sesekali makan makanan siap saji seperti bakso, pangsit dan mie instan, sedangkan pada faktor usia ibu yang masih muda juga berpengaruh karena pada usia muda ibu juga memerlukan asupan gizi yang cukup untuk perkembangan dirinya dan juga untuk perkembangan jainnya. Jadi penyebab dari Kekurangan Energi Kronik yang dialami oleh Ny"E" yaitu karena faktor kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi, polamakan yang tidak teratur dan faktor usia ibu

2. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi data yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakkan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami Kekurangan Energi Kronik. Pada setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan dari setiap data diagnosis dari beberapa sumber referensi yang satu dengan yang lainnya.

Hasil pengkajian pada Ny "E" didapatkan data subjektif dan objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosa ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik. Data subjektif yang didapatkan yaitu: ibu mengatakan pusing serta nafsu makan berkurang. Kehamilan ibu adalah kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran, ibu mengatakan usia kehamilannya 7 bulan.

Riwayat kesehatan yang lalu Ny "E" tidak pernah mengalami penyakit yang serius dan dirawat di Rumah sakit ataupun di Puskesmas. Pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu tinggi fundus uteri (TFU) 2 jari di atas pusat 24 cm, tidak sesuai usia kehamilan 28 minggu 3 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang bergerak atas panggul (BAP), terdengar denyut jantung janin dengan frekuensi 145 x/menit, tunggal dan hidup. Pada pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, konjungtiva pucat, LiLA 23cm, IMT 18,0 dan pemeriksaan laboratorium, didapatkan Hb 11 gr%, albumin negatif, reduksi negatif.

Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa Kekurangan Energi kronis dalam kehamilan yaitu: LiLA kurang dari 23,5 cm, konjungtiva pucat, tekanan darah kurang dari 100 mmHg, Hb kurang dari 11 gr%, nafsu makan berkurang, lemas dan

mata bekunang kunang. Kemudian pada klasifikasi Kekurangan Energi Kronik menggunakan dasar Indeks Massa Tubuh (IMT) krang dari normal 18,5.

Untuk menilai penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada diatas simfisis dan dapat diukur dnegan lima jari tangan (per limaian), bagian diatas simfisis adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul (PAP) dan sisanya telah memasuki pintu atas panggul (PAP).

Di dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu. Adanya gerakan janin dan denyut jantung janin (DJJ) merupakan tanda bahwa janin hidup. Janin yang dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali per menit, selain itu tanda janin hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat oleh ibu satu kali per jam atau lebih dari 10 kali per hari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh.

Berdasarkan uraian di atas maka diagnosis pada kasus Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan tersebut adalah G1P0A0, gestasi 28 minggu 3 hari, presentase kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan. Demikian penerapan tinjauan pustaka pada kasus Ny "E" secara garis besar tampak adanya persamaan antara teori dengan diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan memberikan tindakan selanjutnya.

3. Langkah III. Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis atau masalah yang sudah teridentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap diri untuk mencegah diagnosa/masalah potensial terjadi.

Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman. Dalam mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan terjadi pada Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan yaitu perdarahan, kenaikan berat badan tidak normal, pertumbuhan janin terhambat yang mengakibatkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), cacat bawaan dan bahkan kematian janin.

LiLA adalah antropometri yang dapat menggambarkan keadaan status gizi ibu hamil dan untuk mengetahui resiko (KEK) atau gizi kurang. Dengan LiLA yang kurang beresiko untuk melahirkan berat badan bayi lahir rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KEK pada batas LiLA 23,5 cm belum merupakan resiko melahirkan berat badan lahir rendah (BBLR), sedangkan ibu hamil dengan KEK pada batas LiLA kurang dari 23,5 mempunyai resiko 2 kali untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dibandingkan dengan ibu yang mempunyai lingkaran lengan atas (LiLA) lebih dari 23,5cm dan juga persalinan dapat terjadi sebelum waktunya (premature).

Adapun masalah potensial yang dapat terjadi pada ibu yaitu: anemia, pada proses persalinan sendiri dapat menimbulkan persalinan sulit dan lama dikarenakan

kurangnya asupan pada ibu hamil sehingga saat persalinan berlangsung ibu tidak memiliki tenaga untuk meneran. Ibu hamil memerlukan makanan yang sehat untuk memenuhi asupannya selama hamil dan untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya.

Kekurangan Energi Kronis dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah pola makan yang kurang baik, sehingga ibu hamil dengan KEK sering ditemukan pada ibu yang tidak mengalami penambahan berat badan yang normal dalam kehamilan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik, Marianita, Rindu pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pola makan terhadap kenaikan berat badan ibu hamil dengan Kekurangan Energi kronis.

4. Langkah IV. Tindakan Emergensi Dan Kolaborasi

Pada langkah ini, yang dilakukan oleh bidan adalah mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditindaki bersama, Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat pengelolaan ibu hamil, ibu bersalia, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera.

Pada penjelasan di atas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosisi/masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan darurat /segera yang harus dirumuskan untuk

menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini, termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ny “E” tidak ada indikasi yang memerlukan tindakan segera dan cepat dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Akan tetapi pada kasus Ny “E” dilakukan tindakan kolaborasi dengan dokter ahli gizi.

5. Langkah V Rencana Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Rencana ashan menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah dibutuhkan penyuluhan, konseling, apakah perlu merujuk klien bila ada masalah yang berkaitan dengan social ekonomi, cultural atau masalah psikologis.

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas pada ibu bersalin yang diakibatkan karena adanya Kekurangan energi Kronis dalam kehamilan Penatalaksanaan pada kasus Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan yaitu dilakukan secara konsisten dan sistemik menggunakan praktik pencegahan dengan memberikan asuhan secara rutin sampai pola makan dan jenis makana yang dikonsumsi ibu membaik.

Rencana asuhan pada kasus Ny"E" disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dari kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pada pasien yaitu Ny"E" datang dengan keluhan pusing dan nafsu makan yang kurang pada tanggal 29 Agustus 2022 pada pukul 09.00 wita. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran komposmentis, keadaan umum ibu baik, TD: 90/60 mmHg, N: x/m77enit, S: 36,8°C, P: 20x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas, kedua konjungtiva pucat, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid dan vena jugularis, payudara tampak simetris, tampak *hiperpigmentasi areola mammae*.

Pada pemeriksaan abdomen didapatkan kesan yaitu: TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm teraba bokong pada fundus dan tidak sesuai usia kehamilan 28 minggu 3 hari, punggung kiri, presentasi kepala, situs memanjang, bergerak atas panggul (BAP), pada Auskultasi terdengar DJJ dengan frekuensi 145x/menit janin intrauterin, tunggal dan hidup, pada pemeriksaan penunjang didapatkan hasil laboratorium Hemoglobin: 11 gr%, Albumin: Negatif, Reduksi: negatif.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu : sapa ibu dan keluarga untuk meningkatkan rasa percaya sehingga ibu menjadi lebih koperatif dengan petugas, beritahu hasil pemeriksaan, menganjurkan keluarga untuk memberikan *support* dan semangat kepada ibu, memberikan KIE tentang istirahat yang cukup, menganjurkan ibu memperbaiki pola makan dan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan menjaga personal hygiene dalam kehamilan, Minta persetujuan ibu dan keluarga untuk melakukan informed consent, laksanakan tindakan sesuai dengan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di PMB Hj. Nuryati Gowa, dan

memberikan terapi obat-obatan seperti Fe (1x1), Vit.B com, Vit C, (3x1) dan Kalk (1x1).

Rencana tindakan pada kasus Ny“E” adalah melakukan pemantauan pola konsumsi makanan ibu yang dilakukan selama 6 minggu yang dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022. Rencana asuhan yang diberikan yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu untuk memastikan pertambahan/penurunan tekanan darah pada ibu, menjelaskan pada ibu penyebab terjadinya Kekurangan Energi Kronis, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dengan makan makanan yang bergizi, serta menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola tidur di mana ibu harus lebih banyak beristirahat dan menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sesuai dengan instruksi.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

6. Langkah VI Implementasi Asuhan Kebidanan

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan penatalaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana).

Pada studi kasus Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti dengan menyampaikan hasil pemeriksaan pada pasien dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bertanya apabila ada hal yang tidak ia mengerti, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga mengerti dengan keadaannya, memberikan dukungan psikologis kepada ibu, memberikan pengetahuan kepada ibu tentang pentingnya *Health Education* selama kehamilan seperti pada pola istirahat yang cukup, pola makan yang bergizi seimbang dalam kehamilan terutama dengan menghindari makanan yang banyak mengandung bahan pengawet, serta mengkonsumsi obat sesuai jadwal yang telah diberikan.

Pemantauan yang dilakukan dilakukan di PMB Hj. Nuryati Gowa pada tanggal 29 Agustus 2022, yaitu ibu merasakan pusing dan nafsu makan yang kurang, keadaan umum ibu baik, pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan hasil tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 77 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu 36,8 dan berat badan 44 kg, LILA 22,5, IMT 18,0. Pada pemeriksaan TFU 2 jari di atas pusat, 24 cm, teraba bokong dengan usia kehamilan 28 minggu 3 hari, dengan presentasi kepala, punggung kiri dengan DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 146x/menit, teratur

Tindakan yang dilakukan dalam rencana tindakan pada pemantauan tanggal 29 Agustus 2022 yaitu dengan menjelaskan penyebab rasa pusing pada ibu, menganjurkan ibu untuk memperbaiki pola makan dan istirahat serta tidak telalu

banyak pikiran, menjelaskan pada ibu tentang 9 tanda bahaya kehamilan, menganjurkan ibu untuk tetap rutin melakukan kunjungan *Antenatal* agar kesehatan ibu dan janinnya dapat dipantau dengan baik, memberikan kepada ibu obat penambah darah (1x1) Vit. B com (3x1), Vit C (1x1) dan Kalk (1x1) dan PMT berupa biskuit

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 01 September 2022, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu untuk memastikan tekanan darah ibu bertambah/berkurang dan pada hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 90/60, nadi 77x/menit, pernapasan 20x/menit dan suhu 36,8°C tekanan berat badan 44 kg, LILA 22,5cm, IMT 18,0, dengan pemeriksaan fisik konjungtiva pucat, dan pusing yang dirasakan mulai berkurang akan tetapi nafsu makan ibu masih berkurang. Setelah dilakukan pemeriksaan menganjurkan ibu untuk tetap mengatur pola makan dan pola istirahatnya agar tekanan darah ibu bisa normal, serta menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan intruksi dan tetap mengkonsumsi biskuit yang diberikan sebagai makanan tambahan.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di rumah ibu pada tanggal 05 September 2022, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu dan pada hasil pemeriksaan di dapatkan hasil tekanan darah sudah naik yaitu 100/70 mmHg, nadi 84x/menit, pernapasan 20x/menit dan suhu 36,5°C , berat badan 44 kg, LILA 22,5cm, IMT 18,0 konjungtiva merah muda. Ibu dalam keadaan baik dan ibu bersedia memperbaiki pola konsumsi makan ibu

dengan tetap mengonsumsi makanan tambahan yang diberikan dan tetap mengonsumsi obat sesuai jadwal yang telah diberikan.

Pemantauan selanjutnya yaitu pemantauan yang dilakukan di rumah klien pada tanggal 12 September 2022, pemantauan ini dilakukan dengan mengobservasi kembali tanda-tanda vital ibu dan pada hasil pemeriksaan di dapatkan hasil tekanan darah yaitu 100/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,5°C, berat badan bertambah 45 kg, LILA 22,5, IMT 18,49, konjungtiva merah muda keadaan ibu dalam keadaan baik, ibu sudah tidak mengalami pusing dan nafsu makan ibu mulai membaik. Menganjurkan kembali ibu untuk mengonsumsi makan yang mengandung karbohidrat dan protein tinggi, serta mengurangi makanan yang banyak mengandung pengawet dan makan dengan lebih teratur.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 19 September 2022 yang dilakukan di rumah ibu. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,5°C, berat badan bertambah 47 kg, LILA bertambah 23cm, IMT 19,3. menganjurkan ibu untuk terus mempertahankan pola makan dan mengonsumsi makan yang bergizi seimbang.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 September 2022 yang dilakukan di rumah klien. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,8°C, berat badan bertambah 48 kg, LILA 23cm, IMT 19,72. Menganjurkan ibu untuk terus memperbaiki pola makan dengan

mengonsumsi makan yang bergizi seimbang dan tetap mengonsumsi makanan tambahan dan obat yang diberikan.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 30 September 2022 yang dilakukan di PMB Hj Nuryati Gowa. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 22x/menit, dan suhu 36,8°C, berat badan 48 kg, LILA 23 cm, IMT 19,7. Pada pemeriksaan TFU 3 jari di atas pusat, 28 cm, teraba bokong dengan usia kehamilan 33 minggu dengan presentasi kepala, punggung kiri dengan DJJ terdengar kuat dan jelas pada kuadran kiri bawah perut ibu dengan frekuensi 148x/menit, teratur. Menganjurkan ibu untuk terus memperbaiki pola makan dengan mengonsumsi makan yang bergizi seimbang dan tetap mengonsumsi makanan tambahan dan obat yang diberikan dan selalu berdoa kepada Allah Swt agar diberi kesehatan dan juga pada janinya dan selalu berserah diri kepada nya.

Pemantauan selanjutnya dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2022 yang dilakukan di rumah klien. Dalam pemantauan ini didapat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80x/menit, pernapasan 20x/menit, dan suhu 36,8°C, berat badan 50 kg, LILA 23,5 cm, IMT 20,5. Menganjurkan ibu untuk terus mempertahankan pola makan dengan mengonsumsi makan yang bergizi seimbang dan tetap mengonsumsi makanan tambahan dan obat yang diberikan.

Setelah dilakukan pemantauan selama 6 minggu, meminta ibu untuk tetap mempertahankan pola makan dan pola istirahat yang sekarang, memberikan KIE pada ibu tentang persiapan dan rencana persalinan, menganjurkan pada ibu dan

keluarga untuk senangtiasa berdoa kepada Allah SWT agar kehamilan sekarang dan persalinan ibu nantinya akan berlangsung dengan normal dan lancar tanpa ada komplikasi yang dapat terjadi.

Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

7. Langkah VII Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan Evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedang sebagian belum efektif.

Tahap merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan, pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil anamnesis, pemeriksaan fisik diagnosa yang ditegakkan pada Ny "E" adalah Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan. Rencana asuhan yang telah disusun berorientasi sesuai dengan kebutuhan pasien dan dilaksanakan secara menyeluruh. Adanya kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan sehingga tidak ditemukan hambatan pada saat pelaksanaan asuhan.

Pola konsumsi dan jenis makanan yang bergizi seimbang dan istirahat yang cukup merupakan penanganan sederhana yang dilakukan dalam kasus Kekurangan

Energi Kronis dalam kehamilan, dimana pola makan yang tidak teratur dan banyak mengkonsumsi makanan junk food atau makanan siap saji yang mengandung banyak pengawet, sehingga dapat membahayakan ibu maupun janinnya. Pemberian terapi obat-obatan yang berupa FE, Vit. B com, Vit C dan Kalk yang diberikan sesuai dengan intruksi dan pemberian makanan tambahan berupa biskuit PMT juga dapat membantu menaikkan tekanan darah dan berat badan ibu apabila dikonsumsi dengan teratur. Selain pemberian obat dan PMT ibu dan keluarga diberikan dukungan dengan menganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap bersabar dan meyakinkan ibu bahwa kejadian yang dialami adalah kehendak Allah swt. Serta dilakukan kolaborasi dengan dokter ahli kandungan dalam melakukan pemeriksaan USG untuk memastikan bahwa keadaan janin dalam keadaan baik dan sehat serta tidak ada kelainan. Selama pemantauan berlangsung, ibu telah diberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan ibu dan mendapatkan pendampingan oleh keluarga maupun bidan. Keadaan psikososial ibu baik ditandai dengan tanda-tanda vital yang sudah kembali normal dan meminta ibu untuk tetap berserah diri kepada Allah swt agar kehamilannya tetap dalam keadaan sehat sampai masa persalinannya tiba.

Maka dapat disimpulkan bahwa mulai dari pemantauan pertama sampai pemantauan terakhir, semuanya berlangsung dengan baik, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan.

8. Pendokumentasian

Pendokumentasian pada kasus Ny"E" ini dimulai pada kontak pertama pada kunjungan *antenatal* di PMB Hj Nuryati Gowa pada tanggal 29 Agustus 2022. Telah dilakukan pengumpulan data subjektif dan objektif dan berdasarkan data ditetapkan diagnosis. Berdasarkan diagnosa tersebut, ditentukan diagnosa potensial yang akan timbul. Pada kasus Ny"E" tidak didapatkan adanya data untuk tindakan emergensi. Pada kasus Ny"E", implementasi telah dilakukan berdasarkan semua intervensi yang telah ditetapkan. Intervensi dilakukan mulai dari kunjungan pertama dan dilanjutkan 7 kontak berikutnya. Intervensi yang dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan pada ibu dan pertumbuhan janin terhambat (PJT), cacat bawaan, BBLR dan kematian janin. Evaluasi dilakukan pada kontak kedelapan, keluhan yang sering dirasakan telah menghilang, pemeriksaan fisik normal, tekanan darah normal, dan Hb normal.

Hasil dari kasus yang dialami Ny"E" dengan Kekurangan Energi Kronis dalam kehamilan di atasi dengan membantu ibu untuk memperbaiki pola makan dan jenis makanan yang di konsumsi, pola istirahatnya dan menganjurkan ibu untuk tidak terlalu stress. Rasa pusing tertasi dan dan nafsu makan ibu mulai membaik tanda-tanda vital ibu kembali mambaik, serta ibu tampak sudah tenang.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan selama 6 minggu yaitu di PMB Hj Nuryati Gowa 2 kali dan 6 kali kunjungan di Rumah klien pada Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis di PMB Hj Nuryati Gowa sehingga pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Asuhan kebidanan pada Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesa riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan USG dan keterangan tambahan yang menyangkut atau berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa/masalah aktual yang ditegakkan pada Ny “R” dengan Kekurangan energi Kronis di PMB Hj Nuryati dengan pengumpulan data seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan USG maka ditetapkan diagnosa kebidanan pada Ny “R” dengan Kekurangan Energi Kronis pada masa kehamilan.
3. Perumusan masalah potensial pada Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis berpotensi terjadi perdarahan pada ibu dan pertumbuhan janin terhambat (PJT), Cacat bawaan, BBLR dan kematian janin. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila ditangani lebih cepat.
4. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera, namun diperlukan kolaborasi dengan ahli Gizi pada Ny “E” dengan Kekurangan Energi Kronis di PMB Hj. Nuryati Gowa dengan hasil bahwa kasus ini tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.

5. Hasil rencana tindakan asuhan kebidanan telah disusun pada Ny "E" dengan Kekurangan Energi Kronis di PMB Hj. Nuryati Gowa dengan hasil susunan asuhan berdasarkan diagnosa aktual atau masalah potensial yang dapat terjadi.
6. Asuhan telah diberikan pada Ny "E" dengan Kekurangan Energi Kronis di PMB Hj. Nuryati Gowa dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan.
7. Hasil evaluasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "E" dengan Kekurangan Energi Kronis di PMB Hj. Nuryati Gowa dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan berhasil dengan ditandai perubahan nafsu makan, yang semula kurang menjadi membaik, pola makan lebih teratur, tekanan darah normal, LILA normal dan hemoglobin normal.


B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Bagi ibu
 - a. Diharapkan agar ibu menjaga pola makan setiap hari dan jenis makanan yang dikonsumsi.
 - b. Pentingnya ibu mengonsumsi obat yang diberikan sesuai dengan
2. Bagi Praktik Mandiri Bidan (PMB)
 - a. Petugas kesehatan dapat mengenali dan mendeteksi secara dini Kekurangan Energi Kronis.
 - b. Petugas kesehatan khususnya bidan perlu menjelaskan keadaan ibu kepada keluarga ibu kondisi yang dialami oleh ibu serta diharapkan memberikan dorongan moral pada keluarga.

3. Bagi instutusi pendidikan

- a. Agar menerapkan asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat metode ini sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang lebih profesional.
- b. Perlu adanya persamaan persepsi antara pendidikan dan petugas kesehatan dilahan praktek tentang penerapan asuhan kebidanan sebagai alat dalam pendekatan pemecahan masalah pada praktek sehari-hari sehingga meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bunga Astria Paramashanti, S.Gz., M. P. (2019). *Gizi bagi ibu dan anak : untuk mahasiswa kesehatan dan kalangan umum* (2019th ed.). 2019. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239743>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2021
- Chandradewi, A. (2015). Pengaruh Pemberian Makanan Tambahan terhadap Berat Badan Ibu Hamil KEK di Wilayah Kerja Puskesmas Labuan Lombok. *Jurnal Kesehatan Prima*, 9(1), 1391–1402.
- Chori elserah, Agus Murtana, Endang Sawitri, Uus selia oktaviani. *Faktor Penyebab Kekurangan energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil Study Literature*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten tahun 2021.
- Dieny, F. F., Maadi, A. K., Wijayanti, H. S., Tsani, A. F. A., & Nissa, C. (2019). Asupan Zat Gizi Dan Kadar Hemoglobin Wanita Prakonsepsi Di Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal of Human Nutrition*, 6(2), 70–83. <https://doi.org/10.21776/ub.ijhn.2019.006.02.2>
- Riski Sahid, Darmawansyih. *Manajemen asuhan Kebidanan Pada NY"M" Dengan Perdarahan Poapartum Pada Tanggal 12 September s.d 25 Oktober Di RSUD Syekh Yusuf Gowa*. tahun (2020)
- Data Praktek Mandiri Bidan Hj, Nuryati Gowa, Tahun 2022
- Fatimah S.St, M. K., & Nuryaningsih S.ST, M. K. (2017). *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas. <c:/Users/ASUS/Downloads/Asuhan Kebidanan Kehamilan.pdf>
- Febriyeni, F. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronis Pada Ibu Hamil. *Human Care Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.32883/hcj.v2i3.78>
- Fissa Doroh. (2018). Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ny. VT di Puskesmas Sikumana Kecamatan Maulafa Periode 22 Mei sampai 09 Juni 2018. *Laporan Tugas Akhir*, 1–220. <http://repository.poltekeskupang.ac.id/id/eprint/s152>
- Holil M. Par'i, S., .K.M., M. K., Sugeng Wiyono, S.K.M., M. K., & titus Priyo Harjatmo, B.Sc., S.K.M., M. K. (2017). *Penilaian Status Gizi*. <https://id.scribd.com/document/376309306/PENILAIAN-STATUS-GIZI-FINAL-SC-pdf#>
- Kemenkes, R. (2018). Pedoman asuhan gizi puskesmas. *Pedoman Proses Asuhan Gizi Puskesmas*.

- Kemenkes RI. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru*.
- Mangalik, G., Koritelu, R. T., Amah, M. W., Junezar, R., Kbarek, O. P. I., & Widi, R. (2019). Program Pemberian Makanan Tambahan: Studi Kasus Pada Ibu Hamil Dengan Kurang Energi Kronis Di Puskesmas Cebongan Salatiga. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10(1), 111. <https://doi.org/10.26751/jikk.v10i1.537>
- Manik1, M., & Rindu2. (2017). *Faktor Yang Berpengaruh terhadap kenaikan berat badan Ibu Hamil dengan KEK pada Trimester III*. 16, 23–31.
- meriska cesia putri. (2017). *HUBUNGAN ASUPAN MAKAN DENGAN KEJADIAN KURANG ENERGI KRONIS (KEK) PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Skripsi) Oleh MERISKA CESIA PUTRI*. 1–74. [file:///C:/Users/Dewi/Desktop/Moodme/Jurnal/Hubungan Asupan Nutrisi Dengan Kejadian Kekurangan Energi Kronik.pdf](file:///C:/Users/Dewi/Desktop/Moodme/Jurnal/Hubungan%20Asupan%20Nutrisi%20Dengan%20Kejadian%20Kekurangan%20Energi%20Kronik.pdf)
- Nadya Nadya. (2013). *Kegawatdaruratan Neonatal Anak Dan Maternal (Panduan Praktis Mahasiswa Kebidanan)*. http://opac.uin-alauddin.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5534
- Nisa, L. S., Sandra, C., & Utami, S. (2018). *PENYEBAB KEJADIAN KEKURANGAN ENERGI KRONIS PUSKESMAS JELBUK JEMBER Factors of Chronic Energy Deficiency Incidence in High-Risk Pregnant Women and Utilization of Antenatal Care in Jelbuk Public Health Center Jember District*. 6(2), 136–142. <https://doi.org/10.20473/jaki.v6i2.2018.136-142>
- Nurmila, N. (2017). Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny “R” Dengan Kekurangan Energi Kronis Di Puskesmas Somba Opu Gowa Tahun 2017 Karya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13594/1/Nurmila_70400114030.pdf
- Olivia Anggraeny, A. D. A. (2017). *Gizi prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui/ penulis, Olivia Anggraeny, Ayuningtyas Dian Ariestiningsih (Cetakan pe)*. 2017.
- Prawirohardjo, S. (2016). *Ilmu kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2016. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1113172>
- Prita Muliarini. (2017). *Pola makan dan gaya hidup sehat selama kehamilan (Cet.1)*. <https://onsearch.id/Record/IOS13422.INLIS000000000013586>

- r. Siti Fathonah, M. K. (2016). *Gizi & Kesehatan untuk Ibu Hamil : Kajian Teori & Aplikasinya* (2016 (ed.); 2016th ed.). erlangga.
- Sagita, Y. D., Sanjaya², R., 3, Y. D. F., & Maesaroh⁴, S. (2020). *Universitas Aisyah Pringsewu Journal Homepage* <http://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php?journal=Abdi>. 2(1), 1–6. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/Abdi/article/view/pengetahua> nsayur
- SamiatulMilah, A. (2018). Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Asupan Nutrisi Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Media Informasi*, 14(2), 95–109. <https://doi.org/10.37160/bmi.v14i2.211>
- Sri Widatiningsih, C. H. T. D. (2017). *Praktik terbaik asuhan kehamilan / Sri Widatiningsih, Christi Hinaya Tungga Dewi* (Edisi pert). Yogyakarta : Transmedika, 2017 2017, ©.
- Subriah, Safitr, I. D., Umar, S., & Djuhadiyah Saadong. (2021). *Kurang energi kronis berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil*. 30–34. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/383-61-1752-1-10-20210806 \(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/383-61-1752-1-10-20210806%20(1).pdf)
- Sutanto, Andina Vita, A. K. S., & Yuni Fitriana, S.ST., M. H. K. (2018). *Asuhan pada Kehamilan : Panduan lengkap Asuhan selama kehamilan bagi Praktisi Kebidanan*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1134412>
- Swathma, D., Lestari, H., & Teguh, R. (2018). Riwayat Imunisasi Dasar Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-36 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Kandai Kota Kendari. *JIMKesmas*, 1–10.
- Wagiyo, N., & Putrono. (2016). *Asuhan Keperawatan Antenatal, Intranatal dan Bayi Baru Lahir Fisiologi dan patologis*. <https://books.google.co.id/books?id=LCpLDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

LAMPIRAN :


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221450 Gowa
Website: fak.um-alauddin.ac.id

Nomor : B-~~4086~~ Un.05-FKIK/PP.00.9/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penhal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 10 Agustus 2022

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Syahrani
N I M : 70400119022
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : Dg. Tata Permai

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :


"Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik di Praktek Mandiri Bidan Hj. Nuryati Gowa."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdanti, S.SiT., M.Keb.
2. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja PMB Hj. Nuryati Gowa terhitung mulai tanggal 15 Agustus – 23 September 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fki.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3659/Un.06/FKIK/PP.00.9/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penhal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 9 Agustus 2022

Yth. Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Putri Syahrani
N I M : 70400119022
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Hertasning

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan Pada Ibu Hamil Dengan Kekurangan Energi Kronik di Praktek Mandiri Bidan Hj. Nuryati Gowa Tahun 2022."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Firdayanti, S.ST.,M.Keb.
2. Ferawati Taherdng, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastir Handayany

Tembusan :
-Dekan FKIK UINAM



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 8217/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth,
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4084/Un.06-FKIK/PP.00.9/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : PUTRI SYAHRANI
Nomor Pokok : 70400118022
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (D3)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA IBU HAMIL DENGAN KEKURANGAN ENERGI KRONIK DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN HJ. NURYATI GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 25 Agustus s/d 25 September 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar

Revisi 01 tanggal 25 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SUTKAF S. LATIEF, M.M.

Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010



Tembusan Yth


1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Portinggal*.

Nomor: 8217/S.01/PTSP/2022

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20220825385753



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PRATEK MANDIRI BIDAN HJ.NURYATI,S.ST

Jalan Swadaya, Tompobatang,Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa,Telp.085299133713,Pos :92117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

Nama : Putri syahrani
Nim : 70400119022
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melakukan penelitian di PMB HJ.Nuryati,S.ST Kabupaten Gowa dengan judul
"Manajemen Asuhan Kebidanan berkelanjutan Pada ibu hamil Dengan kekurangan
energi kronik di PMB HJ.Nuryati Kabupaten Gowa " pada tanggal 29 Agustus 2022 S/D 09
Oktober 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Swadaya, 24 September 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

HJ.NURYATI,S.ST

NIP. 196910241991032008

Surat Keterangan Selesai Penelitian di PMB HJ.Nuryati Gowa
(24 September 2022)

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Putri Syahrani
NIM : 70400119022
TTL : Polewali, 11 Agustus 2001
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dg tata 3 lr.3 no.c6 Kec.buntusu
Kab. Makassar

B. Identitas Orang Tua

Ayah : Beny
Ibu : Herawati

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 167 PINRANG : 2007-2012
2. MTS DDI PALIRANG : 2013-2016
3. SMK 4 PINRANG : 2017-2019
4. UIN Alauddin Makassar : 2019- 2023