

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”
DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA
MAKASSAR TANGGAL 04 – 24 AGUSTUS
TAHUN 2022**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli
Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

Oleh

**SULFIANA
Nim. 70400119030**

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfiana
Nim : 70400119030
Tempat/Tgl Lahir : Balanga, 22 Juli 2001
Jurusan : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Balanga Desa Belabori , Kec. Parangloe Kab. Gowa
Judul : Manajemen Asuhan Kebidana Post Natal Pada Ny “N”
Dengan Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar
Tanggal 04 – 24 Agustus Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar dan hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, Maret 2023

Penyusun

SULFIANA
70400119030

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH


Nama : Sufiana
Nim : 70400119030
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny "N" Dengan
Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 04
Agustus 2022 s/d 24 Agustus 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb
NIP : 19890116 20190 3 2009



Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb
NIP : 19870924 201903 2 012

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH


Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny ”N” Dengan Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-baraya Makassar Tanggal 04 Agustus Tahun 2022”**, yang disusun oleh **Sulfiana Nim 70400119030** Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 15 Maret 2023**, bertepatan dengan **Tanggal 22 Sya’ban 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 12 Juni 2023
22 Sya’ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SFT, M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR Al-Kaulza, S.ST, M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji 1	: dr. Miswani Mukani Syuhib, Sp.PA, M.Kes	(.....)
Penguji 2	: Dr. Hj. Sohrah, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan bernilai ibadah disisi-Nya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan akan kebenaran kepada seluruh umat manusia dimuka bumi terutama kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Post Natal Pada Ny “N” Dengan Bendungan ASI Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 04 – 24 Agustus Tahun 2022”** Karya Tulis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dijumpai dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap penyelesaian, namun berkat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengarahkan segala

kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.

2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, SP.A, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan seluruh staf administrasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S,ST.,M.keb selaku ketua Prodi Kebidanan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibunda Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S,ST.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Ibunda Ferawati Taherong, S,ST.,M.Keb selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing serta memberikan arahan yang sifatnya membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda dr Miswani Mukani, Sp.PA.,M.Kes selaku penguji I yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda Dr.Hj. Sohrah, M.Ag selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dibidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para Dosen dan seluruh Staf di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Subair dan Ibunda Yanisi yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik, membina penulis dengan ikhlas dan penuh pengorbanan serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Demikian pula kepada saudariku Sulfianti S.H dan juga kepada seluruh keluargaku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua.
10. Teman-teman seperjuanganku Ligamen angkatan 2019 serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
- Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, masukan ataupun kritikan yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Samata, Maret 2023

Penulis

SULFIANA
70400119030


DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas.....	9
1. Pengertian masa nifas	9
2. Tujuan asuhan masa nifas.....	10
3. Tahapan Masa Nifas.....	11
4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas.....	12
5. Perubahan- perubahan dalam masa nifas	13
6. Kebijakan program dalam masa nifas.....	18
7. Proses Adaptasi Psikologis Masa Nifas	20
B. Manajemen Laktasi	22
1. pengertian Laktasi	22
2. Anatomi dan fisiologi payudara	30
3. Fisiologi Laktasi	32
4. Gizi dalam ASI	36
C. Tinjauan khusus tentang bendungan ASI.....	41
1. Pengertian Bendungan ASI.....	41
2. Etiologi.....	41
3. Patofisiologi	43

4. Tanda dan Gejala.....	45
5. Prognosis	45
6. Diagnosis	45
7. Pencegahan.....	47
8. Penatalaksanaan.....	48
9. Manfaat pemberian ASI bagi bayi dan ibu	49
D. Tinjauan tentang proses kebidanan.....	50
1. Pengertian manajemen kebidanan.....	50
2. Tahapan dalam manajemen kebidanan.....	51
3. Pendokumentasian asuhan kebidanan.....	55
BAB III STUDI KASUS.....	58
A. Manajemen Asuha Kebidanan Dengan 7 Langkah Varney.....	58
B. Pendokumetasian Hasil Asuhan Kebidanan	73
BAB IV PEMBAHASAN.....	92
Langkah I : Identifikasi Data Dasar	92
Langkah II : Idetifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	94
Langkah III : Idetifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	95
Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi.....	95

Langkah V: Perencanaan Asuhan Kebidanan	96
Langkah VI: Implementasi	98
Langkah VII: Evaluasi	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	110
DOKUMENTASI	111
RIWAYAT HIDUP.....	109



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 tinggi fundus uteri dan uterus menurut masa involusi.....	14
Tabel 2.2 karakteristik lochea pada masa nifas.....	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 anatomi payudara.....	32
Gambar 2.2 <i>let down reflex</i>	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : surat permohonan izin penelitan dari Fakultas Kedokteran dan ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran 2 : Surat izin atau rekomendasi penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Walikota Makassar.
- Lampiran 3 : Surat izin penelitian dari Walikota Makassar/Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar.
- Lampiran 4 : Surat izin penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Lampiran 5 : Surat izin meneliti dari Puskesmas Bara-Baraya Makassar.
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Puskesmas Bara-Baraya Makassar.
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Layak etik.
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup.

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, FEBRUARI 2023

Sulfiana, 70400119030

Pembimbing I : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar

Pembimbing II : Ferawati Taherong

“Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Pada Ny “N” Dengan Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 04 Agustus 2022”

Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan penyumbatan pada aliran vena dan limfe sehingga aliran susu menjadi terhambat dan tertekan kesaluran air susu ibu sehingga terjadinya peningkatan aliran vena dan limfe yang menyebabkan payudara bengkak.

Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan Asuhan Kebidanan pada Ny “N” Post Partum hari ke tiga dengan Bendungan ASI dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan tujuh langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada Ny “N” dengan Bendungan ASI tidak ditemukannya kendala dalam menangani masalah tersebut. Dalam penatalaksanaan pada Ny “N” dengan Bendungan ASI yaitu edukasi tentang perawatan payudara, tehnik dan posisi menyusui yang baik dan benar dan pemberian obat paracetamol 500 mg sebagai analgetik (anti nyeri).

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa asuhan yang diberikan berhasil, dengan tidak ditemukannya komplikasi pada ibu, serta keadaan ibu membaik yang ditandai dengan payudara ibu telah kembali normal dan bayi telah aktif menyusui.

Kata kunci : Nifas, Bendungan ASI, Tujuh Langkah Varney

ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

ACADEMIC PAPER, FEBRUARY 2023

Sulfiana, 70400119030

Consultant I : Anieq Mumthi'ah Al Kautzar

Consultant II : Ferawati Taherong

“Postnatal Midwifery Care Management for Mrs. ‘N’ with Breast Milk Engorgement at Bara-Baraya Health Center Makassar on August 4th, 2022

Breast milk engorgement is breast milk that is not immediately released causing blockage in the veins and lymphatic vessels, which results in obstructed milk flow and pressure on the mother’s milk ducts, leading to increased blood and lymphatic flow that causes breast swelling.

This research aims to provide midwifery care to Mrs. “N” on her third day postpartum with breast milk engorgement using the seven-step Varney midwifery care approach and documenting it in SOAP format.

The results of the case study on Mrs. “N” show no difficulties in managing the case. The midwifery care management given to Mrs. “N” with breast milk engorgement was such as giving education on breast care, proper breastfeeding technique and positioning, and giving 500 mg paracetamol as an analgesic (pain reliever).

In conclusion, the care provided is successful with no implications found in the mother, and the mother’s condition improved as indicated by her breast returning to normal and the baby actively breastfeeding.

Keywords: Postpartum, Breast Milk Engorgement, Seven-Step Varney Approach



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa nifas (puerperium) adalah masa setelah melahirkan bayi dan biasa disebut juga dengan masa pulih kembali, dengan maksud keadaan pulihnya alat reproduksi seperti sebelum hamil (Sutanto, 2018). Masa nifas merupakan proses pemulihan ibu setelah masa kehamilan dan persalinan yang berlangsung selama 6 minggu yang ditandai dengan perubahan-perubahan fisiologis salah satunya adalah pengeluaran air susu ibu (Elvira & Panjaitan, 2017).

Bayi baru lahir memiliki hak yaitu sudah seharusnya mendapatkan ASI dari ibunya. Penyebab tidak tercapainya pemberian ASI eksklusif salah satunya yaitu bayi tidak mendapat ASI yang cukup dikarenakan masalah dalam menyusui yang karena ibu mengalami engorgement (Bendungan ASI). Bendungan ASI merupakan peningkatan aliran vena dari limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk proses laktasi, bisa juga karena adanya penyempitan duktus lactiferous pada payudara ibu serta dapat terjadi pula bila memiliki kelainan piting susu datar dan terbenam. Payudara yang mengalami pembengkakan atau bendungan ASI tersebut sangat sukar disuse oleh bayi karena payudara lebih menonjol, puting lebih datar, dan sukar dihisap oleh bayinya (Aulya dan Supriaten, 2021).

Masalah yang biasa terjadi pada saat menyusui, adalah tersumbatnya saluran ASI yang menyebabkan rasa sakit, demam, payudara berwarna merah teraba benjolan

yang terasa sakit atau bengkak dan payudara mengeras, yang bisa disebut juga dengan bendungan ASI. Kejadian ini biasa disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak dikeluarkan sehingga terjadi sumbatan. Gejala yang sering muncul pada saat terjadi bendungan ASI antara lain payudara bengkak, payudara terasa panas dan eras, dan suhu tubuh ibu meningkat. Apabila keadaan ini berlanjut maka dapat mengakibatkan terjadinya mastitis dan abses payudara (Rutina dan Fitriani, 2016).

Mastitis merupakan inflamasi atau infeksi payudara dimana gejalanya yaitu payudara keras, memerah, dan nyeri, dapat disertai demam $>38^{\circ}\text{C}$ (Kemenkes RI, 2013). Sedangkan Abses payudara merupakan komplikasi lanjutan setelah terjadinya mastitis yang mengakibatkan terjadi penimbunan nanah di dalam payudara (Rukiyah, 2012). Selain berdampak pada ibu, bendungan ASI juga berdampak pada bayi akibatnya kebutuhan nutrisi pada bayi akan kurang terpenuhi karena kurangnya asupan yang didapatkan oleh bayi (Munawaroh, 2019).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2015 di Amerika Serikat presentase perempuan menyusui yang mengalami bendungan ASI sebanyak 7198 (66,87%) dari 10.764 ibu nifas dan pada tahun 2016 terdapat ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 6543 (66,34%) dari 9.862 ibu nifas (WHO, 2017).

Menurut data *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada tahun 2014 disimpulkan bahwa presentase cakupan kasus bendungan ASI pada ibu nifas tercatat 107.654 ibu nifas, pada tahun 2015 terdapat ibu nifas yang mengalami

bendungan ASI sebanyak 95.698 (66,87%) ibu nifas, serta pada tahun 2016 ibu yang mengalami bendungan ASI sebanyak 76.543 (71,10) dengan angka tertinggi terjadi di Indonesia (37,12%) (Depkes RI, 2017).

Menurut penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI pada tahun 2018 kejadian bendungan ASI di Indonesia terbanyak terjadi pada ibu-ibu bekerja sebanyak 16% dari ibu menyusui (Kemenkes, 2019). Survey Demografi Kesehatan Indonesia menyebutkan, ibu nifas yang mengalami masalah bendungan ASI mencapai 77.231 orang (37,12%) (Kemenkes RI, 2016). Menurut profil dinas kesehatan Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat 1078 ibu menyusui dan sekitar 541 ibu yang mengalami bendungan ASI (Dinkes Sulawesi Selatan, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meriem Meisyaroh Syamson pada tahun 2017 di RSUD Nene Malloma Kabupaten Sidrap dari tahun 2017 terdapat 782 ibu nifas. Dari 782 ibu nifas terdapat 536 ibu menyusui, dari data yang jumlah ibu menyusui terdapat 350 ibu yang mengalami bendungan ASI dan sekitar 67 ibu mengalami bendungan ASI setiap 2 bulannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rutina & Fitriana, pada tahun 2018 sebanyak 19 orang (73,1%) ibu nifas mengalami bendungan ASI. Berdasarkan kelompok pendidikan ibu nifas yang mengalami bendungan ASI terbanyak adalah ibu kelompok pendidikan SMA sebanyak 13 orang (50%). Berdasarkan kelompok usia ibu nifas yang mengalami bendungan ASI paling banyak yaitu kelompok usia 20 sampai 35 tahun sebanyak 18 orang (69,2%). Berdasarkan kelompok paritas sebagian

besar dari ibu nifas dengan primipara mengalami bendungan ASI yaitu sebanyak sebanyak 11 orang (42,3 %).

Berdasarkan data awal yang dilakukan di Puskesmas Bara-Baraya Makassar pada tahun 2021 terdapat 168 ibu nifas, dari data jumlah ibu nifas terdapat 18 ibu yang mengalami bendungan ASI. Pengetahuan ibu tentang menyusui sangatlah kurang sehingga menyebabkan terjadinya bendungan ASI, perilaku ibu dalam memberikan ASI kepada bayinya juga merupakan salah satu penyebab terjadinya di puskesmas, bidan sering menganjurkan perawatan payudara pada ibu nifas. Namun terkadang banyak ibu nifas tidak memperhatikan terhadap anjuran bidan.

Bendungan ASI disebabkan karena pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena tidak cukup sering menyusui pada ibu nya. Bendungan ASI juga dapat terjadi karena penyempitan duktus laktoferi atau oleh kelenjar-kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna atau karena kelainan pada puting susu sehingga terjadinya pembengkakan pada payudara karena peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menyebabkan bendungan ASI dan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bendungan ASI yaitu pada saat antenatal, dimana ibu diberikan penyuluhan tentang perawatan payudara pada saat trimester II dan III, perawatan payudara pada ibu hamil sampai menyusui perlu dilakukan, karena perawatan payudara sangat penting untuk memperlancar proses pengeluaran ASI, dan juga bermanfaat untuk menjaga kebersihan terutama pada puting susu, merangsang kelenjar-kelenjar air susu yang ada di dalam payudara

sehingga produksi ASI lebih banyak dan lancar dan mendeteksi adanya kelainan pada payudara. Hal ini menunjukkan perawatan payudara penting dilakukan selama hamil sampai menyusui sehingga tidak terjadi masalah pada ibu melahirkan atau setelah melahirkan seperti bendungan ASI. Selain itu penyuluhan tentang personal hygiene juga perlu diberikan karena mengingat terjadinya mastitis disebabkan oleh bakteri staphylococcus aerus. (Munawaroh DKK, 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Pada Ny “N” Dengan Bendungan Asi Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar” Mengingat angka kejadian ibu nifas dengan bendungan ASI masih cukup tinggi dan apabila bendungan ASI tidak segera ditangani akan terjadi mastitis ataupun abses pada payudara.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan ini adalah manajemen asuhan kebidanan pada ibu post natal berkelanjutan dengan bendungan ASI.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu memberikan asuhan kepada ibu post partum dengan masalah bendungan ASI dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang Bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengumpulan data pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- b. Merumuskan interpretasi data pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- c. Mengidentifikasi diagnose potensial pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- d. Melakukan antispasi penanganan segera pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- e. Melakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- f. Melakukan asuhan kebidanan sesuai rencana tindakan pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- g. Mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan pada ibu nifas dengan bendungan ASI.
- h. Melakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang diberikan pada ibu nifas dengan bendungan ASI.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Bidang kesehatan

Sebagai bahan masukan dalam bidang ilmu Kesehatan khususnya tentang nifas dengan bendungan ASI.

- b. Bagi penulis

Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penerapan

Asuhan Kebidanan dengan Bendungan ASI.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi institusi

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses asuhan kebidanan pada kasus Bendungan ASI.

b. Bagi lahan

Sebagai bahan informasi bagi tenaga bidan di dalam menangani kasus khususnya yang berkaitan dengan bendungan ASI.

c. Manfaat bagi penulisan

Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses asuhan kebidanan pada kasus Bendungan ASI.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini meliputi :

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari berbagai buku-buku, literatur, pengambilan data dari internet, profil dari kesehatan yang ada relevansinya dengan karya tulis ini.

2. Studi kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi: pengkajian, merumuskan diagnosis/masalah aktual maupun potensial, implementasi serta melaksanakan evaluasi terhadap manajemen asuhan kebidanan dengan bendungan ASI.

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Melakukan tanya jawab dengan ibu, suami maupun keluarganya yang dapat membantu memberikan keterangan/informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai ke kaki (*head to toe*) meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi serta pemeriksaan diagnostik lainnya dengan menggunakan format pengkajian yang telah disusun sebelumnya.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian psikososial dilakukan meliputi pengkajian status emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi ibu terhadap keluarga, petugas kesehatan dan lingkungannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Pengertian masa nifas

Masa nifas (Post Partum) adalah masa yang di mulai sehabis kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandungan kembali semula seperti sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan ketidak nyamanan pada awal postpartum, yang tidak menutup kemungkinan untuk menjadi patologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Yuliana & Hakim, 2020).

Masa nifas atau post partum atau disebut juga masa puerperium merupakan waktu yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ reproduksinya seperti saat sebelum hamil atau disebut involusi terhitung dari selesai persalinan hingga dalam jangka waktu kurang lebih 6 Minggu atau 42 hari (Maritalia, 2017).

Masa nifas (puerperium) dimulai sejak 2 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu (42 hari) setelah itu. Puerperium yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan parous melahirkan. Jadi, puerperium berarti masa setelah melahirkan bayi yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra hamil (Rini & Kumala,

2016).

Masa nifas itu merupakan masa yang paling rawan dan selalu dialami oleh ibu yang habis melahirkan, dimana pada masa ini terjadinya proses pengeluaran darah dari dalam uterus selama atau sesudah persalinan dan pada normalnya berlangsung selama kurang lebih 6 minggu (Purwoastuti & Walyani, 2015).

2. Tujuan asuhan masa nifas

Ketika memberikan asuhan sebaiknya bidan juga mengetahui apa tujuan pemberian asuhan pada ibu nifas, tujuan diberikannya asuhan pada ibu selama masa nifas, yaitu:

a. Mendeteksi adanya perdarahan masa nifas

Tujuan perawatan masa nifas adalah untuk mendeteksi adanya kemungkinan perdarahan post partum, dan infeksi, penolong persalinan harus waspada, sekurang-kurangnya satu jam post partum untuk mengatasi kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan. Umumnya wanita sangat lemah setelah melahirkan, lebih-lebih bila partus berlangsung lama.

b. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis.

Melaksanakan skrining secara komprehensif dengan mendeteksi masalah, mengobati dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi.

- c. Memberikan pendidikan kesehatan diri.
- d. Memberikan pendidikan tentang laktasi dan perawatan payudara.
- e. Konseling tentang KB.
- f. Untuk memulihkan kesehatan umum penderita (Rini & Kumala, 2016).

3. Tahapan Masa Nifas

Beberapa tahapan pada masa nifas (Maritalia, 2017) adalah sebagai berikut:

a. Puerperium dini

Merupakan masa pemulihan awal dimana ibu yang melahirkan spontan tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala IV dianjurkan untuk mobilisasi dini atau segera Ibu diperbolehkan untuk berdiri dan berjalan-jalan.

b. Puerperium intermedial

Merupakan masa pemulihan yang berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari, dimana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan saat sebelum hamil.

c. Remote puerperium

Merupakan waktu yang diperlukan ibu untuk dapat pulih kembali terutama saat hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Pada tahap ini rentang waktu yang dialami setiap ibu akan berbeda tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama hamil ataupun persalinan.

4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas

Tugas dan tanggung jawab seorang bidan belum selesai pada saat setelah proses persalinan saja akan tetapi asuhan kepada ibu harus dilakukan secara komprehensif dan terus menerus, artinya selama masa kurun reproduksi seorang wanita harus mendapatkan asuhan yang berkualitas dan standar. Adapun peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas dan menyusui:

- a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan ibu dan bayi serta keluarga.
- c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- d. Membuat kebijakan, perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi.
- e. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- f. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenai tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.
- g. Melakukan manajemen asuhan dengan cara mengumpulkan data, menetapkan diagnosa dan rencana tindakan serta melakukannya untuk mempercepat proses pemulihan, mencegah komplikasi dengan memenuhi kebutuhan ibu dan bayi selama periode nifas.

h. Memberikan asuhan secara professional (Rini & Kumala, 2016).

5. Perubahan- perubahan dalam masa nifas

a. Uterus

Uterus adalah organ yang mengalami banyak perubahan besar karena telah mengalami perubahan besar selama masa kehamilan dan persalinan. Pembesaran uterus tidak akan terjadi secara terus menerus, sehingga adanya janin dalam uterus tidak akan terlalu lama. Bila adanya janin tersebut melebihi waktu yang seharusnya, maka akan terjadi kerusakan serabut otot jika tidak dikehendaki. Proses metabolisme akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya masalah tersebut.

Uterus mengalami involusi, yaitu proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil setelah melahirkan, dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram (Dewi, 2020)

Tabel 2.1
Tinggi fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi

Involusi Uterus	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus
Plasenta lahir	Setinggi pusat	1000 gr	12,5 cm
7 hari (1 minggu)	Pertengahan pusat dan Simpisis	500 gr	7,5 cm
14 hari (2 minggu)	Tidak teraba	350 gr	5 cm
6 minggu	Normal	60 gr	2,5 cm

Sumber: Yuliana & Hakim, 2020

b. Pengeluaran lokia

Akibat involusi uteri, lapisan luar desidua yang mengelilingi situs plasenta akan menjadi nekrotik. Desidua yang mati akan keluar bersama dengan sisa cairan. Percampuran antara darah dan desidua inilah yang dinamakan lokia.

Lokia adalah ekskresi cairan Rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa/alkali yang membuat organisma berkembang lebih cepat dari kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lokia mempunyai bau yang amis (anyir) meskipun tidak terlalu menyengat dan volumenya berbeda-beda pada setiap wanita. Lokia mengalami perubahan karena mengalami involusi. Pengeluaran lokia dapat dibagi menjadi lokia rubra, sanguilenta, serosa dan alba. Perubahan masing- masing lokia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Karakteristik lochea dalam masa nifas

Lokia	Waktu	Warna	Ciri-ciri
Rubra	1-3 hari	Merah kehitaman	Terdiri dari sel desidua, verniks caseosa, rambut lanugo, sisa mekoneum dan sisa darah.
Sanguilenta	3-7 hari	Putih bercampur Merah	Sisa darah bercampur lendir.
Serosa	7-14 hari	Kekuningan/kecoklatan	Lebih sedikit darah dan lebih banyak serum, juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta.
Alba	>14 hari	Putih	Mengandung leukosit, selaput lender serviks dan serabut jaringan yang mati.

Sumber: Yuliana & Hakim, 2020

c. Serviks

Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir, disebabkan oleh corpus uteri yang dapat mengadakan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada perbatasan antara corpus dan serviks berbentuk semacam cincin.

Serviks berwarna merah kehitaman karena penuh pembuluh darah. Konsistensinya lunak, kadang-kadang terdapat laserasi atau perlukaan kecil. Karena robekan kecil yang terjadi selama berdilatasi maka serviks tidak akan pernah kembali lagi ke keadaan seperti sebelum hamil. Muara serviks yang berdilatasi sampai 10 cm sewaktu persalinan akan menutup secara perlahan dan bertahap. Pada minggu ke-6 serviks menutup kembali (Mansyur & Dahlan, 2014).

d. Vulva dan Vagina

Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami penekanan, setelah beberapa hari persalinan kedua organ ini kembali dalam keadaan kendor. Rugae timbul kembali pada minggu ke tiga, hymen tampak sebagai tonjolan kecil dan dalam proses pembentukan berubah menjadi karankulae mitiformis yang khas bagi wanita multipara. Ukuran vagina akan selalu lebih besar dibandingkan keadaan saat sebelum persalinan pertama (Yuliana & Hakim, 2020).

e. Perineum

Perubahan pada perineum pasca melahirkan terjadi pada saat perineum mengalami robekan. Robekan jalan lahir dapat terjadi secara spontan ataupun dilakukan episiotomy dengan indikasi tertentu. Meskipun demikian, latihan otot dapat mengembalikan tonus tersebut dan dapat mengencangkan vagina hingga tingkat tertentu. Hal ini dapat dilakukan pada akhir puerperium dengan latihan harian.(Yuliana & Hakim, 2020).

f. Payudara

Payudara atau mammae adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, diatas otot dada. Secara mikroskopik, struktur payudara terdiri dari korpus (badan), aroela dan papilla atau putting. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu (air susu ibu) sebagai nutrisi bagi bayi (Maritalia, 2014).

Payudara mengalami perubahan selama kehamilan sebagai persiapan menyusui, namun perubahan yang dialami oleh setiap ibu hamil sangat bervariasi. Beberapa perubahan payudara selama kehamilan diantaranya:

- 1) Warna aroela mammae menjadi lebih gelap (hiperpigmentasi)
- 2) Lobus (kelenjar air susu) menjadi lebih besar
- 3) Duktus (saluran air susu) mulai bercabang banyak dan menjadi panjang
- 4) Hormon-hormon laktasi (prolactin dan oksitosin) mulai diproduksi yang berperan dalam perubahan pada payudara
- 5) Pada akhir kehamilan payudara terus mengalami pembesaran dan memproduksi kolostrum
- 6) Kelahiran bayi dan plasenta memicu keluarnya ASI dari payudara (Sulfianti, dkk, 2021).

Setelah proses persalinan selesai, pengaruh hormon estrogen dan progesteron terhadap hipofisis mulai menghilang. Hipofisis mulai mensekresi hormon kembali yang salah satunya adalah lactogenic hormon

atau hormon prolactin. kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada saat hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada hari-hari pertama ASI mengandung banyak kolostrum yaitu cairan berwarna agak kuning dan sedikit kental dari ASI yang disekresi setelah hari ketiga postpartum.

6. Kebijakan program dalam masa nifas

Kebijakan program nasional tentang masa nifas adalah:

- a. Gerakan sayang ibu (GSI) merupakan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi dan merupakan gerakan masyarakat bekerja sama dengan pemerintah.
- b. Rooming in merupakan suatu sistem perawatan dimana ibu dan bayi dirawat dalam 1 unit/kamar. Bayi selalu ada disamping ibu sejak lahir (hal ini dilakukan hanya pada bayi yang sehat).
- c. Gerakan nasional ASI eksklusif yang dirancang oleh pemerintah.
- d. Pemberian vitamin A ibu nifas.
- e. Program inisiasi menyusui dini.

Berdasarkan program dan kebijakan teknis masa nifas adalah paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir untuk mencegah, mendeteksi dan menanganimasalah- masalah yang terjadi, yaitu :

1. Kunjungan I : waktu 6-8 jam
 - a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.
 - b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk jika perdarahan berlanjut.
 - c. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenal bagaimana cara mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri.
 - d. Pemberian ASI awal.
 - e. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi yang baru lahir.
 - f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hypotermi.
 - g. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi yang baru lahir selama 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu dan bayinya dalam keadaan stabil.
2. Kunjungan II : waktu 6 hari setelah persalinan
 - a. Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau.
 - b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, perdarahan.
 - c. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit.

- d. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi. Tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari.
- 3. Kunjungan III : waktu 2 minggu setelah persalinan
Sama seperti diatas (6 Hari setelah persalinan).
- 4. Kunjungan IV : waktu 6 minggu setelah persalinan
 - a. Menanyakan pada ibu tentang kesulitan-kesulitan yang ia atau bayinya alami.
 - b. Memberikan konseling untuk KB secara dini.

7. Proses Adaptasi Psikologis Masa Nifas

Berikut ini 3 tahap penyesuaian psikologi ibu dalam masa post partum menurut Sutanto (2019):

- a. Fase *Talking In* (Setelah melahirkan sampai hari ke dua)
 - 1) Perasaan ibu berfokus pada dirinya.
 - 2) Ibu masih pasif dan tergantung dengan orang lain.
 - 3) Perhatian ibu tertuju pada kekhawatiran perubahan tubuhnya.
 - 4) Ibu akan mengulangi pengalaman pengalaman waktu melahirkan.
 - 5) Memerlukan ketenangan dalam tidur untuk mengembalikan keadaan tubuh ke kondisi normal.
 - 6) Nafsu makan ibu biasanya bertambah sehingga membutuhkan peningkatan nutrisi.

7) Kurangnya nafsu makan menandakan proses pengembalian kondisi tubuh tidak berlangsung normal.

b. Fase *Taking Hold* (Hari ke 3 sampai 10)

- 1) Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan merawat bayi, muncul perasaan sedih (baby blues).
- 2) Ibu memperhatikan kemampuan menjadi orang tua dan meningkatkan tanggung jawab akan bayinya.
- 3) Ibu memfokuskan perhatian pada pengontrolan fungsi tubuh, BAK, BAB dan daya tahan tubuh.
- 4) Ibu berusaha untuk menguasai keterampilan merawat bayi seperti menggendong, menyusui, memandikan, dan mengganti popok.
- 5) Ibu cenderung terbuka menerima nasehat bidan dan kritikan pribadi.
- 6) Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak mampu membesarkan bayinya.
- 7) Kemungkinan ibu mengalami depresi postpartum karena merasa tidak mampu membesarkan bayinya.
- 8) Wanita pada masa ini sangat sensitif akan ketidakmampuannya, cepat tersinggung, dan cenderung menganggap pemberi tahu bidan sebagai teguran.
- 9) Dianjurkan untuk berhati-hati dalam berkomunikasi dengan wanita ini dan perlu memberi support.

3. Fase *Letting Go* (Hari ke10 sampai akhir masa nifas)

- 1) Ibu merasa percaya diri untuk merawat diri dan bayinya.
- 2) Setelah ibu pulang ke rumah dan dipengaruhi oleh dukungan serta perhatian keluarga.
- 3) Ibu sudah mengambil tanggung jawab dalam merawat bayi dan memahami kebutuhan bayi.

B. Manajemen Laktasi

1. pengertian Laktasi

Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI di produksi sampai proses bayi dan menelan ASI. Laktasi merupakan bagian integral dari siklus reproduksi mamalia termasuk manusia. Masa masa laktasi mempunyai tujuan meningkatkan pemberian ASI sampai anak umur 2 tahun secara baik dan benar serta anak mendapatkan kekebalan tubuh secara alami (Mansyur & Dahlan, 2014). Air susu ibu (ASI) adalah makanan utama dan terbaik bagi bayi yang tidak bisa digantikan oleh makanan lain. Hal itu dilakukan bagi yang ingin menyusui secara sempurna yaitu dua tahun, seperti yang disebutkan pada firman Allah SWT dalam dalam QS Al-Baqarah(2): 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّحَاءَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَيَكْسُوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاعَدَ وَلَا يَؤْتِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِيدٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاجٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2012).

Ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemaslahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Dan ayah berkewajiban karena sang anak adalah keturunan ayah untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebaninya di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayah pada anak. Apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta (Shihab, 2012).

Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua tahun secara sukarela dan dengan melihat masalah anak,

maka hal itu dibolehkan. Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada wanita lain, hal itu juga dibolehkan. Dalam hal ini, orang tua harus membayar upah dengan rida dan cara yang baik. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam segala perbuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha periksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya. Teks al-Qur'ân menegaskan kewajiban menyusui ada pada ibu, bukan pada orang lain. Menyusukan anak kepada orang lain hanya boleh dilakukan bila si ibu tidak mampu melakukannya. Ahli-ahli fikih telah sepakat mengenai kewajiban menyusui anak pada ibu. Sebab, air susu ibu adalah makanan alami bagi bayi, karena sangat sesuai dengan kebutuhan hidup bayi pada masa itu. Air susu ibu dapat bertambah banyak seiring dengan bertambah besarnya bayi. Selain itu air susu ibu juga memiliki kandungan yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan bayi.

Menyusui anak akan bermanfaat bagi si ibu, dan tidak merugikannya kecuali dalam hal-hal tertentu. Menyusui dapat memperbaiki kondisi kesehatan bayi secara umum melalui perangsangan pertumbuhan sistem pencernaan dan merangsang untuk mendapatkan zat-zat makanan yang dibutuhkan bayi. Di samping itu menyusui juga bermanfaat bagi sang ibu, karena dapat mengembalikan alat reproduksinya kepada keadaan semula setelah proses kelahiran. Ilmu kedokteran modern membolehkan secara berangsur-angsur menyapih anak bayi di bawah dua tahun kalau bayi itu memiliki kesehatan yang memadai. Tetapi apabila kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dan ia tidak mampu mengunyah makanan luar, maka

penyusuan harus disempurnakan menjadi dua tahun. Setelah itu bayi dapat memakan makanan selain air susu ibu (Shihab, 2012).

Menurut tafsir Jalalain (Jalal ad-Din al-Mahalli dan Jalal ad-Din as-Suyuti) tahun 2007. Para ibu menyusukan, maksudnya hendaklah menyusukan anak- anak mereka selama dua tahun penuh sifat yang memperkuat, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan dan tidak perlu ditambah lagi. Dan kewajiban yang diberi anak, maksudnya bapak memberi mereka para ibu sandang pangan sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan secara makruf, artinya menurut kesanggupannya. Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya misalnya dipaksa menyusukan padahal ia keberatan dan tidak pula seorang ayah karena anaknya, misalnya diberi beban di atas kemampuannya.

Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbuai keprihatinan dan kesantunan, dan ahli waris pun ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditujukan kepada wali yang mengatur hartanya berkewajiban seperti demikian, artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. Apabila keduanya ingin, maksudnya ibu bapaknya menyapah sebelum masa dua tahun dan timbul dari kerelaan atau persetujuan keduanya dan hasil musyawarah untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, maka keduanya tidaklah berdosa atas demikian itu. Dan jika kamu ingin ditujukan kepada pihak bapak anakmu

disusukan oleh orang lain dan bukan oleh ibunya, maka tidaklah kamu berdosa dalam hal itu jika kamu menyerahkan kepada orang yang menyusukan pembayaran upahnya atau upah yang hendak kamu bayarkan menurut yang patut secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya (Al-Mahalli & As-Suyuti, 2007).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah penyusuan anak (radha'ah) sangat penting dilakukan oleh ibu kandungnya dengan menggunakan ASI tujuan menyusui bukan hanya sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak tetapi juga bahkan dapat menumbuhkembangkan anak dalam segi fisik dan psikologis yang prima. Oleh sebab itu, berdosalah ibu di hadapan Allah Swt kalau mengabaikan masalah persusuan dengan ASI bila ia mampu melaksanakannya (Shihab, Al Misbah, 2003: 89).

Selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah. Merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai “periode emas (*golden age*)”. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi

belajar, menurunnya kekebalan tubuh mudah sakit dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit jantung, dan kanker. (Risksedas, 2016: 2).

Setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai usia dua tahun. Tidak dipermasalahkan jika masa susuan itu kurang dari masa tersebut apabila kedua ibu-bapak memandang ada mashlahatnya. Demikian pula setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu, baik sandang maupun pangan sesuai dengan kebutuhannya. Ibu laksana wadah bagi anak, sedang bapak sebagai pemilik wadah itu. Maka sudah sewajarnya bapak berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya dan memelihara serta merawat miliknya.

Allah mewajibkan kepada ibu untuk menyusui anaknya, karena air susu ibu mempunyai pengaruh yang besar kepada anaknya. Dari hasil penelitian para ahli medis menunjukkan bahwa air susu ibu terdiri dari saripati yang benar-benar murni. ASI juga merupakan makanan yang paling baik untuk bayi, dan tidak disangsikan lagi oleh para ahli gizi (Kementrian Agama RI, 2010).

Di samping itu ibu dengan fitrah kejadiannya memiliki rasa kasih sayang yang mendalam sehingga penyusuan langsung dari ibu, berhubungan erat dengan perkembangan jiwa dan mental anak. Dengan demikian kurang tepat tindakan sementara para ibu yang tidak menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya. Umpamanya untuk memelihara kecantikan. Padahal ini bertentangan dengan fitrahnya sendiri dan secara tidak langsung ia kehilangan kesempatan untuk membina dasar hubungan keibuan dengan anaknya sendiri

dalam bidang emosi.

Demikianlah pembagian kewajiban kedua orang tua terhadap bayinya yang diatur oleh Allah Swt. Sementara itu diberi pula keringanan terhadap kewajiban, umpama kesehatan ibu terganggu atau seorang dokter mengatakan tidak baik bila disusukan oleh ibu karena satu hal, maka tidak mengapa jika anak mendapat susuan atau makanan dari orang lain. Demikian juga apabila bapak tidak mempunyai kesanggupan melaksanakan kewajibannya karena miskin, maka ia boleh melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesanggupannya. Keringanan itu membuktikan bahwa anak tidak boleh dijadikan sebab adanya kemudaratannya, baik terhadap bapak maupun terhadap ibu. Dengan pengertian, kewajiban tersebut tidak mesti berlaku secara mutlak sehingga mengakibatkan kemudaratannya bagi keduanya. Salah satu pihak tidak boleh memudaratkan pihak lain dengan menjadikan anak sebagai kambing hitamnya. Umpamanya karena ibu mengetahui bahwa bapak berkewajiban memberi nafkah maka ia melakukan pemerasaan dengan tidak menyusui atau merawat si bayi tanpa sejumlah biaya tertentu. Atau bapak sangat kikir dalam memberikan nafkah sehingga ibu menderita karenanya (Kementrian Agama RI, 2010).

Selanjutnya, jika salah seorang dari ibu bapak tidak mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban atau meninggal dunia, maka kewajiban-kewajiban itu berpindah kepada ahli warisnya. Lamanya masa penyusuan dua tahun, namun demikian apabila berdasarkan musyawarah antara

bapak dan ibu untuk kemaslahatan anak, mereka sepakat untuk menghentikannya sebelum sampai masa dua tahun atau meneruskannya lewat dari dua tahun, maka ini boleh saja dilakukan. Demikian juga jika mereka memilih perempuan lain untuk menyusukan anaknya, hal ini diperbolehkan dengan syarat, kepada perempuan yang menyusukan itu diberi imbalan jasa yang sesuai, sehingga terjamin kemaslahatan baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu. Ulama fikih memiliki pendapat tentang siapa yang berhak menyusui dan mengasuh anak, dan jika suami istri bercerai, apakah pengasuhan menjadi tanggung jawab ibu atau bapak? Imam Malik berpendapat bahwa seorang ibu memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya meskipun tidak memiliki harta, anak tersebut akan diasuh oleh orang lain dengan menggunakan harta ibunya. Imam Syafi'i meyakini ini dalam hal ini bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban mayakini dalam hal ini bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban ayah (Kementerian Agama RI, 2010 : 343).

Pemberian ASI setelah bayi di lahirkan sampai bayi 2 tahun sungguh merupakan pondasi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. ASI merupakan makanan yang terlengkap bagi anak yang memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan. Karena itu seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dari air susunya. Kebiasaan menyusui sudah ada sejak Siti Hawa, istri Nabi Adam as. Melahirkan Kabil dan Habil kemudian kebiasaan tersebut di jalankan terus menerus secara turun temurun oleh para ibu. Kebiasaan memberikan air susu ibu (ASI), ini sangat penting artinya untuk pertumbuhan

dan perkembangan bayi, hal ini di karenakan ASI memiliki keutamaan, kelebihan, dan manfaat yang tidak dapat disamakan dengan makanan atau minuman lainnya. Menyusui juga merupakan perwujudan rasa kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ditinjau dari kesehatan, ASI memiliki kelebihan yaitu mengandung antibody (terutama kolostrum) yang melindungi terhadap penyakit, menunjang perkembangan motoric, mudah dicerna dan zat gizi mudah meresap, melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yang dapat menimbulkan alergi. Menyusui memberikan manfaat bagi ibu dan anak yaitu selama proses menyusui, anak dan ibu menjalin komunikasi bathin, dengan menepuk-nepukkan tangan dan atau mengubah intensitas gigitan atau isapan. Secara psikis, seluruh tubuh ibunya merupakan pengirim pesan tentang keadaan hati ibunya. Suhu tubuh, permukaan dan dekatan menggambarkan pada anak mengenai suasana hati ibu. Islam menegaskan bahwa air susu ibu (ASI) yang menyusui akan menularkan dan memindahkan watak ibu tersebut kepada anaknya. Dengan demikian menyusui sebenarnya telah terjadi sebuah proses bimbingan, pendidikan dan pembentukan karakter dari seorang ibu kepada anaknya. Inilah pentingnya kita memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak kita.

2. Anatomi dan fisiologi payudara

Payudara adalah organ tubuh yang terletak pada bagian bawah kulit dan diatas dada. Dengan kata lain, payudara terletak di dinding depan fasia

superfisis anantara tulang dada sampai tulang iga ke enam, bentuknya cembung ke depan bervariasi dan di tengahnya terdapat puting (9 susu yang terdiri dari kulit dan jaringan erektil (Maryuni, 2010).

Ada 3 bagian utama payudara yaitu :

a. Korpus (badan), yaitu bagian yang membesar

Didalam korpus mammae terdapat alveolus yaitu unit terkecil yang memproduksi susu. Alveolus terdiri dari beberapa sel aciner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos dan pembuluh darah. Beberapa lobulus berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara.

b. Areola yaitu bagian yang kehitaman ditengah


Letaknya mengelilingi puting susu dan berwarna kegelapan yang disebabkan oleh penipisan dan penimbunan pigmen pada kulitnya. Perubahan warna ini tergantung dari corak kulit dan adanya kehamilan.

Pada daerah ini akan di dapatkan kelenjar keringat, kelenjar lemak dari montgomery yang membentuk tuberkel dan akan membesar selama kehamilan. Kelenjar lemak ini akan menghasilkan suatu bahan yang melicinkan kalang payudara selama menyusui. Dibawah ini kalang payudara terdapat duktus laktiferus yang merupakan tempat penampungan air susu. Luasnya kalang payudara biasanya $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ dari payudara.

c. Papilla atau puting yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara.

Terletak setinggi interkosta IV, tetapi berhubungan dengan adanya variasi bentuk dan ukuran payudara maka letaknya pun akan bervariasi

pula. Pada tempat ini terdapat lubang-lubang kecil yang merupakan muara duktus dari laktiferus, ujung-ujung serat saraf, pembuluh darah, pembuluh getah bening, serat-serat otot polos yang tersusun secara sirkuler sehingga bila ada kontraksi maka duktus laktiferus akan memadat dan menyebabkan puting susu ereksi sedangkan serat-serat otot yang longitudinal akan menarik kembali puting susu tersebut (Mansyur & Dahlan, 2014).



Gambar 2.1
Anatomi payudara
UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR
Sumber: Mansyur & Dahlan, 2014

3. Fisiologi Laktasi

Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi. Pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan

puting susu, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua reflek pada ibu yang sangat puting susu, terbentuklah prolaktin hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua reflek pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu reflek aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi (Wulyani, 2015). Pada seorang ibu menyusui dikenal 2 refleks yang masing – masing berperan sebagai pembentukan dan pengeluaran air susu yaitu refleks prolaktin dan reflek “*let down*” Refleks prolaktin.

Menjelang akhir kehamilan terutama hormon prolaktin memegang peranan untuk membuat kolostrum, namun jumlah kolostrum terbatas, karena aktifitas prolaktin dihambat oleh estrogen dan progesteron yang kadarnya memang tinggi. Setelah partus berhubungan lepasnya plasenta dan kurang fungsinya korpus luteum maka estrogen dan progesteron sangat berkurang, ditambah lagi dengan adanya isapan bayi yang merangsang ujung-ujung saraf sensoris yang berfungsi sebagai reseptor mekanik. Rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus melalui medula spinalis dan mesensephalon. Hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin dan sebaliknya merangsang pengeluaran faktor-faktor yang memacu sekresi prolaktin.

Faktor-faktor yang memacu sekresi akan merangsang adenohipofise (hipofise anterior) sehingga keluar prolaktin. Hormon ini merangsang sel-sel alveoli yang berfungsi untuk membuat air susu. Kadar prolaktin pada ibu yang menyusui akan menjadi normal 3 bulan setelah melahirkan sampai penyapihan

anak pada saat tersebut tidak akan ada peningkatan prolactin walaupun ada isapan bayi, namun pengeluaran air susu tetap berlangsung. Pada ibu yang melahirkan anak tetapi tidak menyusui, kadar prolaktin akan menjadi normal pada minggu ke 2 – 3. Pada ibu yang menyusui, prolaktin akan meningkat dalam keadaan-keadaan seperti :

- a. Strees atau pengaruh psikis
- b. Anastesi
- c. Operasi
- d. Rangsangan puting susu
- e. Hubungan kelamin
- f. Obat-obatan tranquilizer hipotalamus seperti reserpin, klorpromazin, fenotiaid.

Sedangkan keadaan-keadaan yang menghambat pengeluaran prolaktin adalah Gizi ibu yang jelek dan obat-obatan (Astutik, 2014).


- a. Reflek oksitosin / *let down* reflex

Bersamaan dengan pembentukan prolaktin oleh adenohipofise, rangsangan yang berasal dari isapan bayi ada yang dilanjutkan ke neurohipofise (hipofise posterior) yang kemudian dikeluarkan oksitosin. Melalui aliran darah, hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus sehingga terjadi involusi dri organ tersebut. Oksitosin yang sampai pada alveoli yang mempengaruhi sel

mioepitium. Kontraksi dari sel akan memeras air susu yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem duktulus yang untuk selanjutnya mengalir melalui duktus laktiferus masuk ke mulut bayi.

Faktor – faktor yang meningkatkan refleks *let down* adalah :

- a) Melihat bayi
- b) Mendengarkan suara bayi
- c) Mencium bayi
- d) Memikirkan untuk menyusui bayi



Gambar 2.2
Reflex *let down*

Sumber: Mansyur & Dahlan, 2014.

Faktor-kator yang menghambat reflek *let down* adalah Stres, seperti keadaan bingung/pikiran kacau, takut, cemas. Bila ada stres dari ibu yang menyusui maka akan terjadi suatu blokade dari refleks *let down*. Ini

disebabkan oleh karena adanya pelepasan dari adrenalin (epinefrin) yang menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah alveoli, sehingga oksitosin sedikit harapannya untuk dapat mencapai target organ mioepitelium. Akibat dari tidak sempurnanya refleksi *let down* maka akan terjadi penumpukan air susu di dalam alveoli yang secara klinis tampak payudara membesar. Payudara yang besar dapat berakibat abses, gagal untuk menyusui dan rasa sakit. Rasa sakit ini akan merupakan stress lagi bagi ibu sehingga stress akan bertambah.

Refleksi *let down* tidak sempurna maka bayi yang haus jadi tidak puas. Ketidakpuasan ini merupakan tambahan stress bagi ibunya. Bayi yang haus dan tidak puas ini akan berusaha untuk dapat air susu yang cukup dengan cara menambah kuat hisapannya sehingga tidak jarang dapat menimbulkan luka-luka ini akan dirasakan sakit oleh ibunya yang juga akan menambah stressnya tadi. Dengan demikian akan terbentuk suatu lingkaran setan yang tertutup (*circulus vitiosus*) dengan akibat kegagalan dalam menyusui (Mansyur & Dahlan, 2014).

4. Gizi dalam ASI

a. Kolostrum

- 1) Cairan yang pertama kali disekresi oleh kelenjar payudara, mengandung tissue debris dan residual material yang terdapat dalam alveoli dan duktus dari kelenjar payudara sebelum dan setelah masa

puerperium.

- 2) Disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga atau keempat.
- 3) Merupakan cairan viscous kental dengan warna kekuning-kuningan, lebih kuning dibandingkan dengan susu yang matur.
- 4) Merupakan pencahar yang ideal untuk membersihkan meconium dari usus bayi yang baru lahir dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi bagi makanan yang akan datang.
- 5) Lebih banyak mengandung anti body dibandingkan dengan ASI yang matur, dapat memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan.
- 6) Lebih banyak mengandung protein dibandingkan dengan ASI yang matur, tetapi berlainan dengan ASI yang matur pada kolostrum protein yang utama adalah globulin.
- 7) Kadar karbohidrat dan lemak rendah jika dibandingkan dengan ASI matur.
- 8) Volume berkisar 150-300 ml/24 jam.
- 9) Mineral terutama natrium, kalium dan klorida lebih tinggi jika dibandingkan dengan ASI matur.
- 10) Total energy lebih rendah jika dibandingkan dengan susu matur, hanya 58 kal/100 ml kolostrum.

- 11) Vitamin yang larut dalam lemak lebih tinggi jika dibandingkan dengan ASI matur, sedangkan vitamin yang larut dalam air dapat lebih tinggi atau lebih rendah.
- 12) Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak.
- 13) pH lebih alkalis dibandingkan dengan ASI matur.
- 14) Lipidnya lebih banyak mengandung kolesterol dan lesitin dibandingkan dengan ASI matur.
- 15) Terdapat tripsin inhibitor, sehingga hidrolisprotein didalam usus bayi menjadi kurang sempurna. Hal ini akan lebih banyak menambah kadar antibody pada bayi.

b. Protein dalam ASI

Protein dalam susu adalah kasein dan whey. Kadar protein ASI sebesar 0,9T%, 60% diantaranya adalah whey, yang lebih mudah dicerna dibanding kasein (protein utama susu sapi). Kecuali mudah dicerna, dalam ASI terdapat 2 macam asam amino yang tidak terdapat dalam susu sapi yaitu asitin dan taurin. Sistin diperlukan untuk pertumbuhan somatic, sedangkan taurin untuk pertumbuhan otak. Selain dari ASI, sebenarnya sistin dan tarin dapat diperoleh dari penguraian tirosin, tetapi pada bayi baru lahir enzim pengurai tirozin ini belum ada.

c. Karbohidrat dalam ASI

Karbohidrat utama dalam ASI adalah laktosa, yang kadarnya paling tinggi dibanding dengan susu mamalia lain (7 g%). Lakntosa mudah diurai

menjadi glukosa dan glaktosa dengan bantuan enzim lactase yang sudah ada dalam mukosa saluran pencernaan sejak lahir. Laktosa mempunyai manfaat lain, yaitu mempertinggi absorbs kalsium dan merangsang pertumbuhan laktobasillus bifidus.

d. Lemak dalam ASI

Sumber kalori utama dalam ASI adalah lemak. Sekitar 50% kalori ASI berasal dari lemak. Kadar lemak dalam ASI antara 3,5-4,5%. Walaupun kadar lemak dalam ASI tinggi, tetapi mudah diserap oleh bayi karena trigliserida dalam ASI lebih dulu dipecah menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang terdapat dalam ASI. Kadar kolestrol ASI lebih tinggi dari pada susu sapi, sehingga bayi yang mendapat ASI seharusnya mempunyai kadar kolestrol darah lebih tinggi, tetapi ternyata penelitian Osborn membuktikan bahwa bayi yang tidak mendapatkan ASI lebih banyak menderita penyakit jantung koroner pada usia muda. Diperkirakan bahwa pada masa bayi diperlukan kolestrol pada kadar tertentu untuk merangsang pembentukan enzim protektif yang membuat metabolisme kolestrol menjadi efektif pada usia dewasa. Di samping kolestrol, ASI mengandung asam lemak esensial: asam linoleat (Omega 7 dan asam linolenat (Omega 3).

e. Mineral dalam ASI

- 1) ASI mengandung mineral yang lengkap. Walaupun kadarnya relative rendah tetapi cukup untuk bayi sampai umur 6 bulan.

- 2) Total mineral selama masa laktasi adalah konstan, tetapi beberapa mineral yang spesifik kadarnya tergantung dari diet dan stadium laktasi.
 - 3) Fedan Capaling stabil, tidak dipengaruhi oleh diet ibu .
 - 4) Garam organic yang terdapat dalam ASI terutama adalah kalsium, kalium dan natrium dari asam klorida dan fosfat. Yang terdapat adalah kalium, sedangkan kadar Cu, Fe, dan Mn yang merupakan bahan untuk pembuat darah relative sedikit. Ca dan P yang merupakan bahan pembentuk tulang kadarnya dalam ASI cukup.
- f. Air dalam ASI
- Kira-kira 88% dari ASI terdiri dari air. Air ini berguna untuk melarutkan zat-zat yang terdapat di dalamnya. ASI merupakan sumber air yang secara metabolik adalah aman. Air yang relativ tinggi dalam ASI ini akan meredakan rangsangan haus dari bayi.
- g. Vitamin dalam ASI
- 1) Vitamin dalam ASI dapat dikatakan lengkap.
 - 2) Vitamin A, D, dan C cukup, sedangkan golongan vit. B kecuali riboflavin dan asam panthotenik adalah kurang.
- h. Kalori dalam ASI
- Kalori ASI relative rendah, hanya 77 kalori/100 ml ASI. 90% berasal dari karbohidrat dan lemak, sedangkan 10 % berasal dari protein (Mansyur & Dahlan, 2014).

C. Tinjauan khusus tentang bendungan ASI

1. Pengertian Bendungan ASI

Bendungan ASI adalah suatu kejadian dimana aliran vena dan limfatik tersumbat, aliran susu menjadi terhambat dan tertekan pada saluran air susu ibu dan alveoli meningkat. Kejadian ini biasanya kejadian ibu disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan menurut wulan 2011 (Impartina, 2017).

Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan penyumbatan pada aliran vena dan limfe sehingga aliran susu menjadi terhambat dan tertekan kesaluran air susu ibu sehingga terjadinya peningkatan aliran vena dan limfe yang menyebabkan payudara bengkak (Rutina & Fitriana, 2016).

Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Bendungan ASI terjadi pada hari ke-3 sampai 5 setelah persalinan (Kemenkes RI, 2013).

2. Etiologi

Bendungan air susu dapat terjadi pada hari ke dua atau ke tiga ketika payudara telah memproduksi air susu. Bendungan disebabkan oleh pengeluaran air susu yang tidak lancar, karena bayi tidak cukup sering menyusui, produksi meningkat, terlambat menyusukan, hubungan dengan bayi

(bonding) kurang baik dan dapat pula karena adanya pembatasan waktu menyusui (Sarwono, 2009).

Pada bendungan ASI payudara yang terbenam membesar, membengkak dan sangat nyeri. Payudara terlihat mengkilap dan puting susu teregang menjadi rata. ASI tidak mengalir dengan mudah dan bayi sulit menghisap ASI sampai bengkak berkurang.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan ASI, yaitu:

- a. Pengosongan mammae yang tidak sempurna (dalam masa laktasi, terjadi peningkatan produksi ASI pada ibu yang produksi ASI-nya berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusui, dan payudara tidak dikosongkan, maka masih terdapat sisa ASI didalam payudara. Sisa ASI tersebut jika tidak dikeluarkan dapat menimbulkan bendungan ASI).
- b. Faktor hisapan bayi yang tidak aktif (pada masa laktasi, bila ibu tidak menyusukan bayinya sering mungkin atau tidak aktif menghisap, maka akan menimbulkan bendungan ASI).
- c. Faktor posisi menyusui bayi yang tidak benar (teknik yang salah dalam menyusui. Akibatnya ibu tidak mau menyusui bayinya dan terjadi bendungan ASI).
- d. Puting susu terbenam (puting susu yang terbenam akan menyulitkan bayi dalam menyusui. Karena bayi tidak dapat menghisap puting susu aroela, bayi tidak mau menyusui dan akibatnya terjadi bendungan ASI).

- e. Putting susu terlalu panjang (putting susu yang panjang akan menimbulkan kesulitan pada saat bayi menyusu karena bayi tidak dapat menghisap aroela dan merangsang untuk mengeluarkan ASI. Akibatnya ASI tertahan dan menimbulkan bendungan ASI) (Sarwono, 2009).



Gambar 2.3

Bentuk putting susu

Sumber: <https://sweetysmiler.wordpress.com/2011/03/15/anatomi-fisiologi-payudara-dan-proses-laktasi>

3. Patofisiologi

Pembengkakan payudara atau bendungan ASI terjadi karena ASI tidak disusui dengan adekuat, sehingga sisa ASI terkumpul pada sistem duktus yang mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Payudara bengkak ini sering terjadi pada hari ketiga atau ke empat sesudah melahirkan. Statis pada pembuluh darah dan limfe akan mengakibatkan meningkatnya tekanan intrakaudal, yang akan memengaruhi segmen pada payudara, sehingga tekanan seluruh payudara meningkat. Akibatnya, payudara sering terasa penuh, tegang, serta

nyeri dan kemudian diikuti oleh penurunan produksi ASI. (Rutina & Fitriani, 2016).

Pelepasan ASI berada di bawah kendali neuroendokrin. Rangsangan sentuhan pada payudara (bayi menghisap) akan merangsang produksi oksitosin yang menyebabkan kontraksi sel-sel khusus. Proses ini disebut “reflek prolaktin” atau milk produksi reflek yang membuat ASI tersedia bagi bayi. Dalam hari-hari dini, laktasi reflek ini tidak dipengaruhi oleh keadaan emosi ibu. Nantinya, reflek ini dapat dihambat oleh keadaan emosi ibu bila ia merasa takut, lelah, malu, merasa tidak pasti, atau bila merasakan nyeri.

Sesudah bayi lahir dan plasenta keluar, kadar estrogen dan progesteron turun dalam 2-3 hari. Dengan ini faktor dari hipotalamus yang menghalangi keluarnya pituitary lactogenic hormon (prolaktin) waktu hamil, dan sangat dipengaruhi oleh estrogen tidak dikeluarkan lagi, dan terjadi sekresi prolaktin oleh hipofisis. Hormon ini menyebabkan alveolus-alveolus kelenjar mammae terisi dengan air susu, tetapi untuk mengeluarkannya dibutuhkan reflex yang menyebabkan kontraksi sel-sel mioepitelial yang mengelilingi alveolus dan duktus kecil kelenjar-kelenjar tersebut. Refleksi ini timbul jika bayi menyusu. Pada permulaan nifas apabila bayi belum menyusu dengan baik, atau kemudian apabila kelenjar- kelenjar tidak dikosongkan dengan sempurna, terjadi pembendungan air susu (Rutina & Firtiani, 2016).

4. Tanda dan Gejala

- a. Rasa berat pada payudara
- b. Payudara terasa panas
- c. Badan terasa panas sampai meningkat
- d. Payudara bengkak
- e. Puting susu kencang
- f. Payudara terasa nyeri
- g. ASI tidak keluar (manuaba 2010: 420)

5. Prognosis

Bendungan ASI merupakan permulaan dari infeksi mammae yaitu mastitis. Bakteri yang menyebabkan infeksi mammae adalah stapylococcus aerus yang masuk melalui puting susu. Infeksi menimbulkan demam, nyeri lokal pada mammae, terjadi pematangan mammae, dan terjadi perubahan kulit mammae (Rukiyah, Yulianti, 2012: 22).

6. Diagnosis

Untuk menegakkan diagnose maka dilakukan pemeriksaan payudara dan pemeriksaan harus dikerjakan dengan sangat hati-hati, tidak boleh kasar dan keras. Pemeriksaan payudara dilakukan dengan : (Rukiyah, Yulianti, 2012: 23).

a. Inspeksi

Pemeriksaan inspeksi dilakukan pada ibu untuk melihat tanda-tanda infeksi pada payudara, pertama perhatikan ke simetrisan payudara dengan posisi ibu duduk, tangan ibu disamping dan sesudah itu dengan kedua tangan keatas, selagi pasien duduk. Kita akan melihat dilatasi pembuluh-pembuluh balik dibawah kulit akibat pembesaran tumor jinak atau ganas dibawah kulit. Perlu diperhatikan apakah edema kulit harus diperhatikan pada tumor yang terletak tidak jauh dibawah kulit. Kita akan melihat jelas edema kulit seperti gambaran kulit jeruk (*peaud' orange*) pada kanker payudara.

b. Palpasi

Pada saat akan dilakukan palpasi ibu harus tidur, tangan yang dekat dengan payudara yang akan diraba diangkat ke bawah kepala dan payudara ibu diperiksa secara sistematis bagian medial lebih dahulu dengan jari-jari yang harus ke bagian lateral. Palpasi ini harus meliputi seluruh payudara, bila dilakukan secara sirkuler dan parasternal ke arah garis aksilla belakang, dan dari subklavikuler ke arah paling distal.

Setelah palpasi payudara selesai, dimulai dengan palpasi aksilla dan supraklavikular. Untuk pemeriksaan aksilla ibu harus duduk, tangan aksilla yang akan diperiksa dipegang oleh pemeriksa, dan dokter pemeriksa mengadakan palpasi aksilla dengan tangan yang kontralateral dari tangan sipenderita. Misalnya aksilla kiri ibu yang akan diperiksa,

tangan kiri dokter mengadakan palpasi (Rukiyah, Yulianti, 2012: 23).

7. Pencegahan

- a. Menyusui dini, susui bayi sesegera mungkin (sebelum 30 menit) setelah dilahirkan. Manfaat menyusui dini adalah: merangsang produksi susu, dan memperkuat reflek menghisap bayi.
- b. Perlekatan yang baik. Cara melekatkan Bayi pada payudara ketika menyusui berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui. Langkah-langkah menyusui yang benar
- c. Menyusui *on demand*.

Sebaiknya bayi disusui secara *on demand*, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Ibu harus menyusui bayinya bila bayi menangis bukan karena sebab lain (kencing, kepanasan/ kedinginan, atau sekedar ingin didekap) atau ibu sudah merasa perlu untuk menyusui bayinya. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya bayi akan menyusu pada jadwal yang tidak teratur, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu.

- d. Menyusu yang dijadwal akan berakibat kurang baik, karena hisapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. Dengan menyusui *on demand*, sesuai kebutuhan bayi, akan mencegah timbulnya masalah menyusui.

- e. Lakukan rangsangan efek oksitosin
- f. Kompres panas untuk mengurangi rasa sakit, Ibu harus rileks, dekatkan bayi pada ibu agar ibu dapat memandangnya, pijat leher dan punggung belakang (sejajar daerah payudara) menggunakan ibu jari dengan teknik gerakan memutar searah jarum jam kurang lebih selama 3 menit, Pijat ringan pada payudara yang bengkak (pijat pelan-pelan ke arah tengah) menggunakan minyak pelumas, stimulasi payudara dan puting caranya pegang puting dengan dua jari pada arah yang berlawanan, kemudian putar puting dengan lembut searah jarum jam.
- g. Memakai BH yang sesuai.
BH atau penyokong payudara yang baik penting untuk mencegah atau mengurangi nyeri punggung bagian atas serta dapat menyamankan nyeri tekan karena payudara yang membesar. Selain itu, BH yang sesuai juga memberi ruang untuk memfasilitasi fungsi duktus.

8. Penatalaksanaan

- a. Kompres payudara menggunakan kain basah dan hangat selama 5 menit.
- b. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting atau gunakan sisir untuk mengurut payudara dengan arah "Z" menuju puting.
- c. Keluarkan ASI sebagian dari bagian depan payudara sehingga puting susu menjadi lunak.
- d. Susui bayi *on demand*.

- e. Keluarkan ASI dengan tangan apabila ASI tidak dikosongkan dengan sempurna oleh bayi. Apabila payudara mengalami bendungan dan sulit dikeluarkan dengan tangan dapat dikeluarkan dengan pompa payudara.
- f. Letakkan kain dingin pada payudara setelah menyusui untuk memberi kenyamanan.
- g. Keringkan payudara.

9. Manfaat pemberian ASI bagi bayi dan ibu

- a. Manfaat ASI bagi bayi
 - 1) Asi sebagai Nutrisi
 - 2) Makanan terlengkap untuk bayi terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup mengandung zat gizi yang diperlukan untuk 6 bulan pertama.
 - 3) Mengandung antibody (terutama kolostrum) yang melindungi terhadap penyakit terutama diare dan gangguan pernapasan.
 - 4) Menunjang perkembangan motoric sehingga bayi yang diberikan ASI Eksklusif akan lebih cepat bisa berjalan.
 - 5) Meningkatkan jalinan kasi sayang.
 - 6) Selalu siap sedia dan dalam suhu yang sesuai.
 - 7) Mudah dicerna dan zat gizi mudah diserap.
 - 8) Melindungi terhadap alergi karena mengandung zat yag dapat menimbulkan alergi.

b. Manfaat menyusui bagi Ibu

- 1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan.
- 2) Menempelkan segera bayi pada payudara membantu pengeluaran plasenta karena hisapan bayi mengurangi kontraksi Rahim. Karena menurunkan resiko perdarahan pasca persalinan.
- 3) Memberikan ASI segera (dalam waktu 60 menit) membantu meningkatkan produksi ASI dan proses laktasi.
- 4) Hisapan putting yang segera dan sering membantu mencegah payudara membengkak.
- 5) Pemberian ASI membantu mengurangi beban kerja ibu karena ASI tersedia kapan dan dimana saja ASI selalu bersih, dan dalam suhu yang sesuai.
- 6) Pemberian ASI ekonomis dan murah.
- 7) Menurunkan resiko kanker payudara.

D. Tinjauan tentang proses kebidanan

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang di gunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Menurut Helen Varney, proses penyelesaian masalah merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam manajemen kebidanan. Varney berpendapat bahwa dalam melakukan manajemen kebidanan, bidan harus memiliki kemampuan berfikir secara kritis untuk menegakkan diagnosa atau masalah potensial kebidanan. Selain itu, diperlukan pula kemampuan kolaborasi atau kerja sama. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebidanan selanjutnya.

Proses manajemen terdiri dari 7 (tujuh) langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik. Proses dimulai dengan pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Ketujuh langkah tersebut membentuk suatu kerangka lengkap yang diaplikasikan dalam situasi apapun. Akan tetapi langkah dapat diuraikan lagi menjadi langkah-langkah yang lebih rinci dan bisa berubah sesuai dengan kondisi klien.

2. Tahapan dalam manajemen kebidanan

Adapun dalam tahapan Manajemen Kebidanan yaitu :

a. Langkah I. Identifikasi data dasar

Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien untuk memperoleh data dilakukan dengan cara : Pertama yaitu anamnesis, dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien seperti ibu akan mengeluhkan payudara bengkak, terasa keras, ibu merasa demam

dan dirasakan pada hari ketiga setelah persalinan.

Kedua, yaitu akan didapatkan data objektif dengan melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhannya, pada pemeriksaan fisik ini akan dilakukan inspeksi dan palpasi pada payudara dan akan didapatkan hasil pemeriksaan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras dan nyeri bila ditekan. Ketiga yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pada kasus ini memungkinkan akan didapatkan hasil pemeriksaan dimana suhu tubuh bisa mencapai 38°C .

b. Langkah II. Identifikasi diagnosa/Masalah actual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan, sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Diagnosa bendungan ASI ditegakkan berdasarkan data subjektif dari pasien dan data objektif yang telah didapatkan, serta pada pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bendungan ASI ditegakkan jika didapatkan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras, nyeri bila ditekan, suhu tubuh bisa mencapai 38°C dan terjadi pada hari ke 3-5 setelah persalinan. Jika ibu mengalami bendungan ASI, ASI nya tidak keluar atau belum lancar, maka kemungkinan disebabkan oleh pengosongan mammae yang tidak sempurna, hisapan bayi yang tidak

aktif, posisi menyusui bayi yang tidak benar, puting susu terbenam, dan puting susu terlalu panjang.

c. Langkah III. Antisipasi diagnosa/Masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada kasus bendungan ASI, maka perlu dilakukan antisipasi terjadinya mastitis karena pada kasus ini, bendungan ASI merupakan gejala awal akan terjadinya mastitis dan jika tidak ditangani dengan baik kemungkinan akan terjadi mastitis, sehingga perlu untuk dilakukan antisipasi.

d. Langkah IV. Tindakan segera/kolaborasi

Pada langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Bidan menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera, melakukan konsultasi, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain berdasarkan kondisi klien, pada langkah ini bidan juga harus

merumuskan tindakan emergency untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan.

e. Langkah V. Rencana asuhan kebidanan

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya dan merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diadaptasi. Setiap rencana asuhan harus disertai oleh klien dan bidan agar dapat melaksanakan dengan efektif (Jannah, 2012: 208- 209).

Rencana asuhan yang akan dilakukan yaitu lakukan perawatan payudara, ajarkan teknik menyusui yang baik dan benar, sanggah payudara ibu dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, susukan bayi 2-3 jam sekali sesuai keinginan bayi (*on demand feeding*) dan pastikan bahwa perlekatan bayi dan payudara ibu sudah benar, pada masa-masa awal atau bila bayi yang menyusui tidak mampu mengosongkan payudara, mungkin diperlukan pompa atau pengeluaran ASI secara manual dari payudara, kompres dingin dengan es pada payudara setelah menyusui atau setelah payudara dipompa, bila perlu, berikan parasetamol 3X 500 mg per oral untuk mengurangi nyeri., lakukan evaluasi setelah 3 hari.

f. Langkah VI. Implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien (Jannah, 2012: 211).

g. Langkah VII. Evaluasi kebidanan

Mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan asuhan yang diberikan kepada klien. Pada tahap evaluasi ini bidan harus melakukan pengamatan dan observasi terhadap masalah yang dihadapi klien, apakah masalah diatasi seluruhnya, sebagian telah dipecahkan atau mungkin timbul masalah baru. Pada prinsipnya tahapan evaluasi adalah pengkajian kembali terhadap klien untuk menjawab pertanyaan sejauh mana tercapainya rencana yang dilakukan (Varney, 2008)

3. Pendokumentasian asuhan kebidanan

Pendokumentasian adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan yang mencatat tentang hasil pemeriksaan, prosedur pengobatan pada pasien dan pendidikan kepada pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Alur berfikir bidan dalam menghadapi klien meliputi 7 langkah. Untuk

mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berfikir sistematis di dokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu:

a. S: Subjektif

Menggambarkan dokumentasi hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney. Dimana akan didapatkan data subjektif dari pasien ibu akan mengeluh payudara bengkak, terasa panas, terasa keras, ibu merasa demam dan dirasakan pada hari ketiga setelah persalinan.

b. O: Objektif

Menggambarkan dokumentasi hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium, dan uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney. Pada pemeriksaan fisik akan dilakukan inspeksi dan palpasi pada payudara dan akan didapatkan hasil pemeriksaan payudara warnanya kemerahan, payudara bengkak, keras, dan nyeri apabila disentuh.

c. A: Assesment

Menggambarkan dokumentasi hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi:

Diagnosis/Masalah, diagnosa bendungan ASI ditegakkan berdasarkan data subjektif dan objektif yang telah didapatkan serta pada pemeriksaan fisik yang telah dilakukan. Bendungan ASI ditegakkan jika

didapatkan payudara warna kemerahan, payudara bengkak, nyeri, keras bila ditekan, dan suhu tubuh bisa mencapai 38C dan terjadi pada hari ke 3-5 hari setelah persalinan. Antisipasi diagnosis/ Kemungkinan Masalah, pada bendungan ASI perlu dilakukan antisipasi terjadinya mastitis karena pada kasus ini, bendungan ASI merupakan gejala awal akan terjadinya mastitis sehingga perlu dilakukan antisipasi. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi, dan atau perujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 varney pada kondisi yang di alami ibu yaitu bendungan ASI.

d. P: Planning

Menggambarkan dokumentasi tingkatan (I) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan pengkajian langkah 5, 6, dan 7 Varney. Pada kasus bendungan ASI dapat di lakukan perencanaan tindakan dengan melakukan kunjungan sebanyak 5 kali yaitu melakukan pendekatan kepada klien, menyampaikan kondisi yang dialami ibu bahwa ibu mengalami bendungan ASI mengobservasi tada-tanda vital, menganjurkan ibu menyusui bayinya secara on dement pada kedua payudara secara bergantian, memberikan penjelasan tentang cara mengatasi keluhan yang dirasakan, dan mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”
DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA
MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS

TAHUN 2022

No. Register : xxx

Tanggal Partus : 01 Agustus 2022, pukul 00.05 wita

Tanggal Pengkajian : 04 Agustus 2022, pukul 10.10 wita

Nama Pengkaji : Sulfiana

LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “S”

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SD / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh harian
Alamat : Jl. Monginsidi No.3

A. Keluhan utama

Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak.

B. Riwayat keluhan utama

Ibu mengatakan pulang dari puskesmas tanggal 04 agustus 2022 pukul 15.00 wita, ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 3 agustus 2022 pukul 06.00 wita. Ibu mengatakan ASI nya tidak lancar, dan cemas akan keadaannya.

C. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas

Ini merupakan persalinan pertama dan tidak pernah keguguran. Ibu melahirkan pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 00.05 wita, dengan jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 3100 gram, dan di tolong oleh bidan di puskesmas bara-baraya.

D. Riwayat kesehatan/penyakit yang lalu dan sekarang

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, dan diabetes mellitus, penyakit menular, dan ibu mengatakan tidak riwayat alergi terhadap makanan dan obat-obatan.

E. Riwayat reproduksi

Menarche	: 13 tahun
Siklus haid	: 28-30 hari
Lamanya haid	: 5-7 hari
Disminore	: tidak ada
Banyaknya	: 2 kali ganti pembalut/hari

F. Pola kebiasaan sehari-hari

1. Nutrisi

Selama hamil:

Ibu mengatakan makan 2-3 kali sehari, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan dan kadang-kadang buah, serta minum 7-8 gelas sehari dengan air putih, susu dan teh.

Selama nifas:

Ibu mengatakan sudah makan 1 kali, porsi sedang dengan nasi, sayur, ikan, buah dan minum 1 gelas air putih dan 1 gelas teh.

2. Personal hygiene

Selama hamil:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, keramas 2x seminggu dan ganti baju 2x sehari.

Selama nifas:

Ibu mandi 2x sehari, gosok gigi tiap kali selesai mandi, ganti baju 2x sehari, ganti baju 2x sehari dan ganti pembalut tiap 2x sehari.

3. Eliminasi

Selama hamil:

BAB: ibu BAB 1-2x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 6-7x sehari, warna urine kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada nyeri saat BAK.

Selama nifas:

BAB: ibu BAB 1x sehari, warna kuning kecoklatan, lunak dan tidak ada keluhan.

BAK: ibu BAK 4-5x sehari, warna kuning jernih, bau khas amoniak dan tidak ada rasa nyeri saat BAK.

4. Istirahat

Selama hamil:

Ibu mengatakan tidur siang 2-4 jam dan tidur malam 8 jam

Selama nifas:

Ibu mengatakan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 5-6 jam.

5. Keadaan psikologi

Ibu mengatakan merasa bahagia dan sangat senang dengan kelahiran anak pertamanya dalam keadaan sehat.

6. Menyusui/Laktasi

Tidak lancar, ibu tidak mengetahui cara menyusui yang benar, tidak mengetahui cara perawatan payudara.

7. Spiritual

Selama hamil:

Ibu mengatakan sering melewatkan shalat 5 waktu, ibu sesekali membaca Al-Qur'an.

Selama nifas:

Ibu mengetahui bahwa selama 40 hari masa nifas tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah dan setelah 40 hari ibu harus mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah.

G. Riwayat psikosial, ekonomi, dan spiritual

1. Suami maupun keluarga merasa senang dengan kelahiran anak pertamanya.
2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.
3. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga dibantu oleh keluarga.
4. Ibu dan keluarga beragama islam dan taat menjalankan ibadah.
5. Hubungan keluarga dan tetangga
6. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

H. Pemeriksaan fisik

1. Pemeriksaan umum

Kedaaan umum : baik

Kesadaran : composmentis

2. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 83x/ menit

Suhu badan : 37,°C

Pernafasan : 22x/ menit

3. Pemeriksaan *head to toe*

a. Kepala

Kulit kepala bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan.

b. Wajah

Ibu tampak meringis dan lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan.

c. Mata

Konjungtiva merah muda, tidak icterus

d. Hidung

Simetris kiri dan kanan tidak ada pengeluaran secret

e. Mulut/gigi

Mulut tampak bersih, tidak ada karies

f. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

g. Payudara

Pada payudara sebelah kiri tampak normal dan Pada payudara sebelah kanan ibu tampak tegang, putting susu menonjol, hiperpigmentasi pada aroela mammae, teraba keras, tampak bengkak, dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi.

h. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, line nigra, TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari dibawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah.

i. Genitalia

Tampak lochea rubra, tidak ada luka jahitan, vagina tidak berbau amis, dan tidak ada varises.

j. Ekstremitas

Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises.

LANGKAH II. MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa: Ny "N" P1 A0 post parum hari keempat dengan payudara sebelah kanan mengalami bendungan ASI.

Masalah Aktual: Bendungan ASI

1. Post partum hari keempat

Data subjektif:

Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 01 agustus 2022 pukul 00.05

Data objektif:

Pada pemeriksaan fisik di dapatkann TFU 3 jari dibawah pusat, tampak pengeluaran lokia rubra.

Analisa dan interpretasi data:

Lokia adalah ekskresi cairan Rahim selama masa nifas. Lochea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus. Lokia mempunyai reaksi ba/alkalis yang dapat membuat organisme yang berkembang lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal (Ambarwati, 2008).

2. Bendungan ASI

Data subjektif:

Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, nyeri dan keras sejak tanggal 3 agustus 2022, pukul 06.00 Wita.

Data objektif:

Dari pemeriksaan fisik, tampak payudara sebelah kanan tampak bengkak, teraba keras pada saat palpasi, dan terdapat nyeri tekan.

Analisa dan interpretasi data:

Bendungan ASI adalah bendungan yang terjadi pada kelenjar payudara oleh karena ekspansi dan tekanan dari produksi dan penampungan ASI. Bendungan ASI terjadi pada hari ke-3 sampai 5 setelah persalinan (Kemenkes RI, 2013).

LANGKAH III. MERUMUSKAN DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Potensial terjadi Mastitis.

LANGKAH IV. IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA DAN KOLABORASI

Tidak ada data yang mendukung perlunya dilakukan tindakan segera.

LANGKAH V. RENCANA ASUHAN KEBIDANAN

1. Tujuan

- a. Bendungan ASI dapat teratasi
- b. Mengetahui cara menyusui yang benar dan perawatan payudara
- c. Bayinya dapat menyusui pada ibunya dengan baik
- d. Involusi uterus berlansung normal
- e. Tidak terjadi mastitis.

2. Kriteria keberhasilan

- a. Bendungan ASI teratasi
- b. Payudara ibu tidak bengkak, dan sakit lagi
- c. Ibu dapat menyusui bayinya dengan benar
- d. Ibu dapat menyusui bayinya secara *on demand*
- e. Penurunan TFU dari setinggi pusat hingga normal
- f. Tanda-tanda vital dalam batas normal

Tekanan darah : sistole 100-120 mmHg

Diastole 70-90 mmHg

Nadi : 80-90x/ menit

Suhu : 36 - 37°C

Pernapasan : 12-20x/ menit

3. Rencana asuhan

Tanggal 4 agustus 2022 pukul 10.15 wita

- a. Sampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI.

Rasional : dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan anjuran petugas kesehatan.

- b. Observasi tanda-tanda vital

Rasional: tanda-tanda vital dapat memberikan gambaran dalam menentukan tindakan selanjutnya.

- c. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* di kedua payudara secara bergantian.

Rasional: agar nutrisi bayi dapat tercukupi dan tidak terjadi penampungan ASI yang berlebihan.

- d. Berikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- 1) Menyangga payudara dengan bebat atau bra yang pas
- 2) Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
- 3) Urut payudara dari arah pangkal menuju puting
- 4) Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi

lunak

Rasional: dengan menjelaskan cara mengatasi keluhan kepada ibu, ibu tidak akan terlalu merasakan keluhan yang dialami dan akan membantu petugas kesehatan dalam proses penyembuhan.

- e. Ajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara
- 1) Tempatkan kedua tangan diantara kedua payudara kemudian urut keatas lalu kesamping kemudian urut kebawah hingga tangan menyanggah payudara kemudian sentakkan kebawah payudara secara perlahan.
 - 2) Telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan saling dirapatkan, kemudian sisi keliling tangan kanan mengurut payudara dari pangkal kearah puting, demikian pula payudara kanan.
 - 3) Telapak tangan menopang payudara pada cara ke-2 kemudian jari tangan kanan dikepalkan lalu buku-buku jari tangan kanan mengurut dari pangkal kearah puting.

Rasional: dengan melakukan perawatan payudara dapat meningkatkan produksi ASI dan dapat mempercepat proses pengosongan saluran dan kelenjar susu sehingga ASI menjadi lancar.

- f. Anjurkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar
- 1) Usahakan pada saat menyusui ibu dalam keadaan tenang
 - 2) Memasukkan semua areolla mammae kedalam mulut bayi
 - 3) Ibu dapat menyusui dengan cara duduk atau berbaring sesuai kenyamanan dengan santai dan dapat menggunakan sandaran (bantal) pada punggung

- 4) Payudara dipegang dengan ibu jari diatas, jari yang lain menopang dibawah payudara.
- 5) Berikan asi pada bayi secara teratur dengan selang waktu 2-3 jam atau dengan cara *on demand*. Setelah salah satu payudara mulai terasa kosong, sebaiknya ganti pada payudara yang satunya.
- 6) Setelah selesai menyusui oleskan asi kepayudara, biarkan kering sebelum kembali memakai bra, langkah ini berguna untuk mencegah lecet pada puting.
- 7) Sendawakan bayi tiap kali habis menyusui untuk mengeluarkan udara dari lambung bayi agar bayi tidak kembung dan muntah.

Rasional: bayi akan tampak tenang karena mudah menghisap ASI, pemenuhan nutrisi bayi cukup dan mencegah terjadinya puting susu lecet dan tidak terasa nyeri.

- g. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Rasional: dengan mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi akan dapat memperbanyak dan memperlancar ASI misalnya daun katub, bayam dan lain lain.

- h. Berikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral

Rasional: Paracetamol adalah salah satu obat yang masuk ke dalam golongan analgesik (peredam nyeri).

- i. Anjurkan ibu untuk menjaga personal hygienya dan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua

payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Rasional: dengan rajin mencuci tangan dan membersihkan payudaranya, hal ini akan membuat payudara ibu terhindar dari invasi bakteri yang dapat menyebabkan mastitis.

- j. Anjurkan ibu untuk banyak berzikir dan berdoa atas keadaannya sekarang

Rasional: agar ibu lebih tenang dan tidak cemas dengan keadaannya

- k. Lakukan Pendokumentasian

Rasional: pencatatan yang baik dapat menjadi pegangan petugas jika terjadi sesuatu pada pasien.

LANGKAH VI. IMPLEMENTASI ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 Agustus 2022

pukul 11.20 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI.

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg

Nadi 83x/menit

Suhu 37⁰C

Pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* di kedua payudara secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:
 - a. Menyangga payudara dengan bebat atau bra yang pas.
 - b. Kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit.
 - c. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting.
 - d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

6. Mengajarkan ibu tehnik dan posisi menyusui yang baik dan benar.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral

Hasil: obat telah di berikan

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum dan sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu untuk banyak berzikir dan berdoaatas keadaannya sekarang.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

11. Melakukan pendokumentasian.

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

LANGKAH VII. EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal 4 agustus 2022

pukul 11.25 wita

1. Bendungan ASI telah teratasi
2. Bayi menyusu pada ibunya dengan baik
3. Involusi uterus berlansung normal
4. Ibu dalam keadaan baik
5. Tanda-tanda vital dalam batas normal
6. Ibu rajin berzikir dan berdoa untuk kesembuhannya.



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”

DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA

MAKASSAR TANGGAL 04 – 24 AGUSTUS

TAHUN 2022

No. Register : xxx

Tanggal partus : 01 Agustus 2022 pukul 00.05 wita

Tanggal pengkajian : 04 Agustus 2022 pukul 10.10 wita

Nama pengkaji : Sulfiana

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “S”

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jl. Monginsidi No.37

Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya terasa bengkak, nyeri dan terasa keras sejak tanggal 03 agustus 2022 pukul 06.00 wita.
2. Ibu mengatakan melahirkan pada tanggal 01 agustus 2022 pukul 00.05 wita.
3. Ibu mengatakan merasa cemas dengan keadaannya.

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 83x/ menit

Suhu : 37°C

Pernapasan : 22x/ menit


4. Pemeriksaan fisik

- a. Kepala

Kulit kepala bersih, tidak rontok, tidak ada benjolan sekitar kepala, tidak ada nyeri tekan.

- b. Wajah

Ibu tampak meringis dan lemas, tidak ada cloasma gravidarum, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan.



c. Mata

Konjungtiva merah muda, tidak icterus

d. Hidung

Simetris kiri dan kanan tidak ada pengeluaran secret

e. Mulut/gigi

Mulut tampak bersih, tidak ada karies

f. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, dan vena jugularis

g. Payudara

Pada payudara sebelah kiri tampak normal dan payudara sebelah kanan ibu tampak putting susu menonjol, hiperpigmentasi pada aroela mammae, tampak bengkak, teraba keras, panas, dan terasa nyeri, ketika dilakukan palpasi.

h. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tampak striae alba, line nigra, TFU (Tinggi Fundus Uteri) 3 jari dibawah pusat, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah.

i. Genitalia

Tampak lochea rubra, tidak ada luka jahitan, vagina tidak berbau amis, dan tidak ada varises.

j. Ekstremitas

Tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan, dan tidak ada varises.

Assessment (A)

Ny “N” P1 A0 Post partum hari ke empat dengan payudara sebelah kanan mengalami bendungan ASI.

Planning (P)

Tanggal 4 agustus 2022

pukul 15.05 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI.

Hasil: ibu telah mengetahui tentang kondisinya sekarang

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 82x/menit, suhu 37⁰C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* di kedua payudaranya secara bergantian.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti:

- a. Menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas
- b. Kompres payudar dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit
- c. Urut payudara dari arah pangkal menuju putting
- d. Keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga putting menjadi lunak

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Memberikan terapi obat paracetamol 500 mg 3x1 per oral.

Hasil: obat telah diberikan

9. Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan jika ingin melakukan sesuatu ataupun setelah melakukan sesuatu.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

10. Menganjurkan ibu untuk rajin berzikir dan berdoa untuk kesembuhannya.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

11. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”**DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA****MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS****TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal pengkajian : 09 Agustus 2022 pukul 14.40 wita

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “S”

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jl. Monginsidi No.37



Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya masih bengkak dan nyeri
2. Ibu mengatakan sudah mulai mengetahui cara menyusui yang benar
3. Ibu mengatakan masih cemas dengan keadaannya

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 83x/menit

Suhu badan : 36,8°C

Pernapasan : 22x/menit

4. Payudara


Payudara kanan masih tampak, bengkak, dan masih nyeri saat di palpasi, pengeluaran ASI masih sedikit.

5. Abdomen

TFU pertengahan pusat symphysis, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah.

6. Genitalia

Tampak pengeluaran lokia sanguilenta.



Assessment (A)

Ny "N" post partum hari ke 8 dengan bendungan ASI.

Planning (P)

Tanggal 8 Agustus 2022

pukul 14.45 wita

1. Menyampaikan kepada ibu tentang kondisi yang di alami sekarang bahwa ibu masih mengalami bendungan ASI.

Hasil: ibu mengerti dengan apa yang disampaikan.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital

Hasil: tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 83x/menit, suhu 36,8°C, pernapasan 22x/menit.

3. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu tetap melakukan perawatan payudara

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk tetap meminum obat yang telah diberikan.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

8. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan rajin mencuci tangan setiap akan melakukan sesuatu ataupun selesai melakukan sesuatu dan rajin membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui bayinya.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk tetap banyak berdo'a dan berzikir.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

10. Melakukan pendokumentasian.

Hasil: telah di lakukan pendokumentasian



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”**DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA****MAKASSAR TANGGAL 04 – 24 AGUSTUS****TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal pengkajian : 14 Agustus 2022 pukul 10.20 wita

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “S”

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jl. Monginsidi No.37



Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya masih sedikit bengkak dan nyeri
2. Ibu mengatakan sudah mulai mengetahui cara menyusui yang benar
3. Ibu mengatakan ASInya belum terlalu lancar keluar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 83x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 22x/menit

4. Payudara

Pembengkakan pada payudara sudah berkurang, dan masih sedikit nyeri bila dipalpasi, pengeluaran ASI sudah mulai banyak.

5. Abdomen

TFU tidak teraba, tidak ada nyeri tekan pada perut bagian bawah.

6. Genitalia

Tampak pengeluaran lokia alba

Assessment (A)

Ny "N" post partum hari ke 13 dengan bendungan ASI.

Planning (P)

Tanggal 15 agustus 2022

pukul 10.25 wita

1. Memberitahu ibu tentang pemeriksaan ttv dalam batas normal

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

2. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara *on demand*.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

3. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan setiap akan melakukan sesuatu ataupun sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan kedua payudara sebelum dan sesudah menyusui.

6. Menganjurkan ibu untuk tetap banyak berdoa dan berzikir.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Melakukan pendokumentasian.

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY “N”**DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA****MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS****TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal pengkajian : 19 Agustus 2022 pukul 11.30 wita

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny “N” / Tn “S”

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ± 1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jl. Monginsidi No.37



Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan bengkak dan nyeri pada payudara sudah mulai mereda
2. Ibu mengatakan sudah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar
3. Ibu mengatakan bayinya sudah aktif menyusu
4. Ibu mengatakan ASI nya sudah mulai lancar keluar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/80 mmHg

Nadi : 83x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 22x/menit

**Assessment (A)**

Ny "N" post partum hari ke 18 dengan riwayat bendungan ASI.

Planning (P)

Tanggal 22 agustus 2022

pukul 11.35 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa senang dengan keadaannya yang sekarang.

2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah mulai membaik.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang.

3. Mengingatkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa pendamping ASI apapun.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk tetap berdzikir dan berdoa kepada Allah Swt.

Hasil: Ibu bersedia melakukannya

6. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian



MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL PADA NY "N"**DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA****MAKASSAR TANGGAL 04 - 24 AGUSTUS****TAHUN 2022**

No. Register : xxx

Tanggal pengkajian : 24 Agustus 2022 pukul 15.05 wita

Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "N" / Tn "S"

Umur : 19 tahun / 22 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / ±1 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SD

Pekerjaan : IRT / Buruh harian

Alamat : Jl. Monginsidi No.37



Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan payudaranya sudah tidak bengkak dan nyeri lagi
2. Ibu mengatakan sudah mengetahui cara menyusui yang baik dan benar
3. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar

Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 100/80 mmHg

Nadi : 83x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernapasan : 22x/menit

Assessment (A)

Ny "N" post partum hari ke 22 dengan riwayat bendungan ASI.

Planning (P)

Tanggal 22 Agustus 2022

pukul 15.10 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan merasa senang dengan keadaannya yang sekarang.

2. Menyampaikan kondisi ibu bahwa keadaannya sudah mebaik dan keadaan payudaranya sudah sembuh.

Hasil: ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan ibu merasa senang.

3. Mengingatkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa pendamping ASI apapun.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

5. Memberitahu ibu dan suami bahwa pada hari ke-40 masa nifas sudah bisa melakukan hubungan seksual.

Hasil: ibu dan suami telah mengerti

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mendekati diri kepada Allah Swt.

Hasil: ibu bersedia melakukannya

7. Menjelaskan Imunisasi dasar lengkap wajib diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun

- a. Umur bayi < 7 hari jenis imunisasi Hepatitis B (HB) 0 untuk mencegah penularan hepatitis B dan kerusakan hati.

- b. Umur bayi 1 bulan jenis imunisasi BCG Polio 1 untuk mencegah penularan tuberculosis dan polio.

- c. Umur bayi 2 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 1 polio 2 untuk mencegah

polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hipertensi B, meningitis, dan pneumonia.

- d. Umur bayi 3 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 2 polio 3 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia.
- e. Umur bayi 4 bulan jenis imunisasi DPT-HB-Hib 3 polio 4 untuk mencegah polio, difteri, batuk rejan, tetanus, hepatitis B, meningitis, dan pneumonia.
- f. Umur bayi 9 bulan jenis imunisasi Campak untuk mencegah campak.

8. Melakukan pendokumentasian

Hasil: telah dilakukan pendokumentasian



BAB IV

PEMBAHASAN

Dengan tujuh langkah varney yaitu, pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosa/masalah actual, merumuskan diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditujukan untuk pengumpulan informasi baik fisik, psikososial dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data-data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang/laboratorium (Nurhayati, dkk, 2013).

Pengkajian data dasar pada kasus bendungan ASI ini dilakukan pada saat pengamatan pertama kali di puskesmas. Pengkajian meliputi anamnesa langsung oleh pasien. Pengkajian ini berupa identitas klien, keluhan pasien, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas ibu, riwayat kesehatan, riwayat reproduksi, riwayat keluarga berencana, dan riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pengkajian data objektif diperoleh melalui pemeriksaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Pengkajian pada kasus ini dilanjutkan pada pendokumentasian asuhan kebidanan. Pengkajian meliputi anamnesa langsung kepada pasien, ibu

mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri, dan terasa keras sejak tanggal 3 agustus 2022 pukul 06.00 wita. Ibu mengatakan tidak tau cara dan teknik menyusui yang benar. Ini merupakan persalinan pertama dan tidak pernah keguguran, ibu melahirkan di puskesmas bara-baraya pada tanggal 1 agustus 2022 pukul 00.05 wita. Dengan jenis kelamin perempuan berat badan lahir 3100 gram, dan ditolong oleh bidan. Ibu tidak ada riwayat penyakit menular. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 83x/menit, suhu 37°C, pernapasan 22x/menit.

Bendungan asi adalah suatu kejadian dimana aliran vena dan limfatik, aliran susu menjadi terhambat dan tekanan pada saluran air susu ibu dan alveoli meningkat. Kejadian ini biasanya disebabkan karena air susu yang terkumpul tidak dikeluarkan sehingga menjadi sumbatan (Taqiyah, 2019: 99).

Tanda dan gejala terjadinya bendungan asi ditandai dengan mammae panas serta keras pada perabaan dan terasa nyeri, putting susu mendatar sehingga bayi sulit menyusui, pengeluaran asi terkadang terhalang oleh duktus laktiferi menyempit, payudara bengkak, keras, panas, warnanya kemerahan, suhu tubuh sampai 38°C (Rukiyah 2012: 22).

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan bendungan asi, yaitu pengosongan mammae yang tidak sempurna dalam masa laktasi, terjadi peningkatan produksi asi ibu yang berlebihan. Apabila bayi sudah kenyang dan selesai menyusui payudara tidak dikosongkan, maka masih terdapat sisa asi, faktor posisi menyusui bayi yang tidak

benar teknik yang salah dalam menyusui dapat mengakibatkan putting susu menjadi lecet dan menimbulkan rasa nyeri pada saat bayi menyusui. (Walyani, 2015: 1).

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada kasus bendungan ASI. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi diagnose atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Hasil pengkajian data subjektif dan data objektif yang diperoleh menunjukkan diagnosa Ny "N" Post partum hari ketiga dengan bendungan ASI.

Ibu melahirkan pada tanggal 1 agustus 2022 pukul 00.05 wita. Pada pemeriksaan fisik ditemukan TFU 2 jrbpst, tampak pengeluaran lochea rubra pada jalan lahir ibu. Ibu mengeluh payudaranya terasa bengkak, nyeri, dan terasa keras sejak tanggal 3 agustus 2022 pukul 06.00 wita, ibu mengatakan suhu badannya agak panas dan ibu mengatakan ASI nya belum lancar, dan ibu juga mengatakan dia tidak tau cara dan teknik menyusui yang benar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan payudara ibu tampak bengkak, keras, dan terasa nyeri ketika dilakukan palpasi. Menurut Syamson 2017, Bendungan ASI adalah ASI yang tidak segera dikeluarkan yang menyebabkan penyumbatan pada aliran susu menjadi terhambat dan tertekan kesaluran air susu ibu

sehingga terjadinya peningkatan aliran vena dan limfe yang menyebabkan payudara bengkak.

Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini, kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Identifikasi diagnosis potensial yaitu mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi (Manguji, dkk, 2013). Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien, bidan diharapkan bersiap-siap bila diagnosis/masalah potensial ini benar-benar terjadi dan dilakukan asuhan yang aman.

Bendungan ASI berpotensi terjadi mastitis, statis pada pembuluh limfe akan mengakibatkan tekanan intraduktal yang akan mempengaruhi berbagai segmen pada payudara sehingga tekanan seluruh payudara meningkat akibatnya, payudara sering terasa penuh, tegang, dan nyeri. Terlihat kalang payudara lebih besar sehingga sukar dihisap oleh bayi. Bendungan ASI yang tidak disusukan secara adekuat akhirnya terjadi mastitis. (Ardyan, 2014: 7). Bendungan ASI juga berpotensi membuat ibu tidak mau menyusui bayinya karena akan merasa sakit pada payudaranya pada saat menyusui sehingga nutrisi bayi tidak tercukupi

Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi

Tindakan segera atau kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi

dengan tenaga kesehatan yang ahli dibidangnya. Berdasarkan kasus ini, tidak ada data yang mendukung perlunya tindakan segera.

Langkah V: Perencanaan Asuhan Kebidanan

Langkah ini merupakan lanjutan manajemen asuhan kebidanan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Suatu rencana tindakan harus disetujui pasien dan bidan agar lebih efektif. Semua keputusan yang dibuat dalam merencanakan suatu asuhan yang komprehensif harus merefleksikan alasan yang benar berlandaskan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru, serta telah divalidasi dengan keinginan atau kebutuhan pasien. Rencana asuhan disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan pencegahan masalah/diagnosa potensial. Membuat rencana tindakan asuhan kebidanan hendaknya menentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan dan terdapat sasaran target serta hasil yang akan dicapai dalam penerapan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus (Nurhayati, dkk, 2013).

Adapun sasaran/target dalam rencana asuhan pada kasus ini berfokus untuk mencegah terjadinya komplikasi pada ibu dengan penanganan yang cepat dan tepat serta payudara ibu kembali normal. Bila diagnosis bendungan ASI ditegakkan rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu hasil pemeriksaan, diskusikan penyebab dan penatalaksanaannya, rekomendasikan untuk segera diintervensi.

Pada tempat pengambilan kasus yaitu di puskesmas Bara-baraya Makassar, ibu nifas diberikan penjelasan mengenai pentingnya perawatan payudara, teknik

menyusui yang baik dan benar , dan menyusui bayinya tanpa dijadwal atau secara *on demand* untuk mencegah terjadinya bendungan ASI.

Rencana tindakan yang telah disusun yaitu menyampaikan kepada ibu tentang kondisinya sekarang bahwa ibu mengalami bendungan ASI, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand* dikedua payudaranya secara bergantian, memberikan penjelasan kepada ibu cara mengatasi keluhan yang dirasakan seperti; menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan kain basah/hangat selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan kepada ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik dan posisi menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi, menganjurkan ibu untuk tetap memperhatikan personal hygienya.

Perawatan payudara merupakan upaya untuk merangsang sekresi hormon oksitosin untuk menghasilkan ASI sedini mungkin dan memegang peranan penting dalam menghadapi masalah menyusui. Teknik pijatan dan rangsangan pada puting susu yang dilakukan pada perawatan payudara merupakan latihan semacam efek hisapan bayi sebagai pemicu pengeluaran ASI (Sari, 2014: 6). Pembengkakan payudara terjadi karena ASI tidak disusu dengan adekuat dan posisi bayi pada payudara saat menyusu salah. Sehingga hal ini akan menyebabkan puting susu lecet

dan ASI tidak keluar optimal sehingga terjadi pembendungan air susu pada payudara yang selanjutnya dapat menyebabkan pembengkakan.

Langkah VI: Implementasi

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan ataupun bekerja sama dengan kesehatan lain. Bidan harus melakukan implementasi yang efisien dan akan mengurangi waktu perawatan serta akan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan klien (Jannah, 2012: 211).

Pada studi kasus Ny “N” dengan bendungan ASI, semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Pemantauan pertama yang dilakukan di rumah pasien, mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, menjelaskan pada ibu cara mengatasi keluhannya seperti; menyanggah payudara dengan bebat atau bra yang pas, kompres payudara dengan menggunakan air hangat selama 5 menit, urut payudara dari arah pangkal menuju puting, keluarkan ASI dari bagian depan payudara sehingga puting menjadi lunak, mengajarkan ibu cara melakukan perawatan payudara, mengajarkan ibu teknik menyusui yang baik dan benar, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan yang bergizi serta mengajarkan ibu untuk menjaga personal hygienya, menganjurkan ibu untuk terus berdoa dan berzikir untuk kesembuhannya, dan memberikan terapi obat seperti paracetamol 500 mg 3x1 per oral.

Pada pemantauan kedua, asuhan yang diberikan mengobservasi tanda-tanda vital, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara *on demand*, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi sayuran hijau dan makanan bergizi, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya, menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygienya, menganjurkan ibu untuk tetap berdoa dan berzikir untuk kesembuhannya, dan menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

Pemantauan ketiga, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang kondisinya sekarang, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara *on demand*, menganjurkan ibu untuk tetap melakukan perawatan payudara, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene, dan menganjurkan dan menganjurkan ibu untuk tetap berdoa dan berzikir.

Pemantauan keempat, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang kondisinya saat ini bahwa keadaan ibu sudah mulai membaik, menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya selama 6 bulan tanpa pendamping ASI, menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygiene, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, dan menganjurkan ibu untuk tetap berzikir dan berdoa kepada Allah Swt.

Pemantauan kelima, asuhan yang diberikan memberitahu ibu tentang kondisinya saat ini bahwa keadaan payudara ibu sudah sembuh, menganjurkan ibu

untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan, menganjurkan ibu untuk tetap menjaga personal hygienya dengan rajin mencuci tangan baik sebelum atau sesudah melakukan sesuatu dan membersihkan payudara sebelum atau sesudah menyusui, ibu mengerti dengan yang dijelaskan dan akan melakukan apa yang dianjurkan.

Dalam tahap ini penulis melakukan asuhan kebidanan sebanyak 5 kali kunjungan 1 hari di puskesmas bara-baraya dan 4 hari dirumah klien. Berdasarkan perencanaan yang telah disusun sesuai kebutuhan klien, sehingga tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan kasus yang ada.

Langkah VII: Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, membandingkan data yang dikumpulkan dengan kriteria yang diidentifikasi, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Proses evaluasi merupakan langkah dari proses manajemen asuhan kebidanan pada tahap ini penulis tidak mendapatkan permasalahan atau kesenjangan pada evaluasi menunjukkan masalah teratasi tanpa adanya komplikasi. Hasil evaluasi setelah melakukan asuhan kebidanan selama 1 hari di puskesmas dan 4 hari di rumah klien. Ibu tidak mengalami komplikasi, bendungan ASI telah teratasi yang ditandai dengan keadaan payudara ibu telah normal dan bayi telah menyusu dengan baik. Keberhasilan asuhan ini juga ditandai dengan pemahaman ibu mengenai cara dan

teknik menyusui yang baik dan benar, cara melakukan perawatan payudara serta menyusui bayinya secara *on demand*. Kondisi kesehatan ibu yang sudah membaik dimana bendungan ASI tidak menjadi mastitis . Semua data hingga penatalaksanaan didokumentasikan oleh puskesmas dan peneliti.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses Manajemen Asuhan Kebidanan yang diterapkan pada Ny “N” Post Partum Hari Kedua dengan bendungan ASI cukup berhasil dan efektif.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui kasus Ny “N” dengan Bendungan ASI di Puskesmas Bara-baraya Makassar Tanggal 04 Agustus 2022, maka pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan referensi maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, factor penyebab dan berbagai referensi tentang ibu nifas dengan bendungan asi. Dari referensi didapatkan bendungan asi ditandainya dengan mammae bengkak, keras serta nyeri saat dilakukan palpasi dan ketidaktahuan ibu tentang posisi menyusui yang benar dan perawatan payudara.faktor yang didapatkan yaitu factor dari ibu maupun factor dari bayi itu sendiri.
2. Untuk mengetahui diagnosis bendungan asi yaitu dari data subjektif dan objektif. Data subjektif yang didapatkan payudara ibu terasa bengkak, nyeri dan terasa keras. Data objektif yang didapatkan yaitu payudara sebelah kanan tampak bengkak, teraba keras dan terasa nyeri saat dilakukan palpasi.
3. Perumusan masalah potensial pada Ny “N” dengan bendungan asi berpotensi terjadinya mastitis. Namun masalah potensial itu tidak akan terjadi apabila penanganan lebih cepat. Kasus yang didapatkan pada Ny “N” tidak

didapatkan tanda-tanda terjadinya masalah potensial.

4. Hasil identifikasi tidak didapatkan data perlunya tindakan segera/kolaborasi pada kasus Ny “N” dengan bendungan asi, dengan hasil bahwa kasus ini tidak ada data yang mendukung adanya tindakan segera.
5. Rencana tindakan pada kasus post partum dengan bendungan asi yaitu melakukan perawatan payudara dan mengajarkan ibu teknik dan cara menyusui yang baik dan benar serta pemberian antibiotik.
6. Asuhan telah diberikan pada Ny “N” dengan bendungan asi, dengan hasil yaitu asuhan yang telah diberikan ditandai dengan hasil yaitu semua tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya hambatan. Adapun asuhan yang diberikan pada Ny “N” yaitu melakukan komunikasi terapeutik.
7. Tindakan evaluasi pada kasus post partum dengan bendungan asi untuk mengetahui keadaan pasien dengan maksimal serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi. Kondisi klien baik dan tidak mengalami komplikasi serta kembali normal.

B. Saran

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus peneliti memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Untuk klien

- a. Mengajukan kepada ibu agar mengkonsumsi makanan yang bergizi disamping selalu melakukan perawatan payudara untuk mencegah terjadinya bendungan ASI.
- b. Mengajukan agar setiap ibu post partum selalu menyusui bayinya secara *on demand* agar tidak terjadi bendungan ASI.
- c. Mengerti dan Melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

2. Untuk bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.

3. Untuk institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan professional.

4. Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai Bendungan Asi pada aspek yang lebih luas dengan metode yang lebih dalam menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Aulya, Y & Supriaten, Y. *pengaruh Perawatan Payudara Terhadap Bendungan Asi Pada Ibu Nifas*. Jurnal Menara Medika. 2021 (diakses tanggal 2 maret 2022)
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan As Suyuti. Tafsir Jalalain, Terj. Bahrun Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007
- Aiyeyeh Rukiah. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Jakarta: Bina Pustaka. 2016
- Anggraini, Yetti. *Asuhan Masa nifas*. Yogyakarta: Pustaka Rihanna. 2010
- Astutik Reni Yuli. *Payudara Dan Laktasi*. Kediri: Salemba Medika. 2014
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017*. Jakarta: BPS. 2017
- Calara Ega Ayu Rutina, Lisna Anisa Fitriana. *Gambaran Bendungan Asi Pada Ibu Nifas Dengan Seksio Sesarea Berdasarkan Karakteristik Di RS SariningsihBandung*. https://scolar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Fitriana+bendungan&oq=#d=gs_qabs&t=165899554631&u=%23p%3DXHU8WPnMrosJ (diakses tanggal 28 juli 2022)
- Depkes RI. *Panduan Manajemen Laktasi: Diet Gizi Masyarakat*. Jakarta: Depkes RI. 2017
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2010, 343
- Dewi Anggraini, D. M. H. N. S. *Konsep Kebidanan Memahami Dasar-Dasar Konsep Kebidanan (Issue 1)*. Yayasan Kita Menulis. 2020
- Elvira, D & Panjaitan, A.A. *Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Nifas Dengan Sikap Dalam Melakukan Perawatan Payudara di Rumah Sakit Kartika Husada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017*. Jurnal Kebidanan, 7(1), 55- 62. 2017
- <https://2e.mindsmachine.com/figures/08/08.09.html> (diakses tanggal 2 maret 2022)

<https://www.praborinilactationteam.com/2017/11/11/mastitis-dan-abses-payudara/>

(diakses tanggal 28 juni 2022)

Jannah, Nurul. *Buku Ajar Kebidanan : Kehamilan*. Jakarta: Yayasan Andi. 2012

Kemendes RI. *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi pertama*. Jakarta: kemendes RI. 2013

Kementrian Kesehatan Republik Indonesi. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2105*. (D. Budjianto, Yudianto, B. Hardhana, & T.A. soenardi, Eds). Jakarta: Kementrian Kesehatan. 2016

Kementrian Agama RI. 2010

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah, Cet. V*. Jakarta: Lenetra Hati. 2012

Meriem Meisyaroh Syamson, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Bendungan Asi Pada Ibu Menyusui Di RSUD Nene Malloko Kabupaten Sidrap*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan pencerahan*.2017 (diakses tanggal 2 maret 2022)

Maritalia Dewi. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014

Mansyur Nurliana & Dahlan Kasrida. A. *Buku ajar Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Malang: Selaksa. 2014

Manuaba. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan & Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC. 2010

Maryuni Anik. *Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media. 2010

Mangkuji, dkk. *Asuhan Kebidananan 7 Langkah Soap*. Jakarta: EGC. 2012

Munawaroh Siti Faidatun, Herniyatun, Kusumastuti. *Gambaran Kejadian Bendungan Asi Pada Ibu Nifas Di RS PKU Muhammadiyah Gombang*. 2019

<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/765> Prodi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombang. (diakses tanggal 28 juli 2022)

Nurhayati, dkk. *Konsep Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. 2013

Prawirohardjo, Sarwono. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Maternal dan Nasional*. Jakarta: yayasan Bina Pustaka. 2009

Purwoatuti, Walyani. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Dalam Kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015

Rukiyah, Yulianti. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta: Trans Info Media. 2012 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. Jakarta: Lentera Hati. 2003

Riskesdes. *Situasi Balita Pendek*. Kemenkes RI. 2016

Rutiani Clara Ega Ayu, Fitriana Lisna Anisa. *Gambaran Bendunga ASI Pada Ibu Nifas Dengan Seksio Sesare Berdasarkan Karakteristik di Rumah Sakit SariningsihBandung*. 2018 <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPKI/article/view/4750> Prodi DIII Keperawatan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia. (diakses tanggal 2 Maret 2022)

Rini Susilo dan Kumala Feti. *Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice*. Yogyakarta: Depublish. 2016

Rukiyah, Yulianti. *Asuhan Kebidanan Patologi*. Jakarta: Trans Info Media. 2012

Sari Mustika Surya. *Hubungan Pengetahuan Ibu Post Partum Tentang Breast Care Dengan Kejadian Bendungan ASI Pada Ibu Post Partum*. Vol.6 No 1 (2014). Diakses tanggal 28 november 2022.

Sutanto,A. V. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru. 2018

Sulfianti, dkk. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2021


Sarwono Prawiroharjo. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina Sarwono Prawihardjo. 2009

Varney, Halen, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Volume 2 Edisi 4*. Jakarta: EGC. 2008

WHO (World Health Organization). *World Health Statistics*. 2017

Walyani Elisabeth Siwi. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas & Menyusui*. Jakarta: Pustaka Baru Press. 2015

Yuliana Wahida dan Hakim Nul Bawon. *Emodemo Dalam Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2020



L

A



A

N

DOKUMENTASI



Kunjungan I



Kunjungan 2



Kunjungan 3



Kunjungan 4





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

ALA UDDIN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3257 Un.06-FKIK/PP.00.9/07/ 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 27 Juli 2022

Yth. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sulfiana
N I M : 70400119030
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : Parangloe

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

“Manajemen Asuhan Kebidanan Keluarga Berkelanjutan Pada Ibu Post Natal Dengan Bendungan ASI di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tahun 2022.”

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Anieq Mumth'ah Al Kautzar, S.ST.,M.Keb.
2. Ferawati Taherong, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Bara-Baraya terhitung mulai tanggal 1 Agustus – 31 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 6475/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3335/UN.06-FKIK/PP.00.9/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: SULFIANA
Nomor Pokok	: 70400119030
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA IBU POST NATAL DENGAN
BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 s/d 31 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Peringgal*.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 01 Agustus 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di –
MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ (002-11/BKBP/VIII/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 6475/S.01/PTSP/2022 Tanggal 29 Juli 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **SULFIANA**
NIM / Jurusan : 70400119030 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan: **01 s/d 31 Agustus 2022**
Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah
Alamat : **Jl. H.M.Yasin Limpo No. 56 Romang Polong Gowa**
Judul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN PADA IBU POST NATAL DENGAN BENDUNGAN ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL.



DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

MAKASSAR

No : 440 /31/PSDK/VIII/2022

Kepada Yth,

Lamp : -

Kepala Puskesmas Bara Baraya

Perihal : Penelitian

di-

Tempat

Sehubungan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Kesatuan Politik No :
070/1492-II/BKBP/VI/2022, tanggal 3 Agustus 2022, maka bersama ini di sampaikan
kepada saudara bahwa :

Nama : **Sulfiana**
NIM : 70400119030
Jurusan : D3 Kebidanan
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Berkelanjutan pada ibu post natal dengan bendungan ASI di Puskesmas Bara Baraya Makassar tahun 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah kerja yang saudara pimpin pada tanggal 1 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022. Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 4 Agustus 2022

Kepala Dinas kesehatan
Kota Makassar



Dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes

Pangkat : Pembina TK I/IV B

NIP : 19730112 2006042012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BARA-BARAYA
 Jl. Abubakar Lambogo, 143, Telp (0411) 452035 Kode Pos : 90143
 E-mail: pkm.barabaraya@yahoo.com.



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>DINAS KESEHATAN</i>	Diretira Tgl. : <i>2-8-2021</i>
No. Surat : <i>470/31/PSDK/VIII/2020</i>	No. Agenda : <i>78</i>
Tgl. Surat : <i>4 Agustus 2020</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : <i>-Diploma a/p Sulharna / UIN Staudin</i>	
Diteruskan kepada Srd. : <input type="checkbox"/> <i>Bism ds PNE</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dengan hormat harap : <input checked="" type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/ konfirmasi
Catatan :	Pt. Kepala Puskesmas Bara-Baraya dr. JUNIARSIH NIP. 19870611 200901 2 003

Dikinda dengan CamScanner

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BARA-BARAYA
Jl. Abubakar Lambogo, 143, Telp. (0411) 452035 Kode Pos : 90143
Email pkm.barabaraya@yahoo.com



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 440 / PKM-BRY / 2023 / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Bara-Baraya menerangkan bahwa :

N a m a : Sulfiana
NIM : 70400119030
Jurusan : D III Kebidanan
Instansi : UIN Alauddin
Judul : **" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BERKELANJUTAN
PADA IBU POST NATAL DENGAN BENDUNGAN ASI DI
PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022"**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Bara-Baraya terhitung mulai pada tanggal
01 Agustus 2022 s/d 24 Agustus 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Makassar, 20 Juli 2023

Plt. Kepala Puskesmas Bara-Baraya


dr. Hj. Sophia Qadarsih
Nip. 19740515 200501 2 013



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.077/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
 The research protocol proposed by

Peneliti utama
 Principal In Investigator

: SULFIANA

Nama Institusi
 Name of the Institution

: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:
 Title

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU POST NATAL DENGAN BENDUNGAN
 ASI DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022"

"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR POSTNATAL WITH EXCESS OF BREAST
 MILK AT THE BARA-BARAYA PUBLIC HEALTH CENTER IN 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
 This declaration of ethics applies during the period August 5, 2022 until August 5, 2023

August 5, 2022
 Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syqirah, Sp.A., M.Kes



RIWAYAT HIDUP

Sulfiana, lahir pada tanggal 22 juli 2001 di Balanga, Kec Parangloe, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Alm. Subair dan Yanisi. Penulis berdomisili di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SDI Peo pada tahun 2007 hingga 2013 kemudian tahun 2013 melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Parangloe hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah akhir di SMA Islam Hizbul Wathan hingga tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil jurusan Kebidanan.