

**HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI DENGAN KEJADIAN  
PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER  
DI RSIA ANANDA MAKASSAR**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kedokteran  
Program Studi Pendidikan Dokter Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**FADLIZAINUL MUTTAOIN**

NIM: 70600119034

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadli Zainul Muttaqin  
NIM : 70600119034  
Tempat/Tanggal Lahir : Kanang, 22 September 2001  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Talasalapang Komp. P&K Blok A No.8  
Judul : Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan  
Kejadian Perdarahan Post Partum Primer di  
RSIA Ananda Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Agustus 2023



Fadli Zainul Muttaqin

NIM : 70600119034


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Fadli Zainul Muttaqin, NIM 70600119034, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul : “Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Primer di RSIA Ananda Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 16 Agustus 2023

Pembimbing 1



Dr. dr. H. Najamuddin M.Kes

Pembimbing 2



dr. Andi Alifia Ayu Delima, M. Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Primer di RSIA Ananda Makassar” yang disusun oleh Fadli Zainul Muttaqin, NIM 70600119034, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023, bertepatan dengan 29 Muharam 1445 Hijriah, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Agustus 2023

29 Muharam 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Alifia Ayu Delima, M. Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rista Suryaningsih, M. Med. Ed.	(.....)
Penguji II	: Dr. Muh. Sadiq Sabri, M. Ag.	(.....)

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. karena berkat rahmat dan anugerah-Nyalah penulis diberikan petunjuk dan kemampuan dengan segala keterbatasan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Primer di RSIA Ananda Makassar”**.

*Shalawat* dan salam tak lupa senantiasa tucurahkan kepada baginda Rasulullah saw sebagai manusia terbaik, penyempurna akhlak manusia, semoga di hari kebangkitan kelak mendapatkan syafaat dan petunjuknya yang telah dijanjikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dilalui dan seluruhnya dapat dihadapi berkat bantuan dan dukungan kedua orang tua penulis, Pandi dan Dahlia, yang senantiasa sabar dan selalu memberikan motivasi, serta tidak henti-hentinya memanjatkan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya izinkan penulis mengutarakan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, para wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para wakil dekan dan Staf Akademik

yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Rini Fitriani, M. Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter, dr. Andi Tihardimanto, M.Kes selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter, dosen pengajar mata kuliah yang telah ikhlas memberikan ilmu bermanfaat dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes dan dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes selaku dosen pembimbing penelitian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajar dan membimbing penulis.
5. dr. Rista Suryaningsih, M. Med. Ed. dan Dr. Muh. Sadiq Sabri, M. Ag. selaku dosen penguji kompetensi dan penguji integrasi keislaman yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran terbaik kepada penulis.
6. Staf akademik Program Studi Pendidikan Dokter yang telah membantu mengatur dan mengurus administrasi selama perkuliahan.
7. Teman dekat saya Rasyif Wildan Djunaidi, Din Nurul Rasidin Rumi dan Sultan Abdul Madjid Az-Zuhri serta rekan-rekan PSPD dan terkhususnya mahasiswa Angkatan 2019 (1NTE9RIN) yang telah memberikan bantuan baik berupa dukungan moral maupun materil.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas kekurangan dalam penyajian skripsi ini, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna tercapainya perbaikan

pada skripsi ini. Semoga segala proses yang telah penulis jalani dapat bernilai ibadah, memberikan manfaat kepada diri sendiri dan masyarakat luas. Aamiin.


Makassar, 16 Agustus 2023

Penulis



Fadli Zainul Muttaqin

70600119034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Hipotesis.....	8
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Tujuan Penelitian .....	16
G. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Berat Badan Lahir Bayi.....	18
B. Perdarahan Post Partum .....	28
C. Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum .....	40
D. Kerangka Teori.....	43
E. Kerangka Konsep.....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Desain Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45



C. Variabel Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sampel .....	45
E. Instrumen Penelitian.....	47
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	47
G. Teknik Pengolahan/Analisis Data.....	48
H. Alur Penelitian .....	48
I. Etika Penelitian .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Hasil Penelitian .....	50
B. Pembahasan.....	56
C. Keterbatasan Peneliti.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Definisi Operasional.....	8
<b>Tabel 1.2</b> Kajian Pustaka.....	9
<b>Tabel 2.1</b> Gambaran Klinis Perdarahan Obstetri.....	36
<b>Tabel 2.2</b> Diagnosis perdarahan postpartum .....	37
<b>Tabel 2.3</b> Langkah HAEMOSTASIS untuk tatalaksana perdarahan postpartum	40
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi sampel berdasarkan Diagnosa, Usia Ibu, Paritas dan Berat Badan Lahir Bayi di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 .....	50
<b>Tabel 4.2</b> Analisis hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	52
<b>Tabel 4.3</b> Analisis hubungan usia ibu dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	53
<b>Tabel 4.4</b> Analisis hubungan paritas dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	54
<b>Tabel 4.5</b> Analisis hubungan pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	55

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Teori .....	43
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Konsep.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## ABSTRAK

Nama : Fadli Zainul Muttaqin

NIM : 70600119034

Judul : Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Primer di RSIA Ananda Makassar

---

Angka Kematian Ibu (AKI) terkategori masih tinggi. Pada tahun 2020, sebagian besar kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh perdarahan, yang diikuti oleh hipertensi dan penyakit lainnya. Perdarahan post partum merupakan perdarahan dengan volume melebihi 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir secara pervaginam dan melebihi 1000 cc pada seksio sesarea. Perdarahan post partum terbagi menjadi perdarahan post partum primer dan perdarahan post partum sekunder. Perdarahan post partum primer adalah perdarahan dengan jumlah >500 cc yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Sedangkan perdarahan post partum sekunder adalah perdarahan dengan jumlah >500 cc yang terjadi setelah 24 jam pertama setelah bayi lahir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar. Metode penelitian ini menggunakan desain analitik kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini mendapatkan 122 sampel dengan teknik purposive sampling yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji chisquare. Hasil penelitian didapatkan 92,6% ibu dengan berat badan lahir bayi beresiko rendah, dan 7,4% ibu dengan berat badan lahir bayi beresiko tinggi. Hasil analisis bivariat diperoleh p-value = 0,057 (p-value >0,05), yang menandakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar.

**Kata Kunci** : Berat Badan Lahir Bayi, Perdarahan Post Partum Primer.

## ABSTRACT

*Nama : Fadli Zainul Muttaqin*

*NIM : 70600119034*

*Judul : Relationship between baby birth weight with Primary Post Partum Haemorrhage at RSIA Ananda Makassar*

---

*Maternal mortality rate is categorized still high. In 2020, Most of maternal mortality case in Indonesia caused by bleeding, which followed by hypertension and other diseases. Post partum haemorrhage is bleeding with volume exceed 500 cc that occurs after the birth of baby in vaginal delivery and exceed 1000 cc at caesarean section. Post partum haemorrhage classified into primary post partum haemorrhage and secondary post partum haemorrhage. Primary post partum haemorrhage is bleeding with volume >500 cc which occurs in the first 24 hours after baby birth. Secondary post partum haemorrhage is bleeding with volume >500 cc which occurs after 24 hours after baby birth. The purpose of this study was to determine the relationship between baby birth weight and primary post partum haemorrhage at RSIA Ananda Makassar. The research method uses quantitative analytic design with a cross sectional approach. This study obtained 122 sample with purposive sampling technique and analyzed univariate and bivariate with chi-square test. The result of this study is 92,6% mothers with low risk baby birth weight, and 7,6% mothers with high risk baby birth weight. The result of bivariate analysis obtained  $p\text{-value} = 0,057$  ( $p\text{-value} > 0,05$ ), which indicates that no significant relationship between baby birth weight and primary post partum haemorrhage at RSIA Ananda Makassar.*

**Keywords :** *Baby Birth Weight, Primary Post Partum Haemorrhage*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan di Indonesia mempunyai beberapa prioritas yang harus diperhatikan, salah satunya ialah kesehatan ibu dan anak. Dengan suksesnya pembangunan kesehatan maka akan terjadi peningkatan umur harapan hidup saat lahir. Sedangkan keberhasilan suatu negara dalam mengupayakan kesehatan ibu dilihat dari angka insidensi kematian ibu yang menjadi suatu tolak ukur (Kemenkes RI 2019).

Angka kematian ibu merupakan indikator kesejahteraan perempuan, indikator kesejahteraan suatu bangsa sekaligus menggambarkan hasil capaian pembangunan suatu negara. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian ibu adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2012 angka kematian ibu di Indonesia adalah 359 per 100 000 kelahiran (Regen and Yanuarti, 2022). Berdasarkan data WHO (World Health Organization), 25% dari 100.000 kematian maternal di dunia setiap tahunnya disebabkan oleh perdarahan postpartum (WHO, 2015).

World Health Organization (WHO) mendefinisikan perdarahan post partum sebagai keadaan dimana terjadi kehilangan darah >500 ml pada 24 jam pasca kelahiran. Beberapa pengertian lain menyebutkan jumlah perdarahan >500 ml pada persalinan melalui jalan lahir, dan perdarahan >1000 ml persalinan melalui operasi sesar. Perdarahan postpartum terbagi menjadi perdarahan primer dan perdarahan sekunder. Perdarahan postpartum primer

(*early postpartum hemorrhage*) adalah perdarahan dengan jumlah > 500 cc yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah bayi lahir. Sedangkan perdarahan post partum sekunder adalah perdarahan yang terjadi setelah 24 jam pertama dengan jumlah > 500cc. (Yunadi, Septianingsih and Andika, 2019).

Menurut data WHO (World Health Organization) Mengenai status kesehatan nasional pada capaian target Sustainable Development Goals (SDGs) secara global sekitar 830 wanita meninggal setiap harinya karena komplikasi kehamilan dan proses kelahiran dengan tingkat AKI sebanyak 216/100.000 kelahiran hidup. sekitar 99% dari kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan atau kelahiran terjadi dinegara – negara berkembang. Rasio AKI masih cukup tinggi sebagaimana akan ditargetkan menjadi 79/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO 2018)

Pada tahun 2020 sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh perdarahan mencapai 1.330 kasus, diikuti dengan penyebab lain seperti hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus (Kemenkes RI 2021). Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan (28%), eklamsi (24%) dan infeksi (11%) . perdarahan postpartum merupakan penyebab tersering dari keseluruhan kematian akibat perdarahan obstetrik (Kemenkes RI 2018).

Berdasarkan hasil pelaporan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, pada tahun 2019 angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaporkan sebanyak 144 orang atau 94.29 per 100.000 kelahiran hidup, yang terdiri dari kematian ibu hamil sebanyak 31 orang (22%), kematian ibu

bersalin sebanyak 36 orang (25%), kematian ibu nifas 77 orang (53%) (Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan 2020).

Perdarahan menjadi penyumbang tertinggi penyebab kematian ibu di Indonesia dengan angka sebesar 50 – 60 %, umumnya karena kelemahan atau tidak adanya kontraksi uterus (atonia uteri), dan kesalahan penanganan kala III persalinan, sehingga kelahiran plasenta terjadi lebih lambat dan memperbanyak jumlah perdarahan. Selain itu perdarahan post partum juga dapat disebabkan oleh robekan pada vagina, plasenta previa dan ruptur uteri (Regen dan Yanuarti 2022).

Perdarahan postpartum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tonus (atonia uteri), trauma (robekan jalan lahir), tissue (retensio plasenta, sisa plasenta) dan trombin (kelainan koagulasi darah) atau bisa disebut dengan faktor 4T (Simanjuntak, 2020).

Faktor risiko yang berhubungan dengan perdarahan post partum berupa usia, jumlah anak/paritas, jarak kelahiran, riwayat persalinan, partus lama, retensio plasenta, berat lahir bayi, anemia, pengetahuan, pekerjaan, antenatal care dan fasyankes (Turiyani, 2023).

Berat badan bayi lahir termasuk dalam salah satu faktor risiko yang mempengaruhi proses persalinan. Besarnya berat bayi yang dilahirkan dapat berisiko pada perdarahan postpartum akibat terjadinya ruptur perineum atau robeknya jalan lahir dan juga dapat menimbulkan lemahnya kontraksi otot myometrium. Kisaran berat badan lahir normal adalah 2500 - 4000 gram, sementara berat badan lahir rendah <2500 gram dan berat badan lahir besar



(makrosomia) > 4000 gram (Sylvia, 2019). Berdasarkan hasil data RISKESDAS tahun 2007, persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,1%, sedangkan pada tahun 2010 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,4%. sedangkan pada tahun 2013 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 4,8%, dan pada tahun 2018 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 3,7% (Kemenkes RI, 2018).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat berat badan lahir bayi memiliki keterkaitan sebagai faktor risiko terjadinya perdarahan post partum dimana kejadian perdarahan post partum ini menjadi penyumbang nomor satu angka kematian ibu di Indonesia. Melihat bagaimana kehamilan menjadi suatu hal yang dapat memberikan banyak risiko bagi seorang wanita yang mengandung, maka sudah seharusnya seorang anak senantiasa taat dan patuh pada kedua orang tuanya terutama kepada ibunya karena ibunyalah yang telah mengandung dengan berbagai risiko yang harus ditanggung bahkan sampai kematian pun dapat menjadi salah satunya misalnya dengan kausa perdarahan post partum ini.

Keadaan seperti di atas dapat dilihat misalnya pada firman Allah swt.

dalam QS Luqman/31:14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي  
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang

ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (Kementerian Agama, al-Qur’an & Terjemahnya : Halaman 412)

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 11, ayat ini menyatakan bahwa terdapat wasiat bagi semua umat manusia yang meninggalkan pesan mengenai kedua orang tua ibu bapaknya. Pesan ini disampaikan karena bagaimana seorang ibu yang telah bersusah payah untuk mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan dilahirkan dengan susah payah, hingga membesarkan dan menyusu nya setiap saat. Wasiat nya berisi perintah untuk bersyukur kepada Allah swt. atas penciptaan nya, dan bersyukur kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita di dunia (Shihab, 2005: 11; 127-131).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, ayat ini menyatakan bahwa Allah swt. telah mengirimkan wasiat yang berisi perintah untuk beribadah kepada Allah Yang Esa dan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Pada ayat ini Allah swt. memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, sebagaimana ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (Katsir, 2004: 6; 400-402).

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seorang ibu bersusah payah dalam melahirkan dan memelihara kita, sehingga sepatutnya kita berlaku sopan dan patuh kepada kedua orang tua. Dari tafsir ayat tersebut, dapat diketahui bahwa perjuangan seorang ibu sangat besar, sehingga sudah sepatutnya seorang anak sopan dan patuh kepada kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu.

Pada ayat lain, Allah swt. berfirman dalam QS al-Ahqaf/46:15 yang berbunyi

:  
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا...

Terjemahnya :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)....” (Kementerian Agama, al-Qur’an & Terjemahnya : Halaman 504)

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 13, ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya Kami telah memerintahkan manusia siapa pun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada Kami sepanjang hidup mereka dan Kami telah mewasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapa pun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya (Shihab, 2005: 13; 86-87).

Kata *kurh* (كُرْهًا) dalam ayat ini bermakna, “Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan bersusah payah (pula).” Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menghormati, memuliakan, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibu yang mengandungnya dengan susah payah, hingga mengalami berbagai kesulitan, dengan berbagai gangguan fisik dan psikis, dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan. Masa kandungan dalam perut ibu dan penyapihannya yang paling sempurna adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila sang anak telah dewasa yakni sempurna awal masa bagi kekuatan fisik dan psikisnya, ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan

kebaktiannya berlanjut sampai ia mencapai usia empat puluh tahun yakni masa kesempurnaan kedewasaannya, dan sejak itu ia berdoa memohon agar pengabdianya kepada kedua orang tuanya semakin bertambah (Shihab, 2005: 86-87).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7, ayat ini menyatakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik serta berlemah lembut kepada kedua orang tua (ibu dan bapak). Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, dimana ibu menderita karena ketika mengandung, mengalami kesulitan dan kepayahan, seperti mengidam, pingsan, rasa berat, dan cobaan lainnya yang dialami oleh para ibu hamil. Ibu hamil melahirkan dengan susah payah, juga merasakan rasa sakit yang teramat sangat (Katsir, 2004: 7; 362-363).

Melihat tafsir ayat tersebut, dapat diketahui bahwa perjuangan seorang ibu sangat besar, sampai bersusah payah dalam melahirkan, sehingga sudah sepatutnya seorang anak sopan dan patuh kepada kedua orang tua, terkhusus kepada seorang ibu, sebagaimana seorang ibu melahirkan sang anak dengan susah payah

Melihat pentingnya pembahasan mengenai perdarahan post partum sebagai salah satu penyumbang terbesar Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dan hubungannya dengan berat badan lahir bayi sebagai salah satu faktor risiko, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  
Bagaimana hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer ?

## C. Hipotesis

### 1. Hipotesis Nol (H0)

Tidak terdapat hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar

### 2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar

## D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

**Tabel 1. 1** Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Berat badan lahir bayi	Berat badan lahir bayi merupakan parameter massa tubuh seorang bayi yang baru lahir yang dapat diukur menggunakan satuan berat.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	<u>Kriteria Objektif</u> A.) Risiko Tinggi : ≥ 4000 gram B.) Risiko Rendah : < 4000 gram	Ordinal

Variabel Dependen					
2.	Perdarahan post partum primer	Perdarahan lebih dari 500ml yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau perdarahan lebih dari 1000ml yang terjadi setelah persalinan abdominal pada 24 jam pertama setelah persalinan.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	<u>Kriteria Objektif</u> A.) Mengalami perdarahan post partum B.) Tidak mengalami perdarahan post partum	Nominal

## 2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar dengan metode melihat data rekam medis pasien yang mengalami perdarahan post partum.

## E. Kajian Pustaka

**Tabel 1.2** Kajian Pustaka

Nama Peneliti	Judul dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
Sylvia Damayanti (2021)	Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian	Hasil analisis bivariat menggunakan fischer exact test menunjukkan bahwa	<u>Persamaan :</u> - Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik

	<p>Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Periode Februari – Juli 2018</p> <p>Metode : <i>cross sectional</i></p>	<p>berat badan lahir memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum dengan didapatkan <i>p-value</i> = 0,014 dengan <i>Odds Ratio</i> (OR) sebesar 0,119 yang berarti kelahiran makrosomia 0,119 kali memiliki risiko terjadinya perdarahan postpartum dibandingkan dengan kelahiran bayi bukan makrosomia, serta didapatkan nilai contingency coefficient = 0,159 menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat sangat lemah. Terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir dengan kejadian perdarahan postpartum dengan keeratan hubungan</p>	<p>dengan desain <i>cross sectional</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen dan independen yang diteliti</li> </ul> <p><u>Perbedaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pengolahan data menggunakan Fischer Exact Test</li> <li>- Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling</li> <li>- Jumlah sampel, waktu dan tempat pengambilan subjek</li> </ul>
--	--	--	--

		keduanya yang sangat lemah.	
Dian Novita, Amlah, Eka Afrika (April 2022)	Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Hemoragic Post Partum di Puskesmas Sumber Marga Telang Metode : <i>cross sectional</i>	Hasil uji statistik <i>chi-square</i> didapatkan $\rho$ value = 0,001 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara preeklmasia dengan hemoragic post partum di Wilayah Kerja Puskesmas Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Hasil uji statistik <i>chi-square</i> didapatkan $\rho$ value = 0,044 lebih kecil dari $\alpha=0,05$ menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara jarak kehamilan dengan hemoragic post partum di Wilayah Kerja Puskesmas Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Hasil uji statistik <i>chi-square</i>	<p><u>Persamaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan metode <i>cross sectional</i></li> <li>- Teknik pengolahan data menggunakan uji <i>Chi-Square</i></li> <li>- Variabel dependen yang diteliti yaitu perdarahan post partum</li> </ul> <p><u>Perbedaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampel, waktu dan tempat pengambilan subjek</li> <li>- Terdapat beberapa tambahan variabel independen selain berat badan lahir bayi</li> </ul>



		<p>didapatkan <math>p</math> value = 0,004 lebih kecil dari <math>\alpha=0,05</math> menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara BBBL dengan hemoragic post partum di Wilayah Kerja Puskesmas Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin tahun 2020. Hasil analisa diperoleh nilai OR= 4,5 artinya responden yang berisiko dengan BBRL berpeluang 4,5 kali berisiko untuk mengalami hemoragic post partum dibandingkan responden yang tidak berisiko.</p>	
Gustika Anggriani (2021)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdarahan Pasca Persalinan di	Ada hubungan antara makrosomia dengan kejadian perdarahan pasca persalinan di RSUD Kota Prabumulih tahun 2019 dengan Hasil Uji	<p><u>Persamaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian yang digunakan adalah survey analitik dengan metode <i>cross sectional</i></li> <li>- Variabel independen yang diteliti yaitu</li> </ul>

	<p>RSUD Kota Prabumulih Tahun 2019</p> <p>Metode : <i>cross sectional</i></p>	<p>statistic <i>Chi-Square</i> didapatkan <math>p</math>-value = 0,000 artinya antara makrosomia dengan kejadian perdarahan pasca persalinan ada hubungan yang bermakna, sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang bermakna antara makrosomia dengan kejadian perdarahan pasca persalinan terbukti secara statistik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fitria pada tahun 2015 tentang hubungan partus lama, riwayat perdarahan postpartum dan berat bayi lahir besar (makrosomia) dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Tahun 2015, dari 71 responden</p>	<p>perdarahan post partum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik pengolahan data menggunakan uji <i>Chi-Square</i></li> </ul> <p><u>Perbedaan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah sampel, waktu dan tempat pengambilan subjek</li> <li>- Terdapat beberapa tambahan variabel dependen selain berat badan lahir bayi</li> </ul>
--	---	---	---

		terdapat hasil Uji statistic <i>Chi-Square</i> didapatkan p-value = 0,001 untuk makrosomia artinya ada hubungan bermakna antara makrosomia dengan kejadian perdarahan pasca persalinan	
Turiyani (2023)	Hubungan Jarak Kehamilan dan Berat Lahir Bayi dengan Kejadian Haemoragic Post Partum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Metode : <i>cross sectional</i>	Analisa bivariat diperoleh dari 87 ibu yang memiliki jarak kehamilan risiko tinggi ada 76 ibu (23,3%) didiagnosa Haemoragic Post Partum dan dari 67 ibu yang memiliki berat lahir bayi risiko tinggi ada 52 ibu (16%) didiagnosa Haemoragic Post Partum. Simpulan ada hubungan yang signifikan jarak kehamilan dengan Haemoragic Post Partum (P-value 0,000), dan ada	<u>Persamaan :</u> - Jenis penelitian yang digunakan bersifat analitik dengan desain <i>cross sectional</i> - Variabel dependen yang diteliti yaitu perdarahan post partum - Teknik analisis data yang digunakan adalah uji <i>Chi-Square</i> <u>Perbedaan :</u> - Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling - Terdapat variabel independen tambahan yaitu jarak kehamilan

		hubungan yang bermakna antara berat lahir bayi dengan Haemoragic Post Partum (P-value 0,000)	- Jumlah sampel, waktu dan tempat pengambilan subjek
Eka Afrika, Merisa Riski (2021)	Hubungan Berat Badan Bayi Lahir dan Anemia dalam Kehamilan Dengan Kejadian Pendarahan Post Partum Metode : <i>case control</i>	Pada hasil uji <i>Chi Square</i> di dapatkan <i>p-value</i> = 0,002 ( <i>p Value</i> = 0,05) yang berarti ada hubungan signifikan antara berat badan bayi lahir dengan pendarahan post partum dan Berdasarkan uji <i>chi square</i> didapatkan <i>p-value</i> = 0,001 ( <i>p value</i> $\geq$ 0,05) yang berarti ada hubungan yang signifikan antara anemia dalam kehamilan terhadap pendarahan post partum.	<u>Persamaan :</u> - Variabel dependen yang diteliti yaitu perdarahan post partum - Teknik analisis data yang digunakan adalah uji <i>Chi-Square</i> <u>Perbedaan :</u> - Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan desain <i>case control</i> - Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling - Terdapat variabel independen tambahan yaitu anemia - Jumlah sampel, waktu dan tempat penelitian

## **F. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi berat badan lahir bayi pada ibu yang bersalin di RSIA Ananda Makassar.
- b. Untuk mengetahui angka kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar.
- c. Untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi berisiko rendah dan berat badan lahir bayi berisiko tinggi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer.

### 2. Bagi Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan ibu dan anak.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal dan mengetahui tentang hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer.

4. Bagi Instansi

- a) Memberikan tambahan data dan referensi di bidang kesehatan ibu dan anak terkait hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer.
- b) Bentuk pengabdian diri terhadap perguruan tinggi dengan memenuhi salah satu dari tri dharma perguruan tinggi terkait bidang penelitian sehingga dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian mahasiswa selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Berat Badan Lahir Bayi**

##### **1. Pengertian**

Berat bayi lahir adalah berat badan saat bayi dilahirkan, dimana pengukuran berat badan lahir bayi yang akurat dilakukan pada 1 jam pertama setelah persalinan dengan menggunakan alat penimbang yang telah dikalibrasikan dengan baik (Gladstone *et al.*, 2021).

Bayi baru lahir (BBL) normal adalah bayi yang baru dilahirkan pada kehamilan cukup bulan (dari kehamilan 37-42 minggu) dan berat badan lahir 2500-4000 gram dan tanpa adanya tanda - tanda asfiksia dan penyakit penyerta lainnya (Sugandi, 2019; Amiruddin, 2022).

Berat badan merupakan ukuran antropometri yang paling sering digunakan pada bayi baru lahir (neonatus). Berat badan digunakan untuk mengetahui bayi normal atau BBLR. Pada masa bayi hingga balita, berat badan dapat dipergunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi, kecuali terdapat kelainan klinis seperti dehidrasi, asites, edema, dan adanya tumor. Di samping itu pula berat badan dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan dosis obat dan makanan (Daryanti, 2019).

##### **2. Klasifikasi Berat Badan Bayi Lahir**

Berat bayi lahir berdasarkan berat badan dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan bayi baru lahir yang saat dilahirkan memiliki berat badan  $< 2500$  gram tanpa menilai masa gestasi. Pada tahun 1961 World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa semua bayi yang telah lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram disebut *Low Birth Weight Infants* atau Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) (Windy, Huda and Elza, 2019; Amiruddin, 2022).

Bayi BBLR dibagi lagi menjadi 3 kelompok berdasarkan berat badan lahir :

- 1) Berat badan lahir rendah (BBLR) dengan berat lahir 1500 - 2499 gram.
- 2) Berat badan lahir sangat rendah (BBLSR) dengan berat lahir 1000 - 1499 gram.
- 3) Berat badan lahir amat sangat rendah (BBLASR) dengan berat lahir  $< 1000$  gram (Amiruddin, Delima and Fauziah, 2022; Ayu Sekar R, 2022).

b) Bayi Berat Lahir Normal

Bayi baru lahir normal merupakan bayi yang lahir dengan usia gestasi 37-42 minggu dan berat badan lahir 2500 - 4000 gram (Daryanti, 2019; Sugandi, 2019; Amiruddin, Delima and Fauziah, 2022)

c) Bayi Berat Lahir Lebih

Bayi berat lahir lebih adalah Bayi yang dilahirkan dengan berat lahir lebih  $> 4000$  gram (Kemenkes RI, 2018; Daryanti, 2019).



### 3. Faktor yang Mempengaruhi Berat Bayi Lahir

Faktor mempengaruhi berat bayi lahir antara lain sebagai berikut :

a) Umur Ibu hamil

Umur ibu hamil memiliki keterkaitan dengan berat bayi lahir, dimana kehamilan dibawah umur 20 tahun merupakan kehamilan berisiko tinggi, 2-4 kali lebih tinggi di bandingkan dengan kehamilan pada wanita yang cukup umur. Pada umur yang masih muda, perkembangan organ-organ reproduksi dan fungsi fisiologinya belum optimal. Selain itu, emosi dan kejiwaannya belum cukup matang, sehingga pada saat kehamilan ibu tersebut belum dapat menanggapi kehamilannya secara sempurna dan sering terjadi komplikasi. Selain itu semakin muda usia ibu hamil, maka anak yang dilahirkan akan semakin ringan. Untuk mendapatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil serta bayi, maka sebaiknya merencanakan kehamilan pada usia antara 20-35 tahun. (Daryanti, 2019).

Pada ibu yang mengandung pada usia  $> 35$  tahun dapat menyebabkan gangguan pada saat kehamilan yang berhubungan dengan penyakit kronis seperti hipertensi dan penyakit degeneratif pada persendian tulang belakang dan panggul yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin saat kehamilan nantinya (Daryanti, 2019; Ayu Sekar R, 2022).

b) Jarak Kehamilan/Kelahiran

Jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih sesuai dengan anjuran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), karena jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah sebelumnya telah melahirkan. Proses reproduksi dapat ditekan apabila jarak minimal antara kelahiran 2 tahun (Daryanti, 2019; Ayu Sekar R, 2022).

Jarak kehamilan atau kelahiran yang terlalu dekat akan mempengaruhi kesehatan reproduksi ibu, dimana alat reproduksi ibu belum siap untuk mengandung karena masa pemulihan yang belum optimal sehingga dapat berpengaruh pada daya tahan dan status gizi ibu. Jarak anak yang terlalu dekat juga akan meningkatkan risiko komplikasi obstetri yang membahayakan ibu dan bayinya (Ayu Sekar R, 2022).

c) Paritas

Paritas secara luas mencakup gravida/jumlah kehamilan, prematur/jumlah kelahiran, dan abortus/ jumlah keguguran. Paritas dikatakan tinggi bila seorang ibu/wanita melahirkan anak ke empat atau lebih. Seorang wanita yang sudah mempunyai tiga anak dan terjadi kehamilan lagi keadaan kesehatannya akan mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh melemahnya fungsi uterus oleh karena kehamilan yang berulang. Uterus yang melemah disebabkan oleh jaringan parut yang timbul akibat kehamilan yang telah terjadi kesekian kalinya, yang menyebabkan pasokan nutrisi melalui darah berkurang menuju plasenta, yang

berujung pada penurunan kualitas pertumbuhan dan perkembangan janin (Ayu Sekar R, 2022).

d) Kadar Hemoglobin (Hb)

Kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi yang dilahirkan. Seorang ibu hamil dikatakan menderita anemia bila kadar hemoglobinnya dibawah 11 gr/dL. Hal ini jelas menimbulkan gangguan pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, prematuritas, cacat bawaan, atau janin lahir dengan berat badan yang rendah (Daryanti, 2019).

e) Status Gizi Ibu Hamil

Status gizi ibu hamil sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil, kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain, kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil (Quina, Irianton, dan Noor, 2019).

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Kementerian Agama, al-Qur’an & Terjemahnya : Halaman 25)

Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah Jilid 1, ayat ini menjelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah swt. atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis thayyib, dan tidak semua yang thayyib adalah halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Jadi makanan yang baik ialah makanan yang tidak merugikan apapun bagi pengonsumsi makanan tersebut. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik. Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan thayyib (Shihab, 2005: 1; 379-381).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, ayat ini menyatakan bahwa dia maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakan-

tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa Jahiliyah (Katsir, 2004: 1; 319-320).

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat makanan yang halal namun belum tentu baik bagi yang mengkonsumsi, sehingga sepatutnya seorang ibu hamil menghindari makanan yang dapat mendatangkan penyakit baginya dan mulai memperhatikan asupan makanan yang baik bagi sang ibu (Fitriani, 2022).

Pada ayat lain Allah swt. berfirman dalam QS al-A'raf/7 : 31 yang berbunyi :

يٰٓبَنِيٓ آدَمَ خُذُوٓا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Kementerian Agama, al-Qur'an & Terjemahnya : Halaman 154).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah Jilid 5, ayat ini menyatakan bahwa perintah makan dan minum, lagi tidak berlebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas

atau belum cukup buat orang lain, Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2005, 5; 75-76).

Dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pesan Nabi saw: “Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia, lebih buruk dari perut. Cukupilah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk pernafasannya.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdam Ibnu Ma'dikarib). Ditemukan juga pesan yang menyatakan: “Termasuk berlebih-lebihan bila Anda makan apa yang selera Anda tidak tertuju kepadanya” (Shihab, 2005, 5; 75-76).

Menurut Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, pada firman Allah swt. selanjutnya (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا) "Makan dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan", Sebagian ulama salaf mengatakan, Allah swt. telah menyatukan seluruh pengobatan pada setengah ayat ini, yang dimana menyatakan bahwa manusia hendaklah makan dan minum secukupnya, tanpa berlebih-lebihan. Melalui ayat ini, Allah swt. menetapkan dalam hal tindakan penghalalan atau pengharaman orang-orang yang melampaui batas ketika menghalalkan dengan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, dimana Allah swt. mewajibkan agar menghalalkan apa yang diharamkan-Nya dan

mengharamkan apa yang diharamkan-Nya, sebab yang demikian itu merupakan keadilan yang diperintahkan-Nya (Katsir, 2004: 3; 371-373).

Ayat di atas menyuratkan kepada para ibu hamil untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, serta memiliki dampak baik bagi mengonsumsi, selama tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan ibu hamil, karena sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal apapun (Tamimi, 2022).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui status gizi ibu hamil antara lain memantau pertambahan berat badan selama hamil, mengukur lingkaran lengan atas (LILA) dan mengukur kadar hemoglobin. Pemantauan berat badan ini juga sekaligus bertujuan memantau pertumbuhan janin. Pengukuran LILA dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang menderita Kurang Energi Kronis (KEK), sedangkan pengukuran kadar hemoglobin untuk mengetahui kondisi ibu apakah mengalami anemia besi (Quina, Irianton, dan Noor, 2019).

f) Pemeriksaan kehamilan/ANC

Pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) dilaksanakan minimal sebanyak 4 kali pada masa kehamilan, pada trimester I pemeriksaan dilakukan sebanyak satu kali, pada trimester II pemeriksaan dilakukan sebanyak satu kali, dan pada trimester III pemeriksaan dilakukan sebanyak dua kali (Ayu Sekar R, 2022).

Pemeriksaan kehamilan bertujuan untuk mengenal dan mengidentifikasi masalah yang timbul selama kehamilan, sehingga kesehatan selama ibu hamil dapat terpelihara dan yang terpenting ibu dan bayi dalam kandungan akan baik dan sehat sampai saat persalinan. Pemeriksaan kehamilan hendaknya dimulai seawal mungkin, yaitu segera setelah tidak haid selama 2 bulan berturut-turut tujuannya agar kalau ada kelainan pada kehamilan, masih cukup waktu untuk menangani sebelum persalinan (Daryanti, 2019).

g) Penyakit Saat Kehamilan

Penyakit pada saat kehamilan yang dapat mempengaruhi berat bayi lahir diantaranya adalah Diabetes Melitus Gestasional (DMG), cacar air, dan penyakit infeksi TORCH. Diabetes Melitus Gestasional adalah intoleransi glukosa yang dimulai atau baru ditemukan pada waktu hamil. Tidak dapat dikesampingkan kemungkinan adanya intoleransi glukosa yang tidak diketahui yang muncul seiring kehamilan, komplikasi yang mungkin sering terjadi pada kehamilan dengan diabetes adalah bervariasi, Pada ibu akan meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia, sectio sesaria, dan terjadinya diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari, sedangkan pada janin meningkatkan risiko terjadinya makrosomi. Penyakit infeksi TORCH adalah suatu istilah jenis penyakit infeksi yaitu Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes. Keempat jenis penyakit ini sama bahayanya bagi ibu hamil yaitu dapat mengganggu janin yang dikandungnya. Bayi yang dikandung tersebut mungkin akan



lahir dengan berat bayi tidak normal, keterbelakangan mental, hepatitis, radang selaput otak, radang iris mata, dan beberapa jenis penyakit lainnya (Daryanti, 2019).

## **B. Perdarahan Post Partum**

### **1. Definisi**

Perdarahan postpartum didefinisikan sebagai keadaan dimana terjadi kehilangan darah yang mencapai  $>500$  mL pada persalinan pervaginam, atau kehilangan darah yang mencapai  $> 1000$  mL pada persalinan sesar (Jamil, Bryant and Wormer, 2022).

WHO mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah sebanyak  $> 500$  mL atau selama 24 jam pertama, dan perdarahan postpartum berat adalah kehilangan darah sebanyak  $> 1000$  mL atau setelah 24 jam. *The Royal College of Obstetricians and Gynecologists* mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah sebanyak  $> 500$  mL pervaginam selama 24 jam pertama setelah bayi lahir (Almutairi, 2021).

Namun American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) pada tahun 2017 mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai keadaan dimana terjadi kehilangan darah dengan total yang mencapai  $> 1000$  mL dengan tanda dan gejala hipovolemik dalam 24 jam pertama setelah partus, tanpa melihat jenis persalinan yang dijalani (Jamil, Bryant and Wormer, 2022).

## 2. Epidemiologi

Berdasarkan data dari WHO, setiap tahun terdapat 14 juta ibu atau 11,4 % menderita perdarahan postpartum di seluruh dunia. Pada negara berkembang kejadian perdarahan postpartum terjadi sebanyak 60 % pada 100 ribu kematian ibu setiap tahun dan disebabkan oleh karena manajemen persalinan yang masih buruk terutama pada kala 3 yang bisa menyebabkan kehilangan darah berlebihan (Ramadhan, Rasyid and Rusnita, 2019).

## 3. Klasifikasi

Perdarahan dibagi menjadi minor yaitu 500-1000 ml atau mayor >1000 ml. Perdarahan mayor dapat dibagi menjadi sedang yaitu 1000-2000 ml atau berat >2000 ml. Pembagian lain menurut Sibai adalah perdarahan ringan (mild) apabila jumlah perdarahan  $\leq$  1500 ml, berat (severe) > 1500 ml, dan massif > 2500 ml (Simanjuntak, 2020). Berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi 2, yaitu :

- Perdarahan postpartum primer (*primary post partum haemorrhage*) yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama post partum
- Perdarahan postpartum sekunder (*secondary post partum haemorrhage*) merupakan perdarahan yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 minggu postpartum. (Simanjuntak, 2020).

## 4. Etiologi dan Faktor Risiko

Penyebab perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi 4 T yaitu :

- Tone (tonus; atonia uteri)

Atonia uteri merupakan penyebab utama perdarahan postpartum yaitu sebesar 70% dan sekaligus penyebab utama kematian maternal.

- Trauma (laserasi; laserasi perineum, vagina, serviks dan uterus)  
Trauma seperti laserasi, ruptura uteri menyumbang sebesar 20%
- Tissue (jaringan; retensio plasenta dan sisa plasenta)  
Tissue (jaringan) seperti retensio plasenta, sisa plasenta sebesar 10%
- Thrombin (koagulopati; gangguan pembekuan darah).

Thrombin (koagulopati) atau gangguan pembekuan darah seperti idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), thrombotic thrombocytopenic purpura, penyakit von Willebrand dan hemofilia, menyumbang 1% sebagai penyebab perdarahan postpartum (Simanjuntak, 2020).

Faktor risiko yang berhubungan dengan perdarahan post partum berupa usia, jumlah anak/paritas, berat lahir bayi, jarak kelahiran, riwayat persalinan, anemia, pengetahuan, perilaku, antenatal care dan fasyankes (Turiyani, 2023).

a) Usia

Usia dibawah 20 tahun fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna sehingga belum siap untuk hamil dan mekahirkan, sedangkan pada usia di atas 35 tahun terjadi kemunduran yang progresif dari endometrium yang mempengaruhi kekuatan kontraksi pada saat persalinan (Puspitasari, 2019).

b) Paritas

Pada ibu dengan grande multipara atau hamil lebih dari lima kali memiliki risiko perdarahan yang lebih tinggi. Paritas lebih dari 4 mempunyai risiko lebih besar untuk terjadinya perdarahan postpartum karena otot uterus menjadi lebih sering meregang. Dengan bertambahnya paritas, akan semakin banyak jaringan fibrosa menggantikan serat otot pada uterus sehingga kemampuan untuk berkontraksi semakin menurun akibatnya sulit melakukan penekanan pada pembuluh-pembuluh darah yang terbuka setelah terlepasnya plasenta. Paritas tinggi merupakan faktor risiko dari atonia uteri (Puspitasari, 2019).

c) Berat bayi lahir

Makrosomia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum. Makrosomia didefinisikan sebagai berat lahir bayi >4000 g. Anak terlalu besar dapat menyebabkan renggangan rahim yang berlebihan dan dapat mengakibatkan perdarahan post partum (Puspitasari, 2019).

d) Jarak kehamilan

Jarak kehamilan yang pendek secara langsung akan memberikan efek terhadap kesehatan wanita maupun kesehatan janin yang dikandungnya. Seorang wanita setelah bersalin membutuhkan waktu 2 untuk memulihkan tubuhnya dan mempersiapkan diri untuk kehamilan dan persalinan berikutnya.

Bila jarak kehamilan terlalu dekat, rahim yang masih belum pulih benar akibat persalinan sebelumnya belum bisa memaksimalkan pembentukan cadangan makanan bagi janin dan untuk ibu sendiri. Akibatnya akan berdampak tidak baik bagi ibu maupun bayinya (Puspitasari, 2019).

e) Riwayat perdarahan post partum

Adanya riwayat perdarahan post partum sebelumnya yang disebabkan karena atonia uteri merupakan faktor predisposisi untuk terjadi perdarahan post partum di kehamilan berikutnya (Puspitasari, 2019).

f) Anemia

Kehamilan Bila ibu menderita anemia berat selama kehamilan, pada saat persalinan dapat terjadi gangguan his dan dapat melemahkan kekuatan otot rahim. Hal ini disebabkan karena oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak (Puspitasari, 2019).

g) Kehamilan Gemeli

Kehamilan kembar ialah suatu kehamilan dengan dua janin atau lebih yang ada di dalam kandungan selama proses kehamilan. Suatu kehamilan kembar dapat diketahui sejak usia kehamilan 5 minggu, dengan melihat jumlah kantung gestasi di

dalam kavum uteri. Kehamilan gemeli merupakan faktor predisposisi terjadinya perdarahan post partum yang di akibatkan oleh atonia uteri, dikarenakan merenggang nya rahim yang berlebihan dan akhirnya menurunkan kontraksi rahim untuk menutup perdarahan dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir (Puspitasari, 2019).

## 5. Patomekanisme

### a) Atonia Uteri

Atonia uteri adalah kegagalan miometrium untuk berkontraksi setelah persalinan sehingga uterus dalam keadaan relaksasi penuh, melebar, lembek, dan tidak mampu menjalankan fungsi oklusi pembuluh darah. Perdarahan pada atonia uteri ini berasal dari pembuluh darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian atau lepas keseluruhan. Miometrium adalah lapisan tengah dari dinding uterus yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stroma dan pembuluh darah. Miometrium merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri dari banyak jaringan otot. Selama kehamilan, serat otot miometrium menjadi berbeda dan strukturnya lebih terorganisir dalam rangka persiapan kinerjanya saat persalinan. Miometrium lapisan tengah tersusun sebagai anyaman dan ditembus oleh pembuluh darah. Masing-masing serabut mempunyai dua buah lengkungan sehingga tiap-tiap dua buah serabut kira-kira berbentuk angka delapan. Ketidakmampuan miometrium untuk

berkontraksi akan menyebabkan perdarahan postpartum. Penyebab atonia uteri adalah akibat dari partus lama, pembesaran uterus yang berlebihan pada waktu hamil, multiparitas, anestesi yang dalam, serta anestesi lumbal. Atonia uteri juga dapat disebabkan karena salah penanganan kala III persalinan. Kesalahan tersebut yaitu memijat uterus dan mendorongnya kebawah dalam usaha melahirkan plasenta, yang seharusnya belum terlepas dari dinding uterus (Satriyandari, dkk 2019).

b) Retensio Plasenta

Retensio plasenta adalah keadaan dimana plasenta belum lahir 30 menit setelah janin lahir. Kondisi tersebut disebabkan karena plasenta belum lepas dari dinding uterus atau plasenta sudah lepas, akan tetapi belum dilahirkan. Penyebab plasenta belum lepas dari dinding uterus yaitu karena kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta, plasenta melekat erat pada dinding uterus oleh sebab villi korialis menembus desidua sampai miometrium (plasenta akreta), serta plasenta merekat erat pada dinding uterus oleh sebab villi korialis menembus sampai dibawah peritoneum (plasenta perkreta) (Satriyandari, dkk 2019).

c) Robekan Jalan Lahir

Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya. Sumber perdarahan dapat berasal dari perineum, vagina, serviks, dan robekan uterus (ruptura uteri) (Satriyandari, dkk 2019).

Terdapat beberapa robekan yang dapat terjadi, yaitu laserasi, luka episiotomi, robekan perineum derajat ringan sampai berat (robekan hingga sphincter ani), robekan pada dinding vagina, forniks uteri, serviks, daerah sekitar clitoris, uretra dan yang terparah adalah ruptur uteri (Musa, 2019).

d) Gangguan pembekuan darah

Gangguan pembekuan darah pada perdarahan postpartum biasanya dicurigai menjadi penyebab setelah penyebab lain tidak ditemukan seperti atonia uteri, *rest* plasenta, retensio plasenta, dan robekan jalan lahir. Pada seseorang dengan gangguan pembekuan darah, didapatkan trombositopenia dan hipofibrinogenemia dimana kedua faktor ini merupakan komponen faktor pembekuan darah sehingga jika terjadi perlukaan maka akan terjadi perdarahan yang lama dan susah untuk berhenti. Sama halnya pada saat orang ini hamil dan melahirkan maka akan terjadi perlukaan baik itu pada jalan lahir maupun uterus sehingga akan mengakibatkan perdarahan postpartum (Mukarram, 2020).

## 6. Gejala dan Tanda

Efek perdarahan banyak bergantung pada volume darah sebelum hamil, derajat hipervolemia-terinduksi kehamilan, dan derajat anemia saat persalinan. Gambaran Perdarahan postpartum yang dapat mengecohkan adalah kegagalan nadi dan tekanan darah untuk mengalami perubahan besar sampai terjadi kehilangan darah sangat banyak. Kehilangan banyak darah



tersebut menimbulkan tanda-tanda syok yaitu penderita pucat, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, dan lain-lain. Gambaran klinis pada hipovolemia dapat dilihat pada tabel berikut (Cintania, 2020):

Volume darah yang hilang	Tekanan darah (sistolik)	Tanda dan Gejala	Derajat Syok
500-1000 mL (<15 – 20%)	Normal	Tidak ditemukan	-
1000 – 1500 mL (20 – 25%)	80-100 mmHg	- Bradikardi (<100 kali/menit) - Berkeringat - Lemah	Ringan
1500-2000 mL (25 – 35%)	70-80 mmHg	- Takikardi (100-120 kali/menit) - Oligouria - Gelisah	Sedang
2000-3000 mL (35 – 50%)	50-70 mmHg	- Takikardi (>120 kali/menit) - Anuria	Berat

**Tabel 2.1** Gambaran Klinis Perdarahan Obstetri

## 7. Diagnosis

No	Gejala dan tanda yang selalu ada	Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada	Diagnosis kemungkinan
1.	- Uterus tidak berkontraksi dan lembek - Perdarahan berakhir setelah anak lahir (Perdarahan Pascasalin Primer atau P3)	- Syok	- Atonia uteri
2.	- Perdarahan segera (P3) - Darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir (P3) - Uterus kontraksi baik - Plasenta lengkap	- Pucat - Lemah - Menggigil	- Robekan jalan lahir

3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plasenta belum lahir setelah 30 menit</li> <li>- Perdarahan segera (P3)</li> <li>- Uterus kontraksi baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tali putus akibat traksi berlebihan</li> <li>- Inversio uteri akibat tarikan</li> <li>- Perdarahan lanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Retensio plasenta</li> </ul>
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plasenta atau sebagian selaput (mengandung pembuluh darah) tidak lengkap</li> <li>- Perdarahan segera (P3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus uteri tidak berkurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tertinggalnya sebagian plasenta</li> </ul>
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uterus tidak teraba</li> <li>- Lumen vagina terisi massa</li> <li>- Tampak tali pusat (jika plasenta belum lahir)</li> <li>- Perdarahan segera (P3)</li> <li>- Nyeri sedikit atau berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syok neurogenik</li> <li>- Pucat dan limbung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inversio uteri</li> </ul>
6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub-involusi uterus</li> <li>- Nyeri tekan perut bawah</li> <li>- Perdarahan lebih dari 24 jam setelah persalinan. Perdarahan sekunder atau P2S.</li> <li>- Perdarahan bervariasi (ringan atau berat, terus menerus atau tidak teratur) dan berbau (jika disertai infeksi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anemia</li> <li>- Demam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdarahan terlambat</li> <li>- Endometritis atau sisa plasenta (terinfeksi atau tidak)</li> </ul>
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdarahan segera (P3) (Perdarahan intra-abdomen dan atau vagina)</li> <li>- Nyeri perut berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syok</li> <li>- Nyeri tekan perut</li> <li>- Denyut nadi ibu cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robekan dinding uterus (ruptura uteri)</li> </ul>

**Tabel 2.2** Diagnosis perdarahan postpartum (Cintania 2020)

Diagnosis lain juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Obstetric Shock Index (OSI), metode The Rule of 30, dan metode diagnostik Point of Care.

- Diagnosis dengan Obstetric Shock Index membagi denyut nadi dalam semenit dengan tekanan sistolik jika hasil  $>1$  maka pasien diindikasikan mengalami perdarahan postpartum (Julieta and Widiastuti Giri, 2021).
- The Rule of 30 menilai dari kondisi pasien. Kriteria postpartum haemorrhage dengan metode ini adalah penurunan tekanan darah  $>30$  mmHg, peningkatan heart rate minimal 30 kali per menit, respiratory rate lebih dari 30 kali tarikan napas per menit, dibarengi dengan penurunan hematokrit atau hemoglobin lebih dari 30%, dan penurunan kadar ekskresi urin menjadi kurang 30 mL per jam (Julieta and Widiastuti Giri, 2021).
- Metode Point of Care dilakukan menggunakan viscoelastic test yaitu ROTEM dan TEG. Tes diagnostik ini dapat mengevaluasi coagulation tests of platelet count, prothrombin time, partial thromboplastin time, dan fibrinogen level dengan cepat (Julieta dan Widiastuti Giri 2021).

## 8. Tatalaksana

Manajemen aktif persalinan kala tiga terbukti mencegah terjadinya perdarahan postpartum. Manajemen aktif persalinan kala tiga terdiri dari tiga tindakan yaitu injeksi oksitosin segera setelah bayi lahir, penegangan tali pusat terkendali, dan masase uterus pasca kelahiran plasenta.

Prosedur penanganan perdarahan postpartum dapat disingkat dengan HAEMOSTASIS. Tatalaksana ini terdiri dari tatalaksana awal diantaranya meminta bantuan, memasang jalur intravena dengan kateter ukuran besar, mencari etiologi dan melakukan masase uterus. Langkah selanjutnya yaitu

memberikan obat-obatan berupa preparat uterotonika, diantaranya oksitosin, metilergometrin, dan misoprostol. Oksitosin diberikan 10-20 unit dalam 500 mL NaCl 0,9% atau 10 unit intramuskular. Misoprostol merupakan analog prostaglandin E1 diberikan dengan dosis 600-1000 mcg dengan rute pemberian per oral, rektal atau vaginal.

Setelah memberikan obat-obatan, langkah selanjutnya adalah memberikan tatalaksana konservatif non bedah, seperti menyingkirkan faktor sisa plasenta atau robekan jalan lahir, melakukan kompresi bimanual atau kompresi aorta abdominal, serta memasang tampon uterus vagina dan kondom kateter. Langkah selanjutnya dari tatalaksana perdarahan postpartum adalah melakukan tatalaksana konservatif bedah, yakni metode kompresi uterus dengan teknik B-Lynch, devaskularisasi sistem perdarahan pelvis, atau embolisasi arteri uterina dengan radiologi intervensi. Langkah terakhir adalah melakukan histerektomi subtotal atau total.

WHO membuat rekomendasi penanganan perdarahan postpartum yang kurang lebih sama dengan langkah HAEMOSTASIS. Berikut penjabaran praktis upaya tatalaksana perdarahan postpartum dan persiapan rujukan pada berbagai kondisi (Simanjuntak, 2020):

MNEMONIC		
H	Meminta pertolongan	Langkah awal
A	Akses vena dengan kateter ukuran besar (18G) dan infus kristaloid (NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) serta transfusi	
E	Etiologi dan preparat uterotonik	

M	Masase uterus	
O	Preparat uterotonik dan misoprostol	Obat-obatan
S	Persiapan kamar operasi, Singkirkan faktor sisa plasenta, robekan jalan lahir, kompresi bimanual dan kompresi aorta abdominal	Konservatif non-bedah
T	Tampon uterus vagina, kondom kateter	
A	Kompresi uterus (bedah), teknik B-Lynch	Konservatif bedah
S	Devaskularisasi sistem perdarahan pelvis	
I	Embolisasi a. Uteri dengan radiologi intervensi	
S	Histerektomi subtotal/total	<i>Last effort/langkah akhir</i>

**Tabel 2.3** Langkah HAEMOSTASIS untuk tatalaksana perdarahan postpartum

### C. Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Kejadian Perdarahan Post Partum

Berat badan bayi lahir merupakan faktor risiko yang meningkatkan kejadian pendarahan post partum, apabila ibu melahirkan bayi besar (makrosomia) yaitu bayi baru lahir dengan berat lebih dari 4000 gram (Afrika and Riski, 2021). Besarnya berat bayi yang dilahirkan dapat berisiko pada perdarahan postpartum akibat terjadinya ruptur perineum atau robeknya jalan lahir dan juga dapat menimbulkan lemahnya kontraksi otot myometrium. Kisaran berat badan lahir normal adalah 2500 - 4000 gram, sementara berat badan lahir rendah < 2500 gram dan berat badan lahir besar (makrosomia) >


4000 gram (Sylvia, 2019). Berdasarkan hasil data RISKESDAS tahun 2007, persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,1%, sedangkan pada tahun 2010 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 6,4%. sedangkan pada tahun 2013 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 4,8%, dan pada tahun 2018 persentase berat badan lahir bayi > 4000 gram sebesar 3,7% (Kemenkes RI, 2018).

Perdarahan post partum dapat terjadi pada ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan  $\geq 4000$  gram karena ukuran janin yang besar membuat peregangan pada uterus saat proses persalinan. Hal ini menjadikan miometrium sulit berkontraksi, sehingga kontraksi uterus setelah persalinan akan terganggu, dan menyebabkan pembuluh darah pada dinding uterus akan terbuka dan dapat menyebabkan darah terus keluar dan menyebabkan terjadinya perdarahan post partum (Turiyani, 2023).

Pada partus normal dengan berat badan lahir bayi > 4000 gram, juga dapat terjadi ruptur perineum maupun laserasi jalan lahir yang juga menjadi salah satu faktor perdarahan post partum. Laserasi jalan lahir merupakan penyebab kedua perdarahan setelah atonia uteri yang terjadi pada hampir persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Semakin besar berat badan bayi yang dilahirkan akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum, karena perineum tidak cukup kuat menahan regangan kepala bayi dengan berat badan bayi yang besar, sehingga pada proses kelahiran bayi dengan berat badan bayi lahir yang besar sering terjadi ruptur perineum. (Wijayanti, 2019).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mia Dwi Agustiani pada tahun 2016 didapatkan adanya hubungan antara perdarahan postpartum pada ibu bersalin dengan berat bayi makrosomia. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Turiyani pada tahun 2023, didapatkan bahwa hasil uji statistik *chi-square* didapatkan  $p\text{-value} = 0,000$  yang mengartikan terdapat hubungan yang bermakna antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan postpartum, dan hal ini membuat hipotesis yang menyebutkan adanya hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan postpartum terbukti (Turiyani, 2023).


#### D. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori



### E. Kerangka Konsep



Keterangan :

□ : Variabel independen

○ : Variabel dependen

→ : Hubungan yang diteliti

**Gambar 2.2** Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan desain *cross sectional* mengambil data dari sebuah rekam medik medis berupa kejadian perdarahan post partum primer pada ibu yang telah melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Ananda Makassar.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023.

#### **C. Variabel Penelitian**

Variabel independen pada penelitian ini adalah berat badan lahir bayi, sedangkan variabel dependen adalah perdarahan post partum primer.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### 1. Populasi penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah semua ibu melahirkan yang mengalami perdarahan post partum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar dari tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022. Jumlah ibu hamil yang mengalami perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember 2022 adalah 175 orang.

## 2. Sampel penelitian

Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai subyek dalam penelitian. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Sampel dalam penelitian ini adalah Sebagian rekam medik ibu yang mengalami perdarahan post partum primer dengan berat badan lahir bayi yang tertera di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Kota Makassar dengan memperhatikan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus *Slovin*.

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\
 n &= \frac{175}{1 + 175(0,05)^2} \\
 &= \frac{175}{1 + 175(0,0025)} \\
 &= \frac{175}{1 + 0,4375} \\
 &= \frac{175}{1,4375} \\
 &= 121.73 \text{ (dibulatkan menjadi 122)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah total populasi

$e$  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan (5%)

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 122 orang.

Kriteria inklusi :

1. Ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022
2. Informasi dalam rekam medis jelas dan dapat dibaca (data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah nomor rekam medis, identitas dan berat badan lahir bayi)

Kriteria eksklusi :

1. Ibu dengan kehamilan gemelli
2. Ibu dengan polihidramnion
3. Ibu dengan penyakit koagulopati
4. Ibu yang mengalami retensio plasenta & *rest* plasenta

**E. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari 01 Januari - 31 Desember 2022.

**F. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang didapatkan dari data rekam medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar dari Januari - Desember 2022. *Purposive sampling* merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

## G. Teknik Pengolahan/Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang didapatkan adalah hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Pada penelitian ini analisis data digunakan untuk menguji hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum.


### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi frekuensi dari masing-masing variabel yang diteliti.

### 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Chi Square* dengan bantuan software uji statistik.

## H. Alur Penelitian



**Gambar 3. 1** Metode Pengumpulan Data

### **I. Etika Penelitian**

Etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menurut surat dengan nomor **B-189/KEPK/FKIK/XII/2021** adalah sebagai berikut :

- a) Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b) Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
- c) Menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga tidak merasa dirugikan.
- d) Tidak memaksa dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Ananda Makassar yang terletak di Jl. Andi Djemma No.57, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar tahun 2022. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data lalu peneliti melakukan analisis data sebagai berikut :

##### 1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 122 sampel. Adapun distribusi sampel penelitian dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Distribusi sampel berdasarkan Diagnosa, Usia Ibu, Paritas, Pekerjaan dan Berat Badan Lahir Bayi di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Karakteristik	Frekuensi	
	N	%
<b>Diagnosa Perdarahan Post Partum Primer</b>		
a. Ya	86	70,5
b. Tidak	36	29,5
<b>Usia Ibu</b>		
a. Risiko tinggi : Usia < 20 atau > 35	16	13,1
b. Risiko rendah : Usia 20 - 35	106	86,9

<b>Paritas</b>		
a. Risiko tinggi : < 2 atau $\geq$ 4	84	68,9
b. Risiko rendah : 2 - 3	38	31,1
<b>Pekerjaan</b>		
a. Risiko tinggi : Bekerja	43	35,2
b. Risiko rendah : Tidak bekerja	79	64,8
<b>Berat Badan Lahir Bayi</b>		
a. Risiko Tinggi : $\geq$ 4000 gram	9	7,4
b. Risiko Rendah : < 4000 gram	113	92,6
<b>Total</b>	<b>122</b>	<b>100</b>

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel yaitu 122 sampel yang terdiri dari 86 sampel yang terdiagnosa perdarahan post partum dan 36 sampel yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum. Distribusi karakteristik usia ibu bersalin sebagian besar berusia diantara 20 – 35 tahun yaitu sebanyak 106 sampel (86,9%) dan ibu berusia < 20 atau > 35 tahun sebanyak 16 sampel (13,1%). Berdasarkan karakteristik paritas, sebagian besar terdiri dari ibu bersalin dengan paritas < 2 atau  $\geq$  4 anak berjumlah 84 sampel (68,9 %), sedangkan ibu bersalin dengan paritas 2-3 anak berjumlah 38 sampel (31,1%). Berdasarkan karakteristik pekerjaan, sebagian besar terdiri dari ibu bersalin yang tidak bekerja dengan jumlah 79 sampel (64,8 %), sedangkan ibu bersalin yang bekerja berjumlah 43 sampel (35,2%). Berdasarkan distribusi variabel yang diteliti yaitu berat badan lahir bayi, distribusi berat badan lahir bayi  $\geq$  4000 gram sebanyak 9 sampel (7,4%) dan



distribusi berat badan lahir bayi < 4000 gram sebanyak 113 sampel (92,6 %).

## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan uji *chi-square* untuk mengetahui perbandingan faktor risiko dari setiap variabel independen terhadap sampel. Analisis ini dilakukan untuk membuktikan adanya hubungan antara berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum primer. Adapun analisis hubungan antara berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum primer dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2** Analisis hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Berat Badan Lahir Bayi	Perdarahan Post Partum Primer				Total		p-value	OR	CI 95%
	Ya		Tidak		N	%			
	Ya	%	Tidak	%					
< 4000 gram	77	89,5	36	100	113	92,6			
≥ 4000 gram	9	10,5	0	0	9	7,4	0,057	0,681	0,601 – 0,773
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>100</b>			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.2 ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi < 4000 gram yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 77 sampel (89,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 36 sampel (100%). Sedangkan pada ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi ≥ 4000 gram yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 9 sampel (10,5%) dan

yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki distribusi 0 sampel (0%). Syarat uji *chi-square* adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, dan tidak boleh ada angka nol di tabel count, serta tidak boleh ada cell yang lebih dari 25%. Karena nilai expected tidak memenuhi syarat maka dari itu uji yang digunakan adalah uji alternatif yakni uji fisher yaitu  $p\text{-value} = 0,054$  ( $p > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian perdarahan post partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu dengan berat bayi  $\geq 4000$  gram (risiko tinggi) yang mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai OR = 0,681 (CI 95% = 0,601-0,773) hal ini berarti ibu dengan berat bayi  $\geq 4000$  gram (risiko tinggi) memiliki risiko 0,681 kali untuk terjadinya perdarahan post partum primer dibandingkan dengan ibu yang berat bayinya  $< 4000$  gram (risiko rendah).

**Tabel 4.3** Analisis hubungan usia ibu dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Usia Ibu	Perdarahan				Total		p-value	OR	CI 95%
	Post Partum Primer				N	%			
	Ya	%	Tidak	%					
20-35 tahun	77	89,5	29	80,6	106	86,9	0,239	0,484	0,165 – 1,420
<20 atau >35 tahun	9	10,5	7	19,4	16	13,1			
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>100</b>			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.3 ibu bersalin yang berusia 20-35 tahun dan terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 77 sampel (89,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 29 sampel (80,6%). Sedangkan pada ibu bersalin berusia

<20 atau >35 tahun yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 9 sampel (10,5%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki distribusi 7 sampel (19,4%). Syarat uji *chi-square* adalah sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, dan tidak boleh ada angka nol di tabel count, serta tidak boleh ada cell yang lebih dari 25%. Karena nilai expected tidak memenuhi syarat maka dari itu uji yang digunakan adalah uji alternatif yakni uji fisher yaitu  $p\text{-value} = 0,239$  ( $p > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu terhadap kejadian perdarahan post partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu berusia <20 atau >35 tahun yang mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai OR = 0,484 (CI 95% = 0,165 – 1,420) hal ini berarti ibu dengan usia <20 atau >35 tahun (risiko tinggi) memiliki resiko 0,484 kali untuk terjadinya perdarahan post partum primer dibandingkan dengan ibu dengan usia 20-35 tahun (risiko rendah).

**Tabel 4.4** Analisis hubungan paritas dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Paritas	Perdarahan				Total		p-value	OR	CI 95%
	Post Partum Primer		Tidak		N	%			
	Ya	%	Tidak	%	N	%			
2 - 3	25	29,1	13	36,1	38	31,1			
<2 atau ≥ 4	61	70,9	23	63,9	84	68,9	0,581	1,379	0,605 – 3,144
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>100</b>			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.4 ibu bersalin dengan paritas 2 - 3 dan terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 25 sampel (29,1%) dan

yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 13 sampel (36,1%). Sedangkan pada ibu bersalin dengan paritas  $<2$  atau  $\geq 4$  yang terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 61 sampel (70,9%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki distribusi 23 sampel (63,9%). Hasil analisis *chi-square* didapatkan  $p\text{-value} = 0,581$  ( $p > 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara paritas terhadap kejadian perdarahan post partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu dengan paritas  $<2$  atau  $\geq 4$  yang mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai  $OR = 1,379$  ( $CI\ 95\% = 0,605 - 3,144$ ) hal ini berarti ibu dengan paritas  $<2$  atau  $\geq 4$  (risiko tinggi) memiliki resiko 1,379 kali untuk terjadinya perdarahan post partum primer dibandingkan dengan ibu dengan paritas 2-3 (risiko rendah).

**Tabel 4.5** Analisis hubungan pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Pekerjaan	Perdarahan				Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%
	Post Partum Primer				N	%			
	Ya	%	Tidak	%					
Tidak Bekerja	50	58,1	29	80,6	79	64,8	0,031	2,983	1,177 – 7,560
Bekerja	36	41,9	7	19,4	43	35,2			
<b>Total</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>100</b>			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.5 ibu bersalin yang tidak bekerja dan terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 50 sampel (58,1%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 29 sampel (80,6%). Sedangkan pada ibu bersalin yang bekerja dan

terdiagnosa perdarahan post partum primer memiliki distribusi 36 sampel (41,9%) dan yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum memiliki distribusi 7 sampel (19,4%). Hasil analisis *chi-square* didapatkan *p-value* = 0,031 ( $p < 0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan terhadap kejadian perdarahan post partum primer. Untuk mengetahui besarnya risiko pada ibu bersalin pekerja yang mengalami perdarahan post partum primer maka diketahui nilai OR = 2,983 (CI 95% = 1,177 – 7,560) hal ini berarti ibu bersalin yang bekerja (risiko tinggi) memiliki resiko 2,983 kali untuk terjadinya perdarahan post partum primer dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidak bekerja (risiko rendah).

## **B. Pembahasan**

Telah dilaksanakan penelitian mengenai hubungan berat badan lahir bayi dengan perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar per tanggal 01 Januari sampai 31 Desember Tahun 2022. Selama dilaksanakannya penelitian diperoleh sebanyak 122 sampel.

### **1. Hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer**

Hasil uji statistik dengan uji *chi-square* didapatkan *p-value* = 0,054 ( $p > 0,05$ ), yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryani Sultan pada tahun 2020 di RSIA Sitti Khadijah

1 dengan jumlah sampel sebanyak 77 sampel yang terdiri atas 67 sampel kasus dan 10 sampel kontrol. Hasil analisis data dengan uji *chi-square* didapatkan *p-value* = 1,000 ( $p > 0.05$ ), yang menunjukkan bahwa berat badan lahir bayi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian perdarahan post partum. Selain itu, penelitian dengan hasil yang sama juga diperoleh Izfa Rifdiani pada tahun 2016 di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Blitar dengan jumlah sampel sebanyak 90 sampel yang terdiri atas 45 sampel kasus dan 45 sampel kontrol. Hasil analisis data dengan uji *regresi logistic multivariate* didapatkan hasil *p-value* = 0,648 ( $p < 0,25$ ), yang menunjukkan bahwa berat badan lahir bayi tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian perdarahan post partum,

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Turiyani pada tahun 2023 dengan jumlah sampel 326 responden, dimana 67 ibu dengan berat bayi lahir risiko tinggi terdapat 52 ibu (16%) yang terdiagnosa perdarahan post partum sebanyak dan 15 ibu (4,6%) yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum. Dan dari 259 ibu dengan berat bayi lahir risiko rendah terdapat 70 ibu (21,5%) yang terdiagnosa perdarahan post partum dan 189 ibu (58%) yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum. Hasil Uji statistic *Chi-Square* *p-value* = 0,000 ( $p > 0.05$ ) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum.

Secara teori, Berat badan bayi lahir termasuk dalam salah satu faktor risiko yang mempengaruhi proses persalinan. Besarnya berat bayi yang dilahirkan dapat berisiko pada perdarahan post partum akibat terjadinya ruptur perineum atau robeknya jalan lahir dan juga dapat menimbulkan lemahnya kontraksi otot dinding uterus. Hal ini menjadikan miometrium sulit berkontraksi, sehingga kontraksi uterus pasca salin akan terganggu, dan menyebabkan pembuluh darah pada miometrium akan terbuka dan dapat menyebabkan darah terus keluar dan menyebabkan terjadinya perdarahan post partum (Turiyani, 2023).

Pada saat pengambilan data, sampel yang terpilih ternyata sebagian besar merupakan ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan kurang dari 4000 gram, baik ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan post partum primer, maupun ibu bersalin yang tidak terdiagnosa perdarahan post partum primer. Sampel ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan dibawah 4000 gram sebanyak 113 sampel, sedangkan sampel ibu bersalin yang melahirkan bayi dengan berat badan di atas 4000 gram sebanyak 9 sampel. Kelahiran dengan ukuran bayi yang  $\geq 4000$  gram perlu penanganan khusus agar menghindari risiko terjadinya perdarahan post partum.

Hasil ini memengaruhi uji statistik pengaruh berat bayi lahir terhadap kejadian perdarahan postpartum, sehingga hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel berat bayi lahir terhadap kejadian perdarahan postpartum.

## 2. Hubungan pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum primer

Hasil uji statistik dengan uji *chi-square* didapatkan  $p\text{-value} = 0,031$  ( $p < 0,05$ ), *Odds Ratio* (OR) Sebesar 2,983 pada CI 95% dengan lower limit (LL) sebesar 1,177 dan Upper limit (UL) sebesar 7,560. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin yang bekerja memiliki risiko 2,983 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja/IRT. Hasil ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian perdarahan postpartum primer.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risa Pitriani pada tahun 2017 di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dengan jumlah sampel 144 yang terdiri dari 72 sampel kasus dan 72 sampel kontrol. Hasil uji statistik dengan uji *chi-square* didapatkan  $p\text{-value} = 0,000$  ( $p < 0,05$ ) dengan nilai *Odds Ratio* (OR) = 7,600 (CI 95% = 3,587-16,101), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Artika Dewie pada tahun 2020 di RSUD Undata Palu dengan jumlah sampel 74 yang terdiri dari 37 sampel kasus dan 37 sampel kontrol. Hasil uji statistik dengan uji *chi-square* didapatkan  $p\text{-value} = 1,000$  ( $p > 0,05$ ) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kejadian perdarahan postpartum primer.



Menurut peneliti, hal ini dapat terjadi karena ibu yang bekerja memiliki aktivitas tambahan yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan juga janin. Aktivitas yang berlebih dan tuntutan pekerjaan pada ibu hamil dapat mengakibatkan waktu istirahat berkurang, asupan nutrisi yang tidak adekuat yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan ibu hamil.

### C. Keterbatasan Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan ini telah diusahakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah dan tidak melanggar etik penelitian yang telah ditetapkan. Akan tetapi, tentu masih memiliki beberapa sebagai berikut :

1. Dalam penelitian dengan menggunakan data sekunder ini, diperoleh beberapa catatan medik yang tidak lengkap dalam berkas sehingga dikategorikan sebagai missing case dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
2. Penulisan data yang ditulis tangan yang memberi kemungkinan adanya kesalahan data yang tertulis, sehingga validitas penelitian sangat bergantung pada validitas pada rekam medik.
3. Sampel data yang terpilih cenderung bertolak belakang dengan sampel data yang diharapkan oleh peneliti, yang berpengaruh pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh metode penelitian dengan pendekatan yang kurang tepat, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode penelitian *case control* dengan penggunaan rumus penarikan sampel yang sesuai agar memungkinkan

penarikan jumlah sampel yang lebih besar, yang akan mempengaruhi hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yaitu hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Jumlah ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi dibawah 4000 gram sebanyak 113 sampel (89,5%), sedangkan jumlah ibu bersalin dengan berat badan lahir bayi tidak optimal sebanyak 9 sampel (10,5%).
2. Angka kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 adalah sebanyak 175 kasus yang terdiri atas ruptur perineum derajat II, derajat III, atonia uteri, serta perdarahan post partum sekunder.
3. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir bayi dengan kejadian perdarahan post partum di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.

#### **B. Saran**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar dalam penelitian selanjutnya. Mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel yang belum terdapat pada penelitian ini dengan sampel dan metode serta lokasi penelitian yang berbeda. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan metode penarikan sampel lain agar memudahkan peneliti dalam penarikan sampel yang lebih besar.

## 2. Bagi Masyarakat

Memperhatikan faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya kejadian perdarahan post partum sehingga dapat melakukan pencegahan.

## 3. Bagi Rumah Sakit

Membuat program-program yang dapat memberikan edukasi mengenai bahaya perdarahan setelah persalinan dan cara pencegahannya serta melakukan pencatatan data rekam medik secara lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sylvia Damayanti. (2021) Hubungan Berat Badan Lahir dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes Periode Februari – Juli 2018. S1 Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- WHO (World Health Statistics). (2018) ‘Angka Kematian Ibu Dan Angka Kematian Bayi.’
- Kementerian Kesehatan RI. (2018) ‘Profil Kesehatan Indonesia 2017.’
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an & Terjemahnya, <https://quran.kemenag.go.id/>
- Afrika, E. and Riski, M. (2021) ‘Hubungan Berat Badan Bayi Lahir dan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Post Partum’, *Journal of Midwifery Science*, 1, pp. 22–32.
- Almutairi, W. M. (2021) ‘Literature review: Physiological management for preventing postpartum hemorrhage’, *Healthcare (Switzerland)*, 9(6). doi: 10.3390/healthcare9060658.
- Amiruddin, N. A., Delima, A. A. and Fauziah, H. (2022) ‘Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Angka Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)’, *UMI Medical Journal*, 7(2), pp. 132–140. doi: 10.33096/umj.v7i2.216.
- Ayu Sekar R, P. (2022) ‘Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting’, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Cintania, B. (2020) ‘Gambaran Kejadian Perdarahan Postpartum Berdasarkan Paritas dan Anemia di RS Asy Syifa Medika Tahun 2019’, *Diploma Thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, pp. 10–34.
- Daryanti, A. . (2019) ‘Hubungan Berat Badan dan Panjang Badan Lahir dengan Tingkat Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan di Wilayah Puskesmas Bareng Kota Malang’, pp. 7–26.

- Fitriani (2022) 'Konsep Makanan Halalan Thayyiban Dalam Qs. Al-Baqarah : 168 Perspektif Quraish Shihab Dan Ilmu Kesehatan', *NIHAIYYAT: Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 1(1), pp. 55–59.
- Gladstone, M. E. *et al.* (2021) 'Birthweight Measurement Processes and Perceived Value: Qualitative Research in One EN-BIRTH Study Hospital in Tanzania', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(Suppl 1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s12884-020-03356-2.
- Jamil, T., Bryant, S. B. and Wormer, K. C. (2022) 'Acute Postpartum Hemorrhage', *StatPearls Internet*.
- Julieta, N. P. N. and Widiastuti Giri, M. K. (2021) 'Postpartum Hemorrhage: Kegawatdaruratan dalam Persalinan Ibu Hamil', *Ganesha Medicine*, 1(1), p. 48. doi: 10.23887/gm.v1i1.31709.
- Katsir, I. (2004) 'Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1', in *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 1, 3, 6, 7)*, pp. 319–320; 362–363; 371–373; 400–402.
- Kemkes RI (2019) *Profil Kesehatan Indonesia 2019, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Available at: <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf>.
- Kemkes RI (2018) 'Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018', *Kementerian Kesehatan RI*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Mukarram, Y. I. (2020) 'Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC dengan Onset Perdarahan Postpartum di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2018', *Undergraduate (S1) thesis*, 21(1), pp. 1–9.
- Musa, S. M. (2019) 'Insiden Dan Faktor Risiko Perdarahan Postpartum Pada Persalinan Pervaginam: Studi Literatur', *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 4(2), pp. 28–35.
- Puspitasari, N. F. (2019) 'Hubungan Antara Jarak Kehamilan dengan Perdarahan Post Partum', pp. 6–21.

- Quina, G. S., Irianton, A. and Noor (2019) 'Kajian Kualitas Asupan Energi dari Proporsi Karbohidrat, Protein, dan Lemak pada Ibu Hamil Berisiko di Kabupaten Kulon Progo', *Jurnal Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta*, pp. 10–25.
- Ramadhan, J. W., Rasyid, R. and Rusnita, D. (2019) 'Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di RSUP Dr. M. Djamil Padang', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(2S), p. 46. doi: 10.25077/jka.v8i2s.958.
- Regen, S. and Yanuarti, T. (2022) 'Efektifitas Penggunaan Misoprostol dan Oksitosin pada Penanganan Perdarahan Post Partum di BPM Suryati Bekasi', *Malahayati Nursing Journal*, 4(4), pp. 840–852. doi: 10.33024/mnj.v4i4.5996.
- Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (2021) 'Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020'.
- Republik Indonesia, K. K. (2021) Profil Kesehatan Indonesia 2020, *IT - Information Technology*. doi: 10.1524/itit.2006.48.1.6.
- Satriyandari, Y. and Hariyati, N. R. (2019) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum', *Journal of Health Studies*, 1(1), pp. 49–64.
- Shihab, M. Q. (2005) 'Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an', in *Tafsir Al-Mishbah (Jilid 1, 5, 11, 13)*, pp. 75-76; 86-87; 127-131; 379–381.
- Simanjuntak, L. (2020) 'Perdarahan Postpartum (Perdarahan Paskasalin)', *Jurnal Visi Eksakta*, 1(1), pp. 1–10. doi: 10.51622/eksakta.v1i1.51.
- Sugandi, R. (2019) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BBLR di Wilayah kerja Puskemas Wager Kabupaten Malang', *Poltekkes rs dr. Soepraoen*, (Malang, 2019), pp. 49–56.
- Tamimi, I. M. (2022) 'Adab Berhias Perempuan Menurut Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)', *Undergraduate (S1) thesis*, pp. 49–54.

- Turiyani (2023) 'Hubungan Jarak Kehamilan dan Berat Lahir Bayi dengan Kejadian Haemoragic Post Partum di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih', *Bidang, Jurnal Kesehatan, Ilmu Kebidanan, Akademi Husada, Rangka*, 13(1), pp. 79–87.
- WHO (2015) Centers for Disease and Control Prevention. *Worldwide Prevalence of Hospitalisation, NHK*.
- Wijayanti, H. N. (2019) 'Hubungan Berat Badan Bayi Baru Lahir dengan Kejadian Ruptur Perineum Persalinan Normal pada Ibu Primigravida', *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7(1), p. 26. doi: 10.20961/placentum.v7i1.24992.
- Windy, R. T., Huda, S. N. and Elza, I. (2019) 'Kajian BBLR, Kelengkapan Imunisasi Dasar, dan Status ASI Eksklusif Terhadap Kejadian Stunting pada Anak Balita (12-60 Bulan) di Desa Sendangsari, Kecamatan Minggir, Sleman', *Thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.*, pp. 5–20.
- Yunadi, F. D., Septianingsih, R. and Andika, R. (2019) 'Hubungan Anemia dengan Kejadian Perdarahan Pasca Persalinan (The Relationship Of Anemia With The Postpartum Hemorrhage)', *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad*, XII(2), pp. 47–52.



## LAMPIRAN

*Lampiran 1 Master Table*

No	Nomor RM	Nama	Usia Ibu	Status obstetri	Pekerjaan	BB	Diagnosis
1	10-82-45	Ny. N. T.	27	G2P1A0	IRT	3.570 gr	Atonia Uteri
2	10-67-23	Ny. A. I.	29	G1P0A0	IRT	4.045 gr	Atonia Uteri
3	10-66-61	Ny. M. K.	29	G1P0A0	K. Swasta	3.285 gr	Atonia Uteri
4	10-60-41	Ny. S. A. J.	28	G3P1A1	IRT	3.215 gr	Atonia Uteri
5	10-60-12	Ny. H. A. P.	20	G1P0A0	Pelajar/Mahasiswa	3.455 gr	Atonia Uteri
6	10-59-46	Ny. A. A.	18	G1P0A0	Pelajar/Mahasiswa	2.460 gr	Atonia Uteri
7	10-57-28	Ny. S. N. A. N.	27	G3P1A1	IRT	2.820 gr	Atonia Uteri
8	10-50-90	Ny. N. N. R.	28	G2P1A0	IRT	2.800 gr	Ruptur Perineum Tk. II
9	10-50-49	Ny. A. A. H.	31	G1P0A0	Bidan	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
10	10-50-29	Ny. W. A.	20	G1P0A0	IRT	2.065 gr	APN
11	10-50-06	Ny. I. S.	27	G1P0A0	IRT	3.290 gr	Ruptur Perineum Tk. II
12	10-48-87	Ny. A. A.	22	G1P0A0	K. Honorer	2.850 gr	Ruptur Perineum Tk. II
13	10-48-45	Ny. H. Y.	26	G1P0A0	IRT	2.900 gr	APN
14	10-48-05	Ny. V. E. A. H.	26	G1P0A0	IRT	3.700 gr	Ruptur Perineum Tk. II
15	10-47-47	Ny. H. A.	40	G3P2A0	IRT	2.900 gr	Ruptur Perineum Tk. II
16	10-29-98	Ny. N. R. Y.	23	G3P1A1	IRT	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
17	10-26-77	Ny. S. T.	31	G3P2A0	Tidak Bekerja	2.900 gr	Ruptur Perineum Tk. II
18	10-26-72	Ny. N. R. J.	31	G5P3A1	IRT	2.500 gr	APN
19	10-26-70	Ny. R. A.	20	G1P0A0	IRT	3.040 gr	APN
20	10-26-57	Ny. S. A. N. I.	24	G1P0A0	IRT	3.300 gr	Ruptur Perineum Tk. II
21	10-26-48	Ny. H. I.	39	G4P3A0	K. Swasta	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
22	10-26-09	Ny. M. N.	37	G2P1A0	IRT	2.800 gr	APN
23	10-26-04	Ny. S. H.	33	G1P0A0	K. Swasta	3.300 gr	Ruptur Perineum Tk. II
24	10-25-89	Ny. A. M. S.	28	G3P2A0	IRT	3.100 gr	Ruptur Perineum Tk. II
25	10-25-84	Ny. A. I.	30	G1P0A0	IRT	3.550 gr	Ruptur Perineum Tk. II
26	10-25-84	Ny. A. I.	30	G3P2A0	IRT	3.690 gr	Atonia Uteri
27	10-25-69	Ny. N. W. Y.	26	G1P0A0	K. Swasta	2.620 gr	APN
28	10-25-45	Ny. N. L.	28	G1P0A0	IRT	2.500 gr	APN
29	10-25-40	Ny. I. F.	41	G5P3A1	IRT	3.200 gr	APN
30	10-25-28	Ny. M. L.	23	G1P0A0	IRT	2.900 gr	APN
31	10-25-26	Ny. A. D. A.	21	G1P0A0	Pelajar/Mahasiswa	3.200 gr	Ruptur Perineum Tk. II
32	10-25-20	Ny. A. N. Z.	17	G1P0A0	IRT	2.800 gr	Ruptur Perineum Tk. II
33	10-25-07	Ny. K. I.	29	G1P0A0	K. BUMN	3.300 gr	Ruptur Perineum Tk. II
34	10-24-99	Ny. S. T.	36	G3P1A1	IRT	3.300 gr	APN
35	10-24-74	Ny. R. S.	27	G3P1A1	IRT	3.050 gr	APN
36	10-24-69	Ny. S. S.	29	G1P0A0	K. Swasta	3.200 gr	Ruptur Perineum Tk. II
37	10-24-50	Ny. H. G.	36	G3P2A0	IRT	3.200 gr	APN
38	10-24-46	Ny. S. A. R.	22	G1P0A0	IRT	2.200 gr	APN
39	10-24-05	Ny. N.M.	25	G1P0A0	IRT	4.040 gr	Ruptur Perineum Tk. II
40	10-24-03	Ny. S. Y.	29	G2P1A0	Tidak Bekerja	2.700 gr	APN

41	10-23-98	Ny. N. R. T.	23	G1P0A0	IRT	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
42	10-23-60	Ny. M. A.	30	G4P2A1	IRT	3.000 gr	APN
43	10-23-56	Ny. R. A.	42	G3P2A0	IRT	2.700 gr	APN
44	10-23-35	Ny. Y. A. F.	19	G1P0A0	IRT	2.570 gr	APN
45	10-22-85	Ny. N. T.	21	G1P0A0	IRT	3.100 gr	APN
46	10-22-84	Ny. R. P.	27	G2P1A0	IRT	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
47	10-22-77	Ny. F. J.	26	G1P0A0	IRT	3.100 gr	Ruptur Perineum Tk. II
48	10-22-70	Ny. G. M.	20	G1P0A0	IRT	2.800 gr	APN
49	10-22-17	Ny. D. M. R.	20	G2P1A0	Tidak Bekerja	4.065 gr	Ruptur Perineum Tk. II
50	10-22-11	Ny. L. D.	24	G1P0A0	IRT	3.100 gr	Ruptur Perineum Tk. II
51	10-22-03	Ny. S. I. M.	26	G1P0A0	PNS	3.400 gr	Ruptur Perineum Tk. II
52	10-21-99	Ny. I. A. R.	26	G2P1A0	IRT	2.760 gr	APN
53	10-21-90	Ny. A. Y.	25	G1P0A0	K. Honorer	2.680 gr	APN
54	10-21-83	Ny. A. M. K. P.	23	G1P0A0	IRT	2.820 gr	Ruptur Perineum Tk. II
55	10-21-52	Ny. A. S. W.	34	G3P2A0	IRT	3.580 gr	Atonia Uteri
56	10-21-48	Ny. N. S.	26	G1P0A0	IRT	3.465 gr	Atonia Uteri
57	10-20-14	Ny. S. R.	38	G3P2A0	IRT	2.870 gr	APN
58	10-14-28	Ny. N. N.	22	G1P0A0	IRT	3.500 gr	Atonia Uteri
59	10-13-64	Ny. F. F.	30	G1P0A0	Apoteker	4.110 gr	Ruptur Perineum Tk. III
60	09-90-31	Ny. J. A.	34	G1P0A0	IRT	2.750 gr	Atonia Uteri
61	09-83-29	Ny. R. A.	23	G2P0A1	K. Swasta	3.250 gr	Ruptur Perineum Tk. II
62	09-81-24	Ny. S. W. N.	21	G1P0A0	IRT	4.100 gr	Ruptur Perineum Tk. III
63	09-81-23	Ny. R. D.	27	G1P0A0	IRT	3.165 gr	Atonia Uteri
64	09-79-17	Ny. N. S.	38	G1P0A0	IRT	3.800 gr	Atonia Uteri
65	09-76-77	Ny. D. M. S.	23	G1P0A0	K. Honorer	2.870 gr	Atonia Uteri
66	09-76-71	Ny. S. F. A.	27	G1P0A0	K. BUMD	2.900 gr	Atonia Uteri
67	09-75-97	Ny. N. R. A.	26	G2P1A0	IRT	2.620 gr	Atonia Uteri
68	09-74-20	Ny. S. C.	26	G1P0A0	IRT	3.480 gr	Ruptur Perineum Tk. II
69	09-73-60	Ny. J. I. M.	29	G1P0A0	K. Swasta	2.900 gr	Ruptur Perineum Tk. II
70	09-73-60	Ny. J. I. M.	29	G1P0A0	K. Swasta	2.900 gr	Atonia Uteri
71	09-73-46	Ny. T. A. T.	30	G1P0A0	Pengacara	3.150 gr	Ruptur Perineum Tk. II
72	09-73-43	Ny. A. F. S.	29	G1P0A0	K. Honorer	2.830 gr	Ruptur Perineum Tk. II
73	09-73-31	Ny. S. Y. Y. L.	19	G1P0A0	IRT	2.730 gr	Ruptur Perineum Tk. II
74	09-73-27	Ny. I. S. H.	27	G1P0A0	Wiraswasta	3.000 gr	Ruptur Perineum Tk. II
75	09-73-10	Ny. A. N. A. N.	24	G1P0A0	IRT	2.960 gr	Ruptur Perineum Tk. II
76	09-72-87	Ny. A. V. F.	29	G1P0A0	IRT	2.600 gr	APN
77	09-72-74	Ny. A. Z. T.	22	G1P0A0	IRT	4.050 gr	Ruptur Perineum Tk. II
78	09-72-34	Ny. R. N. I.	30	G1P0A0	K. Honorer	2.800 gr	APN
79	09-72-26	Ny. I. S.	30	G2P1A0	IRT	2.600 gr	APN
80	09-72-13	Ny. R. R.	30	G1P0A0	IRT	2.800 gr	APN
81	09-72-11	Ny. T. H.	31	G1P0A0	K. Honorer	2.800 gr	Ruptur Perineum Tk. II
82	09-71-94	Ny. S. H.	30	G3P2A0	IRT	3.160 gr	Ruptur Perineum Tk. II
83	09-71-91	Ny. N. H. H.	29	G1P0A0	IRT	2.860 gr	APN
84	09-71-70	Ny. S. L. H.	29	G2P1A0	K. Swasta	3.200 gr	APN
85	09-71-54	Ny. S. L. W. H.	26	G1P0A0	IRT	2.900 gr	Ruptur Perineum Tk. II
86	09-71-49	Ny. R. Y.	29	G2P1A0	K. Honorer	2.800 gr	Ruptur Perineum Tk. II

87	09-71-48	Ny. S. A. N.	22	G1P0A0	K. Swasta	2.800 gr	Ruptur Perineum Tk. II
88	09-71-40	Ny. S. S.	26	G1P0A0	K. Honorer	2.600 gr	APN
89	09-71-29	Ny. R. R.	22	G2P1A0	Wiraswasta	2.860 gr	APN
90	09-71-28	Ny. K. H.	29	G2P1A0	IRT	2.600 gr	APN
91	09-70-89	Ny. M. H.	21	G1P0A0	IRT	3.200 gr	Ruptur Perineum Tk. II
92	09-70-74	Ny. H. A.	35	G3P2A0	Dokter	3.450 gr	APN
93	09-70-61	Ny. W.A.	20	G1P0A0	IRT	2.900 gr	APN
94	09-70-46	Ny. A. M.	26	G1P0A0	IRT	2.100 gr	APN
95	09-70-31	Ny. N. W.	22	G2P0A1	IRT	3.650 gr	Ruptur Perineum Tk. II
96	09-70-25	Ny. F. An.	30	G1P0A0	Tidak Bekerja	2.930 gr	Atonia Uteri
97	09-57-71	Ny. N. D. A.	27	G1P0A0	PNS	3.050 gr	Ruptur Perineum Tk. II
98	09-50-87	Ny. N. A. A. A.	22	G1P0A0	IRT	2.966 gr	Atonia Uteri
99	09-50-33	Ny. D. E. R.	30	G1P0A0	IRT	4.085 gr	Ruptur Perineum Tk. II
100	09-50-24	Ny. A. M.	31	G1P0A0	K. Honorer	4.070 gr	Ruptur Perineum Tk. II
101	09-47-75	Ny. R. Mis.	23	G1P0A0	IRT	3.380 gr	Ruptur Perineum Tk. II
102	09-47-46	Ny. V. E.	31	G2P1A0	K. Swasta	2.855 gr	Ruptur Perineum Tk. II
103	09-34-31	Ny. L. A.	26	G1P0A0	K. Honorer	3.380 gr	Ruptur Perineum Tk. III
104	09-32-59	Ny. H. R.	25	G2P1A0	IRT	4.040 gr	Ruptur Perineum Tk. II
105	09-32-42	Ny. N. I. H.	33	G4P2A1	PNS	3.240 gr	Ruptur Perineum Tk. II
106	09-23-80	Ny. N. A. A. A.	28	G1P0A0	K. Swasta	2.930 gr	Atonia Uteri
107	09-21-29	Ny. S. W.	18	G1P0A0	IRT	3.750 gr	APN
108	09-16-26	Ny. I. P.	35	G1P0A0	K. Swasta	3.360 gr	Atonia Uteri
109	09-14-90	Ny. F.H.	24	G1P0A0	IRT	2.700 gr	APN
110	08-25-50	Ny. N. A. B.	32	G1P0A0	IRT	2.565 gr	Atonia Uteri
111	07-50-40	Ny. N. Z. A.	24	G1P0A0	IRT	2.680 gr	Ruptur Perineum Tk. II
112	07-42-17	Ny. F. H.	24	G2P0A1	Kepolisian	3.900 gr	Atonia Uteri
113	07-24-72	Ny. S. R. R.	24	G1P0A0	IRT	2.820 gr	Ruptur Perineum Tk. II
114	06-87-43	Ny. N. F.	32	G1P0A0	PNS	3.265 gr	Atonia Uteri
115	06-66-52	Ny. F. A.	29	G1P0A0	K. Swasta	3.060 gr	Ruptur Perineum Tk. II
116	06-66-51	Ny. A. L.	30	G2P1A0	PNS	3.285 gr	Ruptur Perineum Tk. II
117	07-02-24	Ny. R. S.	34	G3P2A0	IRT	2.360 gr	Ruptur Perineum Tk. III
118	09-09-94	Ny. A. R.	26	G1P0A0	IRT	3.218 gr	Ruptur Perineum Tk. II
119	10-12-79	Ny. S. W.	31	G1P0A0	IRT	3.230 gr	Ruptur Perineum Tk. II
120	09-01-71	Ny. A. V. W.	37	G2P1A0	K. Swasta	3.250 gr	Atonia Uteri
121	07-06-35	Ny. S. A.	39	G2P0A1	K. Swasta	2.820 gr	Atonia Uteri
122	07-02-31	Ny. M. Z.	27	G2P1A0	IRT	2.890 gr	Ruptur Perineum Tk. III

Lampiran 2 Hasil SPSS

**1. Analisis Univariat**

**Usia Ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 atau >35 tahun	16	13.1	13.1	13.1
	20-35 Tahun	106	86.9	86.9	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

**Paritas**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 - 3 Anak	38	31.1	31.1	100.0
	<2 atau 4≥ anak	84	68.9	68.9	68.9
	Total	122	100.0	100.0	

**Berat Badan Lahir Bayi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Risiko Rendah (< 4000 gram)	113	92.6	92.6	92.6
	Risiko Tinggi (≥ 4000 gram)	9	7.4	7.4	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Bekerja	79	64.8	64.8	64.8
	Bekerja	43	35.2	35.2	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

### Diagnosis PPH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	36	29.5	29.5	29.5
	Ya	86	70.5	70.5	100.0
	Total	122	100.0	100.0	

## 2. Analisis Bivariat

### a. Berat Badan Lahir Bayi

#### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Berat Badan Lahir Bayi * Diagnosis PPH	122	100.0%	0	0.0%	122	100.0%

#### Berat Badan Lahir Bayi \* Diagnosis PPH Crosstabulation

		Count	Diagnosis PPH		Total
			Tidak	Ya	
Berat Badan Risiko Rendah Lahir Bayi (< 4000 gram)	Count	36	77	113	
	Expected Count	33.3	79.7	113.0	
	% within Berat Badan Lahir Bayi	31.9%	68.1%	100.0%	
	% within Diagnosis PPH	100.0%	89.5%	92.6%	
	% of Total	29.5%	63.1%	92.6%	
	Berat Badan Risiko Tinggi Lahir Bayi (≥ 4000 gram)	Count	0	9	9
		Expected Count	2.7	6.3	9.0
		% within Berat Badan Lahir Bayi	0.0%	100.0%	100.0%
% within Diagnosis PPH		0.0%	10.5%	7.4%	
Total	Count	36	86	122	
	Expected Count	36.0	86.0	122.0	
	% within Berat Badan Lahir Bayi	29.5%	70.5%	100.0%	
	% within Diagnosis PPH	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.5%	70.5%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.068 <sup>a</sup>	1	.044		
Continuity Correction <sup>b</sup>	2.680	1	.102		
Likelihood Ratio	6.590	1	.010		
Fisher's Exact Test				.057	.038
Linear-by-Linear Association	4.034	1	.045		
N of Valid Cases	122				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.66.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort Diagnosis PPH = Ya	.681	.601	.773
N of Valid Cases	122		

b. Usia Ibu

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia Ibu * Diagnosis PPH	122	100.0%	0	0.0%	122	100.0%

### Usia Ibu \* Diagnosis PPH Crosstabulation

		Diagnosis PPH		Total
		Tidak	Ya	
Usia Ibu 20 - 35 Tahun	Count	29	77	106
	Expected Count	31.3	74.7	106.0

<20 atau >35 tahun	% within Usia Ibu	27.4%	72.6%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	80.6%	89.5%	86.9%
	% of Total	23.8%	63.1%	86.9%
	Count	7	9	16
	Expected Count	4.7	11.3	16.0
	% within Usia Ibu	43.8%	56.3%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	19.4%	10.5%	13.1%
Total	% of Total	5.7%	7.4%	13.1%
	Count	36	86	122
	Expected Count	36.0	86.0	122.0
	% within Usia Ibu	29.5%	70.5%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	29.5%	70.5%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.796 <sup>a</sup>	1	.180		
Continuity Correction <sup>b</sup>	1.094	1	.296		
Likelihood Ratio	1.690	1	.194		
Fisher's Exact Test				.239	.148
Linear-by-Linear Association	1.781	1	.182		
N of Valid Cases	122				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.72.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Ibu (20 - 35 Tahun / <20 atau >35 tahun)	.484	.165	1.420
For cohort Diagnosis PPH = Tidak	.625	.331	1.182

For cohort Diagnosis PPH = Ya	1.291	.825	2.021
N of Valid Cases	122		

c. Paritas

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Paritas * Diagnosis PPH	122	100.0%	0	0.0%	122	100.0%

### Paritas \* Diagnosis PPH Crosstabulation

		Diagnosis PPH		Total
		Tidak	Ya	
Paritas 2 - 3 Anak	Count	13	25	38
	Expected Count	11.2	26.8	38.0
	% within Paritas	34.2%	65.8%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	36.1%	29.1%	31.1%
	% of Total	10.7%	20.5%	31.1%
<2 atau ≥4 anak	Count	23	61	84
	Expected Count	24.8	59.2	84.0
	% within Paritas	27.4%	72.6%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	63.9%	70.9%	68.9%
	% of Total	18.9%	50.0%	68.9%
Total	Count	36	86	122
	Expected Count	36.0	86.0	122.0
	% within Paritas	29.5%	70.5%	100.0%
	% within Diagnosis PPH	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	29.5%	70.5%	100.0%



### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.587 <sup>a</sup>	1	.444		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.304	1	.581		
Likelihood Ratio	.578	1	.447		
Fisher's Exact Test				.521	.288
Linear-by-Linear Association	.582	1	.446		
N of Valid Cases	122				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.21.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (2 - 3 Anak / <2 atau ≥4 anak)	1.379	.605	3.144
For cohort Diagnosis PPH = Tidak	1.249	.712	2.191
For cohort Diagnosis PPH = Ya	.906	.696	1.180
N of Valid Cases	122		

d. Pekerjaan

### Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Pekerjaan * Diagnosis PPH	122	100.0%	0	0.0%	122	100.0%

### Pekerjaan \* Diagnosis PPH Crosstabulation

		Diagnosis PPH		Total	
		Tidak	Ya		
Pekerjaan	Tidak Bekerja	Count	29	50	79
		Expected Count	23.3	55.7	79.0
		% within Pekerjaan	36.7%	63.3%	100.0%
		% within Diagnosis PPH	80.6%	58.1%	64.8%
		% of Total	23.8%	41.0%	64.8%
	Bekerja	Count	7	36	43
		Expected Count	12.7	30.3	43.0
		% within Pekerjaan	16.3%	83.7%	100.0%
		% within Diagnosis PPH	19.4%	41.9%	35.2%
		% of Total	5.7%	29.5%	35.2%
Total	Count	36	86	122	
	Expected Count	36.0	86.0	122.0	
	% within Pekerjaan	29.5%	70.5%	100.0%	
	% within Diagnosis PPH	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	29.5%	70.5%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.587 <sup>a</sup>	1	.018		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4.648	1	.031		
Likelihood Ratio	5.946	1	.015		
Fisher's Exact Test				.022	.014
Linear-by-Linear Association	5.541	1	.019		
N of Valid Cases	122				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.69.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pekerjaan (Tidak Bekerja / Bekerja)	2.983	1.177	7.560
For cohort Diagnosis PPH = Tidak	2.255	1.079	4.712
For cohort Diagnosis PPH = Ya	.756	.611	.936
N of Valid Cases	122		

*Lampiran 3 Etik Penelitian*



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: E.076/KEPK/FKIK/V/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : Fadli Zainul Muttaqin  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"Hubungan Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum  
 Primer di RSIA Ananda Makassar"**

*"The Relationship Between Baby Birth Weight with Primary Post Partum Hemorrhage at  
 RSIA Ananda Makassar"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*


Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024.

*This declaration of ethics applies during the period May 28<sup>th</sup>, 2023 until May 28<sup>th</sup>, 2024.*

May 28<sup>th</sup>, 2023  
 Professor and Chairperson,

  
 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

*Lampiran 4 Izin Penelitian*



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>20614/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-4153/Un.06/LP2M/PP.00.9/7/2023 tanggal 03 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FADLI ZAINUL MUTTAQIN</b>
Nomor Pokok	: 70600119034
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER DI RSIA ANANDA MAKASSAR "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Juli s/d 11 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 05 Juli 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

*Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian*



**Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA**

Jl. Andi Djemma No. 57 (Lama : Jl. Landak Baru No.63) Makassar

Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 190/RSIA-A/VIII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Divisi Tata Usaha & Diklat Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : Fadli Zainul Muttaqin  
 NIM : 70600119034  
 Fakultas : FKTK/ UIN Alauddin Makassar  
 Jurusan : Pendidikan Dokter

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, terhitung tanggal 10 Juli-11 Agustus 2023 guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2022”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 1 Agustus 2023

RUMAH SAKIT ANANDA  
 Divisi Tata Usaha & Diklat  


Rini Safitri, SST., M.Kes

*Lampiran 6 Dokumentasi*



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Penulis**

1. Nama : Fadli Zainul Muttaqin
2. NIM : 70600119034
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Kanang, 22 September 2001
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Talasalapang Komp. P&K Blok A.8
8. Orang Tua
  - a. Ayah : H. Pandi
  - b. Ibu : Hj. Dahlia

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD : SD Islam Athirah 2 Bukit Baruga
2. SMP : SMPN 6 Makassar
3. SMA : SMAN 17 Makassar
4. Tahun 2019 melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Pendidikan Dokter