

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA
DENGAN HALUSINASI MENGGUNAKAN TERAPI MENGGAMBAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ners Jurusan
Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUTHMAINNAH, S.Kep
NIM: 70900122022

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN
ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswi yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah
NIM : 70900122022
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 21 Oktober 1999
Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Andi Tonro 4 Selatan
Judul : “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Menggambar”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa karya tulis akhir ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya tulis akhir ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis akhir dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2023

Penyusun

Muthmainnah, S.Kep
70900122022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Tugas Akhir Ners Saudara(i) Muthmainnah S.Kep, NIM : 70900122022, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus Tugas Akhir Ners yang “Pemberian Intervensi Keperawatan Terapi Menggambar Pada Pasien dengan Halusinasi Pendengaran di RSKD DADI Makassar”. Memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Juni 2023

Menyetujui,



Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep, Sp.Kep-I
Pembimbing I



Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep, Sp.Kep-I
Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Skizofrenia* Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Menggambar", yang disusun oleh Muthmainnah, S.Kep., NIM: 70900122022, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023 M bertepatan dengan 1 Zulhijah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 20 Juni 2023 M
1 Zulhijah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)
Sekretaris: Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep (.....)
Munaqisy I: Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)
Munaqisy II: Titi Mildawati, SPd.I., M.Pd.I (.....)
Pembimbing I : Hj.Syisnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.J(.....)
Pembimbing II: Hj.Rasmawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep. Sp.Kep.J(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis akhir ini yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Menggambar”. Shalawat dan salam atas junjungan kami yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kami nikmat islam dan menuntun manusia kejalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki seta diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan karya tulis akhir ini bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Terima kasih pertama saya ucapkan kepada Ibu saya yang tecinta Hajrah dan Ayah saya yang tersayang Muhammad Rappe, terima kasih telah menjadi pahlawan, panutan untuk penyelesaian skripsi ini karena selalu menjadi motivasi, memberi nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang, serta doa. Kemudian terima kasih juga kepada kakak saya Muhammad Rusydi dan juga adik-adik saya Rani Syathirah, Khaerunnisa, Muhammad Azhar, Nabiia Salsabila, Muhammad Farid dan Shofiyah Syakilah yang selalu memberi semangat dan dorongan serta support kepada saya baik dalam bentuk material maupun non material sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.

Dalam penyusunan karya tulis akhir ini, penulis menemukan berbagai banyak rintangan dan kesulitan, baik itu yang datang dari diri pribadi peneliti maupun yang datang dari luar. Namun, dengan penuh kesabaran peneliti dapat melewati rintangan tersebut tentunya dengan petunjuk dari Allah SWT dan adanya bimbingan serta

bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D, Rektor UIN Alauddin Makassar. Beserta Wakil Rektor I,II,III,IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M. Kes..., SP. A, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I,II, dan III.
3. Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep, Ketua Jurusan Profesi Ners dan Hj. Sysnawati, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep.J, sekretaris Jurusan Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Hj. Sysnawati, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep.J, Selaku Pembimbing I, dan Hj. Rasmawati, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep.J, Selaku Pembimbing II yang telah dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis akhir ini.
5. Eny Sutria, S. Kep., Ns., M. Kes, Selaku Penguji I, serta Titi Mildawati, S.Pd.I., M.Pd.I, Selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis akhir ini.
6. Segenap Dosen dan Staff di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Jurusan Keperawatan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Kepada sahabat-sahabat saya yang tersayang Firja, Nuriah, Afifah, Wahidah, Eka, Desy, Wania, Hafifah, Novi, yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan nasehat kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
8. Kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini sama-sama sedang berjuang Jurusan Profesi Ners Angkatan 21 atas semua kebersamaan yang telah dilalui selama ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila penulis selama ini mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari segi perilaku maupun perkataan. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Aamiin.


Wassalamu'alaikum wr. Wb

Makassar, 14 Juni 2023

Penulis,

Muthmainnah, S.Kep


NIM: 70900122022



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Medis	8
B. Konsep Halusinasi	11
C. Konsep Keperawatan	33
D. Pendekatan Teori Keperawatan	39
E. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN)	41
F. Integrasi Keislaman	44
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Rancangan Studi Kasus	51
B. Subjek Studi Kasus	51
C. Fokus Studi Kasus	52
D. Instrumen Studi Kasus	52
E. Prosedur Pengambilan Data	52
G. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	53
H. Analisis Data dan Penyajian Data	53
I. Etika Studi Kasus	53
BAB IV LAPORAN KASUS	54
A. Pengkajian	54

B. Diagnosis Keperawatan	65
C. Intervensi Keperawatan	66
D. Impelemntasi dan Evaluasi Keperawatan.....	71
BAB V PEMBAHASAN	79
A. Analisis Asuhan Keperawatan	79
B. Analisis Intervensi (EBPN)	97
C. Keterbatasan Penelitian	98
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
RIWAYAT HIDUP	106
LAMPIRAN	107



ABSTRAK

Nama : Muthmainnah

NIM : 70900122022

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Menggunakan Terapi Menggambar

Latar Belakang: *World Health Organization (WHO)* (2020), berdasarkan studi tahun 2019, prevalensi skizofrenia meningkat sebesar 40%, dari 20 juta menjadi 26 juta orang. Kesehatan jiwa menjadi salah satu permasalahan baik secara fisik maupun mental, sehingga masalah ini menjadi perhatian dunia termasuk Indonesia. Salah satu masalah kesehatan jiwa yang paling banyak dialami yaitu Halusinasi. Halusinasi merupakan gangguan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.

Tujuan: Masalah kesehatan jiwa dengan halusinasi dapat mengancam jiwa. Berdasarkan dari latar belakang. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui hasil analisis pemberian terapi menggambar pada pasien skizofrenia dengan halusinasi.

Metode: Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kasus dengan melakukan asuhan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi pada kasus halusinasi di ruang kenari RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. **Hasil:** setelah diberikan terapi menggambar, didapatkan hasil bahwa tanda dan gejala halusinasi seperti mendengar suara-suara, marah-marah, merasa terganggu, khawatir, bicara sendiri, dan perilaku mengikuti isi halusinasi yang dialami pasien sudah menurun dan pasien mampu menerapkan terapi menggambar untuk menurunkan tanda dan gejala halusinasi yang dialaminya. **Kesimpulan:** terapi menggambar efektif dilakukan untuk membantu meningkatkan pengontrolan halusinasi serta dengan terapi menggambar dapat membantu mengurangi tanda dan gejala halusinasi yang dialami oleh pasien.

Kata kunci : *Halusinasi, Terapi menggambar, skizofrenia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit jiwa merupakan reaksi tidak adaptif terhadap lingkungan dalam dan luar, yang ditunjukkan dengan pikiran, perasaan, dan tindakan yang bertentangan dengan budaya setempat dan mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan fisik. Dengan demikian, seseorang yang menderita skizofrenia mengalami gangguan mental, dan gangguan kepribadian serta emosi juga dapat muncul (Astari, 2020).

Skizofrenia adalah kondisi mental yang persisten, parah, yang ditandai dengan gangguan berpikir, delusi, halusinasi, dan perilaku aneh. Skizofrenia adalah kondisi mental kronis dan parah yang ditandai dengan kesulitan komunikasi, distorsi realitas, suasana hati yang menyimpang, penurunan fungsi kognitif, dan kesulitan melakukan tugas sehari-hari. Skizofrenia adalah kondisi kronis yang sering kambuh atau berulang, sehingga memerlukan pengobatan jangka panjang. Merawat pasien skizofrenia membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kesabaran, dan membutuhkan waktu yang lama karena penyakit ini termasuk dalam penyakit kronis (Pardede et al., 2020).

Skizofrenia adalah penyakit mental yang serius dan persisten yang mempengaruhi sekitar 20 juta orang di seluruh dunia. Menurut *World Health Organization (WHO)* (2020), berdasarkan studi tahun 2019, prevalensi

skizofrenia meningkat sebesar 40%, dari 20 juta menjadi 26 juta orang. Sedangkan frekuensi skizofrenia di Indonesia meningkat menjadi 20% dari jumlah penduduk. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 di Indonesia, prevalensi gangguan jiwa adalah 7% per 1000 keluarga. Artinya, dari 1000 rumah, 70 di antaranya memiliki anggota rumah tangga (ART) dengan gangguan jiwa berat. Menurut data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, provinsi Bali dan DI Yogyakarta memiliki insiden penyakit jiwa terbesar, dengan persentase masing-masing 11,1% dan 10,4% per 1000 keluarga yang menderita skizofrenia/psikosis. Provinsi lain yang menyusul adalah Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

Skizofrenia merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi otak, dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu. Gasril, Suryani, & Sasmita (2020) menjelaskan bahwa gejala positif skizofrenia mencakup waham, halusinasi, bicara tidak teratur, dan perilaku agresif/kekerasan. Sedangkan gejala negatif skizofrenia mencakup afektif datar, alogia (kurang berbicara), dan avolisi.

Survei yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2022 di rumah sakit khusus daerah (RSKD) Dadi provinsi Sulawesi Selatan ruang perawatan kenari menunjukkan bahwa, terdapat 97 pasien yang dirawat diruang kenari. Dimana sekitar 90 % dari 97 pasien yang mengalami gangguan halusinasi. Berdasarkan dari survey tersebut, hampir semua pasien di RSKD Dadi

Provinsi Sulawesi Selatan mengalami gangguan persepsi sensori halusinasi. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan atau penghiduan. Halusinasi juga merupakan salah satu gejala yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa, halusinasi sering diidentikkan dengan skizofrenia. Dari seluruh pasien skizofrenia 70% diantaranya mengalami halusinasi. Halusinasi juga merupakan gangguan persepsi dimana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca indra tanpa ada rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami suatu persepsi melalui panca indra tanpa stimulus eksteren persepsi palsu (Andri, Febriawati, Panzilion, Sari, & Utama, 2019).

Dalam islam, sejak masa Nabi Muhammad s.a.w sudah ada berbagai penyakit salah satunya yaitu Skizofrenia yang merupakan salah satu penyakit kesehatan mental berupa gangguan psikologis, untuk itu dalam menangani masalah ini perlunya dilakukan pengobatan. Ada hadist yang menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, yaitu :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ
 الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ
 دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin ‘Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku ‘Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari ‘Abdu Rabbih bin Sa’id dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu ‘alaihiwasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azzawajalla.” (HR.Muslim)

Sesungguhnya kesembuhan yang didapatkan bukanlah semata-mata dari obat yang diciptakan manusia, tetapi dari Allah s.w.t yang mengizinkan obat tersebut membawa kesembuhan. Salah satunya yaitu upaya penyembuhan Skizofrenia dengan halusinasi pendengaran yang dialami oleh individu karena faktor tertentu.

Pemberian terapi medis atau antipsikotik merupakan terapi utama yang diberikan kepada pasien dengan skizofrenia, namun terapi tersebut hanya dapat membantu memperbaiki ketidakseimbangan kimia di dalam otak, sehingga diperlukan terapi modalitas tambahan berupa terapi non farmakologis seperti terapi dzikir yang menurut Gasril, Suryani, & Sasmita (2020) terapi dzikir merupakan suatu bentuk terapi psikoreligius yang mengkombinasikan pendekatan kesehatan jiwa dan pendekatan aspek religious, terapi music yang menurut Yanti, dkk (2020) merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang tujuannya untuk memberikan rasa tenang, membantu mengendalikan emosi serta menyembuhkan gangguan psikologi. Salah satu terapi non farmakologis yang dapat dilakukan oleh pasien yang mengalami skizofrenia seperti halusinasi yaitu dengan terapi menggambar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana analisis asuhan keperawatan menggunakan terapi menggambar pada Tn.H untuk meningkatkan kemampuan mengontrol masalah halusinasi pendengaran di ruang perawatan Kenari RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penulis mengangkat terapi menggambar untuk intervensi yang akan diberikan pada pasien karena terapi menggambar mudah dilakukan dan membantu pasien menyalurkan emosi dan perasaannya dalam gambaran yang akan pasien tuangkan dalam buku yang telah di berikan oleh penulis dan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yaitu Tn.H salah satu pasien yang mengalami halusinasi pendengaran karena dalam ruangan Kenari RSKD Dadi mayoritas pasien mengalami gangguan halusinasi.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penatalaksanaan asuhan keperawatan pemberian terapi menggambar pada pasien skizofrenia dengan halusinasi pendengaran.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui bagaimana analisis pemberian terapi menggambar pada pasien skizofrenia dengan halusinasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya analisis pengkajian keperawatan Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- b. Diketuainya analisis diagnosis keperawatan Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- c. Diketuainya analisis rencana tindakan keperawatan pada Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- d. Diketuainya analisis penatalaksanaan atau implementasi keperawatan pada Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- e. Diketuainya analisis hasil evaluasi penatalaksanaan asuhan keperawatan pada Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- f. Diketuainya hasil analisis kasus asuhan keperawatan pada Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran
- g. Mendokumentasikan asuhan keperawatan pada Tn.H dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ilmiah akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dasar dalam menentukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan kejiwaan skizofrenia dengan gangguan persepsi sensori: Halusinasi pendengaran.

2. Manfaat Aplikatif

Karya tulis ilmiah akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelayanan di rumah sakit dalam memberikan asuhan keperawatan. selain itu, diharapkan juga dapat menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan riset lanjutan mengetani pemberian asuhan keperawatan dengan terapi menggambar dan menghardik pada pasien halusinasi pendengaran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Definisi

Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan perilaku individu. Skizofrenia adalah bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik diri (Yudhantara & Istiqomah, 2018)

2. Etiologi

a. Genetic

Factor genetic turut menentukan timbulnya skizofrenia. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga penderita skizofrenia dan terutama anak-anak kembar satu telur.

b. Neurokimia

1) Hipotesis dopamine

Skizofrenia disebabkan oleh neuroaktifitas pada jaras dopamine mesolimbic. Hal ini didukung oleh temuan bahwa amfetamin yang kerjanya meningkatkan pelepasan dopamine dapat menginduksi psikosis yang mirip skizofrenia, dan obat pasikotik bekerja dengan cara memblok reseptor obat dopamine terutama reseptoe D12.

2) Hipotesis perkembangan saraf

Studi autopsy dan pencitraan otak memperlihatkan abnormalitas struktur dan morfologi otak penderita skizofrenia antara lain berupa berat otak yang rata-rata lebih kecil 6%.

c. Lingkungan

Munculnya gejala skizofrenia diakibatkan dari adanya perubahan pola lingkungan, perilaku dan akibat kondisi biologic individu tersebut. Individu yang rentan tersebut apabila dikenai stress psikososial seperti status ekonomi yang rendah, gagal dalam mencapai cita-cita dan konflik yang berlarut-larut, kematian keluarga yang dicintai dan lain sebagainya dapat berkembang menjadi gangguan jiwa skizofrenia.

3. Manifestasi klinis

a. Gejala positif skizofrenia

Gejala-gejala positif merupakan gejala yang sangat jelas menunjukkan skizofrenia. Gejala-gejala positif yang ditunjukkan oleh penderita skizofrenia diantaranya yaitu :

- 1) Delusi/waham, yaitu keyakinan yang tidak masuk akal.
- 2) Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sebagian besar penderita, mendengar suara atau bisikan bersifat menghibur atau tidak menakutkan, sedangkan lainnya mungkin menganggap suara atau

bisikan tersebut bersifat negative atau memberikan perintah tertentu.

3) Pikiran paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.

b. Gejala negative skizofrenia

Gejala-gejala negative merupakan gejala awal yang menunjukkan skizofrenia. Gejala tersebut masih sulit dipastikan sebagai skizofrenia karena gejala yang sama juga menunjukkan gangguan depresif.

Gejala-gejala negative tersebut diantaranya :

- 1) Alam perasaan tumpul dan datar
- 2) Suka melamun
- 3) Pasif dan apatis
- 4) Kehilangan dorongan atau kehendak dan tidak ada inisiatif, tidak ada upaya dan usaha, monoton, tidak menginginkan apapun dan serba malas, mereka lebih sering tampak berdiam diri di rumah, menyendiri dikamar atau di sudut ruang tertentu tanpa melakukan aktivitas apapun (Suryani, 2023).

c. Gejala kognitif

Gejala kognitif yang dialami penderita skizofrenia termasuk kekurangan dalam ingatan dan perhatian. Gejala kognitif mempengaruhi aktivitas sehari-hari penderita skizofrenia, seperti kesulitan memahami informasi, membuat keputusan, sulit berkonsentrasi, dan mengingat (Wulandari, et al., 2022).

B. Konsep Halusinasi

1. Defenisi Halusinasi

Halusinasi merupakan gangguan persepsi dimana klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Suatu penerapan panca indra tanpa ada rangsangan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami suatu persepsi melalui panca indra tanpa stimulus eksteren persepsi palsu. Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana pasien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan perabaan atau penghiduan. Halusinasi juga merupakan salah satu gejala yang sering ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa, Halusinasi sering diidentikkan dengan skizofrenia. (Andri, Henni Febriawati, Panzilion, & Sari, 2019).

Laila, et al., (2022) mendefinisikan halusinasi salah satu gangguan persepsi, dimana terjadi pengalaman panca indera tanpa adanya rangsangan sensorik atau merupakan adanya persepsi indra yang salah atau yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Halusinasi adalah persepsi klien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata, artinya klien menginterpretasikan suatu yang tidak nyata tanpa stimulus/ rangsangan dari luar. Halusinasi adalah hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangasangan internal (pikiran) dan rangsangan eksternal (dunia luar).Klien member persepsi atau pendapat tentang lingkungan

tanpa ada objek atau rangsangan yang nyata. sebagai contoh klien mengatakan mendengar suara padahal tidak ada orang berbicara.

2. Etiologi Halusinasi

Menurut Pambayun (2015), faktor-faktor yang menyebabkan klien gangguan jiwa mengalami halusinasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Predisposisi

1) Faktor Genetik

Secara genetic, skizofrenia diturunkan melalui kromosom-kromosom tertentu. Namun demikian, kromosom ke berapa yang menjadi faktor penentu gangguan ini sampai sekarang masih dalam tahap penelitian. Anak kembar identic memiliki kemungkinan mengalami skizofrenia, sementara jika dizigote, peluangnya sebesar 15%. Seorang anak yang salah satu orang tuanya mengalami skizofrenia berpeluang 15% mengalami skizofrenia, sementara bila kedua orang tuanya skizofrenia maka peluangnya menjadi 35%.

2) Faktor Neurobiologis

Klien skizofrenia mengalami penurunan volume dan fungsi otak yang abnormal. Neurotransmitter juga ditemukan tidak normal, khususnya dopamine, serotonin, dan glutamate.

a) Studi Neurotransmitter

Skizofrenia diduga juga disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan neurotransmitter. Dopamine berlebihan, tidak seimbang dengan kadar serotonin.

b) Teori Virus

Paparan virus influenza pada trimester ketiga kehamilan dapat menjadi faktor skizofrenia.

c) Psikologis

Beberapa kondisi psikologis yang menjadi faktor predisposisi skizofrenia antara lain anak yang diperlakukan oleh ibu yang pencemas, terlalu melindungi, dingin, dan tidak berperasaan, sementara ayah yang mengambil jarak dengan anaknya.

b. Faktor Presipitasi

- 1) Berlebihannya proses informasi pada system saraf yang menerima dan memproses informasi di hipotalamus dan frontal otak.
- 2) Mekanisme penghantaran listrik di syaraf terganggu.
- 3) Kondisi kesehatan meliputi: nutrisi kurang, kurang tidur, ketidakseimbangan irama sirkadian, kelelahan, infeksi, obat-obatan system saraf pusat, kurangnya latihan, hambatan untuk menjangkau pelayanan kesehatan.

4) Lingkungan, meliputi: lingkungan yang memusuhi, krisis masalah di rumah tangga, kehilangan kebebasan hidup, perubahan kebiasaan hidup, pola aktivitas sehari-hari, kesukaran dalam hubungan dengan orang lain, isolasi social, kurangnya dukungan social, tekanan kerja, kurang keterampilan dalam bekerja, stigmatisasi, kemiskinan, ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan.

Sikap/Perilaku meliputi: merasa tidak mampu, harga diri rendah, putus asa, tidak percaya diri, merasa gagal, kehilangan kendali diri, merasa punya kekuatan berlebihan, merasa malang, bertindak tidak seperti orang lain dari segi usia maupun kebudayaan, rendahnya kemampuan sosialisasi, perilaku agresif, ketidakadekuatan pengobatan, ketidakadekuatan penanganan gejala.

3. Tanda Dan Gejala Halusinasi

Beberapa tanda dan gejala perilaku halusinasi adalah tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai, menggerakkan bibir tanpa suara, bicara sendiri, pergerakan mata cepat, diam, asyik, dengan pengalaman sensori, kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realitas rentang perhatian yang menyempit hanya beberapa detik atau menit, kesukaran berhubungan dengan orang lain, tidak mampu merawat diri, dan perubahan.

Berikut tanda dan gejala halusinasi berdasarkan jenis halusinasi menurut Stuart & Sudden (1998) dalam Yusalia (2015):

Tabel 2.1 Tanda dan Gejala Berdasarkan Jenis Halusinasi

Jenis Halusinasi	Karakteristik Tanda & Gejala
Pendengaran	Mendengar suara-suara/kebisingan paling sering suara kata yang jelas, berbicara dengan klien bahkan sampai percakapan lengkap antara dua orang yang mengalami halusinasi. Pikiran yang terdenga jelas dimana klien mendengar perkataan bahwa pasien disuruh untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang dapat membahayakan.
Penglihatan	Stimulus penglihatan dalam kilatan cahaya, gambar geometris, gambar katun atau panorama yang luas dan komplek. Penglihatan dapat berupa sesuatu yang menyenangkan/sesuatu yang menakutkan seperti monster.
Penciuman	Membau bau-bau seperti darah, urin, feses, umumnya bau-bau yang tidak menyenangkan. Halusinasi penciuman biasanya sering akibat stroke, tumor, kejang/dementia
Pengecapan	Merasa mengecap rasa seperti rasa darah, urin, feses.
Perabaan	Mengalami nyeri atau ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas rasa terserum listrik yang dating dari tanah, benda mati atau orang lain.
Sinestetik	Merasakan fungsi tubuh seperti aliran darah divera (arteri), pencernaan makanan.
Kinestetik	Merasakan pergerakan semacam berdiri tanpa bergerak.

4. Mekanisme Terapi Menggambar

Menurut (Pradana, Dewi, & Fitri, 2023) mekanisme terapi menggambar yaitu :

- a. penyembuhan pribadi. Terapi seni bisa membantu memahami perasaan pribadi dengan mengenali dan mengatasi kemarahan, kekesalan, dan

emosi-emosi lainnya. Terapi ini bisa membantu menyegarkan kembali semangat pasien.

- b. Pencapaian pribadi. Menciptakan sebuah karya seni bisa membangun rasa percaya diri dan memelihara rasa cinta dan menghargai diri sendiri.
- c. Memperkuat. Terapi seni bisa membantu menggambarkan emosi dan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan cara ini, pasien lebih bisa mengontrol perasaan-perasaannya.
- d. Relaksasi dan meredakan stress. Stress kronis bisa membahayakan baik tubuh maupun pikiran. Terapi menggambar bisa digunakan sebagai penanganan tunggal atau dipadukan dengan teknik relaksasi lainnya untuk meredakan stress dan kecemasan.
- e. Meredakan sakit. Terapi seni juga bisa membantu dalam mengatasi rasa sakit. Terapi ini bisa digunakan sebagai terapi pelengkap untuk mengobati pasien yang sakit.

5. Proses Terjadinya Halusinasi

a. Teori Psikodinamika

Proses terjadinya halusinasi dapat disebabkan oleh fungsi biologi, antara lain dopamine dan neurotransmitter yang berlebihan, fungsi psikologis seperti keturunan. Respon metabolik terhadap stress yang mengakibatkan pelepasan zat halusinogen pada system limbik otak, atau terganggunya keseimbangan neurotransmitter di otak.

Proses terjadinya halusinasi secara teori psikodinamika berfaktor atau mengarah pada factor prediposisi yaitu dimana proses gangguan sensori persepsi disebabkan oleh masa perkembangan yang terganggu misalnya rendah control dan kehangatan keluarga menyebabkan klien

tidak mampu mandiri sejak kecil, mudah frustrasi hilangnya percaya diri, dan lebih rentan terhadap stress. Seseorang yang tidak diterima lingkungannya sejak sejak bayi akan merasa disingkirkan, kesepian, dan tidak percaya pada lingkungannya yang dimana hal ini ini mempunyai pengaruh terhadap terjadinya gangguan jiwa, adanya stress yang berlebihan dialami seseorang maka dalam tubuh akan dihasilkan suatu zat yang dapat bersifat halusinogenik neurokimia seperti buffofenon dan dimetytranferase. Akibat stress berkepanjangan menyebabkan teraktifitasnya neurotransmitter otak. Sehingga tipe kepribadian yang lemah bisa menyebabkan terjadinya gangguan sensori persepsi.

b. Teori Psikoanalisa

Halusinasi merupakan pertahanan ego untuk melawan rangsangan dari luar yang di tekan yang kemungkinan mengancam untuk timbulnya halusinasi.

Proses terjadinya halusinasi dijelaskan dengan menggunakan konsep stress adaptasi Stuart yang meliputi stressor dari faktor predisposisi dan presipitasi (Nurhalimah, 2016) :

1) Faktor Predisposisi

Faktor predisposisi halusinasi terdiri dari :

- a) Faktor Biologis : Adanya riwayat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa (herediter), riwayat penyakit atau

trauma kepala, dan riwayat penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA).


- b) Faktor Psikologis Memiliki riwayat kegagalan yang berulang. Menjadi korban, pelaku maupun saksi dari perilaku kekerasan serta kurangnya kasih sayang dari orang-orang disekitar atau overprotektif. 3) Sosiobudaya dan lingkungan Sebahagian besar pasien halusinasi berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, selain itu pasien memiliki riwayat penolakan dari lingkungan pada usia perkembangan anak, pasien halusinasi seringkali memiliki tingkat pendidikan yang rendah serta pernah mengalami kegagalan dalam hubungan sosial (perceraian, hidup sendiri), serta tidak bekerja.

2) Faktor Presipitasi

Stressor presipitasi pasien gangguan persepsi sensori halusinasi ditemukan adanya riwayat penyakit infeksi, penyakit kronis atau kelainan struktur otak, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup, kemiskinan, adanya aturan atau tuntutan dikeluarga atau masyarakat yang sering tidak sesuai dengan pasien serta konflik antar masyarakat.

6. Rentang Respon

Rentang respon neurobiologist menurut (Lilik, 2016) :



Ket :

- a. Respon adaptif adalah respon yang dapat diterima norma-norma sosial budaya yang berlaku. Dengan kata lain individu tersebut dalam batas normal jika menghadapi suatu masalah akan dapat memecahkan masalah tersebut.

- 1) Pikiran logis adalah pandangan yang mengarah pada kenyataan
- 2) Persepsi akurat adalah pandangan yang tepat pada kenyataan
- 3) Emosi konsisten dengan pengalaman yaitu perasaan yang timbul dari pengalaman ahli

4) Perilaku cocok individu berupa tindakan nyata dalam penyelesaian masalah masih dapat diterima oleh norma-norma sosial dan budaya umum yang berlaku.

5) Perilaku sosial/ hubungan sosial harmonis adalah sikap dan tingkah laku yang masih dalam batas kewajaran.

b. Respon Psikologis meliputi :

1) Proses pikir terganggu adalah proses pikir yang menimbulkan gangguan.

2) Illusi adalah miss interpretasi atau penilaian yang salah tentang penerapan yang benar-benar terjadi (Objek nyata) karena rangsangan panca indera.

3) Emosiberlebihan atau berkurang yaitu menisfatasi perasaan atau afek keluar berlebihan atau kurang.

4) Perilaku yang tidak biasa adalah sikap dan tingkah laku yang melebihi batas kewajaran.

5) Menarik diri adalah percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain.

c. Respon Maladaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah yang menyimpang dari norma-norma sosial budaya dan lingkungan, adapun respon maladaptif meliputi :

- 1) Kelainan Pikiran/Waham adalah keyakinan yang secara kokoh dipertahankan walaupun tidak diyakini oleh orang lain dan bertentangan dengan kenyataan sosial.
- 2) Halusinasi merupakan persepsi sensori yang salah atau persepsi eksternal yang tidak realita atau tidak ada.
- 3) Kerusakan proses emosi adalah perubahan sesuatu yang timbul dari hati
- 4) Perilaku tidak terorganisir merupakan suatu yang tidak teratur
- 5) Isolasi sosial adalah kondisi kesendirian yang dialami oleh individu dan diterima sebagai ketentuan oleh orang lain dan sebagai suatu kecelakaan yang negatif mengancam.

7. Fase Halusinasi

Menurut Azizah Lilik, 2016 ada 4(empat) Tahapan / Fase-fase halusinasi yaitu :

- a. Fase I : *Sleep Disorder*, Adalah halusinasi tahap awal seseorang sebelum muncul halusinasi.

1) Karakteristik

Klien merasa banyak masalah, ingin menghindar dari lingkungan, takut diketahui orang lain bahwa dirinya banyak masalah. Masalah makin terasa sulit karena berbagai stressor terakumulasi dan support system yang kurang dan persepsi terhadap masalah sangat buruk. Contohnya misalnya : kekasih

hamil, terlibat narkoba, dihianiti kekasih, PHK ditempat kerja, penyakit, utang, dll.

2) Perilaku Klien

Klien susah tidur dan berlangsung terus menerus sehingga terbiasa menghayal, dan menganggap menghayal awal sebagai pemecah masalah.

b. Fase II : *Comforting Moderate level of anxiety*

Pada fase ini halusinasi secara umum mulai diterima sebagai sesuatu yang alami

1) Karakteristik

Klien mengalami emosi yang berlanjut seperti adanya perasaan cemas, kesepian, perasaan berdosa, ketakutan dan mencoba memusatkan pemikiran pada timbulnya kecemasan.

Klien beranggapan bahwa pengalaman pikiran dan sensorinya dapat ia control bila kecemasannya diatur, dalam tahap ini ada kecenderungan klien merasa nyaman dengan halusinasinya.

2) Perilaku Klien

- a) Tersenyum, tertawa yang tidak sesuai
- b) Menggerakkan bibir tanpa suara
- c) Pergerakan mata yang cepat
- d) Respon verbal yang lambat
- e) Diam, dipenuhi rasa yang mengasyikan

c. Fase III : *Condemning Severe level of Anxiety*

Pada fase ini secara umum halusinasi sering mendatangi klien.

1) Karakteristik

Pengalaman sensori klien menjadi sering datang dan mengalami bias. Klien mulai merasa tidak mampu lagi mengontrolnya dan mulai berupaya menjaga jarak antara dirinya dengan obyek yang dipersepsikan klien mulai menarik diri dari orang dengan intensitas waktu yang lama.

2) Perilaku Klien

- a) Meningkatkan tanda-tanda system saraf otonom akibat ansietas (Nadi, RR, TD) meningkat
- b) Penyempitan kemampuan untuk konsentrasi
- c) Asyik dengan pengalaman sensori dan kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realita

d. Fase IV : *Controlling Severe level of Anxiety*

Pada fase ini fungsi sensorimenjadi tidak relevan dengan kenyataan.

1) Karakteristik

Klien mencoba melawan suara-suara atau sensory abnormal yang datang. Klien dapat merasakan kesepian bila halusinasi berakhir. Dari sinilah dimulai fase gangguan Psychotic.

2) Perilaku Klien

- a) Lebih cenderung mengikuti petunjuk halusinasinya
- b) Kesulitan berhubungan dengan orang lain
- c) Rentang perhatian hanya dalam beberapa menit atau detik
- d) Gejala fisik, ansietas berat, berkeringat, tremor, tidak mampu mengikuti petunjuk

e. Fase V : *Conquering Panic level of Anxiety*

Pada fase ini klien mengalami gangguan dalam menilai lingkungannya.

1) Karakteristik

Pengalaman sensori terganggu, klien mulai merasa terancam dengan datangnya suara-suara terutama bila klien tidak dapat menuruti ancaman atau perintah yang ia dengar dari halusinasinya. Halusinasi dapat berlangsung selama minimal 4 jam atau seharian bila klien tidak mendapatkan komunikasi terapeutik, terjadi gangguan psikotik berat.

2) Perilaku Klien

- a) Perilaku terror akibat panic
- b) Potensi suicide atau homicide
- c) Aktivitas fisik merefleksikan isi halusinasi seperti kekerasan, agitasi, menarik diri, katatonia
- d) Tidak mampu merespon > 1 orang.

8. Jenis Halusinasi

Menurut Stuart (2007) dalam Yusalia (2015), jenis halusinasi antara lain:

a. Halusinasi Pendengaran (Auditorik) 70%

Karakteristik ditandai dengan mendengar suara, terutama suara-suara orang, biasanya klien mendengar suara orang yang sedang membicarakan apa yang sedang dipikirkannya dan memerintahkan untuk melakukan sesuatu.

b. Halusinasi Penglihatan (Visual) 20%

Karakteristik dengan adanya stimulus penglihatan dalam bentuk pancaran cahaya, gambaran geometric, gambaran kartun dan / panorama yang luas dan kompleks. Penglihatan bias menyenangkan atau menakutkan.

c. Halusinasi Penghiduan (Olfactory)

Karakteristik ditandai dengan adanya bau busuk, amis dan bau yang menjijikan seperti: darah, urin atau feses. Kadang-kadang terhidu bau harum. Biasanya berhubungan dengan stroke, tumor, kejang, dan dimensia.

d. Halusinasi Perabaan (Tactile)

Karakteristik ditandai dengan adanya rasa sakit atau tidak enak tanpa stimulus yang terlihat. Contoh: merasakan sensasi listrik dating dari tanah, benda mati atau orang lain.

e. Halusinasi Pengecapan (Gustatory)

Karakteristik ditandai dengan merasakan sesuatu yang busuk, amis, dan menjijikan, merasa mengecap rasa seperti: rasa darah, urin atau fese.

f. Halusinasi Cenesthetik

Karakteristik ditandai dengan merasakan fungsi tubuh seperti darah mengalir melalui vena atau arteri, makanan dicerna atau pembentukan urin.

g. Halusinasi Kinesthetic

Merasakan pergerakan sementara berdiri tanpa bergerak

9. Mekanisme Koping

Mekanisme koping klien Gangguan persepsi sensori : Halusinasi, perilaku yang mewakili upaya untuk melindungi diri sendiri dari pengalaman yang menakutkan berhubungan dengan respon neurobiology maladaptive meliputi: (Nafisa, Hardani, & Hertinjung, 2023)

- a. Regresi, menghindari stress, kecemasan dalam menampilkan perilaku kembali seperti apa perilaku perkembangan anak atau berhubungan dengan masalah proses informasi dan upaya untuk menanggulangi ansietas.
- b. Proyeksi, keinginan yang tidak dapat ditoleransi, mencurahkan emosi pada orang lain karena kesalahan yang dilakukan diri sendiri (sebagai upaya untuk menjelaskan kerancuan persepsi).

- c. Menarik diri, reaksi yang ditampilkan dapat berupa reaksi fisik maupun psikologi, reaksi fisik, yaitu individu pergi atau lari menghindari sumber stressor, misalnya menjauhi polusi, sumber infeksi, gas beracun, dan lain-lain. Sedangkan reaksi psikologis individu menunjukkan perilaku apatis, mengisolasi diri, tidak berminat, sering disertai rasa takut dan bermusuhan.

10. Perilaku Halusinasi

Menurut (Azizah, 2016) Perilaku halusinasi yaitu :

- a. Proses pikir terganggu adalah proses pikir yang menimbulkan gangguan
- b. Ilusi adalah miss intepretasi atau penilaian yang salah tentang penerapannya yang benar-benar terjadi (objek nyata) karena rangsangan panca indera.
- c. Emosi berlebihan atau berkurang
- d. Perilaku tidak biasa adalah sikap dan tingkah laku yang melebihi batas kewajaran
- e. Menarik diri adalah percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain (Azizah, 2016).

11. Penatalaksanaan Medis

- a. Terapi Farmakologi

Salah satu penyebab munculnya halusinasi adalah akibat ketidakseimbangan neurotransmitter di saraf. Untuk itu klien perlu

diberi penjelasan bagaimana kerja obat secara tepat sehingga tujuan pengobatan tercapai secara optimal. Pendidikan kesehatan dapat dilakukan dengan meteri yang benar dalam pemberian obat agar klien patuh untuk menjalankan pengobatan secara tuntas dan teratur.

Jenis-jenis obat yang biasa digunakan pada pasien halusinasi adalah:

1) Chlorpromazine (CPZ, Largactile), Warna: Orange

Chlorpromazine (CPZ) adalah obat yang termasuk golongan antipsikotik fenotiazina yang bekerja dengan menstabilkan senyawa alami otak. Obat ini dapat digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental, seperti skizofrenia dan gangguan psikosis yang lainnya, perilaku agresif yang membahayakan pasien atau orang lain, kecemasan dan kegelisahan yang parah, serta autisme pada anak-anak.

a) Aturan pakai

Aturan pakai : 3 x 100 mg/ hari

b) Indikasi :

Untuk menangani berbagai gangguan mental, seperti skizofrenia dan gangguan psikosis yang lainnya, perilaku agresif yang membahayakan pasien atau orang lain, kecemasan dan kegelisahan yang parah, serta autisme pada anak-anak.

c) Efek samping

Yang dapat terjadi pada pemakaian CPZ meliputi efek sedasi, pusing, pingsan, hipotensi orthostatik, palpitasi, takikardi, sindroma pada mulut, kemerahan pada mukosa, vesikel lidah kotor, gigi tanggal, pandangan kabur, konstipasi, retensi urine, ejakulasi tertahan. CPZ juga menyebabkan efek samping ekstra pyramidal yang meliputi parkinsonisme, dystonia, diskinesia. Gangguan hormonal dapat terjadi yaitu menstruasi tidak teratur, gynecomastia, penurunan libido, peningkatan nafsu makan, berat badan meningkat, edema, glikosuria, hiperglikemia atau hipoglikemia. Reaksi hipersensitif pada beberapa orang menimbulkan efek/ gejala-gejala jaundice, gatal-gatal pada kulit, ptechieae dermatitis, fotosensitis, dan reaksi anafilaksit.

2) Haloperidol (Haldol, Serenace), Warna: Putih

Haloperidol adalah obat golongan anti psikotik yang berfungsi untuk meredakan gejala skizofrenia dan masalah perilaku, atau emosional, serta masalah kejiwaan lainnya. Haloperidol untuk mengatasi skizofrenia biasanya akan diberikan untuk jangka waktu panjang, kecuali ada efek yang merugikan atau berlawanan.

Sedangkan jika untuk meredakan gangguan kecemasan atau agitation, haloperidol hanya dikonsumsi hingga gejala mereda.

a) Aturan Pakai :

Aturan Pakai : 3 x 5 mg/ hari

b) Indikasi :

Meredakan gejala skizofrenia dan masalah perilaku, atau emosional, serta masalah kejiwaan lainnya.

c) Efek samping

Haloperidol serupa dengan efek samping CPZ. Perbedaannya terletak pada efek samping hipotensi ortostatik lebih ringan, sedang efek samping reaksi ekstra lebih berat. Efek samping pada SSP meliputi parkinsonisme, gelisah, akatisia, hiperefleksi, tortikolis, dan tardive diskinesia. Efek otonomi dapat terjadi ; mulut kering (atau hipersalivasi). Konstipasi (atau diare), reaksi urine deaporesi (dosis berlebihan). Pada darah ; leukopenia, leukositosis, anemia. Pada saluran napas ; laringospasme, bronkospasme, peningkatan kedalaman napas, bronkopneumonia, depresi pernafasan. Pada endokrin ; menstruasi tidak teratur, payudara nyeri, ginekomastia, impotensi. Pada kulit ; kemerahan, fotosintesis, rambut

rontok, lain-lain ; anoreksia, mual, muntah, jaundice, penurunan, kadar kolesterol darah.

3) Trihexiphenidyl (THP, Artane, Tremin), Warna: Putih Kecil

Trihexyphenidil (THP) adalah obat yang sering dipakai sebagai penyerta pemberian obat anti psikotik jenis fenotiazin dan butirofenon karena khasiatnya merelaksasi otot polos dan anti spasmodik

a) Aturan Pakai :

Aturan pakai : 3 x 2 mg/ hari

b) Indikasi :

Merelaksasi otot polos dan anti spasmodic

c) Efek Samping

Efek samping yang umum terjadi ; mulut kering, pusing, pandangan kabur, midrasis, fotofobia, mual, nervous, konstipasi, mengantuk, retensi urine. Pada SSP dapat terjadi ; bingung, gitasi, delirium, manifestasi psikotik, euphoria.
Reaksi hipersensitif ; Glaucoma parotitis.

b. Terapi somatic

Terapi somatic adalah terapi yang diberikan kepada klien dengan gangguan jiwa dengan tujuan mengubah perilaku yang maladaptive menjadi perilaku adaptif dengan melakukan tindakan

yang ditujukan pada kondisi fisik klien. Walaupun yang diberi perilaku adalah fisik klien, tetapi target adalah perilaku klien. Jenis somatic adalah meliputi peningkatan, terapi kejang listrik, isolasi, fototerapi.

1) Peningkatan

Peningkatan adalah terapi menggunakan alat mekanik atau manual untuk membatasi mobilitas fisik klien yang bertujuan untuk melindungi cedera fisik sendiri atau orang lain

2) Terapi kejang listrik

Adalah bentuk terapi pada klien dengan menimbulkan kejang (grandma) dengan mengalirkan arus listrik kekuatan rendah (2-8 joule) melalui elektroda yang ditempelkan beberapa detik pada pelipis kiri/ kanan (lobus frontal) klien. (Pambayung, 2015).

c. Terapi nonfarmakologi

1) Terapi aktivitas kelompok

Terapi aktivitas kelompok adalah suatu terapi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi dan juga dapat mengurangi halusinasi bagi penderitanya.

2) Terapi okupasi

Terapi ini lebih mengarah pada pengobatan alami dengan pendekatan batin dan bukan menggunakan obat-obatan kimia. Salah satu manfaat umum dari terapi okupasi adalah untuk

membantu individu dengan kelainan atau gangguan fisik, mental, mengenalkan individu terhadap lingkungan sehingga mampu mencapai peningkatan, perbaikan, dan pemeliharaan kualitas hidup. Salah satu terapi okupasi tersebut adalah terapi menggambar yang merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang menggunakan media seni untuk berkomunikasi. Terapi menggambar juga merupakan terapi yang mendorong seseorang mengekspresikan, memahami emosi melalui ekspresi artistic, dan melalui proses kreatif sehingga dapat memperbaiki fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik.

C. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

- a. Pengkajian data focus
- b. Masalah Keperawatan

1) Persepsi Sensori

a) Isi halusinasi

Ini dapat dikaji dengan menanyakan suara siapa yang didengar, apa yang dikatakan suara itu, jika halusinasi auditorik. Apa bentuk bayangan yang dilihat oleh klien, jika halusinasi visual, bau apa yang tercium jika halusinasi penghidu, rasa apa yang dikecap jika halusinasi pengecapan, dan apa yang dirasakan dipermukaan tubuh jika halusinasi perabaan.

b) Waktu munculnya halusinasi

Dikaji dengan menanyakan kepada klien kapan halusinasi muncul : apakah pagi hari, sore hari atau malam hari. Informasi ini sangat penting untuk menentukan bilamana perlu perhatian saat klien mengalami halusinasi.

c) Frekuensi halusinasi

Dikaji dengan menanyakan kepada klien seberapa sering klien mengalami halusinasi : apakah terus menerus, kadang-kadang, jarang atau sudah tidak muncul lagi.

d) Situasi pencetus halusinasi

Perawat perlu mengidentifikasi situasi yang dialami sebelum halusinasi muncul : Apakah ketika klien sendiri atau setelah terjadinya kejadian tertentu. Selain itu perawat juga bias mengobservasi apa yang dialami klien menjelang munculnya halusinasi untuk memvalidasi pernyataan klien.

e) Respon klien

Untuk menentukan sejauh mana halusinasi telah mempengaruhi klien bisa dikaji dengan apa yang dilakukan oleh klien saat mengalami pengalaman halusinasi. Apakah klien masih bisa mengontrol stimulus halusinasinya atau sudah tidak berdaya terhadap halusinasinya.


- 2) Pembicaraan : Klien dengan halusinasi cenderung suka bicara sendiri, tidak focus ketika diajak berbicara, dan yang dibicarakan sering tidak masuk akal.
- 3) Aktivitas Motorik : Klien dengan halusinasi tampak gelisah, tegang, agitasi, sering menutup telinga, sering menunjuk kerah tertentu, menggaruk-garuk permukaan kulit, sering meludah, sering menutup hidung.
- 4) Afek emosi : Labil. Pada klien dengan halusinasi tingkat emosi lebih tinggi dan cenderung berperilaku agresif.
- 5) Tingkat kesadaran : pada klien dengan halusinasi sering mengalami Apatis atau acuh tak acuh.

b. Masalah Keperawatan

- 1) Resiko tinggi perilaku kekerasan
- 2) Perubahan sensori persepsi halusinasi
- 3) Harga diri rendah kronis

c. Pohon Masalah

Bagan 1.1 Pohon masalah



2. Diagnosis Keperawatan

Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi

3. Intervensi

Tabel 1.3 Intervensi

NO	SP I P	SP I K
1.	Identifikasi halusinasi : isi, frekuensi, waktu terjadinya, factor pencetus, respon saat halusinasi.	1. Diskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat klien
2.	Jelaskan cara mengontrol halusinasi : yaitu dengan cara menghardik halusinasi.	2. Jelaskan pengertian tanda, gejala proses terjadinya halusinasi
3.	Latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik.	3. Latih cara menghardik halusinasi
4.	Menganjurkan klien memasukkan cara menghardik halusinasi dalam kegiatan harian.	4. Ajarkan klien sesuai jadwal dan memberi pujian

NO	SP II P	SP II K
1.	Evaluasi kegiatan menghardik dan beri pujian.	1. Evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat/ melatih pasien dalam menghardik dan beri pujian
2.	Latih cara mengontrol halusinasi dengan minum obat : dengan prinsip 6 benar yaitu : (Jelaskan jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat)	2. Jelaskan cara memberikan obat kepada keluarga dengan prinsip 6 benar
3.	Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik dan minum obat	3. Latih cara memberikan/ membimbing minum obat 4. Anjurkan pasien sesuai jadwal dan memberi pujian

NO	SP III P	SP III K
1.	Evaluasi kegiatan latihan menghardik dan minum obat dan beri pujian.	1. Evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat/ melatih klien menghardik dan memberikan obat dan beri pujian.
2.	Latihan cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi.	2. Jelaskan cara bercakap-cakap dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi
3.	Masukan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap.	3. Latih dan sediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan klien terutama saat halusinasi 4. Anjurkan membantu klien sesuai jadwal berikutnya.

NO.	SP IV P	SP IV K
1.	Evaluasi kegiatan latihan menghardik minum obat, dan bercakap-cakap, beri pujian.	1. Evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat / melatih klien menghardik, memberikan obat, bercakap-cakap

		dan beri pujian.
2.	Latih cara mengontrol halusinasi dalam melakukan kegiatan harian.	2. Anjurkan membantu klien sesuai jadwal dan berikan pujian
3.	Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian.	3. Jelaskan follow up ke Puskesmas, RSJ, tanda kambuh dan rujukan 4. Anjurkan membantu klien sesuai jadwal dan berikan pujian

NO	SP V P	SP V K
1.	Evaluasi kegiatan latihan menghardik, obat, bercakap-cakap, kegiatan harian, berikan pujian.	1. Evaluasi kegiatan keluarga dalam merawat / melatih klien menghardik, memberikan obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan harian dan follow up, beri pujian
2.	Latih kegiatan harian	2. Nilai kemampuan keluarga merawat klien
3.	Nilai kemampuan yang telah mandiri	3. Nilai kemampuan keluarga melakukan kontrol ke RSJ/ Puskesmas
4.	Nilai apakah halusinasi terkontrol	

4. Implementasi

Implementasi adalah melakukan tindakan sesuai dengan rencana , masalah dan kondisi klien yang bersangkutan. Ada 4 fase implementasi komunikasi terapeutik tenaga kesehatan kepada pasien:

a. Fase Orientasi

Pada fase ini hubungan yang terjadi masih dangkaldan komunikasi yang terjadi bersifat pengalihan informasi antara tenaga kesehatan dengan pasien.

b. Fase identifikasi

Merumuskan masalah yang dihadapi pasien.

c. Fase eksploitasi/Fase kerja

Pada fase ini tenaga medis dituntut untuk bekerja untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan pada fase orientasi dan identifikasi. Tenaga

kesehatan harus bekerja sama dengan pasien untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang dialami oleh pasien.

d. Fase relaksasi/Penyelesaian

Pada fase ini perawat mendorong pasien untuk memberikan penilaian atas tujuan yang telah dicapai, agar tujuan yang tercapai adalah kondisi yang saling menguntungkan dan memuaskan.

5. Evaluasi

Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan dan dilakukan harus terus-menerus untuk menilai agar efek dari tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP menjadi pola piker

- S : Respon subyektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan.
- O : Respon objektif klien terhadap keperawatan yang telah dilaksanakan
- A : Gangguan persepsi sensori : Halusinasi (+)
Analisa terhadap data subyektif objektif .
- P : Perencanaan tindakan lanjut berdasarkan hasil analisa respon klien.
- a. Mengenal halusinasi
 - b. Mengontrol halusinasi dengan cara menghardik
 - c. Bercakap-cakap dengan orang lain untuk mengontrol halusinasi

- d. Mengontrol halusinasi dengan cara patuh minum obat
 - e. Melakukan aktivitas terjadwal
6. Terapi Aktivitas Kelompok yang sesuai

Menurut (Lilik, 2016), terapi aktivitas yang cocok adalah terapi aktivitas kelompok (TAK) mengontrol halusinasi, dengan terapi tersebut klien yang mengalami halusinasi dapat mengontrol halusinasinya. Aktivitas digunakan untuk memberikan stimulasi perasaan melalui gerakan tubuh, ekspresi muka, ucapan. TAK Stimulasi Persepsi membantu klien yang mengalami kemunduran orientasi dalam upaya memotivasi proses pikir serta mengurangi perilaku maladaptif. Menurut Keliat, et al (2019) TAK mengontrol halusinasi dibagi menjadi 5 sesi, yaitu :

- 1) Sesi I : Mengetahui Halusinasi (jenis, isi, frekuensi, waktu, situasi, respon)
- 2) Sesi II : Melawan halusinasi dengan menghardik
- 3) Sesi III : Melawan halusinasi dengan bercakap-cakap
- 4) Sesi IV : Melawan halusinasi dengan melakukan kegiatan terjadwal
- 5) Sesi V : patuh minum obat

D. Pendekatan Teori Keperawatan

Karya tulis ini menggabungkan tindakan keperawatan dengan salah satu teori model keperawatan yang sesuai kondisi klien halusinas, yaitu teori keperawatan Hidegard Peplau. Teori model keperawatan ini menjelaskan tentang keperawatan psikodinamik dimana perawatan psikodinamik adalah

kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Terori Hidegard Peplau, berfokus pada individu, perawat, dan proses interaktif yang menghasilkan hubungan antara perawat dan klien (Zainurridha, 2022).

Tujuan keperawatan menurut Peplau adalah untuk membantu klien mencapai kematangan perkembangan kepribadian. Oleh sebab itu perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, dimana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Pada saat klien mencari bantuan, pertama perawat mendiskusikan masalah dan menjelaskan jenis pelayanan yang tersedia (Zainurridha, 2022).

Teori Peplau ini sangat bisa diaplikasikan pada klien yang mengalami halusinasi karena menjelaskan tentang hubungan saling percaya antara klien dan perawat, karena untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi klien maka dibutuhkan suatu proses terapeutik untuk mencapai hubungan saling percaya antara klien dan perawat.

Tujuan teori Peplau di pilih dalam karya tulis ini yaitu untuk meningkatkan hubungan saling percaya antara pasien dan perawat yang akan bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan selama proses perawatan.

E. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)

1. Definisi terapi menggambar

Terapi menggambar merupakan salah satu bentuk psikoterapi yang menggunakan media seni untuk berkomunikasi. Media menggambar dapat berupa pensil, kapur, berwarna, warna, cat, potongan-potongan kertas, alat mewarnai. Terapi menggambar juga merupakan terapi yang mendorong seseorang mengekspresikan, memahami emosi melalui ekspresi artistic, dan melalui proses kreatif sehingga dapat memperbaiki fungsi kognitif, efektif dan psikomotorik.

2. Tujuan terapi menggambar

Aktivitas menggambar dapat membantu pasien dalam menyalurkan atau mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan emosi yang selama ini mempengaruhi perilaku yang tidak di sadarkannya, memberikan kegembiraan, hiburan, serta mengalihkan perhatian pasien pada dunianya sendiri.

3. Indikasi

Terapi menggambar dapat dilakukan pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi. Halusinasi dengan berbagai gangguan indera dapat dilakukan terapi.

4. Kontraindikasi

Tidak terdapat kontraindikasi pada terapi menggambar, karena terapi menggambar tidak memiliki efek samping.

5. Prosedur terapi menggambar

a. Tahap persiapan

Alat dan bahan : pensil dan buku kecil

b. Persiapan pasien :

1) Pasien diusahakan kooperatif atau sudah tenang

c. Tahap orientasi

1) Memberikan salam terapeutik

2) Melakukan evaluasi dan validasi data

3) Melakukan kontrak waktu, tempat dan topic

d. Fase kerja

1) Membaca basmalah

2) Persiapan pasien pada posisi yang nyaman dan aman

3) Berikan buku kecil dan pensil pada pasien

4) Berikan waktu 10-15 menit untuk pasien menggambar

5) Dampingi dan ajak komunikasi pasien pada saat terapi menggambar agar tidak muncul halusinasi

6) Kumpulkan alat dan hasil gambar pasien

7) Berikan reinforcement positif dengan memuji pasien dan meminta pasien menjelaskan makna tentang gambarnya

e. Fase terminasi

- 1) Mengevaluasi respon pasien terhadap terapi
- 2) Melakukan rencana tindak lanjut
- 3) Melakukan kontrak waktu untuk terapi berikutnya
- 4) Berikan pujian sesuai dengan kemampuan pasien
- 5) Mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik
- 6) Dokumentasikan pengaruh atau hasil terapi

6. Jurnal Pendukung

Tabel 1.4 Jurnal Pendukung

Nama jurnal	Tahun	Nama penulis	Sumber	Metode	Hasil
Penerapan terapi okupasi menggambar terhadap tanda dan gejala pasien halusinasi pendengaran di ruang kutilang RSJD provinsi lampung	2023	Vega widya pradana, Nia risa dewi, Nury luthfiyatil fitri	Jurnal cendekia muda	Metode yang digunakan yaitu study kasus	Hasil penerapan menunjukkan bahwa setelah diberikan penerapan terapi menggambar selama 7 hari, menunjukkan bahwa tanda dan gejala halusinasi pendengaran sesudah dilakukan pada subjek 1 dan subjek 2 mengalami penurunan.
Terapi okupasi menggambar terhadap perubahan tanda dan gejala halusinasi pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi di	2023	Firmawati, Fadli syamsuddin, Restivera botutihe	Jurnal medika nusantara	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif desain pre eksperimental dengan rancangan penelitian one group pretest dan posttest.	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara terapi okupasi menggambar terhadap perubahan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi.

RSUD tombulilato					
Pengaruh terapi aktivitas kelompok stimulasi sensoris : menggambar terhadap perubahan tingkat halusinasi pada pasien halusinasi di ruang rawat inap rumah sakit jiwa daerah jambi	2021	Kamariyah, Yuliana	Jurnal ilmiah universitas Batanghari jambi	Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi experiment yang menggunakan pre test dan post test with control group	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan pemberian terapi okupasi menggambar terhadap tingkat halusinasi pada pasien skizofrenia
The effectiveness of application of drawing activity occupational therapy against auditory hallucination symptoms	2023	Sujiah, Herniawarni, Adifikrin	Media keperawatan Indonesia	Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperiment, menggunakan pendekatan control group pre test-post test	Data hasil penelitian ini mengungkapkan jika terapi okupasi aktivitas kegiatan menggambar dapat efektif untuk bisa dilakukan dalam upaya mengendalikan tanda gejala halusinasi pendengaran yang dirasakan responden dengan skizofrenia.

F. Integrasi Keislaman

Dalam paradigm islam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang kesehatan, baik itu dari segi fisik, kejiwaan, sosial dan kerohanian. Ayat-ayat ini terdiri dari dua bagian yaitu :

- a. Konsep-konsep yang merujuk kepada pengertian normative yang khusus, doktrin-doktrin etik. Dalam bagian pertama ini, kita mengenal banyak sekali konsep mengenai kesehatan, baik yang bersifat abstrak maupun kongkrit. Konsep yang abstrak diantaranya adalah konsep yang kondisi jiwa, perasaan, akal dan lain sebagainya. Sementara konsep yang kongkrit mengenai pola kepribadian manusia seperti pola kepribadian yang beriman, pola kepribadian yang munafik, dan pola kepribadian kafir.
- b. Ayat-ayat yang berisi tentang sejarah dan perumpamaan. Seperti kisah didalam mengenai kesabaran Nabi Ayyub dalam meghadapi ujian yang ditimpakan oleh Allah berupa penyakit. Kisah ini tertuang dalam QS. Al-Anbiyya ayat 83-84 :

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤)

Terjemahnya :

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: “(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang”. “Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah”. Qs. Al-Anbiyya : 83-84)

Dikisahkan, sebagaimana ditulis oleh Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Nabi Ayyub adalah sosok yang kaya raya,

memiliki anak-anak dan istri yang sangat dicintainya. Meskipun kaya raya, beliau gemar untuk membantu orang-orang yang hidup dalam kekurangan, anak-anak yatim, dan lansia. Kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ayyub membuat para malaikat-malaikat memanjatkan sholawat untuknya. Ini sebagai wujud bahwa Allah ridho dan mencintai Nabi Ayyub.

Mendengar gemuruh penduduk langit bershalawat untuk Nabi Ayyub, iblis iri dan dengki. Singkat cerita akhirnya iblis meminta izin untuk membumihanguskan harta kekayaan dan putra-putri Nabi Ayyub. Hasan al-Bashri meriwayatkan, ketika Nabi Ayyub telah kehilangan mayoritas yang dimiliki, beliau bergumam: “wahai Tuhanku, sebelum hari ini terjadi, siang hari dunia telah membuatku sibuk, malam hari anak-anakku telah membuatku sibuk, pada hari ini saya memfokuskan pendengaran dan penglihatanku untuk memuji dan berdzikir kepada-Mu. Tidak ada celah iblis membuat tipu dayanya kepadaku”.

Hingga pada akhirnya, beliau dicoba dengan ujian yang berat sampai-sampai beliau diusir oleh penduduk setempat. Masyarakat merasa khawatir jangan-jangan penyakit yang diidap oleh Nabi Ayyub menular pada mereka. Penulis tidak bisa memastikan apakah itu dilakukan dengan cara yang manusiawi atau tidak. Untungnya, di

zaman sekarang bisa dilakukan dengan cara-cara manusiawi, yakni isolasi. Penulis juga tidak bisa memastikan, apakah penyakit Nabi Ayyub benar-benar menular atau tidak.

Dalam kesulitan dan derita yang amat berat ini, Nabi Ayyub tetap menghadapinya dengan penuh kesabaran. Hingga akhirnya beliau melakukan munajat sebagaimana tertera dalam QS. Al-Anbiyâ' ayat 83. Namun, para Ulama berbeda pendapat terkait maksud dari kata "*adh-dhurru*" yang secara leksikal bermakna "kesusahan". Ada yang menyatakan penyakit (*Qatadah*), musibah (*as-Sady*), terputusnya wahyu hingga takut jangan-jangan Allah telah berpaling darinya (*Ja'far ash-Shadiq*) atau terlalu lemah hingga tidak mampu untuk berdiri dalam beribadah (*al-Hasan*).

Meskipun para ulama berselisih, setidaknya ayat di atas menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi Nabi Ayyub yang penuh kesulitan. Masyarakat juga khawatir penyakit Nabi Ayyub menular kepada mereka. Dalam hal ini, penulis menilai, Nabi Ayyub pun memaklumi apa yang dicemaskan oleh masyarakatnya. Meskipun dikisahkan, hanya sedikit dari masyarakatnya yang mau mengikuti ajaran Nabi Ayyub, tapi kita bisa melihat bagaimana kecintaan dan kasih sayang Nabi Ayyub kepada masyarakatnya, sebagaimana telah disampaikan di atas.

Dalam keadaan yang penuh dengan segala kesusahan, tidak ada makanan dan minuman yang sebelumnya selalu diantarkan oleh istrinya, tidak ada yang mau menemaninya, doa Nabi Ayyub akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nabi Ayyub diperintahkan untuk menginjakkan kakinya ke tanah dan seketika itu muncullah air. Nabi Ayyub mandi dengan air tersebut hingga akhirnya sembuhlah penyakit-penyakit yang selama ini dideritanya.

Dalam kisah nabi Ayyub diatas mengajarkan kita untuk ikhlas dan sabar menerima kondisi yang dialami yang telah diberikan oleh Allah sebagai salah satu ujian untuk menilai bagaimana diri kita mampu menghadapi ujian tersebut.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan mental yaitu ada pada Q.S Al-Imran (3) : 110, Allah swt berfirman :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ ۱۱۰

Terjemahnya :

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang baik” (Qs.Al-Imran : 110)

Menurut Quraish Shihab, dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat di atas dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah kalian

sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia jika kalian semua menunaikan syarat-syarat-Nya, dan beriman kepada Allah, yang dilahirkan untuk syarat yang telah Allah tetapkan. Jadi penafsiran ayat tersebut adalah “kalian sebaik-baiknya umat yang memerintahkan manusia kepada yang ma’ruf, melarang manusia yang munkar pada zaman kalian (Samain & Budihardjo, 2020)

Kemudian adapun ayat lain yang berkaitan dengan kesehatan mental yaitu dalam QS. Al-baqarah ayat 155 :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِيرٍ
الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

“Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar”.
(Qs. Al-Baqarah : 155)

Ayat tersebut, menggunakan lafadz wlanabluuwannakum adalah menyatakan kesungguhan, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan sebagaimana yang tersurat dalam ayat diatas: bahwa ujian yang akan diberikan Allah adalah kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah

kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa.

Konsep kesehatan mental adalah terhindarnya dari gangguan mental baik psikosis maupun neurosis dan dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kitab suci Al-Qur'an terdapat kekuatan spiritual untuk mengamalkan ibadah dengan ikhlas. Upaya sadar seorang merupakan keyakinan yang matang dan kokoh kepada Allah swt. Mampu menjadi motivator perolehan kesehatan mental (Samain & Budihardjo, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Menurut Nursalam (2016) penelitian studi kasus merupakan sebuah rancangan penelitian yang mencakup pengkajian suatu unit penelitian secara intensif misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas, dan institusi. Dengan begitu studi kasus lebih mengutamakan secara detail dan terperinci. Penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam kondisi yang dirasakan oleh pasien dengan cara yang sistematis.

B. Subjek Studi Kasus

Pengambilan responden pada penelitian karya tulis ini adalah pasien yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu kriteria inklusi dan eksklusi, kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu :

- a. Pasien yang mengalami gangguan halusinasi pendengaran
- b. Pasien yang bersedia jadi responden

Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu :

- a. Pasien dengan gangguan halusinasi Fase V (*Conquering panic level of anxiety*)
- b. Pasien yang memiliki gangguan skizofrenia selain halusinasi

C. Fokus Studi Kasus

Penelitian ini berfokus pada kasus dengan melakukan proses asuhan keperawatan pada Tn.H dengan halusinasi pendengaran menggunakan terapi menggambar di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen pada karya tulis ini yaitu lembar format asuhan keperawatan, lembar evaluasi tanda & gejala pada pasien halusinasi, buku kecil dan pensil untuk melakukan terapi menggambar.

E. Prosedur Pengambilan Data

Penelitian ini mempunyai beberapa langkah-langkah antara lain :

a. Persiapan

Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan pengajuan judul studi kasus yang berjudul Pengaruh terapi menggambar pada pasien dengan halusinasi pendengaran dengan melakukan observasi, analisis hasil literature, SOP, dan melakukan kontrak

b. Pengumpulan data

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, pengkajian, instrument tanda dan gejala, dan format asuhan keperawatan.

c. Penyusunan laporan

Langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dengan menyusun pengkajian dari data objektif dan subjektif serta wawancara.

Kemudian, melakukan penegakkan diagnosis keperawatan dan menyusun perencanaan tindakan keperawatan, implementasi dan evaluasi dan yang terakhir yaitu melakukan pendokumentasian dengan bentuk laporan karya tulis ilmiah dengan berdasarkan SDKI, SLKI, SIKI dan SOP.

G. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Pengambilan data observasi dan wawancara yaitu pada pasien yang mengalami halusinasi yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2023 di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi Provinsi Sulawesi Selatan

H. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada kasus ini berupa kajian kasus yang didapatkan secara fakta dan dituangkan dalam teks dan bersifat sistematis yang didapatkan dari data-data yang ada. Analisis data pada kasus ini yaitu dengan pasien halusinasi pendengaran yang sebelumnya pernah dirawat di RSKD Dadi.

I. Etika Studi Kasus

Etika yang dilakukan dalam proses asuhan keperawatan ini yaitu etika *confidentiality* (kerahasiaan) dimana perawat tersebut merahasiakan informasi tentang pasien dan juga melakukan BHSP atau bina hubungan saling percaya untuk lebih memudahkan melakukan suatu tindakan keperawatan pada pasien.

BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

RUANG RAWAT : Kenari

TANGGAL DIRAWAT : 03-01-2023

I. IDENTITAS KLIEN

Inisial : Tn. H (L/P)

Tanggal pengkajian : 24 Januari 2023

Umur : 27 Tahun

RM No. : 146387

Informan : Klien dan buku rekam medis klien

II. ALASAN MASUK

Seorang laki-laku usia 27 tahun diantar oleh orang tuanya ke RSKD Dadi untuk kelima kalinya karena klien gelisah, mondar-mandir sekeliling rumah terutama saat malam hari, klien kadang berbicara sendiri. Klien mengatakan sering mendengar suara bisikan perempuan yang mengatakan untuk “mengamuk” dan klien mengikuti perintah tersebut. Klien mengamuk dan menghancurkan barang-barang dikamarnya saat mendengar suara perempuan tersebut dan klien juga pernah memukul ayahnya karena tidak terima dinasehati.

Kondisi Saat ini:

Saat dilakukan pengkajian klien mengatakan saat ini masih sering mendengar suara bisikan perempuan seperti perintah untuk mengamuk. Klien mengatakan mendengar suara itu saat sedang sendirian dan melamun. Klien mengatakan suara itu paling sering muncul pada malam hari, saat suara itu muncul klien hanya menutup telinga sampai suara itu hilang, saat pengkajian klien juga tampak gelisah.

III. FAKTOR PREDISPOSISI

1. Pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu?

Ya

Tidak

2. Pengobatan sebelumnya

Berhasil Kurang berhasil Tidak berhasil

3.

	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Aniaya fisik	<input checked="" type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aniaya seksual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Penolakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pelaku/Usia	Korban/Usia	Saksi/Usia
Kekerasan dalam keluarga	<input checked="" type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tindakan Kriminal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jelaskan No. 1, 2, 3 : gangguan jiwa ini sudah dialami klien sejak tahun 2021. Sebelumnya klien sudah masuk RSKD DADI sebanyak lima kali tapi pengobatan kurang berhasil karena saat klien sudah keluar dari RS klien tidak teratur meminum obatnya, sehingga gangguan jiwa yang dialami klien kambuh. Saat dinasehati oleh ayahnya, klien tidak menerimanya dan langsung memukul ayahnya dengan cara meninju wajahnya.

Masalah Keperawatan : Risiko Perilaku Kekerasan

4. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa

Ya Tidak

Hubungan keluarga

Gejala

Riwayat pengobatan/perawatan

Ibu dari klien

Masalah Keperawatan : tidak ada

5. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan

Klien mengatakan pernah dipukul ayahnya saat umur 20 tahun dan pernah direndahkan oleh sepupunya karena hanya bekerja sebagai pelayan kafe dan tukang parkir. Klien juga mengatakan pernah mengalami putus cinta.

Masalah Keperawatan : _____


IV. FISIK

1. Tanda vital : TD: 110/80, N: 80, S: 36, P: 20
2. Ukur : TB: 180, BB: 65 kg
3. Keluhan fisik : Ya Tidak
 Jelaskan : klien tidak memiliki keluhan tentang fisiknya

Masalah Keperawatan : tidak ada

V. PSIKOSOSIAL

a. Genogram :



Ket :

<input type="checkbox"/>	: laki laki	?	: usia tidak diketahui
<input type="circle"/>	: perempuan	—	: garis pernikahan
X	: meninggal		: garis keturunan
↗	: pasien	----	: garis serumah

G1 : kakek dan nenek klien dari ibu sudah meninggal karena sakit dan kakek dari ayah klien sudah meninggal karena sakit. Sedangkan nenek dari ayah klien masih hidup

G2 : orang tua klien masih hidup, ibu klien berusia 46 tahun dan ayah klien 50 tahun, keadaan ibu klien sehat dan ayah klien saat ini sedang sakit stroke.

G3 : klien adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan sekarang sedang mengalami gangguan halusinasi pendengaran.

Jelaskan : klien mengatakan pola asuh dalam keluarganya yaitu ayahnya tegas, dan dalam komunikasi klien dengan ayahnya kurang, klien juga mengatakan dalam keluarga yang mengambil keputusan adalah ayahnya sebagai kepala keluarga.

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah

b. Konsep diri

- i. Gambaran diri : klien mengatakan bagian tubuh yang disukai adalah matanya karena dengan mata klien bisa melihat, klien juga mengatakan tidak ada anggota tubuh yang tidak disukai klien.
- ii. Identitas : klien mengetahui dirinya sebagai anak dan dulu pernah sekolah tapi hanya sampai SMA, tidak lanjut kuliah karena masalah biaya. Klien juga mengatakan puas dilahirkan sebagai laki-laki.
- iii. Peran : klien mengatakan dalam keluarga klien sebagai anak dan klien pernah bekerja sebagai pelayan kafe dan tukang parkir
- iv. Ideal diri : klien mengatakan ingin sembuh dan bisa hidup seperti orang lain. Klien juga berharap keluarganya terutama ayahnya tidak terlalu keras padanya lagi.
- v. Harga diri : klien mengatakan merasa sedih karena dimasukkan dalam RSKD Dadi. Klien juga mengatakan setelah keluar dari RS akan mencari pekerjaan untuk membiayai hidupnya sendiri.

Masalah Keperawatan : Tidak ada

c. Hubungan Sosial

- i. Orang yang berarti : klien mengatakan orang yang berarti baginya adalah orang tua dan saudara-saudaranya.
- ii. Peran serta dalam kegiatan kelompok/masyarakat: klien mengatakan tidak pernah mengikuti kegiatan kelompok/masyarakat seperti kegiatan gerakan-gerakan pemuda di sekitar lingkungannya dan hanya memilih untuk pergi bersama teman-temannya.
- iii. Hambatan dalam berhubungan dengan orang lain : klien mengatakan tidak memiliki hambatan dalam berhubungan dengan orang lain karena dia mudah

berbau. Tapi semenjak sakit klien jarang keluar dan lebih memilih berada di dalam kamarnya.

Masalah Keperawatan : Tidak ada masalah

d. Spritual :

- i. Nilai dan keyakinan : klien beragama islam dan klien mengatakan penyebab sakit yang dialami karena sudah takdir dari Allah dan perilakunya yang buruk sebelumnya.
- ii. Kegiatan Ibadah : klien mengatakn selama berada di RSKD Dadi klien jarang melaksanakan ibadah.

Masalah Keperawatan : Tidak ada

VI. SATUS MENTAL

a. Penampilan

- Tidak rapih Penggunaan pakaian tidak sesuai cara berpakaia seperti biasanya

Jelaskan : klien tampak sering memakai baju kaos berlengan pendek dan celana kain sepanjang lutut, klien juga tidak berbau, kuku klien juga tampak pendek

Masalah Keperawatan : tidak ada masalah

b. Pembicaraan

- Cepat Keras Gagap Inkoheren
 Apatis Lambat Membisu Tidak mampu memulai pembicaraan

Jelaskan : saat pembicaraan klien tampak berbicara dengan cepat dan dengan suara keras

Masalah Keperawatan : Risiko perilaku kekerasan

c. Aktivitas Motorik :

- Lesu Tegang Gelisah Agitasi
 Tik Grimasen Tremor Kompulsif

Jelaskan : saat pengkajian klien tampak gelisah namun klien mampu melakukan kegiatannya sehari-hari di RS.

Masalah Keperawatan : _____

d. Alam Perasaan

Sedih ketakutan Putus asa Khawatir Sembira berlebihan

Jelaskan : klien mengatakan merasa sedih karena dimasukkan di RSKD Dadi dan orang tuanya jarang menjenguknya

Masalah Keperawatan : _____

e. Afek

Datar Tumpul Labil Tidak sesuai

Jelaskan : saat pengkajian klien tampak kebanyakan diam dan hanya berbicara saat diajukan pertanyaan serta ekspresi wajahnya datar.

Masalah Keperawatan : tidak ada

f. Interaksi selama wawancara

Bermusuhan Tidak kooperatif Masalah tersinggung
 Kontak mata (-) Defensif Curiga

Jelaskan : selama wawancara klien cukup kooperatif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dengan kontak mata yang baik tapi kadang menunduk.

Masalah Keperawatan : tidak ada

g. Persepsi

Pendengaran Penglihatan Perabaan
 Pengecepan Penghidu

Jelaskan : klien mengatakan sering mendengar suara bisikan perempuan yang mengatakan untuk mengamuk, suara itu muncul saat malam hari dengan durasi 1-2 menit.

Masalah Keperawatan : Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran

h. Proses Pikir

Sirkumtansial Tangensial Kehilangan asosiasi
 Flight of idea *Blocking* per ngan
pembicaraan/persevarasi

Jelaskan : klien dapat menjawab pertanyaan dengan baik tanpa berbelit-belit sesuai topic pembicaraan dan memberikan jawaban yang jelas.

Masalah Keperawatan : tidak ada

i. Isi Pikir

Obsesi Fobia Hipokondria

diluar dirinya

Jelaskan : klien mengatakan mengetahui penyakitnya saat ini dan mengatakan bahwa dia bisa menerimanya

Masalah Keperawatan : _____

VII. MEKANISME KOPING

Adaptif

- Bicara dengan orang lain
- Mampu menyelesaikan masalah
- Tehnik relaksasi
- Aktivitas konstruktif
- Olahraga
- Lainnya

Maladaptif

- Minum alkohol
- Reaksi lambat/belebi
- Bekerja berlebihan
- Menghindar
- Mencederai diri
- Lainnya

Masalah Keperawatan : _____

VIII. MASALAH PSIKOSOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Masalah dengan dukungan kelompok, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah berhubungan dengan lingkungan, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah dengan pendidikan, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah dengan pekerjaan, spesifik : klien mengatakan dipecat dari pekerjaannya karena kondisi kesehatannya saat ini.
- Masalah dengan perumahan, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah ekonomi, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah dengan pelayanan kesehatan, spesifik : Tidak ada masalah
- Masalah lainnya, spesifik : Tidak ada masalah


Masalah Keperawatan : _____

IX. PENGETAHUAN KURANG TENTANG

- Penyakit jiwa
- Faktor predisposisi
- Koping
- Sistem pendukung
- Penyakit fisik
- Obat-obatan

Lainnya

Masalah Keperawatan : _____



Analisa Data

Data	Masalah
<p>Subjektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan sering mendengar suara bisikan perempuan yang mengatakan untuk “mengamuk” dan klien mengikuti perintah tersebut. - Klien mengatakan mendengar suara itu saat sedang sendirian dan melamun. - Klien mengatakan suara itu paling sering muncul pada malam hari, - saat suara itu muncul klien hanya menutup telinga sampai suara itu hilang, - semenjak sakit klien jarang keluar dan lebih memilih berada di dalam kamarnya. <p>Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - saat pengkajian klien juga tampak gelisah. - Sebelumnya klien sudah masuk RSKD DADI sebanyak lima kali tapi pengobatan kurang berhasil 	<p>Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran</p>

<p>Subjektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan klien mengamuk dan menghancurkan barang-barang dikamarnya saat mendengar suara perempuan tersebut - klien juga pernah memukul ayahnya karena tidak terima dinasehati. - Klien mengatakan pernah dipukul ayahnya saat umur 20 tahun - klien mengatakan saat mendengar suara bisikan perempuan yang memerintahkannya untuk mengamuk selama di RS, klien ingin melakukannya tapi klien selalu berusaha melawannya dengan cara menutup telinganya. <p>Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - saat pembicaraan klien tampak berbicara dengan cepat dan dengan suara keras 	<p>Risiko perilaku kekerasan</p>
---	----------------------------------

X. ASPEK MEDIK

Diagnosa Medik : Skizofrenia

Terapi Medik :

- Respiredon 2 mg/oral 1-0-1
- Clozapine 25 mg/oral 0-0-1

XI. POHON MASALAH

Risiko Perilaku Kekerasan (effect)



Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran (core problem)



Harga Diri Rendah (cause)

B. Diagnosis Keperawatan

- a. Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran
- b. Risiko Perilaku Kekerasan

C. Intervensi Keperawatan

INISIAL PASIEN : Tn.H

RUANGAN : Kenari

Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan			
	Tujuan	Kriteria Evaluasi	Tindakan Keperawatan	Rasional
Gangguan persepsi sensori : Halusinasi pendengaran	Pasien dapat mengenal dan mengontrol halusinasinya	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, Pasien dapat mengetahui kemampuan dan aspek yang di miliki dengan Kriteria hasil: 1. Pasien dapat menilai kemampuan yang masih dapat digunakan 2. Pasien dapat memilih kegiatan sesuai dengan kemampuan 3. Pasien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan yang diajarkan	Tindakan Keperawatan I 1. Identifikasi halusinas: isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaanb dan respon 2. Jelaskan cara mengontrol halusinasi: hardik, obat, bercakap-cakap, melakukan kegiatan 3. Latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik.	1. Untuk mengetahui frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan dan respon 2. Untuk mengetahui cara mengontrol halusinasi; hardik, obat, bercakap-cakap 3. Untuk mengetahui kemampuan mengontrol halusinasi dengan menghardik 4. Untuk mengetahui cara membuat jadwal kegiatan latihan menghardik
	Pasien mampu mengontrol halusinasinya dengan prinsip 6	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, Pasien dapat mengetahui kemampuan yang di	Tindakan Keperawatan II 1. Evaluasi kegiatan menghardik berikan pujian 2. Latih cara mengontrol	1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan

	benar minum obat	<p>memiliki dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kemampuan kedua 	<p>halusinasi dengan obat (jelaskan 6 benar : jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan: menghardik, minum obat, 	<p>yang akan dilatih terlebih dahulu dan kemampuan untuk rutin minum obat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal latihan
	Pasien dapat mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dengan orang lain	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, Pasien dapat mengetahui kemampuan yang di miliki dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat memilih kegiatan ketiga yang dilakukan 	<p>Tindakan Keperawatan III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik dan minum obat berikan pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan: menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu dan membantu Pasien mengendalikan halusinasi 3. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal latihan
	Pasien dapat mengontrol halusinasi dengan cara melakukan kegiatan	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan, Pasien dapat mengetahui kemampuan yang di miliki dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dapat memilih kegiatan ke empat yang akan di lakukan sesuai 	<p>Tindakan Keperawatan IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik minum obat dan bercakap-cakap berikan pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian yaitu menggambar, membersihkan seperti menyapu 3. Masukkan pada jadwal kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu 3. Meningkatkan kedisiplinan pasien untuk memasukan jadwal latihan

		kemampuan	untuk latihan: menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian	
	Pasien dapat mengontrol halusinasi dengan menghardik, mengkonsumsi obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, Pasien dapat mengetahui kemampuan yang di miliki dengan Kriteria hasil: 1. Pasien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan tanpa membatasinya	Tindakan Keperawatan V 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. berikan pujian. 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri 4. Nilai apakah halusinasi terkontrol	1. Mengetahui pelaksanaan jadwal kegiatan yang dibuat sebelumnya 2. Menentukan kegiatan yang akan dilatih terlebih dahulu dan membantu Pasien mengendalikan halusinasi 3. Melihat sejauh mana kemampuan yang telah mandiri 4. Mengetahui keberhasilan intervensi
Risiko Perilaku Kekerasan	1. Pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan 2. pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan 3. Pasien dapat menyebut jenis perilaku kekerasan yang pernah dilakukan	Setelah dilakukan 2 x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasannya dengan Kriteria hasil: 1. pasien menceritakan penyebab, tanda, gejala (seperti perasaan marah, mata merah, tangan mengempal, ekspresi tegang dan lain-lain) dan mengetahui akibat serta perilaku kekerasan yang is	Tindakan Keperawatan I 1. Identifikasi penyebab, tanda & gejala, PK yang dilakukan, akibat PK 2. Jelaskan cara mengontrol PK: fisik, obat, verbal, spiritual 3. Latihan cara mengontrol PK secara fisik: tarik nafas dalam dan pukul kasur dan bantal 4. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik	1. Mengetahui penyebab, tanda & gejala, PK yang dilakukan, akibat PK dapat menjadi acuan penentuan terapi pasien 2. Menjadi acuan perawat dalam pemberian intervensi dan memberikan edukasi ke pasien 3. Menjadi wadah pasien untuk melampiaskan marah sehingga tidak merusak. 4. Melatih pasien disiplin terhadap jadwal yang telah dibuat

	<p>4. pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan</p> <p>5. pasien dapat menyebut cara mencegah dan mengontrol perilaku kekerasan</p>	<p>lakukan perilaku kekerasannya.</p> <p>2. pasien dapat menyebutkan cara-cara sehat mengungkapkan kemarahan</p>		
	<p>1. Pasien dapat mengendalikan emosi dengan cara tarik napas dalam</p> <p>2. pasien dapat memahami cara mengontrol PK yang ke 2</p>	<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mencegah perilaku kekerasan dengan Kriteria hasil:</p> <p>a. pasien dapat mengetahui tujuan pengobatan</p> <p>b. pasien dapat menyebutkan dosis obat</p>	<p>Tindakan Keperawatan II</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan fisik. Beri pujian</p> <p>2. Latih cara mengontrol PK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat)</p> <p>3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik dan minum obat</p>	<p>1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi</p> <p>2. Mengetahui obat dapat mencegah pasien salah konsumsi obat dan pasien dapat mengetahui obat yang dikonsumsi.</p> <p>3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan jadwal terapi</p>
	<p>pasien dapat memahami cara mengontrol PK yang ke 3</p>	<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku kekerasan dengan Kriteria hasil:</p>	<p>Tindakan Keperawatan III</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan fisik & obat. Beri pujian</p> <p>2. Latih cara mengontrol PK secara verbal (3 cara, yaitu: mengungkapkan, meminta,</p>	<p>1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi.</p> <p>2. Dengan mengekspresikan marah dengan secara perlahan dapat mencegah</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. pasien rutin dan disiplin minum obat 2. pasien menyebutkan cara positif mengekspresikan marah 	<p>menolak dengan benar)</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat dan verbal 	<p>pasien bertindak lebih jauh.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan jadwal terapi
	Pasien dapat mengendalikan emosi dengan cara spiritual	<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku marah dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien dapat menyebutkan cara positif mengungkapkan marah 2. pasien dapat beribadah secara mandiri 	<p>Tindakan Keperawatan IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan fisik & obat & verbal. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol spiritual (2 kegiatan) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, verbal dan spiritual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi 2. Melakukan terapi spiritual dapat mengurangi perilaku kekerasan, dengan mengingat tuhan pasien dapat mencegah pasien PK 3. Melatih pasien disiplin dan menjadi acuan pasien dalam melaksanakan jadwal terapi
	Pasien dapat menontrol PK dengan memukul bantal, minum obat, dengan cara verbal dan spiritual	<p>Setelah dilakukan 2x interaksi pasien diharapkan pasien dapat mengontrol perilaku marah dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasien dapat menyebutkan cara positif mengungkapkan marah 	<p>Tindakan Keperawatan V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan fisik 1, 2 & obat & verbal & spiritual. Beri pujian 2. Nilai kemampuan yang telah mandiri 3. Nilai apakah PK terkontrol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kepatuhan pasien dalam mengikuti terapi, 2. Mengetahui kemampuan yang telah mandiri 3. Mengetahui apakah PK terkontrol dengan melihat tanda dan gejala

D. Impelemntasi dan Evaluasi Keperawatan

Nama : Tn. H

Ruangan : Kenari

No	Diagnosis Keperawatan	Implementasi Keperawatan	Evaluasi Keperawatan
1	<p>Gangguan persepsi sensori : Halusinasi Pendengaran</p>	<p>Selasa, 24 Januari 2023/10.30 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi halusinasi: isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi, pencetus, perasaan, respon Hasil: Pasien mengalami perilaku kekerasan akibat halusinasi pendengaran yang dialaminya, pasien sering mendengar suara bisikan perempuan yang menyuruhnya untuk mengamuk, suara bisikan itu paling sering terdengar saat malam hari, dengan durasi 1-2 menit, saat pasien mendengar suara bisikan itu pasien ada keinginan untuk marah atau mengamuk 2. Menjelaskan cara mengontrol halusinasi: hardik, obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan Hasil: klien mengetahui cara-cara mengontrol halusinasi 3. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik Hasil: klien memahami cara mengontrol halusinasi dengan menghardik suara yang didengarkan 4. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik Hasil: klien memasukkan kegiatan 	<p>Selasa, 24 Januari 2023/12.00</p> <p>S: Pasien mengalami perilaku kekerasan akibat halusinasi pendengaran yang dialaminya, pasien mengatakan mengetahui cara meengontrol halusinasi dengan menghardik O: klien melakukan kegiatan menghardik A: halusinasi pendengaran P: lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik, beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusianasi dengan minum obat 3. Masukkan pada jadwal harian

		menghardik pada jadwal kegiatan	
		<p>Rabu, 25 Januari 2023/09.45 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan menghardik, beri pujian Hasil: klien melakukan kegiatan menghardik dengan baik dan benar saat mendengar suara bisikan, klien mengatakan masih sering mendengar suara bisikan perempuan. 2. Melatih cara mengontrol halusianasi dengan minum obat Hasil: klien mampu memahami penjelesan mengenai obat yang dikonsumsi dengan baik 3. Memasukkan pada jadwal harian Hasil: klien mengatakan akan memasukkan cara mengontrol halusinasi dengan minum obat, klien mengatakan akan rajin minum obatnya saat pulang nanti 	<p>Rabu, 25 Januari 2023/12.00 WITA</p> <p>S: klien mengatakan masih sering mendengar suara bisikan perempuan yang menyuruhnya untuk mengamuk O: klien tampak mampu menjelaskan obat yang dikonsumsi A: halusinasi pendengaran P: lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik dan obat. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap
		<p>Kamis, 26 Januari 2023/15.40 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan III</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik dan obat. Beri pujian Hasil: klien mengatakan rajin minum obatnya dan mampu melkakukan latihan menghardik dnegan baik dan benar 2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap saat terjadi halusinasi Hasil: klien mengatakan memiliki teman di kamarnya sehingga sering bercakap-cakap dnegan temannya 3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk 	<p>Kamis, 26 Januari 2023/16.00 WITA</p> <p>S: klien mengatakan rutin minum obat, dan kadang masih mendengar suara bisikan perempuan O: klien tampak mengerti cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap A: halusinasi pendengaran P: lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan menghardik minum obat dan bercakap-cakap berikan pujian

		<p>latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap Hasil: Klein mengatakan akan memasukkan latihan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap</p>	<p>2. Latih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian (mulai 2 kegiatan) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan: menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian</p>
		<p>Jum'at, 27 Januari 2023/15.10 WITA Tindakan Keperawatan IV</p> <p>1. Mengevaluasi kegiatan menghardik minum obat dan bercakap-cakap berikan pujian Hasil : pasien melakukan kegiatan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap</p> <p>2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian dengan menggambar dan membersihkan seperti menyapu Hasil : pasien mengatakan akan melakukan kegiatan yang diajarkan untuk mengontrol halusinasi</p> <p>3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan: pasien menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian Hasil : pasien bisa melakukan kegiatan menghardik, minum obat dengan teratut, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan seperti menggambar</p>	<p>Jum'ast, 27 Januari 2023/17.00 WITA</p> <p>S: klien mengatakan rutin minum obat yang diberikan oleh perawat, suara-suara bisikan masih sering terdengar, merasa terganggu, marah-marah, khawatir, sering merasa waspada, bicara sendiri, mengikuti halusinasinya. O: klien tampak menggambar dibuku kecil yang diberikan A: halusinasi pendengaran P: lanjutkan intervensi</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. berikan pujian. 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri Nilai apakah halusinasi terkontrol</p>
		<p>Sabtu, 28 Januari 2023/15.10 WITA Tindakan Keperawatan IV</p>	<p>Sabtu, 28 Januari 2023/17.00 WITA</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan menghardik minum obat dan bercakap-cakap berikan pujian Hasil : pasien mampu melakukan kegiatan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap 2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian dengan menggambar dan membersihkan seperti menyapu Hasil : pasien mengatakan melakukan kegiatan yang diajarkan untuk mengontrol halusinasi 	<p>S: klien mengatakan rutin minum obat yang diberikan oleh perawat, suara-suara bisikan masih sering terdengar, masih terganggu, kadang bicara sendiri, dan mengikuti isi halusinasinya.</p> <p>O: klien tampak menggambar pada buku kecil yang diberikan</p> <p>A: halusinasi pendengaran</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. berikan pujian. 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri Nilai apakah halusinasi terkontrol
		<p>Rabu, 01 Februari 2023/15.10 WITA Tindakan Keperawatan IV</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan menghardik minum obat dan bercakap-cakap berikan pujian Hasil : pasien mampu melakukan kegiatan menghardik, minum obat dan bercakap-cakap 2. Melatih cara mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian dengan menggambar dan membersihkan seperti menyapu Hasil : pasien mengatakan melakukan kegiatan yang diajarkan untuk mengontrol halusinasi 	<p>Rabu, 01 Februari 2023/17.00 WITA</p> <p>S: klien mengatakan rutin minum obat yang diberikan oleh perawat, suara-suara bisikan masih kadang terdengar tapi pasien mampu mengatasinya dengan melakukan kegiatan yang telah diberikan pada pasien.</p> <p>O: klien tampak menggambar di buku kecil yang diberikan</p> <p>A: halusinasi pendengaran</p> <p>P: lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian. berikan pujian. 2. Latih kegiatan harian 3. Nilai kemampuan yang telah mandiri Nilai apakah halusinasi terkontrol

		<p>Jum'at, 03 Februari 2023/10.00 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan V</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian, berikan pujian. Hasil : pasien masih mengingat dan melakukan kegiatan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan melakukan kegiatan harian 2. Melatih kegiatan harian Hasil : pasien mengatakan melakukan kegiatan menggambar dan menghardik saat mendengar suara bisikan itu muncul 3. Menilai kemampuan yang telah mandiri Nilai apakah halusinasi terkontrol Hasil : pasien mampu melakukan kegiatan yang telah di ajarkan 	<p>S: klien mengatakan rutin minum obat, dan mampu melakukan kegiatan menghardik dan menggambar saat suara itu muncul dan klien juga mengatakan sudah jarang mendengar suara bisikan perempuan yang selalu menyuruhnya untuk mengamuk</p> <p>O: klien tampak tenang dan kadang tersenyum</p> <p>A: halusinasi pendengaran</p> <p>P: pertahankan intervensi tindakan keperawatan I, II, III, dan IV</p>
2	Risiko perilaku kekerasan	<p>Minggu, 29 Januari 2023/09.40 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala PK yang dilakukan, akibat PK Hasil : Pasien mengalami perilaku kekerasan akibat halusinasi pendengaran yang dialaminya, pasien sering mendengar suara bisikan perempuan yang menyuruhnya untuk mengamuk. Pasien pernah memukul ayahnya. 2. Menjelaskan cara mengontrol PK: fisik, obat, verbal, spiritual Hasil : Pasien telah diajarkan beberapa teknik untuk mengontrol perilaku dengan cara fisik memukul bantal atau kasur, tidak 	<p>Minggu, 29 Januari 2023/12.00 WITA</p> <p>S : Pasien mengatakan akan melatih kegiatan yang telah diberikan.</p> <p>O : Pasien nampak kooperatif saat diajak berbicara, walau kadang nada bicaranya terkesan tinggi dan suaranya keras</p> <p>A : Risiko Perilaku Kekerasan</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kegiatan latihan fisik. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol PK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk

		<p>putus penggunaan obat yang telah diresepkan dokter, meluapkan emosi hanya dengan verbal atau kata-kata tanpa adanya sentuhan fisik, serta mengontrol pk dengan spiritual seperti berdoa dan mengingat Tuhan.</p> <p>3. Melatih cara mengontrol PK secara fisik: tarik nafas dalam dan pukul kasur dan bantal Hasil : Pasien dilatih tarik napas panjang dan tahan 3 detik dan menghembuskan dengan perlahan sebanyak 3x serta menganjurkan untuk meluapkan emosinya pada kasur atau bantal.</p> <p>4. Memasukan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik Hasil : Latihan telah masuk ke jadwal kegiatan, pasien dianjurkan untuk sering-sering melatih teknik yang telah diajarkan apabila terjadi emosi atau dendam ingin memukul.</p>	<p>latihan fisik dan minum obat</p>
		<p>Senin, 30 Januari 2023/10.15 WITA Tindakan Keperawatan II</p> <p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan fisik. Beri pujian Hasil : Pasien masih mengingat latihan fisik yang telah diberikan kemarin, pasien mampu mempraktekkan ulang latihan yang telah diberikan.</p> <p>2. Melatih cara mengontrol PK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat) Hasil : Pasien telah diajarkan 6 benar penggunaan obat. Serta pasien dianjurkan untuk tidak putus obat lagi agar masalah kesehatannya dapat teratasi.</p>	<p>Senin, 30 Januari 2023/12.00 WITA</p> <p>S : Pasien mengatakan akan minum obat secara teratur agar penyakitnya tidak kambuh lagi dan cepat pulang O : Pasien nampak tenang dan mampu menyimak penjelasan yang diberikan dengan baik, kontak mata ada, pasien mampu berinteraksi dengan baik tanpa adanya emosi A : Risiko Perilaku Kekerasan P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan fisik dan obat. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol PK secara verbal (3 cara, yaitu: mengungkapkan,</p>

		<p>3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik dan minum obat Hasil : Latihan fisik dan minum obat dengan tepat telah dimasukkan ke jadwal kegiatan harian.</p>	<p>meminta, menolak dengan benar) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat dan verbal</p>
		<p>Selasa, 31 Januari 2023/10.30 WITA Tindakan Keperawatan III</p> <p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan fisik dan obat. Beri pujian Hasil : Pasien mengatakan sering latihan tarik napas. Pasien juga mengatakan rutin meminum obat sesuai jadwal yang diberikan.</p> <p>2. Melatih cara mengontrol PK secara verbal (3 cara, yaitu: mengungkapkan, meminta, menolak dengan benar) Hasil : Pasien dianjurkan untuk tidak mudah terpancing emosi serta mengontrol pk nya dengan cara mengungkapkan kekesalan atau curhat dengan orang terdekat, meminta bantuan orang terdekat untuk menenangkan, serta menolak perasaan emosi yang muncul.</p> <p>3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat dan verbal Hasil : Latihan telah dimasukkan ke jadwal harian.</p>	<p>Selasa, 31 Januari 2023/12.00 WITA</p> <p>S : Pasien mengatakan akan mencoba mengungkapkan perasaannya, meminta pertolongan, dan menolak tindakan kekerasan apabila ada keinginan untuk memukul O : Pasien banyak tersenyum dan terkesan ramah, pasien menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif A : Risiko Perilaku Kekerasan P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan fisi, obat, dan verbal. Beri pujian 2. Latih cara mengontrol spiritual (2 kegiatan) 3. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, verbal dan spiritual</p>
		<p>Rabu, 01 Februari 2023/ 10.50 WITA Tindakan Keperawatan IV SP IV Pasien</p> <p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan fisik, obat, dan verbal. Beri pujian Hasil : Pasien mengatakan masih mengingat latihan yang telah diberikan</p> <p>2. Melatih cara mengontrol spiritual (2 kegiatan)</p>	<p>Rabu, 01 Februari 2023/ 12.00 WITA</p> <p>S : Pasien mengatakan akan berusaha untuk rajin beribadah O : Pasien sangat kooperatif dan menyimak dengan baik terkait apa yang telah dijelaskan A : Risiko Perilaku Kekerasan P : Lanjutkan Intervensi</p> <p>1. Evaluasi kegiatan latihan fisik 1, 2,</p>

		<p>Hasil : Pasien mengatakan beragama, pasien mengatakan akan mencoba beribadah di dalam ruangan dan melakukan doa</p> <p>3. Memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, verbal dan spiritual</p> <p>Hasil : Latihan telah ditambahkan kedalam jadwal kegiatan harian</p>	<p>obat, verbal, dan spiritual. Beri pujian</p> <p>2. Nilai kemampuan yang telah mandiri</p> <p>3. Nilai apakah PK terkontrol</p>
		<p>Jum'at, 03 Februari 2023/ 11.00 WITA</p> <p>Tindakan Keperawatan V</p> <p>1. Mengevaluasi kegiatan latihan fisik 1, 2, obat, verbal, dan spiritual. Beri pujian</p> <p>Hasil : Pasien mengatakan masih mengingat apa saja latihan yang telah diberikan</p> <p>2. Menilai kemampuan yang telah mandiri</p> <p>Hasil : Pasien telah mandiri dalam melatih mengontrol pk secara fisik dan verbal, pasien teratur minum obat dengan bantuan petugas untuk menyediakan obatnya, pasien juga sudah mencoba beribadah dengan melakukan doa dan sholat</p> <p>3. Menilai apakah PK terkontrol</p> <p>Hasil : Pasien sudah tidak pernah menampakkan adanya emosi</p>	<p>Jum'at, 03 Februari 2023/ 12.00 WITA</p> <p>S : Pasien menyatakan tidak ingin lagi berbuat kesalahan yang sama dan ingin berubah menjadi lebih baik</p> <p>O : Pasien nampak tenang dan banyak tersenyum ramah</p> <p>A : Risiko Perilaku Kekerasan</p> <p>P : Pertahankan Intervensi</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Pada tanggal 5 Januari 2023 seorang laki-laki usia 27 tahun dengan tinggi badan 170 Cm diantar oleh keluarga ke RSKD Dadi untuk kelima kalinya. Pasien sudah berulang kali masuk RSKD Dadi karena salah satu factor penyebabnya yaitu pasien tidak rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan sebelumnya. Menurut (Kaunang, Kalilie, & Kallo, 2015) kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia perlu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, karena keluarga merupakan orang terdekat dengan penderita skizofrenia. Skizofrenia biasanya sukar mengikuti aturan minum obat karena adanya realitas dan ketidakmampuan mengambil keputusan. Sehingga jika terjadi kekambuhan makan pasien akan berperilaku anarkis atau lebih dari itu bisa saja melukai dan mengancam diri sendiri dan orang lain yang berada di sekitar lingkungannya.

Pada tanggal 24 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan fisik pada klien dimana hasilnya Tekanan Darah: 110/80 mmHg, Nadi : 84x/menit, Suhu: 36°C, Pernafasan : 20x/menit, kondisi klien pada saat pengkajian Klien mengatakan kadang masih mendengar suar bisikan perempuan yang memerintahnya untuk mengamuk dan saat mendengar suara itu klien ada

keinginan untuk mengamuk, gelisah, mondar-mandir sekeliling terutama pada malam hari, berbicara sendiri, dan memukul ayahnya. Menurut (Kurniawan, Kumalasari, & Fahrany, 2020) salah satu tanda dan gejala halusinasi yaitu bicara sendiri dan mendengar suara, serta ketakutan.

Hasil pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesamaan teori dengan perilaku maladaptive tentang gangguan halusinasi, yang dimana halusinasi merupakan kondisi terjadinya respon yang tidak sesuai pada seseorang yang berada pada rentan respon neurologis. Pemikiran respon pada halusinasi akan mengakibatkan maladaptive yang biasanya dapat menyebabkan penderita mendengar suara bunyi, dan perintah untuk melukai dirinya sendiri maupun orang lain (Akbar, 2021)

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai individu, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan merupakan dasar dalam penyusunan rencana tindakan asuhan keperawatan, sangat perlu untuk didokumentasikan dengan baik. Diagnosis keperawatan pada kasus Tn. H dari hasil pengkajian terhadap pasien didapatkan 2 masalah keperawatan yang dapat diangkat yaitu:

a. Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran

Gangguan persepsi sensori adalah suatu keadaan yang terjadi dalam diri seseorang yang mengalami perubahan bentuk dan jumlah

rangsangan yang datang dari luar sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan persepsi sensori: halusinasi. Salah satu gangguan persepsi sensori yaitu halusinasi pendengaran, dimana pasien akan mengalami adanya perubahan pada persepsi dan sering mendengar suara bisikan palsu atau tidak nyata dan tidak ada wujudnya (Azizah & Astuti, 2022).

Menurut Sutejo (2019), tanda gejala halusinasi pendengaran diantaranya mendengar suara atau kebisingan, paling sering suara orang. Suara berbentuk kebisingan yang kurang jelas sampai kata-kata yang jelas berbicara tentang pasien, bahkan sampai pada percakapan lengkap antara dua orang yang mengalami halusinasi. Pikiran yang terdengar dimana pasien mendengar perkataan bahwa pasien disuruh untuk melakukan sesuatu kadang dapat membahayakan (Pratiwi & Rahmawati, 2022).

Hasil pengkajian yang telah dilakukan terhadap pasien, ditemukan data subjektif bahwa pasien mengatakan mendengar suara bisikan perempuan mengatakan untuk mengamuk, pasien mengatakan suara itu muncul saat malam hari dan tidak tampak gelisah. Berdasarkan data yang diperoleh dari pasien, didapatkan beberapa perilaku tanda dan gejala pasien sesuai dengan teori Wijayanti (2019), disebutkan beberapa perilaku tanda dan gejala pasien yang mengalami halusinasi pendengaran yaitu berbicara sendiri, senyum

sendiri, ketawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa suara, pergerakan mata yang cepat, respon verbal yang lambat menarik diri dari orang lain, berusaha menghindar dari orang lain, tidak dapat membedakan yang nyata dan tidak nyata, mudah tersinggung, jengkel dan marah dan gelisah. Pasien merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada. Pasien gangguan jiwa mengalami perubahan dalam hal orientasi realitas (Yusuf & Nihayati, 2015).

b. Risiko Perilaku Kekerasan

Risiko perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang berisiko melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan gaduh gelisah tak terkontrol (Amimi et al., 2020). Menurut Muhith (2015), perawat dapat mengidentifikasi dan mengobservasi tanda dan gejala perilaku kekerasan yaitu muka merah dan tegang, mata melotot/ pandangan tajam, mengepalkan tangan, mengatupkan rahang dengan kuat, Bicara kasar Suara tinggi, menjerit atau berteriak, mengancam secara verbal dan fisik, melempar atau memukul benda/orang lain, merusak barang atau benda, tidak mempunyai kemampuan mencegah/mengontrol perilaku kekerasan.

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (2017), terdapat 2 tanda dan gejala yaitu mayor dan minor pada pasien perilaku

kekerasan, mayor subjektif : mengancam, mengumpat dengan kata-kata kasar, suara keras, bicara ketus, objektifnya : menyerang orang lain, melukai diri sendiri/orang lain, merusak lingkungan, perilaku agresif/amuk, sedangkan minornya yaitu objektif : mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengempal, rahang mengatup, wajah memerah, postur tubuh kaku. Hal ini sejalan dengan data pengkajian yang ditemukan pada pasien, dimana data subjektifnya yaitu pasien mengatakan kadang masih ada keinginan untuk mengamuk saat mendengar suara bisikan perempuan tersebut. Pasien mengatakan pernah memukul ayahnya. Sedangkan data objektif yang ditemukan pada pasien yaitu pasien tampak sering mondar-mandir di ruangan, saat pembicaraan pasien tampak berbicara dengan cepat dan dengan suara keras.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada pasien jiwa umumnya berbeda dengan pasien lainnya. Dimana untuk rencana tindakan pada kasus jiwa dapat dilakukan melalui pemberian Strategi Pelaksanaan (SP) 1 sampai dengan 5. Pada masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan terdapat 5 strategi pelaksanaan yang terdiri dari :

- a. Gangguan Persepsi Sensori : Halusinasi Pendengaran

Selanjutnya pada masalah keperawatan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran juga terdapat 5 strategi pelaksanaan yang

terdiri dari : Strategi pelaksanaan 1, bina hubungan saling percaya dengan tujuan umum karena hubungan yang terjalin dengan baik dapat memudahkan selama interaksi berlangsung sehingga pasien mampu mengenal halusinasi. Percaya merupakan dasar untuk kelancaran hubungan interaksi selanjutnya. Mengenal halusinasi memungkinkan pasien untuk menghindarkan faktor pencetus timbulnya halusinasi, dilanjutkan dengan upaya untuk memutuskan siklus halusinasi sehingga halusinasi tidak berkelanjutan dengan cara menghardik. Teknik menghardik dalam dapat mengontrol dan membantu menurunkan tanda dan gejala halusinasi. Hasil yang didapatkan yaitu teknik menghardik sangat efektif untuk mengontrol dan menurunkan tanda dan gejala halusinasi menurut (Anggraini, 2018)

Strategi pelaksanaan 2, tujuan umum pasien mampu mengontrol halusinasi dengan 5 benar minum obat. Kriteria hasil yang diharapkan pasien mampu mengulang dan menyebutkan SP1, Bimbing pasien untuk menerapkan 5 benar minum obat. Pada pasien dengan gangguan jiwa konsumsi obat-obatan yang dianjurkan dokter memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi pasien seperti obat yang dikonsumsi oleh pasien diatas yaitu obat risperidon yang merupakan obat golongan antipsikotik generasi kedua atau antipsikotik atipikal, obat ini biasanya digunakan untuk

mengatasi kondisi seperti skizofrenia, gangguan skizoafektif atau bipolar, obat ini dapat membantu memperbaiki keseimbangan senyawa kimia tertentu dalam otak (Cecilia, 2017). Adapun obat clozapine yang dikonsumsi oleh pasien yaitu obat psikotropika golongan IV yang merupakan obat-obatan dengan dosis tinggi namun dapat memberikan efek penenang karena zat tersebut menekan kerja system saraf pusat (Humas BNN, 2019). Ajarkan pasien mengontrol halusinasi dengan 5 benar minum obat, dengan tujuan umum pasien mampu mengontrol halusinasi dengan penggunaan obat. Ingatkan cara menghardik halusinasi. Lakukan kontrak waktu dan tempat, evaluasi SP2.

Strategi pelaksanaan 3, tujuan umum pasien mampu mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Kriteria hasil yang diharapkan pasien mampu mengulang SP1 dan SP2. Ajarkan cara mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap sehingga dapat mencegah munculnya halusinasi. Ketika pasien bercakap-cakap dengan orang lain maka fokus pasien akan beralih dari yang semula halusinasi ke percakapan. Tujuan dari intervensi ini yaitu mengalihkan pasien dari halusinasinya sehingga pasien berfikir realita dengan cara melakukan kegiatan terstruktur makan sangat berpotensi untuk sembuh (Suhermi, 2021). Ingatkan cara menghardik dan 5 benar minum obat. Lakukan kontrak waktu dan tempat, evaluasi SP3.

Strategi pelaksanaan 4, tujuan umum pasien mampu mengontrol halusinasi dengan kegiatan yang disukai atau kegiatan yang positif. Kriteria hasil yang diharapkan pasien mampu mengulang SP1, SP2 dan SP3. Ajarkan cara mengontrol halusinasi dengan kegiatan yang disukai atau kegiatan positif. Ingatkan pasien mengontrol halusinasi dengan menghardik, 5 benar minum obat dan bercakap-cakap. Masukkan kegiatan pasien ke jadwal harian.

Strategi pelaksanaan 5, tujuan umum mengevaluasi apakah pasien dapat mengetahui kemampuan yang di miliki. Kriteria hasil yang diharapkan pasien dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kemampuan tanpa membatasinya. Evaluasi kegiatan latihan menghardik, minum obat, bercakap-cakap dan kegiatan harian, latih kegiatan harian, nilai kemampuan yang telah mandiri, dan nilai apakah halusinasi terkontrol.

b. Risiko Perilaku Kekerasan

Pada masalah keperawatan risiko perilaku kekerasan terdapat 5 strategi pelaksanaan yang terdiri dari : Strategi pelaksanaan 1, bina hubungan saling percaya dengan tujuan umum pasien dapat mengidentifikasi perilaku kekerasannya. Kriteria hasil yang diharapkan pasien menceritakan penyebab, tanda, gejala (seperti perasaan marah, mata merah, tangan mengepal, ekspresi tegang dan lain-lain) dan mengetahui akibat serta perilaku

kekerasan yang dilakukan perilaku kekerasannya. Pasien dapat menyebutkan cara-cara sehat mengungkapkan kemarahan. Adapun tindakan yang diberikan meliputi : Identifikasi penyebab, tanda & gejala, PK yang dilakukan, akibat PK. Jelaskan cara mengontrol PK: fisik, obat, verbal, spiritual. Latihan cara mengontrol PK secara fisik: tarik nafas dalam dan pukul kasur dan bantal. Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik .

Strategi pelaksanaan 2, tujuan umum pasien dapat mencegah perilaku kekerasan. Kriteria hasil yang diharapkan pasien dapat mengetahui tujuan pengobatan dan pasien dapat menyebutkan dosis obat. Tindakan keperawatan yang diberikan meliputi evaluasi kegiatan latihan fisik. Beri pujian. Latih cara mengontrol PK dengan obat (jelaskan 6 benar: jenis, guna, dosis, frekuensi, cara, kontinuitas minum obat). Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik dan minum obat.

Strategi pelaksanaan 3, tujuan umum pasien dapat mengontrol perilaku kekerasan. Kriteria hasil yang diharapkan pasien rutin dan disiplin minum obat dan pasien menyebutkan cara positif mengekspresikan marah. Tindakan keperawatan yang diberikan meliputi evaluasi kegiatan latihan fisik dan obat. Beri pujian. Latih cara mengontrol PK secara verbal (3 cara, yaitu:

mengungkapkan, meminta, menolak dengan benar). Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat dan verbal.

Strategi pelaksanaan 4, tujuan umum pasien dapat mengontrol perilaku marah. Kriteria hasil yang diharapkan pasien dapat menyebutkan cara positif mengungkapkan marah dan pasien dapat beribadah secara mandiri. Tindakan keperawatan yang diberikan meliputi evaluasi kegiatan latihan fisik, obat, dan verbal. Beri pujian. Latih cara mengontrol spiritual (2 kegiatan). Masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, verbal dan spiritual.

Strategi pelaksanaan 5, tujuan umum mengevaluasi pasien dapat mengendalikan emosi secara mandiri. Kriteria hasil yang diharapkan pasien dapat menyebutkan cara positif mengungkapkan marah. Tindakan keperawatan yang diberikan meliputi evaluasi kegiatan latihan fisik 1, 2, obat, verbal, dan spiritual. Beri pujian. Nilai kemampuan yang telah mandiri, kemudian nilai apakah PK terkontrol.

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi pada Tn. H diberikan selama 2 minggu, 1 minggu untuk implementasi halusinasi dan minggu kedua untuk implementasi risiko perilaku kekerasan. intervensi yang telah disusun yaitu memberikan strategi pelaksanaan untuk diagnosis halusinasi untuk hari pertama klien

diajarkan untuk menghardik suara yang didengarnya, Menghardik halusinasi dilakukan pada pasien dengan cara dilatih untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau tidak memperdulikan halusinasinya. pasien akan mampu mengendalikan diri dan tidak mengikuti halusinasi yang muncul. Mungkin halusinasi tetap ada namun dengan kemampuan ini pasien tidak akan larut untuk menuruti apa yang ada dalam halusinasinya.

Untuk hari kedua klien diajarkan teratur minum obat yang tepat, Ketidapatuhan terhadap minum obat merupakan masalah utama dalam pengobatan dan menyebabkan kekambuhan, sehingga memicu munculnya gejala positif dan negatif skizofrenia. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidapatuhan dalam minum obat yaitu kurang pahamiannya pasien tentang tujuan pengobatan, tidak mengertinya tentang pentingnya mengikuti aturan pengobatan yang di tetapkan sehubungan dengan prognosisnya, sukarnya memperoleh obat diluar rumah sakit, mahalnnya harga obat, dan kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga yang mungkin bertanggung jawab atas pembelian atau pemberian obat itu kepada pasien.

Untuk hari ketiga klien dianjurkan untuk sering-sering bercakap dengan temannya, Salah satu contoh cara mengontrol yang pernah digunakan untuk pasien halusinasi pendengaran adalah dengan cara bercakap cakap. Bercakap-cakap dengan orang lain dapat membantu mengontrol halusinasi, ketika pasien bercakap-cakap dengan orang lain

terjadi distraksi, fokus perhatian pasien akan beralih dari halusinasi ke percakapan yang dilakukan dengan orang lain. Melakukan aktivitas yang terjadwal untuk mengurangi risiko halusinasi muncul lagi adalah dengan menyibukkan diri melakukan aktivitas yang teratur. Hal ini sesuai dengan teori yosep yang telah disebutkan diatas, bahwa terapi individu bercakap-cakap ini akan terjadi distraksi dan fokus perhatian pasien akan beralih dari halusinasi kepercakapan.

Untuk hari keempat klien diajarkan untuk melakukan kegiatan dalam mengontrol halusinasinya dengan cara di anjurkan untuk melakukan terapi menggambar, yang dimana dalam penelitian (Firmawati, Syamsuddin, & Botutihe, 2023) mengatakan adanya pengaruh yang sangat signifikan pemberian terapi okupasi aktivitas menggambar terhadap perubahan halusinasi pada pasien skizofrenia. Pada pelaksanaan terapi menggambar ini, setelah pasien selesai menggambar peneliti menginstruksikan kepada pasien untuk menjelaskan makna dari gambarnya dan pasien menjelaskan bahwa gambarnya menunjukkan apa yang dia rasakan saat ini dan setelah itu pasien diberikan *reinforcement positive* melalui pujian pada pasien yang telah berhasil responden lakukan seperti melakukan terapi menggambar saat ada waktu luang. (Firmawati, Syamsuddin, & Botutihe, 2023) mengatakan dengan terapi menggambar pasien dapat bercerita, mengeluarkan pikiran, perasaan dan emosi yang

sulit di ungkapkan sehingga dapat memperbaiki pikiran pasien yang biasanya kacau.

Sedangkan untuk diagnosis RPK implementasi dilaksanakan selama 5 hari yaitu pada hari pertama mengajarkan cara mengontrol marah dengan cara tarik napas, bentuk latihan relaksasi berupa latihan relaksasi nafas dalam, latihan ini dilakukan untuk mengontrol marah. Latihan ini juga bisa mengendurkan jiwa yang tegang, hasil dan prosesnya akan maksimal jika dilakukan dalam kondisi dan situasi yang relaks. Terapi relaksasi ini bersifat olah nafas dengan mengatur aktivitas nafas. Latihan relaksasi pernafasan dilakukan dengan cara mengatur pola pernafasan secara tempo, irama dan ritme yang lebih lambat dan dalam. Keteraturan dalam bernafas berefek pada sikap mental dan badan yang relaks selanjutnya menyebabkan otot lentur dan dapat menerima situasi luapan emosi tanpa membuatnya kaku.

Untuk hari kedua klien diajarkan untuk mengkonsumsi obatnya secara teratur dengan berpatokan pada 6 langkah minum obat dengan benar, menurut (Mahfudhah & Mayasari, 2018) Pemberian obat merupakan salah satu prosedur yang paling sering dilakukan oleh perawat dengan menggunakan prinsip 7 benar yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar cara pemberian, benar dokumentasi dan benar informasi.

Kepatuhan minum obat dari pasien skizofrenia tidak lepas dari peranan penting dari keluarga, sehingga pasien yang patuh pada pengobatan prevalensi kekambuhannya berkurang, maka pasien tidak akan dirawat lagi di rumah sakit, dan hanya perlu melakukan rawat jalan di poliklinik. Walaupun skizofrenia adalah suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol dengan terapi farmakologi dan psikoterapi. Hal ini berarti dengan pengobatan yang tertaur dan dukungna dari keluarga, masyarakat dan orang disekitar klien besar kemungkinan klien dapat bersosialisasi dan memiliki aktivitas seperti orang normal, dengan demikian maka prevalensi kekambuhan pasien dapat berkurang ataupun pasien tidak akan kambuh karena proses pengobatan pasien dilakukan sesuai dengan anjuran dan petunjuk dokter, sehingga kepatuhan pasien minum obat baik, dan prevalensi kekambuhan pasien berkurang bahkan tidak pernah kambuh dalam kurun waktu 1-2 tahun.

Untuk hari ketiga klien diajarkan untuk bercakap dengan teman dan mengungkapkan emosi secara verbal tanpa ada sentuhan fisik, implementasi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Makhruzah et al., 2021) mengenai salah satu cara mengontrol perilaku kekerasan dengan cara verbal yaitu: menceritakan perilaku kekerasan, bicara baik (meminta, menolak dan mengungkapkan perasaan),

Pada hari ke empat klien diajarkan beribadah di dalam ruangan dan melakukan doa, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sujarwo & PH, 2019) yang menjelaskan bahwa pendekatan Spiritual dan Napas Dalama dapat memberikan efek menenangkan dan merelaksasi pikiran , sehingga klien dapat mengontrol emosinya. Dan pada hari ke lima mengevaluasi semua kegiatan yang telah diajarkan

5. Evaluasi Keperawatan

a. Evaluasi Formatif

1) Halusinasi

Untuk Diagnosis Halusinasi pada awal pengkajian di peroleh data bahwa pasien mengalami halusinasi pendengaran yang dialaminya, pasien sering mendengar suara bisikan perempuan yang menyuruhnya untuk mengamuk. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasien mampu melakukan cara untuk mengontrol halusinasinya yaitu dengan menghardik, namun pasien mengatakan masih sering mendengar suara tersebut. Evaluasi hari kedua menunjukkan bahwa pasien mampu mengingat obat yang dijelaskan dan mengatakan sudah minum obatnya dengan rutin. Evaluasi hari ke 3 didapatkan hasil pasien mampu untuk bercakap-cakap dengan temannya sehingga mengalihkan perhatian jika suara itu muncul, pasien mengatakan sudah tidak lagi mendengarkan bisikan yang biasa muncul, pada

evaluasi hari keempat klien mampu melakukan terapi menggambar untuk suatu kegiatan dalam mengontrol halusinasi yang dialami.

2) Risiko perilaku kekerasan

Untuk Diagnosis risiko perilaku kekerasan pada awal pengkajian di peroleh data bahwa pasien mengalami perilaku kekerasan akibat halusinasi pendengaran yang dialaminya. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pasien mampu melakukan teknik untuk mengontrol emosi dengan melakukan teknik napas dalam, namun pasien belum mampu mengontrol emosinya. Evaluasi hari kedua menunjukkan bahwa pasien mampu mengingat obat yang dijelaskan dan mengatakan sudah minum obatnya dengan rutin. Evaluasi hari ke 3 didapatkan hasil pasien mampu untuk mengungkapkan perasaan dan Nampak pasien mulai tersenyum ramah dan menunjukkan perubahan perilaku positif. Evaluasi hari ke 4 pasien mampu untuk berdoa dan kooperatif saat di berikan intervensi, pasien juga Nampak mulai bisa mengendalikan emosinya. Evaluasi hari ke 5 pasien mampu mengingat semua yang telah di berikan dan Nampak mampu mengendalikan emosinya.

b. Evaluasi Sumatif

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. H selama 2 minggu dimulai dari 24 Januari 2023- 03 Februari 2023 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun, dengan masalah halusinasi dan risiko perilaku kekerasan, Evaluasi dilakukan setiap hari. Dalam proses pelaksanaan evaluasi yang dilakukan selama 1 minggu, untuk masalah halusinasi pendengaran klien telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana saat sebelum diberikan intervensi : isi halusinasinya pasien sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk mengamuk sehingga klien mengamuk, dan berbicara sendiri, marah-marah, khawatir, afek datar, kewaspadaan meningkat, perilaku mengikuti isi halusinasinya, tidak dapat memulai pembicaraan, dan tidak dapat mempertahankan kontak mata. Setelah dilakukan intervensi, didapatkan hasil bahwa halusinasi pendengaran yang dialami pasien sudah membaik dengan menggunakan lembar evaluasi pada pasien halusinasi, Pasien mengatakan kadang masih mendengar suara bisikan yang biasa didengarkan, pasien sudah merasa tidak terganggu, perilaku tidak mengikuti isi halusinasinya, tidak marah-marah, tidak khawatir, afek tidak datar, kewaspadaan menurun, mampu memulai pembicaraan, mampu mempertahankan kontak mata dan tidak berbicara sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmawati, Syamsuddin, & Botutihe (2023)

mengatakan terjadi penurunan tanda dan gejala halusinasi seperti tersenyum sendiri, bicara sendiri, mendengarkan suara yang mengajaknya bercakap-cakap dan menyuruhnya melakukan sesuatu yang membahayakan. Hal ini disebabkan karena dengan aktivitas menggambar pasien dapat bercerita, mengeluarkan pikiran, perasaan dan emosi yang biasanya sulit untuk diungkapkan, sehingga dengan aktivitas menggambar dapat memberinya motivasi dan hiburan untuk memperbaiki pikiran yang biasanya kacau serta meningkatkan aktivitas motoric. Sehingga untuk pelaksanaan intervensi terapi menggambar ini peneliti meminta kepada perawat yang ada dalam ruangan untuk membantu dalam menerapkan terapi menggambar ini pada pasien khususnya pada Tn.H untuk mempertahankan efek dari terapi menggambar yang telah diberikan peneliti.

Sedangkan untuk masalah risiko perilaku kekerasan menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana diawal pengkajian pasien mengatakan Pasien pernah memukul ibunya, memecahkan kaca jendela tetangganya, serta pernah merusak kaca mobil tetangganya dengan kayu, serta sulit mengontrol emosinya. namun setelah di berikan intervensi pasien mampu menjawab dengan kooperatif dan pasien menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif. Sehingga untuk maslaah risiko perilaku kekerasan sudah teratasi namun pasien

masih membutuhkan pengontrolan untuk memaksimalkan intervensi yang telah diberikan.

B. Analisis Intervensi (EBPN)

Selain melakukan kegiatan harian yang terdapat pada strategi keempat yang biasa dilakukan seperti menyapu dan mengepel, terdapat juga kegiatan menggambar yang bisa dilakukan untuk mengontrol halusinasi. Yang dimana ketika pasien melakukan terapi menggambar ini maka kemampuan pasien meningkat dalam mengontrol halusinasinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujia, Warni & Fikrinas (2022) yang menjelaskan bahwa terapi okupasi menggambar ini dapat efektif dilakukan dalam upaya mengendalikan tanda dan gejala halusinasi pendengaran yang dirasakan oleh responden. Terapi aktivitas menggambar ini terbukti dapat merubah tingkat halusinasi, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu terapi modalitas bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa khususnya dengan masalah keperawatan halusinasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana, Dewi, & Fitri (2023) yang menyatakan jika terapi menggambar pada pasien halusinasi dengar dapat mengurangi tanda dan gejala halusinasi dan menurunkan tingkat halusinasi. Dari hasil penelitian Firmawati, Syamsuddin, & Botutihe (2023) juga diperoleh bahwa setelah dilakukan terapi okupasi menggambar yang dilakukan selama 2 kali pertemuan, didapatkan terjadi perubahan tanda dan gejala halusinasi pada

pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi. Hal ini dikarenakan setelah diberikan terapi okupasi menggambar, terjadi penurunan tanda dan gejala halusinasi pada pasien diantaranya pasien yang tersenyum dan tertawa sendiri, berbicara sendiri berkurang, mendengar suara yang mengajaknya bercakap-cakap dan menyuruhnya melakukan sesuatu berbahaya berkurang, tatapan mata pasien pada tempat tertentu berkurang, menunjuk-nunjuk arah tertentu berkurang, tatapan mata pasien pada tempat tertentu berkurang.

Dengan terapi menggambar yang diterapkan oleh beberapa peneliti diatas dapat disimpulkan jika terapi menggambar dapat efektif dilakukan untuk mengontrol dan mengurangi tanda dan gejala halusinasi pendengaran dengan menganjurkan pasien untuk melakukan kegiatan yang positif lainnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Selama pemberian intervensi terapi menggambar pada pasien terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya yang dimana pasien tidak rutin melakukan kegiatan menggambar yang telah disepakati yaitu selama 7 hari karena pasien mengatakan jika buku yang diberikan oleh peneliti kadang dipinjam oleh pasien lainnya sehingga pasien tidak melakukan kegiatan yang telah dianjurkan dan hanya melakukan 3 kali terapi menggambar ini. Namun, meskipun terapi menggambar tidak rutin dilakukan sesuai jadwal yang telah diberikan terdapat perubahan terhadap tanda dan gejala halusinasi pada pasien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan oleh pasien halusinasi pendengaran sesuai intervensi yang telah diberikan yaitu terapi menggambar, maka dapat disimpulkan yaitu :

1. Hasil pengkajian asuhan keperawatan pada tn.H dengan halusinasi pendengaran yaitu pasien mengatakan sering mendengar suara bisikan perempuan yang menyuruhnya untuk mengamuk, suara itu paling sering terdengar saat malam hari dengan durasi 1-2 menit. Sebelumnya pasien sudah 5 kali masuk RSKD Dadi Makassar dengan gangguan halusinasi dikarenakan pasien tidak rutin meminum obatnya.
2. Diagnosis keperawatan yang didapatkan setelah dilakukan anamnesia yaitu gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran dan risiko perilaku kekerasan.
3. Setelah diberikan intervensi mengenai asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan terapi menggambar untuk mengontrol halusinasi peendengaran yang dialami oleh pasien.
4. Implementasi hasil asuhan keperawatan dengan halusinasi pendengaran menggunakan terapi menggambar yang dilakukan selama 2 minggu, yaitu 1 minggu untuk terapi menggambar dan 1

minggu untuk terapi menghardik efektif untuk menurunkan dan mengontrol halusinasi yang dialami oleh pasien.

5. Evaluasi pada pasien halusinasi pendengaran yaitu terapi menggambar mampu menurunkan tanda dan gejala serta meningkatkan kemampuan mengontrol halusinasi yang dialami oleh pasien.
6. Hasil analisis intervensi terapi menggambar terbukti dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap penurunan tanda dan gejala serta meningkatkan kemampuan pasien dalam mengontrol halusinasinya.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus pemberian terapi menggambar pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran diharapkan saran serta kritikan sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan hasil penelitian ini:

2. Bagi mahasiswa

Terapi menggambar dapat menurunkan serta mengontrol halusinasi pada penderita skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi. Sehingga diharapkan kepada para mahasiswa atau pembaca dapat mengetahui cara untuk mengontrol halusinasi pada penderitanya.

3. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang salah satu terapi non farmakologi yaitu terapi menggambar dan menghardik untuk menurunkan dan mengontrol halusinasi pada pasien dengan skizofrenia masalah keperawatan halusinasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan dan mengembangkan penelitian mengenai pengaruh terapi menggambar dan menghardik dalam mengontrol halusinasi pada pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan halusinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, & Rahayu AD. (2021). Terapi Psikoreligius: Dzikir Pada Pasien Halusinasi Pendengaran. Universitas Muhammadiyah Semarang: Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Ilmu Keperawatan Dan Kesehatan.
- Aliffatunnisa, F., & Apriliyani, I. (2022). Strategi Pelaksanaan Mengenal dan Menghardik Halusinasi Pasien Skizofrenia dengan Halusinasi Pendengaran. *Jurnal Keperawatan Merdeka*, 164-168.
- Andri, J., Febriawati, H., Panzilion, Sari, S. N., & Utama, D. A. (2019). Implementasi Keperawatan Dengan Pengendalian Diri Klien Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Kesma Asclepius*, 146-155.
- Amimi, R., Malfasari, E., Febrina, R., & Maulinda, D. (2020). Analisis Tanda Dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*, 3(1), 65–74.
- Atmojo, B. S., & Rohayati. (2022). Literature Review: Penerapan Teknik Menghardik pada Klien yang Mengalami Skizofrenia dengan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi. *Nursing Science Journal*, 43-56.
- Azizah, A. N., & Astuti, A. P. (2022). Pengelolaan Gangguan Persepsi Sensori: Halusinasi Pendengaran Dengan Severe Depressive Episode With Psychotic Symptoms. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 4(2), 261–269.
- Cecilia, I. (2017, September 5). *Cara Menghilangkan Efek Obat Antipsikotik*. Retrieved Juli 11, 2023, from Alodokter: <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/bagaimana-cara-menghilangkan-efek-risperidone#:~:text=Risperidone%20adalah%20obat%20dari%20golongan,%2C%20gangguan%20skizoafektif%2C%20atau%20bipolar>
- Endriyani, S., Kusumawaty, I., Pastari, M., & Umayu, W. (2022). Implementasi Keperawatan Mengontrol Halusinasi dengan Menghardik. *Jurnal Nursing Update*, 83-86.
- Firmawati, Syamsuddin, F., & Botutihe, R. (2023). Terapi Okupasi Menggambar Terhadap Perubahan Tanda dan Gejala Halusinasi Pada Pasien Dengan

Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Di RSUD Tombulilato. *Jurnal Medika Nusantara*, 15-24.

Gasril, Pratiwi, Suryani, & Sasmita, H. (2020). Pengaruh Terapi Psikoreligius: Dzikir Dalam Mengontrol Halusinasi Pendengaran pada Pasien Skizofrenia yang Muslim di Rumah Sakit Jiwa Tampung Provinsi Riau. *JIUBJ*, 21-26.

HumaS BNN. (2019, Januari 2). *Apa Itu Psikotropika dan Bahayanya*. Retrieved Juli 11, 2023, from Badan Narkotika Nasional: <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/#:~:text=Adapun%20contoh%20dari%20golongan%204,yang%20totalnya%20ada%2060%20jenis.&text=Funcsi%20tubuh%20akan%20bekerja%20lebih%20tinggi%20dan%20bergairah%20sehingga%20pemakainya%20l ebih%20terjaga>

Kamariyah, & Yuliana. (2021). Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori: Menggambar Terhadap Perubahan Tingkat Halusinasi pada Pasien Halusinasi di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 511-514.

Kaunang, I., Kanine, E., & Kallo, V. (2015). Hubungan Kepatuhan Minum Obat dengan Prevalensi Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia yang Berobat Jalan di Ruang Poliklinik Jiwa Rumah Sakit Prof Dr. V.L Ratumbuang Manado. *Jurnal Keperawatan*, 1-7.

Keliat, B. A., Hamid, A. Y., Putri, Y. S., Daulima, N. H., Wardani, I. Y., Susanti, H., et al. (2019). *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.

Kurniawan, D., Kumalasari, G., & Fahrany, F. (2020). *Keperawatan Jiwa Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.

Laila, N. S., Susanto, W. H., Yunike, Kusumawaty, I., Alifiani, H., Agustini, M., et al. (2022). *Keperawatan Jiwa*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

Lilik M, Azizah, dkk. (2016). 'Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa -Teori dan Aplikasi Praktik Klinik'. Yogyakarta : Indomedia Pustaka

Ma'rifatul, A., & dkk. (2016). Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: indomedia pustaka.

- Muhith, A. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi)* (M. Bendetu, Ed.). CV Andi Offset.
- Nafisa, A., Hardani, A. R., & Hertinjung, W. S. (2023). Terapi Aktivitas Kelompok: Menghardik Halusinasi pada Pasien Skizofrenia RSJ Prof. Dr Soerojo Magelang. *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, 19-33.
- Nurhalimah. (2016). *Keperawatan Jiwa*. Jakarta
- Pambayun, Ahlul H. 2015. Asuhan Keperawatan Jiwa pada Ny.S Dengan gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Pendengaran Ruang 11 (Larasati) RSJD Dr.Amino Gondohutomo Semarang. Asuhan Keperawatan Psikiatri Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang.
- Pardiansyah, A. (2020, April 6). *Tafsir Surat Al-Anbiya' Ayat 83: Kisah Penyakit Nabi Ayyub dan Kunci Menghadapi Musibah*. Dipetik Juni 14, 2023, dari islami.co: <https://islami.co/tafsir-surat-al-anbiya-ayat-83-kisah-penyakit-nbi-ayyub-dan-kunci-menghadapi-musibah/>
- Pradana, V. W., Dewi, N. R., & Fitri, N. L. (2023). Penerapan Terapi Okupasi Menggambar Terhadap Tanda dan Gejala Pasien Halusinasi Pendengaran di Ruang Kutilang RSJD Provinsi Lampung. *Jurnal Cendekia Muda*, 149-154.
- Pratiwi, A. D. I., & Rahmawati, A. N. (2022). Studi Kasus Penerapan Terapi Dzikir Pada Pasien Gangguan Persepsi Sensori (Halusinasi Pendengaran) Di Ruang Arjuna RSUD Banyumas. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 315–322.
- Samain, & Budihardjo. (2020). Konsep Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Adversity Quotient Perspektif Tfasir Al-Misbah . *Atta'dib Jurnal*, 18-29.
- Suhaimi. (2015). Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam. *Jurnal Risalah*, 197-205.
- Suhermi. (2021). Pengaruh Terapi Activity Daily Living Terhadap Pemulihan Pasien Halusinasi. *Jurnal Penelitian Kesehatan*, 54-57.

- Sujiah, Warni, H., & Fikrinas, A. (2023). The Effectiveness of Application of Drawing Activity Occupational Therapy Against Auditory Hallucination Symptoms. *Media Keperawatan Indonesia*, 83-91.
- Suryani, Y. (2023). *Defisit Pragmatik Tuturan Penderita Skizofrenia*. Jawa Tengah: CV. ZT Corpora.
- Wijayanti. (2019). Terapi Okupasi Aktivitas Waktu Luang Terhadap Perubahan Gejala Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Skizofrenia. *J Gema Keperawatan*, 7(1), 1–7.
- Wulandari, H., Chairiyah, R., Wulandari, N. K., Sya'bin, N., Perestroika, G. D., Susanti, N. Y., et al. (2022). *Asuhan Kebidanan Pada Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Rentan*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yanti, D. A., Sitepu, A. L., Sitepu, K., Pitriani, & Purba, W. N. (2020). Efektivitas Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pendengaran Pada Pasien Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem. *Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi*, 125-131.
- Yudhantara, D.S. & Istiqomah, R. (2016). 'Sinopsis Skizofrenia'. Malang : UB Press
- Yusalia, Refiazka. 2015. Laporan Pendahuluan Dan Strategi Pelaksanaan Halusinasi. www.academia.edu diakses Oktober 2016.
- Yusuf, A. P. R. F., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Salemba Medika.
- Zainurridha, Y. A. (2022). *Buku Ajar Falsafah Dan Teori Keperawatan*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Zelika, Alkhosiyah A., Dermawan, Deden. 2015. Kajian Asuhan Keperawatan Jiwa Halusinasi Pendengaran Pada Sdr.D Di Ruang Nakula Rsjd Surakarta. *Jurnal Profesi Vol.12, No.2*

RIWAYAT HIDUP



Penulis Karya Tulis Akhir dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Terapi Menggambar Pada Pasien Skizofrenia Dengan Halusinasi Pendengaran di RSKD Dadi Provinsi Sulawesi” bernama lengkap Muthmainnah, yang biasa di sapa Inna. Lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 1999. Merupakan anak ke dua dari delapan bersaudara, anak dari Bapak Rappe dan ibu Hajra. Pernah menempuh pendidikan pertama kali di TK Nurkhaliza pada tahun 2004-2005, selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Inpres Jongaya pada tahun 2006-2012, selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan menengah pertama di MTS Madani Alauddin Pao-Pao pada tahun 2013-2015, selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan menengah atas di MA Madani Alauddin Pao-Pao pada tahun 2015-2018, selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan strata 1 keperawatan di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018-2022. Kemudian karena adanya dukungan dan dorongan dari orang tua maka penulis melanjutkan pendidikan di Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis pernah aktif di organisasi internal kampus yaitu HMJ Keperawatan. Penulis memiliki motto hidup “istirahatlah jika lelah, menangislah jika ingin menangis, marahlah jika ingin marah, karena kita hanya manusia biasa yang tidak bisa menghindari dari perasaan itu, jadi hadapilah”

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR EVALUASI TANDA & GEJALA PADA PASIEN DENGAN HALUSINASI


Nama pasien :
Nama perawat :
Ruangan :

No	Aspek penilaian	Tanggal evaluasi						
		27/01	28/01	29/01	30/01	31/01	01/02	02/02
1	Mendengar suara-suara	✓	✓				✓	
2	Meihat bayangan atau sinar							
3	Menghidu bau-bauan							
4	Merasakan rasa pahit, asam, asin di lidah							
5	Merasakan sensasi tidak nyaman dikulit							
6	Ambivalen							
7	Tidak dapat memfokuskan pikiran							
8	Mudah lupa							
9	Tidak mampu mengambil keputusan							
10	Tidak mampu memecahkan masalah							
11	Tidak dapat berpikir							

	logis						
12	Inkoheren						
13	disorientasi						
14	Sirkumstansial						
15	Mendegar suara hati						
16	Blocking pikiran						
17	Daya tilik diri jelek						
Afektif							
18	Senang						
19	Sedih						
20	Merasa terganggu	✓	✓			×	
21	Marah-marah	✓	×			×	
22	Ketakutan						
23	Khawatir	✓	✓			×	
24	Curiga						
25	Afek datar/tumpul						
Fisiologis							
26	Sulit tidur						
27	Kewaspadaan meningkat	✓	×			×	
28	Tekanan darah meningkat						
29	Denyut nadi meningkat						
30	Frekuensi pernapasan meningkat						
31	Muka tegang						
32	Keringat dingin						

33	Pusing							
34	Keletihan/kelelahan							
Perilaku								
35	Bicara sendiri	✓	✓				×	
36	Tertawa sendiri							
37	Menyeringai							
38	Menggerakkan bibir/komat-kamit							
39	Diam sambil menikmati halusinasinya							
40	Perilaku menyerang							
41	Kurang mampu merawat diri							
42	Perilaku mengikuti isi halusinasinya	✓	✓				×	
43	Memalingkan muka kearah suara							
44	Menarik diri							
45	Penampilan tidak sesuai							
Sosial								
46	Tidak tertarik dengan kegiatan sehari-hari							
47	Tidak mampu berkomunikasi secara spontan							
48	Acuh terhadap							

	lingkungan							
49	Tidak dapat memulai pembicaraan							
50	Tidak dapat mempertahankan pembicaraan							
51	Tidak dapat mempertahankan kontak mata							



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran 2



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3

KTA MUTHMAINNAH 2

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	20% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	18% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

17%
★ repository.poltekkes-tjk.ac.id
Internet Source

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On