

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI, ANALGESIK DAN ANTIPIRETIK  
EKSTRAK METANOL BAGIAN-BAGIAN TANAMAN TOBO-TOBO  
(*Ficus septica* Burm F.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN

Oleh:

**MUH.MIFTAHUL ICHSAN**

**70100119018**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh.Miftahul Ichsan

Nim : 70100119018

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 28 Agustus 2001

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


Alamat : Jl.Goa Ria Ruko Regency Blok A No.4

Judul : Uji Aktivitas Antiinflamasi, Analgesik Dan Antipiretik  
Ekstrak Metanol Bagian-Bagian Tanaman Tobo-Tobo  
(*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Mencit (*Mus  
musculus*)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 30 Agustus 2023

Penulis



Muh.Miftahul Ichsan

NIM. 70100119018

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “*Uji Aktivitas Antiinflamasi, Analgesik Dan Antipiretik Ekstrak Metanol Bagian-Bagian Tanaman Tobo-Tobo (Ficus septica Burm F.) Terhadap Mencit (Mus musculus)*” yang disusun oleh Muh.Miftahul Ichsan, NIM: 70100119018, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi (*Munaqasyah*) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kdeokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 24 Agustus 2023 M  
8 Safar 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp,A.,M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Nursalam Hamzah, S.Si, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Khaerani, S. Farm., M. Farm.Klin.	(.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

  
Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes  
NIP : 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Uji Aktivitas Antiinflamasi, Analgesik Dan Antipiretik Ekstrak Metanol Bagian-Bagian Tanaman Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)” Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Namun berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang sangat berperan dan berjasa dalam hidup penulis yakni bapak saya Suriadi Amin, dan mama saya Sri Astuti Syahran, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis hanturkan untuk keluarga besar penulis, terkhususnya untuk saudara penulis adik Muh.Azhabul Kahfi, dan adik Muh.Ridhatul Atfal yang senantiasa memberikan do'a dan semangat serta motivasi.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak/ibu :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik..
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrinegara, SKM., MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Ibu apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Bapak apt. Nursalam Hamzah, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Ibu Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang juga berperan besar dalam mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi.
17. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Suriadi Amin, SE dan Ibunda apt. Sri Astuti Syahrani, S.Farm, serta adik penulis Muh.Azhabul Kahfi dan Muh.Ridhatul Atfal yang dengan segala pengorbanannya takkan pernah penulis lupakan. Doa restu, nasihat, kesabaran serta petunjuk dari mereka merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi


18. kelanjutan studi penulis hingga saat ini, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
19. Kepada tim penelitian ANGKER 8 terkhusus pada Bapak apt. Nursalam Hamzah, S.Si, M.Si. dan Ibu Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si, M.Si. yang telah memberikan bimbingan, waktu, ilmu, motivasi serta wadah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada sahabat sekaligus keluarga di kampus yaitu farmasi angkatan 2019 INTERFERON dan ERONBOYS terima kasih atas persahabatan yang suportif, bantuan, saran, diskusi serta kerja samanya.
21. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa, 30 Agustus 2023

Penulis



Muh.Miftahul Ichsan

NIM : 701001190018

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Uraian Tanaman Tobo-Tobo (Ficus septica Burm F.).....	11
B. Antiinflamasi.....	13
C. Antipiretik.....	15
D. Analgetik.....	20
E. Ekstrak.....	23
F. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel.....	37
E. Prosedur Kerja.....	38



F. Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan.....	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Implikasi Penelitian.....	68
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN.....	75



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Tobo-Tobo.....	11
Gambar 2. Alat Maserasi Dengan Kelengkapan Pengaduk .....	25
Gambar 3. Alat Refluks.....	26
Gambar 4. Alat Soxhletasi .....	27
Gambar 5. Alat Proses Perkolasi.....	28
Gambar 6. Grafik Rata-Rata Volume Edema Pada Mencit Terhadap Aktivitas Antiinflamasi.....	46
Gambar 7. Grafik Volume Edema Pada Menit 30' .....	46
Gambar 8. Grafik Volume Edema Pada Menit 15' .....	46
Gambar 9. Grafik Volume Edema Pada Menit 120' .....	47
Gambar 10. Grafik Volume Edema Pada Menit 60' .....	47
Gambar 11. Grafik Volume Edema Pada Menit 240' .....	47
Gambar 12. Grafik Volume Edema Pada Menit 360' .....	47
Gambar 13. Grafik Rata-Rata Jumlah Respon Nyeri Pada Mencit Terhadap Aktivitas Analgesik.....	48
Gambar 14. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 30'.....	49
Gambar 15. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 15'.....	49
Gambar 16. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 120'.....	49
Gambar 17. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 60'.....	49
Gambar 18. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 360'.....	50
Gambar 19. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 240'.....	50
Gambar 20. Grafik Rata-Rata Geliat Pada Mencit Terhadap Aktivitas Analgesik.....	51
Gambar 21. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 30'.....	51
Gambar 22. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 15' .....	51
Gambar 23. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 60'.....	52
Gambar 24. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 120'.....	52
Gambar 25. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 360'.....	52
Gambar 26. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 240'.....	52
Gambar 27. Grafik Rata-Rata Demam Pada Mencit Terhadap Aktivitas Antipiretik .....	53
Gambar 28. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 120'.....	54
Gambar 29. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 60'.....	54
Gambar 30. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 240'.....	54
Gambar 31. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 180'.....	54
Gambar 32. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 360'.....	55
Gambar 33. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 300'.....	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Antiinflamasi Ekstrak Tobo-Tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm. F) .....	45
Tabel 2. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode <i>Hotplate Test</i> Ekstrak Tobo-Tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm. F).....	48
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode <i>Writhing Test</i> Ekstrak Tobo-Tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm. F).....	50
Tabel 4. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Tobo-Tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm. F) .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel.....	75
Lampiran 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Antiinflamasi.....	76
Lampiran 3. Skema Kerja Uji Aktivitas Analgesik .....	77
Lampiran 4. Skema Kerja Uji Aktivitas Antipiretik .....	78
Lampiran 5. Perhitungan Dosis Ekstrak tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm.F).....	79
Lampiran 6. Perhitungan Dosis Paracetamol (500mg) .....	80
Lampiran 7. Perhitungan Dosis Natrium Diklofenak (50mg).....	81
Lampiran 8. Perhitungan Kebutuhan NaCMC 0,5% .....	82
Lampiran 9. Hasil Analisis Statistik Antiinflamasi .....	83
Lampiran 10. Hasil Analisis Statistik Analgesik <i>Writhing Test</i> .....	92
Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Analgesik <i>Hotplate Test</i> .....	99
Lampiran 12. Hasil Analisis Statistik Antipiretik .....	106
Lampiran 13. Kode Etik.....	106



## ABSTRAK

**Nama** : MUH.MIFTAHUL ICHSAN

**NIM** : 70100119018

**Judul** : **UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI, ANALGESIK DAN ANTIPIRETIK EKSTRAK METANOL BAGIAN-BAGIAN TANAMAN TOBO-TOBO (*Ficus septica* Burm F.) TERHADAP MENCIT (*Mus musculus*)**

---

*Ficus septica* Burm.f atau dikenal dengan nama tobo-tobo secara empiris digunakan sebagai obat penyakit kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit asma. Telah dilakukan penelitian terkait tanaman tobo-tobo yang menjumpai hasil bahwa tobo-tobo mengandung beberapa komponen aktif yang bermanfaat untuk digunakan dalam pengobatan, salah satunya senyawa flavonoid yang memiliki berbagai macam bioaktivitas yang ditunjukkan antara lain efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Flavonoid bekerja sebagai *inhibitor Cyclooxygenase* (COX) yang berfungsi memicu pembentukan prostaglandin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ekstrak tobo-tobo dari bagian manakah antara buah, daun, batang, kulit batang, serta akar yang memiliki pengaruh terbaik terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik pada mencit (*Mus musculus*). Sampel merupakan koleksi dari laboratorium Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah melalui proses pengeringan dan ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit batang di ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sedangkan bagian batang dan akar di ekstraksi menggunakan metode refluks. Penelitian ini dilakukan secara eksperimental terhadap 3 pengujian farmakologi. Uji analgesik dilakukan menggunakan 2 metode yaitu metode *hotplate* atau diinduksi menggunakan plat panas dan metode geliat (*writhing test*) yang diberikan larutan asam asetat sebagai penginduksi secara intraperitoneal. Pengujian antipiretik dilakukan dengan memberikan larutan pepton sebagai bahan penginduksi terhadap hewan coba secara intraperitoneal. Sedangkan pengujian antiinflamasi dilakukan dengan metode pembentukan edema buatan yang diberi larutan penginduksi karagenan secara intraplantar. Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa setiap kelompok pemberian sampel memiliki perbedaan nyata antara kelompok kontrol positif dan negatif. Sedangkan untuk analisis perbedaan antara kelompok positif dengan kelompok pemberian sampel dilanjutkan dengan analisis uji Tukey. Hasil pengujian ekstrak bagian tanaman tobo-tobo yang memiliki pengaruh terbaik terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yaitu ekstrak buah dengan persen inhibisi edema pada aktivitas antiinflamasi ialah 79,22%, persen inhibisi respon nyeri pada aktivitas analgesik metode *hotplate* dan *writhing test* ialah 77,22% dan 53,85%, serta persen inhibisi suhu pada aktivitas antipiretik ialah 45,23%.

**Kata kunci:** *tobo-tobo, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, mencit.*

## ABSTRACT

**Name** : MUH.MIFTAHUL ICHSAN  
**Student ID** : 70100119018  
**Title** : **ACTIVITY TESTS OF ANTI-INFLAMMATORY, ANALGESIC AND ANTIPYRETIC METHANOL EXTRACTS OF TOBO-TOBO PLANT PARTS (*Ficus septica* Burm F.) ON MICE (*Mus musculus*)**

---

*Ficus septica* Burm.f or known as tobo-tobo is empirically used as a medicine for skin diseases, appendicitis, venomous snake bites and asthma. Research related to tobo-tobo plant has been carried out which found that tobo-tobo contains several active components that are useful for use in medicine, one of which is a flavonoid compound which has various bioactivities shown including antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects. Flavanoids work as inhibitor *Cyclooxygenase* (COX) which functions to trigger the formation of prostaglandins. The purpose of this study was to determine tobo-tobo extract from which parts of the fruit, leaves, stems, bark, and roots had the best effect on anti-inflammatory, analgesic, and antipyretic activities in mice (*Mus musculus*). The sample is a collection from the Alauddin State Islamic University Makassar laboratory, which has gone through a drying and extraction process. Parts of leaves, fruit, and bark were extracted using the maceration method. While the stems and roots were extracted using the reflux method. This research was conducted experimentally on 3 pharmacological tests. Analgesic test was carried out using the stretching method (*writhing test*) given an acetic acid solution as an inducer intraperitoneally. Antipyretic testing was carried out by giving peptone solution as an inducer to experimental animals intraperitoneally. Meanwhile, the anti-inflammatory test was carried out using artificial edema formation method which was given intraplantar carrageenan induced solution. The results of the analysis of the ANOVA test showed that each sampling group had a significant difference between the control and negative groups. As for the analysis of differences between the positive group and the group giving the sample followed by analysis of the Tukey test. The test results of the extract of the tobo-tobo plant part that had the best effect on anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity were fruit extracts with the percentage of edema inhibition on anti-inflammatory activity was 79,22%, the percentage of pain response inhibition on the analgesic activity of the hotplate method and writhing test was 77,22% and 53,85%, and the percentage of temperature inhibition on antipyretic activity was 45,23%..

**Keywords:** *tobo-tobo, antipyretic, analgesic, anti-inflammatory, mice.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Inflamasi yang biasa disebut sebagai peradangan merupakan suatu proses fisiologi normal yang dirancang untuk melindungi diri serta untuk mengawali proses penyembuhan jaringan tubuh yang terluka (Becker, 2013). Peradangan biasa ditandai dengan kalor (panas), *rubor* (kemerahan), tumor (pembengkakan), *dolor* (nyeri), serta *functio laesa* (kehilangan fungsi jaringan). Tanda – tanda tersebut disebabkan oleh peningkatan aliran darah (vasodilatasi vaskular) dan peningkatan permeabilitas pada pembuluh darah (pergerakan protein, cairan plasma, dan sel – sel inflamasi dari lumen sistem vaskular ke dalam jaringan), sehingga menyebabkan edema (Winter, 2013).

Nyeri merupakan sensasi yang mengindikasikan bahwa tubuh sedang mengalami kerusakan jaringan, inflamasi, atau kelainan yang lebih berat seperti disfungsi sistem saraf. Oleh sebab itu nyeri sering juga disebut sebagai tanda untuk melindungi tubuh dari kerusakan jaringan yang lebih parah. Rasa nyeri seringkali menyebabkan rasa ketidaknyamanan pada seseorang yang mengalaminya seperti rasa tertusuk, rasa terbakar, rasa kesetrum, dan lainnya (Wardoyo & Oktarlina, 2019).

Demam merupakan peningkatan suhu tubuh di atas normal yang terjadi karena adanya gangguan pada pusat pengatur panas di hipotalamus, suhu tubuh normal berkisar antara 36° – 37°C. Peningkatan suhu tubuh pada keadaan patologi diawali dengan pelepasan suatu zat pirogen endogen atau sitoksin seperti interleukin-1 yang memacu pelepasan prostaglandin yang berlebihan di daerah preoptik hipotalamus (Faizah et al., 2021).

Inflamasi, nyeri dan demam biasanya dapat diatasi dengan pemberian obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini memiliki efek analgesik dan antipiretik. Obat antiinflamasi nonsteroid juga memiliki efek antiinflamasi jika digunakan dalam dosis tinggi. Obat antiinflamasi nonsteroid terdiri atas kelompok yang berbeda-beda dilihat dari sifat kimiawinya, tetapi semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam menghambat *inhibitor Cyclooxygenase* (COX) dan inhibisi sintesis prostaglandin. Obat antiinflamasi nonsteroid secara umum cenderung dipilih untuk mengobati gejala-gejala penyakit inflamasi sendi, nyeri, demam, kekakuan, dan pembengkakan (Anggraeny & Pramitaningastuti, 2016). Pengobatan inflamasi, demam, dan nyeri saat ini masih didominasi oleh obat-obatan sintetik.

Obat sintetik lebih populer dibandingkan dengan obat tradisional, hal itu dikarenakan obat olahan pabrik mampu menyembuhkan berbagai jenis gangguan penyakit dengan cepat. Akan tetapi, obat-obat tersebut menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan seperti gangguan saluran pencernaan. Kenyataan seperti ini mendorong masyarakat untuk mencari alternatif lain yang lebih aman, dengan cara memanfaatkan berbagai jenis tanaman untuk pencegahan dan menyembuhkan suatu penyakit (Anggraeny & Pramitaningastuti, 2016).

Sejak dahulu masyarakat Indonesia memanfaatkan tumbuhan dalam pengobatan. Banyak tanaman obat yang sudah dilaporkan mempunyai efek terapi untuk beberapa penyakit, namun pengetahuan tentang khasiat dan keamanan obat alami ini kebanyakan hanya bersifat empiris dan belum diuji secara ilmiah. Penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman dibandingkan obat modern, hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif sedikit daripada obat modern (Auliah et al., 2019). Tanaman obat mengandung banyak komponen senyawa aktif dan memiliki berbagai efek



farmakologis yang perlu dibuktikan kebenarannya secara ilmiah (Sukmawati et al., 2015).

Tanaman yang berpotensi sebagai senyawa antiinflamasi-analgesik-antipiretik adalah tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm. F). Berdasarkan pengalaman empiris, tumbuhan tobo-tobo sering dimanfaatkan sebagai penyakit kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit asma (Sudarsono & Gunawan, 2022). Telah dilakukan penelitian terkait tumbuhan tobo-tobo yang menjumpai hasil bahwa tobo-tobo mengandung beberapa komponen aktif yang bermanfaat untuk digunakan dalam pengobatan. Niluh Puspita Dewi (2020), melaporkan bahwa Ekstrak Etanol Daun Tobo-Tobo (*Ficus Septica* Brum F.) mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin dan polifenol yang dapat menurunkan kadar glukosa darah (Niluh Puspita Dewi, 2020). Selain itu, Glaudia Y.Tawi dkk (2019), melaporkan bahwa pemberian ekstrak daun awar-awar konsentrasi 40% sama efektifnya dengan pemberian paracetamol 500 mg (Glaudia Y.Tawi et al., 2019). Hal ini disebabkan karena adanya senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tobo-tobo (*Ficus Septica* Brum f.). Menurut Sudirga (2013), tobo-tobo (*Ficus Septica* Brum f.) mengandung senyawa terpenoid, alkaloid, flavonoid, dan fenol (Sudirga, 2013). Wijayakusuma (2021) menegaskan bahwa senyawa flavonoid memiliki berbagai macam bioaktivitas yang ditunjukkan antara lain efek antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Flavanoid bekerja sebagai *inhibitor Cyclooxygenase* (COX) yang berfungsi memicu pembentukan prostaglandin (Wijayakusuma, 2021).

Pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat menyari sebagian besar metabolit sekunder yang diinginkan dalam simplisia (Anonim dalam Salamah, 2015). Metanol merupakan pelarut yang bersifat universal sehingga dapat melarutkan analit yang bersifat polar dan nonpolar. Metanol dapat menarik

senyawa alkaloid, steroid, saponin dan flavonoid dari tanaman (Thompson dalam Salamah, 2015). Rizky Amalia Rachmawati (2020) melaporkan bahwa konstanta dielektrik metanol, etanol, aseton, dan isopropanol berturut-turut yaitu 32, 24, 21, 18. Selain itu menurut Yohed dan Kristiannita (2017) konstanta dielektrik merupakan ukuran kepolaran suatu pelarut. Semakin tinggi konstanta dielektrik pelarut, semakin polar pelarut tersebut begitu pula sebaliknya. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan pelarut dalam ekstraksi. Titik didih metanol lebih rendah dibandingkan etanol (Triningrat, 2010), sehingga mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi pada proses pemurnian dan jika diuapkan tidak tertinggal dalam minyak (Guenther, 1987).

Berdasarkan uraian masalah dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan tentang manfaat tumbuhan tobo-tobo, maka peneliti tertarik untuk menguji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) terhadap mencit (*Mus Musculus*).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta akar tobo-tobo (*Ficus septica* Burm. F) terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (*Mus musculus*)?
2. Esktrak tobo-tobo dari bagian manakah yang memberikan aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yang terbaik terhadap mencit (*Mus musculus*)?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **1. Definisi Operasional**

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **a. Antiinflamasi**

Antiinflamasi atau antiradang adalah sifat (misalnya sifat suatu obat atau makanan) yang mengurangi radang (inflamasi). Antiradang juga memberikan efek analgesik dan antipiretik serta anti penyakit-penyakit di sistem saraf pusat lainnya seperti migrain. Dalam beberapa kelompok, antiradang juga digunakan untuk penyakit alergi termasuk asma.

##### **b. Antipiretik**

Antipiretik adalah obat penurun panas. Obat-obat antipiretik juga menekan gejala-gejala yang biasanya menyertai demam seperti mialgia, kedinginan, nyeri kepala, dan lain-lain.

##### **c. Analgesik**

Analgesik merupakan istilah medis yang digunakan untuk golongan obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, jadi analgetik adalah obat penghilang nyeri.

##### **d. Ekstrak**

Ekstrak adalah zat yang dihasilkan berupa sediaan kering, kental atau cair yang didapatkan dari hasil ekstraksi zat aktif yang berasal dari simplisia nabati atau hewani yang dilakukan dengan cara yang benar dan secara kimiawi.

e. Metanol

Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada penelitian ini metanol digunakan sebagai pelarut pada proses ekstraksi bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.)

f. Tobo-tobo

Tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) adalah sejenis tumbuhan yang termasuk kerabat beringin anggota famili Moraceae. Perdu atau pohon kecil ini biasa ditemukan di hutan semak atau di tempat-tempat yang meliar, getahnya yang terkandung pada akar, ranting, daun dan buahnya dimanfaatkan untuk mengobati keracunan dan sakit pencernaan.

g. Mencit

Mencit (*Mus musculus*) merupakan hewan yang paling umum digunakan pada penelitian laboratorium sebagai hewan percobaan dengan berat sekitar 20-30 gram. Pada penelitian ini hewan coba yang digunakan adalah mencit (*Mus musculus*).

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratorium untuk menganalisis aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) terhadap mencit (*Mus musculus*).

### ***D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu***

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penemuan hasil penelitian sebelumnya dimana ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan beberapa temuan yang dilakukan penelitian sebelumnya.

1. Raymond Arief, Zakiah Thahir, Kristiana (2018) “Uji Aktivitas Antiinflamasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Awar-Awar (*Ficus Septica* Burm. F) Terhadap Udema Kulit Punggung Mencit (*Mus musculus*)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antiinflamasi sediaan salep ekstrak daun tobo-tobo konsentrasi 2% terhadap kondisi udema mencit yang diinduksi dengan karagenan 3% dengan menggunakan etanol 70%. Kelompok perlakuan dibagi menjadi tiga yaitu kelompok I yaitu mencit yang diberi Betametason sebagai kontrol positif, kelompok II diberi basis salep sebagai kontrol negatif dan kelompok III yang diberi sediaan salep ekstrak daun awar-awar 2%. Metode yang digunakan adalah pengukuran persentase udema yang terjadi setelah penggunaan selama enam jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemberian salep ekstrak daun awar-awar dengan konsentrasi 2% memiliki aktivitas antiinflamasi dengan penurunan tebal lipat kulit punggung mencit sebesar 38,79% setelah penggunaan selama 6 jam yang tidak berbeda nyata dengan kontrol positif Betametason.  
Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan penelitian diatas dimana akan dilakukan uji aktivitas antiinflamasi dengan sampel yang sama namun dengan pembandingan yang berbeda yaitu pembandingan Betametason.
2. Glaudia Y. Tawil, Wilmar Maarisit, Olvie S. Datu1, Yessie K. Lengkey (2019) “Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Awar-awar (*Ficus septica* Burm F.) Sebagai Antipiretik Terhadap Tikus Putih *Rattus norvegicus*”. Tumbuhan herbal mempunyai potensi senyawa bioaktif sebagai antipiretik. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa daun awar awar (*Ficus septica* Burm F.) dengan konsentrasi 10%, 20% dan 40%

memiliki efektivitas antipiretik dengan penginduksi demam pepton 5%. Pengukuran suhu rektal tikus menggunakan *thermometer*. Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium yang menggunakan hewan uji tikus putih. Hewan uji dibagi menjadi lima kelompok yaitu kelompok kontrol negatif (air suling), kontrol positif (suspensi parasetamol) dan kelompok uji yaitu pemberian ekstrak daun awar-awar 10%, 20% dan 40%. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Uji ANOVA dan Uji Tukey. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun awar-awar (*Ficus septica* Burm F.) konsentrasi 40% memiliki efektivitas sebagai antipiretik yang lebih efektif dalam penurunan suhu.

Pada penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan penelitian di atas dimana akan dilakukan uji aktivitas antipiretik dengan sampel yang sama namun dengan hewan coba yang berbeda yaitu menggunakan tikus putih (*Rattus norvegicus* L.)

3. Sukmawati, Yuliet, Ririen Hardani (2015) “Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L.) Terhadap Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Yang Diinduksi Karagenan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dan dosis efektif ekstrak sebagai anti-inflamasi. Ekstrak dibuat dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Uji aktivitas antiinflamasi yang dilakukan dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Setiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus putih. Kelompok pertama (kontrol negatif) diberikan 0,5% suspensi Na-CMC; kelompok ke-dua (kontrol positif) diberikan natrium diklofenak 9 mg/kgBB; sedangkan kelompok ke-3, ke-4, dan ke-5 secara berturut-turut diberikan ekstrak daun pisang sebesar 500, 750 dan 1000 mg/kgBB.

Masing-masing tikus kemudian diinduksi menggunakan karagenan 1% secara subplantar. Diameter radang diukur dengan menggunakan jangka sorong dan volume radang menggunakan *pletismometer* dilakukan selama 6 jam dengan interval waktu 60 menit. Data dianalisis secara statistik menggunakan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol negatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan kelompok perlakuan lainnya dimana tidak menunjukkan efek anti-inflamasi. Sebagai kesimpulan, ekstrak etanol daun pisang memiliki aktivitas antiinflamasi yang efektif pada dosis 750 mg/KgBB.

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian di atas, peneliti berencana melakukan penelitian uji aktivitas antiinflamasi dengan metode maserasi, namun sampel yang digunakan berbeda yaitu sampel daun pisang ambon (*Musa paradisiaca* L.).

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta akar tobo-tobo (*Ficus septica* Burm. F) terhadap aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (*Mus musculus*).
2. Untuk mengetahui ekstrak tobo-tobo dari bagian manakah yang memberikan aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik yang terbaik terhadap mencit (*Mus musculus*).

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai data ilmiah atau rujukan tentang hasil dari uji aktivitas antiinflamasi, antipiretik dan analgesik ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.)

terhadap mencit (*Mus musculus*) dimana kedepannya dapat dikembangkan menjadi sediaan farmasi yang bermanfaat bagi masyarakat.





## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Uraian Tanaman Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm F.)



Gambar 1. Tanaman Tobo-Tobo (Sumber Primer)

#### 1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anak divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Urticales
Suku	: Moraceae
Marga	: Ficus
Jenis	: <i>Ficus septica</i> Burm F.

(Steenis, 2008)

## 2. Sinonim

Jawa Ki ciyat (Sunda), Awar-awar (Jawa tengah), Barabar (Madura), Awakawak (Bali), Sulawesi Loloyan (Minahasa), Tobo-tobo (Makassar), Dausalo (Bugis), Babu lutu (Halmahera), Tagalolo (Ternate), Sirih popar (Ambon). (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)

## 3. Morfologi Tanaman

*Ficus septica* Burm.f atau dikenal dengan nama awar-awar adalah Pohon atau semak tinggi yang merupakan salah satu anggota famili Moraceae, tegak 1-5 meter. Batang pokok bengkak, lunak, ranting bulat silindris, berongga, gundul, bergetah bening. Daun penumpu tunggal, besar, sangat runcing, daun tunggal, bertangkai, duduk daun berseling atau berhadapan, bertangkai 2,53 cm. Helaian berbentuk bulat telur atau elips, dengan pangkal membulat, ujung menyempit cukup tumpul, tepi rata, 9-30 kali 9-16 cm, dari atas hijau tua mengkilat, dengan banyak bintik-bintik yang pucat, dari bawah hijau muda, sisi kiri kanan tulang daun tengah dengan 6-12 tulang daun samping; kedua belah sisi tulang daun menyolok karena warnanya yang pucat (Kurdi, 2010)

## 4. Manfaat Tanaman

Tumbuhan awar-awar (*Ficus septica* Burm.F) secara empiris digunakan sebagai obat penyakit kulit, radang usus buntu, gigitan ular berbisa dan penyakit asma (Sudardono, 2022)

Masyarakat Wolio Bau-bau, Sulawesi Tenggara, menggunakan akar dan daun awar-awar untuk tujuan pengobatan. Pemanfaatan akar dengan cara dikupas lalu diseduh dengan air panas, masyarakat setempat mengkonsumsi untuk pengobatan TBC. Daunnya digunakan untuk mengobati wasir. dilakukan dengan memanaskan helaian daun, dan pasien diharuskan duduk di atasnya (Slamet, 2018)

Di Sulawesi selatan, daunnya direbus dengan daun *Achyranthes aspera* dan rimpang *Cheilocostus speciosus*. digunakan sebagai kompres untuk pengobatan demam (Sari N W. B., 2017)

Di Minahasa Utara, kulitnya direbus dan airnya diminum untuk mengobati malaria (MY & Kaunang ENS, 2017). Selain itu di Sulawesi Utara daerah Mongondow dan Miangas tanaman ini digunakan untuk menyembuhkan kejang dan menurunkan kadar gula darah.

## 5. Kandungan Kimia

Studi fitokimia telah dilakukan disetiap bagian tanaman, penelitian yang dilakukan oleh EP, Lansky; HM, paavilainen ; AD, pawlus; RA, newman (2008) melaporkan hasil bahwa terdapat senyawa alkaloid, kumarin, flavonoid, fenolik, pirimidin, sterol, dan triterpenoid dari spesies *Ficus septica* burm F (Lansky EP, 2008). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kaunang dan semuel (2017) juga melaporkan bahwa adanya senyawa tannin yang terdapat pada tumbuhan ini. (MY & Kaunang ENS, 2017). Selain itu penelitian terhadap akar kering oleh Damu (2009) melaporkan adanya *13aR tylophorine*, *13aR-isotylocrebrine*, *13aR-tylocrebrine*, *13aR-antofine*, *ficuseptines A–B dan E–N*, *dehydrotylophorine*, *10S,13aR-isotylocrebrine N-oksida*, *10R,13aR-tylophorine N-oksida*, dan *10S,13aR-tylocrebrine N-oksida*. Flavanon, sekelompok flavonoid, juga telah diidentifikasi dari kulit akar spesies ini (Damu AG, 2009)

### **B. Antiinflamasi**

Antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka fisik, infeksi, panas dan interaksi antigen-antibodi (Houglum, 2005). Berdasarkan mekanisme kerja obat-obat antiinflamasi terbagi dalam dua golongan, yaitu obat

antiinflamasi golongan steroid dan obat antiinflamasi non steroid. Obat antiinflamasi golongan steroid bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel sumbernya. Pemakaian obat-obat tersebut mempunyai efek samping seperti iritasi *gastrointestinal*, kerusakan ginjal, diare, sakit kepala, depresi, pankreatitis dan terapi ini terkadang agresif dan tidak efektif dalam beberapa kasus. Untuk Obat antiinflamasi golongan non steroid merupakan obat analgetik lemah, antiflogistik, yang bekerja melalui mekanisme lain seperti *inhibisi siklooksigenase* (A. A. Tia Santika Dewi, 2015). Secara kimiawi, obat antiinflamasi non steroid merupakan senyawa turunan dari asam asetat, asam propionat, pirazol, dan zat kimia lainnya. obat antiinflamasi non steroid bekerja dengan menghambat kerja dari enzim siklooksigenase. Enzim ini berperan penting dalam jalur metabolisme asam arakhidonat, yaitu bekerja untuk mengkatalis perubahan asam arakhidonat menjadi prostaglandin dan tromboksan. Terdapat dua isoform enzim siklooksigenase yaitu siklooksigenase-1 dan siklooksigenase-2. Kedua enzim ini memiliki struktur yang serupa, namun pada bagian substrate binding channel enzim siklooksigenase-2 memiliki sisi samping yang berbeda dengan enzim siklooksigenase-1. Hal ini lah yang mendasari selektivitas inhibisi enzim ini oleh obat antiinflamasi non steroid (Zahra & Carolia, 2017).

Menurut Reszq (2021) berpendapat bahwa pada peradangan yang diinduksi karagenan, pertama kali didokumentasikan oleh Winter (1962) adalah uji akut, nonimun, dipelajari dengan baik, dan sangat berulang. Segera setelah injeksi subkutan, obat ini menginduksi edema, hiperalgesia, dan eritema yang disebabkan oleh agen proinflamasi, seperti tachykinin, oksigen reaktif, dan spesies nitrogen, histamin, dan bradikinin (Winter et al., 1962). Neutrofil dapat dengan mudah berpindah ke daerah yang meradang dan menghasilkan oksigen reaktif pro-inflamasi dan spesies lain (Morris, 2003). Ketebalan edema dapat dikurangi

dengan obat yang menargetkan molekul spesifik dalam kaskade inflamasi (Rezq et al., 2021). Berdasarkan mekanisme kerjanya obat-obat antiinflamasi terbagi kedalam golongan :

1. Antiinflamasi steroid

Bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel-sel sumbernya, termasuk golongan obat ini antara lain: hidrokortison, prednison, prednisolon, metyl prednisolon, triamsinolon, deksametason dan betametason (Bowman W.C., 1980).

2. Antiinflamasi non steroid

Bekerja dengan cara menghambat enzim sikloxygenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi terganggu. Termasuk golongan obat ini adalah aspirin, natrium diklofenak ibuprofen dan lain-lain (Gunawan, 2008).

### **C. Antipiretik**

Antipiretik adalah obat yang menurunkan suhu tubuh dalam keadaan demam. Namun, hal itu tidak mempengaruhi suhu tubuh normal jika ada demam. Antipiretik bertindak atas hipotalamus untuk mengurangi kenaikan suhu telah diluncurkan oleh interleukin. Setelah itu, tubuh akan beroperasi pada suhu yang lebih rendah, yang mengakibatkan pengurangan demam. Aronoff dan Neilson (2001) berpendapat bahwa mekanisme demam diawali dengan adanya invasi mikroba pada jaringan, kemudian memicu terjadinya respon inflamasi dan mengaktifkan sel-sel endotel vaskular lokal dan leukosit. Leukosit akan teraktivasi dan melepaskan sitokin pirogenik seperti *Interleukin* (IL-1 $\beta$  dan IL-6) dan *Tumor Necrosis Factor* (TNF). Hematogen yang menyebar memungkinkan pirogen endogen untuk menstimulus endotel vaskular guna memproduksi *prostaglandin E2* (PGE2) pada sistem syaraf pusat. Neuron pada *preoptic area of the anterior hypothalamus* (POAH) yang mengandung reseptor Eprostanoid spesifik dapat

mengatur respon demam setelah mendapat sinyal dari PGE2. Selanjutnya, PGE2 akan mengubah laju cincin dari neuron tersebut serta menghasilkan kenaikan termoregulasi set point. Antipiretik yang umum digunakan seperti aspirin, parasetamol, ibuprofen, dan asetosal (Rennie Puspa Novita, 2020).

Demam juga melibatkan peningkatan laju metabolisme dan konsumsi oksigen (Freedman, 2012). Tuntutan fisiologis yang meningkat selama piresis diidentifikasi berpotensi merugikan kesehatan (Mark Anthony Browne, 2013). Dikatakan bahwa potensi manfaat demam adalah dirusak oleh tuntutan fisiologis tambahan pada tubuh (Nitin Bhardwaj, 2014). Dengan demikian, obat antipiretik dapat diberikan untuk mengurangi komplikasi terkait demam (Mark Anthony Browne, 2013). Parasetamol dilaporkan paling banyak antipiretik umum digunakan dalam pengujian saat ini, meskipun banyak bentuk *obat antiinflamasi nonsteroid* (OAINS) juga digunakan, termasuk ibuprofen (Suzuki, 2015). Dilaporkan dalam literatur bahwa demam merugikan pasien dengan patologi neurologis yang tidak menular, misalnya, setelah stroke. Sebaliknya, tidak ada rekomendasi atau pedoman yang jelas mengenai obat antipiretik dan pasien demam dengan infeksi. Penggunaan antipiretik selama infeksi masih menjadi topik kontroversial. Memang, banyak penulis berpendapat bahwa menekan demam mengganggu mekanisme pertahanan alami tubuh, dan dapat memperburuk hasil pasien (I-Min Lee 1, 2012). Sebagai pendukung, beberapa penulis telah melaporkan bahwa infeksi, tanpa adanya demam, sangat berkorelasi dengan prognosis yang buruk (Panagiotis Kiekkas George C, 2008). Saat ini ada satu pedoman yang tersedia, khusus untuk anak-anak, dari National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017), yang dengan jelas menyatakan bahwa antipiretik tidak boleh diberikan hanya untuk menekan demam, kecuali jika anak tersebut mengalami stres. Terlepas dari publikasi pedoman ini, beberapa penulis

telah menyarankan agar profesional kesehatan terus percaya bahwa demam merugikan dan memerlukan penekanan. Selanjutnya, metode penekan demam yang agresif dan rutin telah sering didemonstrasikan dalam pengujian (Carey, 2010).

Menurut Berman et al., (2010) demam memiliki beberapa jenis diantaranya:

1. Demam remiten yaitu jenis demam dimana suhu tubuh meningkat  $\geq 1^{\circ}\text{C}$  selama 24 jam (Noah C. Berman, 2010). Demam ini menunjukkan adanya penyakit tifoid, tuberkulosis, dan septicemia (Sandhar, 2008).
2. Demam intermiten merupakan demam dengan perubahan suhu tubuh yang berulang-ulang dalam interval teratur antara periode demam (pyrexia) dan periode tidak demam (apyrexia) secara abnormal (Berman et al., 2010). Demam ini menunjukkan adanya kasus demam malaria (Sandhar, 2008).
3. Demam kambuhan merupakan kondisi demam yang hilang dan kembali datang. Periode demam yang pendek selama beberapa hari yang diselingi dengan periode suhu normal selama 1 hingga 2 hari (Berman et al., 2010).
4. Demam konstan adalah demam yang terjadi ketika suhu tubuh berfluktuasi rendah diatas suhu normal (Noah C. Berman, 2010).

Beberapa contoh obat antipiretik diantaranya yaitu parasetamol atau asetaminofen, ibuprofen, dan aspirin (Jurnalis et al., 2015). Berikut ini penjelasan dari contoh golongan obat-obatan tersebut :

1. Aspirin

Asam asetil salisilat yang dapat disebut juga asetosal atau aspirin merupakan obat yang memiliki aktivitas analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik (Wilmana dan Gan, 2007). Mekanisme antipiretik dari aspirin yaitu menurunkan jumlah PGE2 dengan menghambat aktivitas enzim COX secara irreversible.



Enzim tersebut mengkatalis perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin E<sub>2</sub>, prostaglandin H<sub>2</sub>, dan tromboksan A<sub>2</sub> (Miladiyah, 2012). Aspirin mencapai kadar tertinggi setelah 1-2 jam pemberian obat dan memiliki durasi terapi yaitu 4-6 jam (Aberg, 2010). Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2015), dosis terapi aspirin untuk antipiretik yaitu sekitar 300-900 mg tiap 4-6 jam. Dosis lainnya yang dapat digunakan yaitu 325-1000 mg tiap 4-6 jam dengan dosis maksimal 4 g perhari (Aronoff dan Neilson, 2001).

Aspirin memiliki efek samping diantaranya iritasi saluran cerna, bronkospasme, dan pada pasien hipersensitif menimbulkan reaksi kulit (BPOM RI, 2015). Selain itu, sindrom reye juga dikaitkan dengan penggunaan aspirin. Meskipun aspirin belum terbukti menyebabkan terjadinya sindrom reye. Namun muncul dugaan bahwa, aspirin dapat menimbulkan disfungsi membran mitokondria yang memblok fosforilasi oksidatif dan oksidasi asam lemak  $\beta$  (Sari dan Irawati, 2018).

## 2. Ibuprofen

Ibuprofen merupakan obat golongan NSAIDs yang tidak selektif karena menghambat COX-1 dan COX-2 secara reversible serta memiliki efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik (Mazaleuskaya et al., 2015). Obat ini diabsorpsi secara cepat melalui lambung dan kadar maksimal dalam plasma dicapai setelah 1-2 jam (Wilmana dan Gan, 2007) dan memiliki durasi terapi yaitu 4-6 jam (Aberg et al., 2009). Dosis terapi ibuprofen untuk antipiretik berkisar 200-800 mg tiap 6-8 jam dengan maksimal dosis 3,2 g perhari (Aronoff dan Neilson, 2001). Menurut Badan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (2015), dosis umum ibuprofen yaitu 200 hingga 250 mg untuk dewasa dan anak usia 8-12 tahun sedangkan dosis 50 mg untuk anak usia 1-2 tahun dan dosis 100-125 mg untuk anak usia 3-7 tahun 3-4 kali sehari.



Ibuprofen memiliki onset lebih lama dari parasetamol (Wahba, 2004). Obat ini biasanya digunakan pada anak-anak yang demam dan nyeri akut dengan dosis 5-10 mg/kgBB setiap 6-8 jam karena memiliki keamanan yang lebih baik dari aspirin dan memiliki kemanjuran lebih baik dari parasetamol. Selain itu, ibuprofen (dewasa: 200-800 mg setiap 6-8 jam; pediatrik: 5-10 mg/kgBB setiap 6-8 jam) memiliki efek antipiretik dan analgesik yang lebih besar pada anak-anak dan orang dewasa dari parasetamol (dewasa: 500-1000 mg setiap 6-8 jam; pediatrik: 10-15 mg/kgBB setiap 4-6 jam) (Mazaleuskaya et al., 2015). Efek samping yang umum terjadi pada penggunaan ibuprofen diantaranya: sakit kepala, diare, konstipasi, mual, muntah, perdarahan lambung, nyeri abdomen, dan lain-lainnya (BPOM RI, 2015).

### 3. Asetaminofen

Asetaminofen atau dapat disebut juga dengan parasetamol merupakan turunan senyawa induk p-aminofenol yang memiliki rumus empiris  $C_8H_9NO_2$  serta berat molekul 151,2 (Sudjadi dan Rohman, 2018). Efek antipiretik yang adadisebabkan adanya gugus aminobenzen (Wilmana dan Gan, 2007). Parasetamol juga memiliki aktivitas lainnya yaitu sebagai analgesik dan antiinflamasi lemah (Aronof dan Neilson, 2001). Pendapat lain menyatakan bahwa parasetamol tidak memiliki efek antiinflamasi sehingga tidak termasuk ke dalam golongan NSAIDs. Mekanisme kerja parasetamol sebagai agen antipiretik yaitu dapat memblok kerja enzim cyclooxygenase-3 (COX-3) pada sel endotel anterior hipotalamus sehingga pembentukan prostaglandin juga terhambat. Jumlah prostaglandin yang menurun membuat panas tubuh juga mengalami penurunan (Zulfa et al., 2017).

Parasetamol diabsorpsi cepat dan sempurna dalam saluran cerna dimana konsentrasi tertinggi di dalam plasma dicapai dalam waktu 30 menit dan waktu

paruh plasma 1-3 jam (Wilmana dan Gan, 2007) serta memiliki durasi terapi 4-6 jam (Aberg et al., 2009). Parasetamol dapat mengalami metabolisme fase 1 dan kemudian menghasilkan N-asetil-p-benzoquinon-imina, metabolit reaktif dan dapat mengakrilasi makromolekul esensial (contohnya protein) sehingga menjadi toksik. Selanjutnya, senyawa tersebut akan dikonjugasi dengan glutation yang dikatalisis oleh enzim (glutation S-transferase) menghasilkan asam merkapturat sehingga dapat dikeluarkan melalui ginjal (Sulanjani dan Hartati, 2016). Akan tetapi, parasetamol yang digunakan pada dosis berlebihan dan pemakaian jangka panjang menyebabkan N-asetil-p-benzoquinon-imina terus bertambah. Jumlah N-asetil-p-benzoquinon-imina yang tidak sebanding dengan jumlah glutation membuat N-asetil-p-benzoquinon-imina berikatan membentuk makromolekul dengan sel hati yang mengakibatkan nekrosis hati (Jurnal et al., 2015).

Dosis parasetamol untuk orang dewasa yaitu 500 mg hingga 1 g setiap tiga kali sehari dan dosis maksimal hariannya 4 g sedangkan dosis untuk anak-anak usia diatas 6 tahun yaitu 325 mg setiap 4 hingga 6 jam dan dosis maksimalnya 1,6 g. Maksimal penggunaan obat ini 3 hari berturut-turut dan tidak dianjurkan pada orang dengan gangguan hati dan peminum alkohol (Fitriani, 2013). Penggunaan parasetamol dalam jangka panjang dan dosis berlebihan (overdosis) juga dapat menyebabkan kerusakan hati (BPOM RI, 2015). Hepatotoksisitas dapat terjadi pada pemberian parasetamol dosis tunggal 10-15 gram (200-250 mg/kgBB) (Wilmana dan Gan, 2007).

#### ***D. Analgesik***

Analgesik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau dapat disebut pula sebagai obat penghalang rasa nyeri, misalnya sakit kepala, otot, perut, dan gigi dengan tanpa mengurangi atau menghilangkan kesadaran dari penderita. Obat analgesik ini digunakan oleh sebagian besar

masyarakat dikarenakan obat ini dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri meskipun obat analgesik ini tidak dapat menyembuhkan penyakit dari penyebabnya (Syamsul, Eka Siswanto Andani, Fitriya Soemarie, 2016). Mekanisme timbulnya nyeri didasari oleh proses multipel yaitu nosisepsi, sensitisasi perifer, perubahan fenotip, sensitisasi sentral, eksitabilitas ektopik, reorganisasi struktural, dan penurunan inhibisi. Antara stimulus cedera jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat empat proses tersendiri yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi (Bahrudin, 2017).

Memahami mekanisme yang mendasari penyebab nyeri sangat penting untuk pengembangan terapi baru dan juga untuk mengetahui jenis analgesik yang diresepkan untuk pasien nyeri. Ada empat jenis nyeri utama yang masing-masing membutuhkan pendekatan pengobatan yang berbeda; jenis nyeri ini meliputi: nyeri nosiseptif, inflamasi, neuropatik, dan disfungsi (nosiplastik) (CJ, 2020). Nyeri nosiseptif adalah jenis nyeri yang disebabkan oleh aktivasi nosiseptor perifer yang mendeteksi rangsangan berbahaya yang merusak jaringan; kehadiran terus menerus dari rangsangan ini dapat mengakibatkan keadaan patologis seperti osteoarthritis (Basbaum, Bautista, Scherrer, & Julius, 2009). Strategi pengobatan untuk nyeri nosiseptif meliputi: pemblokiran target molekuler seperti transient receptor potential cation channel subfamili V member 1 (TRPV1) dan transient subfamili saluran kation potensial reseptor Anggota 1 (TRPA1) dari pengiriman rangsangan berbahaya ke terminal nociceptor, (Julius, 2013) memblokir transmisi potensial aksi di nosiseptor dengan menghambat saluran natrium tegangan-gated (Nav) 1,7 atau 1,8 (Binstok, Bean, & Woolf, 2007) memblokir transmisi rangsangan dari nosiseptor ke otak dan sumsum tulang belakang dengan penghambat saluran kalsium tipe-N atau antagonis reseptor neurotransmitter, (Snutch, 2005) dan secara langsung memblokir aktivasi daerah kortikal yang

menghasilkan efek subyektif nyeri dengan opioid. Nyeri inflamasi, di sisi lain, adalah jenis nyeri yang timbul dari cedera jaringan yang menyebabkan aktivasi nosiseptor oleh sel imun dan sel yang rusak. (Pinho-Ribeiro, Verri, & Chiu, 2017) Oleh karena itu, penurunan respon imun akan mengurangi nyeri inflamasi seperti yang diamati dengan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) dan penghambat siklooksigenase 2 (COX-2) yang mengurangi produksi prostaglandin E2. (Yekkirala, Roberson, Bean, & Woolf, 2017) Nyeri neuropatik bukanlah gejala patologi tetapi merupakan konsekuensi dari perubahan patologis pada sistem saraf perifer dan pusat yang disebabkan oleh cedera pada sistem saraf, dan rasa sakit biasanya tetap ada setelah patologi diobati. Nyeri neuropatik dapat disebabkan oleh diabetes, kemoterapi, cedera tulang belakang, trauma saraf, atau stroke. (Colloca, et al., 2017) Strategi pengobatan termasuk pengurangan aktivasi sirkuit pemicu rasa sakit dengan mengurangi eksitasi dengan gabapentinoid, meningkatkan penghambatan dengan penghambat serapan amina ganda (yaitu, agonis kerja tidak langsung), atau antagonis N-metil-D reseptor-aspartat (NMDA). (Chen Y, 2019) Jenis nyeri terakhir adalah nyeri disfungsi yang terjadi terutama oleh faktor-faktor yang tidak secara langsung disebabkan oleh rangsangan berbahaya, peradangan, atau kerusakan sistem saraf pusat (SSP) (CJ, 2020). Contoh nyeri disfungsi termasuk fibromyalgia, sindrom iritasi usus, dan gangguan sendi temporomandibular (Flodin P., 2014). Berdasarkan kerja farmakologinya, analgetik dibagi 2 kelompok besar, yaitu analgetik narkotik dan analgetik non-narkotik :

### **1. Analgetik narkotik**

Zat ini mempunyai daya penghalau nyeri yang kuat sekali dengan titik kerja yang terletak di sistem saraf sentral, analgetik ini umumnya menurunkan kesadaran (sifat meredakan dan menidurkan) dan menimbulkan perasaan nyaman

(euforia), serta mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis (ketagihan, adiksi) bila pengobatan dihentikan (Tjay & Rahardja, 2002).

## **2. Analgetik non-narkotik**

Analgetik non-narkotik bersifat tidak adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgetik narkotik. Obat-obat ini juga dinamakan analgetik perifer, tidak menurunkan kesadaran dan tidak mengakibatkan ketagihan secara kimiawi (Tjay & Rahardja, 2002).

### ***E. Ekstrak***

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani, dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan dari ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstrak merupakan sediaan yang bisa berupa sediaan kering, kental, ataupun cair, dan dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu maserasi, perkolasi, atau penyeduhan dengan air mendidih (Wewengkang & Rotinsulu, 2021).

Untuk mendapatkan ekstrak pada dasarnya merupakan rangkaian yang panjang dan melibatkan banyak faktor. Pada rangkaian ini terdapat tanaman segar yang dikeringkan, kemudian hasil olahannya dihaluskan dan diekstraksi. Penyaringan atau biasa disebut ekstraksi juga melibatkan larutan penyaring. Ekstrak yang dihasilkan berupa ekstrak cair kemudian dipekatkan dengan menghilangkan atau mereduksi cairan menjadi ekstrak kental, bahkan ekstrak kering (Najib Ahmad, 2018).

Ekstraksi merupakan suatu proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menarik kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut. Senyawa aktif

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, dan lain-lain. Dengan mengetahui adanya senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000).

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimi yang terdapat pada simplisia. Ekstraksi juga merupakan proses penyarian senyawa aktif dari tanaman obat dengan pelarut yang sesuai. Jenis ekstraksi yang dapat dilakukan di laboratorium yaitu jenis ekstraksi padat-cair yang dapat dilakukan dengan beberapa teknik, di antaranya maserasi, refluks, dan soxhletasi (Wewengkang & Rotinsulu, 2021).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik atau memisahkan senyawa dari campurannya atau simplisia. Ada beberapa cara ekstraksi yang telah diketahui. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode dilakukan dengan memperhatikan yaitu sifat senyawa, pelarut yang digunakan, dan alat tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, infusa dan destilasi (Hanani, 2014).

### **1. Metode ekstraksi**


Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna (Wewengkang & Rotinsulu, 2021).

#### **a. Maserasi**

Maserasi adalah kegiatan pengestrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapakali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang

(kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi yang memiliki prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik yaitu dilakukan pengadukan yang kontinu (teru-menerus). Remaserasi yaitu dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah di lakukan penyaringan meserat pertama, dan seterusnya (Depkes RI, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan (Mukhriani, 2014)




Gambar 2. Alat Maserasi Dengan Kelengkapan Pengaduk (Saputra, 2020)

#### **b. Refluks dan Destilasi**

Refluks merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik dididhnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Secara umum, proses ini diulang hingga 3-5 kali pada residu pertama sehingga dapat mencakup ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang telah dihubungkan dengan kondensor. Dalam hal ini pelarut dipanaskan hingga

mencapai titik didih. Kemudian uap tersebut terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Selama pemanasan, uap terkondensasi serta destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor.



Gambar 3. Alat Refluks (Saputra, 2020)


Destilasi uap memiliki prinsip kerja yang sama dengan mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap) (Mukhriani, 2014).

### c. Soxhletasi

Soxhletasi merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang secara umum dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan sampel bubuk dalam bungkus selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Tambahkan pelarut yang sesuai ke dalam labu dengan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi berlangsung secara terus menerus dan sampel diekstraksi dengan pelarut murni hasil kondensasi yang menggunakan lebih sedikit pelarut dan membutuhkan waktu lebih sedikit (Mukhriani, 2014)






Gambar 4. Alat Soxhletasi (Saputra, 2020)

#### d. Perkolasi

Perkolasi Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

Perkolasi adalah cara penarikan senyawa aktif dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah terbasahi. Prinsip ekstraksi secara perkolasi adalah serbuk simplisia diletakkan dalam suatu wadah bejana berbentuk silinder, yang bagian bawah silinder diberi sekat berpori, dimana cairan penyari dialirkan dari bagian atas ke bagian bawah melalui serbuk simplisia, dimana cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel simplisia yang dilalui sampel dalam kondisi jenuh. Bentuk perkolator ada 3 macam yaitu perkolator berbentuk tabung, perkolator berbentuk paruh, dan perkolator berbentuk corong. Pemilihan perkolator tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan di sari (Saputra, 2020).



Gambar 5. Alat Proses Perkolasi (Saputra, 2020)

#### ***F. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman***

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu ciptaannya adalah makhluk hidup seperti tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Berbagai macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat yang merupakan anugerah, karena Allah SWT tidak memberi penyakit tidak dengan obat (penyembuhnya). Buku referensi yang terbaik yang menjelaskan pentingnya tanaman pada pengobatan yang terdapat dalam beberapa surah ialah Al-Qur'an. dimana, fitur yang menonjol dalam pengajaran Islam ialah penyembuhan suatu penyakit melalui tanaman obat. Jadi, pengobatan islami dimulai sejak masa Nabi Adam 'Alaihis Salam hingga pada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sampai berlanjut pada masa sekarang di seluruh dunia (Faradisa & Fakhruddin, 2021 : 1-2). Ada alasan dan tujuan penyebutan tumbuhan dalam Al-Qur'an sebagai bukti kemahakuasaan Allah dan sebagai perumpamaan untuk menyampaikan hikmah. Untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman tumbuhan, manfaat besar tumbuhan harus dirasakan secara berkelanjutan bagi makhluk hidup lainnya. Inilah yang harus manusia pahami dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya QS Thaha/20 : 53 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya:

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kemenag D. R., 2019).

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu, Dia (yang menjadikan untukmu) tempat berpijak di antara makhluk-Nya yang banyak (bumi sebagai hamparan yang luas), dan Dia (yang memudahkan) menjadikan (bagimu di bumi jalan) mudah tempat untuk berjalan-jalan (dan Dia menurunkan hujan dari langit). Kepada Nabi Musa, Allah berfirman apa yang telah Dia sebutkan sebagai nikmat dari-Nya dan khithab bagi penduduk Mekah. (Oleh karena itu, Kami turunkan dengan berbagai jenis air hujan dengan berbagai tanaman). Lafal (شَتَّى) ini menjadi kata sifat dari pada lafal (أَزْوَاجًا), maksudnya, yang berbeda-beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Lafal (شَتَّى) ini adalah bentuk jamak dari lafal Syatiitun, wazannya sama dengan lafal Mardhaa sebagai jamak dari lafal Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja شَتَّى artinya Tafarraqa atau berbeda-beda (Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008).

Pada kitab Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang kejelasan dari perkataan Nabi Musa *‘Alaihis Salam* mengenai Allah *Shubhanahu Wa Ta’ala*. Bahwa pada waktu dia ditanyakan oleh Fir’aun mengenai Rabbnya, maka Musa *‘Alaihis Salam* menjawab: “Rabb kami ialah (Rabb) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.” Tetapi ucapan Musa *‘Alaihis Salam* dibantah oleh Fir’aun dengan pertanyaannya mengenai umat-umat terdahulu. Kemudian Musa *‘Alaihis Salam* memberikan bukti kepadanya dengan mengatakan: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا) “Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan.” Menurut sebagian ahli qiraat, bacaan ini (مَهْدًا) berarti

hamparan yang kalian tinggali, berdiri, serta tertidur di atasnya, serta kalian melakukan perjalanan pada permukaannya. (وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا) “Dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan,” yakni Dia telah membuatkan jalan bagi kalian, hingga kalian dapat berjalan di permukaannya. (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً) (فَأَخْرَجْنَا بِهٖ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى) “Dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” Secara khusus, berbagai jenis tumbuhan, baik yang asam, manis, maupun pahit, serta beberapa lainnya, berupa tumbuhan dan buah-buahan (Syaikh, 2008).

Sedangkan dalam kitab Tafsir al-Misbah diuraikan penjelasan tentang ayat tersebut, Allah menjadikan manusia di bumi ini agar ia menyadari bahwa ada jarak antara ia dan tujuan hidupnya. Ada jalan yang harus ditempuhnya guna mencapai tujuan hidup itu, yakni pendekatan diri kepada Allah dan upaya masuk ke hadirat-Nya, sebagaimana halnya ia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi ini untuk mencapai arah yang ditujunya. Allah menurunkan air dari langit berupa hujan, dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat, yakni tanda-tanda tentang hidayah dan *rububiyyah* / Ketuhanan dan Pemeliharaan Allah swt. Hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang berakal. Dengan demikian tulis Thabathaba'i lebih jauh - firman-Nya: Dia Yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, adalah isyarat bahwa keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah, firman-Nya: Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya

bahwa: Dia menurunkan dari langit air, maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang. Redaksi firman-Nya : *akhrajna bihi azwdjan min nabatin syatta*/maka Kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam beralih menjadi persona pertama (Kami) sedang sebelumnya adalah persona ketiga (Dia) dalam firman-Nya : *alladzi ja'ala lakam al-ardh mahdan*/Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung penciptanya. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik di muka bumi ini.” (Shihab, 2002).

Al-Qur'an juga secara jelas menyebutkan nama-nama tanaman dan buah-buahan. Bukan hanya menyebut secara jelas tanaman dan buah-buahan secara jelas, Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* juga menjelaskan dalam Al-Qur'an fungsi dan manfaat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berguna untuk manusia seperti halnya sebagai *Syifaa'* (Obat). Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah SWT tentang seruan untuk memanfaatkan tumbuhan juga terdapat pada QS Asy-Syu'ara/26:7 yang berbunyi :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik? (Kemenag L. P., 2019)

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu, *يَرَوُا أَوْلَمَ* (Dan apakah mereka tidak memperhatikan) maksudnya tidak memikirkan tentang *كَمْ الْأَرْضِ إِلَيْنَا* (bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu) alangkah banyaknya *كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ* (dari bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang baik) jenisnya? (Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008).

Pada kitab Tafsir al-Misbah diuraikan penjelasan tentang ayat tersebut, Kata (*ila*) ke pada firman-Nya di awal ayat ini: (*awalam yarn ila al-ardh*) “*apakah mereka tidak melihat ke bumi*”, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya. Kata (*zauj*) berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu. (Shihab, 2017)

Penafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa setelah mengajak manusia untuk belajar dari seluruh alam semesta, Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan mereka bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Dan jika mereka mempraktikkan kemusyrikan, apakah mereka memperhatikan berapa banyak jenis tanaman bermanfaat yang telah dikembangkan di muka bumi ini dan seberapa banyak manfaat tumbuhan bagi manusia? Bukankah itu bukti kekuasaan Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* dan belas kasihan-Nya yang tak berkesudahan bagi manusia? (Kemenag, 2019).

Pada ayat tersebut juga dapat diasumsikan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia bahwa banyak tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, tugas kita sebagai manusia adalah meneliti dan mengolah tumbuh-tumbuhan itu, baik yang terdapat pada daun, akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya karena tak satupun yang Allah SWT ciptakan dengan sia-sia (tidak ada manfaat). Salah satu tumbuhan yang diduga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.). kandungan metabolit skunder yang terdapat pada tumbuhan tersebut dapat dikaji secara ilmiah untuk dimanfaatkan sebagai alternative pengobatan dari bahan alam.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* berbicara mengenai khasiat sesuatu yang dikenal dalam farmasi menggunakan kata farmakognosi yaitu sifat-sifat tumbuh-tumbuhan, hewan dan beberapa mineral yang mempunyai khasiat obat. Akan tetapi, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak mengungkapkan bahwa tumbuhan, hewan atau mineral ini bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Selain itu, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga tidak mengungkapkan secara detail cara pengobatan dan takaran dosisnya secara pasti. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* hanya menjelaskan pada hadis



mengenai khasiat dari tumbuh- tumbuhan/buah-buahan, sesuatu yang didapatkan hewan atau mineral tertentu. Meskipun demikian Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga mengingatkan dan melarang berobat menggunakan sesuatu yang diharamkan pada Islam, terutama haram zatnya.

Menurut Syaikh Muhammad Ash-Shayim (2006), tumbuhan menjadi bahan obat yang sangat populer disamping bahan alam lainnya seperti madu dan telur dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Saw., beliau sering menggunakan tumbuhan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dijadikan oleh Allah Swt. sebagai makanan dan obat penyembuh yang sering dicontohkan dalam pengobatan ala Rasulullah Muhammad SAW (thibbun nabawi) diantaranya adalah: minyak zaitun, bawang putih, bawang merah, buah delima, buah labu dan gandum. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya agar mau berusaha mencari obat ketika tubuh sedang sakit, karena itu merupakan bentuk dari rasa sabar yang dicontohkan beliau, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis muslim No.4084 :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بِرَأْيِ اللَّهِ

Artinya :

“Semua penyakit ada obatnya. Jika diantara obat dan penyakitnya sudah tepat, maka (penyakit) akan sembuh dengan izin Allah SWT”. (Hadis Muslim No.4084)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memberikan suatu penyakit pasti memiliki penawar (obat). Mengisyaratkan manusia untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap sembuhnya seseorang dari suatu penyakit pada dasarnya Allah SWT yang menyembuhkan, oleh karena itu Allah SWT menghendaki agar kiranya mempelajari pengobatan sesuai ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati, untuk memperoleh obat yang tepat untuk setiap penyakit tersebut dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar setiap dapat diketahui



efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya mempunyai manfaat, salah satunya tumbuh-tumbuhan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan yaitu mengembangkannya menjadi sebuah obat. Pengujian obat bertujuan untuk mencari solusi terhadap berbagai penyakit yang diderita umat manusia. Dengan demikian, pengujian obat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. demi tercapainya maksud dari perobatan yang diperintahkan (Fahmi, 2021).

Dari tafsiran-tafsiran hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut dalam meningkatkan kesehatan manusia dimana khasiatnya dapat mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa syukur dan yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.

Jadi, apabila dipelajari dan diteliti semua ciptaan Allah Swt. akan memberikan pengetahuan bagi manusia. Akan tetapi mereka yang tidak percaya adanya pencipta alam ini, membuat semua tanda-tanda ke-Esa-an dan kekuasaan Allah di alam ini tidak akan bermanfaat baginya meskipun telah diperingatkan oleh para nabi dan rasul. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, yang tidak percaya akan adanya Allah Swt. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang berada di seluruh alam semesta ini adalah beriman

kepada Allah Swt.

Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* memberikan kesembuhan dan Kesehatan kepada umat-Nya. Yang dimana, bentuk-bentuk pengobatan didasari oleh ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian dan eksperimen ilmiah. Tumbuhan yang banyak manfaatnya sering digunakan sebagai obat sehingga perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam terhadap tumbuhan. Bukan berarti tumbuhan dapat menyembuhkan tanpa adanya izin Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala*. Islam menjelaskan bahwa semua ciptaan Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini sangat sejalan dengan ajaran islam dalam hal mengambil hikmah dari penciptaan tumbuhan tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) sehingga dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia sebagai penyembuh berbagai penyakit.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini termasuk jenis penelitian metode kuantitatif untuk mengetahui uji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) terhadap mencit (*Mus musculus*).

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksperimental berupa pengujian antiinflamasi, analgesik dan antipiretik pada ekstrak tobo-tobo dengan menggunakan mencit sebagai bahan analisis.

#### ***C. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melakukan proses ekstraksi sampel dan Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melakukan uji aktivitas antiinflamasi, analgesik dan antipiretik ekstrak tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.)

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Maret-Juni 2023 .

#### ***D. Populasi dan Sampel***

##### **1) Populasi**

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tumbuhan tobo-tobo yang diperoleh dari Romangpolong, Sumbo opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

## **2) Sampel**

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) dari daun, buah, batang, kulit batang dan akar.

### **E. Prosedur Kerja**

#### **1. Alat dan Bahan**

##### **a. Alat**

Alat yang di gunakan yaitu seperangkat alat refluks dan maserasi, kanula, mortir dan alu, rotary evaporator, syringe, timbangan analitik, timbangan hewan, stopwatch, termometer rektal, pletismometer, hotplate, sarung tangan dan masker.

##### **b. Bahan**

Bahan yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : daun, buah, batang, kulit batang, akar tobo-tobo, mencit, air suling, metanol, larutan pepton 5%, larutan karagenan 1%, larutan asam asetat 0,5%, tablet paracetamol 500 mg, tablet natrium diklofenak 50 mg, NaCMC 0,5%

#### **2. Penyiapan Sampel**

##### **a. Pengambilan Sampel**

Sampel yang diambil pada penelittian adalah tumbuhan tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) yang diambil di Romangpolong, Kecamatan Sumbo opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

##### **b. Pengolahan Sampel**

Bagian-bagian tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F.) yang telah dipanen selanjutnya disortasi basah dan dilakukan pencucian menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel, kemudian dilakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan dan dilakukan perajangan. Setelah itu, dimasukkan ke dalam lemari pengering selama beberapa hari hingga menjadi simplisia. tobo-tobo yang telah dikeringkan kemudian dibuat hingga

halus menggunakan blender.

### **c. Ekstraksi Sampel**

Sampel merupakan koleksi dari laboratorium UIN Alauddin Makassar, yang telah melalui proses pengeringan dan ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit batang di ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sedangkan bagian batang dan akar di ekstraksi menggunakan metode refluks. Proses ekstraksi dapat dilihat pada lampiran. Filtrat yang dihasilkan dari kedua metode ekstraksi tersebut diubah menjadi ekstrak kental dengan cara diuapkan dalam rotary evaporator pada suhu 45-50°C.

## **3) Penyiapan Bahan**

### **a. Pembuatan Suspensi NaCMC 0,5%**

Suspensi NaCMC dibuat dengan cara ditimbang 0,25 gram NaCMC kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang berisi 50 mL aquades panas (suhu 70°C) dan didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh massa yang transparan, diaduk lalu diencerkan dengan aquades hingga 100 mL (Anief, 2019).

### **b. Pembuatan Suspensi Ekstrak 1,2%**

Ditimbang 0,12 gram ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo sesuai dengan dosis pemberian setiap pengujian pada lampiran 5, kemudian digerus di dalam lumpang, lalu disuspensikan dengan NaCMC 0,5% sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan dicukupkan volumenya hingga 10 mL (Jannah, 2021).

### **c. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak 0,04%**

Ditimbang tablet natrium diklofenak sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung berat rata-rata tiap tablet. Tablet dimasukkan ke dalam lumpang dan digerus hingga halus. Hitung berat serbuk natrium diklofenak yang akan

digunakan lalu masukkan kedalam lumpang pada lampiran 7 dan disuspensikan dengan NaCMC 0,5% sambil digerus hingga homogen. Kemudian sebanyak 4 mg masukkan ke dalam labu tentukur 10 mL kemudian dicukupkan volumenya dengan suspensi NaCMC 0,5% hingga tanda batas.

**d. Pembuatan Suspensi Paracetamol 0,04%**

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 588,4 mg. dimasukkan semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak 4 mg yang disuspensikan dalam larutan NaCMC 0,5% sebanyak 10 ml seperti pada lampiran 6.

**e. Pembuatan Suspensi Karagenan 1%**

Karagenan ditimbang sebanyak 0,1 gram, ditambah larutan aqua pro injection 5 ml, dihomogenkan kemudian dicukupkan volumenya hingga 10 ml.

**f. Pembuatan Larutan Pepton 5%**

Larutan pepton 5% dibuat dengan menimbang 0,5 gram pepton kemudian dilarutkan dalam 10 ml aqua pro injection.

**g. Pembuatan Larutan Asam Asetat 0,5%**

Larutan uji asam asetat 0,5% dibuat dengan mengencerkan asam asetat glasial 1 ml dalam 100 ml aqua pro injection pada labu ukur. Volume asam asetat yang akan diberikan pada mencit ialah 0,05 mL/kgBB.

**4. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Coba**

Hewan uji yang digunakan yaitu mencit (*Mus musculus*) jantan yang sehat sebanyak 35 ekor dengan bobot badan 20-30 gram. Sebelumnya mencit diaklimatisasi selama 1 minggu yang bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana laboratorium dan untuk menghilangkan stres akibat transportasi.

Mencit dibagi ke dalam 7 kelompok perlakuan, tiap kelompok terdiri dari 5 ekor mencit yang ditentukan secara acak. Masing-masing kelompok tersebut adalah :

- a. Kelompok 1 : diberi perlakuan pemberian Na-CMC 0,5% sebagai kontrol negatif.
- b. Kelompok 2 : kontrol positif pada pengujian antiinflamasi dan analgesik menggunakan natrium diklofenak dengan perlakuan pemberian per oral dosis 0,2 mg/30 gram BB mencit sedangkan pada pengujian antipiretik menggunakan paracetamol dengan perlakuan pemberian per oral dosis 2 mg/30 gram BB mencit.
- c. Kelompok 3 : diberi perlakuan pemberian ekstrak daun tobo-tobo (*Ficus septica Burm. F*) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit.
- d. Kelompok 4 : diberi perlakuan pemberian ekstrak batang tobo-tobo (*Ficus septica Burm. F*) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit.
- e. Kelompok 5 : diberi perlakuan pemberian ekstrak kulit batang tobo-tobo (*Ficus septica Burm. F*) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit.
- f. Kelompok 6 : diberi perlakuan pemberian ekstrak akar tobo-tobo (*Ficus septica Burm. F*) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit.
- g. Kelompok 7 : diberi perlakuan pemberian ekstrak buah tobo-tobo (*Ficus septica Burm. F*) per oral dengan dosis 4 mg/gram BB mencit

## **5. Pengujian Aktivitas**

### **a. Antiinflamasi**

Pada pengujian aktivitas antiinflamasi masing-masing hewan ditimbang dan diberi tanda pada kaki kirinya. Kemudian diukur volume dan diameter kaki kiri mencit dengan menggunakan Pletismometer dan jangka sorong. Data yang diperoleh dicatat sebagai volume awal ( $V_0$ ) yaitu volume kaki sebelum diberi obat dan diinduksi dengan larutan karagenan. Masing-masing mencit diberi suspensi

bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Satu jam kemudian kepada masing-masing kelompok perlakuan diinduksi secara subplantar dengan 0,01 ml/KgBB larutan karagenan 1%, setelah 30 menit dilakukan pengukuran dengan pletismometer. Dicatat volume kaki mencit ( $V_t$ ) sebagai volume kaki setelah diberi obat dan diinduksi dengan larutan karagenan. Pengukuran dilakukan setiap menit 15', 30', 60' 120' 240' 360'. Kemudian dilakukan perhitungan total perubahan edema dan persen inhibisi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Total Perubahan Edema} = \frac{V_t - V_0}{V_0}$$

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{a-b}{a} \times 100$$

Keterangan :  $V_t$  = volume setelah diinduksi  
 $V_0$  = volume sebelum diinduksi  
 $a$  = total perubahan edema kontrol negatif  
 $b$  = total perubahan edema kelompok uji

## **b. Analgesik**

### **1) Metode *Hotplate Test***

Pada pengujian aktivitas analgesik dengan menggunakan metode *hotplate* yaitu pada masing-masing mencit ditimbang berat badannya dan diberi suspensi bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Kemudian distimulasi nyerinya dengan menggunakan *hot plate* dengan suhu 50°C. Kemudian diukur waktu reaksi dari perlakuan pertama yang ditimbulkan dimana respon yang diamati adalah menjilati telapak kaki atau melompat. Pengukuran dilakukan setiap menit 15', 30', 60' 120' 240' 360'. Kemudian hitung total respon nyeri dan persen inhibisi dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{a-b}{a} \times 100$$

Keterangan :  $a$  = total respon nyeri kontrol negatif  
 $b$  = total respon nyeri kelompok uji



## 2) Metode *Writhing Test*

Pada pengujian aktivitas analgesik dengan menggunakan metode geliat yaitu pada masing-masing mencit ditimbang berat badannya dan diberi suspensi bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya. Kemudian diinduksi nyerinya secara intraperitoneal dengan 0,05 ml/KgBB larutan asam asetat 0,5%. Kemudian diukur waktu reaksi dari perlakuan pertama yang ditimbulkan dimana respon yang diamati adalah geliat pada mencit. Pengukuran dilakukan setiap menit 15', 30', 60' 120' 240' 360'. Kemudian hitung total respon nyeri dan persen inhibisi dengan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{a-b}{a} \times 100$$

Keterangan : a = total geliat kontrol negatif  
b = total geliat kelompok uji

### c. Antipiretik

Pada pengujian aktivitas antipiretik masing-masing hewan ditimbang berat badannya dan diukur suhu rektal awal mencit. Masing-masing mencit diberi suspensi bahan uji secara oral sesuai dengan kelompoknya, kemudian diinduksi demam menggunakan pepton 5% 0,5 ml/KgBB mencit secara intraperitoneal. Setelah 30 menit suhu rektal mencit kemudian diukur kembali dengan menggunakan termometer digital setiap menit 60', 120', 180' 240' 300' 360'. Kemudian dilakukan perhitungan total temperatur mencit dan persen inhibisi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Total Temperatur Mencit} = \frac{T1-T0}{T0}$$

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{a-b}{a} \times 100$$

Keterangan : T1 = temperatur setelah diinduksi  
T0 = temperatur sebelum diinduksi  
a = total perubahan temperatur kontrol negatif  
b = total perubahan temperatur kelompok uji

#### ***F. Analisis Data***

Data yang diperoleh selanjutnya di dianalisis menggunakan sebuah program komputer statistik yaitu GraphPad Prism dan SPSS. Jika rata-rata data uji antiinflamasi, antipiretik dan analgesik telah memenuhi persyaratan yaitu nilai  $p > 0,05$  maka dapat dilakukan uji parametrik one-way Analysis of Variance (ANOVA) dengan tingkat kepercayaan 95 %. Uji ini dilakukan untuk membandingkan rata-rata kelompok, apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai  $p < 0,05$  maka dilanjutkan uji Uji Tukey, uji ini digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji Analisis Ragam di lakukan. Jika probabilitas ( $\text{sig}$ )  $< 0,05$  maka ditolak  $H_0$  ditolak, artinya ada perbedaan yang signifikan.



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**A. Hasil Penelitian**

**1. Hasil Pengamatan Antiinflamasi**


Tabel 1. Hasil Analisis Uji Antiinflamasi Ekstrak Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F)

No	Kelompok Perlakuan	Rata-Rata Volume Edema (ml)								Total Perubahan Edema (ml)	Persen Inhibisi (%) ± SD
		V0	Vt	15'	30'	60'	120'	240'	360'		
1.	NaCM C (-)	0,13± 0,01 <sup>ab</sup>	0,19± 0,01 <sup>c</sup>	0,20± 0,01 <sup>c</sup>	0,21± 0,01 <sup>c</sup>	0,22± 0,01 <sup>d</sup>	0,21± 0,01 <sup>c</sup>	0,21± 0,01 <sup>d</sup>	0,20± 0,01 <sup>c</sup>	4,46 ± 0,40 <sup>c</sup>	0±0
2.	NaDik (+)	0,13± 0,01 <sup>abc</sup>	0,18± 0,01 <sup>bc</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,16± 0,02 <sup>ab</sup>	0,16± 0,01 <sup>abc</sup>	0,16± 0,02 <sup>b</sup>	0,15± 0,01 <sup>bc</sup>	0,14± 0,02 <sup>b</sup>	1,37 ± 0,26 <sup>a</sup>	69,28± 4,17 <sup>b</sup>
3.	Daun	0,12± 0,01 <sup>ab</sup>	0,16± 0,01 <sup>a</sup>	0,16± 0,01 <sup>a</sup>	0,15± 0,01 <sup>a</sup>	0,15± 0,01 <sup>a</sup>	0,14± 0,01 <sup>a</sup>	0,13± 0,01 <sup>a</sup>	0,12± 0,01 <sup>a</sup>	1,09 ± 0,48 <sup>a</sup>	75,47± 8,75 <sup>b</sup>
4.	Batang	0,15± 0,01 <sup>c</sup>	0,18± 0,01 <sup>abc</sup>	0,18± 0,01 <sup>b</sup>	0,17± 0,01 <sup>b</sup>	0,17± 0,01 <sup>c</sup>	0,16± 0,01 <sup>b</sup>	0,16± 0,01 <sup>c</sup>	0,15± 0,01 <sup>b</sup>	1,50 ± 0,54 <sup>a</sup>	66,32± 12,75 <sup>b</sup>
5.	Kulit Batang	0,14± 0,01 <sup>bc</sup>	0,18± 0,01 <sup>abc</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,17± 0,01 <sup>b</sup>	0,16± 0,01 <sup>bc</sup>	0,16± 0,02 <sup>b</sup>	0,15± 0,01 <sup>c</sup>	0,15± 0,01 <sup>b</sup>	1,46 ± 0,80 <sup>a</sup>	67,27± 18,73 <sup>b</sup>
6.	Akar	0,12± 0,01 <sup>a</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,16± 0,01 <sup>bc</sup>	0,16± 0,01 <sup>b</sup>	0,16± 0,01 <sup>c</sup>	0,16± 0,01 <sup>b</sup>	2,59 ± 0,75 <sup>b</sup>	41,93± 18,88 <sup>a</sup>
7.	Buah	0,13± 0,01 <sup>abc</sup>	0,18± 0,01 <sup>abc</sup>	0,17± 0,01 <sup>ab</sup>	0,16± 0,01 <sup>ab</sup>	0,15± 0,01 <sup>ab</sup>	0,14± 0,01 <sup>a</sup>	0,14± 0,01 <sup>a</sup>	0,12± 0,01 <sup>a</sup>	0,93 ± 0,13 <sup>a</sup>	79,22± 4,46 <sup>b</sup>


Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan pada P<0,05




Gambar 6. Grafik Rata-Rata Volume Edema Pada Mencit Terhadap Aktivitas Antiinflamasi




Gambar 8. Grafik Volume Edema Pada Menit 15'




Gambar 7. Grafik Volume Edema Pada Menit 30'




Gambar 10. Grafik Volume Edema Pada Menit 60'



Gambar 9. Grafik Volume Edema Pada Menit 120'



Gambar 11. Grafik Volume Edema Pada Menit 240'



Gambar 12. Grafik Volume Edema Pada Menit 360'


## 2. Hasil Pengamatan Analgesik

### a. Metode *Hotplate Test*

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode *Hotplate Test* Ekstrak Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F)


No	Kelompok Perlakuan	Jumlah Respon Nyeri (Rata-Rata)						Total	Persen Inhibisi (%) ± SD
		15'	30'	60'	120'	240'	360'		
1.	NaCMC (-)	27,00±6,08 <sup>cb</sup>	32,33±7,57 <sup>b</sup>	39,33±11,37 <sup>c</sup>	47,33±7,20 <sup>c</sup>	68,67±5,86 <sup>d</sup>	70,67±5,03 <sup>c</sup>	285,33±31,97 <sup>e</sup>	0±0
2.	NaDik (+)	28,33±5,03 <sup>c</sup>	20,00±4,36 <sup>a</sup>	19,00±4,58 <sup>b</sup>	29,00±3,00 <sup>b</sup>	26,33±4,73 <sup>c</sup>	29,67±7,51 <sup>b</sup>	152,33±9,24 <sup>c</sup>	46,61±8,82 <sup>b</sup>
3.	Daun	26,33±2,89 <sup>bc</sup>	18,67±3,21 <sup>a</sup>	14,67±3,79 <sup>ab</sup>	9,67±5,51 <sup>a</sup>	17,00±1,73 <sup>b</sup>	17,00±1,73 <sup>a</sup>	103,33±6,81 <sup>b</sup>	63,79±2,13 <sup>c</sup>
4.	Batang	20,33±4,51 <sup>ab</sup>	20,33±2,89 <sup>a</sup>	17,33±2,08 <sup>b</sup>	23,00±2,00 <sup>b</sup>	14,00±2,65 <sup>b</sup>	19,67±3,06 <sup>a</sup>	114,67±5,03 <sup>b</sup>	59,81±2,68 <sup>c</sup>
5.	Kulit Batang	15,67±2,08 <sup>a</sup>	18,33±4,04 <sup>a</sup>	16,33±5,68 <sup>ab</sup>	25,33±3,21 <sup>b</sup>	14,67±1,53 <sup>b</sup>	19,00±4,58 <sup>a</sup>	109,33±8,50 <sup>b</sup>	61,68±6,78 <sup>c</sup>
6.	Akar	29,33±1,53 <sup>c</sup>	46,00±3,61 <sup>c</sup>	34,00±1,00 <sup>c</sup>	23,33±2,08 <sup>b</sup>	27,33±1,15 <sup>c</sup>	23,00±3,00 <sup>a</sup>	183,00±4,36 <sup>d</sup>	35,86±6,00 <sup>a</sup>
7.	Buah	14,67±2,08 <sup>a</sup>	16,33±3,51 <sup>a</sup>	7,00±1,73 <sup>a</sup>	8,33±2,31 <sup>a</sup>	3,67±0,58 <sup>a</sup>	15,00±2,65 <sup>a</sup>	65,00±12,29 <sup>a</sup>	77,22±1,76 <sup>d</sup>

Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan pada  $P < 0,05$




Gambar 13. Grafik Rata-Rata Jumlah Respon Nyeri Pada Mencit Terhadap


## Aktivitas Analgesik




Gambar 15. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 15'




Gambar 14. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 30'




Gambar 17. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 60'



Gambar 16. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 120'



Gambar 19. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 240'



Gambar 18. Grafik Jumlah Respon Nyeri Pada Menit 360'


**b. Metode Writhing Test**

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Analgesik Metode *Writhing Test* Ekstrak Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F)


No	Kelompok Perlakuan	Jumlah Geliat (Rata-Rata)						Total	Persen Inhibisi (%) ± SD
		15'	30'	60'	120'	240'	360'		
1.	NaCMC (-)	22,67±3,79 <sup>cd</sup>	24,00±1,00 <sup>c</sup>	11,67±1,53 <sup>b</sup>	12,33±2,52 <sup>b</sup>	6,00±1,00 <sup>cd</sup>	5,67±0,58 <sup>c</sup>	82,33±6,81 <sup>d</sup>	0±0
2.	NaDik (+)	21,33±1,53 <sup>bc</sup>	17,67±0,58 <sup>d</sup>	11,67±1,53 <sup>b</sup>	8,33±0,58 <sup>b</sup>	7,00±1,73 <sup>d</sup>	0,67±0,58 <sup>a</sup>	66,67±1,53 <sup>c</sup>	19,03±5,73 <sup>a</sup>
3.	Daun	13,67±1,15 <sup>a</sup>	11,00±1,00 <sup>a</sup>	7,67±1,15 <sup>a</sup>	4,33±0,58 <sup>a</sup>	1,67±0,58 <sup>ab</sup>	0,33±0,58 <sup>a</sup>	38,67±3,21 <sup>a</sup>	53,04±5,73 <sup>c</sup>
4.	Batang	17,67±1,53 <sup>ab</sup>	14,67±1,15 <sup>c</sup>	10,00±1,00 <sup>a</sup>	8,67±1,15 <sup>ab</sup>	4,00±1,00 <sup>bc</sup>	2,00±1,00 <sup>b</sup>	57,00±3,00 <sup>b</sup>	30,77±4,03 <sup>b</sup>
5.	Kulit Batang	15,00±2,65 <sup>a</sup>	19,33±1,53 <sup>d</sup>	10,00±1,00 <sup>ab</sup>	8,67±1,15 <sup>ab</sup>	3,67±1,53 <sup>bc</sup>	1,00±1,00 <sup>ab</sup>	57,67±2,52 <sup>b</sup>	29,96±4,52 <sup>b</sup>
6.	Akar	26,00±1,00 <sup>d</sup>	15,00±1,00 <sup>bc</sup>	12,67±2,52 <sup>b</sup>	6,00±2,65 <sup>bc</sup>	2,67±2,08 <sup>ab</sup>	0,33±0,58 <sup>ab</sup>	62,67±6,51 <sup>bc</sup>	23,89±3,06 <sup>ab</sup>
7.	Buah	15,33±2,08 <sup>a</sup>	11,67±2,52 <sup>ab</sup>	8,00±1,00 <sup>a</sup>	2,67±0,58 <sup>a</sup>	0,33±0,58 <sup>a</sup>	0,00±0,00 <sup>a</sup>	38,00±3,61 <sup>a</sup>	53,85±4,12 <sup>ab</sup>




Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan pada  $P < 0,05$




Gambar 20. Grafik Rata-Rata Geliat Pada Mencit Terhadap Aktivitas Analgesik




Gambar 22. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 15'




Gambar 21. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 30'




Gambar 23. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 60'



Gambar 24. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 120'



Gambar 26. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 240'




Gambar 25. Grafik Jumlah Geliat Pada Menit 360'

### 3. Hasil Pengamatan Antipiretik


Tabel 4. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm. F)

No	Kelompok Perlakuan	Rata-Rata Temperatur Mencit (°C)								Total Perubahan Temperatur Mencit (°C)	Persen Inhibisi (%) ± SD
		T0	T1	60'	120'	180'	240'	300'	360'		
1.	NaCMC (-)	37,70±0,36 <sup>c</sup>	39,93±0,42 <sup>b</sup>	39,70±0,20 <sup>d</sup>	39,40±0,26 <sup>d</sup>	38,80±1,00 <sup>d</sup>	38,47±0,15 <sup>d</sup>	37,83±0,40 <sup>c</sup>	37,60±0,40 <sup>c</sup>	0,21±0,07 <sup>ab</sup>	0±0
2.	NaDik (+)	36,23±0,15 <sup>ab</sup>	38,33±0,21 <sup>a</sup>	38,73±0,21 <sup>bc</sup>	38,17±0,21 <sup>bc</sup>	37,63±0,15 <sup>c</sup>	37,20±0,20 <sup>c</sup>	36,80±0,10 <sup>b</sup>	36,40±0,17 <sup>a</sup>	0,27±0,03 <sup>b</sup>	-27,73±32,15 <sup>a</sup>
3.	Daun	36,50±0,36 <sup>b</sup>	38,30±0,17 <sup>a</sup>	37,93±0,15 <sup>a</sup>	37,67±0,15 <sup>ab</sup>	37,27±0,25 <sup>b</sup>	36,37±0,12 <sup>a</sup>	36,30±0,20 <sup>a</sup>	36,0±0,10 <sup>a</sup>	0,12±0,09 <sup>a</sup>	42,69±25,00 <sup>ab</sup>
4.	Batang	36,83±0,32 <sup>b</sup>	38,93±0,42 <sup>a</sup>	38,90±0,75 <sup>c</sup>	38,73±0,57 <sup>cd</sup>	38,53±0,25 <sup>d</sup>	38,17±0,21 <sup>d</sup>	37,70±0,17 <sup>c</sup>	37,03±0,51 <sup>b</sup>	0,28±0,02 <sup>b</sup>	-32,54±6,68 <sup>bc</sup>
5.	Kulit Batang	35,80±0,53 <sup>a</sup>	38,60±0,10 <sup>a</sup>	38,20±0,10 <sup>ab</sup>	37,67±0,15 <sup>ab</sup>	36,60±0,10 <sup>a</sup>	36,83±0,21 <sup>b</sup>	36,37±0,15 <sup>a</sup>	35,87±0,31 <sup>a</sup>	0,27±0,10 <sup>b</sup>	-28,37±16,62 <sup>abc</sup>
6.	Akar	37,90±0,20 <sup>c</sup>	38,90±0,62 <sup>a</sup>	38,83±0,38 <sup>bc</sup>	38,50±0,56 <sup>c</sup>	38,60±0,17 <sup>d</sup>	38,37±0,31 <sup>d</sup>	38,30±0,20 <sup>d</sup>	38,57±0,15 <sup>d</sup>	0,13±0,04 <sup>a</sup>	39,57±66,09 <sup>c</sup>
7.	Buah	36,57±0,15 <sup>b</sup>	38,47±0,25 <sup>a</sup>	38,23±0,25 <sup>abc</sup>	37,00±0,61 <sup>a</sup>	37,00±0,10 <sup>ab</sup>	36,63±0,15 <sup>ab</sup>	36,70±0,20 <sup>ab</sup>	36,1±0,30 <sup>a</sup>	0,11±0,04 <sup>a</sup>	45,23±16,74 <sup>ab</sup>


Keterangan : Notasi a, b, c, d, e pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang signifikan pada P<0,05




Gambar 27. Grafik Rata-Rata Demam Pada Mencit Terhadap Aktivitas Antipiretik




Gambar 29. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 60'




Gambar 28. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 120'




Gambar 31. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 180'



Gambar 30. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 240'



Gambar 33. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 300'



Gambar 32. Grafik Suhu Rektal Pada Menit 360'

## B. Pembahasan

Pada penelitian ini sampel yang digunakan merupakan koleksi dari laboratorium UIN Alauddin Makassar, yang telah melalui proses pengeringan dan ekstraksi. Bagian daun, buah, dan kulit batang di ekstraksi menggunakan metode maserasi. Sedangkan bagian batang dan akar di ekstraksi dengan metode refluks menggunakan pelarut metanol. Metanol dikenal sebagai pelarut polar, kelebihan pelarut metanol adalah dapat melarutkan senyawa-senyawa yang bersifat polar seperti golongan fenol (asam fenolik, flavonoid, alkaloid, tannin dan lignin). (Yuliarni et al., 2022). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Mulyana (2021) membuktikan bahwa hasil fitokimia ekstrak metanol tanaman tobo-tobo terbukti mengandung senyawa metabolit sekunder salah satunya senyawa flavonoid (Mulyana, 2021).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) sebagai uji aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik ekstrak metanol bagian-bagian tanaman tobo-tobo. Hewan coba dibagi dalam 7 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 ekor hewan coba. Tujuan dilakukannya replikasi sebanyak 5 kali adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengujian. Ketika hasil dari replikasi menunjukkan hasil yang konsisten, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang baik (Umar, 2014).

Hewan coba atau mencit yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit jantan dengan berat badan 20-30 gram, karena mencit (*Mus musculus*) jantan kondisi biologisnya lebih stabil dibandingkan dengan mencit betina yang kondisi biologisnya dipengaruhi masa siklusnya (estrus). Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetik, atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengelolaan, di samping faktor ekonomis, mudah diperoleh, dan mampu memberikan reaksi biologis yang mirip pada reaksi biologis manusia (Zapino & Fitri, 2022).

### **1. Antiinflamasi**

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antiinflamasi ialah metode edema buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan karagenan. Karagenan dipilih sebagai penginduksi karena dapat menyebabkan peradangan dalam waktu yang relatif singkat, tidak meninggalkan bekas, menunjukkan respon yang lebih sensitif terhadap obat anti-inflamasi daripada yang mengandung senyawa stimulan lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh karagenan ialah perkembangan pembentukan radang lebih lambat, sehingga jaringan dapat normal kembali dalam waktu 1-2 hari. Peradangan yang disebabkan oleh karagenan terlihat jelas dan

tidak menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan di sekitar peradangan (Zakiyah, 2017). Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-jam pertama dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan edema. Fase kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam- 2,5 jam. Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelahnya. Kemudian edema berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan ditunggu selama 1 jam. Hal ini karena 1 jam setelah pemberian karagenan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian diukur volume kaki mencit setelah diinduksi (Dermiati et al., 2018). Pada penelitian ini karagenan 1% dilarutkan dalam larutan *aqua pro injection* sebanyak 0,1 mL pada telapak kaki mencit secara intraplantar. Efek penghambatan pembentukan edema dimulai dengan pengukuran volume udem pada telapak kaki mencit pada selang waktu tertentu menggunakan alat pletismometer air raksa dengan cara telapak kaki mencit yang telah ditandai sebatas mata kaki dimasukkan (sampai tanda) pada pletismometer (Widianti, 2017)

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $P < 0,05$ ,  $P < 0,01$ ,  $P < 0,001$ , dan  $P < 0,0001$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada lampiran 9 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 7 terlihat bahwa pada menit ke-

15 semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC (kontrol negatif) dengan simbol (\*\*) dan memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok Natrium Diklofenak (kontrol positif), sedangkan pada kelompok batang hanya memiliki simbol (\*) dalam hal ini kelompok batang memiliki efek yang rendah dibandingkan dengan kelompok uji yang lain. Pada gambar 8 dan 9 terlihat bahwa menit ke-30 sampai menit ke-60 semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol (\*\*\*\*) dalam hal ini terjadi kenaikan efek penurunan volume edema dan pada kelompok Natrium Diklofenak juga memiliki efek yang tidak signifikan dengan semua kelompok uji. Pada gambar 10, 11 dan 12 terlihat bahwa menit ke-120 sampai menit ke-360 semua kelompok uji juga memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol (\*\*\*\*) dalam hal ini efek dari kelompok uji masih bertahan sampai pada menit ke-360. Pada menit ke-120 kelompok Natrium Diklofenak (\*), kulit batang (\*) dan akar (\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok daun dalam hal ini kelompok daun memiliki efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketiga kelompok uji tersebut. Pada menit ke-240 kelompok akar (\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok daun dalam hal ini daun memiliki efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok akar. Pada menit ke-360 kelompok Natrium Diklofenak (\*), batang (\*), kulit batang (\*), dan akar (\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok daun dan buah sedangkan kelompok buah pada daun memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dalam hal ini efek kelompok daun dan buah tidak jauh berbeda. Penurunan volume edema pemberian larutan uji tersebut disebabkan karena adanya perbedaan berat badan pada hewan coba yang akan menyebabkan perbedaan kenaikan volume cairan pada tabung. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menyesuaikan berat badan hewan coba pada



setiap kelompok untuk menghindari terjadinya perbedaan yang signifikan (Dermiati et al., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo mampu menghambat pembentukan radang pada telapak kaki mencit yang diakibatkan oleh induksi karagenan. Penurunan volume radang pada kaki mencit diduga karena aktivitas dari senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak tanaman tobo-tobo yaitu senyawa flavonoid dimana salah satu senyawa yang diduga memberikan aktivitas antiinflamasi, hasil penelitian yang sama juga dilakukan oleh Arief et al., (2019), bahwa senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak tanaman tobo-tobo secara khusus mampu menghentikan pembentukan dan pengeluaran zat-zat yang menyebabkan peradangan akibat reaksi alergi dan dengan menggunakan konsentrasi 1,5% memiliki efek sebagai antiinflamasi (Arief et al., 2019). Senyawa flavonoid dapat menghambat inflamasi dengan cara menghambat enzim siklooksigenase. Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan kepada hewan coba, memiliki efek antiinflamasi yang dihasilkan, sehingga volume radang pada hewan coba semakin kecil.

## **2. Analgesik**

### **a. Metode *Hotplate Test***

Metode uji yang digunakan pada pengujian analgesik yaitu metode *hotplate*, pengujian dilakukan dengan *hotplate* karena dapat diterapkan berulang kali pada hewan yang sama dalam waktu singkat tanpa menyebabkan cedera jaringan. Prosedur *hotplate* mampu menilai reaktivitas nyeri yang lebih baik

dibanding prosedur lainnya karena mampu menggambarkan nyeri pada manusia yang dimediasi secara supraspinal dan modulasi respon tersebut berbeda dengan refleks menghindar (Hestehave et al., 2019).

Pada penelitian ini masing-masing mencit ditimbang berat badannya, hal ini bertujuan untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, setelah diberi suspensi bahan uji secara oral kemudian diletakkan pada *hotplate* dengan menggunakan suhu 50°C. Kemudian dilakukan pengamatan kurangnya respon nyeri terhadap mencit. Jumlah respon nyeri yang ditunjukkan mencit menandakan kuat lemahnya nyeri yang dirasakan akibat dari stimulasi nyeri pada *hotplate*. Semakin sedikit jumlah respon nyeri yang ditunjukkan oleh mencit maka dapat diartikan semakin lemah pula nyeri yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek analgesik yang dihasilkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total kumulatif respon nyeri pada kelompok kontrol negatif paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kelompok kontrol negatif tidak menggunakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana pada kelompok kontrol negatif tersebut hanya digunakan NaCMC yang bersifat sebagai pembawa yang tidak memberikan efek apapun. Selain itu terdapat penurunan jumlah respon nyeri yang nyata dari kelima kelompok pemberian sampel yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan pemberian bahan uji berupa ekstrak tanaman tobo-tobo dapat mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat stimulan dari *hotplate* yang ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah respon nyeri pada mencit (Lara et al., 2021).

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $P < 0,05$ ,  $P < 0,01$ ,  $P < 0,001$ , dan  $P < 0,0001$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada

lampiran 11 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian NaCMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 14 terlihat bahwa pada menit ke-15 semua kelompok belum memiliki efek penurunan respon nyeri. Pada gambar 15 menit ke-30 kelompok NaCMC (kontrol negatif) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok buah dengan simbol (\*\*). dan kelompok Natrium Diklofenak (kontrol positif) memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok uji yang lain, dalam hal ini kelompok buah pada menit ke-30 sudah memiliki efek penurunan respon nyeri. Pada gambar 16 menit ke-60 kelompok Natrium Diklofenak (\*), daun (\*\*\*), batang (\*), kulit(\*\*), dan buah (\*\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok akar memiliki efek yang tidak signifikan, dalam hal ini kelompok akar pada menit ke-60 belum memiliki efek penurunan respon nyeri, kemudian pada kelompok daun dan buah memiliki efek yang terbaik dengan mempunyai simbol (ns). Pada gambar 17 menit ke-120 semua kelompok memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol (\*\*\*\*) dan (\*\*\*), tetapi pada kelompok Natrium Diklofenak (\*\*) dan akar (\*\*) juga memiliki efek yang signifikan dengan kelompok buah, dalam hal ini kelompok buah memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dengan kedua kelompok tersebut. Pada gambar 18 menit ke-240 semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol (\*\*\*\*), kemudian pada kelompok Natrium Diklofenak (\*\*) dan akar (\*) juga memiliki efek yang signifikan dengan kelompok buah, dalam hal ini kelompok buah memiliki efek yang lebih tinggi dan kelompok Natrium

Diklofenak yang memiliki efek yang terendah. Pada gambar 19 menit ke-360 kelompok daun (\*\*), batang (\*\*), kulit batang (\*\*), dan buah (\*\*), memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok Natrium Diklofenak memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal ini pada menit ke-360 kelompok Natrium Diklofenak sudah tidak memiliki efek penurunan respon nyeri.

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan senyawa flavonoid dari ekstrak tanaman tobo-tobo. Flavonoid berperan sebagai analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim siklooksigenase. Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan kepada hewan coba, memiliki efek analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah respon nyeri pada hewan coba semakin sedikit.

#### **b. Metode *Writhing Test***

Metode uji yang digunakan pada pengujian analgesik yaitu metode *writhing test*. *Writing test* merupakan salah satu metode kimia yang digunakan untuk menguji aktivitas analgesik suatu senyawa. Prinsip kerja dari metode ini adalah mengamati respon geliat yang terjadi karena pemberian rangsangan nyeri oleh suatu iritan. Geliat merupakan respon nyeri yang diperlihatkan oleh mencit yang ditandai dengan menariknya kedua kaki ke belakang dan menempelnya perut ke permukaan kandang (Lara et al., 2021).

Pemberian asam asetat 0,5% pada hewan percobaan yang digunakan sebagai penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat iritasi yang berat pada mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke belakang, meregang dan abdomen menyentuh dasar plate form. Nyeri tersebut diakibatkan

karena penurunan pH di rongga perut yang mengakibatkan terjadinya luka. Nyeri seperti ini termasuk nyeri dalaman (viseral) atau nyeri perut mirip sifat menekan dan disertai reaksi vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsang yang merangsang syaraf nyeri di daerah visceral terutama dalam rongga dada dan perut (Afrianti et al., 2015). Pemberian asam asetat dilakukan secara intraperitoneal, dikarenakan melalui rute ini absorpsi yang terjadi akan cepat dan konstan sehingga nyeri yang dihasilkan akan cukup lama, dengan waktu nyeri yang cukup lama ini maka geliat dapat terhitung selama 360 menit. Pengamatan geliat ini dilakukan setiap menit 15', 30', 60', 120', 240' dan 360' (Lara et al., 2021).

Pada penelitian ini kelompok kontrol hewan coba diberikan larutan NaCMC 0,5% untuk melihat pemulihan geliatan tanpa diberi obat sedangkan pembanding diberikan suspensi paracetamol yang merupakan obat yang lazim digunakan sebagai antipiretik dan analgetik pada masyarakat dan sudah dikonversikan untuk pemberian pada mencit. Pemberian sediaan dilakukan 5 menit sebelum diberi penginduksi. Hal ini bertujuan untuk melihat kerja dari ekstrak dalam memberikan efek proteksi terhadap rasa nyeri yang akan ditimbulkan oleh penginduksi, dan untuk menyembuhkan nyeri dengan menurunkan jumlah geliatan sampai sembuh dan menyesuaikan dengan pemakaian yang biasa dipakai oleh manusia.

Total geliat yang ditunjukkan mencit menandakan kuat lemahnya nyeri yang dirasakan akibat dari induksi asam asetat yang diberikan. Semakin sedikit total geliat yang ditunjukkan oleh mencit maka dapat diartikan semakin lemah pula nyeri yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek analgesik yang dihasilkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total kumulatif geliat pada kelompok kontrol negatif paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kelompok kontrol negatif tidak menggunakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri.

Dimana pada kelompok kontrol negatif tersebut hanya digunakan NaCMC yang bersifat sebagai pembawa yang tidak memberikan efek apapun. Selain itu terdapat penurunan total geliat yang nyata dari kelima kelompok pemberian sampel yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan pemberian bahan uji berupa ekstrak tobo-tobo dapat mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat pemberian asam asetat yang ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah geliat pada mencit (Lara et al., 2021).

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $P < 0,05$ ,  $P < 0,01$ ,  $P < 0,001$ , dan  $P < 0,0001$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada lampiran 10 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Natrium Diklofenak sebagai kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 21 terlihat bahwa pada menit ke-15 kelompok daun memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC (kontrol negatif) dengan simbol (\*) dan pada kelompok akar (\*) yang memiliki efek signifikan dengan kelompok daun kemudian pada kelompok Natrium Diklofenak (kontrol positif) memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal ini pada menit ke-15 kelompok daun dan akar sudah memiliki efek penurunan geliat tetapi kelompok daun yang memiliki efek yang terbaik serta kelompok uji lain belum memiliki efek. Pada gambar 22 menit ke-30 kelompok daun (\*\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dan pada kelompok uji lainnya memiliki efek yang tidak signifikan (ns), dalam hal ini pada menit ke-30

kelompok daun masih memiliki efek penurunan geliat. Pada gambar 23 menit ke-60 kelompok kulit batang (\*) dan buah (\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC, dalam hal ini pada menit ke-60 kelompok buah yang memiliki efek yang terbaik. Pada gambar 24 menit ke-120 kelompok buah (\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC, kemudian kelompok Natrium Diklofenak yang memiliki efek signifikan pada kelompok buah, dalam hal ini kelompok buah yang memiliki efek lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Natrium Diklofenak. Pada gambar 25 menit ke-240 kelompok daun (\*\*\*\*), batang (\*\*), kulit batang (\*\*), akar (\*\*) dan buah (\*\*\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada kelompok daun (\*\*) dan buah (\*\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok Natrium Diklofenak, dalam hal ini kelompok buah memiliki efek yang terbaik dibandingkan dengan kelompok daun. Pada gambar 26 menit ke-360 semua kelompok uji memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dan kelompok daun (\*) dan buah (\*) memiliki efek yang signifikan dengan batang, dalam hal ini kelompok batang yang memiliki efek penurunan geliat terendah.

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan senyawa flavonoid dari ekstrak tanaman tobo-tobo. Flavonoid berperan sebagai analgesik yang mekanismenya menghambat kerja enzim siklooksigenase. Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman tobo-tobo yang diberikan kepada hewan coba, memiliki efek analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah geliat pada hewan coba semakin sedikit.

### **3. Antipiretik**

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antipiretik ialah metode



demam buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan pepton 5% yang dilarutkan dalam larutan aqua pro injection sebanyak 0,5 mL secara intraperitoneal. Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas antipiretik senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, pepton sebagai pemicu demam dan tidak mempunyai sifat toksik (Odding, 2016).

Protein yang berlebihan pada tubuh mencit akan menyebabkan demam pada mencit. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton  $\pm$  5 menit, mencit mengalami berbagai hal yaitu menggigil, mengantuk, peningkatan rasa haus dan demam. pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 30 menit sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal. Penentuan efek penurunan demam dilakukan dengan mengukur suhu setelah pemberian obat hingga rentang waktu 30 menit-1 jam. Kondisi demam pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan termometer digital setiap menit 60', 120', 180', 240', 300', 360'.

Berdasarkan statistik hasil analisis uji one-way ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $P < 0,05$ ,  $P < 0,01$ ,  $P < 0,001$ , dan  $P < 0,0001$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji Tukey. Dari hasil analisis uji Tukey pada lampiran 12 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian Paracetamol sebagai kontrol



positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 29 terlihat bahwa pada menit ke-60 kelompok daun (\*\*\*) dan akar (\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC (kontrol negatif) dan kelompok Paracetamol (kontrol positif), serta pada masing-masing kelompok uji saling memiliki efek yang signifikan antar kelompok uji yang lain, dalam hal ini pada menit ke-60 kelompok daun yang memiliki efek yang tinggi dalam penurunan suhu dibandingkan dengan kelompok akar. Pada gambar 30 menit ke-120 kelompok daun (\*\*), kulit batang (\*\*), dan buah (\*\*\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC sedangkan pada daun (\*), akar (\*\*), dan buah (\*\*\*\*) juga memiliki efek yang signifikan pada kelompok Paracetamol dan pada masing-masing kelompok uji juga saling memiliki efek yang signifikan dalam hal ini pada menit ke-120 kelompok buah yang memiliki efek penurunan suhu yang terbaik dibandingkan dengan kelompok daun. Pada gambar 31 menit ke-180 kelompok Paracetamol, daun, kulit, dan buah memiliki efek yang signifikan dengan kelompok NaCMC dengan simbol (\*\*\*\*) sedangkan kelompok batang dan akar memiliki efek yang signifikan pada kelompok Paracetamol, dalam hal ini pada menit ke-180 kelompok batang dan akar tidak jauh berbeda efek signifikannya dengan kelompok NaCMC (ns). Pada gambar 32 menit ke-240 sama halnya pada menit ke-180 kelompok batang dan akar memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok NaCMC dalam hal ini kelompok batang dan akar juga memiliki efek yang tidak jauh berbeda dengan kelompok NaCMC. Pada gambar 33 menit ke-300 kelompok batang (\*) mulai memiliki efek yang signifikan dengan NaCMC namun efek yang masih rendah sedangkan pada kelompok akar (ns) masih memiliki efek yang tidak signifikan, kemudian pada kelompok daun

dan buah juga memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok Paracetamol, dalam hal ini kelompok daun dan buah tidak jauh berbeda efeknya dengan kelompok Paracetamol. Pada gambar 34 menit ke-360 kelompok akar (\*\*) memiliki efek yang signifikan dengan NaCMC dalam hal ini kelompok akar kembali memiliki efek penurunan suhu pada menit ke-360, kemudian pada menit ke-360 kelompok daun dan buah juga memiliki efek yang tidak signifikan (ns) dengan kelompok Paracetamol dalam hal ini kedua kelompok tersebut masih memiliki efek penurunan suhu yang terbaik dibandingkan dengan kelompok uji yang lain.

Menurut Putra et al (2015) penurunan yang bervariasi ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi seperti hormon, lingkungan, kondisi lambung, dan dapat pula disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres yang dialami akibat pengukuran berulang pada rektum menciit. Penurunan suhu rektal yang terjadi karena adanya senyawa flavonoid pada tanaman. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor biosintesis prostaglandin dengan menghambat enzim siklooksigenase-2 (COX-2) sehingga dapat menurunkan suhu tubuh sampai normal kembali (Sahyuni Putri Koto et al., 2019). Struktur kimia dari flavonoid hampir menyerupai paracetamol dimana masing – masing struktur terdapat cincin benzena dan golongan fenol, karena hal inilah flavonoid juga diduga memiliki efek antipiretik yang lebih baik daripada obat sintetis (Samiun et al., 2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan :

1. Ekstrak daun, buah, batang, kulit batang, serta akar tobo-tobo (*Ficus septica* Burm. F) terbukti memiliki pengaruh pada aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik terhadap mencit (*Mus musculus*).
2. Ekstrak bagian tanaman tobo-tobo yang memiliki pengaruh terbaik adalah ekstrak buah. Pada hasil uji aktivitas antiinflamasi efeknya mulai di menit ke-15 dan meningkat hingga menit ke-360 dengan persen inhibisi 79,22%, pada hasil uji aktivitas analgesik metode *hotplate* efeknya mulai di menit ke-30 dan meningkat hingga menit ke-240 (77,22%), pada hasil uji aktivitas analgesik metode *writhing test* efeknya mulai di menit ke-120 dan meningkat hingga menit ke-240 (53,85%), pada hasil uji aktivitas antipiretik ekstrak buah di menit ke-30 dan efeknya meningkat hingga menit ke-360 (45,23%). Masing-masing memiliki nilai  $P \leq 0.0001$ .

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan saran kepada peneliti selanjutnya bahwa untuk menghasilkan kualitas hasil uji coba yang lebih berpengaruh terhadap efektivitas, sebaiknya menggunakan variasi dosis. Selain itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya juga menggunakan waktu yang lebih bervariasi agar memperoleh hasil uji coba yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, E. N., & Pramitaningastuti, A. S. (2016). Studi Uji Daya Antiinflamasi dan Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Lengkeng (*Dimocarpus longan Lour*) pada Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*) Galur Wistar. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(2), 1–14. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JIF/article/view/7381>
- Arief, R., Thahir, Z., & Kristiana. (2019). Uji Aktivitas Antiinflamasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Awar-Aawr (*Ficus septica* Burm. F) Terhadap Udemata Kulit Punggung Mencit (*Mus musculus*). *IUCN Red List of Threatened Species*, 61(1768). <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T145362991A145370379.en>
- Auliah, N., Lotuconsina, A. A., & Thalib, M. (2019). Uji Efek Analgetik Ekstrak Etanol Daun Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Yang Diinduksi Asam Asetat. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 1(2), 103–113. <https://doi.org/10.33759/jrki.v1i2.24>
- Becker, D. E. (2013). Basic and clinical pharmacology of Glucocorticosteroids. *Anesthesia Progress*, 60(1), 25–32. <https://doi.org/10.2344/0003-3006-60.1.25>
- Fahmi, M. (2021). Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alquran, Hadis dan Kaedah Fiqih. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9004>
- Faizah, A. N., Kundarto, W., & Sasongko, H. (2021). Uji Aktivitas Antipiretik Kombinasi Ekstrak Etanol Herba Meniran (*Phyllanthus niruri* L.) dan Daun Sambung Nyawa (*Gynura procumbens* L.) Pada Mencit yang Diinduksi Ragi. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(3), 275–286. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i3.49698>
- Faradisa, E., & Fakhruddin, A. (2021). Beberapa Tumbuhan Obat di dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Perspektif Sains. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–19.
- Glaudia Y.Tawi, Maarisit, W., S.Datu, O., & Lengkey, Y. K. (2019). Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Awar-awar *Ficus septica* Burm F. Sebagai Antipiretik Terhadap Tikus Putih *Rattus norvegicus*. *The Tropical Journal of Biopharmaceutical*, 1(2), 1–9.
- Hanani, E. (2014). *Analisis Fitokomia*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hestehave, S., Abelson, K. S. P., Bronnum Pedersen, T., & Munro, G. (2019). The analgesic efficacy of morphine varies with rat strain and experimental pain model: implications for target validation efforts in pain drug discovery. *European Journal of Pain (United Kingdom)*, 23(3), 539–554. <https://doi.org/10.1002/ejp.1327>
- Morris, C. J. (2003). Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse. *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, 225, 115–121. <https://doi.org/10.1385/1-59259-374-7:115>
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif*.
- Mulyana, S. (2021). *Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Kapasitas*

- Antioksidan Ekstrak Metanol Tumbuhan Awar-Awar ( Ficus Septica Burm . F .) METODE Chemicals and Plant material Alat Extraction method a . Pengambilan Sampel.*
- Niluh Puspita Dewi. (2020). Uji Kualitatif dan Kuantitatif Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm.f) dengan Metode Spektrofotometer UV-VIS. *Acta Holistica Pharmacia*, 2(1), 16–24.
- Rezq, S., Mahmoud, M. F., El-Shazly, A. M., El Raey, M. A., & Sobeh, M. (2021). Anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic properties of potamogeton perfoliatus extract: In vitro and in vivo study. *Molecules*, 26(16). <https://doi.org/10.3390/molecules26164826>
- RI, D. K. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat.*
- Sahyuni Putri Koto, D., Ahda, M., & Guntarti, A. (2019). Determination of Polifenol Content and Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract 70% Awar-Awar (*Ficus septica* Burm. F) Leaf using DPPH Method (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil) Kadar Polifenol dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Awar-Awar (Fi. *J.Food Pharm.Sci*, 2, 89–96. [www.journal.ugm.ac.id/v3/JFPS](http://www.journal.ugm.ac.id/v3/JFPS)
- Saputra, S. H. (2020). *Mikroemulsi Ekstrak Bawang Tiwai Sebagai Pembawa Zat Warna, Antioksidan Dan Antimikroba Pangan* (B. Saragih (ed.); Cet-1). Deepublish.
- Shihab, Q. (2002). Tafsir al-Misbah Jilid 6 (yunus, hud, yusuf, ar-ra'du). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Shin, J., Seol, I., & Chang-gue, P. (2010). *Interpretasi Dosis Hewan dan Setara dengan Manusia Dosis untuk Pengembangan Obat.* 31, 1–7.
- Sudarsono, & Gunawan, D. (2022). Tumbuhan Obat II Hasil Penelitian, Sifat-Fisat Dan Penggunaannya. In *Pusat Studi Obat Tradisional Universitas Gajah Mada.*
- Sudirga. (2013). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak Daun Awar-Awar.* 7.
- Sukmawati, S., Yuliet, Y., & Hardani, R. (2015). Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L.) Terhadap Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Yang Diinduksi Karagenan. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 1(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2015.v1.i2.6244>
- Wardoyo, A. V., & Oktarlina, R. Z. (2019). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Analgesik Pada Swamedikasi Untuk Mengatasi Nyeri Akut. *Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 156–160. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.138>
- Wewengkang, D. S., & Rotinsulu, H. (2021). *Galenika* (Andriyanto (ed.); Cet-1). Penerbit Lakeisha.
- Wijayakusuma. (2021). Peyembuhan dengan Bawang Putih dan Bawang Merah. In *Milenia popular.*
- Winter. (2013). *Inflammation & Repair in General Pathology.*
- Winter, C. A., Risley, E. A., & Nuss, G. W. (1962). Carrageenin-induced edema in hind paw. *Experimental Biology and Medicine*, 3(111), 544–547.
- Yuliarni, F. F., Ayu Puji Lestari, K., Kun Arisawati, D., Dwi Winda Sari, R., &



- Ratna K., K. (2022). Ekstraksi Jamur *Auricularia* Dengan Menggunakan Pelarut Etanol Dan Metanol. *Jurnal Teknologi Technosciantia*, 14(2), 129–137. <https://doi.org/10.34151/technosciantia.v14i2.3637>
- Zahra, A. P., & Carolia, N. (2017). Obat Anti-inflamasi Non-steroid ( OAINS ): Gastroprotektif vs Kardiotoksik. *Majority*, 6, 153–158.
- Zakiyah, W. (2017). Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Zaitun (*Olea europaea* L.) Pada Edema Telapak Kaki Tikus Galur Sprague-Dawley Jantan Yang Diinduksi Karagenan. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Anggraeny, E. N., & Pramitaningastuti, A. S. (2016). Studi Uji Daya Antiinflamasi dan Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Lengkung (*Dimocarpus longan* Lour) pada Tikus Putih Jantan (*Rattus norvegicus*) Galur Wistar. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 12(2), 1–14. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JIF/article/view/7381>
- Arief, R., Thahir, Z., & Kristiana. (2019). Uji Aktivitas Antiinflamasi Sediaan Salep Ekstrak Daun Awar-Aawr (*Ficus septica* Burm. F) Terhadap Udemata Kulit Punggung Mencit (*Mus musculus*). *IUCN Red List of Threatened Species*, 61(1768). <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T145362991A145370379.en>
- Auliah, N., Lotuconsina, A. A., & Thalib, M. (2019). Uji Efek Analgetik Ekstrak Etanol Daun Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Yang Diinduksi Asam Asetat. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 1(2), 103–113. <https://doi.org/10.33759/jrki.v1i2.24>
- Becker, D. E. (2013). Basic and clinical pharmacology of Glucocorticosteroids. *Anesthesia Progress*, 60(1), 25–32. <https://doi.org/10.2344/0003-3006-60.1.25>
- Fahmi, M. (2021). Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alquran, Hadis dan Kaedah Fiqih. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9004>
- Faizah, A. N., Kundarto, W., & Sasongko, H. (2021). Uji Aktivitas Antipiretik Kombinasi Ekstrak Etanol Herba Meniran (*Phyllanthus niruri* L.) dan Daun Sambung Nyawa (*Gynura procumbens* L.) Pada Mencit yang Diinduksi Ragi. *JPSCR: Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research*, 6(3), 275–286. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v6i3.49698>
- Faradisa, E., & Fakhruddin, A. (2021). Beberapa Tumbuhan Obat di dalam Al-Qur'an Ditinjau dari Perspektif Sains. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–19.
- Glaudia Y.Tawi, Maarisit, W., S.Datu, O., & Lengkey, Y. K. (2019). Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Awar-awar *Ficus septica* Burm F. Sebagai Antipiretik Terhadap Tikus Putih *Rattus norvegicus*. *The Tropical Journal of Biopharmaceutical*, 1(2), 1–9.
- Hanani, E. (2014). *Analisis Fitokomia*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hestehave, S., Abelson, K. S. P., Bronnum Pedersen, T., & Munro, G. (2019). The analgesic efficacy of morphine varies with rat strain and experimental pain model: implications for target validation efforts in pain drug discovery. *European Journal of Pain (United Kingdom)*, 23(3), 539–554.

<https://doi.org/10.1002/ejp.1327>

- Morris, C. J. (2003). Carrageenan-induced paw edema in the rat and mouse. *Methods in Molecular Biology (Clifton, N.J.)*, 225, 115–121. <https://doi.org/10.1385/1-59259-374-7:115>
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif*.
- Mulyana, S. (2021). *Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Metanol Tumbuhan Awar-Awar (Ficus Septica Burm. F.) METODE Chemicals and Plant material Alat Extraction method a. Pengambilan Sampel*.
- Niluh Puspita Dewi. (2020). Uji Kualitatif dan Kuantitatif Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Daun Awar-Awar (*Ficus septica* Burm.f) dengan Metode Spektrofotometer UV-VIS. *Acta Holistica Pharmacia*, 2(1), 16–24.
- Rezq, S., Mahmoud, M. F., El-Shazly, A. M., El Raey, M. A., & Sobeh, M. (2021). Anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic properties of potamogeton perfoliatus extract: In vitro and in vivo study. *Molecules*, 26(16). <https://doi.org/10.3390/molecules26164826>
- RI, D. K. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*.
- Sahyuni Putri Koto, D., Ahda, M., & Guntarti, A. (2019). Determination of Polifenol Content and Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract 70% Awar-Awar (*Ficus septica* Burm. F) Leaf using DPPH Method (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil) Kadar Polifenol dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Awar-Awar (Fi. *J.Food Pharm.Sci*, 2, 89–96. [www.journal.ugm.ac.id/v3/JFPS](http://www.journal.ugm.ac.id/v3/JFPS)
- Saputra, S. H. (2020). *Mikroemulsi Ekstrak Bawang Tiwai Sebagai Pembawa Zat Warna, Antioksidan Dan Antimikroba Pangan* (B. Saragih (ed.); Cet-1). Deepublish.
- Shihab, Q. (2002). Tafsir al-Misbah Jilid 6 (yunus, hud, yusuf, ar-ra'du). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Shin, J., Seol, I., & Chang-gue, P. (2010). *Interpretasi Dosis Hewan dan Setara dengan Manusia Dosis untuk Pengembangan Obat*. 31, 1–7.
- Sudarsono, & Gunawan, D. (2022). Tumbuhan Obat II Hasil Penelitian, Sifat-Fisat Dan Penggunaannya. In *Pusat Studi Obat Tradisional Universitas Gajah Mada*.
- Sudirga. (2013). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak Daun Awar-Awar*. 7.
- Sukmawati, S., Yuliet, Y., & Hardani, R. (2015). Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Pisang Ambon (*Musa paradisiaca* L.) Terhadap Tikus Putih (*Rattus norvegicus* L.) Yang Diinduksi Karagenan. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 1(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2015.v1.i2.6244>
- Wardoyo, A. V., & Oktarlina, R. Z. (2019). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat Analgesik Pada Swamedikasi Untuk Mengatasi Nyeri Akut. *Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 156–160. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.138>
- Wewengkang, D. S., & Rotinsulu, H. (2021). *Galenika* (Andriyanto (ed.); Cet-1). Penerbit Lakeisha.

- Wijayakusuma. (2021). Peyembuhan dengan Bawang Putih dan Bawang Merah. In *Milenia popular*.
- Winter. (2013). *Inflammation & Repair in General Pathology*.
- Winter, C. A., Risley, E. A., & Nuss, G. W. (1962). Carrageenin-induced edema in hind paw. *Experimental Biology and Medicine*, 3(111), 544–547.
- Yuliarni, F. F., Ayu Puji Lestari, K., Kun Arisawati, D., Dwi Winda Sari, R., & Ratna K., K. (2022). Ekstraksi Jamur Auricularia Dengan Menggunakan Pelarut Etanol Dan Metanol. *Jurnal Teknologi Technoscientia*, 14(2), 129–137. <https://doi.org/10.34151/technoscientia.v14i2.3637>
- Zahra, A. P., & Carolia, N. (2017). Obat Anti-inflamasi Non-steroid ( OAINS ): Gastroprotektif vs Kardiotoksik. *Majority*, 6, 153–158.
- Zakiah, W. (2017). Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Zaitun (*Olea europaea L.*) Pada Edema Telapak Kaki Tikus Galur Sprague-Dawley Jantan Yang Diinduksi Karagenan. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.







## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Kerja Pengolahan Sampel


#### 1. Penyiapan sampel




#### 2. Ekstraksi Sampel




## Lampiran 2. Skema Kerja Uji Aktivitas Antiinflamasi



### Lampiran 3. Skema Kerja Uji Aktivitas Analgesik



#### Lampiran 4. Skema Kerja Uji Aktivitas Antipiretik



### Lampiran 5. Perhitungan Dosis Ekstrak tobo-tobo (*Ficus septica* Burm.F)

Perkiraan dosis manusia = 1000mg (Shin et al., 2010)

Konversi dosis manusia → mencit =  $1000 \times 0,0026$   
 = 2,6 mg (untuk mencit 20g)

Untuk mencit 30g =  $\frac{30}{20} \times 2,6$

= 3,9mg ~ 4mg

Sehingga dalam pemberian = 4mg dalam 0,5ml

= 8mg dalam 1ml

= 8mg / 1ml

Kebutuhan larutan uji =  $0,5\text{ml} \times 1 \text{ kali} \times 5 \text{ ekor} \times 4 \text{ kali pengujian}$

= 10ml ~ 15ml

Bobot ekstrak yang dibutuhkan =  $8\text{mg/ml} \times 15\text{ml}$

= 120mg

Pembuatan = 120mg ekstrak dengan NaCMC 0,5% ad 15ml

Dosis pemberian per mencit (ml) =  $\frac{\text{BB}}{30} \times 0,5\text{ml}$

Berat Badan		Hasil	
Kelompok Daun	I	26	0,43333333
	II	23	0,38333333
	III	28	0,46666667
	IV	29	0,48333333
	V	25	0,41666667
Kelompok Batang	I	24	0,4
	II	23	0,38333333
	III	27	0,45
	IV	31	0,51666667
	V	28	0,46666667
Kelompok Kulit Batang	I	29	0,48333333
	II	22	0,36666667
	III	24	0,4
	IV	24	0,4
	V	26	0,43333333
Kelompok Akar	I	27	0,45
	II	25	0,41666667
	III	28	0,46666667
	IV	29	0,48333333
	V	21	0,35
Kelompok Buah	I	23	0,38333333
	II	29	0,48333333
	III	28	0,46666667
	IV	26	0,43333333
	V	24	0,4

## Lampiran 6. Perhitungan Dosis Paracetamol (500mg)

Konversi dosis Paracetamol → mencit =  $500 \times 0,0026$

$$= 1,3 \text{ mg (untuk mencit 20g)}$$

$$\text{Untuk mencit 30g} = \frac{30}{20} \times 1,3 \text{ mg}$$

$$= 1,95\text{mg} \sim 2\text{mg}$$

Sehingga dalam pemberian = 2mg dalam 0,5ml

$$= 4\text{mg dalam 1ml}$$

$$= 4\text{mg} / 1\text{ml}$$

Kebutuhan larutan uji =  $0,5\text{ml} \times 1 \text{ kali} \times 5 \text{ ekor} \times 1 \text{ kali pengujian}$

$$= 2,5\text{ml} \sim 10\text{ml}$$

Bobot Paracetamol yang dibutuhkan (a) =  $4\text{mg/ml} \times 10\text{ml} = 40\text{mg}$

$$a = \frac{40}{500} \times b$$

Pembuatan = timbang tablet Paracetamol dengan NaCMC 0,5% ad 10ml

Dosis pemberian per mencit (ml) =  $\frac{BB}{30} \times 0,5\text{ml}$

Berat Badan		Hasil	
Kelompok NaDiklofenak	I	27	0,45
	II	32	0,53333333
	III	25	0,41666667
	IV	29	0,48333333
	V	26	0,43333333

Ket :

a = bobot paracetamol yang dibutuhkan

b = bobot rata-rata/tablet

### Lampiran 7. Perhitungan Dosis Natrium Diklofenak (50mg)

Konversi dosis Natrium Diklofenak → mencit =  $50 \times 0,0026$

$$= 0,13 \text{ mg (untuk mencit 20g)}$$

$$\text{Untuk mencit 30g} = \frac{30}{20} \times 0,13 \text{ mg}$$

$$= 0,195\text{mg} \sim 0,2\text{mg}$$

Sehingga dalam pemberian = 0,2mg dalam 0,5ml

$$= 0,4\text{mg dalam 1ml}$$

$$= 0,4\text{mg} / 1\text{ml}$$

Kebutuhan larutan uji =  $0,5\text{ml} \times 1 \text{ kali} \times 5 \text{ ekor} \times 3 \text{ kali pengujian}$

$$= 7,5\text{ml} \sim 10\text{ml}$$

Bobot Natrium Diklofenak yang dibutuhkan (a) =  $0,4\text{mg/ml} \times 10\text{ml} = 4\text{mg}$

$$a = \frac{4}{50} \times b$$

Pembuatan = timbang tablet Natrium Diklofenak dengan NaCMC 0,5% ad 10ml

Dosis pemberian per mencit (ml) =  $\frac{BB}{30} \times 0,5\text{ml}$

Berat Badan		Hasil	
Kelompok Paracetamol	I	27	0,45
	II	32	0,53333333
	III	25	0,41666667
	IV	29	0,48333333
	V	26	0,43333333

Ket :

a = bobot natrium diklofenak yang dibutuhkan

b = bobot rata-rata/tablet

**Lampiran 8. Perhitungan Kebutuhan NaCMC 0,5%**

Kebutuhan NaCMC ekstrak = 15ml × 5 kelompok

$$= 75\text{ml} \sim 100\text{ml}$$


Kebutuhan NaCMC kontrol (+) = 10ml × 3 pembanding

$$= 30\text{ml}$$

Kebutuhan NaCMC kontrol (-) = 10ml

$$\text{Bobot total NaCMC} = \frac{0,5}{100} \times 140\text{ml}$$

$$= 0,7\text{g}$$





### Lampiran 9. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Antiinflamasi

Mencit		Pengukuran Volume Edema (ml)								Total Perubahan Edema (ml)	% Inhibisi Edema
		V0	Vt	15'	30'	60'	120'	240'	360'		
Kelompok 1 (Kontrol Negatif)	I	0.12	0.19	0.20	0.21	0.21	0.20	0.22	0.20	4.92	
	II	0.13	0.19	0.20	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	4.31	
	III	0.13	0.20	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	4.15	
Rata-rata		0.13	0.19	0.20	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	4.46	
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.40	
Kelompok 2 (Kontrol Positif)	I	0.14	0.19	0.17	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	1.57	68.04
	II	0.13	0.18	0.18	0.16	0.15	0.16	0.14	0.13	1.46	66.07
	III	0.13	0.18	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	1.08	74.07
Rata-rata		0.13	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	1.37	69.28
SD		0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.26	4.17
Kelompok 3 (Ekstrak Daun)	I	0.12	0.17	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.11	1.58	67.80
	II	0.12	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.12	1.08	74.85
	III	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.62	85.19
Rata-rata		0.12	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	1.09	75.47
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.48	8.75
Kelompok 4 (Ekstrak Batang)	I	0.14	0.17	0.19	0.18	0.17	0.15	0.16	0.16	1.43	70.94
	II	0.13	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.16	0.15	2.08	51.79
	III	0.15	0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.15	0.16	1.00	75.93
Rata-rata		0.14	0.18	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	1.50	66.32
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.54	12.75
Kelompok 5 (Ekstrak Kulit Batang)	I	0.14	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	1.36	72.40
	II	0.13	0.18	0.18	0.18	0.17	0.18	0.16	0.16	2.31	46.43
	III	0.14	0.19	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.71	82.80
Rata-rata		0.14	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	1.46	67.27
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.80	18.73
Kelompok 6 (Ekstrak Akar)	I	0.13	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.16	2.23	54.63
	II	0.11	0.16	0.16	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16	3.45	19.81
	III	0.12	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	2.08	49.85
Rata-rata		0.12	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	2.59	41.93
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	18.88
Kelompok 7 (Ekstrak Buah)	I	0.13	0.17	0.16	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.85	82.79
	II	0.14	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.12	0.86	80.10
	III	0.13	0.18	0.17	0.16	0.14	0.15	0.14	0.11	1.08	74.07
Rata-rata		0.13	0.18	0.17	0.16	0.15	0.14	0.14	0.12	0.93	79.22
SD		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	4.46

## 1. V0

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Volume Edema	Based on Mean	.290	6	14	.932
	Based on Median	.238	6	14	.956
	Based on Median and with adjusted df	.238	6	14.000	.956
	Based on trimmed mean	.291	6	14	.931

### ANOVA

Volume Edema

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.001	6	.000	3.061	.040
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.002	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Akar	3	.1200		
Daun	3	.1233	.1233	
NaCMC	3	.1267	.1267	.1267
Nadik	3	.1333	.1333	.1333
Buah	3	.1333	.1333	.1333
Kulit	3		.1367	.1367
Batang	3			.1400
Sig.		.059	.059	.059

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 2. Vt

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Volume Edema	Based on Mean	.471	6	14	.819
	Based on Median	.200	6	14	.971
	Based on Median and with adjusted df	.200	6	9.091	.968
	Based on trimmed mean	.446	6	14	.836

### ANOVA

Volume Edema

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.002	6	.000	4.063	.014
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.003	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Daun	3	.1633		
Akar	3	.1667	.1667	
Batang	3	.1800	.1800	.1800
Kulit	3	.1800	.1800	.1800
Buah	3	.1800	.1800	.1800
Nadik	3		.1833	.1833
NaCMC	3			.1933
Sig.		.051	.051	.111

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

### 3. Menit Ke-15

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.400	6	14	.867
	Based on Median	.063	6	14	.999
	Based on Median and with adjusted df	.063	6	9.846	.999
	Based on trimmed mean	.354	6	14	.896

#### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.004	6	.001	6.121	.003
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.005	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Daun	3	.1567		
Akar	3	.1667	.1667	
Nadik	3	.1700	.1700	
Buah	3	.1700	.1700	
Kulit	3	.1733	.1733	
Batang	3		.1800	
NaCMC	3			.2033
Sig.		.091	.169	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

#### 4. Menit Ke-30

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.982	6	14	.473
	Based on Median	.333	6	14	.908
	Based on Median and with adjusted df	.333	6	9.600	.904
	Based on trimmed mean	.922	6	14	.508

#### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.007	6	.001	12.067	.000
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.008	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Daun	3	.1533		
Buah	3	.1600	.1600	
Nadik	3	.1633	.1633	
Akar	3	.1700	.1700	
Kulit	3		.1733	
Batang	3		.1767	
NaCMC	3			.2133
Sig.		.073	.078	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 5. Menit Ke-60

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.212	6	14	.356
	Based on Median	.076	6	14	.998
	Based on Median and with adjusted df	.076	6	11.805	.998
	Based on trimmed mean	.955	6	14	.489

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.011	6	.002	17.227	.000
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.012	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	.1433			
Buah	3	.1467	.1467		
Nadik	3	.1567	.1567	.1567	
Kulit	3		.1633	.1633	
Akar	3		.1633	.1633	
Batang	3			.1733	
NaCMC	3				.2167
Sig.		.151	.086	.086	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 6. Menit Ke-120

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.922	6	14	.508
	Based on Median	.444	6	14	.837
	Based on Median and with adjusted df	.444	6	10.800	.834
	Based on trimmed mean	.888	6	14	.529

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.011	6	.002	11.510	.000
Within Groups	.002	14	.000		
Total	.013	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Daun	3	.1333		
Buah	3	.1433	.1433	
Nadik	3		.1567	
Kulit	3		.1600	
Batang	3		.1633	
Akar	3		.1633	
NaCMC	3			.2100
Sig.		.338	.093	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 7. Menit Ke-240

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.782	6	14	.598
	Based on Median	.154	6	14	.985
	Based on Median and with adjusted df	.154	6	9.135	.983
	Based on trimmed mean	.702	6	14	.653

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.013	6	.002	26.314	.000
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.014	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	.1267			
Buah	3	.1367	.1367		
Nadik	3		.1467	.1467	
Kulit	3			.1533	
Batang	3			.1567	
Akar	3			.1600	
NaCMC	3				.2100
Sig.		.195	.195	.115	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.



## 8. Menit Ke-360

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.922	6	14	.508
	Based on Median	.444	6	14	.837
	Based on Median and with adjusted df	.444	6	10.800	.834
	Based on trimmed mean	.888	6	14	.529

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.014	6	.002	24.159	.000
Within Groups	.001	14	.000		
Total	.016	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Daun	3	.1200		
Buah	3	.1200		
Nadik	3		.1400	
Kulit	3		.1500	
Batang	3		.1567	
Akar	3		.1567	
NaCMC	3			.2033
Sig.		1.000	.079	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

**Lampiran 10. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Analgesik *Writhing Test***

Mencit		Aktivitas Analgesik Menit ke-						Total	% Inhibisi
		15'	30'	60'	120'	240'	360'		
Kelompok 1 (Kontrol Negatif)	I	27.00	23.00	12.00	15.00	7.00	6.00	90.00	
	II	21.00	25.00	10.00	12.00	6.00	6.00	80.00	
	III	20.00	24.00	13.00	10.00	5.00	5.00	77.00	
Rata-rata		22.67	24.00	11.67	12.33	6.00	5.67	82.33	
SD		3.79	1.00	1.53	2.52	1.00	0.58	6.81	
Kelompok 2 (Kontrol Positif)	I	23.00	17.00	12.00	9.00	6.00	1.00	68.00	24.44
	II	20.00	18.00	10.00	8.00	9.00	0.00	65.00	18.75
	III	21.00	18.00	13.00	8.00	6.00	1.00	67.00	12.99
Rata-rata		21.33	17.67	11.67	8.33	7.00	0.67	66.67	19.03
SD		1.53	0.58	1.53	0.58	1.73	0.58	1.53	5.73
Kelompok 3 (Ekstrak Daun)	I	13.00	11.00	9.00	5.00	2.00	0.00	40.00	55.56
	II	13.00	10.00	7.00	4.00	1.00	0.00	35.00	56.25
	III	15.00	12.00	7.00	4.00	2.00	1.00	41.00	46.75
Rata-rata		13.67	11.00	7.67	4.33	1.67	0.33	38.67	53.04
SD		1.15	1.00	1.15	0.58	0.58	0.58	3.21	5.29
Kelompok 4 (Ekstrak Batang)	I	18.00	16.00	11.00	8.00	4.00	3.00	60.00	33.33
	II	16.00	14.00	9.00	8.00	5.00	2.00	54.00	32.50
	III	19.00	14.00	10.00	10.00	3.00	1.00	57.00	25.97
Rata-rata		17.67	14.67	10.00	8.67	4.00	2.00	57.00	30.77
SD		1.53	1.15	1.00	1.15	1.00	1.00	3.00	4.03
Kelompok 5 (Ekstrak Kulit Batang)	I	16.00	21.00	11.00	8.00	4.00	0.00	60.00	33.33
	II	17.00	18.00	9.00	8.00	2.00	1.00	55.00	31.25
	III	12.00	19.00	10.00	10.00	5.00	2.00	58.00	24.68
Rata-rata		15.00	19.33	10.00	8.67	3.67	1.00	57.67	29.96
SD		2.65	1.53	1.00	1.15	1.53	1.00	2.52	4.52
Kelompok 6 (Ekstrak Akar)	I	25.00	16.00	13.00	9.00	5.00	1.00	69.00	23.33
	II	26.00	15.00	15.00	5.00	2.00	0.00	63.00	21.25
	III	27.00	14.00	10.00	4.00	1.00	0.00	56.00	27.27
Rata-rata		26.00	15.00	12.67	6.00	2.67	0.33	62.67	23.89
SD		1.00	1.00	2.52	2.65	2.08	0.58	6.51	3.06
Kelompok 7 (Ekstrak Buah)	I	17.00	12.00	9.00	3.00	0.00	0.00	41.00	54.44
	II	16.00	9.00	7.00	2.00	0.00	0.00	34.00	57.50
	III	13.00	14.00	8.00	3.00	1.00	0.00	39.00	49.35
Rata-rata		15.33	11.67	8.00	2.67	0.33	0.00	38.00	53.85
SD		2.08	2.52	1.00	0.58	0.58	0.00	3.61	4.12

## 1. Menit Ke-15

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	2.498	6	14	.074
	Based on Median	.366	6	14	.889
	Based on Median and with adjusted df	.366	6	6.333	.878
	Based on trimmed mean	2.201	6	14	.105

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	381.905	6	63.651	13.639	.000
Within Groups	65.333	14	4.667		
Total	447.238	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	13.6667			
Kulit	3	15.0000			
Buah	3	15.3333			
Batang	3	17.6667	17.6667		
Nadik	3		21.3333	21.3333	
NaCMC	3			22.6667	22.6667
Akar	3				26.0000
Sig.		.054	.057	.462	.080

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 2. Menit Ke-30

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	3.745	6	13	.022
	Based on Median	1.361	6	13	.300
	Based on Median and with adjusted df	1.361	6	7.506	.340
	Based on trimmed mean	3.528	6	13	.027

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	361.033	6	60.172	23.585	.000
Within Groups	33.167	13	2.551		
Total	394.200	19			

Duncan<sup>a,b</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05				
		1	2	3	4	5
Daun	3	11.0000				
Buah	2	11.5000	11.5000			
Akar	3		14.3333	14.3333		
Batang	3			14.6667		
Nadik	3				17.6667	
Kulit	3				19.3333	
NaCMC	3					24.0000
Sig.		.717	.056	.809	.239	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 2,800.

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

### 3. Menit Ke-60

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.920	6	14	.509
	Based on Median	.433	6	14	.845
	Based on Median and with adjusted df	.433	6	9.302	.840
	Based on trimmed mean	.884	6	14	.532

#### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	65.143	6	10.857	4.957	.006
Within Groups	30.667	14	2.190		
Total	95.810	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Daun	3	7.6667	
Buah	3	8.0000	
Batang	3	10.0000	10.0000
Kulit	3	10.0000	10.0000
NaCMC	3		11.6667
Nadik	3		11.6667
Akar	3		12.6667
Sig.		.095	.064

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

#### 4. Menit Ke-120

##### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	2.979	6	14	.043
	Based on Median	.742	6	14	.625
	Based on Median and with adjusted df	.742	6	7.597	.633
	Based on trimmed mean	2.731	6	14	.057

##### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	186.286	6	31.048	12.784	.000
Within Groups	34.000	14	2.429		
Total	220.286	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Buah	3	2.6667			
Daun	3	4.3333	4.3333		
Akar	3		6.0000	6.0000	
Nadik	3			8.3333	
Batang	3			8.6667	
Kulit	3			8.6667	
NaCMC	3				12.3333
Sig.		.211	.211	.072	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 5. Menit Ke-240

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.836	6	14	.164
	Based on Median	.377	6	14	.882
	Based on Median and with adjusted df	.377	6	7.399	.873
	Based on trimmed mean	1.668	6	14	.201

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	98.286	6	16.381	9.297	.000
Within Groups	24.667	14	1.762		
Total	122.952	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Buah	3	.3333			
Daun	3	1.6667	1.6667		
Akar	3	2.6667	2.6667		
Kulit	3		3.6667	3.6667	
Batang	3		4.0000	4.0000	
NaCMC	3			6.0000	6.0000
Nadik	3				7.0000
Sig.		.059	.066	.059	.372

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 6. Menit Ke-360

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.273	6	14	.330
	Based on Median	.556	6	14	.758
	Based on Median and with adjusted df	.556	6	12.000	.757
	Based on trimmed mean	1.221	6	14	.353

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	70.476	6	11.746	24.667	.000
Within Groups	6.667	14	.476		
Total	77.143	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	.0000		
Daun	3	.3333		
Akar	3	.3333		
Nadik	3	.6667		
Kulit	3	1.0000	1.0000	
Batang	3		2.0000	
NaCMC	3			5.6667
Sig.		.129	.098	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.



**Lampiran 11. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Analgesik *Hotplate Test***

Mencit		Aktivitas Analgesik Menit ke-						Total	% Inhibisi
		15'	30'	60'	120'	240'	360'		
Kelompok 1 (Kontrol Negatif)	I	24.00	41.00	52.00	54.00	73.00	76.00	320.00	
	II	34.00	29.00	36.00	48.00	62.00	70.00	279.00	
	III	23.00	27.00	30.00	40.00	71.00	66.00	257.00	
Rata-rata		27.00	32.33	39.33	47.33	68.67	70.67	285.33	
SD		6.08	7.57	11.37	7.02	5.86	5.03	31.97	
Kelompok 2 (Kontrol Positif)	I	33.00	22.00	15.00	26.00	21.00	30.00	147.00	54.06
	II	29.00	15.00	24.00	29.00	28.00	22.00	147.00	47.31
	III	23.00	23.00	18.00	32.00	30.00	37.00	163.00	36.58
Rata-rata		28.33	20.00	19.00	29.00	26.33	29.67	152.33	46.61
SD		5.03	4.36	4.58	3.00	4.73	7.51	9.24	8.82
Kelompok 3 (Ekstrak Daun)	I	23.00	15.00	13.00	16.00	15.00	16.00	98.00	69.38
	II	28.00	20.00	19.00	7.00	18.00	19.00	111.00	60.22
	III	28.00	21.00	12.00	6.00	18.00	16.00	101.00	60.70
Rata-rata		26.33	18.67	14.67	9.67	17.00	17.00	103.33	63.79
SD		2.89	3.21	3.79	5.51	1.73	1.73	6.81	5.15
Kelompok 4 (Ekstrak Batang)	I	25.00	17.00	19.00	23.00	17.00	19.00	120.00	62.50
	II	20.00	22.00	15.00	21.00	13.00	23.00	114.00	59.14
	III	16.00	22.00	18.00	25.00	12.00	17.00	110.00	57.20
Rata-rata		20.33	20.33	17.33	23.00	14.00	19.67	114.67	59.81
SD		4.51	2.89	2.08	2.00	2.65	3.06	5.03	2.68
Kelompok 5 (Ekstrak Kulit Batang)	I	18.00	19.00	12.00	24.00	13.00	20.00	106.00	66.88
	II	14.00	14.00	14.00	23.00	15.00	23.00	103.00	63.08
	III	15.00	22.00	23.00	29.00	16.00	14.00	119.00	53.70
Rata-rata		15.67	18.33	16.33	25.33	14.67	19.00	109.33	61.68
SD		2.08	4.04	5.86	3.21	1.53	4.58	8.50	6.78
Kelompok 6 (Ekstrak Akar)	I	29.00	45.00	33.00	24.00	28.00	26.00	185.00	42.19
	II	28.00	50.00	35.00	25.00	28.00	20.00	186.00	33.33
	III	31.00	43.00	34.00	21.00	26.00	23.00	178.00	30.74
Rata-rata		29.33	46.00	34.00	23.33	27.33	23.00	183.00	35.86
SD		1.53	3.61	1.00	2.08	1.15	3.00	4.36	6.00
Kelompok 7 (Ekstrak Buah)	I	17.00	20.00	9.00	11.00	4.00	18.00	79.00	75.31
	II	14.00	16.00	6.00	7.00	4.00	13.00	60.00	78.49
	III	13.00	13.00	6.00	7.00	3.00	14.00	56.00	78.21
Rata-rata		14.67	16.33	7.00	8.33	3.67	15.00	65.00	77.22
SD		2.08	3.51	1.73	2.31	0.58	2.65	12.29	1.76

## 1. Menit Ke-15

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.803	6	14	.170
	Based on Median	.421	6	14	.853
	Based on Median and with adjusted df	.421	6	6.471	.843
	Based on trimmed mean	1.654	6	14	.205

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	677.810	6	112.968	7.753	.001
Within Groups	204.000	14	14.571		
Total	881.810	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	14.67		
Kulit	3	15.67		
Batang	3	20.33	20.33	
Daun	3		26.33	26.33
NaCMC	3		27.00	27.00
Nadik	3			28.33
Akar	3			29.33
Sig.		.105	.061	.389

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 2. Menit Ke-30

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.486	6	14	.253
	Based on Median	.225	6	14	.962
	Based on Median and with adjusted df	.225	6	7.267	.956
	Based on trimmed mean	1.313	6	14	.314

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2099.810	6	349.968	17.925	.000
Within Groups	273.333	14	19.524		
Total	2373.143	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	16.3333		
Kulit	3	18.3333		
Daun	3	18.6667		
Nadik	3	20.0000		
Batang	3	20.3333		
NaCMC	3		32.3333	
Akar	3			46.0000
Sig.		.331	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

### 3. Menit Ke-60

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	4.226	6	14	.012
	Based on Median	.978	6	14	.475
	Based on Median and with adjusted df	.978	6	5.109	.519
	Based on trimmed mean	3.850	6	14	.018

#### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	2341.143	6	390.190	13.174	.000
Within Groups	414.667	14	29.619		
Total	2755.810	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	7.0000		
Daun	3	14.6667	14.6667	
Kulit	3	16.3333	16.3333	
Batang	3		17.3333	
Nadik	3		19.0000	
Akar	3			34.0000
NaCMC	3			39.3333
Sig.		.065	.383	.250

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

#### 4. Menit Ke-120

##### Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.690	6	14	.196
	Based on Median	.557	6	14	.757
	Based on Median and with adjusted df	.557	6	7.464	.754
	Based on trimmed mean	1.589	6	14	.222

##### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3068.952	6	511.492	31.779	.000
Within Groups	225.333	14	16.095		
Total	3294.286	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	8.3333		
Daun	3	9.6667		
Batang	3		23.0000	
Akar	3		23.3333	
Kulit	3		25.3333	
Nadik	3		29.0000	
NaCMC	3			47.3333
Sig.		.690	.112	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 5. Menit Ke-240

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	4.613	6	14	.009
	Based on Median	.728	6	14	.635
	Based on Median and with adjusted df	.728	6	5.885	.646
	Based on trimmed mean	4.051	6	14	.015

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	7977.905	6	1329.651	131.711	.000
Within Groups	141.333	14	10.095		
Total	8119.238	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Buah	3	3.6667			
Batang	3		14.0000		
Kulit	3		14.6667		
Daun	3		17.0000		
Nadik	3			26.3333	
Akar	3			27.3333	
NaCMC	3				68.6667
Sig.		1.000	.291	.706	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 6. Menit Ke-360

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.022	6	14	.451
	Based on Median	.718	6	14	.642
	Based on Median and with adjusted df	.718	6	9.175	.645
	Based on trimmed mean	1.005	6	14	.460

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6864.286	6	1144.048	61.132	.000
Within Groups	262.000	14	18.714		
Total	7126.286	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Buah	3	15.0000		
Daun	3	17.0000		
Kulit	3	19.0000		
Batang	3	19.6667		
Akar	3	23.0000	23.0000	
Nadik	3		29.6667	
NaCMC	3			70.6667
Sig.		.058	.080	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## Lampiran 12. Data Primer dan Hasil Analisis Statistik Antipiretik

Mencit		Temperatur Mencit (°C)								Total Perubahan Temperatur Mencit (°C)	% Inhibisi
		T0	T1	60'	120'	180'	240'	300'	360'		
Kelompok 1 (Kontrol Negatif)	I	37.40	39.60	39.70	39.50	38.90	38.50	38.20	37.60	0.27	
	II	38.10	40.40	39.50	39.10	38.70	38.30	37.90	38.00	0.14	
	III	37.60	39.80	39.90	39.60	38.80	38.60	37.40	37.20	0.22	
	Rata-rata	37.70	39.93	39.70	39.40	38.80	38.47	37.83	37.60	0.21	
	SD	0.36	0.42	0.20	0.26	0.10	0.15	0.40	0.40	0.07	
Kelompok 2 (Kontrol Positif)	I	36.20	38.50	38.90	38.00	37.80	37.40	36.70	36.50	0.29	-5.34
	II	36.40	38.40	38.80	38.40	37.60	37.00	36.80	36.20	0.23	-69.08
	III	36.10	38.10	38.50	38.10	37.50	37.20	36.90	36.50	0.28	-29.87
	Rata-rata	36.23	38.33	38.73	38.17	37.63	37.20	36.80	36.40	0.27	-27.73
	SD	0.15	0.21	0.21	0.21	0.15	0.20	0.10	0.17	0.03	32.15
Kelompok 3 (Ekstrak Daun)	I	36.10	38.40	38.10	37.80	37.50	36.30	36.50	36.00	0.22	24.77
	II	36.80	38.10	37.90	37.50	37.00	36.50	36.10	35.90	0.04	-24.98
	III	36.60	38.40	37.80	37.70	37.30	36.30	36.30	36.10	0.10	-4.33
	Rata-rata	36.50	38.30	37.93	37.67	37.27	36.37	36.30	36.00	0.12	42.69
	SD	0.36	0.17	0.15	0.15	0.25	0.12	0.20	0.10	0.09	25.00
Kelompok 4 (Ekstrak Batang)	I	36.70	38.80	39.00	38.90	38.50	38.10	37.60	36.90	0.30	61.82
	II	37.20	39.40	39.60	39.20	38.80	38.40	37.90	37.60	0.28	53.00
	III	36.60	38.60	38.10	38.10	38.30	38.00	37.60	36.60	0.25	48.30
	Rata-rata	36.83	38.93	38.90	38.73	38.53	38.17	37.70	37.03	0.28	-32.54
	SD	0.32	0.42	0.75	0.57	0.25	0.21	0.17	0.51	0.02	6.86
Kelompok 5 (Ekstrak Kulit Batang)	I	35.60	38.60	38.20	37.50	36.50	36.90	36.50	35.80	0.30	28.26
	II	35.40	38.50	38.10	37.80	36.60	37.00	36.40	35.60	0.34	35.34
	III	36.40	38.70	38.30	37.70	36.70	36.60	36.20	36.20	0.15	3.67
	Rata-rata	35.80	38.60	38.20	37.67	36.60	36.83	36.37	35.87	0.27	-28.37
	SD	0.53	0.10	0.10	0.15	0.10	0.21	0.15	0.31	0.10	16.62
Kelompok 6 (Ekstrak Akar)	I	37.70	38.20	38.40	38.40	38.50	38.10	38.30	38.40	0.12	137.98
	II	37.90	39.10	39.00	39.10	38.80	38.70	38.50	38.70	0.17	68.35
	III	38.10	39.40	39.10	38.00	38.50	38.30	38.10	38.60	0.09	5.86
	Rata-rata	37.90	38.90	38.83	38.50	38.60	38.37	38.30	38.57	0.13	39.57
	SD	0.20	0.62	0.38	0.56	0.17	0.31	0.20	0.15	0.04	66.09
Kelompok 7 (Ekstrak Buah)	I	36.60	38.70	38.50	37.70	37.10	36.80	36.50	36.10	0.14	4.54
	II	36.40	38.20	38.00	36.70	37.00	36.60	36.90	36.40	0.14	10.91
	III	36.70	38.50	38.20	36.60	36.90	36.50	36.70	35.80	0.06	-20.74
	Rata-rata	36.57	38.47	38.23	37.00	37.00	36.63	36.70	36.10	0.11	45.23
	SD	0.15	0.25	0.25	0.61	0.10	0.15	0.20	0.30	0.04	16.74



## 1. T0

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.946	6	14	.143
	Based on Median	.380	6	14	.880
	Based on Median and with adjusted df	.380	6	7.506	.871
	Based on trimmed mean	1.760	6	14	.180

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	10.458	6	1.743	16.714	.000
Within Groups	1.460	14	.104		
Total	11.918	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Kulit	3	35.8000		
Nadik	3	36.2333	36.2333	
Daun	3		36.5000	
Buah	3		36.5667	
Batang	3		36.8333	
NaCMC	3			37.7000
Akar	3			37.9000
Sig.		.123	.053	.461

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 2. T1

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.982	6	14	.473
	Based on Median	.333	6	14	.908
	Based on Median and with adjusted df	.333	6	9.600	.904
	Based on trimmed mean	.922	6	14	.508

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5.786	6	.964	7.642	.001
Within Groups	1.767	14	.126		
Total	7.552	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Daun	3	38.3000	
Nadik	3	38.3333	
Buah	3	38.4667	
Kulit	3	38.6000	
Akar	3	38.9000	
Batang	3	38.9333	
NaCMC	3		39.9333
Sig.		.070	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

### 3. Menit Ke-60

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	2.566	6	14	.069
	Based on Median	1.161	6	14	.380
	Based on Median and with adjusted df	1.161	6	5.325	.440
	Based on trimmed mean	2.460	6	14	.078

#### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	6.286	6	1.048	8.209	.001
Within Groups	1.787	14	.128		
Total	8.072	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	37.9333			
Kulit	3	38.2000	38.2000		
Buah	3	38.2333	38.2333	38.2333	
Nadik	3		38.7333	38.7333	
Akar	3		38.8333	38.8333	
Batang	3			38.9000	
NaCMC	3				39.7000
Sig.		.346	.064	.052	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

#### 4. Menit Ke-120

#### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	2.629	6	14	.064
	Based on Median	.534	6	14	.774
	Based on Median and with adjusted df	.534	6	6.708	.769
	Based on trimmed mean	2.378	6	14	.085

#### ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	11.443	6	1.907	11.476	.000
Within Groups	2.327	14	.166		
Total	13.770	20			

#### Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Buah	3	37.0000			
Daun	3	37.6667	37.6667		
Kulit	3	37.6667	37.6667		
Nadik	3		38.1667	38.1667	
Akar	3			38.5000	
Batang	3			38.7333	38.7333
NaCMC	3				39.4000
Sig.		.077	.175	.128	.065

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 5. Menit Ke-180

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.067	6	14	.427
	Based on Median	.437	6	14	.842
	Based on Median and with adjusted df	.437	6	8.806	.837
	Based on trimmed mean	1.017	6	14	.453

### ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13.698	6	2.283	76.101	.000
Within Groups	.420	14	.030		
Total	14.118	20			

### Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Kulit	3	36.6000			
Buah	3		37.0000		
Daun	3		37.2667		
Nadik	3			37.6333	
Batang	3				38.5333
Akar	3				38.6000
NaCMC	3				38.8000
Sig.		1.000	.080	1.000	.094

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 6. Menit Ke-240

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	.701	6	14	.654
	Based on Median	.275	6	14	.939
	Based on Median and with adjusted df	.275	6	10.959	.937
	Based on trimmed mean	.664	6	14	.680

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	14.007	6	2.334	58.361	.000
Within Groups	.560	14	.040		
Total	14.567	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	36.3667			
Buah	3	36.6333	36.6333		
Kulit	3		36.8333		
Nadik	3			37.2000	
Batang	3				38.1667
Akar	3				38.3667
NaCMC	3				38.4667
Sig.		.125	.241	1.000	.102

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 7. Menit Ke-300

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.113	6	14	.403
	Based on Median	.583	6	14	.738
	Based on Median and with adjusted df	.583	6	7.744	.736
	Based on trimmed mean	1.077	6	14	.421

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	11.258	6	1.876	37.888	.000
Within Groups	.693	14	.050		
Total	11.951	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Daun	3	36.3000			
Kulit	3	36.3667			
Buah	3	36.7000	36.7000		
Nadik	3		36.8000		
Batang	3			37.7000	
NaCMC	3			37.8333	
Akar	3				38.3000
Sig.		.054	.591	.475	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

## 8. Menit Ke-360

### Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jumlah Respon Nyeri	Based on Mean	1.427	6	14	.272
	Based on Median	.693	6	14	.659
	Based on Median and with adjusted df	.693	6	7.799	.663
	Based on trimmed mean	1.374	6	14	.291

### ANOVA

Jumlah Respon Nyeri

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	17.930	6	2.988	31.221	.000
Within Groups	1.340	14	.096		
Total	19.270	20			

Duncan<sup>a</sup>

Kelompok Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05			
		1	2	3	4
Kulit	3	35.8667			
Daun	3	36.0000			
Buah	3	36.1000			
Nadik	3	36.4000			
Batang	3		37.0333		
NaCMC	3			37.6000	
Akar	3				38.5667
Sig.		.071	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.



## Lampiran 13. Kode Etik



KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Jl.H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210016564, E-mail: [kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id](mailto:kepk.fkik@uin-alauddin.ac.id)

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
**ETHICAL CLEARANCE**  
**DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD**  
**"ETHICAL EXEMPTION/ EXPEDITED/FULLBOARD"**

No: A.003/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama  
*Principal In Investigator* : Muh. Miftahul Ichsan

Nama Institusi  
*Name of the Institution* : UIN Alauddin Makassar

Dengan judul:  
*Title*

**"UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI, ANALGESIK DAN ANTIPIRETIK EKSTRAK METANOL  
BAGIAN-BAGIAN TANAMAN TOBO-TOBO (*Ficus septica* Burm F.) TERHADAP MENCIT (*Mus  
musculus*)"**

*"Activity Tests of Anti-Inflammatory, Analgesic and Antipyretic Methanol Extract Parts of Tobo-Tobo  
Plant (*Ficus septica* Burm F.) on Mice (*Mus Musculus*)"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024.

*This declaration of ethics applies during the period August 1st, 2023 until August 1st, 2024.*

August 1st, 2023  
Chairperson and Chairperson,  
  
DR. Hj. Genty Masri Handayani, M.Si., Apt.

## RIWAYAT HIDUP



Muh. Miftahul Ichsan, biasa dipanggil Ichsan lahir di Makassar pada tanggal 28 Agustus 2001, anak pertama dari 3 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Suriadi, SE dan Ibunda apt Sri Astuti Syahrani, S, Farm. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 5 tahun di TKIT Al-Insyirah dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SDIT Al-Insyirah dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 02 Biringkanaya hingga Sekolah Menengah Keatas di SMA Negeri 15 Makassar hingga tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Motto yang baru-baru ini melekat pada diri penulis ialah Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala*, usaha dan do'a dari Ibunda dalam menjalani aktivitas akademik di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antiinflamasi, Analgesik Dan Antipiretik Ekstrak Metanol Bagian-Bagian Tanaman Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm F.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)”.