

**OPTIMASI EKSTRAKSI SENYAWA FENOLIK KULIT BATANG ANAK  
DARA (*Croton oblongus* Burm F.) SECARA MASERASI  
MENGUNAKAN PENDEKATAN *RESPONSE SURFACE  
METHODOLOGY***



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**NURFAIDA HAMKA**

**70100119040**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfaida Hamka

NIM : 70100119040

Tempat/Tanggal Lahir : Makale, 05 April 2002

Jurusan/Prodi : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Minasupa Blok D5 No 20

Judul : “Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Secara Maserasi Menggunakan Pendekatan *Response Surface Methodology*”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 4 Agustus 2023

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

NURFAIDA HAMKA

NIM : 70100119040

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (Croton oblongus Burm F.) Secara Maserasi Menggunakan Pendekatan Response Surface Methodology*" yang disusun oleh Nurfaida Hamka, NIM: 70100119040, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 Agustus 2023  
29 Muharram 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi., S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Nurul Muhlisah Maddepongeng, S.Farm.,M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Alwiyah Nur Syarif S.Farm, M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini yang berjudul “Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Secara Maserasi Menggunakan Pendekatan *Response Surface Methodology*”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Tetapi berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada kedua orang tua yang sangat berjasa serta turut andil dalam hidup penulis yaitu Bapak Hamka Saleh dan Ibu Asnani yang berperan besar dalam memberikan kasih sayang, doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak terlupakan ucapan terima kasih untuk semua keluarga terkhusus kepada saudara dari ibu dan bapak yaitu Ibu Fatmawati dan Ibu Prof Duha yang berperan besar juga dalam kehidupan penulis dari awal kuliah hingga sampai pada penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan sepenuh hati kepada bapak/ibu:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. Mardan, M. Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. Wahyuddin, M. Hum. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kalamuddin Abunawas, M. Ag. Selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Sartinegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Haeria, S.Si, M.Si. sebagai pembimbing pertama yang senantiasa memberikan semangat serta sabar tak henti-hentinya dalam menghadapi penulis dan meluangkan waktu serta pikiran untuk membimbing hingga mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. apt. Nur Alwiyah Syarif, S,Farm, M.Si. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu beserta pikiran untuk membimbing penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini serta tak henti-hentinya dalam memberikan semangat.

14. Indah, S.Farm, M.Si sebagai penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik maupun penelitian ini.
15. apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si,M.Si selaku penguji kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang membangun terkait skripsi ini.
16. Dr. H. Muh Saleh Ridwan,. M.Ag selaku penguji agama yang banyak memberikan saran dan arahan yang baik dalam mengoreksi kekurangan skripsi ini.
17. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang juga berperan besar dalam mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi.
18. Staf Fakultas dan Kedokteran dan Ilmu Kesehatan beserta staf Jurusan Farmasi yang memberikan kemudahan dalam proses pengurusan berkas penulis dimulai dari penulis menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir.
19. Saudari Fila Delviah M, selaku saudari yang selalu memberikan energi positif serta berperan dalam tempat keluh kesah penulis dalam menjalankan proses perkuliahan hingga sampai di titik akhir penulisan skripsi.
20. Saudari-saudari ciwit yang tak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan serta semangat yang selalu diberikan kepada pada penulis, selalu ada dalam keadaan suka maupun duka dimulai dari proses mahasiswa baru hingga menjadi menjadi mahasiswa akhir.

21. Keluarga Mahasiswa Farmasi UINAM yang tak henti-hentinya memberikan ruang dalam berproses menjadi mahasiswa yang lebih baik serta memberikan semangat serta dukungan maupun bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Harapannya semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional .....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Uraian tumbuhan anak dara .....	12
B. Ekstraksi.....	14
C. Senyawa fenolik.....	20
D. Metode Identifikasi Metabolit.....	23
E. <i>Response Surface Methodology</i> .....	27
F. Tinjauan islam tentang tumbuhan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Populasi dan Sampel .....	37
D. Alat dan Bahan.....	38
E. Cara Kerja .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Optimasi Proses Ekstraksi.....	43


B. Pemilihan Model Respond Rendamen dan Kadar Fenolik .....	45
C. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap Rendamen Kulit Batang Anak Dara.....	47
D. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap Kadar Fenolik Kulit Batang Anak Dara .....	53
E. Optimasi Respon Nilai Rendamen dan Kadar Fenolik Ekstrak Klika Anak Dara .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Tumbuhan Anak Dara ( <i>Croton oblongus</i> Burm F.) .....	12
<b>Gambar 2.</b> Maserasi .....	16
<b>Gambar 3.</b> Perkolator .....	17
<b>Gambar 4.</b> Alat Soxletasi .....	18
<b>Gambar 5.</b> Destilasi Rebus .....	19
<b>Gambar 6.</b> Alat Ultrasound-Assised Extraction .....	20
<b>Gambar 7.</b> Struktur Fenol .....	21
<b>Gambar 8.</b> Diagram alat spectrometer UV-Vis (Single beam) .....	24
<b>Gambar 9.</b> Skema spektrofotometer UV-Vis (Double beam) .....	24
<b>Gambar 10.</b> <i>Contour Plot</i> Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton dan Metanol terhadap Respon Rendamen .....	47
<b>Gambar 11.</b> <i>Surface Plot</i> Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton dan Metanol terhadap Respon Rendamen .....	48
<b>Gambar 12.</b> <i>Contour Plot</i> Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton dan Metanol terhadap Respon Kadar Fenolik .....	53
<b>Gambar 13.</b> <i>Surface Plot</i> Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton dan Metanol terhadap Respon Kadar Fenolik .....	54
<b>Gambar 14.</b> Reaksi kimia senyawa fenol dengan $\text{FeCl}_3$ .....	55
<b>Gambar 15.</b> Reaksi senyawa fenol dengan reagen folin-ciocalteu .....	56
<b>Gambar 16.</b> Kurva Baku Asam Galat .....	79
<b>Gambar 17.</b> Pengambilan Sampel .....	81
<b>Gambar 18.</b> Merajang Klika .....	81
<b>Gambar 19.</b> Pengeringan Sampel .....	81
<b>Gambar 20.</b> Penimbangan Simplisia 10 gr .....	81
<b>Gambar 21.</b> Maserasi .....	81

<b>Gambar 22.</b> Penyaringan Hasil Ekstraksi.....	81
<b>Gambar 23.</b> Penguapan Ekstrak.....	81
<b>Gambar 24.</b> Hasil Ekstrak.....	81
<b>Gambar 25.</b> Larutan Stok Asam Galat.....	81
<b>Gambar 26.</b> Seri Konsentrasi Asam Galat.....	82
<b>Gambar 27.</b> Larutan Uji.....	82
<b>Gambar 28.</b> Analisis Spektrofotometri UV-Vis .....	82




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Desain Eksperimen Aplikasi Design Expert Ver 13 .....	41
<b>Tabel 2.</b> Optimasi ekstraksi kulit batang anak dara.....	44
<b>Tabel 3.</b> Hasil pemilihan model berdasarkan model <i>Summary Statistic</i> persen rendamen.....	45
<b>Tabel 4.</b> Hasil pemilihan model berdasarkan model <i>Summary Statistic</i> Kadar Fenolik .....	46
<b>Tabel 5.</b> Batas optimasi untuk respon penelitian.....	59
<b>Tabel 6.</b> Solusi titik optimum terpilih hasil perhitungan design expert ver 13 .	60
<b>Tabel 7.</b> Hasil rendamen.....	73
<b>Tabel 8.</b> Hasil serapan perbandingan asam galat.....	79



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Skema Kerja.....	67
<b>Lampiran 2.</b> Perhitungan Bahan.....	71
<b>Lampiran 3.</b> Perhitungan rendamen ekstrak kulit batang anak dara .....	74
<b>Lampiran 4.</b> Kadar Fenolik .....	79
<b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi .....	81



## ABSTRAK

**Nama : Nurfaida Hamka**  
**Nim : 70100119040**  
**Judul : “Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) Secara Maserasi Menggunakan Pendekatan Response Surface Methodology”**

Anak dara (*Croton oblongus* Burm F) merupakan salah satu jenis tumbuhan genus *Croton* dan termasuk dalam famili Euphorbiaceae. *Croton oblongus* terkhusus pada bagian kulit batang memiliki beberapa kandungan senyawa metabolit seperti senyawa fenolik. Untuk mendapatkan senyawa dari suatu tanaman atau tumbuhan maka diperlukan suatu metode ekstraksi sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari parameter yang digunakan terhadap jumlah rendamen serta kadar fenolik sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Proses optimasi dimulai dengan melakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi pada simplisia kulit batang anak dara menggunakan 3 parameter uji yaitu jenis pelarut (metanol dan aseton), konsentrasi pelarut (50%, 75% dan 100%) dan waktu maserasi (1 hari, 2 hari, 3 hari). Selanjutnya dilanjutkan dengan penentuan kadar fenolik menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. Hasil persen rendamen serta kadar fenolik yang didapatkan selanjutnya diidentifikasi parameter yang optimal melalui aplikasi *Design Expert* ver 13. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses optimasi kulit batang anak dara secara maserasi diperoleh hasil persen rendamen ekstrak yang optimal yaitu sebesar 10,53% pada waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 75%. Sedangkan kadar fenolik diperoleh hasil yang optimal yaitu  $60,193 \pm 0.001155$  mgGAE/g pada waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol dengan konsentrasi 100%. Sehingga dapat disimpulkan jenis pelarut, konsentrasi pelarut beserta waktu maserasi dapat mempengaruhi persen rendaman dan kadar fenolik yang didapatkan. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dengan waktu maserasi 3 hari dapat menghasilkan persen rendamen ekstrak dan kadar fenolik yang optimal.

**Kata kunci :** *Croton oblongus*, maserasi, fenolik, *Respond Surface Methodology*

## ABSTRACT

**Name : Nurfaida Hamka**  
**Name : 70100119040**  
**Title : “Optimization of Extraction of Phenolic Compounds from Maceration of Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Bark Using Response Surface Methodology Approach”**

*Croton oblongus* Burm F is a type of plant of the genus *Croton* and belongs to the Euphorbiaceae family. *Croton oblongus*, especially in the stem bark, contains several metabolites such as phenolic compounds. To obtain compounds from a plant or plant, an extraction method is needed so that in this study the aim was to determine the effect of the parameters used on the amount of rendition and phenolic content so as to obtain optimal results. The optimization process begins with extracting using the maceration method on the simplicia of anak dara bark using 3 test parameters, namely the type of solvent (methanol and acetone), solvent concentration (50%, 75% and 100%) and maceration time (1 day, 2 days, 3 days). Then proceed with the determination of phenolic levels using UV-Vis Spectrophotometry. The results of the percent yield and phenolic content obtained were then identified as optimal parameters through the application of Design Expert ver 13. The results showed that the process of optimizing the anak dara bark by maceration obtained the optimal percent yield of the extract, which was 10.53% at the time of maceration 3 days using methanol solvent with a concentration of 75%. While the phenolic content obtained optimal results, namely  $60.193 \pm 0.001155$  mgGAE/g at 3 days of maceration using methanol solvent with a concentration of 100%. So it can be concluded that the type of solvent, solvent concentration and maceration time can affect the percent yield and phenolic content obtained. Extraction by maceration method using methanol solvent with maceration time of 3 days can produce optimal percent yield of the extract and phenolic content.

Keywords :*Croton oblongus*, maceration, phenolic, Respond Surface Methodology

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Tumbuhan ataupun tanaman sudah lama dipergunakan secara empiris dan tradisional dalam fungsinya sebagai pengobatan. Potensi penggunaan tumbuhan dalam pengembangan pengobatan tergolong besar. Pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan semakin meningkat seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang farmasi serta ilmu pengetahuan alam. Perubahan pandangan dan mentalitas individu terhadap obat-obatan alami juga berpengaruh terhadap pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan. Senyawa kimia pada tumbuhan merupakan bahan utama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai obat.

Salah satu tumbuhan yang berpotensi dalam pengobatan yang digunakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan terkhusus wilayah Sinjai adalah anak dara (*Croton oblongus* Burm F). Anak dara merupakan salah satu jenis tanaman dari genus *Croton* dan termasuk ke dalam famili *Euphorbiaceae*. Secara empiris masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah menggunakan tumbuhan ini sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah yang dipercaya dapat mengencangkan kulit. Anak dara dipercaya digunakan dalam pengobatan seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016). Beberapa penelitian terkait dengan tumbuhan ini terkhusus pada bagian kulit batang antara lain kulit batang anak dara memiliki kandungan senyawa fenolik, flavonoid serta karotenoid (Haeria, 2014) serta memiliki aktivitas antioksidan (Awaluddin, 2019) dan memiliki aktivitas penghambatan pada sel hela (Tahar, 2015).

Dari berbagai manfaat yang ada pada kulit batang anak dara tidak menutup kemungkinan memiliki masih banyak lagi manfaat yang ada pada tumbuhan

terebut yang bermanfaat bagi kesehatan umat manusia. Dari hal tersebut sebagai manusia baiknya agar mencari tahu dan menguasai ilmu pengobatan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah saw :

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلِّمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya :

“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan no. 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar)

Dari hal tersebut baginda Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dengan ucapan, pilihan dan tindakannya adalah model yang menunjukkan pada umat manusia mengenai pengobatan yang baik yaitu pengobatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan penelitian bukan hanya sekedar perkiraan ataupun fatamorgana. Oleh sebab itu manusia patutnya harus terus mencari manfaat, jaminan mutu serta parameter yang baik untuk digunakan dalam mendapatkan potensi suatu tanaman agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bentuk pengobatan yang sesuai dengan standar kefarmasian.

Senyawa kimia yang ada pada tumbuhan dapat berpotensi sebagai obat dalam menyembuhkan berbagai penyakit dimana senyawa kimia tersebut adalah kelompok metabolit sekunder dari tumbuhan. Pada umumnya senyawa metabolit sekunder memiliki peran utama untuk pertahanan diri terhadap organisme lain seperti serangga. Keberadaan metabolit sekunder terbatas pada tumbuhan asalnya atau suku dari tumbuhan tersebut. Diantara beberapa senyawa yang termasuk kelompok senyawa metabolit sekunder adalah senyawa flavonoid dan senyawa fenolik. Senyawa flavonoid tersebar hampir pada semua bagian tumbuhan yaitu akar, daun, bunga, buah, ataupun biji. Senyawa fenol tersebar luas pada tumbuhan, terutama dalam tumbuhan yang memiliki Senyawa aromatik yang memiliki karakteristik struktur benzen dan hidroksil (Ali, 2020).

Untuk mendapatkan suatu senyawa dari tanaman ataupun tumbuhan maka diperlukan suatu metode ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan senyawa dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut (Zulharmitta, 2010). Salah satu metode ekstraksi adalah maserasi yang merupakan metode yang sederhana serta umum digunakan dengan berbagai kelebihan seperti peralatan yang sederhana, biaya yang murah serta tidak dilakukan proses pemanasan sehingga dapat menghindari kerusakan zat aktif yang ada pada simplisia. Metode ini merupakan metode yang tepat untuk ekstraksi senyawa-senyawa yang bersifat tidak tahan panas (termolabile) (Mauricio, 2013).

Bagian tumbuhan, cara ekstraksi, waktu, konsentrasi pelarut, dan jenis pelarut semuanya berpengaruh terhadap cara ekstraksi (Prayoga, 2019). Waktu atau lamanya proses ekstraksi menentukan kandungan senyawa yang keluar dari bahan. Jumlah senyawa yang diekstrak dari bahan ditentukan oleh lamanya proses ekstraksi. Dengan cara yang sama, jenis larutan yang digunakan atau proporsi yang dapat larut dalam aquadest dapat mempengaruhi perolehan senyawa yang ada pada suatu tanaman, larutan pengestraksi yang digunakan disesuaikan dengan kepolaran senyawa yang diinginkan. Menurut prinsip *like dissolves like*, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan sebaliknya (Agnes, 2021).

Pelarut polar yang dapat mengesktrak senyawa fenolik adalah air, aseton dan metanol. Air digunakan sebagai pelarut karena bersifat polar, universal dan mudah didapat. Menurut Al fauzi *et al* (2022) kadar fenolik tertinggi ekstrak kulit jengkol diperoleh dari pelarut metanol. Sementara menurut Salim *et al* (2019) kadar fenolik tertinggi ekstrak daun mangga diperoleh dengan menggunakan pelarut

aseton. Penggunaan suatu pelarut dapat menjadi optimal jika faktor konsentrasi, waktu dan metode ekstraksi sesuai.

Berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi meskipun metode ekstraksi dengan maserasi memberikan berbagai manfaat tetapi belum diketahui parameter yang optimal untuk mengekstraksi kulit batang anak dara sehingga dilakukannya proses optimasi. Optimasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Rattu et al, 2022).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukannya metode yang tepat agar ekstrak yang didapatkan dari suatu tanaman juga maksimal sehingga salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil dari parameter yang optimal maka menggunakan *Response Surface Methodology* (RSM) yang merupakan suatu metode kumpulan statistik dan matematika teknik yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses, di mana respon dipengaruhi oleh beberapa faktor (variabel independen) (Sarabia and Ortiz, 2009).

Penelitian mengenai optimasi proses ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi untuk menentukan kadar fenolik sejauh ini belum dilaporkan. Sehingga berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penelitian terkait Optimasi Ekstraksi Senyawa Fenolik Kulit Batang Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Secara Maserasi menggunakan Pendekatan *Response Surface Methodology*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi terhadap persen rendamen ekstrak kulit batang anak dara?
2. Bagaimana pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi terhadap kadar fenolik total ekstrak kulit batang anak dara?

### ***C. Definisi Operasional***

Mencegah kebingungan interpretasi pembaca pada variabel di judul, hingga digunakan beberapa istilah dalam penelitian ini. Penjelasan perihal istilah yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Optimasi adalah proses pencarian pengoptimalan faktor yang mempengaruhi suatu objek sehingga diperoleh hasil yang terbaik.
- b. Ekstraksi adalah metode pemisahan senyawa dari tanaman.
- c. Kulit Batang adalah lapisan terluar batang.
- d. Fenolik adalah salah satu metabolit sekunder yang diperoleh dari hasil ekstraksi.
- e. Maserasi adalah metode pemisahan senyawa dari tanaman dengan cara perendaman sampel.
- f. *Response Surface Methodology* adalah kumpulan teknik statistik dan matematika yang membantu dalam mengembangkan, meningkatkan dan mengoptimalkan proses ekstraksi.

### ***D. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi pendekatan *Response Surface Methodology* dengan menggunakan tiga parameter yaitu jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu ekstraksi terhadap kandungan senyawa fenolik dari ekstrak kulit batang anak dara.

### ***E. Kajian Pustaka***

Pada kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haeria tahun 2014 yaitu “Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm.F.)”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa fenolik, flavonoid serta karotenoid pada ekstrak metanol klika anak dara. Pada penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan ialah maserasi serta instrument yang digunakan dalam pengujian kadar adalah spektrofotometri uv-vis. Hasil dari pengujian ini menyatakan bahwa klika anak dara memiliki kandungan senyawa fenolik sebesar 5,47%, kadar flavonoid sebesar 1,92% dan kadar karotenoid sebesar 0,044% (Haeria,2014).

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Haeria di tahun 2014 dengan penelitian yang akan dijalankan adalah dari segi penggunaan pelarut yaitu metanol, metode ekstraksi yaitu maserasi dan penentuan kadar fenolik dengan metode spektrofotometri uv-vis sedangkan perbedaan dilihat dari segi tujuan penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Haeria di tahun 2014 bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa metabolit sekunder yang ada pada klika sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui parameter yang baik untuk menghasilkan kadar senyawa fenolik yang maksimal.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Mu'nisa dalam penelitian “Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Cengkeh” di tahun 2012 dapat disimpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode maserasi dalam

mengestruk senyawa fenol pada daun cengkeh dengan menggunakan 3 pelarut yaitu aquadest, etanol dan metanol dan didapatkan hasil ekstrak tertinggi yaitu dengan maserasi menggunakan pelarut metanol. Kadar total fenol dipengaruhi oleh jenis pelarut dimana senyawa fenol bersifat polar sehingga pelarut yang bersifat polar mampu melarutkan fenol lebih baik dan menghasilkan kadar ekstrak yang tinggi (Andi Mu'nisa, 2012).

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Andi Mu'nisa adalah tujuan untuk mengetahui parameter yang dapat menghasilkan kadar fenolik yang maksimal sedangkan perbedaan penelitian ini adalah jenis penggunaan pelarut. Pada penelitian ini penggunaan pelarut yaitu aquadest, metanol dan aseton. Sedangkan pada penelitian Andi Mu'nisa jenis pelarut yang digunakan adalah aquadest, etanol dan metanol.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yulistia di tahun 2015 dalam penelitian "Studi Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Hasil Isolasi Dan Kadar Senyawa Fenolik Dalam Biji Kacang Tunggak (*Vigna unguiculata* (L.) Walp) Sebagai Antioksidan" dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pelarut yang mampu mengekstrak senyawa fenolik dalam biji kacang tunggak dengan menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut dengan variasi yaitu 80% (v/v) aseton, 50% (v/v) aseton, 0,5% asam asetat dalam 70% (v/v) aseton, 99,9% (v/v) metanol, 70% (v/v) metanol, 99,8% (v/v) etanol, dan 70% (v/v) etanol didapatkan hasil Ekstrak biji kacang tunggak dengan kadar fenolik tertinggi pada ekstrak dalam 80% aseton, sedangkan kadar terendah pada ekstrak dalam pelarut etanol (Yulistian, 2015).

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dhoni dengan penelitian yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi dan penggunaan pelarut

aseton dan metanol sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Dhoni adalah penggunaan pelarut asam asetat serta konsentrasi pada masing-masing pelarut yang digunakan.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Salim di tahun 2019 dengan menguji “Studi Optimasi Ekstraksi Kandungan Senyawa Fenolik Total Dan Uji Aktivitas Antioksidan Dari Daun Manggis (*Garcinia mangostana* Linn.)” Pelarut yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu pelarut air, metanol, etanol, aseton dan pelarut air dengan perbandingan konsentrasi yang berbeda terhadap metanol, etanol, dan aseton (50%, 75% dan 100%). Penggunaan kombinasi air dan pelarut organik dapat meningkatkan ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik. Hasil yang didapatkan adalah hasil ekstrak terbanyak dengan urutan tertinggi yaitu Aseton 50%, Aseton 75%, Metanol 50%, Metanol 75%, Etanol 50%, Metanol 100%, Etanol 75%, Aquadest, Etanol 100%, Aseton 100% (Salim, 2019).

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Salim dengan penelitian yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan dan penggunaan pelarut aseton dan metanol sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Salim adalah penggunaan pelarut etanol serta konsentrasi pada masing-masing pelarut yang digunakan.

5. Peneliti lainnya oleh Alfauzi tahun 2022 dalam “Ekstraksi Senyawa Bioaktif Kulit Jengkol (*Archidendron jiringa*) dengan Konsentrasi Pelarut Metanol Berbeda sebagai Pakan Tambahan Ternak Ruminansia”. Pada penelitian ini menggunakan beberapa perlakuan yaitu P1: Akuades 100% P2: Metanol 24% (75% akuades + 25% metanol) P3: Metanol 48% (50% akuades + 50% metanol) P4: Metanol 72% (25% akuades + 75% metanol)

P5: Metanol 96% (100% metanol). Dari penelitian ini didapatkan hasil total rendemen ekstrak terbanyak yaitu pada perlakuan dengan 75% akuades + 25% metanol dan 50% akuades + 50% metanol. Sedangkan kadar total fenol terbanyak didapatkan dengan perlakuan 100% metanol (Alfauzi, 2012).

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Alfauzi dengan penelitian yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan dan penggunaan pelarut metanol sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Alfauzi adalah perbedaan konsentrasi yang digunakan.

6. Peneliti lainnya oleh Zulharmitta di tahun 2010 dengan “Penentuan Pengaruh Jenis Pelarut Ekstraksi Terhadap Perolehan Kadar Senyawa Fenolat Dan Daya Antioksidan Dari Herba Miniran”. Dalam penelitian ini menggunakan 3 perlakuan yaitu Etanol : Air (50:50), Metanol : Air (50:50), Aseton : Air (50:50). Dalam penelitian ini didapatkan hasil perolehan kadar ekstrak rendemen dan kadar fenolat terbanyak dalam larutan yaitu pada perlakuan Metanol : Air (50:50) yaitu 167,9 mg/g dan 73,1111 mg/g (Zulharmitta, 2010).

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Zulharmitta dengan penelitian yang akan dijalankan adalah metode ekstraksi yang digunakan dan penggunaan pelarut aseton dan metanol sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Zulharmitta adalah konsentrasi pada masing-masing pelarut yang digunakan.

7. Peneliti lainnya oleh Nofita di tahun 2020 dengan judul “Penentuan Fenolik Total dan Flavonoid Ekstrak Etanol Kulit Batang Matoa (*Pometia pinnata* J.R & G. Forst) secara spektrofotometri. Dalam penelitian ini menggunakan sampel Kulit Batang Matoa untuk diidentifikasi kadar fenolik total dan

flavonoid secara spektrofotometri dengan menggunakan asam galat sebagai pembanding dengan reagen folin dan natrium karbonat. Dalam penelitian ini diperoleh kadar fenolik dan flavonoid berturut – turut sebesar  $201,450 \pm 0,017$  mg GAE/g ekstrak dan  $3,092 \pm 0,005$  mg QE/g ekstrak (Nofita, 2020). Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sampel kulit batang dan menggunakan instrument spektrofotometri dalam menentukan kadar dengan menggunakan asam galat sebagai pembanding dengan reagen folin dan natrium karbonat sedangkan perbedaannya ialah pada penggunaan jenis pelarut pada penelitian yang dilakukan oleh Nofita menggunakan pelarut etanol dalam mengekstraksi sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pelarut metanol dan aseton dalam mengekstraksi.

8. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar tahun 2021 dalam penelitian “Optimasi Suhu dan Waktu Ekstraksi Akar Pasak Bumi Menggunakan RSM (*Respond Surface Methodology*) dengan pelarut Etanol 70%. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan suhu dan waktu ekstraksi optimum pada proses ekstraksi akar pasak bumi menggunakan pelarut etanol 70%. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa titik optimum rendemen ekstraksi akar *E.longifolia* sebesar 4,07% diperoleh pada suhu  $51,8^{\circ}\text{C}$  dan waktu 12,13 jam dengan nilai D (desirability) sebesar 0,92. Uji validasi model RSM menunjukkan keakuratan sebesar 97,76%. Model persamaan regresi yang menggambarkan pengaruh suhu dan waktu ekstraksi terhadap rendemen akar *E. longifolia* adalah  $Y = - 70,1 + 2,536X_1 + 1,387X_2 - 0,02389X_1^2 - 0,0464X_2^2 - 0,00500X_1X_2$  (Anwar, 2021).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan parameter yang optimum

dalam menghasilkan kadar rendamen yang tinggi dengan menggunakan metode *Respond Surface Methodology*. Selain itu pemilihan parameter yang digunakan yaitu waktu ekstraksi. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar hanya menggunakan 1 pelarut dengan 2 parameter pengujian sedangkan penelitian yang akan dijalankan menggunakan 2 pelarut dengan 3 parameter.

#### ***F. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi terhadap persen rendamen ekstrak kulit batang anak dara
2. Untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi terhadap kadar fenolik total ekstrak kulit batang anak dara

#### ***G. Manfaat Penelitian***

1. Secara Teoritis

Mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan optimasi senyawa fenolik kulit batang anak dara, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Secara Praktisi

Mampu menambah wawasan bagi peneliti terkait optimasi senyawa fenolik kulit batang anak dara secara maserasi dengan pendekatan *Respond Surface Methodology*.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tumbuhan Anak Dara

##### 1. Klasifikasi Tumbuhan

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Class : Dicotyledonae

Sub Class : Sympetalae

Ordo : Euphorbiales

Family : Euphorbiaceae

Genus : *Croton*

Spesies : *Croton oblongus* Burm. F (Caroline. R & Tindale. M, 1993: 56)



**Gambar 1.** Tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)

## 2. Nama Daerah

Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera Utara), Semoeki (Ternate), dan Kowe (Tidore), Sinjai (Anak Dara) (Dalimartha.S, 2006: 26).

## 3. Habitat

Anak dara dapat tumbuh di berbagai tempat seperti hutan dengan ketinggian 700 m hingga di rawa-rawa. Umumnya anak dara dapat ditemukan di lereng bukit pengunungan, di dekat sungai atau sumber perairan serta dapat ditemukan pada tanah berkapur (Awainah, 2016).

## 4. Morfologi

Tumbuhan anak dara memiliki Panjang 2-3 meter dengan bentuk batang yang tegak berwarna putih kecoklatan. Memiliki daun tunggal yang lonjong dengan tepi daun yang bergerigi serta ujung daun yang runcing. Panjang daun sekitar 3-5 cm dengan lebar 1-4 cm. Memiliki bunga yang berada pada ujung batang serta memiliki mahkota bunga berbentuk corong dan disertai buah yang berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm yang berwarna hijau.

## 5. Kegunaan Tumbuhan

Anak dara ini secara empiris digunakan oleh masyarakat sinjai sebagai masker wajah. Selain itu tumbuhan ini biasanya digunakan sebagai penghilang nyeri, antiaging, penghilang bau badan serta dapat mengobati kanker (Khanitha Pudhom, 2011).

## ***B. Ekstraksi***

### **1. Pengertian Ekstraksi**

Ekstraksi adalah metode yang digunakan dalam pemisahan suatu komponen dengan campurannya yang menggunakan pelarut sebagai pemisah (Noor, 2021: 5). Ekstraksi bisa dikatakan juga sebagai suatu proses pengambilan suatu senyawa-senyawa yang menjadi target dalam bagian tumbuhan atau tanaman (Agung, 2017:70).

Prinsip yang digunakan dalam proses ekstraksi ialah dengan adanya pemisahan yang berdasarkan kemampuan pada pelarut tertentu, sehingga pelarut yang digunakan harus bisa menarik komponen analit secara maksimal. Umumnya proses ekstraksi akan semakin baik apabila luas permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan pelarut semakin luas. Sehingga semakin halus serbuk simplisia maka semakin baik juga hasil yang didapatkan dari proses ekstraksi (Noor, 2021:5).

### **2. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi yaitu memisahkan ataupun menarik senyawa dari campurannya atau simplisia. Metode ekstraksi dibagi berdasarkan terdapat ataupun tidaknya proses pemanasan sehingga dari hal tersebut metode ekstraksi dibagi menjadi dua tipe yaitu ekstraksi cara dingin dan cara panas. Ekstraksi dengan metode dingin pada prinsipnya tidak membutuhkan pemanasan sepanjang proses ekstraksi berlangsung yang bertujuan supaya senyawa yang diinginkan tidak rusak. Sebaliknya ekstraksi cara panas mengaitkan pemanasan sepanjang proses ekstraksi berlangsung bertujuan supaya mempercepat proses ekstraksi (Noor, 2021:8).

### 3. Metode Ekstraksi

Metode Ekstraksi dibedakan atas ada atau tidaknya proses pemanasan sehingga pembagian dalam metode ekstraksi adalah metode dingin dan basah. Ekstraksi dingin tidak memerlukan pemanasan selama proses ekstraksi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada senyawa. Sedangkan ekstraksi dengan menggunakan pemanasan tujuannya untuk mempercepat hasil ekstraksi (Noor, 2021:8)

#### a. Maserasi

Maserasi merupakan metode ekstraksi simplisia yang ditujukan untuk bahan atau simplisia yang tidak tahan panas dengan cara merendam di dalam pelarut tertentu selama waktu tertentu pula. Maserasi dilakukan pada suhu ruang 20-30° C untuk menghindari penguapan pelarut secara berlebihan akibat faktor suhu dan melakukan pengadukan selama 15 menit agar bahan dan juga pelarut tercampur (Noor, 2021:9).

Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari, cairan penyari tersebut nantinya akan menembus dinding sel serta akan masuk ke dalam rongga sel yang memiliki zat aktif, zat aktif tersebut akan larut sebab terdapat perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, sehingga dari itu larutan yang terpekat didesak keluar (Noor, 2021:9).

Kelebihan dari proses ekstraksi ini adalah biaya ekstraksi yang lebih murah dan efisien dalam pengerjaan serta dengan metode ini mampu menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Kelemahan dari metode maserasi adalah kurang efisien dari segi waktu yang bisa memakan waktu yang lama dalam proses mendapatkan suatu senyawa dari ekstrak. Satu kali ekstraksi bisa memerlukan minimal waktu sekitar 1

hari sampai dengan 1 minggu tergantung dari jenis sampel yang akan di ekstrak, semakin kuat jaringan dan dinding sel pada sampel maka semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi sehingga menghasilkan ekstrak yang memiliki senyawa yang diinginkan. Selain itu maserasi juga memerlukan pelarut dalam volume yang lebih banyak (Agung, 2017: 75).




**Gambar 2.** Maserasi (Julianto, 2019:20)

b. Perkolasi

Perkolasi merupakan suatu proses ekstraksi ketika simplisia yang telah halus, diekstraksi dengan pelarut yang sesuai dengan cara dilewatkan secara perlahan-lahan pada suatu kolom. Perkolasi ialah ekstraksi dengan memakai pelarut yang senantiasa baru yang biasanya dicoba pada temperature ruangan. Prinsip perkolasi ialah menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Metode ini membutuhkan waktu lebih lama serta pelarut yang lebih banyak (Noor, 2021:10).

Kelebihan dengan metode perkolasi adalah dapat digunakan pada skala yang lebih besar seperti pada industri. Metode ini efektif pada senyawa metabolit yang ada dalam sampel mudah terlarut dalam pelarut yang digunakan. Kelemahan dari metode ini adalah volume pelarut yang

dibutuhkan dalam jumlah yang besar karena dilakukan secara kontinyu dan tanpa adanya waktu kontak yang lama (Agung, 2017:75).



**Gambar 3.** Perkolator (Julianto, 2019:21)

#### c. Refluks

Refluks ialah tata cara ekstraksi yang dicoba pada titik didih pelarut tersebut, selama waktu tertentu dengan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan terdapatnya pendingin balik, untuk mendapatkan hasil penyarian lebih baik ataupun sempurna, refluks biasanya dilakukan berulang-ulang (3-6 kali) terhadap residu awal. Metode ini memungkinkan terbentuknya penguraian senyawa yang tidak tahan panas (Noor, 2021:11).


Kelebihan dari metode ini adalah penggunaan pelarut yang hemat karena proses ekstraksi dilakukan secara berkelanjutan sedangkan kelemahan dari metode ini adalah adanya penggunaan suhu yang tinggi yang berpotensi mendegradasi beberapa senyawa yang tidak stabil pada temperature yang tinggi (Agung, 2017: 79)

#### d. Soxhletasi

Soxhlet ialah tata cara ekstraksi dengan memakai pelarut yang baru, umumnya dicoba menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi

konstan dengan terbentuknya pendingin balik. Terdapatnya pemanasan menimbulkan pelarut ke atas setelah itu sehabis di atas akan diembunkan oleh pendingin udara menjadi tetesan-tetesan yang akan terkumpul kembali dan bila melewati batas lubang pipa samping soxhlet, hingga akan terjadi sirkulasi yang berulang-ulang dan menghasilkan penyarian yang baik (Noor, 2021:12).

Keuntungan dari metode ini adalah system kerjanya yang kontinyu sehingga dapat dilakukan secara cepat dan penggunaan pelarut yang digunakan dapat diminimalisasi. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah melibatkan proses pemanasan yang tinggi yang beresiko dalam kerusakan senyawa metabolit yang sensitif terhadap panas (Agung, 2017:81)



**Gambar 4.** Alat Soxletasi (Julianto, 2019: 22)

e. Infusa

Infusa merupakan sediaan cair yang terbuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada waktu 15 menit dengan suhu  $90^{\circ}\text{C}$ . Biasanya infusa senantiasa dibuat dari simplisia yang memiliki


jaringan lunak seperti bunga dan daun, yang mengandung minyak atsiri, dan zat-zat yang tidak tahan dengan pemanasan lama (Noor, 2021:14).

f. Destilasi (Penyulingan)

Destilasi adalah suatu proses pemisahan campuran dari dua atau lebih cairan sesuai titik didih dari zat-zat penyusunannya. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Pada proses pendinginan, senyawa serta uap air hendak terkondensasi serta terpisah jadi destilat air serta senyawa yang diekstraksi. Metode ini umum dipergunakan untuk menyari minyak atsiri yang berasal dari tanaman atau tumbuhan (Noor, 2021:14).

Pada cara ini, bahan yang hendak disuling kontak langsung dengan air atau terendam secara sempurna bergantung pada bobot jenis serta jumlah bahan yang hendak disuling. Ciri khas dari metode ini adalah kontak langsung antara bahan yang akan disuling dengan air mendidih (Julianto, 2019:27).


Pada penyulingan dengan air yang jadi fokus merupakan jumlah air yang terdapat dalam ketel. Perkiraan waktu penyulingan dengan jumlah air butuh diperhitungkan dengan matang sebab bila tidak diperhatikan maka akan berakibat gosong serta berdampak pada mutu minyak (Julianto, 2019:28).



**Gambar 5.** Destilasi (Julianto, 2019:28)

### g. Ultrasound-Assisted Extraction

Ultrasound-Assisted Extraction adalah cara canggih yang mempunyai keahlian mengekstraksi beberapa besar senyawa bioaktif dengan waktu ekstraksi yang lebih singkat. Keuntungan utama dari metode ini yaitu meningkatkan penetrasi pelarut ke dalam matriks sebab adanya gangguan dinding sel yang dihasilkan oleh kavitasi akustik. Serta ini mencapai pada suhu rendah dan karenanya ini lebih cocok untuk ekstraksi senyawa termal tidak stabil (Julianto, 2019:24).




**Gambar 6.** Alat Ultrasound-Assisted Extraction (Julianto, 2019:24).

### C. Senyawa Fenolik

Senyawa fenolik ialah senyawa metabolit sekunder yang ada dalam tanaman ataupun tumbuhan dengan ciri-ciri mempunyai cincin aromatik yang memiliki satu ataupun 2 gugus hidroksi (OH). Senyawa fenolik bisa dibedakan atas 2 tipe senyawa utama ialah senyawa fenolik yang berasal dari jalan asam asetat mevalonat serta jalan asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalan asam asetat mevalonat merupakan senyawa poliketida serta senyawa fenolik yang berasal dari jalan asam asetat merupakan fenil propanoid. Ditemui pula senyawa fenolik yang berasal dari campuran 2 jalan biosintesis ini ialah senyawa flavonoid.

Senyawa fenolik dipecah jadi jadi sebagian kelompok ialah fenol simpel serta asam fenolat, fenilpropanoid, flavonoid, serta tannin (Julianto, 2019:35).



**Gambar 7.** Struktur Fenol (Kusnadi, 2018)

Terdapat sebagian pendekatan dalam pengelompokkan senyawa fenol. Ada yang dibedakan atas dasar jumlah gugus hidroksil pada cincin aromatik, di mana terdapat 1-, 2-, ataupun polyatomic fenol. Tidak hanya itu terdapat pengelompokkan yang didasarkan pada jumlah cincin aromatik serta jumlah atom karbon pada rantai samping. Bersumber pada pendekatan ini hingga fenolik dipecah jadi 4, seperti fenolik dengan satu cincin aromatik, fenolik dengan 2 cincin aromatik, quinone, dan polimer. Lebih kompleks lagi terdapat pengklasifikasian bersumber pada jalinan dengan gula maupun sebagian asam organik. Senyawa fenol yang mempunyai lebih dari satu gugus hidroksil pada cincin aromatik diucap selaku senyawa polifenol. Polifenol bisa dikategorikan jadi 2 kelompok, ialah flavonoid serta non- flavonoid( Agung, 2017: 24).

Apabila didasarkan pada jalur biosintesisnya, senyawa fenolik bisa dibagi atas dua tipe senyawa utama ialah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat dan jalur asam sikimat. Kelompok senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat mevalonat adalah senyawa poliketida dan senyawa fenolik yang berasal dari jalur asam asetat adalah fenil propanoid. Didapatkan juga

senyawa fenolik yang berasal dari campuran dua jalur biosintesis ini yaitu senyawa flavonoid (Julianto, 2019:36).

Secara khusus senyawa fenolik dibagi jadi banyak klasifikasi, tetapi biasanya dapat diwakili oleh 3 kelas ialah

1. Memiliki cincin benzenaa tunggal( $C_6$ ) semacam katekol, hidrokuinon, floroglusinol, serta arbutin.
2. Memiliki cincin benzenaa dengan karbon terlampir( $C_6-C_n$ ) semacam asam salisilat, asam keliru, asam siringat, asam vanilin, asam klorogenat, asam kafein, kumarin, isokumarin, naptokuinon.
3. Memiliki lingkungan benzenaa(  $C_6C_nC_6$ ) semacam xantonoid, stilbenoid, antrakuinon, tanin, kuersetin, flavonoid (Mahardani, 2021).

Senyawa fenolik dikelompokan menjadi tiga kelompok (Yasni, 2013) :

1. Golongan fenol sederhana (vanilin, gingerol, shogaol, guaiakol, dan eugenol) dan asam fenol (p-kresol, 3-etilfenol, hidrokuinon, dan asam galat).
2. Turunan asam hidroksinamat (p-kumarin, kafein, dan firulin).
3. Flavonoid (antosianin, flavonon, flavonol, dan tanin)

Gugus-gugus OH yang ada pada struktur senyawa fenolik memberikan atom H sebagai donor radikal bebas oleh sebab itu biasanya menjadikan senyawa fenolik mempunyai berbagai manfaat yaitu: antioksidan, antiinflamasi, antidiabetik, imunoregulasi, antikanker, antimikrobia, melindungi dari penyakit jantung dan sebagainya (Mahardani, 2021).

Fenol bisa digunakan selaku antiseptik semacam yang digunakan Sir Joseph Lister dikala mempraktikkan operasi antiseptik. Fenol ialah komponen utama pada anstiseptik dagang, triklorofenol ataupun diketahui selaku TCP (trichlorophenol). Fenol pula ialah bagian komposisi sebagian anestetika oral, misalnya semprotan

kloraseptik. Fenol pula berperan dalam pembuatan obat-obatan bagian dari penciptaan aspirin, pembasmi rumput liar, serta yang lain.

#### ***D. Metode Identifikasi Metabolit***


##### **1. Spektrofotometri UV-Vis**

Spektrofotometer adalah instrumen yang mengukur transmitansi ataupun absorbansi suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Tiap senyawa atau warna yang terbentuk akan menyerap panjang gelombang cahaya yang berbeda-beda. Penyerapan sinar UV (200-350 nm) atau VIS (350-800 nm) hendak menimbulkan perubahan elektron, yaitu elektron akan dipromosikan dari kondisi dasar berenergi rendah ke orbit kondisi tereksitasi dengan energi yang lebih tinggi (Cairns, 2009).

Perpaduan antara spektrofotometri UV dan visible ialah spektrofotometri UV-Vis. Cara ini memakai dua buah sumber cahaya yang berbeda, ialah sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Oleh sebab itu, cara ini memudahkan dalam penggunaannya untuk sampel berwarna maupun untuk sampel tak berwarna. Spektrofotometri UV-Vis mengaitkan spektroskopi dari foton yang berada pada daerah UV-nampak. Akibatnya menggunakan cahaya yang terlihat dan berdekatan dekat ultraviolet (UV) dan berdekatan dengan inframerah (NIR) kisaran. Warna bahan kimia yang terlibat secara langsung dipengaruhi oleh penyerapan dalam rentang yang terlihat. Molekul mengalami transisi elektronik di wilayah ini dari spektrum elektromagnetik (Syafei, 2015).

Pada umumnya terdapat dua tipe instrumen spektrofotometer, yaitu single-beam serta double-beam. Single-beam instrument Gambar (8), dapat digunakan untuk kuantitatif dengan mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal. Single-beam instrument mempunyai beberapa keunggulan


yaitu sederhana, biaya murah, dan mengurangi biaya yang ada merupakan keuntungan yang nyata. Sebagian instrumen menghasilkan single-beam instrument untuk pengukuran sinar ultra violet dan sinar tampak. Panjang gelombang paling rendah adalah 190 sampai 210 nm dan paling tinggi adalah 800 sampai 1000 nm (Tati, 2017:3).



Gambar 8. Diagram alat spektrometer UV-Vis (single beam)

(Tati, 2017:3)

Double-beam dibuat untuk digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 nm. Double-beam instrument (Gambar 9) mempunyai dua sinar yang dibentuk oleh potongan cermin yang berbentuk V yang disebut pemecah sinar. Sinar pertama melewati larutan blanko dan sinar kedua secara serentak melewati sampel



Gambar 9. Skema spektrofotometer UV-Vis (Double-beam)

(Tati, 2017:4)

Prinsip kerja spektrofotometer ialah zat yang hendak diperiksa akan meresap sinar dengan panjang gelombang tertentu. Tiap zat mempunyai tingkatan penyerapan yang unik ataupun berbeda pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang dengan absorbansi paling tinggi digunakan buat mengukur kandungan zat yang diteliti. Jumlah sinar yang diserap sesuatu zat berbanding lurus dengan kandungan zat tersebut ( KEMENKES, 2010).

- a. Spektrofotometri UV- Visible juga bisa digunakan buat penentuan terhadap sampel yang berbentuk larutan, gas, ataupun uap. Biasanya sampel wajib diganti jadi sesuatu larutan yang jernih. Buat sampel yang berbentuk larutan butuh dicermati sebagian persyaratan pelarut yang dipakai antara lain: Wajib melarutkan sampel dengan sempurna.
- b. Pelarut yang dipakai tidak memiliki jalinan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya serta tidak bercorak( tidak boleh mengabsorpsi cahaya yang dipakai oleh ilustrasi).
- c. Tidak terjalin interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis.
- d. Kemurniannya wajib besar (Tati, 2017:4).

Kelebihan utama dengan cara spektrofotometri ialah kalau dengan cara ini membagikan metode simpel buat menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Tidak hanya itu, hasil yang diperoleh lumayan akurat, dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detector serta tercetak dalam wujud angka digital maupun grafik yang telah diregresikan (Yahya S, 2013).

Faktor-faktor yang kerap menimbulkan kesalahan dalam memakai spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit:

- a. Terdapatnya serapan oleh pelarut. Perihal ini bisa diatasi dengan pemakaian blangko, ialah larutan yang berisi tidak hanya komponen yang hendak dianalisis tercantum zat pembuat warna.

- b. Serapan oleh kuvet. Kuvet umumnya dari bahan gelas ataupun kuarsa, tetapi kuvet dari kuarsa mempunyai mutu yang lebih baik.
- c. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat rendah ataupun sangat besar, perihal ini bisa diatur dengan pengaturan konsentrasi, cocok dengan kisaran sensitivitas dari perlengkapan yang digunakan( lewat pengenceran ataupun pemekatan) (Sri Suyono, 2013).

## 2. Spektroskopi inframerah

Sebagian frekuensi nantinya diserap ketika sinar inframerah melewati sampel senyawa organik; Tetapi, sebagian frekuensi hendak ditularkan lewat ilustrasi tanpa terjalin penyerapan. Penyerapan inframerah dikaitkan dengan pergantian vibrasi yang terjalin di dalam molekul kala terserang radiasi inframerah. Oleh sebab itu, spektroskopi inframerah pada dasarnya bisa digambarkan selaku spektroskopi vibrasi (Julianto, 2019:32).

## 3. Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti – Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Spektroskopi Resonansi Magnetik Inti (NMR) dikaitkan dengan sifat-sifat magnetik dari inti atom tertentu; paling utama inti atom hidrogen, proton, karbon, serta isotop karbon. Spektroskopi NMR sudah membolehkan banyak periset buat menekuni molekul dengan merekam perbandingan antara bermacam inti magnetik, serta dengan demikian membagikan cerminan yang jelas tentang apa posisi inti- inti ini dalam molekul. Tidak hanya itu, alat ini juga dapat menampilkan atom- atom mana yang terdapat di kelompok orang sebelah. Pada kesimpulannya, itu bisa merumuskan berapa banyak atom yang muncul di tiap- tiap area. Sebagian upaya sudah dicoba sebelumnya dengan memakai kromatografi lapis tipis preparatif ataupun semi preparatif,

kromatografi cair, serta kromatografi kolom buat mengisolasi tiap- tiap fenol, struktur yang ditentukan selanjutnya oleh NMR secara off- line( Julianto, 2019:33).

#### 4. Spektrometri Massa untuk Identifikasi Senyawa Kimia

Molekul organik dibombardir dengan elektron ataupun laser dalam spektrometri massa serta dengan demikian diganti jadi ion bermuatan, yang sangat energik. Spektrum massa merupakan plot dari kelimpahan relatif ion terfragmentasi terhadap rasio massa/ muatan ion- ion ini. Memakai spektrometri massa, massa molekul relatif( berat molekul) bisa didetetapkan dengan akurasi besar serta rumus molekul yang pas bisa didetetapkan dengan pengetahuan tentang tempat- tempat di mana molekul sudah terfragmentasi. Dalam karya lebih dahulu, molekul bioaktif dari empulur diisolasi serta dimurnikan dengan ekstraksi pelarut bioaktivitas yang dipimpin, kromatografi kolom, serta HPLC. Metode UV- visible, IR, NMR, serta spektroskopi massa digunakan buat mengkarakterisasi struktur molekul bioaktif. Berikutnya, molekul bisa dihidrolisis serta turunannya dicirikan( Julianto, 2019:33).

Spektrometri massa membagikan data yang melimpah buat elusidasi struktural senyawa kala tandem mass spectrometry( MS) diterapkan. Oleh sebab itu, campuran HPLC serta MS memfasilitasi identifikasi senyawa kimia yang kilat serta akurat dalam racikan- obat, paling utama kala standar murni tidak ada. Baru- baru ini, LC/ MS sudah banyak digunakan buat analisis senyawa fenolik. Ionisasi elektropray( ESI) merupakan sumber yang disukai sebab efisiensi ionisasi yang besar buat senyawa fenolik(Julianto, 2019:34).

#### **E. Response Surface Methodology (RSM)**

*Response Surface Methodology* (RSM) ialah tata cara kumpulan statistik serta matematika yang bermanfaat buat meningkatkan, tingkatan, serta

memaksimalkan proses, di mana reaksi dipengaruhi oleh sebagian aspek (variabel independen) (Sarabia, 2009). RSM menghubungkan suatu reaksi ataupun variable luaran (output) dengan informasi masukan (input) yang mempengaruhinya (Hidayat, 2020).

Trihaditia (2015) menambahkan, metode permukaan respon (RSM) merupakan sesuatu strategi percobaan yang bermanfaat bila respon dipengaruhi sebagian aspek dengan tujuan percobaan ialah buat mencari reaksi optimum. RSM mencakup permasalahan: pemilihan rancangan percobaan yang sesuai buat optimasi serta tata cara penelusuran ruang aspek buat menggapai wilayah optimum dengan cepat.

Pemakaian cara ini berperan buat meningkatkan, mengembangkan, serta mengoptimasi proses penentuan perumusan optimum. Pelaksanaannya sangat penting terkhusus di bidang rancangan, pengembangan serta formulasi produk baru, dan pada peningkatan rancangan produk yang telah terdapat. Tata cara yang digunakan ialah statistika buat memandang ikatan antara satu ataupun lebih variabel perlakuan serta tata cara permukaan reaksi ialah sesuatu himpunan metode- metode matematika yang dicoba secara berupa kuantitatif dengan suatu variabel reaksi yang bertujuan buat memaksimalkan reaksi tersebut dalam sesuatu percobaan( Aliyah, 2018).

Aspek terutama dalam penggunaan tata cara permukaan reaksi merupakan desain eksperimen (DoE). DoE bertujuan dalam pemilihan titik yang sangat sesuai dalam melaksanakan riset. Keuntungan pemakaian tata cara ini ialah pemodelan sistem secara matematis, mengirit waktu dan bayaran dengan kurangi jumlah percobaan( Aydar, 2018: 157).

Salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam metode *Respond Surface Methodology* adalah aplikasi *design expert* ver 13. *Design-Expert* adalah software

metode statistik yang diproduksi oleh stateease. Aplikasi ini pertama kali dirilis tahun 1996 dipergunakan untuk membantu melakukan desain eksperimental seperti menentukan formula optimum suatu sediaan. Tidak hanya optimasi, aplikasi ini pula dapat menginterpretasikan faktor-faktor dalam percobaan. Dalam aplikasi ini terbagi menjadi tiga pilihan arah penelitian tergantung dengan desain percobaan yang akan dilakukan. Terdapat pilihan *screening*, *characterization*, dan *optimization* (Hidayat, 2020).

*Respond surface design* atau desain permukaan respon merupakan desain untuk mencocokkan permukaan respon. Pencocokan menggunakan desain yang berbeda untuk setiap modelnya. Dalam RSM terdapat dua desain yaitu:

1. *Central Composite Design (CCD)*

*Central composite design* ialah proses optimasi dicoba buat mengenali ditaksir arah maksimal sebab dalam RSM optimasi serta posisi maksimal tidak dikenal. Tidak hanya itu pada CCD mempunyai rotatability ataupun pada titik  $x$  yang terletak pada jarak yang sama hendak mempunyai  $y(x)$  yang sama sehingga berarti buat dicoba. Titik uji yang dalam CCD diambil bersumber pada nilai batasan uji yang ditetapkan buat tiap- tiap aspek riset. Informasi reaksi yang diperoleh dimodelkan oleh model matematika yang cocok. Dalam CCD ada sebagian model ialah *mean*, *linier*, *quadratic*, *2 factor interaction (2FI)*, serta *cubic*. Kriteria pemilihan model reaksi sama semacam pada pemilihan model dalam *mixture design*. Penentuan titik optimum dilihat dari nilai desirability yang dihasilkan. *Desirability* membuktikan seberapa terpenuhi ataupun mendekati oleh titik optimum. Nilai *desirability* mendekati 1 merupakan nilai yang diharapkan. Titik optimum yang baik mempunyai *desirability* yang besar ataupun mendekati 1 (Hidayat, 2020).

## 2. *Box-Bhenken Design* (BBD)

*Box-Bhenken Design* (BBD) digunakan buat optimasi dengan 3 variabel independen. Perbandingan *Box-Bhenken Design* (BBD) dengan *Central Composite Design* (CCD) ialah pada rancangan *Box-Bhenken Design* percobaannya lebih efektif sebab sedikit run/ unit percobaan dibanding dengan *Central Composite Design*. Meski jumlah run yang lebih sedikit namun *Box-Bhenken* sanggup memprediksi nilai optimum baik linier ataupun kuadratik dengan baik (Hidayat, 2020).

## F. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan

Istilah yang popular tentang obat dalam berbagai teks-teks keagamaan ialah dawa' (bentuk tunggal) atau adwiyah (bentuk jamak) yang berarti obat. Sedangkan kata da' yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit (Rahim, Naid, Abu Nawas 2007, 1-3).

Terkait dengan istilah di atas, secara umum dapat ditemukan dalilnya pada Al-Qur'an yang berbicara tentang penyakit dan obat, sebagai berikut:

Di dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 22

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضِيًّا فَرِيشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag, 2019)

Menurut tafsir Al-Misbah Allah bukan hanya mendapatkan kamu, tetapi Dia juga yang menjadikan bumi hamparan untuk kamu. Kalau kata *khalaqa* mencipta memberi kesan wujudnya sesuatu, baik melalui bahan yang telah ada sebelumnya maupun belum ada, serta menekankan bahwa wujud tersebut sangat hebat, dan tentu lebih hebat lagi Allah yang mewujudkannya. Kalau kata *khalaqa* demikian halnya,

maka kata *ja 'ala*, mengandung makna mewujudkan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya sambil menekankan bahwa yang wujud itu sangat bermanfaat dan harus diraih manfaatnya, khususnya oleh yang untuknya diwujudkan sesuatu itu, yakni oleh manusia.

Dari tafsir tersebut menjelaskan manusia yang untuknya dijadikan bumi ini terhampar harus meraih manfaat lahir dan batin, material dan spiritual dari dijadikannya bumi ini terhampar. Jangan biarkan bumi, tanpa dikelola dengan baik. Makmurkan ia untuk kemaslahatan hidup, sambil mengingat bahwa sebagaimana ada makhluk yang diciptakan-Nya sebelum kamu, ada juga makhluk yang akan datang sesudah kamu. Yang sebelum kamu telah memanfaatkan bumi ini tanpa menghabiskannya, bahkan masih menyisakan banyak untuk kamu, maka demikian pula seharusnya kamu wahai seluruh manusia masa kini, jangan habiskan atau rusak bumi. Ingatlah generasi sesudah kamu.

Dijadikannya bumi terhampar bukan berarti dia diciptakan demikian. Bumi diciptakan Allah bulat atau bulat telur. Itu adalah hakikat ilmiah yang sulit dibantah. Keterhamparannya tidak bertentangan dengan kebulatannya. Allah menciptakannya bulat untuk menunjukkan betapa hebat ciptaan-Nya itu. Lalu Dia menjadikan yang bulat itu terhampar bagi manusia, yakni ke manapun mereka melangkahkan kaki mereka akan melihat atau mendapatkannya terhampar. Itu dijadikan Allah agar manusia dapat meraih manfaat sebanyak mungkin dari dijadikannya bumi demikian. Firman-Nya: Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu, memberi kesan tentang betapa bumi telah dijadikan Allah swt. begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia, sehingga kehidupan tidak ubahnya bagaikan kasur yang terhampar dan siap untuk ditiduri.

Dari tafsir juga menjelaskan dalam surah al-baqarah ayat 22 bahwa sungguh banyak yang tidak menyadari hal ini. Seandainya Allah swt. mencabut salah satu

sarana kenyamanan atau tidak menyempurnakannya, niscaya manusia akan mengalami kesulitan hidup. Camkanlah apa yang akan terjadi bila udara yang dihirup telah terkena polusi atau lingkungan tercemar. Allah tidak menciptakannya demikian karena Dia menjadikan bumi agar dihuni dengan nyaman.

Penciptaan langit dan bumi dalam keadaan seperti yang digambarkan di atas, tersedianya air dan tumbuh berkembang dan berbuahnya pohon-pohon menunjukkan betapa Allah telah mendptakan alam raya demikian bersahabat dengan manusia, hingga menjadi kewajiban manusia menyambut persahabatan itu dengan memelihara dan mengembangkannya sebagaimana dikehendaki Allah swt. dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi (Shihab, 2000).

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah swt. menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beragam jenisnya, dengan adanya tumbuhan yang beraneka ragam jenis ini tentunya memiliki kandungan fitokimia yang beragam pula. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi yang nantinya digunakan dalam berbagai proses. Zat-zat hasil fotosintesis tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tumbuhan juga menghasilkan metabolisme sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari lingkungannya seperti serangan dari serangga, bakteri, jamur dan jenis pathogen lainnya.

Dari tanaman yang bervariasi atau beragam jenisnya baik berbeda famili ataupun spesies akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda pula. Metabolit sekunder yang berbeda dapat mempunyai manfaat yang sama atau berbeda, tergantung proses biokimiawi yang dipengaruhi. Tentunya hal ini merupakan bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu agar dapat dimanfaatkan dalam pengobatan (Shihab, 2002).

Salah satu makhluk hidup ciptaan Allah yang mempunyai berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu Tanaman. Tanaman dapat memberikan manfaat bagi makhluk hidup seperti berupa vitamin, minyak serta manfaat lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. Asy-syu'araa/26:7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kemenag, 2019)

Menurut tafsir al-misbah Kata *ila* ke pada firman-Nya di awal ayat ini: *awalam yarn ila al-ardh* apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya.

Kata *zauj* berarti pasangan. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah yang terhampar di bumi, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga mem butuhkan pasangannya. Yang jelas, setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja, bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu.

Dari firman tersebut Allah swt. Telah memberikan informasi terdapat banyak tumbuhan dengan sejuta manfaat yang telah diciptakan dengan baik sehingga umat manusia dapat memanfaatkannya dengan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan spesies tanaman anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) secara empiris masyarakat memanfaatkan sebagai kosmetik yaitu masker pada wajah, sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit. Anak dara juga mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan.

Semua yang diciptakan Allah Swt. memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen.

Selain itu pada ayat 9 Q.S Asy-Syu'ara, Allah SWT. berfirman :

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya : “Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang benar-benar Maha Perkasa lagi Maha Penyayang” (Kemenang, 2019)

Pada ayat ini sebenarnya Allah SWT. memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka dengan berbagai macam cara seperti Allah menghancurkan umat-umat dahulu yang durhaka. Ada yang dihancurkan dengan topan dan banjir besar, ada yang dimusnahkan dengan gempa yang dahsyat, dan ada pula dengan suara keras yang mengguntur. Namun demikian, Allah mempunyai sifat rahmat dan kasih sayang. Oleh sebab itu, Allah tidak menimpakan kepada kaum musyrik Mekah siksa azab yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dengan harapan mungkin ada di antara orang-orang kafir yang membangkang dan menantang itu atau anak cucunya yang akan beriman (Departemen Agama, 2009).

Berdasarkan uraian ayat diatas yang menjelaskan tentang nikmat dan kebesaran Allah SWT. yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, maka dapat diasumsikan bahwa Allah SWT mengingatkan kepada manusia di bumi ini terdapat

banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan untuk dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, tugas kita sebagai manusia adalah meneliti dan mengolah tumbuh-tumbuhan itu, baik yang terdapat pada daun, akar, batang dan bagian tumbuhan lainnya karena tak satupun yang Allah SWT. ciptakan dengan sia-sia (tidak ada manfaat).

Salah satu tumbuhan yang diduga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah tumbuhan anak dara. Kandungan metabolit skunder yang terdapat pada tumbuhan tersebut dapat dikaji secara ilmiah untuk dimanfaatkan sebagai alternative pengobatan dari bahan alam.

Allah menciptakan penawar bagi segala macam penyakit. Sebagaimana hadist Rasulullah saw. Yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً


Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] telah menceritakan kepada kami [Abu Ahmad Az Zubairi] telah menceritakan kepada kami [Umar bin Sa'id bin Abu Husain] dia berkata; telah menceritakan kepadaku [Atha' bin Abu Rabah] dari [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga."(HR. Bukhari No. 5246)

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pada kitabnya yang berjudul Ath-Thibban-Nabawi, hadits yang mengandung pengabsahan terhadap adanya sebab musabab dan sanggahan terhadap orang yang menolak fenomena tersebut. Sebab, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas yang diajarkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah menyatakan bahwa kesembuhan dari penyakit itu bergantung dalam cocoknya obat dengan penyakit tersebut. Lantaran setiap ciptaan Allah itu niscaya terdapat lawan kebalikannya maka setiap penyakit niscaya juga

terdapat lawan kebalikannya, yaitu obat yang sebagai penyembuh dari lawan penyakit tersebut.

Dari ayat-ayat dan hadits tersebut, dapat diambil hikmah bahwasannya Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dengan maksud dan tujuan tertentu. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi setiap makhluk hidup. Dalam hal ini, tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan dari pemanfaatan bahan alam.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui optimasi ekstraksi pada Kulit Batang Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) secara maserasi menggunakan pendekatan *Response Surface Methodology*.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Maret 2023-Juni 2023.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental laboratorium.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi Penelitian**

Populasi pada penelitian ini menggunakan tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang berasal dari Kecamatan Borong, Kabupaten Sinjai.

## 2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan adalah kulit batang anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)

### **D. Alat dan Bahan**

#### 1. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, bejana maserasi, blender, corong, cawan porselin, erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, aplikasi *design expert* ver.13, kuvet, spatel, spektrofotometri Uv-Vis tabung reaksi, timbangan analitik, *rotary evaporator*, rak tabung dan vial.

#### 2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk simpilisia kulit batang anak dara, aquadest, aseton, asam galat, metanol, natrium karbonat, kertas saring, reagen Folin-Ciocalteu 7,5%.

### **E. Cara Kerja**

#### 1. Penyiapan Sampel

##### a. Pengambilan sampel

Sampel kulit batang anak dara (*Croton oblongus* Burm F) diambil di daerah Kecamatan Borong, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan.

##### b. Penyiapan sampel

Sampel kulit batang anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang telah diperoleh kemudian disotasi kering dan basah lalu dikeringkan. Sampel yang telah kering kemudian di serbukkan dan sampel siap untuk di ekstraksi.

## 2. Optimasi Proses Ekstraksi

### a. Penentuan Parameter Uji

Pada penelitian ini terdapat tiga parameter uji yang digunakan dalam menentukan optimasi dari ekstraksi kulit batang kulit batang anak dara yaitu Jenis Pelarut (Aseton dan Metanol), Konsentrasi Pelarut (50%,75% dan 100%) dan Waktu Ekstraksi (1 hari, 2 hari dan 3 hari).

### b. Ekstraksi

Sampel yang telah dikeringkan, selanjutnya ditimbang 10 g, kemudian dimasukkan ke dalam bejana maserasi dan di ekstraksi secara maserasi dan setiap bejana menggunakan masing-masing konsentrasi pelarut (50%,75% dan 100%). Ekstraksi dilakukan selama 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Setelah ekstraksi telah selesai, hasil ekstrak cair selanjutnya disaring dan diuapkan menggunakan alat *rotary evaporator*.

### c. Penentuan Bobot Ekstrak Hasil Maserasi dan Persen Rendamen

Ekstrak cair yang telah di uapkan menggunakan *rotary evaporator* ditimbang dan dihitung % rendamennya dengan rumus :

$$\% \text{ rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} \times 100\%$$

## 3. Penentuan Kadar Fenolik dengan metode Spektrofotometri UV-Vis

### a. Pembuatan Larutan Stok

Dibuat larutan stok asam galat dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara menimbang 50 mg asam galat dilarutkan dalam metanol hingga 100 mL.

#### b. Penentuan Panjang gelombang maksimum

Sebanyak 0,3 mL diambil dari salah satu seri konsentrasi larutan asam galat lalu ditambah dengan 1,5 mL pereaksi Folin Ciocalteu 10%. Setelah itu didiamkan selama 3 menit lalu ditambahkan 1,2 mL natrium karbonat, digojog homogen lalu didiamkan selama 120 menit lalu diukur absorbansinya pada panjang gelombang 400-800 nm (Haeria, 2014).

#### c. Pembuatan Kurva Baku

Larutan asam galat dibuat dengan masing-masing seri konsentrasi 25, 35, 45, 55 dan 65 ppm dengan mengencerkan larutan stok konsentrasi 500 ppm. Masing-masing konsentrasi larutan standar asam galat diambil sebanyak 0,3 mL lalu ditambah dengan 1,5 mL pereaksi Folin Ciocalteu 10%. Setelah itu didiamkan selama 3 menit lalu ditambahkan 1,2 mL natrium karbonat, digojog hingga homogen lalu didiamkan selama 120 menit (Nofita, 2020). Masing-masing larutan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 798.

#### 4. Penentuan Kadar Fenolik Total

Ekstrak kulit batang anak dara sebanyak 100 mg dilarutkan dalam metanol hingga volumenya 25 mL. Selanjutnya larutan tersebut dipipet 0,3 mL lalu diencerkan dengan aquadest hingga volumenya menjadi 50 mL. Hasil enceran tersebut dipipet sebanyak 0,3 mL kemudian ditambahkan 1,5 mL reagen folin 10%. Selanjutnya larutan dihomogenkan dan didiamkan selama 3 menit. Setelah didiamkan selama 3 menit larutan tersebut ditambahkan 1,2 mL natrium karbonat 7,5% lalu didiamkan selama 120

menit lalu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 798 nm (Nofita, 2020).

5. Analisis *Response Surface Methodology* (software *design expert* version 13)

Penentuan parameter optimum ekstraksi menggunakan *Response Surface Methodology*. RSM merupakan kumpulan data matematika dan teknik statistik untuk mengoptimalkan respon (*variabel output*) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel independen (*variabel input*) berdasarkan parameter yang digunakan.

6. Tahap Pembuatan Rancangan

Software *design expert* 13 digunakan dalam rancangan respon dengan tujuan menentukan variabel bebas dan variabel tetap. Variabel tetap (Y) meliputi rendamen (Y1) dan kadar fenolik (Y2) sedangkan variabel bebas terdiri dari jenis pelarut (X1), konsentrasi pelarut (X2) dan lama waktu ekstraksi (X3).

**Tabel 1.** Desain Eksperimen Aplikasi *Design Expert* Ver 13

Desain Eksperimen

Run Order	Konsentrasi Pelarut (%)	Waktu Ekstraksi (Hari)	Jenis Pelarut
1	50	1	Aseton
2	100	1	Aseton
3	50	3	Aseton
4	100	3	Aseton
5	50	2	Aseton
6	100	2	Aseton
7	75	1	Aseton
8	75	3	Aseton
9	75	2	Aseton

10	75	2	Aseton
11	75	2	Aseton
12	75	2	Aseton
13	75	2	Aseton
14	50	1	Metanol
15	100	1	Metanol
16	50	3	Metanol
17	100	3	Metanol
18	50	2	Metanol
19	100	2	Metanol
20	75	1	Metanol
21	75	3	Metanol
22	75	2	Metanol
23	75	2	Metanol
24	75	2	Metanol
25	75	2	Metanol
26	75	2	Metanol

## 7. Teknik Analisa Data

### a. Penentuan kadar fenolik

$$y = a + bx$$

dimana :

y = nilai estimasi variabel terikat

a = titik potong regresi pada sumbu y

b = gradient garis regresi

x = nilai variabel-bebas (Novita, 2020)

### b. Validasi Metode (Nilai standar deviasi)

$$SD = \frac{\sqrt{\sum(y-y_1)^2}}{n-1} \text{ (Novita, 2020)}$$

### c. Validasi parameter

Variabel respon (Y) yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi *design expert* ver 13 Untuk menentukan rumus model linier kuadrat. Variabel respon (Y) terdiri dari persen rendamen ekstrak (Y<sub>1</sub>) dan total kadar fenolik (Y<sub>2</sub>).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Optimasi Proses Ekstraksi*

Penelitian yang dilakukan menggunakan sampel dari kulit batang anak dara (*Croton oblongus* Burm. F) yang diperoleh dari Kecamatan Borong, Kabupaten Sinjai. Tumbuhan anak dara merupakan salah satu tumbuhan yang digunakan secara empiris oleh masyarakat sinjai sebagai masker wajah yang dipercaya dapat mengencangkan kulit. Selain itu, kulit batang anak dara dapat mengobati penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan.

Kulit batang anak dara diekstraksi menggunakan metode maserasi karena memiliki kelebihan yaitu biaya yang murah, mudah untuk dilakukan serta tanpa pemanasan sehingga meminimalisir kerusakan komponen senyawa kimia yang terdapat pada sampel (Agnes, 2021). Ekstraksi bertujuan dalam menarik serta memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda dalam berbagai komponen kimia yang ada pada tumbuhan dan tanaman.

Parameter yang mempengaruhi hasil dari ekstraksi yaitu jenis pelarut, konsentrasi pelarut serta waktu maserasi sehingga dalam penelitian ini dilakukan optimasi dari maserasi kulit batang anak dara menggunakan parameter tersebut untuk mengetahui parameter yang optimal dalam menghasilkan rendamen serta kadar fenolik yang maksimal. Jenis pelarut mempengaruhi hasil dari ekstraksi, menurut prinsip *like dissolves like*, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan sebaliknya (Agnes, 2021).

Pelarut polar yang dapat mengesktrak senyawa fenolik adalah air, aseton dan metanol. Air digunakan sebagai pelarut karena bersifat polar, universal dan mudah didapat. Berdasarkan penelitian Al fauzi *et al* (2022) kadar fenolik tertinggi

ekstrak kulit jengkol diperoleh dari pelarut metanol. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Salim *et al* (2019) kadar fenolik tertinggi ekstrak daun mangga diperoleh dengan menggunakan pelarut aseton. Penggunaan suatu pelarut dapat menjadi optimal jika faktor konsentrasi, waktu dan metode ekstraksi sesuai.

Pada penelitian ini kulit batang *Croton oblongus* Burm. F ditimbang sebanyak 10 gram kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dan aseton dengan perbandingan pelarut yaitu 50%, 75% dan 100% dengan waktu ekstraksi 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Pengerjaan dilakukan sesuai dari data eksperimen yang telah diplot melalui aplikasi *Design Expert* ver 13 dan dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil ekstraksi selanjutnya diuapkan menggunakan *rotaryevaporator* untuk mendapatkan ekstrak kental. Ekstrak kulit batang anak dara berwarna kecoklatan dengan wujud kental. Hasil ekstrak yang didapatkan dianalisis kadar fenoliknya menggunakan spektrofotometri uv-vis.

**Tabel 2.** Optimasi ekstraksi kulit batang anak dara

		<b>Factor 1</b>	<b>Factor 2</b>	<b>Factor 3</b>	<b>Response 1</b>	<b>Response 2</b>
<b>Std</b>	<b>Run</b>	A:Konsentrasi Pelarut %	B:Waktu Maserasi Hari	C:Jenis Pelarut	Rendamen %	Kadar Fenolik mgGAE/g
<b>19</b>	1	100	2	Metanol	9.76	52.1577
<b>9</b>	2	75	2	Aseton	7.6	26.1756
<b>25</b>	3	75	2	Metanol	9.3	31.0565
<b>26</b>	4	75	2	Metanol	9.4	32.8125
<b>18</b>	5	50	2	Metanol	7.37	13.9137
<b>24</b>	6	75	2	Metanol	9.2	32.247
<b>11</b>	7	75	2	Aseton	7.5	21.8304
<b>6</b>	8	100	2	Aseton	4.88	21.8304
<b>12</b>	9	75	2	Aseton	7.5	23.497
<b>10</b>	10	75	2	Aseton	7	23.7351
<b>8</b>	11	75	3	Aseton	8.4	41.8601
<b>23</b>	12	75	2	Metanol	9.3	31.1756
<b>16</b>	13	50	3	Metanol	10.03	21.7113
<b>13</b>	14	75	2	Aseton	7.6	26.7411
<b>7</b>	15	75	1	Aseton	7	32.9911

<b>2</b>	16	100	1	Aseton	2.73	23.0804
<b>20</b>	17	75	1	Metanol	7.71	26.1756
<b>22</b>	18	75	2	Metanol	9.1	35.3423
<b>4</b>	19	100	3	Aseton	7.8	42.9315
<b>5</b>	20	50	2	Aseton	5.39	29.0923
<b>1</b>	21	50	1	Aseton	3.67	14.3304
<b>21</b>	22	75	3	Metanol	10.53	39.4792
<b>15</b>	23	100	1	Metanol	9.5	50.878
<b>14</b>	24	50	1	Metanol	4.55	12.5744
<b>3</b>	25	50	3	Aseton	7.02	23.7649
<b>17</b>	26	100	3	Metanol	10.08	60.1935

### ***B. Pemilihan Model Respond Rendamen dan Kadar Fenolik***

Data hasil pengukuran rendemen ekstrak yang diperoleh selanjutnya diinput kedalam aplikasi *Design Expert* ver 13 untuk mengetahui parameter uji optimum dalam menghasilkan rendemen dan kadar fenolik ekstrak kulit batang anak dara. Pengaruh parameter uji terhadap rendemen ekstrak yang dihasilkan dapat dilihat pada model *Summary Statistic* di bawah ini

**Tabel 3.** Hasil pemilihan model berdasarkan model *Summary Statistic* rendamen

#### **Model Summary Statistics**

Source	Std. Dev.	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Predicted R <sup>2</sup>	PRESS	
Linear	<b>1.23</b>	<b>0.6817</b>	<b>0.6383</b>	<b>0.5076</b>	<b>51.75</b>	<b>Suggested</b>
<b>2FI</b>	1.19	0.7459	0.6657	0.2482	79.02	
Quadratic	<b>0.8657</b>	<b>0.8788</b>	<b>0.8217</b>	<b>0.4378</b>	<b>59.09</b>	<b>Suggested</b>
<b>Cubic</b>	0.3491	0.9861	0.9710	0.7034	31.17	Aliased

Focus on the model maximizing the **Adjusted R<sup>2</sup>** and the **Predicted R<sup>2</sup>**.

Pemilihan model menggunakan *Summary Statistic* menurut Montgomery (2001) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai adjust R<sup>2</sup> dan Predicted R<sup>2</sup> yang maksimal. Selain itu nilai PRESS (*Prediction Error Sum of Squares*) dapat digunakan untuk memilih model yang terbaik dimana berdasarkan hal tersebut desain model yang disarankan adalah *Linear* dan *Quadratic*. PRESS menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai PRESS rendah maka

prediksi kesalahan semakin rendah. Seiring dengan nilai PRESS yang lebih rendah makin baik, model *Quadratic* memiliki *adjust R<sup>2</sup>* dan *predicted R<sup>2</sup>* sebesar 0,8217 dan 0,4378. Parameter *adjust R<sup>2</sup>* digunakan untuk mendapatkan nilai signifikan variable yang lebih tepat. Hal ini berarti variabel konsentrasi pelarut, waktu maserasi dan jenis pelarut berpengaruh terhadap respon rendamen sebesar 82,17% pada model *Quadratic*. Pada model linear juga disarankan oleh model dan memiliki nilai *adjust R<sup>2</sup>* dan *predicted R<sup>2</sup>* sebesar 0,6383 dan 0,5076. Hal ini berarti variabel konsentrasi pelarut, waktu maserasi dan jenis pelarut berpengaruh terhadap respon rendamen sebesar 63, 83% pada model linear.

**Tabel 4.** Hasil pemilihan model berdasarkan model *Summary Statistic* Kadar Fenolik

#### Model Summary Statistics

Source	Std. Dev.	R <sup>2</sup>	Adjusted R <sup>2</sup>	Predicted R <sup>2</sup>	PRESS	
<b>Linear</b>	7.58	0.6390	0.5897	0.4559	1906.24	
2FI	<b>5.16</b>	<b>0.8558</b>	<b>0.8103</b>	<b>0.6790</b>	<b>1124.51</b>	<b>Suggested</b>
<b>Quadratic</b>	4.84	0.8861	0.8325	0.6208	1328.33	
<b>Cubic</b>	4.40	0.9337	0.8620	-0.2475	4370.28	Aliased


Focus on the model maximizing the **Adjusted R<sup>2</sup>** and the **Predicted R<sup>2</sup>**.

Pemilihan model menggunakan *Summary Statistic* menurut Montgomery (2001) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai *adjust R<sup>2</sup>* dan *Predicted R<sup>2</sup>* yang maksimal. Selain itu nilai PRESS (*Prediction Error Sum of Squares*) dapat digunakan untuk memilih model yang terbaik dimana berdasarkan hal tersebut desain model yang disarankan adalah *2FI*. *2FI* memiliki nilai PRESS yang rendah dibandingkan dengan model *Linear* dan *Quadratic*. PRESS menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai PRESS rendah maka prediksi kesalahan semakin rendah. Seiring dengan nilai PRESS yang lebih rendah makin baik, model


2FI memiliki *adjust R<sup>2</sup>* dan *predicted R<sup>2</sup>* sebesar 0,8103 dan 0,6970. Parameter *adjust R<sup>2</sup>* digunakan untuk mendapatkan nilai signifikan variable yang lebih tepat. Hal ini berarti variabel konsentrasi pelarut, waktu maserasi dan jenis pelarut berpengaruh terhadap respon kadar fenolik sebesar 81,03% pada model 2FI.

Model terpilih didasarkan pada nilai standar deviasi dan PRESS (*Prediction Residuals Error Sum of Square*) terendah. Semakin besar nilai standar deviasi maka menunjukkan bahwa data semakin bervariasi, sehingga apabila nilai standar deviasi semakin kecil maka tingkat keseragaman data semakin besar (Santoso, 2008). Sedangkan nilai PRESS yang semakin kecil menunjukkan kesalahan data semakin kecil pula. Myers and Montgomery (2002), menyatakan bahwa penentuan model yang terbaik difokuskan pada nilai adjusted R<sup>2</sup> dan predicted R<sup>2</sup> yang maksimal. Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai R<sup>2</sup> menunjukkan semakin lemahnya hubungan antara variabel dependent dan independent (Nisfiannoor, 2009). Menurut Nawari (2010), nilai R<sup>2</sup> berkisar pada angka 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka pengaruh variabel peduga (Independent) terhadap variabel tergantung (dependent) semakin kuat.

### ***C. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap Rendamen Ekstrak Kulit Batang Anak Dara***




(a)




(b)

**Gambar 10.** Contour Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Rendamen



(a)



(b)

**Gambar 11.** Surface Plot Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Rendamen

Rendemen adalah perbandingan antara berat sampel bahan baku dengan berat ekstrak yang didapatkan. Persentase rendemen ekstrak yang semakin tinggi maka menunjukkan ekstrak yang dihasilkan semakin besar. Hasil rendemen suatu sampel sangat diperlukan guna mengetahui berapa banyak ekstrak yang diperoleh selama proses ekstraksi. Hasil rendemen berhubungan dengan senyawa aktif suatu sampel. Bahwa apabila jumlah rendemen yang dihasilkan tinggi maka senyawa yang didapatkan juga tinggi (Alfauzi, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan pada gambar 10 (*Contour Plot*) terlihat sumbu x dan sumbu y menunjukkan variabel yang di optimasi. Sumbu x menunjukkan konsentrasi sedangkan sumbu y menunjukkan waktu maserasi. Garis-garis yang ada dalam contour plot menunjukkan respon. Garis yang terluar menunjukkan nilai respon terendah dan semakin ke dalam maka garis menunjukkan nilai respon yang paling tinggi. Titik-titik merah yang tersebar menggambarkan hasil dari tiap pengujian yang dilakukan. Pada contour tersebut menunjukkan semakin mendekati area yang memiliki warna hijau ke kuning (pelarut aseton) maka nilai optimasi dikatakan semakin baik dan apabila nilai respon semakin dekat dengan daerah yang berwarna merah (pelarut methanol) maka titik tersebut memiliki nilai respon yang semakin tinggi. Dari gambar 10 menunjukkan bahwa jumlah rendemen terendah dan tertinggi dilihat dari contour yang berwarna biru hingga merah sehingga rendemen tertinggi didapatkan dengan menggunakan jenis pelarut methanol dengan konsentrasi 75-100% dengan waktu maserasi 2-3 hari.

Gambar 11 (*Surface Plot*). menunjukkan kurva permukaan respon untuk faktor konsentrasi pelarut waktu maserasi terhadap respon rendemen. Grafik surface plot bertujuan membantu visualisasi dari besarnya respon untuk setiap perlakuan yang berbeda melalui kelengkungan pada plot tiga dimensi (Faulina et al., 2011). Berdasarkan kurva tersebut terdapat titik-titik merah tersebar yang

menggambarkan hasil dari tiap pengujian yang dilakukan. Berdasarkan kurva tersebut juga dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi pelarut, waktu maserasi maka respond rendamen ekstrak kulit batang anak dara juga semakin tinggi meski peningkatan yang terjadi tidak signifikan pada pelarut aseton. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi pelarut dan waktu maserasi akan mempengaruhi hasil rendamen dari ekstrak kulit batang anak dara, begitupun dengan pemilihan jenis pelarut.

Menurut Alfauzi (2022) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi jumlah ekstrak atau rendemen pada proses ekstraksi antara lain sifat dan kepolaran pelarut, jumlah komponen zat aktif yang terdapat dalam sampel, metode ekstraksi yang digunakan serta waktu ekstraksi. Semakin lama waktu ekstraksi, semakin meningkat penetrasi pelarut ke dalam bahan baku sehingga rendemen ekstrak yang dihasilkan semakin meningkat (Sembiring et al, 2020). Selain itu salah satu faktor yang juga berpengaruh pada metode maserasi adalah jenis pelarut.

Pemilihan jenis pelarut mampu mempengaruhi hasil rendamen. Menurut Voight (1994) proses ekstraksi dimulai dengan mengalirnya pelarut ke dalam sel yang menyebabkan protoplasma membengkak dan bahan yang terkandung dalam sel akan terlarut sesuai dengan kelarutannya. Kemampuan melarutkan yang tinggi ini berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang diekstraksi (Vogel, 1978). Semakin mirip kepolaran pelarut dengan kepolaran zat yang terkandung dalam bahan yang diekstraksi maka akan semakin banyak komponen zat yang dapat diekstraksi sehingga dapat terjadi peningkatan rendemen yang diperoleh. Peningkatan tersebut disebabkan oleh semakin mudahnya pengikatan zat dalam bahan oleh pelarut (Prayoga, 2019). Larutan pengestraksi yang digunakan disesuaikan dengan kepolaran senyawa yang diinginkan. Menurut prinsip *like dissolves like*, suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai

tingkat kepolaran yang sama. Pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan sebaliknya (Agnes, 2021).

Gambar 10 dan 11 menunjukkan jumlah rendamen terbanyak dimiliki oleh parameter dengan menggunakan jenis pelarut metanol dengan konsentrasi 75% dan waktu maserasi 3 hari dengan persen rendamen 10,53%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepolaran senyawa yang terkandung pada ekstrak kulit batang anak dara identik dengan kepolaran metanol yang memiliki konstanta dielektrik sebesar 33 (Agnes, 2021). Tingginya rendamen ekstrak kulit batang anak dara menunjukkan pelarut metanol mampu mengekstrak senyawa lebih baik karena perolehan senyawa didasari oleh kesamaan sifat kepolaran terhadap pelarut (Prayoga, 2019).

Pada penelitian ini tingkat konsentrasi 50% pelarut metanol dan aseton memiliki nilai rendamen yang paling rendah dimana konsentrasi aquadest yang dipadukan dengan pelarut baik itu pelarut methanol dan aseton yang digunakan dalam penelitian ini tidak meningkatkan hasil rendamen ekstrak dalam artian semakin tinggi jumlah aquadest yang dipadukan dengan pelarut methanol tidak meningkatkan hasil rendamen ekstrak. Hal ini disebabkan karena air bersifat polar sedangkan metanol bersifat universal (polar, semi-polar, dan non polar) sehingga tidak hanya senyawa yang bersifat polar mampu diekstraksi namun senyawa bersifat universal juga ikut terekstrak (Alfauzi,2022). Mahasuari et al. (2020) menyatakan bahwa ditinjau dari tingkat polaritasnya, air memiliki polaritas yang tinggi sehingga mampu menarik senyawa polar sedangkan metanol merupakan pelarut universal yang mampu menarik senyawa polar, semi-polar, dan non polar.

Berbeda jika kombinasi antara aquadest dan pelarut dengan tingkat konsentrasi pelarut lebih tinggi dibanding aquadest yaitu konsentrasi 75% mampu memiliki tingkat rendamen yang tinggi dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan


karena penggunaan kombinasi air dan pelarut organik mampu meningkatkan ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik (Salim, 2019). Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim (2019) dengan membandingkan pengaruh konsentrasi pelarut yang digunakan dimana hasil rendamen metanol 75% ( $20,38 \pm 0,34$ ) lebih tinggi dibandingkan dengan hasil rendamen metanol 100% ( $17,72 \pm 0,58$ ). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sim (2019) dengan membandingkan pelarut aseton, methanol dan etanol didapatkan hasil rendamen pada pelarut methanol lebih tinggi dibandingkan aseton yaitu 20,13% dan 9,04%.

Pada penelitian ini pelarut metanol mampu menghasilkan persen rendamen yang lebih baik dibandingkan pelarut aseton hal ini dikarenakan metanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan hampir semua senyawa organik baik polar maupun non polar karena metanol memiliki gugus polar (-OH) dan gugus nonpolar (-CH<sub>3</sub>) (Roxb, 2012), sehingga metanol mempunyai kemampuan melarutkan senyawa yang lebih besar jumlahnya dibandingkan aseton. Selain itu jumlah rendamen dengan menggunakan pelarut metanol mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya waktu ekstraksi. Hal tersebut dikarenakan semakin lama waktu ekstraksi maka semakin lama kontak antara senyawa yang terdapat dalam sampel dengan pelarut, sehingga rendemen yang dihasilkan semakin tinggi sampai mencapai titik jenuh larutan.


Dalam pengujian menunjukkan bahwa adanya penambahan aquadest dalam pelarut meningkatkan hasil ekstraksi. Ini diakibatkan kelarutan yang lebih tinggi dari protein serta karbohidrat dalam air dan metanol dibandingkan dalam aseton. Penggunaan kombinasi air dan pelarut organik dapat meningkatkan ekstraksi bahan kimia yang larut dalam pelarut organik (Salim, 2019). Ini menjadi

alasan mengapa hasil ekstraksi metanol dan aseton dengan penambahan air lebih tinggi dari hasil ekstrak methanol dan aseton.

**D. Pengaruh Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut terhadap Kadar Fenolik Ekstrak Kulit Batang Anak Dara**




(a)



(b)

Gambar 12. *Contour Plot* Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Kadar Fenolik




**Gambar 13.** *Surface Plot* Respon Konsentrasi Pelarut, Waktu Maserasi dan Jenis Pelarut Aseton (a) dan Pelarut Metanol (b) terhadap Respon Kadar Fenolik

Senyawa fenol merupakan metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan dan paling melimpah keberadaannya. Fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenolik terdistribusi secara luas pada tumbuhan (Alfauzi, 2022). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan pelarut beserta adanya

variasi konsentrasi dan waktu maserasi berpengaruh terhadap jumlah senyawa fenolik yang didapatkan.

Menurut Haeria (2014), kulit batang anak dara memiliki senyawa fenolik yang terkandung didalamnya dimana berdasarkan penelitiannya dengan menguji melalui identifikasi senyawa fenolik melalui adanya penambahan  $\text{FeCl}_3$  pada ekstrak yang memberikan warna hijau kehitaman pada ekstrak dimana hal ini menunjukkan bahwa sampel ekstrak kulit batang anak dara mengandung senyawa fenolik. Reaksi kimia yang terjadi dapat ditunjukkan pada gambar




**Gambar 14.** Reaksi kimia senyawa fenol dengan  $\text{FeCl}_3$  (Sugiarna et al., 2019)

Reagen spesifik yang umum digunakan dalam menetapkan kadar fenolik pada penelitian ini adalah Folin Ciocalteu karena teknik pengerjaannya yang sederhana. Prinsip metoda Folin Ciocalteu adalah reaksi oksidasi senyawa fenol dalam suasana basa oleh pereaksi Folin Ciocalteu menghasilkan kompleks berwarna biru yang memberikan serapan kuat pada panjang gelombang 798 nm. Peningkatan intensitas warna biru akan sebanding dengan jumlah senyawa fenolik yang ada di dalam sampel (Blainski et al. 2013). Senyawa pembanding yang digunakan adalah asam galat karena asam galat dapat menghasilkan hasil yang realibitas karena mempunyai reaktifitas yang cukup tinggi terhadap reagen Folin Ciocalteu dan merupakan salah satu fenolik yang alami dan stabil (Prior et al. 2005).

Reaksi yang terjadi antara asam galat dengan reagen Folin Ciocalteu dan  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  yaitu terbentuknya senyawa kompleks berwarna biru. Pereaksi akan mengoksidasi fenolat (garam alkali) atau gugus fenolik-hidroksi mereduksi asam heteropoli (fosfomolibdat-fosfotungstat) yang terdapat dalam pereaksi Folin Ciocalteu menjadi suatu kompleks molibdenum-tungsten. Senyawa fenolik

bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteu dalam suasana basa yang akan terjadi disosiasi proton pada senyawa fenolik menjadi ion fenolat sehingga gugus hidroksil senyawa fenolik akan bereaksi dengan reagen Folin Ciocalteu yang akan membentuk kompleks molibdenum-tungsten yang berwarna biru sehingga dapat dideteksi menggunakan spektrofotometer (Nofita, 2020). Reaksi kimia yang terjadi ditunjukkan pada gambar



**Gambar 15.** Reaksi senyawa fenol dengan reagen folin-ciocalteu (Sugiarna et al, 2019)

Kurva kalibrasi dibuat untuk mendapatkan persamaan regresi linear sehingga dapat dihitung konsentrasi senyawa fenolik yang terkandung didalam kulit batang mataoa. Adapun persamaan regresinya yaitu  $y = 0,0112x + 0,0085x$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0,9882. Kadar fenolik optimum pada kulit batang anak dara diperoleh sebesar  $60,193 \pm 0,00115$  mg GAE/g ekstrak.

Dari hasil penelitian yang telah dimasukkan dalam aplikasi *design expert* ver 13 menunjukkan gambar 12. Untuk sumbu x dan sumbu y menunjukkan variabel yang di optimasi. Sumbu x menunjukkan konsentrasi sedangkan sumbu y menunjukkan waktu maserasi sedangkan garis-garis yang ada dalam countour plot menunjukkan respond. Garis yang terluar menunjukkan nilai respon terendah dan semakin ke dalam maka garis menunjukkan nilai respon yang paling tinggi.

Pada contour plot menunjukkan semakin mendekati area yang memiliki warna biru ke hijau (pelarut aseton) maka nilai optimasi dikatakan semakin baik

dan apabila nilai respond semakin dekat dengan daerah yang berwarna merah (pelarut methanol) maka titik tersebut memiliki nilai respond yang semakin tinggi. Respond optimal dari kadar fenolik ekstrak kulit batang anak dara dalam contour tersebut menunjukkan nilai kisaran konsentrasi 75-100% dengan waktu maserasi 3 hari pada pelarut aseton sedangkan pada pelarut methanol dengan konsentrasi 100% dan waktu maserasi 3 hari. Dari gambar 12 menunjukkan bahwa jumlah kadar fenolik terendah dan tertinggi dilihat dari contour yang berwarna biru hingga merah sehingga kadar fenolik tertinggi didapatkan dengan menggunakan jenis pelarut methanol dengan konsentrasi 100% dan waktu maserasi 3 hari.

Kurva permukaan respon untuk faktor konsentrasi pelarut dan waktu maserasi terhadap respon kadar fenolik ditunjukkan pada gambar 13. Berdasarkan kurva tersebut terdapat titik-titik merah tersebar yang menggambarkan hasil dari tiap pengujian yang dilakukan. Berdasarkan kurva tersebut juga dapat diketahui bahwa semakin meningkatnya konsentrasi pelarut, waktu maserasi maka respond kadar fenolik ekstrak kulit batang anak dara juga semakin tinggi terlihat dari jenis pelarut methanol yang memiliki kadar fenolik tertinggi dengan menggunakan konsentrasi 100% dengan waktu maserasi 3 hari. Peningkatan konsentrasi pelarut dan waktu maserasi akan mempengaruhi hasil kadar fenolik dari ekstrak kulit batang anak dara, begitupun dengan pemilihan jenis pelarut.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Iqbal (2012) bahwa penggunaan pelarut dengan kepolaran yang tinggi seperti metanol mampu meningkatkan penarikan senyawa total fenol dari dalam ekstrak. Alothman et al. (2009) menambahkan bahwa penarikan senyawa fenolik bergantung pada pelarut yang digunakan dan polaritasnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa pelarut metanol mampu menarik senyawa fenol yang lebih banyak dibandingkan pelarut lainnya. Sultana et al. (2009) menyatakan bahwa metanol merupakan

pelarut terbaik dalam proses ekstraksi senyawa fenolik. Kandungan total fenolik dalam ekstrak tergantung pada tingkat polaritas pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi. Selain itu, menurut Salim (2019) kandungan fenolik dari ekstrak yang menggunakan perpaduan pelarut dengan aquadest secara signifikan memiliki kadar fenolik yang sedikit dibandingkan dengan ekstrak yang menggunakan hanya pelarut saja tanpa ada tambahan aquadest dapat disebabkan oleh kemungkinan pembentukan kompleks dari beberapa senyawa fenolik dalam ekstrak yang larut dalam methanol dan aseton.

Selain itu waktu maserasi juga mempengaruhi kadar fenolik yang didapatkan dimana kenaikan waktu maserasi menunjukkan peningkatan total fenol yang dihasilkan. Waktu maserasi yang semakin lama menyebabkan kontak bahan dengan pelarut semakin lama, hal ini mengakibatkan dinding sel pada bahan pecah dan mengeluarkan zat terlarut ke dalam pelarut semakin banyak sehingga hasilnya akan bertambah sampai titik optimum dari pelarut (Whidiyana, 2020).

Berdasarkan hasil kandungan fenolik yang terbaik adalah pada pelarut metanol dengan konsentrasi 100% pada waktu maserasi 3 hari. Data yang didapatkan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnes (2021) menghasilkan bahwa penggunaan pelarut methanol ( $38,56 \pm 0,42$  mg GAE/g) mendapatkan kandungan total fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut etanol ( $31,86 \pm 0,93$  mg GAE/g) atau aseton ( $11,70 \pm 2,08$  mg GAE/g). Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Alfauzi (2022) dengan membandingkan pengaruh penambahan aquadest dalam pelarut metanol dalam menghasilkan kadar fenolik, dari penelitian alfauzi mendapatkan hasil adanya penambahan aquadest dalam pelarut untuk mengekstrak senyawa tidak berpengaruh secara nyata dalam menghasilkan kadar fenolik yang tinggi dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh fauzi menggunakan konsentrasi metanol

24%, 48%, 72% dan 100% mendapatkan kadar fenolik berturut-turut  $1,32 \pm 0,19$ ,  $0,97 \pm 0,09$ ,  $1,20 \pm 0,04$ , dan  $1,52 \pm 0,67$ .

### ***E. Optimasi Respon Nilai Rendamen dan Kadar Fenolik Ekstrak Kulit Batang Anak Dara***

Proses optimasi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan setting taraf faktor percobaan yang menghasilkan respon optimal. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengoptimalkan nilai respon rendamen dan kadar fenolik pada parameter percobaan yang lebih luas dengan Batasan-batasan yang ditentukan sesuai tujuan yang diharapkan. Batas optimasi untuk respon penelitian tergambar seperti ini

**Tabel 5.** Batas optimasi untuk respon penelitian

#### **Constraints**

Name	Goal	Lower Limit	Upper Limit	Lower Weight	Upper Weight	Importance
<b>A:Konsentrasi</b>	is in range	50	100	1	1	3
<b>B:Waktu</b>	is in range	1	3	1	1	3
<b>C:Jenis Pelarut</b>	is in ranges	aseton	metanol	1	1	3
<b>rendamen</b>	Maximize	2.73	10.53	1	1	3
<b>kadar fenolik</b>	Maximize	12.5744	60.1935	1	1	3

Berdasarkan Batasan-batasan yang ditentukan pada tabel maka diperoleh solusi optimal hasil komputasi dengan aplikasi *design expert* ver 13 yang ditunjukkan pada tabel.

## Solutions

21 Solutions found

Solutions for 2 combinations of categoric factor levels

Number	Konsentrasi Pelarut (%)	Waktu Maserasi (Hari)	Jenis Pelarut	Rendamen (%)	Kadar Fenolik mgGAE/g	Desirability	
<b>1</b>	<b>98.831</b>	<b>2.998</b>	<b>Metanol</b>	<b>10.550</b>	<b>60.313</b>	<b>1.000</b>	<b>Selected</b>
<b>2</b>	98.906	2.991	Metanol	10.535	60.255	1.000	
<b>3</b>	99.062	2.998	Metanol	10.532	60.484	1.000	
<b>4</b>	98.540	3.000	Metanol	10.576	60.139	0.999	
<b>5</b>	97.076	3.000	Metanol	10.687	59.099	0.988	
<b>6</b>	96.074	3.000	Metanol	10.757	58.381	0.981	
<b>7</b>	94.817	3.000	Metanol	10.838	57.473	0.971	
<b>8</b>	79.344	3.000	Aseton	8.697	37.258	0.630	
<b>9</b>	79.551	3.000	Aseton	8.688	37.293	0.630	
<b>10</b>	79.571	3.000	Aseton	8.687	37.297	0.630	
<b>11</b>	79.085	3.000	Aseton	8.707	37.214	0.630	
<b>12</b>	78.794	3.000	Aseton	8.719	37.164	0.630	
<b>13</b>	79.996	3.000	Aseton	8.669	37.368	0.630	
<b>14</b>	78.431	3.000	Aseton	8.732	37.101	0.630	
<b>15</b>	78.031	3.000	Aseton	8.746	37.031	0.629	
<b>16</b>	77.585	3.000	Aseton	8.762	36.952	0.629	
<b>17</b>	81.105	3.000	Aseton	8.617	37.550	0.629	
<b>18</b>	76.490	3.000	Aseton	8.795	36.754	0.628	
<b>19</b>	82.461	3.000	Aseton	8.545	37.765	0.628	
<b>20</b>	72.339	3.000	Aseton	8.867	35.951	0.622	
<b>21</b>	93.253	3.000	Aseton	7.662	39.158	0.594	

Tabel menunjukkan bahwa perlakuan optimal menggunakan konsentrasi 98.831 waktu maserasi 3 hari dengan jenis pelarut metanol menghasilkan prediksi respon rendamen 10.550 dan kadar fenolik sebesar 60.313 dengan ketepatan desirability 1.000 atau 100%. Nilai desirability merupakan nilai fungsi tujuan optimasi yang menunjukkan kemampuan program untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan pada produk akhir. Kisaran nilainya 0 sampai 1, dimana semakin mendekati satu artinya semakin tinggi kemungkinan mendapatkan respon yang diinginkan (Rahayu et al., 2016).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan persen rendamen dan kadar fenolik total kulit batang anak dara dipengaruhi oleh jenis pelarut, konsentrasi pelarut dan waktu maserasi. Dari hasil penelitian menunjukkan hasil persen rendamen ekstrak yang optimal yaitu sebesar 10,53% pada waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol 75%. Sedangkan kadar fenolik diperoleh hasil yang optimal yaitu  $60,193 \pm 0.001155$  mgGAE/g pada waktu maserasi 3 hari menggunakan pelarut metanol 100%. Ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol dengan waktu maserasi 3 hari dapat menghasilkan persen rendamen ekstrak dan kadar fenolik yang optimal.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penetapan kadar yang didapatkan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penetapan kadar senyawa lain yang lebih optimum. Serta dalam penentuan parameter yang akan diuji lebih banyak lagi serta lebih luas sehingga hasil parameter yang didapatkan bisa lebih optimal.



## DAFTAR PUSTAKA


- Agnes. (2021). Pengaruh Jenis Pelarut Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Tenggulun (*Protiums javanicum* Burm. F) Menggunakan Metode Maserasi. ISSN : 2527-8010
- Agung. (2017). Teknologi Bahan Alam. Universitas Lambung Mangkurat. Penerbit : University Press
- Ali. (2020). Narrative Review: Optimization of Ethanol as a Solvent for Flavonoids and Phenolic Compounds
- Aydar, Alev Yuksel. "Utilization of Response Surface Methodology in Optimization of Extraction of Plant Materials". Intech no. 10 (2018): h. 157-169
- Awaluddin, N. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Methanol Klika Anak Dara (*Croton Oblongus* Burm) Menggunakan Metode Dpph. Jurnal Farmasi FKIK UINAM, 2
- Awainah, N. (2016). *Standarisasi Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)*.
- Alothman M, Bhat R, & Karim AA, (2009). Antioxidant capacity and phenolic content of selected tropical fruits from Malaysia, extracted with different solvents. Food chemistry. 115(3)
- Andi Mu'nisa. (2012). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Cengkeh*. Jurnal Veteriner. Vol. 13 No. 3: 272-277.
- Alfauzi, R. A., Hartati, L., Suhendra, D., Rahayu, T. P., & Hidayah, N. (2022). *J i n t p*. 20(3), 95–103.
- Aliya Awaliyah, R. T. &. (2018). Penentuan Formulasi Optimum Pembuatan Cookies Dari Bekatul Padi Pandanwangi Dengan Penambahan Tepung Terigu Menggunakan Metode Rsm (Response Surface Method). *Agrosience (Agsci)*, 8(2), 212. <https://doi.org/10.35194/agsci.v8i2.494>
- Anwar, K., Istiqamah, F., & Hadi, S. (2021). Optimasi Suhu dan Waktu Ekstraksi Akar Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia* jack.) Menggunakan Metode RSM (response surface methodology) dengan Pelarut Etanol 70%. *Jurnal Pharmascience*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.20527/jps.v8i1.9085>
- Blainski, A., Lopes, G.C., & De Mello, J.C.P. (2013). Application and analysis of the Folin Ciocalteu method for the determination of the total phenolic content from *Limonium brasiliense* L. *Molecules*. 18(6): 6852-6865.
- Caroline. R. & Tindale. M., (1993), "*Flora of The Sidney Region Reed*". Australia.
- Cairns D. 2009. Essentials of Pharmaceutical Chemistry Second Edition (Intisari Kimia Farmasi Edisi Kedua). Penerjemah: Puspita Rini. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Dalimartha,S. (2006) Atlas Tumbuhan Obat Indonesia. Jilid 5. . Jakarta : Pustak Buana

- Faulina, R., S. Andari, & D. Anggraeni. 2011. Response Surface Methodology (RSM) dan Aplikasinya. Jurusan Statistika, Institut T
- Hakim, A. R., & Saputri, R. (2020). Narrative Review: Optimasi Etanol sebagai Pelarut Senyawa Flavonoid dan Fenolik. *Jurnal Surya Medika*, 6(1), 177–180. <https://doi.org/10.33084/jsm.v6i1.1641>
- Hidayat, I. R., Zuhrotun, A., & Sopyan, I. (2020). *Design-Expert Software sebagai Alat Optimasi Formulasi Sediaan Farmasi*. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 99–120. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i1.27842>
- Iqbal, S., Younas U, Chan KW, Zia-Ul-Haq M & Ismail M. 2012. Chemical composition of *Artemisia annua* L. leaves and antioxidant potential of extracts as a function of extraction solvents. *Molecules*. 17(5): 6020-6032
- Julianto, Tatang S. 2019. *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Penerbit Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kemenkes RI. 2010. Riset Kesehatan Dasar, RISKESDAS. Jakarta: Balitbang Kemenkes RI
- Kemenang. (2019). *Alquran dan Terjemahan*
- Khanita. 2011. *Clerodane diterpenoids and a trisubstituted furan from Croton oblongifolius*. *Research Center for Bioorganic Chemistry*, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University.
- Kumar, A., Ahamd, F., & Zaldi, S. (2019). *Importance of Bioactive Compounds Present in Plant Products and Their Extraction*.
- Kusnadi, J. (2018). *Pengawet Alami Untuk Makanan (Cet-1)*. Malang: UB Press.
- Mahasuari NPS, Paramita NV & Putra AGRY. 2020. Effect of methanol concentration as a solvent on total phenolic and flavonoid content of Beluntas leaf extract (*Pulchea indica* L.). *Journal of Pharmaceutical Science and Application*. 2(2): 77-84.
- Mauricio A., Rostagno., and Prado M. J. 2013. *Natural Product Extraction Principles and Applications*. RSC Publishing. Brazil.
- Myers, R.H. and Montgomery, D.C. (2002) *Response Surface Methodology: Product and Process Optimization Using Designed Experiments*. 2nd Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Montgomery, D.C. 2001. *Design Analysis of Experiment 5th Edition*. John Wiley and Sons, inc. New York.
- Mahardani, O. T., & Yuanita, L. (2021). Efek Metode Pengolahan Dan Penyimpanan Terhadap Kadar Senyawa Fenolik Dan Aktivitas Antioksidan. *Unesa Journal of Chemistry*, 10(1), 64–78. <https://doi.org/10.26740/ujc.v10n1.p64-78>
- Nawari. 2010. *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Nisfianoor, M. 2009. Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial. Salemba Humanika. Jakarta
- Noor. (2021). Buku Referensi Ekstraksi. Institut Agama Islam Palangkaraya.
- Nofita, D., Sari, S. N., & Mardiah, H. (2020). Penentuan Fenolik Total dan Flavonoid Ekstrak Etanol Kulit Batang Matoa (*Pometia pinnata* J.R& G.Forst) secara Spektrofotometri. *Chimica et Natura Acta*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.24198/cna.v8.n1.26600>
- Prayoga, D. G. E., Nocianitri, K. A., & Puspawati, N. N. (2019). Identifikasi Senyawa Fitokimia Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kasar Daun Pepe. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Pangan (ITEPA)*, 8(2), 111. <https://doi.org/10.24843/itepa.2019.v08.i02.p01>
- Prior, R.L., Wu, X. & Schaich, K. (2005). Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 53(10): 4290-4302
- Rahayu T, Fudholi A, Fitria A. 2016. Optimasi Formula Gel Ekstrak Daun Tembakau (*Nicotina tabacum*) dengan Variasi Kadar Karbopol 940 dan TEA Menggunakan Metode Simplex Lattice Design (SLD). *Jurnal Ilmia*
- Rattu, P. N., Pioh, N. R., & Sampe, S. (2022). Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Minahasa). *Jurnal Governance*, 2(1), 1–9.
- Roxb, Z. (2012). *Skrining Fitokimia Ekstrak Metanol Rimpang Bangle*
- Salim, E., Afritunando, Y., Febriana, N. A., & Efdi, M. (2019). STUDI OPTIMASI EKSTRAKSI KANDUNGAN SENYAWA FENOLIK TOTAL DAN UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI DAUN MANGGIS (*Garcinia mangostana* Linn.). *Jurnal Riset Kimia*, 10(1), 36–43. <https://doi.org/10.25077/jrk.v12i2.308>
- Sembiring, B. B., Bermawie, N., Rizal, M., & Kartikawati, A. (2020). Pengaruh Teknik Ekstraksi Daun Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas*) dan Daun Jambu Biji (*Psidium guajava*) terhadap Aktivitas Antioksidan The Effect of Extraction Techniques of Purple Sweet Potato (*Ipomoea batatas*) and Guava Leaves (*Psidium guajava*) on. *Jurnal Jamu Indonesia*, 5(1), 22–32.
- Sim, Y. Y., Ting, W., Ong, J., & Nyam, K. L. (2019). Industrial Crops & Products Effect of various solvents on the pulsed ultrasonic assisted extraction of phenolic compounds from *Hibiscus cannabinus* L. leaves. *Industrial Crops & Products*, 140(1), 111708. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111708>
- Sugiarna, R., Farhan, N., Rusdi, M., Ikhlas Arsul, M., Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, J., Yasin Limpo No, J. H., Sombaopu Kabupaten Gowa, K., Selatan, S., & Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, M. (2019). Kadar Fenolik dan Flavonoid Total Ekstrak Etanol Daun Anggur (*Vitis vinifera* L) Total Phenolic and Flavonoid Content of Grapevine (*Vitis vinifera* L) Leaves Ethanol Extract. *Ad-Dawaa Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2(2), 95–102.

- Sarabia, L. A. and Ortiz, M. C. 2009. 'Response Surface Methodology', *Comprehensive Chemometrics*, 1(October 2004), pp. 345–390. doi: 10.1016/B978-044452701-1.00083-1.
- Santoso, S. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta..
- Shihab. M. 2002. Quraish. Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab. M. 2005. Quraish. Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran vol. 1*. Jakarta: Lentera Hati
- Sultana B, Anwar F, & Ashraf M. 2009. Effect of extraction solvent/technique on the antioxidant activity of selected medicinal plant extracts. *Molecules*. 14, 2167–2180.
- Syafei, Zakirullah. 2015. Laporan Praktikum Biomedik 3 BM 506 Metabolisme Glukosa, Urea Dan Trigliserida (Teknik Spektrofotometri). Univreritas Tadulako: Palu.
- Tati. (2017). Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa Untuk Penentuan Senyawa Organik. Penerbit AURA CV Anugrah Utama Raharja
- Trihaditia, R. 2015. Penentuan Formulasi Optimum pada Pembuatan Minuman Fungsional Rambut Jagung dengan Penambahan Madu dan Jeruk Nipis Menggunakan Metode RSM (Response Surface Method). Tesis. Fakultas Teknologi Pangan Universitas Pasundan. Bandung.
- Tahar. (2015). Uji Aktivitas Penghambatan Fraksi Non Polar Ekstrak Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Terhadap Sel Kanker Hela. *JF FIK UINAM*. Vol 3 No 3.
- Vogel, A. I. 1978. *Textbook of Quantitative Chemical Analysis*. Polytechnic, London
- Voight, R. 1994. Buku Pengantar Teknologi Farmasi (diterjemahkan oleh Soedani, N.). Edisi V. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Widhiana Putra, I. K., Ganda Putra, G. ., & Wrasati, L. P. (2020). Pengaruh Perbandingan Bahan dengan Pelarut dan Waktu Maserasi terhadap Ekstrak Kulit Biji Kakao (*Theobroma cacao* L.) sebagai Sumber Antioksidan. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.24843/jrma.2020.v08.i02.p02>
- Yasni, S. (2013). *Teknologi Pengolahan Dan Pemanfaatan Produk Ekstraksi Rempah (Pertama)*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Yahya, S. 2013. *Spektrofotometri UV-VIS*. Jakarta : Erlangga
- Yulistian, D. P., Edi Priyo Utomo, S. M. U., & Yusnawan, E. (2015). Studi pengaruh jenis pelarut terhadap hasil isolasi dan kadar senyawa fenolik dalam biji kacang tunggak (. *Kimia Student Journal*, 1(1), 819–825.
- Zulharmitta, Elrika, D., & Rivai, H. (2010). Penentuan pengaruh jenis pelarut


ekstraksi terhadap perolehan kadar senyawa fenolat dan daya antioksidan dari herba miniran (*Phyllanthus niruri* L.). *Jurnal Farmasi Higea*, 2(1), 37–45. <http://jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/25>



## LAMPIRAN


### Lampiran 1. Skema Kerja

#### 1. Ekstraksi dengan metode maserasi




## 2. Penentuan Kadar Fenolik Sampel


### a. Pembuatan kurva kalibrasi larutan standar (asam galat)



## b. Pengukuran kadar fenolik dalam larutan sampel



### 3. Perhitungan % Rendemen dan Analisis Response Surface Methodology



## Lampiran 2. Perhitungan Bahan

### 1. Pembuatan Konsentrasi Ekstraksi

- a. Konsentrasi 100% dibuat dalam 50 ml

$$\begin{aligned}\text{Konsentrasi 100\%} &= \frac{100}{100} \times 50 \text{ ml} \\ &= 50 \text{ ml}\end{aligned}$$

- b. Konsentrasi 75% dibuat dalam 50 ml

$$\begin{aligned}\text{Konsentrasi 75\%} &= \frac{75}{100} \times 50 \text{ ml} \\ &= 37,5 \text{ ml}\end{aligned}$$

Dicukupkan dengan aquadest hingga 50 ml

- c. Konsentrasi 50% dibuat dalam 50 ml

$$\begin{aligned}\text{Konsentrasi 50\%} &= \frac{50}{100} \times 50 \text{ ml} \\ &= 25 \text{ ml}\end{aligned}$$

Dicukupkan dengan aquadest hingga 50 ml

### 2. Pembuatan Larutan Pembanding (Asam Galat)

$$50 \text{ mg} \longrightarrow 0,1 \text{ L}$$

Sehingga didapatkan konsentrasi 500 ppm

$$500 \text{ ppm} = \frac{50 \text{ mg}}{0,1 \text{ L}}$$

### 3. Pembuatan Larutan Uji

Larutan ekstrak 4.000 ppm

$$4.000 \text{ ppm} = \frac{100 \text{ mg}}{0,025 \text{ L}}$$

### 4. Pembuatan pereaksi

- a. Pereaksi Folin

Pereaksi Follin-Ciocalteu 10% dibuat dalam 100 ml


$$\text{Folin 10\%} = \frac{10}{100} \times 100 \text{ ml}$$

= 10 ml (Dicukupkan dengan aquadest hingga 100 mL)

b. Pereaksi Natrium Karbonat 7,5% dibuat dalam 100 ml

$$\begin{aligned}\text{Na}_2\text{CO}_3 7,5\% &= \frac{7,5}{100} \times 100 \text{ ml} \\ &= 7,5 \text{ mg}\end{aligned}$$

Dicukupkan dengan aquadest hingga 100 ml



### Lampiran 3. Perhitungan rendamen ekstrak kulit batang anak dara

Tabel 7. Hasil Rendamen

#### Rendamen Ekstrak Metanol

Parameter	Replikasi 1	Replikasi 2	Replikasi 3
Konsentrasi 50%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,1435 g Berat ekstrak = 4,1435 - 3,6 = 0,54 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,54 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,4 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,012 g Berat ekstrak = 4,012 - 3,6 = 0,412 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,412 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 4,12 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,061 g Berat ekstrak = 4,061 - 3,6 = 0,413 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,413 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 4,13 \text{ g}$
Konsentrasi 50%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,3426 g Berat ekstrak = 4,3426 - 3,6 = 0,746 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,746 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,46 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,406 g Berat ekstrak = 4,406 - 3,6 = 0,806 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,806 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8,06 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,2614 g Berat ekstrak = 4,2614 - 3,6 = 0,6619 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,6619 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 6,69 \text{ g}$
Konsentrasi 50%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,680 g Berat ekstrak = 4,680 - 3,6 = 1,08 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,08 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 10,8 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,5389 g Berat ekstrak = 4,5389 - 3,6 = 0,9 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,9 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,6297 g Berat ekstrak = 4,6297 - 3,6 = 1,029 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,029 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 10,29 \text{ g}$
Konsentrasi 100%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,6190 g Berat ekstrak = 4,6190 - 3,6 = 1,01 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,01 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 10,1 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,5314 g Berat ekstrak = 4,5314 - 3,6 = 0,9 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,9 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,5468 g Berat ekstrak = 4,5468 - 3,6 = 0,94 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,94 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,4 \text{ g}$

Konsentrasi 100%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,5170 g Berat ekstrak = 4,5170 – 3,6 = 0,917 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,917g}{10g} \times 100\% = 9,17 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,6931 g Berat ekstrak = 4,6931 – 3,6 = 1,09 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,09g}{10g} \times 100\% = 10,9 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,521 g Berat ekstrak = 4,521 – 3,6 = 0,921 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,921g}{10g} \times 100\% = 9,21 g$
Konsentrasi 100%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,6518 g Berat ekstrak = 4,6518 – 3,6 = 1,051 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,051g}{10g} \times 100\% = 10,51 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,6941 g Berat ekstrak = 4,6941 – 3,6 = 1,041 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,041g}{10g} \times 100\% = 10,041 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,5746 g Berat ekstrak = 4,5746 – 3,6 = 0,971 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,971g}{10g} \times 100\% = 9,71 g$
Konsentrasi 75%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,4067 g Berat ekstrak = 4,4067 – 3,6 = 0,8067 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,8067g}{10g} \times 100\% = 8,067 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,4011 g Berat ekstrak = 4,4011 – 3,6 = 0,8011 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,8011g}{10g} \times 100\% = 8,011 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,307 g Berat ekstrak = 4,307 – 3,6 = 0,7079 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,7079g}{10g} \times 100\% = 7,079 g$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,52 g Berat ekstrak = 4,52 – 3,6 = 0,92 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,92g}{10g} \times 100\% = 9,2 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,53 g Berat ekstrak = 4,53 – 3,6 = 0,93 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,93g}{10g} \times 100\% = 9,3 g$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,55 g Berat ekstrak = 4,55 – 3,6 = 0,95 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,95g}{10g} \times 100\% = 9,5 g$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,57 g Berat ekstrak = 4,57 – 3,6 = 0,97 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,52 g Berat ekstrak = 4,52 – 3,6 = 0,92 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,55 g Berat ekstrak = 4,55 – 3,6 = 0,95 g

	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,97 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,7 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,92 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,2 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,95 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,5 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,50 g Berat ekstrak = 4,50 – 3,6 = 0,9 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,9 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,53 g Berat ekstrak = 4,53 – 3,6 = 0,93 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,93 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,3 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,55 g Berat ekstrak = 4,55 – 3,6 = 0,95 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,95 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,5 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,52 g Berat ekstrak = 4,52 – 3,6 = 0,92 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,92 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,2 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,55 g Berat ekstrak = 4,55 – 3,6 = 0,95 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,95 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,5 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,53 g Berat ekstrak = 4,53 – 3,6 = 0,93 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,93 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,3 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,52 g Berat ekstrak = 4,52 – 3,6 = 0,92 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,92 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,2 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,50 g Berat ekstrak = 4,50 – 3,6 = 0,90 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,90 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,51 g Berat ekstrak = 4,51 – 3,6 = 0,91 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,91 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9,1 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,68 g Berat ekstrak = 4,68 – 3,6 = 0,9 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,9 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,69 g Berat ekstrak = 4,69 – 3,6 = 1,09 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,09 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 10,9 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,7 g Berat ekstrak = 4,7 – 3,6 = 1,17 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{1,17 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 11,7 \text{ g}$

### Rendamen Ekstrak Aseton

Parameter	Replikasi 1	Replikasi 2	Replikasi 3
Konsentrasi 50%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 0,321 g Berat ekstrak = 0,321 - 3,6 = 3,21 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{3,21 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 3,21 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,015 g Berat ekstrak = 4,015 - 3,6 = 0,415 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,415 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 4,15 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 3,965 g Berat ekstrak = 3,965 - 3,6 = 0,365 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,365 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 3,65 \text{ g}$
Konsentrasi 50%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,121 g Berat ekstrak = 4,121 - 3,6 = 0,521 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,521 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,21 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,197 g Berat ekstrak = 4,197 - 3,6 = 0,597 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,597 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,97 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,101 g Berat ekstrak = 4,101 - 3,6 = 0,501 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,501 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,01 \text{ g}$
Konsentrasi 50%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,210 g Berat ekstrak = 4,210 - 3,6 = 0,601 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,601 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 6,01 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,331 g Berat ekstrak = 4,331 - 3,6 = 0,731 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,731 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,31 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,367 g Berat ekstrak = 4,367 - 3,6 = 0,767 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,767 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,76 \text{ g}$
Konsentrasi 100%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 3,97 g Berat ekstrak = 3,97 - 3,6 = 0,37 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,37 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 3,7 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 3,84 g Berat ekstrak = 3,84 - 3,6 = 0,24 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,24 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 2,4 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 3,81 g Berat ekstrak = 3,81 - 3,6 = 0,21 g %Rendamen $\frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,21 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 2,1 \text{ g}$
Konsentrasi 100%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,142 g Berat ekstrak = 4,142 - 3,6 = 0,542 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,105 g Berat ekstrak = 4,105 - 3,6 = 0,505 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,019 g Berat ekstrak = 4,019 - 3,6 = 0,419 g


	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,542 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,42 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,505 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 5,05 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,419 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 4,19 \text{ g}$
Konsentrasi 100%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,38 g Berat ekstrak = 4,38 - 3,6 = 0,78 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,78 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,8$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,40 g Berat ekstrak = 4,40 - 3,6 = 0,8 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,8 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,38 g Berat ekstrak = 4,38 - 3,6 = 0,78 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,78 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,8 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 1 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,31 g Berat ekstrak = 4,31 - 3,6 = 0,71 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,71 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,1 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,30 g Berat ekstrak = 4,30 - 3,6 = 0,70 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,70 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,0 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,30 g Berat ekstrak = 4,30 - 3,6 = 0,70 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,70 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,0 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,33 g Berat ekstrak = 4,33 - 3,6 = 0,33 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,33 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,3 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,37 g Berat ekstrak = 4,37 - 3,6 = 0,77 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,77 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,7 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,39 g Berat ekstrak = 4,39 - 3,6 = 0,39 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,39 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,9 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,35 g Berat ekstrak = 4,35 - 3,6 = 0,75 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,75 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,5 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,37 g Berat ekstrak = 4,37 - 3,6 = 0,77 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,77 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,7 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,36 g Berat ekstrak = 4,36 - 3,6 = 0,76 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,76 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,6 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,35 g Berat ekstrak = 4,35 - 3,6 = 0,75 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,36 g Berat ekstrak = 4,36 - 3,6 = 0,76 g	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,34 g Berat ekstrak = 4,34 - 3,6 = 0,76 g

	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,75 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,5 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,76 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,6 \text{ g}$	$\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,76 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,6 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,37 g Berat ekstrak = 4,37 - 3,6 = 0,77 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,77 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,7 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,33 g Berat ekstrak = 4,33 - 3,6 = 0,73 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,73 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,3 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,36 g Berat ekstrak = 4,36 - 3,6 = 0,76 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,76 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,6 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 2 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,35 g Berat ekstrak = 4,35 - 3,6 = 0,75 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,75 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,5 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,47 g Berat ekstrak = 4,47 - 3,6 = 0,87 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,87 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8,7 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,31 g Berat ekstrak = 4,31 - 3,6 = 0,71 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,71 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 7,1 \text{ g}$
Konsentrasi 75%, 3 Hari Maserasi	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,39 g Berat ekstrak = 4,39 - 3,6 = 0,85 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,85 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8,5 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,42 g Berat ekstrak = 4,42 - 3,6 = 0,82 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,82 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8,2 \text{ g}$	Bobot simplisia = 10 g Bobot wadah kosong = 3,6 g Bobot wadah + ekstrak = 4,45 g Berat ekstrak = 4,45 - 3,6 = 0,85 g $\% \text{Rendamen} = \frac{\text{bobot akhir}}{\text{bobot awal}} = \frac{0,85 \text{ g}}{10 \text{ g}} \times 100\% = 8,5 \text{ g}$

#### Lampiran 4. Kadar Fenolik

**Tabel 8.** Hasil serapan perbandingan asam galat

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi			Rata-Rata
	A1	A2	A3	
25	0,344	0,348	0,34	0,344
35	0,504	0,507	0,50467	0,50467
45	0,605	0,601	0,602	0,602
55	0,71	0,71	0,70733	0,70733
65	0,791	0,805	0,802	0,802



**Gambar 16.** Kurva Baku Asam Galat

Perhitungan Kadar Fenolik terhadap asam galat

Diketahui :

Abs Ekstrak : 0.229 (Konsentrasi 50%, Waktu Maserasi 1 Hari, Pelarut Metanol)

$$y = 0.0112x + 0.0885$$

$$0.229 = ax + b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{0.22933 - 0.0885}{0.0112}$$

$$x = 12,57 \text{ mg/g}$$

Standar Deviasi


$$SD = \frac{\sqrt{\sum(y_1 - y)^2}}{n-1}$$


$$SD = \frac{\sqrt{(0,251-0,249)^2 + (0,25-0,249)^2 + (0,246-0,249)^2}}{3-1}$$


$$SD = \frac{\sqrt{0,000004 + 0,000001 + 0,000009}}{3-1}$$

$$SD = \frac{\sqrt{0,000014}}{2}$$

$$SD = 0,00264$$




**Lampiran 5. Dokumentasi****Gambar 17.** Pengambilan Sampel**Gambar 18.** Merajang Klika**Gambar 19.** Pengeringan Sampel**Gambar 20.** Penimbangan  
Simplisia 10 gr**Gambar 21.** Maserasi**Gambar 22.** Penyaringan Hasil  
Ekstraksi**Gambar 23.** Penguapan Ekstrak**Gambar 24.** Hasil Ekstrak**Gambar 25.** Larutan Stok Asam  
Galat



**Gambar 26.** Seri Konsentrasi Asam Galat



**Gambar 27.** Larutan Uji



**Gambar 28.** Analisis Spektrofotometri UV-Vis



## RIWAYAT HIDUP



**Nurfaida Hamka**, lahir di Makale pada tanggal 5 April 2002. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hamka dan Ibu Asnani. Penulis memiliki hobby dalam menulis. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2016. Tak berhenti sampai situ, penulis kembali melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Enrekang dan tamat pada tahun 2019. Di tahun yang sama 2019 penulis melanjutkan Kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama berkuliah selain menekuni bidang akademik, penulis juga mengeksplor kegiatan diluar bangku perkuliahan dengan aktif dalam Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi, Study Club Avicenna Zone serta Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP) FKIK.

Penulis sangat merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT serta doa restu dan dukungan penuh orang tua, keluarga besar dan teman-teman karena berkat doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Penulis akan selalu bersemangat untuk memberikan persembahan terbaik untuk orang-orang sekitar terkhusus pada orang tua.