

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM α -GLUKOSIDASE
FRAKSI N-HEKSAN DAN ETIL ASETAT
RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet L.*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

DIAN ARISTA DAMAYANTI ASIS
NIM: 70100119010

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Arista Damayanti Asis
NIM : 70100119010
TTL : Jeneponto, 28 Juli 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Danau Alam Pendidikan
Judul : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 26 Juni 2023

Penyusun



Dian Arista Damavanti Asis

NIM: 70100119010

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.)*” yang disusun oleh Dian Arista Damayanti Asis, NIM: 70100119010, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Agustus 2023 M
1 Safar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Indah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Hildawati Almah, S. Ag., S.S., M.A	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan nikmat, rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)”. Tak lupa shalawat dan salam penulis curahkan kepada Baginda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penulisan skripsi ini dilakukan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama penulisan skripsi ini tidak sedikit rintangan dan kesulitan yang penulis alami namun dapat terselesaikan berkat do'a, dukungan, kerja keras, dan bantuan dari berbagai pihak.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta bapak Abd. Asis dan ibu Lilis Suryani yang tak henti-hentinya memberikan do'a, motivasi, dan dukungannya yang ikhlas dan tulus semata-mata demi kesuksesan anaknya. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga tercinta atas segala do'a dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Program Studi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing dan memberi dukungan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberi dukungan, arahan, serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu apt. Indah, S.Si., M.Si., selaku Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan masukan kritik dan saran demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini.
8. Ibu Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A., selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan masukan kritik dan saran demi perbaikan dan kelengkapan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis selama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Laboran Laboratorium Biologi Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboran Laboratorium Instrumen Penelitian Universitas Muslim Indonesia yang turut membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

11. Adik-adik penulis Novia Dwi Adriyanti Asis dan Ahmad Muhaimin Asis yang selalu menyemangati, percaya, mendukung, dan mendo'akan semua pilihan dan keputusan penulis.
12. Andi Reski Andini, Layliyah Nurul, dan Salsabila Utami yang senantiasa menemani, menjadi teman berbagi keluh kesah dan memberikan semangat selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman tim Jingiber Jerumbet atas waktu, bantuan, kerja sama, pengalaman dan pengertiannya dari awal penelitian hingga saat ini.
14. Semua teman-teman dan sahabat yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik berupa doa, nasehat, motivasi, dan bantuan lainnya.
15. Serta semua pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari terdapat masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis terbuka akan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang kesehatan serta semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt., Aamiin.

Gowa, 30 Juni 2023


Penulis,

Dian Arista Damayanti Asis
NIM. 70100119010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Uraian Sampel.....	9
B. Diabetes Melitus.....	12
C. Enzim α -glukosidase	26
D. Acarbose.....	27
E. Ekstraksi dan Fraksinasi.....	28
F. Microplate Reader.....	30
G. Tinjauan Islam.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sampel.....	38
D. Alat dan Bahan.....	38
E. Prosedur Kerja.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah.....	46
Tabel 2. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah.....	46
Tabel 3. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Acarbose	46
Tabel 4. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan	46
Tabel 5. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi Etil Asetat	47
Tabel 6. Nilai IC_{50} Standar dan Sampel.....	47
Tabel 7. Data Absorbansi Standar dan Sampel.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> L.).....	9
Gambar 2. <i>The Egregious Eleven</i>	15
Gambar 3. Mekanisme α -Glukosidase Memecah Disakarida	26
Gambar 4. Mekanisme Acarbose Menurunkan Gula Darah	27
Gambar 5. Reaksi Enzimatis Substrat dengan α -Glukosidase.....	51
Gambar 6. Kurva Konsentrasi-% Inhibisi Acarbose.....	76
Gambar 7. Kurva Konsentrasi-% Inhibisi Sampel Fraksi N-Heksan.....	76
Gambar 8. Kurva Konsentrasi-% Inhibisi Sampel Fraksi Etil Asetat.....	77
Gambar 9. Simplisia Dihaluskan Menggunakan Blender	79
Gambar 10. Penimbangan Serbuk Simplisia.....	79
Gambar 11. Maserasi dengan Etanol 70%	79
Gambar 12. Penyaringan Hasil Maserasi	79
Gambar 13. Ekstrak Dipekatkan Menggunakan Rotary Evaporator.....	79
Gambar 14. Penimbangan Ekstrak.....	80
Gambar 15. Ekstrak Didispersikan dengan Air.....	80
Gambar 16. Proses Menggojlok Corong Pisah	80
Gambar 17. Didiamkan Hingga Terpisah 2 Fase	80
Gambar 18. Setiap Fase Ditampung.....	80
Gambar 19. Fraksi Cair N-Heksan.....	81
Gambar 20. Fraksi Cair Etil Asetat.....	81
Gambar 21. Fraksi Air Dipekatkan di Atas Penangas.....	81
Gambar 22. Penimbangan Fraksi Air.....	81
Gambar 23. Penimbangan Fraksi N-Heksan	81
Gambar 24. Penimbangan Fraksi Etil Asetat	82
Gambar 25. Penimbangan Sampel Fraksi N-Heksan.....	82

Gambar 26. Penimbangan Sampel Fraksi Etil Asetat	82
Gambar 27. Pembuatan Larutan Stok	82
Gambar 28. Pemipetan Sampel ke Well	83
Gambar 29. Well Sebelum Ditambahkan Enzim	83
Gambar 30. Well Setelah Ditambahkan Enzim	83
Gambar 31. Proses Inkubasi.....	84
Gambar 32. Proses Pembacaan Absorban.....	84



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	62
Lampiran 2. Perhitungan Persen (%) Rendamen	67
Lampiran 3. Perhitungan Konsentrasi Larutan Stok Sampel dan Standar	68
Lampiran 4. Data Absorbansi Standar dan Sampel	70
Lampiran 5. Perhitungan Persen (%) Inhibisi α -Glukosidase	73
Lampiran 6. Kurva Persen (%) Inhibisi Standar dan Sampel	76
Lampiran 7. Perhitungan IC_{50} Sampel dan Standar	78
Lampiran 8. Gambar Penelitian	79



ABSTRAK

Nama : Dian Arista Damayanti Asis
NIM : 70100119010
Judul Penelitian : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Diabetes melitus masih menjadi perhatian dunia hingga saat ini karena diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis penyumbang angka kematian terbesar ke-7 di seluruh dunia dengan prevelensi yang terus meningkat tiap tahunnya. Penghambat aktivitas enzim α -glukosidase dapat digunakan untuk mengobati diabetes melitus melalui pencegahan penyerapan karbohidrat dan turunannya sehingga dapat mengurangi hiperglikemia postprandial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat aktivitas fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam menghambat enzim α -glukosidase serta mengetahui seberapa besar daya inhibisi enzim α -glukosidase berdasarkan nilai IC_{50} nya sekaligus untuk menemukan fraksi dengan aktivitas menghambat enzim α -glukosidase paling baik. Pada penelitian ini, menggunakan ELISA *reader* untuk mengukur absorbansi dari p-nitrofenol yang terbentuk sebagai akibat dari reaksi enzimatik antara substrat dan enzim. Absorban diukur pada panjang gelombang 405 nm. Hasil menunjukkan bahwa fraksi etil asetat memiliki daya inhibisi lebih kuat dibanding fraksi n-heksan dengan nilai IC_{50} 283,545 $\mu\text{g/mL}$ sedangkan nilai IC_{50} n-heksan 380,028 $\mu\text{g/mL}$ namun keduanya tergolong sangat lemah dalam menghambat enzim α -glukosidase dibanding acarbose yang sangat kuat dengan nilai IC_{50} sebesar 0,087 $\mu\text{g/mL}$.

Kata Kunci: *Zingiber zerumbet*, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat, enzim α -glukosidase, IC_{50}

ABSTRACT

Name : Dian Arista Damayanti Asis
NIM : 70100119010
Research Title : Evaluation the α -Glucosidase Enzyme Inhibition Activities of N-Hexan and Ethyl Acetate Fractions of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Rhizome

Diabetes mellitus is still a global concern today because its one of the chronic diseases contributing to the 7th largest in the world with a prevalence that continues to increase every year. Inhibitor α -glucosidase enzyme activity can be used to treat diabetes mellitus by preventing absorption of carbohydrates and their derivatives so as to reduce postprandial hyperglycemia. This study aims to see the ability of n-hexan and ethyl acetate fractions of lempuyang gajah's rhizome (*Zingiber zerumbet* L.) in inhibiting the α -glucosidase enzyme and to find out how much the inhibitory power of the α -glucosidase enzyme based on their IC_{50} values as well as to find the fraction with the best inhibiting activity of the α -glucosidase enzyme. In this study, a ELISA reader was used to measure the absorbance of p-nitrophenol formed as a result of an enzymatic reaction between the substrate and the enzyme. Absorbance was measured at a wavelength of 405 nm. The results showed that the ethyl acetate fraction had stronger inhibitory power than the n-hexane fraction with an IC_{50} value 283.545 $\mu\text{g/mL}$ while the IC_{50} value of n-hexane was 380.028 $\mu\text{g/mL}$ but both were classified as very weak in inhibiting the α -glucosidase enzyme compared to acarbose which was very strong with an IC_{50} value was 0.087 $\mu\text{g/mL}$.

Keywords: *Zingiber zerumbet*, n-hexane fraction, ethyl acetate fraction, α -glucosidase enzyme, IC_{50}

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) didefinisikan sebagai sekumpulan penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia dan terjadinya metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid yang abnormal. Diabetes melitus terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan sel beta pankreas untuk memproduksi insulin yang cukup, atau disebabkan karena ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat (hiperglikemia) (Dipiro dkk., 2020).

Diabetes melitus menjadi salah satu masalah paling mendesak dan menjadi perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir. Diabetes melitus menjadi penyebab kematian ketujuh di Amerika Serikat serta di seluruh dunia. Angka kematian diabetes melitus mencapai 82,4 per 100.000 dengan total kematian secara global mencapai 5,2 juta kematian akibat diabetes melitus (Glovaci, D dkk., 2019). Menurut data dari *International Diabetes Federation*, pada tahun 2021 terdapat 537 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes. Sedangkan pada tahun 2030 diperkirakan akan mencapai angka 643 juta, dan pada tahun 2045, 783 juta orang dewasa berusia 20-79 tahun diproyeksikan hidup dengan diabetes. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring meningkatnya angka kelahiran, penuaan, dan kejadian obesitas (International Diabetes Federation, 2021).

Salah satu pendekatan terapeutik yang dapat digunakan untuk mengobati diabetes melitus yaitu dengan cara penghambatan enzim yang berhubungan dengan penyerapan glukosa pada sistem pencernaan, seperti enzim α -glukosidase. Enzim α -glukosidase terikat membran yang ada di epitel usus halus yang berfungsi

mempercepat penyerapan glukosa dengan mengkatalisis pembelahan hidrolitik oligosakarida menjadi monosakarida, yang menyebabkan kadar glukosa darah di dalam tubuh mengalami peningkatan setelah makan (Yuda dkk., 2018). Polisakarida kompleks akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi dekstrin yang selanjutnya dihidrolisis lebih lanjut menjadi glukosa oleh enzim α -glukosidase sebelum memasuki sirkulasi darah melalui penyerapan epitelium. Inhibisi kerja enzim ini secara efektif mampu mengurangi pencernaan karbohidrat kompleks dan absorpsinya, sehingga dapat mengurangi hiperglikemia postprandial pada penderita diabetes (Febrinda dkk., 2013). Dibutuhkan agen yang mampu menghambat kerja enzim ini agar laju absorpsi glukosa dapat dihambat dan hiperglikemia postprandial dapat terkendali. Agen yang dimaksud adalah inhibitor α -glukosidase.

Inhibitor alfa glukosidase (*alpha glucosidase inhibitor*, AGI) merupakan salah satu agen antidiabetik yang digunakan dalam tatalaksana diabetes melitus yang bekerja dengan cara menghambat kerja enzim α -glukosidase pada dinding usus halus. Beberapa inhibitor α -glukosidase yang digunakan secara klinis seperti acarbose, voglibose, dan miglitol telah banyak digunakan (Hasimun & Ketut Adnyana, 2019). Namun terdapat kekurangan dalam penggunaan obat sintesis dalam penanganan diabetes melitus yaitu seringkali menimbulkan kejadian efek samping pada sistem pencernaan seperti sakit perut, diare dan perut kembung (Gondokesumo dkk., 2017). Penggunaan bahan alam dapat menjadi alternatif terapi untuk menangani hiperglikemia postprandial pada penderita diabetes melitus dengan keuntungan seperti efek samping yang rendah serta memiliki harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan obat diabetes sintetik yang dijual di pasaran (P Sudha dkk., 2011).

Salah satu tanaman yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan di Indonesia adalah lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Chang dkk., (2012)

melaporkan bahwa ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes yang diinduksi streptozotisin. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi dkk (2018), persentase kemampuan penurunan kadar gula darah ekstrak etanol *Zingiber zerumbet* adalah $61,09 \pm 16,20\%$. Kemampuan farmakoterapi dari tanaman berkaitan dengan kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan uji fitokimia yang dilakukan oleh Origenes Boy Kapitan dkk mengindikasikan bahwa ekstrak etanol *Zingiber zerumbet* mengandung senyawa-senyawa fitokimia turunan terpenoid, flavonoid, tanin dan fenolik (Kapitan dkk., 2017). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji kapasitas penghambatan fraksi dari ekstrak *Zingiber zerumbet* yang memiliki potensi menurunkan glukosa darah dan membuktikan bahwa penurunan glukosa darah tersebut diakibatkan oleh mekanisme penghambatan enzim α -glukosidase serta untuk mendapatkan fraksi dengan aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase paling tinggi.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)?
2. Berapa nilai IC_{50} inhibisi enzim α -glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Fraksinasi merupakan teknik pemisahan ekstrak hasil ekstraksi yang telah diuapkan menjadi ekstrak kental. Masing-masing pelarut dari fraksinasi ini

- memiliki kepolaran yang berbeda-beda, sehingga mengandung senyawa dengan kepolaran yang berbeda pula.
- b. Fraksi merupakan hasil dari proses pemisahan komponen-komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak dengan kata lain fraksi merupakan hasil fraksinasi.
 - c. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis (senyawa yang mempercepat proses reaksi-reaksi biologi tanpa habis bereaksi) dalam suatu reaksi kimia.
 - d. α -glukosidase adalah enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan.
 - e. p-nitrofenil- α -D glukopiranosida (pNPG) adalah substrat untuk menguji penghambatan enzim yang dilakukan berdasarkan pada pemecahan substrat untuk menghasilkan produk berwarna, yang diukur absorbansinya selama periode waktu tertentu.
 - f. Acarbose adalah salah satu antidiabetes golongan inhibitor α -glukosidase yang bekerja dengan cara menunda absorpsi glukosa di dalam usus sehingga dapat mencegah kenaikan level gula darah postprandial.
 - g. *Microplate reader* merupakan instrumen spektrofotometer yang menggunakan sumber cahaya untuk mengukur konsentrasi senyawa pada panjang gelombang tertentu.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) menggunakan substrat p-nitrofenil- α -D glukopiranosida (pNPG) dengan pembanding acarbose dan diukur menggunakan instrumen ELISA *reader*.

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhtadi dkk., (2019) dengan judul “*The Potential Antidiabetic and Anti-inflammatory Activity of Zingiber zerumbet Ethanolic Extracts and Channa striata Powder on Albino wistar Mice*” membahas tentang potensi aktivitas antidiabetes dan anti-inflamasi dari ekstrak etanol lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) dan *Channa striata* yang diujikan pada tikus wistar albino. Untuk uji anti-inflamasi dimulai dengan menyuntikkan 0,2 mL 2% b/v garam natrium karagenan secara subkutan di daerah subplantar kaki belakang kanan tikus. Sedangkan untuk uji antidiabetes, tikus diinduksi aloksan dosis 150 mg/kgBB secara intraperitoneal. Pada 4 hari berikutnya dilakukan pengukuran kadar glukosa darah. Tikus diberikan ekstrak etanolik *Zingiber zerumbet L.* dosis 300 mg/kg BB, 300 mg/kg BB *Channa striata* powder (CSP), dan kombinasi ekstrak yang diberikan *Zingiber zerumbet L.* dan *Channa striata* powder masing-masing dosis 300 mg/kg BB. Adapun hasil dari penelitian ini adalah diperoleh presentase penghambatan edema kaki kelompok *Zingiber zerumbet L.*, *Channa striata* powder, kombinasi *Zingiber zerumbet L.* - *Channa striata* powder, dan kontrol positif berturut-turut adalah $40,01 \pm 7,19$, $35,25 \pm 8,48$, $36,56 \pm 7,22$ dan $36,10 \pm 2,89\%$. Sedangkan persentase kemampuan penurunan kadar gula darah berturut-turut adalah $61,09 \pm 16,20$, $33,78 \pm 26,67$, $69,59 \pm 13,53$, dan $74,72 \pm 9,90\%$. Ekstrak etanol *Zingiber zerumbet L.* menunjukkan penurunan kadar gula terbaik sebesar 115,7 mg/dL lebih rendah dibandingkan kontrol positif sebesar 138,3 mg/dL.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati & Indrayudha, (2021) dengan judul “Penghambatan Enzim α -Glukosidase oleh Daun Mimba (*Azadirachta indica*) dan Rimpang Temu Mangga (*Curcuma mangga*)” dilakukan pengujian aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase oleh fraksi ekstrak etanol dari daun

mimba dan rimpang temu mangga. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya inhibisi terhadap aktivitas α -glukosidase oleh kedua tanaman berdasarkan nilai IC_{50} terendah. Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak dan fraksi dari daun mimba dan rimpang temu mangga memberikan pengaruh penghambatan terhadap aktivitas enzim α -glukosidase dengan nilai IC_{50} terendah pada fraksi semi polar daun mimba, yaitu $24,16 \pm 4,58 \mu\text{g/mL}$. Pada rimpang temu mangga, fraksi semi polar memberikan nilai IC_{50} paling kuat dibandingkan ekstrak dan fraksi rimpang temu mangga lainnya yaitu $31,85 \pm 8,60 \mu\text{g/mL}$.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirastuti dkk., (2022), dengan judul “*Inhibitory Activity and Kinetics of α -Glucosidase by Toona sinensis Stem Bark Extracts*” bertujuan menentukan aktivitas inhibisi α -glukosidase dan IC_{50} ekstrak serta fraksi kulit kayu surian sebagai antidiabetes secara in vitro. Uji penapisan fitokimia menunjukkan ekstrak air mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Ekstrak etanol 70% dan fraksinya menunjukkan kandungan terpenoid, selain senyawa flavonoid, saponin, dan tannin. Uji Inhibisi α -glukosidase dilakukan dengan mengukur absorbansi warna kuning paranitrofenol yang dibebaskan p-NPG menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 405 nm. Hasil penelitian ini adalah diperoleh inhibisi α -glukosidase terbaik ditunjukkan oleh ekstrak etanol 70% yaitu $70.45 \mu\text{g/mL}$ diikuti oleh fraksi etil asetat, fraksi n-heksan, fraksi dietil eter, dan ekstrak air kulit kayu surian secara berturut-turut dengan nilai $81.96 \mu\text{g/mL}$, $98.76 \mu\text{g/mL}$, $140.25 \mu\text{g/mL}$, dan $242.85 \mu\text{g/mL}$.

Suhendi dkk., (2022) melalui penelitiannya dengan judul “*Inhibition Activity of Indonesian Zingiber zerumbet Leaves Extract on α -Glucosidase Enzyme*” menguji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dan mekanisme penghambatannya menggunakan sampel ekstrak daun *Zingiber zerumbet*. Pada penelitian ini mengukur p-nitrofenol yang dihasilkan dari reaksi enzimatik antara

enzim α -glukosidase dengan substrat p-nitrofenil-a-D-glukopiranososa (pNPG) yang diukur menggunakan instrumen *microplate reader*. p-nitrofenol yang dihasilkan memiliki warna kuning yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nm. Digunakan acarbose sebagai kontrol positif. Pengujian kinetika inhibisi enzim dilakukan dengan menggunakan dua sistem reaksi yaitu sistem reaksi tanpa inhibitor dan sistem inhibitor dengan inhibitor. Pengujian dilakukan menggunakan variasi konsentrasi substrat yaitu 0,625 μ M, 1,25 μ M, 2,5 μ M, dan 5 μ M. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan persen inhibisi seiring meningkatnya konsentrasi yang digunakan. Pada penelitian ini ekstrak etanol daun lempuyang gajah mempunyai aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase dengan rata-rata nilai IC_{50} sebesar $22,21 \pm 0,20$ μ g/mL. Nilai IC_{50} kontrol positif diperoleh rata-rata perhitungan sebesar $47,41 \pm 2,37$ μ g/mL. Nilai IC_{50} ekstrak etanol daun lempuyang gajah mempunyai aktivitas lebih besar daripada kontrol positif ditandai dengan nilai IC_{50} lebih kecil. Hasil pengujian mekanisme inhibisi daun lempuyang gajah didapatkan nilai K 0,924 dan nilai Kap 1,219 sedangkan nilai V 1115,49 dan nilai V_{ap} 1087,40. Pola kinetika inhibisi daun lempuyang gajah adalah termasuk tipe inhibisi campuran I.

Adapun informasi yang didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu bahwa rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki potensi tinggi sebagai antidiabetik melalui mekanisme yang kurang jelas. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Peneliti bermaksud menguji aktivitas antidiabetik kandungan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) melalui mekanisme spesifik yaitu aktivitas penghambatan sampel terhadap enzim α -glukosidase. Belum banyak penelitian mengenai aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase fraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Oleh karena itu, pada penelitian yang akan dilakukan akan menguji aktivitas penghambatan

enzim α -glukosidase dari fraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam terapi diabetes melitus.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam menghambat enzim α -glukosidase.
2. Untuk menentukan nilai IC_{50} penghambatan enzim α -glukosidase dari fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan penjelasan serta wawasan kepada penulis dan masyarakat mengenai potensi lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai antidiabetes serta untuk melengkapi data mengenai potensi antidiabetes fraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sehingga dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya dan meningkatkan penggunaan bahan alam sebagai bahan pengobatan, khususnya rimpang lempuyang gajah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: <i>Zingiber</i>
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm (Kapitan dkk., 2017)



Gambar 1. *Zingiber zerumbet* L. (A) Daun; (B) Rimpang; (C) Pembungaan (Silalahi, 2018)

2. Deskripsi dan Morfologi

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) merupakan salah satu anggota Zingiberaceae yang banyak mendapatkan sorotan peneliti dunia karena potensinya untuk dimanfaatkan sebagai pengobatan. *Zingiber zerumbet* tersebar di beberapa belahan dunia khususnya di daerah tropis misalnya di Asia Tenggara (Chang dkk.,

2012). Penyebaran *Zingiber zerumbet* yang mendunia mengakibatkan adanya variasi nama dari berbagai daerah antara lain: lempuyang (Indonesia), *wild ginger* (Inggris), *shampoo plant* (Amerika), *bengle* (Jawa), *panglay* (Sunda), dan *bunglei* (Malaysia) (Silalahi, 2018).

Zingiber zerumbet merupakan tanaman semak yang tumbuh di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1200 m di atas permukaan laut. Lempuyang gajah merupakan tanaman terna tahunan yang tumbuh berumpun. Tinggi batang lempuyang gajah dapat mencapai hingga 1-2 meter yang merupakan batang semu berwarna hijau. Batang tersusun atas kumpulan pelepah daun. Daun berupa daun tunggal berwarna hijau pucat hingga gelap yang tersusun berseling di kiri dan kanan. Pertulangan daun menyirip. Tepi daun rata dengan ujung daun meruncing (*acuminatus*) dan pangkal daun runcing (*acutus*). Panjang daun berkisar 25-40 cm dan lebar daun mencapai 10-15 cm. Umumnya jumlah helai daun perbatang adalah 3-7 helai. Terdapat tangkai daun yang pendek dan berbulu halus. Perbungaan lempuyang gajah tumbuh dari rhizoma dengan bentuk perbungaan *pinecone* berwarna merah. Kelopak bunga saling lepas satu sama lain dan memiliki tangkai bunga dengan panjang kira-kira 12 cm (Lianah dkk., 2020).

Bagian penting dari *Zingiber zerumbet* adalah rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah tertanam di dalam tanah tebal, bersisik, memiliki aroma yang khas, dan warna kuning yang lebih pucat apabila dibandingkan dengan lempuyang wangi (Yob dkk., 2011).

3. Kandungan

Zingiber zerumbet adalah herba yang kaya akan berbagai kandungan senyawa yang termasuk dalam berbagai macam metabolit kimia, seperti polifenol, alkaloid, dan terpen (Koga dkk., 2016).

Bagian rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan tanin. Kandungan utama minyak atsiri adalah sesquiterpenoid zerumbone yang memiliki aktivitas biologi, antara lain sebagai antikanker dan antitumor (Chang dkk., 2012). Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) mengandung minyak atsiri sekitar 0,82 % dengan komponen pendukung antara lain zerumbon, α -pinen, α -kariofilen, kamfer, sineol 1.8, α humulen, kariofilen oksida, humulen epoksida dan sinamaldehyd. Senyawa lain yang sebelumnya pernah diisolasi dari lempuyang gajah adalah 4'-O-asetilafzelin, germakron-4-5-epoksida dan zerumbetenon. (Suhirman dkk., 2006).

4. Manfaat

Zingiberaceae atau yang secara umum dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai jahe-jahean merupakan famili atau suku tumbuhan berbunga. Tumbuhan ini sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak, obat-obatan, bahan rempah-rempah, tanaman hias, bahan kosmetik, bahan minuman, bahan tonik rambut, dan sebagainya (Washikah, 2016).

Tanaman lempuyang gajah telah dibudidayakan selama ribuan tahun dan digunakan sebagai rempah-rempah sekaligus untuk tujuan pengobatan, yaitu sebagai obat sakit kepala, bengkak, masuk angin, maag, koreng, hilang nafsu makan, mual, dan obat nyeri haid (Chang dkk., 2012).

Zingiber zerumbet atau lempuyang gajah dimanfaatkan untuk mengobati luka goresan atau borok dengan penggunaan topikal. Cara pengolahan tergolong sederhana yaitu dengan meremas dan ditempelkan di daerah yang luka. Selain itu daunnya juga sering diolah menjadi ramuan tradisional yang dikonsumsi atau diminum biasanya diberikan untuk mengatasi gejala disentri, kencing manis, hepatitis, bisul, pereda bengkak, gatal-gatal, nyeri perut, serta sebagai anti inflamasi (Sinaga dkk., 2011).

Bagian utama lempuyang gajah yang sering dimanfaatkan untuk pengobatan adalah rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah memiliki rasa pedas, tajam dan hangat. Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) banyak mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri. Khasiat rimpang lempuyang gajah adalah sebagai stomakik, karminativa dan stimulan. Rimpang lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai tonikum, obat luar, anti kejang dan penambah nafsu makan (Rejeki & Priyandari, 2017).

B. Diabetes Melitus

1. Definisi Diabetes Melitus

Diabetes melitus merupakan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh gangguan pada metabolisme tubuh yang tidak mampu memetabolisme protein, lipid, dan karbohidrat dengan normal sehingga terjadi peningkatan kadar gula dalam darah atau biasa disebut sebagai hiperglikemia (Papadakis & McPhee, 2021).

2. Patofisiologi Diabetes Melitus

Sumber bahan bakar utama tubuh adalah glukosa. Sel memetabolisme glukosa sepenuhnya melalui glikolisis dan siklus krebs, menghasilkan adenosin trifosfat (ATP) sebagai energi. Glukosa disimpan di hati dan otot sebagai glikogen. Glikogenolisis mengubah kembali simpanan glikogen menjadi glukosa apabila dibutuhkan. Glukosa juga dapat disimpan dalam jaringan adiposa, yang selanjutnya dapat menjalani lipolisis menghasilkan asam lemak bebas. Dalam keadaan puasa, asam lemak bebas memasok banyak kebutuhan energi untuk tubuh kecuali sistem saraf pusat, yang membutuhkan glukosa untuk berfungsi secara normal. Protein juga dapat diubah menjadi glukosa melalui glukoneogenesis. Homeostasis dicapai melalui keseimbangan metabolisme glukosa, asam lemak bebas, dan asam amino untuk mempertahankan tingkat glukosa darah yang memadai agar pasokan glukosa ke otak tidak terputus. Di pankreas, insulin dan glukagon diproduksi oleh sel-sel di

pulau Langerhans yang terdiri atas 70% hingga 90% sel β yang berfungsi menghasilkan insulin dan amylin, sedangkan sisanya adalah sel α yang berfungsi menghasilkan glukagon. Insulin utamanya berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah sedangkan glukagon bekerja sebagai antagonis insulin yaitu meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Meskipun kadar glukosa darah bervariasi, aksi insulin dan glukagon yang berlawanan, bersama dengan hormon kontraindikasi, biasanya mempertahankan nilai puasa antara 79 dan 99 mg/dL (4,4–5,5 mmol/L). (Chisholm-Burns dkk., 2019).


Kadar insulin puasa dalam sirkulasi rata-rata dari 43 menjadi 186 pmol/L (6–26 μ IU/mL). Respon insulin terdiri atas dua fase yang terjadi saat kadar glukosa darah meningkat yaitu setelah makan. Fase pertama berlangsung sekitar 5-10 menit, dimana insulin merespon dengan mekanisme menekan produksi glukosa hepatik dan menyebabkan pembuangan glukosa yang dimediasi insulin di jaringan adiposa. Insulin yang diproduksi ini mengurangi hiperglikemia selama makan dan postprandial. Fase kedua respon insulin ditandai dengan peningkatan sekresi insulin secara bertahap, yang berlangsung selama 60-120 menit dan merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer yang bergantung pada insulin, yaitu otot. Pelepasan insulin yang lebih lambat memungkinkan tubuh merespons glukosa yang baru masuk dari pencernaan dengan tetap mempertahankan kadar glukosa darah (Chisholm-Burns dkk., 2019).

Pankreas dengan fungsi sel β normal mampu menyesuaikan produksi insulin untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal. Pada penderita diabetes melitus tipe 2, untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal lebih banyak insulin disekresikan hingga akhirnya pankreas tidak dapat lagi memproduksi insulin yang cukup. Hiperglikemia yang dihasilkan meningkat oleh resistensi insulin yang sangat tinggi, kelelahan pankreas di mana sel β kehilangan kapasitas fungsional,

atau keduanya. Fungsi sel β yang terganggu menghasilkan penurunan kemampuan untuk menghasilkan respons insulin fase pertama yang cukup untuk memberi sinyal pada hati untuk berhenti memproduksi glukosa setelah makan (Chisholm-Burns dkk., 2019 & Dipiro dkk., 2020).

Resistensi insulin adalah faktor utama untuk membedakan diabetes melitus tipe 2 dengan bentuk diabetes lainnya. Selama beberapa tahun sebelum diagnosis DM, resistensi insulin dapat terjadi dan dapat terus berlanjut sepanjang perjalanan penyakit. Resistensi terhadap insulin terjadi pada jaringan adiposa, otot rangka, dan hati. Resistensi insulin di hati menyebabkan hati menjadi tidak responsif terhadap insulin untuk penyerapan glukosa, dan produksi glukosa hati setelah makan tidak berhenti, hal ini menimbulkan ancaman ganda dengan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah puasa dan pascamakan (Papadakis & McPhee, 2021).

Schwartz (2016) melaporkan bahwa organ yang berperan sentral dalam patofisiologi penyakit diabetes melitus tipe 2 tidak hanya sel beta pankreas, otot, dan hepar saja tetapi terdapat total sebelas organ yang turut berperan dan disebut sebagai *the egregious eleven* (Schwartz dkk., 2016).



Gambar 2. *The Egregious Eleven* (Schwartz dkk., 2016)

a. Kegagalan sel beta pankreas

Pada saat diagnosis DM tipe 2 ditegakkan, fungsi sel beta sudah sangat berkurang. Obat antidiabetik yang bekerja adalah meglitinid, sulfonilurea, agonis *glucagon-like peptide* (GLP-1) dan penghambat dipeptidil peptidase-4 (DPP-4) (PERKENI, 2019).

b. Disfungsi sel alfa pankreas

Sel alfa pankreas sejak 1970 telah diketahui merupakan salah satu yang berperan dalam hiperglikemia. Sel alfa berfungsi pada sintesis glukagon yang dalam keadaan puasa kadarnya di dalam plasma akan meningkat. Peningkatan ini menyebabkan produksi glukosa hati (*hepatic glucose production*) dalam keadaan basal meningkat secara bermakna dibanding individu yang normal. Obat yang menghambat sekresi glukagon atau menghambat reseptor glukagon meliputi agonis GLP-1, penghambat DPP-4 dan amilin (PERKENI, 2019).

c. Sel lemak

Sel lemak yang resisten terhadap efek antilipolisis dari insulin, menyebabkan peningkatan proses lipolisis dan kadar asam lemak bebas (*free fatty acid* (FFA)) dalam plasma. Kemudian peningkatan FFA akan merangsang proses glukoneogenesis, dan mencetuskan resistensi insulin di hepar dan otot, sehingga mengganggu sekresi insulin, atau yang disebut sebagai lipotoksisitas. Obat yang bekerja di jalur ini adalah tiazolidinedion (PERKENI, 2019).

d. Otot

Didapatkan gangguan kinerja insulin yang multipel di intramioselular terjadi pada penyandang DM tipe 2, yang diakibatkan oleh gangguan fosforilasi tirosin, sehingga terjadi gangguan transport glukosa dalam sel otot, penurunan sintesis glikogen, dan penurunan oksidasi glukosa. Obat yang bekerja di jalur ini adalah metformin dan tiazolidinedion (PERKENI, 2019).

e. Hepar

Pada penyandang DM tipe 2 terjadi resistensi insulin yang berat dan memicu glukoneogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hepar (*hepatic glucose production*) meningkat. Obat yang bekerja melalui jalur ini adalah yang menekan proses glukoneogenesis, yaitu metformin (PERKENI, 2019).

f. Otak

Insulin merupakan penekan nafsu makan yang kuat. Pada individu yang obesitas baik pasien diabetes melitus maupun bukan, didapatkan hiperinsulinemia yang merupakan mekanisme kompensasi dari resistensi insulin. Pada golongan ini akibat adanya resistensi insulin yang juga terjadi di otak menyebabkan asupan makanan turut meningkat. Obat yang bekerja di jalur ini adalah amilin, bromokriptin, dan agonis GLP-1 (PERKENI, 2019).

g. Kolon/Mikrobiota

Komposisi mikrobiota yang mengalami perubahan pada kolon berkontribusi dalam keadaan hiperglikemia. Mikrobiota usus terbukti berhubungan dengan DM tipe 1, DM tipe 2, dan obesitas sehingga menjelaskan bahwa hanya sebagian individu berat badan berlebih akan berkembang DM. Mediator yang diperkirakan dapat menangani keadaan hiperglikemia, yaitu probiotik dan prebiotik (PERKENI, 2019).

h. Usus halus

Glukosa yang ditelan memicu respons insulin jauh lebih besar dibanding jika diberikan secara intravena. Efek yang dikenal sebagai efek inkretin ini diperankan oleh 2 hormon yaitu *glucagon-like polypeptide-1* (GLP-1) dan *glucose-dependent insulinotropic polypeptide* atau disebut juga *gastric inhibitory polypeptide* (GIP). Pada penyandang DM tipe 2 didapatkan defisiensi GLP-1 dan resisten terhadap hormon GIP. Hormon inkretin juga segera dipecah oleh

keberadaan enzim DPP-4, sehingga hanya bekerja dalam beberapa menit. Obat yang bekerja menghambat kinerja DPP-4 adalah DPP-4 inhibitor. Saluran pencernaan juga mempunyai peran dalam penyerapan karbohidrat melalui kinerja enzim alfa glukosidase yang akan memecah polisakarida menjadi monosakarida, dan kemudian diserap oleh usus sehingga berakibat meningkatkan glukosa darah setelah makan. Obat yang bekerja untuk menghambat kinerja enzim alfa glukosidase adalah acarbose (PERKENI, 2019).

i. Ginjal

Ginjal merupakan organ yang diketahui berperan dalam patogenesis DM tipe 2. Ginjal memfiltrasi sekitar 163 gram glukosa sehari. 90% dari glukosa terfiltrasi ini akan diserap kembali melalui peran enzim *sodium glucose co-transporter* (SGLT-2) pada bagian *convulated* tubulus proksimal, dan 10% sisanya akan diabsorpsi melalui peran SGLT-1 pada tubulus desenden dan asenden, sehingga akhirnya tidak ada glukosa dalam urin. Terjadi peningkatan ekspresi gen SGLT-2 pada penyandang DM, sehingga terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa di dalam tubulus ginjal dan mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Obat yang menghambat kinerja SGLT-2 ini akan menghambat reabsorpsi kembali glukosa di tubulus ginjal sehingga glukosa akan dikeluarkan lewat urin (PERKENI, 2019).

j. Lambung

Konsekuensi Kerusakan sel beta pankreas mengakibatkan penurunan produksi amilin pada diabetes. Hal ini menyebabkan percepatan pengosongan lambung dan peningkatan absorpsi glukosa di usus halus, yang berhubungan dengan peningkatan kadar glukosa postprandial (PERKENI, 2019).

k. Sistem Imun

Terdapat bukti bahwa sitokin menginduksi respons fase akut (disebut sebagai inflamasi derajat rendah, merupakan bagian dari aktivasi sistem imun bawaan/innate) yang berhubungan kuat dengan patogenesis DM tipe 2 dan berkaitan dengan komplikasi seperti dislipidemia dan aterosklerosis. Inflamasi sistemik derajat rendah berperan dalam induksi stres pada endoplasma akibat peningkatan kebutuhan metabolisme untuk insulin. DM tipe 2 ditandai dengan resistensi insulin perifer dan penurunan produksi insulin, disertai dengan inflamasi kronik derajat rendah pada jaringan perifer seperti adiposa, hepar dan otot (PERKENI, 2019).

3. Klasifikasi Diabetes Melitus

Menurut *American Diabetes Association* (ADA), diabetes secara umum diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya yaitu (American Diabetes Association, 2022):

a. Diabetes Tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 merupakan diabetes yang disebabkan oleh destruksi sel beta pankreas akibat proses autoimun. Tingkat penghancuran sel beta Pankreas bervariasi pada tiap individu ada yang proses penghancurannya cepat ada pula yang lambat. Sel beta pankreas yang telah dihancurkan oleh proses autoimun menyebabkan insulin tidak dapat diproduksi. Hal ini mengakibatkan hiperglikemia postprandial dimana glukosa tidak mampu disimpan di hati tapi terakumulasi dalam darah dengan konsentrasi yang tinggi (Lestari dkk., 2021). Kondisi ini dapat terjadi pada semua usia namun, paling sering terjadi pada anak-anak dan dewasa muda dengan kejadian puncak pada usia 10-14 tahun (Papadakis & McPhee, 2021).

b. Diabetes Tipe 2

Diabetes melitus tipe II adalah jenis diabetes yang paling umum, dengan persentase 90% dari penderita diabetes di dunia. Berawal dari ketidakmampuan sel-

sel tubuh dalam merespon sepenuhnya insulin yang diproduksi atau kondisi ini sering disebut resistensi insulin. Resistensi insulin yang terus menerus mengindikasikan bahwa insulin kurang efektif dan memicu peningkatan produksi hormon tersebut. Seiring waktu, kegagalan sel beta pankreas untuk memenuhi kebutuhan insulin menyebabkan produksi insulin yang tidak memadai dapat berkembang (International Diabetes Federation, 2021).

Penyebab diabetes tipe 2 tidak sepenuhnya dipahami tetapi ada hubungan kuat dengan bertambahnya usia, etnis, riwayat keluarga, kelebihan berat badan, dan obesitas (International Diabetes Federation, 2021). Pola makan dan aktivitas fisik merupakan pola hidup yang dominan menjadi pencetus diabetes tipe 2. Tingginya jumlah penyandang diabetes melitus tipe 2 antara lain disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat serta kesadaran untuk melakukan deteksi dini penyakit DM, kurangnya aktivitas fisik, dan salah dalam mengatur pola makan. Kadar gula darah pada individu yang memiliki pola makan tidak teratur akan lebih buruk dibandingkan dengan yang memiliki pola makan teratur. Risiko individu untuk menyandang diabetes melitus tipe 2 bagi yang beraktivitas fisik sehari-harinya ringan memiliki risiko 2,68 kali dibandingkan dengan yang melakukan aktivitas fisik sehari-harinya sedang dan berat (Murtiningsih dkk., 2021).

c. Diabetes Melitus Gestasional

Diabetes melitus gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan pada wanita hamil. DMG merupakan keadaan pada wanita selama kehamilan yang menunjukkan kadar glukosa tinggi dimana sebelumnya belum pernah didiagnosis diabetes. Diabetes melitus gestasional berkaitan erat dengan komplikasi selama kehamilan seperti preeklampsia dan infeksi traktus urinaria, meningkatnya kebutuhan seksio sesarea dan risiko ketonemia, serta

meningkatnya gangguan perinatal (makrosomia, hipoglikemia neonatus, dan ikterus neonatorum) (Kamali Adli, 2021).

d. DM tipe lain

Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya, sindrom diabetes monogenik (seperti diabetes neonatal dan diabetes onset maturitas pada usia muda), penyakit pankreas eksokrin (seperti *cystic fibrosis* dan pankreatitis), dan diabetes yang disebabkan oleh obat atau bahan kimia (misalnya penggunaan glukokortikoid, dalam HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) (American Diabetes Association, 2022).

4. Penggolongan Obat Antidiabetes

a. Sulfonilurea

Sulfonilurea meningkatkan sekresi insulin dengan memblokir saluran kalium yang peka terhadap ATP di membran sel sel pankreas. Tindakan ini menghasilkan depolarisasi membran, memungkinkan masuknya kalsium menyebabkan translokasi butiran sekretori insulin ke permukaan sel, dan meningkatkan sekresi insulin dengan cara yang tidak tergantung glukosa. Insulin kemudian diangkut melalui vena portal ke hati, menekan produksi glukosa hati. Obat ini diklasifikasikan sebagai agen generasi pertama atau kedua. Kedua kelas sulfonilurea sama efektifnya bila diberikan dengan dosis yang sama. Salah satu keterbatasan terapi sulfonilurea adalah ketidakmampuan produk ini untuk merangsang pelepasan insulin dari sel-sel pada kadar glukosa yang sangat tinggi atau disebut toksisitas glukosa. Efek samping yang umum termasuk hipoglikemia dan penambahan berat badan (Papadakis & McPhee, 2021).

b. Biguanida

Metformin adalah satu-satunya biguanide yang disetujui oleh *Food and Drug Administration* (FDA) dan saat ini tersedia di Amerika Serikat. Agen ini dianggap

menurunkan glukosa darah dengan menurunkan produksi glukosa hepatic dan meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan otot hepatic dan perifer. Metformin tidak mempengaruhi pelepasan insulin dari sel-sel pankreas, sehingga kejadian hipoglikemia sebagai efek samping jarang terjadi. Efek samping yang sering terjadi biasanya mengganggu gastrointestinal termasuk penurunan nafsu makan, mual, dan diare (Papadakis & McPhee, 2021).

c. Meglitinid

Meglitinida menghasilkan efek farmakologis dengan berinteraksi dengan saluran kalium yang sensitif terhadap ATP pada sel-sel; namun, pengikatan ini adalah pada reseptor yang berdekatan dengan reseptor yang mengikat sulfonilurea. Manfaat utama secretagogues nonsulfonilurea adalah dalam mengurangi kadar glukosa pasca makan. Karena memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang singkat, obat ini harus diminum 15 hingga 30 menit sebelum makan (Papadakis & McPhee, 2021).

d. Thiazolidinediones

Agen ini diketahui meningkatkan sensitivitas insulin menurunkan asam lemak plasma, dengan menstimulasi *peroxisome proliferator-activated receptor gamma* (PPAR- γ). TZD dapat menghasilkan retensi cairan dan edema. Dengan demikian, obat ini dikontraindikasikan dalam situasi di mana peningkatan volume cairan merugikan seperti gagal jantung stadium III dan IV. Retensi cairan tampaknya berhubungan dengan dosis dan meningkat bila dikombinasikan dengan terapi insulin. Meski jarang, TZD dapat memperburuk edema makula di mata. Pertambahan berat badan sebesar 4 kg (8,8 lb) biasa terjadi pada TZD dan dihasilkan dari retensi cairan dan akumulasi lemak (Papadakis & McPhee, 2021).

e. Turunan D-fenilalanin

Golongan antidiabetes ini memiliki cara kerja yang mirip dengan sulfonilurea, namun berbeda lokasi reseptor. Obat derivat fenilalanin ini adalah nateglinide. Nateglinide merangsang sekresi insulin dengan mengikat reseptor sulfonilurea dan menutup saluran kalium yang peka terhadap ATP. Obat ini dengan cepat diserap dari usus, mencapai kadar plasma puncak dalam waktu 1 jam lalu dimetabolisme di hati dan memiliki waktu paruh plasma sekitar 1,5 jam. Seperti repaglinide (derivat asam benzoat), obat ini menyebabkan denyut cepat insulin yang singkat, dan bila diberikan sebelum makan, obat ini mengurangi peningkatan glukosa darah postprandial. Untuk sebagian besar pasien, dosis awal dan pemeliharaan yang dianjurkan adalah 120 mg tiga kali sehari sebelum makan. Gunakan 60 mg pada pasien yang memiliki peningkatan HbA1c ringan. Seperti secretagog insulin lainnya, efek samping utamanya adalah hipoglikemia dan penambahan berat badan (Papadakis & McPhee, 2021).

f. Agonis Reseptor *glucagon-like polypeptide-1* (GLP-1)

Saat ini, tujuh agonis reseptor GLP-1 tersedia di Amerika Serikat. Enam di antaranya diberikan secara subkutan (exenatide, exenatide XR, lixisenatide, dulaglutide, liraglutide, dan semaglutide) dengan jadwal pemberian dosis mulai dari sekali seminggu, dua kali sehari hingga satu (semaglutide) diberikan secara oral dalam sekali sehari. Obat golongan ini merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas dengan cara bergantung pada glukosa. Selain itu, selama hiperglikemia, agonis reseptor GLP-1 mengurangi kadar glukagon yang meningkat secara tidak tepat, yang menyebabkan glukosa penurunan pembentukan hepatic. Agen ini juga memiliki efek langsung pada lambung untuk memperlambat pengosongan lambung melalui sistem saraf otonom, sehingga mengurangi ekskursi glukosa terkait makanan. Selain itu, agen yang menembus penghalang darah-otak meningkatkan

rasa kenyang melalui sistem saraf pusat. Tindakan ini menghasilkan penurunan glukosa dan berat badan. Agonis reseptor GLP-1 juga berpotensi mempertahankan fungsi sel beta pankreas dan melindungi terhadap apoptosis yang diinduksi sitokin. Semua agonis reseptor GLP-1 menghasilkan tingkat farmakologis aktivitas GLP-1 dan resisten terhadap degradasi cepat oleh enzim dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) (Dipiro dkk., 2020).

g. Penghambat enzim *Dipeptidyl Peptidase-4* (DPP-4 Inhibitor)

Empat penghambat DPP-4 disetujui oleh FDA: sitagliptin, saxagliptin, linagliptin, dan alogliptin, semuanya diberikan secara oral sekali sehari. Agen ini menghambat enzim DPP-4 yang bertanggung jawab atas degradasi cepat GLP-1 dan GIP, sehingga memperpanjang waktu paruh GLP-1 dan GIP yang diproduksi secara endogen. Tingkat GLP-1 kurang pada pasien dengan DM tipe 2. Karena agen ini memblokir hampir 100% aktivitas enzim DPP-4 selama setidaknya 12 jam, kadar GLP-1 fisiologis normal tercapai. Hal ini mengakibatkan peningkatan sekresi insulin yang bergantung pada glukosa dari pankreas dan penurunan sekresi glukagon postprandial yang tidak tepat, bila digunakan sebagai monoterapi maka akan menghasilkan kadar glukosa yang lebih rendah tanpa peningkatan hipoglikemia. Obat ini tidak mengubah pengosongan lambung dan tidak menyebabkan mual atau memiliki efek signifikan pada rasa kenyang. Penghambat DPP-4 memiliki dampak netral untuk berat badan (Dipiro dkk., 2020).

Penghambat DPP-4 memiliki kemanjuran penurun glukosa sedang, dengan rata-rata penurunan hbA1c 0,5% hingga 0,9% (0,005-0,009; 6 hingga 10 mmol/mol Hb) hingga saat digunakan pada dosis maksimum. Inhibitor DPP-4 memiliki kurva dosis-respons yang dangkal. Penghambat DPP-4 dianggap sebagai terapi lini kedua atau ketiga dalam algoritme ADA, terutama ketika ada kebutuhan mendesak untuk meminimalkan hipoglikemia atau penambahan berat badan, tetapi golongan ini

memiliki kemanjuran penurunan hbA1c yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelas obat lini kedua lainnya. Keuntungan potensial dari penghambat DPP-4 termasuk dosis sekali sehari, netralitas berat badan, pemberian oral, risiko hipoglikemia rendah, dan toleransi yang baik. Obat golongan ini dapat digunakan pada orang dewasa yang lebih tua dengan insufisiensi ginjal sedang sampai berat atau pada orang-orang di mana tolerabilitas obat adalah prioritas. Namun, kemampuan mereka untuk menurunkan glukosa darah sederhana dan mahal. Penghambat DPP-4 dapat ditoleransi dengan sangat baik. Efek samping jarang terjadi tetapi bisa termasuk hidung tersumbat dan berair; sakit kepala; atau infeksi saluran pernapasan atas. Kekhawatiran keamanan yang muncul pasca-pasar dengan inhibitor DPP-4 termasuk gagal jantung, pankreatitis, dan nyeri sendi. FDA juga telah mengeluarkan peringatan tentang risiko nyeri sendi yang parah dengan penghambat DPP 4 (Dipiro dkk., 2020).

h. Penghambat Enzim *Sodium Glucose co-Transporter-2* (SGLT-2 Inhibitor)

Inhibitor SGLT-2 (canagliflozin, dapagliflozin, dan empagliflozin) disetujui sebagai tambahan untuk diet dan olahraga agar meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan diabetes melitus tipe 2 dan dapat digunakan sebagai monoterapi atau kombinasi. Penghambatan SGLT-2 di tubulus proksimal mengurangi reabsorpsi glukosa yang disaring dan menurunkan ambang ginjal untuk glukosa yang bersama-sama menyebabkan peningkatan ekskresi glukosa urin dan penurunan konsentrasi glukosa plasma. Pengurangan hbA1c tipikal adalah 0,5% hingga 1% (0,005–0,01; 5– 11 mmol/mol Hgb). Efek samping penghambat SGLT-2 termasuk infeksi saluran kemih (ISK) dan infeksi mikotik genital yang meningkat karena peningkatan ekskresi glukosa yang terjadi sebagai fungsi dari mekanisme kerja obat. Diuresis osmotik juga terjadi yang dapat menyebabkan hipotensi simptomatik (Chisholm-Burns dkk., 2019).

Fungsi ginjal harus dipantau pada awal pemberian untuk memandu pemberian dosis awal dan secara berkala selama pengobatan untuk menilai kesesuaian kelanjutan. Status volume termasuk tekanan darah, hematokrit, kalium serum, magnesium serum, serum fosfat, dan kolesterol *low-density lipoprotein* (LDL) juga merupakan parameter pemantauan yang direkomendasikan untuk obat golongan ini. Kasus ketoasidosis euglikemik telah dilaporkan dengan penghambat SGLT-2. Sebelum inisiasi, pasien harus dinilai risiko ketoasidosisnya (beberapa faktor risiko termasuk defisiensi insulin, penurunan dosis insulin, pembatasan kalori, pembedahan, dan infeksi). Jika ketoasidosis terjadi, penghambat SGLT-2 harus ditunda atau dihentikan. Peningkatan risiko patah tulang juga dikaitkan dengan penggunaan inhibitor SGLT-2 serta kanker kandung kemih yang baru didiagnosis dengan dapagliflozin (Chisholm-Burns dkk., 2019).

i. Penghambat α -Glukosidase


Penghambat α -glukosidase secara kompetitif menghambat enzim alfa-glukosidase di usus yang mencerna pati dan sukrosa makanan. Dua dari obat ini yaitu acarbose dan miglitol tersedia untuk penggunaan klinis di Amerika Serikat. Voglibose, penghambat alfa-glukosidase lainnya tersedia di Jepang, Korea, dan India. Acarbose dan miglitol adalah penghambat kuat glukamilase, alfa-amilase, dan sukrase tetapi memiliki efek yang lebih kecil pada isomaltase dan hampir tidak berpengaruh pada trehalase dan laktase (Papadakis & McPhee, 2021).

Acarbose dan miglitol adalah inhibitor α -glukosidase yang bersaing dengan enzim usus kecil yang memecah karbohidrat kompleks. Obat ini menunda penyerapan karbohidrat dan mengurangi konsentrasi glukosa darah postprandial sebanyak 40 hingga 50 mg/dL (2,2–2,8 mmol/L). Insiden tinggi efek samping GI, termasuk perut kembung (42%–74%), ketidaknyamanan perut (12%–19%), dan diare (29%–31%), mengakibatkan penggunaan antidiabetes golongan inhibitor α -

glukosidase terbatas. Dosis awal yang rendah diikuti dengan titrasi bertahap dapat meminimalkan efek samping GI. Penghambat α -glukosidase dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit usus kronis termasuk penyakit radang usus. Selain itu, obat dalam kelas ini tidak direkomendasikan untuk pasien dengan kreatinin serum (SCr) lebih besar dari 2 mg/dL (177 mol/L) (Chisholm-Burns dkk., 2019).

C. Enzim α -glukosidase

α -glukosidase adalah enzim yang mengkatalisis pemotongan ikatan glikosidik pada oligosakarida. Beberapa glukosidase yang bekerja spesifik dalam memotong ikatan glikosidik bergantung pada jumlah, posisi, atau konfigurasi grup hidroksil di dalam molekul gula. Aktivitas glukosidase menjadi hal yang fundamental bagi beberapa proses biokimia seperti degradasi polisakarida menjadi unit monosakarida, agar dapat diserap dan digunakan oleh organisme. Oleh karena itu, seperti yang terjadi pada penderita diabetes yaitu pada kondisi hiperglikemia dimana konsentrasi gula pada darah tinggi melebihi normal. Kondisi hiperglikemia dapat diatasi dengan penghambatan kerja enzim α -glukosidase karena jumlah monosakarida yang dapat diserap oleh usus menjadi berkurang (Febrinda dkk., 2013).



Gambar 3. Mekanisme α -glucosidase memecah disakarida (Gendokesumo dkk., 2022)

D. Acarbose

Acarbose merupakan senyawa oligosakarida yang berasal dari proses fermentasi mikroorganisme *Actinoplanes utahensis*, yang dikenal dengan nama kimia O- 4, 6- dideoxy- 4- [[(1S, 4R, 5S, 6S)- 4, 5, 6- trihydroxy- 3- (hydroxymethyl)- 2 cyclohexen- 1- yl] amino]- a- D- glucopyranosyl- (1->4)- O- a- D- glucopyranosyl- (1->4)- Dglucose dan memiliki rumus empiris $C_{25}H_{43}NO_{18}$. Senyawa oligosakarida kompleks ini merupakan inhibitor kompetitif potensial dari enzim α -glukosidase yang bekerja untuk memecah pati, dekstrin, maltose, dan sukrosa hingga membentuk monosakarida yang dapat dicerna. Berdasarkan sifat tersebut, maka acarbose adalah salah satu agen antidiabetik oral bagi pasien DM tipe 2. Efek samping yang akan dirasakan kebanyakan pasien yang menggunakan acarbose adalah flatulensi, diare, dan sakit perut (Febrinda dkk., 2013).



Gambar 4. Mekanisme acarbose menurunkan gula darah (Gendokesumo dkk., 2022)

E. Ekstraksi dan Fraksinasi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi merupakan pemisahan atau penarikan komponen yang terdapat di dalam suatu bahan padat atau cairan dengan menggunakan bantuan pelarut berdasarkan perbedaan kelarutan antara pelarut dan zat terlarut. Pemisahan terjadi atas dasar kelarutan komponen-komponen dalam campuran pelarut dan zat terlarut (Andree W S dkk., 2015).

2. Metode Ekstraksi

a. Maserasi

Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman serta pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan saat mencapai kesetimbangan antara konsentrasi dalam sel tanaman dengan konsentrasi senyawa dalam pelarut. Setelah proses ekstraksi, penyaringan dilakukan untuk memisahkan pelarut dari sampel. Kelebihan dari metode maserasi adalah dengan metode maserasi rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil dapat dihindari. Sedangkan kelemahan dari metode maserasi adalah pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Kemudian selain akan memakan banyak waktu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar (Mukhriani, 2014).

b. Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pada bagian atas serbuk, pelarut ditambahkan dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Dimana sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru menjadi kelebihan dari metode ini. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain

itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

c. Sokletasi

Sokletasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan cara panas. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut maupun memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

d. Refluks

Metode refluks juga merupakan metode ekstraksi dengan cara panas. Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi lalu kembali ke dalam labu.

e. *Ultrasound*

Ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz) sebagai alat bantu dalam metode maserasi yang dimodifikasi. Wadah *ultrasonic* dan *ultrasound* akan menjadi wadah berisi serbuk sampel. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

3. Fraksinasi

Metode fraksinasi atau pemisahan umumnya terbagi atas (Mukhriani, 2014):

a. Ekstraksi cair-cair

Ekstraksi cair-cair adalah metode pemisahan dengan menggunakan dua campuran pelarut yang tidak saling bercampur, sehingga senyawa tertentu

terpisahkan menurut kesesuaian sifat dengan cairan pelarut (prinsip *solve dissolve like*).

b. Kromatografi

Kromatografi adalah teknik pemisahan zat dari campuran berdasarkan perbedaan migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh fase gerak. Metode fraksinasi didasarkan pada sifat kepolaran eluen yang digunakan sebagai fase gerak dan akan menarik senyawa dengan sifat kepolaran yang sama melalui silika, dimana silika berfungsi sebagai fase diam sehingga senyawa-senyawa tersebut akan terpisah-pisah dalam beberapa fraksi.

F. Microplate Reader

Microplate reader atau disebut *plate reader* merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendeteksi sampel kimia, fisika, atau biologis dalam ukuran mikro. Alat ini umumnya digunakan dalam penelitian obat, validasi, dan banyak hal lainnya yang umum digunakan dalam bidang farmasi, bioteknologi, maupun akademik. Format *microplate* yang umum digunakan yaitu dengan 96 sumur yang terdiri dari 12 kolom dan 8 baris (Yang dkk., 2022).

Dengan *microplate reader* dapat digunakan untuk pengukuran absorbansi. Pembacaan absorbansi suatu sampel dimanfaatkan untuk uji ELISA, kuantifikasi protein dan asam nukleat, serta uji terhadap aktivitas enzim. Prinsip kerja *microplate reader* tidak jauh berbeda dengan spektrofotometri. Sumber cahaya menyinari sampel yang akan diukur dengan panjang gelombang tertentu (diatur dengan filter cahaya atau sebuah monokromator) dan kemudian detektor menghitung banyaknya cahaya awal yang ditransmisikan oleh sampel. Banyaknya cahaya yang ditransmisikan berhubungan dengan konsentrasi molekul yang akan dicari (Yang dkk., 2022).

Metode ELISA (*Enzyme-linked Immunosorbent Assay*) merupakan analisis kuantitatif yang menunjukkan reaksi antigen-antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh dengan menggunakan konjugat terkait enzim dan substrat enzim. ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi dan antigen dalam suatu sampel (Ipandi dkk., 2019).

Kelebihan dari instrumen ELISA (*Enzyme-linked Immunosorbent Assay*) adalah teknik analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang tinggi. Teknik ELISA juga mampu mendeteksi keberadaan antigen dengan kadar yang sangat rendah (Santosa, 2020).

Prinsip kerja ELISA adalah mereaksikan antigen dengan antibodi yang berlabel enzim dengan penambahan substrat sehingga akan dihidrolisis sehingga terjadi perubahan warna yang dapat diukur dan dideteksi menggunakan instrumen spektrofotometer yang disebut ELISA *reader* pada panjang gelombang tertentu. Pada tahap akhir teknik ELISA ditambahkan *stop solution* yang berfungsi untuk menghentikan reaksi. Bahan yang biasa digunakan sebagai *stop solution* adalah larutan dengan pH ekstrim seperti asam atau basa kuat (Santosa, 2020).

G. Tinjauan Islam

Al-Qur'an dalam sebagian ayatnya banyak menjelaskan terkait kuasa Allah Swt. yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan cermat. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup maupun dimanfaatkan sebagai pengobatan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?”
(Kementerian Agama RI, 2019)

Melalui firman Allah Swt. Tersebut memperlihatkan kekuasaan-Nya pada orang-orang yang kufur dan enggan melihat kebesaran-Nya. Apakah mereka tidak melihat ke bumi yaitu mengarahkan pandangan sepanjang, seluas, dan seantero bumi *berapa banyak kami telah tumbuhkan di sana dari setiap pasang tumbuhan* dengan berbagai macam jenisnya yang semuanya tumbuh subur dan bermanfaat. Jika mereka ingin merenungi adanya kuasa-Nya di bumi ini, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah Swt. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik sehingga mendatangkan manfaat, membuktikan bahwa Allah Swt. merupakan dzat yang Maha Kuasa serta membuktikan pula kuasa-Nya menghidupkan dan membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2005).

Ayat di atas menjelaskan tentang kuasa Allah Swt. merupakan dzat yang Maha Kuasa menciptakan bumi beserta isi-isinya, salah satunya ialah tumbuhan. Ketika kita merenungi adanya kuasa Allah Swt. maka mudah bagi kita dalam menemukan petunjuk atas segala sesuatu. Dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya, Allah Swt. telah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh setiap makhluk-Nya. Salah satu manfaatnya yaitu dalam dunia kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan pengobatan atau biasa disebut sebagai tanaman obat (herbal). Bagi hamba-Nya yang senantiasa ingin berpikir dan mengkaji adanya kekuasaan Allah Swt. tersebut, maka niscaya Allah Swt. akan memberikan petunjuk. Tumbuh-tumbuhan yang baik sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan untuk menyembuhkan penyakit. Hal ini merupakan salah satu anugerah

Allah Swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sebaik mungkin salah satunya adalah melalui penelitian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ
ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim No. 4084) (Fachruddin HS, 1979).

Berdasarkan dalil tersebut menjelaskan bahwa setiap penyakit yang diciptakan Allah Swt. bersama dengan obatnya. Semua penyakit dapat sembuh dengan seizin Allah Swt., obat hanya sebagai sarana penyembuhan saja. Adapun seseorang dapat sembuh atau tidak atas dasar kuasa-Nya. Allah menciptakan obat-obatan tidak dalam wujud “obat”, dibutuhkan keterlibatan manusia dalam mengola maupun mengungkap obat tersebut. Termasuk tanaman yang sangat sering dimanfaatkan oleh manusia untuk mencegah maupun mengobati penyakit. Firman Allah Swt. dalam Qur'an Surah Yasin/36:35

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ ٣٥

Terjemahnya:

“agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka (Manusia). Mengapa mereka tidak bersyukur?” (Kementerian Agama RI, 2019)

Menurut Tafsir Ibnu Ktasir pada Ayat 35 ini setelah menyebutkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya melalui tanaman-tanaman yang ditumbuhkan-Nya bagi

mereka, lalu Allah menyebutkan berbagai macam buah-buahan yang dapat dinikmati yang kesemuanya itu ada tiada lain hanyalah berkat rahmat Allah Swt. kepada mereka, bukan semata-mata hanya karena usaha dan jerih payah mereka, bukan pula karena kemampuan dan kekuatan mereka sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur (Al-Hafiz, 2015). Selain itu ada makna lain bahwa ayat tersebut mengandung isyarat tentang perlunya memberi perhatian dan usaha sungguh-sungguh agar hasil pertanian bertambah dan baik, sebagai keterlibatan manusia dalam mengelolanya termasuk dalam mengungkap kandungan dan manfaat suatu tumbuhan melalui ilmu pengetahuan. Ayat ini merupakan salah satu ayat sains yang mendorong manusia melakukan observasi dan inovasi untuk mengungkap rahasia alam semesta agar menunjukkan betapa Maha Besarnya Allah Swt. dan betapa Agung Kekuasaan-Nya (Shihab, 2005).

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan implementasi dari tugas manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi. Oleh karenanya bagi seorang muslim, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sarana untuk mengelola, bukan digunakan untuk merusak bumi. Faktanya, ilmu pengetahuan yang telah terbukti secara empirik selalu selaras dengan Al-Qur'an. Namun ilmu pengetahuan yang masih dalam bentuk teori kadang tampak bertentangan dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an. Dalam kondisi ini, para peneliti tidak seharusnya berhenti pada level observasi, melainkan berusaha mencapai level orang yang berakal, *ulul-albāb*, seperti dijelaskan dalam QS. Ali-Imran/3:190-191 berikut.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ ١٩٠
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
 هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian Agama RI, 2019)

Akal adalah kerja kalbu, hati, yang itu berada dalam dada (sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Ĥajj/22: 46), yang merupakan kemampuan untuk mengambil pelajaran. Kata *ulul-albāb* dalam Al-Qur'an biasa disebutkan mengiringi pemaparan tentang fenomena-fenomena alam untuk menunjuk kepada mereka yang bisa mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena itu (Kementerian Agama RI, 2011). Sebagai farmasis dengan latar belakang ilmu yang berkaitan dengan obat dan pengobatan harus menjadi hamba yang mampu mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini termasuk dalam hal tumbuhan sebagai pengobatan karena segala sesuatu yang diciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia.

Terdapat begitu banyak variasi tumbuhan di permukaan bumi namun tidak semua tumbuhan yang ada dijelaskan manfaatnya dalam Al-Qur'an. Salah satu tumbuhan yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai bentuk pengolahan, dapat dikonsumsi sebagai minuman maupun makanan yaitu jahe. Dijelaskan dalam QS. Al-Insan/76:17

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۗ ۱۷

Terjemahnya:

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kementerian Agama RI, 2019).

Jahe disebut sebagai bahan campuran minuman di surga. Sejarah mencatat bahwa pada masa hidupnya, Rasulullah pernah menerima satu guci asinan jahe

sebagai hadiah dari Kaisar Byzantium. Nabi lalu menyantapnya sekaligus membagikannya kepada sahabat-sahabatnya. Tafsir Mazhari menjelaskan bahwa masyarakat Arab menggemari jahe dan menggunakannya sebagai campuran minuman dan pengobatan (Kementerian Agama RI, 2011).

Seperti yang diketahui bahwa memiliki berbagai varian dari jahe, semuanya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah lempuyang gajah yang sudah sejak lama dimanfaatkan masyarakat khususnya pada bagian rimpangnya sebagai *shampoo* dan obat tradisional dalam mengobati berbagai penyakit seperti demam, sakit perut, wasir, kusta, dan penambah nafsu makan termasuk sebagai antidiabetes.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dari fraksi n-heksan dan etil asetat lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biologi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta Laboratorium Penelitian dan Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2023 hingga Juni 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium untuk menguji ada tidaknya aktivitas penghambatan enzim α -glucosydase pada hasil fraksinasi ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dengan pelarut n-heksan dan etil asetat menggunakan substrat p-nitrofenil- α -D glukopiranosida (pNPG) dengan metode spektrofotometer menggunakan instrumen yang disebut *ELISA reader*.

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian rimpang tumbuhan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang diperoleh dari produsen resmi.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wadah kaca tertutup rapat, blender (Miyako[®]), lemari pengering simplisia, *vacum rotary evaporator* (IKA[®]), *ELISA reader* (BMG Labtech[®]), penangas (Mettler[®]), corong kaca, kertas saring, aluminium foil, kertas perkamen, batang pengaduk, pipet tetes, mikropipet (Eppendorf[®]), cawan porselen, timbangan analitik (Kern[®]), spatel, pH meter (Hanna[®]), labu alas bulat (Duran[®]), labu takar, labu pisah, erlenmeyer, gelas kimia, dan peralatan gelas lainnya dari produsen Pyrex[®].

2. Bahan

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah aquades, etanol 70% (Onemed, Indonesia), rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), n-heksan (Onemed, Indonesia), etil asetat (Onemed, Indonesia), enzim α -glukosidase yang berasal dari rekombinan *Saccharomyces cerevisiae* (Sigma Aldrich, USA), substrat p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (pNPG) (Wako Pure Chemical Industries, LTD., Jepang), acarbose, dimetilsulfoksida (DMSO)(EMD Millipore Corp, Jerman), larutan dapar fosfat pH 7 (Merck, Jerman), Larutan HCl dan larutan Na₂CO₃ (Sigma Aldrich, USA).

E. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi

Simplisia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang diperoleh dari produsen resmi dihaluskan menggunakan blender. Dari proses ini didapatkan

serbuk halus rimpang lempuyang gajah(Ulfah, 2020). Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi. Tahap awal ekstraksi maserasi yaitu serbuk simplisia lempuyang gajah ditimbang sebanyak 600 gram kemudian dimaserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam dengan suhu ruang dan sesekali dilakukan pengadukan. Kemudian saring hasil maserasi, residu yang didapatkan diremaserasi hingga pelarut jernih. Selanjutnya filtrat berupa ekstrak encer gabungan dipekatkan menggunakan *vacum rotary evaporator* pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$ dan diperoleh ekstrak pekat (Fatmawati & Rohmah, 2022).

2. Fraksinasi

Fraksinasi dilakukan dengan metode fraksinasi cair-cair. Fraksi dari ekstrak etanol lempuyang gajah dilakukan dengan menimbang 20 g ekstrak kental rimpang lempuyang gajah kemudian ditambahkan 100 mL aquadest. Pemisahan yang pertama kali dilakukan dengan pelarut n-heksana sebanyak 100 mL, kemudian digojlok dan dibiarkan hingga tepat memisah 2 fase. Fraksi n-heksan akan berada di atas sedangkan fraksi air berada di bawah. Fraksi n-heksan ditampung. Penambahan n-heksana dilakukan sampai diperoleh pelarut n-heksan yang jernih. Fraksinasi yang kedua menggunakan pelarut etil asetat. Sisa larutan fraksi air yang sudah selesai digojlok dengan pelarut n-heksan kemudian ditambahkan 100 mL etil asetat, dan diulangi sampai diperoleh pelarut etil asetat yang jernih. Fraksi-fraksi yang didapatkan dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$. (Anjaswati dkk., 2021; Retnantya Pamungkas & Indrayudha, 2019).

3. Pembuatan Larutan Uji

Prosedur penyiapan larutan uji disiapkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sulasti dkk (2021) yang telah dimodifikasi.

a. Pembuatan Larutan dapar fosfat pH 6,8

Dapar fosfat pH 6,8 dibuat dengan larutan dapar fosfat pH 7 sebanyak 100 mL diatur pHnya menggunakan pH meter hingga mencapai pH 6,8 dengan penambahan HCl 0,2 M.

b. Pembuatan Larutan Enzim α -Glukosidase

Penyiapan larutan enzim dengan menimbang 1 mg enzim α -glukosidase dan larutkan dalam 100 mL dapar fosfat pH 6,8 dalam kondisi dingin (suhu -2 s/d -8°C) untuk mendapatkan konsentrasi larutan enzim 28 U/mL. Dari konsentrasi 28 U/mL dipipet 89 μL kemudian volume dicukupkan menggunakan dapar fosfat pH 6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi 0,25 U/mL

c. Pembuatan Larutan Substrat pNPG (p-nitrophenyl- α -D-glucopyranosyde)

Penyiapan larutan substrat dilakukan dengan menimbang 30,15 mg pNPG dan dilarutkan dengan buffer fosfat sebanyak 5 mL. Sehingga didapat konsentrasi 20 mM. Sebanyak 1 mL dipipet kemudian ditambahkan buffer fosfat hingga 4 mL untuk memperoleh konsentrasi 5 mM.

d. Pembuatan Larutan Natrium Karbonat 200 mM

Pembuatan larutan natrium karbonat dilakukan dengan menimbang 10,6 g serbuk natrium karbonat dan dilarutkan hingga 500 mL dengan air bebas CO_2 sehingga diperoleh natrium karbonat 200 mM.

e. Pembuatan Larutan Standar Acarbose

Standar acarbose ditimbang sebanyak 10 mg dan dilarutkan sedikit dengan dimetil sulfoksida lalu volume dicukupkan dengan dapar fosfat pH 6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 $\mu\text{g/mL}$. Larutan seri standar acarbose dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga diperoleh standar acarbose dengan konsentrasi 0,2 $\mu\text{g/mL}$; 0,4 $\mu\text{g/mL}$; 0,6 $\mu\text{g/mL}$; 0,8 $\mu\text{g/mL}$; dan 1 $\mu\text{g/mL}$.

f. Pembuatan Larutan Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah

Fraksi n-heksan ditimbang sebanyak 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil sulfoksida secukupnya kemudian dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 $\mu\text{g/mL}$. Larutan seri sampel fraksi n-heksan dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga diperoleh seri konsentrasi 200 $\mu\text{g/mL}$; 400 $\mu\text{g/mL}$; 600 $\mu\text{g/mL}$; 800 $\mu\text{g/mL}$; dan 1000 $\mu\text{g/mL}$.

g. Pembuatan Larutan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah

Fraksi Etil Asetat ditimbang sebanyak 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil sulfoksida secukupnya kemudian dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 6,8 hingga 10 mL sehingga diperoleh konsentrasi induk 1000 $\mu\text{g/mL}$. Larutan seri sampel fraksi etil asetat dibuat dengan mengencerkan larutan induk hingga diperoleh seri konsentrasi 200 $\mu\text{g/mL}$; 400 $\mu\text{g/mL}$; 600 $\mu\text{g/mL}$; 800 $\mu\text{g/mL}$; dan 1000 $\mu\text{g/mL}$.

4. Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase

Pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dari sampel fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Maryam dkk. (2020) dengan modifikasi.

a. Pengujian Blanko

Sebanyak 30 μL dimetil sulfoksida dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan 17 μL α -glukosidase lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

b. Pengujian Blanko Kontrol

Sebanyak 30 μL dimetil sulfoksida dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C . Setelah itu ditambahkan 17 μL dapar fosfat pH 6,8 lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C . Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

c. Pengujian Standar Acarbose

Sebanyak 30 μL larutan acarbose 0,2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada acarbose konsentrasi 0,4 $\mu\text{g}/\text{mL}$; 0,6 $\mu\text{g}/\text{mL}$; 0,8 $\mu\text{g}/\text{mL}$; dan 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C . Setelah itu ditambahkan 17 μL α -glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C . Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

d. Pengujian Kontrol Standar

Sebanyak 30 μL larutan acarbose 0,2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada acarbose konsentrasi 0,4 $\mu\text{g}/\text{mL}$; 0,6 $\mu\text{g}/\text{mL}$; 0,8 $\mu\text{g}/\text{mL}$; dan 1 $\mu\text{g}/\text{mL}$. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C . Setelah itu ditambahkan 17 μL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C . Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

e. Pengujian Sampel Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah

Sebanyak 30 μL fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah 200 $\mu\text{g/mL}$ dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah konsentrasi 400 $\mu\text{g/mL}$; 600 $\mu\text{g/mL}$; 800 $\mu\text{g/mL}$; dan 1000 $\mu\text{g/mL}$. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan 17 μL α -glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

f. Pengujian Kontrol Sampel Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah

Sebanyak 30 μL fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah 200 $\mu\text{g/mL}$ dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah konsentrasi 400 $\mu\text{g/mL}$; 600 $\mu\text{g/mL}$; 800 $\mu\text{g/mL}$; dan 1000 $\mu\text{g/mL}$. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan 17 μL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 μL Na_2CO_3 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

g. Pengujian Sampel Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah

Sebanyak 30 μL fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 200 $\mu\text{g/mL}$ dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 μL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 μL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah konsentrasi 400 $\mu\text{g/mL}$; 600 $\mu\text{g/mL}$; 800 $\mu\text{g/mL}$; dan 1000 $\mu\text{g/mL}$. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan 17 μL α -glukosidase pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama

15 menit suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL Na₂CO₃ 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

h. Pengujian Kontrol Sampel Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah

Sebanyak 30 µL fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah 200 µg/mL dipipet ke dalam well, lalu ditambahkan 36 µL dapar fosfat pH 6,8 dan 17 µL larutan substrat pNPG. Dilakukan hal yang sama pada fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah konsentrasi 400 µg/mL; 600 µg/mL; 800 µg/mL; dan 1000 µg/mL. Kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan 17 µL dapar fosfat pH 6,8 pada masing-masing konsentrasi lalu diinkubasi kembali selama 15 menit suhu 37°C. Reaksi dihentikan dengan penambahan 100 µL Na₂CO₃ 200 mM lalu absorban p-nitrofenol diukur pada panjang gelombang 405 nm.

i. Perhitungan Persen Inhibisi dan Nilai *IC*₅₀

Persen hambatan enzim α-glukosidase dihitung menggunakan rumus (Wirastuti dkk., 2022):


$$\text{Inhibisi (\%)} = \frac{(B1-B0)-(S1-S0)}{(B1-B0)} \times 100\%$$

Keterangan:

- B0 = Absorban blanko kontrol (Absorbansi blanko/ kontrol tanpa enzim dan sampel)
- B1 = Absorban blanko (berisi enzim tanpa sampel)
- S0 = Absorban sampel kontrol (Absorbansi sampel tanpa enzim)
- S1 = Absorban sampel (berisi sampel dan enzim)

Nilai persen inhibisi digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi linear antara konsentrasi (pada sumbu x) dan % inhibisi (pada sumbu y). Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dihitung nilai *IC*₅₀ (nilai konsentrasi dari sampel untuk melihat kemampuan dalam menghambat aktivitas enzim α-glukosidase sebesar

50%). Perhitungan IC_{50} didasarkan persamaan linier $y = ax + b$. Aktivitas inhibisi dinyatakan dengan *inhibition concentration 50%* (IC_{50}) yaitu konsentrasi sampel yang dapat menghambat kerja enzim α -glukosidase sebanyak 50%. Nilai IC_{50} diperoleh dari nilai x setelah mengganti $y = 50$.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*)

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah

Jenis Ekstrak	Bobot simplisia (g)	Bobot Ekstrak (g)	Persen Rendamen (%)
Ekstrak kental	600	34,307	5,72

2. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*)

Tabel 2. Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah

Bobot Ekstrak (g)	Jenis Fraksi	Bobot Fraksi (g)	Persen Rendamen (%)
20	Fraksi n-heksan	3,82	19,1
	Fraksi etil asetat	2,58	12,9
	Fraksi air	3,97	19,85

3. Hasil Persentase Inhibisi Enzim α -Glukosidase Standar Acarbose

Tabel 3. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Acarbose

Standar	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Persen Inhibisi (%)
Acarbose	0,2	55,634
	0,4	61,659
	0,6	76,369
	0,8	82,942
	1	90,689

4. Hasil Persentase Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*)

Tabel 4. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi N-Heksan Rimpang Lempuyang Gajah

Sampel	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Persen Inhibisi (%)
Fraksi n-heksan	200	33,959
	400	55,008
	600	66,823
	800	80,047
	1000	94,053

5. Hasil Persentase Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*)

Tabel 5. Persen Inhibisi Enzim α -Glukosidase Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah

Sampel	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Persen Inhibisi (%)
Fraksi etil asetat	200	41,393
	400	59,703
	600	73,083
	800	84,351
	1000	93,662

6. Hasil Perhitungan Nilai IC_{50}

Tabel 6. Nilai IC_{50} Standar dan Sampel

Sampel	Nilai IC_{50} ($\mu\text{g/mL}$)
Acarbose	0,087
Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i>)	380,028
Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i>)	283,545

B. Pembahasan

Tanaman lempuyang gajah telah sejak lama dibudidayakan karena manfaatnya yang dapat digunakan sebagai rempah dan untuk tujuan pengobatan seperti sakit kepala, bengkak, masuk angin, maag, hilang nafsu makan, mual, nyeri haid, bahkan sebagai obat untuk penderita diabetes melitus (Chang dkk., 2012).

Manfaat dari lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) tidak lepas dari kandungan senyawa metabolit sekunder terkandung di setiap bagian lempuyang gajah terutama pada bagian rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan tanin (Koga dkk., 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur aktivitas fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam menghambat enzim α -glukosidase. Enzim α -glukosidase merupakan salah satu enzim yang berperan dalam pemecahan polisakarida dan olisakarida menjadi monosakarida pada proses metabolisme karbohidrat (Yuda dkk., 2018). Penghambatan kerja

enzim ini sangat berguna dalam mengurangi penyerapan karbohidrat dan dapat mengatasi hiperglikemia posprandial pada penderita diabetes melitus.

Selama beberapa dekade terakhir, upaya-upaya menemukan dan mengembangkan penghambat α -glukosidase yang lebih poten tetapi tidak toksik dibanding golongan inhibitor α -glukosidase konvensional yang telah banyak beredar di pasaran sangat gencar dilakukan sebagai pilihan terapi diabetes melitus (Abbas dkk., 2017). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan. Selain mudah didapatkan, pemanfaatan tumbuhan juga lebih aman dikonsumsi, lebih hemat biaya, dan merupakan salah satu metode pengobatan yang diwariskan oleh Rasulullah saw (Nasution, 2020). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari., Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً
إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR Bukhari No. 5246) (Sunarto A., 1991).

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menurunkan obat bagi segala penyakit. Tugas manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini adalah menemukan obat tersebut melalui akal dan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang diciptakan Allah Swt. dengan manfaat yang melimpah ialah tanaman. Penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menemukan khasiat dan potensi

dari salah satu tanaman yang dapat ditemukan di Indonesia yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai obat antidiabetes.

Pada penelitian ini, serbuk rimpang lempuyang gajah diekstraksi menggunakan metode maserasi. Metode maserasi merupakan metode ekstraksi tanpa melalui proses pemanasan sehingga aman untuk bahan-bahan yang tidak tahan pemanasan. Salah satu kandungan senyawa rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang diduga memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase adalah flavonoid (Wirastuti dkk., 2022), dimana flavonoid merupakan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan maka dari itu dipilih metode maserasi. Selain itu, metode maserasi merupakan metode ekstraksi yang sederhana, efektif, dan terjangkau.

Maserasi dilakukan menggunakan etanol 70% sebagai penyari. Etanol merupakan salah satu pelarut yang paling sering digunakan di laboratorium karena memiliki keuntungan seperti tidak beracun, bersifat inert, mampu menyari senyawa lebih bervariasi dibanding dengan metanol dan air (Riwanti dkk., 2020), dapat bercampur dengan air, dan dapat menguap dengan baik pada suhu rendah maupun pada titik didih (78°C). Selain itu, etanol dengan konsentrasi 20% ke atas mampu mencegah pertumbuhan mikroba. Etanol yang dapat menyari senyawa aktif yang optimal termasuk senyawa flavonoid adalah pada konsentrasi 70% (Riwanti dkk., 2020). Proses maserasi dilakukan selama 3 x 24 jam pada suhu ruang dengan sesekali diaduk agar ekstrak yang diperoleh optimal. Ekstrak dipekatkan menggunakan *vacuum rotary evaporator* pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$. Sebanyak 3,4 L ekstrak cair dipekatkan dan diperoleh ekstrak rimpang lempuyang gajah berupa ekstrak kental sebanyak 34,307 gram dengan persen rendamen sebesar 5,72% (tabel 1).


Ekstrak kental selanjutnya difraksinasi menggunakan metode cair-cair. Metode cair-cair ini pada beberapa literatur disebut juga sebagai proses ekstraksi

kedua atau partisi yang pada prinsipnya sama dengan ekstraksi yaitu menyari senyawa yang terkandung dalam sampel menggunakan pelarut yang sesuai. Pada proses fraksinasi ini digunakan 3 pelarut dengan tingkat kepolaran berbeda agar dapat memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Prinsip ini disebut *like dissolve like* yang artinya pelarut polar akan melarutkan senyawa polar, dan pelarut nonpolar akan melarutkan senyawa nonpolar. Semakin besar konstanta dielektrik suatu senyawa maka kepolarannya akan semakin tinggi (Badaring dkk., 2020). Berdasarkan Tabel 2 bobot fraksi yang paling besar adalah fraksi air yaitu sebesar 3,97 gram dengan persen rendamen sebesar 19,85% artinya senyawa yang bersifat polar yang paling banyak terkandung dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

Pada pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) menggunakan instrumen ELISA reader. ELISA reader atau biasa disebut juga *microplate reader* merupakan salah satu spektrofotometer khusus dengan prinsip sama seperti dengan teknik spektrofotometri konvensional namun untuk ELISA reader memiliki kisi refraksi atau filter yang membatasi panjang gelombang yang digunakan. Umumnya instrumen ELISA reader membaca sampel pada panjang gelombang 400-750 nm. Sistem optik berupa serat optik menghantarkan cahaya ke well yang berisi sampel. Sampel dilewati oleh berkas cahaya berdiameter 1-3 mm. Kemudian berkas cahaya yang ditransmisikan tersebut dideteksi oleh detektor di dalam ELISA reader. Perangkat ini kemudian memperkuat sinyal dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang selanjutnya dibaca sebagai nilai absorbansi. Biasanya ELISA reader dihubungkan dengan perangkat lunak komputer yang membantu dalam merekam data dari instrumen bahkan memungkinkan analisis dan interpretasi data (World Health Organization, 2008). Metode ini dipilih karena relatif sederhana, ekonomis,

memiliki sensitivitas yang cukup tinggi serta cocok untuk jumlah sampel yang sedikit.

Enzim α -glukosidase yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rekombinan *Saccharomyces cerevisie* dan menggunakan substrat pNPG (p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida). Enzim α -glukosidase bereaksi dengan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida menghasilkan glukosa dan p-nitrofenol yang berwarna kuning yang dapat dibaca absorbansinya (Suhendi dkk., 2022) (Gambar 5). Adanya aktivitas inhibitor enzim α -glukosidase dari sampel akan menghasilkan intensitas warna kuning yang beragam sesuai dengan nilai inhibisi. Semakin jernih atau pudar warna kuning yang timbul, maka glukosa yang terbentuk semakin sedikit yang artinya sampel banyak menghambat terjadinya reaksi antara enzim dan substrat atau dengan kata lain kekuatan inhibisi sampel terhadap enzim α -glukosidase tinggi.



Gambar 5. Reaksi enzimatik pNPG (p-nitrofenil- α -D-glukopiranoside) dengan α -glukosidase

Sebagai standar atau pembanding digunakan acarbose. Acarbose merupakan salah satu obat antidiabetes dari golongan inhibitor α -glukosidase yang umum digunakan sebagai agen antidiabetes dan telah diizinkan penggunaannya oleh FDA (Barber dkk., 2021). Acarbose memiliki aktivitas menghambat enzim α -glukosidase secara kompetitif. Struktur acarbose memiliki kemiripan dengan glukosa serta ikatan glikosida yang menyerupai substrat. Mekanisme penghambatan aktivitas enzim secara kompetitif dapat terjadi jika senyawa yang

berperan memiliki kemiripan struktur dengan substrat, berkompetisi dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, karena sisi aktif dari enzim α -glukosidase telah diduduki oleh acarbose maka enzim α -glukosidase tidak dapat memecah substrat menjadi p-nitrofenol dan glukosa (Riyanti dkk., 2023).

Uji penghambatan aktivitas enzim α -glukosidase dilakukan pada dua fraksi hasil partisi cair-cair yaitu fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat. Digunakan variasi konsentrasi sampel berturut-turut 200 $\mu\text{g/mL}$, 400 $\mu\text{g/mL}$, 600 $\mu\text{g/mL}$, 800 $\mu\text{g/mL}$, dan 1000 $\mu\text{g/mL}$. Hal ini bertujuan untuk memperoleh nilai persen inhibisi dari tiap konsentrasi yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai IC_{50} dari setiap fraksi. Nilai IC_{50} adalah besarnya konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas enzim dalam hal ini adalah enzim α -glukosidase. Nilai IC_{50} tersebut digunakan untuk mengukur kekuatan penghambatan sampel terhadap enzim α -glukosidase. Semakin rendah nilai IC_{50} dari fraksi, maka fraksi tersebut memiliki aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase yang semakin tinggi.

Pada uji ini, dilakukan pengukuran absorbansi sampel (S) dan absorbansi blanko (B). Pada pengukuran absorbansi blanko digunakan dimetil sulfoksida sebagai pengganti larutan fraksi/standar. Perlakuan pada pengukuran absorbansi sampel (S) dan blanko (B) sama-sama menggunakan kontrol yaitu kontrol sampel dan kontrol blanko yang berperan sebagai faktor koreksi dari hasil nilai serapan sampel dan blanko karena warna dari sampel juga dapat mempengaruhi nilai serapan pada panjang gelombang yang digunakan. Absorbansi p-nitrofenol yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 405 nm.

Nilai persen inhibisi dihitung dengan membandingkan absorbansi sampel (S) dengan absorbansi blanko (B). Adapun nilai persen inhibisi dari acarbose, fraksi n-heksan dan etil asetat berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 3, 4, dan 5. Persen inhibisi yang diperoleh dari kedua sampel (Tabel 4 dan 5) menunjukkan adanya

aktivitas penghambatan sampel terhadap α -glukosidase pada seri konsentrasi yang digunakan. Nilai persen inhibisi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi standar dan sampel yang digunakan, semakin besar pula aktivitas penghambatannya. Hal ini disebabkan karena jumlah senyawa aktif yang berperan dalam menghambat enzim α -glukosidase kuantitasnya juga meningkat seiring bertambahnya konsentrasi standar maupun sampel.

Selanjutnya nilai persen inhibisi yang diperoleh digunakan untuk menghitung nilai IC_{50} . Nilai IC_{50} kedua fraksi dibandingkan dengan nilai IC_{50} acarbose untuk melihat apakah fraksi memiliki kemampuan penghambatan enzim α -glukosidase yang mumpuni untuk dimanfaatkan sebagai agen antidiabetes. Berdasarkan nilai IC_{50} nya, tingkat kekuatan aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dapat dikategorikan: sangat kuat jika $IC_{50} \leq 25 \mu\text{g/mL}$, kuat jika $25 \mu\text{g/mL} < IC_{50} \leq 50 \mu\text{g/mL}$, lemah jika $50 \mu\text{g/mL} < IC_{50} \leq 100 \mu\text{g/mL}$, dan sangat lemah jika $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$ (Najmah dkk., 2021). Nilai IC_{50} standar dan sampel fraksi n-heksan dan etil asetat dapat dilihat di Tabel 6. Nilai IC_{50} acarbose, fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat berturut-turut $0,087 \mu\text{g/mL}$; $380,028 \mu\text{g/mL}$; dan $283,545 \mu\text{g/mL}$. Nilai IC_{50} acarbose menunjukkan aktivitas penghambatan α -glukosidase yang tergolong sangat kuat. Sedangkan, untuk sampel fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) tergolong sangat lemah dalam menghambat kerja enzim α -glukosidase.

Fraksi etil asetat memiliki aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase yang lebih kuat dibanding fraksi n-heksan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Febrinda dkk. (2013), tingginya aktivitas penghambatan terhadap enzim α -glukosidase berkaitan erat dengan senyawa fitokimia yang dikandungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak semi polar memiliki penghambatan enzim α -glukosidase lebih kuat dibanding ekstrak polar air dan hasil tersebut sejalan dengan

hasil yang ditunjukkan secara kualitatif dan kuantitatif pada penapisan fitokimia dan pengukuran total fenolik dan flavonoid, dimana ditemukan pada ekstrak semi polar dibanding ekstrak polar terdapat kandungan total fenolik dan flavonoid yang lebih tinggi. Tingginya kandungan senyawa flavonoid dalam fraksi semi polar menyebabkan tingginya aktivitas inhibitor enzim α -glukosidase karena flavonoid merupakan senyawa dengan aktivitas paling aktif dalam menghambat enzim α -glukosidase (Febrinda dkk., 2013).

Suhendi dkk. (2022) melaporkan penelitiannya yang menguji aktivitas enzim α -glukosidase ekstrak etanol dari daun lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dengan nilai IC_{50} $22,21 \pm 0,2$ $\mu\text{g/mL}$ lebih kecil daripada IC_{50} acarbose sebagai kontrol positif yaitu sebesar $47,41 \pm 2,37$ $\mu\text{g/mL}$ yang menandakan ekstrak daun lempuyang gajah memiliki aktivitas menghambat enzim α -glukosidase yang tergolong sangat kuat bahkan lebih kuat dibanding acarbose. Suhendi dkk. (2022) juga meyakini bahwa kandungan senyawa yang berperan dalam menghambat α -glukosidase pada bagian rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yaitu zerumbon dan kaempferol lebih banyak dibanding pada bagian daunnya (Suhendi dkk., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan sangat berbeda dari yang diperoleh penelitian tersebut, sampel rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki nilai IC_{50} lebih besar atau memiliki kemampuan inhibisi lebih lemah dari acarbose dan teruji tidak aktif dalam menghambat enzim α -glukosidase.

Kemampuan inhibisi sampel yang lemah kemungkinan disebabkan oleh variasi senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak lebih banyak dibanding fraksi sehingga mempengaruhi perbedaan hasil kekuatan inhibisi antara sampel ekstrak dan fraksi. Selain itu, diduga adanya senyawa lain selain flavonoid yang berperan dalam menghambat enzim α -glukosidase sementara selama proses pengerjaan yang diantisipasi hanya kestabilan flavonoid. Pendekatan yang dilakukan masih kurang

tepat karena bisa jadi senyawa lain rusak saat proses yang melibatkan suhu misalnya ketika evaporasi menggunakan *vacuum rotary evaporator*, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut. Faktor lain penyebab sampel menunjukkan aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase yang kurang aktif diduga karena sumber rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang digunakan turut mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan metabolit pada tumbuhan termasuk diantaranya adalah faktor internal seperti gen dan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan seperti parameter pH tanah, intensitas cahaya, suhu, kelembaban dan nutrisi dari tanah (Setyo Utomo dkk., 2020). Pada sampel yang digunakan tidak dapat dipastikan lingkungan tempat hidupnya karena diperoleh dari produsen resmi bukan dipanen sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki potensi dalam menghambat enzim α -glukosidase. Nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) berturut-turut adalah 380,028 μ g/mL dan 283,545 μ g/mL. Aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) termasuk kategori sangat lemah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki potensi dalam menghambat enzim α -glukosidase.
2. Nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) berturut-turut adalah 380,028 $\mu\text{g/mL}$ dan 283,545 $\mu\text{g/mL}$ dan aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase termasuk kategori tidak aktif.

B. Saran

Sebaiknya lebih teliti dalam memastikan kestabilan senyawa yang memiliki aktivitas farmakologi yang ingin diuji, memperhatikan sumber bahan baku, serta menyesuaikan metode pengerjaan untuk memastikan kandungan senyawa tetap stabil. Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai agen antidiabetes melalui mekanisme lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, G., Al-Harrasi, A. S., & Hussain, H. (2017). α -Glucosidase Enzyme Inhibitors from Natural Products. Dalam *Discovery and Development of Antidiabetic Agents from Natural Products: Natural Product Drug Discovery* (Vol. 9, hlm. 251–269). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809450-1.00009-0>
- Al-Hafiz, S. I. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin by Imam Ibnu Katsir*. Shahih
- American Diabetes Association. (2022). Standards of Medical Care in Diabetes 2022 Abridged for Primary Care Providers. *Clinical Diabetes*, 40(1), 10–38. <https://doi.org/10.2337/cd22-as01>
- Andree Wijaya Setiawan, M., Kado Nugroho, E., & Ninan Lestario, L. (2015). Ekstraksi Betasianin dari Kulit Umbi Bit (*Beta vulgaris*) sebagai Pewarna Alami. *AGRIC Jurnal Ilmu Pertanian*, 27(1 & 2), 38–43.
- Anjaswati, D., Pratimasari, D., & Nirwana, A. P. (2021). Perbandingan Rendemen Ekstrak Etanol, Fraksi n-Heksana, Etil Asetat, dan Air Daun Bit (*Beta vulgaris* L.) Menggunakan Fraksinasi Bertingkat. *Journal of Pharmacy 2(1)*.
- Badaring, D. R., Puspitha, S., Sari, M., Nurhabiba, S., Wulan, W., Anugrah, S., & Lembang, R. (2020). Uji Ekstrak Daun Maja (*Aegle marmelos* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. *Indonesian Journal of Fundamental Sciences*, 6(1), 16–26.
- Barber, E., Houghton, M. J., & Williamson, G. (2021). Flavonoids as human intestinal α -glucosidase inhibitors. *Foods*, 10(1939). <https://doi.org/10.3390/foods10081939>
- Boy Kapitan, O., Ambarsari, L., & Falah, S. (2017). In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni (*Zingiber zerumbet*) Asal Pulau Timor. *Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering*, 2(2), 29–32. <https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2014.05.031>
- Chang, C. J., Tzeng, T. F., Liou, S. S., Chang, Y. S., & Liu, I. M. (2012). Acute and 28-day subchronic oral toxicity of an ethanol extract of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith in rodents. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/608284>
- Chisholm-Burns, M. A., Schwinghammer, T. L., Malone, P. M., Kolesar, J. M., Lee, K. C., & Bookstaver, P. B. (2019). *Pharmacotherapy Principles & Practice* (Fifth Edition). McGraw-Hill Education.
- Dipiro, J. T., Yee, G. C., Posey, L. M., Stuart T. Haines, Nolin, T. D., & Ellingrod, V. (2020). *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach* (eleventh edition). McGraw Hill.

- Early Febrinda, A., Astawan, M., Wresdiyati, T., & Dewi Yuliana, N. (2013). Kapasitas Antioksidan dan Inhibitor Alfa Glukosidase Ekstrak Umbi Bawang Dayak. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 24(2), 161–167. <https://doi.org/10.6066/jtip.2013.24.2.161>
- Fachruddin HS. (1979). *Shahih Muslim*. (Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi, Terjemahan). PT. Bulan Bintang
- Fatmawati, R., & Rohmah, J. (2022). Toxicity Test of Ethanol Extract Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbet* (L.) Roscoe Ex Sm.) on Bilirubin and Alkaline Phosphatase Levels in Mice (*Mus Musculus*). *Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology)*, 5(2), 91–97. <https://doi.org/10.21070/medicra.v5i2.1657>
- Gendokesumo, M. E., Putra, G. S., Anwari, F., Widianat, W., & Elysia, M. (2022). Studi In-silico Menghambat Enzim α -glukosidase pada Fitokimia yang Terkandung pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) sebagai Terapi Diabetes. *Akta Kimia Indonesia*, 7(1), 77–90. <https://doi.org/10.12962/j25493736.v7i1.12588>
- Gondokesumo, M. E., Kusuma, H. S. W., & Widowati, W. (2017). α - β -Glucosidase and α -Amylase Inhibitory Activities of Roselle (*Hibiscus sabdariffa* L.) Ethanol Extract. *Molecular and Cellular Biomedical Sciences*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.21705/mcbs.v1i1.3>
- Hasimun, P., & Ketut Adnyana, I. (2019). *Zingiberaceae* Family Effects on Alpha-Glucosidase Activity: Implication for Diabetes. Dalam *Bioactive Food as Dietary Interventions for Diabetes* (hlm. 387–393). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-813822-9.00026-6>
- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas 10th edition*. www.diabetesatlas.org
- Ipandi, I., Sa'adi, A., & Sudjarwo. (2019). Verifikasi Metode ELISA (*Enzym Linked Immunosorbent Assay*) Untuk Penentuan Kadar AMH (*Anti Mullerian Hormone*). *Jurnal Surya Medika*, 5(1), 201–208.
- Kamali Adli, F. (2021). Diabetes Melitus Gestasional: Diagnosis dan Faktor Risiko. *Jurnal Medika Hutama*, 3(1), 1545–1551. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Kementerian Agama RI. (2011). *TAFSIR 'ILMI Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>

- Koga, A. Y., Beltrame, F. L., & Pereira, A. V. (2016). Several aspects of *Zingiber zerumbet*: A review. *Brazilian Journal of Pharmacognosy*, 26(3), 385–391. <https://doi.org/10.1016/j.bjp.2016.01.006>
- Kusumawati, N., & Indrayudha, P. (2021). Penghambatan Enzim Alpha-Glukosidase oleh Daun Mimba (*Azadirachta indica*) dan Rimpang Temu Mangga (*Curcuma mangga*). *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 11(1), 56–64. <https://doi.org/10.22>
- Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *Prosiding Biologi Achieving the Sustainable Development Goals with Biodiversity in Confronting Climate Change*, 237–241. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Lianah, Krisantini, & Wegener, M. (2020). Evaluation and identification of the native *Zingiberaceae* species in Mijen, Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 457(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/457/1/012025>
- Maryam, S., Suhaenah, A., & Amrullah, N. F. (2020). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat Sangrai (*Persea americana* Mill.) Secara In Vitro. *As-Syifaa Jurnal Farmasi*, 12(1), 51–56.
- Muhtadi, M., Suhendi, A., & Sutrisna, E. M. (2019). The potential antidiabetic and anti-inflammatory activity of *Zingiber zerumbet* ethanolic extracts and *Channa striata* powder on albino Wistar mice. *Drug Invention Today*, 12(1), 148–153. <https://www.researchgate.net/publication/331829173>
- Muhtadi, Nur Annissa, Y., Suhendi, A., & Sutrisna, dan E. (2018). Hypoglycemic Effect of *Zingiber zerumbet* Ethanolic Extracts and *Channa striata* Powder in Alloxan Induced Diabetes Rats. *Journal of Nutraceuticals and Herbal Medicine*, 1(1).
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Prmisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 361–367.
- Murtiningsih, M. K., Pandelaki, K., & Sedli, B. P. (2021). Gaya Hidup sebagai Faktor Risiko Diabetes Melitus Tipe 2. *Journal e-CliniC*, 9(2), 328–333. <https://doi.org/10.35790/ecl.9.2.2021.32852>
- Najmah, Hasim, & Faridah, D. N. (2021). Antioxidant Activity, Inhibition α -Glucosidase of *Cymbopogon nardus* (L.) Rendle and Identification of Active Compounds. *Current Biochemistry*, 8(1), 24–36.
- Nasution, H. M. (2020). *Farmasi dalam Perspektif Islam* (R. Agustina Harahap, Ed.). CV.Manhaji.
- P, S., Zinjarde, S. S., Bhargava, S. Y., & Kumar, A. R. (2011). Potent α -Amylase Inhibitory Activity of Indian Ayurvedic Medicinal Plants. *BMC*

Complementary and Alternative Medicine, 11(5).
<https://doi.org/10.1186/1472-6882-11-5>


- Papadakis, M. A., & McPhee, S. J. (2021). *Current Medical Diagnosis and Treatment 2021* (M. W. Rabow, Ed.; 60th Anniversary). McGraw-Hill Company.
- PERKENI, Persatuan Endokrin Indonesia. (2019). *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2019*. PB PERKENI.
- Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss. *IJMS-Indonesian Journal On Medical Science*, 4(2), 232–236.
- Retnantya Pamungkas, A., & Indrayudha, P. (2019). Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol, Fraksi Etanol-Air, Etil Asetat serta N-Heksana Buah Pare (*Momordica charantia*) pada Sel MCF-7 secara In-Vitro. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 16(2), 73–82. <http://journals.ums.ac.id/index.php/pharmacon>
- Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah. (2020). Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Etanol pada Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 50,70 dan 96% *Sargassum polycystum* dari Madura. *J-PhAM Journal of Pharmaceutical Care Anwar Medika*, 2(2), 82–95.
- Riyanti, S., Agustian, N., & Syam, A. K. (2023). Potency of Honje Hutan Flowers (*Etilingera hemisphaerica* (Blume) R.M.Sm.) as Alpha-Glucosidase Inhibitor. *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology (IJPST)*, 10(1), 52–58. <http://jurnal.unpad.ac.id/ijpst/>
- Santosa, B. (2020). *Teknik ELISA: Metode ELISA untuk Pengukuran Protein Mettallothionein pada Daun Padi*. UNIMUS Press.
- Schwartz, S. S., Epstein, S., Corkey, B. E., Grant, S. F. A., Gavin, J. R., & Aguilar, R. B. (2016). The Time is Right for A New Classification System for Diabetes: Rationale and Implications of The β -Cell-Centric Classification Schema. *Diabetes Care*, 39(2), 179–186. <https://doi.org/10.2337/dc15-1585>
- Setyo Utomo, D., Betty Elok Kristiani, E., & Mahardika, A. (2020). Pengaruh Lokasi Tumbuh Terhadap Kadar Flavonoid, Fenolik, Klorofil, Karotenoid dan Aktivitas Antioksidan pada Tumbuhan Pecut Kuda (*Stachytarpheta jamaicensis*). *Bioma*, 22(2), 143–149.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an: Vol. 15 vol*. Lentera Hati.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 147–160.


- Sinaga, E., Suprihatin, & Wiryanti, I. (2011). Perbandingan Daya Sitotoksik Ekstrak Rimpang 3 Jenis Tumbuhan Zingiberaceae terhadap Sel Kanker MCF-7. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 5(3), 125–133.
- Sunarto, A. (1991). *Shahih Bukhari*. (Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Terjemahan). CV. Asy Syifa'
- Suhendi, A., Hanwar, D., Santoso, B., & Abidi1, S. R. (2022). Inhibition Activity of Indonesian *Zingiber zerumbet* Leaves Extract on α -Glucosidase Enzyme. *Prosiding 16th Urecoli Seri MIPA dan Kesehatan*, 59–65.
- Suhirman, S., Cheppy Syukur, dan, & Syukur, C. (2006). Uji Toksisitas Ekstrak Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) terhadap Larva Udang (*Artemia salina* Leach.). *Bul. Littro*, 17(1), 30–38.
- Sulasti, L., Larasati, Y., Desmiaty, Y., & Partomuan Simanjuntak. (2021). Karakteristik Senyawa Kimia Penghambat Enzim α -Glukosidase dari Fraksi Etil Asetat Daun Teh (*Camellia sinensis* (L) Kuntze). *Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Terapan*, 63–69.
- Ulfah, M. (2020). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Aseton Rimpang Kunyit (*Curcuma domestica*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Farmasi Muhammadiyah Kuningan*, 5(1), 25–31. <http://ojs.stikes-muhammadiyahku.ac.id/index.php/jfarmaku>
- Washikah. (2016). Tumbuhan *Zingiberaceae* sebagai Obat-obatan. *Serambi Saintis*, 4(1), 35–43.
- Wirastuti, M. D. G., Falah, S., & Syaefuddin. (2022). Inhibitory Activity and Kinetics of α -Glucosidase by *Toona sinensis* Stem Bark Extracts. *Current Biochemistry*, 9(1), 16–25.
- World Health Organization (2008). *Maintenance Manual for Laboratory Equipment 2nd Edition*. Panamerican Health Organization
- Yang, J., Wu, Y., Wang, H., Yang, W., Xu, Z., Liu, D., Chen, H. J., & Zhang, D. (2022). An Improved Automated High-Throughput Efficient Microplate Reader for Rapid Colorimetric Biosensing. *Biosensors*, 12(284). <https://doi.org/10.3390/bios12050284>
- Yob, N. J., Zakaria, Z. A., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., & Salleh, M. Z. (2011). *Zingiber zerumbet* (L.) Smith: A review of its ethnomedicinal, chemical, and pharmacological uses: A Review. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine*, 2011. <https://doi.org/10.1155/2011/543216>
- Yuda, I. P., Aryenti, & Juniarti. (2018). Aktivitas Inhibitor α -Glukosidase Ekstrak Daun *Toona sureni* (Bl.) Merr. sebagai Antihiperqlikemik. *Majalah Kesehatan PharmaMedika*, 10(2), 63–70.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


1. Ekstraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)




2. Fraksinasi ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

3. Uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase


a. Pengujian Blanko




b. Pengujian Blanko Kontrol




c. Pengujian Standar Acarbose




d. Pengujian Kontrol Standar



- e. Pengujian Sampel Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



- f. Pengujian Kontrol Sampel Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



Lampiran 2. Perhitungan Persen (%) Rendamen

1. Persen rendamen ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

$$\begin{aligned} \% \text{ rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{34,307 \text{ gram}}{600 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 5,72\% \end{aligned}$$

2. Persen rendamen fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

$$\begin{aligned} \% \text{ rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{3,82 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 19,1\% \end{aligned}$$

3. Persen rendamen fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

$$\begin{aligned} \% \text{ rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{2,58 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 12,9\% \end{aligned}$$

4. Persen rendamen fraksi air rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

$$\begin{aligned} \% \text{ rendamen} &= \frac{\text{Bobot ekstrak (gram)}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\% \\ &= \frac{3,97 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 19,85\% \end{aligned}$$

Lampiran 3. Perhitungan Konsentrasi Larutan Stok Sampel dan Standar

1. Pembuatan larutan standar (acarbose)

Larutan induk 1000 µg/mL dibuat menggunakan 10 mg acarbose

$$\frac{10 \text{ mg}}{V} = 1000 \text{ µg/mL}$$

$$V = 10 \text{ mL}$$

Dibuat seri konsentrasi 0,2 µg/mL, 0,4 µg/mL, 0,6 µg/mL, 0,8 µg/mL, dan 1 µg/mL dari larutan induk

a. Pembuatan larutan 0,2 µg/mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 5 \text{ mL} \times 0,2 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 0,2 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 1 \text{ µL}$$

b. Pembuatan larutan 0,4 µg/mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 5 \text{ mL} \times 0,4 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 0,4 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 2 \text{ µL}$$

c. Pembuatan larutan 0,6 µg/mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 5 \text{ mL} \times 0,6 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 0,6 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 3 \text{ µL}$$

d. Pembuatan larutan 0,8 µg/mL

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ µg/mL} = 5 \text{ mL} \times 0,8 \text{ µg/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 0,8 \text{ µg/mL}}{1000 \text{ µg/mL}}$$

$$V_1 = 4 \text{ µL}$$

- e. Pembuatan larutan 1 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 1 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 1 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 5 \mu\text{L}$$

2. Larutan stok sampel (fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Larutan induk 1000 $\mu\text{g/mL}$ menggunakan 10 mg fraksi n-heksan

$$\frac{10 \text{ mg}}{V} = 1000 \mu\text{g/mL}$$

$$V = 10 \text{ mL}$$

Dibuat seri konsentrasi 200 $\mu\text{g/mL}$, 400 $\mu\text{g/mL}$, 600 $\mu\text{g/mL}$, dan 800 $\mu\text{g/mL}$ dari larutan induk

- a. Pembuatan larutan 200 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 200 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 200 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

- b. Pembuatan larutan 400 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 400 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 400 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL}$$

- c. Pembuatan larutan 600 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 600 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 600 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 3 \text{ mL}$$

d. Pembuatan larutan 800 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 800 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 800 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 4 \text{ mL}$$

3. Larutan stok sampel (fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*L))

Larutan induk 1000 $\mu\text{g/mL}$ menggunakan 10 mg fraksi etil asetat

$$\frac{10 \text{ mg}}{V} = 1000 \mu\text{g/mL}$$

$$V = 10 \text{ mL}$$

Dibuat seri konsentrasi 200 $\mu\text{g/mL}$, 400 $\mu\text{g/mL}$, 600 $\mu\text{g/mL}$, dan 800 $\mu\text{g/mL}$ dari larutan induk

a. Pembuatan larutan 200 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 200 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 200 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

b. Pembuatan larutan 400 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 400 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 400 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL}$$

c. Pembuatan larutan 600 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 600 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 600 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 3 \text{ mL}$$

d. Pembuatan larutan 800 $\mu\text{g/mL}$

$$V_1M_1 = V_2M_2$$

$$V_1 \times 1000 \mu\text{g/mL} = 5 \text{ mL} \times 800 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 = \frac{5 \text{ mL} \times 800 \mu\text{g/mL}}{1000 \mu\text{g/mL}}$$

$$V_1 = 4 \text{ mL}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

*Lampiran 4. Data Absorbansi Standar dan Sampel***Tabel 7.** Data Absorbansi Standar dan Sampel

Nama Sampel	Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi Sampel	Absorbansi Sampel Kontrol
Acarbose	0,2	0,671	0,104
	0,4	0,628	0,138
	0,6	0,509	0,207
	0,8	0,461	0,243
	1	0,4	0,281
Fraksi n-heksan	200	0,986	0,142
	400	0,828	0,253
	600	0,768	0,344
	800	0,668	0,413
	1000	0,59	0,514
Fraksi etil asetat	200	0,883	0,134
	400	0,759	0,244
	600	0,685	0,341
	800	0,608	0,408
	1000	0,563	0,482
Blanko			1,332
			1,331
			1,337
	Rata-rata		1,333
Blanko kontrol			0,06
			0,05
			0,054
	Rata-rata		0,055

Lampiran 5. Perhitungan Persen (%) Inhibisi α -glukosidase Standar dan Sampel

Perhitungan aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase menggunakan rumus:

$$\text{Inhibisi (\%)} = \frac{(B1-B0)-(S1-S0)}{(B1-B0)} \times 100\%$$

Keterangan:

B0 = Absorban blanko kontrol

B1 = Absorban blanko

S0 = Absorban sampel kontrol

S1 = Absorban sampel

1. Persen inhibisi standar acarbose

a. 0,2 $\mu\text{g/mL}$

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,671 - 0,104)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 55,634 \%$$

b. 0,4 $\mu\text{g/mL}$

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,628 - 0,138)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 61,659 \%$$

c. 0,6 $\mu\text{g/mL}$

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,509 - 0,207)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 76,369 \%$$

d. 0,8 $\mu\text{g/mL}$

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,461 - 0,243)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 82,942 \%$$

e. 1 $\mu\text{g/mL}$

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,4 - 0,281)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 90,689 \%$$

2. Persen inhibisi sampel fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

a. 200 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,986 - 0,142)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 33,959 \%$$

b. 400 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,828 - 0,253)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 55,008 \%$$

c. 600 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,768 - 0,344)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 66,823 \%$$

d. 800 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,668 - 0,413)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 80,047 \%$$

e. 1000 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,59 - 0,514)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 94,053 \%$$

3. Persen inhibisi sampel fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

a. 200 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,883 - 0,134)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 41,393 \%$$

b. 400 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,759 - 0,244)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 59,703 \%$$

c. 600 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,685 - 0,341)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 73,083 \%$$

d. 800 µg/mL

$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,608 - 0,408)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 84,351 \%$$

e. 1000 µg/mL


$$\frac{(1,333 - 0,055) - (0,563 - 0,482)}{(1,333 - 0,055)} \times 100\% = 93,662 \%$$




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 6. Kurva Persen (%) Inhibisi Standar dan Sampel


1. Kurva standar acarbose

**Gambar 6.** Kurva konsentrasi-% inhibisi acarbose

2. Kurva sampel fraksi n-heksan

**Gambar 7.** Kurva konsentrasi-% inhibisi sampel fraksi n-heksan

3. Kurva sampel fraksi etil asetat



Gambar 8. Kurva konsentrasi -% inhibisi sampel fraksi etil asetat

Lampiran 7. Perhitungan IC_{50} Sampel dan Standar

1. Standar acarbose

$$y = 45,697x + 46,041$$

$$y = bx+a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50-46,041}{45,697}$$

$$=0,087 \mu\text{g/mL}$$

2. Sampel fraksi n-heksan

$$y = 0,0726x + 22,41$$

$$y = bx+a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50-22,41}{0,0726}$$

$$=380,028 \mu\text{g/mL}$$

3. Sampel fraksi etil asetat

$$y = 0,0646x + 31,683$$

$$y = bx+a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50-31,683}{0,0646}$$


$$=283,545 \mu\text{g/mL}$$



Lampiran 8. Gambar Penelitian

1. Ekstraksi sampel

**Gambar 9.** Simplisia dihaluskan menggunakan blender**Gambar 10.** Penimbangan serbuk simplisia**Gambar 11.** Maserasi dengan etanol 70%**Gambar 12.** Penyaringan hasil maserasi**Gambar 13.** Ekstrak dipekatkan menggunakan rotary evaporator



Gambar 14. Penimbangan ekstrak. (A) Penimbangan 1; (B) Penimbangan 2

2. Fraksinasi cair-cair ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



Gambar 15. Ekstrak didispersikan dengan air



Gambar 16. Proses menggojlok corong pisah



Gambar 17. Didiamkan hingga terpisah 2 fase



Gambar 18. Setiap fase ditampung



Gambar 19. Fraksi cair n-heksan



Gambar 20. Fraksi cair etil asetat



Gambar 21. Fraksi air dipekatkan di atas penangas



Gambar 22. Penimbangan fraksi air



Gambar 23. Penimbangan fraksi n-heksan



Gambar 24. Penimbangan fraksi etil asetat

3. Uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase




Gambar 25. Penimbangan sampel fraksi n-heksan




Gambar 26. Penimbangan sampel fraksi etil asetat



Gambar 27. Pembuatan larutan stok



Gambar 28. Pemipetan sampel ke well



Gambar 29. Well sebelum ditambahkan enzim




Gambar 30. Well setelah ditambahkan enzim

Keterangan:

- (A) Acarbose
- (B) Fraksi n-heksan
- (C) Fraksi etil asetat
- (D) blanko
- (E) Kontrol blanko
- (F) Kontrol acarbose
- (G) kontrol fraksi n- heksan
- (H) Kontrol fraksi etil asetat



Gambar 31. Proses inkubasi



Gambar 32. Proses pembacaan absorban

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dian Arista Damayanti Asis akrab disapa Dian. Lahir dan besar di Kabupaten Jeneponto. Penulis Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Abd. Asis dan Ibu Lilis Suryani. Lahir pada 28 Juli 2001 yang bertepatan pada 7 Jumadil Awal 1422 H. Penulis memulai pendidikan pada tingkat Taman Kanak-Kanak di TK BLK Romanga pada usia 5 tahun selama setahun. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDI 227 Romanga selama 6 tahun dan selesai pada tahun 2013. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN Khusus Jeneponto. Di tahun 2016, masuk Sekolah Menengah Atas yang masih satu lingkungan dengan SMPN Khusus Jeneponto yaitu SMAN Khusus Jeneponto jurusan MIPA. Namun, 2019 lulus tingkat SMA sudah dengan nama sekolah yang berbeda yaitu sebagai lulusan SMAN 9 Jeneponto. Lalu melanjutkan pendidikan di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.