

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM α -AMILASE FRAKSI
N-HEKSAN DAN FRAKSI ETIL ASETAT RIMPANG LEMPUYANG
GAJAH (*Zingiber zerumbet* L.)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MAYLINDA YUNHI ASMARANI

70100119011

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maylinda Yunhi Asmarani
NIM : 70100119011
Tempat/Tgl. Lahir : Laikang, 13 Mei 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Mutiara Indah Village Blok GG-18 RW.2, Romang Polong,
Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
Judul : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Amilase Fraksi N-
heksan dan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah
(*Zingiber zerumbet* L.)

Menyatakan dengan sebesar-besarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi merupakan hasil karya sendiri. Jika ditemukan hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Agustus 2023

Penulis,



Maylinda Yunhi Asmarani

NIM: 70100119011

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Amilase Fraksi N-heksan dan Fraksi Etilasetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)*" yang disusun oleh Maylinda Yunhi Asmarani, NIM: 70100119011, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. St. Nasriah, M.Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *swt.*, atas karunia dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, shalawat dan Taslim penulis curahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad saw, yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -amilase Fraksi N-Heksan dan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)” ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam prosesnya, penulis menyadari terdapat beberapa hambatan yang menyertai untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Namun, dengan semangat dan tekad serta dukungan berupa doa dan motivasi dari keluarga dan teman-teman sekitar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sangat berharga dan berperan penting dalam hidup penulis yakni kedua orang tua tercinta, Ayahanda Hadiyuddin, S.Sos., dan Ibunda tersayang Nuraeni, S.Pd.I, yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan serta memotivasi penulis untuk bisa bertahan dalam melewati tahapan penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih khususnya saudara penulis satu-satunya Ahmad Najib Nurhady yang selalu menghibur penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut mendukung proses penyelesaian studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yakni:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph. D. yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag. sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes.,Sp. A. sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M. Si. yang merupakan Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M. Si. sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


11. Ibu Dr. Haeria, S.Si., M. Si. yang merupakan Pembimbing Pertama penulis yang senantiasa mengarahkan, mendukung, dan memberi masukan baik selama penelitian maupun selama proses penyelesaian skripsi ini
12. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M. Si. sebagai Pembimbing Kedua yang senantiasa membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan penelitian hingga mampu Menyusun skripsi ini dengan baik dan benar
13. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si yang merupakan Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritik serta saran yang membangun dan bermanfaat sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini
14. Ibu Dr. St. Nasriah, M. Sos. I. sebagai Penguji Agama yang banyak memberikan masukan serta pengarahan bagi penulis untuk melengkapi kekurangan yang ada
15. Ibu apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Farm., M.Si dan Ibu Fitri Imani, S.Farm sebagai Pelaksana Ujian Akhir yang sangat berkontribusi dalam memudahkan penulis untuk menyelenggarakan ujian akhir dalam proses perolehan gelar sarjana
16. Bapak dan Ibu dosen yang telah berperan besar dalam mengarahkan penulis dalam memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi tulus dan Ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah *swt.* membalas jasa-jasa beliau, serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis
17. Kepada Laboran Laboratorium Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboran Laboratorium Penelitian dan Pengujian Fakultas Farmasi UMI yang turut membantu dan memberi masukan khususnya terkait penelitian laboratorium

18. Teman-teman penelitian “Zingiber zerumbet Team”, Arfani Fathiyah, Rosfiani Nursakinah Rosman, Andi Reski Andini dan Dian Arista Damayanti Asis, terima kasih atas kerja sama yang baik selama penelitian dan penyusunan tugas akhir
19. Kepada sahabat seperjuangan perkuliahan Andi Besse Kalsum yang telah menjadi saksi perjuangan dalam aktivitas akademik sejak 2019 hingga penyusunan skripsi dengan setia memberi motivasi dan dukungan kepada penulis
20. Kepada teman-teman, sahabat seperjuangan di Jurusan Farmasi 2019 Interferon yang tiada hentinya menyemangati penulis serta teman-teman yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas segala doa yang telah diberikan, semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
21. Kepada pemilik NRP 02010898 yang telah berkontribusi sejak awal perkuliahan hingga penulisan skripsi, terima kasih telah meluangkan baik waktu, tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis, mendorong dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis sehingga penulis untuk menyelesaikan kuliah S1 Farmasi.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah *swt.*

Gowa, 16 Agustus 2023

Penulis,



Maylinda Yunhi Asmarani

NIM: 70100119011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ASBTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kerangka Konsep.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Uraian Sampel.....	8
B. Diabetes Mellitus	11
C. Enzim	17
D. Enzim α -amilase	21
E. Acarbose	24
F. Ekstraksi	25

G. Fraksinasi	28
H. Microplate Reader.....	30
I. Tinjauan Islam	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sampel	35
D. Alat dan Bahan.....	36
E. Prosedur Kerja	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	61
RIWAYAT HIDUP PENULIS	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah	44
Tabel 2. Hasil Perhitungan Fraksi Esktrak Rimpang Lempuyang Gajah	44
Tabel 3. Hasil Persen Inhibisi Kontrol Positif Acarbose	44
Tabel 4. Hasil Persen Inhibisi Fraksi N-heksan, Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah dan Kontrol Positif Acarbose	44
Tabel 5. Hasil Perhitungan Nilai IC ₅₀ Fraksi N-heksan dan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah	45
Tabel 6. Data Absorbansi Blanko dan Kontrol Blanko.....	45
Tabel 7. Data Absorbansi Acarbose.....	69
Tabel 8. Data Absorbansi Kontrol Acarbose	69
Tabel 9. Data Absorbansi Fraksi N-heksan.....	69
Tabel 10. Data Absorbansi Kontrol Sampel Fraksi N-heksan	70
Tabel 11. Data Absorbansi Fraksi Etil Asetat	70
Tabel 12. Data Absorbansi Kontrol Sampel Fraksi Etil Asetat	70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah.....	9
Gambar 2. Model <i>Lock and Key</i>	18
Gambar 3. Model <i>Induced Fit</i>	19
Gambar 4. Struktur Enzim α -Amilase	22
Gambar 5. Hidrolisis Pati oleh Enzim α -Amilase	23
Gambar 6. Tahapan Reaksi Reduksi Asam 3,5-dinitrosalisilat	23
Gambar 7. Struktur Kimia Acarbose.....	25
Gambar 8. <i>Microplate Reader</i>	31
Gambar 9. Kurva Fraksi N-heksan.....	74
Gambar 10. Kurva Fraksi Etil Asetat.....	74
Gambar 11. Kurva Kontrol Positif Acarbose.....	75
Gambar 12. Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah	77
Gambar 13. Penimbangan dan Blender Sampel.....	77
Gambar 14. Ekstraksi dengan Metode Maserasi.....	77
Gambar 15. Penyaringan Hasil Maserasi.....	78
Gambar 16. Penggunaan <i>Vacum Rotary Evaporator</i>	78
Gambar 17. Ekstrak Kental Etanol 70%	78
Gambar 18. Proses Pelarutan Ekstrak Kental ke Aquades.....	79
Gambar 19. Proses Fraksinasi Aquades dan N-hkesan.....	79
Gambar 20. Proses Fraksinasi Aquades dan Etil Asetat	79
Gambar 21. Ekstrak Pekat N-heksan	80
Gambar 22. Ekstrak Pekat Etil Asetat	80
Gambar 23. Pembuatan Larutan Pengujian Aktivitas Enzim α -Amilase	81
Gambar 24. Pengujian Aktivitas Enzim α -Amilae	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	61
Lampiran 2. Perhitungan Rendemen Ekstraksi dan Fraksinasi.....	68
Lampiran 3. Data Absorbansi	69
Lampiran 4. Perhitungan % Inhibisi dan Nilai IC ₅₀	70
Lampiran 5. Gambar Penelitian	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : MAYLINDA YUNHI ASMARANI
NIM : 70100119011
Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM α -AMILASE
FRAKSI N-HEKSAN DAN FRAKSI ETIL ASETAT RIMPANG
LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet* L.)

Penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang diderita oleh masyarakat modern. Hal ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disebabkan oleh kelainan pankreas yang gagal memproduksi insulin. Tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) ialah tanaman obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat tradisional. Daun, rimpang, biji dan bunganya memiliki banyak kegunaan, terutama rimpang lempuyang gajah mengandung berbagai jenis metabolit sekunder yang berpotensi sebagai antidiabetes yang bekerja dengan cara menghambat enzim α -amilase sehingga menurunkan kadar gula darah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi metabolit sekunder fraksi n-heksan dan etil asetat pada rimpang lempuyang gajah yang berpotensi menghambat enzim α -amilase sehingga dapat dijadikan landasan awal dalam pembuatan obat baru yang berfokus pada pengobatan penyakit diabetes mellitus.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fraksinasi n-heksan dan etil asetat menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Pengujian aktivitas α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat dengan metode DNSA dan diukur absorbansi dengan *microplate reader*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat memiliki kemampuan dalam menghambat α -amilase dengan hasil nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat berturut-turut, yaitu 128,035 μ g/mL dan 122,276 μ g/mL, sedangkan nilai IC_{50} kontrol positif acarbose yaitu 45,168 μ g/mL.

Kata Kunci: *Fraksi N-heksan, Fraksi Etil Asetat, α -Amilase, IC_{50} , Diabetes Mellitus*

ABSTARCT

Name : MAYLINDA YUNHI ASMARANI
NIM : 70100119011
Title : TEST AMYLASE INHIBITION ACTIVITY OF FRACTION N-HEKSAN AND FRACTION ETIL ASETAT FROM LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (*Zingiber zerumbet* L.)

Diabetes mellitus is a chronic disease suffered by modern society. It is characterized by high blood sugar levels caused by pancreatic abnormalities that fail to produce insulin. *Zingiber zerumbet* L. is a medicinal plant used by the people of Indonesia as a traditional medicine ingredient. Its leaves, rhizomes, seeds, and flowers have many uses, especially *Zingiber zerumbet* rhizomes contain various types of secondary metabolites that have the potential as antidiabetics that work by inhibiting the enzyme α -amylase thereby lowering blood sugar levels.

This study aims to determine and identify secondary metabolites of n-hexane and ethyl acetate fractions in *Zingiber zerumbet* rhizomes that have the potential to inhibit the enzyme α -amylase so that it can be used as an initial foundation in the manufacture of new drugs that focus on the treatment of diabetes mellitus.

The method used in this study is a fractionation of n-hexane and ethyl acetate using a liquid-liquid extraction method. Activity testing of α -amylase n-hexane fraction and ethyl acetate fraction by DNSA method and measured absorbance with a microplate reader.

The result from this study shows that the n-hexane fraction and ethyl acetate fraction can inhibit α -amylase with IC50 value results in n-hexane fraction and ethyl acetate fraction respectively, namely 128.035 $\mu\text{g/mL}$ and 122.276 $\mu\text{g/mL}$, while IC50 values positive control of acarbose was 45.168 $\mu\text{g/mL}$.

Keywords: *N-hexan fraction, ethyl acetate fraction, α -amylase, IC50, Diabetes Mellitus*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kelainan pankreas yang gagal menghasilkan insulin yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah (hiperglikemia) didalam tubuh sehingga menyebabkan penurunan reseptor insulin (Purwati, 2022). Seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes mellitus apabila kadar glukosa darah melebihi batas normal yakni kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL dan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL. Penyakit diabetes mellitus ini seringkali tidak disadari oleh penderitanya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi oleh karena itu penyakit ini biasa dikenal dengan sebutan *silent killer* (Hestiana, 2017).

Menurut Internasional Diabetes Federation (IDF) pada Tahun 2019 diperkirakan seseorang yang berusia 20-79 tahun di dunia menderita diabetes mellitus yang jumlahnya sekitar 463 orang. Pada tahun 2019, sebesar 9,3% angka prevalensi dari total penduduk dengan usia yang sama sedangkan pada Tahun 2021 telah diprediksi bahwa orang yang berusia 20-79 tahun akan meninggal disebabkan penyakit diabetes mellitus dengan perkiraan lebih dari 6,7 juta orang dan setiap tahunnya penyakit diabetes meningkat dikalangan anak-anak dan remaja yaitu usia hingga 19 Tahun (IDF,2021). Kekurangan insulin akan menyebabkan tingginya kadar glukosa darah (hiperglikemia) sehingga mampu mengakibatkan terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin ialah suatu kondisi yang berkaitan dengan kegagalan organ target dalam kondisi normal merespon aktivitas hormon insulin (Muhammad, 2018)

Penderita DM akan mengalami mengalami penurunan berat badan dan terlihat kurus. Namun, jika hal ini berlangsung lama akan menyebabkan masalah mikro dan makrovaskuler (Fatimah, 2015). Selain itu, juga dijumpai dengan ciri-ciri penurunan pola Gerakan tubuh, kesemutan di tangan atau kaki, penglihatan kabur dan pada umumnya sering merasakan gatal-gatal (Purwati, 2022).

Salah satu penanganan diabetes mellitus adalah dengan cara menurunkan kadar glukosa post-prandial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperlambat penyerapan glukosa melalui penghambatan enzim penghidrolisis karbohidrat yaitu α -glukosida dan α -amilase. Enzim ini berada di usus halus yang bertanggungjawab atas pemecahan disakarida dan oligosakarida menjadi monosakarida yang sesuai untuk penyerapan (de Sales et al., 2012). Selain itu dalam literatur lain, salah satu pengobatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus ialah dengan melibatkan enzim pencernaan yang bekerja dengan cara menghambat penyerapan glukosa ke dalam tubuh. Salah satu enzim yang berperan ialah enzim α -amilase (Ariandi, 2016).

Enzim α -amilase merupakan enzim kunci yang mendegradasi karbohidrat menjadi gula. Enzim Ini menghidrolisis ikatan α -1-4 glikosidik pada polisakarida (pati) menghasilkan unit gula yang lebih kecil seperti disakarida dan glukosa. (Watcharachaisoponsiri et al., 2016). Enzim α -amilase ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan saliva (Dinnar Latiefah, 2022). Pencernaan pati dimulai di rongga mulut oleh α -amilase saliva dan dilanjutkan ke usus kecil oleh α -amilase pankreas. Produk reaksi, unit glukosa, diserap ke dalam dinding usus. Glukosa kemudian disalurkan oleh darah ke sel yang ditargetkan di seluruh tubuh. Dengan demikian, penghambatan α -amilase penting untuk menunda degradasi karbohidrat dan penyerapan glukosa (Watcharachaisoponsiri et al., 2016).

Telah dilakukan berbagai cara dengan adanya agen antidiabetik yang tersedia, namun terapi modern tersebut menimbulkan berbagai efek samping jika digunakan. Oleh karena itu, terdapat tanaman obat tradisional sebagai salah satu alternatif pengobatan yang dapat digunakan jika obat modern menimbulkan berbagai efek samping. Salah satu tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengobati penyakit diabetes mellitus adalah Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Hasil skiring fitokimia yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2022) dan (Rahayu et al., 2019) mengungkapkan bahwa berbagai senyawa kimia yang bermanfaat yang terkandung dalam ekstrak *Zingiber zerumbet* (L.) seperti saponin, steroid, alkaloid, flavonoid, fenolik, tannin dan triterpenoid. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tzeng et al., 2013) mengungkapkan bahwa melaporkan bahwa ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) telah terbukti mampu mengurangi kadar glukosa darah pada tikus yang menderita diabetes yang diinduksi streptozotisin.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai obat antidiabetes. Meskipun demikian, penelitian yang akan dilakukan akan lebih difokuskan untuk menggali lebih dalam kemampuan obat ini dalam mengatasi diabetes yakni lebih fokus kepada inhibitor enzim α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah karena sebelumnya belum ada publikasi inhibitor enzim α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat menggunakan rimpang lempuyang gajah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim α -amilase?

2. Berapa nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang dapat menghambat aktivitas enzim α -amilase?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini beberapa istilah digunakan untuk menghindari kekeliruan penafsiran oleh pembaca terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul. Oleh karena itu, penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

- a. Fraksinasi adalah metode pemisahan ekstrak yang telah melalui proses maserasi dan telah diuapkan untuk menghasilkan ekstrak kental. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai pelarut dengan tingkat kepolaran yang berbeda, sehingga setiap pelarut mengandung senyawa-senyawa dengan tingkat kepolaran yang bervariasi.
- b. Enzim merupakan katalisator yang mampu mempercepat kecepatan reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut
- c. α -amilase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis dari alpha-1,4-glikosidik polisakarida untuk menghasilkan oligosakarida, D-glukosa, dekstrin, dan maltosa.
- d. N-heksan adalah jenis pelarut non-polar yang dirancang khusus untuk mengekstraksi minyak atau digunakan pada laboratorium.
- e. Etil asetat adalah pelarut yang cukup polar yang memiliki keuntungan sebagai senyawa yang mudah menguap, relative aman digunakan dan tidak menyerap kelembaban. Biasanya, etil asetat diproduksi melalui reaksi esterifikasi antara etanol dan asam asetat.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas penghambatan enzim α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Dalam kajian Pustaka, beberapa penelitian sebelumnya dibahas sebagai pemanding untuk memperjelas arah penelitian serta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian tersebut. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang sudah ada sebelumnya mengenai judul yang diangkat.

1. Penelitian (Lal et al., 2010) dengan judul “ *Insignificant antidiabetic Activity of rhizome of Zingiber zerumbet* “. Pengujian ini membahas tentang efek antidiabetes ekstrak zingiber zerumbet pada tikus diabetes yang di induksi streptozotosin (STZ) dengan menggunakan pembanding glibenklamid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak zingiber zerumbet mampu menurunkan kadar gula darah tikus yang di induksi Streptozotosin namun tidak signifikan glibenklamid. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak dari *Zingiber zerumbet* tidak dapat mencegah penurunan berat badan pada tikus hiperglikemik seperti yang diamati pada tikus hiperglikemik yang diobati dengan glibenklamide.
2. Penelitian (Ramadhani, 2018) dengan judul “ *Uji Aktivitas Penghambatan α -amilase Secara In-vitro Ekstrak Akar Durian (Durio zibethinus)* “. Pengujian ini membahas tentang aktivitas penghambatan α -amilase ekstrak akar durian dengan menggunakan metode DNSA. Dengan hasil yang diperoleh adalah ketiga fraksi ekstrak akar durian (*Durio zibethinus*) memiliki kemampuan menghambat enzim α -amilase, fraksi ekstrak etil

asetat memiliki nilai penghambatan paling baik dengan nilai IC_{50} 10,46 bpj. sehingga dapat disimpulkan bahwa fraksi ekstrak etil asetat terdapat senyawa yang mampu menghambat aktivitas dari enzim α -amilase.

3. Penelitian (Fatmawati et al., 2011) dengan judul “ *Ekstrak Etanol Daun Salam dan Fraksinya sebagai Inhibitor Alfa-Amilase* “ membahas tentang pengujian ekstrak etanol daun salam dan fraksinasi teraktif untuk inhibitor α -amilase dengan menggunakan metode DNSA, metode kromogenik yang dikembangkan Bernfeld pada tahun 1955. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh fraksi teraktif untuk inhibitor α -amilase serta mengidentifikasi golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun salam dengan konsentrasi 0.1% (b/v) menghambat aktivitas α -amilase sebesar 13.52% dan fraksi n-heksan, etil asetat dan air berturut-turut sebesar 8.59, 2.30, dan 1.32% (b/b serbuk kering).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin menguji dan mengetahui apakah fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat memiliki aktivitas sebagai penghambatan enzim α -amilase pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.).

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dari fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap aktivitas inhibitor enzim α -amilase.
2. Untuk mengetahui nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang dapat menghambat aktivitas enzim α -amilase.

F. Manfaat Penelitian


1. Untuk Pendidikan

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi pedoman atau referensi dalam melakukan penelitian mengenai penghambatan enzim α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

2. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan, wawasan, pengembangan kemampuan ilmiah khususnya yang berkaitan dengan penghambatan α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

G. Kerangka Konsep



Pati akan terhidrolisis menjadi oligosakarida oleh enzim α -amilase di saliva dan pankreas, oligosakarida tersebut di hidrolisis lebih lanjut menjadi glukosa. Glukosa yang terbentuk akan menumpuk di peredaran darah, kurangnya produksi insulin atau tidak responsifnya sel-sel terhadap reseptor insulin akan menyebabkan hiperglikemia.

Untuk mencegah peningkatan glukosa di dalam darah diperlukan inhibitor enzim α -amilase yang dapat ditemukan dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) sehingga pati tidak terhidrolisis menjadi glukosa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Zingiber adalah satu-satunya genus dalam suku Zingibereae yang memiliki sejumlah spesies. Lempuyang (*Zingiber* spp.) merupakan salah satu spesies dalam genus *Zingiber* yang telah lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional terutama sebagai bahan dalam ramuan jamu (Silalahi, 2018).

Secara umum lempuyang dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), lempuyang emprit/pahit (*Zingiber americans*), dan lempuyang wangi (*Zingiber aromaticum*) (Husin & Widjaja, 1987). Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)) merupakan varietas lempuyang yang lebih sering dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional dibandingkan dengan varietas lempuyang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih difokuskan pada lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)) (Rohmah et al., 2022).

1. Klasifikasi

Divisi : Spermatophyte

Sub divisio : Angiospermae

Class : Monocotyledonae

Ordo : Zingiberales

Famili : Zingiberaceae

Genus : *Zingiber*

Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex.Sm.

(Lianah, 2019)



Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria et al., 2011)

2. Deskripsi dan Morfologi

Zingiber zerumbet merupakan tumbuhan yang tumbuh di iklim tropis dengan kondisi lembab. Ciri khas dari tanaman ini adalah bunganya yang berwarna hijau dan lama kelamaan akan berubah menjadi warna kuning pucat hingga merah (Doloking et al., 2022). Bagian-bagian dari tumbuhan lempuyang gajah yaitu batang, daun, bunga, dan rimpang.

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) adalah tanaman terna tahunan yang tumbuh dalam bentuk berumpun. Tanaman ini memiliki batang semu yang dapat mencapai tinggi maksimal 1-2 meter. Batangnya tegak, miring dan berbentuk bulat dan ditumbuhi oleh pelapah daun yang halus berwarna hijau (Nik Norulaini et al., 2009). Daun lempuyang gajah bersifat Tunggal dan tersusun secara berseling di sepanjang batang pada bagian kanan dan kiri. Daunnya memiliki ujung dan pangkal yang meruncing dengan Panjang mencapai 25-40 cm dan lebar 10-15 cm. setiap batang memiliki 3-7 helai daun. Daunnya berwarna hijau pucat hingga gelap. Tangkai daun memiliki Panjang sekitar 6 mm, sementara ligula sangat tipis, utuh dan lebarnya berkisar antara 1,5-2,5 cm. struktur anatomi daun ini berguna untuk membedakan berbagai jenis *Zingiber*. *Zingiber zerumbet* dapat diidentifikasi melalui keberadaan pulvinus yang terletak di antara dasar tangkai daun (petiole)

dan lidah daun (ligula) (Husin & Widjaja, 1987). Bunganya muncul dari ketiak daun yang berlendir dan tekstur lebih cair. Bunga lempuyang gajah muncul dari rimpang, bentuknya *pinecone*. Tangkai bunga panjangnya ± 12 cm, warna bunganya hijau saat muda dan menjadi merah saat tua (Doloking et al., 2022). Bagian terpenting dari *Zingiber zerumbet* adalah rimpangnya. Rimpang lempuyang gajah memiliki diameter 4 cm. Untuk rimpang lempuyang gajah berukuran cukup besar, tebal, bersisik serta bercabang. Daging rimpang lempuyang gajah berwarna kuning kecoklatan. Aroma rimpangnya harum dan rasa pahit dengan rasa sedikit pedas (Lianah, 2019).

3. Kandungan

Pada penelitian yang ditulis oleh (Rohmah et al., 2022) dengan judul " *Antibacterial Activity of Rhizome Extracts of Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Against Streptococcus pneumoniae* " mengungkapkan bahwa *Zingiber zerumbet* (L.) mengandung berbagai senyawa kimia yang bermanfaat termasuk saponin, tannin, alkaloid, steroid, flavonoid, triterpenoid dan fenolik yang ditunjukkan dari hasil skrining fitokimia.

4. Manfaat

Bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpang. Rimpang ini memiliki berbagai khasiat, seperti mengobati pilek, sakit perut, syaraf lemah, sesak nafas, obat penambah nafsu makan dan penambah darah (Wahyuni et al., 2013).

Dalam penelitian lain, ditemukan bahwa rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki manfaat sebagai karminativa (pengurang gas dalam perut), stomakik (penguat pencernaan) dan stimulant. Rimpang lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai obat luar, peningkat nafsu makan dan antikejang. (Rejeki & Priyandari, 2017). Terutama rimpang ini telah digunakan dalam berbagai

aplikasi farmakologi termasuk sebagai analgesik (pengurang rasa sakit), antipiretik (penurun demam), antibakteri (penghambat pertumbuhan bakteri), antiinflamasi (pengurang peradangan), antioksidan (pelawan radikal bebas), antiulkus (pengurang luka lambung), antiplatelet (penghambat penggumpalan darah), antikanker (penghambat pertumbuhan sel kanker), antihiperlikemik, karminatif dan diuretik (Chaudhuri et al., 2018).

B. Diabetes Mellitus

1. Definisi Diabetes mellitus

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kegagalan pankreas dalam memproduksi insulin atau ketidakmampuan sel tubuh dalam merespons insulin dengan baik (Purwati, 2022). Seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes mellitus apabila kadar glukosa darah melebihi batas normal yakni kadar glukosa darah sewaktu ≥ 200 mg/dL dan kadar glukosa darah puasa ≥ 126 mg/dL. (Hestiana, 2017).

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan masalah pada system kardiovaskular yang merupakan kondisi serius yang mampu memicu peningkatan risiko serangan jantung dan hipertensi jika tidak segera ditangani dengan tepat (Lestari et al., 2021). Selain itu, stroke merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi dan mematikan. Ini terjadi karena peningkatan terus-menerus dalam kadar glukosa yang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf, pembuluh darah dan struktur internal lainnya. Penebalan pembuluh darah disebabkan oleh zat kompleks yang terdiri dari gula di dalam dinding pembuluh darah. Sebagai akibat dari penebalan tersebut, aliran darah terutama yang menuju ke kulit dan saraf akan berkurang (Pangaribuan, 2016).

2. Tipe-tipe Diabetes Mellitus

Saat ini, keterbatasan pengetahuan dan sumber daya di sebagian besar negara di dunia membuatnya tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem klasifikasi diabetes yang ideal berdasarkan perawatan klinis, patologi dan epidemiologi. Pengelompokan berdasarkan perawatan klinis dan kebutuhan pemberian insulin terutama saat diagnosis telah diusulkan oleh beberapa ahli (Hardianto, 2021). Secara garis besar, diabetes mellitus dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

a. Diabetes Mellitus Tipe 1

Diabetes melitus tipe 1 yang juga dikenal sebagai Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), terjadi ketika produksi insulin oleh sel-sel dalam tubuh tidak berfungsi menghasilkan jumlah insulin yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Tubuh tidak dapat memproduksi insulin sehingga glukosa tidak dapat memasuki sel-sel. Oleh karena itu, penting untuk mengatur insulin eksogen untuk mengembangkan katabolisme lebih lanjut, mencegah ketosis, dan mengurangi hiperglukagonemia dan meningkatkan kadar glukosa darah. Meskipun sebagian besar pasien berusia di bawah 30 tahun, permulaan dapat terjadi pada tahap kehidupan apapun. Diabetes tipe 1 ditemukan di setiap kelompok etnis, namun frekuensinya paling tinggi terjadi pada orang-orang dari Sardinia dan Eropa utara. Kerentanan muncul melibatkan hubungan genetik multifaktorial, namun hanya 10-15% pasien memiliki riwayat keluarga yang positif. (G. Katzung et al., 2012).

Secara patofisiologi, perjalanan penyakit diabetes mellitus lambat dan memerlukan waktu bertahun-tahun. Penderita diabetes mellitus tipe 1 yang tidak terkontrol mengalami penurunan berat badan. Polyuria dan polydipsia merupakan gejala yang menyertai diabetes mellitus tipe 1. Jika volume urin melebihi batas normal, hal ini akan menyebabkan diuresis osmotik (peningkatan glukosa sehingga

terjadi hiperglikemik) serta di didalam urin terdapat adanya badan-badan keton. Dehidrasi dan kelaparan akan dialami oleh individu yang mengalami diuresis osmotik. Rasa lapar dan haus merupakan hasil dari kekurangan cairan dan ketidakmampuan tubuh dalam menggunakan nutrisi secara efektif (Soelistijo, 2021).

b. Diabetes Mellitus Tipe 2

Diabetes melitus tipe 2 disebut juga sebagai Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) terjadi karena kombinasi resistensi insulin yang tidak dapat diproduksi dan terhambatnya reseptor insulin di lapisan sel. Pada tahap awal, kelainan mendasar adalah penurunan resistensi insulin, yang ditandai dengan peningkatan kadar insulin dalam darah. Diabetes mellitus tipe 2 umumnya bersifat keturunan. Terdapat prediksi bahwa 10-20% orang yang awalnya didiagnosa mengidap diabetes tipe 2 ternyata mengalami diabetes tipe 1 dan tipe 2 atau hanya tipe 1 yang berkembang menjadi diabetes autoimun laten orang dewasa dan pada akhirnya memerlukan penggantian insulin penuh (G. Katzung et al., 2012).

Secara patofisiologi, diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya jaringan tepi dalam tubuh akibat insulin yang disebut dengan obstruksi insulin dan berkurangnya sel β -pankreas dalam mengeluarkan insulin karena beban glukosa. Kedua factor ini akan menimbulkan resistensi insulin yang akan menyebabkan peningkatan produksi glukosa disertai dengan penurunan penggunaan glukosa sehingga menyebabkan hiperglikemia. Dari peristiwa ini, sel β -pankreas menyesuaikan sehingga respons pelepasan insulin akan berkurang dan akhirnya menyebabkan kekurangan insulin. Setelah terjadi penurunan kadar insulin plasma, hal ini akan diiringi dengan peningkatan kadar glukosa plasma dibandingkan dengan biasanya (Soelistijo, 2021).

c. Diabetes Mellitus Tipe Gestasional

Diabetes mellitus gestasional adalah diabetes yang muncul selama kehamilan, biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga dikarenakan zat-zat yang diproduksi yang dikirim oleh plasenta menekan produksi insulin.

Diabetes mellitus gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada masa kehamilan. Biasanya terjadi pada trimester kedua dan ketiga saat kehamilan disebabkan hormon yang disekresi plasenta menghambat kerja insulin. Antara 30-40% penderita diabetes gestasional mengalami perkembangan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Kejadian diabetes mellitus gestasional ini terjadi sekitar 7% kehamilan dan meningkatkan risiko kematian pada ibu serta janin (Hardianto, 2021).

d. Diabetes Mellitus Tipe Lainnya

Faktor genetik, disfungsi insulin dan masalah pankreas eksokrin adalah penyebab diabetes tipe ini. Selain itu, penyebabnya dapat berasal dari penggunaan obat tertentu atau paparan zat kimia seperti setelah menjalani transplantasi organ atau pengobatan HIV/AIDS (Rahmasari & Wahyuni, 2019).

3. Penggolongan Obat DM

Berikut adalah penggolongan obat yang dapat digunakan sebagai pengobatan diabetes mellitus (DEPKES RI, 2005) :

a. Golongan Sulfonilurea

Penderita diabetes dewasa yang baru didiagnosis dengan berat badan normal atau kurang, dan belum pernah mengalami ketoasidosis, biasanya diberikan obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea sebagai pilihan utama. Pada penderita gangguan ginjal, tiroid dan gangguan hati sebaiknya tidak diberikan obat golongan sulfonilurea. Obat-obat ini hanya bekerja jika sel-sel β Langerhans pankreas masih dapat menghasilkan insulin, karena obat ini bekerja dengan merangsang sekresi

insulin di kelenjar pankreas. Perangsangan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas menyebabkan penurunan kadar glukosa darah setelah pemberian senyawa-senyawa sulfonilurea. Senyawa-senyawa obat ini dapat meningkatkan produksi insulin bahkan ketika glukosa (atau dalam keadaan hiperglikemia) tidak dapat merangsang sekresi insulin, stimulasi yang mereka hasilkan berbeda dengan respons terhadap glukosa. Oleh karena itu, obat sulfonilurea sangat membantu penderita diabetes yang pankreasnya masih mampu menghasilkan insulin, tetapi sekresinya terhambat oleh suatu faktor. Contoh obat golongan sulfonilurea yaitu glibenklamid, glimepiride, dan glikuidon.

b. Golongan Meglitinida

Golongan glinida ini salah satu obat hipoglikemik oral yang memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan sulfonilurea. Golongan obat glinida dan sulfonilurea ini memiliki mekanisme meningkatkan produksi dan pelepasan insulin oleh kelenjar pankreas. Obat hipoglikemik golongan meglitinida dan turunan fenilalanin ini biasanya digunakan bersama dengan obat antidiabetic oral lainnya. Contoh obat golongan meglitinide yaitu repaglinide dan nateglinida.

c. Golongan Biguanida

Obat golongan biguanid adalah salah satu obat antidiabetes yang bekerja dengan cara mengurangi produksi glukosa oleh hati dan meningkatkan jumlah glukosa yang di serap oleh jaringan perifer, termasuk otot rangka. Metformin adalah obat hipoglikemik utama yang direkomendasikan untuk anak-anak dan remaja yang menderita diabetes tipe 2, terutama pada pasien yang mengalami obesitas. Namun, obat ini sebaiknya dihindari oleh pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Obat ini dapat menyebabkan terjadinya asidosis jika penggunaannya pada penderita yang lanjut usia.

d. Golongan Tiazolidindion

Golongan obat tiazolidindion memiliki mekanisme kerja dengan cara meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin yang berikatan dengan PPAR γ (peroxisome proliferator activated receptor-gamma) di hati, otot, dan jaringan lemak. Hal ini membantu mengurangi resistensi insulin. Risiko komplikasi mikrovaskular dapat berkurang sebesar 2,6% oleh obat ini. Peningkatan risiko kematian akibat penyakit edema, gagal jantung, kardiovaskular, kanker dan patah tulang telah mengurangi penggunaan obat ini dalam beberapa tahun terakhir. Obat ini juga mampu menurunkan kecepatan glikoneogenesis. Contoh obat golongan tiazolidindion yaitu pioglitazone.

e. Golongan inhibitor α -glukosida

Enzim alfa glukosidase yang terdapat pada dinding usus halus di hambat oleh golongan obat ini. Untuk menghidrolisis oligosakarida pada dinding usus halus di butuhkan enzim-enzim α -glukosidase seperti isomaltase, maltase, sukrase dan glukomaltase. Dengan menghambat kerja enzim secara efektif, pencernaan karbohidrat kompleks dan penyerapannya dapat berkurang. Hal ini membantu mengurangi peningkatan kadar glukosa setelah makan pada penderita diabetes. Enzim α -amilase pankreas yang bertanggung jawab menghidrolisis polisakarida di dalam lumen usus halus juga di hambat oleh senyawa inhibitor α -glukosidase. Contoh obat golongan inhibitor α -glukosida yaitu miglitol dan acarbose.

f. Golongan Penghambat Enzim Dipeptidil Peptidase-4

Dipeptidil Peptidase-4 adalah mendistribusikan secara luas dalam tubuh dari suatu serin protease. Enzim ini membagi dua asam amino peptida yang mengandung prolin dan alanin di posisi N-terminalnya. Enzim DPP-4 terekspresi dalam bentuk dalam plasma, hepatosit, endothelium vaskuler kapiler villi, dan membrane brush border ginjal. Penghambat DPP-4 mencegah inaktivasi glukagon-

like peptide (GLP-1) dengan menghentikan lokasi pengikatan pada DPP-4. Akibatnya, kadar GLP-1 dan glukosa dependent insulin polipeptide tetap aktif di sirkulasi darah yang berarti toleransi glukosa lebih baik, respons insulin yang lebih baik, dan sekresi glukagon yang lebih rendah. Contoh obat golongan DPP-4 yaitu linagliptin, alogliptin, vildagliptin, sitagliptin dan saxagliptin.

g. Golongan Penghambat Enzim Sodium Glucose co-Transporter 2

Cara kerja obat ini melibatkan penghambatan reabsorpsi glukosa di tubulus proksimal dan peningkatan pengeluaran glukosa oleh urin. Menurunkan tekanan darah dan berat badan merupakan manfaat dari golongan obat ini. Pemberian obat ini dapat menyebabkan efek samping berupa genital dan infeksi saluran kemih. Pasien diabetes mellitus yang mengalami gangguan fungsi ginjal harus mengatur dosis obat dan penggunaan obat ini tidak disarankan jika laju filtrasi glomerulus kurang dari 45 ml/menit. Perlu berhati-hati karena obat ini juga berpotensi menyebabkan ketoasidosis.

C. Enzim

1. Definisi Enzim

Perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologi yang diatur dan dijalankan oleh sekelompok protein disebut enzim. Jaringan tubuh membuat enzim untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, seperti halnya protein lainnya. Proses-proses kimia yang mendukung kehidupan dan mempercepat reaksi kimia membutuhkan enzim dengan tingkat katalitik yang sangat tinggi, spesifisitas dan afinitas. Semua sifat-sifat enzim ini menjadi fokus utama dalam pengembangan obat-obatan untuk mengobati berbagai penyakit. Satu atau lebih enzim dapat disintesis oleh lebih dari satu jaringan atau organ dalam tubuh (Purwani, 2018). Organ-organ pada hewan dan tanaman menghasilkan enzim yang bertindak katalitik dalam berbagai reaksi, termasuk hidrolisis, reduksi, oksidasi, transfer,

isomerisasi, radikal, pemutusan rantai karbon dan adisi (Supriyatna et al., 2015). Enzim bertindak sebagai katalisator yang merupakan sebuah senyawa yang dapat mempercepat reaksi 108 hingga 1011 kali lebih cepat daripada reaksi tanpa katalis. Efisiensi kerja enzim menghasilkan inovasi baru yang menguntungkan dari sumber daya alam (Putra et al., 2021).

2. Sifat-sifat Enzim

a. Spesifisitas reaksi substrat dan enzim


Enzim bekerja dengan bersifat spesifik. Spesifisitas ini tidak hanya berlaku untuk tipe reaksi yang dikatalisis tetapi juga mencakup sifat substrat (reaktan) yang terlibat.

b. Pembentukan kompleks enzim-substrat.

Pembentukan kompleks enzim-substrat dimulai dengan kemampuan katalisis enzim dalam membentuk keadaan transisi. Region spesifik pada enzim yang disebut sisi aktif akan menjadi tempat di mana substrat terikat. Enzim-substrat memiliki 2 model sisi aktif yakni model *lock and key* dan *induced fit*.

1) Model *Lock and Key*


Emil Fisher mengajukan model ini dengan prinsip bahwa sisi aktif pada enzim yang belum terikat akan bersesuaian dengan bentuk substrat yang akan terikat.



Gambar 2. Model *Lock and Key* (Wahyuni, 2017)

2) Model *Induced Fit*

Daniel Koshland mengajukan model ini dengan prinsip bahwa substrat akan terikat pada enzim, hal tersebut memicu perubahan konformasi dari enzim.



Gambar 3. Model *Induced Fit* (Wahyuni, 2017)

c. Enzim tidak dipengaruhi oleh reaksi yang dikatalisisnya pada keadaan stabil, karena aktivitasnya dipengaruhi oleh sifat enzim dan proteinnya seperti suhu dan pH (Wahyuni, 2017).

3. Stabilitas Enzim

Kestabilan enzim mampu dinilai dari grafik aktivitas sisa seiring dengan berjalannya waktu inkubasi. Enzim dianggap stabil apabila masih dapat mempertahankan aktivitasnya setidaknya hingga 50% dan tidak mengalami penurunan yang signifikan selama masa inkubasi. Faktor-faktor seperti suhu, konsentrasi substrat dan pH selama periode tertentu memengaruhi kestabilan enzim tersebut.

a. Konsentrasi substrat

Konsentrasi substrat memengaruhi aktivitas enzim. Pada konsentrasi substrat rendah, konversi maksimum oleh enzim tidak tercapai karena kesulitan enzim dalam menemukan substrat yang akan direaksikan. Meningkatnya kecepatan

reaksi terjadi seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat, karena semakin banyaknya substrat yang terikat dengan enzim (Harvey & Ferrier, 2012).

b. Suhu

Pada saat mengkatalisis reaksi, suhu memiliki peran penting dalam menentukan aktivitas enzim. Agar dapat aktif enzim memerlukan jumlah panas tertentu. Aktivitas enzim meningkat apabila suhu juga meningkat. Suhu maksimum menyebabkan enzim mengalami denaturasi karena struktur protein terbuka dan gugus non polar yang sebelumnya berada di dalam molekul menjadi terbuka keluar. Akibatnya, kelarutan protein dalam air yang bersifat polar menurun, mengakibatkan penurunan aktivitas enzim (Harvey & Ferrier, 2012).

c. pH

Struktur dan aktivitas enzim dipengaruhi secara signifikan oleh pH. pH optimum adalah aktivitas katalitik maksimum yang ditunjukkan oleh karakteristik pH. Perubahan pH yang kecil saja dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Denaturasi protein penyusun enzim dapat terjadi akibat perubahan pH (Harvey & Ferrier, 2012).

4. Inhibitor Enzim

Inhibitor adalah suatu enzim yang sering dihambat oleh suatu zat.

Enzim seringkali dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Inhibitor enzim dibagi menjadi 2 yaitu inhibitor reversible dan inhibitor irreversible. Inhibitor reversible berdisosiasi cepat dengan enzim-substrat dan tidak menyebabkan perubahan permanen dari enzim sedangkan inhibitor irreversible berdisosiasi sangat lambat dari enzim targetnya. Inhibitor reversible terbagi lagi menjadi 2 yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki kemiripan bentuk sisi struktur dengan substrat terhadap sisi aktif enzim, sedangkan inhibitor non kompetitif yaitu inhibitor menempel pada sisi


lain dari enzim dan menyebabkan sisi aktif enzim berubah dan enzim tidak dapat berikatan dengan substrat (Wahyuni, 2017).

D. Enzim α -amilase

Enzim pencernaan amilase yang dikategorikan sebagai saccharidase yaitu enzim yang berperan dalam pemecahan polisakarida. Enzim ini terutama dihasilkan oleh kelenjar ludah dan pankreas. Enzim amilase berperan utama dalam memecah pati yang terdapat dalam makanan sehingga pati dapat diolah oleh tubuh. Hidrolisis polisakarida α -1,4-glikosidik dilakukan oleh enzim amilase, menghasilkan oligosakarida, dekstrik, D-glukosa dan maltosa. Sumber utama karbohidrat dalam makanan disebut pati. Selama proses pencernaan yang dimulai dari mulut, pati dihidrolisis oleh α -amilase yang terkandung dalam air liur atau saliva sebelum sampai ke dalam perut. Setelah pati mencapai perut, konversi pati menjadi oligosakarida dan disakarida diselesaikan oleh α -amilase pankreas. α -glukosidase usus kemudian memecah disakarida menjadi monosakarida yang berupa glukosa yang kemudian dapat diserap melalui sel epitel usus kecil ke dalam aliran darah (Oboh et al., 2011).

Peran enzim α -amilase dalam pencernaan glikogen dan pati melibatkan mikroorganisme tumbuhan dan organisme tingkat tinggi dengan struktur yang lebih besar dan kompleks. Enzim α -amilase bekerja melalui dua tahap dalam mekanismenya. Pada tahap pertama, amilosa diuraikan menjadi maltosa dan maltotriosa secara acak. Proses degradasi ini berlangsung dengan sangat cepat, diikuti oleh penurunan viskositas secara signifikan. Pada tahap kedua, enzim α -amilase membentuk glukosa dan maltosa sebagai hasil akhir dan proses ini tidak terjadi secara acak. Inilah cara kerja enzim α -amilase pada molekul amilosa (Ariandi, 2016). Enzim α -amilase bekerja optimum pada pH 5,6-7,2 (Prahesti et al., 2018).

Untuk mengikat substrat, beberapa enzim memiliki lebih dari satu bagian aktif. Ini memungkinkan enzim untuk mengikat substrat yang lain setelah sudah terikat dengan substrat tertentu. Sifat enzim ini disebut alosterik (Sundarram & Murthy, 2014).




Gambar 4. Struktur enzim α -amilase (Sundarram & Murthy, 2014)

Enzim α -amilase bisa dihambat dengan menggunakan obat antidiabetik. Salah satu contohnya adalah acarbose. Acarbose merupakan senyawa oligosakarida buatan yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif yang memperlambat kerja enzim α -amilase. Melalui struktur miripnya dengan pati, acarbose menghambat pencernaan karbohidrat karena bersifat sebagai substrat enzim tersebut. (Budianto & Hairullah, 2017). Dalam menghambat enzim α -amilase dapat digunakan beberapa metode yaitu metode DNSA dan metode fuwa.

1. Metode DNSA


Metode DNSA merupakan metode yang menggunakan pereaksi DNSA untuk mengukur gula reduksi yang berdasar pada turunya jumlah gula pereduksi dari hasil reaksi hidrolisis pati oleh α -amilase dengan adanya inhibitor. Mekanisme hidrolisis pati dapat dilihat pada (Gambar. 5) yang di mana pati akan terhidrolisis oleh enzim α -amilase menjadi gula pereduksi oligosakarida yang lebih pendek. Hasil penguraian oleh α -amilase ialah berbentuk dekstrin. Dekstrin adalah produk

antara pati dan desktrosa glukosa yang terdiri dari campuran oligosakarida kompleks yang memiliki rumus molekul $C_6H_{10}O_3$ (Irawati, 2016).



Gambar 5. Hidrolisis Pati oleh Enzim α -amilase (Timerman, 2012)

Pemanasan dapat menyebabkan perubahan bentuk α -amilase sehingga aktivitasnya akan dihilangkan dan reaksi hidrolisis pati dan α -amilase dapat dihentikan. Setelah menghentikan reaksi, produk hidrolisis diukur dengan menggunakan reagen berwarna asam 3,5-dinitrosalisilat. Gula pereduksi yang ada dalam larutan akan tereduksi oleh reagen tersebut. Dapat dilihat pada (Gambar.6) senyawa 3,5-dinitrosalisilat yang semula berwarna kuning cerah mengalami perubahan menjadi senyawa asam 3-amino-5-dinitrosalisilat yang berwarna jingga kemerahan. Kemudian, absorbansi senyawa ini diukur pada panjang gelombang 540 nm (Timerman, 2012).



Gambar 6. Tahapan reaksi reduksi asam 3,5-dinitrosalisilat (Timerman, 2012)

2. Metode Fuwa

Metode fuwa merupakan metode yang menggunakan larutan iodine. Enzim yang memiliki gugus karboksil dan nitrogen pada sisi aktifnya akan berikatan dengan substrat yang digunakan yaitu pati yang larut dalam air. Enzim akan membentuk kompleks absorbs dengan substrat, di mana ikatan glikosidik pada posisi tertentu berhadapan dengan gugus karboksil dan kelompok imidazole. Absorbansi warna biru yang terukur oleh spektrofotometer pada akhir reaksi menunjukkan jumlah pati yang tidak terhidrolisis oleh enzim. Larutan iodine membentuk senyawa kompleks berwarna biru dengan pati, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan enzim dalam memecah pati dari jumlah pati yang masih ada (Fuwa, 1954).


E. Acarbose

Acarbose adalah suatu obat sintesis yang dapat digunakan sebagai bagian dari terapi farmakologi dalam pengobatan diabetes mellitus. Acarbose digunakan sebagai obat antidiabetes khususnya untuk diabetes mellitus tipe 2 dengan cara menghambat aktivitas enzim alfa-amilase. ini mengakibatkan penundaan dalam pencernaan karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa dan mencegah peningkatan glukosa dalam darah setelah makan (de Sales et al., 2012).

Aktivitas kerja enzim α -amilase dapat dihambat oleh penggunaan acarbose (Alfiani, 2022). Acarbose menggunakan prinsip penghambatan yang sama pada enzim alfa-amilase yang telah lama digunakan sebagai obat untuk mengatasi diabetes mellitus. Obat ini bekerja dengan menunda hidrolisis disakarida dan karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa serta menghambat proses metabolisme sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa (Afsari et al., 2016).

Berdasarkan literatur lain acarbose juga mampu menurunkan absorpsi glukosa dan menurunkan hiperglikemia postprandial yang bekerja dengan cara

kompetitif yang menghambat kerja enzim alfa glukosidase di saluran cerna. Efek klinis dari menghambat enzim adalah mampu mengurangi proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat di dalam usus sehingga mengakibatkan penurunan kadar gula darah setelah makan serta menciptakan respons hemat insulin (G. Katzung et al., 2012).



Gambar 7. Struktur Kimia Acarbose (Dirir et al., 2022)

F. Ekstraksi

Mengambil sari atau memisahkan kandungan senyawa aktif tanaman adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat dari kandungan bahan alam. Untuk mendapatkan sari ataupun kandungan senyawa aktif pada suatu tanaman itu cara yang umum digunakan adalah dengan teknik ekstraksi (Sudarwati Lestari Puji & Fernanda Ferry, 2017). Secara umum, ekstraksi adalah metode di mana senyawa kimia ditarik keluar menggunakan pelarut sebagai bantuannya. Dalam proses ekstraksi, penting untuk memilih pelarut yang mampu memisahkan atau mengekstrak zat yang diinginkan tanpa melarutkan substansi lain yang tidak diinginkan (Prayudo et al., 2015). Secara umum, ekstraksi dapat dilakukan melalui

beberapa metode termasuk perkolasi, maserasi, ekstraksi dengan alat Soxhlet, refluks, infusa, digesi dan dekok (Rosidah et al., 2015).

Secara umum metode dibagi menjadi 2 berdasarkan ada atau tidaknya proses pemanasan, yaitu :

a. Ekstraksi dingin

Selama proses ekstraksi, metode ini tidak memerlukan pemanasan untuk menghindari kerusakan senyawa yang mungkin terjadi akibat suhu tinggi. Jenis metode yaitu :

1) Maserasi

Metode yang sederhana yang umum digunakan adalah metode maserasi. Maserasi adalah metode yang sederhana paling banyak digunakan. Metode ini melibatkan penempatan serbuk tanaman dan pelarut yang cocok ke dalam wadah tertutup rapat pada suhu kamar. Keunggulan dari metode ini adalah mampu melindungi senyawa-senyawa yang sensitif terhadap panas namun memiliki kekurangan seperti penggunaan pelarut yang banyak, potensi kehilangan beberapa senyawa dan membutuhkan waktu yang cukup lama (Mukhriani, 2014).

2) Perkolasi

Proses ini dilakukan dengan cara yang cukup sederhana yaitu dengan merendam serbuk tanaman dalam cairan penyari. Pelarut dituangkan ke atas sampel simplisia dan dibiarkan menetes perlahan ke bagian bawahnya (Sudarwati Lestari Puji & Fernanda Ferry, 2017). Metode perkolasi memiliki keunggulan dalam konteks bahwa sampel terus dialiri oleh pelarut baru, namun kelemahannya terletak pada kesulitan mencapai seluruh area jika sampel dalam perkolator tidak homogen. Metode ini juga memakan waktu lama dan memerlukan banyak pelarut (Mukhriani, 2014).

b. Ekstraksi panas

Metode ini memerlukan proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Kelebihan metode ekstraksi panas dibandingkan ekstraksi dingin yaitu secara otomatis proses penyarian akan menjadi lebih cepat. Jenis metode ekstraksi panas yaitu :

1) Soxhlet

Metode ini melibatkan proses dengan cara menempatkann serbuk sampel di dalam sarung selulosa atau kertas saring dalam klonsong yang diletakkan di atas labu dan di bawah kondensor. Metode ini memiliki keunggulan karena proses eksteaksi berlangsung terus menerus, cepat dan menggunakan sedikit pelarut karena sampel diesktraksi oleh pelarut murni (Mukhriani, 2014).

2) Reflux dan Destilasi Uap

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah metode reflux. Jika pada sintesis menggunakan pelarut yang mudah menguap maka digunakan metode ini. Metode ini digunakan dengan cara pelarut dimasukkan bersama dengan sampel yang alat kondensor dihubungkan dengan labu. Sedangkan, proses destilasi uap sering digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial dan prosedurnya mirip dengan metode lainnya. Senyawa yang memiliki sifat termolabil dapat terdegradasi merupakan salah satu kerugian dari kedua metode ini (Mukhriani, 2014).

3) Infusa

Infusdasi adalah metode esktraksi yang menggunakan pelarut air. Selama infusdasi, pelarut air harus dipanaskan hingga mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Jika rasio berat badan dan air adalah 1:10 berarti jika berat bahan sebanyak 100 gram dan volume air yang digunakan sebagai pelarut adalah

1000 mL. Metode umum yang digunakan melibatkan pemanasan serbuk bahan dengan air yang cukup dalam panci selama 15 menit, dimulai ketika suhu mencapai 90°C sambil sesekali diaduk. Saring selagi masih panas melalui kain flannel dan tambahkan air panas secukupnya ke dalam ampas hingga tercapai volume yang diinginkan (Sariyem et al., 2015).

G. Fraksinasi

Dalam metode fraksinasi pemisahan ekstrak didasarkan pada tingkat kepolarannya dan metode ini digunakan dua pelarut yang tidak bercampur dan memiliki tingkat kepolaran yang berbeda. Fraksinasi digunakan untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya, sehingga senyawa dapat dibagi menjadi fraksi yang berbeda dari segi jumlah dan jenisnya (Aribowo et al., 2021). Pelarut etanol 70% digunakan untuk menarik senyawa polar, pelarut n-heksan digunakan untuk menarik senyawa non-polar, dan pelarut etil asetat digunakan untuk menarik senyawa semi-polar (Sudarwati Lestari Puji & Fernanda Ferry, 2017).

Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode ekstraksi cair-cair dan kromatografi. Metode kromatografi yang biasa digunakan pada isolasi senyawa flavonoid adalah kromatografi kolom (KK), dan kromatografi lapis tipis (KLT):

1. Ekstraksi Cair-cair

Ekstraksi cair-cair adalah teknik di mana larutan yang biasanya dalam air berkontak dengan suatu pelarut kedua yang biasanya organik yang pada dasarnya tidak bercampur (Prihatiningsih et al., 2017). Prinsip dasar ekstraksi cair-cair melibatkan proses pencampuran larutan dengan pelarut lain yang tidak bercampur dengan pelarut asal dan memiliki densitas yang berbeda. Seiring dengan penambahan pelarut, dua fasa akan terbentuk dalam beberapa saat. Ini mengakibatkan perpindahan massa dari pelarut baru yang ditambahkan dengan

adanya gaya dorong yang muncul karena perbedaan potensial kimia antar kedua pelarut (Dilla et al., 2019).

2. Kromatografi Lapis Tipis

Metode analisis yang dikenal sebagai kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk memisahkan campuran senyawa dengan sederhana dan tepat. Pemisahan kromatografi lapis tipis bergantung pada partisi, adsorpsi atau kombinasi kedua efek. Ini bergantung pada jenis lempeng yang digunakan yaitu fase diam atau fase gerak (Hujjatusnaini et al., 2021). Untuk melakukan pemisahan dan analisis sampel menggunakan metode KLT diperlukan pelarutan dan bahan yang cukup sederhana seperti sebuah wadah tertutup (*chamber*) yang berisi lempeng KLT dan pelarut. Pengukuran yang akurat dan pemisahan yang efektif dapat dicapai dengan mengoptimalkan metode menggunakan alat komersial yang tersedia (Wulandari, 2011).

3. Kromatografi Kolom

Kromatografi kolom tetap digunakan sebagai metode pemisahan senyawa. Pemisahan senyawa dalam kromatografi kolom melibatkan mekanisme yang serupa dengan metode kromatografi lainnya yaitu berdasarkan perbedaan daya antarmolekul dalam sampel terhadap fase gerak serta komponen dengan fase diam. Dalam kromatografi kolom, senyawa-senyawa dari campuran dipisahkan berdasarkan adsorbs mereka pada permukaan fase diam atau penjerap yang memiliki afinitas yang berbeda-beda. Keberhasilan pemisahan menggunakan kromatografi kolom dipengaruhi oleh pemilihan bahan penyerap dan pelarut, dimensi kolom yang digunakan dan kecepatan elusi yang diterapkan (Hujjatusnaini et al., 2021).

H. Microplate Reader

Lempeng mikro (*microplate*) dapat dibaca menggunakan alat yang disebut *microplate reader*. *Microplate reader* memiliki filter yang membatasi rentang panjang gelombang yang biasanya antara 400 nm hingga 750 nm, berbeda dengan spektrofotometer konvensional yang memungkinkan pembacaan pada rentang panjang gelombang yang lebih luas. Cara menggunakan *microplate reader* melibatkan penempatan sampel uji di dalam plat yang telah dirancang khusus dengan jumlah sumur tertentu sesuai dengan prosedur atau pengujian yang akan dilakukan (Characteristicsl et al., 2008).

Microplate reader pertama kali dibuat untuk mengukur antibody, tetapi seiring berjalannya waktu dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Sekarang, alat ini dapat mendeteksi dan memproses data kimia, menghasilkan nilai absorbansi untuk aplikasi seperti uji ELISA, mengukur aktivitas enzim, serta mengkuantifikasi protein dan asam nukleat. *Microplate reader* juga digunakan untuk mengidentifikasi obat-obatan, melakukan validasi bioassay, dan dalam pembuatan biodramasi. Prinsip dasar dalam penggunaan *microplate reader* adalah penggunaan penyaring khusus dengan 5-6 panjang gelombang standar yang berlaku untuk semua jenis *microplate reader* (Berg et al., 2015).

Microplate reader berbeda dengan spektrofotometer karena meskipun spektrofotometer lebih akurat dan dapat mengukur pada semua panjang gelombang, merekam spektrum, serta melakukan pengukuran kinetik secara terus-menerus, *microplate reader* memiliki keterbatasan dalam hal ini. *Microplate reader* memiliki keunggulan kecepatan dibandingkan spektrofotometer karena dapat menangani banyak sampel sekaligus dan menggunakan volume yang lebih kecil, misalnya 200-500 μ l untuk lempeng berlubang 96. *Microplate reader* memiliki keunggulan dibandingkan dengan spektrofotometer yang hanya mampu mengukur lebih banyak

sampel dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, kelebihan lain dari *microplate reader* yaitu mengurangi jumlah reagen dan sampel atau bahan lainnya dalam jumlah yang besar. (Characteristicsl et al., 2008).



Gambar 8. *Microplate Reader*

I. Tinjauan Islam tentang Manfaat Tumbuh-tumbuhan

Tumbuh-tumbuhan mengandung berbagai jenis senyawa yang memiliki fungsi tersendiri, maka dari itu tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam bidang Kesehatan, tumbuhan memegang peranan penting yakni pemanfaatannya dalam pengembangan obat-obatan dalam berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi begitu pula dengan pengobatan penyakit, masyarakat mencari bahan alam sebagai alternatif pengobatan. Allah *swt.* Telah menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dengan khasiat yang baik apabila dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah *swt.* Dalam Q.S. Thaaha/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
بِهِ زُرُوعًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya :

“ Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam “(Kementrian Agama, 2019)

Ayat tersebut menyebutkan bahwa segala macam tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah *swt.* merupakan bagian dari hidayah Allah *swt.* Ia telah menunjukkan kekuasaan dan kebesaran-Nya melalui penciptaan-Nya termasuk bumi dan seisinya. Disamping itu, hanya Allah *swt* yang menurunkan air hujan dari langit serta menumbuhkan tumbuh-tumbuhan begitu banyak dan bervariasi, baik bentuk, warna, bau maupun khasiat dan kegunaannya. Oleh karena itu, tugas manusia sebagai khalifa di muka bumi ini mempelajari dan menemukan kegunaan-kegunaan dari tumbuhan yang ada tersebut untuk mengobati atau memelihara Kesehatan manusia diharuskan untuk senantiasa meneliti kandungan tanaman yang ada untuk di jadikan obat, karena semua penyakit ada obatnya (Q. Shihab, 2011). Hal ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“ Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (Al-Bukhari, 2010)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah *swt.* telah memberikan obat untuk segala penyakit dan tugas manusia adalah menggunakan akal yang diberikan oleh Allah *swt.* untuk mencari, meneliti serta mengelola sumber daya alam dengan tekun. Dengan melakukan hal tersebut, manusia dapat mengembangkan obat-obatan yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Salah satu sumber daya alam yang Allah berikan sebagai bahan baku obat, di mana jumlahnya sangat melimpah ruah yakni tumbuh-tumbuhan yaitu Rimpang lempuyang gajah. Namun

demikian, untuk kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga terdapat dalam Q.S Asy-Syu'ara'/26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Artinya :

“ Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. “ (Kementrian Agama, 2019)

Ayat tersebut menerangkan bahwa sakit, baik sakit mental atau fisik adalah bagian dari keniscayaan hidup manusia yang tidak mampu dihindari. Meskipun demikian, menyatakan bahwa penyakit berasal dari Allah *swt.* adalah tidak pantas, karena penyakit dianggap sebagai hal buruk. Sebaliknya, segala hal yang baik dan indah bersumber dari-Nya, sementara hal-hal yang buruk atau tercela seharusnya dicari penyebabnya dalam diri manusia sendiri.

Dari tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa kata “*Apabila aku sakit*” dan “*Apabila Allah swt. menjadikan aku sakit*”, kata tersebut sangat jelas bahwa sebagai hamba Allah harus mengintropeksi diri sendiri. Sesuatu yang buruk itu bersumber dari sendiri. Adapun penyembuhan, Allah-lah yang memberikan kesembuhan, akan tetapi berusaha atau berupaya tetaplah dijalankan oleh manusia untuk menuju kesembuhan itu. Jadi, tugas manusia memang harus berusaha dan mencari bagaimana meneliti untuk mengetahui manfaat tumbuh-tumbuhan sehingga didapatkan bahwa rimpang lempuyang gajah merupakan salah satu obat antidiabetes (Al-Sheikh, 1994).

Meskipun ada berbagai macam tumbuhan di dunia, Al-Qur'an tidak menjelaskan manfaat dari semua tumbuhan tersebut. Salah satu contohnya adalah jahe, yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai bentuk pengolahan termasuk konsumsi sebagai makanan ataupun

minuman. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah *swt.* Q.S Surah Al-Insan/76 : 17

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahnya :

“ Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.”
(Kementrian Agama, 2019)

Dalam Tafsir al-misbah dijelaskan bahwa suatu balasan yang baik bagi penduduk surga yaitu berupa minuman yang campurannya adalah jahe. Namun, jahe yang dimaksud dalam ayat ini adalah mata air yang mengalir dari surga yaitu salsabil. Zanjabil merupakan tanaman tropis yang tumbuh dengan akar yang beraroma digunakan untuk penyedap makanan ataupun minuman. Dengan itu, terdapat berbagai penelitian tentang manfaat jahe. Manfaat jahe sebagai obat yaitu antipiretik, antiinflamasi, antiulcer, analgesik, dan anti mikroba. Seiring dengan perkembangan zaman pengetahuan akan manfaat tumbuh-tumbuhan akan terus berkembang karena banyaknya penelitian yang dilakukan dalam mengkaji tumbuh-tumbuhan berlandaskan kitab suci Al-Qur'an (Q. Shihab, 2017).

Jadi, jahe ini serumpun dengan Rimpang lempuyang gajah. Hal ini bisa kita maknai bahwa di surga kelak juga akan di temui minuman yang memiliki rasa seperti tanaman yang tumbuh di dunia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kuantitatif, untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim α -amilase dari fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Laboratorium Kimia Farmasi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Fakultas Farmasi (Laboratorium Penelitian dan Pengujian) Universitas Muslim Indonesia.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2023 – Juni 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorium yang dilakukan dengan beberapa tahap yakni ekstraksi, fraksinasi dan uji aktivitas penghambatan enzim α -amilase pada tumbuhan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang diperoleh dari supplier resmi Babah Kuya Bandung.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah kaca maserasi, corong, gelas kimia, batang pengaduk, wadah kaca penampung hasil maserasi, labu alas bulat, labu penerima, klem, mesin *vacuum rotary evaporator*, penangas, vial, cawan porselin, spatel, sendok tanduk, timbangan analitik, blender, corong pisah, kaca arloji, pipet tetes, pH meter, labu ukur, erlenmeyer, vortex, mikropipet, tip, plate, *microplate reader*, kompor, *laminar air flow*.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*), etanol 70% (Onemed[®]), acarbose (Sigma Aldrich[®]), kertas saring, tissue, aluminium foil, n-heksan, etil asetat, aquades (Onemed[®]), buffer fosfat pH 6,8 (Certipure[®]), enzim α -amilase (Insen[®]), DNSA (Sigma Aldrich[®]), DMSO (EMD Millipore Corp[®]), sodium potassium tartrate tetrahydrate (Emsure[®]), Kanji, NaOH (Emsure[®]), HCl (Merk[®]).

E. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel rimpang lempuyang gajah

Bagian tanaman lempuyang gajah yang digunakan untuk penelitian adalah rimpang. Rimpang lempuyang gajah diperoleh dalam keadaan sudah kering (simplisia) dari supplier resmi Babah Kuya Bandung sebanyak 5kg. Simplisia rimpang lempuyang gajah kemudian diserbukkan menggunakan blender (Dinnar Latiefah, 2022).

2. Ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah

Ekstrak rimpang lempuyang gajah dibuat dengan metode maserasi dengan tujuan untuk memungkinkan banyak senyawa terekstraksi. Serbuk rimpang lempuyang gajah yang telah dikeringkan diambil sebanyak 600 gram kemudian

dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1,7 Liter selama 3×24 jam sambil sesekali diaduk kemudian disaring dan dimaserasi hingga jernih. Maserat yang dihasilkan kemudian dipekatkan dengan menggunakan *vacuum rotary evaporator* (Podungge Ramadhan et al., 2017).

3. Fraksinasi sampel rimpang lempuyang gajah

Ekstrak yang telah pekat kemudian dilakukan fraksinasi menggunakan metode fraksinasi cair-cair. Fraksinasi dilakukan dengan melarutkan ekstrak kental rimpang lempuyang gajah sebanyak 20 gram dengan 100 mL aquades. Masukkan ke dalam corong pisah, tambahkan n-heksan sebanyak 100 mL kocok secara perlahan-lahan selama 5 menit, setelah itu diamkan hingga tepat memisah 2 fase. Fraksi n-heksan akan berada di atas sedangkan fraksi air berada di bawah. Fraksi n-heksan ditampung dalam Erlenmeyer 500 mL. Penambahan n-heksan dilakukan hingga berubah menjadi warna bening. (Kemdikbud, 2018).

Selanjutnya, sisa larutan fraksi air yang sudah selesai dikocok dengan pelarut n-heksan kemudian ditambahkan 100 mL pelarut etil asetat, kocok secara perlahan-lahan selama 5 menit lalu diamkan hingga terjadi pemisahan. Fraksi etil asetat akan berada di atas sedangkan fraksi air berada di bawah. Fraksi etil asetat ditampung dalam Erlenmeyer 1000 mL. Penambahan etil asetat dilakukan hingga berubah menjadi warna bening. Fraksi-fraksi yang diperoleh dipekatkan menggunakan mesin *vacuum rotary evaporator* pada suhu 50°C (Kemdikbud, 2018).

4. Uji Penghambatan enzim α -amilase

Prosedur kerja uji penghambatan enzim α -amilase dengan sampel rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) berdasarkan pada penelitian terdahulu yaitu penelitian (Ramadhani, 2018) dan (Alfiani, 2022).

a. Pembuatan Larutan Dapar Fosfat pH 6,8

Larutan buffer fosfat pH 7 diambil sebanyak 500 mL masukkan ke dalam gelas kimia, kemudian tambahkan beberapa tetes HCl dan diukur menggunakan pH meter hingga diperoleh buffer fosfat pH 6,8 (Alfiani, 2022).

b. Pembuatan Enzim α -amilase

Larutan enzim α -amilase dibuat dengan menimbang sebanyak 0,05 g enzim α -amilase dan dilarutkan dengan aquades di dalam gelas kimia aduk hingga homogen. Larutan yang sudah homogen dipindahkan ke dalam labu ukur 10 mL, lalu dicukupkan dengan aquades hingga 10 mL kocok hingga larut (Alfiani, 2022).

c. Pembuatan Larutan Pati 1%

Larutan substrat dibuat dengan menimbang pati sebanyak 500 mg dan dilarutkan dalam 50 mL aquades (Alfiani, 2022).

d. Pembuatan Seri Konsentrasi Fraksi n-heksan Rimpang Lempuyang Gajah

Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah ditimbang 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil sulfoksida sebanyak 3 tetes, cukupkan volume hingga 10 mL dengan dapar fosfat 6,8. Dimasukkan ke dalam labu ukur lalu cukupkan hingga dihasilkan konsentrasi 1000 ppm. Larutan fraksi 1000 ppm diencerkan hingga dihasilkan fraksi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ppm (Ramadhani, 2018).

e. Pembuatan Seri Konsentrasi Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah

Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah ditimbang 10 mg lalu dilarutkan dengan dimetil sulfoksida, cukupkan volume hingga 10 mL dengan dapar fosfat 6,8. Dimasukkan ke dalam labu ukur lalu cukupkan hingga dihasilkan konsentrasi 1000 ppm. Larutan fraksi 1000 ppm diencerkan hingga dihasilkan fraksi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ppm (Ramadhani, 2018).

f. Pembuatan seri konsentrasi acarbose

Larutan stok acarbose dengan konsentrasi 1000 ppm di encerkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; 100 ppm (Ramadhani, 2018).

g. Pembuatan Larutan Baku NaOH 2 N

Larutan NaOH 2 N dibuat dengan menimbang 0,8 g NaOH kemudian dilarutkan dengan air bebas CO₂ hingga 10 mL ke dalam labu ukur, diperoleh konsentrasi 2 N (Ramadhani, 2018).

h. Pembuatan Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNSA)

Larutan reagen DNSA dibuat dengan menimbang 0,1 g Asam dinitrosalisilat (DNSA) lalu ditambahkan NaOH 2 N sebanyak 2 mL dan sodium potassium tartrate tetrahydrate sebanyak 3 g. kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 5 mL larutkan hingga larut dan cukupkan volume hingga 10 mL (Ramadhani, 2018).

i. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Blanko

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μ L dan ditambahkan DMSO sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 37°C, setelah itu ditambahkan enzim α -amilase sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan larutan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μ L, setelah itu diinkubasi pada air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

j. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Blanko Kontrol

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μ L dan ditambahkan DMSO sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 37°C. Setelah itu ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan

larutan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μL , setelah itu diinkubasi pada air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

k. Pengujian Efek Penghambatan Acarbose

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μL dan ditambahkan larutan acarbose sebanyak 125 μL dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; dan 100 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu, ditambahkan larutan enzim α -amilase sebanyak 125 μL kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μL , setelah itu diinkubasi pada air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

l. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Acarbose

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μL dan ditambahkan acarbose sebanyak 125 μL dengan konsentrasi 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; dan 100 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu, ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 μL kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μL , setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

m. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Fraksi N-heksan

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μL dan ditambahkan fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah sebanyak 125 μL dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu

37°C. Setelah itu, ditambahkan larutan enzim α -amilase sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μ L, setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

n. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Fraksi Etil Asetat

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μ L dan ditambahkan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah sebanyak 125 μ L dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu, ditambahkan larutan enzim α -amilase sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit dengan suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μ L, setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

o. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Kontrol Fraksi N-heksan

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μ L lalu ditambahkan fraksi n-heksan sebanyak 125 μ L dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu, ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 μ L, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μ L, setelah itu diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

p. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel Kontrol Fraksi Etil Asetat

Buffer fosfat dan larutan pati 1% dipipet sebanyak 125 μ L dan ditambahkan fraksi n-heksan sebanyak 125 μ L dengan konsentrasi 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; dan 500 ppm kemudian diinkubasi selama 5 menit pada suhu 37°C. Setelah itu, ditambahkan buffer fosfat sebanyak 125 μ L kemudian diinkubasi kembali selama 10 menit pada suhu 37°C. Hentikan reaksi dengan menambahkan asam dinitrosalisilat sebanyak 250 μ L. Setelah itu, diinkubasi dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kemerahan. Dinginkan larutan hingga suhu ruangan dan diukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm (Ramadhani, 2018).

q. Perhitungan % Aktivitas Penghambatan Enzim

Aktivitas penghambatan enzim α -amilase, acarbose dan sampel dipisah dan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Inh \%} = \frac{Ac - As}{Ac} \times 100\%$$

Keterangan :

Ac : Penyerapan larutan uji blanko

(Blanko (abs dengan enzim) - Kontrol blanko (abs tanpa enzim))

As : Penyerapan larutan uji dengan sampel

(Sampel (abs dengan enzim) – Kontrol Sample (abs tanpa enzim))

Nilai IC_{50} dihitung dengan menggunakan rumus persamaan regresi linier untuk menentukan persamaan $y = bx + a$. Aktivitas penghambatan dinyatakan dengan *Inhibition Concentration* 50% (IC_{50}) yaitu konsentrasi dari sampel yang dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 50%. Nilai konsentrasi sampel sebagai variabel x sedangkan % inhibisi sebagai variable y. nilai IC_{50} didapatkan dari nilai x setelah mengganti $y = 50$. Atau dihitung dengan menggunakan rumus:


$$IC_{50} = \frac{50-a}{b}$$

Keterangannya :

a = konstanta

b = koefisien

Perhitungan nilai IC_{50} menggunakan persamaan regresi linier yaitu $y = bx + a$, di mana konsentrasi sampel sumbu x dan % persen penghambatan sumbu y.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Rimpang lempuyang gajah

Berat simplisia	Jenis Ekstrak	Berat Esktrak	% Randemen
600 g	Ekstrak kental	34 g	5,66%

2. Hasil Fraksinasi N-Heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Tabel 2. Hasil perhitungan fraksi-fraksi ekstrak rimpang lempuyang gajah

Ekstrak etanol	Jenis Fraksi	Berat Fraksi	% Rendemen
20 g	Fraksi N-heksan	3,82 g	19,10%
	Fraksi Etil asetat	2,57 g	12,85%
	Fraksi Air	3,97 g	19,85%

3. Hasil Persen Aktivitas Inhibitor Enzim α -amilase Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Tabel 3. Hasil persen inhibitor kontrol positif

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibisi
Kontrol positif acarbose	20 $\mu\text{g/mL}$	27,52
	40 $\mu\text{g/mL}$	46,54
	60 $\mu\text{g/mL}$	61,79
	80 $\mu\text{g/mL}$	83,02
	100 $\mu\text{g/mL}$	93,87

4. Hasil Persen Aktivitas Inhibitor Enzim α -amilase Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Tabel 4. Hasil Persen Inhibitor Fraksi N-heksan dan Fraksi Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Sampel	Konsentrasi	Persen (%) Inhibisi
Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah	100 $\mu\text{g/mL}$	45,75
	200 $\mu\text{g/mL}$	60,69
	300 $\mu\text{g/mL}$	70,28
	400 $\mu\text{g/mL}$	80,82
	500 $\mu\text{g/mL}$	95,75
Fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah	100 $\mu\text{g/mL}$	45,28
	200 $\mu\text{g/mL}$	57,86
	300 $\mu\text{g/mL}$	75,00
	400 $\mu\text{g/mL}$	83,02
	500 $\mu\text{g/mL}$	89,15

5. Hasil Nilai IC_{50} Fraksi N-heksan dan Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

Tabel 5. Hasil perhitungan nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah

Sampel	Nilai IC_{50} ($\mu\text{g/mL}$)
Kontrol Positif Acarbose	45,168
Fraksi N-heksan	128,035
Fraksi Etil Asetat	122,276

B. Pembahasan

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) adalah tanaman harum yang secara umum merupakan tanaman obat dengan potensi budidaya yang berlebihan dengan biaya tumbuh yang rendah karena manfaatnya yang luas. Tanaman ini ditanam dan dimanfaatkan secara besar-besaran di iklim tropis dengan kondisi lembab. Daun, rimpang, biji, dan bunganya memiliki banyak kegunaan baik sifat biologis maupun farmakologis. Bagian yang paling penting adalah rimpangnya, yang berhubungan dengan semua kegunaan medis (N. 'Uyun Ahmad et al., 2023).

Bagian rimpang lempuyang gajah mengandung senyawa seperti flavonoid, saponin, fenol, polifenol, dan alkaloid (Rejeki & Priyandari, 2017). Beberapa senyawa dalam suatu tumbuhan termasuk lempuyang gajah memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, antikanker, antimikroba, analgesik dan antivirus (Koga et al., 2016).

Berbagai macam tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah *swt.* tidak ada yang sia-sia, seluruh makhluk hidup yang Allah *swt.* ciptakan sangat bermanfaat bagi kepentingan kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah *swt.* Q.S Asy-Syu'ara/26 : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahannya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama, 2019)

Ayat tersebut membuktikan keniscayaan keesaan Allah *swt.* karena terdapat berbagai macam tumbuhan yang terhampar di muka bumi ini dengan banyak manfaat lagi beraneka jenis rasa dan warna. Hal tersebut tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, melainkan ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. (D. M. Q. Shihab, 2002)

Tumbuhan yang beraneka ragam dapat digunakan sebagai obat dari berbagai jenis penyakit yang merupakan anugerah dari Allah *swt.*, karena-Nya tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan (obat) hal inilah yang harus manusia pahami dan manfaatkan. Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai antidiabetes yang nanti akan dimanfaatkan oleh manusia.

Pengujian penghambatan enzim α -amilase bertujuan untuk mengukur penurunan aktivitas enzim α -amilase dalam menghidrolisis pati. Jumlah maltosa yang dihasilkan dari pati menunjukkan seberapa banyak pati yang telah dipecah menjadi maltosa dan glukosa. Prinsip dasar pengujian ini adalah mengamati reaksi antara maltosa dan glukosa dengan menggunakan asam dinitrosalisilat sehingga menghasilkan warna kemerahan (Pambudi et al., 2021).

Penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Simplisia rimpang lempuyang gajah diserbukkan menggunakan blender untuk meningkatkan kemudahan difusi senyawa aktif ke dalam pelarut. Simplisia kemudian dimasukkan ke dalam toples kaca sebanyak 600 gram untuk selanjutnya ke tahap ekstraksi.

Setelah simplisia dipreparasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan ekstraksi menggunakan metode maserasi. Ekstraksi adalah metode di mana senyawa kimia ditarik keluar dengan menggunakan bantuan pelarut tertentu. Dengan metode maserasi simplisia direndam dalam pelarut tanpa memerlukan pemanasan sehingga bahan alam yang terkandung tidak rusak disebabkan suhu tinggi. Pada proses maserasi dilakukan pergantian pelarut selama 3x24 jam karena pada maserasi akan terjadi proses keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel (Dewatisari, 2020). Selain itu, semakin lama pelarut bersentuhan dengan bahan, jumlah sel yang pecah dari bahan aktif yang larut akan meningkat (Chairunnisa et al., 2019). Dalam penelitian ini, pelarut etanol 70% dipilih untuk mengekstraksi simplisia. Etanol 70% diketahui mampu menarik senyawa aktif yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis pelarut organik lainnya (Riwanti et al., 2018). Selain itu, etanol 70% merupakan satu-satunya jenis pelarut yang tidak

bersifat beracun karena rendahnya tingkat toksisitas dibanding pelarut lain (Hasanah & Novian, 2020).

Hasil ekstraksi kemudian dipekatkan menggunakan alat *rotary evaporator* pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$, hal ini dilakukan pada suhu tersebut yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penguraian yang mungkin terjadi pada senyawa yang terkandung di dalamnya (Saputra et al., 2018). Hasil ekstraksi berupa ekstrak kental dengan persen rendemen sebesar 5,66%.

Ekstrak etanol lempuyang gajah yang telah dipekatkan kemudian diambil sebanyak 20 gram untuk dilakukan fraksinasi dengan menggunakan pelarut n-heksan dan aquades. Metode ekstraksi cair-cair digunakan untuk melakukan fraksinasi. Ini dilakukan dengan menggunakan corong pisah dengan dua pelarut yang tidak saling bercampur. Tujuan dari metode ini adalah agar senyawa-senyawa dapat terlarut pada pelarut yang sesuai dengan tingkat kepolarannya, sehingga lebih mudah untuk mengklasifikasikan senyawa-senyawa yang didapatkan (Saputra et al., 2018). Fraksinasi dengan pelarut n-heksan dilakukan sebanyak 4x pengulangan sedangkan fraksinasi pelarut etil asetat dilakukan sebanyak 7x pengulangan. Hasil fraksi pelarut n-heksan dan etil asetat kemudian dipekatkan kembali dengan menggunakan *rotary evaporator* sehingga diperoleh hasil fraksi n-heksan dengan persen rendemen 19%, fraksi etil asetat 13% dan fraksi air 20% dari hasil rendemen terlihat bahwa fraksi air memiliki persen rendemen yang paling besar, hal ini dimungkinkan bahwa sampel rimpang lempuyang gajah mempunyai senyawa yang polar.

Setelah diperoleh fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat, kemudian dilakukan uji penghambatan aktivitas enzim α -amilase. Enzim α -amilase berfungsi dalam sistem pencernaan dalam pemecahan karbohidrat kompleks menjadi sederhana (Ariandi, 2016). Pada pengujian ini, untuk mendapatkan nilai akhir berupa

persentasi (%) penghambatan dan IC_{50} maka dilakukan beberapa rangkaian pengujian pada beberapa kelompok, yaitu pengujian larutan blanko dan kontrol blanko, pengujian larutan acarbose dan kontrol acarbose, pengujian sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat serta sampel kontrol fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat.

Pengujian larutan blanko dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas enzim α -amilase tanpa penambahan sampel uji. Pada pengujian kontrol blanko bertujuan untuk mengetahui aktivitas pelarut tanpa sampel maupun enzim. Pengujian enzim digunakan untuk mengetahui aktivitas sampel yang digunakan untuk penghambatan enzim α -amilase dan pengujian kontrol sampel digunakan untuk melihat aktivitas tanpa adanya enzim α -amilase.

Pada penelitian ini digunakan pati kanji yang berfungsi sebagai substrat yang berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk suatu produk, sedangkan acarbose sebagai kontrol positif karena acarbose memiliki aktivitas menghambat enzim α -amilase (Dinnar Latiefah, 2022). Mekanisme kerja acarbose dalam menghambat enzim α -amilase terjadi ketika sisi aktif dari α -amilase akan berikatan dengan acarbose sehingga menyebabkan α -amilase tidak dapat berikatan dengan pati sebagai substrat. Hal tersebut akan menghambat proses hidrolisis pati menjadi glukosa sehingga kadar glukosa dalam sampel menjadi rendah dan menyebabkan nilai absorbansi yang diperoleh pada pembacaan spektrofometer akan menjadi kecil (Alfiani, 2022).

Kontrol positif acarbose, sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat masing-masing dibuat menjadi 5 variasi konsentrasi. Untuk kontrol positif acarbose dibuat dengan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm, sedangkan untuk fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat dibuat dengan konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 ppm. Tujuan dari adanya variasi

konsentrasi yaitu melihat pengaruh konsentrasi terhadap peningkatan daya hambat enzim α -amilase (Gaspersz et al., 2022)

Pada pengujian aktivitas penghambatan enzim α -amilase dilakukan dengan menggunakan metode DNSA dengan prinsip untuk melihat reaksi antara maltosa dan glukosa sehingga menghasilkan warna kompleks dengan larutan uji untuk menunjukkan adanya gula pereduksi (Gaspersz et al., 2022). Reaksi yang terjadi merupakan reaksi redoks di mana gugus aldehid pada gula akan teroksidasi menjadi gugus karboksil dan pada DNSA yang sebagai oksidator akan tereduksi membentuk asam 3-amino-5-nitrosalisilat. Hasil reaksi kemudian diukur menggunakan *microplate reader* sehingga didapatkan nilai absorpsi (Lampiran 3). Hasil absorpsi yang didapatkan kemudian digunakan untuk menghitung persen (%) inhibisi dan nilai IC_{50} pada sampel.

Berdasarkan nilai persen inhibisi aktivitas enzim α -amilase oleh kontrol positif acarbose (Tabel 3) diperoleh nilai r 0,9924 dengan nilai persen inhibisi dari konsentrasi terkecil yaitu 27,52%, 46,54%, 61,79%, 83,02%, 93,87%. Adapun fraksi n-heksan (Tabel 4) diperoleh nilai r 0,9933 dengan nilai persen inhibisi dari konsentrasi terkecil yaitu 45,75%, 60,69%, 70,28%, 80,82%, 95,75%, sedangkan untuk fraksi etil asetat (Tabel 4) diperoleh nilai r 0,9659 dengan nilai persen inhibisi dari konsentrasi terkecil yaitu 45,28%, 57,86%, 75,00%, 83,02%, 89,15%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa fraksi n-heksan dan etil asetat rimpang lempuyang gajah memiliki aktivitas penghambatan enzim α -amilase. Nilai persen inhibisi terhadap aktivitas enzim α -amilase fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi fraksi, maka semakin besar aktivitas penghambatan enzim α -amilase. Persen inhibisi terendah terdapat pada konsentrasi sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat 100 ppm yaitu 45,75% dan 45,28%, sedangkan persen inhibisi tertinggi

terdapat pada sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat 500 ppm yaitu 95,75% dan 89,15%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fraksi n-heksan dengan konsentrasi 500 ppm memiliki kemampuan menghambat enzim α -amilase yang paling baik dari pada konsentrasi lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip aktivitas penghambatan enzim, yaitu semakin besar konsentrasi fraksi maka semakin besar pula nilai hambatan yang diperoleh (Gaspersz et al., 2022).

Setelah dilakukan perhitungan nilai persentase inhibisi sampel, maka selanjutnya dibuat persamaan regresi linear untuk menghasilkan nilai IC_{50} . Persamaan regresi linear persen inhibisi aktivitas enzim α -amilase disajikan pada (Lampiran 4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat berturut-turut, yaitu sebesar 128,035 $\mu\text{g/mL}$ dan 122,276 $\mu\text{g/mL}$ dan kontrol positif acarbose sebesar 45,168 $\mu\text{g/mL}$. Tingkat kekuatan inhibisi terhadap enzim α -amilase dikatakan sangat kuat jika $IC_{50} < 50 \mu\text{g/mL}$, kuat jika IC_{50} 50-100 $\mu\text{g/mL}$, sedang jika IC_{50} 100-150 $\mu\text{g/mL}$, lemah jika IC_{50} 150-200 $\mu\text{g/mL}$, dan sangat lemah jika $IC_{50} > 200 \mu\text{g/mL}$ (Primada Hari Anugrahini & Sri Wahyuni, 2021).

Berdasarkan tingkat kekuatan inhibisi enzim α -amilase tersebut, sampel fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat termasuk dalam kategori sedang sedangkan kontrol positif acarbose termasuk kategori sangat kuat. Berdasarkan hasil skrining fitokimia yang dilakukan oleh (Doloking et al., 2022) mengungkapkan bahwa ekstrak methanol *Zingiber zerumbet* mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, polifenol, triterpenoid dan steoird. Secara spesifik senyawa fitokimia dibagi menjadi fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat, untuk fraksi n-heksan mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid sedangkan fraksi etil asetat mengandung senyawa flavonoid dan polifenol. Senyawa yang diduga memiliki peran dalam penghambatan enzim α -amilase adalah senyawa flavonoid. Di mana pada

penelitian (Atikawati et al., 2019) membuktikan bahwa senyawa flavonoid dapat berperan sebagai inhibitor α -amilase.

Rasulullah saw., memerintahkan umatnya untuk berobat apabila ia terkena penyakit sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw., bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

“ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha` bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga “ (Al-Bukhari, 2010).

Dari hadist di atas dengan jelas menjelaskan bahwa Allah *swt.* tidak hanya menciptakan penyakit, tetapi juga memberikan obatnya. Sebagai manusia yang diberi akal pikiran, seharusnya kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran-Nya melalui hadis tersebut. Allah *swt.* telah menyediakan berbagai sumber daya di bumi yang melimpah yang bisa dijadikan alternatif pengobatan jika seseorang mengalami suatu penyakit, misalnya tumbuh-tumbuhan (Rimpang lempuyang gajah).

Berdasarkan hadist di atas disimpulkan bahwa Allah *swt.* akan menurunkan setiap obat untuk setiap penyakit dan akan menyembuhkan siapa yang dikehendakinya. Berhubungan dengan penelitian ini yaitu penemuan potensi obat baru dari tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita, yakni rimpang lempuyang gajah sebagai

antidiabetes. Selain itu juga diharapkan bahwa akan ada obat baru yang memiliki potensi penyembuhan yang baik dengan efek samping yang minimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki kemampuan menghambat enzim α -amilase.
2. Fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah memiliki nilai IC_{50} sebesar 128,035 $\mu\text{g/mL}$, fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah memiliki nilai IC_{50} sebesar 122,276 $\mu\text{g/mL}$ dan kontrol positif acarbose memiliki nilai IC_{50} sebesar 45,168 $\mu\text{g/mL}$. Berdasarkan tingkat kekuatan inhibisi enzim α -amilase, nilai IC_{50} fraksi n-heksan dan fraksi etil asetat termasuk dalam kategori sedang sedangkan kontrol positif acarbose termasuk kategori sangat kuat.

B. Saran

Disarankan isolasi senyawa hasil fraksinasi sehingga didapatkan senyawa murni yang memiliki aktivitas penghambatan enzim α -amilase pada penelitian selanjutnya dengan menggunakan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sebagai obat antidiabetes.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, R., Kusmiyanti, & Merta, W. J. (2016). Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Sirih Merah (*Piper Crocatum*) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Mencit (*Mus musculus*). *Jurnal Biologi Tropis*, 16(1), 49–55. <https://doi.org/10.29303/jbt.v16i1.216>
- Ahmad, N. 'Uyun, Mad Nordin, M. F., Mokhtar, N., Mohamad Abdul Wahab, I., Mohamad, M., Ka Liong, T., & Mohd Amir, S. N. K. (2023). *Zingiber Zerumbet: Pharmacological Values of Zerumbone and the Extraction Technology Evolution*. *Jurnal Teknologi*, 85(2), 21–30. <https://doi.org/10.11113/jurnalteknologi.v85.18913>
- Al-Bukhari, M. bin I. (2010). *Shahih Bukhari (e-book version)*. www.ibnumajjah.com
- Al-Sheikh, D. A. bin M. bin A. bin I. (1994). Kitab tafsir ibnu katsir jilid 1. In *منشورات جامعة دمشق* (Vol. 1999, Issue December, pp. 1–6).
- Alfiani, L. A. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -amilase oleh Ekstrak Herba Ciplukan (*Physalis Angulate* L) Secara In Vitro. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 335–346. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049485>
- Ariandi. (2016). Pengenalan enzim amilase (alpha-amylase) dan reaksi enzimatisnya menghidrolisis amilosa pati menjadi glukosa. *Jurnal Dinamika*, 7(1), 74–82. <https://doi.org/issn 2087-7889>
- Aribowo, A. ., Lubis, C. ., Urbanigrum, L. ., Rahmawati, N. ., & Anggraini, S. (2021). Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Pada Tanaman. *Health Sains p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398*, 2(6), 6.
- Atikawati, Kusumawati, I. G. A. W., Putra, I. M. W. A., & Yogeswara, I. B. A. (2019). Aktivitas Antioksidan dan Penghambatan Enzim α -amilase Ekstrak Air Kombinasi Daun Papasan (*Coccinia grandis* [L .]) dan Daun Sembung (*Blumea balsamifera* [L .] DC). *Journal Media Sains, Vol No 3, 3*(September), 49–56. <http://journals.ums.ac.id/index.php/pharmacon>
- Berg, B., Cortazar, B., Tseng, D., Ozkan, H., Feng, S., Wei, Q., Chan, R. Y. L., Burbano, J., Farooqui, Q., Lewinski, M., Di Carlo, D., Garner, O. B., & Ozcan, A. (2015). *Cellphone-Based Hand-Held Microplate Reader for Point-of-Care Testing of Enzyme-Linked Immunosorbent Assays*. *ACS Nano*, 9(8), 7857–7866. <https://doi.org/10.1021/acsnano.5b03203>
- Budianto, N., & Hairullah. (2017). Perbedaan Efektivitas Acarbose dengan Ekstrak Etanol Kulit Terong Ungu (*Solanum melongena* L) terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) yang Diinduksi Sukrosa. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 6(2), 14–20.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai Sumber Saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri*, 7(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07>
- Characteristicsl, P., Larsson, G., & Starrin, B. (2008). World Health Organization. *Maintenance Manual for Laboratory Equipment 2nd Edition*, 2(3), 172.

- Chaudhuri, A., Sharma, S., & Khan, F. (2018). An Overview on the Advances of *Zingiber zerumbet*. *Pharmaceutical and Biosciences Journal*, 6(5), 24–27. <https://doi.org/10.20510/ukjpb/6/i5/177346>
- de Sales, P. M., de Souza, P. M., Simeoni, L. A., Magalhães, P. de O., & Silveira, D. (2012). α -amylase inhibitors: A review of raw material and isolated compounds from plant source. *Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 15(1), 141–183. <https://doi.org/10.18433/j35s3k>
- DEPKES RI. (2005). Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Diabetes Mellitus. *Departemen Kesehatan RI*, 1–89.
- Dewatisari, W. F. (2020). Perbandingan Pelarut Kloroform dan Etanol terhadap Rendaman Ekstrak Daun Lidah Mertua (*Sansevieria trifasciata prain.*) Menggunakan Metode Maserasi. *Jurnal Biologi, Fakultas Sains Dan Teknologi, UIN Alaudin Makassar, September*, 128–132. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb/>
- Dilla, A. A. F., Pusparini, W. R., & Kurniawan, M. A. (2019). Ekstraksi Dispersium (Dy) Pada Konsentrat Itrium Dalam Keasaman Klorida Menggunakan Cyanex 572. *Indonesian Journal of Chemical Research*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.20885/ijcr.vol3.iss2.art4>
- Dinnar Latiefah, N. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim Alfa Amilase Ekstrak dan Fraksi Daun Binahong Merah (*anredera cordifolia* (ten.) Steenis). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(10), 1361–1376. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i10.718>
- Dirir, A. M., Daou, M., Yousef, A. F., & Yousef, L. F. (2022). A review of alpha-glucosidase inhibitors from plants as potential candidates for the treatment of type-2 diabetes. *Phytochemistry Reviews*, 21(4), 1049–1079. <https://doi.org/10.1007/s11101-021-09773-1>
- Doloking, H., Amalia, R., & Pratama, A. A. (2022). Antioxidant Activity Study of *Zingiber Zerumbet* Rhizome Extract and Fraction. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 5(2), 43-52 6973. <https://doi.org/ISSN 2654-6973>
- Fatmawati, E., Kimia, D., & Suparto, H. (2011). Ekstrak Etanol Daun Salam Dan Fraksinya Sebagai Inhibitor Alfa-Amilase. In *skripsi*. Institut Pertanian Bogor.
- Fuwa, H. (1954). A New Method For Microdetermination Modified Method Of That Described By Mc Cready. *J. Biochem.*, 41(5), 583–603. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jbchem.a126476>
- G. Katzung, B., B. Masters, S., & J. Trevor, A. (2012). *Basic and Clinical Pharmacology 12 tenth edition*. In *Annual Reports in Medicinal Chemistry* (Vol. 12, Issue C). [https://doi.org/10.1016/S0065-7743\(08\)61545-6](https://doi.org/10.1016/S0065-7743(08)61545-6)
- Gaspersz, N., Fransina, E. G., & Ngarbingan, A. R. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Amilase dan Glukoamilase dari Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.). *Jurnal Kimia Mulawarman*, 19(2), 51. <https://doi.org/10.30872/jkm.v19i2.1120>
- Hardianto, D. (2021). Telaah Komprehensif Diabetes Melitus: Klasifikasi, Gejala, Diagnosis, Pencegahan, Dan Pengobatan. *Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBi)*, 7(2), 304–317. <https://doi.org/10.29122/jbbi.v7i2.4209>

- Harvey, R. A., & Ferrier, D. R. (2012). *Glycosaminoglycans, Proteoglycans, and Glycoproteins*. In *Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry*.
- Hasanah, N., & Novian, D. R. (2020). Analisis Ekstrak Etanol Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata D.). *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 9(1), 54–59.
- Hestiana, D. W. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Dalam Pengelolaan Diet Pada Pasien Rawat Jalan Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Kota Semarang. *Jurnal of Health Education*, 2(2), 138–145. <https://doi.org/10.1515/labmed-2018-0016>
- Hujjatusnaini, N., Ardiansyah, Indah, B., Afritri, E., & Widyastuti, R. (2021). Ekstraksi. In *Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*.
- Husin, M. D., & Widjaja, E. A. (1987). Bukti Anatomi dalam Kerabat-kerabat Zingiber zerumbet. *Floribunda*, 1(1), 1–4.
- IDF. (2021). Diabete Atlas 10th Edition. In *Diabetes Research and Clinical Practice* (Vol. 102, Issue 2). <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2013.10.013>
- Irawati, R. (2016). Karakterisasi pH, Suhu dan Konsentrasi Substrat pada Enzim Selulase Kasar yang Diproduksi Oleh Bacillus circulans. In *Skripsi*.
- Kemdikbud. (2018). Buku Informasi Melaksanakan Analisa Secara Kromatografi Konvensional Mengikuti Prosedur. In *Kemdikbud* (Issue 9).
- Kementerian Agama, S. A. (2019). Al-Qur'an al-karim dan terjemahannya. In *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd* (p. 1281).
- Koga, A. Y., Beltrame, F. L., & Pereira, A. V. (2016). Several aspects of Zingiber zerumbet: A review. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 26(3), 385–391. <https://doi.org/10.1016/j.bjp.2016.01.006>
- Lal, V. K., Pandey, A., Tripathi, P., & Pandey, R. D. (2010). Insignificant antidiabetic activity of rhizome of Zingiber zerumbet. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1(2), 58–60. <https://doi.org/10.4103/0976-9234.75707>
- Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *UIN Alauddin Makassar, November*, 237–241. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/psb>
- Lianah. (2019). Biodiversitas Zingiberaceae. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April).
- Muhammad, A. A. (2018). Resistensi Insulin Dan Disfungsi Sekresi Insulin Sebagai Faktor Penyebab Diabetes Melitus tipe 2. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 173–178. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM/article/view/631/504>
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *J. Kesehatan*, VII(2), 361–367. <https://doi.org/10.1007/s11293-018-9601-y>
- Nik Norulaini, N. A., Anuar, O., Omar, A. K. M., AlKarkhi, A. F. M., Setianto, W. B., Fatehah, M. O., Sahena, F., & Zaidul, I. S. M. (2009). Optimization of SC-CO₂ extraction of zerumbone from Zingiber zerumbet (L) Smith. *Food Chemistry*, 114(2), 702–705. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.09.075>

- Oboh, G., Ademiluyi, A. O., & Faloye, Y. M. (2011). *Effect of combination on the antioxidant and inhibitory properties of tropical pepper varieties against α -Amylase and α -glucosidase activities in Vitro*. *Journal of Medicinal Food*, 14(10), 1152–1158. <https://doi.org/10.1089/jmf.2010.0194>
- Pambudi, D. B., Fajriyah, N. N., & Maharisti, R. A. (2021). Uji Aktivitas Penghambatan α -Amylase Pada Ekstrak Etanol Daun Adas (*Foeniculum vulgare* Mill.) Menggunakan Elisa Reader. *Urecol Journal. Part C: Health Sciences*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.53017/ujhs.1>
- Pangaribuan, J. J. (2016). Mendiagnosis Penyakit Diabetes Melitus dengan Menggunakan Metode Extreme Learning Machine. *Jurnal Riset Informatika*, 2(2), 32–40. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/isd/article/view/24>
- Podungge Ramadhan, M., Salimi K, Y., & Duengo, S. (2017). Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan senyawa Flavonoid dari Daun Miana (*Coleus Scutelleroides* Benth.). *Jurnal Entropi*, 1(1), 67–74.
- Prahesti, D. A., Pujiyanti, S., & Rukmi, M. I. (2018). Isolasi, Uji Aktivitas, dan Optimasi Inhibitor α -Amilase Isolat Kapang Endofit Tanaman Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). *Jurnal Biologi*, 7(1), 43–51.
- Prayudo, A., Novian, O., Setyadi, & Antaresti. (2015). Koefisien Transfer Massa Kurkumin Dari Temulawak. *Jurnal Ilmiah Widya Teknik*, 14(1), 26–31.
- Prihatiningsih, M. C., Hidayat, R. N., & Setiawan, D. (2017). Pemisahan Renium-188 Dari Sasaran Wolfram-188 Dengan Metode Ekstraksi Menggunakan Peetil Metil Etil Keton. *Jurnal Forum Nuklir*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.17146/jfn.2016.10.1.3491>
- Primada Hari Anugrahini, C., & Sri Wahyuni, A. (2021). Narrative Review : Aktivitas Antidiabetes Tanaman Tradisional Di Pulau Jawa. *Jurnal Farmasi Indonesia. Edisi Khusus (Rakerda-Seminar IAI Jateng)*, 120–131. <http://journals.ums.ac.id/index.php/pharmacon>
- Purwani, N. N. (2018). Enzim : Aplikasi di Bidang Kesehatan Sebagai Agen Terapi. *QUANTUM: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains*, 9(2), 168–176.
- Purwati, R. A. (2022). Uji Aktivitas Antidiabetes Fraksi N-Heksan Dan Etil Asetat Dari Daun Areuy Kikunti Secara Invitro. *Jurnal Health Sains*, 3(2), 263–268. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Putra, W. A., Diharmi, A. R., & Karnila, R. (2021). Aktivitas Ekstrak Kasar Enzim Kolagenase dari Organ Dalam Ikan Malong (*Congresox talabon*) pada pH Berbeda. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pertanian Indonesia*, 13(1), 27–30. <https://doi.org/10.17969/jtipi.v13i1.18587>
- Rahayu, I. D., Widodo, W., Prihartini, I., & Winaya, A. (2019). *Antibacterial activity of ethanolic extracts from Zingiber zerumbet rhizome against Salmonella spp.* *Biodiversitas*, 20(11), 3322–3327. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d201127>
- Rahmasari, I., & Wahyuni, E. S. (2019). *Efektivitas memordoca carantia (pare) terhadap penurunan kadar glukosa darah 1,2*. 9(1), 57–64.
- Ramadhani, F. (2018). Uji Aktivitas Penghambatan α -Amilase Secara In Vitro Ekstrak Akar Durian (*Durio zibethinus*). In *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.

- Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss. *IJMS-Indonesian Journal On Medical Science*, 4(2), 232–236. <http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/122>
- Riwanti, P., Izazih, F., & Amaliyah, A. (2018). Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Etanol pada Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 50,70 dan 96% *Sargassum polycystum* dari Madura. *Journal of Pharmaceutical-Care Anwar Medika*, 2(2), 35–48. <https://doi.org/10.36932/jpcam.v2i2.1>
- Rohmah, J., Setiyo Rini, C., Indah Nila Asri, N., & Krisdianti, R. (2022). *Antibacterial Activity of Rhizome Extracts of Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Against Streptococcus pneumoniae. Procedia of Social Sciences and Humanities*, 0672, 1007–1016. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Rosidah, I., Bahua, H., Mufidah, R., & Pongtuluran, O. B. (2015). Pengaruh Kondisi Proses Ekstraksi Batang Brotowali (*Tinospora crispa* (L.) Hook.f & Thomson) Terhadap Aktivitas Hambatan Enzim Alfa Glukosidase. *Media Litbangkes*, 25(4), 203–210. <https://doi.org/10.22435/mpk.v25i4.4586.203-210>
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). Penggunaan metode ekstraksi maserasi dan partisi pada tumbuhan cocor bebek (*kalanchoe pinnata*) dengan kepolaran berbeda. *Fullerene Journal of Chemistry*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.37033/fjc.v3i1.26>
- Sariyem, Sadimin, Sunarjo, L., & Haniyati, M. (2015). Efektifitas Ekstrak Daun Sukun Hasil Perebusan Terhadap Pertumbuhan Koloni Bakteri *Streptococcus Mutans* Sariyem □ 1 , Sadimin 2 , Lanny Sunarjo 3 , Makhyatun Haniyati 4. *Jurnal Kesehatan Gigi Vol.02 No.2, 02(2)*.
- Shihab, D. M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an.” In *Lentera Hati* (Vol. 10, Issue jakarta).
- Shihab, Q. (2011). *Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* (p. Volume 8).
- Shihab, Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah “Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an”* (p. Vol.14).
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 49–62.
- Soelistijo, S. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. *Global Initiative for Asthma*, 46. www.ginasthma.org.
- Sudarwati Lestari Puji, T., & Fernanda Ferry, H. (2017). Aplikasi Pemanfaatan Daun Pepaya (*Carica papaya*) sebagai Biolarv Asuda terhadap Larva *Aedes aegypti*. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Sundarram, A., & Murthy, T. P. K. (2014). α -Amylase Production and Applications : A Review. *Journal of Applied & Environmental Microbiology*, 2(4), 166–175. <https://doi.org/10.12691/jaem-2-4-10>
- Supriyatna, A., Amalia, D., Jauhari Agustini, A., & Holydaziah, D. (2015). Aktivitas Enzim Amilase, Lipase, dan Protease dari Larva. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 9(2), 18–32.


<https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v8i3.6762>

- Timerman, A. P. (2012). *The Isolation of Invertase from Baker's Yeast – An Introduction to Protein Purification Strategies*. In R. Ahmad (Ed.), *Protein Purification* (Issues 978-953-307-831-1). InTech. <https://doi.org/10.5772/27543>
- Tzeng, T., Liou, S., Chang, C. J., & Liu, I. (2013). *The Ethanol Extract of Zingiber zerumbet Attenuates Streptozotocin Induced Diabetic Nephropathy in Rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–8.
- Wahyuni, S. (2017). Biokimia Enzim dan Karbohidrat. In Eriyanto (Ed.), *Unimal Press*. www.unimal.ac.id/unimalpress.
- Wahyuni, S., Bermawie, N., & Kristina Nova, N. (2013). Karakteristik Morfologi, Potensi Produksi Dan Komponen Utama Rimpang Sembilan Nomor Lempuyang Wangi. *Jurnal Litri*, 19(3), 99–107. <https://doi.org/10.21082/jlitri.v19n3.2013.99-107>
- Watcharachaisoponsiri, T., Sornchan, P., Charoenkiatkul, S., & Suttisansanee, U. (2016). *The α -glucosidase and α -amylase inhibitory activity from different chili pepper extracts. International Food Research Journal*, 23(4), 1439–1445.
- Wulandari, L. (2011). Kromatografi Lapis Tipis. In *Taman Kampus Presindo*. PT Taman Kampus Presindo.
- Zakaria, Z. A., Yob, N. J., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., & Salleh, M. Z. (2011). *Zingiber zerumbet (L.) Smith: A review of its ethnomedicinal, chemical, and pharmacological uses. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2011/543216>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Lampiran 1. Skema Kerja

A. Preparasi Sampel





B. Ekstraksi Sampel







C. Fraksinasi N-heksan






D. Fraksinasi Etil Asetat







E. Pembuatan Larutan Uji

a. Pembuatan larutan buffer fosfat pH 6,8




b. Pembuatan larutan enzim







c. Pembuatan larutan pati kanji




d. Pembuatan seri konsentrasi fraksi n-heksan




e. Pembuatan seri konsentrasi fraksi etil asetat




f. Pembuatan seri konsentrasi acarbose




g. Pembuatan larutan baku NaOH 2 N



h. Pembuatan larutan Asam Dinitrosalisilat (DNSA)



F. Uji Penghambatan Enzim α -amilase



Lampiran 2. Perhitungan Rendemen Ekstraksi dan Fraksinasi

A. Perhitungan Rendemen Ekstraksi

Dihitung persentase rendemen ekstrak etanol hasil masertasi:

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat ekstrak}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = \frac{34 \text{ gram}}{600 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = 5,66\%$$

B. Perhitungan Rendemen Fraksinasi

Dihitung persentasi rendemen fraksi larut n-heksan dan etil asetat dalam ekstrak etanol hasil maserasi;

1. Fraksi n-heksan

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat fraksi}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = \frac{3,82 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = 19,10\%$$

2. Fraksi etil asetat

$$\% \text{ rendemen} = \frac{\text{berat fraksi}}{\text{berat sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = \frac{2,57 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$\% \text{ rendemen} = 12,85\%$$

*Lampiran 3. Data Absorbansi***Tabel 6.** Blanko dan Kontrol Blanko

Blanko	Kontrol Blanko
0,679	0,043

Tabel 7. Acarbose

Konsentrasi	Absorbansi
20 ppm	0,501
40 ppm	0,417
60 ppm	0,325
80 ppm	0,247
100 ppm	0,201

Tabel 8. Kontrol Acarbose

Konsentrasi	Absorbansi
20 ppm	0,04
40 ppm	0,077
60 ppm	0,082
80 ppm	0,139
100 ppm	0,162

Tabel 9. Sampel Fraksi N-heksan

Konsentrasi	Absorbansi
100 ppm	0,395
200 ppm	0,322
300 ppm	0,280
400 ppm	0,233
500 ppm	0,152

Tabel 10. Kontrol Sampel Fraksi N-heksan

Konsentrasi	Absorbansi
100 ppm	0,05
200 ppm	0,072

300 ppm	0,091
400 ppm	0,111
500 ppm	0,125

Tabel 11. Sampel Fraksi Etil Asetat

Konsentrasi	Absorbansi
100 ppm	0,392
200 ppm	0,341
300 ppm	0,244
400 ppm	0,210
500 ppm	0,182

Tabel 12. Kontrol Sampel Fraksi Etil Asetat

Konsentrasi	Absorbansi
100 ppm	0,044
200 ppm	0,073
300 ppm	0,085
400 ppm	0,102
500 ppm	0,133

Lampiran 4. Perhitungan % Inhibisi dan Nilai IC_{50}

A. Perhitungan % Inhibisi Enzim α -amilase

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{A_c - A_s}{A_c} \times 100\%$$

1. % Inhibisi Fraksi N-heksan

- 100 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679 - 0,043) - (0,395 - 0,050)}{(0,679 - 0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636 - 0,345}{0,636} \times 100\%$$

$$= 45,75\%$$

- 200 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679 - 0,043) - (0,322 - 0,072)}{(0,679 - 0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,250}{0,636} \times 100\%$$

$$= 60,69\%$$

- 300 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,280-0,091)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,189}{0,636} \times 100\%$$

$$= 70,28\%$$

- 400 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,233-0,111)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,122}{0,636} \times 100\%$$

$$= 80,82\%$$

- 500 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,152-0,125)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,027}{0,636} \times 100\%$$

$$= 95,75\%$$

2. % Inhibisi Fraksi Etil Asetat

- 100 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,392-0,044)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,348}{0,636} \times 100\%$$

$$= 45,28\%$$

- 200 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi} &= \frac{(0,679-0,043)-(0,341-0,073)}{(0,679-0,043)} \times 100\% \\ &= \frac{0,636-0,268}{0,636} \times 100\% \\ &= 57,86\% \end{aligned}$$

- 300 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi} &= \frac{(0,679-0,043)-(0,244-0,085)}{(0,679-0,043)} \times 100\% \\ &= \frac{0,636-0,159}{0,636} \times 100\% \\ &= 75,00\% \end{aligned}$$

- 400 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi} &= \frac{(0,679-0,043)-(0,210-0,102)}{(0,679-0,043)} \times 100\% \\ &= \frac{0,636-0,108}{0,636} \times 100\% \\ &= 83,02\% \end{aligned}$$

- 500 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi} &= \frac{(0,679-0,043)-(0,182-0,113)}{(0,679-0,043)} \times 100\% \\ &= \frac{0,636-0,069}{0,636} \times 100\% \\ &= 89,15\% \end{aligned}$$

3. % Inhibisi Kontrol Positif Acarbose

- 20 ppm

$$\begin{aligned} \% \text{ inhibisi} &= \frac{(0,679-0,043)-(0,501-0,040)}{(0,679-0,043)} \times 100\% \\ &= \frac{0,636-0,461}{0,636} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 27,52\%$$

- 40 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,417-0,077)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,340}{0,636} \times 100\%$$

$$= 46,54\%$$

- 60 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,325-0,082)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,243}{0,636} \times 100\%$$

$$= 61,79\%$$

- 80 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,247-0,139)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$= \frac{0,636-0,108}{0,636} \times 100\%$$

$$= 83,02\%$$


- 100 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043)-(0,201-0,162)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$


$$= \frac{0,636-0,039}{0,636} \times 100\%$$

$$= 93,87\%$$


4. Kurva



Gambar 9. Kurva fraksi n-heksan rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



Gambar 10. Kurva fraksi etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



Gambar 11. Kurva kontrol positif acarbose

B. Perhitungan Nilai IC₅₀

1. Fraksi N-heksan

$$y = 0,1201x + 34,623$$

Dik:

$$y = 50$$

$$a = 34,623$$

$$b = 0,1201x$$

$$y = bx + a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{50-34,623}{0,1201}$$

$$x = 128,035$$

2. Fraksi Etil Asetat

$$y = 0,1129x + 36,195$$

Dik: $y = 50$

$$a = 36,195$$

$$b = 0,1129x$$

$$y = bx + a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{50-36,195}{0,1129}$$

$$x = 122,276$$

3. Kontrol Positif Acarbose

$$y = 0,8459x + 11,792$$

Dik: $y = 50$

$$a = 11,792$$

$$b = 0,8459x$$

$$y = bx + a$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{50-11,792}{0,8459}$$

$$x = 45,168$$

Lampiran 5. Gambar Penelitian




Gambar 12. Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)



Gambar 13. Penimbangan dan Blender Sampel



Gambar 14. Ekstraksi dengan Metode Maserasi



Gambar 15. Penyaringan hasil maserasi



Gambar 16. Penggunaan Rotary Evaporator untuk emekatkan Ekstrak



Gambar 17. Ekstrak Kental Etanol 70% Hasil Maserasi



Gambar 18. Proses Pelarutan Ekstrak Kental ke Aquades



Gambar 19. Proses Fraksinasi Aquades dan N-heksan



Gambar 20. Proses Fraksinasi Aquades dan Etil Asetat



Gambar 21. Ekstrak Pekat N-heksan Hasil Fraksinasi



Gambar 22. Ekstrak Pekat Etil Asetat Hasil Fraksinasi





Gambar 23. Pembuatan Larutan Pengujian Aktivitas Enzim α -amilase



Gambar 24. Pengujian Aktivitas Enzim α -amilase Dengan *Microplate reader*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Maylinda Yunhi Asmarani akrab disapa Yunhi, lahir di Laikang pada Tanggal 13 Mei 2001, anak pertama dari 2 bersaudara. Buah kasih pasangan dari Ayahanda Hadiyuddin, S.Sos dan Ibunda Nuraeni S.Pd.I. Penulis memulai Pendidikannya tepat pada umur 4 Tahun selama 3 Tahun dan penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) pada MI DDI Laikang pada Tahun 2008 dan selesai pada Tahun 2013 pada Tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTsN Negeri Pangkep dan selesai pada Tahun 2016, dan pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN Pangkep, penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai pada Tahun 2019. Penulis Kembali melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Farmasi.

Penulis memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya yaitu berjuanglah terus menerus karena hal tersebut adalah cara untuk berkembang. Penulis berharap untuk kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik, sukses serta diberikan kemudahan dalam mencapai cita-cita yaitu sebagai seorang Apoteker.