

**UJI AKTIVITAS HIPNOTIK SEDATIF EKSTRAK ETANOL 70% DAUN  
ANAK DARA (*Croton oblongus* Burm F.) PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh :**

**NUR AULYA RAMADHANI**

**70100119039**

**JURUSAN FARMASI**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Aulya Ramadhani  
NIM : 70100119039  
Tempat/ Tanggal Lahir : Makassar, 30 November 2001  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Komp. Hasanuddin Blok F.24  
Judul : “ Uji Aktivitas Hipnotik Sedatif Ekstrak Etanol 70 % Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Pada Mencit (*Mus musculus*)”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gowa, 03 Oktober 2023

Penyusun



**NUR AULYA RAMADHANI**

**NIM : 70100119039**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Uji Aktivitas Hipnotik Sedatif Ekstrak enaol 70% daun Anak Dara (Croton Oblongus Burm F.) Pada Mencit (Mus musculus)*” yang disusun oleh **Nur Aulya Ramadhani**, NIM : **70100119039**, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 03 Oktober 2023 M** yang bertepatan dengan **17 Rabiul Awal 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 03 Oktober 2023 M  
17 Rabiul Awal 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm., Klin.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Asriyah, M.Pd.I.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes.**  
NIM: 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Uji aktivitas hipnotik sedatif ekstrak etanol 70% daun anak dara (*Croton Oblongus* Burm F.)”. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Namun berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya kepada kedua orang tua yang sangat berjasa serta turut andil dalam hidup penulis yaitu Bapak Achmad Nabohan dan Ibu Yani yang berperan besar dalam memberikan kasih sayang, doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh keluarga terkhusus kepada saudara saya Nur Arsyla dan Muh Asqari berperan besar juga dalam proses penulis dari awal kuliah hingga sampai pada penulisan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan dengan sepenuh hati kepada bapak/ibu:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M. A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Andi Aderus, Lc., M. Ag. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.Og., M. Kes. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. apt Isriany Ismail, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr.H. M. Fais Sartinegara, S.KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. apt. Muh Rusdi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. apt. Khaerani, S.Farm, M.Farm.Klin. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan penguji kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang membangun terkait skripsi ini.
11. apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si. selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan semangat serta meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu beserta pikiran untuk membimbing penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini serta tak henti-hentinya dalam memberikan semangat.

13. Indah, S.Farm, M.Si sebagai penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik maupun penelitian ini.
14. Dr. Asriyah, M.Pd.I selaku penguji agama yang banyak memberikan saran dan arahan yang baik dalam mengoreksi kekurangan skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang juga berperan besar dalam mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi.
16. Teruntuk teman teman ciwit terima kasih atas dukungan serta semangat yang selalu diberikan kepada pada penulis, teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir.
17. Keluarga besar INTERFERON terimakasih atas kerja samanya selama ini serta semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Tujuan Penelitian .....	15
G. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Uraian Tumbuhan Anak Dara.....	16
B. Ekstraksi.....	18
C. Fisiologi Sistem Saraf.....	20
D. Fisiologi Tidur .....	22
E. Insomnia.....	23
F. Hipnotik Sedatif.....	23
G. Obat Golongan Depresan .....	27
H. Dosis Penggunaan.....	32
I. Pengujian Hipnotik Sedatif .....	33
J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40

C. Sampel.....	40
D. Alat dan Bahan.....	41
E. Cara Kerja.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Hasil Ektstrak Daun Anak Dara.....	47
2. Skrining Fitokimia .....	47
3. Hasil Uji Aktivitas Hipnotik .....	48
4. Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik.....	49
5. Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik.....	49
6. Hasil Uji Aktivitas Sedatif .....	50
7. Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif.....	51
8. Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif.....	51
B. Pembahasan.....	52
1. Hasil Uji Aktivitas Hipnotik .....	57
2. Hasil Uji Aktivitas Sedatif .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>89</b>






## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Tumbuhan Anak Dara ( <i>Croton oblongus</i> Burm F.) .....	16
<b>Gambar 2.</b> Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik .....	49
<b>Gambar 3.</b> Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif .....	49
<b>Gambar 4.</b> Hasil Ekstrak .....	80
<b>Gambar 5.</b> Fenolik .....	80
<b>Gambar 6.</b> Flavonoid .....	81
<b>Gambar 7.</b> Saponin .....	81
<b>Gambar 8.</b> Tanin .....	81
<b>Gambar 9.</b> Steroid .....	82
<b>Gambar 10.</b> Terpenoid .....	82
<b>Gambar 11.</b> Alkaloid .....	83
<b>Gambar 12.</b> Alat Traction Test .....	83
<b>Gambar 13.</b> Adaptasi Mencit Pada Alat Traction Test.....	84
<b>Gambar 14.</b> Pengujian Balik Badan Mencit .....	84
<b>Gambar 15.</b> Pengujian Waktu Jatuh Mencit.....	84

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Hasil Ekstrak Daun Anak Dara.....	47
<b>Tabel 2.</b> Hasil Skrining Fitokimia.....	47
<b>Tabel 3.</b> Hasil Uji Aktivitas Hipnotik.....	48
<b>Tabel 4.</b> Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik.....	49
<b>Tabel 5.</b> Hasil Uji Aktivitas Sedatif.....	51
<b>Tabel 6.</b> Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif.....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Skema Kerja.....	66
<b>Lampiran 2.</b> Perhitungan % Rendamen.....	67
<b>Lampiran 3.</b> Uji Skrining Fitokimia.....	68
<b>Lampiran 4.</b> Skema Kerja Pembuatan Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara ( <i>Croton oblongus</i> Burm F.).....	75
<b>Lampiran 5.</b> Pengujian Traction Test.....	76
<b>Lampiran 6.</b> Perhitungan Dosis.....	77
<b>Lampiran 7.</b> Hasil ANOVA dilanjutkan Post Hoc Duncan Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara ( <i>Croton oblongus</i> Burm F.).....	79
<b>Lampiran 8.</b> Hasil ANOVA dilanjutkan Post Hoc Duncan Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara ( <i>Croton oblongus</i> Burm F.).....	80
<b>Lampiran 9.</b> Dokumentasi.....	81

## ABSTRAK

**Nama : Nur Aulya Ramadhani**  
**Nim : 70100113039**  
**Judul : “Uji Aktivitas Hipnotik Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) Pada Mencit (*Mus musculus*).”**

---

---

Gangguan tidur yang umum terjadi adalah insomnia, yang terjadi saat seseorang mengalami kesulitan tidur. Salah satu cara untuk mengatasi insomnia adalah dengan memberikan obat hipnotik sedatif. Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat tradisional adalah Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas Hipnotik Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) pada Mencit (*Mus musculus*). Penelitian ini dilakukan dengan metode ekstraksi secara maserasi. Pemberian pada mencit secara oral dan mengamati reflek balik badan, waktu balik badan dan waktu jatuh menggunakan alat *Traction Test* dengan menggunakan 15 ekor mencit dan dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok I (kontrol positif) Diazepam (2 mg/KgBB), kelompok II (kontrol negatif) Na CMC 0,5%, kelompok III (1 mg/KgBB), IV (2 mg/KgBB), V (4 mg/KgBB) ekstrak etanol daun anak dara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ekstrak etanol daun anak dara dengan dosis 4mg/KgBB dapat menimbulkan efek hipnotik dan pada dosis 4 mg/KgBB dapat menimbulkan efek sedatif. Kemudian untuk Uji efek hipnotik sedatif tiap kelompok dianalisis secara statistik menggunakan metode uji *Post-Hoc Duncan* SPSS. Pada hasil uji statistik One Way ANOVA menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan antara kelompok perlakuan dengan nilai  $P=0.001$  ( $P<0,05$ ). Pada uji *Post-Hoc Duncan* Kelompok II tidak berbeda nyata dengan diazepam, Kelompok IV dan V mempunyai efek hipnotik sedatif yang sama dengan diazepam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun anak dara dapat memberikan efek hipnotik sedatif.

**Kata kunci :** *Croton oblongus*, Diazepam, Hipnotik sedatif, *Traction test*

## ABSTRACT

**Nama** : Nur Aulya Ramadhani  
**Nim** : 70100113039  
**Judul** : “Test of Sedative Hypnotic Activity of 70% Ethanol Extract of Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) In mice (*Mus musculus*).”

---

---

A common sleep disorder is insomnia, which occurs when a person has difficulty sleeping. One way to overcome insomnia is to give sedative hypnotic drugs. One of the plants used as a traditional medicinal ingredient is the Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). This study aims to determine the activity of Sedative Hypnotic Extract of 70% Ethanol Extract of Virgin Leaves (*Croton oblongus* Burm F.) in Mice (*Mus musculus*). This research is carried out by maceration extraction method. Giving mice orally and observing body reverse reflexes, body turning time and falling time using a *Traction Test* tool using 15 mice and divided into 5 groups. Group I (positive control) Diazepam (2 mg/KgBB), group II (negative control) Na CMC 0.5%, group III (1 mg/KgBB), IV (2 mg/KgBB), V (4 mg/KgBB) ethanol extract Anak Dara. The results of this study showed that ethanol extract of virgin leaves at a dose of 4mg / KgBB can cause hypnotic effects and at doses of 4 mg / KgBB can cause sedative effects. Then for the sedative hypnotic effect test, each group was analyzed statistically using *the Duncan SPSS Post-Hoc* test method. The results of the One Way ANOVA statistical test showed a significant difference between the treatment groups with a value of  $P = 0.001$  ( $P < 0.05$ ). In Duncan's Post-Hoc Test Groups II significantly different from diazepam, Groups IV and V had the same sedative hypnotic effect as diazepam. So it can be concluded that ethanol extract of Anak Dara can provide a sedative hypnotic effect.



**Keywords:** *Croton oblongus*, Diazepam, Sedative hypnotic, *Traction test*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Salah satu hal penting dalam upaya menjaga kesehatan adalah cukupnya waktu istirahat atau tidur. Apabila kebutuhan seseorang akan tidur ini tidak terpenuhi, maka beberapa dampak yang bisa terjadi yaitu kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, membuat keputusan, serta melakukan kegiatan sehari-harinya akan menurun (Rahmah, 2016).

Tidur merupakan keadaan hilangnya kesadaran secara normal dan periodik, diperoleh kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuh baik secara fisiologis maupun psikis dan dianggap sebagai suatu perlindungan tubuh untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh yang merugikan kesehatan akibat kurang tidur (insomnia) (Katingan, 2022).

Tidur terjadi dalam siklus yang diselingi periode terjaga. Siklus tidur/terjaga umumnya mengikuti irama Circadian atau 24 jam dalam siklus siang/malam. Kebanyakan orang terjaga dan sibuk di siang hari dan tidur di malam hari (Vaughans, 2013).

Tidur merupakan aktivitas otak yang dikondisikan oleh rangsangan dari hipotalamus, bagian dari diencephalon dan formatio retikuler (Houssay, 1995). Peningkatan aktivitas saraf-saraf parasimpatis terjadi pada keadaan tidur yang menyebabkan tekanan darah menurun, nadi lambat, pernafasan menurun, suhu tubuh menurun, gerak usus lebih aktif, kebanyakan otot menjadi istirahat dan secara umum terjadi pada keadaan tidur yang menyebabkan tekanan darah menurun, nadi lambat, pernafasan menurun, suhu tubuh menurun, gerak usus lebih aktif, kebanyakan otot menjadi istirahat dan secara umum.

Patofisiologi tidur dimana Reseptor GABA merupakan target penting untuk komponen hipnotik-sedatif. GABA merupakan suatu mediator yang dapat mengaktivasi terjadinya inhibisi neuron sehingga aktivitas saraf untuk menghantarkan rangsangan terganggu. GABA yang dilepaskan dari terminal saraf akan terikat pada reseptor GABA, pengikatan ini menyebabkan pembukaan kanal klorida (Cl<sup>-</sup>) Membran sel saraf secara normal tidak permeabel terhadap ion klorida, tapi bila saluran klorida terbuka, memungkinkan masuknya ion klorida, sehingga meningkatkan potensial elektrik sepanjang membran sel dan menyebabkan sel sukar untuk tereksitasi (Katzung, *et al*, 2012).

World Health Organization (WHO) mencatat pada tahun 2021 kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami gangguan sulit tidur atau insomnia. (Rusiana *et al.*, 2021). Prevalensi insomnia atau sulit tidur di Indonesia sekitar 10%. Artinya kurang lebih 28 juta dari total 238 juta penduduk Indonesia menderita insomnia. Jumlah ini terdapat dalam data statistic, banyak jumlah penderita insomnia yang belum terdeteksi (Siregar, 2018). Jumlah kasus insomnia di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 diperkirakan 6.701 kasus. Kurang lebih 18% penduduk dunia pernah mengalami gangguan sulit tidur dan meningkat setiap tahunnya dengan berbagai keluhan dan menyebabkan tekanan jiwa bagi penderitanya. Diperkirakan terdapat 1 dari 3 orang mengalami insomnia atau kesulitan tidur menunjukkan nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyakit lainnya (World Health Organization, 2019).

Insomnia merupakan gangguan tidur yang umum dialami oleh orang dewasa dan merupakan suatu faktor risiko penyebab melemahnya kesehatan baik secara fisik maupun mental (Sexton *et al.* 2020). Insomnia dikarakterisasikan dengan keluhan subjektif mengenai ketidakpuasan terhadap kualitas dan durasi tidur, kesulitan untuk menginisiasi tidur pada jam tidur, atau

terbangun di tengah malam. Insomnia juga mencakup keluhan subjektif akan gejala pada siang hari seperti kelelahan, kehabisan energi, mengalami masalah pada fungsi kognitif seperti gangguan konsentrasi, perhatian, dan memori serta gangguan suasana hati seperti lekas marah dan disforia. Beberapa faktor seperti usia lanjut, jenis kelamin perempuan, mendengkur, kurangnya aktivitas fisik, nocturnal micturition (buang air kecil di malam hari), sering menggunakan obat hipnotik, menstruasi, keluhan insomnia pada periode sebelumnya, stress, dan gangguan psikiatrik merupakan faktor risiko penyebab insomnia (Mai dan Buysse, 2008). Sebuah studi cross-sectional pada suatu komunitas dengan jumlah sampel diperkirakan mencapai 31.432 orang dilakukan pada usia 15 tahun ke atas di Indonesia. Hasilnya, 55,7% partisipan terindikasi tidak mengalami insomnia, 33,3% mengalami subthreshold insomnia, dan 11% lainnya mengalami gejala klinis insomnia (Peltzer dan Pengpid, 2019) (Sukandar et.,al 2022).

*Insomnia* berasal dari kata “in” artinya tidak dan “somnus” yang berarti tidur, jadi *Insomnia* berarti tidak tidur atau gangguan tidur. Selanjutnya dijelaskan bahwa *Insomnia* ada tiga macam, yaitu pertama, *Initial Insomnia* artinya gangguan tidur saat memasuki tidur. Kedua, *Middle Insomnia* yaitu terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur lagi. Ketiga, *Late Insomnia* yaitu sering mengalami gangguan tidur saat bangun pagi. Masalah tidur ini bisa disebabkan berbagai faktor, di antaranya karena hormonal, obat-obatan, dan kejiwaan. Bisa juga karena faktor luar misalnya tekanan batin, suasana kamar tidur yang tidak nyaman, ribut atau perubahan waktu karena harus kerja malam. Penyebab *insomnia* yang utama adalah adanya permasalahan emosional, kognitif, dan fisiologis. Ketiganya berperan terhadap terjadinya disfungsi



kognitif, kebiasaan yang tidak sehat, dan akibat-akibat *insomnia* (Gusti et al., 2016).

Kebanyakan orang yang mengalami *insomnia* mengatasinya dengan cara menggunakan obat tidur. Obat tidur pilihan pertama yaitu benzodiazepin, yang dapat menekan SSP dengan khasiat sedatif dan hipnotisnya. Menurut undang-undang tentang psikotropika (1997), bahwa obat tidur golongan benzodiazepin dan turunannya ini termasuk kedalam obat psikotropika golongan IV. Oleh karena itu. Pemberian obat golongan hipnotik harus dimulai dengan dosis yang rendah selanjutnya dinaikan perlahan - lahan sesuai kebutuhan, agar menghindari penyalahgunaan atau ketergantungan obat (Katingan, 2022).

Hingga saat ini, penanganan insomnia dapat dilakukan secara farmakologi dan non farmakologi. Secara non farmakologi, intervensi untuk menangani insomnia berupa terapi cognitive behavioral, terapi yang paling umum berupa terapi kontrol stimulus, sleep restriction, relaksasi, terapi kognitif, paradoxical intention, dan edukasi terhadap higienitas agar tercapai kualitas tidur yang diinginkan (Dipiro et al. 2011). Obat-obatan yang memiliki aktivitas hipnotik yang dilegalkan oleh FDA untuk menangani insomnia adalah obat golongan benzodiazepin, antihistamin (seperti hidoksizin dan difenhidramin), antidepresan TCA (seperti doxepin), dan agonis reseptor melatonin (ramelteon). Selain obat-obatan tersebut, terdapat barbiturat (secobarbital, butalbital), dan kloral hidrat sudah disetujui oleh FDA tetapi tidak direkomendasikan karena toksisitas potensialnya (Mai dan Buysse, 2008). Penggunaan obat-obatan tersebut memiliki efek samping yang berbahaya seperti anterograde amnesia, kerusakan motorik, sulit berkonsentrasi, pengurangan fungsi kognitif, dan ataxia (Dipiro et al. 2011). Di antara obat-obatan tersebut, benzodiazepin dan barbiturat diperoleh melalui proses sintesis secara kimia. Oleh karena itu, untuk

meminimalkan efek samping yang diakibatkan oleh pemakaian obat-obat tersebut, perlu dicari alternatif berupa obat herbal yang berasal dari tumbuhan yang memiliki aktivitas hipnotik sedatif tetapi efek sampingnya lebih rendah (Sukandar et al., 2022).

Konsumsi diazepam menurun dari tahun 2010-2014, namun masih dibawah 1 ton. Rerata konsumsi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 516,051kg (0,60 S-DDD) dan tahun 2014 sebesar 110,336 kg.

Selama periode 5 tahun konsumsi diazepam di Indonesia mengalami penurunan. Konsumsi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 0,60 S-DDD dan terendah pada tahun 2014 sebesar 0,12 S-DDD. Rerata konsumsi diazepam pada tahun 2010-2014 sebesar 0,36 S-DDD, terjadi penurunan sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan rerata konsumsi global selama periode tahun 2011-2013 sebesar 4,14 S-DDD (INCB, 2015), maka rerata konsumsi diazepam di Indonesia pada periode tahun yang sama hanya 9% dari konsumsi global. Rerata konsumsi global pada tahun 2004-2006 sebesar 5,15 S-DDD, terjadi penurunan sebesar 20% dibanding konsumsi periode tahun 2011-2013. Penurunan konsumsi terbesar di kawasan Asia, (70%) dan Amerika (44%), sedangkan di kawasan Afrika dan Oceania mengalami peningkatan, berturut-turut 70% dan 11% (INCB, 2015).

Hipnotik dan sedatif merupakan golongan obat pendepresi susunan saraf pusat (SSP). Efeknya bergantung kepada dosis, mulai dari yang ringan hingga yang berat yaitu hilangnya kesadaran, keadaan anestesi, koma dan mati. Pada dosis terapi, obat sedatif menekan aktivitas mental, menurunkan respons terhadap rangsangan emosi sehingga menenangkan. Obat hipnotik menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan tidur yang menyerupai tidur fisiologis (Gunawan, 2011).

Pada manusia, obat–obatan sedatif kerap digunakan untuk memberikan efek menenangkan terhadap penderita insomnia, kejang, kecemasan dan status epileptikus. Obat–obatan sedatif merupakan obat yang dapat mendepresikan sistem saraf pusat dan mampu mengurangi rasa cemas dengan adanya efek mental atau motorik, namun tidak sedikit kasus ketergantungan atas obat sedatif ini (Aliwu et al., 2020). Obat sedatif merupakan obat yang sering digunakan untuk penyakit jiwa, hal ini berarti obat ini akan dikonsumsi selama umur penderita, jadi lebih baik jika menggunakan obat herbal dibandingkan obat kimia karena efek samping samping lebih sedikit.

Sedatif dan hipnotik adalah obat yang dapat mengurangi kecemasan dan menghasilkan efek menenangkan dengan menginduksi tidur serta mempertahankan durasi tidur. Saat ini, obat ini banyak digunakan dalam pengobatan berbagai gangguan psikiatrik termasuk kecemasan dan insomnia. Namun, penggunaan terus menerus dari terapi sedatif-hipnotik yang tersedia saat ini cenderung memiliki efek samping yang serius mulai dari disfungsi pernapasan, pencernaan, dan sistem kekebalan hingga penurunan fungsi kognitif, ketergantungan fisik, dan toleransi. Dengan demikian, pengembangan obat sedatifhipnotik baru dengan efek samping yang lebih sedikit disarankan sebagai pendekatan yang menjanjikan untuk melawan berbagai gangguan kejiwaan (Lestari et al., 2020).

Pengobatan sedatif-hipnotik menggunakan golongan obat depresan Susunan Saraf Pusat (SSP) yang relatif tidak selektif (Wiria dan Handoko, 1995). Obat-obatan golongan tersebut bersifat heterogen secara kimia dengan efek farmakologi yang sama, di mana menghasilkan serangkaian efek depresan yang khas mulai dari sedasi ringan, hipnosis hingga anestesi dan koma. Penggunaan obat ini biasanya dalam bersifat ansietas (sedasi) dan kemudahan

untuk tidur (hipnosis) (Katzung, 1994) dan pengobatan gangguan tidur, seperti insomnia (Siswandono dan Soekardjo, 1995). Namun obat dari golongan ini jika digunakan berkepanjangan dapat bersifat toksik dan menyebabkan kematian (Cooper, 2016).(Astuti & Fitriyanti, 2018).

Tanaman Anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) telah digunakan oleh masyarakat Sinjai, Sulawesi Selatan secara turun temurun sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah. Masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah telah menggunakan tanaman ini sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit. Tanaman Anak dara juga dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan. Beberapa penelitian terkait tanaman ini antara lain potensi sebagai antimikroba (Mukhrani et al., 2015), aktivitas penghambatan terhadap sel hela, kandungan senyawa flavonoid, terpenoid, dan fenolik di dalam tanaman Anak dara, aktivitas penghambatan enzim tirosinase (Rauf et al., 2020), potensi sebagai tabir surya (Haeria et al., 2014) ,dan aktivitas antioksidan (Rauf et al., 2020).

Flavonoid merupakan senyawa yang bersifat non polar namun memiliki gugus gula yang menyebabkan flavonoid dapat larut dalam pelarut polar maupun non polar (Fidiyani et al., 2015 Kar et al. 2006) Flavonoid merupakan keluarga baru dan ligan reseptor benzodiazepin yang memiliki efek sedatif yang dimediasi oleh ionotropika GABA, khususnya GABAA melalui benzodiazepin binding site (Hanrahan et al, 2011: Johnson et al. 2009; Ren et al, 2011) Komponen amentoflavon pada flavonoid dapat memodulator reseptor GABAA dan menunjukkan afinitas tinggi terhadap benzodiazepine binding site (Wasowski dan Marder, 2012). Ikatan senyawa flavonoid dengan reseptor GABA menyebabkan terbukanya kanal korida dan hiperpolarisasi membran yang

kemudian memurunkan potensial aksi dan menyebabkan efek sedasi-hipnotik. (Alnamer et al., 2012).

Untuk mendapatkan suatu senyawa dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan beberapa pelarut. Pelarut yang biasanya digunakan untuk menarik senyawa yaitu etanol. Etanol merupakan pelarut terbaik dalam ekstraksi beberapa senyawa. Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh (Pramudita, 2020) dengan mengekstraksi *Sargassum polycystum* menggunakan etanol 50%, 70%, dan 96% , dari proses ekstraksi tersebut didapatkan kadar flavanoid total terbanyak yaitu pada ekstrak yang menggunakan etanol 70%.

Dalam pengobatan hipnotik sedatif belum ada yang melakukan penelitian terhadap ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.). Maka dari itu peneliti ingin membuktikan dengan penelitian ilmiah menggunakan hewan uji yaitu mencit (*Mus musculus*). Melalui penelitian ini bila terbukti secara ilmiah, diharapkan ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) bisa menjadi alternatif pengobatan pada berbagai penyakit yang butuh efek sedasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian mengenai uji aktivitas hipnotik sedatif ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) pada mencit (*Mus musculus*).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki aktivitas hipnotik dan sedatif terhadap hewan coba mencit (*Mus musculus*) ?
2. Berapakah dosis optimum ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang dapat memberikan aktivitas hipnotik dan sedatif pada hewan coba mencit (*Mus musculus*) ?

### C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

#### 1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Sedatif dan hipnotik adalah senyawa yang dapat melumpuhkan sistem saraf pusat, menyebabkan efek sedatif yang lemah pada tidur pulas
- b. Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai
- c. Etanol adalah pelarut yang paling sering digunakan karena mudah ditemukan
- d. Tumbuhan anak dara adalah salah satu spesies tumbuhan famili Euphorbiaceae yang banyak tumbuh di Daerah Sinjai
- e. Diazepam adalah obat pembeding yang digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan, kesulitan tidur (insomnia) meredakan kejang, dan kaku otot

#### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menggunakan laboratorium biologi dan farmakologi untuk melakukan uji aktivitas hipnotik sedatif pada daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) pada mencit (*Mus musculus*). Adapun metode yang digunakan adalah *traction test*. Pelarut atau cairan penyari yang digunakan yakni penyari etanol.

#### D. Kajian Pustaka

Pada beberapa kajian pustaka dibahas mengenai beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini. Beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan Moniruzzaman dkk (2015) yang berjudul *Evaluasi aktivitas sedatif dan hipnotis ekstrak etanolik Scoparia dulcis Linn*, tanaman *S. dulcis* diekstraksi dengan etanol setelah proses maserasi dan diuji keberadaan kandungan fitokimia. Aktivitas sedatif dan hipnotis kemudian diselidiki menggunakan uji hole cross, open field, hole-board, rota-rod, dan thiopental sodium-induced sleep time pada tikus dengan dosis 50, 100, dan 200 mg/kg EESD. Diazepam dengan dosis 1 mg/kg digunakan sebagai obat rujukan pada semua percobaan. Kami menemukan bahwa EESD menghasilkan penghambatan aktivitas alat gerak mencit yang tergantung dosis secara signifikan baik dalam uji hole cross maupun open field ( $<0,05$ ). Selain itu, juga menurunkan performa rota-rod dan jumlah head dips dalam uji hole-board. Selain itu, EESD secara signifikan menurunkan waktu induksi untuk tidur dan memperpanjang durasi tidur, yang diinduksi oleh sodium thiopental. Secara keseluruhan, penelitian kami menunjukkan bahwa EESD mungkin memiliki prinsip obat penenang dengan sifat hipnotis yang kuat.
2. Dari jurnal penelitian yang dilakukan Katingan (2022) berjudul *Uji Sedatif Ekstrak Etanol Daun Ketapang (Terminalia catappa L) Di*

*Daerah Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah* menjelaskan bahwa Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah force swimming test (uji renang), jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain penelitian true eksperimental yang terdiri dari 5 kelompok, yang diamati dalam penelitian ini ialah waktu tidak bergerak mencit dalam detik. Hasil penelitian ini bahwa didalam ekstrak etanol daun ketapang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid, yang memiliki potensi sebagai hipnotik sedatif. Ditentukan dosis 1 sebanyak 2,25 g/20 g BB mencit, dosis 2 sebanyak 4,5 g/20 g BB mencit dan dosis 3 sebanyak 9 g/20 g BB mencit, dan dosis 2 sebagai dosis medium. Didapatkan bahwa pada dosis 3 (9 g/20 g BB mencit) memiliki efek kenaikan waktu yang paling baik. Ekstrak etanol daun ketapang memiliki potensi sebagai sedatif dengan dosis efektif 9 g/20 g BB mencit, memiliki aktivitas kenaikan sedatif lebih baik dari dosis 1, dosis 2 dan lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol positif.

3. Berdasarkan jurnal *Uji Aktivitas Hipnotik-Sedatif Ekstrak Etanol Biji Seledri (Apiumgraveolens. L.) pada Mencit Swiss Webster Jantan dalam Mengatasi Gejala Gangguan Tidur (Insomnia)* Widya lestari dkk (2020) menjelaskan bahwa, Pengaruh ekstrak etanol biji seledri terhadap parameter-parameter uji, dianalisis menggunakan Analisis ANOVA dan dilanjutkan dengan Analisis LSD. Hasil menunjukkan ekstrak etanol biji seledri memiliki nilai signifikan  $p < 0,05$  yang berarti adanya pengaruh dari ekstrak etanol yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol biji seledri



(*Apium graveolens*. L) memiliki aktivitas sedatif-hipnotik yang mampu mempercepat onset sedatif sertameningkatkan durasi hipnotik dan kekuatan efek yang dihasilkan hampler mirip dengan obat pembanding.

4. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Septia Ningsih (2016) menjelaskan bahwa Hasil rendemen infusa umbi rumput teki 72,8 %<sup>b</sup> Rerata onset paling tinggi adalah kelompok kontrol negatif (mean=108,00) dan rerata durasi paling tinggi adalah kelompok kontrol positif (mean=170,00). Pada uji One way Anova dan pada analisis post hoc tests dengan uji LSD menunjukkan terdapat perbedaan yang bermakna antar kelompok perlakuan Kesimpulan: Umbi rumput teki mampu memberikan efek sedasi namun lebih rendah dibanding fenobarbital.
5. Berdasarkan jurnal yang ditulis Karunita Eka Astusi (2018) yang berjudul *Uji Potensiasi Efek Sedatif-Hipnotik Ekstrak Etanol Kangkung Air (Ipomoea Aquatic) Asal Gambut Kalimantan Selatan* menjelaskan bahwa Pengobatan Sedatif-hipnotik menggunakan golongan obat depresan Susunan Saraf Pusat (SSP) yang relatif tidak selektif namun obat dari golongan ini jika digunakan berkepanjangan dapat bersifat toksik dan menyebabkan kematian. Kangkung air (*Ipomoea aquatic*) memiliki efek antioksidan yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan senyawa kimia dan efek tanaman Kangkung air terhadap Uji sedative-Hipnotik. Sebanyak 30 mencit dalam 5 kelompok uji yaitu Kelompok kontrol negatif, kontrol positif dengan pemberian diazepam 10 mg/KgBB secara oral, Kelompok perlakuan dengan

ekstrak Kangkung Air dosis 1 mg/KgBB, 2 mg/KgBB, dan 4 mg/KgBB dengan metode rotaryroad dan Fireplace Test. Data yang didapat dianalisis dengan Shapiro-Wilk, kemudian dilanjutkan uji one way ANOVA dan Post Hoc Tests. Hasil menunjukkan adanya efek sedasi ekstrak etanol kangkung air pada dosis 4 mg/20 BB.

6. Pada jurnal indriwati Aliwu (2020) dengan judul *Skrining Fitokimia Dan Uji Efek Sedatif Pelarut Dari Daun Takokak(Solanum Turvum Swartz) Pada Tikus Putih Galur Wistar* menjelaskan bahwa Hewan uji yang digunakan untuk pengujian sebanyak 15 ekor tikus putih jantan galur wistar dibagi dalam 5 kelompok yaitu NaCMC 1% (kontrol negatif), Diazepam (kontrol positif), ekstrak fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air dosis 300 mg/KgBB, 400 mg/KgBB dan 500 mg/KgBB perlakuan yang tiap kelompok terdiri dari 3 ekor. Semua tikus diaklimatisasi terhadap lingkungan minimal 1 minggu. Sebelum dilakukan pengujian hewan uji dipuaskan selama 18 jam (minum tetap diberikan) sebelum pengujian. Hasil penelitian menunjukkan hasil skrining fitokimia dari fraksi n-heksan, etil asetat dan air dari daun takokak diketahui mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, saponi, dan tanin. Dari ketiga sampel yang diuji, sampel fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air dosis yang paling bagus atau dosis yang memiliki potensi efek sedative yaitu dosis 500 mg/kgBB. Pada Uji BNT (LSD), kelompok uji fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air daun takokak pada dosis 500 mg/kgBB berbeda secara bermakna dengan kelompok uji kontrol positif (Diazepam) dan ekstrak fraksi lainnya pada taraf uji 0,05.

7. Berdasarkan jurnal Cece Supriatna (2020) dengan judul *Uji Efektivitas Sedatif Suspensi Kombinasi Ekstrak Akar Kecubung (*Datura metel L*) dan Biji Pala (*Myristica fragrans Houut*) pada Tikus Putih Jantan* menjelaskan bahwa Telah dilakukan penelitian tentang uji efektivitas sedatif suspensi kombinasi ekstrak akar Kecubung dan biji Pala pada tikus putih jantan. Akar kecubung mengandung alkaloid sedangkan biji pala mengandung terpenoid yang memiliki efektivitas sedatifnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sedatife dari suspensi kombinasi ekstrak akar kecubung dan ekstrak biji pala dan dosis paling efektif dari kombinasi tersebut. Metode yang digunakan untuk melihat efek sedatif pada tikus putih jantan yaitu dengan menggunakan metode Forced swimming test dengan menghitung durasi immobility time. Variabel yang digunakan yaitu suspensi kombinasi ekstrak akar kecubung (*Datura Metel L*) dan biji pala (*Myristica Fragnans Houut*) pada tikus putih jantan dengan kombinasi dosis 2 mg : 6 mg/200 g BB tikus, 4 mg : 4 mg/200 g BB tikus, dan 6 mg : 2 mg/200 g BB tikus sebagai variabel bebas serta sebagai kontrol positifnya adalah suspensi Phenobarbital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suspensi kombinasi ekstrak akar kecubung (*Datura metel L*) dan ekstrak biji pala (*Myristica fragrans Houut*) memiliki efektivitas sebagai sedatif pada tikus putih jantan. Suspensi kombinasi ekstrak akar kecubung (*Datura metel L*) dan ekstrak biji pala (*Myristica fragrans Houut*) yang memiliki dosis paling efektif sebagai sedatif pada tikus putih jantan adalah dosis 4 mg : 4 mg/200 g BB tikus.

### ***E. Tujuan Penelitian***

1. Mengetahui apakah ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) punya efek hipnotik dan sedatif pada mencit (*Mus musculus*)
2. Mengetahui dosis optimum ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang dapat memberikan aktivitas hipnotik dan sedatif pada hewan coba mencit (*Mus musculus*)

### ***F. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baik itu kepada penulis maupun masyarakat luas mengenai uji aktivitas hipnotik sedatif ekstrak etanol pada daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) pada mencit (*Mus musculus*) yang dapat memberikan efek hipnotik dan sedatif. Dan juga dapat mengetahui dosis optimum ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang dapat memberikan aktivitas hipnotik dan sedatif pada hewan coba mencit (*Mus musculus*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tanaman Anak Dara

##### 1. Klasifikasi Tanaman

Regnum : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyta*

Subdivisi : *Angiospermae*

Class : *Dicotyledonae*

Subclass : *Sympetalae*

Ordo : *Euphorbiales*

Family : *Euphorbiaceae*

Genus : *Croton*

Spesies : *Croton oblongus* Burm ) (Dalimartha.S, 2006: 26).



**Gambar 1.** Tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

## 2. Nama Daerah

Simalakian (Sumatera Barat), Ceraken (Jawa), Roengkok (Sumatera Utara), Semoeki (Ternate), dan Kowe (Tidore), Sinjai (Anak Dara) (Dalimartha.S, 2006: 26).

## 3. Habitat

Tumbuhan ini tersebar di berbagai tempat, kadang-kadang di rawa dan di hutan dengan ketinggian 700 m. Sebagian besar di lereng bukit dan pegunungan, kadang-kadang di alluvial. Biasanya pada tanah berpasir, namun dapat pula ditemukan pada tanah liat dan tanah berkapur (Awainah, 2016).

## 4. Morfologi

Uraian Tanaman anak dara (*Croton oblongus* Brum F.) berupa tanaman semak dengan tinggi tanaman sekitar 2-3 m. Bentuk batang tegak, bulat, berambut dan berwarna hijau, dengan daun tunggal, berseling dan lojong. Bentuk tepi daun bergerigi dengan ujung yang runcing. Panjang daun sekitar 3-5 cm, dengan lebar daun sekitar 1-4 cm. Bentuk tangkai silindris dengan panjang 2-3 cm, bentuk pertulangan menyirip dan berwarna hijau. Bunga tanaman majemuk dengan bentuk bulir, berada di ujung batang dengan kelopak membulat, memiliki banyak benang sari dengan mahkota berbentuk corong. Buah tanaman berbentuk bulat dengan diameter sekitar 0,5 cm dan berwarna hijau (Awainah, 2016).

## 5. Kegunaan Tanaman

Tanaman jenis ini biasanya digunakan sebagai antiaging, penghilang bau badan, penghilang nyeri haid dan mengobati kanker (Khanitha Pudhom, 2011).

## **B. Ekstraksi**

### 1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses perpindahan suatu zat atau solut dari larutan asal atau padatan ke dalam pelarut tertentu. Ekstraksi merupakan proses pemisahan berdasarkan perbedaan kemampuan melarutnya komponen-komponen yang ada dalam campuran. Secara garis besar ekstraksi dibedakan menjadi dua macam, yaitu ekstraksi padat-cair (leaching) dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat-cair atau leaching adalah proses pemisahan solut dari padatan yang tidak dapat larut yang disebut inert. (Aji et al., 2018).

### 2. Metode Ekstraksi

Metode ekstraksi dapat dibagi dua yaitu metode ekstraksi dingin dan metode ekstraksi panas. Metode ekstraksi dengan cara panas dapat dibagi berdasarkan cairan penyari yang digunakan yaitu dengan menggunakan air dan dengan pelarut organik seperti metanol atau etanol. Metode ekstraksi secara panas menurut (Ahmad, 2018).

- a. Infusa, proses penyarian yang menggunakan pelarut air pada temperatur  $90^{\circ}\text{C}$  selama 15-20 menit.
- b. Soxhlet, metode ekstraksi untuk bahan yang tahan terhadap panas dengan cara meletakkan bahan yang akan di ekstraksi dalam sebuah kantong ekstraksi atau kertas sari didalam sebuah alat ekstraksi dan bekerja secara kontinu dengan pelarut relatif konstan

dengan adanya pendingin balik dan turun menyari simplisadalam klonsong dan kembali kedalam labu alas bulat setelah melewati pipa sifon.

Adapun metode-metode esktraksi menurut (Dirjen POM, 1986) dalam buku (Agung, 2017)

1. Maserasi adalah teknik ekstraksi dengan cara merendam bahan baku ke dalam pelarut pada suatu bejana dan ditempatkan pada suhu ruang (ekstraksi dingin) selama beberapa waktu.
2. Perkolasi adalah teknik ekstraksi dengan melarutkan senyawa metabolit dengan cara mengalirkan pelarut yang sesuai pada matriks bahan atau sampel yang telah ditempatkan pada alat perkolator.
3. Reflux adalah teknik ekstraksi panas yang dilakukan dengan menguapkan pelarut dan mendinginkannya (kondensasi) lagi untuk diulang secara kontinyu sehingga volume pelarut dalam sistem akan terjaga.
4. Soxhlet adalah pengembangan teknik perkolasi dan refluks dengan menggabungkan dua prinsip tersebut dengan cara menguapkan pelarut dan menyiramkan atau melewatkannya pada sampel bahan yang terbungkus.
5. Ultrasonikasi adalah teknik ekstraksi pengembangan metode maserasi dingin dengan menambahkan alat ultrasonikasi untuk menghasilkan gelombang suara ultrasonik sehingga mempercepat proses pelepasan senyawa metabolit sekunder.
6. Ekstraksi dengan pelarut bertekanan merupakan pengembangan metode perkolasi tetapi dengan menambahkan tekanan dan meningkatkan suhu proses sehingga proses ekstraksi lebih efisien.



### **C. Fisiologi Sistem Saraf**

#### **1. Neurotransmitter**

Neurotransmitter adalah suatu zat kimia yang dapat menyeberangkan impuls dari neuron pre-sinapsis menuju neuron post-sinapsis. Neurotransmitter ada bermacam-macam, misalnya asetilkolin yang terdapat di seluruh tubuh, noradrenalin terdapat di sistem saraf simpatik, dan dopamin serta serotonin yang terdapat di otak (Webster,2001).

Neurotransmitter merupakan satu neuron untuk dapat membangkitkan atau menghambat kerja neuron lainnya. Neurotransmitter tidak hanya terdapat di otak, namun terdapat juga di saraf tulang belakang, saraf perifer, dan di beberapa kelenjar. Melalui efek pada jaringan saraf tertentu, zat ini dapat mempengaruhi suasana hati, ingatan, dan kesejahteraan. Sifat dasar dari efek yang ditimbulkannya tergantung pada tingkat neurotransmitter, lokasinya, dan jenis reseptor yang diikatnya (Carole,2004).

Neurotransmitter yang dikenal dan memiliki efek tidur yaitu terdapat pada serotonin yang mempengaruhi neuron yang berkaitan dengan tidur, nafsu makan, persepsi sensoris, pengaturan suhu, penahan rasa sakit, dan suasana hati. Neurotransmitter lain yang mempengaruhi yaitu GABA (*Gamma aminobutyric acid*) berfungsi sebagai neurotransmitter inhibitor utama dari otak. Tingkat GABA yang abnormal dapat menimbulkan gangguan tidur, gangguan makan, gangguan kejang termasuk epilepsi (Carole,2004).

#### **2. Eksitatori dan Inhibitori**

Transmisi dan proses rangsangan terjadi melalui proses sinaps. Terdapat dua jenis sinaps yaitu eksitatori dan inhibitor. Pada sinaps eksitatori, pelepasan neurotransmitter menyebabkan depolarisasi membran

saraf yang kemudian akan menyebabkan depolarisasi pada saraf reseptor (Rosemary,2003:45). Pada sinaps eksitatori, kompleks neurotransmitter reseptor menyebabkan membran pascasinaps menjadi permeable terhadap ion  $\text{Na}^+$  sehingga membran tersebut mengalami depolarisasi (Raharjo,2004:151).

Pada sinaps inhibitor pelepasan neurotransmitter menyebabkan hiperpolarisasi yang menghambat potensial aksi yang muncul dalam neuron reseptor (Rosemary,2003:45). Pada sinaps inhibitori pembentukan kompleks neurotransmitter reseptor pada membran pascasinaps akan membuatnya tetap impermeable terhadap ion  $\text{Na}^+$ , namun permeable terhadap ion  $\text{Cl}$  akibatnya, membran pascasinaps tidak terdepolarisasi (bagian dalam sel tidak lebih positif), tetapi justru menjadi lebih negatif. Keadaan di dalam sel yang menjadi lebih negatif daripada sebelumnya timbul akibat peristiwa hiperpolarisasi. Dalam keadaan hiperpolar, membran sel menjadi semakin sulit terangsang (Raharjo,2004:150).

### 3. Depolarisasi dan Repolarisasi

Depolarisasi adalah perubahan keadaan listrik serat saraf yang disebabkan oleh rangsangan kimia, mekanis, dan *termal*. Depolarisasi mengubah distribusi ion ion di dalam sel sehingga ion natrium dan klorida mengalir ke dalam sel dan ion kalium mengalir keluar (Bond,1981). Depolarisasi adalah keadaan dimana saraf sedang menjalankan rangsang. Pada keadaan ini muatan yang lebih negatif berada di sisi luar membran sedangkan muatan yang lebih positif berada di sisi dalam membran.

Membran sel saraf bersifat impermeabel terhadap ion kalium dan permeabel terhadap ion natrium sehingga ion (Na) berdifusi dan ion (K) ditahan. Depolarisasi terjadi melalui interaksi aktin dan miosin yang menghasilkan kontraksi miokard (Raharjo,2004).

Repolarisasi disebut juga sebagai periode penyembuhan setelah saraf mengalami depolarisasi. Repolarisasi disebabkan oleh keluarnya ion  $K^+$ , ditambah dengan inaktivasi aliran masuk ion Na yang disebabkan oleh aktivasi saluran lambat (*the slow channel*) yang mengalirkan Ca. Kanal  $Na^+$  dan  $Ca^+$  kemudian tertutup sehingga yang tertinggal hanya saluran ion  $K^+$  yang menyebabkan repolarisasi (Raharjo,2004).

#### ***D. Fisiologi Tidur***

Tidur merupakan suatu keadaan berubahnya kesadaran, dimana dengan adanya berbagai derajat stimulus dapat menimbulkan suatu keadaan yang benar-benar terjaga (Taylor, 1997). Tidur dikarakteristikan dengan aktifitas fisik yang minimal, tingkat kesadaran yang bervariasi, perubahan proses fisiologis tubuh, dan penurunan respons terhadap stimulus eksternal. Hampir sepertiga dari waktu kita, kita gunakan untuk tidur. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa tidur dapat memulihkan atau mengistirahatkan fisik setelah seharian beraktivitas, mengurangi stress dan kecemasan, serta dapat meningkatkan kemampuan dan konsentrasi saat hendak melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas tidur diatur dan dikontrol oleh dua sistem pada batang otak, yaitu *Reticular Activating System* (RAS) dan *Bulbar Synchronizing Region* (BSR). RAS di bagian atas batang otak

diyakini memiliki sel-sel khusus yang dapat mempertahankan kewaspadaan dan kesadaran, memberi stimulus visual, pendengaran, nyeri, dan sensori raba, serta emosi dan proses berpikir. Pada saat sadar, RAS melepaskan katekolamin sedangkan pada saat tidur terjadi pelepasan serum serotonin dari BSR (Wartonah,2003:138-139).

#### **E. *Insomnia***

Sedatif termasuk dalam kelompok psikodepresiva yang mencakup obat-obat yang menekan atau menghambat fungsi-fungsi sistem saraf pusat (SSP) tertentu. Sedatif berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, menenangkan penggunaannya dan biasanya diberikan pada pasien masa preoperatif untuk mengurangi kecemasan sebelum dilakukan anestesi dan pembedahan (Tjay dan Rahardja, 2015; Katzung, 2013) serta digunakan untuk pasien yang mengidap insomnia atau biasa disebut susah tidur (Gunawan dkk, 2009).

#### **F. *Hipnotik Sedatif***

Sedasi dapat didefinisikan sebagai suatu penekanan (supresi) dari kesiapsiagaan terhadap suatu tingkat stimulasi tetap, dengan penurunan aktivitas spontan, penurunan ketegangan dan penurunan timbulnya ide-ide. (Tjay dkk,2002:382). Sedasi adalah penekan susunan saraf pusat atau *central nervous system (CNS) depressant*, sama seperti alkohol dan inhalan. Dalam jumlah (dosis) kecil, sedatif-hipnotik dapat mengatasi ansietas sedangkan dalam jumlah (dosis) besar dapat menginduksi tidur (Joewana,2003). Bentuk yang paling ringan dari penekan SSP adalah

sedasi, dimana penekanan SSP tertentu dalam dosis yang paling rendah dapat menghilangkan respon fisik dan mental tetapi tidak mempengaruhi kesadaran (Anugrah,1994).

Sedasi minimal adalah suatu keadaan dimana selama terinduksi obat, pasien berespon normal terhadap perintah verbal. Walaupun fungsi kognitif dan koordinasi terganggu, tetapi fungsi kardiovaskuler dan ventilasi tidak dipengaruhi. Sedasi sedang (sedasi sadar) adalah suatu keadaan depresi kesadaran setelah terinduksi obat di mana pasien dapat berespon terhadap perintah verbal secara spontan atau setelah diikuti oleh rangsangan taktil cahaya. Tidak diperlukan intervensi untuk menjaga jalan napas paten dan ventilasi spontan masih adekuat. Fungsi kardiovaskuler biasanya dijaga. Sedasi dalam adalah suatu keadaan dimana selama terjadi depresi kesadaran setelah terinduksi obat, pasien sulit dibangunkan tapi akan berespon terhadap rangsangan berulang atau rangsangan sakit. Kemampuan untuk mempertahankan fungsi ventilasi dapat terganggu dan pasien dapat memerlukan bantuan untuk menjaga jalan napas paten. Fungsi kardiovaskuler biasanya dijaga (Keith L & Wilson,2011).

Obat sedatif tidak boleh dikonsumsi dalam kurun waktu yang lama (kecuali atas indikasi medis tertentu) karena dapat menimbulkan efek ketergantungan. Gejala- gejala ketergantungan obat sedatif akan muncul jika penggunaan obatnya dihentikan. Efek samping dari obat sedatif yaitu bergantung pada dosis, mulai dari ringan yang menyebabkan tenang atau kantuk, menidurkan hingga efek yang berat seperti hilangnya kesadaran,

keadaan anestesi, koma dan mati. Salah satu jenis obat sedatif yang umum digunakan dari golongan benzodiazepin yaitu diazepam. Diazepam memiliki efek samping berupa depresi pernapasan, sembelit, vertigo, dan gelisah (Tjay dan Rahardja, 2015). (Erjon et al.,2017).

Sedatif dan hipnotik adalah obat yang dapat mengurangi kecemasan dan menghasilkan efek menenangkan dengan menginduksi tidur serta mempertahankan durasi tidur.(Moniruzzaman et al., 2015).Pengobatan Sedatif-hipnotik menggunakan golongan obat depresan Susunan Saraf Pusat (SSP) yang relatif tidak selektif namun obat dari golongan ini jika digunakan berkepanjangan dapat bersifat toksik dan menyebabkan kematian. Pengobatan Sedatif-hipnotik menggunakan golongan obat depresan Susunan Saraf Pusat (SSP) yang relatif tidak selektif (Wiria dan Handoko, 1995). Obat-obatan golongan tersebut bersifat heterogen secara kimia dengan efek farmakologi yang sama, di mana menghasilkan serangkaian efek depresan yang khas mulai dari sedasi ringan, hipnosis hingga anestesi dan koma. Penggunaan obat ini biasanya dalam bersifat ansietas (sedasi) dan kemudahan untuk tidur (hipnosis) (Katzung, 1994) dan pengobatan gangguan tidur, seperti insomnia (Siswandono dan Soekardjo, 1995). Namun obat dari golongan ini jika digunakan berkepanjangan dapat bersifat toksik dan menyebabkan kematian (Astuti & Fitriyanti, 2018).

Seperti halnya mekanisme kerja obat sedatif-hipnotik, timbulnya efek sedatif-hipnotik memiliki keterkaitan dengan meningkatnya aktifitas GABA, yakni sebuah neurotransmitter utama yang bekerja pada sinapsis

inhibitoris di dalam otak yang menghambat aktifitas susunan saraf pusat atau SSP (Wyann & Fougere dalam Amalia, 2009). Senyawa kimia yang memiliki pengaruh agonis, seperti Alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin, bila kontraksi dapat menghasilkan efek maksimum pada reseptor GABA (Afriani, et al., 2016; Novindriana, et al., 2013). Pengikatan senyawa-senyawa tersebut pada reseptor GABA di membran pascasinaptik akan menghambat enzim GABA transminase sehingga jumlah GABA menjadi berlebih dalam otak dan menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor GABA. Adanya perbedaan komposisi ion dalam cairan intraselular maupun ekstraselular, mengakibatkan sel mengubah potensial membrannya sebagai respon terhadap stimulus yang diterima oleh sel tersebut.

Dalam kondisi sel mengubah potensial membrannya maka membran tersebut lebih permeabel terhadap ion  $K^+$  yang meninggalkan sel sehingga saluran atau kanal ion klorida (gated ion channel) terbuka dan mengakibatkan banyak ion klorida yang masuk ke dalam sel karena gradien konsentrasinya yang besar. Aliran ion mendorong potensial membran pada tekanan yang lebih negatif dibandingkan potensial istirahatnya dan menyebabkan hiperpolarisasi membran. Kondisi ini akan menghambat proses penghantaran potensial aksinya dan pada akhirnya menyebabkan sel sulit tereksitasi. (Samson et al., 2019).

## G. Obat Golongan Depresan

Hipnotik-sedatif merupakan golongan obat penedepresi susunan saraf pusat (SSP). Efeknya bergantung pada dosis, mulai dari yang ringan yaitu menyebabkan tenang dan kantuk, menidurkan, hingga yang berat yaitu menghilangkan kesadaran keadaan anestesi, koma dan mati. Sedatif adalah obat tidur yang dalam dosis lebih rendah dari terapi yang diberikan pada siang hari untuk tujuan menenangkan. Sedatif termasuk ke dalam kelompok psikoleptika yang mencakup obat-obat yang menekan atau menghambat sistem saraf pusat. Sedatif berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan, dan menenangkan penggunanya. Keadaan sedasi juga merupakan efek samping dari banyak obat yang khasiat utamanya tidak menekan Sistem Saraf Pusat, misalnya antikolinergika. Belum jelas apakah kerja anticemas yang terlihat secara klinis ekuivalen atau berbeda dari efek sedasi. Sedatif berfungsi menurunkan aktivitas, mengurangi ketegangan dan menenangkan penggunaannya. Keadaan sedasi juga merupakan efek samping dari banyak obat yang khasiat utamanya tidak menekan SSP, misal antikolinergika (Gunawan,1995).

Sedatif-hipnotik berkhasiat menekan sistem saraf pusat bila digunakan dalam dosis yang meningkat, suatu sedatif, misalnya fenobarbital akan menimbulkan efek berturut-turut peredaan, tidur, dan pembiusan total (anestesi), sedangkan pada dosis yang lebih besar lagi dapat menyebabkan koma depresi pernafasan dan kematian. Bila diberikan berulang kali untuk jangka waktu lama, senyawa ini lazimnya menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Hipnotika atau obat tidur adalah zat-zat yang dalam dosis terapeutik diperuntukkan untuk mempermudah atau menyebabkan tidur. Hipnotika menimbulkan rasa kantuk, mempercepat tidur, dan sepanjang



malam mempertahankan keadaan tidur yang menyerupai tidur alamiah. Secara ideal obat tidur tidak memiliki aktivitas sisa pada keesokan harinya (Tjay dkk, 2002: 384).

Efek hipnotik meliputi depresi sistem saraf pusat yang lebih kuat daripada sedasi, hal ini dapat dicapai dengan semua obat sedatif dengan peningkatan dosis. Depresi sistem saraf pusat yang bergantung pada tingkat dosis merupakan karakteristik dari sedatif-hipnotik. Dengan peningkatan dosis yang diperlukan untuk hipnotik dapat mengarah kepada keadaan anestesi umum. Masih pada dosis yang tinggi, obat sedatif-hipnotik dapat mendepresi pusat-pusat pernafasan dan vasomotor di medulla, yang dapat mengakibatkan koma dan kematian (Katzung, 1997).

Secara klinis obat-obatan sedatif-hipnotik digunakan sebagai obat-obat yang berhubungan dengan sistem saraf pusat seperti nyeri akut dan kronik, tindakan anestesi, kejang serta insomnia.

#### 1. Penggolongan Hipnotik Dan Sedatif

Hipnotik dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yakni senyawa barbiturat dan benzodiadepin, obat-obat lainnya (Tjay dkk, 2002: 389).

##### a. Barbiturat

Selama beberapa waktu barbiturat telah digunakan secara ekstensif sebagai hipnotik-sedatif. Namun sekarang selain untuk beberapa penggunaan yang spesifik, golongan obat ini telah digantikan oleh benzodiazepin yang lebih aman. Berdasarkan masa kerjanya, turunan barbiturate dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Turunan barbiturate dengan masa kerja panjang (6 jam atau lebih)

Contohnya : barbiturate, metarbital, fenobarbital.

2. Turunan barbiturate dengan masa kerja sedang (3-6 jam )  
Contohnya : allobarbital, amobarbital, aprobarbital, dan butbarbital berguna untuk mempertahankan tidur dalam jangka waktu yang panjang.
3. Turunan barbiturate dengan masa kerja pendek (0,5-3 jam)  
Contohnya : secobarbital, dan pentobarbital, yang digunakan untuk menimbulkan tidur untuk orang yang sulit jatuh tidur.
4. Turunan barbiturate dengan masa kerja sangat pendek (<0,5 jam)  
Contohnya : thiopental yang digunakan untuk anastesi umu. Barbiturat harus dibatasi penggunaannya hanya untuk jangka waktu pendek (2 minggu atau kurang) karena memiliki efek samping.

Mekanisme kerja barbiturate pada SSP adalah sebagai berikut :

Barbiturat bekerja pada seluruh SSP, walupun pada setiap tempat tidak sama kuatnya. Dosis nonanestesi terutama menekan respons pasca sinaps. Penghambatan hanya terjadi pada sinaps GABA-nergik. Walaupun demikian efek yang terjadi mungkin tidak semuanya melalui GABA sebagai mediator. Barbiturat memperlihatkan beberapa efek yang berbeda pada eksitasi dan inhibisi transmisi sinaptik, kapasitas barbiturate membantu kerja GABA sebagian menyerupai kerja benzodiazepin, namun pada dosis yang lebih tinggi bersifat sebagai agonis GABA-nergik, sehingga pada dosis tinggi barbiturat dapat menimbulkan depresi SSP yang berat (Tjay dkk, 2002:389).

b. Benzodiazepin

Obat ini pada umumnya kini dianggap sebagai obat tidur pilihan pertama karena toksisitas dan efek sampingnya yang relatif paling ringan. Obat ini juga menimbulkan lebih sedikit interaksi dengan obat lain, lebih ringan menekan pernapasan dan kecenderungan penyalahgunaan yang lebih sedikit dosis aman yang lebar rendahnya toleransi obat dan tidak menginduksi enzim mikrosom hati. Golongan benzodiazepin diantaranya *temazepam*, *nitrazepam*, *flurazepam*, *flunitrazepam*, *diazepam* dan *midazolam* (Tjay dkk, 2002: 389-390).

Mekanisme kerja benzodiazepine pada SSP sebagai berikut :

Kerja benzodiazepin terutama merupakan interaksinya dengan reseptor penghambat neurotransmitter yang diaktifkan oleh asam gamma amino butirat (GABA). Reseptor GABA merupakan protein yang terikat pada membran dan dibedakan dalam 2 bagian besar sub-tipe, yaitu reseptor GABA<sub>A</sub> dan reseptor GABA<sub>B</sub>. Reseptor ionotropik GABA<sub>A</sub> terdiri dari 5 atau lebih sub unit, reseptor GABA<sub>A</sub> berperan pada sebagian besar neurotransmitter di SSP. Sebaliknya reseptor GABA<sub>B</sub> yang terdiri dari peptide tunggal dengan 7 daerah transmembran, digabungkan dengan mekanisme signal transduksinya oleh protein G.

Efek farmakologi benzodiazepin merupakan akibat aksi *gamma-aminobutyric acid* (GABA) sebagai neurotransmitter penghambat di otak dan blokade dari pelepasan muatan listrik. GABA adalah salah satu neurotransmitter-inhibisi otak, yang juga berperan pada timbulnya serangan epilepsi. Benzodiazepin tidak mengaktifkan reseptor GABA melainkan meningkatkan kepekaan

reseptor GABA terhadap neurotransmitter penghambat sehingga kanal klorida terbuka dan terjadi hiperpolarisasi sinaptik membran sel dan mendorong post sinaptik membran sel tidak dapat dieksitasi (Tjay dkk,2002:390-395).

### 3. Diazepam

Diazepam merupakan salah satu obat hipnotika-sedativa dari golongan benzodiazepin. Golongan benzodiazepin obat ini pada umumnya kini dianggap sebagai obat tidur pilihan pertama karena toksisitas dan efek sampingnya yang relatif paling ringan. Obat ini juga menimbulkan lebih sedikit interaksi dengan obat lain, lebih ringan menekan pernapasan dan kecenderungan penyalahgunaan yang lebih sedikit (Tjay dkk, 2007: 389). Diazepam merupakan benzodiazepin yang sangat larut lemak dan memiliki durasi kerja yang lebih panjang dibanding midazolam.

Diazepam dapat diberikan secara oral, intravena (harus diencerkan, karena menyakitkan dan merusak pembuluh darah), intramuskular atau sebagai supositoria. Ketika diazepam yang diberikan secara oral, itu diserap dengan cepat dan memiliki onset cepat tindakan. Onset tindakan adalah 1-5 menit untuk administrasi IV dan 15-30 menit untuk administrasi IM. Durasi puncak efek farmakologis diazepam adalah 15 menit sampai 1 jam untuk kedua rute administrasi. Ketersediaan hayati setelah administrasi oral adalah 100 persen, dan 90 persen setelah pemberian dubur. kadar plasma puncak terjadi antara 30 menit dan 90 menit setelah pemberian oral dan antara 30 menit dan 60 menit setelah

pemberian intramuskular setelah kadar puncak plasma administrasi dubur terjadi setelah 10 menit untuk 45 menit. Diazepam sangat terikat dengan protein 96-99 persen diserap obat yang terikat protein. Separuh distribusi kehidupan diazepam adalah 2 menit sampai 13 menit. Farmakokinetik diazepam cepat diserap melalui saluran cerna dan mencapai puncaknya dalam 1 jam (15-30 menit pada anak-anak) (Samik,2000).

Diazepam juga dapat melewati plasenta dan terdapat dalam sirkulasi fetus. Ikatan protein benzodiazepin berhubungan dengan tingginya kelarutan lemak. Diazepam dengan kelarutan lemak yang tinggi memiliki ikatan dengan protein plasma yang kuat. Sehingga pada pasien dengan konsentrasi protein plasma yang rendah. Metabolisme diazepam mengalami oksidasi N-demethylation oleh enzim mikrosom hati menjadi desmethyldiazepam dan oxazepam serta sebagian kecil temazepam. Desmethyldiazepam memiliki potensi yang lebih rendah serta dimetabolisme lebih lambat dibanding oxazepam sehingga menimbulkan keadaan mengantuk pada pasien 6-8 jam setelah pemberian. (Samik,2000).

#### ***H. Dosis Penggunaan***

Dosis yang digunakan obat diazepam ini pada orang dewasa diberikan secara oral 2-10 mg 2-4 kali sehari atau 15-30 mg bentuk lepas lambat sekali sehari jika secara intravena atau intramuskular 2-10 mg dapat diulang 3-4 jam bila perlu, untuk anak-anak diatas 6 bulan diberikan 1-2,5 mg 3-4 kali sehari. Jika diberikan secara rektal pada orang dewasa 0,15-0,5 mg/kg (sampai 20 mg/dosis), untuk anak-anak 0,2-0,5 mg/kg. Premedikasi : 10 mg oral 1-1,5 jam

sebelum operasi, Sedasi 5-15 mg IV perlahan-lahan, peningkatan bolus 1-2 mg, Status epileptikus : 2 mg, diulang setiap menit sampai kejang berhenti. Dosis maksimal 20 mg. Diazepam ini terutama digunakan pada ketegangan jiwa dan mempunyai efek menidurkan dosis yang biasa digunakan peroral yaitu 3x sehari 2 mg, dalam keadaan tertentu dapat dipertinggi sampai 60 mg perharinya (Samik,2000).

### ***I. Pengujian Sedatif Hipnotik***

1. Pengujian Traction Test dimana lengan/tungkai paling depan hewan uji digantungkan pada suatu kawat yang direntangkan secara horizontal. Hewan uji yang abnormal akan memerlukan waktu yang lama untuk membalikkan badan dan memerlukan waktu yang cepat untuk jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa hewan uji berada dalam pengaruh efek sedatif (positif) (Dini 2019).
2. Pengujian dengan Fireplace Test dimana hewan uji diletakkan pada gelas silinder. Pengamatan dilakukan dengan melihat waktu yang diperlukan hewan uji untuk meloncat keluar dari tabung kaca. Hewan uji normal akan segera kabur dan memanjat gelas silinder, sedangkan hewan uji yang dipengaruhi oleh efek sedatif akan memanjat gelas tersebut dalam waktu yang lebih lama. (Dini 2019).
3. Tes terbuka untuk mengevaluasi aktivitas alat gerak (menunjukkan efek sedatif). Yang bernama capparis berduri, kotak plexiglas (40x40x40 cm) dengan dinding transparan membentuk ruang lapangan terbuka. Menempatkan tikus satu persatu di tengah ruangan dan mencatat pergerakannya dengan kamera digital selama 10 menit kemudian dianalisis dengan video yang direkam oleh sistem pelacakan otomatis lalu melaporkan tiap pergerakan jarak setiap tikus. (Kumar et al., 2021).

4. Aktivitas alat gerak ZZ-6 (Taimeng Software Co.Ltd.,Chengdu,China), yang terdiri dari sistem kontrol komputer mikro dan enam tangki rekasi yang terpisah yang memiliki 36 titik probe susunan inframerah.Tiga puluh menit setelah diberikan diazepam,tikus ditempatkan secara individual di tester aktivitas alat gerak. Setelah diadaptasi selama 5 menit, aktivitas lokomotor direkam selama 5 menit.(Zhu et al., 2016).
5. Pengujian efek sedative dengan *rotarod* dilakukan dengan menghitung jumlah jatuh mencit pada alat *rotaryroad*. Selain itu juga dicatat waktu jatuhnya selama 1 menit. (Astuti & Fitriyanti, 2018).
6. Apabila tikus dikatakan terjaga jika diberikan perlakuan,jika dapat memperbaiki dirinya sendiri (kembali ke posisi tegak). Setelah seekor tikus meluruskan dirinya sendiri, ia ditempatkan di punggungnya sekali lagi dan dibiarkan ke kanan untuk kedua kalinya.(M. Emamghoreishi & Department, 2006).
7. Tikus ditempatkan pada batang logam horizontal yang dilapisi karet (diameter 3 cm) berputar dengan kecepatan awal 10 rpm/ menit. Kecepatan akhir batang adalah 20 rpm dalam studi akselerasi dan kecepatan rotasi batang ditingkatkan secara linier dari 10 menjadi 20 rpm dalam waktu 20 detik. Waktu setiap hewan dapat menjaga keseimbangannya dengan berjalan di atas tongkat diukur.(Razavi et al., 2017).
8. Pada pengujian dilakukan uji *sleeping time* dengan melihat parameter onset tidur, uji onset tidur dilihat dari kehilangan refleks saat sesudah diinduksi. Penentuan adanya refleks dan kehilangan refleks dilakukan dengan pengujian *righting reflex*.(Gusti et al., 2016).
9. Pengujian efek sedatif ini dilakukan dengan menggunakan metode *forced swimming* test dimana hewan uji akan di renangkan dalam suatu tempat

yang berisi air dan dihitung waktu *immobility time* dari hewan tersebut selama 10 menit kemudian dicatat dalam menit/detik.(Adhitama et al.,2022).

#### **J. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan**

Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah swt. yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Allah swt. berfirman :

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۚ ۲۸ وَرَزِيْنًا وَنَخْلًا ۚ ۲۹ وَحَدَاقٍ غُلْبًا ۚ ۳۰ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ ۳۱ مَتَاعًا لَّكُمْ  
وَلِأَنْعَامِكُمْ ۚ ۳۲

Terjemahnya :

“Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, 28). Anggur dan sayur-sayuran, 29). Zaitun dan kurma, 30). Kebun-kebun yang lebat, 31). Dan buah-buahan serta rumput-rumputan, 32). Untuk kesenanganmu dan binatang ternakmu”(QS.Abasa (80): 27-32).

Ayat di atas menjelaskan tentang kuasa Allah swt menciptakan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan serta rumput yang bisa jadi bahan makanan bagi manusia dan ternak. Setiap unsur makanan ini memiliki khasiat unik bagi tubuh manusia yang bisa diteliti dalam kehidupan kita, dan banyak hal dari unsur-unsur ini yang dapat dipelajari untuk mencerahkan dan memberikan pandangan mendalam akan keajaiban yang terkandung di dalam unsur tersebut.

Al-Qur'an yang salah satu fungsinya sebagai kitab sains telah menggariskan tentang beragam manfaat yang bisa diambil oleh manusia dari berbagai macam



tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt. Al-Qur'an Surah Yunus (10) ayat 24 menjelaskan sebagai berikut :

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ  
النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ۗ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang (dapat) dimakan oleh manusia dan hewan ternak. .(QS. Yunus/10: 24 )

Dalam tafsir Nurul Qur'an, Imani (2005) menjelaskan bahwa ayat ini diawali dengan rahmat Allah berupa air hujan yang bisa memunculkan kehidupan ini jatuh ke tanah yang subur, menjadikan berbagai tanaman tumbuh. Sebagian dari tanaman itu berguna bagi manusia dan sebagian lainnya berguna bagi burung dan binatang melata. Kemudian ayat di atas selanjutnya mengatakan, “lalutumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman di bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak”. Tanaman-tanaman ini mengandung gizi bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Manusia mengambil manfaat dari berkah tanaman-tanaman dan buah-buahan serta dari biji-bijian.

Karenanya tumbuhlah tanaman di bumi. gandum dan semua jenis biji-bijian, buah-buahan dan sayuran. Biasanya berupa rumput meskipun terkadang binatang ternak diberi makan dengan gandum. Tumbuhan hidup dengan air beserta unsur hara yang berupa garam-garam. mineral. Semua kejadian yang terjadi di alam adalah tanda-tanda kebesaran Allah swt bagi hamba yang mau berfikir. Berkaitan dengan ditumbuhkan atau dihidupkannya tumbuhan dengan air, al-qur'an memerintahkan kepada manusia secara tidak langsung supaya berpikir bagaimana air itu masuk ke dalam tubuh tumbuhan (Rossidy, 2008).

Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah, maka yang dapat menyembuhkan juga Allah semata. Akan tetapi untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan obat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw

Dari Rasulullah saw. Bersabda :

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا  
 وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya :

“Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit'. Mereka bertanya, 'penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'penyakit tua'.” (HR. At-Tarmizi).

Hadis tersebut menerangkan bahwa Rasulullah menganjurkan berobat terhadap manusia untuk mengusahakan kesembuhan untuk tiap penyakit. Hadis itu juga menjelaskan bahwa Rasulullah mengemukakan bahwa “setiap penyakit pasti diiringi dengan kesembuhan yang dijanjikan oleh Allah swt”.

Dari Jabir bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Setiap penyakit ada obatnya, Apabila didapat obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah azza wa jalla (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, maka wajib bagi setiap orang untuk berobat dan setiap pengobatan itu harus disesuaikan dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt, yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. memerintahkan kita untuk berobat dan melarang kita pasrah tanpa melakukan usaha dan ikhtiar maksimal. Karena usaha dan ikhtiar dalam berobat sama sekali tidak bertentangan dengan sikap tawakkal. Allah pun menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.


Hadis ini mengajak untuk melakukan penelitian medis, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya. Selain itu, Rasulullah saw menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya. Dengan demikian, umat Islam telah benar-benar mencapai puncak kejayaannya dalam bidang kedokteran, yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dari berbagai ilmuwan muslim yang pernah dilahirkan tersebut, pastilah terdapat berbagai yang sampai saat ini masih bertahan dan dapat dilestarikan sebagai alternatif pengobatan yang sangat penting.

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Dalam penelitian ini ditemukan spesies tanaman Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) secara empiris masyarakat memanfaatkan sebagai kosmetik yaitu masker pada wajah, sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat

mengencangkan kulit. Anak dara juga mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan.

Semua yang diciptakan Allah swt. memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian aktivitas dari ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) jantan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Februari 2023- Agustus 2023.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental laboratorium.

#### ***C. Sampel***

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

#### **D. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Alat-alat yang digunakan antara lain aluminium foil, batang pengaduk, corong, erlenmeyer, gelas ukur, kapas, labu ukur, pemanas, seperangkat alat maserasi, spoit oral, stopwatch, timbangan analitik (*sartorius*), timbangan hewan, dan alat *traction test*.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan meliputi akuades, karboksi metil selulosa (CMC), diazepam, asam klorida 2 N, amonia, CHCL<sub>3</sub>, perekasi mayer, perekasi Dragendorff, serbuk Mg, HCl pekat, amil alkohol, klorofom, asam sulfat pekat, asam asetat anhidrat, Liebermann-burchard, mencit jantan sebanyak 15 ekor dengan berat mencit 25-30 gram, pelarut *etanol 70 %*, daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

#### **E. Cara Kerja**

##### 1. Penyiapan Sampel

###### a. Pengambilan Sampel

Sampel Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

diambil di daerah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

###### b. Pengolahan Sampel

Sampel Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

yang telah diperoleh kemudian di sotrasi kering dan basah lalu dikeringkan di lemari pengering. Sampel yang telah kering kemudian diserbukkan dan sampel siap untuk diekstraksi.

## 2. Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Anak Dara

Sebanyak 660 g simplisia daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dimaserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 13000 ml. Maserat dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* dan diperoleh ekstrak kental.

## 3. Skrining Fitokimia

### a. Uji Alkaloid

Sebanyak 2 g sampel ditambahkan 10 mL asam klorida (HCL) 2N, dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes alkaloid. Kemudian ditambahkan 5 mL ammonia 25% dan 20 ml ( $\text{CHCl}_3$ ). Dimasukkan 1 mL filtrat kedalam 2 sabung reaksi, tabung 1 ditambahkan pereaksi mayer. Alkaloid positif jika terjadi endapan putih-kuning. Kemudian tabung 2 ditambahkan perekat Dragendroff, Alkaloid positif jika endapan orange (Franswort, 1966) (Perez, 2017).

### b. Uji Fenolik

Sejumlah sampel diekstrak dengan 20 ml etanol 70%. Larutan yang dihasilkan diambil sebanyak 1 ml kemudian ditambahkan 2 tetes larutan  $\text{FeCl}_3$  5 %. Reaksi positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna hijau atau hijau biru. (Nur & Najib, 2022).

c. Uji Flavonoid

Sebanyak 1 gram sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu tambahkan 20 ml. Aquades lalu dipanaskan selama 15 menit. Hasil filtrat kemudian ditambahkan 100 g serbuk Mg. 1 ml HCl pekat dan 5 ml amyl alcohol lalu di kocok. Ekstrak mengandung flavonid jika terbentuknya warna orange, merah, atau kuning (Farnswort. 1966, Perez, 2017).

d. Uji Saponin

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 20 ml Aquades kemudian dipanaskan selama 15 menit, didinginkan dan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Jika terbentuk buih yang banyak selama tidak kurang dari 10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes kloridak 2 N menunjukkan adanya saponin (Farnswort 1966, Perez, 2017).

e. Uji Tanin

Sebanyak 1 g sampel didihkan selama 15 mneit dalam 20 ml. Aquadest lalu didinginkan dan disaring. Filtrat ditambahkan 1-2 tetes pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5%, jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau kehitaman menunjukkan adanya tannin. Kemudian gelatin 10%, jika terjadi warna lebih putih menunjukkan adanya tannin. Kemudian Stiasyn, jika terjadi merah muda menunjukkan selektif tanin. (Franswort, 1966, Perez, 2017).



f. Uji Steroid / triterpenoid

Sebanyak 1 gram sampel ditambahkan 20 ml asam asetat anhidrat kemudian difiltrate sampai menguap lalu diresidu dan ditambahkan Liebermann-Burchard. Reaksi positif ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi merah keunguan untuk triterpenoid dan hijau kebiruan untuk steroid (Franswort, 1966, Perez, 2017).

g. Uji Terpenoid

5 ml larutan ekstrak dalam klorofom ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat, bila pada batas antara kedua fase terbentuk warna merah kecoklatan menandakan adanya terpenoid (Onuekwusiet al., 2014).

4. Pembuatan Larutan Koloidal Na CMC 0,5%

Ditimbang Na CMC sebanyak 0,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 25 ml aquadest yang telah dipanaskan, sambil diaduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga terbentuk larutan koloidal yang homogen, dicukupkan hingga 100 ml dalam labu terukur.

5. Pembuatan Larutan Diazepam

Ditimbang Diazepam sebanyak 0,0078 mg/KgBB mencit dilarutkan dalam 100 ml Na CMC 0,5% diberikan pada mencit.

6. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Anak Dara

Ekstrak etanol anak dara kental yang diperoleh dari hasil ekstraksi dengan metode maserasi, dibuat suspensi dengan variasi dosis yaitu: 1 mg/KgBB, 2 mg/KgBB, 4 mg/KgBB.

## 7. Pemilihan dan Penyiapan Mencit

Dipilih hewan uji yang akan digunakan adalah mencit jantan yang sehat dan aktivitas normal, berat badan 25-30 gram. Jumlah mencit yang digunakan sebanyak 15 ekor, dibagi dalam 5 kelompok perlakuan.

## 8. Perlakuan Terhadap Mencit

Sebelum melakukan percobaan, mencit diadaptasikan terlebih dahulu pada alat *traction test* selama 7 hari. Sebelum dilakukan pengujian mencit dipuasakan terlebih dahulu selama 4-6 jam tetapi tetap diberi minum.

Setiap mencit diberi perlakuan sesuai kelompok seperti berikut :

- a. Kelompok 1 (Kontrol Positif) : Hewan diberi suspensi diazepam 0,0078 mg/KgBB
- b. Kelompok 2 (Kontrol Negatif) : Hewan diberi pembawa Na CMC 0,5%
- c. Kelompok 3 (Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara) : Hewan diberi ekstrak daun anak dara 1 mg/KgBB
- d. Kelompok 4 (Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara) : Hewan diberi ekstrak daun anak dara 2 mg/KgBB
- e. Kelompok 5 (Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara) : Hewan diberi ekstrak daun anak dara 4 mg/KgBB

Setelah itu, mencit ditempatkan pada posisi menggantung pada alat *Traction Test*, diamati saat masing-masing mencit mulai waktu jatuh hewan uji dan waktu balik badan mencit.

## 9. Pengumpulan Data

Setelah semua mencit mendapatkan perlakuan, diamati waktu waktu jatuh hewan uji dan waktu balik badan hewan uji dan pada alat *traction test*. Setelah pemberian ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) untuk masing-masing konsentrasi dibandingkan dengan pembanding/kontrol, kemudian dicatat data yang diperoleh.

## 10. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan Uji Statistik analisis varian (ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan uji *Post-Hoc Duncan*.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Penelitian dilakukan menggunakan 660 gram serbuk daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang dimasesrasi menggunakan larutan penyari etanol 70% sebanyak 13000 ml, sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 72 gram.

**Tabel 1.** Hasil Ekstraksi Daun Anak Dara

Jenis Ekstrak	Berat Simpilisia	Berat Ekstrak
Ekstrak Kental	660 gram	72 gram

##### 2. Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia merupakan tahap awal yang dilakukan pada saat pengujian, dimana dalam uji ini akan diperoleh golongan senyawa yang terdapat dalam sampel yang akan diuji.

**Tabel 2.** Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Pengujian	Perekasi	Hasil	Keterangan
Alkaloid	Mayer Dragendorff	-	Tidak ada
Fenolik	FeCl <sub>3</sub> 5%	+	Ada
Flavonoid	Serbuk Mg + HCL Pekat + Amyl Alcohol	+	Ada
Saponin	Asam Klorida 2 N	+	Ada
Tannin	FeCl <sub>3</sub> 5% + gelatin 10%	+	Ada
Steroid	Asam Asetat + Liebermann- Burchard	+	Ada
Terpenoid	Asam Sulfat Pekat	+	Ada

### 3. Hasil Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara

(*Croton oblongus* Burm F.)

**Tabel 3.** Hasil Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Kelompok Perlakuan	Pengujian	Lama Waktu Jatuh Mencit (detik)							Rata-rata (Detik)
		1	2	3	4	5	6	7	
Kelompok 1 Diazepam (2mg/KgBB)	1	86	70	50	61	59	63	70	65
	2	88	60	60	63	60	62	72	66
	3	90	70	60	60	60	50	70	65
		<b>Rata-rata</b>							<b>65</b>
Kelompok 2 (Na CMC)	1	258	178	76	80	80	175	65	130
	2	246	160	70	67	80	157	65	120
	3	230	168	77	77	80	155	60	121
		<b>Rata-rata</b>							<b>124</b>
Kelompok 3 EEDAD Dosis I, (1 mg/KgBB)	1	112	250	45	55	70	91	69	98
	2	110	230	40	55	67	90	70	94
	3	110	200	60	60	70	89	70	94
		<b>Rata-rata</b>							<b>95</b>
Kelompok 4 EEDAD Dosis I, (2 mg/KgBB)	1	58	68	65	51	54	100	88	64
	2	60	65	70	60	56	99	88	71
	3	70	60	70	60	60	100	80	71
		<b>Rata-rata</b>							<b>70</b>
Kelompok 5 EEDAD Dosis I, (4 mg/KgBB)	1	60	45	55	78	48	90	48	60
	2	70	50	50	70	50	80	50	60
	3	66	55	50	78	70	70	60	64
		<b>Rata-rata</b>							<b>61</b>

**KET :**

EEDAD : Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

#### 4. Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun

Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

**Tabel 4.** Hasil Rata-Rata Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton Oblongus* Burm F.)


Kelompok Perlakuan	Pengujian 1	Pengujian 2	Pengujian 3	Rata-rata (Detik)
Kelompok 1 Diazepam (2mg/KgBB)	65	66	65	65
Kelompok 2 (Na CMC)	130	120	121	124
Kelompok 3 EEDAD Dosis I, (1mg/KgBB)	98	94	94	95
Kelompok 4 EEDAD Dosis II, (2 mg/KgBB)	64	71	71	70
Kelompok 5 EEDAD Dosis III, (4 mg/KgBB)	60	60	64	61

**KET :**

EEDAD : Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

#### 5. Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun

Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



**Gambar 2.** Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

## 6. Hasil Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara

(*Croton oblongus* Burm F.)

**Tabel 5.** Hasil Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Kelompok Perlakuan	Pengujian	Lama Waktu Balik Badan (detik)							Rata-rata (Detik)
		1	2	3	4	5	6	7	
Kelompok 1 Diazepam (2 mg/KgBB)	1	140	178	56	60	143	80	80	106
	2	150	160	60	70	140	80	80	105
	3	124	167	60	70	140	87	80	104
		<b>Rata-rata</b>							<b>105</b>
Kelompok 2 (Na CMC)	1	60	20	15	33	18	27	17	27
	2	50	22	15	23	17	25	19	24
	3	60	25	13	30	20	20	20	26
		<b>Rata-rata</b>							<b>26</b>
Kelompok 3 EEDAD Dosis I, (1 mg/KgBB)	1	80	120	55	55	109	60	69	78
	2	78	100	50	50	98	50	65	70
	3	80	110	45	50	100	60	70	73
		<b>Rata-rata</b>							<b>74</b>
Kelompok 4 EEDAD Dosis II, (2 mg/KgBB)	1	107	68	78	85	82	70	88	82
	2	100	56	78	77	80	75	88	78
	3	100	70	80	80	80	70	80	80
		<b>Rata-rata</b>							<b>80</b>
Kelompok 5 EEDAD Dosis III, (4 mg/KgBB)	1	146	48	70	75	115	123	70	92
	2	150	45	70	70	100	120	60	87
	3	144	50	66	70	110	122	60	88
		<b>Rata-rata</b>							<b>89</b>

**KET :**

EEDAD : Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

## 7. Hasil Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun

### Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

**Tabel 6.** Hasil Rata-Rata Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton Oblongus* Burm F.)


Kelompok Perlakuan	Pengujian 1	Pengujian 2	Pengujian 3	Rata-rata (Detik)
Kelompok 1 Diazepam, (2 mg/KgBB)	106	105	104	105
Kelompok 2 (Na CMC)	27	24	26	26
Kelompok 3 EEDAD Dosis I, (1mg/KgBB)	78	70	73	74
Kelompok 4 EEDAD Dosis II, (2 mg/KgBB)	82	78	80	80
Kelompok 5 EEDAD Dosis III, (4 mg/KgBB)	92	87	88	89

### KET :

EEDAD : Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

## 8. Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun

### Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



**Gambar 3.** Grafik Rata-rata Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



## **B. Pembahasan**

Tanaman Anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) telah digunakan oleh masyarakat Sinjai, Sulawesi Selatan secara turun temurun sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah. Masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah telah menggunakan tanaman ini sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit. Tanaman Anak dara juga dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016).

Hipnotik dan sedatif adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat sehingga menimbulkan efek sedasi lemah sampai tidur pulas. Hipnotik adalah yang dapat menyebabkan kantuk dan mempermudah tidur serta mempertahankan waktu tidur yang menyerupai tidur fisiologi, sedangkan sedatif adalah senyawa yang menimbulkan sedasi, yaitu suatu keadaan terjadinya penurunan kepekaan terhadap rangsangan dari luar karena ada penekanan system saraf pusat yang ringan (Katingan, 2022).

Pada penelitian ini, sampel daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang telah diambil yang masih muda. Tahap awal dalam pembuatan simplisia yaitu pemanenan dan pengumpulan daun anak dara. Daun anak dara yang telah dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran berupa debu dan hama. Setelah itu di cuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian ditiriskan dan dikeringkan dengan tissue hingga air meresap. Setelah itu dimasukkan kedalam lemari pengering agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air yang

dikandung dalam tanaman sehingga kandungan bahan aktif dapat terjaga dari kerusakan oleh hidrolisis air, untuk mencengah tumbuhnya jamur, bakteri, dan menghentikan kerja enzim yang menyebabkan perubahan komposisi kimiawi tanaman tersebut. Pengeringan tidak dilakukan dibawah sinar matahari langsung untuk menghindari kerusakan bahan oleh sinar matahari (Inna, 2019).

Daun anak dara yang sudah kering didapat sebanyak 660 gram, kemudian diserbukan tanpa menggunakan air untuk mendapatkan derajat halus serbuk. Penyerbukan sangat penting untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil dan meningkatkan efektifitas penyarian. Efektifitas penyarian ini dapat dipengaruhi oleh ukuran partikel, karena semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar luas permukaannya dan akan semakin luas pula permukaan yang kontak dengan cairan penyari sehingga penyarian akan lebih efektif. Ukuran partikel yang semakin kecil juga akan mengurangi tebal lapisan batas dari cairan penyari. Semakin kecil tebal lapisan batas maka cairan penyari akan mempunyai jarak yang lebih kecil untuk menarik senyawa aktif yang ada dalam sel keluar sel dan terlarut dalam cairan penyari. Keluarnya zat aktif dalam sel tersebut karena perbedaan konsentrasi di dalam sel dan diluar sel (Inna, 2019).

Untuk pembuatan ekstrak etanol 70% daun anak dara dibuat dengan menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Maserasi adalah metode ekstraksi paling sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mangandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang ada di luar sel maka larutan yang terpekat akan didesak ke luar. Peristiwa ini berlanjut hingga tercapai kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dengan di dalam sel (Inna, 2019).

Metode ini dipilih karena alat yang digunakan sederhana, murah, dapat digunakan pada skala besar dan skala kecil, baik untuk golongan senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan, dan dapat diperoleh kandungan golongan senyawa yang banyak.

Sampel daun anak dara ditimbang sebanyak 660 gram, dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut etanol 70% sebanyak 13000 ml. Digunakan larutan penyari etanol 70% dengan pertimbangan bahwa etanol 70% yang merupakan pelarut serba guna yang baik untuk ekstraksi pendahuluan (Harborne, 1987). Selain itu pemilihan pelarut etanol 70% dikarenakan pelarut etanol 70% ini merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu mengikat semua komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan bahan alam baik yang bersifat non polar, semi polar dan polar. Setelah itu dibiarkan selama 3x24 jam terlindung dari cahaya, sambil sesekali diaduk. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari etanol 70% yang baru. Hal ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan alat *rotary evaporator* agar didapatkan hasil ekstraksi yang kering dan kental (Erjon et al.,2017).

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan. Mencit dipilih sebagai hewan percobaan karena memiliki

siklus hidup yang relatif pendek, mudah ditangani, harga yang relatif murah dan biaya pemeliharaan yang cukup rendah. Mencit jantan dipilih karena mencit jantan tidak mempunyai hormon estrogen, jika ada jumlahnya pun relatif sedikit serta kondisi hormonal pada mencit jantan lebih stabil jika dibandingkan dengan mencit betina karena pada mencit betina mengalami perubahan hormonal pada masa-masa estrus, masa menyusui, dan kehamilan dimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis hewan uji tersebut. Tingkat stress pada mencit betina lebih tinggi dibandingkan dengan mencit jantan yang mungkin dapat mengganggu penelitian (Muhtadi et al., 2014).

Hewan percobaan yang dipilih memiliki umur dan berat badan yang hampir sama, tujuannya agar dapat tercapai keseragaman dan menghindari variasi biologis, sehingga respon yang diberikan relatif sama. Hewan percobaan yang digunakan yaitu berat badan hewan uji 25 - 30 gram sebanyak 15 ekor. Sebelum digunakan semua hewan uji di aklimatisasi terlebih dahulu selama 7 hari agar hewan terbiasa dengan lingkungan yang baru.

Pemberian sediaan uji dilakukan selama 7 hari. Pada hari pengujian, hewan percobaan ditimbang, kemudian secara random (acak) dikelompokkan menjadi 5 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor hewan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, mencit diadaptasikan terlebih dahulu pada alat *traction test* selama 7 hari. Tujuan dilakukannya adaptasi yaitu agar mencit tidak stress dan terbiasa dengan tempat tinggal yang baru. Sebelum dilakukan pengujian mencit dipuaskan terlebih dahulu selama 4-6 jam tetapi tetap diberi minum.

Pada penelitian ini dilakukan uji efek hipnotik sedatif pada mencit dengan menggunakan alat *Traction Test*, dimana efek hipnotik ditunjukkan yaitu seberapa cepat waktu jatuh mencit pada alat tersebut, kemudian untuk efek sedatif ditunjukkan yaitu semakin lama balik badan maka efek sedatif sudah dirasakan oleh mencit pada alat tersebut begitupun sebaliknya. Kemudian pada penelitian ini digunakan kontrol positif yaitu diazepam dimana efek dari diazepam yaitu dapat memberikan efek sedatif dan hipnotik, adapun mekanisme kerja dari diazepam sebagai derivat dari benzodiazepine bekerja secara selektif pada reseptor asam gama-aminobutirat A ( $GABA_A$ ) yang memerantarai penghambatan transmisi sinaptik yang cepat melalui susunan saraf pusat (SSP), diazepam secara spesifik terikat pada tempat ikatan alosterik dan meningkatkan afinitas GABA pada reseptornya sehingga terjadi peningkatan frekuensi pembukaan kanal klorida. Pada penelitian ini digunakan kontrol negatif Na CMC 0,5% dikarenakan Na CMC ini digunakan sebagai pendispersi zat dalam aquadest menjadi sediaan suspensi, sehingga untuk melihat apakah Na CMC 0,5% ini tidak berpengaruh pada sediaan uji dan tidak memberikan efek apapun (Lestari, 2020).

Parameter yang diamati adalah penurunan aktivitas motorik dengan menggunakan metode *traction test* yaitu lengan hewan uji digantungkan pada suatu kawat dengan panjang 60 cm dan tiang penyangga 30 cm dari bawah lantai (Saputri et al., 2021).

Hewan uji yang abnormal akan memerlukan waktu lama untuk membalikkan badan dan akan segera terjatuh dari alat *Traction Test* dibandingkan hewan uji yang normal. Sedangkan hewan uji yang

normal akan segera membalikkan badan dengan cepat kurang dari 5 detik dan memiliki waktu yang lama dari Traction Test (Saputri et al., 2021).

1. Hasil Uji Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Waktu jatuh badan mencit dimulai setelah pemberian secara oral kelompok uji dan dicatat waktu jatuh mencit. Parameter uji lamanya waktu jatuh mencit dari alat *Traction Test* adalah semakin cepat waktu jatuh mencit maka semakin besar efek hipnotik yang ditimbulkan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil pada tabel 3 dan gambar 2 menunjukkan bahwa waktu jatuh mencit tercepat yaitu pada detik ke 61 pada kelompok 5 (4 mg/KgBB) dengan pemberian ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.), sedangkan waktu jatuh mencit terlama yaitu pada detik ke 95 pada kelompok 3 (2mg/KgBB) dengan pemberian ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) menunjukkan potensi efek hipnotik.

Waktu jatuh mencit yaitu dimulai setelah pemberian oral kelompok uji dan dicatat waktu jatuh mencit. Parameter uji lamanya waktu jatuh mencit dari alat *tarction test* adalah semakin cepat waktu jatuh mencit maka semakin besar efek hipnotik yang ditimbulkan, begitu pula sebaliknya. Pada uji beda Rata-rata Post Hoc Duncan terdapat perbedaan nyata efek hipnotik pada mencit antara kelompok 2 (Na CMC 0,5%) dengan semua perlakuan. Tetapi kelompok 3 (1 mg/kgBB, kelompok 4 (2 mg/KgBB), kelompok 5 (4 mg/KgBB) tidak berbeda nyata dengan Kontrol positif Diazepam (2 mg/KgBB)

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kelompok 2 (Diazepam 2 mg/KgBB) hampir sama dengan kelompok 5 (4 mg/KgBB) dalam memberikan efek hipnotik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) uji aktivitas hipnotik sedatif dimana hasil aktivitas hipnotik terdapat pada dosis tertinggi (80 mg/KgBB). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Saputri et.,al 2021) uji aktivitas hipnotik menunjukkan hasil aktivitas hipnotik pada dosis yang tertinggi (0,68g/KgBB).

Mekanisme kerja hipnotik dimana sebuah neurotransmitter utama yang bekerja pada sinapsis inhibitoris di dalam otak yang menghambat aktifitas susunan saraf pusat atau SSP (Wyann & Fougere dalam Amalia, 2009). Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa kimia seperti flavonoid, saponin, dan tanin, bila kontraksi dapat menghasilkan efek maksimum pada reseptor GABA (Afriani, et al., 2016; Novindriana, et al., 2013). Pengikatan senyawa-senyawa tersebut pada reseptor GABAA di membran pascasinaptik akan menghambat enzim GABA transminase sehingga jumlah GABA menjadi berlebih dalam otak dan menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor GABA. Adanya perbedaan komposisi ion dalam cairan intraselular maupun ekstraselular, mengakibatkan sel mengubah potensial membrannya sebagai respon terhadap stimulus yang diterima oleh sel tersebut (Samson et al.,2019).

2. Hasil Uji Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Waktu balik badan mencit yaitu dimulai setelah pemberian oral kelompok uji dan dicatat waktu yang diperlukan mencit untuk membalikkan badan. Parameter uji lamanya waktu balik badan mencit pada alat traction test adalah semakin lama waktu balik badan mencit maka akan semakin besar efek sedatif yang ditimbulkan, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil tabel 5 dan gambar 3 menunjukkan bahwa waktu balik badan mencit terlama yaitu pada detik ke 89 pada kelompok 5 (4 mg/KgBB) dengan pemberian ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.), sedangkan waktu balik badan mencit tercepat yaitu pada detik ke 74 pada kelompok 3 (2mg/KgBB) dengan pemberian ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) menunjukkan potensi efek sedatif.

Waktu balik badan mencit yaitu dimulai setelah pemberian oral kelompok uji dan dicatat waktu yang diperlukan mencit untuk membalikkan badan. Pada uji beda rata-rata Post-Hoc Duncan terdapat perbedaan nyata efek sedatif pada mencit antara kelompok 2 (Na CMC 0,5%) dengan kelompok 1 (Diazepam 2 mg/Kg BB). Kelompok 3 (1 mg/KgBB), kelompok 4 (2 mg/KgBB) dan kelompok 5 (4 mg/Kg BB), Tetapi kelompok 2 (Diazepam 2 mg/KgBB) dan kelompok 5 (4 mg/KgBB) tidak berbeda nyata atau hampir sama dalam memberikan efek sedatif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) uji aktivitas hipnotik sedatif dimana hasil aktivitas sedatif terdapat pada dosis



tertinggi (80 mg/KgBB). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Saputri et.,al 2021) uji aktivitas sedatif menunjukkan hasil aktivitas sedatif pada dosis yang tertinggi (0,68g/KgBB).

Efek sedasi yang dihasilkan dalam tubuh dimediasi melalui jalur GABA. Mekanisme kerjanya yaitu terjadi ikatan antara *Y-aminobutyric acid* (GABA) dengan reseptor GABA<sub>A</sub> serta penguatan konduktansi ion klorida yang dipicu oleh interaksi dengan GABA dengan reseptor GABA<sub>A</sub>. Kanal klorida yang terbuka menyebabkan banyak ion klorida yang masuk ke dalam sel dan mengakibatkan hiperpolarisasi sehingga mengurangi kemampuan sel untuk dirangsang (Katzung et al.,2017). Hal ini dikarenakan adanya kandungan senyawa kimia yaitu flavonoid pada daun anak dara dapat berefek pada system saraf pusat dengan memacu pusat inhibisi pada formation reticularis dan memodulasi reseptor GABA dan ligam-ion gated chanel sehingga dapat menghambat implus pengantar dan menyebabkan perlambatan reaksi (Astusi, 2018).

Senyawa steroid berikatan dengan steroid pada steroid binding site yang merupakan kompone kompleks protein pada reseptor GABAs yang nantinya mengakibatkan kanal ion klorida terbuka. Hal ini menyebabkan sel sukar terekesitasi sehingga terjadinya penurunan tonus otot yang ditandai dengan penurunan aktivitas. Hal inilah yang menyebabkan sedatif hipnotik dapat terjadi (Astuti, 2018).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus Burm F.*) memiliki aktivitas hipnotik dan sedatif pada mencit jantan dilihat pada waktu jatuh hewan uji dan waktu balik badan pada *traction test*.
2. Dosis ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus Burm F.*) mampu memberikan efek hipnotik sedatif pada mencit jantan dengan dosis 4 mg/ KgB. Pada uji hipnotik yaitu 61 detik, sedangkan sedatif yaitu 89 detik.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil uji aktivitas hipnotik sedatif, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, S. R., Riyanto, R., & Madang, K. (2016). Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (Piper Bettle Linn.) Terhadap Efek Sedasi Mencit (Mus Musculus L.) Dan Sumbangannya Pada Pembelajaran Biologi Sma. *Jurnal Pembelajaran Biologi: Kajian Biologi Dan Pembelajarannya*, 3(1), 27–34. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/fpb/article/view/4964>
- Alnamer, R., Alaoui, K., Boudida, E. H., Benjouad, A., & Cherrah, Y. (2012). Sedative and hypnotic activities of the methanolic and aqueous extracts of *Lavandula officinalis* from Morocco. *Advances in Pharmacological Sciences*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/270824>
- Awainah, N. (2016). *Standarisasi Ekstrak Metanol Klika Anak Dara* (Croton oblongus Burm F.).
- Agung, N. (2017). Buku Ajar: Teknologi Bahan Alam. In *Lambung Mangkurat University Press* (Issue January 2017).
- Aji, A., Bahri, S., & Tantalia, T. (2018). Pengaruh Waktu Ekstraksi Dan Konsentrasi Hcl Untuk Pembuatan Pektin Dari Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima*). *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.29103/jtku.v6i1.467>
- Astuti, K. I., & Fitriyanti. (2018). Uji Potensiasi Efek Sedatif-Hipnotik Ekstrak Etanol Kangkung Air (*Ipomoea aquatic*) Asal Gambut Kalimantan Selatan. *Borneo Journal of Pharmascientech*, 2(2), 59–65.
- CureResearch. 2004. Statistics by Country for Insomnia. Diakses dari <https://www.cureresearch.com/i/insomnia/stats-country.htm>, pada tanggal 03 Juli 2023.
- Dalimartha, S., 2006. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid 4*. Jakarta : Puspa Swara
- Erjon, Ningsih, P. W., & Rikmasari, Y. (2017). Efek Sedatif Ekstrak Etanol Umbi Wortel (*daucus carota L.*) Pada Mencit Putih Jantan Galur Swiss-Webster. *Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi*, 2(2), 17–26.
- Fransworth, NR., 1966, *Penapisan Biologis dan Fitokimia Tumbuhan*, *J.Pharm.Sc i.*, 55 (3), 225- 276.
- Gusti, M. N., Lestari, F., & Fitriyaningsih, S. P. (2016). Efek Sedatif-Hipnotik Ekstrak Etanol Daun Afrika ( *Vernonia amygdalina Delile* ) dalam Mempercepat Onset Tidur Mencit Swiss Webster Jantan. *Prosiding Farmasi*, 2, 777–781.
- Haeria, Ningsi, S., & Israyani. (2014). Penentuan Potensi Tabir Surya Ekstrak Klika Anak Dara (Croton Oblongus Burm F.). *Jurnal Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol. 2(1), 1–5.
- International Narcotics Control Board, 2016, INCB Report 2015, Vienna, Austria :101.*

- Katingan, K. (2022). *Sains Medisina. Uji Sedatif Ekstrak Etanol Daun Ketapang (Terminalia Catappa L) Di Daerah Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah* 1(1), 27–32.
- Kumar, R., Rao, P., & Sudireddy, R. (2021). *Effect of combination polymers of natural and semi synthetic origin on the drug release of Flavoxate . HCl Abstract : 4(1), 4–10.*
- Lestari, W., Suwendar, & Lestari, F. (2020). *Uji Aktivitas Hipnotik-Sedatif Ekstrak Etanol Biji Seledri (Apium graveolens. L.) pada Mencit Swiss Webster Jantan Dalam Mengatasi Gejala Gangguan Tidur (Insomnia).* 228–233. <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.22818>
- M. Emamghoreishi, G. H.-H., & Department. (2006). *Essential Oil of Coriander Seeds.* 31(1), 22–27.
- Moniruzzaman, M., Atikur Rahman, M., & Ferdous, A. (2015). Evaluation of sedative and hypnotic activity of ethanolic extract of Scoparia dulcis Linn. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2015. <https://doi.org/10.1155/2015/873954>
- Mukhriani, Paturusi, A. A. E., & AS, A. N. (2015). Fraksinasi Senyawa Antimikroba Daun Anak Dara (Croton oblongus Burm f.). *Jurnal Farmasi FIK UINAM*, 3(4), 193–200.
- National Sleep Foundation. *Insomnia and Women.* Diakses dari <https://sleepfoundation.org/insomnia/content/insomnia-women>, pada tanggal 03 Juli 2023.
- Nur, A., & Najib, S. Z. (2022). Skrining Fitokimia Dan Penetapan Kadar Total Fenol. *Indonesian Journal of Pharmaceutical and Herbal Medicine*, 1(2), 96–104.
- Onuekwusi E.C., Akanya H.O., Evans E.C. 2014. Phytochemical Constituents of Seeds of Ripe and Unripe Blighia Sapida (K. Koenig) and Physicochemical Properties of the Seed oil, *Internasional Journal of Pharmaceutical Science Invention* ISSN (Online): 2319-6718, ISSN September 2014 pp. 31-40 [www.ijpsi.org](http://www.ijpsi.org).
- Rahmah, A. R. (2016). Uji Efek Sedatif Ekstrak Daun Gynura procumbens (LOUR.) Merr Dengan Ekstraksi Bertingkat Terhadap Mencit Jantan Galur Balb/C. *Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Departemen Farmakognosi Dan Fitokimia Surabaya*, 7. [http://repository.unair.ac.id/56798/2/ff\\_ft\\_05\\_16.pdf](http://repository.unair.ac.id/56798/2/ff_ft_05_16.pdf)
- Rauf, A., Ningsi, S., Hasriani, A., & Mukhriani, M. (2020). Aktivitas Penghambatan Enzim Tirosinase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm F.). *Jurnal Kesehatan*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v1i1.18220>
- Razavi, B. M., Zargarani, N., & Hosseinzadeh, H. (2017). Anti-anxiety and hypnotic effects of ethanolic and aqueous extracts of Lippia citriodora leaves

and verbascoside in mice. *Avicenna Journal of Phytomedicine*, 7(4), 353–365. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28884085> <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5580873>

Saputri, M., Sudewi, S., Karimah, N., & Nadia, S. (2021). Uji Efektivitas Sedatif Ekstrak Etanol Daun Rambusa (*Passiflora foetida* L.) Terhadap Mencit Jantan (*Mus musculus*). *Journal of Pharmaceutical And Sciences*, 4(2), 93–100. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v4i2.80>


Samson, E., Ridwan, W. A. H., & Baszary, C. D. U. (2019). Potensi Sedatif-Hipnotik Daun Kayu Galala (*Erythrina Lithosperma*) Sebagai Kandidat Obat Insomnia. *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi*, 20(2), 84–94. <https://doi.org/10.33830/jmst.v20i2.166.2019>

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: *Pesan, Kesan dan Kekeragaman al-Quran* vol. 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sukandar, E. Y., Pratiwi, B., & Putri, R. A. (2022). Studi Literatur Tumbuhan Indonesia Dengan Aktivitas Hipnotik Sedatif Berdasarkan Khasiat Empiris Dan Data Uji Klinis. *Acta Pharmaceutica Indonesia*, 47(1), 29–42. <https://doi.org/10.5614/api.v47i1.16974>

Zhu, H., Zhang, L., Wang, G., He, Z., Zhao, Y., Xu, Y., Gao, Y., & Zhang, L. (2016). Sedative and hypnotic effects of supercritical carbon dioxide fluid extraction from *Schisandra chinensis* in mice. *Journal of Food and Drug Analysis*, 24(4), 831–838. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2016.05>



**LAMPIRAN****Lampiran 1. Skema Kerja**


## Lampiran 2. Perhitungan % Rendamen

Rendamen ekstrak dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat ekstrak yang di dapat}}{\text{Berat simplisia yang di ekstraksi}} \times 100 \%$$


$$\% \text{ Rendamen} = \frac{75 \text{ gram}}{660 \text{ gram}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Rendamen} = 11,40 \%$$




### Lampiran 3. Uji Skrining Fitokimia


#### a. Uji Alkaloid





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





**b. Uji Fenolik**

**c. Uji Flavonoid**


**d. Uji Saponin**

**e. Uji Tanin**


**f. Uji Steroid/ triterpenoid**

**g. Uji Terpenoid**

**Lampiran 4. Skema kerja Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Anak Dara**  
**(*Croton oblongus* Burm F.)**



### Lampiran 5. Pengujian *Traction Test*



**KET :**

EEDAD = Ekstrak Etanol Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



## Lampiran 6. Perhitungan Dosis

### 1. Dosis Ekstrak

a. Dosis ekstrak yang digunakan 1 mg/Kg BB.

1. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 30 g adalah :

$$\frac{1 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{30 \text{ g}}$$

$$x = \frac{1 \text{ mg} \times 30 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,03 \text{ mg}/30\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,03 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,03 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,3 \text{ ml}/30\text{gBB mencit}$$

2. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 29 g adalah :

$$\frac{1 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{29 \text{ g}}$$

$$x = \frac{1 \text{ mg} \times 29 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,029 \text{ mg}/29\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,029 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,029 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,3 \text{ ml}/29\text{gBB mencit}$$

3. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 28 g adalah :

$$\frac{1 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{28 \text{ g}}$$

$$x = \frac{1 \text{ mg} \times 28 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,028 \text{ mg}/28\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,028 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,0028 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,3 \text{ ml}/28\text{gBB mencit}$$

- b. Dosis ekstrak yang digunakan 2 mg/Kg BB.

1. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 30 g adalah :

$$\frac{2 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{30 \text{ g}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg} \times 30 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,06 \text{ mg}/30\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,06 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,06 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,6 \text{ ml}/30\text{gBB mencit}$$

2. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 29 g adalah :

$$\frac{2 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{29 \text{ g}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg} \times 29 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,058 \text{ mg}/29\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,058 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,058 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,6 \text{ ml}/29\text{gBB mencit}$$

3. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 28 g adalah :

$$\frac{2 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{28 \text{ g}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg} \times 28 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,056 \text{ mg}/28\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,056 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,056 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 0,6 \text{ ml}/28\text{gBB mencit}$$

c. Dosis ekstrak yang digunakan 4 mg/Kg BB.

1. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 30 g adalah :

$$\frac{4 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{30 \text{ g}}$$

$$x = \frac{4 \text{ mg} \times 30 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,1 \text{ mg}/30\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,1 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,1 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 1 \text{ ml}/30\text{gBB mencit}$$

2. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 29 g adalah :

$$\frac{4 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{29 \text{ g}}$$

$$x = \frac{4 \text{ mg} \times 29 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,16 \text{ mg}/29\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,16 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,16 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 1 \text{ ml}/29\text{gBB mencit}$$

3. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 28 g adalah :

$$\frac{4 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} = \frac{x}{28 \text{ g}}$$

$$x = \frac{4 \text{ mg} \times 28 \text{ g}}{1000 \text{ g}}$$

$$x = 0,12 \text{ mg}/28 \text{ gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{100 \text{ ml}} = \frac{0,12 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,12 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml}$$

$$x = 1 \text{ ml}/28\text{gBB mencit}$$

## 2. Dosis Diazepam

### 1. Diazepam yang digunakan 2 mg

Perhitungan dosis untuk mencit bobot 30 g adalah:

$$2 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,0052/20\text{gBB mencit}$$

$$= \frac{0,0052 \text{ mg}}{20 \text{ g}} = \frac{x}{30 \text{ g}}$$

$$x = \frac{0,0052 \text{ mg} \times 30 \text{ g}}{20 \text{ g}}$$

$$x = 0,0078 \text{ mg}/30\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{1000 \text{ ml}} = \frac{0,0078 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,0078 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 1000 \text{ ml}$$

$$x = 0,8 \text{ ml}/30\text{gBB mencit}$$

### 2. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 29 g adalah:

$$2 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,0052/20\text{gBB mencit}$$

$$= \frac{0,0052 \text{ mg}}{20 \text{ g}} = \frac{x}{29 \text{ g}}$$

$$x = \frac{0,0052 \text{ mg} \times 29 \text{ g}}{20 \text{ g}}$$

$$x = 0,0075 \text{ mg}/29\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{1000 \text{ ml}} = \frac{0,0075 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,0075 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 1000 \text{ ml}$$

$$x = 0,8 \text{ ml}/29\text{gBB mencit}$$

3. Perhitungan dosis untuk mencit bobot 28 g adalah:

$$2 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,0052/20\text{gBB mencit}$$

$$= \frac{0,0052 \text{ mg}}{20 \text{ g}} = \frac{x}{28 \text{ g}}$$

$$x = \frac{0,0052 \text{ mg} \times 28 \text{ g}}{20 \text{ g}}$$

$$x = 0,0072 \text{ mg}/28\text{gBB mencit}$$

Dilakukan pengenceran :

Minimal timbangan yang digunakan 10 mg

$$\frac{x}{1000 \text{ ml}} = \frac{0,0072 \text{ mg}}{10 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{0,0072 \text{ mg}}{10 \text{ mg}} \times 1000 \text{ ml}$$

$$x = 0,7 \text{ ml}/28\text{gBB mencit}$$

**Lampiran 7. Hasil ANOVA dilanjutkan Uji *Post Hoc* Duncan Aktivitas Hipnotik Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)**

ANOVA					
Lama Waktu Jatuh					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8243.067	4	2060.767	241.496	<,001
Within Groups	85.333	10	8.533		
Total	8328.400	14			

HIPNOTIK			
Duncan <sup>ab</sup>			
Kelompok perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Dosis III	3	61.33	
Diazepam	3	65.33	65.33
Dosis II	3	70.33	
Dosis I	3	95.33	
CMC	3		123.67
Sig.		.124	.062
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = 11,533.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000.			
b. Alpha = 0,05.			

**Lampiran 8. Hasil ANOVA dilanjutkan Uji *Post Hoc* Duncan Aktivitas Sedatif Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)**

ANOVA					
Lama Waktu Balik Badan					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	10607.600	4	2651.900	441.983	<,001
Within Groups	60.000	10	6.000		
Total	10667.600	14			

SEDATIF			
Duncan <sup>ab</sup>			
Kelompok perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
CMC	3	25.67	
Dosis I	3		73.67
Dosis II	3		80.00
Dosis III	3		89.00
Diazepam	3		104.67
Sig.		1.000	1.000
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on observed means. The error term is Mean Square (Error) = 6.133.			
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 7.000.			
b. Alpha = 0,05.			

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



### Lampiran 9. Dokumentasi



**Gambar 4.** Hasil Ekstrak



**Gambar 5.** Fenolik

RI  
ALA UDDIN  
M A K A S S A R




**Gambar 6. Flavonoid**




**Gambar 7. Saponin**



**Gambar 8. Tanin**





**Gambar 11.** Alkaloid



**Gambar 12.** Alat Traction Test



**Gambar 13.** Adaptasi Mencit Pada Alat Traction Test




**Gambar 14.** Pengujian Balik Badan mencit



**Gambar 15.** Pengujian Waktu Jatuh Mncit

## RIWAYAT HIDUP



**Nur Aulya Ramadhani**, Lahir di Makassar pada tanggal 30 November 2001. Anak pertama dari 3 bersaudara, anak dari pasangan bapak Achmad Nabohan dan ibu Yani. Penulis memiliki hobby berenang. Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Mangasa dan tamat pada tahun

2013, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2016. Tak berhenti sampai situ, penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Gowa dan tamat pada tahun 2019. Di tahun yang sama 2019 penulis melanjutkan Kembali pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Selama berkuliah selain menekuni bidang akademik, penulis juga mengeksplor kegiatan diluar bangku perkuliahan dengan aktif dalam Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi (FKIK).

Penulis dengan ini merasa sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah swt. serta doa restu dan dukungan penuh dari orang tua, keluarga besar dan teman-teman karena berkat doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Penulis akan selalu bersemangat untuk memberikan persembahan terbaik untuk orang-orang sekitar terkhusus pada orang tua tercinta.