

**UJI AKTIVITAS ANTIHIPERLIPIDEMIA PADA PEMBERIAN
BISKUIT SUBSTITUSI TEPUNG PORANG (*Amorphophallus oncophyllus*)
PADA TIKUS JANTAN (*Rattus norvegicus*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Farmasi Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SITI FARADILAH
70100119050
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Faradilah
Nim : 70100119050
Tempat/Tgl Lahir : Watubara, 10 Maret 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Pada Pemberian Biskuit
Subtitusi Tepung Porang (*Amorphophallus oncophyllus*)
Pada Tikus Jantan (*Rattus norvegicus*)

Menyatakan bahwa dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, September 2023

Penulis,

Siti Faradilah

NIM: 70100119050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Pada Pemberian Biskuit Substitusi Tepung Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) Pada Tikus Jantan (*Rattus Norvegicus*)", yang disusun oleh Siti Faradilah, NIM: 70100119050, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 09 November 2023 M yang bertepatan dengan 25 Rabiul akhir 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 09 November 2023 M

25 Rabiul akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si	(.....)
Penguji I	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm	(.....)
Penguji II	: Prof. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan



Dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes

19810621 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah swt karena segala Rahmat dan limpahan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang karena cahaya ilmu.

Skripsi yang disusun dengan judul “ Uji Aktivitas Anihiperlipidemia Pada Pemberian Biskuit Substitusi Tepung Porang (*Amorphophallus onchophyllus*) Pada Tikus Jantan (*Rattus norvegicus*) ini adalah salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dalam proses menyelesaikan skripsi yang tidak mudah ini, banyak kendala yang dihadapi, tetapi berkat banyaknya doa dan dukungan dari orang-orang yang senantiasa mendoakan dan membantu sehingga penulis dapat mengatasi kendala dan menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya tersayang, Ayahanda Arifin Hamid dan Ibunda Andiwianto serta saudara saya Fikrul Fahmi, yang senantiasa selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh baik berupa materi dan nasehat, serta semua keluarga yang selalu memberikan restu dan doa'nya kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis juga menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar,

2. Prof. Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor 1 UIN Alauddin Makassar,
3. Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Alauddin Makassar,
4. Prof. Muhammad Khalifa Mustami, M.Pd. selaku Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar, dan
5. Prof. Muhammad Amry, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
6. Ibu Dr. dr Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
8. Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unuversitas Islam Negeri Alauddin Makassar
10. Ibu Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
11. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

12. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
13. Ibu Apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si Selaku pembimbing kedua saya dan pembimbing akademik saya yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
14. Apt. Nur Azizah Syahrana,. S.Farm., M. Farm selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dr. Muhammad Shuhufi, S.Ag., M.Ag selaku penguji keislaman yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca.

Samata-Gowa, 2023

Penulis,

Siti Faradilah

70100119050

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Sampel Umbi Porang (<i>Amorphophallus Oncophyllus</i>)	8
1. Klasifikasi	8
2. Nama Daerah.....	8
3. Morfologi	9
4. Manfaat Dan Kegunaan	10
B. Uraian Hewan Coba Tikus Jantan (<i>Rattus Norvegicus</i>)	11
1. Klafikasi	11
2. Morfologi	11
C. PENGANTAR FARMAKOLOGI	14
1. Hiperlipidemia.....	14
2. Lemak.....	19
3. Lipoprotein.....	20
4. Kolesterol	20
D. PENGANTAR BISKUIT.....	23
E. PENGANTAR FITOKIMIA.....	24
F. TINJAUAN ISLAMI	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	30

1. Jenis Penelitian	30
2. Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	30
1. Populasi	30
2. Sampel	30
D. Instrument Penelitian	30
1. Alat	30
2. Bahan	31
E. Metode Pengumpulan Data Dan Teknik Pengolahan	31
1. Pengambilan Sampel	31
2. Pengolahan Sampel	31
3. Pembuatan Biskuit	32
4. Pengujian Efek Antihiperlipidemia	33
5. Pengumpulan Dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Hasil Pembuatan Tepung Porang	38
2. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol	38
3. Hasil Penurunan Kadar Kolesterol	39
4. Hasil Uji Hedonik	41
B. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	54
RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lipoprotein Dan Kandungan Lipid	20
Tabel 2. Kadar Kolesterol Total	21
Tabel 3. Kadar Kolesterol Di Beberapa Bahan Pangan (mg/100 Gram)	22
Tabel 4. Formula Dasar	32
Tabel 5. Formulasi	33
Tabel 6. Uji Hedonik Aroma	36
Tabel 7. Uji Hedonik Rasa	36
Tabel 8. Uji Hedonik Warna	37
Tabel 9. Uji Hedonik Tekstur/Kerenyahan	37
Table 10. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol	38
Tabel 11. Hasil Pengukuran Penurunan Kadar Kolesterol Pada Tikus Setiap Kelompok	39
Tabel 12. Kadar Kolesterol Setelah Pemberian Biskuit Tepung Porang	40
Tabel 13. Hasil Uji Hedonik Aroma	41
Tabel 14. Hasil Uji Hedonik Rasa	42
Tabel 15. Hasil Uji Hedonik Warna	43
Tabel 16. Hasil Uji Hedonik Tekstur/Kerenyahan	44


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman Umbi Porang (<i>Amorphophallus oncophyllus</i>)	8
Gambar 2. Umbi porang (<i>Amorphophallus oncophyllus</i>)	9
Gambar 3. Tikus Jantan (<i>Rattus Norvegicus</i>)	11
Gambar 4. Peta Lokasi Pengambilan Sampel	57
Gambar 5. Pengelolaan Sampel	58
Gambar 6. Pengelolaan Biskuit Tepung Porang	60
Gambar 7. Perlakuan terhadap hewan uji	61
Gambar 8. Kelompok I	64
Gambar 9. Kelompok II	64
Gambar 10. Kelompok III	65
Gambar 11. Kelompok IV	65
Gambar 12. Hasil SPSS	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	54
Lampiran 2. Lokasi	57
Lampiran 3. Gambar Pengamatan	58
Lampiran 4. Penurunan Kolesterol	63
Lampiran 5. Grafik perubahan kadar kolesterol	64
Lampiran 6. Hasil Pengolahan Data Pada Aplikasi SPSS	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Siti Faradilah

NIM : 70100119050

Judul : Uji Aktivitas Antihiperlipidemia Pada Pemberian Biskuit Substitusi Tepung Porang (*Amorphophallus oncophyllus*) Pada Tikus Jantan (*Rattus norvegicus*)

Tanaman umbi porang adalah salah satu jenis umbi yang awalnya tumbuh liar di pekarangan rumah atau di hutan kemudian sekarang banyak di budidayakan. Umbi porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) mengandung senyawa glukomanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada tikus (*Rattus Norvegicus*). Dalam penelitian ini dilakukan Formulasi Biskuit Substitusi Tepung Porang terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Tikus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penurunan kadar kolesterol dengan menggunakan tepung porang yang dibuat dalam bentuk biskuit terhadap tikus Jantan. Penelitian ini menggunakan 12 ekor tikus yang dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 4 jenis perlakuan. Tikus hiperlipidemia dengan penginduksian kuning telur puyuh. Semua tikus diukur kadar kolesterol awalnya. Untuk kelompok I diberikan biskuit tepung porang formula 1 sebanyak 100 gram. Untuk kelompok II diberikan formula 2 biskuit sebanyak 75 gram. Untuk kelompok III diberikan biskuit formula 3 sebanyak 50 gram. Untuk kelompok IV diberi formula 4 tanpa menggunakan tepung porang sebagai kontrol negatif. Pemberian ini dilakukan secara peroral. Hasil pada biskuit formula 1,2 dan 3 dengan pemberian tepung porang sebanyak masing- masing 100 gram, 75 gram dan 50 gram, dapat menurunkan kadar kolesterol pada tikus jantan.

Kata Kunci: Biskuit, Umbi Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*), Tikus, Antihiperlipidemia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Nama : Siti Faradilah

NIM : 70100119050

Judul : Antihyperlipidemia Activity Test on Giving Biscuits Substituted with Porang Flour (*Amorphophallus Oncophyllus*) in Male Rats (*Rattus norvegicus*)

The porang tuber plant is a type of tuber that originally grew wild home gardens or in the forest and is now widely cultivated. Porang tubers (*Amorphophallus oncophyllus*) contain glucomannan compounds that can reduce cholesterol levels in rats (*Rattus norvegicus*). In this study, the Formulation of Biscuits Substituted with Porang. Toward Lowering Cholesterol Levels in Male Rats was carried out. This study aims to determine the potential to reduce cholesterol levels by using porang flour made in the form of biscuits for male rats. This study used 12 rats which were divided into 4 groups. Each group is divided into 4 types of treatment. Hyperlipidemia rats with quail egg yolk induction. All rats were measured for initial cholesterol levels. Group I was given porang flour biscuits formula 1 as much as 100 grams. Group II was given formula 2 biscuits as much as 75 grams. Group III was given formula 3 biscuits as much as 50 grams. Group IV was given formula 4 without using porang flour as a negative control. This administration was done orally. The results of biscuit formulas 1, 2 and 3 with porang flour as much as 100 grams, 75 grams and 50 grams, respectively, can reduce cholesterol levels in male rats.

Keywords: Biscuit, Porang tubers (*Amorphophallus Oncophyllus*), Rats, Antihyperlipidemia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular akibat aterosklerosis yang diakibatkan karena potensi lemak (kadar kolesterol) tinggi. Kolesterol yang menempel di area pembuluh arteri coroner, yang juga menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia. Hiperlipidemia merupakan salah satu penyebab resiko terjadinya penyakit jantung koroner (PJK) (Mahirdini silmi dan afifah nur, 2016).

Hiperlipidemia adalah meningkatnya lemak di dalam darah akibat asupan lemak dalam tubuh berlebihan sehingga asupan lemak dalam tubuh tidak seimbang. Hiperlipidemia juga merupakan penyakit karena tingginya konsentrasi lipid dalam darah dan kadar kolesterol dalam darah meningkat melebihi kadar kolesterol normal pada manusia yaitu > 200 mg/dl. Hal ini dikarenakan meningkatnya degradasi oksidatif lemak yang di akibatkan oleh oksigen yang berada di dalam tubuh seperti organ hati (Rosalina, 2019).

Dilihat hasil RISKESDAS Pada tahun 2018, 7,6% masyarakat Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mempunyai kadar kolesterol. Tinggi (≥ 240 mg/dL). Sebanyak 24,3% memiliki kadar HDL yang rata-rata rendah (≤ 40 mg/dl) (Riskesdas, 2018). Diperkirakan 94,6 juta orang dewasa di Amerika Serikat mempunyai kolesterol tinggi dengan skor 200. mg/dl (5,17 mmol/l) atau lebih tinggi. 1 dari 3 orang dewasa di Amerika Serikat kolesterol tinggi (LDL); (Marie A et al., 2019). 3,4% populasi mempunyai kadar LDL yang sangat tinggi (≥ 190 mg/dl) dan selanjutnya 0,8% Penduduk dengan kadar trigliserida sangat tinggi (≥ 500 mg/dl) (Riskesdas, 2018).

Hiperlipidemia dapat terjadi secara primer ataupun sekunder. Hiperlipidemia primer diakibatkan karena faktor genetik, sedangkan hiperlipidemia sekunder diakibatkan oleh penyakit lain, seperti diabetes mellitus, hipotiroid, obesitas, dan lain-lain. Dan juga karena obat seperti diuretic, β blocker, kontrasepsi oral dll (Riskesdas, 2018).

Serat pangan mempunyai mekanisme kerja yaitu menghindari perkembangan gangguan metabolisme seperti halnya dalam tubuh dan menghindari penyakit kardiovaskular. Serat pangan dapat mengikat empedu, hal ini dapat meningkatkan perubahan kolesterol dalam darah berkurang. Selain itu dalam menunjang penyembuhan hiperlipidemia yaitu dengan mengatur pola makan terutama membatasi asupan lemak berlebih (Riskesdas, 2018).

Tepung porang sebagai pengganti tepung terigu dalam membuat biskuit memiliki pengaruh yang sangat baik pada kenaikan serat pangan, perbandingan tepung porang dan tepung terigu adalah 40% : 60% (Mahirdini. S, 2016). Dilihat dari penelitian dalam dosis 200 mg pemberian tepung porang menunjukkan efek maksimal dalam mencegah terjadinya penumpukan lemak yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah (Urli, dkk. 2017).

Biskuit adalah sejenis makanan yang dibuat dengan komposisinya terdiri dari tepung lain atau jenis tepung terigu, lemak atau minyak, dan menambahkan campuran pangan lain atau penambahan bahan lain, kemudian dipanggang didalam oven. Hasil data dari asosiasi industry, tahun 2012 konsumsi biskuit meningkat. (Jagat, 2017).

Konsumen (masyarakat) sekarang sangat memperhatikan kesehatan dan pola hidup, makanan bergizi, jumlah kalori, kadar gula rendah, Makanan berserat tinggi seperti makanan berprotein tinggi dan rendah lemak seperti biskuit (kue

kering). Kue kering merupakan salah satu makanan siap saji paling populer, umur simpan yang lama dan nilai gizi yang tinggi (Amin T, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat dilakukan penelitian tentang potensi biskuit umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus jantan (*Rattus norvegicus*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah biskuit umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus*) memiliki potensi sebagai terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus jantan (*Rattus norvegicus*) ?
2. Formula biskuit manakah memiliki potensi terbaik sebagai terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus jantan (*Rattus norvegicus*) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah biskuit umbi porang (*amorphophallus oncophyllus*) memiliki potensi terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus jantan (*rattus norvegicus*)
- b. Untuk mengetahui formulasi terbaik yang memiliki potensi sebagai terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus jantan (*rattus norvegicu*)

2. Manfaat Penelitian

- a. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemanfaatan bahan alam dalam pembuatan makanan sehat dan mengembangkan substitusi tepung porang dalam pembuatan biskuit.
- b. Sebagai sarana pembelajaran untuk orang yang membacanya.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Uji Aktifitas merupakan suatu metode untuk menentukan menentukan aktifitas hiperlipidemia dari substitusi tepung porang dalam membuat biskuit tepung porang yang akan di uji pada mencit jantan
- b. Antiperlipidemia adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma atau lemak dalam darah.
- c. Biskuit adalah salah satu produk makanan sehat yang diolah dengan cara dipanggang dengan menggunakan bahan aktif tepung porang.
- d. Substitusi adalah pengganti. Substitusi tepung porang adalah bahan pengganti dalam pembuatan biskuit tepung porang.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, dimana dilakukan uji aktifitas antihiperlipidemia substitusi tepung porang pada mencit jantan.

E. Kajian Pustaka

1. Menurut penelitian Silmi Mahardini dan Dian Nurafifah pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Terigu Dengan Tepung Porang (*Amorphophallus Oncopphyllus*) Terhadap Kadar Protein, Serat Pangan, Lemak, Dan Tingkat Penerimaan Biskuit. Dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam metode eksperimental. Perhitungan kandungan zat gizi bahan utama pembuatan biskuit yang ditetapkan dengan dipertimbangkannya total kadar protein, lemak, dan serat pangan untuk pasien kardiovaskular menjadi dasar penetapan formulasi. Tepung porang menjadi pengganti tepung terigu terpengaruh pada penurunan kadar lemak pada biskuit. Analisis kandungan lemak menunjukkan perlakuan alternatif tepung porang 0% dan tepung terigu 100% memiliki 33,30%, kandungan lemak kemudian meningkat dua

kali lipat dibandingkan dengan biskuit yang disubstitusi dengan tepung porang 100%. Dan 0% tepung terigu. Penelitian telah menunjukkan bahwa makanan yang mempunyai kandungan glukomanan meningkatkan profil lipid dan dapat digunakan sebagai pengobatan potensial untuk kadar glukomanan dalam umbi-umbian ini.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tepung porang mempunyai kadar glukomanan yang tinggi sehingga dapat menurunkan kadar lipid. Hal ini menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian ini.

2. Menurut penelitian Saputri Risa, dkk pada tahun 2021 yang berjudul Pengaruh pemberian jelly mengandung glukomanan porang (*Amorphophalus oncophyllus*) dan inulin sebagai makanan selingan terhadap berat badan, IMT, lemak tubuh, kadar kolesterol total, dan trigliserida pada orang dewasa obesitas. Dengan menggunakan rancangan penelitian randomized controlled trial (RCT) dengan pre-post test group design dalam metode eksperimental. Pemberian jelly yang mengandung inulin dan glukomanan porang dapat menurunkan IMT, berat badan dan kadar lemak dalam tubuh sehingga mendukung program terjaganya berat badan dari obesitas. Konsumsi jeli porang-inulin dapat mencegah naiknya kadar trigliserida dan kadar kolesterol orang dewasa yang mengalami obesitas.

Hal ini menjadi acuan untuk peneliti melakukan penelitian ini karena tepung porang mengandung kadar glukomanan yang tinggi sehingga mampu menurunkan kadar lipid.

3. Menurut penelitian Nurinda eva, dkk pada tahun 2018 yang berjudul porang flour with keji beling maceration reduced total cholesterol levels in diabetic rats male wistar rats. dengan desain pre post control group desain dalam

metode eksperimental. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Madah (UGM) lebih tepatnya di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi (PSPG) pada bulan juni sampai juli 2017. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak tepung porang menurunkan kadar kolesterol total darah tikus sebesar 28,76%. Metode penelitian dan penggunaan tepung porang sebagai bahan penelitian menjadi salah persamaan dari penelitian ini.

4. Menurut penelitian Putu Mirah Danawati dalam jurnal bioshell yang berjudul “Uji Preventif Tepung Umbi Porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) Terhadap Kenaikan Kolesterol Total Tikus (*Rattus norvegicus* L.)” pada tahun 2022. Dengan metode true eksperimental research dengan menggunakan design penelitian pretest and post test randomized controlled group design. Didapatkan hasil bahwa Tepung umbi porang dapat mencegah terjadinya kenaikan kolesterol total darah atau mempertahankan kadar kolesterol total darah pada rentang normal. Glukomanan dalam tepung umbi porang memiliki sifat sebagai serat yang mampu menyerap air. Serat tersebut dapat mengikat garam empedu di lumen usus. Secara normal lebih dari 95% garam empedu akan di daur ulang dengan cara diserap oleh darah dan dikembalikan lagi di hati. Serat ini akan menghambat proses daur ulang dan garam empedu akan diekskresikan melalui feses, sehingga hanya sedikit garam empedu yang dikembalikan ke hati. Hal ini akan merangsang hati untuk membentuk garam empedu yang baru dan akan mengambil kolesterol dari darah sebagai bahan pembentuk garam empedu. Semakin banyak garam empedu yang dibentuk maka kolesterol yang beredar di dalam darah akan semakin berkurang atau turun.

Tepung umbi porang dengan dosis 25, 50, 100 mg/200 gBB dapat berpengaruh secara preventif dalam kenaikan kadar kolesterol total darah

tikus jantan galur wistar yang diberikan diet tinggi lemak dan tinggi fruktosa. Saran pada penelitian ini yaitu perlu dilakukan pengujian terkait menggunakan model tikus hiperlipidemia. Untuk mengetahui apakah dosis tepung umbi porang yang sama mampu menurunkan kadar kolesterol total darah tikus hiperlipidemia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Umbi Porang (*Amorphophallus oncophyllus*) (ITIS, 2022).



Gambar 1: Tanaman Umbi Porang (*Amorphophallus oncophyllus*)

<i>Familia</i>	: <i>Araceae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Amorphophallus</i>
<i>Species</i>	: <i>Amorphophallus oncophyllus</i> Prain
<i>Divisio</i>	: <i>Magnoliophyta</i>
<i>Class</i>	: <i>Liliopsida</i>
<i>Sub Class</i>	: <i>Arecidae</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Arales</i>
<i>Regnum</i>	: <i>Plantae</i>
<i>Sub Regnum</i>	: <i>Tracheobionta</i>
<i>Super Divisio</i>	: <i>Spermatophyta</i>

2. Nama Daerah

Tanaman porang di Indonesia mempunyai banyak nama tergantung dari daerah asalnya. Contohnya, di Sunda dikenal dengan acung atau acoan oray, di

Nganjuk dikenal dengan kajrong, dan sebagainya. Tanaman ini dikenal dengan nama iles-iles, tire, acung atau acoan, tire, di beberapa daerah.

3. Morfologi



Gambar 2. Umbi porang (*Amorphophallus oncophyllus*)

Tanaman umbi porang adalah salah satu jenis umbi yang awalnya tumbuh liar di pekarangan rumah atau di hutan kemudian sekarang banyak di budidayakan. Tumbuhan umbi porang dengan mempunyai warna pada batang yaitu bercak putih dengan hitam atau hijau halus kemudian tegak dan lunak. Mempunyai tiga batang sekunder dari batang tunggal kemudian pada batang sekunder akan menjadi tempat tumbuhnya daun (ITIS, 2022).

Porang mempunyai umbi yang berada didalam tanah kemudian tumbuh batang yang tegak lurus berwarna hijau atau hitam dengan bercak putih. Diameter batang umbi porang sesuai dengan umur tumbuh tanaman porang yakni berukuran 5-50 mm. Tangkai yang halus berwarna kecoklatan atau hijau kecoklatan dengan sejumlah bercak putih yang mempunyai ukuran 40 sampai 180 cm x 5 cm. Tinggi tanaman umbi porang 1,5 m dan batang umbi porang mulai layu ketika memasuki musim kemarau dan tumbuh kembali ketika musim ketika musim hujan tergantung iklim dan tingkat kesuburan tanah (ITIS, 2022).

Daun porang termasuk daun yang terdiri dari beberapa kesatuan dan dibagi menjadi beberapa helai daun (menjari). Ujung daun umbu porang berbentuk runcing dan dan begelombng pada permukaan daun yang halus, kemudian ada bermacam – macam warna daun seperti daun tua berwarna kuning, daun muda berwarna hijau dan daun muda berwarna ungu muda. Semua tumbuhana porang mempunyai 4 daun dari beberapa kesatuan dan terdapat 10 helai dari tiap kesatuan dengan lebar daun mencapai sekitar 25-150 cm sesuai dengan umur tanaman (ITIS,2022).

Setiap tanaman umbi porang menghasilkan satu umbi karena merupakan salah satu umbi tunggal dengan berat umbi 3 kg dan besar umbi 28 cm. Mempunyai bentuk agak lonjong dan bulat dengan mempunyai akar serabut, dengan berat tumbuh tanaman umbi porang pada satu periode yakni 50-200g, pada dua periode yakni 250-1.350g, dan pada tiga periode tumbuh yakni 450-3.350g. Tanaman porang akarnya menyelimuti umbi. Tanaman umbi porang tidak memiliki akar tunggang, sebelum bibit tumbuh daun, dalam waktu satu minggu hingga dua minggu akar akan tumbuh dengan cepat kemudian tumbuh tunas baru (ITIS, 2022).

Bunga umbi porang tersusun atas spatha (daun pelindung), putik dan benang sari, bunga tumbuh saat umbi tidak mengalami tumbuh daun ketika musim hujan. Benang sari terletak diatas putik yang berwarna merah hati (maroon). *Spatha* (daun pelindung) mempunyai bentuk agak tegak, agak bulat, tinggi mencapai hingga 20-28 cm, dan mempunyai bercak putih pada warna hijau keunguan di pelindung bunga. bentuk bunga tumpul dan mempunyai garis tengah 407 cm dan, 10-20 cm tingginya. Garis tengah 16- 28 cm dan mempunyai permukaan yang licin dengan warna hijau muda – hijau tua, serta mempunyai tangkai dengan Panjang 25-45 cm (ITIS, 2022).

4. Manfaat dan Kegunaan

Di Indonesia tumbuhan yang mengandung glukomanan paling tinggi adalah *Amorphophallus oncophyllus*. Merupakan salah satu jenis porang yang paling banyak tumbuh di daerah Jawa. Kandungan glukomanan terdapat dalam umbi porang. Glukomanan berpotensi memberikan manfaat kesehatan karena memiliki sifat penyembuhan yang kuat seperti aktivitas antihiperlipidemia, aktivitas antiobesitas, dan hiperkolesterolemia, aktivitas prebiotik, aktivitas antiinflamasi serta efek pencahar. (pasaribu, 2020)

Tanaman ini mengandung glukomanan, suatu karbohidrat yang penting. Jumlah glukomanan pada tanaman porang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman umbi lain, juga merupakan sumber glukomanan non-pohon yang cukup besar. Glukomanan membuat tanaman porang tidak hanya berguna sebagai bahan pangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai pengental, pengikat, pengencer air, dan lain-lain. Dalam bidang kesehatan, glukomanan memiliki efek positif terhadap kesehatan, seperti mengurangi risiko kanker, menurunkan berat badan, menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), dan mengatasi masalah konstipasi. (Hidayah, 2016)

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Tikus (*Rattus Norvegicus*) (ITIS, 2022).



Gambar 2 : Tikus Jantan (*Rattus norvegicus*)

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : *Vertebrata*

Kelas : *Mamalia*

Ordo : *Rodentia*

Subordo : *Myomorpha*

Famili : *Muroidae*

Subfamili : *Murinae*

Genus : *Rattus*

Spesies : *Rattus norvegicus*

2. Morfologi

Tikus (*Rattus*) adalah hewan yang sering digunakan dalam setiap penelitian. Tikus (*Rattus*) cocok untuk berbagai penelitian karena sifat-sifatnya yang Sebagian besar sudah diketahui seperti, mudah dipelihara dan sangat relative untuk berbagai macam penelitian. Tikus dapat hidup selama 3,5 tahun dengan pertumbuhan kenaikan berat badan 5g/ hari (ITIS, 2022).

Tikus yang paling umum digunakan dalam penelitian ialah tikus putih, karena mudah dikerjakan, bersifat lebih tenang dan tidak terlalu takut terhadap cahaya. Tikus mempunyai ukuran yang lebih besar dan cenderung lebih pintar di bandingkan mencit. Kehadiran manusia tidak begitu membuat tikus merasa terganggu. Tingkah laku tikus biasanya, mengunyah, memanjat, bersarang, menggali, menyelidiki aroma sesuatu dan mencari (ITIS, 2022).

Sistem reproduksi, sistem saraf, kecemasan, dan penyakit (kanker dan diabetes) yang ada pada tikus memiliki kesamaan dengan manusia. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesamaan DNA dan ekspresi gen, 98% gen pada manusia memiliki gen sebanding dengan gen tikus. Tikus (*rattus*) mempunyai penciuman, sentuhan dan pendengaran yang berkembang dengan sangat baik. kelenjar hardarian yang berada di bagian belakang mata dan berada dalam di Sebagian orbita

yang menyebabkan tikus mempunyai penglihatan yang kurang baik. Kelenjar hardaria ini mensekresi kelenjar lipid dan pigmen porfirin yang berfluoresensi di bawah sinar UV. Sekresi meningkat dengan adanya stres dan penyakit (ITIS, 2022).

Karantina bagi binatang penting dilakukan, berkaitan dengan pengiriman binatang ke tempat penelitian, masa inkubasi virus dan bakteri, dan riwayat kesehatan. Selanjutnya, stabilisasi dilakukan pada tikus selama 3–5 hari untuk mengurangi stressor yang didapatkan tikus karena perbedaan lingkungan baru di tempat penelitian dan lingkungan sebelumnya. Tikus perlu dibiasakan untuk kontak dengan operator atau handler secara gentle pada awal-awal masa hidupnya. Selain mengurangi stressor handling, hal ini juga mempermudah tikus bereaksi terhadap stimulus yang digunakan pada penelitian. Tiga hari masa aklimasi merupakan waktu minimal yang dibutuhkan tikus untuk beradaptasi, walaupun beberapa binatang percobaan kadang memerlukan masa aklimasi yang lebih panjang, disesuaikan dengan prosedur penelitian, dan sistem organ atau parameter fisiologi yang diteliti (ITIS, 2022).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memelihara tikus antara lain gedung sebagai tempat pemeliharaan tikus berupa bangunan permanen. Dinding gedung terbuat dari bahan kokoh, atap dapat menghangatkan ruangan, lantai mudah dibersihkan, serta pintu dan jendela gedung terbuat dari besi yang berengsel (ITIS, 2022).

Kandang (*Cage*) Lokasi disesuaikan dengan kondisi hewan coba. Kandang berbentuk kotak terdiri dari besi, kayu, dan plastik bening, terdapat tempat berlindung, serta hygiene pada kandang dan sekitarnya harus selalu dijaga (ITIS, 2022).

Kondisi lingkungan Suhu lingkungan yang diharapkan, yakni 18–26°C, jika perlu dapat menggunakan pengatur suhu. Selain itu, sinar matahari secara langsung dan suara kebisingan harus dihindari serta ventilasi lingkungan dipertahankan tetap baik agar kelembapan mencapai 30–70% dan mencegah *airborne disease* dengan pertukaran udara yang baik (ITIS, 2022).

Makanan dan minuman Makanan berupa pelet dan suplemen tambahan. Kandungan pelet, yaitu 10–15% rumput, 10–15% susu kering, 60–70% tepung gandum, 20% tepung kedelai dan 1% garam. *Pelet* diletakkan dalam wadah makanan (tinggi 2 cm), sedangkan air minum berada dalam botol yang digantung (ITIS, 2022).

Alas tidur (*Bedding*) Alas atau lantai tempat pemeliharaan harus memiliki daya serap yang baik, bebas dari bahan berbahaya, dan tidak mudah dimakan. Alas terbuat dari bahan kering seperti jerami atau serabut kayu dan diganti secara berkala (ITIS, 2022).

C. Pengantar Farmakologi

1. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah meningkatnya lemak di dalam darah akibat asupan lemak dalam tubuh berlebihan sehingga asupan lemak dalam tubuh tidak seimbang. Hiperlipidemia juga merupakan penyakit karena tingginya konsentrasi lipid dalam darah dan kadar kolesterol dalam darah meningkat melebihi kadar kolesterol normal pada manusia yaitu > 200 mg/dl. Hal ini dikarenakan meningkatnya degradasi oksidatif lemak yang di akibatkan oleh eksogen yang berada di dalam tubuh seperti organ hati (Pradana et al., 2018).

Hiperlipidemia merupakan salah satu kondisi yang dipicu oleh gaya hidup tersebut. Saat ini prevalensi hiperlipidemia masih tinggi. Prevalensi hiperlipidemia di dunia sekitar 45%, di Asia Tenggara sekitar 30% dan di Indonesia 35% (Kemenkes RI, 2017; Balitbangkes, 2013; WHO, 2019).

a. Epidemiologi

Dilihat hasil RISKESDAS Pada tahun 2018, 7,6% masyarakat Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mempunyai kadar kolesterol. Tinggi (≥ 240 mg/dL). Sebanyak 24,3% memiliki kadar HDL yang rata-rata rendah (≤ 40 mg/dl) (Riskesdas, 2018).

Diperkirakan 94,6 juta orang dewasa di Amerika Serikat mempunyai kolesterol tinggi dengan skor 200. mg/dl (5,17 mmol/l) atau lebih tinggi. 1 dari 3 orang dewasa di Amerika Serikat kolesterol tinggi (LDL); (Marie A et al., 2019).

3,4% populasi mempunyai kadar LDL yang sangat tinggi (≥ 190 mg/dl) dan selanjutnya 0,8% Penduduk dengan kadar trigliserida sangat tinggi (≥ 500 mg/dl) (Riskesdas, 2018).

b. Patofisiologi

Hiperlipidemia dapat terjadi secara primer ataupun sekunder. Hiperlipidemia primer diakibatkan karena faktor genetik, sedangkan hiperlipidemia sekunder diakibatkan oleh penyakit lain, seperti diabetes mellitus, hipotiroid, obesitas, dan lain-lain. Dan juga karena obat seperti diuretic, β blocker, kontrasepsi oral dll (Putri Cempaka dan Decy Sitangkir, 2022).

Kolesterol LDL bersirkulasi secara normal di dalam tubuh Kira-kira 2,5 hari kemudian, terikat pada reseptor LDL menjadi hepatosit untuk endositosis selanjutnya. LDL dalam tubuh Ini hilang dan menghambat sintesis kolesterol oleh hati. Reduktase HMG-CoA. pada hiperkolesterolemia familial Fungsi reseptor LDL mungkin terganggu atau bahkan hilang, menurut LDL Ini beredar dalam darah lebih lama, yaitu empat setengah hari. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar LDL dalam darah, serta lipoprotein lainnya tetap normal. Mutasi ApoB menyebabkan penurunan ikatan Partikel LDL dengan reseptor yang menyebabkan peningkatan kadar LDL (Putri Cempaka dan Decy Sitangkir, 2022).

c. Etiologi

Hiperlipidemia merupakan peningkatan kadar kolesterol dan/atau trigliserida. Hiperlipidemia diartikan sebagai kolesterol serum minimal 200 mg/dl atau trigliserida serum minimal 150 mg/dl. Hiperlipidemia memiliki berbagai mekanisme epidemiologi (Nuralifah, dkk, 2020).

Hiperlipidemia dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu seperti factor keturunan yang mengalami hiperlipidemia, pengaruh lingkungan, gaya hidup, dan mengonsumsi alcohol, hiperlipidemia juga bisa terjadi karena asupan makanan yang tinggi kolesterol, lemak jenuh, kalori berlebihan (Nuralifah, dkk, 2020).

Aterosklerosis adalah penyakit arteri yang cukup besar yang menyebabkan penyakit pembuluh darah, seperti penyakit arteri koroner dan penyakit serebrovaskular, di mana lipid (terutama kolesterol ester) menumpuk di sel otot polos, makrofag, dan jaringan ekstraseluler yang melapisi dinding bagian dalam menengah dan besar ditandai dengan akumulasi (Nuralifah, dkk, 2020).

d. Manifestasi Klinis

Hiperlipidemia, salah satu manifestasi klinis obesitas, ini mengakibatkan beberapa kondisi abnormal dalam tubuh.

1) Atherosklerosis

Kadar lipid darah yang tidak normal dapat menyebabkan masalah lain dalam jangka panjang, salah satunya adalah risiko aterosklerosis (lemak menumpuk di pembuluh darah dan menyumbatnya aliran darah) dan peningkatan penyakit arteri koroner atau karotis untuk orang dengan kolesterol total tinggi. Kadar kolesterol jumlah total yang ideal adalah 140-200 mg/dL atau kurang. Risiko penyakit jantung berlipat ganda saat kolesterol total mendekati 300 mg/dL (Santos-Baez & Ginsberg, 2020).

Beberapa penelitian dalam sepuluh tahun terakhir tentang kolesterol total dan kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL-C), Menurunkan kadar kolesterol high-density lipoprotein (HDL-C) Perkembangan penyakit arteri koroner (PJK). kadar LDL-C tinggi Ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tetapi kadar HDL-C yang lebih tinggi dapat mengurangi risiko penyakit jantung. biasanya kadar LDL tidak boleh melebihi 130 mg/dL dan kadar kolesterol HDL tidak boleh menurun. 40mg/dl atau lebih. Level HDL harus setidaknya 1/4 level atau lebih tinggi total kolesterol (Lee et al., 2019).

2) Pankreatitis

Peningkatan risiko pankreatitis ketika kadar trigliserida darah tercapai 1000-2000mg/dl. Di sisi lain, kadar trigliserida dinyatakan normal jika dalam kisaran Kurang dari 250 mg/dL dalam darah (Pratama, 2016).

3) Xantoma

Xanthoma adalah kondisi kulit berupa plak atau nodul berwarna Warna kuning-oranye karena timbunan lemak yang tidak normal. xanthoma Biasanya digunakan sebagai sinyal bahwa seseorang memiliki kondisi hiperlipidemia. Xanthoma disebabkan oleh akumulasi lipid dalam sel imun. Makrofag di kulit atau lemak subkutan (Fakhria dan Iskandar, 2019).

e. Penatalaksanaan Terapi

Terapi Farmakologi Hiperlipidemia

1) Statin (Inhibitor HMG-CoA Reduktase)

Statin merupakan obat yang bekerja dengan menurunkan kadar lipid yang paling efektif, juga untuk menurunkan kadar kolesterol LDL dan terbukti aman tanpa efek samping yang berbahaya. Selain Untuk menurunkan kolesterol LDL, statin juga meningkatkan kolesterol HDL dan TG.

Mekanisme kerja statin yaitu reduktase HMG-CoA. Efek regulasi CETP (ester kolesterol) protein transfer) mengakibatkan menurunnya.

Kadar kolesterol LDL, VLDL. Di hati, statin meningkatkan regulasi reseptor kolesterol LDL Hal ini meningkatkan pembersihan kolesterol LDL (Erwinanto dkk, 2013).

2) Inhibitor Absorpsi Kolesterol

Obat penurun lipid pertama yang menghambat penyerapan kolesterol empedu tanpa mengganggu penyerapan nutrisi dalam lemak. Direkomendasikan ezetimibe dosis 10 mg/hari digunakan Bersama statin, dapat digunakan secara tunggal jika tidak toleran terhadap statin. Kombinasi statin dan agen penurun ezetimibe Kolesterol LDL lebih dari dua kali dosis obat kombinasi statin Ezetimibe dan simvastatin sedang diuji pada pasien dengan stenosis aorta dan stenosis aorta pasien gagal ginjal kronik. Belum ada efek samping yang berbahaya dari ezetimibe sampai sekarang ini. penggunaan Ezetimibe sendiri atau dalam kombinasi Harus dipertimbangkan dalam kombinasi dengan sequestran asam empedu atau asam nikotinat Pasien yang tidak dapat mentoleransi statin (Rahmania Fitri, dkk, 2020).

3) Fibrat

Fibrat merupakan agonis PPAR- α . Fibrat direduksi oleh reseptor ini Regulasi gen apoC III dan peningkatan regulasi gen apoA I dan A II. Penurunan sintesis ApoC III mengakibatkan meningkatnya katabolisme TG Lipoprotein lipase mengurangi pembentukan kolesterol VLDL, Peningkatan pembersihan kilomikron. Terapi bersama dengan fibrat (*fenofibrate*) dan statin pada pasien dengan DM tidak lebih unggul dari terapi statin saja dalam mengurangi kejadian Penyakit kardiovaskular, kecuali kadar TG melebihi 200 mg/dL

Kolesterol LDL 84 mg/dL, Konsentrasi kolesterol HDL 34 mg/dL (Rahmania Fitri, dkk, 2020).

4) Inhibitor CETP

Kolesterol Ester Transfer Protein Membantu Mentransfer Kolesterol Ester Kolesterol HDL menjadi VLDL dan LDL Dibersihkan dari sirkulasi melalui reseptor LDL di hati. Pengobatan dengan Inhibitor CETP memiliki efek ganda. Ini membalikkan kolesterol HDL dan menurunkan kadar kolesterol LDL. Transportasi kolesterol. Inhibitor CETP dapat meningkatkan aterogenesis ketika: Ester kolesterol dari VLDL atau kolesterol LDL diambil oleh makrofag. Di sisi lain, ketika ester kolesterol diambil oleh hati melalui reseptor LDL, Penghambat CETP bersifat antiaterogenik (Rahmania Fitri, dkk, 2020).

Terapi Non Farmakologi

Terapi non farmakologis lainnya yang dapat dilakukan yakni, Aktivitas Fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan merupakan program latihan yang mencakup setidaknya 30 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang (menurunkan 4-7 kkal/menit) 4 sampai 6 kali seminggu, dengan pengeluaran minimal 200 kkal/hari. Kegiatan yang disarankan meliputi jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Tujuan aktivitas fisik harian dapat dipenuhi dalam satu sesi atau beberapa sesi sepanjang rangkaian dalam sehari (minimal 10 menit). Bagi beberapa pasien, beristirahat selama beberapa saat disela aktivitas penguatan otot dianjurkan dilakukan minimal 2 hari seminggu. (saragih ardian, 2020)

2. Lemak

Adalah salah satu senyawa biomolekuler yang tidak larut air. seperti ikatan dengan plasma dalam air seperti ikatan dengan plasma sebagai cara kerja transpor dalam serum lipid dapat diekstraksi dengan pelarut organik eter, benzena,

kloroform, karbon tetraklorida, dll. Lipid ini penting. Nilai energi tinggi, mengandung bahan isolasi dan pelindung untuk melindungi jaringan dibawah kulit dan organ tertentu. Sebagai contoh: jaringan syaraf. Trigliserol digunakan oleh tubuh terutama untuk suplai energi untuk berbagai proses metabolisme. Fungsi lipid ini sesuatu yang penting Beberapa lipid, terutama kolesterol, fosfolipid, dan turunannya, digunakan di seluruh tubuh untuk menyediakan fungsi intraseluler lainnya (Siregar Aguslina, 2020).

Lemak-lemak (trigliserida), sterol, fosfolipid, atau senyawa sejenis, merupakan lipid yang sangat penting dalam kehidupan. Lemak yang digunakan dalam tubuh untuk energi sama pentingnya dengan karbohidrat. Lipid plasma dalam tubuh yang paling penting adalah kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid Asam lemak bebas tidak larut dalam plasma (Siregar Aguslina, 2020).

3. Lipoprotein

Lipoprotein adalah kompleks lipid-protein yang mengandung lipid yang dikapsulasi apoprotein. Senyawa lemak yang dilarutkan oleh plasma apoprotein. Sembilan apoprotein yang berbeda sekarang dikenal dan akan diberi nama. Berdasarkan abjad, yaitu Apo A, Apo B, Apo C, Apo E.

Lipoprotein plasma utama merupakan partikel dengan daerah inti yang besar hidrofobik, mengandung ester kolesterol dan trigliserida Kolesterol dan fosfolipid monolayer yang tidak teresterifikasi mengelilingi inti. Protein khusus (apolipoprotein) adalah permukaan. Lipoprotein tertentu, termasuk apolipoprotein (protein B). Partikel dengan berat molekul sangat tinggi tidak bermigrasi dari partikel partikel lain seperti apolipoprotein yang lebih kecil (Siregar Aguslina, 2020).

Tabel 1 : Lipoprotein dan Kandungan Lipid

Jenis Lipoprotein	Kandungan Lipid (%)		
	Trigliserida	Kolestrol	Fosfolipid
Kilomikron	80-90	2-7	3-9
VLDL	55-80	5-15	10-20
IDL	20-50	20-40	15-25
LDL	5-15	40-50	20-25
HDL	5-10	15-25	20-30

Keterangan:

VLDL : *Very Low Density Lipoprotein*

IDL : *Intermediate Density Lipoprotein*

LDL : *Low Density Lipoprotein*

HDL : *High Density Lipoprotein*

4. Kolesterol

Merupakan komponen struktural esensial yang membentuk membran sel serta lapisan eksternal lipoprotein. Selain itu, dari sudut biokimia kolesterol memiliki makna penting karena menjadi prekursor sejumlah besar senyawa steroid yang sama pentingnya seperti asam empedu, hormon korteks adrenal, hormon seks, vitamin D, glikosida jantung. Kolesterol juga merupakan steroid yang banyak dikenal karena hubungannya dengan arteroklerosis. (Siregar Aguslina, 2020)

Kolesterol dalam tubuh dihasilkan oleh sintesis dalam hati. Kolesterol diperoleh dari karbohidrat, protein dan lemak. Kolesterol terdapat didalam makanan yang berasal dari hewan. Kolesterol bersumber di hati, ginjal dan kuning telur. Setelah itu, daging, keju, susu, udang dan kerang. Daging ayam dan ikan juga mengandung sedikit kolesterol. Kolesterol disintesis tergantung kebutuhan tubuh dan banyaknya yang diperoleh dari makanan. (Ramadhian, 2016)

Kadar normal kolesterol pada manusia adalah 200 mg/dL. Metode enzymatic photometric tes CHOD- PAP dapat digunakan untu menetapkan kadar koleterol dalam darah. Metode enzymatic photometric tes CHOD- PAP ini memiliki prinsip reaksi pembentukan quinoneimine dari kolesterol dimana senyawa ini mempunyai panjang gelombang serapan 540 (Siregar Aguslina, 2020).

Table 2 : Kadar Kolesterol Total

Kategori	Kadar (mg/dL)
< 200	Optimal
200-239	Diinginkan
≥ 240	Tinggi

Didalam tubuh manusia dan hewan terdapat jumlah kolesterol didalam sel yang diatur oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: Factor di luar sel, misalnya jumlah kolesterol bebas atau terikat didalam lipoprotein diluar sel, prsediaan hormon tertentu dan asam lemak bebas, dan factor dalam sel, seperti jumlah ketersediaan terpenoidalanosterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis kolesterol, jumlah hasil metabolisme, kegiatan enzim yang berperan dalam katabolisme kolesterol, adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau deivatnya keluar dari sel dengan mekanisme pengangkutan aktif melalui membrane sel dan pengaruh viskositas membrane sel. Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat mengakibatkan sebagai kelainan seperti patofisiologi (Siregar Aguslina, 2020).

Tabel 3. Kadar Kolesterol di beberapa bahan pangan (mg/100gram) (Yani, 2015)

Bahan Makanan	Kolesterol	Bahan Makanan	Kolesterol
Kuning telur	2630	Daging kambing	98
Ginjal, direbus	804	Daging ayam, direbus	94
Telur utuh	504	Daging sapi, direbus	79
Hati, direbus	274	Lemak hewan	95
Udang, direbus	250	Susu bubuk penuh	704
Keju (Cheddar)	111	Susu cair penuh	14
Mentega	150	Margarine	0

Faktor penyebab kolesterol tinggi :

- a. Faktor keturunan
- b. Kelebihan berat badan dan kurang berolahraga
- c. Kebiasaan merokok
- d. Konsumsi makanan tinggi lemak seperti daging, telur, udang, kerang, kepiting dan cumi-cumi (Yani, 2015)

Akibat dari konsumsi lemak berlebihan dapat menyebabkan kelebihan kolesterol dalam tubuh, sehingga selain terdapat dalam tubuh juga terdapat dalam darah. Oleh karena itu untuk meminimalisir lemak berlebih dalam tubuh sebaiknya hindari makanan pangan yang banyak mengandung kolesterol (pada protein hewani) seperti; daging, telur, udang, kerang, kepiting dan cumi-cumi (Thomas et al., 2016; Arthur dan Bejaei, 2017)..

Telur puyuh merupakan sumber protein hewani yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti telur ayam, daging sapi, daging kambing dan lain-lain. Zat yang terkandung di dalam telur puyuh lebih

baik dari pada susu sapi segar dalam jumlah kandungan kalori, protein, lemak phospor, zat besi, vitamin A, vitamin B, dan vitamin B12. Telur puyuh mempunyai kadar kolesterol lebih tinggi, yaitu 844 mg/dL, dibandingkan dengan kadar kolesterol telur ayam yang hanya sebesar 423 mg/dL (Thomas et al., 2016; Arthur dan Bejaei, 2017). namun dengan kandungan gizi yang lebih baik daripada susu sapi segar. Telur puyuh banyak diminati karena terjangkau secara ekonomi dan tampilan yang unik (Thomas et al., 2016; Arthur dan Bejaei, 2017).

Kandungan kolesterol yang tinggi pada telur puyuh adalah hal yang perlu diperhitungkan karena telur puyuh merupakan bahan pangan sumber protein yang relatif murah, mudah didapat dan banyak disukai masyarakat (Aviati et al., 2014).

Akan tetapi, konsumsi kolesterol berlebih akan merugikan kesehatan karena dapat menyebabkan aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh arteri (Thomas et al., 2016; Arthur dan Bejaei, 2017).

D. Pengantar Biskuit

Saat ini orang lebih sering menyantap makanan praktis, terjangkau dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, ini menjadi peluang untuk industri makanan. Mulai perusahaan yang membuat biskuit, kue kering dibentuk menjadi potongan-potongan kecil yang dipanggang menjadi makanan ringan. biskuit mengandung banyak air dibuat dengan atau tanpa bahan berbasis tepung rendah (\pm 5%). Secara umum, proses pembuatan biskuit dimulai dengan pencampuran (kneading), Penambahan bahan makanan lain yang disetujui dan pencetakan (cutting) memanggang yang bisa dilakukan dalam skala rumah (Amin T, 2016).

Konsumen (masyarakat) sekarang sangat memperhatikan kesehatan dan pola kesehatannya makanan bergizi, jumlah kalori, kadar gula rendah, Makanan berserat tinggi seperti makanan berprotein tinggi dan rendah lemak dan tinggi serat seperti

biskuit (kue kering). Kue kering Berisi salah satu makanan siap saji paling populer, umur simpan yang lama dan nilai gizi yang tinggi (Amin T, 2016).

Biskuit adalah salah satu jenis produk snack yang dibuat dengan Metode roasting yang disukai banyak orang, terutama di Indonesia. Kue kering (biskuit) termasuk camilan bergizi dikonsumsi oleh semua. Biskuit ada dalam berbagai warna, rasa dan berbagai bentuk (Jagat, 2017).

Biskuit telah menjadi makanan yang sering disantap sebagai cemilan atau makanan siap saji yang dirancang untuk membuat produk biskuit enak dan sehat. biskuit sering ditemukan di pasar, toko dan restoran. Penjualan berada di berbagai tempat dan biskuitnya dikonsumsi oleh hampir semua orang, tapi tidak bisa dipungkiri orang memperhatikan nilai gizi makanan. secara umum, biskuit mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Salah satu makanan sumber protein merupakan kombinasi kacang-kacangan dalam pembuatan biskuit (Jagat, 2017)

E. Pengantar Fitokimia

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah salah satu proses untuk mendapatkan suatu zat aktif dengan cara pemisahan campuran senyawa atau simplisia dari suatu bahan alam. Terdapat beberapa ekstraksi yang diketahui dan masing-masing ekstraksi mempunyai kelebihan dan kekurangannya. sifat senyawa, pelarut yang digunakan, dan alat tersedia merupakan cara memerhatikan pemilihan metode yang akan digunakan. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi yaitu antara lain, Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan. maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, infusa, dekok, destilasi merupakan beberapa metode ekstraksi. (Wijaya, 2018)

Tujuan dari proses ekstraksi adalah untuk memisahkan dan mengambil komponen kimia dengan kelarutan yang berbeda-beda dari bahan alami seperti

tanaman, hewan, dan organisme laut dengan menggunakan pelarut organik yang spesifik (Depkes RI, 2000).

2. Maserasi

Maserasi adalah cara ekstraksi simplisia dengan merendam dalam pelarut pada suhu kamar sehingga kerusakan atau degradasi metabolit dapat diminimalisasi. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar dan didalam sel sehingga diperlukan penggantian pelarut secara berulang (Sarah, 2019).

Metode ekstraksi maserasi adalah proses ekstraksi bahan dasar dengan menggunakan pelarut dan dilakukan dengan cara memercikkan atau mengaduk pada suhu ruangan. Secara teknologi, maserasi termasuk metode ekstraksi dengan prinsip mencapai konsentrasi melalui keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan dengan cara mengaduk secara terus-menerus. Remaserasi adalah proses pengulangan dengan menambah pelarut setelah melakukan penyaringan terhadap hasil maserasi pertama, dan seterusnya (Sarah, 2019).

3. Freeze Drying

Merupakan sarana alat/ mesin untuk mengeringkan bahan dengan pemasaan suhu rendah. Dimana, proses ini sangat penting dalam preparasi sampel dan untuk pengawetan serta penyimpanan berbahan biologis, farmasi dan makanan. Freeze Drying (pengeringan beku) atau liofilisasi adalah proses pengeringan dari bahan cair yang dibekukan, kemudian diperlakukan dengan suatu proses pemanasan ringan dalam suatu ruang/ chamber hampa udara. Kristal es yang terbentuk selama tahap pembekuan, menyublim jika dipanaskan pada tekanan hampa yaitu berubah secara langsung dari es menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Kemudian akan dihasilkan produk yang bersifat porous, tidak merusak bahan atau senyawa dan terjaga kualitasnya dan aman (Anna R, 2013).

F. Tinjauan Islami

Pengobatan yang dilakukan guna memperoleh kesembuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Tumbuh-tumbuhan mempunyai banyak manfaat misalnya, vitamin-vitamin, minyak, dan masih banyak lainnya yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lainnya.

Tumbuh- tumbuhan diciptakan sedemikian rupa oleh Allah swt sehingga dapat berfungsi bagi semua makhluk hidup di bumi. Dan ini merupakan salah satu merupakan salah satu bukti kemahakuasaan Allah swt senada dengan Firmannya dalam QS. Al. An'am (6) : 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahanya :

“Dialah yang menurunkan udara dari langit, lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka dari itu kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami mengolah) kebun-kebun anggur. (Kami mengelolah pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada saat berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman). (Kemenag, 2023)

Ayat ini masih mengenai lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt. Ayat-ayat yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya, supaya ia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah swt Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan. Yang dipaparkan untuk diamati pada ayat-ayat yang lalu adalah hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang, selanjutnya

dipaparkan juga tentang manusia, asal usul dan kehadirannya di bumi. Nah, ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang disebut di atas, bermula dengan menegaskan bahwa dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau (Shihab, 2002).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Shihab, 2002).

Berdasarkan uraian surah diatas dapat dilihat bagaimana kekuasaan Allah swt dalam menciptakan makhluk hidup dengan sedemikian rupa, misalnya pada tumbuhan dimana Allah swt menurunkan udara dari langit (air hujan) sehingga dapat menumbuhkan segala macam jenis tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah swt bukan tanpa alasan melainkan agar tumbuhan tersebut menjadi sesuatu yang baik. Dalam ini tumbuh subur dan bermanfaat bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Beberapa contoh manfaat tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan makanan dan bahan baku obat.

Tanaman merupakan apotek lengkap yang didalamnya terkandung zat aktif yang beragam. Diciptakan oleh Allah swt dengan beragam manfaat dalam melawan penyakit dan zat berbahaya yang berada dalam tubuh manusia. Salah satu yang

dapat menjadi acuan adalah tanaman umbi porang sebagai antihiperlipidemia.

Senada dengan firman Allah swt dalam QS. Ash-shu'araa/26:7

كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِنْ فِيهَا أَنْبَأْنَا كَمْ الْأَرْضِ إِلَى يَرَوْا أَوْمَ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik”? (Kementrian Agama, 2014).

Ayat ini dapat dipahami bagaimana Allah swt menegaskan kepada manusia bahwa Allah swt telah menciptakan begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Dimana dari tumbuh-tumbuhan itu akan dapat diteliti oleh mereka yang memiliki pengetahuan dalam mengembangkan dan memperluas pengetahuannya terutama ilmu yang membahas tentang obat-obatan yang berasal dari alam, baik tumbuhan, hewan ataupun mineral. Tumbuh-tumbuhan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an mengandung zat/obat yang dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit seseorang.

Oleh karena itu, setiap penyakit yang diturunkan Allah swt pasti ada obatnya. Setiap pengobatan harus sesuai dengan sifat penyakit. Jika Allah berkehendak, maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Namun Allah swt ingin obatnya diperhatikan oleh ahlinya sehingga dapat beradaptasi dengan penyakit yang sedang dirawat untuk memudahkan pengobatan yang diberikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium dengan menggunakan tikus sebagai hewan percobaan

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Biologi Farmasi dan Farmakologi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode eksperimental.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanaman porang (*Amorphophallus oncophyllus*)

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu umbi *porang*.

D. Instrument Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan antara lain alat pengukur kolesterol (autocheck[®]), baskom, batang pengaduk, cetakan biskuit, ayakan mesh 80, kandang tikus, kanula,

senduk, loyang, lumpang dan alu, oven, pisau, rolling pin, toples kaca, sendok tanduk, spoit, gunting, timbangan analitik.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, aquadest, betadine[®], umbi porang, baking powder, garam, gula, vanili, hewan uji tikus jantan (*rattus norvegicus*), pakan tikus, kapas, tepung terigu, etanol 70 %, kuning telur, strip kolesterol, susu skim bubuk dan tissue.

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan

1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan adalah umbi porang yang diambil di Desa Banyorang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan.

2. Pengolahan Sampel

Setelah proses pemanenan, umbi porang dibersihkan dari tanah dan akar yang menempel pada umbi. Kemudian, umbi porang dapat diolah menjadi tepung porang atau chip porang.

a. Pembersihan Sampel

Langkah awal yang dilakukan yaitu sortasi kering (dipisahkan umbi dengan akar atau dibersihkan dari tanah), kemudian dilakukan sortasi basah (dicuci sampel). Selanjutnya sampel dibersihkan dari kulitnya atau dikupas, kemudian sampel yang telah dikupas diiris-iris lalu dicuci dengan air mengalir.

b. Pembuatan Chip Porang

Direndam irisan umbi porang dalam larutan garam yaitu diambil 1 liter air kemudian larutkan 1 sendok garam. Setelah merata didiamkan rendaman umbi porang selama 6 jam. Setelah 6 jam ditiriskan lalu dicuci dengan air bersih, kemudian dijemur hingga menjadi chip porang.

c. Pembuatan Tepung Porang

Umbi porang yang telah menjadi chip porang kemudian diblender sampai halus. Setelah itu diekstraksi dengan cara di maserasi menggunakan etanol 70% selama 3 x 24 jam sambil diaduk. Setelah itu endapan dari hasil maserasi dikeringkan. Setelah mengering, kemudian digerus lalu diayak dengan ayakan mesh 80.

3. Pembuatan Biskuit

a. Rancangan Formula

Tabel 4. Formulasi dasar

No	Bahan-bahan	Jumlah
1.	a. Tepung tergiu b. Tepung gabus 30%	175 g 75 g
2.	Gula halus	100 g
3.	Garam	1 g
4.	Baking powder	0,2 g
5.	Vanili	1 g
6.	Susu skim bubuk	2,5 g

Tabel 5: Formulasi

No.	Bahan	Formula			
		F1	F2	F3	F4
1	Tepung Porang	100 g	75g	50 g	-
2	Tepung Terigu	-	25g	50g	100 g
3	Susu Skim (penambahan nilai gizi)	50 ml	50 ml	50 ml	50 ml
4	Gula (cita rasa)	4 sdk	4 sdk	4 sdk	4 sdk
5	Vanili (aroma dan rasa)	0,2 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
6	Baking Powder (pengembang)	0,2 g	0,2 g	0,2 g	0,2 g
7	Garam (cita rasa)	1 sdt	1 sdt	1 sdt	1 sdt

b. Prosedur Kerja

Proses pencampuran bahan (*mixing*), proses ini bertujuan untuk mencampur semua bahan. Dilarutkan gula bersama dengan susu skim dengan cara dikocok hingga larut kemudian masukkan semua bahan lainnya lalu diaduk hingga kalis.

Setelah itu berlanjut pada proses pencetakan adonan. Sebelum masuk pada tahap pemanggangan adonan terlebih dahulu dicetak dan diletakkan diatas Loyang.

Dilakukan proses pemanggangan pada suhu 170°C dalam waktu 15 menit didalam oven. Lalu evaluasi sediaan. (Irferamuna ade, dkk)

4. Evaluasi Sediaan

a. Uji Kerenyahan

Tekstur atau Kerenyahan adalah salah satu faktor kualitas biskuit yang perlu dipertimbangkan. Hal ini erat kaitannya dengan tanggapan konsumen. Biskuit biasanya dianggap sesuai Ketika biskuit bertekstur rapuh, dan ketika Anda menekan biskuit dengan jari Anda, itu menjadi lebih ringan dan rusak (SNI 01-2715-1996/Rev.92) tekstur biskuit dipengaruhi oleh semua bahan baku yang digunakan.

b. Aroma

Aroma adalah hal yang penting dalam pembuatan pangan termasuk biskuit, karena salah satu penilaian diterima atau tidaknya suatu produk dengan cara diketahui aromanya. Aroma biskuit biasanya muncul saat proses pemanggangan. Parameter rasa sangat penting untuk menentukan pilihan konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk makanan. (SNI 01-2715-1996/Rev.92).

c. Rasa

Rasa dimulai dengan respon *gustatory* (lidah) terhadap rangsangan kimia sampai akhirnya muncul keseluruhan interaksi antara karakteristik aroma, rasa dan tekstur sebagai keseluruhan rasa makanan. Biskuit dapat dipengaruhi oleh bahan lain seperti margarin yang meningkatkan rasa. Selain itu, dalam biskuit, adanya protein dalam tepung dapat memicu reaksi Maillard makanan (SNI 01-2715-1996/Rev.92).

d. Warna

Warna biskuit berasal dari warna bahan baku yang digunakan. Warna memainkan peran penting dalam penyerapan makanan, dan warna bukti perubahan kimia dalam makanan. Warna adalah properti material yang dikaitkan dengan memperluas spektrum cahaya. Selain itu, warna bukanlah materi atau objek, sensasi seseorang dengan stimulasi seberkas energi pancaran yang jatuh pada sensasi mata, atau retina mata. Preferensi warna adalah penilaian pertama untuk menentukan preferensi subjek untuk produk biskuit (SNI 01-2715-1996/Rev.92).

5. Pengujian Efek Antihiperlipidemia

a. Penyiapan Hewan Coba

Sebelumnya disesuaikan dulu selama 7 hari agar terbiasa dengan lingkungan sekitar yang baru. Kemudian mengelompokkan tikus jantan sebagai

hewan coba. Terdapat 12 ekor tikus pada penelitian ini, yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian dan terdiri 3 ekor untuk setiap bagian.

b. Pembuatan Pakan Tinggi Kolesterol

Bagian kuning telur diambil sebanyak 10 gram kemudian dimasukkan kedalam wadah yang berukuran 100 ml, kemudian, 50 ml air ditambahkan kedalam wadah dan diaduk sampai tercampur semua dan mencapai ukuran 100 ml. selama satu minggu pakan ini diberikan kepada tikus 2 kali sehari. Pakan diberikan kepada tikus melalui mulut atau secara peroral dengan menggunakan kanula. Sebelum di treatment tikus terlebih dahulu di cek kadar kolesterol setiap pagi.

c. Pemberian biskuit tepung porang pada tikus

Terlebih dahulu digerus biskuit tepung porang menggunakan lumpang sampai menjadi serbuk yang halus. Kemudian, timbang biskuit yang telah menjadi serbuk halus sesuai dosis yang ingin digunakan lalu dicampur menggunakan aquadest. Aduk hingga membentuk bubur kemudian diberikan kepada tikus. Diberikan biskuit selama satu minggu 2 kali sehari.

d. Pengukuran Kadar Kolesterol Darah

Pertama, ditekan tombol ON pada alat untuk mengaktifkannya dan masukkan chip atau kode strip. Darah diambil melalui ekor tikus. Sebelum dipotong sebanyak 1 mm bagian ekor tikus, terlebih dahulu diusapkan alcohol 70%. Kemudian potong bagian ekor yang telah diusapkan alcohol 70%, lalu teteskan darah pada chip atau kode strip. Hasilnya akan muncul pada monitor karena kadar kolesterol pada tikus akan terukur secara otomatis.

Data yang telah diambil kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan sistem analisis statistic (menggunakan SPSS).

6. Pengumpulan dan Analisis Data

a. Uji Hedonik

Dilakukan uji hedonik atau uji tingkat kesukaan pada suatu produk yang melibatkan 20 orang responden yang sudah diberikan lembar penilaian berupa aroma, rasa, warna, tekstur biskuit tepung porang (Maturahmah, 2017).

1. Skala Uji Hedonik Aroma

Tabel 6. Uji hedonik aroma

Skala Hedonik	Numerik
Sangat suka	6
Suka	5
Agak suka	4
Agak tidak suka	3
Tidak suka	2
Sangat tidak suka	1

2. Skala Uji Hedonik Rasa

Tabel 7. Uji hedonik rasa

Skala Hedonik	Numerik
Sangat suka	6
Suka	5
Agak suka	4
Agak tidak suka	3
Tidak suka	2
Sangat tidak suka	1

3. Skala Uji Hedonik Warna

Table 8. uji hedonik warna

Skala Hedonik	Numerik
Sangat suka	6
Suka	5
Agak suka	4
Agak tidak suka	3
Tidak suka	2
Sangat tidak suka	1

4. Skala Uji Hedonik Tekstur/Kerenyahan

Table 9. uji hedonic tekstur/kerenyahan

Skala Hedonik	Numerik
Sangat suka	6
Suka	5
Agak suka	4
Agak tidak suka	3
Tidak suka	2
Sangat tidak suka	1

Data yang telah diambil kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan sistem analisis statistik (menggunakan SPSS) *one way ANOVA*. Uji statistik dilakukan pada derajat kepercayaan 95% dan perbedaan ini bermakna apabila nilai p kurang dari 0,05.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Pembuatan Tepung Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*)

Hasil pembuatan tepung dari umbi porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) sebanyak 10kg dengan metode maserasi dengan menggunakan aquadest 70% dan pengeringan didapatkan hasil yaitu 1kg tepung porang murni.

2. Pengukuran Kadar Kolesterol Selama 15 Hari Berturut-turut

Tabel 10. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol

KELOMPOK	PERLAKUAN	K0 (mg/dL)	PEMBERIAN KUNING TELUR (K1) (mg/dL)						
			H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
FI (100 g)	1	156	170	173	175	180	185	192	200
	2	142	162	173	180	182	190	194	204
	3	138	147	159	168	191	203	207	212
	Rata-rata	145.33	159.67	168.33	174.33	184.33	192.67	197.67	205.33
FII (75 g)	1	162	164	171	178	191	205	237	267
	2	142	148	170	173	187	190	204	220
	3	140	143	158	167	171	175	178	190
	Rata-rata	148	151.67	166.33	172.67	183	190	206.33	225.67
FII (50 g)	1	116	122	146	149	163	167	181	187
	2	142	144	151	159	172	186	218	243
	3	174	184	204	224	243	240	246	249
	Rata-rata	144	150	167	177.33	192.67	197.67	215	226.33
FIV (kontrol negatif)	1	150	153	160	168	174	181	190	202
	2	116	122	146	149	163	167	181	187
	3	129	143	147	147	149	153	161	170
	Rata-rata	131.67	139.33	151	154.67	162	167	177.33	186.33

Keterangan:

K0 : Kadar Kolesterol Sebelum Perlakuan

H1 – H8 : Hari 1 – Hari 8

Tabel 11. Pemberian Biskuit Tepung Porang

KELOMPOK	PERLAKUAN	PEMBERIAN BISKUIT SUBTITUSI TEPUNG PORANG (K2) (mg/dL)						
		H8	H9	H10	H11	H12	H13	14
FI (100 g)	1	200	194	190	187	184	181	180
	2	197	190	186	182	179	176	174
	3	200	193	190	188	180	178	170
	Rata-rata	199	192.33	188.67	185.67	181	178.33	174.67
FII (75 g)	1	263	263	260	258	256	252	249
	2	217	213	209	205	205	200	199
	3	182	177	171	158	158	156	156
	Rata-rata	220.67	217.67	213.33	207	206.33	202.67	201.33
FIII (50 g)	1	187	187	185	185	184	183	182
	2	231	227	227	211	190	190	189
	3	246	240	237	224	222	220	219
	Rata-rata	221.33	218	216.33	206.67	198.67	197.67	196.67
FIV (kontrol negatif)		202	202	200	199	199	199	199
		187	187	187	187	186	186	186
		170	170	167	167	167	167	167
	Rata-rata	186.33	186.33	184.67	184.33	184	184	184

Keterangan :

FI - FIV : Formulasi I - Formulasi IV

H8 - H14 : Hari Ke-8 – Hari Ke-14

3. Hasil Penurunan Kadar Kolesterol Pada Tikus Setelah Pemberian Sediaan Biskuit Substitusi Tepung Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*)

Penurunan kolesterol pada tikus yang dilakukan dengan pemberian biskuit substitusi tepung porang (*amorphophallus oncophyllus*) dengan jumlah pemberian 100 gram, 75 gram, 50 gram dan kontrol negatif pada masing-masing kelompok.

Tabel 12. Hasil Pengukuran Penurunan Kadar Kolesterol Pada Tikus

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran			Penurunan Kolesterol Setelah Perlakuan (mg/dL)	Presentase Penurunan %
		K0 (mg/dL)	K1 (mg/dL)	K2 (mg/dL)		
FI (100 g)	1	156	200	180	20	10%
	2	142	204	174	30	14.70%
	3	138	212	170	42	18.81%
	rata-rata	145.33	205.33	174.67	30.67	15%
FII(75 g)	1	162	267	249	18	6.74%
	2	142	220	199	21	9.54%
	3	140	190	156	34	17.89%
	rata-rata	148	225.67	201.33	24.33	11.39%
FIII (50 g)	1	116	187	182	5	2.67%
	2	142	243	189	54	22.22%
	3	174	249	219	30	12.04%
	rata-rata	144	226.33	196.67	29.67	12.31%
FIV(kontrol negatif)	1	150	202	199	3	1.48%
	2	116	187	186	1	0.53%
	3	129	170	167	3	1.76%
	rata-rata	131.67	186.33	184	2.33	1.26%

Keterangan : K0 : Kadar Kolesterol Awal
 K1 : Kadar Kolesterol Setelah Pemberian Kuning Telur
 K2 : Kadar Kolesterol Setelah Terapi (Pemberian Biskuit)

Tabel 13. Hasil Uji Hedonik Aroma

Responden	Aroma			
	F I	F II	F III	F IV
1	6	5	6	6
2	6	6	5	5
3	6	6	6	6
4	6	6	6	6
5	3	4	6	6
6	4	5	6	6
7	6	5	4	4
8	5	5	5	5
9	6	5	4	4
10	3	4	5	4
11	5	4	5	5
12	4	5	5	5
13	3	3	5	5
14	4	5	5	5
15	2	3	6	6
16	3	4	6	6
17	2	3	5	4
18	3	4	5	6
19	5	4	6	6
20	5	5	5	5
Jumlah	87	91	106	105
Rata-Rata	4.35	4.55	5.3	5.25

Keterangan :

FI : Formulasi 1

FII : Formulasi 2

FIII : Formulasi 3

FIV : Formulasi 4

Tabel. 14. Hasil Uji Hedonik Rasa

Responden	Rasa			
	F I	F II	F III	F IV
1	4	3	5	5
2	3	2	5	5
3	2	3	5	5
4	3	4	6	6
5	5	3	4	4
6	4	5	5	5
7	3	4	5	5
8	4	4	4	4
9	5	5	6	6
10	3	5	4	4
11	3	3	3	3
12	5	5	4	3
13	5	5	6	4
14	5	6	6	5
15	5	5	4	3
16	4	6	5	5
17	6	4	5	5
18	4	6	5	5
19	4	6	5	5
20	4	5	5	6
Jumlah	81	89	97	93
Rata-Rata	4.05	4.45	4.85	4.65

Keterangan :

- FI : Formulasi 1
- FII : Formulasi 2
- FIII : Formulasi 3
- FIV : Formulasi 4

Tabel. 15. Hasil Uji Hedonik Warna

Responden	Warna			
	F I	F II	F III	F IV
1	6	5	4	4
2	6	3	5	4
3	6	5	4	3
4	6	4	5	5
5	6	6	4	3
6	4	6	5	5
7	5	4	5	5
8	5	5	5	5
9	3	4	6	6
10	4	4	5	5
11	2	3	4	4
12	3	4	4	4
13	3	4	5	5
14	3	4	5	5
15	3	5	5	5
16	2	3	4	4
17	2	3	4	4
18	4	4	4	5
19	4	3	5	6
20	3	3	4	4
Jumlah	80	82	92	91
Rata-Rata	4	4.1	4.6	4.55

Keterangan :

- FI : Formulasi 1
- FII : Formulasi 2
- FIII : Formulasi 3
- FIV : Formulasi 4

Tabel. 16. Hasil Uji Hedonik Tekstur/Kerenyahan

Responden	tekstur/kerenyahan			
	F I	FII	F III	F IV
1	3	3	4	4
2	6	5	3	3
3	2	3	4	4
4	4	4	3	3
5	2	3	3	3
6	2	2	2	2
7	4	4	3	3
8	3	4	5	5
9	3	4	4	5
10	4	4	4	4
11	6	5	4	3
12	2	2	2	2
13	5	4	4	3
14	6	4	3	3
15	6	4	5	5
16	4	4	5	3
17	5	4	3	3
18	5	4	3	3
19	4	4	3	3
20	5	5	4	4
Jumlah	81	76	71	68
Rata-Rata	4.05	3.8	3.55	3.4

Keterangan :

FI : Formulasi 1

FII : Formulasi 2

FIII : Formulasi 3

FIV : Formulasi 4

Keterangan : 6 : Sangat Suka
5 : Suka
4 : Agak Suka
3: Agak Tidak Suka
2 : Tidak Suka
1 : Sangat Tidak Suka

B. Pembahasan

Hiperlipidemia adalah meningkatnya lemak di dalam darah akibat asupan lemak dalam tubuh berlebihan sehingga asupan lemak dalam tubuh tidak seimbang. Hiperlipidemia juga merupakan penyakit karena tingginya konsentrasi lipid dalam darah dan kadar kolesterol dalam darah meningkat melebihi kadar kolesterol normal pada manusia yaitu > 200 mg/dL. Hal ini dikarenakan meningkatnya degradasi oksidatif lemak yang di akibatkan oleh eksogen yang berada di dalam tubuh seperti organ hati

Biskuit adalah sejenis makanan yang dibuat dengan komposisinya terdiri dari tepung lain atau jenis tepung terigu, lemak atau minyak, dan menambahkan campuran pangan lain atau penambahan bahan lain, kemudian dipanggang didalam oven. (Jagat, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah biskuit umbi porang (*amorphophallus oncophyllus*) memiliki potensi terapi alternatif antihiperlipidemia pada tikus jantan (*rattus norvegicus*) dan untuk mengetahui formulasi terbaik yang memiliki potensi sebagai terapi alternatif antihiperlipidemia terhadap tikus Jantan (*rattus norvegicus*).

Pada penelitian ini digunakan sampel umbi porang yang diolah menjadi tepung umbi porang. Umbi porang dibersihkan dari akar dan tanah yang menempel pada umbi setelah proses pemanenan. Setelah itu, umbi orang dapat diolah menjadi tepung porang atau chip porang. Sebelum pembuatan tepung porang terlebih dahulu dilakukan pembuatan chip porang. Setelah proses pembuatan chip porang barulah diproses menjadi tepung porang. Pertama-tama

Umbi porang yang telah diolah menjadi chip porang yang kering kemudian dimasukkan kedalam blender untuk di blender sampai halus lalu kemudian di ayak dengan ayakan mesh 80. Lakukan maserasi pada tepung porang dengan etanol 70%. Hasil maserasi kemudian di keringkan dan di ayak Kembali dengan ayakan mesh 80, kemudian dihasilkan tepung porang murni.

Terlebih dahulu ditimbang semua bahan. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu tepung porang, baking powder dipakai untuk mengembangkan adonan, susu skim dipakai untuk menambah gizi dan menambah cita rasa pada biskuit. Gunakan susu skim yang rendah lemak sehingga aman dikonsumsi oleh penderita tinggi kolesterol. Garam digunakan untuk menambah cita rasa pada adonan, dan gula digunakan untuk membentuk tekstur dan menambah cita rasa pada biskuit.

Dalam pembuatan biskuit, pertama-tama dimulai dengan tahap awal yaitu pencampuran yaitu mula-mula gula dilarutkan dengan susu skim cair, kemudian dimasukkan semua bahan yang lain yaitu, terigu atau tepung porang, vanilli, baking powder, dan garam. Kemudian adonan diaduk hingga kalis sehingga bisa di cetak. Adonan kemudian di cetak dan disusun di atas loyang, kemudian dipanggang dalam oven selama 15 menit dengan suhu 170°C. Sementara itu tidak ada bahan lemak seperti telur, mentega atau minyak yang digunakan untuk membuat biskuit.

Tikus memiliki tingkat metabolisme tinggi, sehingga tikus digunakan dalam percobaan ini. Secara hormonal, tikus jantan lebih stabil dari pada tikus betina. Berat rata-rata tikus yang digunakan yaitu 150-200 gram dan dibagi menjadi empat bagian. 3 ekor tikus di setiap kelompok. Tikus itu kemudian diadaptasikan selama 7 hari untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Setelah melakukan proses adaptasi, diukur lebih dahulu kadar kolesterol awal pada tikus.

Kemudian diberikan pakan kuning telur kepada tikus agar kolesterol pada tikus meningkat. Pemberian pakan kuning telur dilakukan selama 7 hari. Setelah itu dicek Kembali kadar kolesterol pada tikus setelah pemberian pakan kuning telur. Diberikan biskuit tepung porang kepada tikus selama 7 hari, setelah itu di cek kadar kolesterol akhir pada tikus.

Berdasarkan hasil pengujian hedonik aroma, biskuit pada formulasi 4 (kontrol negatif) paling disukai dengan nilai rata-rata yaitu 5,25, kemudian dari hasil pengujian hedonik rasa, formula 3 dengan dosis 50 gram tepung porang paling banyak disukai dengan nilai rata-rata yaitu 4,85, pada hasil pengujian hedonik warna yang paling disukai adalah formulasi 3 dengan dosis 50 gram tepung porang dengan nilai rata-rata 4,6, dan pada pengujian hedonik tekstur/kerenyahan formulasi 1 dengan dosis 100 gram tepung porang paling banyak disukai dengan nilai rata-rata yaitu 4,05. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa biskuit yang paling disukai dari segi rasa dan warna adalah formula III yaitu 50 gram tepung porang dan 50 gram tepung terigu. Kemudian dari segi aroma yang paling disukai adalah formula IV yaitu 100 gram tepung terigu (tidak menggunakan tepung porang) dan untuk segi tekstur/kerenyahan yaitu formula I yaitu 100 gram tepung porang.

Pada pengujian penurunan kolesterol, untuk kelompok I,II, dan III diberikan biskuit substitusi tepung porang (*amorphophallus oncophyllus*) dengan varian dosis yang berbeda untuk masing-masing kelompok perlakuan yaitu, 100 gram, 75 gram, dan 50 gram. Kelompok IV diberikan biskuit tanpa tepung porang (*amorphophallus oncophyllus*) sebagai kontrol negatif.

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit substitusi tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai penurunan kolesterol, pada tabel 8.

Berdasarkan hasil yang didapat setelah pengukuran kadar kolesterol dari hari ke-1 hingga hari ke-7, kadar kolesterol total pada tikus mengalami peningkatan yang signifikan. Kadar kolesterol pada tikus meningkat setelah diberikan pakan kuning telur selama 7 hari berturut-turut dan diberikan sehari sebanyak 2 kali yaitu pagi dan sore hari. Hasil pengukuran kadar kolesterol awal pada tikus sebelum perlakuan berkisar antara 116-162 mg/dL, dimana nilai masih berada dalam batas normal yaitu < 200 mg/dL. Dimana nilai rata-rata kadar kolesterol sebelum pemberian kuning telur yaitu pada perlakuan kelompok 1 145,33, kelompok 2 148, kelompok 3 144 dan kelompok 4 131,67. Namun setelah dilakukan pemberian kuning telur puyuh kadar kolesterol tikus meningkat berkisar antara 170-267 mg/dL. Setelah pemberian kuning telur nilai rata-rata tikus pada setiap kelompok juga meningkat yakni pada kelompok 1 205,33, kelompok 2 225,67, kelompok 3 226,67 dan kelompok 4 186,33. Nilai rata-rata tertinggi setelah pemberian kuning telur yaitu pada kelompok perlakuan 3.

Telur puyuh merupakan sumber protein hewani yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya seperti telur ayam, daging sapi, daging kambing dan lain-lain. Kandungan kolesterol dalam kuning telur puyuh mencapai 2630. Kadar kolesterol dalam kuning telur puyuh lebih tinggi yaitu, 844 mg/dL, dibandingkan dengan kadar kolesterol kuning telur ayam yang hanya sebesar 423 mg/dL.

Dari hasil yang didapatkan kadar kolesterol pada tikus di hari ke-8 hingga hari ke-14 terjadi penurunan yang signifikan pada kelompok perlakuan 1,2 dan 3. Hal ini dikarenakan tikus diberikan biskuit substitusi tepung porang formula 1,2 dan 3. Masing-masing formula memiliki kadar tepung porang berbeda – beda, pada formula 1 terdapat 100 gram tepung porang, formula 2 terdapat 75 gram tepung dan formula 3 terdapat 25 gram tepung porang. Untuk pemberian biskuit

formula 1 dilihat Pada hari ke-8 rata-rata penurunan kolesterol dengan nilai rata-rata yaitu 199 mg/dL, pada hari ke-9 dengan rata-rata 192,33 mg/dL, pada hari ke-10 dengan rata-rata 188,67 mg/dL, pada hari ke-11 dengan nilai rata-rata yaitu 185,67 mg/dL, pada hari ke-12 dengan nilai rata-rata 181 mg/dL, pada hari ke-13 dengan nilai rata-rata 178,33 mg/dL, dan pada hari ke-14 dengan nilai rata-rata 174,67 mg/dL. Untuk formula 2 dengan dosis 75 gram dilihat pada hari ke-8 nilai rata-rata penurunan kadar kolesterol yaitu 220,67 mg/dL, hari ke-9 dengan nilai rata-rata 217,67 mg/dL, hari ke-10 dengan nilai rata-rata 213,33 mg/dL, hari ke-11 dengan nilai rata-rata 207 mg/dL, hari ke-12 dengan nilai rata-rata 206,33 mg/dL, hari ke-13 dengan nilai rata-rata 202,67 mg/dL, dan hari ke-14 dengan nilai rata-rata 201,33 mg/dL. Untuk formula 3 dengan dosis 50 gram tepung porang dilihat pada hari ke-8 dengan nilai rata-rata penurunan kadar kolesterol yaitu 221,33 mg/dL, hari ke-9 dengan nilai rata-rata 218 mg/dL, hari ke-10 dengan nilai rata-rata 216,33 mg/dL, hari ke-11 dengan nilai rata-rata 206,67 mg/dL, hari ke-12 dengan nilai rata-rata 198,67 mg/dL, hari ke-13 dengan nilai rata-rata 197,67 mg/dL dan hari ke-14 dengan nilai rata-rata 196,67 mg/dL. Untuk formula 4 (kontrol negatif) dilihat pada hari ke-8 dengan nilai rata-rata 186,33 mg/dL, hari ke-9 dengan nilai rata-rata 183,33 mg/dL, hari ke-10 dengan nilai rata-rata 184,67 mg/dL, hari ke-11 dengan nilai rata-rata 184,33 mg/dL, hari ke-12 dengan nilai rata-rata 184 mg/dL, hari ke-13 dengan nilai rata-rata 184 mg/dL dan hari ke-14 dengan nilai rata-rata 184.

Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa setelah pemberian biskuit tepung porang kepada setiap perlakuan pada tikus kelompok yang paling baik penurunan kadar kolesterolnya adalah kelompok perlakuan 1 yang diberikan biskuit tepung porang formula I dengan dosis 100 gram. Dan penurunan yang

sangat rendah yaitu pada kelompok perlakuan 4 dengan pemberian biskuit formula IV (kontrol negatif).

Sejalan dengan Penelitian Putu Mirah Dinawati dalam jurnal bioshell yang berjudul “uji prefentif tepung umbi porang terhadap kenaikan kolesterol total tikus. Pada penelitiannya menggunakan tepung porang dengan dosis 100 gram, 75 gram, 50 gram dan 25 gram yang diberikan pada tikus hiperlipidemia. Dan dalam penelitiannya didapatkan hasil tepung porang dalam dosis itu mampu menurunkan kadar lemak pada tikus dan dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah tikus.

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit substitusi tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai penurunan kolesterol, pada tabel 9. Kelompok I dengan dosis 100 garam diperoleh hasil setelah perlakuan pada tikus ke-1 sebesar 20 mg/dL, tikus ke-2 sebesar 30 mg/dL, tikus ke-3 sebesar 42 mg/dL. Terjadi penurunan signifikan terhadap penurunan kadar kolestrol pada tikus. Kelompok ke-2 dengan dosis 75 gram diperoleh hasil detelah perlakuan pada tikus ke-1 sebesar 18 mg/dL, tikus ke-2 sebesar 21 mg/dL, pada tikus ke-3 sebesar 34 mg/dL. Kelompok III dengan dosis 50 gram diperoleh hasil setelah perlakuan pada tikus ke-1 sebesar 5 mg/dL, tikus ke-2 sebesar 54 mg/dL, tikus ke-3 sebesar 30 mg/dL. Kelompok IV (kontrol negatif) diperoleh hasil setelah perlakuan pada tikus ke-1 sebesar 3 mg/dL, pada tikus ke-2 sebesar 1 mg/dL, pada tikus ke-3 sebesar 3 mg/dL. Pada kelompok perlakuan 4 dengan pemberian biskuit (kontrol negatif) terjadi penurunan yang sangat kecil dibandingkan dengan biskuit formula I,II dan III.

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit substitusi tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*) sebagai penurun kolesterol. Diperoleh hasil rata-rata penurunan untuk kelompok I dengan dosis 100 gram yaitu 30,67 (mg/dL), kelompok 2 dengan dosis 75 gram yaitu 24,33 (mg/dL) kelompok III dengan dosis

50 gram yaitu 29,67 (mg/dL) dan kelompok IV kontrol negatif yaitu 2,33 (mg/dL).

Dari data yang didapatkan kemudian dihitung nilai % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara kolesterol akhir setelah perlakuan dengan kolesterol setelah diinduksi kuning telur dan dikali dengan 100%. Berdasarkan data yang didapatkan, untuk biskuit substitusi tepung porang, (*Amorphophallus oncophyllus*) dengan dosis 100 gram didapatkan presentase 15%, dosis 75 gram diperoleh presentase 11,39 %, dosis 50 gram didapatkan presentase 12,31%, dan kontrol negatif diperoleh 1,26 %. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang paling tinggi presentasi penurunannya yaitu yaitu dosis 100 gram.

Pada penelitian ini hasil pengukuran kadar kolesterol dari dari h-1 hingga hari ke-14 dianalisis menggunakan menggunakan SPSS (*Statistical Program Service Solution*) versi 26.0, dengan metode ANOVA (*Analysis of Varian*) untuk mengetahui adanya perbedaan pengaruh penurunan kadar kolesterol pada tikus setelah pemberian biskuit substitusi tepung porang.

Dari data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan uji *one-way ANOVA* untuk penurunan kolesterol total dalam darah didapatkan $(p)= 0,000$. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya terdapat perbedaan bermakna antar rata-rata tiap kelompok perlakuan. Hasil uji ANOVA pada pengujian sama dengan penelitian deny, dkk(2021) yang menyatakan bahwa hasil uji SPSS dinyatakan berdistribusi normal dan homogen, dan hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan nyata antar kelompok perlakuan.

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa biskuit substitusi tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*) dapat menurunkan kadar kolesterol pada dosis 100 gram, 75 gram dan 50 gram yang menunjukkan bahwa memiliki aktivitas dalam penurunan kadar kolesterol pada tikus Jantan (*Rattus norvegicus*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

1. Tepung porang (*Amorphophallus onchophyllus*) sebagai pengganti tepung terigu dalam formulasi sediaan biskuit tepung porang (*amorphophallus oncophyllus*) memiliki aktivitas antihiperlipidemia dengan karakteristik tekstur yang sedikit keras.
2. Formulasi biskuit terbaik dengan bahan baku tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*) 100 gram dapat memberikan efek aktivitas antihiperlipidemia.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan bahan tambahan yang mengandung kadar lemak rendah dalam pembuatan biskuit substitusi tepung porang (*Amorphophallus oncophyllus*)
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan perlakuan perbandingan dengan menggunakan obat-obat sintetik.

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,F., Ghanbari,R.,Alkharfy,KM., Gilani, A.H., Saari, N., 2012. Valuable Nutrients and Functional Bioactives in Different Parts of Olive (*Olea europaea* L.) - A Review. *Int.J.Mol.Si.*, 13, 3291-3340
- Amin T, B. A. Development Of High Protein And Sugar-Free Cookies Fortified With Pea (*Psium sativum* L.) Flour, Soya Bean (*Glycine max* L.) Flour And Oat (*Avena sativa* L.) Flakes. *International Food Research Journal*, 72-76. 2016
- Anna R, S. J., 2013. Uji Fungsi Freeze Dryer Radiofarmaka. *Batan*, 61-67.
- Arnata, A. P., Rosalina, R., & Lestari, P. (2018). Pengaruh Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) Terhadap Peningkatan Kualitas Tidur pada Lansia di Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Indonesian Journal of Nursing Research (IJNR)*, 1(1)
- Aviati, V, Mardiyati, S, M, Tyas, R, S. 2014. Kadar kolesterol telur puyuh setelah pemberian tepung kunyit dalam pakan. *Buletin Anatomi dan Fisiologi*. 22(1):58-64
- BPOM RI. (2021). Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Depkes RI. (2000). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tanaman Obat*. In *Departemen Kesehatan RI* (Vol. 1, pp. 10–11).
- DiPiro J.T., Wells B.G., Schwinghammer T.L. and DiPiro C. V., 2015, *Pharmacotherapy Handbook*, Ninth Edit., McGraw-Hill Education Companies, Inggris.
- Dipiro, J. T., Dipiro, C.V., Wells, B.G., & Scwinghammer, T.L. 2008.*Pharmacoteraphy Handbook* Seventh Edition. USA : McGraw-Hill Compan
- Erwinanto, (2013). *Panduan Pengelolaan Dislipidemia di Indonesia*, 1st ed. Centra Communications, jakarta.
- Fachriyani Ulfah dan Iskandar Yoppi. 2020. *Aktivitas Tanaman Jati Belanda (Guazuma Ulmifolia) Sebagai Antihiperlipidemia*. Bandung : Universitas Padjajaran.
- Ganjari LE, 2014. *Pembibitan Tanaman Porang (Amorphopalus oncophillus Blume) dengan model groekosistem botol plastik*.
- Gordon, M. 1985. Cholesterol. *Nutrition & Food Science*. 85(3):10-11
- Harikumar K, Althaf SA, Kumar BK, Ramunaik M, Suvarna CH, 2013, A Review on Hyperlipidemic, *International Journal of Novel Trends in Pharmaceutical Sciences*; 3(4), pp. 59-68.
- Hidayah, R. N. (2016). *Budidaya Tanaman Porang secara intensif*. June, 1–24. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3487.9600>
- ITIS (Integrated Taxonomic Information System). *Rattus Norvegicus. Taxonomic Information System. Reston, Virginia*. 2023. ITIS Standar Report. TSN: 180363.


- ITIS (Integrated Taxonomic Information System). *Amorphophallus*. *Taxonomic Information System*. Reston, Virginia. 2023. ITIS Standar Report. TSN: 500822.
- Jagat, A. N., 2017. Penangkayaan Serat Pada Pembuatan Biskuit Dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Kuning (*Lpomea batatas L.*) . Indonesian Food Technologists, 1.
- Kemenkes RI. (2017). *Pedomanan dan Standar Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Farmakope Indonesia Edisi VI*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Abyan. 2014.
- Lestari, A. P. 2017. Efek Tepung Porang (*Amorphophallus oncophyllus*) dengan Maserasi Keji Beling Terhadap kadar Kolesterol Total Pada Tikus Wistar Jantan (*Rattus Norvegicus*) Diabetes Mellitus Tipe 2 (skripsi). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan Universitas Alma Ata Yogyakarta.
- Mahardini Silmi dan afifah., 2016. Jurnal Gizi Indonesia, Pengaruh Substitusi Tepung Terigu Dengan Tepung Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) Terhadap Kadar Protein, Serat Pangan, Lemak, Dan Tingkat Penerimaan Biskuit, Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang.,
- Mayasari, R., 2015. Kajian Karakteristik Biskuit Yang Dipengaruhi Perbandingan Tepung Ubi Jalar (*Lpomea Batatas L.*) Dan Tepung Kacang Merah (*Phaseolus vulgaris L.*) .
- Mayes P.A, B. A. 2000. Biokimia Heper. Jakarta: EGC.
- Murtiningsih. 2013. Peran Pektin dan Sukrosa Pada Selai Ubi Jalar Ungu, UPN Jawa Timur, Surabaya.
- Nuralufah, dkk. 2020. Journal Syifa Science and Clinical Research (Uji aktifitas Antihierlipidemia Ekstrak Etanol Daun Notika (*Arcboldiodendron calosericeum Kobuski*) Terhadap Kadar Kolesterol Total Tikus (*Rattus Norvegicus Jantan Wistar*) . Kendari Indonesia : Universitas Halu Oleo.
- Pradana, D. A., Apriani, L., & Widyarini, S. (2018). Hyperlipidemia Preventing Activities of Standardized Ethanolic Extract of Red Spinach (*Amaranthus tricolor L.*): An in Vivo Study in Male Sprague-Dawley Rats. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 8, 102-108. DOI: 10.22435/jki.v8i2.349
- Pratiwi iin, dkk. 2020. Pengaruh Formulasi Berbagai Jenis Tepung Pangan Lokal Terhadap Nilaiproksimat Produk Biskuit. *J. Sains dan Teknologi Pangan* Vol. 5, No.1, P. 2798-2700. Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo, Kendari
- Putri cempaka dan Decy situngkir. 2022. Edukasi Mengenai Hiperlipidemia dan Hiperqlikemia Serta Cara Mengatasinya Pada Pekerja Bongkar Muat. Indonesia : Universitas Esa Unggul
- Rejeki Purwo, dkk. 2021. Ovaricktomi Pada Tikus dan Mencit. Surabaya, Airlangga Universitas Press

- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018.
- Sergia Ardian Dearta. 2020. Terapi Dislipidemia Untuk Mencegah Resiko Penyakit Jantung Koroner. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences Volume 1 Nomor 1.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Volume 2* . Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Sitompul, R. M., Suryana, F., Bhuana, D., dan Mahfud. 2018. Ekstraksi Asam Oksalat Pada Umbi Porang (*Amorphophallus Oncophyllus*) dengan Metode Mechanical Separation. Jurnal Teknik ITS. 7 (1) : 135.
- Standar Nasional Indonesia (1992). Tepung Ikan Bahan Baku Pakan SNI 01-2715-1996/ Rev.1992. Dewan Standarisasi Nasional, Jakarta
- Thomas, K, S, Jagatheesan, P, N, R, Reetha, T, L, Rajendran, D. 2016. Nutrient composition of japanese quail eggs. International Journal of Science, Environment and Technology. 5(3):1293-1295
- Urli, dkk. 2017. Pengaruh Pemberian Tepung Porang (*amorphophallus muelleriblume*) Terhadap Kadar Hdl Pada Tikus (*rattusnovergicus*) Strain Wistar Dm Tipe 2. Nursing News. Vol 2 No 2 hlm 652-664
- Wahyuni, R. 2010. Pemanfaatan Kulit Buah Naga Super Merah (*Hylocereus Costaricensis*) sebagai Sumber Antioksidan dan Pewarna Alami pada Pembuatan Jelly. Jurnal Teknologi Pangan (2) : 68 – 85
- Wilson E.D, K. F. *Principles of Nutrient*. 1979.
- Yani, Muhammad, 2015. Mengendalikan Kadar Kolesterol Pada Hiperkolesterolemia. Jurnal Olahraga Prestasi Volume 11 Nomor 2. 1-7.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


a. Pengolahan sampel




b. Pembuatan Biskuit



c. Pengamatan




d. Perlakuan Terhadap Hewan Coba



Lampiran 2 : lokasi

Gambar 3. Peta Lokasi Pengambilan Sampel



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3 : Gambar pengamatan

Gambar 4 : pengelolaan sampel



Tanaman umbi porang



sortasi basah



Sampel di potong kecil-kecil



Pengeringan sampel



Sampel diblender hingga halus



maserasi



Penyaringan



pengeringan menggunakan oven



Tepung porang murni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 5 : pengelolaan biskuit tepung porang



Bahan-bahan yang telah ditimbang



Adonan biskuit yang telah dicampurkan



proses pencetakan



Proses pemanggangan



Biskuit tepung porang

Gambar 6 : Perlakuan Terhadap Hewan Uji



Tikus Jantan (Rattus Norvegicus)



penimbangan hewan coba



Induksi kuning telur



Pengambilan darah tikus



Pengecekan kadar kolesterol tikus



hasil pengukuran kadar kolesterol



Pemberian Biskuit Tepung Porang



Alat Cek Kolesterol

Lampiran 4. Penurunan Kolesterol

Rumus % penurunan = $\frac{\text{penurunan kadar setelah perlakuan}}{\text{kolesterol setelah induksi}} \times 100\%$:

Kelompok 1 (Formula I)

- Replikasi 1 = $\frac{20}{200} \times 100\% = 10\%$
- Replikasi 2 = $\frac{30}{204} \times 100\% = 14,70\%$
- Replikasi 3 = $\frac{42}{212} \times 100\% = 19,81\%$

Kelompok 2 (Formula II)

- Replikasi 1 = $\frac{18}{267} \times 100\% = 6,74\%$
- Replikasi 2 = $\frac{21}{220} \times 100\% = 9,54\%$
- Replikasi 3 = $\frac{34}{190} \times 100\% = 17,89\%$

Kelompok 3 (Formula III)


- Replikasi 1 = $\frac{5}{157} \times 100\% = 2,67\%$
- Replikasi 2 = $\frac{54}{243} \times 100\% = 22,22\%$
- Replikasi 3 = $\frac{30}{249} \times 100\% = 12,04\%$

Kelompok 4 (Formulasi IV)


- Replikasi 1 = $\frac{3}{202} \times 100\% = 1,48\%$
- Replikasi 2 = $\frac{1}{187} \times 100\% = 0,53\%$
- Replikasi 3 = $\frac{3}{170} \times 100\% = 1,76\%$

Lampiran 5. Grafik perubahan kadar kolesterol


Gambar 7. Kelompok I




Gambar 8. Kelompok II



Gambar 9. Kelompok III



Gambar 10. Kelompok IV



Lampiran 6. Hasil Pengolahan Data Pada Aplikasi SPSS

Gambar 1. Hasil SPSS

KELOMPOK		Case Processing Summary					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
DATA	F1	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%
	F2	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%
	F3	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%
	F4	7	100,0%	0	0,0%	7	100,0%

KELOMPOK		Statistic		Std. Error
DATA	F1	Mean	185,67	3,191
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	177,86
			Upper Bound	193,48
		5% Trimmed Mean	185,54	
		Median	185,67	
		Variance	71,288	
		Std. Deviation	8,443	
		Minimum	175	
		Maximum	199	
		Range	24	
		Interquartile Range	14	
		Skewness	,336	,794
		Kurtosis	-,657	1,587
		F2	Mean	204,33
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		193,78	
	Upper Bound		214,88	
5% Trimmed Mean	204,83			
Median	206,33			
Variance	130,078			
Std. Deviation	11,405			
Minimum	182			
Maximum	218			

	Range		36	
	Interquartile Range		12	
	Skewness		-1,265	,794
	Kurtosis		2,518	1,587
F3	Mean		207,91	3,997
	95% Confidence Interval for	Lower Bound	198,13	
	Mean	Upper Bound	217,69	
	5% Trimmed Mean		207,78	
	Median		206,67	
	Variance		111,819	
	Std. Deviation		10,574	
	Minimum		197	
	Maximum		221	
	Range		25	
	Interquartile Range		20	
	Skewness		,151	,794
	Kurtosis		-2,336	1,587
F4	Mean		184,81	,404
	95% Confidence Interval for	Lower Bound	183,82	
	Mean	Upper Bound	185,80	
	5% Trimmed Mean		184,77	
	Median		184,33	
	Variance		1,143	
	Std. Deviation		1,069	
	Minimum		184	
	Maximum		186	
	Range		2	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		1,026	,794
	Kurtosis		-1,068	1,587

Tests of Normality

KELOMPOK		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
DATA	F1	,138	7	,200*	,981	7	,965
	F2	,253	7	,195	,898	7	,319
	F3	,237	7	,200*	,860	7	,151
	F4	,267	7	,140	,742	7	,010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Oneway

Notes

Output Created	30-AUG-2023 00:24:18	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	28
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each analysis are based on cases with no missing data for any variable in the analysis.
Syntax	ONEWAY DATA BY KELOMPOK /STATISTICS HOMOGENEITY /MISSING ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,08

Test of Homogeneity of Variances

		Levene			
		Statistic	df1	df2	Sig.
DATA	Based on Mean	3,805	3	24	,023
	Based on Median	3,203	3	24	,041
	Based on Median and with adjusted df	3,203	3	13,024	,059
	Based on trimmed mean	3,725	3	24	,025

ANOVA

DATA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3099,352	3	1033,117	13,147	,000
Within Groups	1885,966	24	78,582		
Total	4985,318	27			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Siti Faradilah, sering dipanggil Fafah atau Farah. Anak dari pasangan Bapak Arifin Hamid dan Ibu Andiwianto. Lahir di Watubara pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2001. Anak pertama dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Watubara pada tahun 2012, SMP Katholik Sinar Pelita Mukusaki pada tahun 2015. SMK Santha Mathilda Maumere pada tahun 2018 dan sekarang sedang menempuh pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R