

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 70%
BOTTO-BOTTO (*Chromolaena odorata* L.) TERHADAP BAKTERI
*HELICOBACTER PYLORI***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH :

UMMU KALSUM H. SANDA

NIM : 70100119056

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ummu Kalsum H. Sanda
Nim : 70100119056
Tempat/Tgl. Lahir : Tongko, 17 Februari 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Bumi Alauddin Indah, Romangpolong
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Botto-
Botto (*Chromolaena odorata* L.) Terhadap Bakteri
Helicobacter pylori

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2023
Peneliti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Ummu Kalsum H. Sanda
NIM. 70100119056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L*) Terhadap Bakteri *Helicobacter Pylori*” yang disusun oleh **Ummu Kalsum H. Sanda, NIM: 70100119056**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 27 Oktober 2023 M** yang bertepatan dengan **12 Rabiul Akhir 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 27 Oktober 2023

12 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.
NIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil ladzil kaana bi'ibaadihi khoiroom bashiir. Tabarakal ladzii ja'ala fis samaa-i buruujaw waja'ala fihaa siroojaw waqomarom muniir. Asyhadu alaa ilaaha illallaahu, wa- asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosuuluhuh. Alladzii ba'atsahu bilhaqqi basyiirow wanadzirow wa daa'iyaa ilalhaqqi biidznihi wasiroojaam muniir. Allahumma sholli'alaihi wa'alaa aalihii washohbihi wasallim tasliimaan katsiroo. Amma ba'du.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kekepada Nabi Muhammad SAW, agar mendapat syafa'at di hari akhir kelak.

Skripsi dengan judul **“Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Botto-Botto (*Chromolaena odorata* L.) Terhadap Bakteri *Helicobater Pylori*”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Peneliti menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya peneliti sampaikan kepada orangtua tercinta, Ayahanda Hasan Sanda S.E dan Ibunda Dra. Sitti Maryam W

S.PdI., M.PdI, serta saudara (i) saya Zul Ilmi H Sanda S.PdI., M.PdI dan Fadli Hasan Sanda Amd.T, yang telah memberikan restu dan doanya, kasih sayang, nasehat, motivasi, dan memberikan dukungan baik moral maupun material kepada peneliti selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Demikian pula penulis menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada :

1. Prof . H. Hamdan Juhannis , MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor 1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Andi Aderus, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. apt. Isriyani Ismail, M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., Mars. selaku wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

9. apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar sekaligus penguji kompetensi saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
11. apt. Indah, S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang juga senantiasa memberi masukan, arahan, dan motivasi serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing peneliti hingga selesainya skripsi ini.
12. apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si selaku pembimbing akademik yang banyak membantu dan memberi arahan serta motivasi dalam proses perkuliahan dan penelitian.
13. Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag selaku penguji agama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti sejak menempuh pendidikan farmasi hingga selesainya skripsi ini.
15. Teman-teman “Interferon” angkatan 2019 yang tidak sempat disebutkan satu persatu, pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Besar harapan peneliti kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
16. Kepada teman-teman seperjuangan penelitian saya Dwi Febrianty Kurnia, Nurfadilah, dan Irma Afrianti, terima kasih penulis ucapkan atas segala bantuan dan kerjasamanya selama awal penelitian hingga berada pada jalannya masing-masing.

17. Kepada teman-teman seperjuangan dari awal menginjakkan kaki di dunia farmasi (Idzil, Kirani, Cacca, Andipitri, Neni, dan Tripeni) terimakasih atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah di farmasi.

18. Harri Suyatno, S.I.Kom terima kasih sudah jadi teman baik peneliti yang telah memberikan banyak bantuan serta *support* dari perkuliahan sampai tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, Namun besar harapan kiranya dapat memberikan manfaat bagi peneletian-penelitian selanjutnya, khususnya dibidang mikrobiologi farmasi, dan semoga benilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samata-Gowa, September 2023

Penulis

Ummu Kalsum H. Sanda

NIM : 70100119056

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Defenisi Operasional	4
D. Ruang Lingkup Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Tujuan penelitian	7
G. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Uraian Sampel	8
1. Klarifikasi Tanaman	8
2. Nama daerah Tanaman Daun Botto-botto (<i>Chromolaena</i> <i>Odorata L.</i>).....	8
3. Morfologi Tanaman Botto-botto (<i>Chromolaena odorata L.</i>)	9
4. Kandungan Kimia Tanaman Botto-botto (<i>Chromolaena</i> <i>orodata L.</i>)	10

5. Manfaat Tanaman Botto-botto (<i>Chromolaena odorata</i> L)	10
B. Ulkus Peptikum	10
1. Pengertian ulkus peptikum	10
2. Etiologi ulkus peptikum.....	11
3. Patofisiologi ulkus peptikum	16
4. Gejala Ulkus peptikum	18
C. Ekstraksi	18
1. Pengertian Ekstraksi	18
2. Jenis-jenis Ekstraksi	19
D. Antibakteri	22
1. Metode Difusi	23
2. Metode Dilusi	24
E. Bakteri	25
1. Ciri-ciri Bakteri.....	26
2. Struktur Tubuh Bakteri	28
F. <i>Helicobacter pylori</i>	31
G. Antibiotika Pembanding	32
H. Perhitungan Zona Hambat	33
I. Tinjauan Islami	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Lokasi penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sampel penelitian	40
D. Instrument penelitian	40
E. Teknik pengolahan.....	40
1. Pengambilan Sampel	40
2. Pengelolaan Sampel	40
3. Ekstraksi Sampel.....	41
4. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak	41
5. Sterilisasi Alat	41
6. Pembuatan Media NA.....	42

7. Pembuatan MC Farland	42
8. Inokulasi Bakteri.....	43
9. Pembuatan Suspensi Bakteri.....	43
10. Uji Aktivitas Bakteri.....	43
11. Analisis Statistik	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil.....	45
1. Pengelolaan Sampel.....	45
2. Uji Aktivitas Antibakteri.....	45
3. Diagram Aktivitas Antibakteri.....	46
4. Uji Analisis Statistik.....	46
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kategori diameter zona hambat	33
Tabel 2. Perbandingan jumlah ekstrak dan volume akuades.....	42
Tabel 3. Hasil ekstraksi daun botto-botto	45
Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri	45
Tabel 5. Uji one way anova penghambatan bakteri <i>H. pylori</i>	47
Tabel 6. Uji tukey penghambatan bakteri <i>H. pylori</i>	47




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Botto-botto.....	8
Gambar 2. Struktur tubuh bakteri.....	27
Gambar 3. Struktur kimia kloramfenikol	31
Gambar 4 . Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat	33
Gambar 5. Diagram hasil uji aktivitas antibakteri.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi daun botto-botto.....	62
Lampiran 2. Skema pembuatan media Nutrient agar.....	63
Lampiran 3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland	64
Lampiran 4. Skema Kultur dan Suspensi <i>Helicobacter pylori</i>	65
Lampiran 5. Uji aktivitas antibakteri	66
Lampiran 6. Perhitungan rendamen ekstrak.....	67
Lampiran 7. Perhitungan konsentrasi dan pengenceran ekstrak	68
Lampiran 8. Perhitungan zona hambat bakteri	69
Lampiran 9. Hasil Uji Aktvitas antibakteri	72
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	73



ABSTRAK

Nama : Ummu Kalsum H. Sanda
NIM : 70100119056
Judul : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 70% Daun Botto-Botto (*Chromolaena odorata L.*) Terhadap Bakteri *Helicobacter pylori*

Ulkus peptikum adalah salah satu gangguan gastrointestinal, dimana terjadi luka dilapisan lambung atau usus kecil (duodenum), penyebab utama penyakit ini adalah bakteri *Helicobacter pylori*. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan pada penyakit tersebut yaitu daun botto-botto yang memiliki kandungan senyawa kimia seperti flavonoid, tanin dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto (*chromolaena odorata L.*) dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori* dengan konsentrasi tertentu. Konsentrasi ekstrak yang digunakan 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, dan 80% g/ml, ekstrak etanol 70% daun botto-botto. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan cakram disk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak daun botto-botto dapat memberikan zona penghambatan pada bakteri *Helicobacter pylori* dengan hasil diameter rata-rata zona hambat pada kontrol positif sebesar 17 mm, konsentrasi 20% sebesar 9,8 mm, konsentrasi 40% sebesar 9,8 mm, konsentrasi 60% sebesar 17,5 mm, dan konsentrasi 80% sebesar 20 mm. Konsentrasi 80% yang memiliki daya hambat bakteri terkuat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Berdasarkan hasil uji one way anova menunjukkan hasil nilai $p=0,000$ ($p < 0,05$) sehingga dilakukan uji lanjutan dengan uji *Tukey* yang diperoleh nilai ialah $p=0,051$ ($p > 0,05$) yang berarti tidak signifikan antara kontrol positif, konsentrasi 80% dan 60%, konsentrasi 40% dan 20%.

Kata Kunci : Daun botto-botto, Antibakteri, *Helicobacter pylori*.

ABSTRAK

Nama : Ummu Kalsum H Sanda
NIM : 70100119056
Judul : Antibacterial Activity Test of 70% Ethanol Extract of Botto-Botto Leaves (*Chromolaena odorata* L.) Against *Helicobacter pylori* Bacteria

Peptic ulcers are a gastrointestinal disorder, where an injury occurs in the lining of the stomach or small intestine (duodenum), the main cause of this disease is the bacteria *Helicobacter pylori*. One plant that can be used as an alternative treatment for this disease is botto-botto leaves which contain chemical compounds such as flavonoids, tannins and saponins which have antibacterial potential. This study aims to determine the antibacterial activity of 70% ethanol extract of botto-botto leaves (*chromolaena odorata* L.) in inhibiting *Helicobacter pylori* bacteria at certain concentrations. The extract concentrations used were 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, and 80% g/ml, 70% ethanol extract of botto-botto leaves. The antibacterial activity test was carried out using the agar diffusion method using discs. The results of this study indicate that botto-botto leaf extract can provide an inhibition zone for *Helicobacter pylori* bacteria with the average diameter of the inhibition zone in the positive kontrol being 17 mm, the 20% concentration being 9.8 mm, the 40% concentration being 9.8 mm , 60% concentration is 17.5 mm, and 80% concentration is 20 mm. The 80% concentration has the strongest bacterial inhibitory power against *Helicobacter pylori* bacteria. Based on the results of the one way ANOVA test, the value of $p=0.000$ ($p < 0.05$) was carried out, so the test was carried out using the Tukey test, the value obtained was $p=0.051$ ($p > 0.05$), which means no significant between positive kontrol, concentration 80% and 60%, concentration 40% and 20%.

Keywords : Botto-botto leaves, Antibacterial, *Helicobacter pylori*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit ulkus peptikum (PUD) adalah salah satu gangguan gastrointestinal yang telah umum terjadi dengan pengeluaran perawatan kesehatan yang paling tinggi. Ulkus peptikum atau tukak lambung mempunyai prevalensi berkisar antara 11-14% pada laki-laki, sedangkan sebesar 8-11% pada wanita. Prevalensi penyakit ini di Indonesia ialah 6-15% dengan rata-rata usia antara 20-50 tahun. Menurut data WHO, kematian akibat ulkus peptikum sebesar 1.081 atau 0,08% dari total keseluruhan kematian di Indonesia (Zahra dkk., 2022). Infeksi dari bakteri *Helicobacter pylori* merupakan penyebab utama dari penyakit ulkus peptikum, selain itu efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti NSAID bisa ditandai dengan gejala perut terasa perih, mual dan muntah. Bakteri tersebut terdapat di mukosa lambung dan juga banyak ditemukan pada permukaan epitel di antrum lambung (DiPiro J.T. dkk. 2020).

Helicobacter pylori adalah bakteri Gram-negatif mikroaerofilik berbentuk spiral yang mengkolonisasi mukosa lambung dan telah berevolusi bersama manusia selama puluhan ribu tahun (Chen, dkk., 2023). Infeksi *Helicobacter pylori* adalah salah satu penyakit kronis yang paling luas penyebarannya di dunia, dengan lebih dari separuh populasi global terinfeksi (Hooi, dkk., 2017). Infeksi *Helicobacter pylori* berhubungan erat dengan berbagai penyakit sistem pencernaan, seperti maag kronis, penyakit tukak lambung, limfoma jaringan limfoid terkait mukosa lambung, dan kanker lambung (Malfertheiner, dkk. 2007);

(Wang, dkk. 2007), serta berbagai penyakit non-sistem pencernaan, seperti penyakit jantung koroner dan anemia defisiensi besi (Karadag, dkk., 2018) . Saat ini, metode utama untuk memberantas infeksi *Helicobacter pylori* dalam praktik klinis adalah terapi tiga kali lipat standar (penghambat pompa proton ditambah dua antibiotik) dan terapi empat kali lipat bismut (penghambat pompa proton ditambah dua antibiotik ditambah bismut) (Egan, dkk., 2007; Hentschel, 2000).

Namun, dengan meluasnya penyalahgunaan antibiotik di bidang medis, resistensi *Helicobacter pylori* telah meningkat secara signifikan. Sebuah meta-analisis terhadap tingkat resistensi *Helicobacter pylori* menunjukkan bahwa tingkat resistensi primer dan sekunder terhadap klaritromisin, metronidazol, dan levofloxacin pada *Helicobacter pylori* yang diisolasi dari 65 negara di WHO semuanya lebih besar dari 15%, dan resistensi klaritromisin akan mengurangi resistensi secara signifikan. Proporsi strain *Helicobacter pylori* yang resisten terus meningkat, dan antibiotik baru yang tidak resisten semakin sulit ditemukan (Zou, dkk., 2020), maka saat ini tidak ada metode yang efektif dalam praktik klinis selain mengubah kombinasi antibiotik, meningkatkan dosis antibiotik, dan memperpanjang masa pengobatan.

Berdasarkan masalah tersebut, pencarian alternatif pengobatan terbaru berupa zat aktif dari tumbuhan mulai banyak dikembangkan karena lebih efektif, murah, mudah dalam penggunaan, aman, toksisitas rendah, dan mampu mencegah penyebaran gen resistensi antarspesies mikroorganisme. Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional adalah botto-botto (*Chromolaena odorat* L). Uji fitokimia ekstrak daun botto-botto

mengandung tanin, saponin, antrakuinon, terpenoid, glikosida jantung, fenol dan alkaloid sehingga bersifat antiinflamasi, anthelmintik, antioksidan, analgesik, antipiretik, dan antispasmodik. Botto-botto dapat digunakan sebagai agen, antibakteri (Ernawati and Jannah 2021). Penelitian terdahulu mengatakan bahwa ekstrak etanol daun botto-botto memiliki aktivitas baik sebagai antimikroba termasuk pada bakteri *S. aureus*. Aktivitas antimikroba dari ekstrak daun botto-botto dipengaruhi oleh jumlah total senyawa fenol dan flavonoid yang dihasilkan (Hanphanphoom and Krajangsang 2016).

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ekstrak etanol daun botto-botto memiliki penghambatan terhadap efek antibakteri. Namun belum ada penelitian mengenai uji aktivitas antibakteri daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori*, berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak daun botto-botto memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*?
2. Berapakah konsentrasi optimal ekstrak daun botto-botto yang memberikan daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*?

C. Definisi Operasional

1. Uji aktivitas merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri
2. Antibakteri merupakan zat yang berasal dari ekstrak daun botto-botto yang

dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan dapat membunuh bakteri penyebab infeksi

3. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
4. Daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) merupakan salah satu tanaman yang dianggap sebagai tanaman liar yang digunakan sebagai sumber obat. Daunnya berbentuk oval, bagian bawah lebih lebar, makin ke ujung makin runcing. Panjang daun 6 – 10 cm dan lebarnya 3 – 6 cm. Pertulangan daun menyirip, kedua permukaan agak kasar, berwarna hijau muda. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadap-hadapan. Memiliki bau khas.
5. Bakteri *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) adalah bakteri berbentuk spiral yang ditemukan pada lapisan dinding mukosa lambung atau melekat pada lapisan epitel lambung. *Helicobacter pylori* menyebabkan lebih dari 90% dari ulkus duodenum dan hingga 80% dari ulkus lambung.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, dimana dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) terhadap biofilm *Helicobacter pylori*

E. *Kajian Pustaka*

1. Dalam penelitian (Yutika dkk., 2015) yang berjudul Aktivitas Antibakteri Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* (L.) R.M.King & H.Rob.) Terhadap Bakteri Gangren. Penelitian ini merupakan pengujian aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode difusi agar menggunakan paper disk. Hasil penelitian menunjukkan adanya aktivitas daya hambat dari ekstrak daun kirinyuh tersebut Kategori kekuatan daya hambat dari ekstrak yaitu termasuk kategori sedang (5-10 mm). Konsentrasi terbaik terdapat pada konsentrasi 30%. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menjadikan acuan untuk menindaklanjuti aktivitas antibakteri daun botto-botto (*Chromolaena odorata* (L.) terhadap bakteri *Helicobacter pylori* dengan metode yang sama yaitu metode difusi agar menggunakan paper disk.
2. Dalam penelitian (Ekayani dkk., 2021) dengan judul uji efektivitas larvasida dan evaluasi sifat fisik sediaan losio antinyamuk ekstrak etanol daun kirinyuh (*chromolaena odorata* L.) terhadap nyamuk *aedes aegypti*. Dalam penelitian ini menggunakan ekstrak daun kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.), ekstrak kental diperoleh dengan mengekstraksi daun kirinyuh menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70% kemudian dilakukan uji skrining fitokimia. Dari hasil uji skrining fitokimia ekstrak etanol 70% daun kirinyuh (*Chromolaena odorata* L) positif mengandung senyawa flavonoid, terpenoid, dan tannin. Dari penelitian diatas dapat dijadikan acuan oleh peneliti dalam menggunakan sampel daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L) dalam melakukan uji aktivitas antibakteri.

3. Dalam penelitian (Fadia dkk., 2020) yang berjudul efektivitas ekstrak etanol daun kirinyuh (*chromolaena odorata* L) sebagai antibakteri *salmonella typhi* dan *staphylococcus aureus*. penelitian ini merupakan penelitian uji efektivitas antibakteri etanol daun kirinyuh (*chromolaena odorata* L) dengan metode KHM dan KBM menggunakan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil rata-rata KHM ekstrak etanol daun kirinyuh terhadap *Salmonella typhi*: 20% dan *Staphylococcus aureus*: 20%. Sedangkan hasil rata-rata nilai KBM terhadap *Salmonella typhi*: 40% dan *Staphylococcus aureus*: 40%. Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menjadikan acuan untuk dalam menentukan konsentrasi terhadap pengujian yang akan dilakukan.
4. Dalam penelitian (Fajrina dkk., 2018) yang berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ektrak Etil Asetat *Spons Aplysina aerophoba* Pada *Helicobacter pylori* dan *Shigella dysenteriae*. Penelitian ini merupakan pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat *apon Aplysina aerophoba* terhadap *Shigella dysenteriae* dan *Helicobacter pylori* menggunakan metode difusi dilakukan dengan mengukur diameter hambat di sekeliling cakram kertas, dengan menggunakan berbagai konsentrasi yaitu 7%, 5%, 3%, 1%. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat *Aplysina aerophoba* mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Shigella dysenteriae* dan *Helicobacter pylori* dengan terbentuknya rata-rata diameter hambat pada masing-masing konsentrasi sebesar 10,60 mm; 9,44 mm; 8,3 mm; 5,641 mm pada bakteri *Helicobacter pylori*. Berdasarkan penelitian diatas,

peneliti menjadikan acuan untuk menggunakan metode yang sama dengan satu bakteri uji yang sama yaitu *Helicobacter pylori*.

Berdasarkan kajian pustaka diatas diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai uji aktivitas antibakteri daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) sebagai antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori*
2. Untuk mengetahui konsentrasi optimal ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) dalam memberikan daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*

G. Manfaat Penelitian.

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) terhadap biofilm *Helicobacter pylori*
2. Penelitian ini dapat menjadi sumber literatur dalam pengembangan ilmu kesehatan khususnya mengenai bahan antibakteri dalam pengobatan penyakit akibat infeksi terhadap *Helicobacter pylori*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: Plantae
super Divisi	: spermatphyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Asteridae
Ordo	: Asterales
Family	: Asteraceae
Genus	: Chromolaena
Spesies	: <i>Chromolaena odorata</i> L



Gambar 1. Daun Botto-botto (Gambar Koleksi pribadi)

2. Nama daerah Tanaman Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L)

Tanaman botto-botto (*Chromolaena odorat*L.) dalam beberapa negara dikenal dengan nama siam weed (Inggris), elizabeth (Nigeria), dan pokok kapal terbang atau aerop (Malaysia). Di Indonesia dikenal dengan nama lain Kirinyuh

(Sunda), laruna dan kopasanda (Makassar), Botto-Botto (Gowa), sikhokhoh (Aceh), dan lenga-lenga (Sumatera Utara). (Vijayaraghavan dkk., 2017)

3. Morfologi Tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata* L)

Tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) termasuk keluarga Asteraceae. Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) tumbuh membentuk semak mencapai 5 meter, bahkan lebih.

Daunnya berbentuk oval, bagian bawah daun lebih lebar, semakin ke ujung semakin runcing. Memiliki 6 – 10 cm panjang daun dan 3 – 6 cm lebarnya. Tepi daun bergerigi, menghadap ke pangkal. Letak daun juga berhadapan-hadapan.

Memiliki bunga terletak di ujung cabang (terminal). Setiap karangan terdiri atas 20 – 35 bunga. Warna bunga selagi muda kebiru-biruan, semakin tua menjadi coklat. Berbunga pada musim kemarau, perbungaannya serentak selama 3 – 4 minggu.

Batang muda berwarna hijau dan agak lunak yang nantinya akan berubah menjadi coklat dan keras (berkayu) ketika sudah tua. Letak cabang biasanya berhadapan-hadapan (oposit) dan memiliki jumlah sangat banyak. Percabangannya yang rapat dapat menyebabkan berkurangnya cahaya matahari ke bagian bawah, sehingga dapat menghambat pertumbuhan spesies lain, termasuk rumput yang tumbuh di bawahnya.

Tumbuhan ini sangat cepat tumbuh dan berkembang biak. Karena cepatnya pertumbuhan dan perkembangbiakannya, gulma ini juga cepat membentuk komunitas yang rapat sehingga dapat menghalangi tumbuhnya tumbuhan lain. Oleh karena itu gulma ini dapat tumbuh sangat cepat dan dapat mendominasi area

dengan cepat pula. Karena kemampuannya yang dapat mendominasi area dengan cepat ini juga disebabkan oleh produksi bijinya yang sangat banyak.

4. Kandungan Kimia Tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata*L.)

Dalam penelitian terdahulu ada beberapa kandungan senyawa fitokimia dari daun botto-botto (*Chromolaena odorata*L.) diantaranya Flavonoid, Tanin, dan Terpenoid. Pada penelitian lain menggunakan sampel ekstrak etanol daun botto-botto (*Chromolaena odorata*L.) mengandung senyawa utama yaitu senyawa tannin, flavonoid, saponin, triterpene, dan steroid. (Ekayani et al. 2021)

5. Manfaat Tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata* L)

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas dengan banyak tanaman obat. Namun daun kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.) merupakan tumbuhan perdu yang berasal dari Amerika dan tersebar di Indonesia, Afrika, dan Pasifik. Daun kirinyuh merupakan tanaman obat yang mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid. Berbagai manfaat farmakologi antara lain antiinflamasi, antimikroba, antioksidan, antidislipidemia, agen hematologi, antidiabetes dan antikatarak, analgesik dan antipiretik, penyembuhan luka, antimalaria, pembasmi larva nyamuk, antihiperkolesterolemia dan antijamur. Dari hasil penelitian ini dapat diperkirakan bahwa Kirinyuh (*C. odorata* L.) memiliki potensi yang cukup sebagai bahan baku obat. (Harfiani dkk., 2022)

B. Ulkus peptikum

1. Pengertian ulkus peptikum

Tukak peptik mengacu pada gangguan gastrointestinal atas yang membutuhkan asam dan pepsin untuk pembentukannya. Penyebab penyakit ini

adalah infeksi *Helicobacter pylori*, penggunaan obat NSAID dan kerusakan mukosa yang berhubungan dengan stress. Infeksi dari bakteri *Helicobacter pylori* merupakan penyebab utama dari penyakit tukak peptik, selain itu efek samping dari penggunaan obat-obatan seperti NSAID bisa ditandai dengan gejala perut terasa perih, mual dan muntah (DiPiro J.T. dkk. 2020)

2. Etiologi ulkus peptikum

Infeksi *Helicobacter pylori* dan penggunaan NSAID adalah faktor risiko PUD (penyakit ulkus peptikum) yang paling umum. Faktor yang kurang umum termasuk ZES (sindrom Zollinger-Ellison) dengan hipersekresi asam juga dapat berperan. Gangguan pada pertahanan dan penyembuhan mukosa normal. Mekanisme ini memungkinkan asam dan pepsin mencapai epitel lambung. Tukak lambung jinak, erosif, dan maag dapat terjadi di bagian mana saja di lambung, meskipun antrum dan kurvatura minor merupakan lokasi yang paling umum. Kebanyakan tukak duodenum terjadi pada bagian pertama duodenum (boham duodenum). (DiPiro J.T. dkk. 2020)

a. *Helicobacter pylori*

Helicobacter pylori adalah bakteri gram negatif berbentuk spiral, mikroaerofilik, dengan flagella memiliki aktivitas urease, katalase, dan oksidase. Faktor-faktor ini memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup di lingkungan asam lambung. Bakteri urease mengubah urea menjadi amonia yang menetralkan asam lambung, sehingga membuat lingkungan mikro menjadi basa. Aktivitas katalase memungkinkan bakteri bertahan hidup secara reaktif oksidasi oleh fagosit yang berusaha membunuh organisme, namun hasilnya peradangan merusak lapisan

epitel lambung sehingga memungkinkan *Helicobacter pylori* berkembang. Flagela bakteri memfasilitasi infeksi awal dan memungkinkan kolonisasi pada mukosa lambung. *Helicobacter pylori* terutama ditularkan melalui jalur orang ke orang melalui kontak gastro-oral (muntah) atau fecal-oral (diare). Faktor risiko untuk tertular *Helicobacter pylori* meliputi kontak dekat dalam rumah tangga, sosial ekonomi rendah status, dan negara asal.

Infeksi *Helicobacter pylori* dapat menyebabkan maag akut dan kronis pada orang yang terinfeksi individu dan dikaitkan dengan beberapa komplikasi GI. PUD, limfoma jaringan limfoid terkait mukosa (MALT), dan kanker lambung semuanya telah dikaitkan dengan infeksi *H. pylori*. Sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun, namun 10% hingga 20% akan mengembangkan PUD selama hidup mereka dan sekitar 1% akan mengembangkan kanker lambung. Faktor lingkungan, tuan rumah genetika, dan faktor virulensi strain *Helicobacter pylori* memainkan peran penting dalam patogenesis PUD dan kanker lambung. Infeksi *Helicobacter pylori* meningkatkan risiko perdarahan GI dan tukak lambung sebanyak tiga hingga tujuh kali lipat. Tidak ada hubungan spesifik yang ditemukan antara *Helicobacter pylori* dan dispepsia, dispepsia nonulcer (NUD), atau penyakit refluks gastroesofageal (GERD). Namun, beberapa pasien dengan dispepsia dan NUD mungkin mengalami perbaikan gejala dari *Helicobacter pylori* pemberantasan. Sebaliknya, pemberantasan *Helicobacter pylori* dapat memperburuk gejala GERD pada beberapa pasien, namun pemberantasan harus diusahakan karena penyakit maag yang diketahui risiko kanker. *Helicobacter pylori* juga dikaitkan dengan anemia

defisiensi besi manfaat pemberantasan masih belum diketahui.

b. Obat Anti Inflamasi Nonsteroid

NSAID yang diresepkan dan tidak diresepkan, banyak digunakan di Amerika Serikat, dan telah dikaitkan dengan PUD. Ada banyak bukti menghubungkan penggunaan NSAID kronis (termasuk aspirin dosis rendah) dengan cedera saluran pencernaan bagian atas, PUD, gastritis, dan erosi superfisial. Pada individu yang rentan, NSAID menyebabkan kerusakan mukosa superfisial berupa petechiae (perdarahan intramukosa) dalam beberapa menit setelah konsumsi, dan berkembang menjadi erosi dengan penggunaan berkelanjutan. Lesi ini biasanya sembuh dalam beberapa hari dan jarang menimbulkan gejala tukak atau perdarahan saluran cerna bagian atas akut. Ulkus akibat NSAID lebih jarang terjadi di kerongkongan, usus kecil, dan usus besar. Mekanisme penggunaan NSAID kerusakan pada saluran cerna bagian bawah tidak jelas, namun enteropati berhubungan dengan hal ini perdarahan GI bagian bawah. Ulkus NSAID dan komplikasi terkait bergantung pada dosis, durasi penggunaan, dan jenis NSAID. Meskipun dosis itu penting, dosis rendah NSAID tanpa resep dan aspirin dosis rendah kardioprotektif (81-325 mg/hari) meningkatkan risiko pembentukan tukak. Faktor-faktor seperti potensi NSAID, durasi efek yang lebih lama, dan kecenderungan yang lebih besar untuk menghambat isoenzim siklooksigenase-1 (COX-1) dibandingkan siklooksigenase-2 (COX-2) dikaitkan dengan peningkatan resiko. Dispepsia terkait NSAID juga bisa menyebabkan hal tersebut tidak berkorelasi langsung dengan cedera mukosa atau kejadian klinis. Namun, dispepsia yang baru timbul, perubahan keparahan, atau dispepsia tidak dapat

diatasi dengan obat antiulkus. obat-obatan mungkin menunjukkan adanya maag atau komplikasi maag. Nonasetilasi salisilat (misalnya salsalate) mungkin berhubungan dengan penurunan toksisitas GI. Aspirin yang dibuffer atau dilapisi enterik tidak memberikan perlindungan tambahan terhadap kejadian GI bagian atas. Risiko komplikasi ulkus NSAID dan GI meningkat dengan penggunaan beberapa NSAID atau penggunaan aspirin dosis rendah secara bersamaan, oral bifosfonat, kortikosteroid, antikoagulan, obat antiplatelet, dan selektif inhibitor reuptake serotonin. Risiko komplikasi GI terkait maag lebih besar bila NSAID atau inhibitor COX-2 diberikan bersamaan dengan aspirin dosis rendah dibandingkan bila salah satu obat tersebut dikonsumsi sendiri. NSAID juga dapat mengurangi efek antiplatelet aspirin, meskipun NSAID bervariasi dalam pengaruhnya terhadap fungsi trombosit. Kortikosteroid, bila digunakan sendiri, tidak meningkatkan risiko tukak atau komplikasi, namun risiko relatifnya meningkat dua kali lipat pada pengguna kortikosteroid yang juga menggunakan NSAID secara bersamaan. Risiko relatif perdarahan GI meningkat hingga 20 kali lipat ketika NSAID dikonsumsi bersamaan dengan antikoagulan (misalnya warfarin) dan hingga enam kali lipat dengan penggunaan simultan inhibitor reuptake serotonin. Pemberian bersama clopidogrel dalam kombinasi dengan aspirin, NSAID, atau antikoagulan secara signifikan meningkatkan risiko perdarahan GI dibandingkan dengan salah satu obat yang dikonsumsi sendiri. Bahkan bila diresepkan sebagai monoterapi, clopidogrel meningkatkan risiko perdarahan ulang pada pasien dengan riwayat tukak berdarah. Prasugrel dan ticagrelor memiliki penghambatan trombosit yang lebih kuat dibandingkan

clopidogrel berhubungan dengan risiko perdarahan yang lebih besar. *Helicobacter pylori* dan NSAID bertindak secara independen untuk meningkatkan risiko maag dan perdarahan terkait maag dan tampaknya memiliki efek tambahan. Dengan demikian, angka kejadian tukak lambung lebih tinggi pada pengguna NSAID *H. pylori*-positif.

c. Merokok

Merokok telah dikaitkan dengan PUD, namun tidak diketahui secara pasti apakah merokok menyebabkan tukak lambung. Prevalensi penyakit maag hampir dua kali lipat pada perokok aktif dan mantan perokok (11,4% dan 11,5%) dibandingkan pada mereka yang tidak pernah merokok (6%). Risiko tukak lambung paling besar terjadi pada perokok dengan penggunaan sehari-hari yang banyak, namun risiko tukak lambung kecil bila kurang dari 10 batang rokok yang dihisap per hari. Merokok mengganggu penyembuhan maag, mempercepat kekambuhan maag, dan meningkatkan risiko maag. Namun, mekanisme yang mendasari efek buruk merokok masih belum jelas. Mekanisme yang mungkin terjadi adalah iskemia mukosa, penghambatan sekresi bikarbonat pankreas, dan peningkatan asam lambung dan sekresi mukosa, namun efek ini tidak konsisten.

d. Stres psikososial

Stress psikososial dapat mempengaruhi patogenesis PUD, namun sulit untuk menentukan apakah paparan stres tersebut pernah terjadi sebelumnya perkembangan ulkus. Pengamatan klinis menunjukkan bahwa pasien maag memang demikian terkena dampak buruk dari peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Namun, hasil dari uji coba terkontrol bertentangan dan gagal

mendokumentasikan hubungan sebab-akibat. Stres emosional dapat menyebabkan risiko perilaku seperti merokok dan penggunaan NSAID atau mengubah respon inflamasi atau resistensi terhadap infeksi *H. pylori*. Peran stres dan pengaruhnya terhadap PUD sangatlah kompleks dan mungkin terjadi multifaktorial.

e. Faktor Makanan

Pengaruh pola makan dan nutrisi terhadap patofisiologi PUD masih belum pasti. Minuman berkarbonasi, kopi, teh, bir, susu, dan rempah-rempah sering menyebabkan dispepsia, namun tampaknya tidak meningkatkan risiko PUD. Intervensi diet seperti diet hambar atau terbatas tidak mengubah frekuensi kekambuhan maag. Meskipun kafein adalah stimulan asam lambung, konstituen dalam kopi tanpa kafein atau teh, minuman berkarbonasi bebas kafein, bir, dan anggur juga dapat meningkatkan sekresi asam lambung. Dalam konsentrasi tinggi, konsumsi alkohol dikaitkan dengan kerusakan mukosa lambung akut dan perdarahan saluran cerna bagian atas; Namun, tidak ada cukup bukti untuk memastikan bahwa alkohol menyebabkan maag.

3. Patofisiologi ulkus peptikum

Patofisiologi tukak lambung dan duodenum ditentukan oleh faktor keseimbangan antara agresif (asam lambung dan pepsin) dan protektif (pertahanan mukosa dan perbaikan). Asam lambung disekresi oleh sel parietal yang mengandung reseptor histamin, gastrin, dan asetilkolin. Asam (serta infeksi *Helicobacter pylori* dan penggunaan NSAID) merupakan faktor independen yang berkontribusi terhadap gangguan integritas mukosa. Sekresi asam meningkat pada pasien dengan tukak duodenum dan mungkin akibat infeksi *H. pylori*. sebaliknya,

Pasien dengan tukak lambung biasanya memiliki tingkat sekresi asam yang normal atau berkurang (hipoklorhidria).

Jumlah asam yang disekresikan pada kondisi basal atau puasa disebut sebagai keluaran asam basal (BAO); setelah stimulasi maksimal, keluaran asam maksimal (MAO). Sekresi asam basal dan maksimal bervariasi menurut waktu dan hari keadaan psikologis individu, usia, jenis kelamin, dan status kesehatan. BAO mengikuti ritme sirkadian, dengan sekresi asam tertinggi terjadi pada malam hari dan terendah pada pagi hari. Peningkatan rasio BAO:MAO menunjukkan keadaan hipersekresi basal seperti ZES.

Pepsin adalah kofaktor enzim penting dalam aktivitas proteolitik yang terlibat dalam pembentukan ulkus. Pepsinogen, prekursor pepsin yang tidak aktif, disekresikan oleh sel utama di fundus lambung. Aktivitas pepsin ditentukan oleh pH karena diaktifkan oleh pH asam (pH optimal 1,8-3,5), dinonaktifkan secara reversibel pada pH 4, dan hancur secara permanen pada pH 7.

Sekresi lendir dan bikarbonat, pertahanan sel epitel intrinsik, dan aliran darah mukosa melindungi mukosa gastroduodenal dari berbahaya zat endogen dan eksogen. Sifatnya kental dan pH mendekati netral penghalang mukus-bikarbonat melindungi lambung dari kandungan asam di dalamnya lumen lambung. Perbaikan mukosa setelah cedera berhubungan dengan sel epitel pemulihan, pertumbuhan, dan regenerasi. Produksi prostaglandin endogen (PG) memfasilitasi integritas dan perbaikan mukosa. Istilah sitoproteksi adalah sering digunakan untuk menggambarkan proses ini, tetapi pertahanan mukosa dan perlindungan mukosa adalah istilah yang lebih akurat, karena PG mencegah cedera mukosa

yang dalam dan tidak dangkal kerusakan pada sel individu. Hiperemia lambung dan peningkatan sintesis PG mencirikan sitoproteksi adaptif, adaptasi jangka pendek sel mukosa hingga iritasi topikal ringan yang memungkinkan perut pada awalnya menahan efek iritasi yang merusak. Perubahan pertahanan mukosa yang disebabkan oleh *Helicobacter pylori* atau NSAID merupakan kofaktor terpenting dalam pembentukan tukak lambung. (DiPiro J.T. dkk. 2020)

4. Gejala Ulkus peptikum

- a. Sakit perut bagian atas merupakan gejala yang paling umum dan terjadi pada hampir 80% pasien dengan PUD.
- b. Mual, cepat kenyang, nyeri kuadran kanan atas, nyeri kuadran kiri atas, dan punggung rasa sakit juga telah dilaporkan.
- c. Nyeri klasik tukak duodenum adalah nyeri yang terjadi beberapa jam setelahnya makanan dicerna ketika asam disekresikan tanpa buffer makanan.
- d. pasien mungkin juga mengalami hal tersebut tidak menunjukkan gejala dan mungkin mengalami pendarahan atau perforasi sebagai gejala pertama yang muncul (DiPiro J.T. dkk. 2020)

C. Ekstraksi

1. Pengertian ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi ketetapan.

Ekstraksi merupakan suatu metode pemisahan bahan atau kandungan kimia dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2. Jenis-jenis ekstraksi

Beberapa jenis ekstraksi bahan alam yang sering digunakan yaitu ekstraksi secara dingin dan panas. Ekstraksi secara dingin dilakukan dengan cara soxhletasi, maserasi, dan perkolasi. Sedangkan untuk ekstraksi secara panas dapat dilakukan antara lain dengan cara infudasi, refluks, dan destilasi uap air.

a. Ekstraksi secara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang (kamar) (Depkes RI, 2000). Proses ekstraksi ini dilakukan dengan cara merendam sampel pada suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai, sehingga dapat melarutkan analit dalam sampel. Proses perendaman biasanya dilakukan selama 3-5 hari sambil diaduk sesekali agar mempercepat proses pelarutan dari analit. Indikasi bahwa semua analit telah terekstrak secara sempurna yaitu ketika pelarut yang digunakan tidak berwarna (Leba, 2017).

Kelebihan dari metode ekstraksi maserasi adalah alat dan cara yang digunakan pada proses ekstraksi sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan dengan pemanasan maupun yang tidak tahan terhadap

pemanasan. Sedangkan untuk kelemahan dari metode ekstraksi ini adalah membutuhkan banyak pelarut (Leba, 2017).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan (Depkes RI, 2000). Pola penambahan pelarut yang dilakukan adalah dengan menggunakan pola peneteskan pelarut dari bejana terpisah disesuaikan dengan jumlah pelarut yang dikeluarkan atau dilakukan dengan penambahan pelarut dalam jumlah besar secara berkala (Leba, 2017). Proses ekstraksi dilakukan hingga analit dalam sampel terekstraksi secara sempurna. Indikasi bahwa seluruh analit telah terekstraksi secara sempurna adalah pelarut yang digunakan tidak berwarna (Leba, 2017).

b. Ekstraksi Secara Panas

1) Infudasi

Infudasi meruakan proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati, yang dapat dilakukan dengan cara membasahi menggunakan air. Biasanya dua kali bobot bahan, kemudian ditambah dengan air secukupnya dan dipanaskan dalam tangas air selama 15 menit dengan suhu 90 – 980 C, sambil sekali-kali diaduk. Untuk mencukupi kekurangan air, dapat ditambahkan melalui ampasnya. Umumnya 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan.

2) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna

(Depkes RI, 2000). Kelebihan dari metode ini adalah padatan yang bertekstur kasar dan tahan terhadap pemanasan langsung dapat diekstraksi dengan menggunakan metode ini. Sedangkan untuk kelemahan dari metode ini adalah membutuhkan banyak pelarut pada proses ekstraksi (Febryanto 2017)

3. Destilasi Uap Air

Ekstraksi secara destilasi uap merupakan ekstraksi yang dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang mengandung komponen yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan normal. Pada pemanasan biasa memungkinkan terjadi kerusakan zat aktif. Untuk mencegah kerusakan tersebut maka penyarian dilakukan dengan destilasi uap air air.

D. Antibakteri

Antibakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu Anti yang berarti “melawan” dan Bacteria yang berarti tongkat. Karena bakteri pertama kali ditemukan berbentuk seperti batang (Aulia Deby Pelu, 2022). Zat antibakteri digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Antibakteri adalah metabolit sekunder yang terdapat pada makhluk hidup. Zat antibakteri seringkali bekerja dengan cara mengganggu dinding sel, mengubah permeabilitas membran, mencegah sintesis protein, dan berpotensi menghambat aktivitas enzim. Alkaloid, flavonoid, dan fenol adalah beberapa zat yang berkontribusi terhadap kerusakan dinding sel bakteri atau penghambatan bakteri. Zat ini dapat berfungsi sebagai agen antibakteri organik melawan mikroorganisme berbahaya seperti *Staphylococcus aureus* (Septiani, dkk, 2017). Pada dasarnya banyak metode yang dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas antibakteri suatu senyawa obat.

1. Metode Difusi

Metode ini merupakan salah satu metode dari uji aktivitas antibakteri yang sering digunakan. Dibandingkan dengan pendekatan lain, metode ini merupakan salah satu yang paling sering digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri. Dengan menempatkan piring yang mengandung agen antimikroba di atas media agar yang telah diisi dengan bakteri, pendekatan ini memungkinkan agen antimikroba meresap ke dalam media agar. Daerah bening dapat digunakan sebagai indikator bahwa perlakuan antimikroba telah menghambat perkembangan bakteri pada permukaan media agar. Diameter zona hambat pertumbuhan bakteri akibat difusi obat pada titik awal pemberian ke daerah difusi merupakan metode difusi observasi.

a. Metode Difusi Cakram

Piringan yang berisi agen antibakteri kemudian diletakkan pada media agar yang sebelumnya telah ditanami bakteri sehingga antibakteri dapat berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan bakteri oleh agen antibakteri pada permukaan media agar tersebut. Metode difusi ini dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan kertas samir (cakram) atau disk lalu dilihat hasil diameter hambatnya. Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai kekuatan inhibisi obat melawan bakteri yang diuji.

b. Metode E-Test (Epsilometer test)

Metode ini merupakan metode gabungan antara metode difusi dan metode dilusi. Metode ini digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat Minimum

(KHM) yang merupakan konsentrasi minimal suatu agen antibakteri untuk dapat menjadi penghambat pertumbuhan bakteri. Metode ini menggunakan strip plastik yang mengandung agen antibakteri dari kadar terendah sampai dengan kadar tertinggi dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya.

c. Ditch-Plate Technique

Metode ini menggunakan sampel uji berupa agen antibakteri. Dalam teknik ini, sampel uji berupa agen antibakteri digunakan. Itu ditempatkan di parit yang dibuat dengan mengiris media agar secara longitudinal dalam cawan petri, dan bakteri uji (menggunakan maksimal 6 jenis bakteri uji) digoreskan ke arah parit yang mengandung agen antibakteri.

c. Cup-Plate Technique

Metode ini sama dengan metode disk diffusion dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami oleh mikroorganisme dan pada media agar tersebut diberi agen antibakteri yang akan dilakukan pengujiannya.

2. Metode Dilusi

Metode dilusi adalah salah satu metode aktivitas antibakteri yang digunakan untuk mengetahui potensi suatu senyawa terhadap aktivitas antimikroba dengan menentukan Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) (Fatisa, 2013).

Metode dilusi menggunakan prinsip pengenceran antibakteri sehingga dapat diperoleh beberapa konsentrasi yang ditambah suspensi bakteri dalam media. Metode pengenceran memanfaatkan prinsip pengenceran antibakteri untuk

menghasilkan beberapa konsentrasi yang ditambahkan pada media yang mengandung suspensi bakteri. Ada atau tidak adanya pertumbuhan bakteri adalah pendekatan yang diamati; jika ada pertumbuhan bakteri, tingkat kesuburan pertumbuhan itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah koloni. Menghitung jumlah koloni yang diperlukan untuk menghentikan pertumbuhan atau membasmi bakteri yang diuji adalah tujuannya (Indra Lesmana And Afidatul Maudifah, 2020).

E. Bakteri

Kata bakteri berasal dari bahasa latin yaitu “bacterium” yang merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri adalah kelompok organisme mikroskopis yang pada umumnya bersel tunggal, dan tidak memiliki membran inti sel (Febriza, dkk, 2021). Bakteri biasanya berukuran beberapa mikrometer panjangnya dan mungkin berbentuk bulat, berbentuk batang, atau berbentuk spiral. Bakteri tersebut dapat tumbuh subur di tanah, air, mata air panas yang bersifat asam, limbah radioaktif, dan biosfer kerak bumi. Selain itu, bakteri dapat hidup berdampingan secara parasit dan bersimbiosis dengan tumbuhan dan hewan. Hanya sekitar 27 persen spesies bakteri yang memiliki spesies yang dapat diproduksi di laboratorium, sedangkan sebagian besar bakteri belum dikarakterisasi.

Struktur sel bakteri sangat sederhana, artinya tidak memiliki inti sel atau nukleus, badan sel, dan organel-organel lainnya seperti mitokondria dan kloroplas. Kita dapat menemukan bakteri hampir di semua tempat seperti air, udara, tanah, dan dalam simbiosis dengan organisme lainnya serta sebagai agen patogen atau


parasit, bahkan bakteri juga dapat kita temukan di dalam tubuh manusia. Pada umumnya ukuran bakteri adalah $0,5-5 \mu\text{m}$. Namun ada beberapa bakteri tertentu yang dapat mencapai ukuran hingga $700 \mu\text{m}$ yakni Thiomagrita yang secara normal bakteri jenis ini mempunyai dinding sel, seperti sel pada tumbuhan dan jamur akan tetapi bahan pembentuknya berbeda atau peptidoglikan. Beberapa jenis bakteri mampu bergerak atau motil pergerakannya ini karena bakteri memiliki flagel (Effendi, 2020).

1. Ciri- Ciri Bakteri

- a. Uniseluler (bersel tunggal), prokariotik (tidak mempunyai membran inti)
- b. Ukurannya sangat kecil, lebar $0,5 - 1,0$ milimikron, tetapi ada bakteri yang berukuran 100 mikron
- c. Hidupnya ada yang soliter (hidup secara sendiri-sendiri) dan ada juga bakteri yang hidup secara koloni (berkelompok) serta ada juga bakteri yang bersimbiosis, parasit, dan saprofit.
- d. Bakteri pada umumnya tidak mempunyai kloroplas, kecuali bakterioklorofil dan bakteriopurpurin.
- e. Bakteri berkembang biak secara vegetatif dengan pembelahan biner dan generatif dengan konjugasi, transformasi, dan transduksi.
- f. Bakteri hidupnya kosmopolit, artinya bakteri dapat hidup dan ditemukan dimana saja. Akan tetapi dalam kondisi ekstrim bakteri dapat membentuk endospora. Pembentukan endospora dimulai ketika sel mulai mereplikasi DNA dan satu salinan DNANYA dikelilingi oleh

dinding sel yang tebal dan kuat. Akhirnya, dinding sebelah luar rusak, tetapi endospora bakteri dapat bertahan hidup melewati segala jenis yang meliputi kekurangan makanan dan air. Panas atau dingin yang ekstrim, dan kebanyakan racun. Ketika lingkungan telah berubah menjadi normal maka endosporanya akan kembali mengalami hidrasi dan hidup kembali secara vegetatif untuk membentuk koloni (Susilowarno and Hartono 2007).

2. Struktur Tubuh Bakteri



Gambar 2. Struktur tubuh bakteri (Fifendy M 2017)

Setiap bagian tubuh pada bakteri memiliki fungsi masing-masing tiap bagian.

a. Flagela atau bulu cambuk

Flagela bakteri tersusun atas protein kontraktil sehingga dapat berkontraksi menyebabkan pergerakan ke kiri dan ke kanan sehingga bakteri dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 50 mm /detik atau sekitar seratus kali panjang tubuh perdetik. Flagella pada bakteri berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri.

b. Pilus atau fimbria

Bagian menonjol dari bakteri, yang muncul sebagai benang-benang kecil yang muncul dari dinding sel yang terbuat dari protein kontraktil, berfungsi sebagai mekanisme perlekatan pada bakteri lain dan juga pada organisme lain (sel inang).

c. Kapsula

Lapisan lendir yang mengelilingi sel dan merupakan kapsul, yang merupakan komponen dari bakteri, dibuat sebagai hasil dari sekresi metabolik. Bakteri ini memiliki kapsul yang berfungsi untuk terhubung ke substrat dan dapat memberikan perlindungan ekstra, termasuk meningkatkan ketahanan terhadap mekanisme pertahanan inang. Kapsul juga berfungsi sebagai pendiri koloni.

d. Dinding sel

Lapisan tubuh dinding sel terdiri dari peptidoglikan, juga dikenal sebagai murein, protein yang melekat pada rantai polimer polisakarida. Untuk bertindak sebagai bentuk sel pelindung, memberikan keamanan mekanis, dan mencegah sel pecah di lingkungan hipertonik yang lebih kental, dinding selnya tebal dan kaku.

e. Membran plasma

Molekul lipoprotein, yang terdiri dari molekul lipid (lemak) dan protein,

membentuk membran plasma bakteri, yang merupakan membran tipis. Dinding sel bakteri mengandung membran plasma. Membran plasma mengontrol pertukaran zat antara sel dan lingkungannya dan berfungsi sebagai organ pelindung sel terhadap dunia luar.

f. Mesosom

Mesosom merupakan struktur seperti membran yang membentuk lipatan yang ada di sitoplasma. Mesosom berfungsi sebagai tempat segregasi (pemisahan) DNA dan pembentukan dinding sel baru serta transpor intraseluler.

g. Sitoplasma

Cairan yang membentuk sel bakteri disebut sitoplasma. Komponen utama sel, sitoplasma, terdiri dari air dan zat organik dan anorganik. Pada bakteri, sitoplasma berfungsi baik sebagai lingkungan organel dan penghalang terhadap benturan.

h. Ribosom

Di dalam sitoplasma bakteri terdapat organel terapung yang disebut ribosom. Molekul protein dan RNA membentuk ribosom. Sintesis protein terjadi pada ribosom. Protein terstruktur, seperti membran sel, dan protein fungsional, seperti enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme, keduanya dapat diproduksi oleh ribosom.

i. Region nukleoid

Meskipun bakteri tidak memiliki nukleus sel asli, mereka memiliki area yang mirip: area nukleoid. Sitoplasma lebih padat berwarna daripada area nukleoid. Molekul DNA beruntai ganda dengan bentuk seperti cincin (melingkar)

dapat ditemukan di daerah nukleoid. DNA sel prokariotik biasanya seperseribu ukuran bakteri. Struktur seperti kromosom dari DNA beruntai ganda ini terlihat pada sel eukariotik. Untuk mengontrol aktivitas seluler agar sel bakteri bereproduksi, DNA bakteri melakukan peran ini.

j. DNA sirkuler

Meskipun bakteri tidak memiliki inti sel, mereka mengandung komponen yang disebut nukleoid. Hanya ada satu molekul DNA sirkular di dalam nukleoid.

Lembar fotosintetik

Lembaran fotosintetik adalah lipatan membran yang terjadi pada bakteri fotosintetik yang menghadap sitoplasma. Lembar fotosintesis bertindak sebagai katalis untuk fotosintesis.

k. Endospora

Beberapa bakteri ada yang mampu membentuk endospora. Pembentukan endospora adalah kemampuan beberapa bakteri. Bakteri dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan dengan memproduksi endospora. Endospora tidak akan rusak oleh pemanasan karena tahan panas. Ketika suhu naik di atas 120 °C, spora dapat mati. Namun, endospora dapat berkembang menjadi bakteri seperti sebelumnya jika keadaan atau habitat telah membaik (Susilowarno and Hartono 2007).

F. *Helicobacter pylori*

Helicobacter pylori adalah bakteri berbentuk spiral atau batang bengkok, bersifat gram negatif, dan hidup dalam lingkungan mikroaerofilik dalam lapisan mukosa, epitel, dan jaringan lambung. Infeksi *Helicobacter pylori* telah diketahui


sebagai penyebab utama penyakit peptic ulcer (tukak lambung dan duodenum).

Klasifikasi *Helicobacter pylori* adalah sebagai berikut:

Devisi : *Bacteria*
 Kelas : *Epsilon Pro bacteria*
 Bangsa : *Campylobacterialis*
 Suku : *Helicobacteraceae*
 Marga : *Helicobacter*
 Spesies : *Helicobacter pylori*

G. Antibiotika Pemanding

Antibiotik yang digunakan sebagai pemanding adalah **kloramfenikol**.



Gambar 3. Struktur kimia kloramfenikol
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020)

Kloramfenikol mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 103,0% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020)

Pemerian : Hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; Putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan; Larutan praktis netral terhadap lakmus P; stabil dalam larutan netral atau larutan agak asam. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020)

Kelarutan : Sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol, dalam propilen glikol, dalam aseton dan dalam etil asetat.


(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020)

Mekanisme aksi : kloramfenikol bekerja menghambat sintesis protein pada sel bakteri. Kloramfenikol akan berikatan secara reversibel dengan unit ribosom 50 S, sehingga mencegah ikatan antara asam amino dengan ribosom. Obat ini berikatan secara spesifik dengan akseptor (tempat ikatan awal dari amino asil t-RNA) atau pada bagian peptidil, yang merupakan tempat ikatan kritis untuk perpanjangan rantai peptida (Katzung, 2004).

Penggunaan klinik: kloramfenikol digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh *Salmonella*, *H. influenza*, dan bakteri anaerob termasuk yang disebabkan oleh *B. fragilis*. Kloramfenikol juga digunakan pada saat antibiotik tidak efektif untuk infeksi meningitis, rickettsia, dan infeksi gram negatif yang disebabkan oleh bakteremia (virus yang memakan bakteri). (Kester, dkk. 2007).

H. Perhitungan Zona Hambat

Zona hambat adalah daerah bening yang tampak di sekeliling perlakuan. zona hambat antibakteri diukur berdasarkan diameter dan penghambatnya berupa areal bening di sekeliling daerah pengujian berdasarkan metode yang digunakan seperti kertas cakram atau sumuran. Pengukuran diameter dihitung secara vertikal dan horizontal termasuk dengan diameter sumur uji, lalu dirata-ratakan. Penghitungan luas zona hambat sebagai berikut :



Gambar 4 . Rumus Perhitungan Diameter Zona Hambat (*Calculation formula of inhibition zone diameter*) .(Winastri dkk., 2020)

Adapun kategori zona hambat sebagai berikut (tabel 1) :

Tabel 1. Ketegori diameter zona hambat (*The category of inhibition zone diameter*) (Fachriyah dkk., 2020).

Diameter	Kekuatan Daya Hambat
≤ 5 mm	Lemah (<i>Weak</i>)
6–10 mm	Sedang (<i>Moderate</i>)
11–20 mm	Kuat (<i>Strong</i>)
≥ 21 mm	Sangat Kuat (<i>Very Strong</i>)

I. Tinjauan Islami

Keanekaragaman tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu digunakan sebagai bahan pangan maupun sebagai bahan pengobatan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT memiliki banyak manfaat sehingga dihamparkan dibumi dan dikelola oleh manusia sebagai khalifah di atas bumi ini. Hanya saja dalam pengelolaannya di butuhkan Ilmu pengetahuan, dengan itu, manusia sebagai khalifah dapat mengambil manfaat dari ciptaan Allah SWT. terutama dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pengobatan (Mukhriani 2014).

Berdasarkan hal tersebut, Allah berfirman dalam QS. Thaha/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
 بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.” (Kementerian Agama RI 2014).

Berkenan ayat diatas M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa yakni Allah SWT. “Yang telah menjadikan bagi kamu”, wahai Fir’aun dan seluruh manusia sebagian besar “bumi sebagai hamparan” dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, “Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air”, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, “maka kami tumbuhkan dengannya”, yakni dengan perantara hujan itu, “berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan (Shihab 2002).

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT. Menciptakan hamparan yang luas dengan macam tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain. Oleh sebab itu, pada penelitian yang akan dilakukan adalah memanfaatkan tumbuhan daun botto-

botto sebagai upaya pengobatan antibakteri pada penyakit yang terjangkit infeksi bakteri *Helicobacter pylori*. penelitian ini dapat terjadi dengan adanya izin Allah SWT.

Agar pemanfaatan tumbuhan dapat dilakukan sebagaimana mestinya, maka diperlukan penelitian ilmiah yang bersumber dari bacaan-bacaan yang memiliki validitas yang baik. Perintah Allah SWT. Dalam membaca dijelaskan dalam QS. Al-Alaq/96:1 :

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Terjemahnya :

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”
(Kementrian Agama RI 2014).

Kata *iqra'* berasal dari kata *qara'a* yang pada mulanya berarti menghimpun. Hal ini berarti pula menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri sesuatu, dan sebagainya yang bermuara pada arti menghimpun (Shihab 2009). Penggalan ayat ini merupakan salah satu dari banyak ayat yang senantiasa menyeru manusia untuk mendalami makna, menelaah, membaca, serta memahami yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dengan ayat ini dapat menjadi acuan dalam membaca terkait penelitian ilmiah tentang pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan penyakit.

Allah SWT menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya, sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Muslim bahwa telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah

mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir r.a. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim no.4084). (Al- Aini dkk, 1980)

Al-Nawawi dalam kitabnya Syarh al-Nawawi ‘ala Muslim menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan keutamaan berobat, itu menurut jumbuh ulama, al-Qhadi mengatakan bahwa hadis ini mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan agama, dunia, kesehatan, ilmu kedokteran, dan bolehnya berobat. Menurut hujjah para ulama bahwa Allah selaku penentu dan adapun pengobatan juga berasal dari ketentuan Allah SWT (An-Nawawi dkk, 1375).

Allah SWT. tidak memberikan penyakit kepada seseorang kecuali ia telah menentukan obatnya. Dalam hadist diatas menunjukkan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya sampai pada penyakit-penyakit yang mematikan,

karena segala sesuatu itu memiliki lawannya, lawan penyakit adalah berupa obat penawarnya.

Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa setiap penyakit yang diberikan Allah SWT ada anti penawarnya. Tetapi sering kali kita melihat orang berobat tetapi tidak kunjung sembuh dari sakitnya, ini biasanya dikarenakan ketidaktahuan terhadap hakikat obat yang sesuai dengan penyakitnya atau cara pengobatannya yang kurang seperti kelebihan dosis, sehingga efeknya lebih buruk, atau kurangnya dosis sehingga tidak bermanfaat, dan ini bukan berarti bahwa penyakit tersebut tidak ada penawarnya. Maka kita sebagai manusia hanya perlu berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mencari tahu segala cara untuk memperoleh kesembuhan dari suatu penyakit dengan salah satu cara mengelola atau memanfaatkan segala jenis kekayaan hayati yang ada di bumi seperti tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Sehingga kita sebagai manusia dapat melakukan berbagai penelitian tentang manfaat dari setiap tumbuhan yang telah Allah SWT limpahkan di muka bumi ini.

Dimana pada penelitian ini menggunakan tumbuhan daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) dengan memanfaatkan senyawa yang terkandung di dalam daunnya dimana diketahui daun botto-botto mengandung senyawa yang dapat digunakan sebagai antibakteri untuk menyembuhkan infeksi disebabkan oleh bakteri *Helicobacter pylori*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimen laboratorium. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu perlakuan terhadap objek penelitian. Penelitian Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui Uji aktivitas antibakteri ekstrak Daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) secara in vitro pada bakteri *Helicobacter pylori*

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April - September 2023

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan desain penelitian eksperimental dengan pendekatan *posttest-only kontrol grup design*. Uji aktivitas antibakteri dari ekstrak daun botto-botto dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan paper disk.

C. Sampel penelitian

Sampel pada penelitian ini yaitu daun botto-botto yang diambil dari kelurahan Romangpolong, kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Gelas kimia (*pyrex*®), Erlenmeyer (*pyrex*®), batang pengaduk, tabung reaksi (*pyrex*®), jarum ose, spatula, mikropipet (*memmert*®), bunsen, timbangan analitik (*kern*®), autoklaf (*hirayama*®), oven (*memmert*®), inkubator (*memmert*®), microwave, Laminar Air flow (LAF) (*esco*®), lemari pendingin, vial, dan vortex, spoit 20 cc (*onemed*®), jangka sorong (*kenmaster*®), bunsen, cawan petri, dan rotary evaporator.

2. Bahan

Akuades steril, daun botto-botto, etanol 70%, NaCl 0,9 %, paper disc kosong, cakram kloramfenikol, bakteri *Helicobacter pylori*, medium natrium agar, kapas, kertas saring, aluminium foil, dan plastik wrap.

E. Teknik Pengolahan

1. Pengambilan Sampel

Sampel diambil pada pagi hari lalu dilakukan pengolahan sampel. (Makin, dkk, 2022).

2. Pengolahan Sampel

Seluruh sampel daun botto-botto (*Chromolaena odorat* L.) yang telah diambil, dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air

mengalir. Sampel dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam lemari pengering, kemudian dilanjutkan dengan sortasi kering dan diblender hingga menjadi serbuk simplisia (Komala, dkk, 2021).

3. Ekstraksi Sampel

Daun botto'-botto' (*Choromolaena odorata* L.) yang sudah kering di timbang sebanyak 300 g lalu dimasukan kedalam wadah maserasi, direndam dengan 3 liter etanol 70% hingga seluruh simplisia terbasahi dan ditambahkan kembali etanol hingga batas pelarut kira-kira 2 cm di atas simplisia. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam ditempat terlindung dari sinar matahari sambil diaduk sekali-sekali. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya. kemudian ekstrak diuapkan pelarutnya dengan menggunakan rotavapor hingga pekat (Handayani, dkk, 2018). Ekstrak kental yang diperoleh kemudian di *freeze dryer* guna menghilangkan kadar air dari ekstrak. (Reubun, dkk. 2020)

Hasil ekstrak (rendemen) yang didapatkan dihitung menggunakan rumus:

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Bobot ekstrak kental}}{\text{Bobot serbuk kering yang diekstrak}} \times 100\%$$

4. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak

Cara pembuatan variasi konsentrasi ekstrak daun botto-botto adalah dengan mencampurkan ekstrak kering hasil maserasi dan akuades steril. Perbandingan volume ekstrak dan volume akuades dapa dilihat pada (tabel 2).

Tabel 2. Perbandingan jumlah ekstrak (g) dan volume akuades steril

Konsentrasi (%)	Jumlah ekstrak (g)	Volume akuades (ml)
80%	4 g	5 ml
60%	3 g	5 ml
40%	2 g	5 ml
20%	1 g	5 ml

5. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang digunakan dicuci dengan sabun, dibilas dengan air sampai bersih, dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Alat gelas disterilkan menggunakan oven pada suhu 180° C selama 2 jam. Ose dan pinset disterilkan dengan pemijaran di atas api spritus, sedangkan alat-alat yang terbuat dari karet, plastik dan medium yang tidak tahan pemanasan disterilkan dalam atouklaf pada suhu 121 °C selama 15 menit. (Lay, 1994)

6. Pembuatan Media Nutrient Agar

Sebanyak 5 gram nutrient agar dilarutkan dengan 250 mL akuades dalam erlemeyer dan dipanaskan diatas hot plate menggunakan batang pengaduk sampai terbentuk larutan jernih. Kemudian disterilkan didalam autoklaf pada suhu 121°C tekanan 2 atm selama 15 menit. Nutrient agar kemudian dimasukkan ke dalam beberapa tabung cawan petri. Dibiarkan agar menjadi dingin dan keras. (Fajrina dkk., 2018)

7. Pembuatan larutan standar Mc Farland

Pembuatan Larutan BaCl_2 1 %. Ditimbang dengan teliti BaCl_2 sebanyak 1 gram. Dilarutkan kedalam labu ukur 100 ml dengan akuades sampai tanda batas lalu homogenkan. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat dan gelap.

Pembuatan Larutan H_2SO_4 1 %. Disiapkan labu ukur 100 ml yang sudah diisi akuades sebanyak ± 50 ml. Dipipet dengan hati-hati asam sulfat pekat sebanyak 1,02 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml melalui dinding secara mengalir. Keluarkan cairan sampai habis. Paskan larutan dengan akuades sampai tanda batas. Pindahkan larutan ke dalam botol reagent yang bertutup rapat.

Pembuatan Larutan McFarland 0,5. Dipipet larutan BaCl_2 1 % sebanyak 0,05 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Kemudian dipipet juga larutan H_2SO_4 1 % sebanyak 9,95 ml. Dicampurkan kedalam tabung reaksi tutup ulir yang sudah berisi larutan BaCl_2 1 %. larutan ini di vortex sampai tercampur sempurna. (Rosmania and Yanti 2020)

8. Inokulasi bakteri

bakteri *Helicobacter pylori* inokulasi dengan menggunakan media *Natrium Agar* dengan cara medium dituang kedalam cawan petri. Setelah medium memadat, diambil 1 ose isolat bakteri kemudian dilakukan teknik penggoresan (*streak plate*) lalu inkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. (Fajrina dkk., 2018)

9. Pembuatan Suspensi Bakteri

Bakteri *Helicobacter pylori* yang telah diinokulasi kemudian di inkubasi selama 24 jam diambil dengan kawat ose steril lalu disuspensikan kedalam tabung reaksi yang berisi NaCl 0,9% kemudian di vortex dan disetarakan dengan standar kekeruhan larutan Mc. Farland 0,5 (Fajrina dkk., 2018)

10. Pengujian ekstrak daun botto-botto sebagai antibakteri dengan metode difusi agar *papper disc*

Sebanyak 15 mL nutrien agar (NA) dimasukkan kedalam cawan petri steril hingga memadat, kemudian ditambahkan suspensi bakteri 100 μ L. Kemudian dihomogenkan dengan cara mengoyang-goyangkan cawan petri yang berisi media tersebut. Paper disk steril direndam pada larutan uji ekstrak etanol 70% dengan konsentrasi 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml, dan 80% g/ml, kemudian ditempelkan ke permukaan agar. Sebagai kontrol negatif digunakan Akuades dan kontrol positif digunakan cakram kloramfenikol 30 mcg. Perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali. Kemudian cawan petri diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37°C. Aktivitas antibakteri ditetapkan dengan mengukur diameter daerah hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong (Fajrina dkk., 2018). Menurut Davis & Stout (1971) klasifikasi kekuatan daya hambat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu kategori sangat kuat diameter hambat ≥ 20 mm, kuat 10-20 mm, sedang 5-10 mm, dan lemah ≤ 5 mm.

11. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan sistem statistik SPSS menggunakan uji one way annova dan dilanjutkan Uji Tukey.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan sampel

Sampel daun botto-botto dilakukan ekstraksi sampel dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 3x24 jam. Selanjutnya dievaporasi untuk menguapkan pelarut yang terkandung dalam filtrat. Hasil ekstrak kental yang diperoleh dapat dilihat pada (tabel 3) :

Tabel 3. Hasil ekstraksi daun botto-botto

Berat Sampel	Berat Ekstrak	(%) Rendamen	Warna
300 g	49 g	16,3 %	Hijau

2. Uji aktivitas antibakteri

Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri

Konsentrasi	Rata-Rata \pm SD	Kategori (Davis & Stout, 1971)
DDB 80% g/ml	20 \pm 4.9	Kuat
DDB 60% g/ml	17.5 \pm 5.3	Kuat
DDB 40% g/ml	9.8 \pm 1.3	Sedang
DDB 20% g/ml	9.8 \pm 0.3	Sedang
K (+)	17 \pm 5.4	Kuat
K (-)	0	Tidak Menghambat


Keterangan :

- DDB 80 % = Daun botto-botto konsentrasi 80% g/ml
- DDB 60 % = Daun botto-botto konsentrasi 60% g/ml
- DDB 40 % = Daun botto-botto konsentrasi 40% g/ml
- DDB 20 % = Daun botto-botto konsentrasi 20% g/ml
- K (+) = Kontrol positif menggunakan Kloramfenikol
- K (-) = Kontrol negatif menggunakan Akuades

Pengujian antibakteri ekstrak daun botto-botto dengan tiga replikasi metode difusi agar *papper disc* dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada (tabel 4) :

3. Diagram aktivitas antibakteri

Berdasarkan data aktivitas antibakteri, terdapat diagram data aktivitas antibakteri untuk mengetahui pembacaan data berdasarkan besarnya konsentrasi. Diagram dapat dilihat pada (Gambar 5) :



Gambar 5. Diagram hasil uji aktivitas antibakteri

4. Uji analisis statistik

Uji analisis statistik uji one way annova digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai signifikansi sampel dalam memberikan zona hambat dan uji lanjutan dengan uji Tukey untuk melihat perbedaan pada masing-masing data zona hambat yang dihasilkan. Hasil analisis statistik dapat dilihat pada (tabel 5 dan 6) :

Tabel 5. Uji one way anova penghambatan bakteri *Helicobacter pylori*

ANOVA					
Data	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	815,569	5	163,114	11,803	,000
Within Groups	165,833	12	13,819		
Total	981,403	17			

Tabel 6. Uji tukey penghambatan bakteri *Helicobacter pylori*

Data			
Tukey HSD ^a			
Konsentrasi	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
Kontrol negatif	3	,000	
40%	3	9,833	9,833
20%	3	9,833	9,833
Kontrol positif	3		17,000
60%	3		17,500
80%	3		20,000
Sig.		,061	,051

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
a. Uses Harmonic Mean Sampel Size = 3,000.

B. Pembahasan

Senyawa antibakteri merupakan senyawa yang dapat mengganggu pertumbuhan atau metabolisme bakteri. Berdasarkan sifat toksisitasnya, antibakteri dapat bersifat membunuh bakteri (bakterisidal) dan menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik). Antibakteri bakteriostatik hanya menghambat pertumbuhan bakteri dan tidak mematikan, sedangkan bakterisidal dapat membunuh bakteri. Bakteriostatik dapat bersifat bakterisidal jika dalam konsentrasi yang tinggi. Mekanisme kerja antibakteri dapat melalui berbagai cara, di antaranya menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan

permeabilitas dinding sel, menghambat protein dinding sel, menghambat sintesis asam nukleat, dan menghambat metabolisme sel mikroba. Senyawa antimikroba yang berasal dari bahan alam yang berasal tumbuhan kini secara terus-menerus dikembangkan, dimana lebih dari 300 senyawa metabolit alam menunjukkan aktivitas mikroba dan sekitar 145 senyawa berpotensi sebagai antimikroba. (Septiani dkk., 2017)

Berdasarkan tinjauan islam tumbuhan memiliki berbagai macam manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan cara mengelola tumbuhan untuk dijadikan sebagai obat. Dimana pada penelitian ini memanfaatkan tumbuhan daun botto-botto sebagai obat agar menghindari terjadi kontaminasi bakteri. Yang telah dijelaskan dalam al quran dan hadis mengenai pemanfaatan tumbuhan. Dengan mengaitkan penelitian ini dengan q.s Thaha ayat 53.

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibakteri yakni daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional. Uji fitokimia menggambarkan akan golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak. Hasil uji fitokimia daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) mengandung golongan senyawa, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa fitokimia tersebut berpotensi sebagai antibakteri alami pada bakteri pathogen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Kurang and Penlaana.

Mekanisme saponin sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang

merupakan pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas membran sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. (Saptowo dkk., 2022)

Sementara flavonoid memiliki kemampuan mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel yang menyebabkan sel menjadi lisis. Mekanisme kerja flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri. Mekanisme kerjanya dengan cara mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi. (Rahmawati dkk., 2020)

Aktivitas tanin diduga dapat bekerja dengan mengadakan kompleks hidrofobik dengan protein, menginaktivasi enzim dan protein transport dinding sel, sehingga mengganggu pertumbuhan bakteri. Selain itu juga tannin dapat mengerutkan dinding sel sehingga mengganggu permeabilitas dinding sel akibatnya menghambat pertumbuhan bakteri atau bahkan mati (Rahmawati dkk., 2020)

Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebagai uji aktivitas antibakteri yakni ekstrak daun botto-botto. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Metode maserasi dipilih karena prosesnya sederhana, cukup efektif untuk menarik zat-zat yang diinginkan, pengerjaan tidak menggunakan alat khusus, dan tidak ada proses pemanasan sehingga kerusakan zat aktif akibat suhu yang tinggi dapat dihindari, seperti senyawa flavonoid yang tidak tahan terhadap pemanasan, dimana flavonoid akan mengalami degradasi

akibat proses pemanasan. Pelarut yang dipilih adalah etanol 70% dikarenakan sampel dalam bentuk kering tujuannya untuk mempermudah membuka pori-pori sampel (Verawati dkk., 2017) serta harga etanol murah, bersifat universal (mampu menarik senyawa polar dan non polar) serta relatif tidak toksik sehingga aman digunakan.

Proses maserasi dilakukan dengan merendam 300 g serbuk simplisia daun botto-botto dengan etanol 70% selama 3 hari sambil sesekali lakukan pengadukan. Setelah 3 hari perendaman, disaring dengan kertas saring untuk mendapatkan maseratnya. Kemudian ampasnya dimaserasi dengan cara yang sama. Proses ekstraksi dilakukan beberapa kali pengulangan sampai maserat transparan. Semua maserat dari proses maserasi digabungkan dan diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator dan dilanjutkan dengan waterbath hingga diperoleh ekstrak kental daun botto-botto. Selanjutnya dilakukan penentuan rendemen ekstrak dari 300 g serbuk daun botto-botto didapatkan ekstrak kental sebanyak 49 g dengan hasil perhitungan rendemen sebesar 16,3% menunjukkan bahwa rendemen dari ekstrak daun kirinyuh memenuhi persyaratan (Farmakope Herbal Indonesia, 2017) yaitu rendemen tidak kurang dari 12%.

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto (*chromolaena odorata* L.) terhadap *Helicobacter pylori* dilakukan dengan metode difusi agar menggunakan cakram disk sebanyak 3 kali pengulangan yang terdiri dari beberapa tahap pengujian yaitu, pembuatan media nutrient agar (NA), kultur bakteri, pembuatan Mc Farland, pembuatan suspensi bakteri, pembuatan seri konsentrasi ekstrak, dan pengujian antibakteri.

Selanjutnya pembuatan media NA dibuat dengan cara menimbang serbuk NA 5 gram kemudian dilarutkan dengan akuades 250 ml. media NA yang telah dibuat kemudian disterilisasi pada autoklaf suhu 121°C selama 15 menit.

Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori* dilakukan dengan menginokulasikan bakteri uji terlebih dahulu. Bakteri *Helicobacter pylori* diinokulasikan pada media NA (nutrient agar). NA merupakan media yang tidak selektif, oleh karena itu semua bakteri dapat tumbuh pada media ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Pelczar dan Chan (2008) yang menyatakan bahwa media NA mengandung nutrisi yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri. Semua bakteri membutuhkan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan dalam pertumbuhan organisme. Dengan media pertumbuhan dapat diperoleh isolat mikroorganisme menjadi kultur murni. Media NA banyak mengandung sumber Nitrogen sehingga media ini banyak digunakan dalam prosedur bakteriologi untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. (Putri and Kusdiyantini 2018). Bakteri *Helicobacter pylori* yang tumbuh pada media Na ditandai dengan bentuk sedang, bulat, halus dan akan tampak berwarna putih, setelah diinkubasi suhu 37°C selama 24 jam.

Tahap selanjutnya yakni pembuatan suspensi bakteri. Bakteri uji yang telah ditumbuhkan kemudian disuspensikan ke dalam natrium klorida (NaCl) 0,9% kemudian divortex. NaCl (larutan garam fisiologis yang terbuat dari garam NaCl dengan konsentrasi 0,9% b/v) berfungsi untuk menjaga keseimbangan ion sel mikroba sehingga baik untuk menjaga ketahanan

hidup bakteri Suspensi bakteri kemudian dibandingkan kekeruhannya dengan standar Mc Farland. Larutan standar Mc Farland digunakan sebagai standar kekeruhan dari bakteri suspensi sehingga suspensi bakteri akan berada dalam kisaran tertentu. Suspensi bakteri yang dibuat kemudian dibandingkan dengan kekeruhan larutan standar Mc Farland. Mc Farland 0,5 digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau diasumsikan setara dengan kekeruhan bakteri suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membakukan mikroba pengujian. (Rosmania and Yanti 2020)

Tahap selanjutnya yakni pembuatan suspensi bakteri. Bakteri uji yang telah ditumbuhkan kemudian disuspensikan ke dalam natrium klorida (NaCl) 0,9% kemudian divortex. NaCl (larutan garam fisiologis yang terbuat dari garam NaCl dengan konsentrasi 0,9% b/v) berfungsi untuk menjaga keseimbangan ion sel mikroba sehingga baik untuk menjaga ketahanan hidup bakteri Suspensi bakteri kemudian dibandingkan kekeruhannya dengan standar Mc Farland. Larutan standar Mc Farland digunakan sebagai standar kekeruhan dari bakteri suspensi sehingga suspensi bakteri akan berada dalam kisaran tertentu. Suspensi bakteri yang dibuat kemudian dibandingkan dengan kekeruhan larutan standar Mc Farland. Mc Farland 0,5 digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan atau diasumsikan setara dengan kekeruhan bakteri suspensi sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membakukan mikroba pengujian. (Rosmania and Yanti 2020)

Persiapan larutan uji ekstrak etanol 70% daun botto-botto dibuat sebanyak 5 mL dengan 4 konsentrasi yang berbeda yaitu 20% g/ml, 40% g/ml, 60% g/ml,

dan 80% g/ml. Pelarut yang digunakan adalah akuades karena dapat melarutkan senyawa polar serta tidak berpengaruh pada aktivitas antibakteri.

Pengujian dilakukan terhadap satu sampel yaitu ekstrak etanol 70% daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L) dengan menggunakan kontrol positif dan juga kontrol negatif sebagai pembanding terhadap sampel yang diuji. Kontrol negatif yang digunakan adalah akuades yang berfungsi untuk membantuk melarutkan ekstrak daun botto-botto. Tujuan dari penggunaan kontrol negatif adalah untuk melihat bahwa pelarut yang digunakan tidak berpengaruh pada aktivitas antibakteri melainkan murni dari senyawa aktif dari sampel uji tersebut yang ditandai dengan adanya diameter zona hambat. Sedangkan kontrol positif berfungsi untuk memastikan bahwa metode pada pengujian yang dilakukan sudah benar yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat. Adapun kontrol positif yang digunakan adalah cakram disk antibiotik kloramfenikol. Kloramfenikol ini efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, kloramfenikol merupakan antibiotik bakteristatik berspektrum luas yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein, mencegah perpanjangan rantai protein, dengan menghambat aktivitas transferase peptidil dari ribosom bakteri, menghambat pembentukan dinding serta permeabilitas membran sel bakteri. (Fajrina dkk., 2018). Kontrol positif terhadap bakteri *Helicobacter pylori* sebaiknya menggunakan antibiotik golongan quinolone (levofloxacin, moxifloxacin), tetracycline, rifabutin, clarithromycin, dan amoxicillin karena antibiotik diatas merupakan antibiotik yang digunakan pada eradikasi yang terkait infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Helicobacter pylori*, (Katelaris dkk., 1992).

Namun pemilihan kloramfenikol sebagai kontrol positif karena memiliki spektrum luas dengan mekanisme kerjanya menghambat sintesis protein.

Pada pengujian antibakteri, media NA steril kemudian dimasukkan kedalam cawan petri sebanyak 15 ml, lalu ditambahkan suspensi bakteri 100 µl kedalam cawan petri setelah media NA memadat, kemudian diratakan. Setelah itu cakram disk kosong direndam pada larutan uji yang telah dibuat lalu ditempelkan pada cawan petri menggunakan pinset steril, perlakuan yang sama dilakukan pada kontrol positif (kloramfenikol) dan kontrol negatif (akuades).

Hasil pengujian aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol 70% daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori* secara *triplo* yaitu pada konsentrasi 80% dengan hasil zona hambat 21,5 mm, 14,5 mm, 24 mm, memberikan zona hambat kuat (*strong*) dengan diameter rata-rata zona hambat 20 mm, sedangkan pada konsentrasi 60 % dengan hasil zona hambat 18 mm, 12 mm, 22,5 mm. mampu memberikan zona hambat dengan kategori kuat (*strong*) dengan diameter rata-rata zona hambat 17,5 mm, kemudian pada konsentrasi 40% dengan hasil zona hambat 11 mm, 10 mm, 8,5 mm, memberikan zona hambat dengan kategori sedang (*moderate*) dengan diameter rata-rata zona hambat 9,8 mm, seperti pada konsentrasi 20% dengan hasil zona hambat 10 mm, 10 mm, 9,5 mm, memberikan zona hambat dalam kategori sedang (*moderate*), dengan diameter rata-rata zona hambat 9,8 mm, sementara zona hambat kontrol positif kloramfenikol dengan hasil zona hambat 18,5 mm, 11 mm, 21,5 mm, mampu memberikan daya hambat dengan kategori kuat (*strong*) dengan diameter rata-rata 17. Pada kontrol negatif akuades tidak memberikan zona hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

Beberapa konsentrasi yang digunakan yakni konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80%, memiliki aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Dari konsentrasi yang paling rendah yakni 20% sudah dapat dilihat bahwa ekstrak etanol 70% daun botto-botto memiliki daya hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.

Pada konsentrasi 80% dengan hasil diameter rata-rata zona hambat 20 mm, lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi 60% dengan hasil diameter rata-rata 17,5 mm, hal menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan maka semakin tinggi daya penghambatan yang dihasilkan. Pada konsentrasi 40% memberikan zona hambat dengan diameter rata-rata 9,8 mm, dimana diameter rata-rata zona hambat yang dihasilkan sama dengan konsentrasi 20% dengan diameter rata-rata zona hambat 9,8 mm juga. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor paper disk yang tidak terendam sempurna dalam ekstrak. Pada penggunaan kloramfenikol sebagai kontrol positif dengan hasil diameter rata-rata zona hambat sebesar 17,5 mm, diketahui bahwa zona hambat kloramfenikol lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsentrasi 60%, akan tetapi jika dibandingkan dengan konsentrasi 80%, zona hambat yang dihasilkan kloramfenikol sebagai kontrol positif lebih rendah, hal ini mungkin disebabkan oleh penggunaan kontrol positif yang tidak spesifik pada bakteri *Helicobacter pylori*. Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa konsentrasi 80% ekstrak etanol 70% daun botto-botto yang memberikan zona hambat terkuat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*.


Pada tahap analisis statistik uji one way annova dengan menggunakan SPSS bahwa terlihat nilai signifikansi $p=0,000$ ($p <0,05$) hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata zona hambat pada antar konsentrasi ekstrak daun botto-botto terhadap bakteri *Helicobacter pylori*. Sehingga dilakukan uji lanjutan berupa uji Tukey untuk melihat konsentrasi yang berbeda.

Uji Tukey pada data zona hambat menunjukkan hasil $p=0,051$ ($p >0,05$) bahwa pada nilai zona hambat konsentrasi 80%, 60%, dan kontrol positif tidak signifikan dalam penghambatan bakteri *Helicobacter pylori*, konsentrasi 40% dan 20% menunjukkan hasil $p= 0,61$ ($p >0,05$) yang berarti tidak signifikan dalam penghambatan bakteri *Helicobacter pylori*, yang berarti bahwa beberapa konsentrasi yang digunakan beserta kontrol positif tidak signifikan dalam menghambat bakteri.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa ekstrak daun botto-botto dengan menggunakan pelarut etanol 70% dapat memberikan zona hambat terhadap bakteri *Helicobacter pylori*, hal ini mungkin dipengaruhi oleh golongan senyawa antibakteri yang ada pada ekstrak daun botto-botto sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh ekayani, menyatakan bahwa dalam penelitiannya metode yang digunakan dalam ekstraksi yakni metode maserasi menggunakan etanol 70% sebagai pelarut pada ekstraksi senyawa bioaktif. Dalam uji fitokimia yang dilakukan didapatkan hasil bahwa daun botto-botto (*Chromolaena odora* L) mengandung flavonoid, tanin dan terpenoid. (Ekayani dkk., 2021)

Diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan pada tingkat fraksinasi

dan isolasi senyawa untuk mengetahui senyawa spesifik yang berperan sebagai aktivitas antibakteri dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori*. Serta dalam penggunaan kontrol positif agar menggunakan antibiotik yang lebih spesifik untuk mengeradikasi bakteri *Helicobacter pylori*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ekstrak etanol 70% daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Helicobacter pylori* dengan metode difusi agar menggunakan paper disk. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa beberapa konsentrasi yang digunakan memiliki aktivitas menghambat bakteri *Helicobacter pylori*.
2. Konsentrasi optimal ekstrak etanol 70% daun botto-botto (*Chromolaena odorata* L) dalam menghambat bakteri *Helicobacter pylori* adalah konsentrasi 80% dengan diameter rata-rata zona hambat 20 mm dengan kategori zona hambat kuat.

B. Saran

Disarankan untuk penelitian lebih lanjut agar melakukan pengujian senyawa bioaktif yang mengandung aktivitas antibakteri. Serta penggunaan kontrol positif antibiotik yang lebih spesifik dalam mengeradikasi infeksi *Helicobacter pylori*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Aini, and Badaruddin. 1980. *Umdat Al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Bairut: Dār al-Fikr.
- An-Nawawi, and Muhy ad-Dīn Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. 1375. *Riyādl Ash-Shālihīn*. Kairo: at-Tijariyah.
- Aulia Deby Pelu. 2022. *Mikrobiologi Aktivitas Antibakteri (Vol. I)*. (Wiwi Rumaolat, Annuha Zarkasyai, & Syafri Imanda, Red.). Malang, Indonesia: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Chen, Pengting, Meiyun Chen, Chang Peng, Jiahui Yan, Xue Shen, Weijia Zhang, Yuemei Yuan, Guoxing Gan, Xiaojun Luo, Weixing Zhu, and Meicun Yao. 2023. "In Vitro Anti-Bacterial Activity and Its Preliminary Mechanism of Action of the Non-Medicinal Parts of *Sanguisorba officinalis* L. against *Helicobacter Pylori* Infection." *Journal of Ethnopharmacology* 116981. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2023.116981>.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI). 2000. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan.
- DiPiro J.T., Yee G.C., Posey L, Haines S.T., Nolin T.D, and Ellingrod V(Eds.). 2020. *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11e*. McGraw Hill.
- Ekayani, Mardiana, Yohanes Juliantoni, and Aliefman Hakim. 2021. "Uji Efektivitas Larvasida Dan Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Losio Antinyamuk Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.) Terhadap Nyamuk *Aedes Aegypti*." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(4):1261–70.
- Ernawati, and Nur Jannah. 2021. "Aktivitas Antimikroba Perasan Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.) Terhadap *Candida albicans* Dan *Pseudomonas aeruginosa*." *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 17 No. 2:137-144 *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*.
- Fachriyah, E., P. J. Wibawa, and A. Awaliyah. 2020. "Antibacterial Activity of Basil Oil (*Ocimum basilicum* L) and Basil Oil Nanoemulsion." *Journal of Physics: Conference Series* 1524(1). doi: 10.1088/1742-6596/1524/1/012060.
- Fadia, Fadia, Nurlailah Nurlailah, Tini Elyn Helmiyah, and Leka Lutpiatina. 2020. "Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L) Sebagai Antibakteri *Salmonella typhi* Dan *Staphylococcus aureus*." *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia* 2(3):158–68. doi: 10.33759/jrki.v2i3.104.
- Fajrina, Anzharni, Dwi Dinni, Aulia Bakhtra, and Yuyun Irenda. 2018. "Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Spons *Aplysina aerophoba* Pada *Helicobacter Pylori* Dan *Shigella dysenteriae*." *Jurnal Farmasi Higea* 10(2):134–42.
- Fatima, Y. 2013. "(*Nephelium mutabile*) Terhadap *Staphylococcus aureus* Dan

Escherichia Coli Secara In Vitro.” *Jurnal Peternakan* 10(1):31–38.

- Febriza, Moch. Aditya, Qadhli Jafar Adrian, and Adi Sucipto. 2021. “Penerapan Ar Dalam Media Pembelajaran Klasifikasi Bakteri.” *Jurnal BIOEDUIN: Program Studi Pendidikan Biologi* 11(1):10–18. doi: 10.15575/bioeduin.v11i1.12076.
- Febryanto, Muhammad. 2017. “Studi Ekstraksi Dengan Metode Soxhletasi Pada Bahan Organik Umbi Sarang Semut (*Myrmecodia Pendans*) Sebagai Inhibitor Organik.”
- Fifendy M. 2017. *Mikrobiologi Edisi Pertama*. Depok: kencana.
- Handayani, Selpida, Ahmad Najib, and Nurul Purnama Wati. 2018. “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Daruju (*Acanthus Ilicifolius* L.) Dengan Metode Peredaman Radikal Bebas 1,1-Diphenyl-2-Picrylhidrazil (DPPH).” *Jurnal Fitofarmaka Indonesia* 5(2):299–308. doi: 10.33096/jffi.v5i2.414.
- Hanphanphoom, Srisuda, and Sukhumaporn Krajangsang. 2016. “Antimicrobial Activity of *Chromolaena Odorata* Extracts against Bacterial Human Skin Infections.” *Modern Applied Science* 10(2):159. doi: 10.5539/mas.v10n2p159.
- Harfiani, Erna, Yudhi Nugraha, Citra Ayu Aprilia, Feda Anisah Makkiyah, Ratna Puspita, Viol Dhea Kharisma, Muhammad Hermawan Widyandanda, Ahmad Affan Ali Murtadlo, Dora Dayu Rahma Turista, Muhammad Badrut Tamam, Riso Sari Mandeli, Mirella Fonda Maahury, Devi Purnamasari, Muhammad Arya Ghifari, Muhammad Thoriq Albari, Muhammad Raffi Ghifari, Asmi Citra Malina A. R. Tasakka, Alexander Patera Nugraha, and Rahadian Zainul. 2022. “The Phytochemical and Pharmacological Activity of Extract *Kirinyuh* (*Chromolaena Odorata* L.) Leaves: A Review.” *Pharmacognosy Journal* 14(5):580–86. doi: 10.5530/pj.2022.14.139.
- Hooi, James K. Y., Wan Ying Lai, Wee Khoo Ng, Michael M. Y. Suen, Fox E. Underwood, Divine Tanyingoh, Peter Malfertheiner, David Y. Graham, Vincent W. S. Wong, Justin C. Y. Wu, Francis K. L. Chan, Joseph J. Y. Sung, Gilaad G. Kaplan, and Siew C. Ng. 2017. “Global Prevalence of *Helicobacter Pylori* Infection: Systematic Review and Meta-Analysis.” *Gastroenterology* 153(2):420–29. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022.
- indra lesmana, and afidatul maudifah. 2020. *Senyawa Antibakteri Bahan Alam. (I. Lesmana, Red.)*. Malang: media nusa creative.
- Katellaris, Peter, Youri Glupczynski, Alain Burette, Hilpi Rautelin, Timo U. Kosunen, Kari Seppälä, G. D. Bell, and K. Powell. 1992. “Eradicating *Helicobacter Pylori*.” *The Lancet* 339(8784):54–55. doi: 10.1016/0140-6736(92)90176-4.
- Katzung, G. B. 2004. *Basic and Clinical Pharmacology. Endocrine Drugs*. 9th Editio. Philadelphia.: McGraw-Hill.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Farmakope Indonesia Edisi IV*.
- Kester, M., K. .. V rana, S. .. Quraishi, and K. Dowhower Karpa. 2007. *Elsevier's. Integrated Pharmacology*. Philadelphia.: mobsy Elsevier.
- Komala, Oom, . Yulianita, and Rita Rahmawati. 2021. "Uji Aktivitas Ekstrak Etanol 96% Dan Fraksi Daun Kirinyuh (*Chromolaena Odorata L.*) Terhadap *Propionibacterium Acnes*." *Fitofarmaka: Jurnal Ilmiah Farmasi* 11(1):23–34. doi: 10.33751/jf.v11i1.2657.
- Kurang, Rosalian Y., and Ribka Penlaana. 2022. "Daya Hambat Ekstrak Metanol Dan Etil Asetat Daun Kirinyuh (*Chromolaena Odorata L.*) Terhadap Bakteri *Escherichia Coli*." 4(2):22–29.
- Lay, W. B. 1994. *Analisa Mikroba Di Laboratorium*. edisi I. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Leba, Maria A. U. 2017. *Ekstraksi Dan Real Kromatografi*. edisi 1. Yogyakarta: Deepublishle.
- Makin, Florian Mayesti Prima Remba, Welsiliana Welsiliana, and Gede Arya Wiguna. 2022. "Karakterisasi Stomata Dan Trikomata Daun Kirinyuh (*Chromolaena Odorata L.*)" *Journal Science of Biodiversity* 3(1):61–67. doi: 10.32938/jsb/vol3i1pp61-67.
- Malfertheiner, P., F. Megraud, C. O'Morain, F. Bazzoli, E. El-Omar, D. Graham, R. Hunt, T. Rokkas, N. Vakil, E. J. Kuipers, Leif Andersen, John Atherton, Masahiro Asaka, Franco Bazzoli, Peter Bytzer, Francio Chan, Luiz Gonzaga Vaz Coelho, Niek De Wit, Jean Charles Delchier, Francesco Di Mario, Emad El-Omar, Kwong Ming Fock, David Forman, Toshio Fujioka, Giovanni Gasbarrini, Robert Genta, K. L. Goh, David Y. Graham, Alexander Hirschl, Pali Hungin, Richard Hunt, Vassili A. Isakov, Roger Jones, Manfred Kist, Sibylle Koletzko, Ernst J. Kuipers, Limas Kupcinskas, Spiros Ladas, Angel Lanas, Jose Machado, Peter Malfertheiner, Kenneth E. L. McColl, Franco Mégraud, Pierre Michetti, Paul Moayyedi, Colm Omorain, Alberto Pilotto, Mario Quina, Theodore Rokkas, Pateek Sharma, Ylkay Simsek, Pentii Sipponen, J. Sollano, Reinold Stockbrügger, Kentaro Sugano, Dino Vaira, Nimish Vakil, Michael Vieth, and Shudong Xiao. 2007. "Current Concepts in the Management of *Helicobacter Pylori* Infection: The Maastricht III Consensus Report." *Gut* 56(6):772–81. doi: 10.1136/gut.2006.101634.
- Mukhriani. 2014. "Farmaknosi Analisis." *Universitas Islam Negeri (IUN) ALuddin* 1–188.
- Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M. S. 2020. *Identifikasi Bakteri: Metode Identifikasi Dan Klasifikasi Bakteri*. Oceanum.
- Putri, Adde Lolita, and Endang Kusdiyantini. 2018. "Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Asam Laktat Dari Pangan Fermentasi Berbasis Ikan (Inasua) Yang

- Diperjualbelikan Di Maluku-Indonesia.” *Jurnal Biologi Tropika* 1(2):6. doi: 10.14710/jbt.1.2.6-12.
- Rahmawati, Ayu, Dewi Mayasari, and Angga Cipta Narsa. 2020. “Kajian Literatur: Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba Suruhan (*Peperomia Pellucida* L.)” *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* 12:117–24. doi: 10.25026/mpc.v12i1.401.
- Reubun, Yonathan Tri Atmodjo, Shirly Kumala, Siswa Setyahadi, and Simanjuntak Partomuan. 2020. “Pengeringan Beku Ekstrak Herba Pegagan (*Centella Asiatica*.)” *Sainstech Farma* 13(2):113–17.
- RI, Depkes. 2000. “Herbal Indonesia.” *Pocket Handbook of Nonhuman Primate Clinical Medicine* 2:213–18.
- Rosmania, Rosmania, and Fitri Yanti. 2020. “Perhitungan Jumlah Bakteri Di Laboratorium Mikrobiologi Menggunakan Pengembangan Metode Spektrofotometri.” *Jurnal Penelitian Sains* 22(2):76. doi: 10.56064/jps.v22i2.564.
- Saptowo, Ari, Risa Supriningrum, and Supomo Supomo. 2022. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Sekilang (*Embeliaborneensis* Scheff) Terhadap Bakteri *Propionibacterium Acnes* Dan *Staphylococcus Epidermidis*.” *Al-Ulum: Jurnal Sains Dan Teknologi* 7(2):93. doi: 10.31602/ajst.v7i2.6331.
- Septiani, Septiani, Eko Nurcahya Dewi, and Ima Wijayanti. 2017. “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Lamun (*Cymodocea Rotundata*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus Aureus* DAN *Escherichia Coli* (Antibacterial Activities of Seagrass Extracts (*Cymodocea Rotundata*) Against *Staphylococcus Aureus* and *Escherichia Coli*.)” *SAINTEK PERIKANAN: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology* 13(1):1. doi: 10.14710/ijfst.13.1.1-6.
- Shihab, M. Quraish. 2002. “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Qur’an.” P. 318 in. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2009. “Tafsir Al-MisbahPesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.” P. 128 in Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati.
- Susilowarno, R. Gunawan, and R. Supto Hartono. 2007. *Biologi*. indonesia: grasindo.
- Verawati, Verawati, Dedi Nofiandi, and Petmawati Petmawati. 2017. “Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kadar Fenolat Total Dan Aktivitas Antioksidan Daun Salam (*Syzygium Polyanthum* (Wight) Walp.)” *Jurnal Katalisator* 2(2):53. doi: 10.22216/jk.v2i2.1744.
- Vijayaraghavan, Kavitha, Johanna Rajkumar, Syed Nasir Abbas Bukhari, Badr Al-Sayed, and Mohammed Ali Seyed. 2017. “*Chromolaena Odorata*: A Neglected Weed with a Wide Spectrum of Pharmacological Activities (Review).” *Molecular Medicine Reports* 15(3):1007–16. doi:


10.3892/mmr.2017.6133.

- Wang, Changcheng, Yuhong Yuan, and Richard H. Hunt. 2007. "The Association between Helicobacter Pylori Infection and Early Gastric Cancer: A Meta-Analysis." *American Journal of Gastroenterology* 102(8):1789–98. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01335.x.
- Winastri, Ni Luh Arisa Prahastuti, Handa Muliasari, and Ernin Hidayati. 2020. "Aktivitas Antibakteri Air Perasan Dan Rebusan Daun Calincing (*Oxalis Corniculata* L.) Terhadap *Streptococcus Mutans*." *Berita Biologi* 19(2). doi: 10.14203/beritabiologi.v19i2.3786.
- Yutika, Media, Rolan Rusli, and Adam M. Ramadhan. 2015. "Aktivitas Antibakteri Daun Kirinyuh (*Chromolaena Odorata* (L.) R.M.King & H.Rob.) Terhadap Bakteri Gangren." (November):75–81. doi: 10.25026/mpc.v2i1.43.
- Zahra, Hafizh, Rosa Berlina Haridas, Gusnia Meilin Gholam, and Aprijal Ghiyas Setiawan. 2022. "Aktivitas Antiulseratif Berbagai Tanaman Herbal Dan Prospek Masa Depan Sebagai Tanaman Budidaya." *Jurnal Sains Dan Kesehatan* 4(3):343–53. doi: 10.25026/jsk.v4i3.1046.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja ekstraksi daun botto-botto



Lampiran 2. Skema pembuatan media Nutrient agar



Lampiran 3. Skema Pembuatan Larutan Standar Mc Farland


Dicampurkan H_2SO_4 1% sebanyak 9,95 ml dengan larutan BaCl_2 1% sebanyak 0,05 ml ke dalam tabung reaksi




Dihomogenkan hingga terbentuk larutan yang keruh



Lampiran 4. Skema Kultur dan Suspensi *Helicobacter pylori*



Lampiran 5. Uji aktivitas antibakteri




Lampiran 6. Perhitungan rendamen ekstrak

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Bobot ekstrak kental}}{\text{Bobot serbuk kering yang diekstrak}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{49 \text{ g}}{300 \text{ g}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = 16,3 \%$$



Lampiran 7. Perhitungan konsentrasi dan pengenceran ekstrak

Konsentrasi ekstrak sampel daun botto-botto dibuat dalam 5 ml pelarut.

1. Konsentrasi ekstrak 20% g/ml = $\frac{20}{100} \times 5 \text{ ml} = 1 \text{ g}$
2. Konsentrasi ekstrak 40% g/ml = $\frac{40}{100} \times 5 \text{ ml} = 2 \text{ g}$
3. Konsentrasi ekstrak 60% g/ml = $\frac{60}{100} \times 5 \text{ ml} = 3 \text{ g}$
4. Konsentrasi ekstrak 80% g/ml = $\frac{80}{100} \times 5 \text{ ml} = 4 \text{ g}$



Lampiran 8. Perhitungan zona hambat bakteri

$$\text{Rumus perhitungan zona hambat} = \frac{(Dv-Dc)+(Dh-Dc)}{2}$$

Keterangan :

- a. Dv (diameter ventikal),
- b. Dh (diameter horizontal),
- c. Dc (Diameter *papper disc*)

1. Zona hambat bakteri *Helicobacter pylori*

a. *Helicobacter pylori* 1

$$20\% = \frac{(20-6)+(12-6)}{2}$$

$$= \frac{(14)+(6)}{2}$$

$$= 10 \text{ mm}$$

$$40\% = \frac{(19-6)+(15-6)}{2}$$

$$= \frac{(13)+(9)}{2}$$

$$= 11 \text{ mm}$$

$$60\% = \frac{(31-6)+(17-6)}{2}$$

$$= \frac{(25)+(11)}{2}$$

$$= 18 \text{ mm}$$

$$80\% = \frac{(39-6)+(16-6)}{2}$$

$$= \frac{(33)+(10)}{2}$$

$$= 21,5 \text{ mm}$$

b. *Helicobacter pylori* 2

$$20\% = \frac{(17-6)+(15-6)}{2}$$

$$= \frac{(11)+(9)}{2}$$

$$= 10 \text{ mm}$$

$$40\% = \frac{(14-6)+(18-6)}{2}$$

$$= \frac{(8)+(12)}{2}$$

$$= 10 \text{ mm}$$

$$60\% = \frac{(19-6)+(17-6)}{2}$$

$$= \frac{(13)+(11)}{2}$$

$$= 12 \text{ mm}$$

$$80\% = \frac{(22-6)+(19-6)}{2}$$

$$= \frac{(16)+(13)}{2}$$

$$= 14,5 \text{ mm}$$

c. *Helicobacter pylori* 3

$$20\% = \frac{(14-6)+(17-6)}{2}$$

$$= \frac{(8)+(11)}{2}$$

$$= 9,5 \text{ mm}$$

$$40\% = \frac{(15-6)+(14-6)}{2}$$

$$= \frac{(9)+(8)}{2}$$

$$= 8,5 \text{ mm}$$

$$60\% = \frac{(43-6)+(14-6)}{2}$$

$$= \frac{(37)+(8)}{2}$$

$$= 22,5 \text{ mm}$$

$$80\% = \frac{(29-6)+(31-6)}{2}$$

$$= \frac{(23)+(25)}{2}$$

$$= 24 \text{ mm}$$

2. Zona hambat bakteri kontrol kloramfenikol (k+)

a. Kloramfenikol 1

$$= \frac{(31-6)+(18-6)}{2}$$

$$= \frac{(25)+(12)}{2}$$

$$= 18,5 \text{ mm}$$

b. Kloramfenikol 2

$$= \frac{(17-6)+(17-6)}{2}$$

$$= \frac{(11)+(11)}{2}$$

$$= 11 \text{ mm}$$

c. Kloramfenikol 3

$$= \frac{(39-6)+(6-6)}{2}$$

$$= \frac{(33)+(11)}{2}$$

$$= 21,5 \text{ mm}$$

Lampiran 9. Tabel Hasil Uji Aktvitas Antibakteri

konsentrasi	Replikasi 1	Replikasi 2	Replikasi 3	Rata-rata ± SD	kategori
DDB 80%	21,5	14,5	24	20 ± 4,9	Kuat
DDB 60%	18	12	22,5	17,5 ± 5,3	Kuat
DDB 40%	11	10	8,5	9,8 ± 1,3	Sedang
DDB 20%	10	10	9,5	9,8 ± 0,3	Sedang
K +	18,5	11	21,5	17 ± 5,4	Kuat
K -	0	0	0	0	Tidak menghambat

Keterangan :

- DDB 80 % = Daun botto-botto konsentrasi 80%
- DDB 60 % = Daun botto-botto konsentrasi 60%
- DDB 40 % = Daun botto-botto konsentrasi 40%
- DDB 20 % = Daun botto-botto konsentrasi 20%
- K + = Kontrol positif menggunakan Kloramfenikol
- K - = Kontrol negatif menggunakan Akuades

Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian



A



B

Gambar 6. Pengambilan dan pengelolaan sampel

Keterangan :

A : Daun botto-botto

B : Proses sortasi basah



A



B

M A K A S S A R



C



D

Gambar 7. Proses ekstraksi sampel

Keterangan :

A : Proses peredaman sampel

B : Proses penyaringan sampel

C : Proses penguapan dengan rotary evaporator

D : Hasil ekstraksi (ekstrak kental)



A

Gambar 8. Pembuatan seri konsentrasi ekstrak

Keterangan :

A : seri konsentrasi ekstrak 20%, 40%, 60%, dan 80%



A

Gambar 9. Pembuatan media NA

Keterangan :

A : media NA yang telah dilarutkan akuades



A



B

Gambar 10. Sterilisasi Alat dan Bahan

Keterangan :

A : sterilisasi bahan dengan autoklaf

B : sterilisasi alat dengan oven



A

Gambar 11. Kultur bakteri

Keterangan :

A : proses kultur bakteri *H. pylori*



A



B


Gambar 12. Pembuatan suspensi bakteri

Keterangan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

A : Suspensi bakteri

B : Suspensi bakteri disetarakan dengan Mc Farland

ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 13. Proses uji aktivitas antibakteri


Keterangan :

A : Replikasi 1 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

B : Replikasi 2 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

C : Replikasi 3 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

D : Proses inkubasi uji antibakteri





D



E

Gambar 14 : Hasil zona hambat uji antibakteri

Keterangan :

A : Zona hambat Replikasi 1 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

B : Zona hambat Replikasi 2 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

C : Zona hambat Replikasi 3 (1 : 20%, 2 : 40%, 3 : 60%, 4 : 80%)

D : Zona hambat kontrol negatif 3 replikasi

E : Zona hambat kontrol positif 3 replikasi

RIWAYAT HIDUP



Ummu Kalsum H Sanda dilahirkan di Tongko, kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Februari 2000. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Hasan Sanda, S.E dan Dra. Sitti Maryam W, M.PdI. Pendidikan formal peneliti dimulai dari TK RA Aisyiyah Tongko pada tahun 2007 dan melanjutkan di SDN 98 Tongko. Setelah tamat, lanjut di Mts Muhammadiyah Tongko. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Kesehatan Yapika Makassar. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, untuk jenjang S1 pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai saat biografi ini ditulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R