

**HUBUNGAN JENIS KELAMIN DAN ASFIKZIA DENGAN KEJADIAN
HIPERBILIRUBINEMIA PADA NEONATUS DI RSIA ANANDA
MAKASSAR TAHUN 2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

ASTRID PUTRI SHAFIRA

NIM : 70600119045

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astrid Putri Shafira
NIM : 70600119045
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 12 Desember 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Andi Tonro Permai C.14/8
Judul : Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia
dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada
Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun
2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2024



Astrid Putri Shafira
NIM : 70600119045

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Astrid Putri Shafira, NIM: 70600119045, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: "Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 19 Februari 2024

Pembimbing 1



dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes

Pembimbing 2



dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022**” yang disusun oleh Astrid Putri Shafira, NIM 70600119045, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Februari 2023, bertepatan dengan 9 Syaban 1445, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Februari 2024

9 Syaban 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed	(.....)
Pembimbing I	: dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M.A	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes

19810621 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul **‘Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022’**. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian proposal ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orangtua ayahanda Makhzuni, SE. MM dan ibunda Selvi, S. ST, M. Kes dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
3. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Purnamaniswaty Yunus, M. Kes dan dr. Arlina Wiyata Gama, M.Biomed selaku dosen pembimbing penelitian yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka perbaikan penulisan

baik dalam bentuk arahan, motivasi, bimbingan, dan pemberian informasi yang tepat.

5. dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK selaku penguji kompetensi dan Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M.A selaku penguji integrasi keislaman, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis, baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi, dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat saya Berbipotato (Iin, Husnul, Bila, Mira, Aisyah, dan Vian) yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan proposal ini.
8. Teman-teman sejawat angkatan 2019, Inte9rin, yang telah kebersamai hari-hari saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis siap menerima kritik dan saran serta koreksi yang membangun dari semua pihak.

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 19 Februari 2024

Penyusun



Astrid Putri Shafira

70600119045

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar belakang</i>	1
B. <i>Rumusan masalah</i>	6
C. <i>Hipotesis</i>	6
D. <i>Definisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	7
E. <i>Kajian pustaka</i>	9
F. <i>Tujuan penelitian</i>	15
G. <i>Manfaat penelitian</i>	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. <i>Tinjauan Umum Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia</i>	17
1. <i>Definisi</i>	17
2. <i>Etiologi</i>	18
3. <i>Faktor Risiko</i>	22
4. <i>Patofisiologi</i>	22
5. <i>Klasifikasi hiperbilirubin</i>	25
6. <i>Manifestasi Klinik</i>	26
7. <i>Komplikasi</i>	28
8. <i>Tatalaksana</i>	28

B. <i>Tinjauan Umum Jenis Kelamin</i>	31
1. Definisi Jenis Kelamin	31
2. Indikator Jenis Kelamin	31
C. <i>Tinjauan Umum Asfiksia</i>	31
1. Definisi	31
2. Faktor Risiko	32
3. Patofisiologi	37
4. Penegakan Diagnosa	38
5. Tatalaksana.....	40
D. <i>Hubungan Jenis Kelamin dengan Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia</i>	41
E. <i>Hubungan Asfiksia dengan Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia</i>	42
F. <i>Integrasi Keislaman</i>	42
G. <i>Kerangka Teori</i>	47
H. <i>Kerangka Konsep</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. <i>Jenis Penelitian</i>	49
B. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	49
C. <i>Variabel Penelitian</i>	49
D. <i>Populasi dan Sampel</i>	50
E. <i>Teknik Pengambilan Sampel</i>	51
F. <i>Instrumen Penelitian</i>	51
G. <i>Pengolahan data</i>	52
H. <i>Analisis Data</i>	52
I. <i>Alur Penelitian</i>	53
J. <i>Etika Penelitian</i>	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. <i>Hasil Penelitian</i>	55
B. <i>Pembahasan</i>	58
C. <i>Keterbatasan Penelitian</i>	62

BAB V PENUTUP	63
<i>A. Kesimpulan</i>	63
<i>B. Saran</i>	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi Operasional	7
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka.....	9
Tabel 2. 1 Penyebab hiperbilirubinemia pada neonatal	20
Tabel 2. 2 Apgar Score.....	38
Tabel 4. 1 Distribusi Sampel Berdasarkan Diagnosa, Usia, Jenis Kelamin dan Asfiksia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	55
Tabel 4. 2 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022	56
Tabel 4. 3 Analisis Hubungan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022.....	57



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Kerangka Teori	47
Bagan 2. 2 Kerangka Konsep.....	48
Bagan 3. 1 Alur Penelitian	53




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metabolisme Bilirubin.....25



DAFTAR SINGKATAN



AAP	: <i>American Academy of Pediatric</i>
ACOG	: <i>American College Obstetrics & Gynecology</i>
AKB	: Angka Kematian Bayi
APGAR	: <i>Activity, Pulse, Grimace, Appearance, & Respiration</i>
ASI	: Air Susu Ibu
BBLR	: Berat Bayi Lahir Rendah
FKIK	: Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Ha	: Hipotesis Alternatif
Hb	: Hemoglobin
Ho	: Hipotesis Nol
IDAI	: Ikatan Dokter Anak Indonesia
Kemenkes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KPD	: Ketuban Pecah Dini
NCHID	: <i>National Institute of Child health and Human development</i>
pH	: <i>Potential Hydrogen</i>
Rh	: Rhesus
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RSIA	: Rumah Sakit Ibu Anak
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah sakit Umum Daerah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for Social Science</i>

SWT : *subhānahū wa ta'ālā*
UIN : Universitas Islam Negeri
UNICEF : *United Nations Children's Fund*
QS : Al-Qur'an Surah
WHO : *World Health Organization*



ABSTRAK

Nama : Astrid Putri Shafira

NIM : 70600119045

Judul : Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian

Hiperbilirubinemia Pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun
2022

Hiperbilirubinemia pada neonatus merupakan kondisi yang sering ditemukan dalam minggu pertama kehidupannya. Sebagian besar kasus ikterus neonatorum bersifat fisiologis, namun pada beberapa kasus dapat menjadi patologis yang harus diwaspadai, karena dapat menyebabkan komplikasi serius dan fatal jika tidak ditangani dengan baik. Hiperbilirubinemia merupakan salah satu penyebab kematian bayi terbanyak akibat kegawatdaruratan dan komplikasi neonatus. Hiperbilirubinemia mempunyai potensi yang dapat menimbulkan kernikterus dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Adapun faktor risiko yang dapat menyebabkan hiperbilirubinemia pada neonatus seperti jenis kelamin dan asfiksia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan desain analitik kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 373 sampel neonatus yang diperoleh dari data rekam medik. Hasil penelitian ini didapatkan 207% neonatus dengan jenis kelamin laki-laki beresiko tinggi, dan 166% neonatus dengan jenis kelamin perempuan beresiko rendah. Hasil analisis bivariat diperoleh p-value 0,003 (p-value <0,05), yang menandakan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia dan didapatkan 4% neonatus yang mengalami asfiksia dan 369% neonatus yang tidak mengalami asfiksia. Hasil analisis bivariat diperoleh p-value 0,129 (p-value >0,05), yang menandakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia dengan nilai nilai p value didapatkan $0,003 < 0,05$.

Kata Kunci : Jenis Kelamin, Asfiksia, Hiperbilirubinemia

ABSTRACT

Nama : Astrid Putri Shafira

NIM : 70600119045

Judul : The Relationship between Gender and Asphyxia with the Incidence of Hyperbilirubinemia at RSIA Ananda Makassar in 2022

Hyperbilirubinemia in neonates is a condition that is often found in the first week of life. Most cases of neonatal jaundice are physiological, but in some cases it can be pathological which must be watched out for, because it can cause serious and fatal complications if not treated properly. Hyperbilirubinemia is one of the most common causes of infant death due to emergencies and neonatal complications. Hyperbilirubinemia has the potential to cause kernicterus and can cause mental retardation. The risk factors that can cause hyperbilirubinemia in neonates include gender and asphyxia. This study aims to determine the relationship between gender and asphyxia with the incidence of hyperbilirubinemia in neonates at the Ananda Mother and Child Hospital Makassar in 2022. This research method uses a quantitative analytical design with a cross sectional approach. The sampling method used a purposive sampling technique of 373 neonate samples obtained from medical record data. The results of this study showed that 207% of male neonates were at high risk, and 166% of female neonates were at low risk. The results of the bivariate analysis obtained a p-value of 0.003 ($p\text{-value} < 0.05$), which indicates that there is a significant relationship between gender and the incidence of hyperbilirubinemia and it was found that 4% of neonates experienced asphyxia and 369% of neonates who did not experience asphyxia. The results of the bivariate analysis obtained a p-value of 0.129 ($p\text{-value} > 0.05$), which indicates that there is no significant relationship between asphyxia and the incidence of hyperbilirubinemia at RSIA Ananda Makassar in 2022. The conclusion in this study is that there is a relationship between gender and the incidence of hyperbilirubinemia and The p value obtained was $0.003 < 0.05$.

Keywords : *Gender, Asphyxia, Hyperbilirubinemia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hiperbilirubinemia didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana terjadi peningkatan jumlah bilirubin yang terakumulasi di darah dimana kadar bilirubin serum total ≥ 5 mg/dL (86 μ mol/L) ditandai dengan ikterus yaitu keadaan kuning yang terlihat pada kulit, sklera mata, kuku dan mukosa akibat akumulasi bilirubin dalam darah. (Astariani et al., 2021). Hiperbilirubinemia pada neonatus merupakan kondisi yang sering ditemukan dalam minggu pertama kehidupannya. Sebagian besar kasus ikterus neonatorum bersifat fisiologis, namun pada beberapa kasus dapat menjadi patologis yang harus diwaspadai, karena dapat menyebabkan komplikasi serius dan fatal jika tidak ditangani dengan baik. (Yeviza Puspitasari, 2020)

Pada tahun pertama kehidupan bayi, masa yang paling rawan dalam hal kelangsungan hidup bayi adalah satu bulan pertama kehidupan, atau biasa dikenal dengan neonatus (28 hari pertama kehidupan). Jumlah kematian bayi baru lahir sekitar 6.700 setiap harinya di dunia. Kematian neonatus sebanyak 75% terjadi pada minggu pertama kehidupan dan 1 juta neonatus meninggal dalam 24 jam pertama pada tahun 2019. Hasil penelitian pada tahun 2020 bayi meninggal di satu bulan pertama kehidupannya sebanyak 2,4 juta. (WHO, 2022)

Hiperbilirubinemia merupakan salah satu penyebab kematian bayi terbanyak akibat kegawatdaruratan dan komplikasi neonatus. (Khotimah & Subagio, 2021). Menurut WHO, AKB di seluruh dunia sebesar 4.000.000 jiwa pada tahun 2018. Secara global, angka kematian bayi telah mengalami penurunan dari 65 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1990 menjadi 29 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018. Kematian bayi tahunan juga telah menurun dari 8,7 juta pada tahun 1990 menjadi 4,0 juta pada tahun 2018. Angka tersebut masih terbilang cukup besar, untuk itu seluruh negara berupaya untuk menurunkan angka tersebut sesuai dengan target SDGs pada tahun 2030 yaitu angka kematian neonatal sebesar 12 kematian per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita sebesar 25 kematian per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi itu sendiri merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. (UNICEF et al., 2020)

Di Amerika Serikat, sebanyak 65% neonatus mengalami icterus dari total 4 juta neonatus yang lahir setiap tahun. (Sulaksana et al., 2019)

Berdasarkan profil Kesehatan di Indonesia terdapat 27.566 kasus jumlah kematian balita pada tahun 2021, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 28.158 kasus. Dari seluruh kematian balita, 73,1% diantaranya terjadi pada masa neonatal yaitu sebesar 20.154 kematian. Dari seluruh kematian neonatal yang

dilaporkan, Sebagian besar diantaranya 79,1% terjadi pada usia 0-6 hari, sedangkan kematian pada usia 7-28 hari sebesar 20,9%. (kemenkes RI, 2022). Berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2015, angka kejadian ikterus pada bayi baru lahir di Indonesia sebesar 51,47% dengan faktor penyebabnya antara lain asfiksia 51%, BBLR 42,9%, sectio cesaria 18,9%, prematur 33,3%, kelainan kongenital 2,8%, dan sepsis 12%. (Riskesdas, 2015).

Berdasarkan Data Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 jumlah bayi yang mengalami ikterus sebanyak 376 (0,58% dari total bayi yang lahir) dan yang tertangani sebanyak 287 orang, dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar (195 kasus). (Riskesdas 2015)

Hiperbilirubinemia mempunyai potensi yang dapat menimbulkan kernikterus dan dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Salah satu penyebab mortalitas bayi baru lahir adalah kernikterus yang merupakan komplikasi ikterus neonatorum yang paling berat yang mendapatkan gejala sisa berupa *cerebral palsy*, tuli nada tinggi sehingga sangat memengaruhi kualitas hidup. (Jubella et al., 2022). Peningkatan kadar bilirubin, terlebih yang tidak terkonjugasi akan sangat berbahaya bagi neonatus. Bilirubin yang tidak terkonjugasi ini bersifat larut dalam lemak, sehingga dapat dengan mudah menembus sawar darah otak dan terdeposisi di didalam jaringan otak yang akan menyebabkan adanya disfungsi otak. Kondisi deposisi bilirubin akut akan menyebabkan

terjadinya bilirubin enselopatis akut yang akan menyebabkan kondisi disfungsi neural secara transient. Saat deposisi bilirubin ini berlangsung secara kronis atau terus menerus maka akan terjadi disfungsi neural permanen yang disebut dengan kernikterus. (Noormartany et al., 2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Noormartany dkk (2019) mengenai “Perbandingan Kadar Bilirubin Total pada Bayi Laki-Laki dan Perempuan dengan Neonatal Hiperbilirubinemia di RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung” Bayi dengan jenis kelamin laki-laki yang menderita Neonatal Hiperbilirubinemia memiliki kadar bilirubin rata-rata sebesar 14 mg/dL. Bayi dengan jenis kelamin perempuan yang menderita hiperbilirubinemia neonatal memiliki kadar bilirubin rata-rata sebesar 12,6 mg/dL. (Noormartany et al., 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hindratni dkk (2020) menunjukkan bahwa dari 333 sampel terdapat 266 bayi (79,9%) yang asfiksia dan yang tidak sekitar 67 (20,1%). Hal tersebut menjelaskan bahwa bayi dengan asfiksia merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperbilirubinemia (Hindratni et al., 2020).

Allah swt. Mengetahui segala apa yang terjadi kepada bayi selama berada di dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt QS Ar-Ra'd/13: 8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) Rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya”.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data awal terkait kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di beberapa rumah sakit di daerah Makassar. Pada RSIA Ananda Makassar untuk tahun 2021 didapatkan sebanyak 197 neonatus mengalami hiperbilirubinemia. Pada tahun 2022 tercatat 203 neonatus mengalami hiperbilirubinemia. Angka tersebut menunjukkan bahwa pada RSIA Ananda Makassar untuk kasus hiperbilirubinemia neonatus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan angka kejadian hiperbilirubinemia neonatus di RSIA Ananda Makassar jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan RSIA Khadijah, RSUD Haji dan RSIA Fatimah Makassar. RSIA Khadijah pada tahun 2020 menunjukkan jumlah hiperbilirubinemia neonatus sebanyak 50 kasus pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 25 kasus. RSUD Haji pada tahun 2020 total keseluruhan hiperbilirubinemia neonatus sebanyak 8 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 26 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 37 kasus. RSIA Fatimah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa total kejadian hiperbilirubinemia neonatus sebanyak 9 kasus. Pada tahun 2021 sebanyak 18 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 20 kasus.

Berdasarkan rincian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan asfiksia terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- b. Tidak terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- b. Terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

D. Definisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi setiap variable dengan mengkaji lebih rinci pengukuran variable tersebut. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam table sebagai berikut :

Table 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Jenis Kelamin	Bayi laki-laki atau perempuan yang mengalami hiperbilirubinemia.	Menggunakan data rekam medik pasien.	a. laki-laki b. perempuan	Nominal
2.	Asfiksia	Keadaan dimana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur setelah kelahiran dinilai	Menggunakan data rekam medik pasien.	a. Asfiksia : bila tercatat skor APGAR ≤ 7	Nominal

		<p>menggunakan APGAR Score dengan melihat warna kulit, frekuensi denyut jantung, tonus otot dan pernapasan bila di jumlah didapatkan skor APGAR ≤ 7 .</p>		<p>b. Tidak asfiksia : bila tercatat skor APGAR >7</p>	
Variabel Dependen					
3.	Hiperbilirubinemia	<p>Hiperbilirubinemia merupakan peningkatan jumlah bilirubin yang terakumulasi di darah dimana kadar bilirubin serum total ≥ 5 mg/dL (86 μmol/L).</p>	<p>Menggunakan data rekam medik pasien.</p>	<p>a. Hiperbilirubinemia : Kadar bilirubin serum ≥ 5 mg/dL b. Tidak hiperbilirubinemia : Kadar bilirubin serum <5 mg/dl)</p>	Nominal

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini mencari hubungan antara jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan melihat data rekam medik pasien RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

E. Kajian pustaka

Table 1. 2 Kajian Pustaka

No	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	sampel	Hasil
1.	Yeviza Puspitasari (2020)	Kejadian Hiperbilirubinemia Ditinjau dari Berat Badan Lahir	<i>Cross sectional</i>	228 sampel	Ada hubungan BBLR dengan kejadian hiperbilirubinemi di RSUD dr. Ibnu Soetowo Baturaja Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2019.
2.	Felicia Anita Wijaya, I Wayan Bikin Suryawan (2019)	Faktor Risiko Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di	<i>Case control</i>	43 sampel	Faktor risiko yang memengaruhi kejadian hiperbilirubinemia

		Ruang Perinatologi RSUD Wangaya Kota Denpasar			pada neonatus yang dirawat di ruang perinatologi RSUD Wangaya adalah usia gestasi dan ASI.
3.	Grace Novi Pratiwi, Devi Angeliana Kusumaningtiar (2021)	Kejadian Hiperbilirubinemia Bayi Baru Lahir di RS Swasta Jakarta	<i>Cross Sectional</i>	94 sampel	Adanya hubungan pemberian ASI eksklusif, kompatibilitas ABO, jenis persalinan, BBLR, usiagestasi dengan hiperbilirubin.
4.	Farida Triani, Bagus Setyo boedi, Budiono (2022)	Faktor Risiko Insiden Hiperbilirubinemia pada Neonatus di Rumkital Dr. Ramelan Surabaya	<i>Cross sectional</i>	122 sampel	Terdapat hubungan signifikan antara jenis usia gestasional, jenis kelamin dan berat badan lahir dengan kejadian

					<p>hiperbilirubinemi</p> <p>a. Sedangkan jenis persalinan dan paritas tidak ada hubungan signifikan dengan kejadian hiperbilirubinemia.</p>
5.	<p>Intan Astriani, I</p> <p>Wayan Dharma</p> <p>Artana, Ni Made</p> <p>Rini Suari</p> <p>(2021)</p>	<p>Karakteristik</p> <p>Faktor Penyebab</p> <p>Hiperbilirubinemia</p> <p>pada Neonatus di</p> <p>RSIA Puri Bunda</p> <p>Tabanan, Bali</p> <p>Tahun 2021</p>	<p><i>Cross</i></p> <p><i>sectional</i></p> <p><i>retrospective</i></p>	<p>146</p> <p>sampel</p>	<p>Didapatkan di</p> <p>RSIA Puri Bunda</p> <p>Tabanan yaitu</p> <p>inkompatibilitas</p> <p>ABO sebagai</p> <p>penyebab</p> <p>terbanyak dan</p> <p>asfiksia</p> <p>neonatorum</p> <p>sebagai penyebab</p> <p>paling sedikit</p>
6.	<p>Eka Frelestanty,</p> <p>Lea Masan</p> <p>(2020)</p>	<p>Analisis Hubungan</p> <p>BBLR (Berat Bayi</p> <p>Lahir Rendah) dan</p>	<p><i>Deskriptif</i></p> <p><i>kuantitatif</i></p> <p><i>dengan</i></p>	<p>265</p> <p>sampel</p>	<p>Hasil pengujian</p> <p>menggunakan Chi</p> <p>square memberikan</p>

		Asfiksia dengan Ikterus Neonatorum	<i>pendekatan retrospektif</i>		hasil p-value <0.001 artinya ada hubungan antara antara BBLR dan asdiksia dengan ikterus neonatorum.
7.	Elsi Rahmadani, Marlin Sutrisna (2022)	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Ikterus pada Bayi Baru Lahir di RSUD UMMI	<i>Cross Sectional</i>	55 sampel	Ada hubungan antara BBLR, frekuensi ASI, inkompatibilitas ABO dengan kejadian ikterus padabayi baru lahir di RSUD Ummi tahun 2021.
8.	Noormartany, Buti Azfiani Azhali, Alifia Intan Perdani (2019)	Perbandingan Kadar Bilirubin Total pada Bayi Laki -Laki dan Perempuan dengan Neonatal	<i>Cross sectional</i>	276 sampel	Memperlihatkan bahwa kadar rata – rata bilirubin pada neonatus laki – laki lebih tinggi sebesar 14,3 mg/dL

		Hiperbilirubinemia di RSUD AL-Ihsan Kabupaten Bandung			sedangkan kadar rata – rata bilirubin perempuan sebesar 12,6 mg/dL.
9.	Gangina Sriram, R. Rama Krishna Paramahamsa (2019)	Predictive Value of Serum Bilirubin Level for Identifying Term Neonates at Risk for Subsequent Hyperbilirubinemia	<i>Hospital-based prospective study</i>	200 sampel	Bayi baru lahir yang mengalami hiperbilirubinemia laki-laki:perempuan yang signifikan rasionya adalah 1,07:1. 9 (33%) bayi baru lahir dengan hiperbilirubinemia signifikan mengalami ikterus
10.	A. Muh Akbar Jaya, Saharuddin, Henny Fauziah (2021)	Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Hiperbilirubinemia	<i>Cross sectional</i>	400 sampel	Terdapat korelasi yang signifikan antara berat badan lahir rendah dengan

		di Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar Periode Januari- Desember Tahun 2018			kejadian hiperbilirubinemia.
--	--	--	--	--	---------------------------------



F. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui angka kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- b. Mengetahui distribusi frekuensi jenis kelamin pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi asfiksia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- d. Menganalisa hubungan jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.
- e. Menganalisa hubungan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022.

G. Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan dibidang kesehatan terutama mengenai

hubungan jenis kelamin dan asfiksia kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus.

2. Bagi Institusi

- a. Dapat digunakan sebagai data tambahan kepustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia.
- b. Dapat digunakan sebagai referensi bacaan terkait kesehatan ibu dan anak sehingga dijadikan dasar penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat mengenai risiko jenis kelamin dan asfiksia terhadap kejadian hiperbilirubinemia agar ibu dapat lebih paham dan mengerti mengenai jenis kelamin dan asfiksia yang berisiko mengakibatkan hiperbilirubinemia dan dapat digunakan sebagai upaya dalam menurunkan Angka Kematian Bayi akibat hiperbilirubinemia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia*

1. Definisi

Neonatus adalah bayi yang baru lahir sampai usia 28 hari (0-28 hari). Fase neonatus merupakan fase paling rentan, karena sedang terjadinya berbagai penyesuaian fisiologis tubuh dalam menghadapi kehidupan ekstrauterin. Tingkat morbiditas dan mortalitas neonatus cukup tinggi selama fase ini. Salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas yang terjadi pada fase neonatus ini adalah hiperbilirubinemia neonatal. (Sudarti, 2014)

Bilirubin adalah pigmen kristal tetrapiol berwarna jingga kuning yang merupakan bentuk akhir dari pemecahan katabolisme heme melalui proses reaksi oksidasi-reduksi yang terjadi di sistem retikulo endothelial (Kosim, 2012). Bilirubin diproduksi oleh kerusakan normal sel darah merah. Bilirubin dibentuk oleh hati kemudian dilepaskan ke dalam usus sebagai empedu atau cairan yang berfungsi untuk membantu pencernaan. (Mendri NK, 2017)

Hiperbilirubinemia adalah peningkatan kadar serum bilirubin dalam darah sehingga melebihi nilai normal. Pada bayi baru lahir biasanya dapat mengalami hiperbilirubinemia pada minggu pertama setelah kelahiran. Keadaan hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh meningkatnya produksi bilirubin atau mengalami

hemolisis, kurangnya albumin sebagai alat pengangkut, penurunan *uptake* oleh hati, penurunan konjugasi bilirubin oleh hati, penurunan ekskresi bilirubin, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. (IDAI,2014)

Pada kebanyakan bayi baru lahir, hiperbilirubinemia tak terkonjugasi merupakan fenomena transisional yang normal, tetapi pada beberapa bayi akan terjadi peningkatan bilirubin secara berlebihan sehingga bilirubin berpotensi menjadi toksik. Hal ini akan menyebabkan kematian bayi baru lahir dan apabila bayi bertahan hidup dalam jangka panjang akan menyebabkan sekuele neurologis. (Kosim MS, 2012)

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme bilirubin dan fungsi hati secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pemenuhan Gizi anak, Faktor-faktor tersebut antara lain ialah : Kondisi Sosial ekonomi anak, pendidikan ibu, pekerjaan orang tua dari anak, jumlah anak, pengetahuan ibu, pola asuh anak, dan lingkungan tempat tinggal anak. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola makan seimbang dan mengonsumsi nutrisi yang cukup guna menjaga kesehatan hati dan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah. (Hadijah, Yunus, Rahim, 2021)

2. Etiologi

Hiperbilirubinemia disebabkan oleh peningkatan produksi bilirubin karena tingginya jumlah sel darah merah, dimana sel darah

merah mengalami pemecahan sel yang lebih cepat. Selain itu, hiperbilirubinemia juga dapat disebabkan karena penurunan *uptake* dalam hati, penurunan konjugasi oleh hati, dan peningkatan sirkulasi enterohepatik. (IDAI,2014)

Kejadian ikterik atau hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir disebabkan oleh disfungsi hati pada bayi baru lahir sehingga organ hati pada bayi tidak dapat berfungsi maksimal dalam melarutkan bilirubin ke dalam air yang selanjutnya disalurkan ke empedu dan diekskresikan ke dalam usus menjadi urobilinogen. Hal tersebut menyebabkan kadar bilirubin meningkat dalam plasma sehingga terjadi ikterus pada bayi baru lahir. (Kosim MS, 2012)

Secara garis besar etiologi ikterus atau hiperbilirubinemia pada neonatus dapat dibagi menjadi :

- a. Produksi bilirubin yang berlebihan. Hal ini melebihi kemampuan neonatus untuk mengeluarkan zat tersebut. Misalnya pada hemolisis yang meningkat pada inkompatibilitas darah Rh, ABO, golongan darah lain, defisiensi enzim G6-PD, piruvat kinase, perdarahan tertutup dan sepsis. (Kosim MS, 2012)
- b. Gangguan dalam proses *uptake* dan konjugasi hepar. Gangguan ini dapat disebabkan oleh asidosis, hipoksia, dan infeksi atau tidak terdapatnya enzim *glukoronil transferase* (sindrom crigler- Najjar). Penyebab lain yaitu defisiensi protein. Protein Y dalam hepar yang berperan penting dalam *uptake* bilirubin ke

sel hepar. (Kosim MS, 2012)

- c. Gangguan transportasi bilirubin. Bilirubin dalam darah terikat pada albumin kemudian diangkat ke hepar. Ikatan bilirubin dengan albumin ini dapat dipengaruhi oleh obat misalnya salisilat, sulfafurazole. Defisiensi albumin menyebabkan lebih banyak terdapatnya bilirubin indirek yang bebas dalam darah yang mudah melekat ke sel otak. (Kosim MS, 2012)
- d. Gangguan dalam ekskresi. Gangguan ini dapat terjadi akibat obstruksi dalam hepar atau diluar hepar. Kelainan diluar heparbiasanya disebabkan oleh kelainan bawaan. Obstruksi dalam heparbiasanya akibat infeksi atau kerusakan hepar oleh penyebab lain. (Kosim MS, 2012)

Tabel 2.1 Penyebab hiperbilirubinemia pada neonatal

Dasar	Penyebab
- Peningkatan produksi bilirubin	- Incompatibilitas darah fetomaternal (Rh, ABO)
- Peningkatan penghancuran bilirubin.	- Defisiensi enzim konginetal
- Peningkatan jumlah hemoglobin	- Perdarahan tertutup (sefalhematom, memar), sepsis,
- Peningkatan sirkulasi enterohepatik	- Polisitemia (twin-to-twintransfusion, SGA)
- Perubahan <i>clearance</i>	- Keterlamban klem tali pusat
	- Keterlambatan pasase mukonium, ileus mukonium, <i>muconium plug syndrome</i> .
	- Puasa atau keterlambatan minum

-
- | | |
|---|--|
| bilirubinhati.
- Perubahan produksi atau aktifitas <i>uridine diphosphoglucoroyl transverase</i> .
- Perubahan fungsi dan perfusihati (kemampuan konjugasi) | - Atrrsia atau stenosis intestinal.
- Imaturitas
- Gangguan metabolik/endokrin

- Asfiksia, hipoksia, hipotermi,sepsi (juga proses inflamasi)
- Obat-obatan dan hormon (novobiasin, pregnanediol)
- Stasis biliaris (hepatitis,sepsis)
- Bilirubin load berlebihan(sering pada hemolisis berat) |
|---|--|
-

3. Faktor Risiko

a. Faktor maternal

Identifikasi faktor maternal yang berhubungan dengan hiperbilirubinemia penting dalam hal pencegahan, skrining dan penatalaksanaan ikterus neonatorum. Faktor maternal yang terkait adalah usia ibu, paritas, Inkompatibilitas ABO, jenis persalinan, hipertensi dan preeklampisa, TORCH syndrome, premature rupture of membranes (PROM), usia kehamilan, dan menyusui (Boskabadi, Rakhshanizadeh, & Zakerihamidi, 2020).

b. Faktor neonatal

Faktor neonatal yang merupakan faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia adalah BBLR, usia gestasi/preterm, sepsis neonatal, jenis kelamin, polisitemia, saudara dengan riwayat penyakit kuning, sefalhematoma, trisomi 21, inkompatibilitas Rh atau ABO, infeksi, gangguan endokrin (Boskabadi et al., 2020).

c. Faktor lainnya

Ada beberapa faktor risiko lain terjadinya hiperbilirubinemia yaitu, faktor prenatal, faktor internatal, faktor postnatal. (Auliasari, N. A., et al. 2019)

- Faktor prenatal yaitu terjadinya infeksi pada ibu, obat-obatan dan hormon, kebiasaan merokok pada ibu dan air ketuban keruh
- Faktor internatal yaitu ketuban pecah dini, sefal hematoma, sepsis, plasenta previa, hipotermi dan hipoglikemia.
- Faktor postnatal yaitu gangguan metabolik/endokrin, anomaly kongenital, pemberian ASI, stasis biliaris, dan polisitemia. (Isa, H. M., et al., 2022)

4. Patofisiologi

Bilirubin diproduksi sebagian besar (70-80%) dari eritrosit yang telah rusak. Kemudian bilirubin indirek (tak terkonjugasi) dibawa ke hepar dengan cara berikatan dengan albumin. Bilirubin direk (terkonjugasi) kemudian diekskresikan melalui traktus

gastrointestinal. Bayi memiliki usus yang belum sempurna, karna belum terdapat bakteri pemecah, sehingga pemecahan bilirubin tidak berhasil dan menjadi bilirubin indirek yang kemudian ikut masuk dalam aliran darah, sehingga bilirubin terus bersirkulasi. (Atika, 2016)


Pembentukan bilirubin yang terjadi di sistem retikuloendotelial, selanjutnya dilepaskan ke sirkulasi yang akan berikatan dengan albumin. Neonatus mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang rendah dan kapasitas ikatan molar yang kurang. Bilirubin yang terikat dengan albumin tidak dapat memasuki susunan syaraf pusat dan bersifat toksik. (Kosim MS, 2012)

Pigmen kuning ditemukan di dalam empedu yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin oleh kerja *heme oksigenase*, biliverdin, reduktase, dan agen pereduksi non enzimatis dalam sistem retikuloendotelial. Setelah pemecahan hemoglobin, bilirubin tak terkonjugasi diambil oleh protein intraseluler "Y protein" dalam hati. Pengambilan tergantung pada aliran darah hepatic dan adanya ikatan protein. Bilirubin tak terkonjugasi dalam hati diubah atau terkonjugasi oleh enzim *asam uridin disfoglukuronat (uridine disphoglucuronid acid) glukorinil transferase* menjadi bilirubin *mono* dan *diglucuronida* yang polar, larut dalam air (bereaksi direk). Bilirubin yang terkonjugasi yang larut dalam air dapat dieliminasi

melaui ginjal. Dengan konjugasi, bilirubin masuk dalam empedu melaui membran kanalikular. Kemudian ke sistem gastrointestinal dengan diaktifkan oleh bakteri menjadi urobilinogen dalam tinja dan urine. Beberapa bilirubin diabsorpsi kembali menjadi sirkulasi enterohepatik. (Sudarti, 2014)

Hiperbilirubinemia dapat disebabkan oleh pembentukan bilirubin yang melebihi kemampuan hati untuk mengekskresikan bilirubin yang telah diekskresikan dalam jumlah normal. Selain itu, hiperbilirubinemia juga dapat disebabkan oleh obstruksi saluran ekskresihati. Apabila konsentrasi bilirubin mencapai 2 – 2,5 mg/dL maka bilirubin akan tertimbun di dalam darah. Selanjutnya bilirubin akan berdifusi ke dalam jaringan yang kemudian akan menyebabkan kuning atau ikterus. (Mendri NK, 2017)

Warna kuning dalam kulit akibat dari akumulasi pigmen bilirubin yang larut lemak, tak terkonjugasi, non polar (bereaksi indirek). Pada bayi dengan hiperbilirubinemia kemungkinan merupakan hasil dari defisiensi atau tidak aktifnya glukoronil *transferase*. Rendahnya pengambilan dalam hepatic kemungkinan karena penurunan protein hepatic sejalan dengan penurunan darah hepatic. (Kosim MS, 2012)



Sumber : (Kemenkes RI 2019)

Gambar 2. 1 *Metabolisme Bilirubin*

5. Klasifikasi hiperbilirubin

1. Hiperbilirubinem Fisiologis

Hiperbilirubinemia fisiologis pada bayi baru lahir tidak muncul pada 24 jam pertama setelah bayi dilahirkan. Biasanya pada hiperbilirubinemia fisiologis peningkatan kadar bilirubin total tidak lebih dari 5mg/dL per hari. Pada bayi cukup bulan, hiperbilirubinemia fisiologis akan mencapai puncaknya pada 72 jam setelah bayi

dilahirkan dengan kadar serum bilirubin yaitu 6 – 8 mg/dL. Selama 72 jam awal kelahiran kadar bilirubin akan meningkat sampai dengan 2 – 3 mg/dL kemudian pada hari ke-5 serum bilirubin akan turun sampai dengan 3mg/dL. (Guyton, 2014)

Setelah hari ke-5, kadar serum bilirubin akan turun secara perlahan sampai dengan normal pada hari ke-11 sampai hari ke-12. Pada Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) atau bayi kurang bulan (*premature*) bilirubin mencapai puncak pada 120 jam pertama dengan peningkatan serum bilirubin sebesar 10 – 15 mg/dL dan akan menurun setelah 2 minggu. (Prawirohardjo, 2014)

2. Hiperbilirubinemia Patologis

Hiperbilirubinemia patologis atau biasa disebut dengan ikterus pada bayi baru lahir akan muncul dalam 24 jam pertama setelah bayi dilahirkan. Pada hiperbilirubinemia patologis kadar serum bilirubin total akan meningkat lebih dari 5 mg/dL per hari. Pada bayi cukup bulan, kadar serum bilirubin akan meningkat sebanyak 12 mg/dL sedangkan pada bayi kurang bulan (*premature*) kadar serum bilirubin total akan meningkat hingga 15 mg/dL. Ikterus biasanya berlangsung kurang lebih satu minggu pada bayi cukup bulan dan lebih dari dua minggu pada bayi kurang bulan. (Pratiwi, 2019)

6. Manifestasi Klinik

Bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubinemia apabila bayi baru lahir tersebut tampak berwarna kuning dengan kadar serum bilirubin

5mg/dL atau lebih (Kosim MS, 2012). Hiperbilirubinemia merupakan penimbunan bilirubin indirek pada kulit sehingga menimbulkan warna kuning atau jingga. Pada hiperbilirubinemia direk biasanya dapat menimbulkan warna kuning kehijauan atau kuning kotor. (IDAI,2014)

Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir dapat menyebabkan ikterus pada sklera, kuku, atau kulit dan membran mukosa. *Jaundice* yang muncul pada 24 jam pertama disebabkan oleh penyakit hemolitik pada bayi baru lahir, sepsis, atau ibu dengan diabetik atau infeksi. *Jaundice* yang tampak pada hari kedua atau hari ketiga, dan mencapai puncak pada hari ketiga sampai hari keempat dan menurun pada hari kelima sampai hari ketujuh yang biasanya merupakan *jaundice* fisiologis. (Pratiwi, 2019)

Menurut Ridha (2014) bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubinemia apabila tampak tanda-tanda sebagai berikut :

- Sklera, selaput lendir, kulit atau organ lain tampak kuning akibat penumpukan bilirubin.
- Terjadi pada 24 jam pertama kehidupan.
- Peningkatan konsentrasi bilirubin 5mg/dL atau lebih setelah 24 jam.
- Konsentrasi bilirubin serum 10 mg/dL pada neonatus cukup bulan dan 12,5 mg/dL pada neonatus kurang bulan.
- Ikterik yang disertai proses hemolisis.
- Ikterik yang disertai berat badan lahir kurang dari 2000 gram, masa

gestasi kurang dari 36 minggu, hipoksia, sindrom gangguan pernafasan, infeksi trauma lahir kepala, hipoglikemia, hiperkarbia. (Ridha, 2014)

7. Komplikasi

Hiperbilirubinemia pada bayi baru lahir apabila tidak segeradiatasi dapat mengakibatkan bilirubin *encephalopathy* (komplikasi serius). Pada keadaan lebih fatal, hiperbilirubinemia pada neonatus dapat menyebabkan kernikterus, yaitu kerusakan neurologis, *cerebral palsy*, dan dapat menyebabkan retardasi mental, hiperaktivitas, bicara lambat, tidak dapat mengoordinasikan otot dengan baik, serta tangisan yang melengking. (Pratiwi, 2019)

8. Tatalaksana

A. Tindakan umum

Memeriksa golongan darah ibu (Rh, ABO) pada waktu hamil, mencegah trauma lahir, pemberian obat pada ibu hamil atau bayi baru lahir yang dapat menimbulkan ikterus, infeksi dan dehidrasi. Pemberian ASI atau makanan dini dengan jumlah cairan dan kalori yang sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir. Imunisasi yang cukup baik di tempat bayi dirawat. Berdasarkan pada penyebabnya, maka manajemen bayi dengan Hiperbilirubin diarahkan untuk mencegah anemia dan membatasi efek dari Hiperbilirubin. Pengobatan mempunyai tujuan yaitu menghilangkan anemia, menghilangkan antibodi maternal dan teresnsitisasi, meningkatkan badan serum albumin dan menurunkan

serum bilirubin. Metode therapi pada Hiperbilirubin meliputi : fototerapi, transfusi pengganti, infus albumin dan terapi obat. (Williamson, 2013)

B. Fototerapi

Fototerapi dapat digunakan sendiri atau dikombinasi dengan transfusi pengganti untuk menurunkan bilirubin. Memaparkan neonatus pada cahaya dengan intensitas yang tinggi akan menurunkan bilirubin dalam kulit. Fototerapi menurunkan kadar bilirubin dengan cara memfasilitasi eksresi biliar bilirubin tak terkonjugasi. Hal ini terjadi jika cahaya yang diabsorpsi jaringan mengubah bilirubin tak terkonjugasi menjadi dua isomer yang disebut foto bilirubin. Foto bilirubin bergerak dari jaringan ke pembuluh darah melalui mekanisme difusi. Di dalam darah Foto bilirubin berikatan dengan albumin dan dikirim ke hati. Foto bilirubin kemudian bergerak ke empedu dan diekskresi ke dalam deodenum untuk dibuang bersama feses tanpa proses konjugasi oleh hati Fototerapi mempunyai peranan dalam pencegahan peningkatan kadar bilirubin, tetapi tidak dapat mengubah penyebab kekuningan dan hemolisis dapat menyebabkan Anemia. (Kosim MS, 2012)

Secara umum fototerapi harus diberikan pada kadar bilirubin indirek 4 -5 mg / dl. Neonatus yang sakit dengan berat badan kurang dari 1000 gram harus di foto terapi dengan konsentrasi bilirubin 5 mg/dl. Beberapa ilmuwan mengarahkan untuk memberikan fototerapi

profilaksis pada 24 jam pertama pada bayi resiko tinggi dan berat badan lahir rendah. (Kosim MS, 2012)

C. Tranfusi Pengganti / Tukar

Transfusi pengganti atau imediat diindikasikan adanya faktor-faktor titer anti Rh lebih dari pada ibu, penyakit hemolisis berat pada bayi baru lahir, penyakit hemolisis pada bayi saat lahir perdarahan atau 24 jam pertama, tes coombs positif, kadar bilirubin direk lebih besar 3,5 mg / dl pada minggu pertama, serum bilirubin indirek lebih dari 20 mg / dl pada 48 jam pertama, hemoglobin kurang dari 12 gr / dl. Bayi dengan hidrops saat lahir. Bayi pada resiko terjadi Kernikterus. (Williamson, 2013)

Transfusi Pengganti digunakan untuk mengatasi anemia sel darah merah yang tidak suseptible (rentan) terhadap sel darah merah terhadap antibodi maternal, menghilangkan sel darah merah untuk yang tersensitisasi (kepekaan), menghilangkan serum bilirubin, meningkatkan albumin bebas bilirubin dan meningkatkan keterikatan dengan bilirubin, pada Rh inkomptabilitas diperlukan transfusi darah golongan O segera (kurang dari 2 hari), Rh negatif *whole blood*. Darah yang dipilih tidak mengandung antigen A dan antigen B yang pendek. setiap 4 - 8 jam kadar Bilirubin harus dicek. Hemoglobin harus diperiksa setiap hari sampai stabil. (Prawirohardjo, 2014)

B. Tinjauan Umum Jenis Kelamin

1. Definisi Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah sifat fisik maupun psikis yang membedakan antara pria dan wanita. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis dan fisiologis yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan. perbedaan secara biologis ini dibawa sejak lahir dan tak dapat diubah. (Notoatmodjo, 2014)

2. Indikator Jenis Kelamin

Berdasarkan uraian di atas, indikator pada penelitian ini jenis kelamin sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Perempuan

C. Tinjauan Umum Asfiksia

1. Definisi

Berdasarkan WHO asfiksia didefinisikan sebagai kegagalan dalam bernapas secara spontan dan teratur segera setelah bayi lahir. Menurut *American college of obstetric and gynaecology* dan *American Academy of Pediatrics*, asfiksia adalah keadaan dimana terjadi gangguan pada pertukaran gas darah sehingga menyebabkan sedikitnya kadar oksigen dalam darah dan gagal napas karena akumulasi karbon dioksida dalam darah disertai dengan asidosis metabolik. (Kemenkes, 2019)

Asfiksia neonatorum ialah kondisi bayi baru lahir yang mengalami kegagalan bernapas secara spontan dan teratur pada saat lahir, yang mengakibatkan bayi tidak dapat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbondioksida dari dalam tubuhnya. (Sarifuddin et al. 2023)

2. Faktor Risiko

A. Faktor Antepartum

1. Usia Ibu

Kehamilan dibawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun merupakan umur kehamilan yang berisiko yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan berdampak pada ibu maupun pada bayi. pada dibawah usia 20 tahun organ reproduksi wanita belum sepenuhnya matang dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan akan intake makanan yang bergizi selama kehamilan sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Kehamilan di usia lebih dari 35 tahun juga merupakan kehamilan berisiko dikarenakan pada usia lebih dari 35 tahun organ reproduksi wanita mengalami penurunan fungsi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti preeklampsia dan hipertensi yang akan menyebabkan komplikasi pada saat persalinan seperti perdarahan dan persalinan terlalu dini. (Vina, 2019)

2. Paritas

Paritas adalah salah satu faktor risiko terjadinya asfiksia dikarenakan primipara atau ibu yang belum pernah melahirkan sebelumnya cenderung mengalami kesulitan dikarenakan psikologis yang belum siap dan kekakuan pada otot perineum dan serviks sehingga berdampak pada lamanya waktu persalinan sehingga menyebabkan bayi mengalami asfiksia. (Mandasari, 2020)

Kondisi primipara dengan tingkat stress yang tinggi akibat psikologis yang belum siap menjelang persalinan juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kortisol dalam tubuh yang akan mempengaruhi dan berdampak pada aliran darah ke plasenta. Multiparitas dengan kehamilan lebih dari 4 kali juga merupakan faktor risiko asfiksia dikarenakan secara fisik ibu akan mengalami penurunan fungsi pada tubuh untuk menghadapi kehamilan selanjutnya, hal ini akan meningkatkan terjadinya komplikasi persalinan. (Vina, 2019)

3. Preklampsia

Kondisi preeklampsia yang dialami ibu hamil akan sangat berdampak pada kondisi janin karena akibat dari adanya disfungsi endotel sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan antara kadar hormone vasokonstriktor (*tromboksan, endotelin, angiotensin*) dan vasodilator (*prostasiklin dan nitritoksida*). Keadaan ini menyebabkan

vasokonstriksi sehingga akan berdampak pada peningkatan proteinplasma pada ginjal yang akan menyebabkan adanya protein dalam urin. Selain itu vasokonstriksi yang diakibatkan oleh terganggunya hormon vasokonstriktor dan vasodilator akan mengakibatkan penurunan suplai darah ke plasenta sehingga akan membuat janin hipoksia dan terjadi gangguan pada pertukaran gas O₂ dan CO₂ yang nantinya akan menyebabkan asfiksia pada bayi. (Mongdong, 2021)

4. Anemia

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana kadar hemoglobin dalam darah < 11 gr/dl pada trimester pertama dan ketiga dan < 10,5 gr/dl pada kehamilan trimester kedua. Kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah selama kehamilan terjadi karena intake nutrisi yang tidak adekuat seperti kekurangan zat besi dan asam folat, perdarahan akibat hemorroid dan perdarahan saluran cerna. Anemia kehamilan akan menyebabkan terjadinya gangguan aliran oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan hipoksia janin dan asfiksia pada bayi pada saat setelah kelahiran (Astuti, 2021).

5. Hipertensi pada ibu hamil

Hipertensi (tekanan darah tinggi) dan asfiksia (kurangnya oksigen) adalah dua kondisi medis yang berbeda, tetapi pada beberapa kasus, mereka dapat saling berhubungan. Hubungan

antara hipertensi dan asfiksia terkait dengan kemungkinan adanya tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Jika seorang ibu hamil memiliki hipertensi yang tidak terkontrol, ini dapat menyebabkan peningkatan risiko komplikasi selama kehamilan, termasuk risiko asfiksia pada bayi saat proses persalinan. Risiko terjadi asfiksia pada bayi baru lahir lebih besar pada ibu hamil yang mengalami hipertensi karena tekanan darah tinggi mengakibatkan resistensi pembuluh darah perifer meningkat yang akan mengganggu sirkulasi uteroplasenta dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan janin. (Sarifuddin et al. 2023)

B. Faktor Intranatal

1. Jenis Persalinan

Tindakan persalinan dengan menggunakan metode *sectio caesarea* dan ekstraksi vakum memiliki risiko lebih tinggi menyebabkan asfiksia dibandingkan dengan jenis persalinan spontan karena persalinan dengan *section caesarea* dapat menstimulasi pengeluaran hormone stress pada ibu sehingga akan berdampak pada kondisi bayi yang menyebabkan pematangan paru-paru bayi yang berisi cairan paru. Bayi yang lahir dengan metode *section caesarea* memiliki lebih banyak cairan paru dibandingkan dengan udara didalam paru. (Alfitri, 2021)

2. Ketuban Pecah Dini

Penyebab asfiksia pada kejadian ketuban pecah dini dapat dipengaruhi oleh keadaan oligohidramnion yang akan menyebabkan penyempitan tali pusat oleh karena adanya tekanan sehingga akan menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke janin dan gangguan pada pemenuhan oksigen sehingga menyebabkan hipoksia janin. (Wulan, 2019)

C. Faktor Bayi

1. Bayi Prematur

Bayi yang lahir prematur biasanya berhubungan dengan imaturitas pada organ janin dimana sistem pernapasan mengalami defisiensi surfaktan akibat pertumbuhan dan perkembangan paru yang belum matang dan otot-otot pernapasan yang masih lemah sehingga sulit untuk bernapas spontan. Semakin muda usia kehamilan, maka paru-paru akan semakin imatur yang akan berdampak pada kandungan surfaktan yang sedikit. Defisiensi surfaktan pada paru-paru akan berdampak pada kesulitan saat ventilasi. (Muliahari, 2022)

2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum dikarenakan fungsi organ bayi yang imatur seperti fungsi

alveolus yang belum sempurna, kurangnya kadar surfaktan dalam paru, penyempitan lumen saluran napas, kolpas dan obstruksi saluran napas, otot-otot pernapasan yang masih lemah sehingga menyebabkan kegagalan dalam bernapas spontan. (Hidayah, 2020)

3. Patofisiologi

Adanya transisi janin dari intrauterin ke ekstrauterin akan menyebabkan beberapa perubahan seperti alveoli paru janin dalam uterus akan terisi cairan paru. Ketika bayi baru lahir bernapas untuk pertama kalinya maka udara akan memasuki alveoli paru yang kemudian akan diabsorpsi oleh jaringan paru. Selanjutnya, pada saat bayi lagi makavolume udara yang masuk ke alveoli akan akan terus bertambah banyak. Hal inilah yang akan menyebabkan alveoli berisikan udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru akan meningkat diakibatkan karena ekspansi paru membutuhkan tekanan yang tinggi saat inspirasi dan ekspirasi. Adanya peningkatan pada tekanan alveoli disertai dengan ekspansi paru akan berdampak pada terjadinya penurunan resistensi vaskuler paru dan akan meningkatkan aliran darah paru setelah lahir. Peningkatan aliran darah paru yang kemudian akan menyebabkan hipertensi pulmonal persisten disebabkan karena adanya kegagalan pada saat penurunan resistensi vaskuler hal ini juga disebabkan karena aliran darah paru yang inadekuat dan hipoksia relatif. Ekspansi paru yang tidak adekuat akan menyebabkan kegagalan

saat bernapas. (Antono, 2018)

Asfiksia neonatorum terjadi ketika bayi kekurangan O₂ karena aliran O₂ plasenta ke janin mengalami gangguan karena gagal beradaptasi masa transisi. Pada keadaan hipoksia akut, darah akan menuju ke organ vital terlebih dahulu seperti batang otak dan jantung, dibandingkan ke serebrum, pleksus koroid, substansia alba, kelenjar adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ thoraks dan abdomen seperti paru, hati ginjal, dan traktus gastrointestinal. Adanya perubahan aliran darah diakibatkan karena penurunan resistensi pembuluh darah otak ke jantung dan peningkatan resistensi pembuluh darah ke organ perifer. (Kemenkes, 2019)

4. Penegakan Diagnosa

Penilaian asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan menggunakan APGAR skor. Apgar skor merupakan penilaian pada bayi baru lahir secara sistematis segera setelah lahir.

Tabel 2. 2 APGAR skor

Tanda	0	1	2
Warna kulit (<i>Appearance</i>)	Biru atau pucat	Tubuh kemerahan, sianosis	Seluruhnya kemerahan
Frekuensi denyut jantung (<i>Pulse</i>)	Tidak ada	<100	>100
Tonus otot (<i>Activity</i>)	Tidak ada	Ekstremitas fleksi sedikit	Aktif bergerak

Pernapasan (<i>Respiration</i>)	Tidak ada	Menangis lemah, hipoventilasi	Menangis kuat
--------------------------------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Sumber : *the American Collage Obstetrics & Gynecology* (ACOG) (2015).

a. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO

- 1) Asfiksia neonatorum berat : APGAR skor 0-3 pada menit ke- 5 disertai dengan denyut nadi <100x/menit, pernapasan tidak ada atau megap-megap, warna kulit pucat, tidak ada tonus otot.
- 2) Asfiksia ringan-sedang : APGAR skor 4-7 pada menit ke- 5 ditandai dengan pernapasan tidak norma dalam 1 menit pertama, denyut jantung $\geq 100x/menit$, sedikit tonus otot, merespon terhadap rangsangan. (world health Organization, 2021)

b. Klasifikasi Asfiksia berdasarkan *The American College Obstetrics & gynecology* (ACOG) & *American Academy of Pediatric* (AAP)

- 1) Pada pemeriksaan darah tali pusat didapatkan Asidosis metabolic atau campuran (pH <7.0)
- 2) APGAR skro 0-3 pada menit ke-5
- 3) Adanya manifestasi neorolig, seperti kejang, hipotonia, atau koma (ensefalopati neonatus)
- 4) Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, hematologi, respirasi, dan renal.
- 5) Diagnosis bayi mengalami asfiksia neonatorum dapat ditegakkan apabila memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria yang ditemukan pada bayi. (Kemenkes, 2019)

c. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan *National Institute of Child health and Human development (NICHD)*

- 1) Pada pemeriksaan darah tali pusat dalam satu jam setelah kelahiran didapatkan pH <7.0 atau defisit basa >16 mmol/L.
- 2) Riwayat episode hipoksik perinatal (daselesasi/bradikardia berat pada janin, prolapse tali pusat, ruptur tali pusat, solusio plasenta, ruptur uteri, perdarahan/trauma fetomaternal, atau *cardiorespiratory arrest*) dan salah satu dari :
 - a) Nilai APGAR skor ≥ 5 pada menit ke- 10
 - b) Bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 menit jika pH darah tali pusat 7,01 – 7,15 dan defisit basa 10 – 15,9 mmol/L atau pada keadaan pemeriksaan gasdarah tidak tersedia. (Kemenkes, 2019)

5. Tatalaksana

Asfiksia adalah komplikasi pada bayi baru lahir yang dapat dicegah dengan cara memberikan edukasi terkait dengan faktor – faktor risiko dari asfiksia sebagai upaya pencegahan primer. Tatalaksana awal berupa resusitasi dan pasca resusitasi di ruang bersalin dan yang merupakan upaya pencegahan sekunder, memberikan terapi untuk mengatasi hipotermia merupakan pencegahan tersier. (Kemenkes, 2019)

D. Hubungan Jenis Kelamin dengan Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia

Pada penelitian yang dilakukan di India, Insiden hiperbilirubinemia kerap terjadi pada laki-laki (63,9%) daripada perempuan. Kondisi ini terjadi karena laki laki memiliki kadar bilirubin lebih tinggi dan lebih rentan mengalami hiperbilirubinemia. Hal ini disebabkan adanya pengaruh jenis kromosom pada laki-laki yang memiliki satu kromosom X sehingga disebut defisiensi G6PD (*Glukosa 6 Phospat Dehidrogenase*), sedangkan pada bayi perempuan memiliki dua kromosom X untuk mengatur dan menyeimbangkan enzim sel darah merah. (Rafi, 2019)

Kelainan gen tersebut bertanggung jawab atas kekurangan enzim yang umumnya terjadi pada laki-laki, dimana mereka akan lebih berpotensi mengalami hiperbilirubin dibanding bayi perempuan yang memiliki dua kromosom X. (Parulian et al., 2017). Bayi laki-laki memiliki kromosom Y bisa menyebabkan kejadian peningkatan laju metabolisme bilirubin dan pematangan enzim pembantu metabolisme bilirubin melambat, akibatnya dapat meningkatkan kadar bilirubin didalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kondisi hiperbilirubinemia. Kadar enzim UDPG-T (*uridin difosfat-glukoronid transferase*) pada bayi laki-laki lebih rendah diakibatkan pengaruh dari hormon progesteron yang juga rendah sehingga memperlambat laju metabolisme bilirubin dan mempengaruhi tingginya kadar bilirubin. (Sriram, 2019)

E. Hubungan Asfiksia dengan Neonatus yang mengalami Hiperbilirubinemia

Asfiksia adalah kegagalan memulai dan melanjutkan pernapasan secara spontan dan teratur pada saat bayi baru lahir atau beberapa saat sesudah lahir. Bayi mungkin lahir dalam kondisi asfiksia (asfiksia primer) atau mungkin dapat bernafas tetapi akan mengalami asfiksia beberapa saat setelah lahir (asfiksia sekunder) yang dapat mempengaruhi terjadinya hiperbilirubinemia. (Sudarti, 2014)

Kurangnya asupan oksigen pada organ-organ tubuh sehingga fungsi organ tidak maksimal, glikogen yang dihasilkan tubuh dalam hati berkurang yang menyebabkan hiperbilirubinemia. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa adanya hubungan antara neonatus yang kekurangan oksigen pada organ-organ tubuh sehingga fungsi organ tidak maksimal , glikogen yang dihasilkan tubuh dalam hati berkurang yang menyebabkan hiperbilirubinemia. (Kosim MS, 2012)

F. Integrasi Keislaman

Bayi baru lahir merupakan karunia yang telah Allah swt. titipkan kepada seorang ibu. Sebelum bayi tersebut dilahirkan di dunia, bayi bertumbuh di dalam janin seorang ibu selama kurang lebih 9 bulan. Allah swt. Mengetahui segala apa yang terjadi kepada bayi selama berada di dalam kandungan. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt QS Ar-Ra'd/13: 8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّوا تُكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang (tidak sempurna dalam) Rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisi-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan mengenai ilmu Allah swt. Yang begitu luas salah satunya adalah membahas mengenai janin yang berada dalam kandungan seorang ibu. Berdasarkan Tafsir al-Misbah Jilid 6: Setelah ayat-ayat lalu membuktikan kekuasaan Allah swt, kini diuraikan ilmu-Nya yang sangat luas lagi mencakup segala yang kecil dan yang besar. Tuhan yang Maha Mengetahuilah yang menentukan juga jenis ayat atau mukjizat yang diturunkannya kepada setiap rasul. Salah satu objek pengetahuan-Nya adalah tentang kandungan. Allah, sejak dahulu, sekarang dan terus menerus mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk sperma. Calon bapak lalu membuahi ovum yang berada dalam diri seorang calon ibu. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan atau betina setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel di dinding rahim. Allah mengetahui bukan saja jenis kelaminnya, tetapi berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan lain-lain. Dan Allah mengetahui apa, yakni sperma serta ovum yang berkurang di dalam Rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran dan Allah mengetahui juga yang bertambah, yakni tumbuh atau yang dalam keadaan kembar dan segala sesuatu baik menyangkut kandungan (Shihab, 2006)

Dasar keadilan dan persamaan dalam keluarga juga merupakan salah satu sasaran al- Quran. Persamaan hak harus diberikan secara adil sekalipun terhadap anak-anak. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita karena keduanya adalah seimbang dan tidak ada seorangpun dapat melebihi yang lainnya kecuali karena kemuliaan amalnya sebagaimana firman Allah swt QS Ali Imran/ 3: 195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ

Terjemahnya:

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (seraya berfirman) “sesungguhnya aku tidak menyalah-nyalahkan amal orang-orang yang beriman diantara kamu, baik laki-laki atau perempuan karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik”.

Ayat diatas menjelaskan mengenai adanya perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa membeda bedakan antara satu dengan yang lain. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan wanita karena keduanya adalah seimbang, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah Jilid 2 : Istilah *ba'dhuhum min ba'dh* atau *ba'dhukum min ba'dh* ditemukan dalam banyak tempat, antara lain ketika wahyu-wahyu Ilahi berbicara tentang asal kejadian manusia (QS. Al 'Imran/3: 195.) yang mengandung arti bahwa baik lelaki

maupun perempuan lahir dan sebagian lelaki dan sebagian perempuan, yakni perpaduan antara sperma lelaki dan indung telur perempuan, karena itu tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antar mereka dan karenanya pula Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada mereka masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.

Proses penciptaan manusia di jelaskan dalam hadist :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

Terjemahnya:


“Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu (esa). Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab (Ajam), dan tidak ada kelebihan bangsa lain (Ajam) terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah (puith) terhadap yang berkulit hitam, tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah (putih), kecuali dengan taqwanya”. (HR. Ahmad).

Dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam menjadikan takwa sebagai tolak ukur keutamaan di antara manusia; dan dengan kepastian tolak ukur ini, maka gugurlah semua perbedaan. Sebab manusia jika dikaitkan dengan Adam dalam penciptaan dari tanah adalah sama, namun yang membedakan keutamaan mereka adalah dengan menaati Allah dan Rasul-Nya. Pada sisi lain, bahwa keadilan itu bukan berarti persamaan secara mutlak, namun itu berarti adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban karena itu keutamaan di antara manusia harus berdasarkan upaya yang mereka kerahkan, baik dalam amalan dunia maupun amalan akhirat dengan kata lain diberikannya hak

kepada setiap yang memilikinya dan mendahulukan orang yang memiliki kemampuan. (Ath-Thabari, 2008)




G. Kerangka Teori



Bagan 2. 1 Kerangka Teori


H. Kerangka Konsep



Keterangan :



= Variabel Dependen



= Variabel Independen yang diteliti



= Variabel Independen yang tidak diteliti

Bagan 2. 2 Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu berupa penelitian kuantitatif dengan desain observasional *cross sectional*. Desain *cross sectional* merupakan penelitian yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau akibat yang terjadi pada obyek penelitian dan diukur secara simultan. Penelitian ini memperoleh data dari rekam medik berupa kadar bilirubin pada neonatus di RSIA Ananda Kota Makassar dengan pertimbangan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November 2023.

C. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 2 variabel, yaitu terdiri dari variabel independen dan variabel dependen dimana 2 variabel independen dan 1 variabel dependen.

1. Variable Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel stimulus yang dapat memengaruhi sebab terjadinya variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah jenis kelamin dan asfiksia.

2. Variable Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel output atau disebut hasil perlakuan dari variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh neonatus di RSIA Ananda Makassar

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah neonatus yang mengalami hiperbilirubinemia di RSIA Ananda Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan rumus *Slovin*

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$= \frac{5507}{1+5507(0,05^2)}$$

$$= \frac{5507}{1+5507(0,0025)}$$

$$= \frac{5507}{14,8}$$

$$= 372,9 \text{ (dibulatkan menjadi 373)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d = Tingkat Signifikansi (p)

Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 373 orang.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini digunakan teknik purposive sampling dengan mengambil sampel dari populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan oleh peneliti.

1. Kriteria Inklusi

- a. Bayi berusia 0-28 hari yang di rawat di RSIA Ananda Makassar pada tahun 2022
- b. Bayi yang memiliki data rekam medik yang lengkap

2. Kriteria Eksklusi

- a. Pasien bayi dengan kelainan genetik
- b. Pasien bayi dengan gangguan hemolitik

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang berasal dari rekam medis berupa hasil pemeriksaan laboratoirum bilirubin pada nenotus di RSIA Ananda Makassar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

G. Pengolahan data

Teknik pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yaitu editing, coding, data entry dan tabulating.

1. *Editing*

Editing atau penyuntingan data adalah tahap memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yang dicatat dalam daftar pengumpulan data.

2. *Coding*

Coding atau pemberian kode adalah tahap mengubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk bilangan. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis data.

3. *Data Entry*

Data entry adalah tahap pengisian data ke dalam master table.

4. *Tabulating*

Tabulating adalah tahap membuat penyajian data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Analisis Data

Analisa data bertujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Analisa data pada penelitian ini digunakan untuk menguji adanya hubungan tiap variabel terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus. Analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS).


1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan dengan cara deskriptif tiap variabel yang digunakan dengan membuat tabel distribusi frekuensi maupun membuat nilai rata-rata, atau nilai tengah untuk data kontinyu.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk menilai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah uji chi square dengan bantuan software uji statistik.

I. Alur Penelitian



Bagan 3. 1 Alur Penelitian

J. Etika Penelitian

Peneliti mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar. Etika penelitian pada penelitian ini yaitu menjamin kerahasiaan identitas subjek penelitian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang sedang dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Ananda Makassar yang terletak di Jalan Andi Djemma No.57, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data lalu peneliti melakukan analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 373 sampel. Adapun distribusi sampel penelitian dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Berdasarkan Diagnosa, Jenis Kelamin dan Asfiksia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Karakteristik	Frekuensi	
	N	%
Diagnosa		
a. Hiperbilirubinemia	203	54,4
b. Tidak Hiperbilirubinemia	170	45,6
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	207	55,5
b. Perempuan	166	44,5
Asfiksia		
a. Ya	4	1,1
b. Tidak	369	98,9
Total	373	100

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan jumlah sampel yaitu 373 sampel yang terdiri dari 203 sampel yang terdiagnosa hiperbilirubinemia dan 170 sampel yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia. Berdasarkan distribusi variabel yang diteliti yaitu jenis kelamin dan asfiksia, distribusi neonatus

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 207 sampel (55,5%) sedangkan neonatus dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 166 sampel (44,5%). Adapun distribusi neonatus yang mengalami asfiksia sebanyak 4 sampel (1,1%) dan yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 369 sampel (98,9%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan adanya hubungan antara jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus. Adapun analisis hubungan variabel jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Analisis Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Jenis Kelamin	Diagnosis Hiperbilirubinemia				Total		p-value	OR	CI 95%
	Ya	%	Tidak	%	N	%			
Laki-laki	127	112,7	80	94,3	207	207,0	0,003	0,532	0,352-0,805
Perempuan	76	90,3	90	75,7	166	166,0			
Total	203	203	170	170	373	373			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan neonatus dengan jenis kelamin laki-laki yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 127 sampel (112,7%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia distribusi 80 sampel (94,3%). Sedangkan pada neonatus dengan jenis kelamin perempuan yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 76 sampel (90,3%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 90 sampel (75,7%). Dari hasil analisis bivariat *Chi-Square*

menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,003 yang menunjukkan jenis kelamin memiliki hubungan yang bermakna terhadap hiperbilirubinemia pada neonatus. Nilai *Odd Ratio* sebesar 0,532 dengan CI 95% (0,352-0,805) menunjukkan bahwa neonatus dengan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko lebih besar untuk mengalami hiperbilirubinemia dibandingkan neonatus dengan jenis kelamin perempuan.

Tabel 4. 3 Analisis Hubungan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022

Asfiksia	Diagnosis Hiperbilirubinemia				Total		<i>p-value</i>	OR	CI 95%
	Ya	%	Tidak	%	N	%			
Ya	4	2,2	0	1,8	4	4,0	0,129	0,539	0,491-0,593
Tidak	199	200,8	170	168,2	369	369,0			
Total	203	203	170	170	373	373			

(Sumber : Data Sekunder, 2022)

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan neonatus yang mengalami asfiksia yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 4 sampel (2,2%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 0 sampel (1,8%). Sedangkan pada neonatus yang tidak mengalami asfiksia yang terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 199 sampel (200,8%) dan yang tidak terdiagnosa hiperbilirubinemia memiliki distribusi 170 sampel (168,2%). Dari hasil analisis bivariat *Chi-Square* menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,129 yang menunjukkan asfiksia tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap hiperbilirubinemia pada neonatus. Nilai *Odd Ratio* sebesar 0,539 dengan CI 95% (0,491-0,593).

B. Pembahasan

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jenis kelamin terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai *p-value* 0,003. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa jenis kelamin menjadi salah satu faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia pada neonatus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Auliya, Hendra Kusumajaya dan Indri Puji Lestari (2023) di RSUD Drs. H. Abu Hanifah dengan sampel sebanyak 70 neonatus, pada hasil uji bivariat variabel jenis kelamin didapatkan hasil *p-value* 0,028 yang artinya jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dimana jenis kelamin laki-laki berisiko berpeluang lebih besar mengalami hiperbilirubinemia pada neonatus daripada bayi dengan jenis kelamin perempuan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Farida Triani, Bagus Setyoboedi dan Budiono (2022) di RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya dengan sampel sebanyak 252 bayi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai *p-value* 0,046. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marini Madiastuti dan Sri Chalada (2016).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perhitungan statistik bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai *p-value* 0,104.

Hiperbilirubinemia pada neonatus sering terjadi pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kromosom dimana perempuan memiliki kromosom XX sedangkan laki-laki memiliki kromosom XY. Kromosom Y yang dimiliki laki-laki dapat meningkatkan laju destruksi sel darah merah dan hambatan pematangan enzim metabolisme bilirubin. (Noormartany et al., 2019)

Bayi laki-laki memiliki kromosom Y bisa menyebabkan kejadian peningkatan laju metabolisme bilirubin dan pematangan enzim pembantu metabolisme bilirubin melambat, akibatnya dapat meningkatkan kadar bilirubin didalam pembuluh darah sehingga menyebabkan kondisi hiperbilirubinemia. Kadar enzim UDPG-T (*uridin difosfat-glukoronid transferase*) pada bayi laki-laki lebih rendah diakibatkan pengaruh dari hormon progesteron yang juga rendah sehingga memperlambat laju metabolisme bilirubin dan mempengaruhi tingginya kadar bilirubin. (Sriram, 2019)

Tidak ada penelitian yang membahas secara spesifik mengapa terjadi hiperbilirubinemia pada perempuan, namun beberapa teori mengatakan secara fisiologis kadar bilirubin akan meningkat setelah lahir lalu menetap dan selanjutnya menurun setelah 7 hari, neonatus yang mengalami hiperbilirubinemia merupakan proses yang patologis dengan pemberian

nutrisi secara adekuat yakni dengan pemberian ASI memberikan tujuan untuk menstimulasi sel-sel usus untuk mencapai fungsi yang optimal. ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan tanpa ada tambahan makanan lain, dan dapat dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan bayi. (Luthfi et al., 2022; Sudirman et al., 2024)

Sumber lain mengatakan jenis kelamin perempuan mengalami hiperbilirubinemia dikarenakan menyusu tidak adekuat dimana kita ketahui pemberian ASI lebih sering mencegah bayi mengalami dehidrasi dan kekurangan asupan kalori serta teori ini menjelaskan terlambatnya bayi mendapatkan nutrisi (ASI) mengakibatkan bilirubin direk yang sudah mencapai usus didalam usus inilah bilirubin direk diubah menjadi bilirubin indirek yang akan diserap kembali ke dalam darah sehingga hiperbilirubin menetap, tidak terikat oleh makanan dan tidak dikeluarkan melalui anus bersama makanan. (Dewi & Isfaizah, 2023; Khotimah & Subagio, 2021)

2. Hubungan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara asfiksia terhadap kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus dengan nilai *p-value* 0,129. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori bahwa asfiksia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya hiperbilirubinemia pada neonatus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rieke Primasdika, Titi Mursiti, Riza Amalia dan Sri Setiasih (2023) di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo dengan sampel sebanyak 55 bayi didapatkan hasil *p-value* 0,226 yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Khodilatul Aulia dkk. (2022) dengan jumlah sampel 134 bayi menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia dengan nilai *p-value* 0,522. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka Frelestanty dan Lea Masan (2020). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa asfiksia memiliki hubungan dengan kejadian hiperbilirubinemia dengan nilai $p < 0.001$.

Asfiksia neonatorum adalah kondisi kegagalan nafas secara spontan, tidak teratur dan tidak adekuat yang terjadi setelah lahir. Bayi dengan asfiksia menyebabkan kurangnya asupan oksigen pada organ-organ tubuh neonatus, sehingga fungsi kerja organ tidak optimal. Bayi asfiksia dapat menghambat aktivitas UDPG-T (*uridin difosfat-glukoronid transferase*) di hati yang menyebabkan meningkatnya bilirubin tak terkonjugasi. (Primasdika R et al., 2023)

Secara teori asfiksia akan menyebabkan terjadinya hipoksia pada bayi dimana salah satunya dapat mempengaruhi fungsi hati. Identifikasi risiko asfiksia dengan pertolongan persalinan yang tepat merupakan salah satu upaya untuk mencegah asfiksia. Penatalaksanaan awal asfiksia yang tepat

dan cepat dengan manajemen resusitasi yang benar merupakan suatu upaya yang dapat mencegah bayi mengalami kekurangan oksigen dan mencegah penumpukan bilirubin yang tak terkonjugasi. Riwayat bayi dengan asfiksia bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperbilirubinemia, hal ini dimungkinkan karena adanya faktor lain yang menyebabkan kejadian hiperbilirubinemia. (Anggelia et al., 2018)

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah serta tidak melanggar etik penelitian yang sudah ditetapkan. Namun, pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Penulisan data yang ditulis tangan yang memberi kemungkinan adanya kesalahan data yang tertulis, sehingga validitas penelitian sangat bergantung pada validitas rekam medik.
2. Pengambilan data satu kali dari rekam medik hanya menggambarkan variabel yang diteliti, baik independen maupun dependen pada waktu yang sama, tidak mencakup perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu sehingga dapat bersifat lemah dalam melihat hubungan sebab akibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan jenis kelamin dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Angka kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022 sebanyak 203 kasus.
2. Jumlah neonatus dengan jenis kelamin laki-laki adalah 207 bayi (55,5%) dan jumlah neonatus dengan jenis kelamin perempuan adalah 166 bayi (44,5%).
3. Jumlah neonatus yang mengalami asfiksia adalah 4 bayi (1,1%) dan jumlah neonatus yang tidak mengalami asfiksia adalah 369 bayi (98,9%).
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022 dengan nilai *p-value* 0,003.
5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asfiksia dengan kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Ananda Makassar tahun 2022 dengan nilai *p-value* 0,129.

B. Saran

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya ibu hamil diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor kejadian hiperbilirubinemia pada neonatus sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Begitu juga bagi tenaga kesehatan dapat memberikan usaha dalam upaya pencegahan yang dapat dilakukan mulai dari masa antenatal sampai neonatus sehingga bayi dapat lahir dengan berat lahir normal diantaranya dengan melakukan pengawasan antenatal yang baik, pencegahan persalinan prematur dan mencegah hipoksia pada janin dan neonatus.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar dalam penelitian selanjutnya. Mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel yang belum terdapat pada penelitian ini dengan sampel dan metode serta lokasi penelitian yang berbeda.

c. Bagi Rumah Sakit

Diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan berupa skrining pada semua bayi baru lahir dengan melakukan tes kadar bilirubin sebelum pulang dari rumah sakit tanpa memandang usianya sebagai bentuk pencegahan. Pihak rumah sakit juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI yang cukup dalam pengelolaan ikterus disamping layanan kesehatan yang tepat dan cepat dari rumah sakit untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, N. A. (2021). Hubungan Umur Kehamilan, Jenis Persalinan, Dan Ketuban Pecah Dini Dengan Derajat Asfiksia Neonatorum Di Rsud Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Periode 2019 - 2020. *Jurnal Kedokteran Mulawarman*, VIII(1), 19. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.30872/j.ked.mulawarman.v8i1.6006>
- Anggelia, T. M., Sasmito, L., & Purwaningrum, Y. (2018). The Risk Of The Neonatory Interest In The Neonatus With The History Of Asfiksia Baby New Born. *Jurnal Terapan*, 4(2), 154–164.
- Antono, S. D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, VI(2), 188–198.
- Astariani, I., Artana, I. W. D., & Suari, N. M. R. (2021). Karakteristik faktor penyebab hiperbilirubinemia pada neonatus di RSIA Puri Bunda Tabanan, Bali Tahun 2021. *Intisari Sains Medis*, 12(3), 917–920. <https://doi.org/10.15562/ism.v12i3.1174>
- Astuti, E. R. (2021). Derajat Anemia pada Kehamilan dengan Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir. *Journal Midwifery Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Gorontalo*, IV(1), 1.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Jami" Al- Bayan an Ta"wil Ayi Al-Qur"an, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Atika, V. d. (2016). *Asuhan Kebidanan pada Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta: Trans Info Media.
- Auliasari, N. A., et al. (2019). Faktor Risiko Kejadian Ikterus Neonatorum. *Pedionaternal Nursing Journal*. 5 (2), 183-188
- Boskabadi, H., Rakhshanizadeh, F., Moradi, A., & Zakerihamidi, M. (2020). Risk Factors and Causes of Neonatal Hyperbilirubinemia: A Systematic Review Study. *Journal of Pediatrics Review*, 8(4), 211–222. <https://doi.org/10.32598/jpr.8.4.293.3>

- Boskabadi, H., Rakhshanizadeh, F., & Zakerihamidi, M. (2020). Evaluation of maternal risk factors in neonatal hyperbilirubinemia. *Archives of Iranian Medicine*, 23(2), 128–140.
- Dewi, H. S. K., Isfaizah. (2023). Karakteristik Bayi Baru Lahir dengan Hiperbilirubin di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo. *Journal of Holistics and Health Sciences*. 5(1): 111-119.
- Guyton, A. C. (2014). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC, 1022.
- Haidhir, A. (2007). *Hadist Arba`in Nawawiyah*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Hidayah, A. (2020). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kota Mobagu. *Indonesia Midwifery Journal*, IV(1), 16-21.
- Hindratni, F. et al. (2020). Factors Associated With Neonatal Hiperbilirubinemia In Arifin Achmad Hospital Pekanbaru City In 2018. *Jurnal Ibu dan Anak*. 8(2), 21-29.
- IDAI. (2014). *Buku Ajar Neonatologi*. Jakarta: IDAI.
- Isa, H. M., et al. (2022). Neonatal and Maternal Risk Factors for Indirect Hyperbilirubinemia: A Cross-Sectional Study from Bahrain. *International Journal of Pediatrics*. Volume 2022, Article ID 5199423, 8 pages <https://doi.org/10.1155/2022/5199423>
- Jubella, M., Taherong, F., & Nurfaizah Alza. (2022). Manajemen Asuhan Kebidanan Segera Bayi Baru Lahir Berkelanjutan pada Bayi Ny “M” dengan Ikterus Neonatorum Fisiologis di Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar Tahun 2021. *Jurnal Midwifery*, 4(1), 65–76. <https://doi.org/10.24252/jmw.v4i1.28001>
- Kemenkes. (2019). *Pedoman Nasional pelayanan kedokteran tata laksana asfiksia*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia .
- Kemenkes RI. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. In [Pusdatin.Kemkes.Go.Id](https://pusdatin.kemkes.go.id).
- Khotimah, H., & Subagio, S. U. (2021). Analisis Hubungan antara Usia Kehamilan, Berat Lahir Bayi, Jenis Persalinan dan Pemberian Asi dengan Kejadian Hiperbilirubinemia. *Faletahan Health Journal*, 8(2), 115–121. <https://doi.org/10.33746/fhj.v8i02.146>

- Kosim MS, Y. A. (2012). *Buku Ajar Neonatologi*.
- Luthfi, R. K., et al. (2022). Asfiksia Sedang dan Hiperbilirubinemia Pada Bayi Berat Lahir Cukup. *Continuing Medical Education*. ISSN : 2721-2882
- Mandasari, P. (2020). Hubungan Kehamilan Lewat Waktu dan Preeklampsia Berat (PEB) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum. . *Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung, IV(1)*, 36-40. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.33862/citradelima.v4i1.98>
- Mendri NK, P. A. (2017). *Asuhan keperawatan pada anak sakit dan bahaya resiko tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mongdong, V. A. (2021). Studi Faktor Risiko Preeklamsi terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD dr. Sayidiman Magetan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma, X(1)*, 11.
- Muliahari, M. S. (2022). Relationship between Premature Birth and Asphyxia in Newborn Babies. *International Journal of Current Science Research and Review, V(VI)*. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i6-45>
- Noormartany, Azhali, B. A., Perdani, A. I. (2019). Perbandingan Kadar Bilirubin Total pada Bayi Laki -Laki dan Perempuan dengan Neonatal Hiperbilirubinemia di RSUD AL-Ihsan Kabupaten Bandung. *Prosiding Pendidikan Dokter. 5(1)*.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pratiwi, A. M. (2019). *Patologi Kehamilan: Memahami berbagai penyakit dan komplikasi* . Pustaka Baru Press.
- Prawirohardjo, S. (2014). *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Pt. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Primasdika, R., Titi M., Riza A., & Sri S. (2023). Analisis Faktor Hiperbilirubinemia pada Bayi Di RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo. *Midwifery Care Journal. 4(4):131-142*.
- Rafi, S. K. (2019). Prediction of neonatal hyperbilirubinemia by cord blood analysis to diagnose subsequent hyperbilirubinemia. *International Journal of Contemporary Pediatrics, IV(6)*, 1658. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20192772>
- Ridha, H. N. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Anak* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Risikesdas. (2015). Riset Kesehatan Dasar.

Sarifuddin, M. J., Asriani, Fauziah, H., & Gama, A., W. (2023). Hubungan Hipertensi pada Ibu Hamil dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Salewangan Kabupaten Maros Tahun 2018-2019. *Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains (JKS)*. 5(1):18-22. <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jiks>

Shihab, M. Q. (2006). Tafsir Al-Misbah.

Sriram, G. &. (2019). Predictive value of serum bilirubin level for identifying term neonates at risk for subsequent hyperbilirubinemia. *International Journal of Contemporary Pediatrics*, IV(5), 1914. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.18203/2349-3291.ijcp20193626>

ST. Hadijah, Yunus, P., Rahim, R. (2021). Hubungan Daerah Tempat Tinggal Dengan Status Gizi Anak di Kabupaten Bantaeng Periode Januari-Desember 2019. *Al-Iqra Medical Journal : Jurnal Berkala Ilmiah Kedokteran*. 5(1):22-29.

Sudarti. (2014). *Pathologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Neonatus Resiko Tinggi*. Jakarta: Nuha Medika.

Sudirman, N. A., et al. 2024. Hubungan ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Balita 6-24 Bulan. *Alami Journal: Alauddin Islamic Medical Journal*. 8(1): 1-7.

Sulaksana, W., Parwata, S., Putra, P. J., Kardana, M., Artana, W. D., & Sukmawati, M. (2019). The characteristic of neonatal hyperbilirubinemia before and after phototherapy at Sanglah Hospital , Denpasar , Bali in 2017. 10(2), 309–312. <https://doi.org/10.15562/ism.v10i2.312>

UNICEF, WHO, & WBO. (2020). Levels & Trends in Child Mortality Report 2020. In UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (UN-Igme). <https://www.unicef.org/media/79371/file/UN-IGME-child-mortality-report-2020.pdf>

Vina, E. (2019). Hubungan Umur Ibu Dan Paritas Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Al-Insyirah Midwifery. Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 73–77. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.35328/k>

Williamson, K. (2013). *Buku Ajar Asuhan Neonatus*. Jakarta: Buku Kedokteran.

- Wulan, R. C. (2019). Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Tahun 2019. *Journal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)*, II(2), 136–143.
- Yeviza Puspitasari. (2020). Kejadian Hiperbilirubinemia Ditinjau dari Berat Badan Lahir. *Cendekia Medika*, 5(1), 36–42.
<https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v5i1.18>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Master Tabel

No	Nomor RM	Inisial	Usia Neonatus	Jenis Kelamin	Diagnosa Asfiksia	Hasil Lab. Bilirubin			Diagnosa Hiperbilirubinemia
						Indirek	Direk	Total	
1.	101136	By. B Ny. SHA	0-14 hari	L	Tidak	15,51	0,39	15,9	Ya
2.	101334	By. B Ny. EF	0-14 hari	L	Tidak	10,07	14,56	24,63	Ya
3.	102848	By. B Ny. AANI GI	0-14 hari	L	Tidak	18,55	0,6	19,15	Ya
4.	102851	By. B Ny. AANI GII	0-14 hari	L	Tidak	16,31	0,49	16,8	Ya
5.	102827	By. B Ny. IAP	0-14 hari	L	Tidak	19,6	0,52	20,12	Ya
6.	105256	By. B Ny. SSA	15-28 hari	L	Tidak	20,62	1,05	21,67	Ya
7.	102436	By. NSPA	15-28 hari	P	Tidak	18,26	0,34	18,76	Ya
8.	101632	By. B Ny. MW	0-14 hari	P	Tidak	15,73	0,43	16,16	Ya
9.	102922	By. B Ny. MNAI	0-14 hari	P	Tidak	15,82	0,31	16,13	Ya
10.	100621	By. B Ny. SM	0-14 hari	L	Tidak	23,01	0,69	23,7	Ya
11.	100601	By. B Ny. AL	0-14 hari	P	Tidak	11,89	0,29	12,18	Ya
12.	101815	By. B Ny. HS	0-14 hari	L	Tidak	13,13	0,57	13,7	Ya
13.	103388	By. B Ny. DW	15-28 hari	P	Tidak	14,24	0,63	14,87	Ya
14.	106446	By. AGAI	15-28 hari	L	Tidak	13,61	0,36	14	Ya
15.	091724	By. B Ny. DS	0-14 hari	P	Tidak	19,2	0,6	19,8	Ya
16.	092633	By. MRK	0-14 hari	L	Tidak	19,52	0,35	19,87	Ya
17.	102191	By. B Ny. RIR	0-14 hari	L	Tidak	18,15	0,59	18,74	Ya
18.	102092	By. B Ny. SS	0-14 hari	P	Tidak	16,77	0,57	17,34	Ya
19.	102342	By. ACR	0-14 hari	L	Tidak	10,5	0,32	10,82	Ya
20.	102297	By. DSY	0-14 hari	L	Tidak	19,6	0,63	20,23	Ya
21.	102241	By. MAA	0-14 hari	L	Tidak	18,77	0,58	19,35	Ya
22.	102230	By. B Ny. AM	0-14 hari	L	Tidak	18,73	0,47	19,2	Ya
23.	100760	By. FM	0-14 hari	L	Tidak	21,34	0,4	21,74	Ya
24.	100778	By. ABA	0-14 hari	L	Tidak	15,01	0,28	15,29	Ya
25.	100788	By. B Ny. NAMF	0-14 hari	L	Tidak	28,29	0,56	28,85	Ya
26.	100849	By. B Ny. SFA	0-14 hari	P	Tidak	19,2	0,57	19,77	Ya
27.	100853	By. IHA	0-14 hari	L	Tidak	22,46	0,68	23,14	Ya
28.	100881	By. B Ny. ROT	0-14 hari	L	Tidak	21,74	0,43	22,17	Ya
29.	100902	By. B. Ny. NM	0-14 hari	L	Tidak	23,63	0,7	24,33	Ya
30.	101005	By. NHS	0-14 hari	P	Tidak	18,83	0,57	19,4	Ya
31.	101068	By. ADQ	0-14 hari	P	Tidak	14,17	0,39	14,56	Ya
32.	101010	By. AM	0-14 hari	P	Tidak	14,27	0,42	14,69	Ya
33.	101015	By. B Ny. IDM	0-14 hari	L	Tidak	14,09	0,47	14,56	Ya
34.	105809	By. MGQ	0-14 hari	L	Tidak	18,29	0,38	18,67	Ya
35.	104992	By. B Ny. MA	0-14 hari	L	Tidak	12,65	0,47	13,12	Ya
36.	104879	By. MRF	0-14 hari	L	Tidak	11,66	0,54	12,2	Ya
37.	105690	by. B ny. ML	15-28 hari	P	Tidak	19,94	0,42	20,36	Ya
38.	104740	By. B Ny. SAA	0-14 hari	L	Tidak	15,37	0,35	15,72	Ya
39.	104659	By. B Ny. HS	0-14 hari	L	Tidak	17,93	0,43	18,36	Ya
40.	104656	By. MAA	0-14 hari	L	Tidak	18,49	0,63	19,12	Ya
41.	104633	By. B Ny. SJ	0-14 hari	L	Tidak	15,18	0,35	15,53	Ya
42.	105504	By. B Ny. RS	0-14 hari	P	Tidak	15,64	0,32	15,96	Ya

43.	105196	By. B Ny. SR	0-14 hari	P	Tidak	18,91	1,11	20,02	Ya
44.	106316	By. B Ny. RAP	0-14 hari	L	Tidak	10,92	0,72	11,64	Ya
45.	106273	By. B Ny. AUD	0-14 hari	P	Tidak	15,36	0,3	15,66	Ya
46.	106268	By. B Ny. NAKS	0-14 hari	P	Tidak	16,54	0,35	16,89	Ya
47.	103698	By. NNI	15-28 hari	L	Tidak	6,72	0,51	7,23	Ya
48.	105933	By. B Ny. HRE	0-14 hari	P	Tidak	15,48	1,36	16,84	Ya
49.	107052	By. B Ny. AA	0-14 hari	P	Tidak	13,01	0,41	13,42	Ya
50.	106990	By. AMRR	0-14 hari	L	Tidak	18,17	0,66	18,83	Ya
51.	106968	By. MAAR	0-14 hari	L	Tidak	11,9	0,51	12,41	Ya
52.	106922	By. LSI	0-14 hari	P	Tidak	10,96	1,1	12,06	Ya
53.	106920	By. LSI	0-14 hari	P	Tidak	17,07	0,85	17,92	Ya
54.	106916	By. RAM	0-14 hari	P	Tidak	11,81	0,43	12,24	Ya
55.	106853	By. B Ny. YM	0-14 hari	L	Tidak	11,5	3,4	14,9	Ya
56.	107170	By. B Ny. SFA	0-14 hari	L	Tidak	13,36	0,47	13,83	Ya
57.	107102	By. B Ny. TSS	0-14 hari	L	Tidak	14,39	0,57	14,96	Ya
58.	107062	By. NK	0-14 hari	L	Tidak	14,1	0,31	14,41	Ya
59.	105842	By. B Ny. IF	0-14 hari	L	Tidak	15,45	0,43	15,88	Ya
60.	105865	By. B Ny. RC	0-14 hari	L	Tidak	15,98	0,76	16,74	Ya
61.	106767	By. B Ny. NR	0-14 hari	L	Tidak	13,18	0,26	13,44	Ya
62.	101675	By. B Ny. KN	0-14 hari	L	Tidak	14,98	0,38	15,36	Ya
63.	101609	By. B Ny. RM	0-14 hari	L	Tidak	22,75	0,77	23,52	Ya
64.	101602	By. B Ny. NN	0-14 hari	P	Tidak	16,6	0,55	17,15	Ya
65.	104322	By. MA	0-14 hari	L	Tidak	17,89	0,45	18,34	Ya
66.	106478	By. B Ny. AAU	0-14 hari	L	Tidak	14,9	0,32	15,22	Ya
67.	106461	By. B Ny. RA	0-14 hari	P	Tidak	21,18	0,66	21,84	Ya
68.	106402	By. B Ny. NR	0-14 hari	L	Tidak	16,21	0,71	16,92	Ya
69.	106525	By. KAH	0-14 hari	P	Tidak	18,03	0,4	18,43	Ya
70.	105806	By. B Ny. JA	0-14 hari	L	Tidak	20,14	0,53	20,67	Ya
71.	105370	By. CPI	0-14 hari	P	Tidak	10,31	0,28	10,59	Ya
72.	105220	By. B Ny. TDL	0-14 hari	L	Tidak	20,62	0,78	21,4	Ya
73.	104903	By. B Ny. II	0-14 hari	L	Tidak	15,16	0,89	16,05	Ya
74.	104814	By. B Ny. SK	0-14 hari	P	Tidak	18,03	0,38	18,41	Ya
75.	104668	By. B Ny. NFN	0-14 hari	P	Tidak	20,92	0,68	21,6	Ya
76.	104356	By. B Ny. AP	0-14 hari	P	Tidak	19,52	0,49	20,01	Ya
77.	104332	By. MQAS	0-14 hari	L	Tidak	19,91	0,56	20,47	Ya
78.	104271	By. B Ny. RAA	0-14 hari	L	Tidak	16,43	0,41	16,84	Ya
79.	104260	By. B Ny. WGM	0-14 hari	L	Tidak	20,12	0,41	20,53	Ya
80.	104087	By. B Ny. WRL	0-14 hari	P	Tidak	19,99	0,54	20,53	Ya
81.	104082	By. B Ny. MG	0-14 hari	P	Tidak	20,32	0,4	20,72	Ya
82.	103843	By. B Ny. AMY	0-14 hari	L	Tidak	20,32	0,63	20,95	Ya
83.	103741	By. B Ny. SHS	0-14 hari	L	Tidak	17,04	0,45	17,49	Ya
84.	103707	By. B Ny. FH	0-14 hari	L	Tidak	15,2	0,49	15,68	Ya
85.	103580	By. B Ny. FFS	0-14 hari	L	Tidak	20,18	0,21	20,39	Ya
86.	103179	By. B Ny. SU	0-14 hari	L	Tidak	18,74	0,49	19,23	Ya
87.	101821	By. B Ny. LMS	0-14 hari	L	Tidak	14,96	0,67	15,63	Ya
88.	101316	By. B Ny. DNS	0-14 hari	L	Tidak	21,93	0,65	22,58	Ya
89.	105786	By. B Ny. NS	0-14 hari	L	Tidak	22,74	0,76	23,5	Ya
90.	100360	By. B Ny. AUW	0-14 hari	L	Tidak	10,94	0,33	11,27	Ya

91.	100510	By. SSAA	0-14 hari	P	Tidak	12,91	0,42	13,33	Ya
92.	099751	By. B Ny. ROR	0-14 hari	L	Tidak	14,71	0,33	15,04	Ya
93.	099718	By. B Ny. F	0-14 hari	L	Tidak	17,09	0,32	17,41	Ya
94.	099640	By. MQA	0-14 hari	L	Tidak	15,66	0,36	16,02	Ya
95.	099538	By. B Ny. FY	0-14 hari	L	Tidak	12,75	0,65	13,40	Ya
96.	099420	By. ASH	0-14 hari	P	Tidak	11,26	0,23	11,49	Ya
97.	094628	By. B Ny. MM	0-14 hari	P	Ya	15,03	0,69	15,72	Ya
98.	098809	By. RAZ	0-14 hari	P	Ya	14,94	0,70	15,64	Ya
99.	093274	By. B Ny. DNA	0-14 hari	P	Ya	14,94	0,70	15,64	Ya
100.	101998	By. B Ny. RIM	0-14 hari	P	Ya	8,42	0,40	8,82	Ya
101.	094940	By. B Ny. FNH	0-14 hari	L	Tidak	12,93	0,61	13,54	Ya
102.	094683	By. B Ny. RR	0-14 hari	L	Tidak	16,04	0,72	16,76	Ya
103.	092260	By. B Ny. RIPU	0-14 hari	L	Tidak	13,00	0,38	13,38	Ya
104.	092443	By. B Ny. DMM	0-14 hari	P	Tidak	12,72	0,30	13,02	Ya
105.	092584	By. API	0-14 hari	P	Tidak	14,54	0,86	15,40	Ya
106.	092619	By. ANY	0-14 hari	L	Tidak	11,05	0,53	11,58	Ya
107.	092715	By. B Ny. ASM	0-14 hari	L	Tidak	10,03	0,41	10,44	Ya
108.	092850	By. B Ny. ST GI	0-14 hari	L	Tidak	14,43	0,62	15,05	Ya
109.	092851	By. B Ny. ST GII	0-14 hari	L	Tidak	17,31	0,52	17,83	Ya
110.	092940	By. B Ny. ALA	0-14 hari	L	Tidak	11,58	0,71	12,29	Ya
111.	092949	By. ALI	0-14 hari	P	Tidak	11,39	0,44	11,83	Ya
112.	092592	By. B Ny. NS	0-14 hari	L	Tidak	16,42	0,41	16,83	Ya
113.	092964	By. AAH	0-14 hari	P	Tidak	14,36	0,95	15,31	Ya
114.	093044	By. NAH	0-14 hari	P	Tidak	14,89	0,40	15,29	Ya
115.	093067	By. AAG	0-14 hari	L	Tidak	13,78	0,59	14,37	Ya
116.	093096	By. B Ny. RMS	0-14 hari	P	Tidak	11,76	0,63	12,39	Ya
117.	092742	By. B Ny. RD	0-14 hari	P	Tidak	14,35	0,68	15,03	Ya
118.	093123	By. B Ny. MF	0-14 hari	L	Tidak	9,79	0,40	10,19	Ya
119.	093171	By. GJF	0-14 hari	P	Tidak	12,32	0,40	12,72	Ya
120.	093273	By. B Ny. IA	0-14 hari	L	Tidak	18,38	0,39	18,77	Ya
121.	095784	By. B Ny. NN	0-14 hari	L	Tidak	14,41	0,56	14,97	Ya
122.	093285	By. B Ny. SAOE	0-14 hari	L	Tidak	7,34	0,32	7,66	Ya
123.	093293	By. B Ny. NOS	0-14 hari	L	Tidak	16,79	0,50	17,29	Ya
124.	093026	By. NEJ	0-14 hari	P	Tidak	10,9	0,32	11,22	Ya
125.	093424	By. B Ny. S	0-14 hari	L	Tidak	13,86	0,72	32,58	Ya
126.	093438	By. B Ny. RN GII	0-14 hari	P	Tidak	15,17	0,54	15,71	Ya
127.	093572	By. B Ny. MM	0-14 hari	L	Tidak	18,9	0,45	19,35	Ya
128.	095092	By. DAFS	0-14 hari	L	Tidak	11,8	1,20	13,00	Ya
129.	093724	By. B Ny. HA	0-14 hari	L	Tidak	19,96	1,40	21,36	Ya
130.	095150	By. B Ny. SN	0-14 hari	P	Tidak	19,87	0,63	20,5	Ya
131.	093264	By. B Ny. NR	0-14 hari	L	Tidak	13,05	0,56	13,61	Ya
132.	095044	By. B Ny. RG	0-14 hari	L	Tidak	15,76	0,47	16,23	Ya
133.	095202	By. NFR	0-14 hari	P	Tidak	13,25	0,72	13,97	Ya
134.	095222	By. B Ny. IA	0-14 hari	P	Tidak	12,77	0,35	13,12	Ya
135.	095295	By. B Ny. IP	0-14 hari	L	Tidak	7,82	0,28	8,10	Ya
136.	093713	By. B Ny. CD	0-14 hari	L	Tidak	11,12	0,40	11,52	Ya
137.	093784	By. RAU	0-14 hari	P	Tidak	16,28	0,55	16,83	Ya
138.	094091	By. B Ny. D	0-14 hari	L	Tidak	17,38	0,56	17,94	Ya

139.	095309	By. B Ny. MRS	0-14 hari	P	Tidak	21,06	0,41	21,47	Ya
140.	095911	By. B Ny. AM	0-14 hari	L	Tidak	14,77	0,45	15,22	Ya
141.	095510	By. B Ny. FM	0-14 hari	P	Tidak	18,96	0,72	19,68	Ya
142.	095247	By. AHA	0-14 hari	L	Tidak	7,27	0,26	7,53	Ya
143.	094284	By. MFA	0-14 hari	P	Tidak	12,22	0,33	12,55	Ya
144.	094380	By. AHS	0-14 hari	L	Tidak	23,06	0,48	23,54	Ya
145.	094508	By. BNA	0-14 hari	L	Tidak	13,99	0,39	14,38	Ya
146.	094714	By. B Ny. II	0-14 hari	L	Tidak	13,42	0,70	14,12	Ya
147.	095411	By. B Ny. MM	0-14 hari	P	Tidak	15,09	0,39	15,48	Ya
148.	095623	By. B Ny. TWP	0-14 hari	L	Tidak	10,45	0,32	10,77	Ya
149.	094766	By. B Ny. IY GI	0-14 hari	L	Tidak	14,15	0,25	14,40	Ya
150.	094767	By. B Ny. IY GII	0-14 hari	L	Tidak	13,67	0,39	14,06	Ya
151.	095672	By. B Ny. DRH	0-14 hari	L	Tidak	17,01	0,53	17,54	Ya
152.	095694	By. B Ny. RA	0-14 hari	P	Tidak	10,01	0,45	10,46	Ya
153.	094912	By. B Ny. MR	0-14 hari	L	Tidak	10,89	0,45	11,34	Ya
154.	091881	By. B Ny. AA	0-14 hari	L	Tidak	9,94	0,54	10,48	Ya
155.	102829	By. B Ny. JH	0-14 hari	L	Tidak	18,45	0,54	18,99	Ya
156.	101568	By. B Ny. AAQ	0-14 hari	L	Tidak	20,84	0,41	21,25	Ya
157.	101453	By. B Ny. R	0-14 hari	P	Tidak	25,43	0,82	26,25	Ya
158.	103480	By. B Ny. SP	0-14 hari	L	Tidak	22,42	0,78	23,2	Ya
159.	101669	By. B Ny. RR	0-14 hari	L	Tidak	8,57	0,68	9,19	Ya
160.	101832	By. B Ny. SIS	0-14 hari	P	Tidak	17,09	0,62	17,71	Ya
161.	101853	By. AMS	0-14 hari	P	Tidak	18,99	0,83	19,82	Ya
162.	092103	By. B Ny. NKK	0-14 hari	L	Tidak	16,48	0,35	16,83	Ya
163.	091662	By. ZR	0-14 hari	P	Tidak	19,39	0,26	19,65	Ya
164.	092770	By. B Ny. AA	0-14 hari	L	Tidak	19,81	0,4	20,21	Ya
165.	095784	By. B Ny. NN	0-14 hari	L	Tidak	17,26	1,25	18,51	Ya
166.	104855	By. AA	0-14 hari	P	Tidak	20,76	0,45	21,24	Ya
167.	106135	By. B Ny. DL	0-14 hari	L	Tidak	19,96	0,72	20,68	Ya
168.	106551	By. B Ny. FP	0-14 hari	P	Tidak	18,82	0,82	19,64	Ya
169.	103579	By. B Ny. NM	0-14 hari	L	Tidak	11,87	0,57	12,44	Ya
170.	103577	By. RZAJ	0-14 hari	L	Tidak	20,68	0,31	20,99	Ya
171.	103493	By. QS	0-14 hari	L	Tidak	19,7	0,74	20,44	Ya
172.	103192	By. B Ny. NRP	0-14 hari	P	Tidak	19,16	0,57	19,73	Ya
173.	103182	By. ARS	0-14 hari	L	Tidak	19,87	0,58	20,45	Ya
174.	103579	By. B Ny. NM	0-14 hari	L	Tidak	20,43	0,49	20,92	Ya
175.	103577	By. RZAJ	0-14 hari	L	Tidak	14,15	0,48	14,63	Ya
176.	103493	By. QS	0-14 hari	L	Tidak	19,35	0,56	19,91	Ya
177.	103192	By. B Ny. NRP	0-14 hari	P	Tidak	20,21	0,45	20,66	Ya
178.	103182	By. ARS	0-14 hari	L	Tidak	23,62	0,34	23,96	Ya
179.	103579	By. B Ny. NM	0-14 hari	L	Tidak	16,86	0,47	17,33	Ya
180.	103577	By. RZAJ	0-14 hari	L	Tidak	20,45	1,14	21,59	Ya
181.	103493	By. QS	0-14 hari	L	Tidak	15,03	0,48	15,51	Ya
182.	103192	By. B Ny. NRP	0-14 hari	P	Tidak	15,15	0,75	15,9	Ya
183.	103182	By. ARS	0-14 hari	L	Tidak	19,56	0,94	20,5	Ya
184.	103579	By. B Ny. NM	0-14 hari	L	Tidak	19,5	0,58	20,08	Ya
185.	101818	By. MNAF	0-14 hari	P	Tidak	12,64	0,47	13,11	Ya
186.	100532	By. MAS	0-14 hari	L	Tidak	21,43	0,38	21,81	Ya

187.	101247	By. B Ny. FH	0-14 hari	L	Tidak	23,85	1,17	25,02	Ya
188.	101217	By. AFN	15-28 hari	L	Tidak	20,05	0,56	20,61	Ya
189.	101157	By. B Ny. AAB	0-14 hari	L	Tidak	20,73	0,47	21,2	Ya
190.	100782	By. B Ny. AFH	0-14 hari	L	Tidak	20,23	0,33	20,56	Ya
191.	100780	By. B Ny. NFS	0-14 hari	P	Tidak	19,44	0,26	19,7	Ya
192.	100732	By. NLA	0-14 hari	P	Tidak	30,68	0,26	30,94	Ya
193.	100597	By. B Ny. WA	0-14 hari	P	Tidak	24,33	0,52	24,85	Ya
194.	105735	By. B Ny. AS	0-14 hari	L	Tidak	14,31	0,34	14,65	Ya
195.	105747	By. B. Ny. MDL	0-14 hari	L	Tidak	15,22	0,63	15,85	Ya
196.	100074	By. B Ny. FM	0-14 hari	P	Tidak	13,41	0,43	13,84	Ya
197.	100123	By. MRAYF	0-14 hari	L	Tidak	8,66	0,38	9,04	Ya
198.	099826	By. B Ny. PAD	0-14 hari	L	Tidak	15,36	0,63	15,99	Ya
199.	099838	By. MADS	0-14 hari	L	Tidak	20	0,50	20,5	Ya
200.	099511	By. B Ny. SC	0-14 hari	L	Tidak	19,05	0,01	19,06	Ya
201.	099395	By. SNAF	0-14 hari	P	Tidak	17,22	0,35	17,57	Ya
202.	099689	By. B Ny. TNC	0-14 hari	P	Tidak	16,26	0,51	16,77	Ya
203.	098819	By. AFP	0-14 hari	L	Tidak	12,16	0,42	12,58	Ya
204.	101547	By. B Ny. RHF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
205.	101549	By. B Ny. SHS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
206.	101552	By. B Ny. AA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
207.	105511	By. B Ny. HS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
208.	105581	By. B Ny. AFM	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
209.	105598	By. B Ny. NR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
210.	105613	By. B Ny. HM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
211.	105632	By. B Ny. NAPS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
212.	105698	By. B Ny. EAR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
213.	105699	By. B Ny. NS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
214.	105718	By. B Ny. SA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
215.	105727	By. B Ny. NA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
216.	105748	By. B Ny. ALB	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
217.	105749	By. B Ny. NAS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
218.	105752	By. B Ny. NI	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
219.	105763	By. B Ny. SS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
220.	105789	By. B Ny. RA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
221.	105614	By. B Ny. SWB	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
222.	105570	By. B Ny. AAR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
223.	105569	By. B Ny. HN	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
224.	105566	By. B Ny. SAH	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
225.	105431	By. B Ny. RF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
226.	105415	By. B Ny. HI	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
227.	105360	By. B Ny. PRH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
228.	105356	By. B Ny. DP	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
229.	105342	By. B Ny. MA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
230.	105340	By. B Ny. MR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
231.	105322	By. B Ny. NSFF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
232.	105325	By. B Ny. MPP	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
233.	105292	By. B Ny. FS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
234.	105289	By. B Ny. NA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak

235.	105273	By. B Ny.SS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
236.	105272	By. B Ny. ANZ	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
237.	105265	By. B Ny. RW	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
238.	105256	By. B Ny. SSA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
239.	102966	By. B Ny. HAA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
240.	102968	By. B Ny. Pt	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
241.	102976	By. B Ny. FF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
242.	102978	By. B Ny. YH	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
243.	102977	By. B. Ny. SDS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
244.	102979	By. B Ny. IFA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
245.	102985	By. B Ny. MR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
246.	102989	By. B Ny. IPS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
247.	102990	By. B Ny. IY	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
248.	102997	By. B Ny. SS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
249.	102643	By. B Ny. NA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
250.	102828	By. B Ny. SAS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
251.	101617	By. B Ny. NFA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
252.	101375	By. B. Ny. HT	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
253.	103120	By. B. Ny. MFF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
254.	103116	By. B Ny. GAF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
255.	103115	By. B Ny. FAS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
256.	103114	By. B Ny. SEA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
257.	103113	By. B Ny. ES	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
258.	103099	By. B Ny. EM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
259.	103098	By. B Ny. IT	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
260.	103094	By. B Ny. FA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
261.	103007	By. B Ny. SH	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
262.	103003	By. B Ny. TA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
263.	103243	By. B Ny. NA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
264.	103132	By. B Ny. DK	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
265.	103130	By. B Ny. DN	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
266.	103128	By. B Ny. ANK	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
267.	103126	By. B Ny. DAM	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
268.	103123	By. B Ny. WA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
269.	103121	By. B Ny. FE	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
270.	103168	By. B Ny. AS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
271.	103164	By. B Ny. RR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
272.	103163	By. B Ny. DA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
273.	103162	By. B Ny. DRA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
274.	103161	By. B Ny. SR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
275.	103158	By. B Ny. SDA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
276.	103157	By. B Ny. MM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
277.	103203	By. B Ny. ASK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
278.	103200	By. B Ny. AAA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
279.	103197	By. B ny. SZK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
280.	103194	By. B Ny. AA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
281.	103175	By. B Ny. YKM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
282.	103169	By. B Ny. RIR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak

283.	103112	By. B Ny. SH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
284.	103111	By. B Ny. RT	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
285.	103106	By. B Ny. YPA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
286.	103104	By. B Ny. NA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
287.	103103	By. B Ny. MAS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
288.	103028	By. B Ny. NI	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
289.	103027	By. B Ny. FK	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
290.	103025	By. B Ny. AS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
291.	103016	By. B Ny. FR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
292.	103010	By. B Ny. AN	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
293.	103047	By. B Ny. IK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
294.	103040	By. B Ny. IS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
295.	103032	By. B Ny. ZS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
296.	103031	By. B Ny. KWF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
297.	103030	By. B Ny. IR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
298.	103083	By. B Ny. MY	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
299.	103074	By. B Ny. TS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
300.	103067	By. B Ny. RY	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
301.	103061	By. B Ny. HH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
302.	103059	By. B Ny. ADN	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
303.	103058	By. B Ny. SS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
304.	103056	By. B Ny. SHB	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
305.	103055	By. B Ny. RS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
306.	103057	By. B Ny. FR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
307.	103054	By. B Ny. ASE	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
308.	106567	By. B Ny. JH	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
309.	101678	By. B Ny. NW	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
310.	101672	By. B Ny. GK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
311.	101661	By. B Ny. MR	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
312.	101659	By. B Ny. SH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
313.	101658	By. B Ny. IK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
314.	101655	By. B Ny. NA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
315.	101651	By. B Ny. APA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
316.	101648	By. B Ny. IN	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
317.	101647	By. B Ny. NAL	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
318.	101645	By. B Ny. HT	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
319.	101644	By. B Ny. SCB	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
320.	101642	By. B Ny. FWJ	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
321.	101635	By. B Ny. FAN	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
322.	101634	By. B Ny. FS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
323.	101629	By. B Ny. IMS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
324.	101628	By. B Ny. HH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
325.	101623	By. B Ny. FRI	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
326.	101618	By. B Ny. DA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
327.	101617	By. B Ny. NF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
328.	101616	By. B Ny. FN	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
329.	101507	By. B Ny. AIA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
330.	101505	By. B Ny. RF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak

331.	101498	By. B Ny. FVR	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
332.	101497	By. B Ny. YD	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
333.	101490	By. B Ny. SS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
334.	101542	By. B Ny. IK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
335.	101544	By. B Ny. AST	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
336.	093142	By. B Ny. AA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
337.	093411	By. B Ny. NRI	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
338.	093440	By. B Ny. NIP	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
339.	093457	By. B Ny. SRA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
340.	093642	By. B Ny. SF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
341.	093767	By. B Ny. ASA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
342.	093813	By. B Ny. HA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
343.	093822	By. B Ny. DWA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
344.	094028	By. B Ny. DIM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
345.	094054	By. DRS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
346.	094146	By. B Ny. UK	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
347.	094156	By. B Ny. IAM	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
348.	094209	By. B Ny. UDM	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
349.	094503	By. B Ny. AP	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
350.	094527	By. B Ny. JS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
351.	094532	By. B Ny. MY	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
352.	094754	By. B Ny. VE	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
353.	095141	By. B Ny. NIS	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
354.	095329	By. GTA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
355.	095335	By. MRES	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
356.	095486	By. B Ny. MY	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
357.	095546	By. AI	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
358.	095856	By. B Ny. NY	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
359.	095950	By. B Ny. NH	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
360.	096009	By. B Ny. JY	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
361.	096996	By. B Ny. RI	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
362.	097003	By. GAK	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
363.	097359	By. B Ny. NF	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
364.	097449	By. B Ny. WA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
365.	097979	By. B Ny. RS	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
366.	098207	By. B Ny. NM GI	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
367.	098208	By. B Ny. NM GII	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
368.	099075	By. MAA	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
369.	099223	By. B Ny. RA	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
370.	099238	By. B Ny. NF	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
371.	099700	By. B Ny. MIH	0-14 hari	L	Tidak	-	-	-	Tidak
372.	099994	By. B Ny. LD	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak
373.	100249	By. B Ny. RK	0-14 hari	P	Tidak	-	-	-	Tidak

Lampiran 2 Hasil SPSS

1. Uji Univariat

		Statistics		
		Diagnosa Hiperbilirubinemia	Asfiksia	Jenis Kelamin
N	Valid	373	373	373
	Missing	0	0	0

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	170	45.6	45.6	45.6
	Ya	203	54.4	54.4	100.0
	Total	373	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	207	55.5	55.5	55.5
	Perempuan	166	44.5	44.5	100.0
	Total	373	100.0	100.0	

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	369	98.9	98.9	98.9
	Ya	4	1.1	1.1	100.0
	Total	373	100.0	100.0	

2. Uji Bivariat

a. Jenis kelamin

Crosstab

		Diagnosa Hiperbilirubinemia		Total	
		Tidak	Ya		
Jenis Kelamin	Laki-laki	Count	80	127	207
		Expected Count	94.3	112.7	207.0
	Perempuan	Count	90	76	166
		Expected Count	75.7	90.3	166.0
Total		Count	170	203	373
		Expected Count	170.0	203.0	373.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.003 ^a	1	.003		
Continuity Correction ^b	8.386	1	.004		
Likelihood Ratio	9.024	1	.003		
Fisher's Exact Test				.003	.002
Linear-by-Linear Association	8.979	1	.003		
N of Valid Cases	373				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 75.66.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jenis Kelamin (Laki-laki / Perempuan)	.532	.352	.805
For cohort Diagnosa Hiperbilirubinemia = Tidak	.713	.571	.889
For cohort Diagnosa Hiperbilirubinemia = Ya	1.340	1.100	1.633
N of Valid Cases	373		

b. Asfiksia

Crosstab

		Diagnosa Hiperbilirubinemia		Total	
		Tidak	Ya		
Asfiksia	Tidak	Count	170	199	369
		Expected Count	168.2	200.8	369.0
	Ya	Count	0	4	4
		Expected Count	1.8	2.2	4.0
Total		Count	170	203	373
		Expected Count	170.0	203.0	373.0

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	3.386 ^a	1	.066		
Continuity Correction ^b	1.783	1	.182		
Likelihood Ratio	4.903	1	.027		
Fisher's Exact Test				.129	.087
Linear-by-Linear Association	3.377	1	.066		
N of Valid Cases	373				


a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.82.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort Diagnosa Hiperbilirubinemia = Ya	.539	.491	.593
N of Valid Cases	373		

Lampiran 3 Etik Penelitian


KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H.M. Yasin Lango No. 36, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, Telp. 081210916364, E-mail: kepk.rik@uim-alauddin.ac.id

KETERANGAN LAYAK ETIK
ETHICAL CLEARANCE
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION/EXPEDITED/FULLBOARD
"ETHICAL EXEMPTION"
No: E.017/KEPK/FKIK/I/2023

Protokol penelitian yang diajukan oleh:
The research protocol proposed by

Peneliti utama: **Asriid Putri Shafira**
Principal Investigator

Nama Institusi: **UIN Alauddin Makassar**
Name of the Institution


Dengan judul:
Title
"Hubungan Jenis Kelamin dan Asfiksia dengan Kejadian Hiperbilirubinemia pada Neonatus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2022"
"The Relationship between Gender And Asphyxia with The Incident Of Hyperbilirubinemia in Neonates at Ananda Mother and Child Hospital Makassar in 2022"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Manfaat/Exploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefit, 4) Risk, 5) Permission/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2024.

This declaration of ethics applies during the period November 27, 2023 until November 27, 2024.


November 27, 2023
Chairperson and Chairperson
DR. Hj. Genny Susety Hidayat, M.Si., Apt.

Lampiran 4 Izin Penelitian

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231		
Nomor	: 28201/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	
di- Tempat		
Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-5120/Un.06/LP2M/PP.00.9/10/2023 tanggal - perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:		
N a m a	: ASTRID PUTRI SHAFIRA	
Nomor Pokok	: 70600119045	
Program Studi	: Kedokteran	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang polong-Gowa	
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :		
" HUBUNGAN JENIS KELAMIN DAN ASFIKZIA DENGAN KEJADIAN HIPERBILIRUBINEMIA PADA NEONATUS DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2022 "		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 24 Oktober s/d 31 Desember 2023		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.		
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 24 Oktober 2023		
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN		
		
ASRUL SANI, S.H., M.Si. Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008		
Tembusan Yth		
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;		
2. <i>Pertinggal.</i>		

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57 (Lama - Jl. Landak Baru No 63) Makassar

Telp. +62411 - 874596, Fax. +62411 - 853694

Email : sekretarat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor. 447/RSIA-A/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Divisi Tata Usaha & Diklat Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, menerangkan bahwa:

Nama : Astrid Putri Shafira
NIM : 70600119045
Fakultas : FKIK/ UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Pendidikan Dokter

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, terhitung tanggal 24 Oktober – 31 Desember 2023 guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "HUBUNGAN JENIS KELAMIN DAN ASFIKSI DENGAN KEJADIAN HIPERBILIRUBINEMEMIA PADA NEONATUS DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2022"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 Desember 2023


Divisi Tata Usaha & Diklat

Rini Salitri, SST., M.Kes

Lampiran 6 Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Astrid Putri Shafira
2. NIM : 70600119045
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar/12 Desember 2000
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Andi Tonro Permai C.14/8
8. Orang Tua :
 - a. Ayah : Makhzuni
 - b. Ibu : Selvi

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Kakatua Makassar
2. SMP : SMP Negeri 3 Makassar
3. SMA : SMA Katolik Rajawali Makassar
4. Tahun 2019 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Dokter.