

**PENGARUH JENIS EMULGATOR TERHADAP AKTIVITAS DAN
STABILITAS FISIK KRIM TABIR SURYA EKSTRAK
ETANOL RIMPANG LEMPUYANG GAJAH
(*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.)**



70100118042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
M A K A S S A R
2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aeriqah Junaidi
Nim : 70100118042
Tempat/ Tgl. Lahir : Pare-pare/ 9 Januari 2001
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bumi Permata Sudiang
Judul : Pengaruh Jenis Emulgator Terhadap Aktivitas dan Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 23 februari 2023

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis



Aeriqah Junaidi
70100118042

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Emulgator Terhadap Aktivitas dan Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet (L) Roscoe ex sm.*)” yang disusun oleh Aeriqah Junaidi NIM: 70100118042, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis, **23 Februari 2023 M**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 Februari 2023

2 Sya'ban 1444

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dr. apt. Mukhriani., S.Si., M.Si	(.....)
Penguji I	: apt Nur Azizah Syahrana., M.Farm	(.....)
Penguji II	: Dra. Audah Mannan., M.Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


M A K A S S A R

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad Saw yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul **“Pengaruh Jenis Emulgator Terhadap Aktivitas dan Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.)”**, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Junaidi, S.E dan Dra. Hj. Juwita atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, do'a yang selalu terpanjatkan, dukungan semangat dan dukungan moril serta materilnya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Wahyuddin, M. Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Darussalam, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S. KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Haeria., S. Si., M. Si. selaku pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Apt. Mukhriani, S. Si., M. Si. selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan atau saran dalam tahap penyelesaian skripsi saya.
7. Dra. Audah Mannan, M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan serta tuntunan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi saya.
8. Bapak ibu panitia seminar selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.

9. Bapak Ibu Dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah Swt. membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Swt. Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 23 februari 2023

Penyusun,



AERIOAH JUNAIDI

NIM: 70100118042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	6
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	6
D. <i>Kajian Pustaka</i>	7
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	9
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. <i>Rimpang Lempuyang Gajah</i>	10
B. <i>Antioksidan</i>	12
C. <i>Tabir Surya</i>	13
D. <i>Sun Protection Factor (SPF)</i>	17
E. <i>Krim</i>	19
F. <i>Ekstraksi</i>	27
G. <i>Tinjauan Islam</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. <i>Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian</i>	35
B. <i>Pendekatan Penelitian</i>	35


C. <i>Sampel</i>	35
D. <i>Instrument Penelitian</i>	36
E. <i>Cara Kerja</i>	36
F. <i>Evaluasi Sediaan Krim</i>	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. <i>Hasil Penelitian</i>	43
B. <i>Pembahasan</i>	54
BAB V PENUTUP	62
A. <i>Kesimpulan</i>	62
B. <i>Saran</i>	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penggolongan potensi tabir surya	14
Tabel 2. Kefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF	18
Tabel 3. Normalized product function digunakan pada kalkulasi SPF (yulianti, 2015)	19
Tabel 4. Rancangan formula sediaan krim.....	37
Tabel 5. Formula I krim anionik	43
Tabel 6. Formula II krim anionik	44
Tabel 7. Formula III krim anionik	44
Tabel 8. Formula IV krim anionik	45
Tabel 9. Formula V krim anionik.....	45
Tabel 10. Formula VI krim anionik	46
Tabel 11. Panjang gelombang transmisi eritema I.....	47
Tabel 12. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula I.....	47
Tabel 13. Panjang gelombang transmisi eritema II.....	47
Tabel 14. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula II	48
Tabel 15. Panjang gelombang transmisi eritema formula III.....	48
Tabel 16. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula III.....	49
Tabel 17. Panjang gelombang transmisi eritema formula IV	49
Tabel 18. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula IV.....	49
Tabel 19. Panjang gelombang transmisi eritema formula V.....	50
Tabel 20. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula V	50
Tabel 21. Panjang gelombang transmisi eritema formula VI	51

Tabel 22. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula VI.....	51
Tabel 23. Tabel Uji Organoleptik	52
Tabel 24. Uji Homogenitas	52
Tabel 25. Uji pH.....	53
Tabel 26. Uji Daya Sebar.....	53
Tabel 27. Uji Vikositas	53
Tabel 28. Uji Daya Lekat.....	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria, 2015).....	11
Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SPF.....	46
Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Nilai %Te dan %Tp.....	52
Gambar 8. Bagan Alur Penelitian	67
Gambar 9. Proses Ekstraksi	68
Gambar 10. Pembuatan Krim Anionik.....	69
Gambar 11. Bagan Pembuatan Krim Nonionik	70
Gambar 12. Penentuan Nilai SPF	71
Gambar 13. Bagan Uji Organoleptis.....	72
Gambar 14. Bagan Uji Homogenitas	72
Gambar 15. Bagan Uji pH.....	73
Gambar 16. Bagan Uji Viskositas.....	73
Gambar 17. Bagan Uji Daya Sebar.....	74
Gambar 18. Bagan Uji Daya Lekat.....	75
Gambar 19. Potensi Tabir Surya.....	76
Gambar 20. Tanaman Lempuyang Gajah	84
Gambar 21. Hasil Uji SPF Formula I Anionik.....	85
Gambar 22. Kurva Hasil Uji SPF Formula I Anionik.....	85
Gambar 23. Hasil Uji SPF Formula II Anionik.....	86
Gambar 24. Kurva Hasil Uji SPF Formula II Anionik	86
Gambar 25. Hasil Uji SPF Formula III Anionik	87

Gambar 26. Kurva Hasil Uji SPF Formula III Anionik.....	87
Gambar 27. Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik.....	88
Gambar 28. Kurva Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik.....	88
Gambar 29. Hasil Uji SPF Formula V Nonionik.....	89
Gambar 30. Kurva Hasil Uji SPF Formula V Nonionik.....	89
Gambar 31. Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik.....	90
Gambar 32. Kurva Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik.....	90
Gambar 33. Hasil Uji Eritema Formula I Anionik.....	91
Gambar 34. Kurva Hasil Uji Eritema Formula I Anionik.....	91
Gambar 35. Hasil Uji Eritema Formula II Anionik.....	92
Gambar 36. Kurva Hasil Uji Eritema Formula II Anionik.....	92
Gambar 37. Hasil Uji Eritema Formula III.....	93
Gambar 38. Kurva Hasil Uji Eritema Formula III Anionik.....	93
Gambar 39. Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik.....	94
Gambar 40. Kurva Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik.....	94
Gambar 41. Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik.....	95
Gambar 42. Kurva Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik.....	95
Gambar 43. Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik.....	96
Gambar 44. Kurva Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik.....	96
Gambar 45. Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik.....	97
Gambar 46. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik.....	97
Gambar 47. Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik.....	98
Gambar 48. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik.....	98


Gambar 49. Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik.....	99
Gambar 50. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik.....	99
Gambar 51. Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik.....	100
Gambar 52. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik.....	100
Gambar 53. Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik.....	101
Gambar 54. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik.....	101
Gambar 55. Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik.....	102
Gambar 56. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik.....	102
Gambar 57. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim.....	103
Gambar 58. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim.....	104
Gambar 59. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim.....	105
Gambar 60. Hasil Evaluasi Uji pH Krim.....	106
Gambar 61. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim.....	107
Gambar 62. Hasil Evaluasi Uji Daya Lekat Krim.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	67
Lampiran 2. Proses Ekstraksi.....	68
Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Krim.....	69
Lampiran 4. Evaluasi Penentuan Nilai SPF.....	71
Lampiran 4. Evaluasi Sediaan Krim.....	72
Lampiran 5. Perhitungan Kadar 4000 ppm.....	77
Lampiran 6. Perhitungan Nilai SPF Formula I Krim Anionik.....	77
Lampiran 7. Perhitungan Nilai SPF Formula II Krim Anionik.....	77
Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Formula III Krim Anionik.....	78
Lampiran 9. Perhitungan Nilai SPF Formula IV Krim Anionik.....	78
Lampiran 10. Perhitungan Nilai SPF Formula V Krim Anionik.....	78
Lampiran 11. Perhitungan Nilai SPF Formula VI Krim Anionik.....	79
Lampiran 12. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula I.....	79
Lampiran 13. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula II.....	80
Lampiran 15. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula III.....	80
Lampiran 16. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula IV.....	81

Lampiran 17. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula V	82
Lampiran 18. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi Krim Formula VI.....	82
Lampiran 19. Gambar Tanaman Lempuyang Gajah.....	84
Lampiran 20. Gambar Hasil Uji SPF Formula I Anionik	85
Lampiran 21. Gambar Hasil Uji SPF Formula II Anionik.....	86
Lampiran 22. Gambar Hasil Uji SPF Formula III Anionik	87
Lampiran 23. Gambar Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik	88
Lampiran 24. Gambar Hasil Uji SPF Formula V Nonionik	89
Lampiran 25. Gambar Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik	90
Lampiran 26. Gambar Hasil Uji Eritema Formula I Anionik	91
Lampiran 27. Gambar Hasil Uji Eritema Formula II Anionik.....	92
Lampiran 28. Gambar Hasil Uji Eritema Formula III Anionik	93
Lampiran 29. Gambar Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik	94
Lampiran 30. Gambar Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik.....	95
Lampiran 31. Gambar Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik	96
Lampiran 32. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik	97
Lampiran 33. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik.....	98
Lampiran 34. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik	99
Lampiran 35. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik	100
Lampiran 36. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik	101
Lampiran 37. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik	102

Lampiran 38. Gambar Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim	103
Lampiran 39. Gambar Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim	104
Lampiran 40. Gambar Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim.....	105
Lampiran 41. Gambar Hasil Evaluasi Uji pH Krim.....	106
Lampiran 42. Gambar Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim.....	107
Lampiran 42. Gambar Hasil Evaluasi Uji Daya Lekat Krim.....	108



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : AERIQAH JUNAIDI
Nim : 70100118042
Judul Skripsi : Pengaruh Jenis Emulgator Terhadap Aktivitas dan Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.)

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi dan penentuan potensi tabir surya dari krim ekstrak rimpang lempuyang gajah (*zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis emulgator terhadap nilai SPF dari sediaan krim tabir surya, mengetahui karakteristik fisik sediaan krim tabir, serta potensi rimpang lempuyang gajah sebagai tabir surya terkait nilai SPF, persen transmisi eritema, dan persen transmisi pigmentasi. Krim dibuat dalam 6 formula dengan variasi 3 formula anionik dan 3 formula nonionik. Sediaan krim dievaluasi berdasarkan pengamatan organoleptik (bentuk, warna, bau), homogenitas, viskositas, pH, daya sebar, dan daya lekat serta diukur efektivitas tabir surya dari sediaan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema, serta persen transmisi pigmentasi. Hasil menunjukkan bahwa tiap krim memenuhi syarat tiap evaluasi krim yang baik. Hasil pengujian SPF pada krim Formula I anionik 6,3 (proteksi ekstra), formula II anionik 9,9 (proteksi maksimal), formula III anionik 14,0 (proteksi maksimal), formula IV nonionik 18,7 (proteksi ultra), formula V nonionik 19,2 (proteksi ultra), formula VI nonionik 19,8 (proteksi ultra). Masing-masing krim termasuk kategori sunblock berdasarkan nilai persen eritema <1.

Kata Kunci : *Zingiber zerumbet*, Tabir Surya, SPF, Transmisi Eritema, Transmisi Pigmentasi

ABSTRACT

Nama : AERIQAH JUNAIDI
Nim : 70100118042
Judul Skripsi : Effect of Type of Emulgator on Physical Activity and Stability of Ethanol Extract Sunscreen Cream of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.)

Research has been carried out on the formulation and determination of sunscreen potency from the rhizome extract cream of elephant lempuyang (*zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm.). This study aims to determine the effect of the type of emulsifier on the SPF value of sunscreen cream preparations, to determine the physical characteristics of the sunscreen cream preparations, as well as the potential of lempuyang gajah rhizome as a sunscreen related to the SPF value, the percentage of erythema transmission, and the percentage of pigmentation transmission. The cream was made in 6 formulas with variations of 3 anionic formulas and 3 nonionic formulas. The cream preparations were evaluated based on organoleptic observations (shape, color, smell), homogeneity, viscosity, pH, spreadability, and adhesion and measured the effectiveness of the sunscreen from the preparations based on the SPF value, percentage of erythema transmission, and percentage of pigmentation transmission. The results show that each cream meets the requirements of each good cream evaluation. SPF test results on formula I anionic 6.3 (extra protection), formula II anionic 9.9 (maximum protection), formula III anionic 14.0 (maximum protection), formula IV nonionic 18.7 (ultra protection), formula Nonionic V 19.2 (ultra protection), nonionic VI formula 19.8 (ultra protection). Each cream is included in the sunblock category based on the erythema percentage <1.

Keywords: *Zingiber zerumbet*, Sunscreen, SPF, Erythema Transmission, Pigmentation Transmission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tropis, dimana pengaruh sinar matahari sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup, (Soeratri & Ifansyah, 2005).

Sinar matahari memberikan efek yang menguntungkan yaitu dapat mencegah atau mengobati gangguan pada tulang dengan cara mengaktifkan provitamin D3 yang terdapat pada epidermis kulit menjadi vitamin D3 (Puspitasari *et al.*, 2018). Namun paparan sinar matahari yang berlebihan juga dapat menimbulkan efek yang merugikan terutama terhadap kulit (Nur Maulida & Supartono, 2016). Sinar matahari yang sampai dipermukaan bumi yaitu sinar ultraviolet A (UV-A) dengan panjang gelombang 320-400 nm dapat menyebabkan pigmentasi dan sinar ultraviolet B (UV-B) dengan panjang gelombang 290-320 nm dapat menyebabkan eritema. Sedangkan sinar ultraviolet C (UV-C) dengan panjang gelombang 200-290 nm tidak sampai kepermukaan bumi karena tersaring oleh lapisan ozon (Isfardiyana & Safitri, 2014).

Kulit manusia sesungguhnya telah memiliki sistem perlindungan alamiah terhadap efek sinar matahari yang merugikan dengan cara penebalan stratum korneum dan pigmentasi kulit (Andriyani & Triana, 2015). Namun

tidak efektif untuk menahan kontak dengan sinar matahari yang berlebih. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan perlindungan tambahan seperti menggunakan sediaan tabir surya (Putri Dewi, 2020).

Tabir surya merupakan senyawa yang dapat menyerap atau memantulkan sinar ultraviolet secara efektif terutama pada daerah emisi gelombang UV sehingga dapat mencegah gangguan pada kulit akibat paparan langsung sinar UV (Noviardi *et al.*, 2019). Flavonoid, tanin, antarquinon, sinamat dan sebagainya memiliki kemampuan sebagai perlindungan terhadap sinar UV (Susanti *et al.*, 2012). Flavonoid mempunyai potensi tabir surya karena adanya gugus kromofor (ikatan rangkap tunggal terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV baik UV A maupun UV B sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit (Lisnawati *et al.*, 2019).

Radikal bebas merupakan molekul yang relatif tidak stabil, memiliki elektron yang tidak berpasangan diorbit luarnya sehingga bersifat reaktif dalam mencari pasangan elektron. Elektron dari radikal bebas yang tidak berpasangan sangat mudah menarik elektron dari molekul lainnya sehingga radikal bebas tersebut menjadi sangat reaktif. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan akan bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal bebas yang tidak reaktif dan relatif stabil. Warna merah, biru, ungu dalam buah dan sayuran biasanya disebabkan oleh warna pigmen antosianin (salah satu flavonoid). Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Senyawa fenolik telah

diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme sebagai pereduksi, penangkal radikal bebas, pengkkelat logamserta pendonor elektron. Beberapa tahun belakangan ini, flavonoid telah diteliti memiliki potensi yang besar untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh penangkap radikal (Pratimasari,2009).

Kosmetik perawatan kulit (skin-care cosmetic) diantaranya terdiri dari kosmetikuntuk membersihkan kulit (cleansing cream, sabun, cleansing milk, dan penyegar kulit), kosmetik untuk melembabkan kulit/moisturizer (nigh cream),kosmetik pelindung (sunscreen cream, sun block cream/lotion), dan kosmetik untukmenipiskan kulit / peeling (scrub cream). (Tranggono iswari, 2007). Adapun krim antioksidan tergolong jenis kosmetik perawatan kulit.

Bahan aktif tabir surya yang bersumber dari bahan alam dapat menutupi kebutuhan konsumen kulit sensitif terhadap kosmetika tabir surya (Warnida & Nurhasnawati, 2017).Di dalam tumbuhan terdapat zat alami yang dapat diekstrak dan dapat bertindak sebagai sumber potensial tabir surya karena bersifat fotoprotektif. Hal tersebut memberikan sedikit gambaran mengenai kemampuan tanaman untuk melindungi kulit melalui senyawa yang terkandung didalam tanaman yang berupa senyawa bioaktif seperti senyawa fenolik dan didukung oleh adanya senyawa yang bersifat antioksidan (Prasiddha *et al.*, 2016).

Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe sx sm) merupakan salah satu tanaman yang banyak dijumpai seluruh daerah di Indonesia dan diketahui mempunyai kandungan yang memiliki berbagai

manfaat. Salah satu kandungan yang terdapat dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) roscoe sx sm) adalah Flavonoid dan tanin. Hal tersebut diungkapkan oleh (Hanwar *et al.*, 2019) bahwa rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe sx sm) mengandung saponin, flavonoida dan polifenol. Selain itu, Uji fitokimia dari ekstrak etanol rimpang tersebut positif adanya komponen fenolik, tanin, asam amino, karbohidrat, dan alkaloid. Adanya kandungan flavonoid dan tanin dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) roscoe sx sm) dapat dijadikan acuan untuk menetapkan potensi tabir surya, karena senyawa flavonoid dan tanin memiliki gugus benzen aromatis terkonjugasi yang mampu menyerap sinar UV-A atau UV-B (Wahidah *et al.*, 2021).

Kosmetik tabir surya yang beredar di masyarakat terdapat berbagai jenis dan bentuk sediaan, salah satunya adalah sediaan krim. Keuntungan dari sediaan krim adalah penampilan dan konsistensi yang menyenangkan saat penggunaannya karena setelah pemakaian tidak menimbulkan bekas, memberikan efek dingin pada kulit, tidak berminyak serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik dan Sediaan semi padat seperti krim biasanya digunakan pada kulit dan umumnya digunakan sebagai pelindung dari sinar ultraviolet (UV) matahari (Tandi & Novrianto, 2017). Selain itu, bentuk sediaan krim memiliki keuntungan antara lain selain mudah diaplikasikan, lebih nyaman digunakan pada kulit, tidak lengket dan mudah dicuci dengan air khususnya krim tipe minyak dalam air (m/a) (Ummu Kalsum *et al.*, 2021).

Kestabilan suatu zat merupakan suatu yang harus diperhatikan dalam membuat suatu formulasi atau sediaan farmasi, Hal ini penting mengingat suatu sediaan biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk sampai ke tangan konsumen (Dewi *et al.*, 2014). Oleh karena itu, sediaan tersebut juga perlu diuji kestabilannya sesuai prosedur yang telah ditentukan, Sediaan krim yang stabil yaitu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama masa periode penyimpanan dan penggunaan, yaitu sifat dan karakterisasinya tetap sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Adanya zat aktif diperkirakan mempengaruhi kestabilan fisik dari setiap formulasi krim yang dibuat (Eko, 2017)

Dalam pembuatan krim pertimbangan yang terpenting yakni kestabilan fisiknya. Kestabilan fisik bercirikan tidak adanya penggabungan fase dalam, tidak adanya creaming, dan memberikan penampilan bau, warna dan sifat-sifat fisik lainnya yang baik. Dan kestabilan emulsi ini dipengaruhi oleh suhu dan waktu (Suartha *et al.*, 2021). Kestabilan fisik dari krim salah satunya ditentukan oleh emulgatornya. Jenis emulgator yang biasa digunakan pada sediaan krim yaitu emulgator anionik dan nonanionik. Emulgator anionik (asam stearat dan trethanolamin) yang sering digunakan dalam dermatologi untuk penggunaan luar. Emulgator nonanionik (tween 80 dan span 80) sebagai bahan pengemulsi dengan kerja menyeimbangkan molekul hidrofilik dan lipofilik (Natalie *et al.*, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh jenis emulgator terhadap stabilitas fisik yang dimana kita akan

mengetahui pengaruh jenis emulgator terhadap aktivitas dan stabilitas fisik dari sediaan krim tabir surya rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm) dengan konsentrasi ekstrak etanol yang digunakan adalah 70%.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh jenis dan konsentrasi emulgator terhadap nilai SPF dari sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm)?
2. Bagaimana pengaruh jenis emulgator terhadap kestabilan fisik krim tabir surya dari sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm)?
3. Bagaimana potensi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm) sebagai tabir surya terkait nilai SPF?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Jenis emulgator yang dimaksud disini adalah emulgator anionik dan nonanionik
- b. Stabilitas fisik merupakan stabilitas krim yang dinilai berdasarkan parameter organoleptik, homogenitas, pH, viskositas serta daya sebar
- c. Aktivitas tabir surya yaitu aktivitas yang digambarkan dari nilai SPF
- d. Krim adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian bagian luar yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex sm)

- e. Ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) adalah ekstrak kental yang diperoleh dari proses ekstraksi maserasi rimpang lempuyang gajah menggunakan pelarut etanol 70%

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah formulasi dan uji potensi sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2013) mengenai Uji Stabilitas Formula Krim Tabir Surya Ekstrak Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine americana* L. Merr.). Hasil pengujian yang diperoleh adalah pada uji organoleptis tidak ada perubahan pada pengamatan yang dilakukan terhadap masing-masing sediaan sebelum dan setelah penyimpanan pada suhu kamar pada hari ke-7, -14, dan -21. Kemudian pada uji homogenitas dari hasil uji hedonik pada tingkat kepercayaan 95% (SNI 01-2346-2006), disimpulkan bahwa homogenitas sediaan pada semua formula yang dihasilkan masuk dalam kategori halus. Selanjutnya pada stabilitas pH dilakukan pengujian dan dihasilkan bahwa pH 5,5-8,0 untuk Formula A dan pH 7,0-7,7 untuk Formula B dengan berbagai konsentrasi ekstrak, setelah penyimpanan 21 hari, disimpulkan pH sediaan masih stabil dan aman untuk digunakan (SNI 16-4399-1996) sebagai formula sediaan tabir surya berbahan ekstrak umbi bawang dayak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi et al., (2019) mengenai Standarisasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm). Pada penelitian ini dilakukan standarisasi ekstrak rimpang lempuyang gajah yang meliputi parameter non-spesifik (susut pengeringan, bobot jenis, kadar air, kadar abu, kadar abu tidak larut asam, dan kadar abu larut asam), parameter spesifik (organoleptis, kelarutan dalam pelarut tertentu). Didapat ekstrak rimpang lempuyang gajah mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, dan alkaloid dan kadar zerumbon pada tanaman lempuyang gajah sebesar $2,53 \pm 0,24\%$.

Penelitian yang dilakukan oleh (Noviardi et al., 2019) mengenai Formulasi Sediaan Krim Tabir Surya dari Ekstrak Etanol Buah Bisbul (*Diospyros blancoi*). Berdasarkan pada hasil penelitian, ekstrak buah bisbul dapat dibuat menjadi sediaan krim tabir surya. Nilai SPF yang diperoleh dari konsentrasi ekstrak 10, 20, dan 40% secara berturut-turut adalah 9,25; 0,02; dan 13,00. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa formula dengan konsentrasi 40% merupakan krim terbaik yang memiliki nilai SPF tertinggi sebesar dengan proteksi kategori maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari et al., 2018) mengenai formulasi dan evaluasi sediaan krim tabir surya dengan variasi konsentrasi ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura L.*) serta mengetahui nilai SPF-nya dan didapatkan hasil nilai SPF Formula 1 sebesar 0,1149; formula 2 sebesar 7,6574 (proteksi ekstra); formula 3 sebesar 13,7847 (proteksi

maksimal); dan formula 4 sebesar 19,0871 (proteksi ultra). Semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun kersen semakin besar nilai SPF-nya.

E. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh jenis dan konsentrasi emulgator terhadap nilai SPF dari sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Roscoe ex sm*)
- b. Untuk mengetahui pengaruh jenis emulgator terhadap kestabilan fisik krim tabir surya dari sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Roscoe ex sm*)
- c. Untuk mengetahui bagaimana potensi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Roscoe ex sm*) sebagai tabir surya terkait nilai SPF

F. Manfaat Penelitian

- a. Diperoleh data ilmiah mengenai stabilitas fisik sediaan krim tabir surya yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber Zerumbet (L) Roscoe ex sm*) dengan emulgator anionik dan nonionik.
- b. Diperoleh data ilmiah tentang pengaruh jenis dan konsentrasi emulgator yang memberikan stabilitas fisik yang baik pada sediaan krim ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Roscoe ex sm*) sebagai tabir surya.
- c. Dapat menjadi alternatif produk farmasi yang berasal dari bahan alam yang dapat diformulasikan menjadi sediaan krim tabir surya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rimpang Lempuyang Gajah

1. Uraian Tumbuhan

Lempuyang gajah berasal dari Asia tropis dan ditemukan tumbuh tersebar di India, Sri Lanka Malaysia sampai Pulau Jawa. Lempuyang gajah tumbuh mencapai ketinggian sekitar satu meter. Daun berwarna hijau, kecil memanjang, berukuran panjang rata-rata 17,8 cm dan lebar 5,60 cm. Jumlah daun mencapai 14 helai. Di dataran rendah setiap rumpun dapat menghasilkan sekitar 14 anakan, sedangkan di dataran tinggi hanya 5 anakan. Tangkai bunga tumbuh tegak, berambut dan bersisik yang berbentuk lanset. Kuntum bunga berwarna kuning terang, kuning gelap, sampai putih kekuningkuningan. Rimpang muda maupun rimpang tua berwarna kuning muda dengan warna daging kuning. Rimpang berasa pahit getir dan berbau wangi (Inherent usu, 2006).

2. Nama daerah

Nama daerah dari lempuyang gajah adalah lempuyang kapur, lempuyang kebo (Jawa), lempuyang paek (Madura) (Inherent usu, 2006).

3. Klarifikasi lempuyang gajah

Gajah Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae
Ordo : Zingiberales
Famili : Zingiberaceae
Genus : Zingiber
Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. (Lianah, 2020)



Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria, 2015)

4. Morfologi Tumbuhan

Tumbuhan lempuyang gajah merupakan habitus semak, semusim yang tingginya ± 1 m. Ciri-ciri morfologi tanaman lempuyang gajah sebagai berikut: (Inherent usu, 2006). Dengan batang tegak, semu, membentuk rimpang. Daun tunggal, bentuk lanset, tepi rata, ujung dan pangkal runcing, permukaan licin, panjang 25-40 cm, lebar 10-15 cm, hijau muda, pelepah bentuk talang, panjang ± 17 cm, tangkai panjang ± 10 cm, hijau. Bunga majemuk, bentuk bongkol, tumbuh dari pangkal rimpang, tangkai panjang ± 12 cm, merah, kelopak lepas satu sama lain, merah. Biji bulat panjang, diameter ± 4 mm, hitam. Akar serabut, kuning keputih-putihan.

5. Kandungan senyawa Kimia

Rimpang lempuyang gajah mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, polifenol dan minyak atsiri. Minyak atsiri 0,82% mengandung zerumbone, α pinen, α -kariofilen, kamfer dan sineol (Inherent, 2006)

6. Kegunaan Tumbuhan

Rimpang lempuyang gajah digunakan untuk mengobati kejang, sakit perut, diare, disentri, gangguan empedu, kencing batu, radang ginjal, radang usus, radang lambung, sembelit, kurang darah, rematik, borok, penyakit kulit dan bisul. Selain itu dapat menambah nafsu makan, menyegarkan badan dan meningkatkan stamina. Biji lempuyang gajah digunakan untuk mengobati nyeri perut, cacingan, disentri, lemah usus dan lambung, batu ginjal, ambeien, sesak napas dan borok (Inherent usu, 2006).

B. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan kereaktifan radikal bebas. Terdapat beberapa senyawa sintetis eksogen yang dapat digunakan sebagai antioksidan adalah vitamin E dan BHA (Butylated Hydroxylanisole). Tetapi penggunaan antioksidan sintetis ini menunjukkan adanya efek toksik yang ditimbulkan jika penggunaan dosis yang tidak tepat. Oleh karena itu dicarilah antioksidan yang berasal dari alam untuk mengurangi efek toksik (Wandita & Musrifoh, 2018).

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dibagi menjadi antioksidan endogen, yaitu enzim-enzim yang bersifat antioksidan, seperti: Superoksida Dismutase (SOD), katalase (Cat), dan glutathione peroksidase (Gpx); serta

antioksidan eksogen, yaitu yang didapat dari luar tubuh/makanan. Berbagai bahan alam asli Indonesia banyak mengandung antioksidan dengan berbagai bahan aktifnya, antara lain vitamin C, E, pro vitamin A, organosulfur, α -tocopherol, flavonoid, thymoquinone, statin, niasin, phycocyanin, dan lain-lain. Berbagai bahan alam, baik yang sudah lama digunakan sebagai makanan sehari-hari atau baru dikembangkan sebagai suplemen makanan, mengandung berbagai antioksidan tersebut (Werdhasari, 2014)

Antioksidan diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh. Radikal bebas merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan dalam orbitalnya, sehingga bersifat sangat reaktif dan mampu mengoksidasi molekul di sekitarnya (lipid, protein, DNA dan karbohidrat) Antioksidan bersifat sangat mudah dioksidasi, sehingga radikal bebas akan mengoksidasi antioksidan dan melindungi molekul lain dalam sel dari kerusakan akibat oksidasi oleh radikal bebas atau oksigen reaktif (Werdhasari, 2014)

C. Tabir Surya

Salah satu produk kosmetik yang dapat atau mampu melindungi kulit dari paparan sinar ultra violet salah satunya yaitu produk tabir surya. Tabir surya adalah zat yang mengandung bahan yang melindungi kulit dari sinar matahari dari penetrasi sinar ultraviolet ke dalam kulit. Tabir surya melindungi kulit dengan menyebarkan sinar matahari dan menyerap energi pancaran sinar matahari yang mengenai kulit, mencegah energi pancaran itu mengenai kulit

secara langsung (Kennon *et al.*, 2019). Menurut Pratama & Zulkarnain (2015), tabir surya didefinisikan sebagai senyawa yang secara fisik atau kimia dapat digunakan untuk menyerap sinar matahari secara efektif terutama daerah emisi gelombang UV sehingga dapat mencegah gangguan pada kulit akibat pancaran langsung sinar UV. Besarnya radiasi yang mengenai kulit bergantung pada jarak suatu tempat dengan khatulistiwa, kelembaban udara, musim, ketinggian tempat, dan jam waktu setempat (Purwaningsih *et al.*, 2015).

1. Klarifikasi Tabir Surya

Penggolongan tabir surya didasarkan pada persen transmisi sinar UV, bisa dilihat pada table dibawa ini (Rosman, 2015):

Tabel 1. Penggolongan potensi tabir surya

Klasifikasi produk	Persen transmisi sinar ultraviolet (%)	
	<i>Erytemal range</i>	<i>Tanning range</i>
<i>Total block</i>	<1,0	3-40
<i>Extra protection</i>	1-6	42-86
<i>Regular suntan</i>	6-12	45-86
<i>Fast tanning</i>	10-18	45-86

Berdasarkan mekanisme kerjanya, bahan aktif tabir surya dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme pemblok fisik (memantulkan radiasi matahari) serta mekanisme penyerap kimia (menyerap radiasi matahari). Tabir surya fisik mekanisme kerjanya memantulkan radiasi sinar ultraviolet, kemampuannya berdasarkan ukuran partikel dan ketebalan lapisan, bisa menembus lapisan dermis hingga subkutan atau hipodermis dan efektif pada spektrum radiasi UV-A, UV-B dan sinar tampak,

2. Jenis Tabir Surya Berdasarkan Mekanisme Kerja

Berdasarkan mekanisme kerjanya, tabir surya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: (Khan, 2018)

1) Tabir surya fisik (Anorganik)

Tabir surya fisik atau dapat juga disebut *physical blockers* ini merupakan tabir surya yang diformulasi dari bahan kimia yang memiliki mekanisme UV-blocking dengan cara memantulkan (*reflector*) atau menghamburkan (*scatter*) sinar ultraviolet. Kemampuannya berdasarkan ukuran partikel dan ketebalan lapisan. Beberapa contoh bahan aktif yang memiliki mekanisme ini yang biasanya digunakan dalam sediaan tabir surya adalah Zinc Oxide (ZnO) dan Titanium Dioksida (TiO₂).

2) Tabir Surya Kimiawi (Organik)

Tabir surya juga disebut penyerap kimia. Tabir surya ini bekerja dengan cara menyerap sinar ultraviolet yang bersentuhan dengan kulit. Kerugian yang dilaporkan oleh beberapa konsumen tabir surya jenis ini adalah gatal dan iritasi kulit. Beberapa senyawa dengan mekanisme ini adalah octylmethoxycinnamate (OMC), benzophenone dan para-aminobenzoic acid (PABA).

3. Syarat Sediaan Tabir Surya (*Sunscreen*)

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bahan penyerap UV pada kosmetik adalah (Khan, 2018) : (1) non toksik, dengan keamanan tinggi dan dan tidak menyebabkan kerusakan kulit, (2) absorbansi UV yang tinggi

pada rentang panjang gelombang yang lebar, (3) tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV dan panas, (4) kompatibilitas baik dengan material sediaan kosmetik. pada penggunaan penggunaan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar UV, harus mempunyai 2 syarat yang harus dipenuhi:

- a. jumlah yang memadai dari substansi yang akan diterapkan dengan frekuensi yang sesuai,
- b. efektif dalam mencakup semua daerah yang terpapar dari sinar UV.

4. Potensi Tabir Surya

Kemampuan dari suatu tabir surya tidak hanya tergantung dari nilai SPFnya, ada beberapa faktor yang turut menentukan potensi tabir surya yaitu

a. Jenis

Tabir surya yang ideal jenisnya adalah tabir surya yang memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB (spektrum luas), tidak menimbulkan iritasi, mudah didapat. Selain jenis bahan pembawa dalam tabir surya juga mempengaruhi potensi penetrasi bahan aktif ke kulit dan stabilitas seperti water resistant (Hari, 2013; Lili, 2009).

b. Cara pakai

Cara pakai menentukan efektifitas tabir surya, yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan tabir surya yaitu (Bambang, 2014; Syarif, 2011):

1. jumlah/ketebalan yang cukup dan merata,
2. Pemakaiannya rutin setiap hari

3. Waktu pemakaian adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/ terpapar sinar UV dan tabir surya dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum memakai make up
 4. Pengulangan kembali pemakaian tabir surya kurang lebih setelah 2-4 jam tergantung aktifitas, efektifitas tabir surya berkurang jika terkena keringat/air. Jika melakukan aktifitas berenang di ulang dalam 1 jam dengan memakai tabir surya water resistant.
 5. Pemakaian awal atau pergantian tabir surya baru dianjurkan untuk mencobanya terlebih dahulu pada sebahagian kecil area untuk menghindari efek alergi ataupun iritasi.
- c. Kadar

Seperti yang telah diuraikan diatas nilai SPF yang baik adalah diatas 15, namun banyak kosmetik yang dijual di pasaran mencantumkan SPF pada kemasan tetapi tidak menyantumkan jenis tabir surya yang dikandung.

D. Sun Protection Factor (SPF)

Sun Protection Factor (SPF) merupakan suatu parameter efektivitas dari sediaan sunscreen jika nilai SPF yang didapatkan semakin besar, maka semakin besar pula efektivitas perlindungan yang didapatkan, nilai SPF suatu produk menyatakan perbandingan antara waktu yang dibutuhkan oleh radiasi sinar UV-A dan UV-B untuk menimbulkan eritema pada kulit yang tidak terlindungi dengan tingkatan eritema yang sama (Khan, 2018). Efektivitas tabir surya dapat ditunjukkan, antara lain nilai faktor perlindungan matahari (SPF), yang didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mendapatkan dosis minimum eritema (MED) pada kulit yang dilindungi oleh tabir surya split

selama jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mendapatkan MED pada kulit yang tidak terlindungi (Paul, 2019). MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Donglikar & Deore, 2016).

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara in vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara in vitro secara umum terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji (Pratama, 2015).

Tabel 2. Kefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF

SPF	Kategori Proteksi Tabir Surya
2-4	Proteksi minimal
4-6	Proteksi sedang
6-8	Proteksi ekstra
8-15	Proteksi maksimal
≥ 15	Proteksi ultra

Nilai SPF sediaan krim dianalisis menggunakan metode Mansur:

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times Abs(\lambda)$$

Keterangan :

EE : *Erythemat effect spectrum*

I : *Solar intensity spectrum*

Abs : *Absorbance of sunscreen product*

CF : *Correction factor (= 10)*

Nilai EE X I adalah konstan dan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. *Normalized product function* digunakan pada kalkulasi SPF

(yulianti, 2015)

Panjang gelombang (λ nm)	EE X I
290	0,0150
295	0,0817
300	0,2874
305	0,3278
310	0,1864
315	0,0839
320	0,0180
Total	1

Cara perhitungan :

1. Nilai serapan yang diperoleh dikalikan dengan nilai EE X I untuk masing–masing panjang gelombang yang terdapat pada tabel diatas.
2. Hasil perkalian serapan dan EE X I dijumlahkan.
3. Hasil penjumlahan kemudian dikalikan dengan faktor koreksi yang nilainya 10 untuk mendapatkan nilai SPF sediaan.

E. *Krim*

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (Lumentut *et al.*, 2020). Sediaan krim terdiri atas 2 komponen utama, yaitu bahan aktif dan bahan dasar (basis) krim. Bahan dasar krim terdiri dari fase minyak dan fase air yang dicampur dengan adanya bahan pengemulsi (emulgator) sehingga membentuk basis krim. Supaya diperoleh suatu basis krim yang baik, maka penggunaan dan pemilihan bahan pengemulsi sangat menentukan. Dalam suatu krim agar menunjang dan menghasilkan suatu karakteristik formula krim yang diinginkan, maka sering ditambahkan bahan-bahan tambahan seperti pengawet,

pengkelat, pengental, pewarna, pelembab, pewangi, dan sebagainya (Rosman, 2015).

Sediaan krim adalah salah satu produk yang dapat digunakan sebagai produk kosmetik untuk melindungi kulit dan menjaga kesegarannya, karena formulasi krim bersifat semi padat. Formulasi krim yang baik memiliki kekentalan optimum sehingga mencegah terjadinya pemisahan selama penyimpanan, tetapi juga dapat menyebar saat digunakan pada permukaan kulit. Krim dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kriterianya: krim minyak dalam air (M/A) dan krim air dalam minyak (A/M) (Baskara *et al.*, 2020).

Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air atau dispersi mikrokristal dari asam-asam lemak atau alkohol berantai panjang dalam air, dapat dicuci dengan air dan terutama ditujukan untuk pemakaian kosmetik dan estetika. Secara umum, dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. Emulsi minyak dalam air (M/A) Krim tipe minyak dalam air sangat mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan serta peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit. Contohnya vanishing cream, adalah produk kosmetik yang digunakan sebagai pembersih, pelembab dan alas bedak. Vanishing cream sebagai pelembab (moisturizing) meninggalkan lapisan film/berminyak pada kulit (Magi, 2020).
- b. Emulsi air dalam minyak (A/M) Pada umumnya orang lebih menyukai tipe air dalam minyak sebab penyebarannya lebih baik walaupun sedikit

berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas pada kulit. Contohnya cold cream, adalah produk kosmetik yang digunakan untuk memberikan rasa sejuk dan nyaman pada kulit dan digunakan sebagai krim pembersih, berwarna putih serta bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil yang tinggi (Magi, 2020).

Krim sediaan topikal yang lebih banyak karena memiliki banyak keuntungannya, diantaranya yaitu: sederhana dalam pembuatan, mudah dalam penggunaan, mudah dicuci, bentuknya menarik serta menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna. Syarat-syarat dasar krim yang baik dan ideal adalah stabil; lunak dan homogen; mudah digunakan; cocok dengan zat aktif; bahan obat dapat terbagi halus dan terdistribusi merata dalam dasar krim (Popescu *et al.*, 2020).

Proses terbentuknya krim dapat terjadi melalui reaksi saponifikasi (penyabunan) dan emulsifikasi. Reaksi penyabunan terdiri dari suatu basa dan asam lemak. Sedangkan reaksi emulsifikasi terdiri dari gabungan surfaktan yang membentuk emulsi berdasarkan Hydrophilic-Lipophilic Balance (HLB) butuh dari minyak. Dalam pembuatan krim berlaku juga peraturan-peraturan untuk membuat salep dimana bahan-bahan yang larut dalam fase minyak dilarutkan dalam minyak dan dipanaskan pada suhu 70°- 80°C di atas tangas air. Untuk bahan-bahan yang dapat larut air dilarutkan dalam fase air kemudian dipanaskan pada suhu 70°- 80°C di atas tangas air. Pencampuran kedua fase ini dilakukan pada suhu yang sama. Kemudian diaduk sampai terbentuk krim. Bila ada bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan maka bahan tersebut

ditambahkan langsung pada masa krim yang telah jadi. Adapun penjelasan tentang komposisi krim diuraikan sebagai berikut:

a. Setil alkohol

Rumus molekul: $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol terjadi sebagai lilin, serpihan putih, butiran, kubus. Setil alkohol memiliki bau khas yang samar dan rasa hambar. Setil alkohol banyak digunakan dalam kosmetik dan formulasi residu farmasi seperti supositoria, bentuk sediaan padat ester vale, emulsi, losion, krim, dan salep. Dalam losion, krim, dan salep cetyl alcohol digunakan karena sifat emoliennya, menyerap air, dan pengemulsi saponifikasi. Ini meningkatkan stabilitas, meningkatkan tekstur, dan kejelasan dan meningkatkan konsistensi. Sifat emolien adalah karena penyerapan dan retensi setil alkohol di epidermis, di mana ia melumasi dan melembutkan kulit sambil memberikan tekstur beludru yang khas.

Setil alkohol juga digunakan karena sifat penyerapan airnya dalam emulsi air dalam minyak. Setil alkohol bertindak sebagai pengemulsi lemah dari jenis air dalam minyak, sehingga memungkinkan pengurangan jumlah agen pengemulsi lainnya (Sheskey, 2017).

b. Asam stearat

Rumus molekul: $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat berbentuk keras, berwarna putih atau agak kuning mengkilap, padatan kristal atau bubuk putih atau putih kekuningan. Memiliki sedikit bau (dengan ambang batas bau 20 ppm) dan rasa seperti

lemak. Dalam formulasi topikal, asam stearat digunakan sebagai zat pengemulsi dan pelarut. Asam stearat bebas larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform, dan eter (95%), heksana, dan propilenglikol, praktis tidak larut dalam air. Asam stearat adalah bahan yang stabil; antioksidan juga bisa ditambahkan ke dalamnya. Bahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup, di tempat sejuk dan kering. Asam stearat tidak cocok dengan sebagian besar logam hidroksida dan mungkin tidak cocok dengan basis, zat pereduksi, dan zat pengoksidasi (Sheskey, 2017).

c. Span 80

Rumus molekul: $C_{24}H_{44}O_6$

Span 80 (Sorbitan Monoleat) merupakan suatu surfaktan atau emulgator non-ionik. Pemerian cairan seperti minyak berwarna putih bening atau kekuningan, sedikit berasa basa, bau khas, putih bening atau kekuningan, larut dalam etanol dan air, tidak larut dalam minyak mineral dan minyak nabati. Biasanya digunakan sebagai emulgator tipe minyak (Devi *et al.*, 2019).

d. Tween 80

Rumus molekul: $C_{64}H_{124}O_{26}$

Tween 80 (Polioksi Etilen Sorbitan) monoleat merupakan ester dari sorbitan dengan asam lemak disamping mengandung ikatan eter dengan oksidasi etilen. Pemerian cair seperti minyak digunakan sebagai surfaktan atau amfifil, menurunkan tegangan antarmuka minyak atau air dan membentuk film monomolekuler (Murtiningrum *et al.*, 2013).

e. Metil Paraben

Rumus molekul: $C_8H_8O_3$

Metil paraben adalah serbuk hablur halus, putih hampir tidak berbau, tidak mempunyai rasa kemudian agak membakar diikuti rasa tebal. Larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih. Dalam 5-10 bagian etanol (95%) p, dan dalam 3 bagian aseton p, mudah larut dalam eter p dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam 60 bagian gliserol p panas dan dalam 40 bagian minyak lemak nabati panas, jika didinginkan larutan tetap jernih. Penggunaan metil paraben digunakan antara 0,02-0,03% (Widiastuti, 2016)

f. Propil Paraben (Nipasol)

Rumus molekul: $C_{10}H_{12}O_3$

Propil paraben mengandung tidak kurang dari 99,0% dan tidak lebih dari 100,5% $C_{10}H_{12}O_3$ dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian serbuk putih atau hablur kecil, tidak berwarna. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan dalam eter, sukar larut dalam air mendidih. Biasanya digunakan sebagai zat pengawet (Widiastuti, 2016).

g. TEA

Rumus molekul: $C_6H_{15}NO_3$

Trietanolamin (TEA) dalam sediaan topikal digunakan sebagai bahan pengemulsi dan juga alkalizing agent untuk menghasilkan emulsi yang homogen dan stabil. Untuk memperoleh sediaan losio maka terlebih dahulu

membuat basis losio yang stabil dan homogen serta tetap memperhatikan pH basis tersebut. Ph sediaan losio perlu diperhatikan karna ditujukan untuk penggunaan secara topikal dikulit. Pengujian pH ini bertujuan untuk mengetahui keamanan sediaan losio pada saat penggunaan agar tidak mengiritasi kulit. Sediaan topikal diharapkan memiliki pH yang berada pada pH kulit normal yaitu 4,5- 7 (Desnita, 2018)

h. Gliserin

Rumus molekul: $C_3H_8O_3$

Gliserin digunakan sebagai humektan karena gliserin merupakan komponen higroskopis yang dapat mengikat air dan mengurangi jumlah air yang meninggalkan kulit. Efektifitas gliserin tergantung pada kelembaban lingkungan di sekitarnya. Humektan dapat melembabkan kulit pada kondisi kelembaban tinggi. Gliserin dengan konsentrasi 10% dapat meningkatkan kehalusan dan kelembutan kulit (Sukmawati *et al.*, 2019).

i. Parafin cair

Rumus molekul: $C_{12}H_{26}$

Parafin cair digunakan sebagai basis pada formulasi sediaan topikal. Penambahan parafin cair dapat menurunkan viskositas dari sediaan. Parafin cair terdiri dari 2 macam kualitas yaitu viskositas ringan yang biasa digunakan untuk membuat vanishing cream, sedangkan parafin cair yang mempunyai viskositas berat digunakan untuk membuat cold cream. Parafin cair bersifat stabil yang berfungsi sebagai emolien, lubrikan dan pelarut. Parafin harus disimpan pada wadah yang tertutup, di tempat yang sejuk dan

kering serta terlindung dari cahaya sinar matahari langsung (Suartha *et al.*, 2021).

j. Adeps Lanae

Adeps lanae ialah ester-ester lemak dengan kolesterol, setil-alkohol dan karnaubil-alkohol. Tipe basis absorpsi seperti Adeps lanae memiliki sifat hidrofilik yaitu memiliki potensi mengabsorpsi air, absorpsi air ini hanya menunjukkan pada kemampuan basis didalam menyerap air. Penggunaan adeps lanae kontraindikasi ke pasien yang memiliki hipersensitifitas ke adeps lanae/ lemak bulu domba, efek yang mungkin ditimbulkan ialah kemerahan, rasa terbakar serta penggunaan adeps lanae tidak untuk luka terbuka. Adeps lanae bertendensi menjadi tengik hal ini karena, kandungan adeps lanae yaitu 25-30% merupakan air, selain itu industrial kosmetika sangat jarang menggunakan adeps lanae sebagai basis produk (Sunari *et al.*, 2020).

k. Air suling ad

Air suling (Distilled water) Air suling adalah salah satu jenis dari air yang dimurnikan. Air suling telah melalui proses distilasi untuk menghilangkan kotoran. Distilasi dilakukan dengan mendidihkan air menjadi uap, lalu mendinginkan uap tersebut menjadi air kembali. Proses ini sangat efektif untuk menghilangkan kontaminan seperti bakteri, virus, protozoa, dan bahan kimia seperti timbal dan sulfat (Sudewi *et al.*, 2020).

F. Ekstraksi

Tahap awal untuk mendapatkan bahan alam yakni melalui ekstraksi. Ekstraksi adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh materi yang terkandung dalam makhluk hidup baik hewan, tumbuhan ataupun mikroba. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perolehan materi alam, maka dikembangkan beberapa metode ekstraksi yang dapat disesuaikan dengan keinginan peneliti. Pemilihan metode yang sesuai dikaitkan dengan sifat senyawa ataupun bahan alam itu sendiri (Endarini, 2016).

Secara garis besar, proses ekstraksi terdiri atas beberapa tahapan yaitu: (Firdaus, 2013)

- a. Pengeringan
- b. Penghancuran bahan atau homogenisasi bagian tanaman
- c. Pemilihan pelarut
- d. Pemilihan metode ekstraksi

Pilihan utama cairan penyari yang digunakan dalam ekstraksi yakni metanol, etanol 70%, dan etanol 96%. Pelarut-pelarut ini memiliki daya ekstraksi yang luas, semua metabolit sekunder dapat tersari, sehingga sering digunakan dalam proses ekstraksi dimana belum diketahui struktur senyawa metabolit sekundernya (Azis, 2014).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu:

- a. Maserasi

Metode maserasi ialah salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel ke pelarut yang sesuai. Perendaman sampel pada pelarut mengakibatkan perbedaan tekanan di dalam dan luar sel sehingga dinding

sel pecah dan metabolit sekunder yang terkandung dapat terlarut di cairan penyari. Dalam maserasi, semakin lama sampel melakukan kontak dengan cairan penyari maka semakin banyak metabolit yang terlarut akibat banyaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut sampai terciptanya keseimbangan intrasel dan ekstrasel pada sampel. Metode maserasi memiliki keuntungan yaitu zat aktif yang diperoleh tidak akan rusak, namun kerugiannya yakni dibutuhkan cairan penyari yang cukup banyak dalam prosesnya (Mukhriani, 2014).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan melewati cairan penyari pada sampel sehingga senyawa organik akan ikut terbawa bersama dengan cairan tersebut (Hasrianti *et al.*, 2016). Proses ekstraksi dilakukan dalam perkolator, sampel dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan dibiarkan menetes perlahan di bagian bawah. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani, 2014).

c. Sokletasi

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas

labu. Cairan penyari yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Metode soxhlet memiliki keuntungan yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat terekstraksi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

d. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes turun kembali ke wadah.

Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan dipekatkan menggunakan rotary evaporator (Susanty & Bachmid, 2016).

e. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction

Seperti namanya, teknik ekstraksi ini merupakan teknik yang telah dimodifikasi dengan penambahan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Penambahan ultrasound dimaksudkan untuk memberi tekanan mekanik pada sel-sel di simplisa sehingga menghasilkan ruang

antar sel dan senyawa kimia pun dapat diperoleh dengan mudah. Teknik ekstraksi ini dilakukan dengan memasukkan wadah yang berisi sampel ke dalam wadah ultrasound. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

G. Tinjauan Islam tentang tumbuhan

Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah Swt. baik seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Swt. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berbagai macam kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Sebagai firman Allah Swt. Dalam Q.S. Ash-Syu'ara ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kemenag RI, 2018).

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan serta kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan kepada manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Swt. Dan menggunakannya dengan baik anugrah-Nya bahwasanya dia maha kuasa itulah yang telah menurunkannya dari langit. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang dapat berkhasiat sebagai pelindung dari paparan langsung sinar matahari.

Keanekaragaman tumbuhan banyak yang dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia yang salah satunya sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Swt. Memiliki fungsi sehingga diciptakan di bumi ini. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Namun untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. Sebagai firman Allah SWT. Dalam Q.S Thaha ayat 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّاهُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI, 2018).

Ayat diatas menyatakan bahwa Allah Swt. telah menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah Allah Swt. Dikatakan dalam Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya Firman-Nya: Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan

hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2009).

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral, dimana ketiganya telah dijelaskan dalam Al-Quran mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Swt di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Savitri, 2008).

Dalam suatu pribahasa yang mengatakan bahwa Allah Swt tidak akan memberikan suatu cobaan kepada hamba jika cobaan itu tidak bisa diselesaikan, begitu juga dengan penyakit yang diberikan oleh-Nya diturunkan bersama dengan obatnya. Obat itu menjadi rahmat dan keutamaan dari-Nya untuk hambanya yang beriman maupun yang kafir. Rasulullah Saw bersabda, dalam hadits Abu Hurairah Ra,:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra, dari nabi saw, bersabda ; “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”. (H.R. Al-Bukhari)

Setiap ciptaan Allah (penyakit) itu pasti ada penawarnya, dan setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh (As-Suyuthy, 1997). Pengobatan dengan menggunakan saripati tumbuh-tumbuhan yang ada merupakan suatu bentuk upaya pencarian fungsi dari tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah SWT. Manusia diberi akal pikiran untuk bisa memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan sebagai salah satu cara menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Dengan akal pikiran inilah yang tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan sehingga manusia bisa memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai mana mestinya untuk menunjang kehidupan umat manusia di muka bumi.

Di dalam Islam telah dijelaskan segala sesuatu berdasarkan ukurannya serta tidak berlebihan seperti halnya pada pembuatan kosmetik, sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. Al-Qamar: 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya :

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan tafsir Quraish Shihab, sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran yang sesuai dengan hikmah. Selanjutnya dalam rangka pengaturan dan kadar yang ditetapkan Allah atas segala sesuatu itu, kita melihat bahwa setiap makhluk hidup diberi senjata untuk membentengi dirinya dalam melawan serangan musuh-musuhnya atau menghindari bahaya kepunahannya. Senjata itu beraneka ragam dan berbeda-beda antara satu

dengan yang lain. Ular-ular kecil dilengkapi dengan racun atau kelincihan bergerak, sedang ular-ular besar mempunyai otot yang sangat kuat, tetapi jarang yang memiliki racun. Demikian seterusnya, sampai kepada manusia. Tidak ada satu pun yang Allah ciptakan sia-sia atau tanpa tujuan yang benar dan kesemuanya diberi potensi yang sesuai dan dengan kadar yang cukup untuk melaksanakan fungsinya, semuanya kait berkait, tunjang menunjang dalam satu kesimbangan (Shihab, 2005).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar (ukuran atau aturan). Kadar tersebut dalam dapat dikaitkan dengan pembuatan obat, makanan serta pembuatan kosmetik harus sesuai dengan kadarnya ataupun aturan-aturan. Jika melebihi dari kadarnya maka, terapi yang diinginkan tidak tercapai dan dapat menimbulkan suatu penyakit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan formulasi, uji aktivitas dan uji stabilitas fisik krim tabir surya pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium kimia farmasi dan Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2022.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan eksperimental laboratorium. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi tabir surya dalam sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm).

C. Sampel

Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm).

D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang, yaitu antara lain:

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, batang pengaduk, corong, gelas arloji, kertas saring, lumpang dan stamper, pH meter, waterbath, rotavapor, termometer, wadah maserasi, spektrofotometri uv-vis.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, adeps lanae, asam stearat, serbuk rimpang lempuyang gajah, etanol 70 %, gliserin, metil paraben, parafin cair, propil paraben, setil alkohol, span 80 dan tween 80, TEA.

E. Cara Kerja

1. Pengambilan Sampel

Rimpang yang di ambil adalah rimpang yang berukuran besar dan tua serta siap panen, diambil pada waktu pagi hari.

2. Pengolahan Sampel

Sampel yang diteliti adalah rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm) yang telah diperoleh dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sebanyak 3 kg dibersihkan dari kotoran yang melekat. Kemudian sampel rimpang Lempuyang gajah dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel, lalu ditiriskan, kemudian dipotong kecil-kecil. Selanjutnya dikeringkan di lemari

pengering simplisia. Setelah kering dimasukkan kedalam wadah maserasi untuk selanjutnya dilakukan proses ekstraksi.

3. Ekstraksi sampel

Metode yang digunakan dalam ekstraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm) yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang terdapat dalam sampel. Kemudian serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang sebanyak 500 gram kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi dibasahi dengan etanol 70%, secukupnya, diaduk kemudian dicukupkan hingga sampel terendam seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 3 x 24 jam ditempat yang tanpa penyinaran matahari (ruang gelap), selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol 70%. Hal ini dilakukan sebanyak sebanyak 3 kali maserasi selama masa penyimpanan 3x24 jam kemudian, selanjutnya maserasat di evaporasi pada suhu 60°C dengan bantuan alat rotary evaporator dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol yang kental

4. Pembuatan Krim

a) Rancangan formula

Formula pembuatan krim diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dina, 2016) dengan modifikasi.

Tabel 4. Rancangan formula sediaan krim

Nama Bahan	Formula Anionik			Formula Non ionik			Kegunaan
	I	II	III	IV	V	VI	
Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah	5	5	5	5	5	5	Zat aktif
Setil alkohol	3	3	3	3	3	3	Pengental
TEA	2	3	4	-	-	-	Pengemulsi
Asam stearat	10	15	20	-	-	-	Pengemulsi
Gliserin	10	10	10	10	10	10	Humektan
Parafin cair	10	10	10	10	10	10	Emolien
Adeps lanae	5	5	5	5	5	5	Humektan
Span 80	-	-	-	2	3	4	Pengemulsi
Tween 80	-	-	-	2	3	4	Pengemulsi
Metil paraben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Pengawet
Propil paraben	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Pengawet
Alfa tokoferol	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	Antioksidan
Air suling ad	100	100	100	100	100	100	Pelarut

Keterangan :

Formula I : Formula anionik dengan TEA basis 2% dan asam stearat basis 10%

Formula II : Formula anionik dengan TEA basis 3% dan asam stearat basis 15%

Formula III : Formula anionik dengan TEA basis 4% dan asam stearat basis 20%

Formula IV : Formula nonionik dengan span 80 dan tween 80 basis 2%

Formula V : Formula nonionik dengan span 80 dan tween 80 basis 3%

Formula VI : Formula nonionik dengan span 80 dan tween 80 basis 4%

b) Cara Pembuatan

1. Pembuatan Formula Anionik

Disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur campuran asam stearat, setil alkohol, adeps lanae, parafin cair. Kemudian ditambahkan propil paraben, kemudian suhu dipertahankan pada suhu 70°C . Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam sebagian volume air panas. Kemudian tambahkan gliserin sebagian dan sisa volume air. Kemudian ditambahkan TEA. kemudian ditambahkan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah Dipertahankan suhunya 70°C . Krim dibuat dengan mencampurkan fase minyak dan fase air secara bersamaan ke dalam lumpang sambil diaduk secara terus menerus hingga terbentuk massa krim kemudian dimasukkan kedalam wadah. (Hamzah, 2014).

2. Pembuatan Formula Nonionik

Disiapkan alat dan bahan yang digunakan. Fase minyak dibuat dengan melebur campuran setil alkohol, adeps lanae, parafin cair, span 80. Kemudian ditambahkan propil paraben, kemudian suhu dipertahankan pada suhu 70°C . Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam sebagian volume air panas. Tambahkan gliserin sebagian, tween 80, dan sisa volume air. dipertahankan suhunya 70°C . Krim dibuat dengan mencampurkan fase minyak dan fase air secara bersamaan ke dalam lumpang sambil

diaduk secara terus menerus hingga terbentuk massa krim kemudian dimasukkan kedalam wadah. (Hamzah, 2014).

F. Evaluasi Sediaan Krim

1. Penentuan nilai SPF

Krim ditimbang sebanyak 0,1 g lalu dipindahkan ke labu ukur 100 ml kemudian diencerkan dengan etanol 70 %. Sebanyak 1 ml Selanjutnya, dilakukan ultrasonikasi selama 5 menit. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 5 menit. Diukur nilai absorbansinya menggunakan alat spektrofotometer. Spektrum absorbansi sampel dalam bentuk larutan diperoleh pada kisaran 290-320 nm, setiap interval 5 nm.

Nilai SPF sediaan krim dianalisis menggunakan metode Mansur

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times Abs(\lambda)$$

Keterangan :

EE : Erythema effect spectrum

I : Solar intensity spectrum

Abs : Absorbance of sunscreen product

CF : Correction factor (= 10)

(Yulianti *et al.*, 2015)

2. Uji stabilitas fisik Krim

a. Uji organoleptik

Pengamatan organoleptis yang dilakukan terhadap sediaan yang telah dibuat meliputi pengamatan perubahan warna, bau, dan bentuk.

(Hamzah, 2014).

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan mengolesi preparat pada permukaan kaca objek, kemudian ditebarkan pada kaca objek lainnya untuk mengetahui permukaan yang homogen. Krim dikatakan homogen jika struktur partikelnya tidak menyebabkan menggumpal atau tidak tercampur (Geraldine & Hastuti, 2018).

c. Uji pH

Elektroda pada pH meter dicelupkan dalam sediaan, kemudian dicatat angka pada pH meter. Angka yang ditunjukkan pH meter menunjukkan pH sediaan (Geraldine & Hastuti, 2018).

d. Uji viskositas

Viskositas diukur menggunakan Viskometer Brookfield DV2T. Pengujian viskositas dilakukan dengan menyiapkan spindel pada gantungan spindel, lalu spindel diturunkan ke dalam sampel hingga tercelup, dinyalakan viskometer sambil menekan tombol, dibiarkan spindel berputar dan lihatlah jarum merah pada skala. Angka yang tertera pada jarum menunjukkan nilai viskositas sediaan (Erwiyani *et al.*, 2021).

e. Uji daya sebar

Sebanyak 0,5 gram krim diletakkan di tengah kaca bulat, diatas krim diletakkan kaca bulat lain dan dibiarkan selama 1 menit lalu diukur diameter krim yang menyebar. Beban seberat 150 gram diletakkan di atas kaca bulat dan didiamkan selama 1 menit lalu diukur lagi diameter

krim yang menyebar dari berbagai sisi diukur diameternya menggunakan jangka sorong (Erwiyani *et al.*, 2021).

f. Uji daya lekat

Sebanyak 0,25 gram krim dioleskan pada plat kaca, kedua plat ditempelkan sampai plat menyatu. Krim diantara plat kaca ditekan dengan beban 50 g selama 5 menit. Plat kaca yang saling menempel dipasang pada alat uji daya lekat dan dilepas kemudian dicatat waktu saat kedua plat tersebut lepas (Pratasik *et al.*, 2019).



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstrak Lempuyang Gajah

Penelitian dilakukan dengan menggunakan 3 kg rimpang lempuyang gajah kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir lalu dilakukan perajangan selanjutnya dikeringkan hingga diperoleh 500 g simplisia rimpang lempuyang gajah yang dimaserasi menggunakan larutan etanol 70% sebanyak 5 liter dan dilakukan remaserasi sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 35 g.

$$\begin{aligned} \text{Rendamen} &= \frac{\text{Berat Ekstrak}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{35 \text{ g}}{500 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 7 \text{ g} \end{aligned}$$

2. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF)

a. Formula I krim anionik

Tabel 5. Formula I krim anionik

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	0,768	0,0150	0,0115	6,3565	Proteksi Ekstra
295	0,743	0,0817	0,0607		
300	0,669	0,2874	0,1922		
305	0,623	0,3278	0,2042		
310	0,585	0,1864	0,1090		

315	0,571	0,0839	0,0479		
320	0,555	0,0180	0,0099		
Σ			0,6356		

b. Formula II Krim Anionik

Tabel 6. Formula II krim anionik

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,057	0,0150	0,0158	9,9801	Proteksi Maksimal
295	1,043	0,0817	0,0852		
300	1,013	0,2874	0,2911		
305	0,994	0,3278	0,3258		
310	0,976	0,1864	0,1819		
315	0,961	0,0839	0,0806		
320	0,968	0,0180	0,0700		
Σ			0,9980		

c. Formula III Krim Anionik

Tabel 7. Formula III krim anionik

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,242	0,0150	0,0186	14,0969	Proteksi Maksimal
295	1,491	0,0817	0,1218		
300	1,455	0,2874	0,4181		
305	1,404	0,3278	0,4602		
310	1,364	0,1864	0,2542		
315	1,342	0,0839	0,1125		
320	1,334	0,0180	0,0240		

Σ	1,4096		
----------	--------	--	--

d. Formula IV Krim Noionik

Tabel 8. Formula IV krim anionik

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,537	0,0150	0,0230	18,7122	Proteksi Ultra
295	1,861	0,0817	0,1520		
300	1,886	0,2874	0,5420		
305	1,878	0,3278	0,6156		
310	1,866	0,1864	0,3478		
315	1,867	0,0839	0,1566		
320	1,89	0,0180	0,0340		
Σ			1,8712		


e. Formula V Krim Nonionik

Tabel 9. Formula V krim anionik

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	0,814	0,0150	0,0122	19,2699	Proteksi Ultra
295	0,775	0,0817	0,0633		
300	0,696	0,2874	0,2000		
305	3,634	0,3278	1,1912		
310	0,559	0,1864	0,1041		
315	4,127	0,0839	0,3462		
320	0,542	0,0180	0,0097		
Σ			1,9269		

f. **Formula VI Krim Nonionik****Tabel 10. Formula VI krim anionik**

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	0,837	0,0150	0,0125	19,8920	Proteksi Ultra
295	0,792	0,0817	0,0647		
300	0,766	0,2874	0,2201		
305	0,75	0,3278	0,2458		
310	7,36	0,1864	1,3719		
315	0,725	0,0839	0,0608		
320	0,734	0,0180	0,0132		
Σ			1,9892		

**Gambar 2. Grafik Perbandingan Nilai SPF****3. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi****a. Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim****formula I**

Tabel 11. Panjang gelombang transmisi eritema I

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,144	0,1105	0,0159	0,5020	Sunblock
297.5 nm	0,646	0,6720	0,4341		
302.5 nm	1,765	1,0000	1,7650		
307.5 nm	3,461	0,2008	0,6949		
312.5 nm	5,354	0,1364	0,7302		
317.5 nm	7,163	0,1125	0,8058		
Σ		0,3720	0,7410		

Tabel 12. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula I

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	16,789	0,186	3,1227	20,9661
327.5 nm	17,286	0,170	2,9386	
332.5 nm	18,031	0,160	2,8849	
337.5 nm	18,690	0,146	2,7287	
342.5 nm	19,385	0,135	2,6169	
347.5 nm	20,217	0,127	2,5675	
352.5 nm	21,440	0,120	2,5728	
357.5 nm	23,231	0,109	2,5321	
362.5 nm	25,681	0,100	2,5681	
367.5 nm	29,132	0,091	2,6410	
372.5 nm	33,246	0,081	2,6929	
Σ		0,1295	2,7260	

b. Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim formula II

Tabel 13. Panjang gelombang transmisi eritema II

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fp)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,167	0,1105	0,1105		
297.5 nm	0,757	0,6720	0,5087		

302.5 nm	2,033	1,0000	2,0330	0,5105	Sunblock
307.5 nm	3,916	0,2008	0,7863		
312.5 nm	6,020	0,1364	0,8211		
317.5 nm	8,094	0,1125	0,1125		
Σ		0,3720	0,7286		

Tabel 14. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula II

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	20,323	0,186	3,7800	24,0621
327.5 nm	20,686	0,170	3,5166	
332.5 nm	21,287	0,160	3,4059	
337.5 nm	21,798	0,146	3,1825	
342.5 nm	22,339	0,135	3,0157	
347.5 nm	23,017	0,127	2,9231	
352.5 nm	24,145	0,120	2,8974	
357.5 nm	25,914	0,109	2,8246	
362.5 nm	28,476	0,100	2,8476	
367.5 nm	32,167	0,091	2,9272	
372.5 nm	36,638	0,081	2,9676	
Σ		0,1295	3,1171	

c. **Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim formula III**

Tabel 15. Panjang gelombang transmisi eritema formula III

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,030	0,1105	0,0033	0,7134	Sunblock
297.5 nm	0,182	0,6720	0,1223		
302.5 nm	0,898	1,0000	0,8980		
307.5 nm	0,909	0,2008	0,5841		
312.5 nm	5,252	0,1364	0,7163		
317.5 nm	7,154	0,1125	0,8048		
Σ		0,3720	0,5215		

Tabel 16. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula III

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	24,489	0,186	4,5549	27,9029
327.5 nm	25,143	0,170	4,2743	
332.5 nm	26,095	0,160	2,9386	
337.5 nm	26,938	0,146	3,9329	
342.5 nm	27,785	0,135	3,7509	
347.5 nm	28,738	0,127	3,6497	
352.5 nm	30,033	0,120	3,6039	
357.5 nm	31,841	0,109	3,4706	
362.5 nm	34,212	0,100	3,4212	
367.5 nm	37,414	0,091	3,4046	
372.5 nm	41,123	0,081	3,3309	
Σ		0,1295	3,6666	

d. **Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim formula IV**

Tabel 17. Panjang gelombang transmisi eritema formula IV

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,020	0,1105	0,0022	0,1671	Sunblock
297.5 nm	0,066	0,6720	0,0443		
302.5 nm	0,174	1,0000	0,1740		
307.5 nm	0,342	0,2008	0,0686		
312.5 nm	0,522	0,1364	0,0712		
317.5 nm	0,674	0,1125	0,0126		
Σ		0,3720	0,0622		

Tabel 18. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula IV

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	3,402	0,186	0,6327	
327.5 nm	3,538	0,170	0,6014	

332.5 nm	3,736	0,160	0,5977	4,3814
337.5 nm	3,907	0,146	0,5704	
342.5 nm	4,083	0,135	0,5512	
347.5 nm	4,325	0,127	0,5492	
352.5 nm	4,728	0,120	0,5673	
357.5 nm	5,423	0,109	0,5911	
362.5 nm	6,497	0,100	0,6497	
367.5 nm	8,214	0,091	0,7474	
372.5 nm	5,308	0,081	0,8536	
Σ		0,1295	0,9659	

e. Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim

formula V

Tabel 19. Panjang gelombang transmisi eritema formula V

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,096	0,1105	0,0106	0,23821	Sunblock
297.5 nm	0,424	0,6720	0,2849		
302.5 nm	1,184	1,0000	1,1840		
307.5 nm	2,313	0,2008	0,4644		
312.5 nm	3,639	0,1364	0,4963		
317.5 nm	4,905	0,1125	0,5518		
Σ		0,3720	0,4986		

Tabel 20. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula V

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	1,529	0,186	0,2843	4,83444
327.5 nm	1,588	0,170	0,2699	
332.5 nm	1,685	0,160	0,5783	
337.5 nm	1,764	0,146	0,2575	
342.5 nm	1,859	0,135	0,2509	
347.5 nm	1,997	0,127	0,2536	
352.5 nm	2,249	0,120	0,2698	
357.5 nm	2,713	0,109	0,2957	
362.5 nm	3,478	0,100	0,3165	
367.5 nm	4,811	0,091	0,3896	

372.5 nm	2,3673	0,081	0,4542	
Σ		0,1295	0,6262	

f. Panjang gelombang transmisi eritema dan pigmentasi krim


formula VI

Tabel 21. Panjang gelombang transmisi eritema formula VI

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,020	0,1105	0,0022	0,2545	Sunblock
297.5 nm	0,084	0,6720	0,0564		
302.5 nm	0,226	1,0000	0,2260		
307.5 nm	0,443	0,2008	0,0889		
312.5 nm	0,679	0,1364	0,0926		
317.5 nm	0,907	0,1125	0,1020		
Σ		0,3720	0,0947		

Tabel 22. Panjang gelombang transmisi pigmentasi formula VI

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Te)	Fluks Pigmentasi (Fp)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	10,959	0,186	2,0383	14,2411
327.5 nm	11,353	0,170	1,9300	
332.5 nm	12,428	0,160	1,9076	
337.5 nm	12,937	0,146	1,8144	
342.5 nm	13,573	0,135	1,7465	
347.5 nm	14,509	0,127	1,7410	
352.5 nm	15,941	0,120	1,7375	
357.5 nm	17,924	0,109	1,7924	
362.5 nm	20,802	0,100	1,8929	
367.5 nm	24,305	0,091	1,9687	
372.5 nm	15,1504	0,081	2,9287	
Σ		0,1295	1,9544	



Gambar 3. Grafik Hubungan Antara Nilai %Te dan %Tp

4. Hasil Evaluasi Krim

a. Uji Organoleptik

Tabel 23. Tabel Uji Organoleptik

Krim	Bentuk	Warna	Bau
F I	Semi padat	Kuning	Khas
F II	Semi padat	Kuning	Khas
F III	Semi padat	Kuning	Khas
F IV	Semi padat	Kuning	Khas
F V	Semi padat	Kuning	Khas
F VI	Semi padat	Kuning	Khas

b. Uji Homogenitas

Tabel 24. Uji Homogenitas

Krim	Homogenitas
F I	Homogen
F II	Homogen
F III	Homogen
F IV	Homogen
F V	Homogen
F VI	Homogen

c. Uji pH

Tabel 25. Uji pH

Krim	pH
F I	6,2
F II	6,5
F III	6,4
F IV	6,2
F V	6,1
F VI	6,0

d. Uji Daya Sebar

Tabel 26. Uji Daya Sebar

Krim	Daya Sebar (cm)
F I	5,6
F II	5,1
F III	6,7
F IV	6,9
F V	6,2
F VI	5,2

e. Uji Viskositas

Tabel 27. Uji Viskositas

Krim	Viskositas (CPS)
F I	31973
F II	31493
F III	22075
F IV	24835
F V	27534
F VI	24115

f. Uji Daya Lekat

Tabel 28. Uji Daya Lekat

Krim	Daya Lekat (Detik)
F I	183
F II	210

F III	256
F IV	295
F V	247
F VI	205

B. Pembahasan

Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex Sm) merupakan salah satu tanaman yang banyak dijumpai seluruh daerah di Indonesia dan diketahui mempunyai kandungan yang memiliki berbagai manfaat. Salah satu kandungan yang terdapat dalam rimpang lempuyang gajah (*zingiber zerumbet* (L) roscoe ex sm) adalah Flavonoid dan tanin.

Sampel lempuyang gajah yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kabupaten Sinjai. Pengeringan sampel dilakukan dengan cara dimasukkan kedalam lemari pengering selama 3 hari untuk menghilangkan air dan mencegah terjadinya perubahan kimia (berjamur dan cepat busuk) sehingga dapat menghasilkan mikroorganisme yang dapat merubah senyawa yang terkandung dalam sampel tersebut. Sampel yang telah kering diblender untuk memperluas permukaan serta membantu pemecahan dinding membran sel sehingga lebih mudah memaksimalkan proses ekstraksi (Rosman, 2015).

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan menggunakan pelarut. Ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex Sm.) dilakukan dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% dimana etanol adalah pelarut organik yang dapat menarik sebagian besar senyawa-senyawa bioaktif yang terdapat dalam simplisia. Maserasi merupakan salah satu metode

pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan (Marjoni,2016). Proses maserasi dilakukan dalam 3 x 24 jam dan diaduk sekali sehari, selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan zat padat yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) dengan cairan penyarinya yaitu etanol 70%. Hasil penyaringan akan diuapkan dengan menggunakan alat rotary rotavapor dengan suhu 40-50⁰ C untuk mendapatkan ekstrak kental yang akan diteliti (Maria, 2011).

Selanjutnya dilakukan pembuatan krim dengan mencampurkan dua fase yakni fase air dan fase minyak serta penambahan ekstrak untuk mengidentifikasi potensi tabir surya yang ada pada ekstrak. Pada pembuatan krim ini menggunakan formula anionik yaitu kombinasi TEA dan asam stearat formula nonionik yaitu kombinasi tween 80 dan span 80, Emulgator nonionik merupakan emulgator yang paling luasa penggunaannya dalam sediaan emulsi karena memiliki kesetimbangan hidrofilik-lifofilik yang seimbang didalam molekulnya serta tidak mudah dipengaruhi perubahan pH dan adanya elektrolit. Emulgator ionik merupakan emulgator yang memiliki muatan negative dan emulgator yang paling besar jumlahnya.

Dapat diketahui emulgator anionik memiliki aktifitas permukaan bahan pengemulsi ini terletak pada anion yang bermuatan negatif. Contoh bahan yaitu kalium, natrium dan garam ammonium dan asam laurat, asam oleat, dan asam stearat yang larut air dan merupakan bahan pengemulsi M/A yang baik. Bahan ini mempunyai rasa yang kurang menyenangkan dan mengiritasi saluran cerna sehingga membatasi penggunaannya hanya untuk penggunaan luar.

Reaksi amin organik dengan asam lemak menghasilkan surfaktan organik yang dibentuk oleh reaksi asam oleat dan asam stearat dengan trietanolamin yang secara luas digunakan untuk membentuk emulsi minyak dalam air untuk aplikasi topikal (Rosman, 2015). Asam stearat digunakan dalam krim yang basis dapat dicuci dengan air, sebagai zat pengemulsi untuk memperoleh konsistensi krim tertentu serta untuk memperoleh efek yang tidak menyilaukan pada kulit. Jika sabun stearat digunakan sebagai pengemulsi, maka umumnya kalium hidroksida atau trietanolamin ditambahkan secukupnya agar bereaksi dengan 8 sampai 20 asam stearat. Asam lemak yang tidak bereaksi meningkatkan konsistensi krim. Krim ini bersifat lunak dan menjadi mengkilap atau berkilau dan waktu penyimpanan, disebabkan oleh adanya pembentukan kristal-kristal asam stearat (Lachman, 1994) Biasanya 2-4% trietanolamin dikombinasikan dengan 5-15% asam stearat (Jenkins *et al*, 1957). Namun pada emulgator nonionik Surfaktan yang luas penggunaannya sebagai bahan pengemulsi karena memiliki keseimbangan lipofilik dan hidrofilik dalam molekulnya. Selain itu surfaktan ini tidak seperti tipe anionik dan kationik, emulgator nonionik tidak dipengaruhi perubahan pH dan penambahan elektrolit. Contoh yang paling banyak yang digunakan yaitu ester gliseril, ester polioksietilenglikol, ester asam lemak sorbitan (Span) dan turunan polioksietilennya (Tween).

Sebelumnya telah dilakukan orientasi pengujian SPF ekstrak lempuyang gajah pada konsentrasi 5% dan didapatkan hasil proteksi ekstra yaitu 6 Efektivitas tabir surya suatu sediaan ditentukan dengan metode penentuan % eritema dan % pigmentasi serta nilai Sun Protection Factor (SPF) secara

spektrofotometri uv-vis. Penentuan nilai % transmisi eritema dan % transmisi pigmentasi dilakukan pada ketiga krim konsentrasi 5 % mengandung ekstrak lempuyang gajah yang telah diencerkan 4000 ppm atau 0,1 g krim dilarutkan dalam 25 ml etanol yang selanjutnya diamati serapannya pada spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 292-372 nm yang merupakan panjang gelombang eritema dan pigmentasi dengan interval setiap 5 nm.

Hasil pengujian SPF pada krim Formula I anionik 6,3 (proteksi ekstra), formula II anionik 9,9 (proteksi maksimal), formula III anionik 14,0 (proteksi maksimal), formula IV nonionik 18,7 (proteksi ultra), formula V nonionik 19,2 (proteksi ultra), formula VI nonionik 19,8 (proteksi ultra). Dari hasil pengujian nilai SPF semakin tinggi konsentrasi bahan yang digunakan pada formula anionik (TEA dan asam stearat) serta formula nonionik (tween 80 dan span 80) maka semakin tinggi pula nilai SPF suatu sediaan. TEA dan asam stearat formula nonionik yaitu kombinasi tween 80 dan span 80, Emulgator nonionik merupakan emulgator yang paling luasa penggunaannya dalam sediaan emulsi karena memiliki kesetimbangan hidrofilik-lifofilik yang seimbang didalam molekulnya serta tidak mudah dipengaruhi perubahan pH dan adanya elektrolit. Emulgator ionik merupakan emulgator yang memiliki muatan negative dan emulgator yang paling besar jumlahnya. (Rosman, 2015)

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing emulgator sehingga dapat disimpulkan bahwa jika rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) yang memiliki

beberapa kandungan kimia diformulasikan dalam bentuk krim kemungkinan dapat berpengaruh terhadap nilai spf yang akan dihasilkan.

Pengujian potensi tabir surya ekstrak lempuyang gajah dilakukan dengan menghitung nilai transmisi eritema (%Te) dan transmisi Pigmentasi (%Tp) serta nilai. Pada pengujian ini pada formula I anionik (%Te 0,50 dan %Tp 20,9), formula II anionik (%Te 0,51 dan %Tp 24,0), formula III anionik (%Te 0,71 dan %Tp 27,9), formula IV nonionik (%Te 0,16 dan %Tp 4,38), formula V nonionik (%Te 0,23 dan %Tp 4,83), formula VI nonionik (%Te 0,25 dan %Tp 14,2), dari hasil pengujian diperoleh bahwa Semakin kecil nilai transmisi suatu sampel maka semakin banyak sinar diserap oleh sampel tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa semakin kecil nilai transmisi suatu sampel maka semakin baik pula aktivitas tabir surya yang diperoleh sampel tersebut (Aulia, 2017).

Pengujian organoleptis sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.), dengan variasi jenis emulgator anionik dan nonionik dilakukan dengan menggunakan indera, dilakukan dengan mengamati krim yang meliputi warna, tekstur dan bau. Hasil warna yang diperoleh pada formula Ionik yaitu formula I berwarna kuning pada formula II dan III berwarna kuning pucat, pada formula nonionik yaitu pada formula IV dan V berwarna kuning pucat formula IV berwarna kuning. Perbedaan warna yang dihasilkan pada semua krim dipengaruhi oleh konsentrasi bahan yang digunakan pada tiap formula. Tekstur yang dihasilkan pada sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.), yakni berupa setengah padat dengan

bau khas yang berasal dari ekstrak lempuyang gajah. Hasil pengujian homogenitas pada formula krim anionik dan nonionik yaitu tidak terdapatnya butiran kasar pada masing-masing sediaan krim yang diuji.

Pengujian pH bertujuan untuk mengetahui sediaan topical yang dibuat memiliki pH yang sama dengan pH kulit normal (Lumentut et al., 2020). Hasil pengujian pH pada Formula I anionik (6,2), formula II anionik (6,5), formula III anionik (6,4), formula IV nonionik (6,2), formula V nonionik (6,1), formula VI nonionik (6,0). Berdasarkan hasil pengujian pH pada sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) menunjukkan bahwa pH memenuhi persyaratan sediaan topical yaitu 4,5-6,5 (Lumentut et al., 2020).

Pengujian Viskositas menggunakan alat viscometer Brookfield dengan spindle 64 dengan kecepatan 10 rpm. Hasil pengujian viskositas formula I anionik 22075, formula II anionik 24115, formula III anionik 24835, formula IV nonionik 27534, F V nonionik 31493, formula VI nonionik 31973. Standar viskositas yang baik untuk sediaan tabir surya yaitu berkisar 2000-50.000 Cp, Berdasarkan hasil pengujian viskositas pada sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) memenuhi persyaratan standar viskositas yang baik (Cahyani & Erwiyani, 2021). Peningkatan nilai viskositas dipengaruhi masing-masing komponen tween 80 dan span 80 dan interaksi keduanya meningkatkan viskositas sediaan. Span 80 dapat menyerap sejumlah air yang menyebabkan molekul span 80

menjadi besar. Bertambah besarnya molekul span 80 mengakibatkan viskositas semakin tinggi (Lumentut et al., 2020).

Uji daya sebar krim dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan krim mampu menyebar saat dioleskan dan kelunakan dari sediaan krim. Sediaan krim diharapkan mampu menyebar dengan mudah dikulit, tanpa menggunakan suatu tekanan. Semakin besar nilai diameter daya sebar semakin besar pula luas permukaan yang dapat dijangkau oleh krim. Krim yang baik merupakan krim yang mempunyai daya sebar yang luas, sehingga kontak antara zat aktif dengan kulit lebih optimal. Semakin besar nilai daya sebar krim, maka konsistensi dari krim tersebut semakin lunak (Zulfa *et al.*, 2018). Hasil pengujian daya sebar formula I anionik 5,6 cm, formula II anionik 5,1 cm, formula III anionik 6,7 cm, formula IV nonionik 6,9 cm, formula V nonionik 6,2 cm, formula VI nonionik 5,2 cm. Berdasarkan hasil pengujian daya sebar pada sediaan krim yang mengandung ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) memenuhi persyaratan daya sebar yang baik yaitu 5-7 cm (Lumentut et al., 2020).

Tujuan dilakukan pengujian uji daya lekat krim ini yaitu untuk mengetahui kemampuan krim melekat pada kulit. Semakin besar daya lekat krim maka absorpsi zat aktif akan semakin besar karena ikatan yang terjadi antara krim dengan kulit akan semakin lama, sehingga basis dapat melepaskan zat aktif lebih optimal. Basis yang baik mampu menjamin waktu kontak yang efektif dengan kulit dan kenyamanan penggunaan, sehingga efek dari zat aktif dapat mencapai dengan baik (Cahyani & Erwiyani, 2021). Hasil pengujian daya

lekat krim ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) yaitu berkisar antara 5,45-6,37 hal ini sesuai dengan persyaratan uji daya lekat yaitu tidak kurang dari 4 detik (Cahyani & Erwiyani,2021).



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsentrasi emulgator formula nonionik dengan basis tween 80 dan span 80 memiliki nilai SPF yang tinggi dibanding dengan formula anionik dengan basis TEA dan asam stearat.
2. Evaluasi fisik krim menunjukkan masing-masing krim memiliki formula yang baik yakni memenuhi persyaratan tiap evaluasi homogenitas, viskositas, pH, daya sebar, serta daya lekat.
3. Emulgator dan konsentresi sediaan krim tabir surya ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Roscoe ex sm.) yang memiliki nilai SPF yang baik yaitu krim emulgator anionik TEA : asam stearat yaitu formula IV nonionik 18,7 proteksi ultra, formula V nonionik 19,2 proteksi ultra, formula VI nonionik 19,8 proteksi ultra.

B. *Saran*

Saran untuk penelitian selanjutnya ialah mengubah karakteristik fisik krim sehingga baik di nilai pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. R. A. (2013). Uji Stabilitas Formula Krim Tabir Surya Ekstrak Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine americana* L. Merr.). *Journal Of Tropical Pharmacy And Chemistry*, 2(3), 159–165. <https://doi.org/10.25026/jtpc.v2i3.62>
- Andriyani, R., & Triana, A. (2015). Anatomi dan Fisiologi Kulit. *Bahan Ajar 3 Dasar Rias*, September, 134–145.
- Azis, S. (2014). *Senyawa Alam Metabolit Sekunder: Teori, Konsep, dan Teknik Pemurnian*. Deepublish.
- Cahyani, A. S., & Erwiyani, A. R. (2021). Formulasi dan Uji Sun Protection Factor (SPF) Sediaan Krim Ekstrak Etanol 70% Daging Buah Labu Kuning (*Curcubita Maxima* Durch) Secara In Vitro. *Jurnal Farmasi (Journal of Pharmacy)*, 2(1), 1–11.
- Desnita, R. (2018). Pengaruh Penambahan TEA (Trietanolamine) Terhadap Ph Basis Lanolin Sediaan Losio. *Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura*, 59, 4–9.
- Devi, I. G. A. S. K., Mulyani, S., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh Nilai Hydrophile-Liphophile Balance (HLB) dan Jenis Ekstrak terhadap Karakteristik Krim Kunyit-Lidah Buaya (*Curcuma domestica* val.-*Aloe Vera*). *Jurnal Ilmiah Teknologi Pertanian Agrotechno*, 4(2), 54. <https://doi.org/10.24843/jitpa.2019.v04.i02.p01>
- Dewi, R., Anwar, E., & Yunita, K. S. (2014). Uji Stabilitas Fisik Formula Krim yang Mengandung Ekstrak Kacang Kedelai (*Glycine max*) Abstrak. 1(3), 194–208.
- Dina, M. N. H. (2016). Antioxidant Cream Formulation of Ethanolic Extract from Avocado Leaves (*Persea americana* Mill.). *Acta Pharmaciae Indonesia*, 4(2), 7–15.
- Donglikar, M. M., & Deore, S. L. (2016). Sunscreens: A review. *Pharmacognosy Journal*, 8(3), 171–179. <https://doi.org/10.5530/pj.2016.3.1>
- Erwiyani, A. R., Cahyani, A. S., Mursyidah, L., Sunnah, I., & Pujistuti, A. (2021). Formulasi dan Evaluasi Krim Tabir Surya Ekstrak Daging Labu Kuning (*Cucurbita maxima*). *Majalah Farmasetika*, 6(5), 386–397. <https://doi.org/10.24198/mfarmasetika.v6i5.35969>
- Firdaus. (2013). *Tanaman Bakau: Biologi dan Bioaktivitas*. Tim UB Press.
- Geraldine, E. T., & Hastuti, E. D. (2018). Formulasi krim tabir surya ekstrak buah parioto (*Medinilla speciosa* Blume) dan uji nilai SPF secara in vitro. *Jurnal Farmasi Sains Dan Komunitas*, 15(2), 92–98. <https://doi.org/10.24071/jpsc.1521525>
- Hanwar, D., Elisafitri, O., & Suhendi, A. (2019). Standardisasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbet* Smith). *The 9th University Research Colloquium 2019*, 9(1), 345–351.
- Hasrianti, Nururrahmah, & Nurasia. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah dan Asam Asetat Sebagai Pengawet Alami Bakso. *Jurnal Dinamika*, 07(1), 9–

30.

- Inherent Usu. (2006). *Buku Ajar Taksonomi Tumbuhan*. 179 Halaman.
- Isfardiyana, S. H., & Safitri, S. R. (2014). Pentingnya melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan cara melindungi kulit dengan sunblock buatan sendiri. *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 126–133.
- Kennon, J. T., Fong, B., & Grippo, A. (2019). Determining the effectiveness of sunscreens. *Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas*, 53(3), 112–128. <https://doi.org/10.1080/00368121.2016.1188053>
- Khan, M. A. (2018). Sun Protection Factor Determination Studies of Some Sunscreen Formulations Used in Cosmetics for Their Selection. *Journal of Drug Delivery and Therapeutics*, 8(5-s), 149–151. <https://doi.org/10.22270/jddt.v8i5-s.1924>
- Lianah. (2020). Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Lisnawati, N., Fathan, M. N. U., & Nurlitasari, D. (2019). Mangga Gedong Menggunakan Spektrofotometri Uv – Vis. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 1(2), 157–166.
- Luly Hanni Endarini. (2016). *Farmakognisi dan Fitokimia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lumentut, N., Edi, H. J., & Rumondor, E. M. (2020). Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Goroho (*Musa acuminata* L.) Konsentrasi 12.5% Sebagai Tabir Surya. *Jurnal MIPA*, 9(2), 42. <https://doi.org/10.35799/jmuo.9.2.2020.28248>
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, VII(2), 405–417.
- Murtiningrum, Sarungallo, Z. L., Cepeda, G. N., & TIN, N. O. (2013). Stabilitas Emulsi Minyak Buah Merah (*Pandanus Conoideus* L) Pada Berbagai Nilai Hydrophile-Lyphophile Balance (Hlb) Pengemulsi Emulsion Stability Of Red Fruit Oil (*Pandanus Conoideus* L) On Various Value Of Hydrophile-Lyphophile Balance (Hlb) Of Emulsifie. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 23(1), 30–37.
- Natalie, A., Mulyani, S., & Admadi, B. H. (2017). Hubungan Lama Simpan Dengan Karakteristik Mutu Pada Beberapa Formulasi Krim Ekstrak Kunyit (*Curcuma domestica* Val.). *Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Mahasiswa Teknologi Pertanian Unud, Fakultas Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Dosen*, 5(4), 21–30.
- Ni Made Widiastuti. (2016). *Analisis Pengawet Paraben Dalam Kosmetika*. Universitas Udayana.
- Noviardi, H., Ratnasari, D., & Fermadianto, M. (2019). Formulasi Sediaan Krim Tabir Surya dari Ekstrak Etanol Buah Bisbul (*Diospyros blancoi*). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(2), 262. <https://doi.org/10.35814/jifi.v17i2.771>
- Nur Maulida, A., & Supartono. (2016). Uji Efektivitas Krim Ekstrak Temu Giring (*Curcuma heyneana* Val) Sebagai Tabir Surya. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 5(2), 98.
- Nursalam Hamzah. (2014). Pengaruh Emulgator Terhadap Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* Linn).


Jurnal Kesehatan, 3.

- Paul, S. P. (2019). Ensuring the Safety of Sunscreens, and Their Efficacy in Preventing Skin Cancers: Challenges and Controversies for Clinicians, Formulators, and Regulators. *Frontiers in Medicine*, 6(September), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fmed.2019.00195>
- Popescu, C., Manea, S., Vlăduț, V., Olah, N. K., Morgovan, C., Salman, D., & Lupuleasa, D. (2020). Study On Effectiveness Of Two Cosmetic Creams With Argan Oil And Their Subjective And Instrumental Evaluation Carmen. *Jokull Journal*, 64(January), 325–342.
- Pratama, W. A., & Zulkarnain, A. K. (2015). Uji Spf In Vitro dan Sifat Fisik yang Beredar di Pasaran. *Majalah Farmaseutik*, 11(1), 275–283.
- Pratasik, M. C. M., Yamlean, P. V. Y., & Wiyono, W. I. (2019). Formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan krim ekstrak etanol daun sesewanua (*Clerodendron squamatum* Vahl.). *Pharmakon*, 8(2), 261–267. <https://doi.org/10.35799/pha.8.2019.29289>
- Purwaningsih, S., Salamah, E., & Adnin, M. N. (2015). Photoprotective Effect Of Sunscreen Cream With Addition Of Carrageenan And Black Mangrove Fruit (*Rhizophora mucronata* Lamk.). *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v7i1.9819>
- Puspitasari, A. D., Mulangsri, D. A. K., & Herlina, H. (2018). Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) untuk Kesehatan Kulit. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 28(4), 263–270. <https://doi.org/10.22435/mpk.v28i4.524>
- Putri Dewi, J. (2020). Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Akar Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia*, Jack) dan Uji Nilai Spf Secara In Vitro. *Journal.Yamasi.Ac.Id*, 4(1), 87–97.
- Rindiyantoko Eko, E. D. H. (2017). Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Yang Mengandung Ekstrak Buah Parijoto (*Medinella speciosa*). *Publikasi Riset Untuk Daya Saing Bangsa*, 196–202.
- Rosman, J. B. (2015). *Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum sanctum* L.)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sheskey. (n.d.). *Handbook of Pharmaceutical Excipients 8th by Sheskey, Paul J Cook.pdf*.
- Siti Sunari, A. A. M., Artini, N. P. R., & Apsari, D. P. (2020). Perbandingan Kualitas Krim Antara Basis Adeps Lanae Dengan Ghee (Mentega Susu Sapi). *Widya Kesehatan*, 2(2), 24–29. https://doi.org/10.32795/widya_kesehatan.v2i2.962
- Soeratri, W., & Ifansyah, N. (2005). Penentuan Persentase Transmisi Eritema. *Berkala Hayati*, 10, 117–121.
- Suartha, I. N., Sudimartini, L. M., & Wijayanti, N. P. A. D. (2021). Evaluasi Stabilitas Krim Ekstrak Nimba, Pegagan, dan Sirsak untuk Pengobatan Dermatitis pada Anjing. *Buletin Veteriner Udayana*, 21, 229. <https://doi.org/10.24843/bulvet.2021.v13.i02.p16>
- Sudewi, S., Zebua, N. F., & Milda, A. (2020). Formulasi Sediaan Krim Menggunakan Kolagen Tulang Itik Air (*Anas platyrhynchos domesticus*)


- Sebagai Anti Aging. *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 1(3), 83–89. <https://doi.org/10.47065/jharma.v1i3.615>
- Sukmawati, A., Laeha, M. N., & Suprpto, S. (2019). Efek Gliserin sebagai Humectan Terhadap Sifat Fisik dan Stabilitas Vitamin C dalam Sabun Padat. *Pharmacon: Jurnal Farmasi Indonesia*, 14(2), 40–47. <https://doi.org/10.23917/pharmacon.v14i2.5937>
- Susanti, M., Dachriyanus, & Ptra, D. P. (2012). Aktivitas perlindungan sinar uv kulit buah. *Pharmacon*, 13(2), 61–64.
- Susanty, L.), & Bachmid, F. (2016). *Perbandingan Metode Ekstraksi Maserasi dan Refluks terhadap Kadar Fenolik dari Ekstrak Tongkol Jagung (Zea mays L.) (Susanty, Fairus Bachmid)*. 87–93.
- Tandi, J., & Novrianto, K. G. (2017). Formulasi Tabir Surya Zink Oksida Dalam Sediaan Krim Dengan Variasi Konsentrasi Ekstrak Anggur Hitam (*Vitis vinivera L.*). *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 1(7), 352–358. <https://doi.org/10.25026/jsk.v1i7.72>
- Ummu Kalsum, Farid, N., Inayah, N., & Arman, M. (2021). *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis Uji Potensial Sediaan Krim Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle L .) Dikombinasikan Dengan Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum Sanctum L .) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat Potential Test Of Green Betel (Piper Betle L .) Lea*. 7(3), 427–435.
- Wahidah, S. W., Fadhilah, K. N., Nahhar, H., Afifah, S. N., & Sri, N. (2021). Uji Skrining Fitokimia dari Amilum Familia Zingiberaceae. *Jurnal Buana Farma*, 1(1996), 1–4.
- Wandita, G. A., & Musrifoh, I. (2018). Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan. *Farmaka*, 16(2), 564–571.
- Werdhasari, A. (2014). Peran Antioksidan Bagi Kesehatan. *Jurnal Biomedik Medisiana Indonesia*, 3(2), 59–68.
- Yulianti, E., Adelsa, A., & Putri, A. (2015). Penentuan nilai SPF (Sun Protection Factor) Ekstrak Etanol 70 % Temu Mangga (*Curcuma mangga*) dan Krim Ekstrak Etanol 70 % Temu Mangga (*Curcuma mangga*) secara In Vitro Menggunakan Metode Spektrofotometri. *Majalah Kesehatan FKUB*, 2, 41–50.
- Zakaria. (2015). Uji Aktivitas Anti Rayap Ekstrak Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet smith*) Terhadap Rayap Tanah (*Coptotermes curvignathus holmgren*). *Jurnal Hutan Lestari*, 1(69), 5–24.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




Gambar 4. Bagan Alur Penelitian

Lampiran 2. Proses Ekstraksi**Gambar 5. Proses Ekstraksi**


Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Krim


a. Pembuatan krim anionik



Gambar 6. Pembuatan Krim Anionik


b. Pembuatan krim nonionik

**Gambar 7. Bagan Pembuatan Krim Nonionik**

Lampiran 4. Evaluasi Penentuan Nilai SPF**Gambar 8. Penentuan Nilai SPF**


Lampiran 4. Evaluasi Sediaan Krim

a. Uji Organoleptis




Gambar 9. Bagan Uji Organoleptis

b. Uji Homogenitas




Gambar 10. Bagan Uji Homogenitas


c. Uji Ph

**Gambar 11. Bagan Uji pH**

d. Uji Viskositas

**Gambar 12. Bagan Uji Viskositas**

e. Uji Daya Sebar




Gambar 13. Bagan Uji Daya Sebar

f. Uji daya lekat



Gambar 14. Bagan Uji Daya Lekat

g. Lampiran 5. Uji Potensi Tabir Surya

**Gambar 15. Potensi Tabir Surya**

Lampiran 5. Perhitungan Kadar 4000 ppm

$$ppm = \frac{\mu g}{ml}$$

$$4000 \text{ ppm} = \frac{\mu g}{25 \text{ ml}}$$

$$\mu g = 4000 \text{ ppm} \times 25 \text{ ml}$$

$$\mu g = 100000$$

$$100000 \mu g \approx 100 \text{ mg} \approx 0,1 \text{ gram}$$

Lampiran 6. Perhitungan Nilai SPF Formula I Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0115 + 0,0607 + 0,1922 + 0,2042 + 0,1090 + 0,0479 \\ + 0,0099$$

$$SPF = 10 \times 0,6356$$

$$SPF = 6,3565$$

Lampiran 7. Perhitungan Nilai SPF Formula II Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0158 + 0,0852 + 0,2911 + 0,3258 + 0,1819 + 0,0806 \\ + 0,0700$$

$$SPF = 10 \times 0,9980$$

$$SPF = 9,9801$$

Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Formula III Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0186 + 0,1218 + 0,4181 + 0,4602 + 0,2542 + 0,1125$$

$$+ 0,0240$$

$$SPF = 10 \times 1,4096$$

$$SPF = 14,09698$$

Lampiran 9. Perhitungan Nilai SPF Formula IV Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0230 + 0,1520 + 0,5420 + 0,6156 + 0,3478 + 0,1566$$

$$+ 0,0340$$

$$SPF = 10 \times 1,8712$$

$$SPF = 18,7122$$

Lampiran 10. Perhitungan Nilai SPF Formula V Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0122 + 0,0633 + 0,2000 + 1,1912 + 0,1041 + 0,3462$$

$$+ 0,0097$$

$$SPF = 10 \times 1,9269$$

$$SPF = 19,2699$$

Lampiran 11. Perhitungan Nilai SPF Formula VI Krim Anionik

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

$$SPF = CF \times \sum_{320}^{290} 0,0125 + 0,0647 + 0,2201 + 0,2458 + 1,3719 + 0,0608$$

$$+ 0,0132$$

$$SPF = 10 \times 1,01321$$

$$SPF = 19,8920$$

Lampiran 12. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula I

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,0159 + 0,4341 + 1,7650 + 0,6949 + 0,7302 + 0,8058)}{0,3720}$$

$$\% Te = \frac{0,7410}{0,3720}$$

$$\% Te = 0,5020$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(3,1227 + 2,9386 + 2,8849 + 2,7287 + 2,6169 + 2,5675 + 2,5728 + 2,5321 + 2,5681 + 2,6510 + 2,6929)}{0,1295}$$

$$\% Te = \frac{2,7160}{0,1295}$$

$$\% Te = 20,9661$$

Lampiran 13. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula II

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,1105 + 0,5087 + 2,003 + 0,7863 + 0,82113 + 0,1125)}{0,3720}$$

$$\% Te = \frac{0,7286}{0,3720}$$

$$\% Te = 0,5105$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(3,7800 + 3,5166 + 3,4059 + 3,4059 + 3,1825 + 3,0157 + 2,9231 + 2,8974 + 2,8246 + 2,4476 + 2,9272 + 2,9676)}{0,1295}$$

$$\% Te = \frac{3,1171}{0,1295}$$

$$\% Te = 24,0621$$

Lampiran 15. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula III

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,0033 + 0,1223 + 0,8980 + 0,5841 + 0,7163 + 0,8048)}{0,3720}$$

$$\% Te = \frac{0,5215}{0,3720}$$

$$\% Te = 0,7134$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(4,5549 + 4,2743 + 2,9386 + 3,9329 + 3,7509 + 3,6497 + 3,6039 + 3,4706 + 3,4212 + 3,4046 + 3,3309)}{0,1295}$$

$$\% Te = \frac{3,6666}{0,1295}$$

$$\% Te = 27,9029$$

Lampiran 16. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula IV

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,0022 + 0,0443 + 0,1340 + 0,0686 + 0,0712 + 0,0126)}{0,3720}$$

$$\% Te = \frac{0,0622}{0,3720}$$

$$\% Te = 0,1671$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(0,6327 + 0,6014 + 0,5977 + 0,5704 + 0,5512 + 0,5492 + 0,5673 + 0,5911 + 0,6497 + 0,7474 + 0,8536)}{0,1295}$$

$$\% Te = \frac{0,9659}{0,1295}$$

$$\% Te = 4,3814$$

Lampiran 17. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula V

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(T \times Fe)}{\Sigma fe}$$

$$\% Te = \frac{Ee}{\Sigma fe} = \frac{\Sigma(0,0106 + 0,2849 + 1,1840 + 0,4644 + 0,4963 + 0,5518)}{0,3720}$$

$$\% Te = \frac{0,4986}{0,3720}$$

$$\% Te = 0,23821$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(T \times Fp)}{\Sigma fp}$$

$$\% Te = \frac{Ep}{\Sigma fp} = \frac{\Sigma(0,2843 + 0,2699 + 0,5783 + 0,2575 + 0,2509 + 0,2536 + 0,2698 + 0,2957 + 0,3165 + 0,3896 + 0,4542)}{0,1295}$$

$$\% Te = \frac{0,6262}{0,1295}$$

$$\% Te = 4,83444$$

Lampiran 18. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim Formula VI

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma(T \times F_e)}{\Sigma f_e}$$

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma(0,0022 + 0,0564 + 0,2260 + 0,0889 + 0,0926 + 0,1020)}{0,3720}$$

$$\% T_e = \frac{0,0947}{0,3720}$$

$$\% T_e = 0,2545$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_e = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma(T \times F_p)}{\Sigma f_p}$$

$$\% T_e = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma(2,0383 + 1,93001,90768 + 1,8144 + 1,7465 + 1,7410 + 1,7375 + 1,7924 + 1,8929 + 1,9687 + 2,9287)}{0,1295}$$

$$\% T_e = \frac{1,96871}{0,1295}$$

$$\% T_e = 14,2411$$

Lampiran 19. Gambar Tanaman Lempuyang Gajah

(a)

(b)

Gambar 16. Tanaman Lempuyang Gajah

Lampiran 20. Gambar Hasil Uji SPF Formula I Anionik


4:06pm 26Dec22

Scanning
Test Name: _Default_

Wavelength	Abs
290.0	0.768
295.0	0.743
300.0	0.669
305.0	0.623
310.0	0.585
315.0	0.571
320.0	0.555

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect Baseline	Graph	Edit Data	Measure Sample
---------------------	-------	--------------	-------------------

Gambar 17. Hasil Uji SPF Formula I Anionik**Gambar 18. Kurva Hasil Uji SPF Formula I Anionik**


Lampiran 21. Gambar Hasil Uji SPF Formula II Anionik



Scanning 5:40pm 26Dec22
Test Name: _Default_

Wavelength	Abs
290.0	1.057
295.0	1.043
300.0	1.013
305.0	0.994
310.0	0.976
315.0	0.961
320.0	0.968

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 19. Hasil Uji SPF Formula II Anionik**Gambar 20. Kurva Hasil Uji SPF Formula II Anionik**

Lampiran 22. Gambar Hasil Uji SPF Formula III Anionik**Gambar 21. Hasil Uji SPF Formula III Anionik****Gambar 22. Kurva Hasil Uji SPF Formula III Anionik**

Lampiran 23. Gambar Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik


5:42pm 26Dec22

Scanning
Test Name: _Default_

Wavelength	Abs
290.0	1.537
295.0	1.861
300.0	1.886
305.0	1.878
310.0	1.866
315.0	1.867
320.0	1.890

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 23. Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik**Gambar 24. Kurva Hasil Uji SPF Formula IV Nonionik**

Lampiran 24. Gambar Hasil Uji SPF Formula V Nonionik


4:03pm 26Dec22

Scanning
Test Name: _Default_

Wavelength	Abs
290.0	0.814
295.0	0.775
300.0	0.696
305.0	0.634
310.0	0.588
315.0	0.559
320.0	0.542

ID# : 1
Baseline collected 26Dec22

Collect Baseline	Graph	Edit Data	Measure Sample
---------------------	-------	--------------	-------------------

Gambar 25. Hasil Uji SPF Formula V Nonionik**Gambar 26. Kurva Hasil Uji SPF Formula V Nonionik**


Lampiran 25. Gambar Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik

Scanning
Test Name: _Default_ 5:36pm 26Dec22

Wavelength	Abs
290.0	0.837
295.0	0.792
300.0	0.766
305.0	0.750
310.0	0.736
315.0	0.725
320.0	0.734

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 27. Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik**Gambar 28. Kurva Hasil Uji SPF Formula VI Nonionik**


Lampiran 26. Gambar Hasil Uji Eritema Formula I Anionik

Scanning 5:55pm 26Dec22
Test Name: _Default_

Wavelength	%T
292.5	0.144
297.5	0.646
302.5	1.765
307.5	3.461
312.5	5.354
317.5	7.163

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 29. Hasil Uji Eritema Formula I Anionik**Gambar 30. Kurva Hasil Uji Eritema Formula I Anionik**


Lampiran 27. Gambar Hasil Uji Eritema Formula II Anionik

Scanning 5:57pm 26Dec22
Test Name: _Default_

Wavelength	%T
292.5	0.167
297.5	0.757
302.5	2.033
307.5	3.916
312.5	6.020
317.5	8.094

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 31. Hasil Uji Eritema Formula II Anionik**Gambar 32. Kurva Hasil Uji Eritema Formula II Anionik**


Lampiran 28. Gambar Hasil Uji Eritema Formula III Anionik



Scanning 6:01pm 26Dec22
Test Name: _Default_

Wavelength	%T
292.5	0.030
297.5	0.182
302.5	0.898
307.5	2.909
312.5	5.252
317.5	7.154

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 33. Hasil Uji Eritema Formula III**Gambar 34. Kurva Hasil Uji Eritema Formula III Anionik**

Lampiran 29. Gambar Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik**Gambar 35. Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik****Gambar 36. Kurva Hasil Uji Eritema Formula IV Nonionik**


Lampiran 30. Gambar Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik

Scanning 5:53pm 26Dec22
Test Name: _Default_


Wavelength	%T
292.5	0.096
297.5	0.424
302.5	1.184
307.5	2.313
312.5	3.639
317.5	4.905

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22


Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 37. Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik**Gambar 38. Kurva Hasil Uji Eritema Formula V Nonionik**

Lampiran 31. Gambar Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik




Gambar 39. Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik




Gambar 40. Kurva Hasil Uji Eritema Formula VI Nonionik

Lampiran 32. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik




Gambar 41. Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik




Gambar 42. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula I Anionik

Lampiran 33. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik




Gambar 43. Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik




Gambar 44. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula II Anionik

Lampiran 34. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik




Gambar 45. Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik




Gambar 46. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula III Anionik

Lampiran 35. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik




Gambar 47. Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik




Gambar 48. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula IV Nonionik

Lampiran 36. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik




Gambar 49. Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik




Gambar 50. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula V Nonionik

Lampiran 37. Gambar Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik



Gambar 51. Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik





Gambar 52. Kurva Hasil Uji Pigmentasi Formula VI Nonionik


Lampiran 38. Gambar Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim





Gambar 53. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim

Lampiran 39. Gambar Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim**Gambar 54. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim**

Lampiran 40. Gambar Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim**Gambar 55. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim**

Lampiran 41. Gambar Hasil Evaluasi Uji pH Krim**Gambar 56. Hasil Evaluasi Uji pH Krim**

Lampiran 42. Gambar Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim**Gambar 57. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim**

Lampiran 42. Gambar Hasil Evaluasi Uji Daya Lekat Krim**Gambar 58. Hasil Evaluasi Uji Daya Lekat Krim**

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Aeriqah Junaidi, akrab disapa Ika. Penulis lahir di Pare-Pare, 9 Januari 2001. Anak kedua dari pasangan bapak Junaidi, S.E. dan ibu Dra. Hj. Juwita berasal dari daerah Kabupaten Pinrang. Saat ini penulis tinggal di perumahan Bumi Permata Sudiang 1. Tahun 2006, penulis mulai memasuki bangku sekolah dasar. Saat itu bersekolah di SDN 164 Pinrang. Kemudian lanjut di SMP Negeri 3 Pinrang dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1. Pada tahun 2018 dinyatakan lulus di program studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN. Selama berkuliah, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R