

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BIJI LABU  
KUNING (*Semen cucurbita moschata*) MENGGUNAKAN  
METODE DPPH (2,2-diphenyl -1-picrylhydrazyl)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ANDI ANNISA AMALIA**

**NIM. 70100119081**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Annisa Amalia

Nim : 70100119081

Tempat, Tanggal Lahir : Palattae, 05 November 2000

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Kelurahan Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone

Judul : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*) Menggunakan Metode DPPH (*2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazy*)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 23 Oktober 2023

Penulis

Andi Annisa Amalia  
NIM. 70100119081

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*) Menggunakan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)” yang disusun oleh **Andi Annisa Amalia**, NIM: 70100119081, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 23 Oktober 2023 M** yang bertepatan dengan **07 Rabiul Akhir 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Gowa, 23 Oktober 2023**  
**07 Rabiul Akhir 1445 H**

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm.	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A.	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



**Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.**  
NIP. 19810621 200604 2 005

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT. berkat limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*) Menggunakan Metode DPPH (*2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl*)”. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Dalam proses penyelesaian skripsi, penulis sangat menyadari bahwa hambatan dan rintangan berdatangan menerpa silih berganti. Namun, penulis menyakini bahwa hal tersebut dapat dilalui dengan tekad yang kuat, pantang menyerah dan kerja keras yang diiringi doa dan motivasi dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang berperan dan berjasa dalam hidup penulis, Bapak tercinta Andi Muh. Haris dan yang terkhusus Ibu tersayang A. Subaedah, S.Pd, sosok ibu yang kuat dan tegar dalam memainkan dua peran penting, yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis dengan sangat tulus. Berkat doa tulus yang senantiasa dipanjatkan oleh beliau, penulis dapat berada pada tahap penyelesaian skripsi. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk saudara-saudara penulis, untuk saudara A. Ahmad Akbar dan Andi Mutia Amalia yang senantiasa memberikan motivasi dan nasehat. Kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita senantiasa diberkahi dan berada dalam lindungan Allah SWT.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Andi Aderus Lc.M.Ag. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof Muhammad Khalifa Mustami M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Prof Muhammad Amry Lc.M.Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. apt. Isriyani Ismail, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H. M. Fais Satrinegara, SKM. MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. apt. M. Rusdi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm. Klin. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

12. Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan serta meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm, M.Farm. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktunya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc.M.A. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Segenap dosen serta staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan bantuan dan mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu.
17. Kepada teman-teman seperjuangan kuliah yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan, kerjasama, dan doanya hingga terselesaikannya skripsi ini.
18. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, 23 Oktober 2023

Penulis

Andi Annisa Amalia  
NIM: 70100119081



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian pustaka .....	5
E. Tujuan penelitian.....	8
F. Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Sampel.....	9
B. Ekstraksi .....	10
C. Radikal Bebas.....	16
D. Fenolik.....	19
E. Flavonoid.....	21
F. Antioksidan .....	24
G. Metode Analisis Aktivitas Antioksidan .....	27
H. Uraian Vitamin C .....	31
I. Spektrofotometri UV-Vis.....	33
J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	42

B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Alat dan Bahan .....	43
E. Pengolahan dan Pengujian Sampel.....	43
F. Analisis Data .....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan .....	51
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	61
LAMPIRAN.....	65
RIWAYAT HIDUP .....	95





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Buah dan biji labu kuning.....	9
Gambar 2.	Gugus fenol.....	20
Gambar 3.	Kerangka C <sub>6</sub> -C <sub>3</sub> -C <sub>6</sub> flavonoid .....	21
Gambar 4.	Flavonoid (R•) terhadap radikal bebas .....	23
Gambar 5.	Diagram alat spektrometer UV-Vis .....	35
Gambar 6.	Reaksi pembentukan kompleks flavonoid-AlCl <sub>3</sub> .....	55
Gambar 7.	Reaksi DPPH dengan antioksidan .....	57
Gambar 8.	Kurva standar kuersetin .....	75
Gambar 9.	Kurva standar asam galat .....	79
Gambar 10.	Kurva standar ekstrak etanol 96% biji labu kuning.....	84
Gambar 11.	Kurva standar vitamin C.....	85



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil ekstraksi biji labu kuning ( <i>Semen cucurbita moschata</i> ).....	50
Tabel 2. Hasil penetapan kadar total flavonoid ekstrak etanol 70% .....	50
Tabel 3. Hasil penetapan kadar total flavonoid ekstrak etanol 96% .....	50
Tabel 4. Hasil penetapan kadar total fenolik ekstrak etanol 70% .....	50
Tabel 5. Hasil penetapan kadar total fenolik ekstrak etanol 96% .....	51
Tabel 6. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% biji labu kuning.....	51
Tabel 7. Hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C .....	51
Tabel 8. Data absorbansi kurva baku kuersetin .....	75
Tabel 9. Data absorbansi kurva baku asam galat .....	79



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Skema kerja .....	65
Lampiran 2.	Perhitungan rendamen ekstrak .....	72
Lampiran 3.	Pembuatan larutan dan pereaksi .....	72
Lampiran 4.	Contoh perhitungan pengenceran larutan asam galat.....	74
Lampiran 5.	Perhitungan kadar total flavonoid .....	75
Lampiran 6.	Perhitungan kadar total fenolik .....	79
Lampiran 7.	Perhitungan % Inhibisi .....	82
Lampiran 8.	Perhitungan IC <sub>50</sub> .....	84
Lampiran 9.	Peta Lokasi Pengambilan Sampel .....	86
Lampiran 10.	Gambar penelitian .....	87



## ABSTRAK

**Nama** : Andi Annisa Amalia

**NIM** : 70100119081

**Judul** : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*) Menggunakan Metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)

---

Biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) merupakan bagian yang kerap dibuang begitu saja karena dianggap sebagai limbah. Biji labu kuning dilaporkan mengandung senyawa bioaktif berupa flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki berbagai manfaat salah satunya sebagai antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar total flavonoid dan fenolik serta nilai  $IC_{50}$  ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*). Ekstraksi biji labu kuning dilakukan dengan metode meserasi menggunakan pelarut etanol dengan variasi konsentrasi yaitu 70% dan 96% dengan metode pengukuran kadar senyawa menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% biji labu kuning mengandung total flavonoid sebesar 71,91 mg QE/g ekstrak sedangkan pada ekstrak etanol 96% mengandung total flavonoid sebesar 84,40 mg QE/g ekstrak. Hasil pengujian kadar total fenolik ekstrak etanol 70% biji labu kuning memiliki nilai sebesar 183,034 mg GAE/g ekstrak sedangkan pada ekstrak etanol 96% mengandung kadar fenolik sebesar 266,57 mg GAE/g ekstrak. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% biji labu kuning memiliki nilai  $IC_{50}$  sebesar 1935,96 ppm. Sedangkan nilai  $IC_{50}$  vitamin C sebesar 3,21 ppm. Hal ini menunjukkan ekstrak etanol 96% biji labu kuning tidak memiliki aktivitas antioksidan.

**Kata kunci:** biji labu kuning, fenolik, flavonoid, DPPH.

## ABSTRACT

**Name** : Andi Annisa Amalia

**Student ID** : 70100119081

**Title** : *Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract of Yellow Pumpkin Seeds (Semen cucurbita moschata) Using the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) Method*

---

Pumpkin seeds (*Semen cucurbita moschata*) are a part that is often thrown away because it is considered waste. Pumpkin seeds are reported to contain bioactive compounds in the form of flavonoids, saponins, tannins and other polyphenols. Polyphenolic compounds are reported to have various benefits, one of which is as an antioxidant. The aim of this research was to determine the total levels of flavonoids and phenolics as well as the  $IC_{50}$  value of the ethanol extract of pumpkin seeds (*Semen cucurbita moschata*). Extraction of pumpkin seeds was carried out using the meseration method using ethanol solvent with varying concentrations, namely 70% and 96% with a method of measuring compound levels using a UV-Vis spectrophotometer and antioxidant activity using the DPPH method. The results showed that the 70% ethanol extract of pumpkin seeds contained a total of flavonoids of 71.91 mg QE/g of extract, while the 96% ethanol extract contained a total of 84.40 mg of QE/g of extract. The results of testing the total phenolic content of the 70% ethanol extract of pumpkin seeds had a value of 183.034 mg GAE/g extract, while the 96% ethanol extract contained a phenolic content of 266.57 mg GAE/g extract. The antioxidant activity of 96% ethanol extract of pumpkin seeds has an  $IC_{50}$  value of 1935.96 ppm. Meanwhile, the  $IC_{50}$  value for vitamin C is 3.21 ppm. This shows that the 96% ethanol extract of pumpkin seeds does not have antioxidant activity.

**Keywords:** pumpkin seeds, phenolics, flavonoids, DPPH.

WALAFRATIS ALAUDDIN  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Penyakit degeneratif merupakan salah satu penyakit yang semakin meningkat dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit degeneratif seperti asma, stroke, ginjal kronis, diabetes mellitus, obesitas, kanker, hipertensi, dan jantung mengalami peningkatan prevalensi dari waktu ke waktu (Linda & Rahayu, 2021). Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam menimbulkan beragam penyakit degeneratif adalah stres oksidatif (Werdhasari, 2014).

Stres oksidatif merupakan suatu kondisi dimana radikal bebas mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan peningkatan antioksidan yang ada pada tubuh sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sel karena tidak berfungsi dengan baik. Sel akan mengalami kerusakan terutama bagian lipid, protein, serta DNA (Zulfahmidah, et al., 2021). Dalam proses metabolisme, radikal bebas serta kelompok oksigen reaktif atau ROS (*reactive oxygen species*) akan dihasilkan secara rutin oleh sel. Dimana radikal bebas merupakan molekul yang pada orbitalnya mempunyai elektron tunggal tanpa pasangan sehingga akan menyerang langsung dan mengikat molekul stabil yang berada disekitarnya dengan cara mengambil elektron yang terdapat pada zat tersebut. Zat yang telah kehilangan elektron berubah menjadi radikal bebas yang menyebabkan terjadinya reaksi berantai dan kemudian mempengaruhi sel serta menimbulkan kerusakan pada fungsi sel (Sinaga, 2016).

Perubahan struktur kimia DNA dapat terjadi apabila salah satu basa dari DNA berinteraksi dengan ROS maka akan mengakibatkan DNA mengalami mutasi yang akhirnya berujung pada keganasan apabila tidak terjadi perbaikan



DNA (Zulfahmidah, et al., 2021). Jumlah peningkatan radikal bebas dapat diperoleh dari dua sumber yang berbeda yakni faktor yang berasal dari internal berupa hasil metabolisme di dalam tubuh, kemudian faktor dari luar tubuh berupa asap rokok, zat kimia seperti pengawet, pewarna buatan dalam makanan, hasil penyinaran ultra violet, serta polutan lainnya yang menyebabkan tubuh memerlukan tambahan antioksidan yang lebih agar dapat membantu tubuh dalam menetralsir radikal bebas yang berlebihan (Werdhasari, 2014). Penghambatan radikal bebas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan antioksidan yang dimana merupakan molekul yang mampu mendonorkan elektronnya sehingga dapat menetralsir radikal bebas yang tidak berpasangan dan mencegah terjadinya penyakit yang tidak diinginkan akibat serangan radikal. Senyawa antioksidan akan bereaksi terhadap radikal bebas secara langsung sehingga mampu mengurangi kerusakan oksidatif dan dengan cara tidak langsung menghentikan aksi dari enzim yang dapat memproduksi radikal bebas atau dapat pula dengan peningkatan terhadap aktivitas kerja enzim antioksidan seluler (Amanda, et al., 2019).

Antioksidan dapat dihasilkan dari dua sumber yakni antioksidan yang di produksi dalam tubuh manusia berupa antioksidan endogen dan dihasilkan diluar tubuh manusia yang disebut antioksidan eksogen yaitu antioksidan sintetis serta antioksidan alami. Penggunaan antioksidan sintesis dapat menimbulkan efek berupa meningkatkan karsinogenesis jika melebihi batas yang dianjurkan sehingga kebutuhan antioksidan alami sangat dibutuhkan. Meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif di Indonesia mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi kandungan antioksidan dari berbagai bahan alami (Hasnaeni & Aminah, 2019).

Berbagai bahan alami Indonesia yang di dalamnya memiliki kandungan antioksidan yang terdapat pada bahan aktif yang berbeda seperti vitamin E, C,

provitamin A, organosulfida, polifenol,  $\alpha$ -tokoferol, flavonoid, timokuinon, statin, niacin, fikosianin yang mampu meredam radikal bebas. Salah satu bahan alam yang di dalamnya mengandung senyawa tersebut yaitu biji labu kuning (Amanda, et al., 2019; Berawi & Marini, 2018).

Biji labu kuning ini seringkali berupa potongan yang dibuang begitu saja karena dianggap sebagai limbah, padahal kandungan di dalam biji labu kuning merupakan zat yang dapat berkhasiat bagi tubuh. Nutrisi yang terkandung pada biji labu kuning adalah Zn, Mg, vitamin E (tokoferol), asam amino, sterol, asam lemak utama, karetenoid, kriptoksantin, sesquiterpenoid monosiklik serta inhibitor tripsin. Pada biji labu terdapat senyawa antioksidan dan asam lemak tidak jenuh ganda, kalium, vitamin B2 (riboflavin) dan folat dalam jumlah yang cukup (Syam et al., 2019). Dari hasil pengujian dengan menggunakan pereaksi warna, didapatkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning memiliki kandungan senyawa bioaktif berupa flavonoid, tanin, saponin dan terpenoid (Pelu et al., 2020).

Dalam Islam, Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta, termasuk bumi dan segala isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Beragam jenis tanaman yang baik dengan kandungan dan manfaat yang dapat digunakan untuk tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tanaman yang beragam dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh manusia maupun dijadikan bahan dalam pengobatan. Dari berbagai jenis tanaman ciptaan Allah SWT. terdapat tanaman yang dapat bermanfaat untuk pengobatan, salah satunya adalah biji labu kuning yang dimana mengandung zat dan nutrisi yang dapat digunakan untuk kesehatan manusia. Namun, dalam memanfaatkan sumber alami dari berbagai jenis ciptaan Allah SWT. diperlukan suatu ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Pada umumnya, untuk mengetahui kandungan senyawa dalam suatu tumbuhan, diperlukan metode pengujian untuk menganalisis kandungan antioksidan pada suatu tanaman dapat menggunakan metode analisis FRAP (*Ferric Reducing Ability of Plasma*), metode analisis ABTS (*2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)*), metode analisis DPPH ( *$\alpha,\alpha$ -diphenyl- $\beta$ picrylhydrazyl*), dan metode analisis ORAC<sub>OH\*</sub> atau HORAC (*Hydroxyl Radical Activities*) (Mu'nisa, 2022). Salah satu metode dengan waktu yang singkat, sederhana, dan tidak menggunakan biaya yang mahal untuk mengetahui aktivitas antioksidan dapat digunakan metode DPPH. DPPH (*2,2-difenil-1-pikrilhidrazil*) adalah metode pengujian untuk menentukan aktivitas antioksidan dengan kemampuannya menangkal radikal bebas. Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara mengukur penurunan intensitas cahaya berwarna ungu dari DPPH dimana setara dengan penurunan konsentrasi DPPH. Kemampuan aktivitas antioksidan dalam suatu sampel dinyatakan dalam nilai IC<sub>50</sub>, yakni konsentrasi larutan sampel yang diperlukan dalam menghambat 50% radikal bebas DPPH (Prasetyo, et al., 2021; Indra, et al., 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) menggunakan metode DPPH (*2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl*).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapakah nilai kadar total flavonoid dan kadar total fenolik ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*)?
2. Berapakah nilai IC<sub>50</sub> ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) dengan menggunakan metode DPPH?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Ekstrak merupakan sediaan kental yang didapatkan dari hasil ekstraksi tanaman yang direndam dengan pelarut yang sesuai lalu diuapkan.
- b. Uji aktivitas merupakan suatu pengujian untuk mengukur besar potensi ekstrak etanol biji labu kuning yang dapat memberikan efek sebagai antioksidan.
- c. Biji labu kuning adalah bahan alami berupa biji-bijian dari sebuah labu yang memiliki banyak kandungan dan dapat digunakan untuk pengobatan.
- d. Radikal bebas adalah molekul yang memiliki elektron tidak berpasangan pada orbitalnya.
- e. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat dan menetralkan radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektron.
- f.  $IC_{50}$  adalah parameter dalam menyatakan hasil konsentrasi dari uji DPPH

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratorium untuk menganalisis aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) menggunakan metode DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl).

### **D. Kajian Pustaka**

Pada kajian pustaka dijelaskan beberapa hasil penemuan dari penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kejelasan arah, manfaat dan posisi dari penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Pelu, dkk tahun 2020 dengan judul “Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Terhadap Daya Hambat Bakteri *Staphylococcus aureus*” menyatakan

bahwa ekstrak etanol biji labu kuning memiliki kandungan senyawa bioaktif berupa flavonoid, tanin, saponin dan terpenoid berdasarkan hasil pengujian skrining fitokimia menggunakan pereaksi warna.

Peneliti mengambil acuan dari jurnal tersebut dengan menggunakan pelarut etanol. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kaitan dengan penelitian tersebut. Namun, pada penelitian ini dilakukan pengujian lanjutan yakni mengukur kadar total flavonoid dan kadar total fenolik dari sampel yang sama.

2. Penelitian Suena & Ni Putu pada tahun 2020 dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Maserat Air Biji Kopi (*Coffea canephora*) Hijau Pupuan Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)” menyatakan bahwa terdapat aktivitas antioksidan pada maserat air biji kopi hijau robusta di daerah Pupuan dengan menggunakan metode DPPH. Metode DPPH merupakan metode pengujian aktivitas antioksidan yang sederhana, mudah, cepat, dan peka. Selain itu, pada pengujian ini hanya menggunakan sampel yang sedikit untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari suatu senyawa bahan alami dimana prinsip pengukurannya secara kuantitatif dengan metode DPPH yaitu terjadi perubahan intensitas warna ungu DPPH yang setara dengan konsentrasi larutan DPPH. Saat elektronnya berpasangan, warna dari DPPH akan berubah menjadi warna kuning. Perubahan warna yang terjadi menghasilkan pengaruh pada nilai absorbansi panjang gelombang maksimum DPPH dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis sehingga diketahui nilai aktivitas peredaman radikal bebas dan dinyatakan dengan nilai  $IC_{50}$  (*Inhibitory concentration*). Dari penelitian tersebut, merujuk melakukan penelitian uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Namun, sampel yang

digunakan berbeda.

3. Penelitian Damanis, dkk tahun 2020 dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol *Ascidian Herdmania Momus* Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-picrylhydrazyl)” menyatakan bahwa ekstrak *Ascidian Herdmania momus* mempunyai aktivitas antioksidan dengan aktivitas tertinggi pada konsentrasi 125 $\mu$ g/mL dengan nilai % inhibisi rata-rata 66.16%. Pada penelitian ini menggunakan metode DPPH dan vitamin C sebagai pembanding. Dimana vitamin C merupakan antioksidan sekunder yang dapat meredam radikal bebas dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Vitamin C memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi dan bersifat lebih polar dibandingkan dengan vitamin yang lainnya. Vitamin C memiliki gugus hidroksi bebas yang dapat bertindak sebagai penangkap radikal bebas. Selain itu, Vitamin C juga sangat mudah diperoleh. Dari penelitian tersebut, merujuk untuk melakukan penelitian dengan menggunakan vitamin C sebagai pembanding dalam pengujian aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Namun, sampel yang digunakan berbeda.
4. Penelitian Indra, dkk tahun 2019 dengan judul “Fenolik Total, Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (*Glochidion arborescens Blume.*)” menyatakan bahwa ekstrak etanol daun mareme berpotensi sebagai antioksidan alami dimana hasil pengujian peredaman radikal bebas (DPPH) didapatkan nilai IC<sub>50</sub> sebesar 5,62  $\mu$ g/mL yang menyatakan bahwa nilai IC<sub>50</sub> dari ekstrak lebih besar daripada vitamin C (3,34  $\mu$ g/mL). Dari hasil pengujian total polifenol ekstrak daun mareme diperoleh sebesar 33,32 mg GAE/g dan total flavonoid sebesar 3,02 mg QE/g. Senyawa flavonoid dan fenolik merupakan senyawa yang



berpotensi sebagai antioksidan, semakin tinggi total fenolik pada suatu tumbuhan maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidan yang dimiliki untuk meredam radikal bebas DPPH.

Dari penelitian tersebut, merujuk untuk melakukan penelitian berupa penentuan kadar total fenolik dan flavonoid serta korelasi kapasitas antioksidan dengan sampel yang berbeda.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui nilai kadar total flavonoid dan kadar total fenolik ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*).
2. Mengetahui nilai  $IC_{50}$  ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) dengan menggunakan metode DPPH.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta penjelasan tentang aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning menggunakan metode DPPH serta dapat memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya alam khususnya biji labu kuning sebagai antioksidan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Sampel

##### 1. Klasifikasi Tanaman Labu Kuning (Panjaitan, et al., 2015)

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Sub divisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Dicotyledonae</i>
Ordo	: <i>Cucurbitaceae</i>
Famili	: <i>Cucurbitaceae</i>
Genus	: <i>Cucurbita</i>
Spesies	: <i>Cucurbita moschata</i>



**Gambar 1.** Buah dan Biji Labu Kuning (Sumber Primer, 2023)

##### 2. Morfologi Biji Labu Kuning

Biji labu kuning berada dibagian tengah pada daging buah tepatnya dibagian rongga yang kosong dan diditutupi oleh lendir berserat. Bijinya pipih dengan ujung runcing. Berdasarkan hasil penelitian, biji labu memiliki bentuk bulat atau lonjong. Panjang biji bervariasi dari 1,4 hingga 1,8 cm, dan lebar biji dari 0,6 hingga 1 cm. Permukaan biji labu kuning berwarna putih hingga kecoklatan (Furqan, et al., 2018).

### 3. Kandungan kimia

Biji labu kuning memiliki kandungan senyawa alkaloid, saponin, stearin, kukurbitasin, tirosol, senyawa fitosterol, lesitin, resin, flavonoid, fenolik, asam lemak, squalen, asam vanilat, vanillin, luteolin dan asam sinapat, vitamin (termasuk vitamin  $\beta$ -karoten, vitamin A, vitamin B2,  $\alpha$ -tokoferol, vitamin C dan vitamin E) (Tandi, et al., 2018). Biji labu kuning juga mengandung Zn (*zinc*), Mg (magnesium), sterol, asam amino, vitamin E (tokoferol), asam lemak utama, karetenoid, kriptoxantin, sesquiterpenoid monosiklik dan inhibitor tripsin. Beberapa zat tersebut dapat menghambat pembentukan radikal bebas. Banyak antioksidan yang terdapat di dalam biji labu kuning serta asam lemak tak jenuh ganda, kalium, vitamin B2 (riboflavin) serta folat dengan jumlah yang cukup (Syam, et al., 2019).

#### **B. Ekstraksi**

Ekstraksi merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan untuk menarik kandungan zat dari campuran dengan bantuan pelarut yang sesuai. Ekstraksi adalah proses pemisahan untuk mengambil suatu bagian yang ada di dalam bahan padat maupun cair menggunakan pelarut tertentu yang didasarkan pada perbedaan kelarutan suatu pelarut dengan zat yang terlarut. Efisiensi suatu ekstraksi tak lepas dari kekuatan suatu pelarut untuk melarutkan suatu bagian senyawa yang dapat larut. Selain itu, efisiensi proses ekstraksi dapat pula ditentukan berdasarkan kemurnian pelarut, suhu, metode ekstraksi yang digunakan serta ukuran partikel suatu sampel yang diekstrak. Semakin murni suatu pelarut serta semakin lama durasi yang digunakan untuk melarutkan suatu sampel dengan suhu tertentu selama proses ekstraksi, maka akan menghasilkan ekstrak dalam jumlah yang banyak (Mukhriani, 2014; Setiawan, et. al., 2015).

Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan senyawa terlarut dengan memisahkan zat tidak larut dengan pelarut cair. Dari proses ekstraksi ini, akan menghasilkan suatu ekstrak. Ekstrak adalah hasil penarikan senyawa aktif yang terdapat pada sampel dalam bentuk sediaan kental yang telah diuapkan seluruh pelarutnya hingga tersisa sediaan kental atau serbuk yang diproses sampai memenuhi standar yang telah ditentukan. Ekstraksi ini bermanfaat dalam mengambil kandungan kimiawi yang terdapat pada suatu bahan. Berdasarkan prinsipnya, massa komponen senyawa kimiawi suatu sampel dipindahkan ke pelarut yang digunakan. Selama proses ini, terjadi perpindahan pada lapisan antarmuka yang selanjutnya akan berdifusi masuk ke dalam pelarut (Saputra, et al., 2020).

Ada beberapa metode dalam proses ekstraksi yang dapat digunakan. Namun sebelum pemilihan suatu metode, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik dari simplisia serta kandungan senyawa kimia yang akan diisolasi. Berikut merupakan jenis-jenis metode dalam proses ekstraksi bahan alam, yakni (Mukhriani, 2014) :

### **1. Maserasi**

Metode maserasi adalah metode ekstraksi yang sangat sederhana dan termasuk metode ekstraksi dingin. Mekanisme dari metode maserasi yaitu dinding sel tumbuhan akan ditembus oleh larutan penyari kemudian masuk ke dalam rongga sel yang memiliki kandungan senyawa aktif. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi yang berbeda dari larutan senyawa aktif yang berada dalam sel dengan konsentrasi larutan yang berada di luar sel. Sehingga zat aktif yang sifatnya larutan pekat ditarik keluar dari sel (Hasnaeni, et al., 2019).

Maserasi merupakan metode dalam mengekstraksi simplisia yang kerap dilakukan untuk memperoleh ekstrak, baik itu skala laboratorium maupun skala

industri karena metodenya yang sangat sederhana. Maserasi dapat dikerjakan dengan tahapan perendaman sampel menggunakan pelarut di dalam suatu tempat kemudian ditutup rapat dan terlindungi dari cahaya lalu disimpan dengan suhu normal (suhu kamar). Metode ekstraksi dapat diakhiri apabila konsentrasi zat aktif pada pelarut telah seimbang dengan konsentrasi dalam sel tumbuhan telah tercapai. Kemudian pelarut pada sampel disaring menggunakan kain/kertas saring untuk memisahkan antara pelarut yang sudah bercampur dengan sampel (Mukhriani, 2014).

Pada tahapan perendaman, bidang kontak antara bahan simplisia dengan pelarut harus tetap kontak selama jangka waktu yang sudah ditentukan. Selama waktu perendaman, zat terlarut terpisah dari sampel dan dipindahkan ke bagian pelarut yang digunakan. Dibutuhkan pula pengadukan selama perendaman agar perpindahan zat terlarut semakin cepat dan tuberkulensi dapat meningkat (Haeria, 2014).

## **2. *Ultrasound-Assisted Solvent Extraction***

*Ultrasound - Assisted Solvent Extraction* (UEA) adalah sebuah metode modifikasi maserasi yang dibantu dengan ultrasound (sinyal frekuensi tinggi, 20 kHz). Mekanisme kerja ekstraksi UEA yaitu wadah yang telah diisi dengan serbuk simplisia kemudian dimasukkan pada tempat ultrasonik dan ultrasound. Perlakuan ini bertujuan agar sel mendapatkan tekanan mekanik sehingga membentuk suatu rongga di dalam sampel. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya peningkatan larutan pada suatu zat yang ada dalam pelarut dan menyebabkan terjadinya peningkatan pada hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

Ekstraksi UAE adalah cara ekstraksi dengan bantuan gelombang ultrasonik untuk menarik senyawa dalam suatu sampel dengan pelarut organik. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang suara yang frekuensinya  $>20$  KHz, lebih tinggi

dibandingkan dengan pendengaran manusia. Ekstraksi dengan ultrasound memiliki keuntungan utama dibandingkan dengan metode ekstraksi lainnya yakni tenaga yang digunakan sangat rendah dengan durasi pengoperasian yang digunakan terhitung sedikit. Pada ekstraksi gelombang ultrasound, penggunaan bahan baku serta pelarut dalam jumlah yang rendah, kemudian selama proses ekstraksi yang dilakukan menggunakan tekanan dan suhu yang rendah, langkah sintesis lebih pendek yang bersamaan dengan peningkatan selektivitas akhir, menggunakan bahan baku dan kemurnian pelarut yang lebih sedikit serta bertambah (Baihaqi, et al., 2023).

### **3. Perkolasi**

Perkolasi merupakan metode ekstraksi dingin yang dapat dikerjakan dengan waktu yang cepat dan lebih mudah. Keuntungan teknik perkolasi yakni simplisia yang digunakan selalu ditambahkan dengan pelarut yang baru untuk memaksimalkan ekstraksi dan menghindari senyawa mengalami kerusakan apabila senyawa tersebut bersifat tidak tahan panas (Wigati & Rahardian, 2018).

Metode perkolasi merupakan teknik pengekstraksian yang dikerjakan dengan cara serbuk simplisia yang berada di dalam perkolator (suatu wadah yang silinder, mempunyai keran di bagian bawah) dibasahi perlahan-lahan. Serbuk simplisia dialiri pelarut pada bagian atas serbuk kemudian secara perlahan akan menetes di bagian bawah. Pada metode perkolasi, akan ditambahkan pelarut yang baru pada sampel sehingga penggunaan pelarut dengan metode perkolasi dalam jumlah yang banyak dan waktu pengerjaan yang lama. Kekurangan lainnya dari teknik ekstraksi perkolasi yaitu apabila sampel tidak homogen di dalam perkolator, maka akan mengakibatkan pelarut yang digunakan kesulitan untuk menjangkau semua tempat sehingga kontak antar sampel dengan pelarut akan berkurang (Mukhriani, 2014).



#### **4. Soxhlet**

Metode soxlet termasuk dalam metode ekstraksi panas dan dingin. Selama proses mengekstraksi, disimpan pelarut serta simplisia pada tempat yang berbeda. Prinsip dari metode ini yaitu proses ekstraksi berlangsung secara kontinyu dengan penggunaan pelarut yang jumlahnya relatif kecil. Setelah itu diuapkan pelarut tersebut setelah proses ekstraksi selesai untuk memperoleh ekstrak. Pelarut yang biasa digunakan dalam metode ini bersifat mempunyai titik didih yang rendah atau sangat rentan untuk menguap (Hasnaeni, et al., 2019).

Ekstraksi soxhlet merupakan metode umum dan stabil dengan hasil yang lebih tinggi dari metode ekstraksi lainnya. Sebagian besar, metode soxhlet tergantung pada karakteristik tanaman dan ukuran partikel. Pada suhu ekstraksi dan penguapan yang dapat mempengaruhi kualitas produk akhir (Haeria, 2014).

Metode ekstraksi soxhletasi dapat dikerjakan dengan cara sampel yang akan diekstraksi disimpan di dalam kertas saring lalu dimasukkan pada klonsong. Setelah itu, klonsong yang berisi sampel dihubungkan dengan kondensor bagian bawah lalu ditempatkan di atas labu. Kemudian labu alas bulat yang digunakan dimasukkan pelarut yang sesuai lalu diatur suhu penangas di bawah suhu reflux. Metode ekstraksi ini memiliki keuntungan yaitu selama pengekstraksian, dilakukan secara kontinyu. Kemudian penggunaan pelarut yang sedikit dan waktu yang sedikit. Namun dalam metode ini memiliki kekurangan yakni senyawa yang sifatnya tidak tahan terhadap panas akan terdegradasi dikarenakan ekstrak yang dihasilkan mencapai titik didih (Mukhriani, 2014).

#### **5. Refluks**

Refluks termasuk salah satu cara mengekstraksi simplisia yang dapat dilakukan dengan bantuan pemanasan sehingga mampu mengekstraksi senyawa yang tahan panas (Laksmiani et al., 2015). Selama proses mengekstraksi dengan

metode refluks, dikerjakan dengan memasukkan sampel dan pelarut yang sesuai pada labu kemudian dihubungkan ke kondensor. Dipanaskan pelarut tersebut sampai berada pada titik didih. Setelah itu, terjadi proses kondensasi uap dan kembali ke labu (Mukhriani, 2014).

Dalam metode refluks, yang sangat mempengaruhi proses ekstraksi refluks adalah tingkat pemanasan akan bertambah serta pelarut yang digunakan selama mengekstraksi selalu baru atau segar dikarenakan pelarut akan menguap kembali pada bahan yang terendam. Metode ekstraksi ini dapat digunakan untuk mengekstrak bahan atau simplisia yang sifatnya tahan panas dan bertekstur kasar seperti batang, biji, dan akar (Hasnaeni et al., 2019).

## **6. Destilasi Uap**

Destilasi uap merupakan proses ekstraksi yang serupa dengan metode reflux dan umumnya penggunaan metode ini untuk mengekstrak minyak esensial (campuran dari beragam zat yang menguap). Dalam tahapan pemanasan, uap akan mengalami kondensasi dan destilat (dipisahkan menjadi dua komponen yang tidak dapat menyatu) disimpan di dalam tempat yang dihubungkan ke kondensor. Metode destilasi uap memiliki kekurangan yakni senyawa dapat terdegradasi jika sifatnya tidak tahan dengan pemanasan (Mukhriani, 2014).

Selama proses ekstraksi destilasi uap, bahan yang dihasilkan dari destilasi akan panas karena adanya pemberian panas vaporisasi dari uap yang diumpankan. Sel-sel yang terdapat di jaringan tumbuhan yang memiliki kandungan minyak atsiri akan terdorong oleh uap tersebut sehingga komponen volatil yang dikandungnya akan terbuka dan terlepas dari komponennya. Komponen minyak atsiri yang mudah menguap akan bercampur dengan uap sehingga membentuk campuran fase gas. Kemudian campuran fase gas melewati labu destilasi menuju proses kondensasi. Setelah destilasi dikondensasi, akan dihasilkan dua fase yang

terpisah karena minyak atsiri yang tidak mampu bersatu dengan air. Dimana minyak atsiri terdapat pada bagian atas dari lapisan air. Setelah itu, dipisahkan antara minyak atsiri dengan air lalu disimpan (L. K. Dewi et al., 2018).

### **C. Radikal Bebas**

Radikal bebas adalah suatu atom yang pada orbitalnya tidak mempunyai pasangan elektron. Untuk memperoleh stabilitas kimia, radikal bebas tidak mampu untuk bertahan dengan bentuk aslinya dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga langsung membentuk ikatan dengan bahan di sekitarnya. Molekul stabil terdekat akan diserang oleh radikal bebas dengan cara mengikat elektron molekul tersebut. Kemudian senyawa yang elektronnya telah diambil berubah bentuk ke radikal bebas dan menyebabkan terbentuknya reaksi berantai, dimana pada akhirnya dapat menyebabkan sel rusak. Radikal bebas yang sifatnya reaktif akan mudah menghasilkan reaksi yang sulit untuk dikendalikan sehingga menyebabkan terjadinya ikatan silang pada protein, DNA, lipid, dan pada gugus fungsional mengalami kerusakan oksidatif dalam biomolekul. Peroksidasi lipid pada membran sel dapat merusak membran yang berdampak pada kerusakan protein secara langsung akibat radikal bebas sehingga berpengaruh terhadap beragam jenis protein dan aktivitas dari enzim terganggu serta fungsi struktural protein (Sinaga, 2016).

Radikal bebas secara kontinyu akan terbentuk pada tubuh karena faktor-faktor antara lain metabolisme sel, makanan, paparan radiasi sinar gamma, sinar-X, sinar ultraviolet, peradangan, kandungan kimiawi dalam makanan dan obat, lingkungan yang tercemar, dan pola makan yang tidak sehat. Radikal bebas jika berinteraksi dengan bagian-bagian biologis (protein, lemak serta DNA) dapat membentuk zat oksidatif yang pada akhirnya akan rusak dan menyebabkan stres oksidatif. Secara umum, reaksi berantai yang disebabkan oleh radikal bebas akan

terbentuk dalam tiga fase yakni fase inisiasi, fase propagasi, serta fase terminasi (Labola & Puspita, 2018).

Fase inisiasi adalah tahapan pertama dalam menciptakan jenis radikal. Pada umumnya, peristiwa fase inisiasi adalah homolitik akan membelah namun hal ini tidak sering terjadi akibat dari terhambatnya energi. Fase ini umumnya terjadi di bawah pengaruh dari beberapa faktor, seperti suhu yang tinggi, radiasi ultraviolet, atau katalis logam yang digunakan untuk menghalangi energi. Pada fase propagasi, rantai adalah bagian dari reaksi berantai. Setelah radikal bebas reaktif terbentuk, hal ini memicu terjadinya reaksi terhadap atom yang stabil kemudian menciptakan radikal bebas yang baru. Jadi, tahapan ini berlangsung secara kontinyu yang menyertakan penangkapan atom H atau bertambahnya radikal pada ikatan rangkap dan menyebabkan bertambahnya radikal bebas. Pada fase terakhir berupa terminasi, dimana terhentinya reaksi radikal apabila kedua radikal mengalami reaksi satu sama lain dan memperoleh spesies non-radikal (Labola & Puspita, 2018).

Radikal bebas dapat diperoleh dari sumber endogen dan dapat pula diperoleh dari sumber eksogen. Pada sumber endogen dapat diperoleh dari metabolisme sel normal yang merupakan sumber utama penghasil ROS (*radical oxygen species*) dimana dapat berperan penting ketika mengaktivasi jalur sinyal dalam sel dan berpengaruh pada metabolisme intraseluler dan ekstraseluler (Suryadinata, 2018). ROS merupakan zat oksidan turunan dari oksigen dengan sifatnya yang reaktif, tersusun dari komponen radikal bebas dan non-radikal (Sinaga, 2016). Di dalam tubuh manusia, ROS mempunyai bentuk yang beragam seperti superoksida anion ( $O_2^-$ ), lipid (R), radikal hidroksil (HO), serta peroksida yakni ROO dan XO. ROS dapat menyebabkan kerusakan pada sel dengan cara menyerang membran lipid hingga rusak melalui serangkaian reaksi peroksidasi

lipid. Hal tersebut dapat terjadi karena asam lemak tidak jenuh ganda dalam membran sel memiliki kapasitas sangat tinggi. Peroksidasi membran lemak mengakibatkan terjadinya permeabilitas membran sel meningkat, menurunnya transpor kalsium pada retikulum sarkoplasma, terjadi kerusakan pada fungsi mitokondria serta enzim, dan terbentuknya metabolit toksik (Berawi & Agverianti, 2017).

Produksi ROS secara berlebihan akan menyebabkan tubuh mengalami stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan manifestasi sistemik radikal bebas seperti ROS yang tidak seimbang dengan kemampuan sistem di dalam tubuh dalam menetralkan dan memperbaiki sel yang rusak akibat dari radikal bebas. Rusaknya sel di dalam tubuh sebagian besar tidak terjadi secara langsung, melainkan dapat diakibatkan karena adanya ROS yang diperoleh berupa  $O_2^-$  (radikal superoksida),  $H_2O_2$  (hidrogen peroksida), dan  $OH$  (radikal hidroksil). Meningkatnya stres oksidatif akan mengakibatkan terganggunya metabolisme baik yang dapat menimbulkan beragam jenis penyakit degeneratif diantaranya aterosklerosis, kanker, alzheimer, parkinson, infark miokard, dan gagal jantung (Suryadinata, 2018).

Radikal bebas dapat pula didapatkan dari beberapa faktor eksternal, yakni asap rokok, hasil paparan ultraviolet, senyawa yang dapat memicu bertambahnya radikal yang terdapat di dalam makanan serta polutan lainnya. Radikal bebas mampu mengakibatkan munculnya penyakit yang sifatnya kronis dimana memerlukan rentang waktu yang cukup panjang agar penyakit timbul menjadi nyata atau bersifat akumulatif. Dalam pencegahan beragam penyakit yang ditimbulkan dari radikal bebas dapat diperbaiki dengan pemberian antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektronnya sehingga menstabilkan radikal bebas. Agar stres oksidatif dapat


menurun, maka dibutuhkan tambahan asupan antioksidan dari luar tubuh baik itu dari makanan maupun obat-obatan (Fakriah et al., 2019; Amanda et al., 2019).

#### ***D. Fenolik***

Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder bioaktif yang penyebarannya sangat luas di dalam tanaman terutama disintesis melalui jalur metabolisme asam sikamat, pentosa fosfat, serta fenilpropanoid. Senyawa fenolik berdasarkan strukturnya mengandung beragam senyawa yang mempunyai cincin aromatik baik satu maupun lebih gugus hidroksil dan dapat berkisar dari molekul yang sederhana sampai molekul polimer kompleks. Menurut jumlahnya, senyawa fenolik terbagi atas subkelompok asam fenolik, flavonoid, tanin dan stilbena yang terikat gugus hidroksil fenolik dan elemen struktural yang terhubung dengan cincin benzena (Diniyah & Lee, 2020).

Senyawa fenolik adalah senyawa yang diperoleh dari metabolit sekunder yang berasal dari tanaman dengan kombinasi monosakarida dan polisakarida yang terikat pada satu atau lebih gugus fenolik, baik dalam bentuk ester atau turunan metil ester. Senyawa ini termasuk senyawa aromatik dengan struktur yang berasal dari turunan benzena sehingga mempunyai cincin aromatik serta memiliki gugus hidroksil (OH) berjumlah satu atau lebih. Fenolik memiliki kelarutan yakni cenderung larut di dalam air. Biasanya terikat pada glukosa sebagai glikosida, serta ditemukan pada vakuola sel. Saat ini, diketahui bahwa keanekaragaman struktur senyawa fenolik telah diketahui telah mencapai kisaran lebih dari 8.000 struktur (Mahardani & Yuanita, 2021).





**Gambar 2.** Gugus fenol (Kusnadi, 2018)

Senyawa fenolik adalah senyawa metabolik sekunder yang diperoleh dari tumbuhan dan bercirikan cincin aromatik dengan gugus hidroksil. Senyawa ini bermanfaat sebagai antioksidan, anti kanker, anti inflamasi, antimikroba, melindungi terhadap penyakit jantung, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya sebagai antioksidan, senyawa ini dapat mengurangi ROS karena mempunyai banyak gugus hidroksil (polifenol), dimana gugus hidroksil tersebut (-OH) bereaksi sebagai antioksidan dan menurunkan ROS rantai radikal bebas. (Mahardani & Yuanita, 2021). Untuk mengetahui kadar fenolik dalam suatu sampel maka dilakukan penetapan kandungan fenolik.

Penentuan kandungan total fenolik ditujukan untuk mengetahui korelasi antara aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenolik. Penetapan kandungan total fenolik ditentukan dengan penggunaan reagen folin-ciocalteu dan asam galat sebagai kurva standar. Asam galat termasuk turunan asam hidrogenoat yang termasuk golongan asam fenolik sederhana. Asam galat adalah fenol alami yang bersifat stabil (Wirasti, 2019).

Kandungan fenolik tanaman dinyatakan dalam GAE (*galac acid ekuivalent*), yaitu jumlah kesetaraan miligram asam galat (*3,4,5-trihydroxybenzoic acid*) dalam satu gram sampel. Ekuivalen asam galat adalah panduan yang biasanya digunakan untuk menentukan jumlah senyawa total fenolik yang ada pada sampel (Mukhriani, et al., 2019).


Berdasarkan prinsipnya, reaksi metode folin-ciocalteu berupa ion fenolat



akan mereduksi asam fosfomolibdenum fosfotungstat menjadi kompleks tungsten molibdenum biru dalam media basa. Ion fenolik terbentuk dari disosiasi proton senyawa basa pada media basa. Semakin tinggi konsentrasi kompleks fenolik, maka semakin tinggi ion fenolik yang terbentuk sehingga mereduksi fosfomolibdat-fosfotungstat dan membentuk warna biru pekat yang dapat menghasilkan ukuran serapan semakin besar. Kemampuan senyawa fenolik dalam berperan sebagai antioksidan diakibatkan karena adanya gugus hidroksil pada fenolik. Ketika terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan zat radikal bebas melalui media transfer elektron, hal tersebut akan bertindak sebagai donor atom hidrogen sehingga menghambat proses oksidasi (Wirasti, 2019).

#### ***E. Flavonoid***

Senyawa flavonoid adalah metabolit sekunder polifenol. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol dengan 15 atom karbon dengan susunan ordo  $C_6-C_3-C_6$  yang artinya rangka karbon mengandung dua gugus  $C_6$  (cincin benzena tersubstitusi) dan dihubungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Senyawa flavonoid memiliki struktur yang lebih stabil, tersedia dan aktif secara biologis pada tumbuhan dengan bentuk glikosilasi atau termetilasi. Glikosilasi flavonoid dicapai melalui mekanisme biologis glikosiltransferase dimana enzim mengkatalisis perlekatan molekul gula untuk memperoleh glikosida (Arifin & Ibrahim, 2018).




**Gambar 3.** Kerangka  $C_6-C_3-C_6$  Flavonoid (Sirait, 2007)

Golongan flavonoid antara lain antosianin, kalkon, proantosianin, biflavonil, flavon, flavanol, glikoflavon, flavonon, auron, serta isoflavon. Senyawa flavonoid mampu menghambat banyak reaksi oksidasi karena merupakan senyawa pereduksi. Flavonoid memiliki fungsi sebagai antioksidan dikarenakan mampu mendonorkan elektron pada radikal bebas yang tidak berpasangan. Dimana  $R\cdot$  adalah senyawa radikal bebas,  $Fl-OH$  adalah senyawa flavonoid dan  $Fl-OH\cdot$  adalah senyawa radikal flavonoid (Haeria, et al., 2016).

Kandungan total flavonoid dapat ditetapkan menggunakan metode kolorimetri menggunakan  $AlCl_3$ . Prinsip metode penggunaan  $AlCl_3$  dalam menentukan kandungan total flavonoid yaitu terbentuknya kompleks antara  $AlCl_3$  dengan gugus keton pada atom C-4 dan gugus hidroksida pada atom tetangga C-3 atau C-5 dari gugus flavon dan flavonol. Dalam penetapan kadar total flavonoid digunakan senyawa kuersetin yang dijadikan kurva standar karena kuersetin merupakan flavonoid yang termasuk golongan flavonol dengan gugus keton pada atom C-4 dan juga gugus hidroksil pada atom C-3 dan yang berdekatan C-5. Dalam reaksi ini, diperoleh warna kuning dari kuersetin. Dimana penggunaan kuersetin dalam jumlah yang besar, maka warna kuning yang diperoleh semakin pekat. Pemilihan kuersetin sebagai pembanding dalam penentuan total flavonoid dikarenakan kuersetin termasuk senyawa yang sangat banyak didistribusikan pada tanaman. Terdapat sekitar 60 hingga 75% flavonoid yang terbentuk dalam kuersetin dan glikosidanya. Selain itu, kuersetin mengandung flavonoid yang sangat baik untuk meredam radikal bebas serta menghentikan terjadinya beragam reaksi oksidasi dikarenakan mampu membentuk radikal fenolik yang stabil akibat dari pengaruh resonansi cincin aromatik (Wirasti, 2019).

Penetapan kadar senyawa flavonoid (*2-[3,4-dihydroxyphenyl]-3,5,7-trihydroxy-4H-chromen-4-one*) yang diukur dengan penggunaan pembanding

kuersetin, dapat dihitung sebagai QE (*quercetin equivalent*). Ekuivalen kuersetin merupakan panduan yang biasanya digunakan untuk menentukan kadar senyawa golongan flavonoid yang ada pada suatu sampel (Mukhriani, et al., 2019).



**Gambar 4.** Flavonoid (R•) terhadap radikal bebas FI-O• bereaksi dengan radikal kedua, menghasilkan kuinon yang stabil (Arifin & Ibrahim, 2018).

Senyawa flavonoid mempunyai kemampuan secara langsung dalam meredam radikal bebas yaitu dengan menyumbangkan atom hidrogen. Radikal ini dinonaktifkan berdasarkan persamaan reaksi dimana radikal bebas berupa R• dan radikal fenoksil berupa FI-O•. Secara *in vitro*, flavonoid yang memiliki aktivitas antioksidan sangat bergantung pada susunan gugus fungsi dalam struktur inti. Mekanisme kerja antioksidan berdasarkan pada substansialnya, sangat berpengaruh dari konfigurasi serta jumlah keseluruhan gugus hidroksil. Konfigurasi hidroksil cincin B merupakan konfigurasi yang memiliki pengaruh tinggi terhadap penentuan dalam kemampuan meredam ROS, sedangkan substitusi cincin A dan C mempunyai pengaruh kecil terhadap konstanta laju peredaman radikal anion superoksida (Arifin & Ibrahim, 2018).

## ***F. Antioksidan***

### **1. Pengertian Antioksidan**

Menurut pengertian kimiawi, antioksidan merupakan senyawa donor elektron. Namun menurut pengertian biologis, antioksidan definisikan sebagai senyawa yang berpotensi dalam mengurangi efek negatif oksidan, seperti enzim dan protein pengikat logam. Mekanisme kerja dari antioksidan yaitu dengan cara menyumbangkan elektron pada senyawa oksidan sehingga terbentuk aktivitas untuk menghambat senyawa oksidan (Irianti et al., 2017).

Senyawa antioksidan merupakan atom yang mampu menetralkan radikal bebas dengan menyumbangkan elektronnya untuk menghentikan keadaan radikal yang tidak memiliki pasangan. Senyawa antioksidan mempunyai kemampuan secara langsung dalam menurunkan kerusakan oksidatif dengan cara bereaksi dengan radikal bebas. Selain itu, dapat pula dengan cara tidak langsung seperti menghentikan aktivitas enzim yang dapat memproduksi radikal bebas atau menambah aktivitas enzim antioksidan seluler (Hasnaeni & Aminah, 2019).

Senyawa antioksidan berperan untuk menetralkan serta memusnahkan radikal bebas dalam merusak sel dan molekul biologis di dalam tubuh, seperti DNA, protein dan lipoprotein. Dimana kerusakan tersebut menyebabkan penyakit degeneratif berupa diabetes, kanker, hati, jantung, arthritis, dan katarak. Untuk mencegah kerusakan yang tidak diinginkan, perlu dilakukan penambahan antioksidan dari luar atau dikenal juga dengan antioksidan eksogen. Antioksidan alami mempunyai kemampuan dalam melindungi dan menjaga tubuh dari spesies oksigen reaktif yang dapat merusak biomolekul di dalam tubuh dengan cara menghambat timbulnya penyakit degeneratif, serta mencegah peroksidasi lemak dalam makanan (Hasnaeni & Aminah, 2019).

Antioksidan memiliki fungsi terpenting pada bidang kesehatan, kecantikan dan bahan makanan. Fungsi antioksidan pada bidang kesehatan bermanfaat dalam menjaga tubuh dari penyakit degeneratif berupa penyakit kanker, diabetes, ginjal kronis dan sebagainya. Antioksidan di bidang kecantikan bermanfaat sebagai anti aging atau mencegah tubuh dari penuaan dini dan melindungi kesehatan kulit. Pada bidang pangan, senyawa antioksidan berfungsi sebagai pencegah proses oksidasi yang mampu merusak bahan pangan seperti ketengikan, merubah aroma dan warna pada makanan serta mencegah peroksidasi lipid pada bahan pangan (Berawi & Marini, 2018).

## **2. Jenis-jenis antioksidan**

Antioksidan berdasarkan kelompoknya, terdiri atas dua yakni antioksidan alami dan antioksidan sintetis (Irianti, et al., 2017).

### **a. Antioksidan alami**

Antioksidan alami merupakan senyawa antioksidan yang didapatkan dari bahan alam. Senyawa antioksidan dapat ditemukan dalam berbagai macam tanaman, buah, sayuran, serta rempah-rempah. Antioksidan alami dapat berfungsi sebagai zat pereduksi, penyerapan pembentukan oksigen singlet, meredam radikal bebas dan pengkelat logam dengan bobot molekul 200-400.

Antioksidan alami diklasifikasikan menjadi dua yaitu enzim dan vitamin. Antioksidan seperti enzim yang diproduksi di dalam tubuh yaitu superoksida dismutase (SOD), glutathione peroksidase dan katalase. Senyawa antioksidan dari vitamin yaitu beta karoten (vitamin A),  $\alpha$ -tokoferol (vitamin E) dan asam askorbat (vitamin C). Sedangkan antioksidan yang diperoleh dari tanaman dapat berupa senyawa polifenol atau fenolik, flavonoid, kumarin, turunan asam sinamat, asam organik, dan tokoferol.

## **b. Antioksidan sintetis**

Antioksidan sintetis berfungsi untuk meredam radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Adapun contoh dari senyawa ini yaitu *Butylated hydroxytoluene* (BHT), *Butylated hydroxyl anisole* (BHA), *Propyl gallate* (PG), *metal chelating agent* (EDTA), *Nordihydro guaretic acid* (NDGA), *Tertiary butyl hydroquinone* (TBHQ). Antioksidan yang dimanfaatkan pada bahan pangan pada saat ini yaitu monohidroksi atau polihidroksi senyawa fenol dengan beragam substituen pada cincin. Dalam peningkatan kelarutan pada lemak dan minyak, antioksidan fenolik sintesis kerap digantikan dengan alkil.

Batas penggunaan antioksidan sintetis utama adalah 0,02% yang terkandung dalam lemak atau minyak. TBHQ merupakan antioksidan minyak nabati. BHA dan BHT memiliki sifat yang stabil dengan panas dan kerap dimanfaatkan dalam menstabilkan lemak selama proses pemanggangan dan penggorengan produk. Dalam penggunaan jangka panjang, BHA dan BHT dapat memberikan efek toksik pada tubuh. BHT atau BHA yang mengandung 1% dalam makanan dapat menyebabkan berat badan menurun serta organ hati dan otak yang mengalami pembengkakan yang berat.

## **3. Mekanisme kerja antioksidan**

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan terdiri atas tiga yakni antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier (Berawi & Marini, 2018).

### **a. Antioksidan primer**

Mekanisme kerja antioksidan primer ini yaitu antioksidan primer memiliki sifat yang dapat memutus reaksi berantai (*chain-breaking antioxidant*) dan mampu bereaksi terhadap radikal lipid sehingga berubah lebih stabil. Adapun



contoh dari antioksidan jenis ini yaitu *Superoksida Dismutase (SOD)*, *Glutation Peroksidase (GPx)*, catalase serta protein pengikat logam.

#### **b. Antioksidan sekunder**

Mekanisme kerja antioksidan sekunder yaitu dengan menarik ion logam, meredam radikal, menangkap oksigen, menguraikan hidroperoksida menjadi senyawa non-radikal, menyerap radiasi ultraviolet serta melindungi agar tidak terjadi reaksi berantai. Adapun contoh antioksidan ini yaitu isoflavone, vitamin E, vitamin C, bilirubin serta albumin.

#### **c. Antioksidan tersier**

Mekanisme kerja antioksidan tersier yakni bekerja dengan cara melakukan perbaikan terhadap biomolekul yang rusak akibat serangan radikal bebas. Antioksidan jenis ini dapat berupa enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase.

### **G. Metode analisis aktivitas antioksidan**

Analisis antioksidan merupakan metode kuantitatif yang dilakukan dengan mengukur suatu komponen untuk mengetahui kemampuannya dalam mereduksi suatu zat. Terdapat beragam metode analisis dalam penentuan aktivitas antioksidan pada ekstrak tanaman. Pada metode analisis antioksidan, dibagi menjadi dua bagian yakni: HAT (*Hydrogen Atom Transfer*) dan SET (*Single Electron Transfer*). Dari kedua metode tersebut seringkali muncul secara bersamaan, namun mekanisme dari kedua metode tersebut mempunyai perbedaan seperti berikut (Mu'nisa, 2022):

- a. Metode HAT merupakan metode pengukuran kapasitas antioksidan yang dapat dilakukan untuk menetralkan radikal bebas dengan cara menyumbangkan atom H. Metode ini sangat baik digunakan untuk senyawa fenolik dan pada pengujian aktivitas antioksidan yang menggunakan zat



berwarna dari radikal bebas. Dalam pengujian ini akan menunjukkan adanya aktivitas antioksidan yang ditandai dengan berubahnya warna dari radikal bebas menjadi tidak berwarna. Contoh dari metode HAT yaitu pengujian antioksidan menggunakan metode ABTS dan *Hydroxyl radical scavenging assay* (ORAC<sub>OH\*</sub>).

- b. Metode SET didasarkan pada reaksi redoks. Dalam pengujian antioksidan, agen oksidasi mengalami reaksi terhadap antioksidan yang termasuk dalam senyawa fluoresensi. Pada pengujian ini digunakan alat spektrofotometri untuk mengukur perubahan warna yang memiliki korelasi terhadap konsentrasi antioksidan yang terkandung pada suatu sampel. pH dan pelarut yang digunakan sangat mempengaruhi metode SET. Dalam pengujiannya, didasarkan pada warna yang mengalami perubahan dimana proses reduksi akan semakin tinggi jika terjadi perubahan warna yang besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi aktivitas antioksidan dalam suatu sampel semakin besar. Contoh dari metode SET yaitu pengujian antioksidan dengan menggunakan metode FRAP dan DPPH.

Berdasarkan dari kedua mekanisme analisis antioksidan tersebut, metode pengujian yang sering dilakukan yaitu FRAP, DPPH, dan ABTS.

### 1. Metode DPPH

DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; C<sub>18</sub>H<sub>12</sub>N<sub>5</sub>O<sub>6</sub>, M=394.33) adalah suatu radikal bebas dengan sifat yang stabil. Dalam pengujian dengan menggunakan metode DPPH, warna ungu yang dimiliki oleh DPPH akibat delokalisasi akan mengalami perubahan warna menjadi kuning hidrazine jika terjadi reaksi antara antioksidan dengan DPPH. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya proses reduksi yang mengakibatkan berkurangnya warna ungu pada DPPH. Pada proses reduksi, substrat akan menyumbangkan atom H ke radikal

bebas. Metode pengujian ini berfungsi untuk mengetahui potensi dari antioksidan pada suatu sampel dalam menangkal radikal bebas dimana dilakukan uji kuantitatif berupa proses skrining menggunakan alat spektrofotometri pada panjang gelombang maksimal. Metode pengujian DPPH dipengaruhi oleh cahaya, pH, pelarut yang digunakan, waktu inkubasi, ion organik, garam dan suhu. Pada penentuan aktivitas antioksidan dapat dilakukan menggunakan pengujian DPPH yang ditetapkan dengan parameter  $IC_{50}$  (*inhibition concentration*). Hasil dari nilai  $IC_{50}$  yang diperoleh dinyatakan sebagai konsentrasi antioksidan yang digunakan dalam mengurangi konsentrasi DPPH sebanyak 50%. Dimana semakin kecil nilai  $IC_{50}$  maka semakin tinggi aktivitas antioksidan pada suatu sampel, kemudian dikalkulasikan menggunakan *inhibition curve* (Mu'nisa, 2022).

Pada pengukuran antioksidan, metode serapan terhadap DPPH termasuk metode sederhana, cepat, mudah, cukup teliti serta hanya membutuhkan sampel dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, pengujian DPPH sangat efektif jika diterapkan dalam pengukuran aktivitas antioksidan pada suatu sampel. DPPH merupakan senyawa organik yang memiliki kandungan nitrogen yang tidak stabil dengan penyerapan kuat pada  $\lambda$  maximum 517 nm dan memiliki warna ungu gelap. Berdasarkan prinsipnya, DPPH bekerja dengan mengikat atom hydrogen yang ada pada senyawa antioksidan (transfer elektron) contohnya fenol agar lebih stabil, atau senyawa antioksidan akan menyumbangkan atom H dengan proses reaksi antara DPPH dengan antioksidan sehingga menyebabkan penyerapan DPPH semakin menurun. Hal ini dapat ditandai dengan warna radikal bebas DPPH yang berubah warna, yang awalnya warna ungu berubah menjadi warna kuning pucat. Penggunaan metode reduksi DPPH dalam menetapkan aktivitas antioksidan dapat ditetapkan sebagai nilai peredaman DPPH (Haeria, et al., 2016).

Metode DPPH memiliki kelebihan seperti metode analisis dalam pengujian ini lebih sederhana, waktu yang singkat, lebih mudah serta sensitif terhadap sampel yang menggunakan konsentrasi rendah. Kekurangan pengujian DPPH yaitu keterbatasan dalam penggunaan pelarut karena DPPH memiliki kelarutan yang hanya larut dengan pelarut organik, sehingga ketika menganalisis senyawa hidrofilik akan sedikit sulit. DPPH sendiri banyak digunakan sebagai langkah utama untuk melakukan pengujian analisis aktivitas antioksidan karena dapat menunjukkan sistem pertahanan tubuh dalam meredam radikal bebas (Amnestiya, et al., 2023).

## 2. Metode ABTS

ABTS (*2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)*) adalah senyawa radikal kation organik yang dimanfaatkan dalam pengukuran aktivitas antioksidan, dimana bereaksi pada kondisi pH 7,4. Metode ini didasarkan pada waktu serta persentase perubahan warna sebagai bagian dari fungsional konsentrasi. Aktivitas ABTS dapat ditandai dengan terjadinya reaksi warna yang berubah dari warna biru kehijauan menjadi bening. Metode pengujian ABTS bertujuan agar dapat mengetahui seberapa besar potensi antioksidan dalam menyumbangkan radikal proton sehingga mencapai stabilitas (Mu'nisa, 2022).

Metode ABTS memiliki kelebihan berupa hasil absorbansi atau penyerapan spesifik pada rentang panjang gelombang tampak dan durasi respon yang singkat. Metode ABTS juga larut dengan pelarut yang organik dan air sehingga mampu mengukur senyawa lipofilik dan senyawa hidrofilik. Akan tetapi, metode ABTS tidak dapat menunjukkan sistem pertahanan tubuh terhadap radikal bebas. Oleh karena itu, metode pengujian ABTS hanya dapat digunakan sebagai metode referensi karena tidak mampu mewakili sistem pertahanan biologis tubuh (Amnestiya et al., 2023).

### 3. Metode FRAP

FRAP (*Ferric Reducing Ability of Plasma*) adalah metode analisa yang umumnya diterapkan dalam pengukuran kemampuan antioksidan untuk mereduksi Fe(III)-TPTZ (*ferritripyridyl-triazine*) menjadi Fe(II)-TPTZ yang dapat ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi warna biru. TPTZ merupakan *colorants* dan Fe(III) adalah radikal bebas. Pengujian kemampuan antioksidan dilakukan dengan metode FRAP tidak memerlukan perlakuan *pre-treatment* karena dipandang konstan dan linear terhadap hasil pengujian. Metode ini mampu melakukan pengukuran terhadap kombinasi efek antioksidan dari senyawa biologi non-enzim. Kemudian mampu memberi indeks dalam menurunkan efek oksidatif dari radikal bebas (Mu'nisa, 2022).

#### H. Uraian Vitamin C

Vitamin C merupakan vitamin yang dapat larut dalam air, dan manfaat untuk memperbaiki jaringan dan metabolisme di dalam tubuh melalui reaksi oksidasi dan reduksi. Selain itu, vitamin C dapat berfungsi sebagai antioksidan, mempercepat proses penyembuhan luka, proses hidrosilasi hormon korteks adrenal, membantu membentuk kolagen dan mengurangi kadar kolesterol di dalam darah. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan kuat yang mampu menjaga sel terhadap karsinogen, dan terutama dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium (mineral penting dalam perkembangan gigi dan tulang) dan zat besi dari bahan makanan lainnya (Hasanah, 2018).

Vitamin C merupakan nutrisi yang berfungsi sebagai antioksidan dan sangat baik dalam meredam aktivitas radikal bebas, dimana radikal ini mampu mengakibatkan rusaknya sel di dalam tubuh. Selain itu juga mampu menjaga lensa dari kerusakan oksidatif yang diakibatkan oleh radiasi. Vitamin C juga mampu

menurunkan resiko kanker dan mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas yang mampu menyebabkan kanker (Hasanah, 2018).

Vitamin C dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pengujian aktivitas antioksidan pada suatu sampel karena berperan sebagai antioksidan sekunder yang dimana mampu meredam radikal bebas, melindungi dari terjadinya reaksi berantai, aktivitas antioksidan yang dimiliki sangat tinggi, sangat mudah untuk didapatkan serta vitamin C memiliki sifat yang lebih polar dari vitamin lainnya. Vitamin C memiliki gugus hidroksi bebas yang berperan sebagai peredam radikal bebas (Damanis, et al., 2020).

Vitamin C merupakan antioksidan yang ditemukan dalam larutan air seperti darah dan (intraseluler). Pada fase air, akan terjadi reaksi antara vitamin C dengan radikal bebas sebelum radikal bebas merusak terutama menghancurkan lipid sel sehingga tidak berfungsi dengan baik. Vitamin C mampu bereaksi dengan beragam jenis spesies oksigen reaktif (ROS) dan spesies nitrogen yang terdapat di dalam darah atau pada sel dengan cara menyumbangkan elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas yang awalnya tidak berpasangan menjadi berpasangan. Beragam radikal bebas dan spesies reaktif yang bereaksi dengan vitamin C merupakan radikal hidroksil ( $\text{OH}^\circ$ ), radikal hidroperoksil ( $\text{HO}_2^\circ$ ), radikal superoksida ( $\text{O}_2^\circ$ ), radikal alkoksil ( $\text{RO}^\circ$ ), radikal peroksil ( $\text{RO}_2^-$ ), hidrogen peroksida ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), radikal peroksinitrit, dan radikal nitrit oksid (Hasanah, 2018).

Vitamin C memiliki sifat yang mudah teroksidasi bila terpapar oleh udara dan akan dipercepat lagi apabila terpapar oleh panas, sinar, alkali, enzim, oksidator, serta katalis tembaga (Cu) dan besi (Fe). Hal ini disebabkan karena sifat dari vitamin C yang tidak stabil. Vitamin C mudah teroksidasi dikarenakan kandungan senyawa berupa gugus fungsi hidroksi (OH) yang sangat reaktif. Apabila terdapat zat pengoksidasi, maka gugus hidroksi akan teroksidasi menjadi

gugus karbonil. Proses oksidasi akan terhambat jika vitamin C berada dalam suasana sangat asam atau pada suhu rendah. Namun, vitamin C cukup stabil dalam kondisi kering (Hasanah, 2018).

### *I. Spektrofotometri UV-Vis*

Spektrofotometri UV-Vis merupakan instrumen yang dapat digunakan dalam mempelajari sifat-sifat serapan dari bahan-bahan yang berfungsi sebagai panjang gelombang. UV-Vis adalah singkatan dari ultraviolet-visible. Spektrofotometri UV-Vis dapat dimanfaatkan untuk mengetahui sifat penyerapan suatu bahan dalam rentang panjang gelombang ultraviolet (dari kisaran 200 nm) sampai mencakup semua panjang gelombang cahaya tampak (hingga kisaran 700 nm) (Due et al., 2019).

Spektrofotometer UV-Vis merupakan metode instrumental yang umumnya digunakan dalam analisis kimia untuk mengetahui senyawa (padat/cair) yang didasarkan pada serapan foton. Pada umumnya, suatu sampel harus diolah atau diderivatisasi agar dapat menyerap foton pada daerah UV-Vis, contohnya seperti dilakukan penambahan pereaksi/reagen sehingga membentuk garam kompleks dan lain-lain (Irawan, 2019).

Spektrofotometer UV-Vis adalah metode yang digunakan dalam pengujian jumlah cahaya yang diserap pada setiap panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak. Dalam perangkat ini, sinar cahaya yang terbelah sebagian cahaya diarahkan melewati sel transparan yang memiliki kandungan pelarut. Berdasarkan prinsipnya adalah apabila radiasi elektromagnetik pada daerah sinar ultraviolet dan cahaya tampak melewati senyawa dengan ikatan rangkap, sebagian radiasi biasanya diserap oleh senyawa tersebut. Banyaknya radiasi yang diserap bergantung pada panjang gelombang radiasi dan struktur senyawa. Absorbansi cahaya radiasi dapat disebabkan oleh penurunan energi radiasi ketika elektron dari



orbit energi yang lebih rendah tereksitasi ke orbit energi yang lebih tinggi (Haeria, et al., 2016).


Spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan dalam pengujian analisa fosfat dalam sedimen melalui interaksi antara cahaya pada panjang gelombang tertentu dan bahan dalam bentuk molekul atau atom. Sinar dapat berupa sinar tampak (visibel), sinar ultraviolet (tak kasat mata), dan sinar infra merah, sedangkan pada suatu bahan dapat berupa molekul yang memiliki elektron valensi. Sinar yang dikeluarkan dari suatu sumber dikenal dengan radiasi elektromagnetik. Interaksi antara cahaya atau radiasi elektromagnetik dan materi dapat terjadi melalui emisi, serapan, dan hamburan. Oleh karena itu, seringkali disebut adanya spektroskopi emisi, spektroskopi serapan dan spektroskopi hamburan. Pada alat spektrofotometri UV-Vis digunakan interaksi penyerapan dalam pengujiannya. Secara sederhananya, spektrofotometri UV-Vis terdiri atas beberapa bagian yaitu (Munarsih & Rini, 2019):

- a. Sumber cahaya, yaitu cahaya polikromatis dari lampu Tungsten/Wolfram yang berada di daerah Visible (400-800 nm) dan lampu Deuterium yang berada di daerah Ultraviolet (0-400 nm) (Munarsih & Rini, 2019).
- b. Monokromator berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. Monokromator adalah suatu bagian dalam proses spektrofotometer UV-Vis untuk memperoleh radiasi monokromatik dari sumber radiasi polikromatik. Monokromator pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian slot masuk-filter-prisma-grating-keluar (Munarsih & Rini, 2019; RD Rahmah, et al., 2021).
- c. Kuvet/sel sampel sebagai tempat sampel yang akan dianalisis, dimana peninjauan dari pemakaian kuvet ada dua macam yaitu, kuvet permanen yang terbuat dari bahan gelas hasil leburan silika dan kuvet disposable yang



pemakaiannya untuk satu kali terbuat dari bahan teflon atau plastik. Berbentuk persegi panjang lebar 1 cm, memiliki permukaan lurus dan sejajar secara optis, transparan, tidak bereaksi terhadap bahan kimia, tidak mudah rapuh, dan memiliki bentuk yang sederhana namun solid (Munarsih & Rini, 2019; RD Rahmah et al., 2021).

- d. Detektor berfungsi untuk menangkap sinar yang melewati sampel. Kualitas detektor sangat menentukan kualitas spektrofotometer UV-Vis. Berfungsi sebagai pengubah sinyal radiasi menjadi sinyal elektronik (Munarsih & Rini, 2019; RD Rahmah et al., 2021).
- e. *Read Out* yaitu suatu sistem yang dapat menangkap isyarat listrik yang berasal dari detektor dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk angka transmittan atau penyerapan yang ditunjukkan pada display alat (Munarsih & Rini, 2019)



**Gambar 5.** Diagram alat spektrometer UV-Vis (Suhartati, 2017)

Berdasarkan prinsip kerjanya, spektrofotometri UV-Vis bekerja dengan cara sinar monokromatik melewati suatu medium (larutan), kemudian sebagian

sinar tersebut diserap ( $I$ ), sebagian dipantulkan ( $I_r$ ), dan sebagian dipancarkan ( $I_t$ ). Penerapan rumus ini dalam pengukuran kuantitatif dilakukan secara komparatif dengan menggunakan kurva kalibrasi yang berhubungan dengan konsentrasi deret larutan untuk menganalisis unsur pada kadar rendah baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Pada penetapan secara kualitatif didasarkan pada puncak yang diperoleh spektrum dari suatu unsur tertentu dalam panjang gelombang tertentu, sedangkan penetapan secara kuantitatif didasarkan pada nilai serapan yang diperoleh dari spektrum yang terdapat pada suatu senyawa kompleks tergantung unsur yang dianalisis. Dasar dari pengukuran spektrofotometri UV-Vis yaitu apabila digunakan dalam hukum Lambert-Beer, yaitu jika suatu cahaya monokromatik melewati medium yang transparan, maka intensitas cahaya yang diteruskan sebanding dengan ketebalannya dan sensitivitas media larutan yang digunakan (Fatimah & Yanlinastuti, 2016).

Spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan dalam penetapan suatu sampel seperti larutan, gas, atau uap. Biasanya, sampel perlu diolah terlebih dahulu menjadi suatu larutan jernih. Sedangkan pada sampel yang sifatnya larutan, maka terdapat persyaratan pelarut yang harus diperhatikan dalam penggunaannya, seperti (Suhartati, 2017):

1. Sampel harus larut dengan sempurna
2. Pelarut yang digunakan tidak memiliki kandungan ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak memiliki warna (tidak boleh menyerap sinar yang digunakan oleh sampel)
3. Pelarut tidak berinteraksi dengan molekul senyawa yang dianalisa
4. Kemurnian pelarut harus tinggi.

### **J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan**

Pengobatan merupakan suatu langkah dalam menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu kesehatan hidup manusia. Prinsip pengobatan dalam Islam diperbolehkan selama tidak berobat dengan zat yang terlarang atau yang diharamkan, tidak merugikan orang-orang yang berada disekitar serta tidak membawa syirik seperti menggunakan mantra atau sihir dan berdoa kepada roh halus karena Islam berarti keselamatan sebagai agama tauhid yang tidak bertentangan dengan akal dan tidak musyrik. Pengobatan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi manusia, yakni jasmani dan rohani melalui pengobatan al-Quran maupun sesuatu yang telah Allah ciptakan. Sesungguhnya Allah SWT. menurunkan penyakit beserta obatnya.

Allah SWT. dengan segala kekuasaan dan keadilannya mampu menurunkan penyakit kepada hambanya dan dapat pula menyembuhkan penyakit dengan menurunkan obat sebagai penawar dari penyakit tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً  
(رواي البخاري)."

Artinya:

“Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad al-Zubairiy menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id bin Abi Husain menceritakan kepada kami, dia berkata: Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepadaku, dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi SAW. dia bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari: 5678).

Dalam hadits lain disebutkan dari riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir, Rasulullah SAW. bersabda: Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, niscaya akan sembuhlah penyakit itu atas seizin Allah” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa Allah SWT. yang menurunkan penyakit kepada hamba-Nya, baik itu ringan, fisik maupun mental maka Allah SWT. juga yang menurunkan obatnya. Segala jenis penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT. pasti ada obatnya tergantung dari usaha dan cara mengatasinya sehingga penyakit tersebut dapat sembuh atas izin Allah SWT.

Pengobatan dalam al-Quran disebutkan secara umum bahwa terdapat dua jenis pengobatan yakni pengobatan secara psikologi misalnya memperbanyak zikir untuk menenangkan hati dalam beraktivitas termasuk dalam melakukan penelitian dan pengobatan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang diperoleh secara alami. Dikalangan masyarakat, salah satu pengobatan yang kerap dilakukan yaitu dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena relatif murah dan efek samping yang ditimbulkan juga sangat sedikit. Oleh karena itu banyak penelitian yang tengah berkembang dan dilakukan oleh ilmuwan dan para praktisi tradisional di dunia terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan sebagai obat.

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan seisinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan

yang baik dengan kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S Ash-Shu'ara / 26: 7

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakah adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah SWT. di Bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2015).

Dalam tafsir Al-Qurthubi mengatakan bahwa Allah memperingatkan akan keagungan dan kekuasaan-Nya, bahwa jika mereka melihat dengan hati dan mata mereka niscaya mereka mengetahui bahwa Allah adalah yang berhak untuk disembah, karena Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hal apa yang disebutkan, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi untuk menunjukkan bahwa Allah Maha kuasa dan tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu apapun (Al-Qurthubi, 2009).

Dari penjelasan kedua ulama di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT. dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya yang menciptakan bumi dan segala isinya, salah satunya beragam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Ketika kita senantiasa merenungi, mengamati dan mengkaji setiap ciptaan-Nya, niscaya Allah SWT. akan memberikan petunjuk bagi hamba-Nya.

Sebagaimana dijelaskan pula oleh Allah SWT. mengenai berbagai jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam firman-Nya QS. Taahaa / 20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

“Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”

Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah SWT. telah menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah Allah SWT. dikatakan dalam firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya: Dia meurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan serta kebutuhan makhluk hidup. Ayat tersebut juga mengisyaratkan pada manusia agar senantiasa mensyukuri serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah diturunkan dari langit oleh Allah SWT. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. mempunyai



manfaat sehingga diciptakan di muka bumi ini. Tanaman yang beragam dapat digunakan oleh manusia sebagai bahan-bahan dalam pengobatan. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam pengobatan adalah biji labu kuning yang mempunyai begitu banyak kandungan yang dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Namun untuk mengetahui manfaat dari beragam jenis tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. dibutuhkan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Dari ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa Allah SWT. memerintahkan untuk memperhatikan bumi yang diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Dengan dilakukannya penelitian dapat meningkatkan, mengembangkan dan mencari jalan keluar terhadap masalah perkembangan ilmu pengetahuan seperti pada penelitian di bidang kesehatan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) menggunakan metode DPPH (*2,2-diphenyl -1-picrylhydrazyl*).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmasi Biologi, Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Farmasi Kimia, dan Laboratorium Kimia Analisa Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan terhitung mulai bulan April sampai Agustus 2023.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium yang merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat suatu variabel, berupa pengujian fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) menggunakan spektrofotometri UV-Vis.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman labu kuning (*Cucurbita moschata*).

## 2. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel dari bahan alam yaitu biji labu kuning yang diperoleh dari Pasar Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.

### *D. Alat dan Bahan*

#### 1. Alat

Alat yang digunakan ialah blender (Advance<sup>®</sup>), ayakan mesh 40, seperangkat alat maserasi, spektrofotometri UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis<sup>®</sup>), timbangan analitik (AND GR-200<sup>®</sup>), vakum rotary evaporator (Heidolph<sup>®</sup>), dan vortex mixer (GEMMY VM-300<sup>®</sup>).

#### 2. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu air suling, aluminium klorida (AlCl<sub>3</sub>), asam galat, simplisia biji labu kuning, folin-ciocalteu, kuersetin, natrium asetat (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>), natrium hidroksida (NaOH), kertas saring, metanol (CH<sub>3</sub>OH), etanol (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 70%, etanol 96%, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), dan etanol pro-analisis.

### *E. Pengolahan dan Pengujian Sampel*

#### 1. Pengumpulan Sampel

Pengambilan sampel biji labu kuning dilakukan secara acak tanpa memperhatikan ukuran buah dan biji.

#### 2. Pengolahan Sampel

Biji labu kuning yang diperoleh ditimbang sebanyak 1000 gram basah. Setelah itu, dilakukan sortasi basah atau dibersihkan dari kotoran yang menempel kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih dan ditiriskan. Selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40° C hingga kering dengan susut

pengeringan tidak lebih dari 10%. Kemudian dilakukan sortasi kering. Simplisia yang sudah kering, selanjutnya dihaluskan menggunakan diblender kemudian diayak menggunakan ayakan mesh nomor 40 (Tandi, et al., 2018; KemenKes RI, 2017; Moerfiah et al., 2012).

### 3. Pembuatan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning

Sampel biji labu kuning yang telah diserbukkan selanjutnya ditimbang sebanyak 300 gram kemudian diekstraksi secara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% sebanyak 750 mL hingga sampel terendam seluruhnya. Bejana maserasi ditutup dengan *aluminium foil* dan direndam selama 3x24 jam ditempat yang terlindungi dari cahaya matahari sambil sesekali diaduk. Setelah 3 hari, sampel disaring menggunakan kertas saring kemudian ampas direndam kembali dengan pelarut selama 3 hari. Hal ini dilakukan hingga hasil filtrat bening. Hasil filtrat kemudian diuapkan menggunakan *rotary evaporator* hingga menghasilkan ekstrak yang kental. Perlakuan yang sama dilakukan menggunakan pelarut etanol 96% (Pelu, et al., 2020).

$$\% \text{ rendemen ekstrak} = \frac{\text{bobot ekstrak}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\%$$

### 4. Penetapan Kadar Total Flavonoid

#### a. Pembuatan reagen

- 1) Reagen Aluminium klorida ( $\text{AlCl}_3$ ) 10%

2,5 gram  $\text{AlCl}_3$  dilarutkan di dalam labu tentukur 25 mL menggunakan aquadest dan dicukupkan volumenya hingga 25 mL (KemenKes RI, 2014).

- 2) Pereaksi natrium asetat ( $\text{C}_2\text{H}_3\text{NaO}_2$ )

2,05 gram  $\text{C}_2\text{H}_3\text{NaO}_2$  dilarutkan dalam labu tentukur 25 mL menggunakan aquadest dan dicukupkan hingga 25 mL (KemenKes RI, 2014).

**a. Prosedur penetapan panjang gelombang maksimum kuersetin**

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan running larutan standar kuersetin dengan cara diambil 1,4 mL larutan kuersetin kemudian dicukupkan dengan etanol p.a sebanyak 3,5 mL. Setelah itu diukur serapan panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 435 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel (Haeria, et al., 2016).

**b. Prosedur pengukuran larutan pembanding**

Kuersetin sebanyak 2,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 mL dan dicukupkan dengan etanol p.a. sebanyak 25 mL sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Kemudian dibuat seri konsentrasi 20 µg/mL, 25 µg/mL, 30 µg/mL, 35 µg/mL, dan 40 µg/mL. Sebanyak 0,5 mL larutan standar kuersetin dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 0,1 mL AlCl<sub>3</sub> 10% dan 0,1 mL C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub> 1 M lalu ditambahkan 2,8 mL air suling. Didiamkan selama 30 menit (Haeria, et al., 2016).

**c. Penetapan kadar total flavonoid dalam sampel**

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 0,5 mL larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan reagen AlCl<sub>3</sub> sebanyak 0,1 mL dan 0,1 mL C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>NaO<sub>2</sub>. Kemudian ditambahkan aquadest hingga 6 mL. Didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 435 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik (Haeria, et al., 2016).

Kadar fenolik total dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Total Flavonoid} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

Ket :

C = Konsentrasi kuersetin (nilai x) (mg/L)

V = Volume ekstrak (L)

M = Massa sampel (g)

FP = Faktor Pengenceran

## 5. Penetapan Kadar Total Fenolik

### a. Pembuatan reagen

#### 1) Reagen *follin-ciocalteu* 7,5%

Folin-ciocalteu sebanyak 7,5 mL dicukupkan volumenya dengan aquadest hingga 100 mL (KemenKes RI, 2014).

#### 2) Pereaksi natrium hidroksida (NaOH)

NaOH sebanyak 1 gram dilarutkan dengan 100 mL aquadest (KemenKes RI, 2014)

### b. Prosedur penetapan panjang gelombang maksimum asam galat

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan dengan running larutan standar asam galat dengan cara diambil 0,4 mL larutan asam galat kemudian dicukupkan dengan etanol p.a sebanyak 1 mL. Setelah itu diukur serapan panjang gelombang 400-800 nm menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 425 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel (Haeria, et al., 2016).

### c. Prosedur pengukuran larutan asam galat

2,5 mg asam galat dimasukkan ke dalam labu tentukur 25 mL dan dicukupkan dengan etanol p.a. sebanyak 25 mL sehingga diperoleh konsentrasi 100 ppm. Kemudian dibuat seri konsentrasi 20  $\mu\text{g/mL}$ , 30  $\mu\text{g/mL}$ , 40  $\mu\text{g/mL}$ , 50  $\mu\text{g/mL}$ , dan 60  $\mu\text{g/mL}$ . Masing-masing dari konsentrasi dicukupkan dengan

aquadest hingga 1 mL. Selanjutnya ditambahkan reagen follin-ciocalteu 7,5% sebanyak 1,25 mL kemudian ditambahkan 1 mL pereaksi NaOH. Diinkubasi selama 15 menit kemudian diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm (Safitri, et al., 2021).

**d. Penetapan kadar total fenolik dalam sampel**

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 20 µL larutan sampel uji ke dalam tabung reaksi dan dicukupkan aquadest hingga 230 µL. Selanjutnya ditambahkan 1,25 mL reagen follin-ciocalteu dan 1 mL NaOH. Didiamkan selama 15 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 425 nm. Dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik, kemudian kandungan fenolik dalam ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen asam galat (mg GAE/g Ekstrak) (Safitri, et al., 2021). Kadar fenolik total dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Total Fenolik} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

Ket :

C = Konsentrasi asam galat (nilai x) (mg/L)

V = Volume ekstrak (L)

M = Massa sampel (g)

FP = Faktor Pengenceran

**6. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH (2,2-diphenyl - 1-picrylhydrazyl)**

**a. Pembuatan larutan DPPH (BM 394,32) konsentrasi 0,4 mM**

7,88 mg serbuk DPPH ditimbang dan dilarutkan dengan 50 mL etanol p.a. Selanjutnya diukur panjang gelombang maksimum DPPH dengan cara diambil 1 mL larutan DPPH 0,4 mM dan dimasukkan ke dalam vial coklat kemudian



ditambahkan 1 mL etanol p.a dan diukur serapan panjang gelombang 400-800 nm. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 515 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel (Haeria, et al., 2016).

#### **b. Pembuatan kurva baku vitamin C**

Vitamin C sebanyak 2,5 mg dilarutkan dalam 25 mL etanol p.a sehingga menghasilkan 100 ppm. Dibuat seri konsentrasi 1 µg/mL, 2 µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL, dan 5 µg/mL. Masing-masing dari konsentrasi ditambahkan 1 mL DPPH dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga 4 mL. Didiamkan selama 30 menit diruangan yang tertutup dan gelap kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Wulan, et al., 2019).

#### **c. Pengujian aktivitas antioksidan sampel**

Ekstrak ditimbang sebanyak 20 mg kemudian dilarutkan dalam 5 mL etanol p.a. sehingga menghasilkan konsentrasi 4000 ppm. Dibuat seri konsentrasi 100 µg/mL, 200 µg/mL, 300 µg/mL, 400 µg/mL, dan 500 µg/mL. Kemudian ditambahkan larutan DPPH sebanyak 1 mL dan dicukupkan dengan etanol p.a. hingga 4 mL. Larutan dihomogenkan dan didiamkan diruangan yang tertutup dan gelap selama 30 menit kemudian diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 515 nm (Haeria, et al., 2016).

#### **F. Analisis data**

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan perhitungan data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. Perhitungan persentasi inhibisi serapan DPPH menggunakan rumus (Purwanto et al., 2017):

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{\text{absorbansi blanko} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi blanko}} \times 100\%$$

Ket :

Absorbansi blanko = absorbansi DPPH

Absorbansi sampel = absorbansi sampel uji

Aktivitas antioksidan dapat ditentukan dengan perhitungan  $IC_{50}$  senyawa aktif menggunakan regresi linear dengan rumus:

$$y = ax + b$$

Dimana :

y = nilai presentase inhibisi

x = konsentrasi sampel (ppm)

a = konstanta (titik potong y)

b = koefisien (variabel x)



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

1. Hasil Ekstraksi

**Tabel 1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata)**

Jenis Ekstrak	Berat Sampel (g)	Volume Pelarut etanol (L)	Berat Ekstrak (g)	% Rendemen
Etanol 70%	300	1,5	8,38	2,794%
Etanol 96%	300	1,5	9,86	3,286%

2. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid

**Tabel 2. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70%**

Replikasi	Berat Sampel (mg)	Absorbansi	Kadar Flavonoid (mg QE/g ekstrak)
I	20,0	0,411	68,35
II	20,2	0,469	75,05
III	20,1	0,445	72,33
<b>Rata-rata</b>			<b>71,91</b>

**Tabel 3. Hasil Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 96%**

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kadar Flavonoid (mg QE/g ekstrak)
I	20,0	0,520	82,26
II	20,2	0,570	87,78
III	20,1	0,529	82,99
<b>Rata-rata</b>			<b>84,40</b>

3. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik

**Tabel 4. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70%**

Replikasi	Berat Sampel (mg)	Absorbansi	Kadar Fenolik (mg GAE/g ekstrak)
I	20,2	0,675	162,91
II	20,3	0,689	193,34
III	20,2	0,688	191,38
<b>Rata-rata</b>			<b>183,034</b>

**Tabel 5. Hasil Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 96%**

Replikasi	Berat Sampel (mg)	Absorbansi	Kadar Fenolik (mg GAE/g ekstrak)
I	20,1	0,716	253,94
II	20,2	0,727	276,77
III	20,4	0,724	267,55
<b>Rata-rata</b>			<b>266,57</b>

4. Hasil Pengukuran Nilai IC<sub>50</sub> Aktivitas Vitamin C dan Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*) Metode DPPH

**Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*)**

Sampel	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC <sub>50</sub> (ppm)
Ekstrak Etanol 96%	100	0,766	10,16	$y = 0,0218x + 7,796$ $R^2 = 0,9956$	1935,96
	200	0,749	12,15		
	300	0,734	13,99		
	400	0,713	16,41		
	500	0,692	18,91		

**Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C**

Sampel	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC <sub>50</sub> (ppm)
Vitamin C	1	0,638	25,21	$y = 12,098x + 11,161$ $R^2 = 0,9823$	3,21
	2	0,587	31,18		
	3	0,429	49,71		
	4	0,343	59,79		
	5	0,244	71,40		

## B. Pembahasan

Pada penelitian ini, menggunakan sampel biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) yang diekstraksi menggunakan metode maserasi. Metode maserasi merupakan metode sederhana, tidak menggunakan pemanasan sehingga kandungan senyawa yang terdapat pada bahan alam tidak terurai (Puspitasari & Lean Syam Proyogo, 2017). Perendaman sampel pada tanaman akan

menyebabkan terjadinya pemecahan pada dinding dan membran sel yang disebabkan karena adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut. Metode maserasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, waktu, dan juga jenis pelarut yang digunakan dalam maserasi. Pada proses maserasi digunakan 300 gram sampel yang sudah diayak menggunakan ayakan mesh 40, dimana semakin kecil ukuran sampel yang digunakan pada proses ekstraksi maka dapat menyebabkan bidang kontak antara bahan dengan pelarut semakin luas hingga batas senyawa yang diekstraksi habis dalam bahan. Sampel dilarutkan menggunakan dua jenis pelarut yaitu etanol 70% dan etanol 96% direndam selama 3 x 24 jam ditempat yang terlindungi dari cahaya matahari sambil sesekali diaduk (Fakhruzy, et al., 2020).

Suatu senyawa mempunyai sifat kelarutan yang berbeda terhadap suatu pelarut sehingga perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut yang tepat dalam peningkatan efisiensi selama mengekstraksi. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah selektivitas suatu pelarut, kemampuan dalam mengekstrak, mudah untuk diuapkan (Yusriah, et al., 2017). Pelarut etanol konsentrasi 70% dan 96% merupakan pelarut yang paling banyak digunakan untuk mengekstraksi metabolit sekunder. Etanol merupakan pelarut yang umumnya digunakan untuk menarik berbagai senyawa aktif, baik senyawa yang sifatnya non polar hingga senyawa polar. Pelarut etanol tidak berbahaya dan beracun, titik didih dari pelarut etanol cenderung rendah. Etanol bekerja dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi selama mengekstraksi berbagai bahan aktif pada herbal dari rempah-rempah maupun buah-buahan (Surya & Luhurningtyas, 2021; Pujiastuti & El'Zeba, 2021).

Hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian dihitung rendamen ekstrak dengan cara perbandingan berat akhir (berat ekstrak yang dihasilkan setelah evaporasi) dengan berat awal (berat biomassa yang digunakan) kemudian dikalikan 100% (Surya & Luhurningtyas, 2021). Adapun hasil rendamen yang diperoleh dari ekstrak etanol 70% biji labu kuning yaitu 8,38 gram dengan % rendamen sebesar 2,794%. Sedangkan untuk ekstrak etanol 96% biji labu kuning yaitu 9,86 gram dengan % rendamen sebesar 3,286%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil rendamen ekstrak etanol 96% lebih besar dibandingkan dengan ekstrak 70%.

Antioksidan dari tumbuhan dapat berupa senyawa polifenol atau fenolik, dan flavonoid. Polifenol dan flavonoid yang terkandung pada suatu ekstrak dapat berperan sebagai antioksidan yang sifatnya sebagai donor elektron, bereaksi dengan radikal bebas sehingga dapat mengakhiri terjadinya reaksi berantai (Surya & Luhurningtyas, 2021). Oleh karena itu, dilakukan pengujian kandungan flavonoid total dan kandungan fenolik total. Kandungan fenolik dalam suatu tumbuhan dapat dinyatakan sebagai GAE (*galic acid equivalent*) yakni jumlah kesetaraan milligram asam galat dalam satu gram sampel. Sedangkan kandungan senyawa flavonoid yang diukur menggunakan standar kuersetin, dihitung sebagai QE (*quercetin equivalent*). Dimana ekuivalen asam galat dan kuersetin merupakan acuan dalam pengukuran jumlah fenolik dan flavonoid yang terkandung dalam suatu senyawa yang terdapat pada sampel (Mukhriani, et al., 2019).

Hasil penelitian yang diperoleh dari penetapan kadar total fenolik ekstrak etanol 70% biji labu kuning sebesar 183,034 mg GAE/g ekstrak. Sedangkan untuk ekstrak etanol 96% biji labu kuning diperoleh kadar total fenolik sebesar 266,57 mg GAE/g ekstrak, linear dengan aktivitas antioksidannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Hussain, et al. (2021) yang melaporkan bahwa ekstrak




biji labu kuning memiliki kandungan total fenolik sebesar 224,61 mg GAE/g ekstrak.

Penetapan kandungan total fenolik bermanfaat untuk mengetahui korelasi antara aktivitas antioksidan dengan kandungan total fenolik pada suatu sampel. Penetapan kandungan total fenolik dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi folin-ciocalteu dengan standar asam galat. Penggunaan asam galat sebagai standar kurva baku dikarenakan asam galat merupakan turunan dari asam hidrobenzoat yang termasuk dalam golongan asam fenol sederhana. Berdasarkan prinsipnya, reaksi menggunakan folin-ciocalteu adalah ion fenolat akan mereduksi asam fosfomolibdat-fosfotungstat dalam suasana basa menjadi senyawa kompleks molibdenum-tungsten berwarna biru. Senyawa fenolik berpotensi sebagai antioksidan, hal ini disebabkan karena adanya gugus hidroksil pada senyawa fenolik. Gugus hidroksil berperan sebagai donor atom hidrogen apabila bereaksi dengan senyawa radikal melalui mekanisme transfer elektron sehingga dapat menghambat terjadinya oksidasi (Wirasti, 2019).

Hasil penelitian dari penentuan kadar total flavonoid ekstrak etanol 70% biji labu kuning sebesar 71,91 mg QE/g ekstrak. Sedangkan untuk ekstrak etanol 96% biji labu kuning diperoleh kadar total flavonoid sebesar 84,40 mg QE/g ekstrak. Hal ini tidak jauh berbeda dari penelitian yang dilaporkan oleh Hussain, et al. (2021) yang melaporkan bahwa ekstrak biji labu kuning mempunyai kandungan total flavonoid sebesar 77,11 mg QE/g ekstrak.

Pada penentuan kandungan total flavonoid dapat dilakukan dengan penggunaan metode kolorimetri dengan menggunakan  $AlCl_3$ . Berdasarkan prinsipnya, penentuan kadar total flavonoid yang menggunakan metode  $AlCl_3$  yaitu terjadi pembentukan kompleks antara  $AlCl_3$  dengan gugus keton pada atom C-4 dan gugus hidroksida pada atom C-3 atau C-5 yang bertetangga dari golongan

flavon dan flavonol. Senyawa yang dapat digunakan sebagai standar pada penentuan kadar total flavonoid yaitu kuersetin yang merupakan flavonoid golongan flavonol. Kuersetin yang digunakan sebagai pembanding positif akan bereaksi dan menghasilkan warna ungu. Pemilihan kuersetin sebagai pembanding dalam penetapan kadar total flavonoid karena kuersetin merupakan senyawa yang sangat luas tersebar dan terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Terdapat sekitar 60-75% jumlah kuersetin dan glikosidanya terdapat dalam senyawa flavonoid (Wirasti, 2019).




**Gambar 6.** Reaksi pembentukan kompleks Flavonoid- $\text{AlCl}_3$  (Dewi et al., 2018)

Hasil pengujian kadar total flavonoid dan kadar total fenolik dengan menggunakan pelarut etanol 70% dan etanol 96% menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning yang menggunakan pelarut etanol 96% memiliki kadar total flavonoid dan kadar total fenolik yang lebih tinggi daripada ekstrak etanol 70%. Hal tersebut dapat disebabkan karena sifat kepolaran pelarut yang berbeda-beda, etanol 96% dikatakan paling baik dalam memperoleh kandungan total fenolik dan total flavonoid. Sehingga kadar total flavonoid yang dihasilkan berbeda. Pelarut etanol 96% menghasilkan kadar yang lebih tinggi dikarenakan sifatnya yang semi polar, hal ini dapat disebabkan karena kandungan senyawa

flavonoid yang terdapat dalam sampel lebih banyak yang bersifat non polar (Pujiastuti & El'Zeba, 2021). Menurut penelitian Susiloningrum & Sari (2021) melaporkan bahwa dari tiga jenis variasi konsentrasi pelarut etanol yang digunakan, ekstrak etanol 50%, 70% dan 96% yang mempunyai kadar total flavonoid yang paling tinggi dan aktivitas antioksidan yang kuat adalah ekstrak etanol 96%. Etanol 96% dikatakan paling baik dalam memperoleh kandungan total fenolik dan total flavonoid. Etanol 96% memiliki sifat semi polar yang menghasilkan kadar lebih tinggi dapat disebabkan flavonoid yang terkandung lebih banyak bersifat semi polar. Sehingga dipilih ekstrak etanol 96% biji labu kuning dalam pengujian aktivitas antioksidan.

Metode yang digunakan dalam penetapan aktivitas antioksidan yaitu metode serapan radikal DPPH. Metode DPPH merupakan metode yang sederhana, mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat. Metode pengujian DPPH didasarkan pada kemampuan substansi antioksidan dalam menetralkan radikal. Prinsip kerja pada pengujian ini yaitu DPPH memiliki warna ungu karena terdapat delokalisasi akan mengalami perubahan warna menjadi kuning hydrazine jika bereaksi dengan antioksidan dan mengalami proses reduksi. Terjadinya proses reduksi dikarenakan terdapat donor hidrogen dari substrat yang dapat berakibat pada perubahan warna ungu yang berkurang pada DPPH. Senyawa yang dimanfaatkan sebagai pembanding dalam pengujian aktivitas antioksidan yaitu vitamin C. Vitamin C memiliki rumus  $C_6H_8O_6$  yang diketahui mempunyai aktivitas antioksidan yang sangat tinggi karena sifatnya sebagai reduktor. Sifat reduktor tersebut dapat diakibatkan oleh atom hydrogen yang mudah terlepas pada gugus hidroksil yang berikatan pada atom  $C_2$  dan atom  $C_3$  (Mu'nisa, 2022; Wirasti, 2019).



**Gambar 7.** Reaksi DPPH dengan antioksidan (Haeria, et al., 2016)

Pengukuran antioksidan ditandai dengan perubahan warna setelah diinkubasi selama 30 menit. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum DPPH dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Parameter yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah *inhibition concentration* ( $IC_{50}$ ). Semakin kecil  $IC_{50}$  yang diperoleh, maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya.

Hasil pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH pada ekstrak etanol 96% biji labu kuning diperoleh nilai  $IC_{50}$  sebesar 1935,96 ppm. Sedangkan pada vitamin C diperoleh nilai  $IC_{50}$  sebesar 3,21 ppm. Aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol 96% biji labu kuning lebih rendah dibandingkan dengan aktivitas antioksidan vitamin C. Dimana kategori antioksidan sangat kuat jika nilai  $IC_{50}$  kurang dari 50 ppm, kuat untuk  $IC_{50}$  dengan nilai 50-100 ppm, sedang jika nilai  $IC_{50}$  100-150 ppm, dan lemah jika nilai  $IC_{50}$  151-200 ppm. Berbeda halnya dengan aktivitas antioksidan yang dilaporkan dari penelitian Nyam, et al. (2013) *fibre from pumpkin (Cucurbita pepo L.) seeds and rinds: physico-chemical properties, antioxidant capacity and application as bakery product ingredients* yang melaporkan bahwa biji labu kuning memiliki aktivitas antioksidan sebesar 36,97%.

Rendahnya aktivitas antioksidan ini kemungkinan dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti tempat dan waktu panen sampel. Waktu panen sangat erat kaitannya dengan proses pembentukan senyawa aktif pada bagian tumbuhan yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat adalah pada saat bagian tumbuhan tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang besar. Pemanenan dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan kandungan metabolit sekunder yang maksimal (Sueno & Antari, 2020). Biji labu kuning yang diperoleh dari Pasar Palattae tidak dapat ditentukan lokasi tanam, umur tanaman serta waktu panen karena diperoleh secara acak dari beberapa penjual.

Selain itu, rendahnya aktivitas antioksidan dapat dipengaruhi oleh waktu penyiapan sampel. Dimana pada penelitian ini, sampel biji labu kuning dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40° selama 2 minggu. Sedangkan pada penelitian Setiawan & Raharjo, (2018) melaporkan bahwa aktivitas antioksidan ekstrak biji labu kuning sebesar 29,113 ppm dan partisi etil sebesar asetat 27,893 ppm. Dimana sampel biji labu kuning yang digunakan, dikeringkan dengan cara diangin anginkan terlebih dahulu untuk menghilangkan kadar air yang ada di pada suatu sampel. Husni et al., (2014) menyatakan bahwa suhu, lama waktu, serta interaksi sampel dengan suhu dan waktu pengeringan menunjukkan perbedaan nyata terhadap aktivitas antioksidan.

Pada penelitian ini, vitamin C mempunyai kandungan antioksidan sangat kuat karena merupakan senyawa murni, berbeda dengan ekstrak etanol 96% biji labu kuning. Senyawa flavonoid terkandung dalam ekstrak etanol biji labu kuning kemungkinan merupakan flavonoid golongan glikosida. Senyawa flavonoid dalam bentuk ekstrak murni dan bukan dalam bentuk isolatnya masih terikat pada gugus glikosida, dimana gugus glikosida yang berikatan dengan flavonoid dapat mengurangi aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan akan meningkat apabila

terdapat penambahan gugus hidroksil dan akan berkurang apabila terdapat gugus glikosida. Flavonoid pada tanaman umumnya terdapat dalam bentuk glikosida (flavonoid glikosida) dan jarang sekali ditemukan dalam bentuk tunggal/aglikon flavonoid (La et al., 2021).





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil pengujian kadar total flavonoid ekstrak etanol 70% biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) memiliki nilai sebesar 71,91 mg QE/g ekstrak. Sedangkan pada ekstrak etanol 96% biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) memiliki nilai sebesar 84,40 mg QE/g ekstrak. Hasil pengujian kadar total fenolik ekstrak etanol 70% biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) memiliki nilai sebesar 183,034 mg GAE/g ekstrak. Sedangkan pada ekstrak etanol 96% biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) memiliki nilai sebesar 266,57 mg GAE/g ekstrak.
2. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol 96% biji labu kuning (*Semen cucurbita moschata*) memiliki nilai IC<sub>50</sub> sebesar 1935,96 ppm. Sedangkan nilai IC<sub>50</sub> vitamin C sebesar 3,21 ppm. Hal ini menunjukkan ekstrak etanol 96% biji labu kuning tidak memiliki aktivitas antioksidan.

#### B. Saran

Disarankan agar lebih selektif dalam pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu panen, iklim, dan letak geografis yang dapat mempengaruhi kandungan senyawa dalam sampel. Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa antioksidan dari biji labu kuning, serta dilakukan pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, Imam. (2009). Tafsir Al-Qur'an (13). Terjemahan Muhyiddin Mas Rida dan M. Rana Mengala. Ed. Mukhlis B. Mukti. Jakarta: Pustaka Azzam
- Amanda, K. A., Mustofa, S., & Nasution, S. H. (2019). Review Efek Antioksidan pada Kemuning (*Murraya paniculata* (L.) Jack). *Majority*, 8(2), 265–272.
- Amnestiya, P., Putra, A. Y., & Sari, Y. (2023). Review : Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder Dan Uji Aktivitas Antioksidan Pada Limbah Kulit Buah Indonesia. *Jurnal Kimia Mulawarman*, 20(2), 97–103.
- Arifin, B., & Ibrahim, S. (2018). Struktur, Bioaktivitas Dan Antioksidan Flavonoid. *Jurnal Zarah*, 6(1), 21–29.
- Baihaqi, Nuraida, Fridayati, D., & Adam, K. Al. (2023). Jurnal Sains Pertanian Ekstraksi oleoresin pala menggunakan metode UAE (Ultrasound Assisted Extraction) Extraction of nutmeg oleoresin using the UAE ( Ultrasound Assisted Extraction ) Method. *Jurnal Sain Pertanian*, 7(2), 42–45.
- Berawi, K. N., & Agverianti, T. (2017). Efek Aktivitas Fisik pada Proses Pembentukan Radikal Bebas sebagai Faktor Risiko Aterosklerosis. *Jurnal Majority*, 6(2), 85–90.
- Berawi, K. N., & Marini, D. (2018). Efektivitas Kulit Batang Bakau Minyak (*Rhizopora apiculata*) sebagai Antioksidan The Effectiveness Rhizopora apiculata Bark as an Antioxidant. *Agromedicine*, 5(1), 412–417.
- Damanis, F. V. M., Wewengkang, D. S., & Antasionasti, I. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Ascidian *Herdmania Momus* Dengan Metode Dpph (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil). *Pharmacon*, 9(3), 464.
- Dewi, L. K., Friatnasary, D. L., Herawati, W., Nurhadianty, V., & Cahyani, C. (2018). Studi Perbandingan Metode Isolasi Ekstraksi Pelarut dan Destilasi Uap Minyak Atsiri Kemangi terhadap Komposisi Senyawa Aktif. *Jurnal Rekayasa Bahan Alam Dan Energi Berkelanjutan*, 2(1), 13–19.
- Dewi, S. R., Ulya, N., & Argo, B. D. (2018). Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak *Pleurotus ostreatus*. *Rona Teknik Pertanian*, 11(1), 1–10.
- Diniyah, N., & Lee, S.-H. (2020). Komposisi Senyawa Fenol Dan Potensi Antioksidan Dari Kacang-Kacangan: Review. *Jurnal Agroteknologi*, 14(01), 91.
- Due, Y. P., Bukit, M., & Johannes, A. Z. (2019). Kajian Awal Spektrum Serapan Uv–Vis Senyawa Hasil Ekstrak Daun Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Asal Tarus Kabupaten Kupang. *Jurnal Fisika : Fisika Sains Dan Aplikasinya*, 4(1), 40–47.
- Fakhruzzy, Kasim, A., Asben, A., & Anwar, A. (2020). Review: Optimalisasi Metode Maserasi Untuk Ekstraksi Tanin Rendemen Tinggi. *Menara Ilmu*, 14(02), 38–41.
- Fatimah, S., & Yanlinastuti. (2016). Pengaruh Konsentrasi Pelarut untuk Menentukan Paduan U-Zr dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-Vis. *Pusat Teknologi Bahan Nuklir*, 9(17), 22–33.

- Furi, M., Al Basit, N., Ikhtiarudin, I., & Utami, R. (2020). Penentuan Total Fenolik, Flavonoid Dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Dan Fraksi Daun Kedabu (*Sonneratia ovata* Backer). *Jurnal Farmasi Indonesi*, 12(1), 48–59.
- Furqan, M., Suranto, & Sugiyarto. (2018). Karakterisasi Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Berdasarkan Karakter Morfologi Di Daerah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *Seminar Nasional Pendidikan Biologi Dan Saintek Iii*, 136–141.
- Haeria, Hermawati, & Dg.Pine, A. T. (2016). Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bidara (*Ziziphus spinachristi* L.). *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 1(2), 57–61.
- Hasanah Uswatun. (2018). Penentuan Kadar Vitamin C Pada Mangga Kweni Dengan Menggunakan Metode Iodometri. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 16(31), 90–95.
- Hasnaeni, & Aminah. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan dan Profil Fitokimia Ekstrak Kayu Beta-beta (*Lunasia amara* Blanco.). *Jurnal Farmasi Galenika I*, 5(1), 101–107.
- Hasnaeni, Wisdawati, & Usman, S. (2019). Formulasi dan Analisis Nilai Gizi Bakso Kotak dari Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*). *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 5(2), 166–174.
- Husni, A., Putra, D. R., & Bambang Lelana, I. Y. (2014). Aktivitas Antioksidan *Padina* sp. pada Berbagai Suhu dan Lama Pengeringan. *Jurnal Pascapanen Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 165.
- Hussain, A., Kausar, T., Din, A., Murtaza, M. A., Jamil, M. A., Noreen, S., Rehman, H. ur, Shabbir, H., & Ramzan, M. A. (2021). Determination of total phenolic, flavonoid, carotenoid, and mineral contents in peel, flesh, and seeds of pumpkin (*Cucurbita maxima*). *Journal of Food Processing and Preservation*, 45(6), 1–8.
- Irawan, A. (2019). Kalibrasi Spektrofotometer Sebagai Penjaminan Mutu Hasil Pengukuran dalam Kegiatan Penelitian dan Pengujian. *Indonesian Journal of Laboratory*, 1(2), 1.
- Irianti, T. T., Sugiyanto, Nuranto, S., & Kuswandi, M. (2017). *Antioksidan* (Issue Otoper).
- Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Farmakope Indonesia Edisi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Farmakope Herbal Indonesia Edisi II*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- La, E. O. J., Sawiji, R. T., & Yuliani, N. M. R. (2021). Identifikasi Kandungan Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak n-Heksana Kulit Jeruk Bali (*Citrus maxima* Merr.). *Jurnal Surya Medika*, 6(2), 185–200.
- Labola, Y. A., & Puspita, D. (2018). Peran Antioksidan Karotenoid Penangkal Radikal Bebas Penyebab Berbagai Penyakit. *Majalah Farmasetika*, 2(5), 12.
- Laksmiani, Susanti, Widjaja, Rismayanti, & Wirasuta. (2015). Pengembangan Metode Refluks untuk Ekstraksi Andrografolid dari Herba Sambiloto (*Andrographis paniculata* (Burm.f.) Nees). *Jurnal Farmasi Udayana*, 4(2), 82–90.

- Linda, O., & Rahayu, L. S. (2021). Prevensi awal dan lanjutan penyakit degeneratif untuk usia dewasa di masa pandemi covid-19. *Jurnal Arsip Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 107–115.
- Mahardani, O. T., & Yuanita, L. (2021). Efek Metode Pengolahan Dan Penyimpanan Terhadap Kadar Senyawa Fenolik Dan Aktivitas Antioksidan. *Unesa Journal of Chemistry*, 10(1), 64–78.
- Mu'nisa, A. (2022). *Antioksidan Pada Tanaman Dan Peranannya terhadap Penyakit Degeneratif*.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 361–367.
- Mukhriani, Rusdi, M., Arsul, M. I., Sugiarna, R., & Farhan, N. (2019). Kadar Fenolik dan Flavonoid Total Ekstrak Etanol Daun Anggur (*Vitis vinifera* L.). *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 2(2), 95–102.
- Munarsih, E., & Rini, P. (2019). Penggunaan spektrofotometer Uv-Vis untuk analisis nutrisi fosfat pada sedimen dalam rangka pengembangan modul praktikum oseanografi kimia. *Jurnal Penelitian Sains*, 21(3), 163–167.
- Nyam, K. L., Lau, M., & Tan, C. P. (2013). Fibre from pumpkin (*cucurbita pepo* L.) Seeds and rinds: Physico-chemical properties, antioxidant capacity and application as bakery product ingredients. *Malaysian Journal of Nutrition*, 19(1), 99–110.
- Panjaitan, R., Ni'mah, S., Romdhonah, R., & Annisa, L. (2015). Pemanfaatan Minyak Biji Labu Kuning (*Cucurbita Moschata* Durch) Menjadi Sediaan Nanoemulsi Topikal Sebagai Agen Pengembangan Cosmética Anti Aging. *Khazanah*, 7(2), 61–81.
- Pelu, A. D., Ely, I. P., & Bassy, L. La. (2020). Skrining Fitokimia Dan Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Curcubita Moschata*) Terhadap Daya Hambat Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Sains Dan Kesehatan (JUSIKA)*, 4(1), 61–70.
- Prasetyo, E., Zukhruf, N. K. W., & Rahayu, T. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) Terhadap Ekstrak Etanol Kulit Buah Durian (*Durio zibethinnus* L.) dari Desa Alasmalang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pharmascience*, 08(01), 75–82.
- Pujiastuti, E., & El'Zeba, D. (2021). Perbandingan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 70 % Dan 96 % Kulit Buah Naga Merah (*Hylocereus*). *Cendekia Journal of Pharmacy*, 5(1), 28–43.
- Purwanto, D., Bahri, S., & Ridhay, A. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Purnajiwa (*Kopsia Arborea* Blume.) Dengan Berbagai Pelarut. *Kovalen*, 3(1), 24.
- Puspitasari, A. D., & Lean Syam Proyogo. (2017). Perbandingan metode ekstraksi maserasi dan sokletasi terhadap kadar fenolik total ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura*). *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 1(2), 1–8.
- Saputra, A., Arfi, F., & Yulian, M. (2020). Literature Review: Analisis Fitokimia Dan Manfaat Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera*). *Amina*, 2(3), 114–119.
- Setiawan, Mochamad Redhia. Raharjo, S. J. (2018). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Dan Partisi Etil Asetat Biji Labu Kuning (*Cucurbitae moshata*). *Doctoral Dissertation, Akafarma Putra Indonesia Malang*, 1–8.




- Shihab, M.Q. (2015). Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Sinaga, F. A. (2016). Stress oksidatif dan status antioksidan pada aktivitas fisik maksimal. *Jurnal Generasi Kampus*, 9(2), 176–189.
- Suena, N. M. D. S., & Antari, N. P. U. (2020). Uji Aktivitas Antioksidan Maserat Air Biji Kopi (*Coffea canephora*) Hijau Pupuan Dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-1-pikrilhidrazil). *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 6(1), 28–32.
- Suhartati, T. (2017). Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis Dan Spektrometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. In *AURA CV. Anugrah Utama Rahaja*.
- Surya, R. P. A., & Luhurningtyas, F. P. (2021). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% dan 96% Buah Parijoto Asal Bandungan dan Profil Kromatografinya. *Pharmaceutical and Biomedical Sciences Journal*, 3(1), 39–44.
- Suryadinata, R. V. (2018). Pengaruh Radikal Bebas Terhadap Proses Inflamasi pada Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). *Amerta Nutrition*, 2(4), 317.
- Susiloningrum, D., & Sari, D. E. M. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Dan Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Temu Mangga (*Curcuma Mangga* Valeton & Zijp) Dengan Variasi Konsentrasi Pelarut. *Cendekia Journal of Pharmacy*, 5(2), 117–127.
- Syam, A., Zainal, & Kurniati, Y. (2019). *Biji labu kuning yang menyehatkan*. Massagen Press.
- Tandi, J., Rahmawati, Isminarti, R., & Lapangoyu, J. (2018). Efek Ekstrak Biji Labu Kuning Terhadap Glukosa, Kolesterol dan Gambaran Histopatologi Pankreas Tikus Hiperkolesterolemia-Diabetes. *Talenta Conference Series: Tropical Medicine (TM)*, 1(3), 144–151.
- Werdhasari, A. (2014). Peran Antioksidan Untuk Kesehatan. *Biotek Medisiana Indonesia*, 3(2), 59–68.
- Wigati, D., & Rahardian, R. R. (2018). Penetapan Standarisasi Non Spesifik Ekstrak Etanol Hasil Perkolasi Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr). *Jurnal Ilmu Farmasi Dan Farmasi Klinik*, 15(2), 36.
- Wirasti. (2019). Penetapan Kadar Fenolik Total, Flavonoid Total, dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Benalu Petai (*Scurrula atropurpurea* Dans.) Beserta Penapisan Fitokimia Wirasti. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 4(1), 1–5.
- Yusriah, Hambali, E., & Dadang. (2017). Formulasi Insektisida Nabati Minyak Bungkil Mimba Dengan Surfaktan DEA. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 27(3), 310–317.
- Zulfahmidah, Fajriansyah, Makmun, A., & Rasfahyana. (2021). Hubungan Obesitas dan Stress Oksidatif. *UMI Medical Journal*, 6(1), 62–69.


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Kerja

#### 1. Penyiapan Sampel Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*)




#### 2. Pembuatan Ekstrak Etanol 70% dan 96% Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*)







### 3. Pembuatan Larutan Standar Kuersetin Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis




4. Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol 70% dan 96%  
Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*)




## 5. Pembuatan Larutan Standar Asam Galat Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis




**6. Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 70% dan 96% Biji Labu Kuning (*Semen cucurbita moschata*)**



## 7. Penetapan Aktivitas Antioksidan Larutan Standar Vitamin C Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis



**8. Penetapan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning (Semen cucurbita moschata) Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis**





## Lampiran 2. Perhitungan Rendamen Ekstrak

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Bobot Ekstrak (gram)}}{\text{Bobot Simplisia (gram)}}$$

1. Ekstrak Etanol 70%

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{8,3820 \text{ gram}}{300 \text{ gram}} \times 100 = 2,794\%$$

2. Ekstrak Etanol 96%

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{9,8578 \text{ gram}}{300 \text{ gram}} \times 100 = 3,286\%$$

## Lampiran 3. Pembuatan Larutan dan Perekasi

### 1. Pembuatan Larutan Pembanding

Kuersetin, Asam galat, dan Vitamin C

2,5 mg → 25 mL

Sehingga didapatkan konsentrasi 100 ppm

$$\text{Konsentrasi ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{mL}} = \frac{2500 \mu\text{g}}{25 \text{ mL}} = 100$$

### 2. Pembuatan Larutan Uji

20 mg → 5 mL

Sehingga didapatkan larutan ekstrak 4000 ppm

$$\text{Konsentrasi ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{mL}} = \frac{20.000 \mu\text{g}}{5 \text{ mL}} = 4000$$

### 3. Pembuatan Perekasi Uji Flavonoid Total, Fenolik Total dan DPPH

- a. Perekasi Flavonoid Total

- 1)  $\text{AlCl}_3$  10%

Ditimbang 2,5 gram  $\text{AlCl}_3$  kemudian dilarutkan dengan 25 mL aquadest

$$10\% = \frac{10}{100} \times 25 = 2,5 \text{ gram}$$

## 2) Natrium Asetat 1 M

$$1 \text{ M} = \frac{\text{g}}{\text{Mr}} \times \frac{1000}{\text{mL}}$$

$$1 \text{ M} = \frac{\text{g}}{\text{Mr}} \times \frac{1000}{25}$$

$$\text{g} = \frac{1 \text{ M} \times 82,03}{40}$$

$$\text{g} = 2,050 \text{ gram}$$

## b. Pereaksi Fenolik Total

## 1) Follin Ciocelteu 7,5%

Diukur 7,5 mL follin ciocelteu kemudian dicukupkan dengan aquadest hingga 100 mL

$$7,5\% = \frac{7,5}{100} \times 100 = 7,5 \text{ mL}$$

## 2) Natrium Hidroksida 1%

Ditimbang 1 gram natrium hidroksida kemudian dilarutkan dengan aquadest 100 mL

$$1\% = \frac{1}{100} \times 100 = 1 \text{ gram}$$

## c. Pereaksi DPPH

Dibuat larutan DPPH sebanyak 50 mL

Reagen DPPH konsentrasi 0,4 mM

$$\text{BM DPPH} = 394,32$$

$$0,4 \text{ mM} = 0,0004 \text{ M}$$

$$\begin{aligned} \text{Mg DPPH} &= \text{M} \times \text{BM} \times \text{Vol (mL)} \\ &= 0,0004 \text{ M} \times 394,32 \times 50 \text{ mL} \\ &= 7,88 \text{ mg} \end{aligned}$$

#### Lampiran 4. Contoh Perhitungan Pengenceran Larutan Asam Galat

##### a. Larutan Asam Galat

###### 1. 20 ppm

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 20 ppm sebanyak 1 mL

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 20 \text{ ppm} \times 1 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{20 \times 1}{100}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ mL}$$

$$V_1 = 200 \text{ } \mu\text{L}$$

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 200  $\mu\text{L}$  kemudian dicukupkan aquadest hingga 1 mL.

##### b. Larutan Kuersetin

###### 1. 20 ppm

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 20 ppm sebanyak 3,5 mL

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 20 \text{ ppm} \times 3,5 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{20 \times 3,5}{100}$$

$$V_1 = 0,7 \text{ mL}$$

$$V_1 = 700 \text{ } \mu\text{L}$$

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 700  $\mu\text{L}$  kemudian dicukupkan aquadest hingga 3,5 mL.

##### c. Larutan Vitamin C

###### 1. 1 ppm

Larutan induk 100 ppm yang diencerkan menjadi 1 ppm sebanyak 4 mL

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \text{ ppm} \times V_1 = 1 \text{ ppm} \times 4 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{1 \times 4}{100}$$

$$V_1 = 0,04 \text{ mL}$$


$$V_1 = 40 \text{ } \mu\text{L}$$

Larutan induk 100 ppm diambil sebanyak 40  $\mu\text{L}$  kemudian dicukupkan aquadest hingga 4 mL.

### Lampiran 5. Perhitungan Kadar Total Flavonoid

**Tabel 8.** Data Absorbansi Kurva Baku Kuersetin

Konsentrasi ( $\mu\text{g/mL}$ )	Absorbansi
20	0,357
25	0,474
30	0,584
35	0,608
40	0,877



**Gambar 8.** Kurva Standar Kuersetin

- $y = ax + b$
- $ax = y - b$
- $x = (y-b)/a$

Dik :

$$FP = \frac{\text{Vol. larutan encer}}{\text{Vol. larutan pekat}}$$

$$FP = \frac{6 \text{ mL}}{0,5 \text{ mL}}$$

$$= 12$$

### 1. Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70%

#### a. Replikasi I

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,411$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,411 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,411 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 22,783 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

$$= \frac{22,783 \times 0,005 \times 12}{0,02}$$

$$= 68,35 \text{ mg QE/g ekstrak}$$

#### b. Replikasi II

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,469$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,469 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,469 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 25,251 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

$$= \frac{25,251 \times 0,005 \times 12}{0,0202}$$

$$= 75,05 \text{ mg QE/g ekstrak}$$

c. Replikasi III

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,445$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,445 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,445 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 24,2298 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

$$= \frac{24,2298 \times 0,005 \times 12}{0,0201}$$

$$= 72,33 \text{ mg QE/g ekstrak}$$

## 2. Penetapan Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 96%

a. Replikasi I

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,520$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,520 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,520 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 27,421 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times FP}{M}$$

$$= \frac{27,421 \times 0,005 \times 12}{0,02}$$

$$= 82,263 \text{ mg QE/g ekstrak}$$



## b. Replikasi II

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,570$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,570 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,570 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 29,549 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$

$$= \frac{29,549 \times 0,005 \times 12}{0,0202}$$

$$= 87,78 \text{ mg QE/g ekstrak}$$

## c. Replikasi III

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,529$$

$$y = 0,0235x - 0,1244$$

$$0,529 = 0,0235x - 0,1244$$

$$x = \frac{0,529 + 0,1244}{0,0235}$$

$$= 27,804 \text{ mg/L}$$

$$\text{KFT} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$


$$= \frac{27,804 \times 0,005 \times 12}{0,0201}$$

$$= 82,99 \text{ mg QE/g ekstrak}$$

## Lampiran 6. Perhitungan Kadar Total Fenolik

**Tabel 9.** Data Absorbansi Kurva Baku Asam Galat

Konsentrasi ( $\mu\text{g/mL}$ )	Absorbansi
20	0,625
30	0,643
40	0,651
50	0,665
60	0,679



**Gambar 9.** Kurva Standar Asam Galat

- $y = ax + b$
- $ax = y - b$
- $x = (y-b)/a$

Dik :

$$\text{FP} = \frac{\text{Vol. larutan encer}}{\text{Vol. larutan pekat}}$$

$$\text{FP} = \frac{230 \mu\text{L}}{20 \mu\text{L}}$$

$$= 11,5$$

### 1. Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70%

#### a. Replikasi I

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,675$$

$$y = 0,0013x + 0,6006$$

$$0,675 = 0,0013x + 0,6006$$

$$x = \frac{0,675 - 0,6006}{0,0013}$$

$$= 57,231 \text{ mg/L}$$

$$\text{KTFe} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$

$$= \frac{57,231 \times 0,005 \times 11,5}{0,0202}$$

$$= 162,91 \text{ mg GEA/g ekstrak}$$

#### b. Replikasi II

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,689$$

$$y = 0,0013x + 0,6006$$

$$0,689 = 0,0013x + 0,6006$$

$$x = \frac{0,689 - 0,6006}{0,0013}$$

$$= 68,256 \text{ mg/L}$$

$$\text{KTFe} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$

$$= \frac{68,256 \times 0,005 \times 11,5}{0,0203}$$

$$= 193,34 \text{ mg GAE/g Ekstrak}$$

## c. Replikasi III

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,688$$

$$y = 0,0013x + 0,6006$$

$$0,688 = 0,0013x + 0,6006$$

$$x = \frac{0,688 - 0,6006}{0,0013}$$

$$= 67,231 \text{ mg/L}$$

$$\text{KTFe} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$

$$= \frac{67,231 \times 0,005 \times 11,5}{0,0202}$$

$$= 191,38 \text{ mg GAE/g Ekstrak}$$

## 2. Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 96%

## a. Replikasi I

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,716$$

$$y = 0,0013x + 0,6006$$

$$0,716 = 0,0013x + 0,6006$$

$$x = \frac{0,716 - 0,6006}{0,0013}$$

$$= 88,769 \text{ mg/L}$$

$$\text{KTFe} = \frac{C \times V \times \text{FP}}{M}$$

$$= \frac{88,769 \times 0,005 \times 11,5}{0,0201}$$

$$= 253,94 \text{ mg GEA/g ekstrak}$$

## b. Replikasi II

$$\text{Abs. ekstrak} = 0,727$$

$$y = 0,0013x + 0,6006$$

$$\begin{aligned}
 0,727 &= 0,0013x + 0,6006 \\
 x &= \frac{0,727 - 0,6006}{0,0013} \\
 &= 97,231 \text{ mg/L} \\
 \text{KTFe} &= \frac{C \times V \times \text{FP}}{M} \\
 &= \frac{97,231 \times 0,005 \times 11,5}{0,0202} \\
 &= 276,77 \text{ mg GEA/g ekstrak}
 \end{aligned}$$

c. Replikasi III

$$\begin{aligned}
 \text{Abs. ekstrak} &= 0,724 \\
 y &= 0,0013x + 0,6006 \\
 0,724 &= 0,0013x + 0,6006 \\
 x &= \frac{0,724 - 0,6006}{0,0013} \\
 &= 94,923 \text{ mg/L} \\
 \text{KTFe} &= \frac{C \times V \times \text{FP}}{M} \\
 &= \frac{94,923 \times 0,005 \times 11,5}{0,0204} \\
 &= 267,55 \text{ mg GEA/g ekstrak}
 \end{aligned}$$

**Lampiran 7. Perhitungan % Inhibisi**

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs. Blanko} - \text{Abs. Sampel}}{\text{Abs. Blanko}} \times 100\%$$

**a. Ekstrak Etanol 96%**

1. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,766}{0,853} \times 100\% = 10,16\%$$

2. Konsentrasi 200 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,749}{0,853} \times 100\% = 12,15\%$$

3. Konsentrasi 300 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,734}{0,853} \times 100\% = 13,99\%$$

4. Konsentrasi 400 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,766}{0,853} \times 100\% = 16,41\%$$

5. Konsentrasi 500 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,692}{0,853} \times 100\% = 18,91\%$$

**b. Vitamin C**

1. Konsentrasi 1 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,638}{0,853} \times 100\% = 25,21\%$$

2. Konsentrasi 2 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,587}{0,853} \times 100\% = 31,18\%$$

3. Konsentrasi 3 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,429}{0,853} \times 100\% = 49,71\%$$

4. Konsentrasi 4 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,343}{0,853} \times 100\% = 59,79\%$$


5. Konsentrasi 5 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,853 - 0,244}{0,853} \times 100\% = 71,40\%$$



## Lampiran 8. Perhitungan IC<sub>50</sub>

### 1. Perhitungan IC<sub>50</sub> sampel ekstrak etanol 96%



**Gambar 10. Kurva Standar Ekstrak Etanol 96% Biji Labu Kuning**

Perhitungan IC<sub>50</sub> sampel melalui persamaan linear

- $y = ax + b$
- $ax = y - b$
- $x = (y-b)/a$

Diketahui : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$$y = 50$$

$$a = 0,0218$$

$$b = 7,796$$


Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 7,796}{0,0218}$$

$$x = 1935,96 \text{ ppm}$$

## 2. Perhitungan IC<sub>50</sub> vitamin C



**Gambar 11. Kurva Standar Vitamin C**

Perhitungan IC<sub>50</sub> sampel melalui persamaan linear

- $y = ax + b$
- $ax = y - b$
- $x = (y-b)/a$

Diketahui :  $y = 50$

$a = 12,098$

$b = 11,161$


Penyelesaian :

$$x = \frac{y - b}{a}$$

$$x = \frac{50 - 11,161}{12,098}$$

$$x = 3,21 \text{ ppm}$$

### Lampiran 9. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Penelitian



**Lampiran 10. Gambar Penelitian****Gambar 12. Sampel Biji Labu Kuning****Gambar 13. Proses Penghalusan Biji Labu Kuning****Gambar 14. Proses Ekstraksi Biji Labu Kuning**



**Gambar 15.** Proses Penimbangan Ekstrak Biji Labu Kuning



**Gambar 16.** Proses Pengujian Kadar Total Flavonoid Ekstrak Biji Labu Kuning



**Gambar 17.** Proses Pengujian Kadar Total Fenolik Ekstrak Biji Labu Kuning





**Gambar 18.** Proses Pengujian Kadar Total Fenolik Ekstrak Biji Labu Kuning




**Gambar 19.** Deret Konsentrasi Larutan Standar Kuersetin Dan Larutan Sampel



**Gambar 20.** Deret Konsentrasi Larutan Asam Galat Dan Larutan Sampel





**Gambar 21.** Deret Konsentrasi Larutan Standar Vitamin C



**Gambar 22.** Deret Konsentrasi Larutan Sampel




**Gambar 23.** Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum DPPH



**Gambar 24.** Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Flavonoid



**Gambar 25.** Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Fenolik



**Gambar 26.** Hasil Pengukuran Absorbansi Kuersetin

ID#	Abs
1	0.000
2	0.625
3	0.643

ID#	Abs
1	0.000
2	0.651

ID#	Abs
1	0.000
2	0.665

ID#	Abs
1	0.000
2	0.679

**Gambar 27.** Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat

ID#	Abs
1	0.000
2	0.638
3	0.587
4	0.429

ID#	Abs
1	0.000
2	0.343

ID#	Abs
1	0.000
2	0.244

**Gambar 28.** Hasil Pengukuran Absorbansi Vitamin C

Advanced A-T-C 4:21pm 23Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 515.0nm
1	0.000
2	0.784

Page 1, Samples 1 - 2

Measure Save  
Blank Data

Advanced A-T-C 8:14pm 23Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 515.0nm
1	0.000
2	0.777

Page 1, Samples 1 - 2

Measure Save  
Blank Data

Advanced A-T-C 9:14pm 23Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 515.0nm
1	0.000
2	0.738

Page 1, Samples 1 - 2

Measure Save  
Blank Data

**Gambar 28.** Hasil Pengukuran Absorbansi 100 ppm Sampel Ekstrak Etanol 96%  
Metode DPPH

Advanced A-T-C 3:49pm 7Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 425.0nm
1	0.666
2	0.681
3	0.678

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Save  
Blank Data

**Gambar 29.** Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik  
Ekstrak Etanol 70%

Advanced A-T-C 5:36pm 4Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	abs
	425.0nm
1	0.713
2	0.712
3	0.724

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Save  
Blank Data

**Gambar 30.** Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik

Ekstrak Etanol 96%

Advanced A-T-C 5:03pm 16Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	abs
	435.0nm
1	0.000
2	0.446
3	0.444
4	0.445

Page 1, Samples 1 - 4

Measure Save  
Blank Data

**Gambar 31.** Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid

Ekstrak Etanol 70%

Advanced A-T-C 7:37pm 16Aug23  
Test Name: \_Default\_

ID#	abs
	435.0nm
1	0.000
2	0.527
3	0.526
4	0.534

Page 1, Samples 1 - 5

Measure Save  
Blank Data

**Gambar 31.** Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid

Ekstrak Etanol 96%

## RIWAYAT HIDUP



Andi Annisa Amalia, lahir di Palattae, Kabupaten Bone pada tanggal 05 November 2000. Penulis merupakan putri dari pasangan Andi Muh. Haris dan A. Subaedah, S.Pd. Penulis memulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2006 di Taman Kanak-kanak PGRI Palattae. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 277 Palattae pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kahu dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Bone pada tahun 2016 kemudian lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R