

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM  $\alpha$ -AMILASE EKSTRAK  
ETANOL 70% RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet* L.)  
SECARA IN VITRO**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**ARFANI FATHIYAH**  
**70100119007**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arfani Fathiyah  
NIM : 70100119007  
Tempat/Tgl. Lahir : Tappale, 06 Januari 2001  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM VIII, Tamalanrea, Makassar  
Judul : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase Ekstrak  
Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber  
Zerumbet L.*) Secara In Vitro

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Agustus 2023

Penulis,



**Arfani Fathiyah**  
NIM: 70100119007

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet L.) Secara In Vitro*" yang disusun oleh Arfani Fathiyah, NIM: 70100119007, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 16 Agustus 2023  
29 Muharram 1445 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.S	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *swt.*, Tuhan semesta alam yang telah memberi izin kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbet* L.) Secara In Vitro” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang sangat berharga dan berperan penting dalam hidup penulis yakni Kedua orang tua kami, Bapak Muhammad Alwi Hasan, Ibu Rosma, saudariku Aryanti S.KM, Arlina S.T, Arfina Shalsabila S.P dan seluruh keluarga besar kami yang selalu memberikan semangat, doa, dana, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis yang tidak terhingga.

Penulis menyadari bahwa banyak kendala yang dihadapi selama proses penyelesaian skripsi ini, tetapi berkat bantuan dan doa dari berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis dengan tulus menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. yang merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag. sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum. sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. yang merupakan Ketua Jurusan Farmasi sekaligus penguji kompetensi dan Ibu Nur Syamsi Dhuha S. Farm., M. Si. sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
11. Ibu Haeria, S.Si., M. Si. yang merupakan Pembimbing Pertama penulis yang senantiasa mengarahkan, mendukung dan memberi masukan baik selama penelitian maupun selama proses penyelesaian skripsi ini
12. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si. yang merupakan Pembimbing Kedua yang senantiasa membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan penelitian hingga mampu menyusun skripsi ini dengan baik dan benar.
13. Bapak Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum sebagai Penguji Agama yang banyak memberikan masukan serta pengarahan bagi penulis untuk melengkapi kekurangan yang ada.



14. Ibu apt. Nurul Muhlisah Maddepongeng, S. Farm., M. Farm. dan Ibu Fitril Imani, S.Farm sebagai Pelaksana Ujian Akhir yang sangat berkontribusi dalam memudahkan penulis untuk menyelenggarakan ujian akhir dalam proses perolehan gelar sarjana
15. Bapak dan Ibu dosen yang telah berperan besar dalam mengarahkan penulis dalam memperoleh ilmu serta minat dibidang farmasi tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah *swt.* membalas jasa-jasa beliau.
16. Kepada laboran Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar dan Laboran Laboratorium Penelitian dan Pengujian Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia yang selalu dapat diandalkan dalam memberi masukan khususnya terkait penelitian laboratorium
17. Kepada teman-teman peneliti INTERFERON 2019 yang tidak bisa penulis tuliskan namanya satu persatu
18. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Zingiber zerumbet team, Maylinda Yunhi Asmarani, Rosfiani Nursakinah Rosman, Andi Reski Andini, dan Dian Arista Damayanti Aziz. Terima kasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar dan selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama pengerjaan skripsi ini
19. Teman-teman KKN posko 5 Pekkabata, Eppona lato Hammade squad dan Andi Besse Kalsum Serta seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan dari awal penelitian yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.


Akhir kata, penulis berdoa atas segala macam kebaikan, bantuan, perhatian dan bimbingan yang telah diberikan penulis ucapkan terima

kasih. Semoga Allah *swt* membalas kebaikannya dengan berkat yang jauh lebih besar.

Gowa, 16 Agustus 2023



**Arfani Fathiyah**  
NIM 701001190007




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	11
A. Uraian Sampel .....	11
B. Diabetes Mellitus .....	15
C. Hidrolisis Pati .....	20
D. Enzim.....	21
F. Enzim $\alpha$ -amilase.....	23
G. Acarbose .....	27
H. Ekstraksi .....	28
I. Microplate Reader.....	30
J. Tinjauan Islam .....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	39




B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sampel .....	39
D. Alat dan Bahan .....	40
E. Prosedur Kerja .....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan .....	48
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	56
KEPUSTAKAAN .....	57
LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kriteria Penegakan Diagnosis Diabetes Mellitus.....	15
Tabel 2. Hasil Ekstraksi Sampel .....	47
Tabel 3. Nilai %P penghambatan Enzim $\alpha$ -Amilase Pada Acarbose.....	47
Tabel 4. Nilai %P penghambatan Enzim $\alpha$ -Amilase Pada Sampel.....	47
Tabel 5. Nilai $IC_{50}$ Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dan Acarbose .....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rimpang Lempuyang Gajah.....	11
Gambar 2. Daun, Batang dan Pembungan Lempuyang Gajah.....	13
Gambar 3. Struktur Enzim $\alpha$ -Amilase.....	24
Gambar 4. Reaksi Kimia Glukosa Dengan Pereaksi DNS.....	26
Gambar 5. Struktur Kimia Acarbose.....	27
Gambar 6. Microplate Reader .....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja .....	63
Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Larutan Uji.....	65
Lampiran 3. Hasil Perhitungan Uji Penghambatan.....	69
Lampiran 4. Gambar Penelitian .....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama** : Arfani Fathiyah  
**NIM** : 70100119007  
**Judul Skripsi** : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.) Secara In Vitro

---

Diabetes Mellitus (DM) adalah suatu masalah kesehatan yang terjadi karena kelainan pada proses metabolisme tubuh, dimana terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Meningkatnya kadar gula ini terjadi akibat rusaknya kelenjar pankreas sehingga hanya sedikit insulin yang dihasilkan atau bahkan sama sekali tidak ada insulin. Satu tindakan yang dapat diambil untuk menurunkan gula darah adalah dengan menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase, yang bertanggung jawab atas penguraian karbohidrat. Lempuyang gajah adalah salah satu tanaman keluarga jahe-jahean yang ada di Indonesia dan mudah ditemukan di pedesaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji potensi inhibitor  $\alpha$ -amilase yang dimiliki oleh ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah sebagai kandidat antidiabetes dari bahan alam.

Pengujian penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dapat dilakukan dengan menambahkan pereaksi DNS atau asam 3,5-dinitrosalisilat. Dalam penelitian ini menggunakan metode DNS, dimana maltosa dan glukosa akan bereaksi dengan pereaksi DNS sehingga larutan yang diuji menunjukkan pigmen warna yang kompleks, yang selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat glukosa yang direduksi. Aktivitas inhibisi enzim  $\alpha$ -amilase dapat diukur menggunakan microplate reader dengan panjang gelombang 540 nm.

Hasil ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah diukur absorbansinya menggunakan microplate reader kemudian dihitung nilai  $IC_{50}$  nya. Hasil penelitian menunjukkan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki kemampuan yang sangat lemah dalam menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase karena nilai  $IC_{50}$  sebesar 237,643  $\mu$ g/mL. Sehingga diketahui bahwa aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase pada acarbose lebih besar daripada aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah.

**Kata Kunci** : Rimpang Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), Enzim  $\alpha$ -amilase, DNS (Dinitrosalisilic Acid)

## ABSTRACT

**Name** : Arfani Fathiyah  
**Student ID** : 70100119007  
**Title** : In Vitro Inhibition Test of  $\alpha$ -Amylase Enzyme Ethanol 70%  
Extract of Lempuyang Gajah Rhizome (*Zingiber zerumbet* L.)

---

Diabetes Mellitus (DM) is a health problem that occurs due to abnormalities in the body's metabolic processes, where there is an increase in glucose levels in the blood. Increased levels of glucose in the blood occur due to damage to the pancreas gland so that it cannot produce insulin or only a little insulin. One solution to lowering blood sugar levels is to inhibit enzymes that hydrolyze carbohydrates, namely the  $\alpha$ -amylase enzyme. *Zingiber zerumbet* L is one of the ginger family plants in Indonesia and is easily found in rural areas. The purpose of this research is to know the effect of inhibition in *Zingiber zerumbet* L rhizome ethanolic extract as an antidiabetic candidate from natural ingredients.

Testing of the inhibitory activity of enzyme  $\alpha$ -amylase was carried out using the method of adding DNS reagents (3,5-dinitrosalicylic acid) capable of breaking starch into simple sugars, such as glucose and maltose. DNS method testing is to see the reaction between maltose and glucose with DNS, so as to produce a complex color with the test solution and be an indicator to indicate the presence of reducing sugars. Measurements of the inhibitory activity of  $\alpha$ -amylase were carried out using a microplate reader at a wavelength of 540 nm.

The ethanol extract of *Zingiber zerumbet* L rhizomes was measured for absorbance using a microplate reader, and then the  $IC_{50}$  value was calculated. The finding indicated that the ethanol extract of *Zingiber zerumbet* L rhizome had very weak  $\alpha$ -amylase enzyme inhibitory activity because the  $IC_{50}$  value is 237.643  $\mu$ g/mL. It is acknowledged that the  $\alpha$ -amylase enzyme's effectiveness in acarbose surpasses its efficacy in the acarbose ethanol extract obtained from *Zingiber zerumbet* L rhizomes.

**Keyword** : *Zingiber zerumbet* L., enzyme  $\alpha$ -amylase, DNS (Dinitrosalicylic Acid)



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Diabetes Mellitus (DM) merupakan suatu kondisi dimana terjadi gangguan kesehatan karena ada kelaianan pada sistem metabolisme pada, lemak, protein dan karbohidrat (Barbara G. Wells et al., 2015). Diabetes Mellitus terjadi karena kurangnya produksi insulin oleh tubuh atau ketidakmampuan tubuh dalam merespons insulin dengan baik. Kurangnya insulin atau ketidakmampuan sel untuk meresponnya, mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat atau sering disebut hiperglikemia yang merupakan indikator diagnosa diabetes. Diabetes dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, hiperglikemia terjadi akibat kekurangan insulin karena adanya pengaruh genetik dimana tubuh merusak sel beta pankreas. Diabetes mellitus tipe 2 adalah keadaan dimana kadar gula darah meningkat atau naik karena insulin tidak bisa menggerakkan glukosa dari darah hingga masuk ke dalam sel. Hal tersebut terjadi oleh reseptor insulin yang menjadi resisten.

Menurut data IDF (International Diabetes Federation), jumlah penduduk dengan usia 25 tahun ke atas yang menderita diabetes mencapai 463 juta pada tahun 2019. Prevalensi diabetes di seluruh dunia pada kelompok usia 20 hingga 79 tahun adalah sebesar 9,3%. Di tahun yang sama, IDF menyajikan data mengenai angka kejadian diabetes berdasarkan kelamin, yang menunjukkan bahwa 9,65% laki-laki dan 9% perempuan terdiagnosis menderita penyakit tersebut. Jumlah orang yang menderita diabetes mellitus diduga semakin meningkat sejalan dengan semakin bertambahnya usia, sehingga diketahui presentasinya sebesar 19,9% atau sekitar 111,2 juta orang yang berusia antara 65

sampai 79 tahun. Berdasarkan proyeksi, jumlah tersebut diduga akan semakin naik sampai menyentuh angka 578 juta pada tahun 2030 serta 700 juta pada tahun 2045 (International Diabetes Federation, 2021). Diperkirakan terdapat 19.465.100 penderita diabetes berusia antara 20 dan 79 tahun di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk dewasa usia 20 hingga 79 tahun berjumlah 179.720.500 jiwa, artinya jika dihitung dari kedua angka tersebut maka diketahui angka kejadian diabetes pada penduduk rentang usia 20 hingga 79 tahun adalah sebesar 10,6%. Dengan kata lain, kasus tersebut terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya yaitu 8,5% pada tahun 2018 meningkat menjadi 10,6% pada tahun 2021 (International Diabetes Federation, 2021; Kemenkes, 2018).

Satu metode dalam mengatasi Diabetes Mellitus adalah dengan mengurangi penyerapan gula melalui penghambatan enzim yang mendegradasi karbohidrat dalam saluran cerna menjadi gula (Watcharachaisoponsiri et al., 2016). Enzim tersebut adalah  $\alpha$ -amilase yang merupakan enzim kunci yang mendegradasi substrat polimer menjadi oligomer yang lebih pendek dengan mengkatalisis hidrolisis ikatan -1,4-glukan yang ada dalam pati, maltodekstrin, dan karbohidrat lainnya (Gong et al., 2020). Dengan menghambat enzim  $\alpha$ -amilase penyerapan glukosa bisa ditunda dan menekan kenaikan kadar gula darah postprandial, sehingga menurunkan kadar gula darah (Fitrianingsih et al., 2016).

Acarbose memiliki mekanisme menghambat enzim  $\alpha$ -amilase pankreas dan hidrolase  $\alpha$ -glukosida pada membran usus untuk selanjutnya menghambat hidrolisis karbohidrat kompleks menjadi glukosa di usus kecil. Sayangnya, belum ada obat antidiabetes ini yang bebas dari efek samping termasuk risiko hipoglikemia, gangguan gastrointestinal, penambahan berat badan, diare, gagal ginjal dan hipersensitivitas. Oleh karena itu, tumbuhan sebagai produk alami dijadikan sumber senyawa terbaik sebagai bahan obat. Selain itu, produk alami

telah dilaporkan berpotensi terlibat dalam interaksi sinergis dengan antidiabetes obat yang dapat menjadi target untuk terapi kombinasi. Studi farmasi pada produk alami terus dieksplorasi untuk pengembangan antidiabetes baru (Alam et al., 2016; Pujimulyani et al., 2018).

Lempuyang gajah adalah salah satu dari tumbuhan keluarga jahe-jahean yang berpotensi memiliki aktivitas menghambat enzim  $\alpha$ -amilase. Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) sangat sering dimanfaatkan sebagai bahan baku obat tradisional. Hasil skrining fitokimia oleh Chia Ju Chang et al mengungkapkan bahwa terdapat beberapa senyawa yang diperoleh dari ekstrak lempuyang gajah, senyawa tersebut adalah alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, saponin, terpenoid, polifenol, dan glikosida (Chang et al., 2012). Pada tahun 2013, dilakukan penelitian yang menunjukkan ekstrak etanol yang berasal dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki kemampuan untuk mengurangi tingkat glukosa darah pada sampel berupa tikus dengan keadaan diabetes karena diberikan induksi streptozotisin (Tzeng et al., 2013). Hal ini menunjukkan *Zingiber zerumbet* L. mampu menurunkan kadar gula darah.

Untuk menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase, dilakukan pengukuran jumlah gula yang direduksi dengan menggunakan metode penambahan reagen asam dinitrosalisilat (DNS) yang kemudian absorbansinya diukur menggunakan *microplate reader*. Prinsip dari metode DNS yakni mengamati reaksi yang terjadi saat maltosa dan glukosa bereaksi dengan DNS, sehingga menghasilkan larutan uji yang berwarna kompleks yang kemudian menjadi indikator adanya gula pereduksi. Absorbansi diukur dengan panjang gelombang 540 nm (Gaspersz et al., 2022).

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi terkait kegunaan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase

karena penelitian tentang lempuyang gajah sebagai inhibitor enzim  $\alpha$ -amilase masih sangat terbatas.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimanakah potensi penghambatan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase?
2. Berapakah nilai  $IC_{50}$  dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### 1. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata atau istilah yang digunakan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman pembaca terhadap kata-kata tersebut, perlu penjelasan mengenai makna kata-kata yang digunakan sebagai berikut.

- a. Ekstrak merupakan bentuk sediaan yang berupa kering, kental, maupun dalam bentuk cair yang pembuatannya melalui proses penyarian simplisia dengan metode yang sesuai, di luar pengaruh dari sinar matahari.
- b. Etanol adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus  $CH_3CH_2OH$  dan molekulnya mengandung gugus hidroksil (OH-).
- c. Enzim adalah senyawa yang bersifat protein yang sangat efektif yang mengkatalisis reaksi kimia karena kemampuannya untuk berikatan secara khas dengan berbagai macam molekul.
- d.  $\alpha$ -amilase adalah suatu enzim yang dapat ditemukan di luar sel dan memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi. Enzim ini berperan dalam pemecahan ikatan 1,4  $\alpha$ -glikosida pada substrat yang terdapat pada gugus amilosa dan amilopektin sehingga terbentuk molekul yang lebih sederhana yaitu dekstrin atau oligosakarida, maltosa, dan glukosa.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup pengujian efek penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Metode DNS digunakan untuk mengukur aktivitas penghambatan enzim kemudian membaca absorbansinya menggunakan *microplate reader*.

### **D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka ini peneliti membahas tentang informasi dari peneliti terdahulu sabagai bahan perbandingan, kejelasan arah, maanfaat serta kekurangan atau keunggulan dari masing-masing penelitian yang telah ada. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti akan memasukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh informasi terkait teori yang berhubungan dengan judul penelitian yang diangkat

1. Penelitian Muhtadi dkk, 2019 dengan judul “*The potential antidiabetic and anti-inflammatory activity of Zingiber zerumbet ethanolic extracts and Channa striata powder on albino Wistar mice*” membahas tentang potensi aktivitas antidiabetes dan antiinflamasi dari *Channa striata* powder dan ekstrak etanol lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang diujikan pada tikus wistar albino. Untuk uji antiinflamasi dimulai dengan menyuntikkan 0,2 ml 2% b/v garam natrium karagenan secara subkutan di daerah subplantar kaki belakang kanan tikus. Natrium diklofenak (0,9 mg/200 g) diberikan secara oral dalam waktu 30 menit sebelum injeksi karagenan, kemudian volume kaki belakang diukur secara plethysmometric sebelum dan sesudah injeksi karagenan setiap 30 menit selama 90 menit. Untuk uji antidiabetes, tikus diinjeksikan aloksan secara intraperitoneal pada dosis 150 mg/kgBB. Selama periode selanjutnya selama 4 hari, sampel darah



diambil untuk diukur kadar glukosanya sebelum proses induksi aloksan dimulai. Jika terlihat peningkatan pada kadar glukosa darah hingga  $\pm 200$  mg/dL, maka tikus disebut sudah dalam kondisi diabetes. Tikus diberikan ekstrak etanolik *Zingiber zerumbet* L. dosis 300 mg/kg BB, *Channa striata* powder (CSP) 300 mg/kg BB, dan kombinasi ekstrak yang diberikan *Zingiber zerumbet* L. dan *Channa striata* powder masing-masing dosis 300 mg/kg BB. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah diperoleh hasil presentase penghambatan edema kaki kelompok *Zingiber zerumbet* L., *Channa striata* powder, kombinasi *Zingiber zerumbet* L - *Channa striata* powder, dan kontrol positif berturut-turut adalah  $40,01 \pm 7,19$ ,  $35,25 \pm 8,48$ ,  $36,56 \pm 7,22$  dan  $36,10 \pm 2,89\%$ . Adapun persentase penurunan kemampuan kadar gula darah *Zingiber zerumbet* L., *Channa striata* powder, kombinasi *Zingiber zerumbet* L - *Channa striata* powder, dan kontrol positif berturut-turut adalah  $61,09 \pm 16,20$ ,  $33,78 \pm 26,67$ ,  $69,59 \pm 13,53$ , dan  $74,72 \pm 9,90\%$ . Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat efek sinergis terhadap aktivitas antidiabetes *Zingiber zerumbet* L. dan *Channa striata* powder. Sedangkan pada penelitian antiinflamasi tidak menunjukkan adanya efek sinergis.

2. Penelitian Fadliyah Ramadhani, 2018 dengan judul “*Uji Aktivitas Penghambatan  $\alpha$ -amilase Secara In Vitro Ekstrak Akar Durian (Durio zibethinus)*”. Penelitian ini membahas uji penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase pada fraksi ekstrak akar durian menggunakan metode DNS. Akar durian diekstraksi menggunakan metanol hingga diperoleh ekstrak kental, selanjutnya di fraksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair dengan n-heksan hingga diperoleh hasil akhir berupa fraksi ekstrak metanol, fraksi ekstrak etil asetat dan fraksi ekstrak n-heksan. Selanjutnya, absorbansi dari



fraksi—fraksi tadi diukur dengan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 540 nm untuk mengetahui aktivitas penghambatannya. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu fraksi metanol, fraksi ekstrak etil asetat dan fraksi ekstrak n-heksan dari ekstrak metanol akar durian (*Durio zibethinus*) memiliki kemampuan dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase. Fraksi dengan aktivitas paling tertinggi dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase antara ketiga fraksi tersebut adalah ekstrak etil asetat dengan nilai  $IC_{50}$  sebesar 10,46 bpj.

3. Penelitian Shoffiyanti dkk, 2019 dengan judul “Penghambatan  $\alpha$ -Amilase dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Alpukat”. Penelitian ini menguji potensi daun alpukat (*Persea americana* Mill) dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase dan sebagai antioksidan. Sampel daun alpukat didapatkan secara resmi dari Balitro (Badan Penelitian Tanaman Rempah dan Obat). Sampel awal di ekstraksi dengan cara maserasi dengan pelarut etanol 70%. Setelah diperoleh maserat, kemudian diuapkan menggunakan mesin *vacum rotary evaporator* hingga di dapatkan ekstrak yang kental. Setelah itu, dilakukan analisis fitokimia untuk melihat adanya kandungan metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, saponin, fenol, steroid, dan triterpenoid sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Uji penghambatan dilakukan dengan menggunakan pereaksi DNS. Setelah itu, absorbansinya diukur menggunakan spektrofotometer Uv-Vis pada rentang panjang gelombang 490-540 nm. Hasil dari penapisan fitokimia pada penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan hasil penapisan yang pernah dilakukan peneliti pada jurnal penelitian sebelumnya, yakni daun alpukat secara positif memiliki kandungan tanin, saponin, alkaloid, flavonoid, steroid dan tidak ditemukan terpenoid. Uji inhibisi enzim  $\alpha$ -amilase daun

alpukat menggunakan variasi konsentrasi 90µg/mL, 150µg/mL, 260µg/mL, 450µg/mL dan 780µg/mL dan konsentrasi acarbose yang digunakan adalah 16µg/mL, 25µg/mL, 39µg/mL, 61µg/mL, 95µg/mL. Hasil nilai  $IC_{50}$  yang diperoleh dari sampel daun alpukat yaitu 139,01µg/mL, adapun nilai  $IC_{50}$  acarbose sebagai pembanding atau adalah sebesar 42,6973 µg/mL. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% daun alpukat memiliki kemampuan untuk menghambat enzim  $\alpha$ -amilase, nilai  $IC_{50}$  sebesar 139,1 µg/mL. Potensi relatif dari ekstrak alpukat ini adalah 0,3 kali lebih rendah dibandingkan dengan acarbose, yang menunjukkan bahwa daun alpukat memiliki potensi sebagai pengobatan untuk diabetes mellitus. Selain itu, masih ada kemungkinan untuk mengidentifikasi senyawa aktif yang ada di dalamnya (Fajriah Shoffiyanti et al., 2019).

4. Pada jurnal yang ditulis oleh Lulu Alda Alfiani, 2022 dengan judul “ *Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -amilase oleh Ekstrak Herba Ciplukan (Physalis Angulate L.) Secara In Vitro*” membahas tentang uji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase menggunakan ekstrak herba ciplukan. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi hingga dihasilkan ekstrak kental. Setelah itu, dilakukan analisis fitokimia untuk mengidentifikasi zat-zat kimia yang terkandung dalam tumbuhan ciplukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tumbuhan ciplukan terdapat senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti tannin, saponin, fenol, alkaloid, dan flavonoid. Uji penghambatan  $\alpha$ -amilase diukur dengan alat spektrofotometer UV-Vis untuk membaca absorbansi pada rentang panjang gelombang 400-800 nm. Uji penghambatan  $\alpha$ -amilase sampel dan acarbose menggunakan variasi konsentrasi 100µg/mL, 250µg/mL, 500µg/mL, 750µg/mL, dan 1.000

$\mu\text{g/mL}$ , lalu nilai  $IC_{50}$  dihitung. Hasil  $IC_{50}$  yang diperoleh adalah 241,32  $\mu\text{g/mL}$  pada acarbose dan 735,45  $\mu\text{g/mL}$  pada ekstrak herba ciplukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penghambatan aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase di acarbose lebih besar dari pada ekstrak herba ciplukan.

Penelitian ini akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan sampel berupa batang, daun, akar, herba dan bunga sedangkan sampel pada penelitian ini adalah sampel berupa rimpang dimana belum banyak yang melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan diuji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah karena dalam penelitian terdahulu melaporkan ekstrak etanol lempuyang gajah memiliki aktivitas antidiabetes. Oleh karena itu, peneliti bermaksud menguji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dari rimpang lempuyang gajah dalam terapi diabetes mellitus.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber Zerumbet L.*)
2. Untuk mengetahui nilai  $IC_{50}$  ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber Zerumbet L.*) dalam menghambat enzim  $\alpha$ -amilase

#### ***F. Manfaat Penelitian***

1. Untuk Mahasiswa

Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan mengembangkan kapasitas keilmuan khususnya yang berkaitan dengan penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

## 2. Untuk Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pembanding untuk mengarahkan dan menyumbangkan ide pada peningkatan metode belajar mengajar serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai efek penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase oleh ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*).



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

##### 1. Klasifikasi

Selama bertahun-tahun, *Zingiber zerumbet* L. sudah banyak digunakan sebagai obat tradisional. Di Indonesia sendiri *Zingiber zerumbet* L. dikenal dengan nama Lempuyang Kebo atau Lempuyang Gajah di daerah Jawa dan disebut Lempuyang Paek di daerah Madura (Muhtadi et al., 2019).

- Regnum : Plantae  
Divisi : Spermatophyta  
Subdivisi : Angiospermae  
Kelas : Monocotyledonae  
Ordo : Zingiberales  
Famili : Zingiberaceae  
Genus : Zingiber  
Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. (Lianah, 2019)



**Gambar 1.** Rimpang Lempuyang Gajah (Zakaria et al., 2011)


## 2. Deskripsi dan Morfologi

Lempuyang gajah umumnya dikenal sebagai tumbuhan herbal yang dapat tumbuh alami di lingkungan lembab dan dataran rendah atau lereng bukit. Tumbuhan memiliki berbagai macam nama di Asia. Di Indonesia dan Malaysia tumbuhan ini dikenal sebagai lempuyang, di India dikenal dengan nama Ghatian dan Yaiimu, di Bangladesh dikenal dengan Jangli adha, di Hawaii dikenal dengan nama Awapuhi, dan di Arab dikenal dengan nama Zurun-bah (Zakaria et al., 2011).

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) adalah salah satu tumbuhan terestrial dimana batang semuanya tersusun atas lapisan pelepah daun berwarna hijau melengkung yang mampu tumbuh sepanjang 1-2 m, ukuran kecil memanjang, memiliki batang bawah tanah yang tumbuh tepat di bawah permukaan tanah (Evizal, 2013). Lempuyang gajah dapat dicirikan dengan adanya pulvinus antara pangkal tangkai daun dan ligula, batang dapat tumbuh setinggi kira-kira 1-2 m. Daunnya terkadang berwarna hijau atau keunguan di bawah pucuk yang masih muda, dengan ketebalan 25-35 cm dengan pelepahnya terangkat kuat dari permukaan bawah. Tangkai daunnya kira-kira panjangnya 6 mm dan memiliki ligula (lidah daun). Bunga tumbuh dari rimpang yang memiliki panjang 6-12 cm, berwarna merah ketika sudah tua dan berwarna hijau saat masih muda (Zakaria et al., 2011). Lempuyang gajah memiliki cadangan makanan yang disebut umbi atau rimpang dengan diameter 4 cm. Daging rimpang lempuyang gajah berwarna kuning pucat dan berasa pahit getir (Evizal, 2013). Simplisia rimpang lempuyang gajah berupa bagian irisan yang berbentuk memanjang hingga bulat, permukannya kasar dan berserabut-serabut. Jika diperhatikan, bagian luar atau permukaan luar memiliki warna yang lebih gelap, pada permukaan



dalam terlihat batas yang jelas antara steel dengan korteks, patahan tidak rata serta bagian luarnya berwarna coklat agak kekuningan (KEMENKES, 2017).



**Gambar 2.** (a) Daun dan Batang Lempuyang Gajah ; (b) Pembungan Lempuyang Gajah (Zakaria et al., 2011)

### 3. Kandungan

Rimpang lempuyang gajah memiliki kadar pati 60%, serat 6,5% dan minyak atsiri 0,8% (Evizal, 2013). Skrining fitokimia penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa ekstrak kental *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm mengandung banyak kandungan senyawa kimia bermanfaat yaitu alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, saponin, terpenoid, glikosida dan polifenol (Chang et al., 2012). Lempuyang gajah juga mengandung minyak atsiri 0,82% yang terdiri dari kariofilen, ar-kurkumen, humulenol I,II, kariofilenoksid, humulenepoksid I, II, III,  $\gamma$ -kadinen, zerumbonoksid. Pada ras tertentu ditemukan kamfen, humulen, zerumbon, mirsen,  $\alpha$ -terpineol,  $\gamma$ -terpinen, zerumbonoksid, (+)-humulenol I, (+)-humulenol II, heksahidrohumulenol II, asetil afzelin, diasetil afzelin, kurkumol, kurkumenol, isokurkumenol, prokurkumenol, kurkumadiol, kurdion, dehidrokurdion, furanodienon, isofuranodienon, zederon, furanodien (suatu turunan germaken), kurserenon, epikurserenon, isofuranogermakren,

furanogermakren, asam 4-metoksisinamat, kurkuminoid (turunan diaril heptanoid) (Silalahi, 2018)

#### 4. Manfaat

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) merupakan salah satu tumbuhan dari keluarga jahe-jahean (*Zingiberaceae*) yang sering dimanfaatkan sebagai obat di Indonesia. Lempuyang gajah sejak dahulu digunakan sebagai bahan obat tradisional maupun sebagai bahan baku untuk membuat jamu. Adapaun industri makanan, lempuyang gajah banyak digunakan untuk meningkatkan aroma dari suatu masakan dan *appetizer* (Silalahi, 2018). Umbi atau rimpang lempuyang gajah digunakan untuk menurunkan demam, mengatasi batuk dan asma, cacangan dan penyakit kulit. Untuk anak-anak yang terkena demam, rimpangnya ditumbuk hingga setengah halus atau halus lalu ditempelkan pada kening atau perut (SN Darwin et al., 1991).

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) diketahui memiliki khasiat obat tertentu seperti, antitumor, antipiretik, antiinflamasi, antialergi, antibakteri, dan memiliki aktivitas agregasi platelet. Tumbuhan lempuyang gajah ini juga diketahui mengandung sesquiterpenoid, flavonoid, turunan kaempferol, vanilin, senyawa aromatik dan senyawa polifenol lainnya (Rohmah et al., 2022). Sesquiterpenoid zerumbone mempunyai efek antiradang, analgesik, dan antikanker, digunakan untuk mengobati sakit perut, luka memar akibat pukulan, sebagai obat bius untuk sakit gigi, serta untuk mengobati jamur kulit dan kurap (Lallo et al., 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lallo dkk 2018, mengungkapkan hasil analisis tentang kandungan zerumbone dalam ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) bahwa tanaman ini memperlihatkan kemampuan untuk

menghambat aktivitas bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang penyebab penyakit tuberkulosis pada tingkat konsentrasi 0,1%.

## ***B. Diabetes Mellitus***

### **1. Definisi Diabetes Mellitus**

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit yang terjadi karena adanya kelaianan pada sistem metabolisme pada karbohidrat, lemak, dan protein yang biasanya ditandai dengan adanya hiperglikemia (Barbara G. Wells et al., 2015). Diabetes Mellitus ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar gula darah, dimana meningkatnya kadar gula dalam darah ini terjadi akibat kerusakan kelenjar pankreas sehingga hanya sedikit insulin yang dapat dihasilkan atau bahkan tidak ada insulin. Hormon insulin yang menurun mengakibatkan meningkatnya penyerapan glukosa dalam darah (Nurjanah et al., 2020). Menurut *American Diabetes Association* (ADA) terdapat karakteristik utama penanda terjadinya diabetes mellitus, yaitu buang air kecil menjadi lebih sering (poliuria), minum menjadi lebih banyak (polidipsi), dan penurunan berat badan (Brunton et al., 2008).

Tabel 1. Kriteria Penegakan Diagnosis Diabetes Mellitus (Papadakis & McPHEE, 2019)

<b>Kriteria</b>	<b>Normal</b>	<b>Pradiabetes</b>	<b>Diabetes</b>
Kadar Glukosa Puasa	< 100 mg/dL (5.6 mmol/L)	100-125 mg/dL(5,6-6,9 mmol/L)	≥126 mg/dL (7,0 mmol/L)
Glukosa Plasma 2 Jam Setelah Makan	<140 mg/dL (7.8 mmol/L)	≥140-199 mg/dL (7,8-11,0 mmol/L)	≥ 200 mg/dL (11,1 mmol/L)
Kadar Hemoglobin Terglikasi	< 5,6%	5,7-6,4%	≥ 6,5%

## 2. Klasifikasi Diabetes Mellitus

### a. Diabetes Mellitus Tipe I

Diabetes Mellitus tipe I umumnya ditemui pada anak-anak atau pada masa dewasa awal yang merupakan hasil dari proses autoimun yang menghancurkan sel pankreas (Barbara G. Wells et al., 2015). Gangguan metabolik yang terjadi pada glukosa menyebabkan diabetes tipe I, yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah melebihi batas normal. Kondisi ini timbul karena sistem kekebalan tubuh yang salah mengenali dan menyerang sel beta pankreas, yang menyebabkan produksi insulin menjadi sangat terbatas. Dampak dari kurangnya insulin ini masuknya protein dan lemak ke dalam aliran darah mengakibatkan kelemahan dan penurunan berat badan pada tubuh (Sunarto, 2011).

### b. Diabetes Mellitus Tipe II

Diabetes Mellitus tipe II merupakan jenis diabetes yang sering dijumpai, bermula dari sel-sel tubuh yang tidak mampu sepenuhnya merespon terhadap insulin atau sering disebut resistensi insulin (International Diabetes Federation, 2021). Insulin adalah hormon yang bekerja dengan menghambat atau menekan pembentukan enzim-enzim glukoneogenik, seperti fruktosa-1,6-difosfatase, glukosa-6-fosfatase, dan karboksilase piruvat sehingga insulin dapat mengedalikan proses metabolisme karbohidrat (Sunarto, 2011). Saat resistensi insulin terjadi, hormon ini kurang efektif sehingga mendorong peningkatan produksi insulin. Resistensi insulin pada akhirnya akan membentuk kerugian dimana terjadinya hiperglikemia berat yang berujung pada berkurangnya produksi insulin dalam tubuh. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2, insulin yang terdapat didalam tubuh tidak bisa bekerja secara baik karena reseptor insulin yang ada pada sel berkurang, akibatnya hanya sebagian kecil glukosa yang bisa masuk kedalam sel. Hal tersebut menyebabkan glukosa yang masuk hanya sedikit, maka

terjadilah kekurangan glukosa dalam sel. Glukosa yang tidak masuk dalam sel kemudian menumpuk didalam darah sehingga menyebabkan hiperglikemia dan penyakit lain (Sunarto, 2011).

c. Diabetes Mellitus Gestasional (DMG)

Diabetes melitus gestasional (GDM) merupakan kelainan pada toleransi glukosa yang ditemukan pada kondisi ibu hamil. Diabetes melitus gestasional merupakan suatu kondisi diabetes yang terjadi pada wanita yang belum pernah terdiagnosis diabetes dan memiliki kadar gula darah tinggi selama kehamilan (Adil, 2021). Secara umum, diabetes gestasional ditemukan pada ibu hamil setelah memasuki trimester kedua atau setelahnya. Diketahui sebanyak 7% wanita mengalami diabetes gestasional tersebut. Biasanya, sekitar 50% wanita yang mengalami diabetes gestasional akan kembali ke status normal setelah kehamilan berakhir, akan tetapi resiko untuk terkena diabetes tipe II meningkat atau lebih besar dibandingkan dengan wanita dengan keadaan normal (Barbara G. Wells et al., 2015). Diabetes gestasional erat kaitannya dengan komplikasi pada masa kehamilan, seperti peningkatan kebutuhan operasi caesar, peningkatan risiko ketonemia, preeklamsia, dan infeksi saluran kemih, serta peningkatan morbiditas perinatal (hipoglikemia neonatus, makrosomia, dan ikterus neonatorum) (Plows et al., 2018)

d. Penggunaan obat Antidiabetes

Penatalaksanaan dan mencegah komplikasi pada pasien diabetes dilakukan dengan cara mengatur kadar glukosa yang tepat melalui pengobatan farmakologis dan nonfarmakologis. Pengobatan secara nonfarmakologis meliputi perbaikan asupan nutrisi yang sehat serta perbaikan pola hidup pada penderita diabetes, seperti tidak minum alkohol dan merokok.



Pengobatan secara farmakologi diabetes dapat dilakukan dengan menggunakan obat hipoglikemik antara lain acarbose, metformin , glibenclamide atau dengan menggunakan obat alami yang dapat menurunkan kadar gula darah (Mahfur & Wlid, 2019).

Obat-obatan antidiabetes umumnya ditujukan untuk penderita Diabetes Mellitus tipe II. Berikut adalah penggolongan obat antidiabetes :

1) Golongan Sulfonilurea

Mekanisme aksi sulfonilurea yaitu untuk merangsang sel beta pankreas untuk melepaskan insulin. Sulfonilurea ditunjukkan hanya kepada pasien diabetes mellitus tipe II karena obat-obatan ini membutuhkan sel beta pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan efeknya pada glukosa darah (Papadakis & McPHEE, 2019). Generasi pertama sulfonilurea meliputi asetoheksamida, tolazamid, tolbutamida, dan klorpropamid. Adapun generasi kedua sulfonilurea yaitu glimepirid, glyburide (glibenclamide), gliclazid, dan glipizid (Brunton et al., 2008).

2) Golongan Meglitinid

Meglitinid dan sulfonilurea adalah kelompok obat yang memiliki efek serupa dalam mengurangi kadar glukosa dengan merangsang pelepasan insulin dari pankreas. Namun, produksi insulin oleh pankreas dipengaruhi oleh kadar glukosa dan berkurang saat kadar glukosa dalam darah rendah. Golongan obat meglitinid memiliki efek merangsang produksi insulin dengan cara menghalangi fungsi saluran K yang tidak bergantung pada ATP pada sel beta pankreas (Barbara G. Wells et al., 2015).

3) Golongan Biguanid

Metformin adalah obat golongan biguanid yang paling umum diresepkan. Metformin adalah antihiperlikemik, bukan hipoglikemik. Metformin tidak



merangsang pelepasan insulin dari pankreas dan umumnya tidak menyebabkan hipoglikemia. Mekanisme kerja metformin yaitu menurunkan kadar glukosa dengan cara menurunkan produksi glukosa dihati serta meningkatkan insulin aksi di jaringan otot dan lemak (Brunton et al., 2008).

#### 4) Golongan Thiazolidinediones

Secara tidak langsung golongan ini meningkatkan sensitivitas insulin pada otot, hati, dan jaringan lemak. Thiazolidinediones merupakan agonis peroxisome proliferator activated receptor- $\gamma$  (PPAR  $\gamma$ ). PPAR mengaktifkan responsif gen pada insulin berfungsi mengatur metabolisme lipid dan karbohidrat. Thiazolidinediones pada prinsipnya bekerja untuk meningkatkan sensitivitas pada insulin pada jaringan perifer dan efektif jika ada insulin. Thiazolidinediones mengurangi produksi glukosa oleh hati dan untuk meningkatkan aliran glukosa ke otot dan jaringan adiposa, diperlukan peningkatan produksi dan perpindahan jenis transporter glukosa yang khusus. Thiazolidinediones juga merangsang aktivitas gen yang mengatur proses metabolisme asam lemak pada jaringan perifer (Brunton et al., 2008).

#### 5) Penghambat enzim $\alpha$ -glukosidase

Acarbose sebagai salah satu penghambat enzim  $\alpha$ -glukosidase bekerja dengan efek menunda penyerapan glukosa di dalam usus. Dampaknya adalah mencegah peningkatan kadar gula darah setelah makan. Menghambat enzim  $\alpha$ -glukosidase akan mengurangi pengambilan pati, disakarida dan dekstrin di usus dengan menghambat tindakan enzim tersebut di dalam interstin. Dengan memperlambat aktivitas enzim  $\alpha$ -glukosidase di permukaan usus, maka peningkatan kadar glukosa dalam darah dapat dicegah pada individu sehat dan pasien diabetes mellitus (Brunton et al., 2008).

### ***C. Hidrolisis Pati***

Pati merupakan suatu jenis polimer yang terdiri dari glukosa dengan rumus molekul  $(C_6H_{10}O_5)_n$ . Pati adalah komponen utama yang diproduksi oleh tumbuhan sebagai tempat penyimpanan glukosa berlebih. Pati terdiri dari dua jenis karbohidrat, yaitu amilopektin dan amilosa, yang memiliki komposisi yang beragam. Amilosa adalah satu jenis polimer rantai lurus terdiri dari banyak molekul glukosa yang terhubung melalui ikatan  $\alpha$  1,4 glukosida. Jenis yang kedua adalah amilopektin yang mengandung cabang pada rantai karena adanya ikatan  $\alpha$  1,6 glukosida pada beberapa bagian. Ikatan glikosidik dalam pati memiliki kestabilan yang cenderung tinggi dalam kondisi basa tetapi memiliki kestabilan yang rendah dalam kondisi asam. Enzim pemecah pati juga dapat menyebabkan ikatan tersebut berpisah. Polisakarida, jenis karbohidrat ini banyak ditemukan di alam, terutama pada sebagian besar tanaman. Pati terdapat di dalam akar, batang, daun dan juga biji-bijian (Nangin & Sutrisno, 2015).

Proses hidrolisa adalah suatu proses di mana polimer dipecah menjadi molekul penyusun yang lebih sederhana, seperti maltosa, dekstrin, dan glukosa. Proses penguraian secara hidrolisis bisa dilakukan dengan menggunakan zat asam atau enzim sebagai agen pengkatalis. Penggunaan asam atau enzim dalam perlakuan hidrolisis berperan dalam meningkatkan kecepatan reaksi hidrolisis pati. Meningkatnya peminat untuk menggunakan enzim amilase dikarenakan sifatnya yang ramah lingkungan, kemampuannya untuk melakukan pemecahan yang lebih spesifik, dan tidak menyebabkan perubahan rasa pada produk akhir. Penguraian pati dengan menggunakan enzim amilase dapat mencapai tingkat penguraian pati sebesar 42%-97%, tergantung pada jenis pati yang digunakan serta lamanya waktu inkubasi. (Nangin & Sutrisno, 2015).

Proses ini terjadi melalui 3 langkah yang meliputi gelatinisasi, likuifikasi, dan sakarifikasi. Gelatinasi adalah proses awal sebelum terjadi likuifikasi, di mana granula pati membesar karena dipanaskan yang menyebabkan putusya ikatan hidrogen antara molekul dalam ikatan glikosidik pati. Gelatinasi adalah proses yang sangat penting karena berperan dalam menentukan kecepatan likuifikasi. Likuifikasi adalah tahap penting dalam hidrolisis enzimatik di mana  $\alpha$ -amilase mengontrol proses pemecahan pati menjadi molekul yang lebih sederhana seperti dekstrin, oligosakarida dan maltosa (Wahyuningsih, 2019).

Biasanya enzim  $\alpha$ -amilase dan enzim glukoamilase dipakai bersama-sama dalam proses pembentukan glukosa. Enzim  $\alpha$ -amilase secara efisien menghancurkan ikatan amilosa dalam pati yang sudah mengalami gelatinisasi dalam waktu yang singkat. Kemudian, pada tahap sakarifikasi, enzim glukoamilase akan memecah pati menjadi glukosa dengan sempurna (Ramadhani, 2018).

#### ***D. Enzim***

Enzim adalah zat yang ada dalam organisme hidup dan berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reaksi kimia, serta memainkan peran penting sebagai faktor penentu kecepatan reaksi (Wahyuningsih, 2019). Molekul enzim memiliki kantung khusus yang disebut sebagai sisi aktif. Sebuah sisi yang aktif mencakup urutan samping asam amino yang membentuk sebuah permukaan tiga dimensi yang sesuai dengan substrat. Pada sisi aktif, substrat terikat membentuk hubungan dengan enzim membentuk kompleks enzim-substrat (ES), kemudian kompleks ini diubah menjadi enzim-produk (EP) yang terpisah (Harvey & Ferrier, 2011).



Dalam persamaan tersebut terlihat bahwa saat enzim berinteraksi dengan pati, terbentuk suatu senyawa kompleks yang kemudian mengalami reaksi kesetimbangan dan menjadi enzim murni serta oligosakarida sebagai produk. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan mengikat substrat, sehingga menghasilkan kestabilan dalam keseluruhan proses reaksi (Harvey & Ferrier, 2011).

Mekanisme enzim dalam suatu reaksi melibatkan terbentuknya kompleks antara enzim dan substrat. Maka, jika ada kendala dalam penyatuan substrat di sisi aktif enzim, itu dapat menghambat reaksi yang menggunakan enzim sebagai katalis.

Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berbagai faktor dapat memengaruhi kecepatan reaksi enzim adalah sebagai berikut.

a. Suhu

Kenaikan suhu akan mempercepat kecepatan reaksi karena bertambahnya energi kinetik dan frekuensi benturan molekul-molekul yang terlibat dalam reaksi tersebut. Meskipun demikian, kenaikan suhu yang berlebihan dapat mengurangi kecepatan reaksi karena enzim mengalami kerusakan struktural akibat denaturasi (Harvey & Ferrier, 2011).

b. Konsentrasi substrat

Kecepatan reaksi yang dipercepat oleh enzim meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat sampai mencapai kecepatan maksimal ( $V_{maks}$ ). Pada tingkat substrat yang tinggi, enzim akan jenuh terhadap substrat karena semua sisi aktif enzim telah terikat dengan substrat.

### c. pH

Pengetahuan mengenai tingkat keasaman atau basa (pH) sangat penting saat bekerja dengan enzim karena enzim hanya efektif pada pH tertentu. Keseimbangan antara denaturasi enzim pada pH tinggi atau rendah dapat diamati melalui hubungan antara aktivitas dan konsentrasi ion hidrogen. Pada pH yang ekstrim, enzim dapat mengalami denaturasi karena diketahui bahwa Pada kondisi pH yang ekstrim, dapat terjadi denaturasi enzim karena diketahui bahwa enzim merupakan molekul protein, molekul protein kestabilannya dapat dipengaruhi oleh tingkat keasaman lingkungan dan kondisi keasaman yang ekstrim molekul-molekul protein dari enzim akan rusak (Harvey & Ferrier, 2011).

Menghambat suatu proses dapat dilakukan oleh inhibitor dengan tiga jenis mekanisme berbeda, yaitu secara kompetitif, unkompetitif, atau nonkompetitif. Pada penghambat kompetitif, zat penghambat dan zat substrat bersaing untuk mengikat ke enzim. Umumnya, inhibitor kompetitif mempunyai struktur yang serupa dengan substrat enzim yang asli. Maka baik substrat ataupun zat penghambat saling berlomba untuk bergabung dengan bagian aktif enzim. Apabila zat penghambat berhasil mendahului dan terikat dengan bagian aktif enzim, maka substrat tidak akan bisa lagi terikat dengan bagian aktif enzim. Pada inhibitor non kompetitif, molekul inhibitor terikat pada bagian enzim selain tempat pengikatan aktif, menyebabkan perubahan bentuk enzim. Pada keadaan ini, interaksi antara substrat dan kompleks enzim-inhibitor terhambat karena terjadi perubahan pada sisi aktif enzim (Ramadhani, 2018).

### ***F. Enzim $\alpha$ -amilase***

Amilase dapat dikategorikan sebagai saccharidase yakni enzim yang melapisi polisakarida. Amilase adalah enzim pencernaan yang diproduksi oleh kelenjar ludah dan pankreas. Tugas enzim amilase adalah untuk menguraikan

karbohidrat kompleks dalam makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh (Ariandi, 2016).

Enzim  $\alpha$ -amilase merupakan jenis enzim yang bekerja di luar sel dan melakukan pemecahan ikatan 1,4- $\alpha$ -glikosidik pada gugus amilopektin dan amilosa. Proses ini menghasilkan senyawa yang lebih sederhana seperti dekstrin, maltosa dan glukosa. Enzim  $\alpha$ -amilase berfungsi dalam proses pencernaan karbohidrat seperti pati dan glikogen yang ada pada mikroorganisme tumbuhan dan organisme tingkat tinggi yang memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi (Robi'a & Sutrisno, 2015).



**Gambar 3.** Struktur Enzim  $\alpha$ -amilase (Monteiro De Souza & de Oliveira e Magalhães, 2010)

Mekanisme kerja enzim  $\alpha$ -amilase dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada molekul amilosa dan olekul amilopektin. Dalam molekul amilosa,  $\alpha$ -amilase bekerja melalui dua tahap, dimana tahap pertama melibatkan degradasi amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa secara acak. Ini adalah peristiwa yang terjadi dengan cepat dimana penurunan tingkat kehancuran disertai dengan penurunan kekentalan yang tiba-tiba. Dalam tahap kedua, pembentukan glukosa dan maltosa terjadi sebagai produk akhir yang dihasilkan dan tidak terjadi dengan secara bebas. Pada molekul amilopektin, aktivitas  $\alpha$ -amilase akan menghasilkan glukosa, maltosa, dan beberapa jenis dekstrin  $\alpha$ -limit, serta oligosakarida yang terdiri dari



empat atau lebih molekul glukosa yang terhubung oleh ikatan  $\alpha$ -1,6-glikosidik (Ariandi, 2016).

Enzim  $\alpha$ -amilase memiliki kemampuan untuk bekerja pada dua tingkat keasaman, yakni pada lingkungan yang bersifat asam dan netral. Pada kondisi yang asam enzim  $\alpha$ -amilase dapat berfungsi dengan baik pada pH yang optimal antara 3.0 hingga 6.0, dan pada suhu antara 40° C hingga 115° C. Sementara itu, untuk  $\alpha$ -amilase yang lebih stabil pada lingkungan netral, enzim ini dapat berfungsi dengan baik pada pH yang optimal antara 6.5 hingga 8.0, dan pada suhu antara 30° C hingga 40° C (Nurul Hidayati et al., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chorotun Nisak (2020) diperoleh hasil bahwa suhu memengaruhi aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase, dimana dalam penelitian tersebut diketahui bahwa semakin tinggi suhu, semakin meningkat pula aktivitas  $\alpha$ -amilase. Pada suhu 37° C, aktivitas mencapai tingkat puncaknya. Pada suhu 45° C, enzim mengalami penurunan keaktifan.

Untuk menentukan aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase dapat digunakan beberapa metode sebagai berikut.


#### 1. Metode Fuwa

Metode ini berdasarkan pada pembentukan kompleks antara sisa pati yang tidak terurai dengan iodin. Ketika iodin ditambahkan, pati dapat diperiksa dengan melihat apakah ada perubahan warna menjadi biru atau ungu. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah residu glukosa (monomer) penyusun pati tersebut. Semakin besar aktivitas penghambatannya, maka jumlah pati yang terhidrolisis semakin sedikit sehingga kompleks iodin dengan pati yang terbentuk semakin banyak dan menghasilkan warna biru. Pengukuran menggunakan spektrofotometer dapat mengukur tingkat kekompleksan warna tersebut (Robyt, 1998).



## 2. Metode DNSA

Metode ini didasarkan pada gula pereduksi yang dihasilkan dari hidrolisis pati. Gula reduksi akan bereaksi dengan karbonil bebas pada DNSA (3,5 dinitrosalicylic acid) yang berwarna kuning dalam suasana basa, lalu akan terbentuk asam 3-amino-5-nitrosalisilat menjadi warna jingga kemerahan. Senyawa inilah akan terserap pada spektrofotometri (Negrulescu et al., 2012). Prinsip yang digunakan dalam pengujian metode DNS adalah mengamati respons yang terjadi antara maltosa dan glukosa dengan DNS. Hal ini akan menghasilkan perubahan warna kompleks pada larutan uji dan berfungsi sebagai indikator keberadaan gula. Pengukuran aktivitas penghambatan  $\alpha$ -amilase dilakukan menggunakan panjang gelombang 540 nm (Gaspersz et al., 2022).




**Gambar 4.** Reaksi kimia glukosa dengan pereaksi DNS (Rismawati & Bahri, 2016)

Penggunaan DNS lebih dominan dalam mengukur aktivitas enzim yang menghasilkan gula yang mengalami reduksi. Kemudian, langkah-langkah dalam prosedur kerja menggunakan metode DNS ini lebih mudah karena jumlah prosedur yang relatif sedikit. Hal ini diperkirakan dapat mengurangi kesalahan sehingga data akhir yang diperoleh menjadi lebih optimal.

### G. Acarbose

Acarbose adalah suatu jenis oligosakarida yang diperoleh melalui proses fermentasi mikroorganisme. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih dan memiliki berat molekul sebesar 645,6. Acarbose mudah larut dalam air dan rumus molekulnya adalah  $C_{25}H_{43}NO_{18}$  (Depkes RI, 2020). Pemberian antidiabetik dapat dilakukan untuk menghambat enzim  $\alpha$ -amilase. Acarbose merupakan salah satu obat antidiabetik yang dibuat dari oligosakarida buatan yang memiliki sifat sebagai penghambat kompetitif dan mampu menghentikan aktivitas enzim. Acarbose memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -glukosidase dan juga mencegah kerja enzim  $\alpha$ -amilase di pankreas (Eko Wirawan Budianto & Hairullah, 2017).



**Gambar 5.** Struktur Kimia Acarbose (Gendokesumo et al., 2022)

Acarbose digunakan sebagai obat antidiabetes untuk mengobati diabetes mellitus tipe 2. Obat ini berfungsi menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase yang bertanggung jawab dalam pencernaan karbohidrat. Dengan demikian, acarbose dapat memperlambat proses pencernaan karbohidrat, mengurangi penyerapan glukosa dan mencegah tingginya kadar glukosa dalam darah setelah makan (Mahfur & Wlid, 2019). Acarbose juga berfungsi sebagai inhibitor enzim  $\alpha$ -glukosidase. Penghambatan kerja enzim  $\alpha$ -glukosidase menyebabkan terjadi

penurunan hidrolis pati di usus halus sehingga hanya sedikit glukosa yang terbentuk dan dapat diabsorpsi oleh mukosa usus halus (Sinulingga et al., 2020).

### ***H. Ekstraksi***

Ekstraksi adalah kegiatan memisahkan suatu substansi kimia yang larut dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan bantuan agen pemisah berupa pelarut cair (Rosidah et al., 2015). Ekstraksi merupakan tahap dimana sebuah zat terlarut ditarik dari larutannya dalam air menggunakan pelarut yang tidak bercampur. Pemisahan solut melalui ekstraksi pelarut melibatkan perpindahan solut antara dua cairan yang tidak dapat dicampur. Terdapat berbagai kemungkinan menarik dalam pemisahan analisis posisi zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak dapat bercampur (Hasrianti et al., 2016). Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan menggolongkan beberapa metode ekstraksi yaitu maserasi, refluks, perkolasi, ekstraksi dengan alat soxhlet, infus, digesti, dan dekok.

#### **1. Maserasi**

Dalam metode maserasi, simplisia diekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sesekali diaduk pada suhu ruangan. Kemudian dilakukan proses penyaringan dan pemerasan, dimana pelarut ditambahkan kembali setelah penyaringan pertama, dan seterusnya. Ada beberapa keunggulan dari metode maserasi, yang pertama adalah metode ini lebih simpel dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Selain itu, metode ini juga lebih ekonomis daripada metode lainnya. Yang terakhir, metode maserasi dapat mencegah kerusakan pada senyawa yang tidak tahan panas.

Prinsip ekstraksi metode maserasi yaitu dengan merendam serbuk dalam cairan penyari yang cocok selama beberapa hari pada suhu ruangan dan dilindungi

dari sinar matahari. Larutan penyari dapat masuk ke sel melalui membran sel. Kandungan dalam sel akan terlarut karena adanya perbedaan tingkat konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi akan didorong keluar dan digantikan oleh cairan penyari yang memiliki konsentrasi yang rendah (proses difusi). Kejadian itu berlangsung hingga mencapai titik di mana terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di dalam sel dan di luar sel (Hasrianti et al., 2016).

## 2. Refluks

Refluks merupakan salah satu metode ekstraksi yang melibatkan pemanasan. Prinsip dasar dari metode refluks adalah bahwa pelarut yang mudah menguap akan dipanaskan sampai suhu tinggi, namun kemudian akan dikondensasikan oleh kondensor sehingga kembali menjadi cairan dan jatuh kembali ke dalam wadah atau sistem dengan bantuan pendingin balik (Hasrianti et al., 2016). Umumnya proses dilakukan berulang kali pada residu pertama sampai 3-5 kali.

## 3. Perkolasi

Perkolasi merupakan proses ekstraksi yang melibatkan penyaluran zat pelarut organik melalui sampel sehingga zat pelarut dapat mengambil senyawa organik bersamanya. Namun, tingkat keberhasilan dari proses ini hanya akan meningkat dengan signifikan untuk senyawa organik yang sangat dapat larut dalam jenis pelarut yang digunakan (Hasrianti et al., 2016). Dalam metode perkolasi, ekstraksi dilakukan pada suhu ruangan dengan menggunakan pelarut yang selalu diganti dengan yang baru sampai proses tersebut selesai. Proses ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengembangan bahan, proses maserasi di antara, dan tahap perkolasi yang sebenarnya. Perkolasi dilakukan secara terus

menerus hingga diperoleh ekstrak dengan jumlah 1-5 kali lebih banyak dari bahan yang digunakan.

#### 4. Soxhlet

Proses Soxhlet dilakukan menggunakan perangkat khusus dan menggunakan pelarut yang selalu segar. Hal ini memungkinkan ekstraksi terjadi tanpa henti dengan jumlah pelarut yang tetap dan adanya pendinginan yang terus-menerus.

#### 5. Infus

Proses infus melibatkan ekstraksi dengan air sebagai pelarutnya pada suhu yang sama dengan air mendidih. Dalam metode infus, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan air sebagai pelarut pada suhu yang sama dengan air mendidih, yaitu 90°C. Bejana infus kemudian direndam dalam air mendidih selama jangka waktu antara 15 hingga 20 menit (Hasrianti et al., 2016).

#### 6. Digesti

Metode ini dilakukan dengan pengadukan secara terus-menerus pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, biasanya dilakukan pada suhu 40<sup>0</sup> hingga 50<sup>0</sup> C (Hasrianti et al., 2016).

#### 7. Dekok

Dekok ialah metode penyeduhan infus yang dilakukan selama waktu yang lebih lama (lebih dari atau sama dengan 30 menit) dengan menggunakan suhu hingga mencapai titik didih air.

### ***I. Microplate Reader***

*Microplate reader* merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk membaca piringan kecil yang disebut lempeng mikro atau microplate. *Microplate*

*reader* adalah spesialis spektrofotometer yang dirancang untuk membaca hasil *ELISA* secara spesifik dalam sampel. Sistem *Microplate reader* mendeteksi cahaya yang berasal dari sampel, menghasilkan reaksi yang produknya dapat dibaca oleh spektrofotometer. *Microplate reader* atau yang disebut juga *enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)* merupakan alat diagnostik *high-throughput* untuk mendeteksi keberadaan biomarker dalam darah atau urin. Salah satu contoh situasi di mana pengujian dengan menggunakan sampel ini dapat dilakukan adalah setelah proses vaksinasi. Setelah proses vaksinasi dilakukan, kita dapat mengamati dan mengukur tingkat keberadaan antibodi dan antigen dalam tubuh. Dalam analisis makanan, *microplate reader* memegang peran penting dalam kuantifikasi asam amino, komponen gula, dan vitamin. Secara keseluruhan, *microplate reader* adalah alat penting untuk pengukuran biokimia dengan hasil tinggi di berbagai bidang seperti tes medis, pemantauan lingkungan, dan analisis makanan (Yang et al., 2022).

*Microplate Reader* memiliki berbagai fungsi seperti mengukur fluoresensi dan luminesensi di tempat di mana bahan kimia pewarna dapat memancarkan cahaya atau fluoresensi saat terpapar cahaya. Penggunaan jumlah pantulan, penyerapan, dan perbedaan warna kemudian digunakan untuk identifikasi dan pengukuran kuantitas suatu bahan.

*Microplate reader* atau yang disebut sebagai *Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)* reader merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi suatu sampel, salah satu sampel yang digunakan adalah protein (Santoso et al., 2021).

*Microplate reader* berbeda dengan spektrofotometer konvensional karena alat ini menggunakan filter untuk membatasi panjang gelombang yang digunakan dalam pembacaan, biasanya antara 400-750 nm. Akan tetapi, beberapa pembaca



mikroplater berfungsi dengan menggunakan jangkauan panjang gelombang antara 340 hingga 700 nm. Banyak produsen menggunakan serat optik dalam sistem mereka untuk mengirimkan cahaya ke dalam lubang microplate yang berisi sampel. Pancaran sinar, yang melewati benda uji, memiliki ukuran diameter sekitar 1 hingga 3 mm. Sebuah sistem akan mengidentifikasi sinar yang berasal dari sampel, meningkatkan kekuatan sinyal, dan menentukan sejauh mana sampel menyerap sinar tersebut, kemudian mengonversikannya menjadi data dalam bentuk angka digital (World Health Organization., 2008).



**Gambar 6.** Microplate Reader

Prinsip kerja dasar *microplate reader* adalah menggunakan colorimeter fotolistrik atau spektrofotometer untuk mengukur perbedaan energi cahaya sebelum dan sesudah melewati zat uji. Perbedaan energi dalam cahaya yang disebabkan oleh penyerapan zat uji biasanya berbanding lurus dengan konsentrasi zat uji. Oleh karena itu, pembaca pelat mikro dapat mengukur konsentrasi zat uji melalui pengukuran optik penyerapan cahaya pada panjang gelombang selektif (Yang et al., 2022).

*Microplate reader* ini dapat melakukan analisis dengan volume sampel yang sedikit sehingga lebih praktis dan ekonomis, jumlah variasi sampel yang

banyak sehingga lebih menghemat waktu dalam proses analisis, *throughput* sampel yang tinggi dan kemudahan penggunaannya (Durand et al., 2012).

Microplate reader memiliki perbedaan dengan spektrofotometer dalam beberapa hal. Meskipun spektrofotometer lebih akurat, mampu mengukur pada berbagai panjang gelombang, merekam spektrum, melakukan pengukuran kinetik secara berkelanjutan, dan lebih sensitif, namun hal ini tidak berlaku untuk microplate reader. Berbeda dengan spektrofotometer, microplate reader memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dengan kemampuan membaca sampel secara cepat. Selain itu, microplate reader juga bisa digunakan untuk membaca banyak sampel sekaligus. Selain itu, penggunaan volume yang lebih kecil seperti 200-500  $\mu$ l juga memungkinkan dalam microplate 96-well (Maulidia, 2020).

Metode yang umum digunakan dalam membaca mikroplate adalah dengan menggunakan mikroplate berukuran 96-well. Penggunaan piring mikro ini umumnya dilakukan untuk mengukur sejumlah besar sampel dalam waktu yang bersamaan. Ini disebabkan oleh kemampuan unik microplate reader dalam mengukur banyak sampel dalam waktu yang lebih singkat daripada spektrofotometer yang hanya mampu mengukur satu hingga enam sampel sekaligus (Maulidia, 2020).

### ***J. Tinjauan Islam***

Kehidupan manusia dan tumbuhan saling terhubung secara erat. Sangat banyak kegunaan yang diperoleh oleh manusia dari tumbuhan, namun masih terdapat jenis tumbuhan yang masih belum diketahui kegunaannya. Tumbuhan adalah anugerah dan karunia Allah yang diberikan kepada semua ciptaan-Nya. Al-Qur'an memaparkan beberapa petunjuk mengenai variasi tumbuhan yang ada, salah satunya adalah Q.S Asy-Syu'ara/26: 7, yaitu :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧)

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan peringatan Allah *swt* yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir karena telah mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Kemudian, Allah *swt* menunjukkan kebesaran-Nya kepada mereka yang menentang dan tidak percaya kepada Rasul dan kitab-Nya dengan cara menciptakan bumi dan menyebabkannya ditumbuhi tumbuhan yang indah (Ghoffar, 2005).

Dalam ayat tersebut, bisa dipahami bahwa manusia diminta untuk mengamati tumbuhan-tumbuhan yang indah dan bernilai tinggi yang telah diciptakan oleh Allah *swt* di bumi ini. Allah *swt* memerintahkan untuk menggunakan kecerdasan yang dianugerahkannya untuk merenungkan dan memahami makna ciptaan-Nya termasuk tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat.

Secara hakikatnya, semua penyakit berasal dari Allah *swt*, sehingga hanya dialah yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkannya. Namun, agar bisa mencapai pemulihan tersebut, tentu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh. Allah secara langsung menurunkan penyakit, dan pada saat yang sama Allah akan memberikan solusi atau obat yang tepat untuk mengatasinya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah Rasulullah *saw* bersabda:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَلَّتْ الْأَزَابُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى ؟ قَالَ : نَعَمْ عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ : الْهَرَمُ (رواه الترمذ ي وابوداود وابن ماجه)

Artinya :

“ Dari Usamah bin Syuraik ra ia berkata: Orang-orang Arab Badui berkata: wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?, Rasul menjawab: ya, wahai hamba Allah berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan penawarnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: penyakit apa itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab: menjadi tua “ (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang sakit dianjurkan untuk menyembuhkan dirinya dengan cara berobat, namun dalam agam Islam dilarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Haram yang dimaksud disini adalah haram mulai dari segini bahan obat, proses pembuatan atau pengelolaan serta termasuk cara pengobatannya (Razali, 2021).

Hadis tersebut juga mengungkapkan bahwa penyembuhan seseorang karena sebab-sebab tertentu tidak hanya perlu dirayakan dengan sukacita dan kelegaan semata, tetapi juga perlu untuk merenungkan dan memikirkan peristiwa-peristiwa sebelumnya serta melakukan introspeksi diri serta mengakui keajaiban dan kuasa Allah *swt* (Ruslan, 2015).

Dari segi ilmu pengetahuan, obat apa pun yang dikonsumsi, manusia seharusnya memikirkan dan merenungkan segala yang terkait dengan proses adanya obat tersebut. Mendalami dan melakukan penelitian terhadapnya juga merupakan salah satu kegiatan berpikir (*tafakkur*) dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah *swt* (Ruslan, 2015).

Hadis ini dapat dipahami sebagai dorongan kepada pasien untuk mengatasi penyakit yang dideritanya. Karena jika orang sakit sudah merasakan suatu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, maka orang tersebut akan menaruh harapan dan tidak berputus asa dalam mengatasi penyakitnya. Selain itu, hadis ini juga memberikan dorongan kepada peneliti termasuk dokter dan apoteker untuk mencari obat dan menyelidikinya, terutama untuk penyakit yang belum diketahui obatnya.

Terdapat berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat sebagai obat di dunia ini, salah satunya adalah jahe. Jahe adalah jenis tumbuhan obat yang dijelaskan dalam Q.S Al-Insan/76: 17.

وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَجْجِيًّا (١٧)

Terjemahnya :

“Di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe” (Kementrian Agama RI, 2019)

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dikemukakan bahwa bagi mereka yang beriman dan berada di surga, akan diberikan minuman melalui wadah-wadah berbentuk gelas. Mereka diberikan minuman yang mengandung "kafur" yang suhunya dingin dan pada kesempatan lain diberikan minuman yang mengandung jahe yang suhunya hangat, demi menjaga keseimbangan bagi mereka (Ghoffar, 2005).

Tasfir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, 2002 mengatakan bahwa jahe yang disebutkan dalam ayat ini merupakan sebuah mata air dari surga yang bernama *shalsabila* (Shihab, 2002).

Meskipun demikian, terdapat keistimewaan tersendiri dalam penyebutan kata jahe dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa jahe memiliki keunggulan dibandingkan dengan tanaman lain. Tumbuhan lempuyang gajah merupakan salah satu jenis jahe-jahean yang telah lama dipergunakan. *Zingiber zerumbet* L yang lebih dikenal dengan sebutan lempuyang gajah, merupakan salah satu jenis tumbuhan dari keluarga *Zingiberaceae* yang telah digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional dan juga sebagai bahan dasar dalam pembuatan jamu tradisional. Lempuyang gajah memiliki efek analgesik, antiinflamasi, antitumor, dapat mengobati luka memar akibat pukulan, dan juga digunakan sebagai obat

tradisional untuk masalah perut. Namun belum banyak penelitian yang membahas manfaat lempuyang gajah dalam mengatasi diabetes.

Pada dasarnya Al-Qur'an mengandung isyarat dan sejumlah informasi tentang pengobatan, bahkan terdapat berbagai pandangan dan pendapat di kalangan ulama, akan tetapi substansi makna pengobatan itu sendiri masih perlu diungkap berdasarkan isyarat *nash* (Ruslan, 2015).

Penjelasan tentang pengobatan yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak sekomprehensif penjelasan yang kita temukan dalam pengobatan modern saat ini (medis). Sangat dapat dimengerti, karena Al-Qur'an tidak secara khusus diungkapkan dalam bentuk buku kedokteran atau pengobatan. Al-Qur'an diturunkan sebagai panduan bagi manusia agar mengikuti jalur yang benar dan memberikan penjelasan mengenai berbagai aspek kehidupan. Walaupun begitu, Al-Qur'an juga mencakup informasi tentang pengobatan yang bisa dianggap sebagai saran bagi manusia untuk menjaga kesehatan mereka (Ruslan, 2015).

Terkhusus kepada eksistensi Al-Qur'an yang memiliki fungsi sebagai penyembuh (*al-syifā'*) dan ada beberapa pemahaman yang masih sedang dikaji dan dianalisis secara mendalam. Al-Qur'an juga bisa digunakan sebagai bacaan mantra (ruqyah) yang dapat membawa berkah bagi yang membacanya. Selain itu, ayat-ayat dalam Al-Qur'an memiliki kemampuan untuk menyembuhkan masalah psikis, kejiwaan, dan mental. Selanjutnya dapat berfungsi sebagai pengobatan baik untuk kebutuhan spiritual maupun fisik. Pandangan Al-Qur'an tentang pengobatan mencakup ayat yang menunjukkan pentingnya aspek kesehatan yang dapat melibatkan terapi pengobatan (Ruslan, 2015).

Hadis juga banyak menyediakan informasi tentang kesehatan dan pengobatan, yang menjadikannya sumber hukum Islam yang signifikan setelah Al-Qur'an. Menurut perspektif teologis, ada banyak hadis Nabi saw yang



menyatakan bahwa setiap kali muncul wabah penyakit di masyarakat, pasti ada pengobatannya. Pandangan ini mengajarkan nilai keyakinan yang kuat untuk tidak menyerah dalam menghadapi sebuah penyakit, sambil memberikan dukungan sosial kepada para pasien. Dari pandangan ini, dapat dilihat bahwa dalam Islam diajarkan kepada umatnya untuk tetap memiliki sikap optimis, meskipun mereka sedang mengalami penyakit atau kondisi yang tidak menguntungkan.

Dari penjelasan terkait ayat maupun hadis diatas, dapat diketahui bahwa pengobatan dalam dunia kesehatan yang dilakukan hingga kini, telah dipertegas dalam Al-Qur'an dan hadis.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dengan menggunakan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Laboratorium biologi dan laboratorium kimia analisis) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Fakultas Farmasi (Laboratorium Penelitian dan Pengujian) Universitas Muslim Indonesia.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Januari 2023 hingga bulan Juni 2023

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan eksperimental ilmiah yang dilakukan di laboratorium dengan beberapa langkah, yaitu melakukan ekstraksi dan menguji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase pada ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.)

#### ***C. Sampel***

Dalam penelitian ini jenis sampel yang digunakan adalah bagian rimpang tumbuhan lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) yang telah berbentuk simplisia dan didapatkan dari supplier resmi toko jamu Babah Kuya di Bandung.

#### **D. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Dalam penelitian ini, beberapa peralatan yang dijadikan sebagai alat penunjang antara lain wadah kaca tertutup rapat, blender simplisia, *vacuum rotary evaporator*, labu alas bulat, penangas, *microplate*, *microplate* reader, inkubator, labu ukur, kertas saring, mikropipet, cawan porselen, timbangan analitik, kertas perkamen, batang pengaduk, gelas kimia, pipet tetes, spatel, pH meter dan gegep.

##### 2. Bahan

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain aquades, etanol 70% (Onemed<sup>®</sup>), Simplisia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.), enzim  $\alpha$ -amilase (Insen<sup>®</sup>), kanji, acarbose standar (Sigma Aldrich<sup>®</sup>), Buffer fosfat pH 7 (Certipure<sup>®</sup>), HCl (Emsure<sup>®</sup>), Asam Dinitrosalisilat (Sigma Aldrich<sup>®</sup>), Sodium Potassium Tartrate Tetrahydrate (Emsure<sup>®</sup>), Dimetil Sulfoksida (EMD Millipore Corp.<sup>®</sup>), kertas saring, aluminium foil dan kertas perkamen,

#### **E. Prosedur Kerja**

##### 1. Preparasi Sampel

Simplisia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) diperoleh dari supplier resmi di Bandung. Simplisia rimpang lempuyang gajah tersebut kemudian dihaluskan menggunakan blender serbuk untuk mendapatkan serbuk kasar simplisia (Shavira et al., 2021).

##### 2. Ekstraksi

Pentingnya melaksanakan pemilihan metode ekstraksi adalah karena hasil ekstraksi akan menunjukkan sejauh mana metode tersebut berhasil. Cara yang digunakan dalam mengambil ekstrak dari rimpang lempuyang gajah adalah melalui

proses maserasi. Metode ekstraksi maserasi dipilih karena merupakan metode ekstraksi dingin yang terbilang mudah dilakukan karena alat dan prosedurnya sederhana. Metode ini juga memungkinkan senyawa aktif dalam bahan baku tidak rusak karena tidak melibatkan pemanasan. Metode ini dapat digunakan baik untuk bahan baku yang tahan maupun tidak tahan terhadap pemanasan. Zat-zat bioaktif seperti flavonoid, fenol dan tanin akan mengalami kerusakan saat terkena suhu di atas 50° C karena dapat mengubah struktur mereka sehingga menghasilkan ekstrak dengan kualitas rendah (Yuliantari et al., 2017).

Simplisia rimpang lempuyang gajah yang sudah berbentuk serbuk kasar kemudian ditimbang sebanyak 400 gram kemudian dimaserasi menggunakan etanol 70% sebanyak 3 liter selama 3 x 24 jam pada suhu ruang. Serbuk direndam sambil sekali- kali diaduk. Maserat yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan *vacum rotary evaporator* hingga diperoleh ekstrak kental (Melannisa et al., 2012; Rejeki & Priyandari, 2017).

### 3. Uji Aktivitas Penghambatan Enzim $\alpha$ -Amilase

Pengujian aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dari sampel rimpang lempuyang gajah merujuk pada penelitian Alfiani, 2022 dan Ramadhani, 2018

#### a. Pembuatan Buffer Fosfat pH 6,8

Buffer fosfat pH 7 dibuat dengan menyesuaikan penambahan HCl, kemudian diukur pH nya menggunakan pH meter hingga diperoleh buffer fosfat pH 6,8.

#### b. Pembuatan Enzim $\alpha$ -amilase

Enzim  $\alpha$ -amilase di timbang sebanyak 500 mg kemudian dilarutkan dengan buffer pH 6,8 sedikit demi sedikit hingga larut, setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur. Cukupkan volume hingga 10 mL lalu kocok sampai homogen.

c. Pembuatan Larutan Pati 1%

Larutan pati 1% dibuat dengan cara menimbang pati kanji sebanyak 200 mg, setelah itu dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan menggunakan aquades sedikit demi sedikit, selanjutnya volume dicukupkan hingga 20 mL.

d. Larutan Seri Konsentrasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah

Larutan ekstrak rimpang lempuyang gajah dibuat dengan menimbang 10 mg ekstrak kental dan dilarutkan dengan dimetil sulfoksida (DMSO) 3 tetes,, selanjutnya dimasukkan ke labu ukur dan volumenya dicukupkan sampai 10 mL menggunakan buffer fosfat pH 6,8 sehingga di dapatkan larutan stok dengan konsentrasi 1000  $\mu\text{g/mL}$ . Larutan stok 1000  $\mu\text{g/mL}$  kemudian diencerkan lagi sampai di peroleh konsentrasi ekstrak 100  $\mu\text{g/mL}$ , 200  $\mu\text{g/mL}$ , 300  $\mu\text{g/mL}$ , 400  $\mu\text{g/mL}$  dan 500  $\mu\text{g/mL}$ .

e. Larutan Seri Konsentrasi Acarbose

Ditimbang acarbose sebanyak 10 mg kemudian dilarutkan pada 10 mL buffer fosfat pH 6,8 dalam labu ukur hingga diperoleh konsentrasi 1000  $\mu\text{g/mL}$ . Larutan stok acarbose konsentrasi 1000  $\mu\text{g/mL}$  diencerkan sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 20  $\mu\text{g/mL}$ , 40  $\mu\text{g/mL}$ , 60  $\mu\text{g/mL}$ , 80  $\mu\text{g/mL}$  dan 100  $\mu\text{g/mL}$ .

f. Larutan baku NaOH 2 N

Sebanyak 0,8 g NaOH ditimbang lalu dilarutkan dengan air bebas  $\text{CO}_2$  sampai volume 10 mL ke dalam labu ukur, sehingga didapatkan konsentrasi 2 N.

g. Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNS)

Sebanyak 0,1 g asam dinitrosalisilat ditimbang kemudian tambahkan 2 ml NaOH 2 N, setelah itu tambahkan sodium potassium tartrate tetrahydrate

sebanyak 3 g ke dalam labu ukur, volume dicukupkan hingga 10 mL dengan aquadest.

i. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Blanko

Dipipet sebanyak 125  $\mu$ L buffer fosfat pH 6,8 kemudian dimasukkan ke dalam *microplate*, tambahkan 125  $\mu$ L larutan pati 1% dan inkubasi dengan suhu 37° C selama 5 menit. Larutan tersebut di tambahkan 125  $\mu$ L larutan enzim  $\alpha$ -amilase dan diinkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya di tambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu$ L, kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm

j. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Standar Acarbose

Sebanyak 125  $\mu$ L buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam micro plate, tambahkan masing-masing 125  $\mu$ L larutan acarbose dengan konsentrasi 20  $\mu$ g/mL, 40  $\mu$ g/mL, 60  $\mu$ g/mL, 80  $\mu$ g/mL dan 100  $\mu$ g/mL, kemudian ditambahkan lagi 125  $\mu$ L larutan pati 1% dan di inkubasi pada suhu 37° C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125  $\mu$ L larutan enzim  $\alpha$ -amilase kemudian inkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu$ L, kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm.

k. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Sampel

Sebanyak 125  $\mu$ L buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam micro plate, tambahkan masing-masing 125  $\mu$ L larutan sampel dengan konsentrasi



100  $\mu\text{g/mL}$ , 200  $\mu\text{g/mL}$ , 300  $\mu\text{g/mL}$ , 400  $\mu\text{g/mL}$  dan 500  $\mu\text{g/mL}$ , kemudian ditambahkan lagi 125  $\mu\text{L}$  larutan pati 1% dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125  $\mu\text{L}$  larutan enzim  $\alpha$ -amilase kemudian inkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu\text{L}$ , kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm.

#### l. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Blanko

Dipipet sebanyak 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat pH 6,8 kemudian dimasukkan ke dalam micro plate, tambahkan 125  $\mu\text{L}$  larutan pati 1%, kemudian tambahkan 125  $\mu\text{L}$  DMSO dan inkubasi pada suhu 37° C selama 5 menit. Larutan tersebut ditambahkan lagi 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat pH 6,8 dan diinkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu\text{L}$ , kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm.

#### m. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Sampel

Sebanyak 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam micro plate, tambahkan masing-masing 125  $\mu\text{L}$  larutan sampel dengan konsentrasi 100  $\mu\text{g/mL}$ , 200  $\mu\text{g/mL}$ , 300  $\mu\text{g/mL}$ , 400  $\mu\text{g/mL}$  dan 500  $\mu\text{g/mL}$ , kemudian ditambahkan lagi 125  $\mu\text{L}$  larutan pati 1% dan diinkubasi pada suhu 37° C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat pH 6,8 kemudian inkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu\text{L}$ , kemudian larutan diinkubasi dalam air

mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm.

n. Pengujian Efek Penghambatan Larutan Kontrol Acarbose

Sebanyak 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat dipipet kemudian dimasukkan ke dalam micro plate, tambahkan masing-masing 125  $\mu\text{L}$  larutan acarbose dengan konsentrasi 20  $\mu\text{g/mL}$ , 40  $\mu\text{g/mL}$ , 60  $\mu\text{g/mL}$ , 80  $\mu\text{g/mL}$  dan 100  $\mu\text{g/mL}$ , kemudian ditambahkan lagi 125  $\mu\text{L}$  larutan pati 1% dan di inkubasi pada suhu 37° C selama 5 menit. Setelah diinkubasi, tambahkan 125  $\mu\text{L}$  buffer fosfat pH 6.8 kemudian inkubasi kembali pada suhu 37° C selama 10 menit. Selanjutnya ditambahkan larutan asam dinitrosalisilat (DNS) 250  $\mu\text{L}$ , kemudian larutan diinkubasi dalam air mendidih untuk menghentikan reaksi hingga warna berubah menjadi kemerahan. Larutan didinginkan sampai suhu ruangan. Absorbansi diukur dengan *microplate reader* pada panjang gelombang 540 nm.

o. Perhitungan % aktivitas penghambatan enzim

Dalam analisis ini, digunakan rumus untuk memisahkan dan menghitung persentase aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dari acarbose dan sampel, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Inhibisi (\%)} = \frac{Ac - As}{Ac} \times 100\%$$

Keterangan:

Ac : Penyerapan larutan uji blanko – blanko kontrol

As : Penyerapan larutan uji dengan sampel- sampel kontrol

Setelah mendapatkan persentase dari setiap konsentrasi, dilakukan perhitungan nilai  $IC_{50}$ . Nilai  $IC_{50}$  merupakan nilai dari konsentrasi sampel yang dapat menghambat aktivitas enzim sebesar 50%.  $IC_{50}$  dihitung dengan


menggunakan persamaan regresi linear, log konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan persen inhibisi sebagai sumbu y, dari persamaan  $y = bx \pm a$  dapat dihitung dengan  $IC_{50}$  dengan rumus :

$$IC_{50} = \frac{50-a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

a = slope

b = intersep



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Hasil Ekstraksi Sampel**

**Tabel 2.** Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah dengan Pelarut Etanol 70%

Berat Sampel Yang Diekstraksi (g)	Berat Ekstrak Etanol Kental (g)	Rendemen
400	22,1832	5,54

**2. Hasil Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -amilase**

**Tabel 3.** Nilai % Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase dari Acarbose

No	Konsentrasi ( $\mu\text{g/mL}$ )	Absorbansi	%Inhibisi
1	20	0,501	27,51
2	40	0,471	46,54
3	60	0,325	61,79
4	80	0,247	83,01
5	100	0,201	93,86

**Tabel 4.** Nilai % Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase dari Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L)

No	Konsentrasi ( $\mu\text{g/mL}$ )	Absorbansi	%Inhibisi
1	100	0,554	19,96
2	200	0,418	45,28
3	300	0,309	68,39
4	400	0,262	76,88
5	500	0,145	97,95

### 3. Nilai $IC_{50}$ Uji Aktivitas Penghambatan Enzim $\alpha$ -amilase

**Tabel 5.** Nilai  $IC_{50}$  Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah dan Acarbose

No	Sampel	Nilai $IC_{50}$ (ppm)
1	Acarbose	45,174
2	Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah	237,643

#### **B. Pembahasan**

Penyakit diabetes mellitus semakin meningkat prevalensinya secara terus-menerus dan tidak ada batasnya dari tahun ke tahun. Diabetes muncul dengan sendirinya ketika tubuh tidak dapat mengontrol banyaknya jumlah glukosa dalam darah, serta terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup atau tidak memproduksi insulin sebagaimana mestinya (Suryasa et al., 2021). Jika diabetes mellitus tidak ditangani dengan baik, dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang yang menderita DM dan berbagai penyakit kronis yang terkait, seperti masalah kesehatan pada pembuluh darah otak, penyakit jantung, kondisi pada pembuluh darah di kaki, serta komplikasi pada mata, ginjal, dan sistem saraf (Eko Wirawan Budianto & Hairullah, 2017).

Metode pengobatan diabetes mellitus secara oral dapat dilakukan dengan menghentikan fungsi enzim  $\alpha$ -amilase yang berperan untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Senyawa-senyawa penghambat  $\alpha$ -amilase bertujuan untuk menghambat aksi enzim  $\alpha$ -amilase yang ada di dalam usus kecil.

Penggunaan lempuyang gajah sebagai bahan obat terkait dengan komposisi metabolit yang memiliki efek antiinflamasi, anti ulcer, analgesik, antipiretik dan anti mikroba (Silalahi, 2018). Pada penelitian ini, dilakukan pengujian terkait potensi penghambat  $\alpha$ -amilase yang ada dalam ekstrak etanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.). Lempuyang gajah, sebuah

tumbuhan memiliki senyawa yang berpotensi sebagai pengobatan untuk diabetes. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dkk pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa ekstrak etanol 70% dari *Zingiber zerumbet* L menunjukkan adanya berbagai kandungan kimia yang memiliki manfaat, seperti alkaloid, flavonoid, fenolik saponin, tannin, steroid dan triterpenoid (Rohmah et al., 2022). Pernyataan ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan lempuyang gajah mengandung flavonoid, senyawa aromatik, seskuiterpenoid, turunan kaempferol, vanilin, dan senyawa polifenol lainnya.

Ragam tumbuhan yang ada di dunia ini adalah hasil penciptaan Allah *swt*. tak ada sesuatu yang tidak berguna untuk diciptakan, seperti yang disabdakan-Nya dalam Q.S Lukman : 31/10 yaitu :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (١٠)

Terjemahnya:

“ Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik” (Kementrian Agama RI, 2019)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah *swt* telah diperlihatkan melalui penciptaan berbagai macam jenis tumbuhan, termasuk lempuyang, yang kerap digunakan sebagai salah satu komponen pengobatan tradisional.

Dalam penelitian ini, simplisia rimpang lempuyang gajah didapatkan dari distributor resmi dan diekstraksi dengan menggunakan teknik maserasi. Ekstraksi merujuk pada proses pengambilan komponen kimia yang larut dengan menggunakan pelarut cair, sehingga dapat dipisahkan dari bahan yang tidak larut (Rosidah et al., 2015). Metode maserasi melibatkan perendaman bahan alami



dalam pelarut tanpa memerlukan pemanasan, sehingga menghindari potensi kerusakan atau degradasi akibat suhu tinggi. Metode maserasi dipilih karena prosesnya relatif sederhana namun berpengaruh besar. Simplisia yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian direndam menggunakan pelarut etanol 70% selama 3 x 24 jam dengan sesekali pengadukan. Pelarut etanol dengan konsentrasi 70% terbukti aman, tidak bersifat berbahaya, memiliki kemampuan penyerapan yang baik, dan tahan terhadap pertumbuhan mikroba (Sakit et Al, 2015). Hasil dari ekstrak yang didapatkan sangat mempengaruhi konsentrasi dari etanol. Saat konsentrasi etanol lebih besar dari 70%, maka tingkat ekstraksi komponen target menjadi sedikit menurun, kemungkinan karena denaturasi protein dapat meningkatkan resistensi difusi pada konsentrasi etanol yang lebih tinggi. Meningkatnya konsentrasi etanol dapat meningkatkan laju disolusi dan ekstraksi (Fan et al., 2020). Maserat tersebut kemudian dipisahkan dan dipekatkan dengan menggunakan mesin *vakum rotary evaporator*. Pada proses pemekatan, diperoleh hasil ekstraksi etanol yang pekat dan berwarna coklat kehitaman sebanyak 22,18 g, dengan persentase rendemen sekitar 5,54%.

Setelah diperoleh ekstrak kental, selanjutnya dilakukan uji penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase. Uji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase dilakukan untuk mengetahui penurunan aktivitas dari enzim  $\alpha$ -amilase dalam memecah pati. Penghambat  $\alpha$ -amilase adalah senyawa-senyawa yang dapat mengganggu aktivitas  $\alpha$ -amilase, yaitu enzim yang berperan dalam proses hidrolisis pati menjadi gula yang lebih sederhana. Menghambat aktivitas  $\alpha$ -amilase dapat memperlambat dan memperpanjang proses pencernaan karbohidrat, yang mengakibatkan berkurangnya penyerapan glukosa dan mencegah peningkatan kadar gula darah setelah makan (Fitrianingsih et al., 2016).

Untuk mengetahui aktivitas inhibitor  $\alpha$ -amilase digunakan alat berupa *microplate reader*, karena memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah dapat mempercepat proses analisis dalam penelitian yang biasanya jika menggunakan spektrofotometri membutuhkan waktu analisis sampel 1-2 jam, sedangkan dengan menggunakan metode *microplate reader* hanya membutuhkan waktu 15-20 menit untuk analisis sampel, lebih praktis dan ekonomis. Sehingga lebih efisien dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran suatu sampel selama melakukan penelitian (Yang et al., 2022) .

Pada pengujian ini, beberapa kelompok larutan diuji, termasuk larutan blanko, larutan kontrol kosong, larutan standar acarbose dan kontrol acarbose, serta larutan sampel dan kontrol sampel yang diuji. Pengelompokan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tugas kelompok blanko bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas enzim secara independen tanpa adanya sampel yang berfungsi sebagai inhibitor. Kelompok kontrol blanko bertujuan untuk mengatasi penggunaan pelarut tanpa ekstrak atau enzim yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Penggunaan kelompok sampel bertujuan untuk mempelajari efek ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah terhadap penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase, sementara kelompok kontrol sampel digunakan sebagai kontrol untuk melihat aktivitas ekstrak tanpa intervensi enzim atau sebagai referensi dalam analisis larutan sampel. Perlakuan yang sama diberikan kepada pembanding acarbose sebagaimana dilakukan terhadap sampel.

Uji aktivitas penghambat  $\alpha$ -amilase pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dilakukan dengan menggunakan pati kanji sebagai bahan dasar yang berinteraksi dengan enzim aktif untuk menghasilkan sebuah produk, dan kontrol positif yang digunakan adalah acarbose. Acarbose digunakan karena lebih mudah didapat dan banyak digunakan sebagai pembanding pada berbagai literatur. Acarbose merupakan obat antidiabetes yang dapat memperlambat

absorpsi gula setelah makan yaitu dengan menunda hidrolisis karbohidrat, disakarida dan absorpsi glukosa; serta menghambat metabolisme sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Perbandingan acarbose dibuat dengan 5 variasi konsentrasi yaitu 20  $\mu\text{g/mL}$ , 40  $\mu\text{g/mL}$ , 60  $\mu\text{g/mL}$ , 80  $\mu\text{g/mL}$  dan 100  $\mu\text{g/mL}$ . Pada penelitian ini menguji efek pengaruh konsentrasi terhadap peningkatan aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase dengan menggunakan berbagai tingkat konsentrasi yang berbeda (Gaspersz et al., 2022). Jika presentasi penghambatan tinggi, maka efek yang dihasilkan akan menjadi lebih menguntungkan. Apabila nilai  $IC_{50}$  lebih kecil, dampak yang terjadi menjadi lebih signifikan (Ramadhani, 2018).

Mekanisme penghambatan acarbose terhadap  $\alpha$ -amilase terjadi karena sisi aktif dari  $\alpha$ -amilase akan berikatan dengan acarbose yang menyebabkan  $\alpha$ -amilase tidak dapat berikatan dengan pati sebagai substrat. Hal ini akan menghambat proses penguraian pati menjadi glukosa sehingga kadar glukosa dalam sampel rendah dan menyebabkan nilai absorbansi yang didapat pada pembacaan dengan spektrofotometer menjadi kecil (Dinicolantonio et al., 2015).

Proses pengujian penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase yang pertama yaitu masing-masing ekstrak ditambahkan pati yang berfungsi sebagai substrat yang berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk suatu produk. Larutan ekstrak disiapkan menggunakan 5 variasi konsentrasi yang berbeda, yaitu 100  $\mu\text{g/mL}$ , 200  $\mu\text{g/mL}$ , 300  $\mu\text{g/mL}$ , 400  $\mu\text{g/mL}$ , dan 500  $\mu\text{g/mL}$ . Selanjutnya, dilakukan inkubasi awal pada suhu 37°C selama 10 menit untuk mengaktifkan substrat. Setelah itu, sampel ditambahkan dan diinkubasi kembali pada suhu 37°C selama 5 menit. Tujuan dari ini adalah agar enzim amilase dapat berinteraksi dengan sampel uji. Selain itu, suhu tersebut dipilih karena merupakan suhu ideal untuk aktivitas enzim amilase (Pambudi et al., 2021). Reaksi tersebut menghasilkan gula sederhana yang disebut glukosa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks, di mana gugus aldehyd pada glukosa akan berubah menjadi gugus karboksil dan DNS

sebagai zat pengoksidasi akan berubah menjadi asam 3-amino-5-nitrosalisilat. Proses ini terjadi dalam kondisi yang bersifat basa. Larutan DNS awalnya terlihat kuning ketika bereaksi dengan gula reduksi dan menghasilkan warna jingga kemerahan, lalu selanjutnya diukur menggunakan microplate reader. Asam 3-amino-5-nitrosalisilat adalah senyawa yang memiliki kemampuan yang kuat dalam menyerap radiasi gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 540 nm. Proses pemanasan pada air yang sudah mendidih selama waktu 5 hingga 15 menit setelah pereaksi DNS ditambahkan bertujuan untuk menghentikan reaksi, karena enzim akan mengalami perubahan struktur yang menyebabkan denaturasi (Pambudi et al., 2021). Hasil yang diperoleh dari pengujian ini, yaitu nilai absorbansi yang digunakan untuk menentukan nilai persentase (%) penghambatan terhadap aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase agar dapat digunakan untuk membuat persamaan regresi linier untuk menghitung  $IC_{50}$  (Gaspersz et al., 2022).

Nilai  $IC_{50}$  merupakan nilai konsentrasi sampel yang dapat menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase sebesar 50%. Pengukuran nilai  $IC_{50}$  digunakan untuk mengetahui kemampuan penghambatan masing ekstrak terhadap enzim, dimana  $IC_{50}$  diperoleh dari hasil pengukuran % penghambatan. Nilai  $IC_{50}$  merupakan nilai yang diperoleh melalui persamaan regresi linier yang menunjukkan hubungan antara variabel x yang melibatkan konsentrasi ekstrak dengan variabel y yang mewakili persentase penghambatan. Kategori nilai  $IC_{50}$  <50  $\mu\text{g/mL}$  sangat kuat; 50-100  $\mu\text{g/mL}$  kuat, 100-150  $\mu\text{g/mL}$  sedang, 150-200  $\mu\text{g/mL}$  lemah, dan sangat lemah jika nilai >200  $\mu\text{g/mL}$  (Melia & Noraini, 2017).

Hasil uji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase kontrol positif acarbose secara berturut-turut adalah 27,5%, 46,54%, 61,79%, 83,01%, dan 93,86% (Tabel 2). Adapun hasil uji aktivitas penghambatan enzim  $\alpha$ -amilase pada sampel ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah secara berturut-turut adalah adalah 19,96%, 45,28%, 68,39%, 76,88% dan 97,95% (Tabel 3). Nilai ini diperoleh dari

perhitungan nilai absorbansi dari masing-masing konsentrasi. Nilai Persentase penghambatan dari ekstrak atau acarbose semakin tinggi sejalan dengan peningkatan konsentrasi, dengan demikian konsentrasi memiliki pengaruh terhadap intensitas efek yang dihasilkan. Tujuan dari mengubah hasil dalam bentuk presentase adalah untuk memahami perbandingan aktivitas inhibitor enzim di setiap konsentrasi sampel.

Hasil uji aktivitas penghambatan  $\alpha$ -amilase menunjukkan nilai  $IC_{50}$  pada kontrol acarbose yaitu 45,174  $\mu\text{g/mL}$ , sedangkan nilai  $IC_{50}$  dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah adalah 237,643  $\mu\text{g/mL}$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah berpotensi sebagai penurun kadar gula dalam darah namun termasuk dalam kategori lemah karena memiliki nilai  $IC_{50}$  200  $\mu\text{g/mL}$ .

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa penghambatan yang terjadi pada acarbose lebih signifikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa acarbose hanya memiliki satu senyawa sintesis yang berfungsi sebagai penghambat enzim, sementara pada ekstrak terdapat beberapa senyawa yang kemungkinan saling berinteraksi. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan. Salah satunya adalah kualitas sampel yang didapatkan dari produsen resmi tidak dapat dijamin dengan baik. Selain itu, selama proses pengerjaan, digunakan suhu Vacuum rotary evaporator yang melebihi 50<sup>0</sup>C, yang dapat menyebabkan kerusakan pada senyawa flavonoid dalam sampel. (Yuliantari et al., 2017).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa zat alkaloid dan flavonoid dapat berfungsi sebagai obat antidiabetes yang dapat menurunkan kadar gula darah dengan cara menghambat penyerapan glukosa dan menghambat aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase, yang bertanggung jawab untuk mengubah disakarida dan polisakarida menjadi glukosa di usus, sehingga mengurangi fluktuasi glukosa dalam plasma (Nurjanah et al., 2020). Flavonoid bekerja sebagai penghambat non kompetitif



pada enzim dengan cara mengikat enzim dan substrat secara bersamaan pada tempat ikatan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan enzim tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara itu, alkaloid dapat mengurangi kadar glukosa dalam darah dengan menghambat penyerapan glukosa (Alfiani, 2022).

Meskipun ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang sangat lemah sebagai penghambat enzim  $\alpha$ -amilase, bukan berarti rimpang lempuyang gajah tidak memiliki potensi sebagai antidiabetes. Dalam penelitian Muhtadi et al, 2019 diketahui bahwa lempuyang gajah memiliki aktivitas antidiabetes. Lempuyang gajah memiliki sel yang berperan dalam proses penurunan kadar gula pada tikus yang disebut dengan zerumbon. Zerumbon dalam lempuyang gajah dapat memblokir  $\alpha$ -glukosidase yang memperlambat penyerapan karbohidrat di usus. Kaemferol pada rimpang lempuyang gajah juga berpengaruh terhadap penurunan kadar gula. Kaemferol dapat menghentikan apoptosis dan caspase-3 pada sel  $\beta$ -pankreas dengan kondisi hiperglikemik (Muhtadi et al., 2019).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai  $IC_{50}$  pada ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah adalah 237,643  $\mu\text{g/mL}$  sedangkan  $IC_{50}$  acarbose sebagai pembanding sebesar 45,174  $\mu\text{g/mL}$ . Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah memiliki potensi sebagai penurun kadar gula dalam darah walaupun dalam kategori lemah.

#### ***B. Saran***

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan enzim yang lebih spesifik yaitu dengan melakukan karakterisasi enzim  $\alpha$ -amilase meliputi pH, suhu, konsentrasi enzim, lama inkubasi enzim (perlakuan panas), dan penambahan inhibitor yang berpengaruh terhadap aktivitas enzim  $\alpha$ -amilase. Selain itu, dari segi sampel disarankan untuk digunakan sampel yang spesifik serta meningkatkan ketelitian dalam proses pengujian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adil, F. K. (2021). Diabetes Melitus Gestasional : Diagnosis dan Faktor Resiko. *Jurnal Medika Utama*, 3(1), 1545–1551. <http://jurnalmedikahutama.com>
- Alam, F., Islam, M. A., Kamal, M. A., & Gan, S. H. (2016). *Updates on Managing Type 2 Diabetes Mellitus with Natural Products Towards Antidiabetic Drug Development*. *Current Medicinal Chemistry*, 23, 1–37. <https://doi.org/10.2174/09298673236661608132>
- Alfiani, L. A. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -amilase oleh Ekstrak Herba Ciplukan (*Physalis Angulate L*) Secara In Vitro. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 335–346. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049485>
- Ariandi. (2016). Pengenalan Enzim Amilase (Alpha-Amylase) Dan Reaksi Enzimatisnya Menghidrolisis Amilosa Pati Menjadi Glukosa. *Jurnal Dinamika*, 7(1), 74–82. <https://journal.uncp.ac.id/index.php/dinamika/article/view/613>
- Barbara G. Wells, Joseph T. DiPiro, Terry L. Schwinghammer, & Cecily V. DiPiro. (2015). *Pharmacotherapy Handbook : Ninth Edition* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Brunton, L., Parker, K., Blumenthal, D., & Buxton, I. (2008). *Goodman Gilman - Manual of Pharmacology and Therapeutics 2008*. <https://doi.org/10.1036/0071443436>
- Chang, C. J., Tzeng, T. F., Liou, S. S., Chang, Y. S., & Liu, I. M. (2012). *Acute and 28-day subchronic oral toxicity of an ethanol extract of Zingiber zerumbet (L.) Smith in rodents*. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2012/608284>
- Depkes RI. (2020). *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Dinicolantonio, J. J., Bhutani, J., & O'keefe, J. H. (2015). *Acarbose: safe and effective for lowering postprandial hyperglycaemia and improving cardiovascular outcomes*. *Open Heart*, 2, 327. <https://doi.org/10.1136/openhrt-2015>
- Eko Wirawan Budianto, N., & Hairullah. (2017). Perbedaan Efektivitas Acarbose dengan Ekstrak Etanol Kulit Terong Ungu (*Solanum melongena L*) terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih (*Rattus norvegicus*) yang Diinduksi Sukrosa. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 6(2), 14–20. <http://erepository.uwks.ac.id/id/eprint/1096>
- Evizal, R. (2013). *Tanaman Rempah dan Fitofarmaka*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Fajriah Shoffiyanti, N., Putri Dwita, L., & Anggia, V. (2019). Penghambatan  $\alpha$ -Amilase Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Alpukat. *PROSIDING POKJANAS TOI KE 57*, 105–110. <https://ffs.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2020/07/Naskah-17.pdf>
- Fan, S., Yang, G., Zhang, J., Li, J., & Bai, B. (2020). *Optimization of ultrasound-assisted extraction using response surface methodology for simultaneous quantitation of six flavonoids in flos Sophorae immaturus*

and antioxidant activity. *Molecules*, 25(8).  
<https://doi.org/10.3390/molecules25081767>

- Fitrianingsih, S. P., Maulana, I. T., Choesrina, R., Dwiputri, D., & Aprilliani, R. (2016). Uji Aktivitas Penghambatan Alfa Amilase Ekstrak Daun *Tithonia Diversifolia* Secara In Vitro. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan PKM Kesehatan*, 6(1), 108–115.  
<https://proceeding.unisba.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/1418/0>
- Gaspersz, N., Fransina, E. G., & Ngarbingan, A. R. (2022). Uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -Amilase dan Glukoamilase dari Ekstrak Etanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.). *JURNAL KIMIA MULAWARMAN*, 19(2), 51. <https://doi.org/10.30872/jkm.v19i2.1120>
- Gendokesumo, M. E., Putra, G. S., Anwari, F., Widianat, W., & Elysia, M. (2022). Studi In-silico menghambat enzim  $\alpha$ -glukosidase pada fitokimia yang terkandung pada *Momordica charantia* Linn. (Pare) sebagai terapi diabetes. *Akta Kimia Indonesia*, 7(1), 77–90.  
<https://doi.org/10.12962/j25493736.v7i1.12588>
- Ghoffar, M. A. (2005). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Gong, L., Feng, D., Wang, T., Ren, Y., Liu, Y., & Wang, J. (2020). *Inhibitors of  $\alpha$ -amylase and  $\alpha$ -glucosidase: Potential linkage for whole cereal foods on prevention of hyperglycemia. Food Science and Nutrition*, 8(12), 6320–6337. <https://doi.org/10.1002/fsn3.1987>
- Harvey, R., & Ferrier, D. (2011). *Lippincott's Illustrated Reviews : Biochemistry 5th edition* (5th ed.). Wolters kluwer.
- Hasrianti, Nururrahmah, & Nurasia. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah Dan Asam Asetat Sebagai Pengawet Alami Bakso. *Jurnal Dinamika*, 7(1), 9–30.
- International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas 10th edition*. [www.diabetesatlas.org](http://www.diabetesatlas.org)
- KEMENKES. (2017). Farmakope Herbal Indonesia (2nd ed.). KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
- Kemenkes. (2018). Riset Kesehatan Dasar. [https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir\\_519d41d8cd98f00/files/Hasil-risikesdas-2018\\_1274.pdf](https://kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-risikesdas-2018_1274.pdf)
- Kementrian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahan. CV. Daurus Sunnah.
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal)*, 4(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138>
- Lianah. (2019). Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang.
- Mahfur, & Wlid, M. (2019). Uji Kombinasi Antidiabetik Antara Ekstrak Kulit Durian Dan Acarbose Dengan Perhitungan Combination Index Dalam Penghambatan Kerja Enzim  $\alpha$ -amilase. *Pharmaceutical Journal of Indonesia*, 16(1), 85–95.

- Maulidia, N. R. (2020). *Uji Sitotoksitas Ekstrak Etanol 96% Daun Semanggi*.  
[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9r4yX76P\\_AhXZ2TgGHcd3DoYQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Fetheses.uin-malang.ac.id%2F20180%2F1%2F16670025.pdf&usg=AOvVaw23E3k-iX9me3rbjZnzDrrw](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9r4yX76P_AhXZ2TgGHcd3DoYQFnoECBQQAQ&url=http%3A%2F%2Fetheses.uin-malang.ac.id%2F20180%2F1%2F16670025.pdf&usg=AOvVaw23E3k-iX9me3rbjZnzDrrw)
- Melannisa, R., Trisharyanti DK, I., & Widyaningrum. (2012). Penentuan Profil Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) J.E. Smith) Dengan KLT dan KCKT. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/20204>
- Melia, O., & Noraini. (2017). Uji Aktivitas Antidiabetes dari Ekstrak Metanol Buah Kiwi (*Actinidia deliciosa*) melalui Penghambatan Aktivitas  $\alpha$ -Glukosidase. *Galenika Journal of Pharmacy*, 3(2), 132–137. <https://doi.org/10.22487/j24428744>
- Monteiro De Souza, P., & de Oliveira e Magalhães, P. (2010). *Application Of Microbial Alpha Amylase In Industry: A Review*. *Brazilian Journal of Microbiology*, 41, 850–861. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3769773/>
- Muhtadi, M., Suhendi, A., & Sutrisna, E. M. (2019). *The potential antidiabetic and anti-inflammatory activity of Zingiber zerumbet ethanolic extracts and Channa striata powder on albino Wistar mice*. *Drug Invention Today*, 12(1), 148–153. <https://www.researchgate.net/publication/331829173>
- Nangin, D., & Sutrisno, A. (2015). Enzim Amilase Pemecah Pati Mentah Dari Mikroba: Kajian Pustaka. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 3(3), 1032–1039.
- Negrulescu, A., Patrulea, V., Mincea, M. M., Ionascu, C., Vlad-Oros, B. A., & Ostafe, V. (2012). *Adapting the reducing sugars method with dinitrosalicylic acid to microtiter plates and microwave heating*. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 23(12), 2176–2182. <https://doi.org/10.1590/S0103-50532013005000003>
- Nurjanah, S., Marlina, E., & Astuti, W. (2020). Uji Aktivitas Inhibisi Amilase Pada Tanaman Melicope Yang Berpotensi Sebagai Antidiabetes. *Jurnal Atomik*, 5(2), 94–98. <http://jurnal.kimia.fmipa.unmul.ac.id/index.php/JA/article/view/878>
- Nurul Hidayati, F., Dewi Rosahdi, T., & Rahmi Hafsari, A. (2018). Pengaruh pH, Suhu dan Bufer Terhadap Aktivitas  $\alpha$ -Amilase dari *Bacillus* Sp. K2Br5. <https://etheses.uinsgd.ac.id/15629/>
- Pambudi, D. B., Fajriyah, N. N., & Maharisti, R. A. (2021). *Test of  $\alpha$ -Amylase Inhibition Activity in Ethanol Extract of Fennel Leaves (*Foeniculum vulgare* Mill.) Using Elisa Reader*. *Urecol Journal. Part C: Health Sciences*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.53017/ujhs.1>
- Papadakis, M. A., & McPHEE, S. J. (2019). *Current Medical Diagnosis & Treatment* (58th ed.). McGraw-Hill Education.
- Plows, J., Stanley, J., Baker, P., Reynolds, C., & Vickers, M. (2018). *The Pathophysiology of Gestational Diabetes Mellitus*. *International*




- Journal of Molecular Sciences*, 19(11), 3342.  
<https://doi.org/10.3390/ijms19113342>
- Pujimulyani, D., Adi Yulianto, W., Setyawati, A., Arumwardana, S., Amalia, A., Sari W. Kusuma, H., & Afifah, E. (2018). *Amylase Inhibition and Free Radical Scavenging Activities of White Turmeric Extract and Fractions*. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 29(1), 10–18.  
<https://doi.org/10.6066/jtip.2018.29.1.10>
- Ramadhani, F. (2018). Uji Aktivitas Penghambatan A-Amilase Secara In Vitro Ekstrak Akar Durian (*Durio zibethinus*).
- Razali, M. F. (2021). Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alquran, Hadis dan Kaedah Fiqih. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 64–75. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss. *IJMS-Indonesian Journal On Medical Science*, 4(2), 232–236.  
<http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article/view/122>
- Rismawati, Y., & Bahri, S. (2016). Produksi Glukosa Dari Jerami Padi (*Oryza sativa*) Menggunakan Jamur *Trichoderma* sp. [Glucose Production from Rice Straw (*Oryza sativa*) Using *Trichoderma* sp.]. *Kovalen*, 2(2), 67–76.
- Robi'a, & Sutrisno, A. (2015). Karakteristik Sirup Glukosa Dari Tepung Ubi Ungu (Kajian Suhu Likuifikasi Dan Konsentrasi  $\alpha$ -Amilase): Kajian Pustaka. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 3(4), 1531–1537.  
<https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/view/277>
- Robyt, J. F. (1998). *Essentials of Carbohydrate Chemistry*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1622-3>
- Rohmah, J., Setiyo Rini, C., Indah Nila Asri, N., & Krisdianti, R. (2022). *Antibacterial Activity of Rhizome Extracts of Zingiber zerumbet (L.) Roscoeex Sm. Against Streptococcus pneumoniae*. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 107–1016. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Rosidah, I., Bahua, H., Mufidah, R., & Pongtuluran, O. B. (2015). Pengaruh Kondisi Proses Ekstraksi Batang Brotowali (*Tinospora crispa* (L) Hook.f & Thomson) Terhadap Aktivitas Hambatan Enzim Alfa Glukosidase. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 25(4), 203–210. <https://doi.org/10.22435/mpk.v25i4.4586.203-210>
- Ruslan. (2015). Tafsir Pengobatan. Alauddin University Press.  
<http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/1201>
- Santoso, K., Herowati, U. K., Rotinsulu, D. A., Murtini, S., Ridwan, M. Y., Hikman, D. W., Zahid, A., Wicaksono, A., Nugraha, A. B., Afiff, U., Wijaya, A., Arif, R., Tarigan, R., & Sukmawinata, E. (2021). *Comparison Of Colorimetric-Based Rabies Postvaccination Antibody Titer Detection Using Elisa Reader And Mobile Phone Camera*. *Jurnal Veteriner*, 22(1), 79–85.  
<https://doi.org/10.19087/jveteriner.2021.22.1.79>

- Shavira, S., Margaretta, A. D., Sandra, A. D., Sitorus, R. U., & Fatmaria, F. (2021). Formulasi Dan Uji Stabilitas Sediaan Suspensi Ekstrak Rimpang Zingiber Zerumbet. *Herb-Medicine Journal*, 4(4), 7. <https://doi.org/10.30595/hmj.v4i4.11628>
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah. Lentera Hati.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 147–160.
- Sinulingga, S., Subandrate, & Safyudin. (2020). Uji Fitokimia dan Potensi Antidiabetes Fraksi Etanol Air Daun Benalu Kersen (Dendrophthoe petandra (L) Miq). *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 16(1), 76–83. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JKK>
- SN Darwin, Indo Mandjo, & Hasyiah Siti. (1991). Tumbuhan Obat Famili Zingiberaceae. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Sunarto, K. (2011). Studi Asupan Gizi dengan Tingkat Kesembuhan Penderita Diabetes Melitus Tipe II. *Jurnal Health & Sport*, 3(1), 221–238.
- Suryasa, I. W., Rodríguez-Gámez, M., & Koldoris, T. (2021). *Health and Treatment of Diabetes Mellitus. International Journal of Health Sciences*, 5(1), I–V. <https://doi.org/10.53730/IJHS.V5N1.2864>
- Tzeng, T. F., Liou, S. S., Chang, C. J., & Liu, I. M. (2013). *The ethanol extract of zingiber zerumbet attenuates streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2013/340645>
- Wahyuningsih, S. (2019). Pengaruh Konsentrasi Enzim  $\alpha$ -Amilase pada Hidrolisis Pati Labu Jepang (Kabocho). *CHEESA*, 2(1), 26–32. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/cheesa>
- Watcharachaisoponsiri, T., Sornchan, P., Charoenkiatkul, S., & Suttisansanee, U. (2016). *The  $\alpha$ -glucosidase and  $\alpha$ -amylase inhibitory activity from different chili pepper extracts. International Food Research Journal*, 23(4), 1439–1445. The  $\alpha$ -glucosidase and  $\alpha$ -amylase inhibitory activity from different chili pepper extracts
- World Health Organization. (2008). *Maintenance manual for laboratory equipment*. World Health Organization. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY9af99qT\\_AhUi4DgGHZKEAbIQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.frankshospitalworkshop.com%2Forganisation%2Fbiomed\\_documents%2FMaintenance%2520Manual%2520for%2520Laboratory%2520Equipment%2520-%2520WHO.pdf&usg=AOvVaw1rc5DRwpUdE1vAK-miuWj3](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY9af99qT_AhUi4DgGHZKEAbIQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.frankshospitalworkshop.com%2Forganisation%2Fbiomed_documents%2FMaintenance%2520Manual%2520for%2520Laboratory%2520Equipment%2520-%2520WHO.pdf&usg=AOvVaw1rc5DRwpUdE1vAK-miuWj3)
- Yang, J., Wu, Y., Wang, H., Yang, W., Xu, Z., Liu, D., Chen, H. J., & Zhang, D. (2022). *An Improved Automated High-Throughput Efficient Microplate Reader for Rapid Colorimetric Biosensing. Biosensors*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/bios12050284>
- Yuliantari, N. W. A., Widarta, I. W. R., & Permana, D. G. M. (2017). Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Daun Sirsak (Annona muricata L.)



Menggunakan Ultrasonik. *Scientific Journal of Food Technology*, 4(1), 35–42.

Zakaria, Z. A., Yob, N. J., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., & Salleh, M. Z. (2011). *Zingiber zerumbet* (L.) Smith: A review of its ethnomedicinal, chemical, and pharmacological uses. In *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine* (pp. 1–12). <https://doi.org/10.1155/2011/543216>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Kerja

#### A. Ekstraksi Sampel



## B. Uji Aktivitas Pengambatan Enzim



## Lampiran 2. Perhitungan Rendemen dan Pembuatan Larutan Uji

### A. Perhitungan Rendemen

Dihitung persentase rendemen ekstrak larut dalam etanol 70%

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Berat Ekstrak}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{22.18 \text{ g}}{300 \text{ g}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Rendemen} = 5,54\%$$

### B. Pembuatan Larutan Uji

#### 1. Pembuatan Larutan Buffer Fosfat


Disiapkan buffer fosfat pH 7 sebanyak 100 ml

Ditambahkan beberapa tetes HCl


Diukur dengan pH meter hingga diperoleh  
buffer pH 6,8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


## 2. Pembuatan Larutan Enzim $\alpha$ -amilase




## 3. Pembuatan Larutan pati 1%



#### 4. Larutan Seri Konsentrasi Sampel




#### 5. Larutan baku NaOH 2 N





## 6. Larutan Asam Dinitrosalisilat (DNS)



### Lampiran 3. Hasil Perhitungan Uji Penghambatan

#### A. Perhitungan % Inhibisi

##### 1. Perhitungan % Inhibisi Acarbose

###### ➤ Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,501-0,04)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,461}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 27,51 \%$$

###### ➤ Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,417-0,077)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,34}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 46,54 \%$$

###### ➤ Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,325-0,082)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,243}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 61,79 \%$$

###### ➤ Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,247-0,139)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,108}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 83,01 \%$$

###### ➤ Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,201-0,162)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,039}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 93,86 \%$$

## 2. Perhitungan % Inhibisi Acarbose

### ➤ Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,554-0,045)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,509}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 19,96 \%$$

### ➤ Konsentrasi 200 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,418-0,07)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,348}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 45,28 \%$$

### ➤ Konsentrasi 300 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,309-0,108)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,201}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 68,39 \%$$

### ➤ Konsentrasi 400 ppm

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,262-0,115)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,147}{0,636} \times 100\%$$

$$\text{inhibisi} = 76,88 \%$$

➤ Konsentrasi 500 ppm


$$\% \text{ inhibisi} = \frac{(0,679-0,043) - (0,145-0,132)}{(0,679-0,043)} \times 100\%$$

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{0,636-0,013}{0,636} \times 100\%$$


$$\text{inhibisi} = 97,95 \%$$

## B. Kurva

### 1. Kurva Untuk Menghitung Nilai $IC_{50}$ Acarbose



### 2. Kurva Untuk Menghitung Nilai $IC_{50}$ Sampel



### C. Perhitungan $IC_{50}$

#### 1. Perhitungan $IC_{50}$ Acarbose

$$y = 0,8458x + 11,791$$

Dimana,

$$y = 50$$

$$a = 11,791$$

$$b = 0,8458x$$

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 11,791}{0,8458}$$

$$= 45,17 \mu\text{g/mL}$$

#### 2. Perhitungan $IC_{50}$ Sampel

$$y = 0,1876x + 5,418$$

Dimana,

$$y = 50$$

$$a = 5,418$$

$$b = 0,1876x$$

$$y = ax + b$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$= \frac{50 - 5,418}{0,1876}$$

$$= 237,643 \mu\text{g/mL}$$

*Lampiran 4. Gambar Penelitian*



Gambar 7. Simplisia Rimpang Lempuyang Gajah



Gambar 8. Penghalusan Sampel



Gambar 9. Penimbangan Sampel





Gambar 10. Perendaman Sampel dengan Etanol 70%



Gambar 11. Penyaringan Maserat



Gambar 12. Maserat Hasil Ekstraksi




Gambar 13. Penggunaan *Vacum Rotary Evaporator* Untuk Memekatkan Ekstrak



Gambar 14. Ekstrak Kental



Gambar 15. Larutan Uji

Gambar 16. Pengujian Penghambatan Enzim  $\alpha$ -amilase

Raw Data (S40)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A								0,043	0,679			
B								0,056	0,636			
C								0,034	0,671			
D												
E												
F												
G	0,04	0,077	0,082	0,139	0,162							
H	0,501	0,417	0,925	0,847	0,701							

Pola												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A								KB1	B1			
B								KB2	B2			
C								KB3	B3			
D												
E												
F												
G	KST 1	KST 2	KST 3	KST 4	KST 5							
H	ST 1	ST 2	ST 3	ST 4	ST 5							

E	
E	Blanko
EB	Kontrol blanko
ST	Standar
KST	Kontrol standar

Konsentrasi Standar	
1	20
2	40
3	60
4	80
5	100

Raw Data (S40)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0,045	0,558										
B	0,07	0,418										
C	0,108	0,509										
D	0,115	0,242										
E	0,182	0,149										
F												
G												
H												

Raw Data (S40)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	K51	S1										
B	K52	S2										
C	K53	S3										
D	K54	S4										
E	K55	S5										
F												
G												
H												

S	
S	Sampel
KS	Kontrol sampel

Konsentrasi Sampel	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500

Gambar 17. Hasil uji Aktivitas Penghambatan Enzim  $\alpha$ -amilase

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Arfani Fathiyah akrab disapa fani, dilahirkan di Desa Tappale, salah satu desa yang berada di Kabupaten Bone pada 06 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Muhammad Alwi Hasan dan Ibunda Hj. Rosma S.Pd. Penulis menempuh Pendidikan Dasar di SD INP 12/79 Tappale pada tahun 2008 dan menyelesaikan pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah di MtsN 4 Bone. Pada tahun 2016, penulis kemudian lulus, dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di sebuah Madrasah Aliyah Swasta, yaitu Pondok Pesantren Al-Ikhlas ujung Bone. Pada tahun 2019, penulis lulus sekolah menengah atas dan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis memiliki hobi membaca dan menggambar. Semasa sekolah penulis kerap kali mengikuti berbagai macam kegiatan keilmuan seperti cerdas cermat dan beberapa olimpiade. Dalam hidupnya, penulis menerapkan prinsip menjadi seperti bunga yang selalu memberikan keharuman meski pada tangan yang menghancurkan. Penulis berharap kedepannya dapat menjadi pribadi yang sukses dan mendapat kemudahan dalam mencapai cita-cita yakni sebagai seorang apoteker.