

**FORMULASI DAN UJI ANALISIS KIMIA SEREAL *FLAKES* DARI BUAH  
SIRSAK (*Annona muricata* Linn) SEBAGAI MAKANAN ALTERNATIF  
PENDERITA ASAM URAT**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**DIAN IRAWATI AHMAD**

**NIM. 70100118041**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Irawati Ahmad  
NIM : 70100118041  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/ 12 September 2001  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bumi Sudiang Permai, Makassar  
Judul : “Formulasi Dan Uji Analisis Kimia Sereal *Flakes* Dari Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn) Sebagai Makanan Alternatif Penderita Asam Urat”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennya batal demi hukum.

Makassar. Januari 2023

Peneliti,



**Dian Irawati Ahmad**  
**70100118041**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Formulasi Dan Uji Analisis Kimia Sereal Flakes Dari Buah Sirsak (Amnona muricata Linn) Sebagai Makanan Alternatif Penderita Asam Urat*" yang disusun oleh Dian Irawati Ahmad, NIM: 70100118041, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 Februari 2023  
3 Sya'ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nursyamsi Dhuha, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Nurhidayat Muh.Said,M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S. Si, M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'ala. Dengan limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Formulasi Dan Uji Analisis Kimia Sereal *Flakes* Dari Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn) Sebagai Makanan Alternatif Penderita Asam Urat”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabiullah Muhammad shallallahu ‘alayhi wasllam. sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa begitu banyak hambatan dan juga tantangan yang selalu dihadapi, namun menurut peneliti hal tersebutlah yang mewarnai perjalanan jembatan untuk mewujudkan harapan dan pencapaian tujuan.

Peneliti sangat berterima kasih kepada mereka yang sangat berharga dan telah berjasa yang tak ternilai dalam hidup peneliti yakni sosok luar biasa kedua orang tua peneliti Bapak tercinta Ahmad A. Md. dan Ibu tersayang Nurbaya Amin, yang tak pernah merasa jenuh dalam mendo’akan, memotivasi dan menasehati peneliti dengan tulus. Peneliti sampai saat ini menyadari sepenuhnya bahwa peneliti tidak akan dapat berada di tahap ini tanpa adanya do’a-do’a dari beliau. Terima kasih pula peneliti ucapkan kepada saudara-saudari peneliti yang tersayang Dina Amelia Ahmad, Sutan Almalikus Saleh Ahmad, Nur Fatimah Ahmad dan Desi Zackia Ahmad yang senantiasa menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti. Demikian pula keluarga besar

peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Teman-teman selama perkuliahan yang kuat dan telah terikat satu salam lain dan saling berkasih sayang saat menjalani studi ini. Semoga Allah subhanahu wata'ala selalu memberkati kita dan menjadi kita dalam lindungan-Nya.

Peneliti juga ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. menjabat Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. menjabat Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. menjabat Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. menjabat Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. menjabat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. menjabat Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. menjabat Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. menjabat Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si. menjabat Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Ibu apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si. sebagai Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam menuntun dan mengarahkan peneliti dengan bijaksana dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu apt. Indah, S. Si., M. Si. sebagai Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya memberikan masukan dan mengoreksi peneliti dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S. Si, M. Si. sebagai Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Bapak Dr. Nurhidayat Muh. Said, M. Ag. sebagai Penguji Agama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang baik dalam perbaikan seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Ibu Apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm. sebagai Pelaksana Ujian Akhir yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
16. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

17. Kepada Kak apt. Andri Anugrah Pratama, S.Farm., M.Si., Laboran Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Kak apt. Sukri, S.Farm., Laboran Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Kak Anshari Masri, Laboran Laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, dan Bapak Awaluddin I.P., S.Si., M.Si., Laboran Riset Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang senantiasa mengarahkan peneliti selama menyelesaikan penelitian.
18. Kepada kakak-kakak senior Jurusan Farmasi 2016 dan 2017 yang telah mengarahkan dan menyemangati peneliti selama menyelesaikan penelitian.
19. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2018, Suspensi yang selalu menyemangati dan mendukung hingga terselesaikannya penelitian dan skripsi ini.
20. Kepada teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa Riset Keilmuan dan Kemitraan Masyarakat (UKM RITMA) UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
21. Ucapan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis yang tak sempat disebutkan satu per-satu.

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Makassar, 23 Januari 2023  
Peneliti,




**Dian Irawati Ahmad**  
**70100118041**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
BAB 2.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Buah Sirsak.....	8
C. Antioksidan.....	16
D. Produk Sereal.....	18
E. Tinjauan Islam.....	31

BAB III.....	36
METODE KERJA.....	36
A.    Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	36
B.    Pendekatan Penelitian.....	36
C.    Populasi dan Sampel.....	36
D.    Alat dan Bahan .....	37
E.    Prosedur Kerja.....	38
F.    Uji Organoleptik.....	39
G.    Prosedur Analisis Proksimat.....	40
H.    Pengujian Antioksidan.....	44
BAB IV .....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A.    Hasil Penelitian.....	46
B.    Pembahasan.....	55
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A.    Kesimpulan.....	68
B.    Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	105



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi Buah Sirsak dalam 100 mg.....	11
Tabel 2. Kandungan Gizi Sereal dalam 100 gram .....	18
Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Tepung Jagung dalam 100 gram .....	22
Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Susu Skim Bubuk dalam 100 gram .....	23
Tabel 5. Kandungan Zat Gizi Margarin dalam 100 gram .....	24
Tabel 6. Kandungan Gizi Perisa Vanili dalam 100 gram.....	25
Tabel 7. Kandungan Zat Gizi Gula Pasir dalam 100 gram .....	26
Tabel 8. Kandungan Zat Gizi Soda Kue dalam 100 gram .....	28
Tabel 9. Kandungan Zat Gizi Garam dalam 100 gram .....	28
Tabel 10. Formulasi Sereal Flakes Buah Sirsak ( <i>Annona muricata</i> Linn).....	38
Tabel 11. Skala Hedonik.....	39
Tabel 12. Tahap Awal Pembuatan Sereal Flakes.....	46
Tabel 13. Tahap Kedua Pembuatan Sereal Flakes .....	47
Tabel 14. Hasil Uji Organoleptik Sereal Flakes.....	51
Tabel 15. Hasil Analisis Proksimat.....	51
Tabel 16. Hasil Pengujian Antioksidan F1 .....	52
Tabel 17. Hasil Pengujian Antioksidan F2 .....	52
Tabel 18. Hasil Pengujian Antioksidan F3 .....	53
Tabel 19. Hasil Pengujian Antioksidan Vitamin C.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Buah Sirsak ( <i>Annona mucirata</i> Linn) .....	8
Gambar 2. Struktur Asam Urat .....	12
Gambar 3. Metabolisme Asam Urat.....	13
Gambar 4. Ilustrasi Antioksidan ( $A^\circ$ ) dalam Nanopartikel yang Menarik Radikal ....	16
Gambar 5. Struktur Kimia Steviol .....	27
Gambar 6. Produk Sereal Flakes.....	50
Gambar 7. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 1 dengan konsentrasi hambat Formula 1 .....	53
Gambar 8. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 2 dengan konsentrasi hambat Formula 2 .....	54
Gambar 9. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 3 dengan konsentrasi hambat Formula 3 .....	54
Gambar 10. Grafik hubungan Ln konsentrasi Vitamin C dengan konsentrasi hambat Vitamin C.....	54
Gambar 11. Proses Pembuatan Sereal Flakes .....	92
Gambar 12. Logo dan Desain Kemasan.....	93
Gambar 13. Uji Organoleptik.....	94
Gambar 14. Analisis Kadar Air.....	95
Gambar 15. Analisis Kadar Abu .....	96
Gambar 16. Analisis Antioksidan .....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kerangka Konsep .....	74
Lampiran 2. Pembuatan Sereal Flakes .....	75
Lampiran 3. Analisis Proksimat Sereal Flakes .....	76
Lampiran 4. Analisis Antioksidan.....	85
Lampiran 5. Hasil Uji Organoleptik.....	87
Lampiran 6. Proses Pengerjaan Sereal Flakes.....	92



## ABSTRAK

Nama : DIAN IRAWATI AHMAD  
NIM : 70100118041  
Jurusan : FARMASI  
Judul Skripsi : FORMULASI DAN UJI ANALISIS KIMIA SEREAL *FLAKES* DARI BUAH SIRSAK (*Annona muricata* Linn) SEBAGAI MAKANAN ALTERNATIF PENDERITA ASAM URAT

---

Penelitian ini berjudul “Formulasi Dan Uji Analisis Kimia Sereal *Flakes* Dari Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn) Sebagai Makanan Alternatif Penderita Asam Urat” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis formulasi sereal *flakes* substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram terhadap kandungan kimianya sebagai makanan alternatif penderita asam urat. Untuk menetapkan kadar proksimat berupa kadar air, abu, lemak, protein, dan serat kasar digunakan metode AOAC 2005 dan kadar karbohidrat digunakan metode *Luff schoorl*. Untuk menganalisis aktivitas antioksidan digunakan metode peredaman DPPH (1,1-*diphenyl-2-picrylhydrazyl*) dengan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm.

Menurut hasil penelitian, *flakes* substitusi buah sirsak berpengaruh besar pada warna tetapi tidak berdampak signifikan pada rasa, rasa, atau tekstur. Pada analisis proksimat sereal *flakes* substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki kadar air, protein, lemak, dan karbohidrat yang sesuai dengan syarat mutu SNI01-2885-2015, sedangkan untuk kadar abu melebihi syarat dan kadar serat berada dibawah syarat sehingga tidak memenuhi syarat. Adapun hasil aktivitas antioksidan sereal *flakes* substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki nilai IC<sub>50</sub> berturut-turut adalah 2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm Sehingga dapat disimpulkan bahwa sereal *flakes* dari buah sirsak memiliki kandungan proksimat yang baik serta dapat berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat menjadi makanan alternatif penderita asam urat.

Agar dapat menjadikan sereal *flakes* sebagai pangan fungsional yang dapat dimanfaatkan sebagai asupan antioksidan alami dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat sereal *flakes* bagi kesehatan sendi.

**Kata Kunci :** *Annona muricata* Linn, proksimat, dpph, ic50

## ABSTRACT

Name : DIAN IRAWATI AHMAD  
NIM : 70100118041  
Departement : FARMASI  
Title : FORMULATION AND CHEMICAL ANALYSIS TEST OF  
CEREAL FLAKES FROM SOURSOP (*Annona muricata* Linn)  
FRUIT AS AN ALTERNATIVE FOOD FOR GOUT  
SUFFERERS

---

This study entitled " Formulation And Chemical Analysis Test Of Cereal Flakes From Soursop (*Annona muricata* Linn) Fruit As An Alternative Food For Gout Sufferers " is a study conducted with the aim of analyzing the formulation of cereal flakes substituted for soursop fruit 100, 110, and 120 grams for the content of chemical as a potential alternative food to lower uric acid levels. Determine proximate levels in the form of water, ash, fat, protein, and crude fiber content, was used by AOAC 2005 method and the total carbohydrate was used by *Luff schoorl* method. As for analyzing the antioxidant activity, DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) attenuation method was used then measured the absorbance with a spectrophotometer UV-Vis at wavelength of 517 nm.

The results of this study was found that soursop subs have a significant effect on color, but no significant effect in aroma, taste and texture. In proximate analysis of soursop fruit substitute flakes 100, 110, and 120 grams had total water, protein, fat, and carbohydrate that complied with the quality requirements of SNI01-2885-2015, while total ash exceeded the requirements and total fiber content was below the requirements so it was not qualify. The antioxidant activity of 100, 110, and 120 grams of soursop substitution flakes cereal had IC<sub>50</sub> values of 2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm respectively. So that it is stated that cereal flakes from soursop fruit have good proximate content and potential as antioxidants so that they can be alternative foods to gout sufferers.

With this research, it can be information to the public regarding the efficacy of cereal flakes for joint health so that it has the potential as a development on functional food that can be used as natural antioxidant intake in daily life.

**Keywords :** *Annona muricata* Linn, proximate, dpph, ic50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Arthirtis gout* atau yang dikenal asam urat merupakan penyakit yang sering menyerang lansia dan senantiasa menjadi pengobatan rutin pasien dalam pelayanan kesehatan. *Arthritis gout* merupakan produk limbah yang dihasilkan oleh degradasi purin dalam DNA sel tubuh yang terdegradasi dan protein makanan yang berkumpul di jaringan tubuh dan selanjutnya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk urin. Karena ketidakteraturan metabolisme asam urat, asam urat menyebabkan endapan kristal (asam urat) pada persendian (Hikmatyar & Larasati, 2017).

Dari hasil Studi Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memaparkan bahwa Indonesia memiliki prevalensi penyakit sendi 7.30% dengan prevalensi penyakit sendi pada lansia naik dari 24,7% dari tahun 2013 menjadi 7,30% permil. Di Sulawesi Selatan, prevalensi penyakit sendi menjadi 6,39% permil. Dari seluruh kejadian penyakit sendi di Indonesia, lansia memiliki prevalensi tertinggi dari penyakit ini. Pada usia 65-74 tahun mencapai 18,63% per juta, dan pada usia 75 dan lebih tua mencapai 18,95% per juta (Kemenkes RI, 2018).

Tiga jenis *arthritis gout* adalah primer, sekunder, dan idiopatik. Asam urat primer adalah hasil langsung dari tubuh yang memproduksi terlalu banyak asam urat atau tubuh mengeluarkannya lebih sedikit dari yang seharusnya. Kondisi medis lain atau penggunaan obat tertentu dapat menyebabkan asam urat sekunder. Pada gout idiopatik, didefinisikan sebagai hiperurisemia tanpa penyebab utama yang diketahui, kondisi keturunan, dan kelainan fisiologis dan anatomi pada tubuh. Komplikasi dari hiperurisemia kronis termasuk asam urat. Degenerasi sendi yang disebabkan oleh arthritis gout kronis dapat menyebabkan kelainan bentuk. Karena nefropati urat, yang

dapat menyebabkan gagal ginjal kronis, asam urat juga dapat menyebabkan nefrolitiasis (Hikmatyar & Larasati, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan gout dalam mengurangi produksi asam urat yang berlebihan agar mencegah terjadinya komplikasi penyakit sendi lainnya.

Diantara asupan gizi yang berpotensi dalam mengurangi gejala penyakit gout adalah buah-buahan seperti buah sirsak. Buah sirsak adalah salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang berpotensi sebagai obat. Menurut Trupti et al. (2014) yang dikutip dari Prasetyorini, Moerfiah, Wardatun, & Affandi (2014) buah sirsak memiliki kadar vitamin C dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan, dimana aktivitas antioksidan dapat menghambat kerja xantin oksidase melalui inhibisi kompetitif dengan substrat golongan xantin sehingga berperan sebagai penurun kadar asam urat.

Pengembangan buah sirsak menjadi sereal *flakes* menjadi salah satu topik yang menarik karena sampai saat ini pemanfaatan buah sirsak sebagai makanan masih dikonsumsi dalam sediaan daging buah utuh. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan aktivitas buah sirsak dalam penurunan kadar asam urat, namun penyajian buah secara langsung membuat buah sirsak enggan dikonsumsi karena penyajiannya yang sulit karena harus dipisahkan dari bijinya terlebih dahulu serta rasa asamnya yang pekat, terutama pada pagi hari. Masyarakat umum hanya mengetahui konsumsi buah sirsak dalam keadaan utuh maupun substitusi dengan makanan lainnya seperti jus, pudding, permen, dan lainnya. Namun belum ada substitusi buah sirsak pada formulasi sereal yang digunakan sebagai penurun kadar asam urat. Pengembangan formulasi sediaan buah sirsak sebagai sarapan pagi diharapkan menjadi alternatif asupan gizi yang diperlukan oleh penderita asam urat.

Dalam mengurangi gejala asam urat yang dialami penderita, maka dibutuhkan sarapan pagi yang dapat berperan sebagai sumber asupan nutrisi yang sehat sekaligus memperbaiki gejala nyeri sendi agar dapat produktif dalam beraktivitas. Salah satu

bentuk sarapan pagi yang umum di masyarakat adalah sereal. Menurut Susanti, Loebis, & Meilidayani (2017), sereal merupakan menu sarapan yang relatif murah, bergizi dan dapat menjadi bagian dari diet yang seimbang dan sehat. Sereal *Flakes* berbahan utama tepung dan berbentuk pipih bulat dengan tepi tidak beraturan, kadar air yang rendah serta mempunyai daya rehidrasi yang tinggi.

Konsumsi perkapita sereal Indonesia pada tahun 2020 mencapai 0.088 % lebih kecil dibandingkan konsumsi beras 78.487 % ataupun beras ketan 0.267 %. Adapun produksi padi gagan di Indonesia mencapai angka 55,161 % (Pusat Data dan Informasi Sistem Pertanian, 2021). Masyarakat Indonesia masih jarang mengonsumsi sereal sebagai makanan sehari-hari, sedangkan produksi padi-padian di Indonesia sangat tinggi. Padahal, sereal termasuk salah satu menu sarapan sehat yang sangat diminati dan mudah dikonsumsi. Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO) Cereal Supply and Demand Brief (2022)*, konsumsi sereal dunia pada tahun 2020 mencapai 2.760,7 miliar ton dan akan terus mengalami peningkatan setiap tahun. *Flakes* dipilih karena tergolong sebagai makanan sereal siap santap yang telah diolah dan mudah dalam penyajiannya. Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan formulasi sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) sebagai alternatif makanan penurun kadar asam urat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah buah sirsak (*Annona muricata* Linn) dapat diformulasikan menjadi sereal *flakes* dengan kualitas fisik yang baik?
2. Formulasi sereal *flakes* buah sirsak (*Annona muricata* Linn) manakah yang memiliki evaluasi yang terbaik berdasarkan uji proksimat dan uji hedonik?
3. Bagaimana potensi sereal *flakes* buah sirsak (*Annona muricata* Linn) sebagai makanan alternatif penderita asam urat?

### **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Formulasi adalah proses pengolahan bahan baku baik dalam wujud tunggal ataupun campuran menjadi produk sereal.
- b. Pengujian merupakan salah satu tahapan penelitian yang dilakukan peneliti untuk mengetahui hasil aktivitas penurunan kadar asam urat dari sereal *flakes* buah sirsak melalui pengujian antioksidan sereal *flakes*.
- c. *Flakes* adalah sereal berbahan dasar tepung dan berbentuk bulat pipih dengan tepi yang tidak beraturan, berkadar air rendah serta mempunyai daya rehidrasi.
- d. Buah sirsak merupakan buah asli dari Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang dapat dikonsumsi sebagai makanan maupun sebagai pengobatan.
- e. *Arthritis gout* merupakan produk limbah dari degradasi purin yang terkandung dalam DNA sel-sel tubuh dan protein makanan yang menumpuk dalam jaringan tubuh dan diekskresikan oleh ginjal dalam bentuk urin.

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Formulasi dan pengujian analisis kimia sereal *flakes* buah sirsak (*Annona muricata* Linn) untuk makanan alternative bagi penderita asam urat merupakan bagian dari ruang lingkup analisis dan teknologi farmasi dalam penelitian ini.

### **D. Kajian Pustaka**

1. Dalam jurnal berjudul “**Aktifitas Berbagai Sediaan Buah Sirsak (*Annona Muricata* Linn) dalam Penurunan Kadar Asam Urat Tikus Putih *Sprague-Dawley***”. Telah dilakukan penelitian potensi sari buah, ekstrak etanol, ekstrak etil asetat dengan dosis yang berbeda dari buah sirsak seperti asam urat. Perlakuan yang diberikan berupa sari buah dengan dosis 930 mg, 1870 mg dan 2810 mg; ekstrak etanol 96% dengan dosis 26,79 g/100 ml, 53,58 g/100 ml dan 80,37 g/100 ml; dan ekstrak dengan dosis etil asetat 2,58 g/100 ml, 5,16 g/100 ml dan 7,74 g/100 ml. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi jus buah, dan peras

langsung daging buahnya dengan kain batis. Ketiga formulasi tersebut mengandung flavanoid, alkaloid, tanin, saponin, dan polifenol sesuai hasil uji kualitatif. 100 g sari buah, ekstrak etanol 96%, dan 0,473 g ekstrak etil asetat masing-masing mengandung 0,473 g polifenol. SAG: 0,194 mg SAG dan 0,324 g SAG. Vitamin C Jus buah, ekstrak etanol 96%, ekstrak etil asetat 38,24 mg, 30,56 mg, dan kalium 35,66 mg per 100 g jus buah. Bahan sari buah antara lain ekstrak etanol 96%, ekstrak etil asetat 0,39 g, 0,26 gram, dan 0,22 gram. Jus buah, ekstrak etanol 96%, dan ekstrak etil asetat masing-masing memiliki kandungan natrium masing-masing sebesar 100 g, 0,0269 g, 0,0416 g, dan 0,0436 g. Hasil uji menunjukkan bahwa perlakuan yang diteliti secara signifikan menurunkan kadar asam urat pada tikus. Ekstrak etanol 96%, dosis 53,58 g/100 ml dan 80,37 g/100 ml, dan ekstrak etil asetat dosis 7,74 g/100 ml juga dapat menurunkan kadar asam urat darah di luar kontrol positif. Tiga dosis jus buah menurunkan kadar asam urat darah hingga 40%. (Prasetyorini, dkk., 2014).

2. Dalam penelitian berjudul “**Khasiat Sari Buah Sirsak Gunung Dan Minuman Probiotik Buah Sirsak Gunung (*Annona Montana*) Untuk Menurunkan Kadar Asam Urat**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas jus sirsak gunung dan minuman probiotik (*Annona montana*) pada mencit (*Mus musculus* L.) dengan kadar asam urat yang meningkat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang melibatkan aklimatisasi 25 ekor mencit, pemberian pure hati ayam, pembuatan minuman probiotik dan jus sirsak gunung, dan perlakuan pada mencit selama tiga minggu. Analisis menunjukkan bahwa jus sirsak gunung dan minuman probiotik buah sirsak gunung dapat menurunkan asam urat hingga 50%, yang mengarah pada kesimpulan bahwa produk ini memiliki efek terapeutik terhadap kadar asam urat mencit (Fidyasari, dkk., 2019).
3. Dalam jurnal berjudul “**Flakes Sarapan Pagi Berbasis Mocaf dan Tepung Jagung**”. Dalam penelitian ini, mocaf digunakan sebagai bahan baku utama untuk membuat tiga jenis *flakes* yang berbeda: A1 (90 persen tepung mocaf : 10 persen tepung jagung), A2 (80 persen mocaf : 20 persen tepung jagung), dan A3 (70 persen

tepung mocaf : 30 persen tepung jagung). *Flakes* yang dipilih adalah flakes dengan formula A2 (tepung mocaf 80% + tepung jagung 20%) yang ditentukan dengan uji organoleptik yang dilakukan dengan metode skalar garis. *Flakes* memiliki kadar air 1,05%, kadar abu 1,46%, kadar lemak 13,90%, kadar protein 1,76%, kadar serat pangan 3,5%, dan kadar karbohidrat 81,83%. Jumlah kalori yang dihasilkan adalah 459,70 Kkal (Susanti dkk., 2017).

4. Dalam jurnal berjudul “**Analisis Proximat, Antioksidan dan Kesukaan Sereal Makanan Dari Bahan Dasar Tepung Jagung (*Zea mays L.*) dan Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata* Durch)**”. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui nilai gizi produk sereal yang dibuat dengan tiga tingkat perbandingan tepung labu kuning dan tepung jagung sebagai bahan dasarnya agar dapat diketahui komposisi yang tepat dan dapat diterima masyarakat (1:1; 1:2; 2:1). ). Tingkat kedua (1:2) memiliki kandungan gizi yang tinggi meliputi kadar air 4,275%, abu 0,832%, dan serat kasar 10,654%, sesuai hasil analisis proksimat, sedangkan tingkat ketiga (2:1) memiliki kandungan gizi yang tinggi meliputi kandungan antioksidan 27,772%, lemak 24,316%. , dan protein 15,211%. Hanya 54,135% dari kalori tingkat pertama (1:1) berasal dari karbohidrat. Semua dari 28 panelis yang berpartisipasi dalam analisis organoleptik menyukai tingkat kedua dibandingkan tingkat lainnya dalam hal rasa, aroma, tekstur, dan warna. (Ramadhani, dkk., 2012).

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui formulasi buah sirsak (*Annona muricata* Linn) dalam bentuk sereal *flakes* yang memiliki kualitas fisik yang baik.
2. Mengetahui evaluasi sediaan sereal *flakes* buah sirsak sirsak (*Annona muricata* Linn) berdasarkan uji proksimat dan uji hedonik.
3. Mengetahui potensi sereal *flakes* buah sirsak (*Annona muricata* Linn) pada penderita asam urat.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Adanya penulisan karya ilmiah ini yang mengusung pembuatan sereal Flakes dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) agar dapat menjadi alternatif makanan bagi pasien *arthritis gout* dalam menurunkan kadar asam urat serta menjaga asupan sarapan pagi yang bergizi.

### 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

- a. Bagi masyarakat , penelitian ini bertujuan sebagai referensi sekaligus salah satu acuan bagi masyarakat, terkhususnya bagi pasien *arthritis gout* agar mengonsumsi makanan alternatif penurun kadar asam urat dalam menjaga kesehatan tubuh khususnya persendian.
- b. Bagi pemerintah, penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah agar dapat mendukung karya peneliti khususnya perpaduan dalam bidang kefarmasian seperti formulasi sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) sebagai penurun kadar asam urat.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam bidang kefarmasian sekaligus sebagai salah satu persyaratan kelulusan Strata 1 (S1).

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Buah Sirsak

##### 1. Uraian Tumbuhan

Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan adalah asal mula tanaman sirsak, serta Amerika Utara, Amerika Serikat Bagian Timur Laut, dan Brasil Tenggara. Penduduk asli Amazon di Amerika Selatan menyebutnya sebagai pohon ajaib. Selama ribuan tahun, penduduk setempat telah memanfaatkan tanaman sirsak untuk menyembuhkan berbagai penyakit mulai dari masalah hati hingga radang sendi. Buah-buahan dan biji-bijian misalnya, digunakan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan menyingkirkan parasit. Wanita mengkonsumsi akar untuk membantu relaksasi, dan akar tanaman dan kulit kayu diolah menjadi obat penenang atau teh tonik saraf yang digunakan di Polinesia untuk mengangkat semangat dan mengurangi depresi (Sugeng, 2010).

Pada abad ke-19, budidaya tanaman ini mulai dibudidayakan di Malaysia dan Indonesia setelah menyebar dengan cepat ke seluruh Asia (Noller, 2005). *A. muricata* Linn juga dikenal sebagai *Guanabanus muricatus*, *A. macrocarpa*, *A. bonplandiana*, dan *A. cearensis*. Kata Belanda "Zuurzak", yang diterjemahkan menjadi "kantong yang asam", adalah asal nama "sirsak". (Thomas, A.N. S, 1992).

Gambar 1. Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn)



## 2. Klasifikasi Tumbuhan

Menurut Widyaningrum (2012), tumbuhan sirsak dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Polycarpiceae
Famili	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona muricata</i> Linn
Nama Umum	: Graviola (Brazil), Soursop (Inggris), Guanabana (Spanyol), Nangka Sabrang atau Nangka Belanda (Jawa), Nangka Walanda atau Sirsak (Sunda)

## 3. Morfologi Tumbuhan

Pohon sirsak tumbuh setinggi 7,5 hingga 9 meter, lebat namun ramping, dan bercabang rendah. Daun berbau umumnya hijau, halus, berkilau, hijau tua di atas, lebih terang di bawah; lonjong, elips, atau berujung sempit dengan kedua ujung runcing; dan ukurannya bervariasi dari panjang 6,25 hingga 20 cm dan lebar 2,5 hingga 6,25 cm. Bunga dapat tumbuh di batang, cabang, atau ranting dan bersifat otonom. Bertangkai pendek, panjang 4 sampai 5 cm, montok, berbentuk kerucut segitiga, dengan 3 kelopak luar berdaging, menyebar, kuning kehijauan dan 3 kelopak dalam kuning pucat yang berdekatan (J., 1987)

Akibat pertumbuhan karper yang buruk atau kerusakan akibat serangga, buah biasanya kurang lebih lonjong atau berbentuk hati, terkadang tidak rata, miring, atau bengkok. Beratnya antara 4,5 dan 6,8 kg dan berukuran panjang antara 10 dan 30 cm dan lebar 15 cm. Kulit buahnya keras tapi lembut, pahit dan tidak bisa dimakan, teksturnya lembut dengan duri yang lentur. Buahnya kompleks dan tertutup retikulum. Saat buah sudah benar-benar matang, bagian atasnya mudah patah. Buah mentah berwarna hijau tua, kemudian hijau agak kekuningan, dan akhirnya empuk saat disentuh kulit. Permukaan bagian dalam berwarna krem dan berpasir dan mudah dipisahkan dari tumpukan segmen seputih salju, berserat, dan berair yang mengelilingi bagian inti yang lunak. Secara aroma, daging buahnya agak seperti nanas, tetapi rasa musky, subasam hingga asamnya unik. Di setiap segmen buah ada satu biji lonjong, tekstur halus namun keras dan berwarna hitam, serta berukuran 1,25 hingga 2 cm); dan buah yang besar mungkin mengandung beberapa lusin hingga 200 biji atau lebih (J., 1987).

#### **4. Manfaat dan Kandungan**

Terdapat kandungan nutrisi yang tinggi, yang meliputi karbohidrat, vitamin C, dan mineral, sirsak sejauh ini telah dibudidayakan untuk diambil buahnya. Menurut Widyaningrum (2012), untuk mengobati dan mencegah terjadinya gastroenteritis, maag, disentri, demam, dan influenza serta meningkatkan produksi ASI dan menjaga energi. Bronkitis dan batuk diobati dengan bunga. Astringen, karminatif, pemicu muntah, kutu kepala, parasit kulit, dan obat caceng semuanya dicegah dan diobati dengan biji. Ashma, batuk, hipertensi, infeksi parasit, sedativa, dan epilepsi semua diobati menggunakan kulit kayu. Akarnya digunakan untuk mengobati kejang, obat penenang, dan diabetes (terutama kulit akar). Selain itu, daunnya mengandung senyawa antioksidan yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit jantung, diabetes, dan kanker.

Menurut Wiradharma (2021), daging buah sirsak dalam 100 gram mengandung gizi sebagai berikut.

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi Buah Sirsak dalam 100 mg

Kandungan	Jumlah	Kandungan	Jumlah
Energi	65.0 kal	Serat	2.00 mg
Protein	1.0 g	Vitamin A	1.0 RE
Lemak	0.30 mg	Vitamin B1	0.07 mg
Karbohidrat	16.30 mg	Vitamin B2	0.04 mg
Kalsium	14.0 mg	Vitamin C	20.0 mg
Fosfor	27.00 mg	Niacin	0.70 mg

Hampir 86% dari buah adalah pulp dengan 3% menjadi wadah. Rasa sirsak dikaitkan dengan adanya gula dan asam organik (asam malat dan sitrat) (0,65-0,85%) (Bhat & Paliyath, 2015). Berdasarkan penelitian Lako et al. (2007) yang dikutip dari Bhat & Paliyath (2015), sirsak mengandung kandungan polifenol yang tinggi (kapasitas antioksidan setara 72 trolox dan 42 asam galat setara mg/100 g, masing-masing). Di antara berbagai senyawa, asam alifatik, ester (51%), dan terpen seperti mono dan seskuiterpen (*b-caryophyllene* 12,7%, *1,8-cineole* 9,9%, *linalool* 7,8%, *α-terpineol* 2,8%, *linalyl propionate* 2.2 %, dan *calarene* 2,2%) diisolasi dari minyak esensial sirsak.


Kandungan antioksidan yang meliputi vitamin C dan bahan kimia polifenol diduga terkait dengan kemampuan buah sirsak untuk mengurangi asam urat. Melalui penghambatan kompetitif dengan substrat xantin, aktivitas zat antioksidan ini dapat mencegah kerja xantin oksidase. Menurut Taylor (2002), karena kandungan polifenol buah sirsak yang tinggi, buah sirsak telah digunakan sebagai antirematik di Brazil. Penghambatan enzim xanthine oxidase dapat mencegah produksi asam urat karena mengkatalisis konversi purin menjadi asam urat (Prasetyorini, dkk., 2014).

## B. Uraian Umum Asam Urat

### 1. Struktur Asam Urat

Produk sampingan terakhir dari metabolisme purin adalah asam urat dengan rumus kimia  $C_5H_4N_4O_3$ . Asam urat menggandakan jumlah ion urat yang dihasilkan pada pH (basa tinggi) dibandingkan pada pH asam (Dianati, 2015).

Gambar 2. Struktur Asam Urat




Pemecahan asam nukleat dalam makanan menghasilkan purin, lalu segera diubah menjadi asam urat. Semua sel memecah nukleotida purin, tetapi hanya organ yang mengandung xantin oksidase (khususnya yang ada di hati dan usus kecil) yang menghasilkan asam urat. Asam urat endogen disintesis rata-rata harian 300-600 mg, dan kemudian dieliminasi rata-rata harian 600 mg ke dalam urin dan 200 mg ke usus dari makanan (Dianati, 2015).

### 3. Metabolisme Asam Urat

Terdapat sepertiga dari jumlah total asam urat tubuh berasal dari makanan yang mengandung purin; dua pertiga lainnya berasal dari pemecahan purin endogen. Darah mengandung sejumlah besar asam urat dalam bentuk (ion asam urat), terutama monosodium urat, ketika pH netral. Konsentrasi 7,0 md/dL atau kurang dianggap normal. Kadar urat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, BB, TD, fungsi ginjal, penggunaan alkohol, dan kebiasaan diet yang menyebabkan asupan purin berlebihan. Karena estrogen memiliki dampak urikosurik, kadar asam urat pada pria mulai meningkat sepanjang masa pubertas sementara pada wanita tetap rendah hingga menopause. Oksidase asam urat atau enzim urikase dalam tubuh manusia mengubah asam urat menjadi allantoin. Kadar asam urat serum yang tinggi merupakan

tanda defisiensi urinase pada manusia. Ginjal menyumbang 70% dari ekskresi urea, sedangkan saluran pencernaan menyumbang 30%. Keseimbangan antara produksi dan ekskresi asam urat menentukan jumlah asam urat dalam darah (Dianati, 2015).

Gambar 3. Metabolisme Asam Urat



Langkah pertama dalam produksi asam urat adalah pengembangan basa purin dari gugus ribosa, khususnya 5-fosforibosil-1 pirofosfat (PRPP), yang diperoleh dari ribosa 5-fosfat, sumber gugus ribosa dan diproduksi dengan ATP (adenosin trifosfat). Pada reaksi awal, PRPP dan glutamin bergabung untuk membuat fosforibosilamin, senyawa yang memiliki sembilan cincin purin. Enzim PRPP glutamyl amidotransferase, yang dihambat oleh produk IMP (Nukleotida Inosinmonofosfat), adenin monofosfat (AMP), dan guanin monofosfat, bertanggung jawab untuk mengkatalisis reaksi ini (GMP). Selain itu, ketiga nukleotida ini menjaga terhadap sintesis PRPP, yang mengurangi tingkat substrat PRPP dan memperlambat sintesis nukleotida purin. Nukleotida purin awal yang dihasilkan dari gugus glisin adalah inosin monofosfat (IMP), yang juga mengandung basa hipoksantin. Nukleotida adenin dan guanin bercabang di inosin monofosfat. Dalam proses yang melibatkan GTP, IMP

diubah menjadi adenosinmonofosfat (AMP) dengan menambahkan gugus amino aspartat ke cincin purin enam karbon (Guanosin trifosfat). Melalui transfer amino glutamin menjadi karbon pada satu gugus amino dari dua cincin purin, guanosinmonofosfat (GMP) dibuat dari IMP; reaksi ini membutuhkan ATP. Inosin dibuat ketika adenosin monofosfat dideaminasi, dan guanosin dan IMP dibuat ketika IMP dan GMP didefosforilasi. Dari IMP, yang didefosforilasi dan diubah menjadi xantin oleh xantin oksidase, basa hipoksantin dibuat. Guanin juga akan dideaminasi untuk menghasilkan xantin. Xanthine oxidase akan mengubah xantine menjadi asam urat (Dianati, 2015).

#### **4. Patogenesis Asam Urat**

Ketika konsentrasi monosodium urat dalam plasma melebihi 7,0 mg/dl, kristal akan terbentuk. Konsentrasi plasma monosodium urat bukan satu-satunya faktor yang mendorong pertumbuhan kristal. Hal ini terlihat jelas pada pasien dengan hiperurisemia tertentu yang dalam jangka waktu lama tanpa menunjukkan gejala apapun sebelum mengalami kejadian gout arthritis yang pertama. Tidak diketahui secara pasti apa yang menyebabkan episode arthritis gout pada orang dengan hiperurisemia. Dipercaya bahwa pH, suhu, dan interaksi antara protein plasma dan asam urat semuanya berdampak pada seberapa larut asam urat.

Akumulasi kristal monosodium urat akan berkomunikasi dengan fagosit menggunakan dua metode yang berbeda. Langkah pertama melibatkan sel opsonisasi dan fagositosis untuk mengaktifkannya, yang kemudian melepaskan mediator inflamasi. Metode kedua melibatkan interaksi langsung kristal monosodium urat diangkut melalui membran sel fagosit dan glikoprotein bersama dengan lipid membran dan protein. Protein G, fosfolipase C dan D, ERK1/ERK2, dan c-Jun N-terminal kinase adalah beberapa jalur transduksi, dan p38 mitogen-activated protein kinase, diaktifkan oleh interaksi ini. Prosedur di atas akan menyebabkan sel monosit melepaskan

interleukin (IL), yang merupakan penentu penumpukan neutrofil (Wahyu Widyanto, 2014).

TLR 2 (Toll Like Receptor) dan TLR 4 terlibat dalam pengenalan kristal monosodium urat, dan reseptor ini serta protein kopling TLR MyD88 mendukung fagositosis. Faktor transkripsi faktor nuklir- $\kappa$ B juga akan diaktifkan dan berbagai faktor inflamasi akan dihasilkan sebagai hasil dari pengenalan TLR 2 dan 4. Spesies oksigen reaktif (ROS) diproduksi selama fagositosis kristal monosodium urat oleh NADPH oksidase. Respon tubuh mengenai ini dengan mengaktifkan NLRP3 dan kristal monosodium urat juga menyebabkan pelepasan ATP, yang mengaktifkan P2X7R. Pelepasan cepat kalium dari sel yang terjadi ketika P2X7R diaktifkan mengaktifkan NLRP3. NLRP3, ASC, pro-caspase-1, dan CARDINAL membentuk rakitan makromolekul yang disebut sebagai inflamosome. IL-1 dibuat dengan semua langkah yang disebutkan di atas. Leukosit, neutrofil, dan makrofag adalah sel yang sering diperiksa pada artritis gout. Aktivasi sel endotel vaskular, yang menghasilkan vasodilatasi disertai dengan peningkatan aliran darah dan permeabilitas protein plasma dan akumulasi leukosit ke dalam jaringan, merupakan salah satu faktor utama dalam inflamasi akut. Ada kemungkinan bahwa faktor TNF- yang dihasilkan oleh sel mast inilah yang menyebabkan E-selectin, intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), dan vascular cell adhesion molecule-1 adalah beberapa molekul adhesi yang dihasilkan sebagai hasil dari aktivasi endotel (VCAM). -1). Melalui zat kemotaktik seperti sitokin dan kemokin yang terlibat dalam perlekatan dan transmigrasi endotel, neutrofil berkontribusi pada proses inflamasi. IL-1, IL-8, CXCL1, dan faktor koloni perangsang granulosit adalah beberapa faktor yang telah dikaitkan dengan perkembangan *arthritis gout* (Wahyu Widyanto, 2014).

## C. Antioksidan


### 1. Definisi

Secara kimia, antioksidan adalah zat penyumbang elektron. Adapun secara biologi, zat antioksidan adalah zat yang dapat melindungi sel dari efek radikal bebas yang merusak dengan mereduksi radikal bebas sehingga menghambat stress oksidatif (Winarsi, 2007). Dalam biokimia, oksidasi mengacu pada pelepasan elektron dari suatu zat, sedangkan reduksi mengacu pada perolehan elektron. Reduktor atau zat pereduksi adalah zat yang dapat menerima atau memberikan elektron, sedangkan oksidan atau oksidator adalah zat yang dapat melepaskan elektron.

Antioksidan termasuk senyawa pendonor elektron (agen pereduksi). Dengan beerat molekul yang kecil, antioksidan mampu mencegah terbentuknya radikal dengan menginaktivasi proses oksidatif dan menghambat kerusakan sel dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif (Winarsi, 2007). Dalam memerangi radikal bebas, antioksidan menggunakan dua mekanisme. Pemutusan rantai adalah mekanisme pertama, dimana antioksidan primer melepaskan elektron untuk memerangi radikal bebas. Mekanisme kedua berupa memadamkan katalisator rantai untuk menghilangkan ROS (*Reactive Oxygen Species*). ROS adalah radikal bebas yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan dan mampu berdiri sendiri sehingga sangat reaktif (Kaur, et al., 2013). Adapun konsep peredaman molekul radikal bebas oleh antioksidan terdapat pada gambar berikut.

Gambar 4. Ilustrasi Antioksidan ( $A^\circ$ ) dalam Nanopartikel yang Menarik Radikal

Bebas ( $R^\circ$ ) ( $R:A$  merupakan senyawa netral)



Antioksidan merupakan molekul yang dapat memperlambat atau mencegah oksidasi molekul lain dengan menghilangkan intermediet radikal bebas dan menghambat reaksi oksidasi lainnya dengan mengoksidasi diri mereka sendiri. Dalam sistem biologis, antioksidan melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan dipercaya berperan dalam pencegahan penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, rheumatoid arthritis, katarak, penyakit Alzheimer, dan lainnya (Kaur et al., 2013).

## **2. Klasifikasi Antioksidan**

Antioksidan enzimatis dan antioksidan non-enzimatis adalah dua kategori antioksidan. Antioksidan enzimatis superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT), glutathione peroksidase (GPx), dan glutathione reduktase secara langsung berkontribusi pada netralisasi ROS dan RNS. Sedangkan antioksidan nutrisi dan antioksidan metabolik merupakan dua kategori antioksidan non enzimatis. Antioksidan endogen, seperti asam lemak, glutathione, L-arginine, koenzim Q10, melatonin, asam urat, bilirubin, protein pengikat logam, transferrin, dan lain-lain termasuk dalam kategori antioksidan metabolik. Antioksidan eksogen termasuk zat seperti vitamin E, vitamin C, karotenoid, logam jejak (selenium, mangan, seng), flavonoid, asam lemak omega-3, dan vitamin E yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh sendiri dan harus diperoleh dari makanan atau suplemen. Omega-6 dan lainnya (Kaur et al., 2013).

## **3. Pengujian Antioksidan**

Pengujian antioksidan dilakukan dengan pengujian efektivitasnya dalam membersihkan senyawa radikal DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*). DPPH adalah senyawa radikal yang digunakan dalam pengujian antioksidan didasarkan pada transfer elektron sehingga menghasilkan perubahan warna larutan (Prasetyorini, dkk., 2014).

## D. Produk Sereal

### A. Definisi Sereal

Menurut Peraturan BPOM RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan, Serealia adalah produk yang berasal dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur (bagian dalam batang tanaman), bukan termasuk produk bakerei dan bukan termasuk kacang dari pangan buah dan sayur. Menurut Susanti et al (2017), sereal adalah salah satu jenis makanan olahan yang terbuat dari tepung biji-bijian dan diolah menjadi bentuk serpihan (*Flake*), setrip (*Shredded*), ekstrudat (*Extruded*), dan ditambahkan susu, air atau yogurt meskipun sereal juga dapat dikonsumsi dalam keadaan kering. Sereal terbuat dari tepung biji serealia, akar dan umbi-umbian, kacang-kacangan dan empulur sebagai makanan siap santap serta mudah dalam penyeduhannya. Seereal sarapan dihasilkan dari campuran beberapa jenis serealia baik yang belum diolah, telah diolah sebagian, atau diolah sempurna dengan penambahan bahan lain misalnya gula, malt, madu, garam, dan bahan lainnya (BPOM RI, 2015). Menurut USDA, kandungan gizi sereal adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Kandungan Gizi Sereal dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
<b>Kalori</b>	357 kal
<b>Total Lemak</b>	0.4 g
<b>Sodium</b>	729 mg
<b>Total Karbohidrat</b>	84.1 g
Serat	3.3 g
Gula	9.5 g
<b>Protein</b>	7.5 g
Vitamin C	21 mg
Vitamin D	3.6 mcg
Zat Besi	28.9 mg

## B. Penggolongan Sereal

Berdasarkan Peraturan BPOM RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan, terdapat jenis produk sereal sebagai berikut.

- a. Bulgur adalah produk gandum pratanak yang masih memiliki biji dan sekamnya dan dapat dimasak atau direndam dalam air untuk menyusun kembali bulirnya.
- b. Serpihan jagung adalah produk jagung yang dibuat dengan mengekstruksi pati jagung menjadi gelatin kemudian dikeringkan.
- c. Meal merupakan makanan sereal yang terbuat dari biji-bijian serta dapat berisi campuran sereal.
- d. Tepung bibit gandum merupakan tepung yang terbuat dari embrio atau biji gandum, bersama dengan kulit ari dan komponen lainnya.
- e. Oatmeal adalah produk tepung yang terbuat dari biji oat yang telah digiling atau dihasilkan setelah dipisahkan dari kulitnya.
- f. Tepung jagung utuh adalah tepung yang terbuat dari biji jagung (*Zea mays L.*) tua yang belum berkecambah dan telah digiling hingga tingkat kehalusan tertentu. Partikel kasar hasil penggilingan dapat dipisahkan maupun digiling kembali, serta dicampur kembali dengan bahan aslinya selama proses penggilingan.
- g. Tepung jagung degermed adalah tepung yang terbuat dari biji jagung (*Zea mays L.*) tua, yang telah dibersihkan dari jamur, biji gulma dan biji-biji lainnya yang telah digiling hingga tingkat kehalusan tertentu kemudian dipisahkan dari sekamnya. Partikel kasar hasil penggilingan dapat dipisahkan maupun digiling kembali, serta dicampur kembali dengan bahan aslinya selama proses penggilingan.
- h. Nasi jagung adalah produk jagung yang terbuat dari jagung pipilan yang telah digiling atau dihaluskan sebelum diolah lebih lanjut seperti memasak nasi.

- i. Sereal siap saji adalah sarapan olahan yang diperoleh dari campuran dari berbagai jenis sereal baik yang belum diproses, sebagian, atau diproses sepenuhnya kemudian ditambahkan bahan lain seperti gula, malt, madu, garam, dan bahan makanan lainnya.
- j. Tiwul merupakan tepung singkong yang kemudian dikukus setelah direndam dalam air serta biasanya dikonsumsi warga Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan sebagai pengganti nasi.
- k. Jagung degermed adalah jenis bubur jagung yang dibuat dengan menggiling atau menumbuk biji jagung kuno (*Zea mays L.*) hingga mencapai tingkat kehalusan tertentu, di mana semua dedak dan kulit ari terlepas.
- l. Gari adalah produk yang terbuat dari pengolahan ubi kayu (*Manihot esculenta Crantz*).

### **C. Kelebihan Sereal *Flakes***

Kelebihan sereal adalah sebagai berikut.

- a. Kesukaan rasa dan praktis

Sereal memiliki banyak manfaat dan disukai oleh banyak masyarakat Indonesia karena rasanya yang disukai dan nilai praktisnya (Ramadhani dkk., 2012).

- b. Relatif murah dan kaya nutrisi

Sereal merupakan sarapan yang relatif murah, bergizi dan dapat menjadi diet yang sehat dan seimbang (Susanti dkk., 2017).

### **D. Kekurangan Sereal *Flakes***

Penderita rheumatoid arthritis memperhatikan atau meminumnya dengan sebutir garam tetapi makan biji-bijian sereal seperti gandum, rye, barley, oat dan jagung, atau kacang-kacangan, seperti kacang dan kacang polong, dapat menghasilkan

perubahan dalam struktur usus yang mendorong perkembangan penyakit pada orang yang rentan. Keadaan yang tepat dapat mencakup konsumsi makanan seperti biji-bijian sereal dan kacang-kacangan, yang tinggi zat yang disebut lektin. Lektin dapat menyebabkan perubahan pada dinding saluran pencernaan, yang memungkinkan beberapa bahan yang biasanya disimpan di dalam usus bocor ke dalam tubuh. Bahan tersebut kemudian dapat mendorong sistem kekebalan untuk menyerang sendi tubuh sendiri, yang mengakibatkan *rheumatoid arthritis* (Tracey, 2000).

Selanjutnya, berdasarkan penelitian Major, Topless, Dalbeth, & Merriman (2018) tentang meta-analisis kohort berbasis populasi yang bertujuan untuk menguji secara sistematis komponen makanan untuk hubungannya dengan kadar urat serum diketahui bahwa sereal berkhasiat menurunkan serum urat. Di studi lain, pada penelitian Jakše, Jakše, Pajek, Pajek, & Jernej (2019) asupan makanan rendah purin yang tinggi, seperti produk susu, sereal, kacang-kacangan dan beberapa bentuk produk kedelai (misalnya, kedelai hijau, daun dadih (Okara), tahu goreng), sayuran, dan sebagian besar jamur sangat dianjurkan untuk keadaan asam urat, hiperurisemia, dan penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, sereal bagi pasien *arthritis gout* dapat menjadi alternatif asupan bergizi sebagai penurun kadar asam urat tubuh.

#### **E. Bahan-Bahan Pembuat Sereal *Flakes***

##### **a. Bahan Dasar**

Gandum dan jagung adalah komponen utama *flakes* yang biasanya tersedia di pasaran. Singkong adalah bahan baku lain yang dapat digunakan, dan tersedia melimpah di Indonesia. (Susanti dkk., 2017).

##### **b. Bahan tambahan sereal**

Menurut Permenkes Nomor 1 Tahun 2015, sereal dapat dicampurkan bahan makanan seperti : gula, malt, madu, garam, maupun lainnya (BPOM RI, 2015).

## F. Uraian bahan Sereal *Flakes*

Digunakan bahan berikut ini.

### a. Tepung Jagung

Menurut BPOM RI (2015), tepung jagung merupakan biji jagung (*Zea mays* Linn) yang dihaluskan dengan cara digiling maupun ditumbuk. Dalam pembuatan sereal *flakes* digunakan tepung jagung. Menurut Ramadhani et al. (2012), nilai gizi jagung sebanding dengan terigu, bahkan memiliki kandungan pangan fungsional seperti serat makanan, zat besi, dan beta-karoten (provitamin A). Diketahui bahwa penderita gout memerlukan makanan berserat tinggi. Menurut Inglett (1987) yang dikutip dari Ramadhani, Izzati, & Parman (2012), jagung memiliki kandungan serat cukup tinggi, yaitu sebesar 86,7% pada bobot kering. Dengan demikian, tepung jagung dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan sereal flakes dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn). Menurut USDA (*United States Departement of Agriculture*), adapun kandungan gizi tepung jagung adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kandungan Zat Gizi Tepung Jagung dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
<b>Kalori</b>	361 kal
<b>Total Lemak</b>	3.9 g
<b>Sodium</b>	5 mg
<b>Total Karbohidrat</b>	76.9 g
Serat	7.3 g
Gula	0.6 g
<b>Protein</b>	6.9 g
Kalsium	7 mg
Zat Besi	2.4 mg
Kalium	315 mg

### b. Susu Skim Bubuk

Hasil susu yang masih ada setelah krim diambil sebagian atau seluruhnya disebut susu skim. Meskipun susu skim memiliki lebih sedikit lemak dan vitamin yang larut dalam lemak, susu skim masih mengandung semua komponen susu. Berdasarkan penelitian Álvarez-Lario & Alonso-Valdivielso (2014), diamati bahwa beberapa makanan memiliki efek perlindungan terhadap hiperurisemia dan asam urat, terutama produk susu skim, sayuran, dan serat. Mereka yang minum susu sekali atau lebih dalam sehari memiliki jumlah asam urat yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak. Terdapat faktor urikosurik pada susu (berfungsi meningkatkan ekskresi asam urat melalui urin). Dengan demikian, susu skim menjadi asupan nutrisi yang diperlukan oleh penderita gout.

Menurut USDA, adapun kandungan gizi susu skim bubuk dalam 100 gram adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Susu Skim Bubuk dalam 100 gram

<b>Komposisi Zat Gizi</b>	<b>Jumlah Zat Gizi</b>
<b>Kalori</b>	34 kal
<b>Total Lemak</b>	0.08 g
<b>Kolesterol</b>	20 mg
<b>Sodium</b>	535 mg
<b>Total Karbohidrat</b>	4.96 g
Gula	5.09 g
<b>Protein</b>	3.37 g
Kalsium	122 mg
Zat Besi	0.42 mg
Kalium	156 mg

### c. Margarin

Margarin adalah emulsi air dan minyak dengan setidaknya 80% lemak. Lemak yang digunakan berasal dari lemak nabati seperti minyak biji kapas, minyak kedelai, minyak kelapa, dan minyak sawit. Dalam 100 gram minyak nabati terdapat 50–72 gram (Winarno, 2008). Margarin biasanya memiliki komposisi sebagai berikut: lemak 80 hingga 81%, susu skim 14 hingga 16%, garam 3%, pengemulsi 0,5%, dan vitamin 2,5% (Ulfa dkk., 2017). Mentega, margarin, dan lemak yang digunakan dalam kembang gula adalah contoh lemak yang dapat dicerna tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Jenis lemak lain yang digunakan dalam makanan dimasak bersama komponen lain atau berfungsi sebagai media transmisi panas. Selain itu, penambahan lemak berfungsi untuk meningkatkan jumlah kalori dan meningkatkan rasa dan tekstur bahan makanan (Ulfa et al., 2017).

Menurut USDA, adapun kandungan gizi margarin dalam 100 gram adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Kandungan Zat Gizi Margarin dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
<b>Kalori</b>	717 kal
<b>Total Lemak</b>	81.1 g
Lemak Jenuh	2.9 g
<b>Sodium</b>	733.1 mg
<b>Total Karbohidrat</b>	0.06 g
<b>Protein</b>	0.85 g
Kalsium	24 mg
Zat Besi	0.02 mg
Kalium	24 mg
Natrium	643 mg

Berdasarkan (Niagara Health System, n.d.), untuk pasien dengan penderita *arthrtisis gout* dibatasi mengkonsumsi mentega, margarin, minyak, dan saus salad 3-6 sendok teh perhari. Hal ini menganjurkan pendeirta asam urat boleh mengkonsumsi mentega dalam jumlah terbatas. Dengan demikian, margarin dapat digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan sereal flakes dari buah sirsak (*Annona mucirata* Linn).

#### d. Vanili

Negara tropis seperti Indonesia membudidayakan tanaman rempah vanili (*Vanilla planifolia*). Tumbuhan ini terkenal penggunaannya sebagai bahan tambahan penyedap makanan, minuman, kue, es krim, obat-obatan, dan sebagai bahan dasar parfum (Mesak, 2010). Ada rasa vanila alami dan buatan. Aroma yang dihasilkan perisa vanila sintetik tidak sekuat aroma ekstrak vanili alami karena hanya mengandung satu komponen perasa vanila yaitu vanilin atau etil vanillin. Lebih dari 100 bahan kimia yang mudah menguap, termasuk karbonil aromatik, alkohol aromatik, asam aromatik, ester aromatik, fenol dan ester fenol, alkohol alifatik, karbonil, asam, ester, dan lakton, hadir dalam rasa vanila alami, dengan aldehida vanillin menjadi yang paling dominan. Menurut USDA, adapun kandungan gizi perisa vanili dalam 100 gram adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Kandungan Gizi Perisa Vanili dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
<b>Kalori</b>	43 kal
<b>Total Lemak</b>	0.8 g
<b>Total Karbohidrat</b>	8 g
Gula	1.9 g
<b>Protein</b>	1.2 g
Kalsium	8 mg
Natrium	35 mg

Bergantung pada bagaimana dan di mana ditanam, setiap varietas ekstrak vanila memiliki aroma yang unik. Ada banyak varietas ekstrak vanili, seperti Guadeloupe Vanillin, Mexican Vanilla, Tahiti Vanilla, dan Indonesian Vanilla. Vanili Indonesia biasanya memiliki profil wewangian kayu dan fenolik sebagai hasil dari proses pengeringan yang terlalu cepat. (Dwi Setyaningsih, Rusli, & Nurmalia Muliati, 2007). Dengan demikian, vanili dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan sereal flakes dari buah sirsak (*Annona mucirata* Linn).


#### e. Gula Stevia

Stevia adalah pemanis alami yang dapat ditemukan di Jepang dan Amerika Selatan dan berasal dari daun tanaman *Stevia rebaudiana* Bertoni di Paraguay. Sebagai pemanis alami non-kalori, daun stevia memiliki rasa manis yang 70 hingga 400 kali lebih manis dari gula tebu. Stevia banyak digunakan sebagai pengganti gula buatan, yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, terutama jika diminum secara berlebihan dan tidak mengandung kalori, bahan tambahan kimia, atau efek samping utama. Penggunaan komersial ekstrak stevia sebagai pemanis untuk produk seperti kecap, sayuran, dan minuman ringan cukup umum (Raini & Ismawati, 2012). Menurut USDA, adapun kandungan zat gizi gula pasir dalam 100 gram adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Kandungan Zat Gizi Gula Pasir dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Jumlah Zat Gizi
<b>Kalori</b>	0 kal
<b>Total Lemak</b>	0 g
<b>Total Karbohidrat</b>	10 g
Gula	0 g
Natrium	0 mg

Gambar 5. Struktur Kimia Steviol



Turunan steviol, terutama stevioside (4–15%), rebaucid A (2-4%) dan C (1-2%), dan dulcoside A (0,4-0,7%), merupakan bahan utama dalam daun stevia. Rasa, aroma, tampilan, dan tingkat kemanisan adalah indikator kualitas pemanis stevia. Stevia tidak memiliki sisa rasa yang keras, berbeda dengan pemanis lainnya. Molekul kompleks yang dikenal sebagai stevioside, glikosida yang terdiri dari glukosa, sophorose, dan steviol, inilah yang memberi pemanis dalam stevia karakteristik uniknya. Berdasarkan lebih dari 500 penelitian, stevia memiliki sejumlah keunggulan, seperti aman bagi penderita diabetes, tidak berdampak pada kadar gula darah, menghindari kerusakan gigi dengan menahan pertumbuhan kuman di mulut, serta membantu pencernaan dan merawat lambung. nyeri. Membatasi makanan manis berkalori tinggi bermanfaat untuk manajemen berat badan. Stevia dapat menahan panas hingga 200°C sehingga dapat digunakan di hampir semua resep (Raini & Ismawati, 2012).

#### f. *Baking Powder*

*Baking Powder* adalah bahan tambahan yang dapat menghasilkan gas CO<sub>2</sub> hingga jenuh dan kemudian melepaskan gas secara konsisten selama proses pemanggangan, *baking powder* memperbaiki tekstur makanan. Hasilnya adonan mengembang dengan benar, susut tetap terjaga, dan remah-remahnya homogen. Dalam produksi sereal, *baking powder* membantu menciptakan volume, mengatur aroma, menyebarkan tekstur, dan membuat produk akhir menjadi ringan. (Marsigit, dkk., 2017).

Menurut USDA, adapun kandungan zat gizi baking powder dalam 100 gram adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Kandungan Zat Gizi Soda Kue dalam 100 gram

<b>Komposisi Zat Gizi</b>	<b>Jumlah Zat Gizi</b>
<b>Kalori</b>	354 kal
<b>Total Lemak</b>	16.3 g
<b>Total Karbohidrat</b>	44.6 g
Gula	2.2 g
Kalsium	234 mg
Zat Besi	2.9 mg
Natrium	578 mg

#### **g. Garam**

Garam adalah bahan padatan berwarna putih, berbentuk kristal, bersifat higroskopis dan terbentuk lebih dari 80% garam, yang juga mengandung magnesium klorida ( $MgCl_2$ ), kalsium klorida ( $CaCl_2$ ), dan magnesium sulfat ( $MgSO_4$ ) ( $CaCl_2$ ). Garam mengawetkan makanan agar tidak terasa kusam, menambah warna, dan berfungsi sebagai penyedap rasa. Menurut FatSecret (2008), 100 gram garam memberikan nutrisi sebagai berikut.

Tabel 9. Kandungan Zat Gizi Garam dalam 100 gram

<b>Komposisi Zat Gizi</b>	<b>Jumlah Zat Gizi</b>
Sodium	38758 mg
Kalsium	24 mg
Kalium	8 mg
Zat Besi	0.33 mg

### **G. Proses Pembuatan Sereal *Flakes***

*Flakes* biasanya dibuat dengan memanaskan adonan lalu memasukkannya di antara dua rol baja untuk meratakannya, lalu memanggang dan mengeringkannya pada suhu tinggi. (Tribelhorn, 1991) (Susanti dkk., 2017).

### **H. Evaluasi Sereal**

#### **a. Uji Organoleptik**

Berdasarkan selera dan kesiapan menilai produk, pengujian organoleptik mengevaluasi bahan makanan. Kualitas sensorik digunakan dalam evaluasi makanan untuk mengukur penerimaan suatu produk. Enam langkah membuat evaluasi sensorik, yaitu menerima materi, mengidentifikasinya, mendefinisikan atributnya, mengingat materi yang telah dilihat, dan menyatakan kembali karakteristik sensorik produk. Bahan makanan biasanya ditentukan oleh sejumlah variabel, antara lain warna, rasa, tekstur, aroma, dan kandungan gizi. (Astuti, Liviawaty, & Subiyanto, 2021).

Selama pengujian, panelis diminta untuk menyatakan tingkat kesukaannya. Skala hedonis, yang dibentangkan sesuai dengan rentang skala preferensi, adalah nama yang diberikan untuk tingkat preferensi ini. Skala hedonistik dapat diukur menjadi skala numerik dengan penomoran angka mutu tingkat kesukaan (Astuti et al., 2021).

#### **b. Analisis Proksimat**

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan nilai gizi dari sediaan yang diuji dalam skala ilmiah. Pengujian keberadaan air, abu, lemak, protein, serat, dan karbohidrat berfungsi sebagai analisis proksimat.

##### **1) Kadar Air**

Ketika *flakes* buah sirsak dikeringkan dalam oven pada suhu sekitar 100°C, jumlah air yang ada diukur untuk menentukan kehilangan berat akibat penguapan air dari bahan kering. Semua makanan disiapkan menggunakan metode ini, kecuali

makanan yang mengandung bahan yang mudah menguap atau rusak saat dipanaskan hingga 100 °C (Yenrina, 2015).

## 2) Kadar Karbohidrat

Jumlah total karbohidrat dalam sereal *flakes* buah sirsak ditentukan dengan menggunakan pengukuran kuantitatif menggunakan indikator pati dan metode titrasi larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ . Pati, gula, pektin, dan selulosa adalah beberapa jenis karbohidrat yang terdapat dalam berbagai makanan. Kandungan gizi pada nasi sebagian besar terkandung dalam bentuk karbohidrat, terutama dalam bentuk pati. (Susanti et al., 2017).

## 3) Kadar Serat

Banyaknya lemak dalam sereal yang terbuat dari serpihan buah sirsak yang diperoleh dari serat larut dan tidak larut merupakan kandungan serat yang dimaksud. Serat makanan adalah bahan makanan, seperti kumpulan polisakarida, yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan tubuh. Serat makanan larut dan tidak larut membentuk serat makanan total. Serat makanan tidak larut tidak dapat larut dalam air panas atau dingin, tetapi serat makanan larut dapat larut dalam air hangat atau panas (Susanti et al., 2017).

## 4) Kadar Abu

Abu adalah komponen mineral yang tersisa setelah suatu zat dibakar sampai semua jejak karbon dihilangkan. Pembakaran dan radiasi senyawa organik atau kandungan abu bahan alami atau mineral yang tidak mudah menguap. Kualitas produk akhir pada *flakes* dipengaruhi oleh kadar abu yang dihasilkan (Susanti et al., 2017).

## 5) Kadar Protein

Untuk pertumbuhan tubuh, protein sangat penting, terutama untuk sel-sel jaringan. Gluten merupakan bahan yang bersifat elastis dan kenyal yang terdapat pada

tepung terigu. Protein dan gluten sangat erat hubungannya satu sama lain. Jumlah gluten dalam tepung meningkat dengan peningkatan kandungan protein dan sebaliknya (Susanti et al., 2017).

#### 6) Kadar Lemak

Kombinasi tepung jagung dan margarine menghasilkan kandungan lemak pada *flakes*. Makanan yang dipanggang seperti biskuit, *flakes*, dan kue kering mendapat manfaat dari aksi pemendekan lemak tepung jagung karena beraroma dan renyah. Lemak dengan demikian meningkatkan struktur fisik dengan menyebabkan adonan mengembang dan dengan menyebabkan tekstur makanan menjadi lebih lembut (Susanti et al., 2017).

#### c. Uji Antioksidan

Menurut Rahmawati, Sinardi, & Iryani (2017), uji ini bertujuan dalam mengamati potensi antioksidan sampel sereal *flakes* dari buah sirsak menggunakan metode DPPH (2,2 difenil-1-1- pikrihidrazil).

### E. Tinjauan Islam

Dalam kehidupan, tumbuhan dan manusia sangat erat hubungannya. Manusia mendapat manfaat dari tumbuhan dengan berbagai cara, namun terdapat banyak tumbuhan di sekitar kita yang kegunaannya masih belum diketahui. Seluruh makhluk Allah Subhanahu Wata'ala menikmati berkah dan nikmat dari tumbuhan ciptaan-Nya.

Allah Subhanahu Wata'ala menunjukkan berbagai hikmah dalam menciptakan segala sesuatu. Hal ini sebagaimana terdapat pada firman Allah subhanahu wata'ala QS As-syu'ara /26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kementerian Agama, 2019).

Kata (إِلَى) ila/ ke pada firman-Nya di awal ayat ini “أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ”

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi”, adalah frasa yang menunjukkan tenggat waktu. Bagian ini mendesak manusia agar menggunakan penglihatan mereka sebaik mungkin agar mereka dapat melihat seluruh dunia, termasuk seluruh tanah, tumbuhan, serta keajaiban alam di muka bumi. Tujuannya adalah untuk memperluas bidang penglihatan hingga potensi maksimalnya. Bagi individu yang tidak mendasarkan pendapatnya pada bukti kuat tersebut, frasa ini juga berfungsi sebagai pertanyaan dengan bentuk keheranan. (Shihab, 2002).

Istilah (زَوْج) zauj bermakna pasangan. Pasangan dalam ayat ini mengacu pada pasangan tanaman, seperti yang tumbuh di celah-celah tanah yang memanjang di atas bumi. Ini menjelaskan mengapa mitra diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Istilah (كَرِيم) karim digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang positif tentang hal-hal yang digambarkannya. Tanaman yang subur dan praktis adalah tanaman yang baik (Shihab, 2002).

Apakah mereka tidak akan pernah mengamati dan merenungkan ciptaan Allah di dunia ini untuk membentengi diri mereka dari keraguan dan penipuan? Memang, jika mereka memperhatikannya dan merenungkannya, mereka akan menerima arahan. Kamilah adalah yang menghasilkan beragam tumbuhan yang baik dari tanah ini. Satu-satunya yang dapat melakukan keseluruhan hal tersebut adalah Allah Yang Mahakuasa (Shihab, 2002).

Tanaman yang dimaksud adalah buah sirsak, yang memiliki khasiat unik dan banyak manfaat bagi manusia, khususnya dalam pengobatan penyakit asam urat. Buah sirsak memiliki potensi antioksidan karena kandungan vitamin C dan komponen

polifenolnya yang tinggi. Melalui penghambatan kompetitif dengan substrat dari golongan *xanthine*, aktivitas antioksidan ini dapat mencegah kerja *xanthine oxidase*, sehingga dapat mencegah produksi asam urat (Prasetyorini, dkk. 2014).

Oleh karena tanaman sirsak mudah diakses, aman, dan harganya terjangkau, masyarakat telah membudidayakannya secara luas untuk digunakan dalam pencegahan dan pengobatan banyak penyakit. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, buah sirsak terbukti dapat berkhasiat sebagai penurun kadar asam urat, hal tersebut dapat didasarkan bahwa suatu penyakit dapat sembuh jika manusia berdoa dan berikhtiar dengan berobat. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda,

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ الْعَمِّيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ إِنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ  
الدَّوَاءَ فَتَدَاوُوا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Harb berkata, saya telah mendengar 'Imran yang buta berkata, saya mendengar Anas berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla ketika menciptakan penyakit, juga menciptakan obat, maka berobatlah kalian." (HR. Abu Daud: 3357).

Asam urat adalah suatu kondisi yang terutama menyerang orang dewasa di usia pertengahan hingga akhir tahun dan disebabkan oleh tingginya kadar asam urat yang menumpuk di persendian.

Dalam QS Al-Furqon /25:2, Allah berfirman sebagai berikut.

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ  
شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۚ

Terjemahnya :

“(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”  
(Kementerian Agama, 2019).

Manusia yang hidup di dunia ini telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wata'ala berupa makanan, minuman, dan kehidupan yang nyaman sesuai dengan ukurannya sehingga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjaga kesehatan, mengontrol pola makan seimbang berdasarkan ukuran, dan menghindari kelebihan adalah salah satunya. Banyak orang menderita sejumlah penyakit, terutama asam urat, yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak seimbang dan tidak tepat, termasuk penggunaan makanan dan minuman berbahaya seperti alkohol dan makanan kaya purin, yang meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Diantara makanan yang baik adalah sarapan pagi dengan asupan yang bergizi, seperti mengonsumsi sereal. Sereal adalah sarapan yang relatif murah, bergizi serta sebagai diet seimbang yang sehat. Sereal merupakan olahan makanan yang dibuat dari tepung tumbuh-tumbuhan dan praktis dikonsumsi.

Perkembangan teknologi yang maju membuat para ilmuwan melakukan penelitian terkait tanaman obat yang berpotensi menurunkan kadar asam urat pada tubuh, khususnya buah sirsak.

Allah subhanahu wataa'ala berfirman pada QS Ali-Imran/3:190 sebagai berikut.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal.”  
(Kementerian Agama, 2019)

Pada tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Shihab (2002) menjelaskan bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia untuk mempertimbangkan sebagian kecil dari ciptaan-Nya yang telah Dia gambarkan. “Sesungguhnya dalam penciptaan”, yaitu terjadinya dan perputaran bumi dan porosnya, sehingga menimbulkan silih bergantinya perbedaan malam dan siang, sebagai bukti kemahakuasaan Allah bagi ulul albab, yakni orang-orang yang berakal murni, pada penciptaan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan jutaan gugus bintang di langit serta pengaturan sistem kerja langit yang cermat.

Istilah (الألباب) al-albab merupakan bentuk jamak dari “lubb” adalah inti dari sesuatu. Kacang, misalnya isiannya dilindungi oleh kulit kacang. Lubb adalah nama isian kacang. Orang yang Ulul Albab memiliki pikiran murni yang bebas dari "kulit" konsep, yang dapat mengaburkan penilaian mereka dan menyebabkan mereka melakukan kesalahan. Mereka yang merenungkan proses alam semesta akan dapat menemukan bukti yang sangat meyakinkan tentang keesaan dan kekuasaan Allah subhanahu wata'ala (Shihab, 2002).

Hal ini mengandung makna bahwa banyak pelajaran dan hikmah yang harus dipetik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia di balik semua kekuatan Allah subhanahu wata'ala yang telah dimanifestasikan kepada manusia. Agar ada khalifah di muka bumi, maka mendorong manusia untuk mencari dan mendapatkan hikmah yang dikandungnya.

Dengan demikian adanya penelitian terkait formulasi makanan sehat dari buah sirsak yang bertujuan sebagai penurunan kadar asam urat diharapkan sebagai upaya manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang menjadi hikmah dan petunjuk untuk menuju kebahagiaan dan kehidupan yang baik.

## BAB III

### METODE KERJA

#### A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

##### 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimental. Dalam pengaturan terkontrol, teknik eksperimental digunakan untuk menentukan bagaimana perlakuan tertentu mempengaruhi variabel lain. (Sugiyono, 2015).

##### 2. **Lokasi Penelitian**

Laboratorium Riset Kimia Fakultas Sains dan Teknologi, Laboratorium Biologi, dan Laboratorium Farmasetika Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, Laboratorium Kimia Pakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menjadi lokasi penelitian ini.

##### 3. **Waktu Penelitian**

Riset dilakukan bulan Juni-Desember 2022.

#### B. *Pendekatan Penelitian*

Dilakukan pendekatan kuantitatif berupa pengujian sereal *flakes* buah sirsak (*Annona muricata* Linn) sebagai makanan alternatif bagi penderita asam urat.

#### C. *Populasi dan Sampel*

##### 1. **Populasi**

Populasi yang digunakan yaitu tanaman buah sirsak (*Annona muricata* Linn).

## 2. Sampel

Penelitian ini menggunakan daging buah sirsak (*Annona muricata* Linn) yang diperoleh dari Bantaeng, Sulawesi Selatan.

### a. Kriteria Inklusi

Berikut kriteria inklusi ciri-ciri sampel penelitian pada populasi yang diteliti :

- 1) Buah sirsak yang telah matang, permukaan buah lembek dan lunak
- 2) Warna buah sirsak hijau muda
- 3) Daging buah sirsak berwarna putih bersih, lembut dan berair

### b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah hal-hal yang menghalangi sampel untuk memenuhi persyaratan dan mencegahnya untuk diikutsertakan dalam penelitian, yaitu :

- 1) Buah sirsak yang belum matang, permukaan buah padat dan keras
- 2) Warna buah sirsak hijau tua
- 3) Daging buah sirsak berwarna putih kekuningan dan berserat

## D. Alat dan Bahan

### 1. Alat

Blender *Miyako*<sup>®</sup>, mangkok, sendok kayu, cetakan *flake*, pengayak, loyang, mixer, pemotong, gilasan, wadah plastik, spatula, cawan porselin, desikator *Nalge*<sup>®</sup>, tanur *Nobertherm*<sup>®</sup>, oven *Mito*<sup>®</sup>, timbangan digital *Fleco*<sup>®</sup>, neraca analitik *Kern*<sup>®</sup>, kertas perkamen, erlenmeyer *Iwaki*<sup>®</sup>, *shiever shaker Vortex*<sup>®</sup>, Spektrometer UV-Vis *Varian Cary 50*<sup>®</sup>, gegep kayu, rak tabung, dan tabung reaksi *Iwaki*<sup>®</sup>.

### 2. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu buah sirsak (*Annona muricata* Linn), tepung jagung *Meizena*<sup>®</sup>, susu skim bubuk *Indo Sehat*<sup>®</sup>, margarin butter *Palmia*<sup>®</sup>, gula stevia

*Tropicana Slim*<sup>®</sup>, perisa vanila *Koepoe*<sup>®</sup>, baking powder *Cap dua burung*<sup>®</sup>, garam, aluminium foil, DPPH, etanol *pro analysis*, vitamin C, dan aquadest.

## E. Prosedur Kerja

### 1. Penyiapan Sampel

Untuk mendapatkan sari buah sirsak, daging buahnya kemudian diblender dan disaring. Produk akhir, sereal *flake* siap untuk diproses.

### 2. Pembuatan Formula Sereal *Flakes*

Formulasi sereal *flakes* buah sirsak dengan takaran sesuai tabel 10. Dosis buah sirsak yang dikonsumsi sehari-hari berkisar antara 100 hingga 300 gram (Prasetyorini, dkk., 2014). Total adonan adalah 233,6 gram dan total tepung komposit (buah sirsak dan tepung jagung) adalah 200 gram. Adapun perbandingannya sebagai berikut.

Formula 1 = Buah sirsak : Tepung Jagung 50% : 50%

Formula 2 = Buah sirsak : Tepung Jagung 62.5% : 37.5%

Formula 3 = Buah sirsak : Tepung Jagung 75% : 25%

Tabel 10. Formulasi Sereal *Flakes* Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn)

Bahan	Formula 1 (g)	Formula 2 (g)	Formula 3 (g)	Fungsi
Buah sirsak	100	110	120	Zat Aktif
Tepung Jagung	100	90	80	Pengikat
Susu Skim Bubuk	2	2	2	Perasa
Baking Powder	2	2	2	Pengembang
Gula Stevia	8	8	8	Pemanis
Margarin <i>Butter</i>	20	20	20	Pelumas
Perisa Vanila	0,6	0,6	0,6	Penyedap
Garam	1	1	1	Penyedap

### 3. Proses Pembuatan Sereal *Flakes*

Diaduk margarin *butter* hingga berwarna putih, kemudian gula stevia, susu skim bubuk, baking powder, dan perisa vanilla dicampur hingga rata. Selanjutnya dimasukkan sari buah sirsak dan tepung jagung lalu diaduk kembali hingga homogen. Setelah agak kalis kemudian adonan dicetak menggunakan cetakan biskuit sesuai dengan ketebalan yang seragam supaya menyerupai *flakes*, kemudian adonan yang telah tercetak disusun diatas loyang yang telah dilapisi aluminium foil. Setelah itu dipanggang selama 150 menit pada suhu 110°C. Setelah matang, *flakes* dikemas pada kemasan tertutup yang telah diberi silika gel *food grade* untuk dianalisis uji organoleptik dan kandungan proksimatnya (Susanti et al., 2017).

#### F. Uji Organoleptik

Sebanyak 36 panelis menilai setiap variasi serealisa serpih buah sirsak. Serpihan yang disiapkan dan formulir uji organoleptik. Kemudian panelis diberikan penjelasan mengenai pengujian yang akan dilakukan, dengan menjelaskan urutan penilaian yang dilakukan seperti warna, aroma, tekstur dan rasa. Selanjutnya panelis melakukan uji organoleptik tanpa membandingkan antar sampel dan dicatat pada kertas yang telah disediakan oleh peneliti dengan skala hedonik 1-4. Langkah yang sama diulangi untuk penilaian warna, aroma, tekstur dan rasa. Pengujian harus dilakukan secara berurutan agar hasil yang diperoleh valid. Air diberikan kepada panelis agar penilaian tidak bias (Wardani, Liviawaty, & Junianto, 2012).

Tabel 11. Skala Hedonik

Skala Hedonik	Skala Numerik
Sangat suka	4
Suka	3
Agak Suka	2
Tidak Suka	1

Untuk memastikan apakah perlakuan penelitian memberikan dampak yang besar atau tidak, maka data hasil penelitian organoleptik menggunakan pendekatan kualitas sensori dianalisis berdasarkan tingkat kualitas setiap parameter yang diolah menggunakan program SPSS 16. Uji Duncan kemudian digunakan untuk menentukan perbedaannya. Tidak perlu dilakukan uji Duncan jika hasil analisis varian ANOVA  $p > 0,05$  (tidak berbeda secara signifikan) (Susanti et al., 2017).

### **G. Prosedur Analisis Proksimat**

#### **1. Analisis Kadar Air**

Metode oven digunakan untuk mengukur kadar air. Proses pengeringan cawan yang akan digunakan membutuhkan waktu 30 menit atau hingga beratnya stabil. Kemudian ditimbang setelah didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Sebanyak 5 gram (B1) sampel ditimbang dalam cawan pada suhu 100–105°C hingga tercapai berat yang stabil (8-12 jam). Sampel ditimbang setelah didinginkan dalam desikator selama 30 menit (B2). Berikut adalah cara penghitungan kadar air basis kering (DB) (AOAC, 2005).

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{B1 - B2}{B2} \times 100\%$$

#### **2. Analisis Serat Kasar**

Sampel ditimbang sebanyak 2,5 gram, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer runcing 250 mL, ditambahkan 200 mL larutan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 0,255 N, dan campuran tersebut kemudian dipanaskan di atas hot plate selama 30 menit. Akuades panas digunakan untuk mencuci endapan dari larutan hingga netral (ditentukan dengan kertas lakmus), setelah itu residu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 750 mL. Setelah penambahan 200 mL larutan NaOH 0,313 N, campuran dipanaskan lagi selama 30 menit sebelum disaring panas menggunakan corong buncher dan kertas saring (berat kertas saring telah ditentukan dan dikeringkan) (W1). Produk filter secara bertahap dibilas dengan 15 mL K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%, 50 mL air suling panas, dan 15 mL etanol 96% sambil tetap ditarik

ke dalam corong Buncher. Setelah sampel dicuci, kertas yang sudah mulai kering dikeluarkan, dikeringkan pada suhu 105°C, didinginkan dalam desikator selama 15 menit, kemudian ditimbang untuk menentukan berat konstannya (W2). Persamaan digunakan untuk menghitung kandungan serat kasar (1) (AOAC, 2005).

$$\text{Kadar Serat Kasar (\%)} = \frac{W1 - W2}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

### 3. Kadar Karbohidrat

Sejumlah 3 gram sampel ditimbang, dan Erlenmeyer 500 ml diisi sampel dengan ditambahkan 200 ml HCl 3% dan beberapa butir batu panas. Kondensor dihubungkan, lalu dididihkan selama 3 jam. Larutan kemudian dinetralkan menggunakan NaOH 4 N (uji kualitatif menggunakan kertas lakmus), dan ditambahkan 1 ml CH<sub>3</sub>COOH pekat karena larutan berfungsi paling baik dalam lingkungan asam. Setelah ditepatkan dengan tanda tera dan dituang ke dalam labu takar 250 ml, lalu disaring. Setelah didapatkan filtrat, 10 ml dipipet ke dalam erlenmeyer 500 ml dan ditambahkan 25 ml larutan *luff schoorl*. Selanjutnya, dididihkan larutan selama dua menit dan dididihkan terus selama 10 menit menggunakan *waterbath*. Selanjutnya, didinginkan dengan es batu. Tambahkan 15 ml KI 30% dan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 25% 25% secara bertahap setelah pendinginan. Titrasi setelah itu menggunakan larutan Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0,1 N dan indikator kanji 0,5%. Kuning adalah tanda bahwa pati baru perlu ditambahkan. kemudian tentukan jumlah karbohidratnya (Yenrina, 2015).

### 4. Kadar Abu

Dengan menggunakan proses pengabuan kering, kadar abu ditentukan. Prinsip dasar pada pengujian ini adalah pembakaran seluruh bahan organik pada suhu tinggi (sekitar 500–600 °C), setelah itu residu dari proses pembakaran ditimbang. Cawan yang akan digunakan dikeringkan dalam oven dengan suhu 100-105°C selama 30 menit, atau hingga tercapai berat konstan. Kemudian ditimbang setelah didinginkan selama 30 menit dalam desikator. Sampel sebanyak 5 gram dimasukkan ke dalam

cawan yang telah diketahui beratnya dan dibakar di atas kompor listrik atau bunsen sampai tidak ada asap yang dihasilkan. Kemudian ditempatkan di tanur pengabuan dan dipanaskan hingga 400°C, dimana sampel dibakar sampai diperoleh abu abu atau berat tetap tercapai (B1). Kemudian, selama 12 sampai 24 jam, suhu tanur dinaikkan menjadi 600°C. Sampel kemudian ditimbang setelah didinginkan dalam desikator selama 30 menit (B2). Kandungan abu dihitung sebagai berikut. (AOAC, 2005) (Sunartaty & Yulia, 2017).

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{B1 - B2}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

## 5. Kadar Protein

Metode Kjeldahl digunakan untuk menentukan kandungan protein. Prinsip destruksi, distilasi, dan titrasi dari metode analisis protein Kjeldahl berlaku. Pada tahap destruksi, sampel ditimbang kemudian dibagi menjadi 0,1-0,5 g, yang kemudian dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl bersama dengan 40 mg HgO, 1,9 mg K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, dan 2 ml H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>. Alat pemanas dengan suhu 430°C dalam ruang asam digunakan untuk memanaskan labu yang berisi larutan. Sampai berwarna bening, destruksi dilakukan (1-1,5 jam). Hasil kemudian didinginkan dan secara bertahap diencerkan dengan 10-20 ml air suling.

Persiapan alat sistem Kjeltec memulai fase destilasi. Sampel yang disiapkan digunakan untuk memulai analisis setelah dicerna. Sampel hasil digesti ditempatkan dalam labu Kjeldahl, yang kemudian dipindahkan ke alat distilasi. Kemudian dibilas dan dicuci lima sampai enam kali dengan 1-2 ml air suling, dan air bilasan dan pencuci juga dimasukkan ke dalam alat destilasi. Sesaat sebelum distilasi dimulai, dimasukkan ke dalam erlenmeyer sebanyak 125 ml yang berisi 5 ml larutan HBO<sub>3</sub> (asam borat) dan 2-4 tetes indikator (campuran 2 bagian metil merah 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian biru metilen 0,2% dalam alkohol). Ujung kondensor harus direndam dalam larutan H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> (asam borat). Sertakan sampel yang dicerna yang dipindahkan bersama dengan

larutan NaOH-Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (natrium tiosulfat) sebanyak 8 hingga 10 ml. Selanjutnya dilanjutkan penyulingan sampai Erlenmeyer dapat menampung tidak lebih dari 15 ml destilat. Gunakan air suling untuk membilas tabung kondensor, lalu kumpulkan bilasan di Erlenmeyer yang sama. Isi Erlenmeyer kemudian diencerkan sekitar 50 ml, selanjutnya dilanjutkan ke tahap titrasi.

Sampel yang telah didestilasi lalu dititrasi menggunakan buret dan HCl 0,02 N. Titrasi dilanjutkan sampai warna larutan sampel berubah menjadi merah muda. Dicatat berapa banyak HCl yang digunakan (A dan B (ml)). Selanjutnya ditentukan kandungan protein dengan menggunakan rumus di bawah ini. (AOAC, 2005).

$$\% N = \frac{(A - B) \times N \text{ HCl} \times 14}{\text{Berat sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$\text{Kadar protein} = \% N \times \text{Faktor konversi (6.25)}$$

## 6. Kadar Lemak

Metode soxhlet digunakan untuk menghitung kandungan lemak. Prinsip dasar pada analisis ini adalah mengekstraksi lemak menggunakan pelarut n-heksana, kemudian menimbang lemak dan menentukan persentasenya setelah pelarut menguap. Lemak kasar adalah produk akhir.

Labu lemak dikeringkan selama 30 menit pada suhu 105°C dalam oven, selanjutnya didinginkan selama 15 menit dalam desikator, lalu ditimbang (A). Sebanyak 5 gram sampel ditimbang, kemudian dibungkus dengan kertas saring dan ditempatkan dalam selongsong lemak. Ruang ekstraktor tabung soxhlet diisi dengan kapas bebas lemak, selongsong lemak ditempatkan di dalamnya, dan tabung kemudian dihubungkan ke alat distilasi soxhlet.

Setelah itu, labu lemak yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam alat destilasi di atas pemanas listrik yang diatur suhunya sekitar 80 T. Refluks dilakukan minimal selama lima jam, atau hingga pelarut yang kembali ke labu lemak menjadi

jernih. Pelarut labu lemak didestilasi, dan labu berisi hasil ekstraksi kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 60 menit, atau sampai bobotnya tetap. Labu lemak kemudian ditimbang setelah didinginkan dalam desikator selama 20 sampai 30 menit (B) (AOAC, 2005).

$$\text{Kadar Lemak (\%)} = \frac{B - A}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

## H. *Pengujian Antioksidan*

### A. **Pembuatan Larutan DPPH 0.2 mM**

Sebanyak 3,9433 mg DPPH ditimbang, dan 50 ml etanol ditambahkan ke labu ukur untuk melarutkannya (Rahmawati et al., 2017). Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum (Panjang gelombang maksimum ditentukan menggunakan larutan DPPH, diukur dengan serapan pada panjang gelombang 515 hingga 517 nm).

### B. **Pembuatan Larutan Induk Sereal *Flakes* 1000 ppm**

Sampel serbuk sereal *flakes* F1, F2, dan F3 masing-masing ditimbang hingga 10 mg kemudian dilarutkan dalam labu ukur 10 ml dan dilarutkan etanol hingga tanda tera. (Rahmawati et al., 2017).

### C. **Pembuatan Larutan Induk Baku Vitamin C 1000 ppm**

Serbuk Vitamin C ditimbang hingga 10 mg kemudian dilarutkan dalam labu ukur 10 ml dan dilarutkan etanol hingga tanda tera (Rahmawati dkk., 2017).

### D. **Pembuatan Larutan Uji Sampel Sereal *Flakes***

Dipipet ke dalam labu ukur 10 ml sejumlah 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml sereal *flakes* F1, F2, dan F3. Setiap labu ukur kemudian diisi dengan 1 ml larutan DPPH dan metanol sampai tanda tera. Setelah 30 menit inkubasi, absorbansi larutan ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 517 nm (Rahmawati et al., 2017).

### E. Pembuatan Larutan Pembanding Vitamin C

Dipipet ke dalam labu ukur 10 ml sejumlah 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml Vitamin C. Setiap labu ukur kemudian diisi dengan 1 ml larutan DPPH dan metanol sampai tanda tera. Setelah 30 menit inkubasi, absorbansi larutan ditentukan menggunakan spektrofotometer UV-Visible pada panjang gelombang 517 nm (Rahmawati et al., 2017).

### F. Analisis Persen Pemerangkapan Radikal Bebas DPPH dan Nilai IC<sub>50</sub>

Aktivitas antioksidan ini merupakan suatu penangkal radikal yang dilihat melalui persen inhibisi seperti rumus berikut.

$$\% \text{ Inhibisi Radikal DPPH} = \frac{\text{Absorbansi Kontrol} - \text{Absorbansi Bahan Coba}}{\text{Absorbansi Kontrol}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan regresi linier menggunakan persamaan  $y=bx+a$ , dimana  $x$  adalah konsentrasi (ppm) dan  $y$  adalah persentase inhibisi (%), dilakukan setelah persentase inhibisi dari masing-masing konsentrasi dihitung. Konsentrasi penghambatan 50% (IC<sub>50</sub>), atau konsentrasi sampel yang dapat mereduksi radikal DPPH hingga 50%, merupakan ukuran aktivitas antioksidan. Setelah  $y$  diganti dengan 50, nilai IC<sub>50</sub> dihitung dari nilai  $x$ . (Yayan dkk., 2022).

### G. Analisis Data

Analisis probit pada aplikasi Microsoft Excel digunakan dalam mengolah nilai inhibisi % yang diperoleh untuk menentukan nilai IC<sub>50</sub>.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Produk Sereal *Flakes*

Tabel 12. Tahap Awal Pembuatan Sereal *Flakes*

Formula	Komposisi	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Daging buah sirsak yang sudah disaring	Pengeringan dengan penjemuran di bawah matahari $\pm 2$ jam dan <i>rice cooker</i> $\pm 10$ jam. Hasil disimpan pada suhu ruangan	Tekstur melempe Warna hitam kekuningan Bau khas sirsak Rasa sangat asam
2	Daging buah sirsak yang sudah disaring	Pengeringan dengan penjemuran di bawah matahari $\pm 4$ jam dan pemanggangan di oven $\pm 15$ menit .	Tekstur keras dan melempe Warna hitam pekat Bau khas sirsak gosong Rasa sangat asam pahit
3	Daging buah sirsak yang sudah disaring	Pengeringan dengan penjemuran di bawah matahari $\pm 4$ jam dan pemanggangan di oven $\pm 16$ menit tidak diolesi margarin.	Tekstur keras berserat dan melempe Warna hitam kecoklatan Bau khas sirsak Rasa sangat asam

4	Daging buah sirsak yang sudah disaring	Pengeringan dengan penjemuran di bawah matahari $\pm$ 4 jam dan pemanggangan di oven $\pm$ 16 menit dan diolesi margarin.	Tekstur lembek dan melempem Warna hitam kecoklatan Bau khas sirsak Rasa sangat asam
5	Daging buah sirsak yang sudah disaring	Pemaanggangan di oven 18 menit	Tekstur keras berserat Warna coklat kehitaman Bau khas sirsak kuat Rasa sangat asam
6	Buah sirsak 50 g Tepung Jagung 50 g <b>Total 100 g</b>	Buah sirsak diblender dan disaring, diambil seratnya. Pemaanggangan di oven 110°C selama 75 menit	Tekstur keras Warna kuning muda Bau khas Rasa sangat asam

Tabel 13. Tahap Kedua Pembuatan Sereal *Flakes*

Formula	Komposisi	Perlakuan	Hasil Pengamatan
1	Buah sirsak 50 g Tepung jagung 47 g Susu skim bubuk 5 g Baking soda 0.5 g Gula pasir 5 g	- Buah sirsak diblender - Panggang oven 8 menit (suhu kecil kompor)	- Tekstur keras - Warna coklat keabu-abuan - Bau khas <i>flakes</i> - Rasa pahit agak asin

	Margarin	9 g		
	Vanilin	1 g		
	Garam	1 g		
	<b>Total</b>	<b>118.5 g</b>		
2	Buah sirsak	50 g	- Buah sirsak	- Tekstur keras
	Tepung jagung	47 g	diblender	- Warna coklat keabu-abuan
	Susu skim bubuk	5 g	- Panggang oven	
	Baking soda	0.5 g	6 menit (suhu kecil	- Bau khas <i>flakes</i>
	Margarin	9 g	kompor)	- Rasa pahit agak asin
	Vanilin	1 g		
	<b>Total</b>	<b>112.5 g</b>		
3	Buah sirsak	25 g	- Buah sirsak	- Tekstur keras
	Tepung jagung	50 g	diblender	- Warna kuning kecoklatan
	Susu skim bubuk	5 g	- Pemanggangan oven	
	Baking soda	1 g	150°C selama 30	- Bau khas <i>flakes</i>
	Gula pasir	10 g	menit	- Rasa pahit
	Margarin	10 g		
	Vanilin	1 g		
	Garam	1 g		
	<b>Total</b>	<b>103 g</b>		
4	Buah sirsak	25 g	- Buah sirsak	- Tekstur keras
	Tepung jagung	50 g	diblender	- Warna kuning cerah
	Susu skim bubuk	5 g	- Buah sirsak	- Bau khas <i>flakes</i>
	Baking soda	1 g	diblender	- Rasa hambar, sedikit pahit
	Gula pasir	10 g	- Pemanggangan di	
	Margarin	10 g	oven 150°C selama	
	Vanilin	1 g	10 menit; 100°C	
	Garam	1 g	selama 20 menit;	

	<b>Total</b>	<b>103 g</b>	110°C selama 5 menit	
5	Buah sirsak	50 g	- Buah sirsak	- Tekstur keras
	Tepung jagung	40 g	diblender dan	- Warna agak coklat
	Susu skim bubuk	2 g	disaring, diambil	- Bau Khas <i>flakes</i>
	Baking powder	1 g	sarinya	- Rasa agak enak
	Gula pasir	6 g	- Pemanggangan di	
	Garam	1 g	oven 110°C selama	
	<b>Total</b>	<b>100 g</b>	60 menit; 110°C selama 15 menit;	
			110°C selama 15 menit; 110°C selama	
			15 menit;	
6	Buah sirsak	50 g	- Buah sirsak	- Tekstur keras
	Tepung jagung	40 g	diblender dan	- Warna agak coklat
	Susu skim bubuk	2 g	disaring, diambil	- Bau Khas <i>flakes</i>
	Baking powder	1 g	seratnya	- Rasa enak dan agak
	Gula pasir	16 g	- Pemanggangan di	manis
	Garam	1 g	oven 110°C selama	
	<b>Total</b>	<b>110 g</b>	60 menit; 110°C selama 15 menit;	
			110°C selama 15 menit; 110°C selama	
			15 menit;	
7	Buah sirsak	60 g	- Buah sirsak	- Tekstur renyah
	Tepung jagung	40 g	diblender dan	- Warna kuning
	Susu skim bubuk	2 g	disaring, diambil	- Bau Khas <i>flakes</i>
	Baking powder	1 g	sarinya	- Rasa enak

	Gula pasir	6 g	- Pemanggangan di	
	Garam	1 g	oven 110°C selama	
	Margarin	10 g	120 menit	
	<b>Total</b>	<b>120 g</b>		
8	Buah sirsak	50 g	- Buah sirsak	- Tekstur renyah
	Tepung jagung	50 g	diblender dan	- Warna kuning
	Susu skim bubuk	1 g	disaring, diambil	kecoklatan
	Baking powder	1 g	sarinya	- Bau khas <i>flakes</i>
	Gula stevia	4 g	- Pemanggangan oven	- Rasa enak
	Garam	0,5 g	110°C selama 150	
	Margarin butter	10 g	menit	
	Perisa vanilla	0,3 g		
	<b>Total</b>	<b>116,8 g</b>		

---

Gambar 6. Produk Sereal Flakes



M A K A S S A R

## 2. Hasil Uji Organoleptik

Tabel 14. Hasil Uji Organoleptik Sereal *Flakes*

No	Parameter	Formula		
		F1	F2	F3
1	Warna	2,58	2,89	3,00
2	Aroma	2,86	3,00	2,97
3	Rasa	3,00	2,78	2,89
4	Tekstur	3,11	3,08	2,86

## 3. Hasil Analisis Proksimat

Tabel 15. Hasil Analisis Proksimat

No	Parameter	Formula					
		F1		F2		F3	
1	Air	F1.1	0,72	F2.1	0,38	F3.1	0,44
		F1.2	0,61	F2.2	0,29	F3.2	0,28
		F1.3	0,60	F2.3	0,29	F3.3	0,41
		$\bar{x}$	0,64	$\bar{x}$	0,32	$\bar{x}$	0,36
2	Abu	F1.1	0,30	F2.1	4,79	F3.1	5,39
		F1.2	12,63	F2.2	10,83	F3.2	3,90
		F1.3	5,36	F2.3	7,87	F3.3	5,04
		$\bar{x}$	6,09	$\bar{x}$	7,83	$\bar{x}$	4,77
3	Protein	F1.1	2,75	F2.1	2,30	F3.1	1,84
		F1.2	2,27	F2.2	1,84	F3.2	1,84
		F1.3	2,30	F2.3	2,29	F3.3	1,84
		$\bar{x}$	2,44	$\bar{x}$	2,14	$\bar{x}$	1,84
4	Lemak	F1.1	12,32	F2.1	12,93	F3.1	13,65
		F1.2	12,18	F2.2	12,78	F3.2	13,32
		F1.3	12,22	F2.3	12,82	F3.3	13,26
		$\bar{x}$	12,24	$\bar{x}$	12,84	$\bar{x}$	13,41
5	Serat Kasar	F1.1	1,52	F2.1	1,63	F3.1	2,34
		F1.2	1,49	F2.2	1,62	F3.2	2,39
		F1.3	1,48	F2.3	1,66	F3.3	2,35

		$\bar{x}$ 1,49	$\bar{x}$ 1,63	$\bar{x}$ 2,36			
6	Karbohidrat	F1.1	69,79	F2.1	67,29	F3.1	65,96
		F1.2	70,61	F2.2	66,67	F3.2	65,70
		F1.3	69,21	F2.3	67,60	F3.3	66,62
		$\bar{x}$	69,87	$\bar{x}$	67,18	$\bar{x}$	66,09

#### 4. Hasil Pengujian Antioksidan

Tabel 16. Hasil Pengujian Antioksidan F1

PPM	Ln Konsentrasi	Abs. DPPH	Abs. Sampel F1	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	Nilai IC 50
20	2,9957		0,1514	35,8474		
40	3,6888		0,1416	40	$y = 0,6869x$	
60	4,0943	0,236	0,1415	40,0423	+ 35,251	2113
80	4,3820		0,153	35,1694	$R^2 = 0,0356$	
100	4,6051		0,1445	38,7711		

Tabel 17. Hasil Pengujian Antioksidan F2

PPM	Ln Konsentrasi	Abs. DPPH	Abs. Sampel F2	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	Nilai IC 50
20	2,9957		0.1561	33,8559		
40	3,6888		0.1437	39,1101	$y = 0,0635x$	
60	4,0943	0,236	0.1487	36,9915	+ 36,046	2,7249
80	4,3820		0.1409	40,2966	$R^2 = 0,0001$	
100	4,6051		0.1623	31,2288		


Tabel 18. Hasil Pengujian Antioksidan F3

PPM	Ln Konsentrasi	Abs. DPPH	Abs. Sampel F3	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	Nilai IC 50
20	2,9957		0,1654	29,9152		
40	3,6888		0,1709	27,5847	$y = 6,1506x$	
60	4,0943	0,236	0,1624	31,1864	$+ 10,499$	615,4171
80	4,3820		0,0859	63,6016	$R^2 = 0,0562$	
100	4,6051		0,1846	21,7796		


Tabel 19. Hasil Pengujian Antioksidan Vitamin C

PPM	Ln Konsentrasi	Abs. DPPH	Abs. Sampel VIT C	% Inhibisi	Persamaan Regresi Linear	Nilai IC 50
20	2,9957		0,0483	79,5338		
40	3,6888		0,04	83,0508	$y = 3,5401x$	
60	4,0943	0,236	0,0347	85,2966	$+ 69,539$	0,0040
80	4,3820		0,0361	84,7033	$R^2 = 0,8759$	
100	4,6051		0,0352	85,0847		


Gambar 7. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 1 dengan konsentrasi hambat Formula 1




Gambar 8. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 2 dengan konsentrasi hambat Formula 2



Gambar 9. Grafik hubungan Ln konsentrasi Formula 3 dengan konsentrasi hambat Formula 3



Gambar 10. Grafik hubungan Ln konsentrasi Vitamin C dengan konsentrasi hambat Vitamin C



## B. *Pembahasan*

Buah Sirsak (*Annona muricata* Linn) merupakan tumbuhan dari Family Annonaceae mengandung senyawa polifenol dan vitamin C yang tinggi dengan kapasitas antioksidan yang setara dengan 72 trolox dan 42 asam galat dalam 100 gram buah sirsak. Dengan mencegah produksi enzim xanthine oxidase, yang terlibat dalam mengkatalisis konversi purin menjadi asam urat, zat antioksidan berperan dalam menghambat reaksi oksidasi dan mencegah sintesis asam urat yang berlebihan. Oleh karena itu, buah sirsak memiliki aktivitas antioksidan yang berperan dalam menurunkan kadar asam urat sebagai penanganan terhadap penyakit *arthirits gout* (Prasetyorini, dkk., 2014).

Dalam penelitian ini digunakan sampel buah sirsak (*Annona muricata* Linn) yang diperoleh di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Untuk menetapkan kebenaran dan keaslian tanaman yang digunakan dalam penelitian, dilakukan determinasi. Adapun hasil determinasi tanaman sirsak adalah sebagai berikut: Pohon kecil, perenial, tinggi sekitar 3-8 m. Daun tunggal, bangun bulat panjang, duduk tersebar, tanpa spitula, permukaan atas bewarna hijau tua mengkilap, permukaan bawah hijau pucat, tepi rata, ujung meruncing, basal runcing, tulang daun menyirip, memiliki aroma khas ketika diremas. Bunga tunggal, perhiasan bunga 2-3 lingkaran, lingkaran luar sepaloid, bisexual, benang sari banyak. Buah besar bentuk tidak beraturan, hijau, berduri lembut pada permukaan kulit buah, daging buah berwarna putih susu, rasa manis asam, memiliki aroma khas. Biji hitam, pipih. Fam Annonaceae – Annona – *Annona muricata* Linn.

Pada proses preparasi buah sirsak, daging buah sirsak dikumpulkan terlebih dahulu, buah dikuliti, dan bijinya dipisahkan. Buah dikupas dengan tujuan untuk memisahkan daging buah dengan bagian-bagian lainnya. Daging buah sirsak kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender agar semua daging tercampur rata dan disaring hingga mendapatkan daging buah sirsak. Penyaringan dilakukan untuk

memisahkan antara sari buah dan airnya sehingga menghasilkan daging buah yang kaya serat dengan kadar air yang sesuai dalam pembuatan sereal.

Ada tiga langkah dalam proses formulasi. Untuk membuat tepung komposit, komposisi tepung buah sirsak dipastikan terlebih dahulu. Langkah kedua berupa pemilihan resep awal *flakes*. Tahap ketiga berupa pengembangan formula dan penambahan zat tambahan ke dalam adonan *flake*. Pembuatan lima formulasi tepung buah sirsak yang berbeda merupakan langkah awal dalam proses formulasi yang terdapat pada Tabel 12. Pada Formula 1 hingga 4 dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari untuk menghilangkan hidrat air agar proses pengeringan lebih cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam pemanggangannya (Pangestika dkk., 2021). Kelima formula menghasilkan *flake* dengan tekstur agak keras (kurang renyah) dan agak liat. Waktu yang digunakan selama penjemuran dan pemanggangan juga mempengaruhi daging buah sirsak yang dihasilkan. Penambahan margarin pada F4 menghasilkan tekstur yang lembek dan masih agak liat. Formulasi daging buah sirsak diperbaiki dengan menambahkan tepung jagung serta tidak dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari, dan diperoleh tekstur yang agak keras namun lebih baik dari sebelumnya. Tepung jagung yang digunakan berasal dari pembuatan tepung jagung berdasarkan penelitian Susanti dkk. (2017) berupa penirisan jagung pipilan kemudian dikeringkan, selanjutnya digiling dan dilakukan pengayakan. Namun produk yang dihasilkan menghasilkan rasa yang padat dan kurang disukai sehingga formula diperbaiki dengan penggantian tepung jagung menjadi tepung jagung yang telah dijual dipasaran.

Pada Tabel 13 menunjukkan 8 formula perbaikan dan pengembangan sereal *flakes* dengan penambahan bahan tambahan untuk memperbaiki citarasa yang dihasilkan. Bahan tambahan yang digunakan berdasarkan pada pembuatan *flakes* yang dilakukan oleh penelitian Susanti dkk. (2017) dengan modifikasi. Resep yang dipilih memiliki rasa, tampilan, aroma, dan tekstur terbaik.

Proses pembuatan sereal *flakes* dari buah sirsak dilakukan dengan metode pembuatan sereal *flakes* pada penelitian sebelumnya dengan modifikasi. Tahap pertama dilakukan pengadukan margarin *butter* hingga berwarna putih, kemudian ditambahkan gula stevia, susu skim bubuk, baking powder, dan perisa vanilla dicampur hingga rata. Selanjutnya dimasukkan buah sirsak dan tepung jagung lalu diaduk kembali hingga homogen. Setelah agak kalis kemudian adonan dibentuk menggunakan cetakan. Cetakan yang digunakan berbentuk daun dan tipis dengan ketebalan pemotongan 4 mm. Kemudian adonan yang telah tercetak disusun diatas loyang yang telah dilapisi aluminium foil. Setelah itu di panggang pada suhu 110°C. Pemilihan suhu 110°C disesuaikan berdasarkan prosedur pembuatan flakes yang telah dilakukan oleh Sukasih & Setyadjit (2017). Adapun kualitas suhu pemanggangan pada oven yang digunakan pada penelitian ini menggunakan waktu 150 menit. Parameter yang digunakan untuk menentukan *flakes* telah matang dilihat dari warna *flakes* yang telah berwarna kuning kecoklatan serta tingkat kekerasan *flakes* yang tidak mudah rapuh ketika telah didinginkan. Warna adonan buah sirsak pada sereal *flakes* adalah putih kekuningan, sehingga semakin banyak sirsak yang digunakan, maka semakin putih *flakes* yang dihasilkan. Setelah matang, *flakes* didinginkan selama 10 menit dan dikemas pada kemasan tertutup yang telah diberi silika gel *food grade* untuk menjaga kelembapan *flakes* agar dapat tahan lebih lama.

Setelah diperoleh sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn), selanjutnya masuk ketahap uji organoleptik dan analisis kimia proksimat serta pengujian antioksidan. Uji organoleptik dilakukan berupa pengamatan melalui pancaindra meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur sereal *flakes* melalui uji skalar dari sangat suka (1), suka (2), tidak suka (3), dan sangat tidak suka (4) (Susanti et al., 2017). Uji skalar pada uji penginderaan, panelis diminta untuk mengemukakan tanggapannya dalam sensorik panelis. Sampel uji disiapkan menggunakan kemasan yang seragam. Setiap sampel ditawarkan kepada panelis, yang kemudian dicicipi dan dievaluasi rasa, aroma, warna, dan tekstur (renyah) *flakes* saat mengisi formulir.

Hasil analisis varian (ANOVA) untuk parameter warna menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam perbandingan F1, F2, dan F3. Berdasarkan hasil, Formula 3 dengan substitusi 120 gram buah sirsak memiliki nilai 3,00 adalah warna yang paling disukai. Hal ini disebabkan karena tepung maizena memiliki warna sedikit lebih ringan dari buah sirsak yang lebih putih. Sehingga akan menghasilkan warna yang bervariasi saat dipanaskan dengan suhu tinggi. Semakin banyak kandungan buah sirsak pada adonan maka warna yang dihasilkan semakin berwarna putih. Warna pada formula 1 substitusi 100 gram buah sirsak memiliki nilai 2.58 terlihat lebih cokelat dan gelap disebabkan kandungan buah sirsaknya lebih sedikit dibandingkan formula 3 sedangkan kurang disukai oleh panelis. Adapun formula 2 substitusi 110 gram buah sirsak memiliki nilai 2.89 berwarna cokelat kekuningan disebabkan buah sirsaknya hampir mendekati formula 3 yang berwarna putih kekuningan. Selain penambahan warna dari tepung buah sirsak dan tepung jagung, bahan gula mengalami proses pemanasan yang menyebabkan gula dalam *flakes* meleleh di atas titik lelehnya sehingga produk yang dihasilkan menjadi coklat. Sebagian besar penguapan air akibat proses pemanasan terus menerus, maka akan terjadi karamelisasi. (Susanti et al., 2017).

Selain itu, parameter aroma juga berperan dalam menentukan daya terima konsumen terhadap sereal *flakes* dari buah sirsak. Hasil analisis varians (ANOVA) untuk parameter aroma menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan ( $>0,05$ ) pada F1, F2, dan F3. Artinya ketiga formula sereal *flakes* memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Namun untuk melihat nilai tertinggi diantara ketiga formula tersebut dilakukan uji lanjutan Duncan. Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, diketahui bahwa hasil yang memiliki aroma yang sangat disukai adalah formula 2 dengan substitusi 110 gram buah sirsak dengan nilai sebesar 3.00. Hal ini disebabkan aroma khas buah sirsak yang apabila semakin tinggi maka bau khas sirsak semakin tinggi, dan pada formula 2 kadar buah sirsak tidak terlalu banyak sehingga aromanya juga dipengaruhi oleh bahan pangan lainnya. Selanjutnya, reaksi *maillard*, yang terjadi ketika asam amino bebas dari produk makanan yang mengandung protein dan gula

yang ada dalam makanan ini dipanaskan, bereaksi selama pemanggangan untuk menghasilkan aroma pada *flakes*. (Susanti et al., 2017). Aroma juga dipengaruhi oleh perisa vanila yang digunakan, selain sebagai citarasa juga berperan menghilangkan aroma tengik pada sereal *flakes* yang dihasilkan.

Pada parameter rasa, diketahui bahwa hasil pengujian ANOVA tidak memiliki perbedaan yang nyata ( $>0.05$ ). Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, diketahui bahwa formula 1 dengan substitusi 100 gram buah sirsak dengan nilai sebesar 3.00 memiliki rasa yang sangat disukai. Kandungan buah sirsak yang apabila semakin tinggi maka rasa asam sirsak yang dihasilkan semakin tinggi, pada formula 2 dengan substitusi 110 gram buah sirsak dan formula 3 dengan substitusi 120 gram buah sirsak memiliki kadar buah sirsak lebih banyak dibandingkan formula 1 sehingga kurang disukai oleh panelis. Selain itu, penambahan garam dan gula stevia sebagai perasa juga dapat menutupi rasa asam pada sereal *flakes*. Akibat proses hidrolisis yang terjadi pada granula pati sehingga menghasilkan monosakarida sebagai bahan awal asam organik yang dicampur dengan tepung untuk menghasilkan produk dengan rasa menyerupai singkong (Susanti et al., 2017).

Selanjutnya, dalam menghasilkan rasa yang disukai panelis dibutuhkan kesesuaian tekstur atau kerenyahan sereal saat dikonsumsi. Pada parameter tekstur, diketahui bahwa hasil pengujian ANOVA tidak memiliki perbedaan yang nyata ( $>0.05$ ). Setelah dilakukan uji lanjutan Duncan, diketahui bahwa hasil yang memiliki rasa yang sangat disukai adalah Formula 1 dengan nilai sebesar 3.11 dibandingkan Formula 2 (3.08) dan formula 3 (2.86). Tepung jagung dengan kandungan amilopektin tinggi digunakan untuk membuat sereal *flakes* berpori, renyah, dan renyah dari buah sirsak. Sedangkan pati dengan kandungan amilosa yang tinggi, seperti pati yang terbuat dari umbi-umbian, cenderung menghasilkan *flakes* yang keras (Susanti et al., 2017). Pemanggangan dengan suhu tinggi dapat mengubah kerenyahan dan tekstur makanan. Jumlah kombinasi antara buah sirsak dan tepung jagung sangat berpengaruh terhadap tekstur *flakes* yang dihasilkan karena buah sirsak dan tepung jagung yang digunakan

untuk membuat *flakes* tidak mengandung protein gluten seperti tepung terigu. Apabila daging buah sirsak dipanaskan pada suhu tinggi akan menyebabkan tekstur mengeras sehingga semakin tinggi kandungan sirsaknya maka produk yang dihasilkan maka semakin kurang disukai panelis. Bahan tambahan yang mengandung lemak seperti margarin butter juga memberikan rasa gurih pada produk. Berdasarkan dengan literatur diketahui bahwa rasa gurih dari suatu produk dapat ditentukan oleh jumlah kadar protein dan lemak adonannya (Fajari, Yusuf, & Nurrahman, 2019).

Analisis proksimat bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi pada sereal *flakes* yang dihasilkan. *Flakes* merupakan produk yang dapat menyerap uap air di udara, umur simpannya akan dipersingkat jika kadar airnya tinggi. Air memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas produk, sehingga jika produk memiliki kadar air yang tinggi, maka akan lebih rentan terhadap bahaya dari pertumbuhan jamur dan bau apek (Susanti et al., 2017). Berdasarkan hasil *flakes* pada F1, F2, dan F3 kadar air masing-masing produk adalah 0,64%, 0,32%, dan 0,36%. Kadar air produk yang berkurang berarti dengan kemasan yang tepat dapat bertahan cukup lama. Produk yang lebih tahan terhadap pembentukan jamur yang dapat merusak produk memiliki kadar air yang rendah. *Flakes* harus memiliki kadar air maksimal 4% agar memenuhi kriteria kualitas makanan ringan SNI 01-2886 tahun 2015. Adanya kandungan air dalam bahan makanan juga mempengaruhi daya tahan pangan terhadap mikroba, khususnya jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya sehingga *flakes* mudah berjamur, maka pada penelitian ini jumlah kandungan air pada produk menunjukkan bahwa *flakes* buah sirsak dengan penambahan tepung jagung memiliki daya simpan yang lama untuk dikonsumsi (Susanti et al., 2017).

Pengujian kadar abu pada sereal *flakes* juga bertujuan untuk mengetahui komposisi mineral produk. Sebagai residu yang tertinggal setelah bahan dibakar hingga tidak mengandung komponen karbon, maka kadar abu merupakan unsur mineral. Kandungan abu dapat dianggap sebagai komponen yang tidak mudah menguap yang tersisa setelah molekul organik dibakar dan dinyalakan. Jumlah abu dalam serpihan

berdampak signifikan pada produk akhir, yang juga berdampak pada kualitas produk. Tepung terigu dengan konsentrasi abu tinggi mungkin memiliki lebih sedikit serat gluten. Kandungan abu dapat mengubah warna tepung, sehingga produk pangan sangat memperhatikan jumlah kandungannya. Adapun kadar abu *flakes* tiap formula adalah 6,09%, 7,83%, dan 4,77%. Makanan dengan kandungan abu yang lebih tinggi cenderung kaya akan mineral. Produk *flakes* tersebut tidak memenuhi standar mutu SNI-01-2886-2015 karena kadar abunya melebihi 4%. Akibat produk bersifat higroskopis, perpindahan sampel selama pengujian dapat menyebabkan masuknya uap air dan diserap oleh produk sehingga menyebabkan nilai resultan menjadi lebih tinggi dari nilai yang dipersyaratkan. (Tumakaka, dkk., 2020).

Protein merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, terutama untuk perkembangan sel-sel jaringan. Data yang dihasilkan menunjukkan bahwa kadar protein pada F1, F2, dan F3 masing-masing adalah 2,44%, 2,14%, dan 1,84%. Jumlah kandungan gluten dalam sereal *flakes* sebanding dengan jumlah protein maupun sebaliknya. Hasil yang diperoleh untuk produk *flakes* menunjukkan bahwa kandungan proteinnya kurang dari 5%, sehingga tidak memenuhi syarat SNI01-2886-2015. Kekurangan gluten pada tepung maizena ditunjukkan dengan rendahnya konsentrasi protein. Tepung jagung ditambahkan ke adonan untuk membuat produk menjadi padat dan renyah pada *flakes* serta berperan meningkatkan kadar protein produk. Protein dalam makanan dapat terdenaturasi jika dipanaskan pada suhu sedang (60–90°C) dalam waktu lama, yang dapat mengakibatkan penurunan kandungan protein tepung jagung. Denaturasi adalah transisi struktural dari bentuk bercabang ganda yang kaku menjadi bentuk yang fleksibel dan terbuka yang memfasilitasi hidrolisis dan pemecahan asam amino oleh enzim pencernaan (Susanti dkk., 2017).

Protein merupakan biomakromolekul yang dibentuk dengan melipat rantai panjang asam amino, dan pencernaan protein di saluran pencernaan dapat menghasilkan dipeptida asam amino dan tripeptida untuk metabolisme sel dan sintesis protein di otot maupun jaringan lainnya. Asupan protein yang tinggi juga dapat

mempengaruhi homeostasis asam urat, karena pencernaan protein dapat menghasilkan beberapa asam amino, seperti glutamin, glisin dan treonin yang dapat menginduksi sintesis purin sehingga mendorong perkembangan hiperurisemia pada pasien *arthritis gout* (Zhang, et al., 2022). Asupan protein yang dianjurkan untuk pasien *arthritis gout* adalah 45-55 gram/hari (Endah & Zulmah, 2021) Sereal *flakes* Formula 1 dengan substitusi buah sirsak 100 gram dapat menyumbang 13,1% dari anjuran asupan protein dalam sehari.

Hasil analisa kadar lemak pada *flakes* yang dihasilkan pada F1, F2, dan F3 sebesar 12,24%, 12,84%, dan 13,41%. Kadar tersebut masih memenuhi syarat mutu *flakes* pada SNI 01-2886-2015 yaitu sereal *flakes* memiliki batas kandungan lemak maksimal 30%. Dengan mencairkan lemak, proses pemanasan dapat menurunkan kandungan lemak makanan. Hal ini terjadi ketika komponen lemak terurai menjadi zat yang mudah menguap seperti aldehida, keton, alkohol, asam, dan hidrokarbon (Tumakaka dkk., 2020). Akibat proses pemanasan menggunakan suhu tertentu, pengolahan bahan makanan dapat merusak lemak yang terkandung di dalamnya. Intensitas penghancuran lemak akan meningkat seiring dengan suhu yang digunakan. Lemak pada produk berasal dari penggunaan tepung jagung; lemak dari tepung jagung menghasilkan efek *shortening* pada makanan yang dipanggang seperti biskuit, *flakes*, dan kue kering. Pemecahan struktur oleh lemak akan melapisi pati pada tepung jagung sehingga menghasilkan *flakes* yang renyah dan enak. Selain itu lemak dapat meningkatkan struktur fisik seperti pengembangan dan dapat melunakkan tekstur adonan pada mesin cetak sehingga adonan lebih mudah untuk dikeluarkan dan dicetak. (Susanti dkk., 2017).

Kandungan lemak pada makanan dimetabolisme menjadi trigliserida di dalam usus dan diubah sebagai kilomikron untuk diteruskan ke jaringan perifer, sehingga terjadi proses perubahan trigliserida menjadi asam lemak bebas (*Free Fatty Acids / FFA*) untuk penyerapan dan penyimpanan energi. Sejumlah kecil FFA dapat diserap oleh jaringan hati, bersama dengan lipid yang tersisa di kilomikron. Namun, makanan

tinggi lemak dapat membangkitkan kenikmatan makan dan mendorong keinginan individu untuk mengonsumsi lebih banyak makanan padat energi, yang berpuncak pada kelebihan produksi FFA. Peristiwa metabolisme yang dimediasi asam lemak bebas memicu timbulnya penyakit gout akut dengan penumpukan kristal monosodium urat yang disimpan di sendi (Zhang et al., 2022). Selain itu, ekskresi asam urat melalui urin umumnya dapat terhambat oleh lemak. Akibatnya, asupan lemak harus dijaga seminimal mungkin, yaitu 10-20% dari total energi atau idealnya 15% dari total kebutuhan energi (Kusumayanti, dkk., 2014). Sereal *flakes* Formula 3 dengan substitusi buah sirsak 120 gram dapat menyumbang 44,1% dari total 15% kebutuhan energi total anjuran asupan lemak dalam sehari.

Selanjutnya, bahan makanan yang dianalisis menggunakan asam dan alkali yang mendidih, menghasilkan residu berupa serat kasar, yang sebagian besar terdiri dari selulosa dengan sedikit lignin dan pentosan. (Yenrina, 2015). Berdasarkan hasil menyatakan bahwa kandungan serat kasar pada F1, F2, dan F3 adalah 1,49%, 1,63%, dan 2,36%. Hasil ini menunjukkan bahwa formula 3 memiliki kandungan serat yang lebih tinggi dikarenakan memiliki kandungan buah sirsak yang banyak (Wiradharma, 2021). Asupan serat makanan dapat mengatur metabolisme glukosa dan lipid sehingga menjaga keseimbangan energi serta meningkatkan komposisi mikrobiota usus yang menguntungkan pada pasien asam urat. Proses fermentasi serat oleh mikrobiota akan mengatasi peradangan dengan menginduksi ekskresi sitokin sebagai respon imun akibat penumpukan kristal monosodium urat pada pasien *arthritis gout*. (Zhang et al., 2022).

Sebagai sumber energi utama tubuh, karbohidrat merupakan nutrisi penting dalam kehidupan manusia. Tubuh mampu mendapatkan 60–70% energinya dari karbohidrat. Selain itu, karbohidrat memiliki peran penting dalam penentuan rasa, warna, dan tekstur pada makanan Berdasarkan analisis, F1, F2, dan F3 memiliki kandungan karbohidrat sebesar 69,87%, 67,18%, dan 66,09%. Pati, gula, pektin, dan selulosa adalah jenis karbohidrat yang termasuk dalam banyak makanan. Pada nasi,

karbohidrat (kebanyakan pati) mengandung unsur dalam konsentrasi atau proporsi yang lebih tinggi. Hasil akhir *flakes*, terutama struktur produk *flakes* saat penambahan air atau susu, sangat dipengaruhi oleh karbohidrat, terutama pati (amilopektin). *Flakes* akan segera mengembang setelah menyerap air maupun susu. *Flakes* dapat menggunakan pati dan turunannya, terutama sebagai bahan fungsional, untuk membantu memenuhi parameter tekstur yang dibutuhkan. Untuk membuat makanan lebih garing, gunakan tepung maizena dengan kandungan pati yang tinggi amilosa. Hasil ketiga formulasi ini sesuai dengan syarat keberterimaan SNI01-2886-2015 yaitu minimal 60%. Asupan karbohidrat yang dianjurkan untuk pasien *arthritis gout* adalah 100-350 gram/hari (Kusumayanti et al., 2014). Dalam sehari, sereal flakes Formula 1 dengan substitusi buah sirsak 100 gram dapat menyumbang 169,6% dari anjuran asupan karbohidrat.

Analisis aktivitas antioksidan pada sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn.) menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk menganalisis 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH), berupa metode peredaman zat radikal bebas. Dengan metode ini, jumlah aktivitas zat yang terdapat pada produk yang memerangi radikal bebas harus dievaluasi. DPPH digunakan dalam prosedur ini sebagai molekul radikal yang stabil. Keuntungan menggunakan metode DPPH untuk menilai aktivitas antioksidan adalah mudah, lebih cepat, tidak rumit, sensitif, dan hanya membutuhkan sedikit sampel. Berdasarkan hasil penelitian Rahmawati dkk. (2017), setelah pengukuran serapan larutan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 400-600 nm digunakan panjang gelombang 617 nm. Blanko yang digunakan adalah etanol *pro analysis*.

Berdasarkan penelitian pengujian antioksidan pada ekstrak buah sirsak gunung (*Annona montana*), maka pada pengujian antioksidan ini digunakan konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm (Fidyasari et al., 2019). Setelah dianalisis konsentrasi yang digunakan, ditentukan nilai Ln (Logaritma natural) Konsentrasi yang bertujuan untuk mengetahui nilai riil positif dari bilangan konsentrasi yang digunakan.

Absorbansi larutan blanko DPPH memiliki nilai 0,236 berdasarkan penelitian terdahulu setelah pengukuran serapan larutan blanko DPPH dengan panjang gelombang 517 nm (Rahmawati et al., 2017). Pada hasil pengamatan Tabel 14. menunjukkan bahwa setelah didapatkan hasil pengukuran absorbansi sebanyak 5 replika pada konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm dan dilakukan pengukuran persen inhibisi sereal *flakes* Formula 1 terhadap DPPH menunjukkan nilai 35,84%, 40%, 40,04%, 35,16% dan 38,77%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu dianalisis persamaan regresi linear dengan perbandingan Ln konsentrasi dan % inhibisi untuk memperoleh nilai IC<sub>50</sub>.

Persamaan linier ( $y=bx+a$ ) digunakan untuk menghitung nilai IC<sub>50</sub> (*Inhibition Concentration 50*) dari persimpangan garis yang mewakili 50% penghambatan dan sumbu konsentrasi. Pada penelitian ini aktivitas antioksidan *flakes* buah sirsak ditentukan dan disesuaikan berdasarkan standar sangat aktif (50 ppm), aktif (50-100 ppm), kurang aktif (100-1000 ppm), dan tidak aktif (>1000 ppm). (Prasetyorini dkk., 2014). Adapun hasil pengujian IC<sub>50</sub> sampel Formula 1 adalah 2113962448 ppm (Tidak aktif). Adapun pada Tabel 15. menunjukkan hasil pengukuran persen inhibisi sereal *flakes* Formula 1 terhadap DPPH berturut-turut 33,85%, 39,11%, 36,99%, 40,29%, dan 31,22%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu diperoleh nilai IC<sub>50</sub> sampel Formula 2 adalah 2,7249 ppm (Sangat aktif) Selanjutnya pada Tabel 16. menunjukkan hasil pengukuran persen inhibisi sereal *flakes* Formula 3 terhadap DPPH berturut-turut 29,91%, 27,58%, 31,18%, 63,60%, dan 21,77%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu diperoleh nilai IC<sub>50</sub> sampel Formula 3 adalah 615,4171 ppm (Kurang aktif). Dari ketiga formula sereal *flakes*, maka disimpulkan bahwa Formula 2 memiliki aktivitas antioksidan yang paling kuat. Berdasarkan penelitian Prasetyorini, Moerfiah, Wardatun, & Rusli (2014) diketahui bahwa aktivitas antioksidan sari buah sirsak adalah 282,61 ppm yang tergolong dalam kategori kurang aktif.

Adapun pada pengujian antioksidan ini menggunakan pembanding vitamin C. Pada Tabel 17. menunjukkan bahwa hasil pengukuran persen inhibisi vitamin C

terhadap DPPH berturut-turut 79,53%, 83,05%, 85,29%, 84,70%, dan 85,08%. Setelah diukur persen inhibisi, lalu diperoleh nilai  $IC_{50}$  sampel vitamin C adalah 0,0040 ppm (Sangat aktif). Vitamin C yang diuji merupakan zat murni dengan kandungan 100 persen, sedangkan vitamin C pada buah sirsak hanya 0,038 persen, maka aktivitas antioksidan vitamin C masih lebih baik dibandingkan dengan aktivitas antioksidan sereal *flakes*, dimana aktivitas antioksidan vitamin C adalah 6,8 kali lebih kuat dari aktivitas antioksidan buah sirsak. Perubahan warna larutan sampel dari ungu pucat menjadi kuning dari deret konsentrasi terendah hingga tertinggi menunjukkan adanya aktivitas antioksidan. Adanya bahan kimia antioksidan yang dapat menyumbangkan atom hidrogen ke radikal DPPH dan mereduksi radikal untuk menghasilkan molekul stabil DPPH-H (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazine) adalah mekanisme perubahan warna dan perubahan warna pada sampel (Rahmawati dkk., 2017).

Penurunan nilai aktivitas antioksidan pada sereal *flakes* disebabkan oleh proses pembuatan adonan menjadi sereal. Hal ini sesuai berdasarkan penelitian Nintami & Rustanti (2012) yang menemukan bahwa pengolahan dapat menurunkan nilai aktivitas antioksidan dan antioksidan dapat terdegradasi oleh suhu pemanasan yang tinggi, pengeringan matahari, dan proses oksidasi saat terpapar oksigen ( $O_2$ ) akibat penjemuran dibawah sinar matahari. Hasil uji aktivitas antioksidan pada sereal *flakes* Formula 2 substitusi 110 gram buah sirsak memperoleh nilai 2,7249 ppm memiliki nilai antioksidan paling aktif, dan Formula 3 substitusi 120 gram buah sirsak memperoleh nilai 615,4171 ppm dalam 242,8 gram memiliki nilai antioksidan kurang aktif sehingga sereal tersebut masih mampu dalam menangkal radikal bebas.

Penurunan kadar antioksidan pada Formula 3 dapat disebabkan tingginya kadar buah sirsak dan proses pengeringan yang berlangsung lama. Pada formula *flakes* digunakan tepung jagung mengandung senyawa karotenoid (zeaxantin) yang sangat tinggi (Yulianti & Hersoelistyorini, 2020). Disintegrasi struktur karotenoid akibat perubahan ikatan trans menjadi cis selama proses pengeringan *flakes* mengakibatkan penurunan intensitas warna karoten atau adanya perubahan warna sebagai indikator

berkurangnya kadar karoten karena oksidasi. Struktur ikatan cis karoten membuatnya lebih rentan terhadap oksidasi oksigen (Mukharomah et al., 2020). Hal ini dibuktikan dari warna yang dihasilkan oleh F1 lebih pucat dibandingkan F2 dan F3. Hal ini dibuktikan dengan kadar tepung jagung yang semakin tinggi maka kadar antioksidan pada sereal *flakes* semakin tinggi pula. Tepung jagung mengandung komponen fenolik seperti asam ferulat, flavonoid, dan antosianidin sehingga dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam produk tepung secara komplementer (Yulianti & Hersoelistyorini, 2020). Sedangkan tidak aktifnya kadar antioksidan pada F1 dapat disebabkan oleh perbandingan kadar buah sirsak yang lebih sedikit sedangkan suhu pemanasan yang digunakan sangat tinggi sehingga menghasilkan sereal *flakes* terlalu matang yang dibuktikan dengan hasil *flakes* yang dihasilkan berwarna lebih cokelat dibandingkan formula lainnya. Dari hasil uji aktivitas antioksidan yang didapatkan, maka sereal 110 gram dan 120 gram buah sirsak dapat dijadikan salah satu referensi bahan makanan yang berpotensi dalam menangkal radikal bebas dan mampu menjadi makanan alternatif pada pasien *arthirits gout* serta sebagai salah satu upaya dalam mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi khususnya pada pagi hari.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) pada F1, F2, dan F3 memiliki hasil organoleptik yang bervariasi. Parameter warna paling disukai adalah formula 1 (nilai 3.00), parameter aroma paling disukai adalah formula 2 (nilai 3.00), parameter rasa paling disukai adalah formula 1 (nilai 3.00), dan parameter tekstur paling disukai adalah formula 2 (nilai 3.08).
2. Sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) pada formula 1, formula 2, dan formula 3 memiliki kadar air, protein, lemak, dan karbohidrat yang sesuai dengan syarat mutu SNI01-2885-2015, sedangkan kadar abu melebihi syarat dan kadar serat kasar berada dibawah syarat sehingga tidak memenuhi syarat.
3. Sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) memiliki aktivitas antioksidan sereal *flakes* substitusi buah sirsak 100, 110, dan 120 gram memiliki nilai  $IC_{50}$  masing-masing sebesar 2113 ppm, 2,7249 ppm, dan 615,4171 ppm.
4. Sereal *flakes* dari buah sirsak (*Annona muricata* Linn) memiliki kandungan proksimat yang baik serta berpotensi sebagai antioksidan sehingga dapat menjadi makanan alternatif bagi penderita asam urat.

#### B. Saran

Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan pengolahan sereal *flakes* menggunakan alat ekstruder sehingga *flakes* yang dihasilkan lebih baik, penambahan uji organoleptik dalam menjaga mutu *flakes* serta pengujian antioksidan yang lebih teliti dalam menghasilkan hubungan persen inhibisi dan konsentrasi yang lebih linear.

## DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez-Lario, B., & Alonso-Valdivielso, J. L. (2014). Hiperuricemia y gota: El papel de la dieta. *Nutricion Hospitalaria*, 29(4), 760–770. <https://doi.org/10.3305/nh.2014.29.4.7196>
- Association of Official Analytical Chemist (AOAC). (2005). *Official Methods of Analysis* (18th ed.). Meyland, USA: Association of Official Analytical Chemist Inc.
- Astuti, A., Liviawaty, E., & Subiyanto. (2021). Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk Terhadap Tingkat Kesukaan Bakso Ikan Nila. *Akuatek*, 2(2), 95–103.
- Bhat, R., & Paliyath, G. (2015). Fruits of Tropical Climates: Dietary Importance and Health Benefits. In *Encyclopedia of Food and Health* (1st ed.). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384947-2.00338-X>
- BPOM RI. (2015). Per KBPOM No. 1 Tahun 2015 Tentang Kategori Pangan. *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kategori Pangan*.
- Dianati, N. A. (2015). Gout and hyperuricemia. *J Majority*, 4(5), 82–89. <https://doi.org/10.1201/9781420006452-31>
- Dwi Setyaningsih, Rusli, M. S., & Nurmalia Muliati. (2007). Sifat Fisiokimia Dan Aroma Ekstrak Vanili. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 12(3), 173–181.
- Endah, N., & Zulmah, A. (2021). Gambaran Pola Makan Berdasarkan Jenis , Frekuensi Dan Jumlah Makan Terhadap Peningkatan Kadar Asam Urat : Literature Review. *Borneo Student Research*, 3(1), 118–138. Retrieved from <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/2361/995>
- Fajari, C. N. A., Yusuf, M., & Nurrahman. (2019). Pengaruh Penggunaan Sisik Ikan Bandeng Terhadap Kadar Kalsium, Daya Kembang dan Organoleptik Camilan. *Jurnal Pangan Dan Gizi*, 9(April), 65–73.
- FAO Cereal Supply and Demand Brief. (2022). World cereal production, utilization, stocks, and trade all likely to contract in 2022/23. Retrieved June 12, 2022, from <https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/>
- FatSecret. (2008). Salt. Retrieved June 5, 2022, from <https://www.fatsecret.com/calories-nutrition/usda/salt?portionid=56639&portionamount=100.000#:~:text=There are 0 calories in 100 grams of,Calorie breakdown%3A 0%25 fat%2C 0%25 carbs%2C 0%25 protein.>

- Fidyasari, A., Hafiz, M., Fitria, N., & Rohmah, U. (2019). Khasiat Sari Buah Sirsak Gunung Dan Minuman Probiotik Buah Sirsak Gunung (Anona Montana) Untuk Menurunkan Kadar Asam Urat. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 7(3), 49–55. <https://doi.org/10.21776/ub.jpa.2019.007.03.6>
- Hikmatyar, G., & Larasati, T. A. (2017). Penatalaksanaan Komprehensif Arthritis Gout dan Osteoarthritis pada Buruh Usia Lanjut. *Medical Profession Journal of Lampung University*, 7(3), 22–29.
- Hoiriyah, Y. U. (2019). Peningkatan Kualitas Produksi Garam Menggunakan Teknologi Geomembran. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 35–42. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i2.6684>
- J., M. (1987). Soursop. Retrieved May 30, 2022, from <https://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/soursop.html>
- Jakše, B., Jakše, B., Pajek, Pajek, M., & Jernej. (2019). Uric Acid and Plant-Based Nutrition. *Nutrients*, 1–15. <https://doi.org/10.3390/nu11081736>
- Kaur, H., Gupta, S., Verma, M., Singh, K., & Singh, J. (2013). Free radicals and antioxidants in human health and disease—An overview. *Rrbs*, 7(5), 187–191. Retrieved from <https://www.tsijournals.com/articles/free-radicals-and-antioxidants-in-human-health-and-disease-an-overview.pdf>
- Kemendes RI. (2018). Laporan Nasional Riskesdas. In *Kementerian Kesehatan RI*. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantung-penyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kusumayanti, G. A. D., Wiardani, N. K., & Sugian, P. P. S. (2014). Diet Mencegah Dan Mengatasi Gangguan Asam Urat. *Jurnal Ilmu Gizi*, 5(1), 69–78.
- Major, T. J., Topless, R. K., Dalbeth, N., & Merriman, T. R. (2018). Evaluation of the diet wide contribution to serum urate levels: Meta-analysis of population based cohorts. *BMJ (Online)*, Vol. 363. <https://doi.org/10.1136/bmj.k3951>
- Marsigit, W., Bonodikun, & Sitanggang, L. (2017). Pengaruh Penambahan Baking Powder dan Air terhadap Karakteristik Sensoris dan Sifat Fisik Biskuit Mocaf (Modified Cassava Flour). *Jurnal Agroindustri*, 7(1), 1–10.
- Mesak, T. (2010). Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Pengendalian Penyakit Busuk Batang Vanili. *Pengembangan Inovasi Pertanian*, 2(3).
- Mukharomah, H. L., Shobaiyah, L., Tadris, J., Bologi, I. P. A., Syekh, I., & Cirebon,

- N. (2020). *Kajian Etnozoologi Biawak ( Varanus salvator ) dalam Bidang Kesehatan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam ( SAD )*. 2, 369–375.
- Niagara Health System. (n.d.). Purine Restricted Diet ( Diet for Gout ). *The American Dietetic Association, Manual of Clinical Dietetics 6th Ed. 2000*.
- Nintami, A. L., & Rustanti, N. (2012). KADAR SERAT, AKTIVITAS ANTIOKSIDAN, AMILOSA DAN UJI KESUKAAN MI BASAH DENGAN SUBSTITUSI TEPUNG UBI JALAR UNGU (*Ipomoea batatas* var *Ayamurasaki*) BAGI PENDERITA DIABETES MELITUS TIPE-2. *Journal of Nutrition College*, 1(1), 388–397. <https://doi.org/10.14710/jnc.v1i1.679>
- Noller. (2005). *Technical Data Report for Graviola (A. muricata Linn)*.
- Pangestika, W., Putri, F. W., & Arumsari, K. (2021). Pemanfaatan Tepung Tulang Ikan Patin Dan Tepung Tulang Ikan Tuna Untuk Pembuatan Cookies. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.21776/ub.jp.a.2021.009.01.5>
- Prasetyorini, Moerfiah, Wardatun, S., & Affandi. (2014). Aktifitas Berbagai Sediaan Buah Sirsak (*Annona Muricata Linn*) Dalam Penurunan Kadar Asam Urat Tikus Putih Sprague-Dawley. *Ekologia*, 14(2), 25–33.
- Prasetyorini, Moerfiah, Wardatun, S., & Rusli, Z. (2014). Potensi antioksidan berbagai sediaan buah sirsak (*Annona muricata Linn*). *Penelitian Gizi Dan Makanan*, 37(2), 137–144.
- Pusat Data dan Informasi Sistem Pertanian. (2021). *Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2020*. Retrieved from <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/163-statistik/statistik-konsumsi/751-statistik-konsumsi-pangan-tahun-2020>
- Rahmawati, Sinardi, & Iryani, A. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Bunga Brokoli (*Brassica oleracea L. Var Italica*) dengan Metode DPPH (2,2-difenil-1-1 pikrihidrazil). *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Teknik UNIFA*, (November), 230–241.
- Raini, M., & Ismawati, A. (2012). Kajian: Khasiat Dan Keamanan Stevia Sebagai Pemanis Pengganti Gula. *Media of Health Research and Development*, 21(4 Des), 145–156. <https://doi.org/10.22435/mpk.v21i4Des.50>
- Ramadhani, G. A., Izzati, M., & Parman, S. (2012). Analisis Proximat, Antioksidan dan Kesukaan Sereal Makanan Dari Bahan Dasar Tepung Jagung (*Zea mays L.*) dan Tepung Labu Kuning (*Cucurbita moschata* Durch). *ANATOMI Dan FISILOGI*, XX(2), 32–39.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*.

Retrieved from <https://tafsirq.com/>

Sugeng. (2010). *Forum Komunikasi Fakultas Kedokteran*.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sukasih, E., & Setyadjit, N. (2017). Formulasi Pembuatan Flake Berbasis Talas Untuk Makanan Sarapan (Breakfast Meal) Energi Tinggi Dengan Metode Oven. *Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian*, 9(2), 70. <https://doi.org/10.21082/jpasca.v9n2.2012.70-76>

Sunartaty, R., & Yulia, R. (2017). Pembuatan Abu Dan Karakteristik Kadar Air Dan Kadar Abu Dari Abu Pelepah Kelapa. *Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, 1, 560–562.

Susanti, I., Loebis, E. H., & Meilidayani, S. (2017). Modifikasi Flakes Sarapan Pagi Berbasis Mocaf dan Tepung Jagung. *Warta Industri Hasil Pertanian*, 34(1), 44. <https://doi.org/10.32765/wartaihp.v34i1.4067>

Tracey, E. (2000). You Are What You Eat: New Theories About Rheumatoid Arthritis. Retrieved April 26, 2022, from WebMD website: <https://www.webmd.com/rheumatoid-arthritis/news/20000418/rheumatoid-arthritis-diet>

Tumakaka, H., Sirajuddin, S., Salam, A., & Jafar, N. (2020). Formulasi dan Kandungan Zat Gizi Minuman Serbuk Berbasis Seledri (*Apium graveolens* L.) sebagai Pangan Fungsional. *JGMI: The Journal of Indonesian Community Nutrition*, 9(2), 151–161.

Ulfa, A. M., Winahyu, D. A., & Jasuma, M. (2017). Penetapan Kadar Lemak Margarin Merk X Dengan Kemasan Dan Tanpa Kemasan Dengan Metode Sokletasi. *Jurnal Analis Farmasi*, 2(4), 258–262.

USDA. (n.d.-a). Biscuit Baking Powder Or Buttermilk Type Made From Home Recipe. Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/784702/nutrients>


USDA. (n.d.-b). Butter, Salted. Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173410/nutrients>

USDA. (n.d.-c). Cereal Corn Flakes. Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/785610/nutrients>

USDA. (n.d.-d). Corn flour, yellow, whole-grain. Retrieved from [https://www.nutritionvalue.org/Corn\\_flour%2C\\_yellow%2C\\_whole-](https://www.nutritionvalue.org/Corn_flour%2C_yellow%2C_whole-)


grain\_nutritional\_value.html

- USDA. (2019a). Milk, Nonfat, Fluid, with Added Vitamin A and Vitamin D (Fat Free or Skim). Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171269/nutrients>
- USDA. (2019b). Sweetener, Herbal Extract Powder from Stevia Leaf. Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170679/nutrients>
- USDA. (2020). Vanilla Flavored Milked Oats, Vanilla. Retrieved from <https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/941614/nutrients>
- Wahyu Widyanto, F. (2014). Arthritis Gout Dan Perkembangannya. *Saintika Medika*, 10(2), 145–152. <https://doi.org/10.22219/sm.v10i2.4182>
- Wardani, D. P., Liviawaty, E., & Junianto. (2012). Fortifikasi Tepung Tulang Tuna Sebagai Sumber Kalsium Terhadap Tingkat Kesukaan Donat. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 3(4), 41–50.
- Widyaningrum, H. (2012). *Sirsak Si Buah Ajaib 10.000x Lebih Hebat dari Kemoterapi*. Yogyakarta: MedPress.
- Winarsi, H. (2007). *Antioksidan Alami dan Radikal Bebas : Potensi dan Aplikasinya dalam Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiradharma, P. B. (2021). Pembuatan Puree Menjadi Produk Siap Pakai Dan Pemasarannya. *Jurnal Pengolahan Pangan*, 6(1), 7–14.
- Yayan Rizikiyan, Lela Sulastri, Sulistiorini Indriaty, Khofifah, & Yuniarti Falya. (2022). Formulasi Dan Uji Aktivitas Antioksidan Lotion Ekstrak Etanol Kulit Buah Manggis (*Garcinia Mangostana L.*) Dengan Metode Dpph (2,2-Difenyl-1-Pikrylhidrazil). *Medical Sains : Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(2), 147–160. <https://doi.org/10.37874/ms.v7i2.330>
- Yenrina, R. (2015). Metode Analisis Bahan Pangan Dan Komponen Bioaktif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Padang: Andalas University Press.
- Yulianti, D. E. R., & Hersoelistorini, W. (2020). Effect of Maizena Addition on Levels of  $\beta$ -carotene, Antioxidant Activity and Organoleptic Properties of Instant Yellow Pumpkin Soup. *Jurnal Pangan Dan Gizi*, 10(2), 61–72.
- Zhang, Y., Chen, S., Yuan, M., Xu, Y., & Xu, H. (2022). Gout and Diet: A Comprehensive Review of Mechanisms and Management. *Nutrients*, 14(17), 1–22. <https://doi.org/10.3390/nu14173525>


*Lampiran 1 Kerangka Konsep*

## Lampiran 2. Pembuatan Sereal Flakes

### 1. Penyiapan Sampel




### 2. Pembuatan Formula Sereal *Flakes*



### Lampiran 3. Analisis Proksimat Sereal Flakes

#### 1. Analisis Kadar Air




Perhitungan Kadar Air

$$\% \text{ Kadar Air} = \frac{B1 - B2}{B2} \times 100\%$$

Dengan :  $B1$  : berat cawan dan sampel awal

$B2$  : berat cawan dan sampel akhir

## 2. Analisis Kadar Serat Kasar




Perhitungan Kadar Serat


$$\% \text{ Kadar Serat Kasar} = \frac{W1 - W2}{\text{Berat sampel (gram)}} \times 100\%$$

### 3. Analisis Kadar Karbohidrat


#### a. Pembuatan Larutan *Luff Schoorl*




#### b. Pembuatan Larutan Kanji



## c. Pembuatan Titar Thio 0.1 N



## d. Analisis Kadar Karbohidrat




Perhitungan Kadar Karbohidrat

$$\text{Larutan Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \text{ yang digunakan} = \frac{(\text{ml blanko} - \text{ml sampel}) \times N \text{ tio}}{0.1} = Z$$

Z lihat pada tabel Luff schoorl untuk melihat kandungan gulanya (mg glukosa)

$$\text{Kadar Pati (\%)} = \frac{\text{mg glukosa} \times \text{Faktor Pengencer} \times 0.95 \times 100\%}{\text{berat sampel (mg)}}$$

## 4. Analisis Kadar Abu




Perhitungan Kadar Abu


$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{B1 - B2}{\text{Berat sampel (gram)}} \times 100\%$$

## 5. Analisis Kadar Protein


### a. Tahap Destruksi



### b. Tahap Destilasi



## c. Tahap Titration




## Perhitungan Kadar Protein

$$\% N = \frac{(A - B) \times N_{HCl} \times 14}{\text{Berat sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$\text{Kadar protein} = \% N \times \text{Faktor konversi (6,25)}$$

## 6. Analisis Kadar Lemak



Perhitungan Kadar Lemak

$$Kadar\ Lemak\ (\%) = \frac{B - A}{Berat\ sampel\ (g)} \times 100\%$$

#### Lampiran 4. Analisis Antioksidan

1. Pembuatan Larutan Sampel Sereal Flakes dan Vitamin C konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 ppm (dalam 10 ml)

- a. Konsentrasi 20 ppm

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$V1 = \frac{20 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,2 \text{ ml}$$

- b. Konsentrasi 40 ppm

$$V1 = \frac{40 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,4 \text{ ml}$$

- c. Konsentrasi 60 ppm

$$V1 = \frac{60 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,6 \text{ ml}$$

- d. Konsentrasi 80 ppm

$$V1 = \frac{80 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{1000 \text{ ppm}} = 0,8 \text{ ml}$$

- e. Konsentrasi 100 ppm

$$V1 = \frac{100 \text{ ppm} \times 10 \text{ ml}}{1000 \text{ ppm}} = 1,0 \text{ ml}$$

2. Pengujian Antioksidan

- a. Pembuatan Larutan DPPH 0.2 mM

Ditimbang 3,9433 mg

↓  
- Dilarutkan di 50 ml  
etanol pa (0,2 mM)


Diukur serapannya pada Panjang gelombang 515-517 nm

- b. Pembuatan Larutan Induk Sampel Sereal Flakes 1000 ppm


Ditimbang 10 mg F1, F2, dan F3

Dilarutkan di 10 ml etanol pa

## c. Pembuatan Larutan Induk Vitamin C 1000 ppm



## d. Pembuatan Kurva Standar Sampel Sereal Flakes dan Vitamin C



## Lampiran 5. Hasil Uji Organoleptik

### 1. Data Hedonik Panelis

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Sampel													
				Warna			Aroma			Rasa			Tekstur				
				F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F1	F2	F3		
1	Surya Aulia F.	19	P	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Fathiah	18	P	2	4	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	4	4
3	Ramuna	17	P	3	3	4	4	3	3	2	2	4	4	4	4	4	4
4	Rizaa Ramadhani	19	P	2	3	4	2	2	3	1	2	2	3	3	3	3	4
5	Aenar Mardiah	18	P	2	3	4	2	3	4	2	3	4	3	3	3	3	3
6	F.O	18	L	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	4	4
7	Sr	22	P	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3
8	Fr	22	P	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4
9	Teman Wika	21	P	3	2	4	1	3	3	1	2	3	1	3	2	3	2
10	Halifah	22	P	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
11	Achenk	22	L	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3
12	Sri Wahyuni	22	P	2	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	4
13	Mansur	39	L	3	3	3	3	3	3	4	2	3	4	4	3	3	3
14	Hayati	30	P	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
15	Ningsi	30	P	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	2
16	Syamsiar	36	P	2	3	4	1	3	4	1	3	4	3	4	3	3	3
17	Huma I	37	P	2	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3
18	Sr	22	P	2	3	3	3	4	3	2	3	3	2	3	2	3	3
19	Samsinar	44	P	3	1	1	3	2	2	1	3	3	1	2	2	2	1
20	Hariyanti	40	P	2	2	2	3	3	3	4	2	2	2	3	3	2	2
21	Suami Hariyanti	49	L	2	2	2	3	3	3	4	2	2	3	3	3	2	2
22	Syamsidar	40	P	4	2	2	4	2	2	4	1	2	4	1	2	4	1
23	Nurbaya	48	P	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Ahmad	49	L	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
25	A. Bariati	52	P	3	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	2
26	Bau	50	P	4	3	3	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	2
27	Mariyati	54	P	2	2	2	3	3	3	4	3	2	4	4	3	2	2
28	Ibu Kantin Wika	55	P	2	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	3	4	4
29	Ridwan M.	55	L	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
30	Dg. Rillau	55	L	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4
31	Rusmiyati	56	P	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
32	Ibu Kost Wika	59	P	2	4	3	3	3	3	2	2	4	2	3	4	2	2
33	Harnia	72	P	3	2	2	3	2	2	3	2	1	3	3	3	3	3
34	Siti Hasna	69	P	2	3	4	1	3	3	2	1	4	3	2	1	4	3
35	Lammi	76	P	3	3	2	3	3	2	2	3	2	2	3	2	2	3
36	Hafishah	72	P	2	3	2	3	2	3	3	1	3	2	3	2	3	3
<b>Jumlah</b>				<b>93</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>103</b>	<b>108</b>	<b>107</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>104</b>	<b>112</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

## 2. Parameter Warna

**Tests of Between-Subjects Effects**

Dependent Variable:Warna

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	23.676 <sup>a</sup>	37	.640	1.494	.074
Intercept	861.343	1	861.343	2.011E3	.000
Sampel	3.352	2	1.676	3.913	.024
Panelis	20.324	35	.581	1.356	.139
Error	29.981	70	.428		
Total	915.000	108			
Corrected Total	53.657	107			

a. R Squared = .441 (Adjusted R Squared = .146)

**Warna**

Duncan

Sampel	N	Subset	
		1	2
Formula 1	36	2.58	
Formula 2	36	2.89	2.89
Formula 3	36		3.00
Sig.		.052	.474

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = .428.

## 3. Parameter Aroma

## Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Aroma

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	14.722 <sup>a</sup>	37	.398	1.034	.443
Intercept	936.333	1	936.333	2.433E3	.000
Sampel	.389	2	.194	.505	.606
Panelis	14.333	35	.410	1.064	.404
Error	26.944	70	.385		
Total	978.000	108			
Corrected Total	41.667	107			

a. R Squared = .353 (Adjusted R Squared = .012)

## Aroma

Duncan

Sampel	N	Subset
		1
Formula 1	36	2.86
Formula 3	36	2.97
Formula 2	36	3.00
Sig.		.376

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error)  
= .385.

## 4. Parameter Rasa

## Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Rasa

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	35.556 <sup>a</sup>	37	.961	1.316	.160
Intercept	901.333	1	901.333	1.234E3	.000
Sampel	.889	2	.444	.609	.547
Panelis	34.667	35	.990	1.357	.139
Error	51.111	70	.730		
Total	988.000	108			
Corrected Total	86.667	107			

a. R Squared = .410 (Adjusted R Squared = .099)

## Rasa

Duncan

Sampel	N	Subset
		1
Formula 2	36	2.78
Formula 3	36	2.89
Formula 1	36	3.00
Sig.		.304

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error)  
= .730.

## 5. Parameter Tekstur

## Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Tekstur

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	29.315 <sup>a</sup>	37	.792	1.513	.068
Intercept	984.037	1	984.037	1.880E3	.000
Sampel	1.352	2	.676	1.291	.281
Panelis	27.963	35	.799	1.526	.067
Error	36.648	70	.524		
Total	1050.000	108			
Corrected Total	65.963	107			

a. R Squared = .444 (Adjusted R Squared = .151)

## Tekstur

Duncan

Sampel	N	Subset
		1
Formula 3	36	2.86
Formula 2	36	3.08
Formula 1	36	3.11
Sig.		.171

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error)  
= .524.

**Lampiran 6. Proses Pengerjaan Sereal Flakes**

**Gambar 11. Proses Pembuatan Sereal Flakes**



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)

Keterangan :

(a) Penyiapan; (b) Pengupasan; (c) Penyaringan; (d) Penimbangan; (e) Pencampuran;  
(f) Pengadonan; (g) Pencetakan; (h) Pengemasan

Gambar 12. Logo dan Desain Kemasan



*Gambar 13. Uji Organoleptik*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Gambar 14. Analisis Kadar Air**



(a)

(b)



(c)

Keterangan :

(a) Formula 1; (b) Formula 2; (c) Formula 3

**Gambar 15. Analisis Kadar Abu**



(a)




(b)


Keterangan :

(a) Formula 1 dan Formula 2; (b) Formula 3

**Gambar 16. Analisis Antioksidan**



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan : (a) Formula 1; (b) Formula 2; (c) Formula 3; (d) Vitamin C; (e) Pengukuran; (f) Pembacaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya  
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224  
Laman : <http://bio.fmipa.unm.ac.id>

No : 003/SKAP/LAB.BIOLOGI/VII/2022  
Lamp : 1  
Hal : Hasil Determinasi/Identifikasi Tumbuhan

Makassar, 27 Juni 2022

Kepada Yth.  
**Dian Irawati Ahmad (70100118041)**  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Farmasi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan hasil determinasi/identifikasi tumbuhan yang saudara kirimkan ke laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Makassar, sebagai berikut:

No	No. Koleksi	Species	Familia
1	01	<i>Annona muricata</i> L.	Annonaceae

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Laboratorium Biologi  
FMIPA UNM



**Prof. Oslan Jumadi, S.Si, M.Phil, Ph.D.**  
NIP. 19701016 199702 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
LABORATORIUM BIOLOGI

Alamat : Kampus Parangtambung Jl. Dg. Tata Raya  
Tlp. (0411) 840610 Fax. (0411) 841504 Makassar 90224  
Laman : <http://bio.fmipa.unm.ac.id>

**Deskripsi *Annona muricata* L.**

Pohon kecil, perennial, tinggi sekitar 3-8 m. Daun tunggal, bangun bulat panjang, duduk tersebar, tanpa stipula, permukaan atas berwarna hijau tua mengkilap, permukaan bawah hijau pucat, tepi rata, ujung meruncing, basal runcing, tulang daun menyirip, memiliki aroma khas ketika diremas. Bunga tunggal, perhiasan bunga 2-3 lingkaran, lingkaran luar sepaloid, bisexual, benang sari banyak. Buah besar bentuk tidak beraturan, hijau, berduri lembut pada permukaan kulit buah, daging buah berwarna putih susu, rasa manis asam, memiliki aroma khas. Biji hitam, pipih.

**Klasifikasi *Annona muricata* L.**

Regnum : Plantae  
Divisio : Magnoliophyta  
Classis : Magnoliopsida  
Subclassis : Magnoliidae  
Ordo : Magnoliales  
Familia : Annonaceae  
Genus : *Annona*  
Species : *Annona muricata* L.

**Referensi:**

1. Jones, S.B. Jr. & A.E. Luchsinger, 1987. *Plant Systematics* (second ed.) McGraw-Hill Book Company. New York.
2. Steenis, van C.G.G.J., S. Bloembergen, dan P.J. Eyma, 2008. *Flora: Untuk Sekolah di Indonesia (Cetakan ke 12)*. Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Tjitrosoepomo, G. 1989. *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.



LABORATORIUM BIOTEKNOLOGI TERPADU PETERNAKAN  
 FAKULTAS PETERNAKAN  
 UNIVERSITAS HASANUDDIN  
 Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea, Makassar  
 Email: lab\_bioternak@unhas.ac.id

No.Dok.: FSPO-LBTK-UH-12.2

### SERTIFIKAT HASIL UJI

No.: 198/T/LBTK-UH/XI/2022

#### Informasi Pelanggan

Nama Perusahaan/Pelanggan : Dian Irawati Ahmad  
 Alamat Lengkap : Fklts Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
 No. Telp./faks./e-mail : 085343749149  
 Personel Penghubung : 081241981874

#### Informasi Sampel

No. Identitas Laboratorium : 198/LBTK-RK/XI-2022  
 Uraian/Matriks Sampel : -  
 Kondisi Saat Diterima : Baik  
 Tanggal Diterima : 11/11/2022  
 Tanggal Pengujian : 24/11/2022  
 Tujuan Pengujian : -

#### Informasi Hasil Pengujian

No	Kode Sampel	PARAMETER UJI				
		Kadar Air (%) (AOAC 930.15)	Kadar Abu (%) (AOAC 942.05)	Kadar Protein Kasar (%) (AOAC 984.13)	Kadar Lemak Kasar (%) (AOAC 920.39)	Kadar Serat Kasar (%) (AOAC 962.09)
1	F1	-	-	2,75	12,32	1,52
2	F1	-	-	2,27	12,18	1,49
3	F1	-	-	2,30	12,22	1,48
4	F2	-	-	2,30	12,93	1,63
5	F2	-	-	1,84	12,78	1,62
6	F2	-	-	2,29	12,82	1,66
7	F3	-	-	1,84	13,65	2,34
8	F3	-	-	1,84	13,32	2,39
9	F3	-	-	1,84	13,26	2,35

Makassar, 6 Desember 2022  
 Devisi Teknis,

Ket: 1. Kadar air ditetapkan sesuai sampel uji; 2. Selain kadar air, parameter ditetapkan berdasarkan sampel asli; 3. Lembaran sertifikat hasil uji ini tertelusur; 4. Hasil hanya berhubungan dengan contoh yang diuji dan ~~laporan ini tidak boleh digandakan~~

Dr. Ir. Syahrani Syahrir, M.Si.  
 NIP.: 196511121990032001



LABORATORIUM KIMIA MAKANAN TERNAK  
JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

HASIL ANALISIS BAHAN

No	Kode Sampel	Karbohidrat (%)
1	F1.1	69,79
2	F1.2	70,61
3	F1.3	69,21
4	F2.1	67,29
5	F2.2	66,67
6	F2.3	67,60
7	F3.1	65,96
8	F3.2	65,70
9	F3.3	66,62

Ket. : 1. Hasil Analisis Berdasarkan Contoh Asli


Makassar, 28 November 2022

Analisis

Muhammad Syahrul

Nip. 19790603 2001 12 1 001

1/5/2023 3:04:29 PM Page 1 of 1



### Scan Analysis Report

Report Time : Thu 05 Jan 03:04:25 PM 2023  
Method:  
Batch:  
Software version: 3.00(339)  
Operator:

#### Sample Name: DPPH 0,2 mM

Collection Time 12/28/2022 3:04:53 PM

Peak Table	
Peak Style	Peaks
Peak Threshold	0.0100
Range	520.0nm to 515.0nm

No peak found above threshold

1/5/2023 3:05:11 PM Page 1 of 2

## Advanced Reads Report

Report time 12/28/2022 3:10:30 PM  
 Method  
 Batch name C:\Varian\Cary Winuv\DPPH 28122022.BAB  
 Application Advanced Reads 3.00 (339)  
 Operator

## Instrument Settings

Instrument Cary 50  
 Instrument version no. 3.00  
 Wavelength (nm) 517.0  
 Ordinate Mode Abs  
 Ave Time (sec) 0.1000  
 Replicates 3  
 Sample averaging OFF

Comments:

## Analysis

Collection time 12/28/2022 3:10:30 PM

Sample	F	Mean	SD	%RSD	Readings
F1 20 PPM					0.1512 0.1515 0.1515
		0.1514	0.0002	0.14	
F1 40 PPM					0.1416 0.1416 0.1417
		0.1416	0.0001	0.04	
F1 60 PPM					0.1414 0.1416 0.1414
		0.1415	0.0001	0.08	
F1 80 PPM					0.1533 0.1532 0.1526
		0.1530	0.0003	0.23	
F1 100 PPM					0.1445 0.1445 0.1446
		0.1445	0.0000	0.02	
F2 20 PPM					0.1561 0.1561 0.1561
		0.1561	0.0000	0.02	
F2 40 PPM					0.1438 0.1438 0.1436
		0.1437	0.0001	0.08	
F2 60 PPM					0.1487 0.1487 0.1486
		0.1487	0.0001	0.05	
F2 80 PPM					0.1407 0.1411 0.1410
		0.1409	0.0002	0.13	
F2 100 PPM					0.1624 0.1622 0.1625
		0.1623	0.0001	0.09	
F3 20 PPM					0.1654 0.1654 0.1653
		0.1654	0.0000	0.01	
F3 40 PPM					0.1710 0.1709 0.1708
		0.1709	0.0001	0.03	
F3 60 PPM					0.1625 0.1624 0.1623
		0.1624	0.0001	0.07	
F3 80 PPM					0.0859 0.0858

1/5/2023 3:05:11 PM

Page 2 of 2

	0.0859	0.0001	0.10	0.0859
F3 100 PPM				0.1847
				0.1845
	0.1846	0.0001	0.04	0.1846
VIT C 20 PPM				0.0482
				0.0483
	0.0483	0.0000	0.07	0.0483
VIT C 40 PPM				0.0393
				0.0400
	0.0400	0.0007	1.81	0.0407
VIT C 60 PPM				0.0347
				0.0348
	0.0347	0.0001	0.22	0.0346
VIT C 80 PPM				0.0362
				0.0361
	0.0361	0.0002	0.57	0.0358
VIT C 100 PPM				0.0352
				0.0353
	0.0352	0.0001	0.20	0.0353

**Results Flags Legend**

R = Repeat reading

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ikhtiar lalu tawakkal, pasti bisa! Merupakan slogan andalan yang saya simpan di bio Instagram pribadi. Saya Dian Irawati Ahmad, lahir di kota Daeng pada 22 tahun yang lalu dan sekarang masih berdomisili di kota yang sama. Saya adalah sang pemimpi dari 37 mimpi, yang lembaran targetnya tersimpan rapih dalam mushaf pribadi, puji syukur satu diantaranya telah tercapai.

Saya dilahir dan dibesarkan oleh keluarga sederhana, yang kedua orang tua saya memilih menggantungkan cita-citanya yang luar biasa kepada kami selaku penerusnya. Kami bersyukur diberi banyak kemudahan dalam menapaki keistimewaan itu. Pun selama membawa nama ini pada setiap kesempatan, nama orang tua saya ada di dalamnya. Hingga menjadi mahasiswa, selain belajar, saya banyak mengikuti kegiatan seperti bergabung di UKM Universitas, kegiatan volunteer, pelatihan, lomba fiksi maupun keilmiah, hingga pekerjaan sampingan seperti asisten dosen, mengajar dan menjual bakso setelah perkuliahan selesai. Satu hal lucu, saat ujian final *plenary discussion*, saya dan teman-teman angkatan berusaha mengemukakan pendapat dan berkuat dengan literatur yang ruwet, sesaat setelah itu dagangan bakso saya diambil dan ludes dibeli teman-teman satu angkatan saking melelahkannya ujian tersebut padahal dosen belum keluar.

Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan beasiswa Hadji Kalla setelah ditolak 9 beasiswa selama berkuliah. Seperti motto saya, semua pengalaman tersebut membentuk pribadi saya menjadi seperti sekarang ini. Cita-cita saya akan sangat panjang untuk ditulis disini, namun akan selalu saya buka ketika membaca al-Qu'an. Setelah itu, sampai jumpa di journey-journey yang luar biasa!