

**UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL BIJI LABU
KUNING (*Cucurbita moschata*) MENGGUNAKAN METODE ABTS
(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:
DISA SAFITRI
NIM 70100119064

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Disa Safitri
NIM : 70100119064
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 30 Desember 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Yusuf Bauty Blok D 1 No. 1
Judul : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Menggunakan Metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))

Menyatakan bahwa sesungguhnya dengan penuh kesadaran skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 28 Desember 2023

Penulis,

Disa Safitri

NIM: 70100119064

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Menggunakan Metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))”, yang disusun oleh **Disa Safitri, NIM: 70100119064**, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 28 Desember 2023 M** yang bertepatan dengan **15 Jumadil Akhir 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 28 Desember 2023
15 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng., S.Si., M.Si	(.....)
Penguji I	: Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.
NIIP. 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Menggunakan Metode ABTS (2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))”. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Namun berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sangat spesial kepada kedua orang tua yang sangat berperan dan berjasa dalam hidup penulis Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Maria Dolores Lolita K yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak/ibu :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil Rektor 1 UIN Alauddin Makassar, Dr. H. Andi Aderus, Lc., M.A. selaku Wakil Rektor II UIN

Alauddin Makassar, Prof. Muhammad Halifah Mustamin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar, dan Prof. H. Muhammad Amry, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.

2. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp.OG., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. M. Fais Satrinegara, SKM., MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr Fatima S.Kep., Ners., M.Kep. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si selaku pembimbing pertama yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.
9. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng., S.Si., M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan motivasi hingga selesainya skripsi ini.

10. Ibu apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A selaku penguji agama yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu apt. Alwiyah Nur Syarif, S.Farm., M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak membimbing dan memberi arahan dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
13. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga selesainya skripsi ini.
14. Serta teman-teman farmasi angkatan 2019 yang tidak sempat disebutkan satu persatu, pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya baik selama dibangku perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.

Gowa, 28 Desember 2023

Disa Safitri


NIM: 70100119064

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
1. Definisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu.....	6
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Uraian Sampel	11
1. Klasifikasi.....	11
2. Deskripsi dan Morfologi.....	11
3. Kandungan.....	13
4. Manfaat.....	15
B. Ekstraksi	16
1. Pengertian Ekstraksi	16
2. Metode Ekstraksi	16
C. Skrining Fitokimia.....	17

1. Flavonoid	18
2. Fenolik	19
3. Alkaloid	20
4. Terpenoid	21
D. Uraian Flavonoid	21
E. Radikal Bebas	22
F. Penyakit Degeneratif	23
G. Antioksidan	23
1. Pengertian Antioksidan	23
2. Mekanisme antioksidan	24
3. Jenis-jenis antioksidan	25
H. Metode Pengujian Antioksidan	26
1. Metode ABTS	27
2. Metode TRAP	28
3. Metode FRAP	29
4. Metode ORAC atau HORAC	29
5. Metode CUPRAC	29
6. Metode DPPH	30
I. Spektrofotometri UV-Visibel	30
J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan	32
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Lokasi Penelitian	36
3. Waktu Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sampel	36
D. Alat dan Bahan	36
1. Alat	36
2. Bahan	37
E. Prosedur Kerja	37

1. Preparasi sampel.....	37
2. Ekstraksi	37
3. Skrining Fitokimia.....	38
4. Penentuan Aktivitas Antioksidan dengan Metode ABTS	39
5. Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan	44
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	77



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1. Kajian Pustaka.....	6
2. Kandungan Biji Labu Kuning dalam 100 g.....	14
3. Hasil Rendemen Biji Labu Kuning	43
4. Hasil Skrining Fitokimia	43
5. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Sampel Ekstrak Biji Labu Kuning.....	44
6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Pembanding Vitamin C	44
7. Hasil Running Panjang Gelombang Maksimal	70
8. Data Absorbansi Vitamin C	71
9. Data Absorbansi Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Anatomi Labu Kuning.....	13
2. Reaksi oksidasi ABTS oleh kalium persulfat.....	27
3. Panjang Gelombang Maksimal ABTS 750 nm	71
4. Kurva Baku Vitamin C.....	71
5. Kurva Ekstrak Sampel.....	72
6. Sertifikat Analisis ABTS.....	73
7. Sertifikat Analisis Kalium Persulfat.....	74
8. Ekstraksi Sampel	75
9. Hasil Skrining Fitokimia	75
10. Pengujian Antioksidan Metode ABTS	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja	60
2. Perhitungan.....	65
3. Grafik.....	70
4. Sertifikat Analisis	73
5. Gambar	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Disa Safitri
Nim : 70100119064
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning
(*Cucurbita moschata*) Menggunakan Metode ABTS
(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))

Antioksidan merupakan zat yang melindungi dan menstabilkan kerusakan sel akibat radikal bebas. Belakangan ini, radikal bebas banyak menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker dan penuaan dini. Manusia memiliki antioksidan di dalam tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen yang merupakan antioksidan yang berasal dari luar tubuh. Antioksidan sintetik yang berasal dari sintesis kimia memiliki efek karsinogenesis sehingga penggunaan antioksidan alami lebih dipilih. Salah satu antioksidan alami yang dipilih adalah biji labu kuning (*Cucurbita moschata*). Telah dilakukan skrining fitokimia senyawa flavonoid, fenolik, alkaloid, dan terpenoid dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) secara kuantitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) positif mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid yang dapat berpotensi sebagai antioksidan. Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) memiliki aktivitas antioksidan dengan metode ABTS yang ditunjukkan oleh nilai IC_{50} sebesar 14,136 ppm sedangkan untuk pembanding vitamin C sebesar 5,186 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning dan pembanding vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan sangat kuat karena nilai IC_{50} tidak lebih dari 50 ppm.

Kata Kunci: Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*), aktivitas antioksidan, ABTS (2,2-Azinobis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid)

ABSTRACT

Name : Disa Safitri
Nim : 70100119064
Thesis Title : Antioxidant Activity Test of Ethanol Extract of Yellow Pumpkin
Seeds (*Cucurbita moschata*) Using ABTS Method
(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid))

Antioxidants are substances that protect and stabilize cell damage caused by free radicals. Recently, free radicals have caused many degenerative diseases such as stroke, diabetes, hypertension, heart disease, cancer and premature aging. Humans have antioxidants in the body, but the amount is insufficient to overcome excess free radicals, so exogenous antioxidants are needed, which are antioxidants that come from outside the body. Synthetic antioxidants derived from chemical synthetics have carcinogenesis effects so the use of natural antioxidants is preferred. One of the natural antioxidants chosen is pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*). Phytochemical screening of flavonoid, phenolic, alkaloid, and terpenoid compounds from ethanol extract of yellow pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*) and antioxidant activity test on ethanol extract of yellow pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*) using ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) method quantitatively. Based on the results obtained, pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*) positively contain flavonoid and alkaloid compounds that can have potential as antioxidants. Pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*) have antioxidant activity with the ABTS method which is addressed by the IC₅₀ value of 14.136 ppm while for vitamin C comparison is 5.186 ppm. This shows that ethanol extract of pumpkin seeds and vitamin C have very high antioxidant activity.

Keywords: Pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*), antioxidant activity, ABTS (2,2'-Azinobis-3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic acid)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Radikal bebas banyak menyebabkan terjadinya penyakit degeneratif seperti stroke, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, kanker, penuaan dini dan penyakit lainnya. Radikal bebas berasal dari beberapa faktor yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita seperti asap rokok, polusi air, polusi udara, makanan minuman yang kontaminasi, obat-obatan, cahaya matahari, radiasi, gelombang elektromagnetik dari perangkat elektronik dan pestisida (Nadesul, 2006). Penyakit degeneratif terjadi akibat antioksidan yang tersedia dalam tubuh tidak mampu menetralkan peningkatan konsentrasi radikal bebas, sehingga diperlukan antioksidan dari luar tubuh untuk dapat meredakan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel (Salamah & Erlindah, 2015). Radikal bebas dapat diikat dengan antioksidan sehingga dapat menyembuhkan berbagai penyakit (Sayuti & Yenrina, 2015).

Antioksidan merupakan zat yang melindungi dan menstabilkan kerusakan sel akibat radikal bebas yang terbentuk sebagai stres oksidatif. Ketidakseimbangan antara radikal bebas (prooksidan) dan antioksidan disebut stres oksidatif. Ini terjadi karena dua kondisi umum seperti kurangnya antioksidan dan kelebihan produksi radikal dalam tubuh (Puspitasari dkk, 2016). Manusia memiliki antioksidan dalam tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen yang merupakan antioksidan yang berasal dari luar tubuh.

Berdasarkan sumbernya antioksidan dapat berupa antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan sintetik ini dikhawatirkan dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena bersifat karsinogenik sehingga penggunaan antioksidan alami lebih dipilih. Sumber antioksidan alami

banyak dikembangkan karena umumnya berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari yang mengandung vitamin A, C, E, asam folat, antosianin, senyawa fenol, dan flavonoid (Isnindar dan Wahyuno, 2011).

Indonesia memiliki banyak tanaman budidaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Buah labu kuning adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman ini mudah tumbuh, tidak membutuhkan banyak perawatan, dan hasilnya sangat menguntungkan masyarakat (Panjaitan dkk, 2015). Buah labu kuning memiliki biji, namun bagian bijinya sering terbuang percuma dan sering dianggap sampah oleh masyarakat. Padahal, biji labu kuning mengandung zat gizi yang baik serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan (Syam dkk, 2019).

Dalam Islam, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya dimuka bumi ini tidak ada yang sia-sia dan setiap yang diciptakan oleh Allah SWT patut kita syukuri dengan memanfaatkan ciptaan-Nya. Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Salah satunya adalah biji labu kuning yang terdapat pada buah labu kuning yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan.

Biji buah labu kuning (*Cucurbita moschata*) mengandung alkaloid, flavonoid, steroid dan tanin (Abd El-Aziz.dkk, 2011) dan juga menurut Primawati (2007) biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) mengandung senyawa fenolik, alkaloid, saponin, lesitin, resin, kukurbitasin, senyawa fitosterol, stearin, vanillin, asam lemak, tirosol, squalen, luteolin, asam malat dan asam sinapat, vitamin

(termasuk vitamin A, vitamin B2, vitamin β -karoten, α -tokoferol, vitamin C dan vitamin E) sehingga memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, antibakteri, antiinflamasi dan efek antioksidan. Sumber antioksidan alami dari tanaman dapat berupa senyawa kimia dari golongan flavonoid, polifenol, β -karoten, vitamin C, dan vitamin E (Hernani dan Rahardjo, 2005).

Flavonoid adalah jenis senyawa fenolik yang ada di alam yang memiliki bioaktivitas dan potensi sebagai antioksidan. Flavonoid, antioksidan eksogen yang mengandung gugus fenolik, memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena strukturnya yang memungkinkan mereka untuk mengubah atau mengurangi radikal bebas, serta sebagai antiradikal bebas (Giorgio, 2000). Sebagai antioksidan, flavonoid mendonorkan ion hidrogen, yang memungkinkan mereka untuk menstabilkan radikal bebas yang reaktif (Arora et al., 1998).

Dalam pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity) dan DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl) (Chanda dan Dave, 2009). Dalam penelitian ini digunakan metode ABTS. Metode ABTS dipilih karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode lain, yaitu pengujian sederhana, mudah diulang, menggunakan alat yang sederhana dan yang paling penting adalah fleksibel dan dapat digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan yang bersifat hidrofilik maupun lipofilik dalam ekstrak makanan dan cairan. Metode ABTS memiliki sensitivitas lebih tinggi dibandingkan DPPH, prosesnya cepat, dapat bekerja pada rentang pH luas. Metode ABTS juga dapat mengetahui kemampuan penghambatan radikal bebas dan jumlah konsentrasi antioksidan sebanyak 50% (IC_{50}). Besarnya aktivitas antioksidan ditunjukkan dengan nilai IC_{50} . Inhibition concentration 50

(IC₅₀) adalah konsentrasi efektif senyawa dalam sampel yang dapat menghambat 50% absorbansi ABTS (Puspitasari dkk, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*)?
2. Bagaimana aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Antioksidan adalah zat alami atau senyawa kimia yang dapat membantu melindungi dan menunda tubuh dari kerusakan sel yang disebabkan oleh kelebihan radikal bebas, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit degeneratif.
- b. Ekstrak etanol adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari biji labu kuning menggunakan pelarut salah satunya etanol 70%.
- c. Biji labu kuning adalah hasil dari biji yang terdapat didalam buah labu kuning. Ciri khas dari biji labu kuning adalah bentuknya yang lonjong meruncing dan gepeng.
- d. Metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) merupakan salah satu metode dalam menentukan aktivitas antioksidan yang

dimana ABTS diperoleh dari hasil oksidasi kalium persulfat sehingga terbentuk senyawa radikal.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol dari biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan salah satu metode pada pengujian antioksidan yaitu metode ABTS.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*)?
2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan penjelasan serta wawasan kepada penulis dan masyarakat mengenai kandungan biji labu kuning yang dapat dimanfaatkan sebagai agen antioksidan menggunakan metode ABTS sehingga dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan meningkatkan penggunaan bahan alam sebagai bahan pengobatan, khususnya pada biji labu kuning (*Cucurbita moschata*).

F. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Kajian Pustaka

No	Judul	Peneliti	Hasil	Perbedaan/Persamaan
1	Uji Aktivitas Antioksidan Fraksi Etil Asetat Daun kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.) Menggunakan Metode ABTS	Imrawati dkk, 2018	Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode ABTS menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat kuat dengan nilai IC ₅₀ 1,20 ppm yang sebanding dengan vitamin C (IC ₅₀ 1,18 ppm). Sehingga dapat disimpulkan bahwa daun <i>M. calabura</i> berpotensi sebagai sumber oksidan alami.	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan sampel Fraksi Etil Asetat Daun kersen (<i>Muntingia calabura</i> L.) Persamaan: Penelitian ini melakukan skrining fitokimia dan menggunakan metode ABTS dan pembandingan vitamin C secara spektrofotometri UV-Visible
2	Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Okra (<i>Abelmoschus esculentus</i>)	Faisal, 2019	Hasil pengukuran ekstrak etanol buah okra dengan metode DPPH memiliki aktivitas antioksidan	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan sampel buah okra dan

	L.Moench) Dengan Metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) dan Metode ABTS (2,2-azinobis-(3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid)		dengan kategori sangat kuat, dengan nilai IC_{50} 27,15 ppm dan pembanding vitamin C dengan nilai IC_{50} 3,38 ppm sedangkan hasil pengukuran aktivitas antioksidan ekstrak etanol buah okra dengan metode ABTS memiliki aktivitas antioksidan dengan kategori juga sangat kuat dengan nilai nilai IC_{50} 24,50 ppm dan pembanding vitamin C dengan nilai IC_{50} 28,35 ppm.	membandingkan dengan metode lain yaitu DPPH Persamaan: Penelitian ini menggunakan sampel dari ekstrak etanol dan menggunakan metode ABTS dan pembanding vitamin C secara spektrofotometri UV-Visible
3	Uji Aktivitas Antioksidan Dan Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Biji Labu	Rustina, 2016	Hasil skrining fitokimia menunjukkan ekstrak etil asetat biji labu kuning mengandung senyawa fenol hidrokuinon, alkaloid, steroid,	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan ekstrak etil asetat, hasil skrining mengandung triterpenoid,

	Kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch. Poir)		dan triterpenoid. Ekstrak etil asetat biji labu kuning berefek antioksidan dalam meredam radikal bebas DPPH dengan nilai IC ₅₀ sebesar 453,35 µg/ml. Selain itu, ekstrak etil asetat biji labu kuning dapat menghambat bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> .	menggunakan metode DPPH dan uji bakteri. Persamaan: Penelitian ini menggunakan sampel biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch. Poir), hasil skrining mengandung alkaloid dan melakukan uji aktivitas antioksidan secara spektrofotometri UV-Vis.
4	Uji Efek Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch) Terhadap Kadar Kreatinin Ureum Tikus Putih Jantan (<i>Rattus Norvegicus</i>)	Ayu dkk, 2020	Hasil uji skrining fitokimia ekstrak etanol biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch) mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, saponin, tanin dan polifenol. Ekstrak etanol biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch)	Perbedaan: Penelitian ini ekstrak etanol biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch) mengandung senyawa polifenol serta melakukan pengujian efek kadar kreatinin ureum tikus putih jantan hiperkolesterolemia-diabetes.

	Hiperkolesterolemia-Diabetes.		memberikan efek penurunan terhadap kadar kreatinin ureum tikus putih Jantan hiperkolesterolemia-diabetes.	Persamaan: Penelitian ini menggunakan sampel ekstrak etanol biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i> Duch), melakukan pengujian skrining fitokimia dan hasil skrining fitokimia mengandung flavonoid dan alkaloid.
5.	Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Dan Partisi Etil Asetat Biji Labu Kuning (<i>Cucurbita moschata</i>)	Setiawan, 2018	Analisa KLT ekstrak metanol dan partisi etil asetat biji labu kuning mengandung senyawa Flavonoid. Kekuatan antioksidan dengan metode DPPH yang dimiliki yaitu berdasarkan nilai IC_{50} 29,113 $\mu\text{g/ml}$ pada ekstrak metanol dan 27,893 $\mu\text{g/ml}$ pada partisi etil asetat	Perbedaan: Penelitian ini menganalisis senyawa menggunakan metode KLT dan menggunakan metode DPPH. Persamaan: Penelitian ini menggunakan sampel biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i>), biji labu kuning mengandung senyawa flavonoid dan melakukan uji aktivitas

				antioksidan secara Spektrofotometri UV-Vis.
6.	Evaluation of Antioxidant Activity of Botto-Botto Leaf Fraction (<i>Chromolaena Odorata</i> L.) Using DPPH and ABTS Methods	Tahir dkk, 2022	Fraksi n-butanol ekstrak daun Botto-Botto (<i>Chromolaena odorata</i> L) mempunyai aktivitas antioksidan paling tinggi dibandingkan fraksi n- heksana dan fraksi air, dimana pada metode DPPH nilai IC ₅₀ n- fraksi butanol sebesar 33,535 µg/mL dan pada metode ABTS nilai IC ₅₀ sebesar 60,885 µg/mL.	Perbedaan: Penelitian ini menggunakan sampel daun Botto-Botto, membandingkan uji aktivitas antioksidan dengan metode lain yaitu DPPH dan pada metode ABTS menggunakan ELISA reader. Persamaan: Penelitian ini melakukan skrining fitokimia dan menguji aktivitas antioksidan dengan metode ABTS.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi

Labu kuning merupakan suatu jenis tanaman sayuran menjalar dari famili Cucurbitaceae yang setelah berbuah akan langsung mati. Bagian tengah labu kuning terdapat biji yang diselimuti lendir dan serat. Bijinya berbentuk pipih dengan kedua ujungnya berbentuk runcing (Patel, 2013).

Klasifikasi biji labu kuning (Hayati dkk, 2012)

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Cucurbitales
Famili	: Cucurbitaceae
Genus	: <i>Cucurbita</i>
Species	: <i>Cucurbita moschata</i>

2. Deskripsi dan Morfologi


Di Indonesia, labu kuning memiliki nama lokal yang antara satu daerah atau pulau berbeda dengan daerah atau pulau yang lainnya. Di Pulau Jawa, labu kuning disebut waluh. Di Pulau Madura dikenal dengan nama labuh. Di pulau Sulawesi disebut dengan nama boyo'. Sementara itu, di Malaysia diberi nama labu metah, ada pula yang menamainya dengan labu parang (Hayati dkk, 2012).

Tanaman labu kuning adalah spesies tumbuhan semak yang merambat, mudah ditanam, dan tidak memerlukan perawatan intensif. Tanaman ini dapat

tumbuh pada berbagai jenis lahan atau tanah, misalnya di kebun, dan bahkan di halaman rumah. Oleh karena itu, tanaman ini mudah di dapatkan di berbagai tempat, termasuk di seluruh wilayah di Indonesia. Adapun ciri umum tanamannya adalah mempunyai batang berkayu, lunak, berbentuk segi empat, berambut, berbuku-buku, memiliki panjang batang kurang lebih 25 meter dan berwarna hijau muda (Hayati dkk, 2012).

Tanaman labu kuning mempunyai daun yang lebar, berbentuk jantung di bagian kaki daun, berbulu dan memiliki kelenjar di bagian bawah. Tanaman ini memiliki bunga yang terdiri atas lima bagian dan umumnya berwarna hijau dan kuning. Buah tanaman labu cenderung berukuran besar, dengan kulit berwarna hijau bagi tanaman labu yang cenderung muda. Akan tetapi, jika sudah tua dan siap panen kulit buahnya berwarna kuning. Adapun daging buahnya cenderung berukuran tebal 2 hingga 4 cm. Sementara itu, buahnya terasa manis. Warna kuning cerah pada daging buah menunjukkan bahwa tanaman ini mengandung pigmen karotenoid, di antaranya adalah betakaroten yang akan diolah oleh tubuh menjadi vitamin A yang bermanfaat bagi pertumbuhan, pemeliharaan jaringan tubuh dan penglihatan, reproduksi, perkembangan janin serta untuk meminimalisir kanker dan gangguan hati (Syam dkk, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan biji labu kuning berbentuk bulat hingga lonjong. Panjang biji berkisar antara 1,4-1,8 cm dan lebar biji berkisar 0,6-1 cm. Warna permukaan biji mulai dari putih hingga kecoklatan (Patel, 2013). Berikut ini merupakan struktur anatomi dari labu kuning yang terdiri atas, kulit buah, biji buah labu kuning, dan daging buahnya.



Gambar 1. Struktur Anatomi Labu Kuning (a) Kulit biji labu kuning; (b) Daging buah labu kuning; (c) Biji labu kuning (Primer, 2023)

3. Kandungan

Biji labu kuning mengandung beberapa jenis asam amino yaitu alanin, arginin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glisin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, threonin, triptofan, tirosin, dan valin (Glew dkk, 2006). Biji labu kuning juga mengandung berbagai bahan penting dalam jumlah yang relatif besar unsur mikro seperti K, Cr dan Na. Biji labu kuning merupakan sumber Mg, Zn, Cu, Mo dan Se yang baik. (Yadav et al., 2010). Berikut gizi dan kandungan kimia yang terdapat dalam biji labu kuning yang salah satunya vitamin C yang berpotensi sebagai antioksidan (USDA, 2018):

Tabel 2. Kandungan Biji Labu Kuning dalam 100 g

Kandungan	Nilai per 100 g
Proksimat	
Air	4,5 g
Energi	446 kkal
Protein	18,55 g
Lemak	19,4 g
Karbohidrat	53,75 g
Serat	18,4 g
Mineral	
Kalsium (Ca)	55 mg
Besi (Fe)	3,31 mg
Magnesium (Mg)	262 mg
Fosfor (P)	92 mg
Kalium (K)	919 mg
Natrium (Na)	18 mg
Zink (Zn)	10,3 mg
Vitamin	
Vitamin C	0,3 mg
Thiamin	0,034 mg
Riboflavin	0,052 mg
Niacin	0,0286 mg
Vitamin B6	0,037 mg
Folat	9 µg

Biji labu kuning mengandung vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks yang tinggi serta vitamin larut lemak seperti vitamin E dan K (USDA, 2018). Biji labu kuning juga mengandung senyawa alkaloid, saponin, kukurbitasin, lesitin, resin, stearin, senyawa fitosterol, fenolik, asam lemak, squalen, tirosol, asam vanilat, vanillin, luteolin dan asam sinapat, vitamin (termasuk vitamin β -karoten, vitamin A, vitamin B2, α -tokoferol, vitamin C dan vitamin E). Salah satu senyawa

yang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan adalah kandungan vitamin C dalam biji labu kuning.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tandi dkk (2018) bahwa ekstrak etanol biji labu kuning mengandung senyawa metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, dan tanin. Dan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rustina (2016) pada ekstrak etil asetat biji labu kuning mengandung senyawa alkaloid, steroid, triterpenoid dan fenol hidrokuinon. Menurut penelitian dari Fa-seng dkk (2009) Biji labu kuning mengandung karotenoid (betakaroten), Vitamin A dan C, mineral, lemak serta karbohidrat.

4. Manfaat

Biji labu kuning memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia, diantaranya meningkatkan kesehatan jantung karena memiliki serat yang bisa menurunkan kolesterol jahat. Manfaat lainnya adalah sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang karena mengandung kalsium yang merupakan zat gizi pembentuk tulang. Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) juga mengandung antioksidan tinggi, yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi yang terkandung di dalamnya sangat beragam dan baik untuk tubuh, sehingga menyebabkan biji labu kuning menjadi salah satu makanan alternatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Syam dkk., 2019).

Biji labu kuning dapat diolah seperti menjadi minyak, biji labu kuning ini sangat banyak sekali khasiatnya terutama dalam pengobatan, digunakan sebagai obat untuk penyakit anti aging, anti kanker, radang usus, dan anti diabetes. Biji labu kuning dapat mencegah penuaan dini, mengonsumsi biji labu kuning bisa menjadi salah satu triknya. Hal ini dikarenakan biji labu kuning kaya akan kandungan vitamin E, seperti alfa-tokoferol dan gamma tokoferol, yang merupakan antioksidan

super. Vitamin E yang terdapat pada biji labu kuning bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi. Untuk itu, kandungan-kandungan ini menjaga sel agar tidak cepat rusak dan mencegah penuaan dini (Syam dkk, 2019).

B. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Menurut Farmakope Indonesia edisi IV, Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang tepat, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes, 1995).

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Tetti, 2014). Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Depkes RI, 2020).

2. Metode Ekstraksi

Metode pemisahan ekstraksi menggunakan prinsip kelarutan *like dissolve like* dimana suatu pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non polar akan melarutkan senyawa non polar (Rukayyah, 2022). Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional adalah metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Faktor- faktor yang mempengaruhi ekstraksi antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, dan ukuran partikel (Chairunnisa, 2019).

Ekstraksi menggunakan pelarut terdiri dari cara dingin yaitu maserasi. Maserasi adalah salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu (Wijaya, 2022). Pada saat proses perendaman bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan (Wijaya, 2022).

Metode ekstraksi sederhana adalah maserasi. Maserasi terdiri dari ekstraksi, atau difusi, bahan kandungan dari sel yang masih utuh dan larutnya bahan kandungan simplisia dari sel yang rusak. Setelah waktu maserasi selesai, yang berarti keseimbangan antara bahan yang diekstraksi dan yang masuk ke dalam cairan telah tercapai, proses difusi akan berakhir. Pengadukan dilakukan berulang kali selama proses maserasi atau perendaman. Upaya ini memastikan konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat di dalam cairan tetap seimbang. Namun, perpindahan bahan aktif menurun selama keadaan diam selama maserasi. Secara teoritis, ekstraksi maserasi tidak memungkinkan ekstraksi absolut. Menurut Voight (1994), hasil yang lebih baik dapat dicapai dengan perbandingan yang lebih sederhana terhadap cairan pengestraksi.

C. *Skrining Fitokimia*

Pengujian yang disebut skrining fitokimia bertujuan untuk mengetahui senyawa metabolit tumbuhan yang terdapat pada biji labu kuning. Tumbuhan menghasilkan senyawa yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya yang dikenal sebagai senyawa metabolit. Flavonoid, fenolik, alkaloid, dan terpenoid adalah metabolit sekunder. Fitokimia digunakan untuk mengetahui apakah ada senyawa metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan.

Dua jenis senyawa organik ada di dalam tumbuhan yaitu senyawa metabolit primer, yang merupakan senyawa utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Sebaliknya, senyawa metabolit sekunder, yang juga disebut sebagai senyawa non nutrisi, dibuat untuk melindungi tumbuhan dari bakteri, serangga, dan patogen lainnya (Rasyd, 2012).

Skринing fitokimia adalah langkah pertama dalam penelitian ini untuk mencari senyawa bioaktif baru dari bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk obat tertentu. Uji fitokimia digunakan dalam penelitian ini. Flavonoid, fenolik, alkaloid, saponin, dan terpenoid akan diuji (Harborne, 2009).

1. Flavonoid

Kelompok fenol terbesar, flavonoid ditemukan di banyak bagian tanaman seperti daun, batang, akar, dan buah. Senyawa tersebut mengandung zat merah, ungu, biru, dan sebagian kuning yang ditemukan dalam tanaman. Salah satu kelompok polifenol, flavonoid, diketahui memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif, dan berfungsi sebagai antiinflamasi (Pourmourad dkk, 2006). Menurut Robinson (1995), flavonoid mengontrol fotosintesis, pertumbuhan, dan aktivitas antimikroba dan antivirus. Flavonoid berfungsi sebagai antiinflamasi, mencegah keropos tulang, meningkatkan kinerja vitamin C, dan melindungi struktur sel (Haris, 2011).

Flavonoid dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan, seperti buah, biji, akar, daun, dan kulit luar batang (Ahmad et al., 2015). Menurut Miller (1996), sejumlah tanaman obat yang mengandung flavonoid memiliki sifat antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi, dan antikanker. Dalam struktur molekulnya, flavonoid yang mengandung gugus flavanon, katekin, flavon, dan antosianin berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa ini berfungsi untuk menghentikan radikal bebas seperti superoksida yang terbentuk sebagai hasil dari

reaksi enzim xantin oksidase. Untuk mengetahui apakah ada senyawa flavonoid dalam ekstrak tumbuhan, magnesium dan asam klorida ditambahkan pada ekstrak tumbuhan sehingga menghasilkan warna merah atau orange (Sirait, 2007).

2. Fenolik

Senyawa fenolik adalah substansi organik yang terdiri dari senyawa aromatik yang terikat dengan satu atau lebih substituen hidroksil (OH). Sebagian besar senyawa fenolik adalah polifenol, meskipun sedikit yang ditemukan dalam sumber hewani. Flavonoid adalah golongan terbesar dari 8000 senyawa polifenol tumbuhan yang diketahui (Williams et al., 1994).

Saat ini, senyawa fenolik adalah bahan alam yang cukup populer. Sangat bermanfaat bagi manusia karena kemampuan untuk berfungsi sebagai senyawa biologi aktif. Salah satunya berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah dan mengobati penyakit degeneratif seperti kanker, penuaan dini, penyakit sistem imun tubuh yang rusak, dan penyakit lainnya (Apsari dan Susanti, 2011). Fenol, asam fenolat, tanin, lignin, dan flavonoid adalah beberapa contoh senyawa fenol yang ditemukan dalam tumbuhan. Beberapa senyawa fenolik memiliki aktivitas alelopati, yang berarti mereka dapat berdampak baik atau buruk pada tanaman yang tumbuh bersama (Croteau dkk, 2000). Sifat farmakologi senyawa fenolik termasuk antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Fenol adalah antioksidan alami yang ditemukan sebagai senyawa aktif pada tumbuhan atau makanan.

Senyawa fenol banyak ditemukan pada kulit, daun, batang, dan biji tumbuhan. Untuk mengetahui apakah ada senyawa fenolik pada suatu tumbuhan, 1% FeCl_3 ditambahkan ke dalam air atau etanol digunakan untuk menghasilkan warna hijau kecoklatan, coklat kehitaman, atau hitam pekat.

3. Alkaloid

Alkaloid ada di banyak bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit batang. Alkaloid biasanya hanya ada dalam jumlah kecil dan perlu dipisahkan dari kombinasi senyawa kompleks yang berasal dari jaringan tumbuhan (Ningrum, 2016). Alkaloid bertindak sebagai racun untuk tanaman, melindunginya dari serangga dan herbivora, faktor pengatur pertumbuhan, dan senyawa simpanan yang dapat memberikan nitrogen dan bahan lain yang dibutuhkan tanaman (Wink, 2008). Berdasarkan sistem cincinnya, alkaloid dibagi menjadi kelompok seperti piridina, piperidina, indol, isokuinolina, dan tropana. Meskalina dan efedrina adalah dua alkaloid yang memiliki nitrogen dalam struktur alifatik. Secara umum, senyawa ini ditemukan dalam tumbuhan sebagai garam dari berbagai senyawa organik, dan sering diproses di laboratorium sebagai garam dengan asam hidroklorida dan asam sulfat (Robinson, 1995).

Senyawa golongan alkaloid digunakan dalam pengobatan seperti antimalaria, antioksidan, obat asma, dan senyawa yang berfungsi sebagai antihiperlipidemik (Tiong dkk, 2013). Untuk mengetahui apakah ada senyawa alkaloid pada suatu tumbuhan, pereaksi seperti pereaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorff dapat ditambahkan. Positif alkaloid menunjukkan jika ditambahkan pereaksi Mayer terjadi perubahan warna menjadi warna kuning dan disertai endapan putih hingga putih kabut. Sedangkan jika ditambahkan pereaksi Dragendorff terjadi perubahan warna menjadi warna merah jingga dan membentuk endapan orange hingga endapan kuning kecoklatan. Positif alkaloid jika ditambahkan pereaksi Mayer dan menghasilkan endapan kuning hingga coklat. Perubahan yang terjadi untuk pereaksi Wagner adalah menghasilkan endapan putih hingga putih kabut.

4. Terpenoid

Dalam jaringan tanaman, ada senyawa terpenoid bebas, namun sebagian besar di antaranya ditemukan dalam bentuk alkohol, aldehid (Harborne, 1987), glikosida, dan ester asam aromatik. Terpenoid memiliki berbagai aktivitas fisiologis, antara lain untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, malaria, radang (Aguirre, 2006), analgesik (Delporte, 2007), dan kanker. Di sisi lain, tumbuhan itu sendiri dapat berfungsi sebagai insektisida atau antifungis (Robinson, 1995).

Pada umumnya, senyawa ini memiliki bau yang kuat dan dapat melindungi tumbuhan dari predator dan herbivora. Uji triterpenoid dengan Liebermann-Burchard menunjukkan hasil positif jika memberikan warna cincin merah, jingga, kuning, ungu, atau violet pada perbatasan dua pelarut. Terbentuknya warna hijau, hijau kebiruan, atau biru adalah tanda adanya steroid (Lestari, 2012).

D. Uraian Flavonoid

Sekelompok besar polifenol yang terdapat dalam tanaman disebut flavonoid. Kandungan flavonoid dalam tanaman sangat rendah, sekitar 0,25%, dan biasanya terdapat dalam keadaan terikat atau terkonjugasi dengan senyawa gula (Winarsi, 2007). Deretan senyawa C₆-C₃-C₆ menunjukkan kelompok flavonoid terdiri dari dua gugus C₆ (cincin benzene tersubsitisi) yang terhubung oleh rantai alifatik 3 karbon. Aglikon flavonoid, atau flavonoid tanpa gula terikat, dapat ditemukan dalam berbagai bentuk struktur dalam satu tumbuhan, serta dalam bentuk kombinasi glikosida (Harbone, 1987).

Sifat antioksidan flavonoid memungkinkannya berfungsi sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Selain itu, karena berfungsi sebagai reduktor, flavonoid memiliki kemampuan untuk memberikan hidrogen kepada radikal bebas (Silalahi, 2006). Antioksidan kuat seperti quersetin,

morin, mirisetin, kaemferol, asam tanat, dan asam elagat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006).

Sebagai antioksidan, flavonoid merangsang pembentukan nitrit oksida, yang dapat melebarkan (relaksasi) pembuluh darah dan menghambat penggumpalan keping keping sel darah. Flavonoid juga memiliki sifat hepatoprotektif, antitrombotik, antiinflamasi, dan antivirus selain berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas (Winarsi, 2007). Flavonoid memiliki efek yang sangat beragam terhadap berbagai organisme, yang menjelaskan mengapa tumbuhan yang mengandung flavonoid digunakan dalam pengobatan tradisional. Flavonoid tertentu adalah bahan aktif tumbuhan yang digunakan secara tradisional untuk mengobati gangguan fungsi hati. Aktivitas antioksidannya mungkin menjadi penyebabnya (Robinson, 1995).

E. Radikal Bebas

Menurut Novioella (2019), radikal bebas adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang membuatnya sangat reaktif dan mencari pasangan dengan menempel pada elektron molekul terdekat. Radikal bebas dapat berasal dari dua sumber: dari dalam tubuh (endogen), yang berasal dari enzim SOD (superoksidase dismutase), siklooksigenase, lipoksigenase, dan enzim pentransfer elektron; dan dari luar tubuh (eksogen), yang berasal dari ozon, bahan kimia, sumber radiasi, pencemaran udara, pestisida, toksin, sinar ultraviolet, dan asap rokok (Butarbutar, 2019).

Penyeimbangan antara antioksidan dan radikal bebas dapat memengaruhi kesehatan tubuh. Stres oksidatif terjadi ketika aktivitas radikal bebas lebih dari kapasitas antioksidan tubuh. Keadaan ini dapat memperburuk sel normal. Konsumsi antioksidan dapat menurunkan risiko penyakit degeneratif dan memiliki efek positif (Sitinjak, 2017). Paparan reaktivitas radikal bebas berbeda-beda, seperti penyakit

autoimun, kerusakan jaringan atau sel, dan penyakit degeneratif seperti aterosklerosis, penyakit jantung koroner (PJK), diabetes mellitus, dan kanker (Novioella, 2019).

Tiga tahap biasanya terlibat dalam reaksi pembentukan radikal bebas. Pertama, inisiasi terjadi ketika radikal bebas pertama kali terbentuk; kedua, propagasi terjadi ketika radikal bebas bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk radikal baru; dan terakhir, terminasi terjadi ketika radikal bebas mengikat suatu radikal bebas lainnya sehingga menjadi stabil atau tidak reaktif (Sitinjak, 2017).

F. Penyakit Degeneratif

Penyakit degeneratif adalah kondisi di mana fungsi sel saraf secara bertahap menurun. Ini menyebabkan sel saraf yang normal berfungsi menjadi lebih buruk dan tidak dapat berfungsi kembali (Suiraoaka, I. 2016). Diabetes mellitus, kanker, aterosklerosis, jantung kardiovaskular, koroner, obesitas, dan dyslipidemia adalah penyakit degeneratif. Sel-sel tubuh akan rusak, sistem kekebalan menurun, dan proses metabolisme terganggu seiring bertambahnya usia. Tubuh membutuhkan antioksidan yang dapat mengurangi dan melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas karena hal tersebut dapat memicu penyakit degeneratif (Sitinjak, 2017).

G. Antioksidan

1. Pengertian Antioksidan

Antioksidan diartikan sebagai senyawa yang menghambat oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif yang membentuk radikal bebas reaktif tidak stabil. Dalam arti kimiawi, antioksidan adalah senyawa pemberi elektron, tetapi dalam arti biologis, antioksidan adalah semua senyawa yang dapat mengurangi efek negatif oksidan, seperti enzim dan protein pengikat protein. Antioksidan dapat mencegah penyakit yang terkait dengan radikal bebas, seperti

karsinogenesis, penyakit kardiovaskular, dan penuaan. Antioksidan alami dan sintetis adalah dua bentuk antioksidan yang berbeda. Antioksidan alami berasal dari ekstraksi bahan alami yang memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas, sedangkan antioksidan sintetis berasal dari bahan kimia sintetis (Hartati dkk, 2021).

2. Mekanisme antioksidan

Berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya, antioksidan terdiri atas tiga yakni antioksidan primer, antioksidan sekunder, dan antioksidan tersier (Berawi & Marini, 2018).

a. Antioksidan primer

Mekanisme kerja antioksidan primer ini yaitu antioksidan primer memiliki sifat yang dapat memutus reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) dan mampu bereaksi terhadap radikal lipid sehingga berubah lebih stabil. Adapun contoh dari antioksidan jenis ini yaitu Superoksida Dismutase (SOD), Glutation Peroksidase (GPX), catalase serta protein pengikat logam.

b. Antioksidan sekunder

Mekanisme kerja antioksidan sekunder yaitu dengan menarik ion logam, meredam radikal, menangkap oksigen, menguraikan hidroperoksida menjadi senyawa non-radikal, menyerap radiasi ultraviolet serta melindungi agar tidak terjadi reaksi berantai. Adapun contoh antioksidan ini yaitu isoflavone, vitamin E, vitamin C, bilirubin serta albumin.

c. Antioksidan tersier

Mekanisme kerja antioksidan tersier yakni bekerja dengan cara melakukan perbaikan terhadap biomolekul yang rusak akibat serangan radikal bebas. Antioksidan jenis ini dapat berupa enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase.

3. Jenis-jenis antioksidan

a. Antioksidan alami

Dalam sayuran dan biji-bijian, antioksidan alami seperti vitamin E, vitamin C, beta karoten, dan senyawa fenolik dapat mengurangi kerusakan oksidatif yang terkait dengan banyak penyakit, seperti kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit defisiensi imun, dan penuaan. Banyak peneliti meneliti antioksidan alami. Ada bukti bahwa tanaman yang mengandung fenolat dan flavonoid memiliki sifat antioksidan yang kuat (Santoso, 2016).

Secara toksikologi, antioksidan alami lebih aman untuk dikonsumsi dan lebih mudah diserap oleh tubuh daripada antioksidan sintesis, yang dapat melindungi tubuh manusia dari radikal bebas dan mengurangi risiko penyakit jangka panjang (Yong, 2007). Karena mengandung gugus hidroksil, flavonoid memiliki sifat antioksidan dan berfungsi sebagai penangkap radikal bebas. Karena bersifat reduktor, flavonoid juga memiliki kemampuan untuk memberikan hidrogen kepada radikal bebas. Flavonoid tidak lagi bertindak sebagai prooksidan karena mereka dapat membentuk kompleks, atau kelat, dengan ion logam transisi seperti besi dan aluminium. Oleh karena itu, oksidasi dapat dicegah. Flavonoid atau senyawa yang berkaitan erat dengannya membentuk sekitar 2% karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan. Flavonoid adalah salah satu golongan fenol terbesar yang ada di alam. Lebih lanjut disebutkan bahwa flavonoid ditemukan dalam setiap penelitian ekstrak tumbuhan karena fakta bahwa mereka ada dalam semua tumbuhan hijau (Markham, 1988).

Vitamin C (L-asam askorbat) merupakan suatu antioksidan penting yang larut dalam air. Vitamin C secara efektif menangkap radikal-radikal O_2 , OH, ROO dan juga berperan dalam regenerasi vitamin E. Vitamin C dapat melindungi membran biologis dan LDL (Low Density Lipid) dari kerusakan prooksidatif

dengan cara mengikat radikal peroksil dalam fase berair dari plasma atau sitosol (Silalahi, 2006).

b. Antioksidan Sintetik

Antioksidan yang terbentuk sebagai akibat dari reaksi kimia disebut antioksidan sintetik. Butil hidroksi anisol (BHA), butil hidroksi toluen (BHT), propil galat (PG), terbutil hidroksi quinon (TBHQ), dan tokoferol adalah beberapa contoh antioksidan sintetik yang diizinkan untuk digunakan dalam makanan dan telah sering digunakan. Antioksidan sintesis yang dibuat untuk keuntungan perdagangan bukanlah antioksidan alami (Santoso, 2016). Untuk mengontrol oksidasi, antioksidan sintetik seperti BHA, BHT, PG, dan TBHQ sering digunakan. Namun, antioksidan ini mungkin memiliki efek karsinogenik. Oleh karena itu, antioksidan yang berasal dari alam sedang dipelajari dan dikembangkan sebagai pengganti antioksidan sintetik (Shahidi et al., 1995).


Antioksidan membantu mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas. Antioksidan dapat membantu menghentikan banyak penyakit, seperti kanker, katarak, penyakit kardiovaskuler, penurunan fungsi saraf, dan penuaan dini (Mbata, 2014). Senyawa antioksidan sangat penting untuk kesehatan manusia. Antioksidan menurunkan risiko penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung koroner, menurut banyak bukti ilmiah. Kemampuannya untuk menangkap radikal bebas adalah ciri antioksidan senyawa (Prakash, 2001).

H. Metode Pengujian Antioksidan

ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)), TRAP (Trapping Antioxidant Potential), FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power), ORAC (Kapasitas Absorbansi Radical Oksigen), CUPRAC (Kapasitas Antioxidant Cupric Ion Reducing), dan DPPH (2,2'-diphenyl-1-picrylhydrazyl) adalah beberapa metode in vitro yang dapat digunakan untuk menguji aktivitas antioksidan

1. Metode ABTS

Metode ABTS menggunakan senyawa 2,2'-azinobis (3-etilbenzotiazolin-6-asam sulfonat) sebagai sumber penghasil radikal bebas. Mekanisme reaksi oksidasi ABTS oleh kalium persulfat ($K_2S_2O_8$) untuk menghasilkan ABTS^{•+} kation radikal dan reaksinya dengan senyawa antiradikal (Shalaby dan Shanab, 2013). Penggunaan metode ABTS (2,2'-azino-bis (3 etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonat) sebagai sumber penghasil radikal bebas dengan prinsip uji ABTS yaitu penghilangan warna kation ABTS dengan mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal ABTS. Berikut reaksi ABTS terhadap kalium persulfat dan reaksi ABTS terhadap senyawa antioksidan :



Gambar 2. Reaksi oksidasi ABTS oleh kalium persulfat menghasilkan ABTS^{•+} kation radikal dan reaksinya dengan senyawa antiradikal (Oliveiraa, 2014).

Analisis antioksidan dengan metode ABTS berdasarkan hilangnya warna biru akibat tereduksinya ABTS oleh antioksidan yang terdapat pada sampel yang ditandai dengan perubahan intensitas warna biru menjadi redup. Intensitas warna ini diukur pada panjang gelombang visibel 750 nm (Shalaby dan Shanab, 2013). Pengujian ini didasarkan pada kemampuan dari masing-masing substansi untuk membentuk kation radikal (ABTS^{•+}) yang telah dimodifikasi. ABTS^{•+} dibuat

dengan mereaksikan larutan stok ABTS 7 mM dengan 2,45 mM kalium persulfat dan membiarkan campuran dalam ruang gelap pada suhu kamar selama 12-16 jam. Kation radikal ABTS yang terbentuk menunjukkan penyerapan maksimal pada berbagai panjang gelombang: 415 nm, 645 nm, 734 nm dan 815 nm (Shalaby dan Shanab, 2013). ABTS adalah reagen yang dapat tetap stabil selama tiga hari dalam ruang gelap di suhu 25°C (Konan dkk, 2016). ABTS sering digunakan oleh industri makanan untuk mengukur antioksidan makanan (Fitriana dkk, 2016).

Kelebihan dari metode ABTS yaitu ABTS dapat bereaksi cepat dengan antioksidan, dapat digunakan pada rentang pH yang luas, dapat larut dalam air dan pelarut organik (Prior dkk, 2005). Kekurangan dari metode tersebut yaitu harga dari reagen ABTS mahal. Metode ABTS lebih baik daripada metode DPPH karena metode ABTS lebih sensitif daripada DPPH dan juga metode ABTS dapat digunakan pada tingkat pH yang berbeda sedangkan DPPH sensitif terhadap pH asam (Shalaby dkk, 2013).

2. Metode TRAP

Pengujian TRAP atau Total radical-trapping antioxidant parameter bekerja berdasarkan pengukuran konsumsi oksigen selama reaksi oksidasi Lipid terkontrol yang diinduksi oleh dekomposisi termal dari AAPH (2,2- Azobis (2-aminidopropana) hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil uji diekspresikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang terperangkap oleh 1 liter plasma. Pengukuran serum TRAP berdasarkan penentuan lamanya waktu yang diperlukan oleh serum uji untuk dapat bertahan dari oksidasi buatan (Antolovich dkk, 2002).

3. Metode FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma)

Metode ini mengukur kemampuan antioksidan untuk mereduksi ferri besi. Hal ini didasarkan pada reduksi kompleks ferric besi dan 2,3,5-trifenil-1,3,4- triaza-2-azoniacyclopenta-1,4-diena klorida (TPTZ) ke bentuk ferrous pada pH asam. Cara metode ini dengan 3 ml RA ditambahkan 100 mL sampel, kemudian diabsorpsi pada panjang gelombang 3 nm setelah diinkubasi selama 30 menit pada suhu 3°C (Alam dkk, 2013). Kelebihan metode ini yaitu sederhana, cepat, murah, dan tidak memerlukan peralatan khusus (Shalaby dkk, 2013)

4. Metode ORAC atau HORAC (Hydroxyl Radical Activities)

Metode ini mengukur aktivitas antioksidan bereaksi dengan radikal peroksil yang dihasilkan melalui larutan cair 2,2'-azobis- (2-amidino-propana) dihidroklorida (AA H), pada suhu 3°C (Pisoschi & Negulescu, 2011). Pengujian dilakukan dengan menggunakan Trolox (analog vitamin E yang larut dalam air) sebagai standar untuk menentukan Trolox Equivalent (TE). Nilai ORAC kemudian dihitung dari Equivalent Trolox. Semakin tinggi nilai ORAC, maka semakin besar kandungan antioksidannya (Alam dkk, 2013).

5. Metode CUPRAC (Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity)

Pada pengujian menggunakan metode ini antioksidan standar atau ekstrak dicampur dengan CuSO_4 dan neocuproine. Pada pengujiannya Cu(II) akan berubah menjadi Cu(I) melalui donor elektron antioksidan. Dimana Cu(II) bertindak sebagai katalisator dengan adanya antioksidan yang berlebih dan antioksidan bertindak sebagai pro-oksidan. Maka dari itu Cu(II) dapat dikatakan sebagai inisiator (zat yang mengawali suatu reaksi radikal bebas) untuk menguji kapasitas pemecahan rantai radikal antioksidan (Shalaby and Shanab, 2013).

6. Metode DPPH

Uji peredaman warna radikal bebas DPPH adalah untuk menentukan aktivitas antioksidan dalam sampel dengan melihat kemampuannya dalam menangkal radikal bebas DPPH. Sumber radikal bebas dari metode ini adalah senyawa 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil. Prinsip pengujiannya adalah adanya donasi atom hidrogen dari substansi yang diujikan kepada radikal DPPH menjadi 17 senyawa non radikal difenilpikrilhidrazin yang ditunjukkan oleh perubahan warna (Hartanto, 2012). Reaksi DPPH dengan Antioksidan Metode DPPH mengukur kemampuan suatu senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Kemampuan penangkapan radikal berhubungan dengan kemampuan komponen senyawa dalam menyumbangkan elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau hidrogen akan bereaksi dan akan memudahkan DPPH. Intensitas warna DPPH akan berubah dari ungu menjadi kuning oleh elektron yang berasal dari senyawa antioksidan. Konsentrasi DPPH pada akhir reaksi tergantung pada konsentrasi awal dan struktur komponen senyawa penangkap radikal (Ariyanto, 2006).

I. Spektrofotometri UV-Visibel

Spektrofotometri UV-Vis singkatan dari spektrofotometri sinar ultraviolet dan visible (cahaya tampak). Metode ini berdasarkan pada pengukuran energi cahaya oleh suatu zat kimia pada panjang gelombang maksimum tertentu. Kelebihan dari Spektro UV-Vis adalah biaya yang lebih murah, waktu yang digunakan relatif singkat dibandingkan dengan metode yang lain (Julianto, 2019). Menggunakan metode spektro UV-Vis sangat mudah untuk sampel berwarna dan tidak berwarna. Spektrofotometri UV-Vis menggunakan sinar ultraviolet (UV) dan inframerah yang dekat. Oleh karena itu, spektroskopi foton yang berada pada bagian UV-Vis berfungsi. Warna bahan kimia yang terlibat dipengaruhi oleh

penyerapan dalam jangkauan yang dapat dilihat. Menggunakan instrumen spektrofotometer, spektrofotometri UV-Vis adalah metode analisis fisika kimia yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik ultraviolet (UV) pada panjang gelombang 190 nm–380 nm dan cahaya tampak (visible) pada panjang gelombang 380 nm–780 nm. Molekul mengalami transisi energi pada spektrum elektromagnetik di daerah ini.

Kelebihan dari instrumen Spektrofotometer UV-Vis yaitu dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, mempunyai ketelitian yang tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1%-3%, analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil (Hasibuan, 2015). Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan (Yahya, 2013).

Prinsip kerja Spektrofotometer UV-Vis yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media (larutan), maka sebagian cahaya tersebut diserap (I), sebagian dipantulkan (I_r), dan sebagian lagi dipancarkan (I_t). Adapun yang melandasi pengukuran spektrofotometer ini dalam penggunaannya adalah hukum Lambert-Beer yaitu bila suatu cahaya monokromatis dilewatkan melalui suatu media yang transparan, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan sebanding dengan tebal dan kepekaan media larutan yang digunakan (Yanlinastuti & Fatimah, 2016).

Spektrofotometri UV-Visible dapat digunakan untuk penentuan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, atau uap. Pada umumnya sampel harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih Untuk sampel yang berupa larutan perlu diperhatikan beberapa persyaratan pelarut yang dipakai antara lain:

1. Harus melarutkan sampel dengan sempurna.

2. Pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak berwarna (tidak boleh mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel)
3. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis
4. Kemurniannya harus tinggi (Suhartati, 2017).

J. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan

Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk mencari ilmu tentang tumbuhan obat dan memanfaatkannya secara bijaksana. Dalam mencari obat, kita harus berusaha mencari obat yang sesuai dengan anjuran syariat dan harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Karena dengan memanfaatkan obat yang sudah disediakan Allah SWT, penyakit itu dapat sembuh sehingga kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Al Qur'an juga menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal yang mau menggunakan akal pikirannya untuk mempelajari segala sesuatu yang telah Allah SWT ciptakan termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam dengan berbagai manfaatnya. Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS Ali-Imran/ 3:191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَهُ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian Agama, 2010).

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat “مَا خَلَقْتَهُ هٰذَا بَاطِلًا” mengatakan bahwa tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Engkau tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu itu sendiri adalah bukti kekuasaan dan hikmah-Mu (Shihab, 2015).

Tafsir dari ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk jagat raya dan segala yang ada di dalamnya, memiliki tujuan dan hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam pandangan Islam, Allah adalah Pencipta yang Maha bijaksana, dan setiap aspek kehidupan memiliki makna dan tujuan yang telah ditentukan oleh-Nya. Maha Suci dan Maha Sempurna Allah yang telah menciptakan seluruh alam beserta isinya dengan sangat teratur dan seimbang. Segala yang diciptakan oleh Allah SWT pasti memiliki manfaat seperti tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai obat.

Tak terkecuali biji pada buah labu kuning yang biasanya hanya terbuang percuma karena dianggap limbah ternyata tidak diciptakan begitu saja melainkan apabila kita dapat memanfaatkan ciptaan-Nya dengan sebaik-baiknya maka akan diketahui manfaat dari biji labu kuning tersebut sebagai antioksidan dalam bidang kesehatan.

Al Qur'an dalam sebagian ayatnya banyak menjelaskan terkait kekuasaan Allah SWT yang patut kita syukuri dan manfaatkan dengan cermat. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup maupun dimanfaatkan sebagai pengobatan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-syu'ara' / 26: 7.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَخْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementrian Agama, 2010).

Dalam tafsir Al-Misbah, “أَوَلَمْ يَرَوْا” mengatakan bahwa apakah mereka tidak melihat ke bumi, merupakan kata yang mengandung makna batas akhir. Ia berfungsi memperluas arah pandangan hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas

kemampuannya memandang sampai mencakup seantero bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhannya (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT memberikan peringatan melalui ciptaan-Nya dan menggunakan dengan baik anugrah-Nya bahwasanya Dia maha kuasa yang telah menurunkannya hujan dari langit yakni salah satunya menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan yang baik. Sang Pencipta telah memberikan petunjuk ketentuan-ketentuan-Nya yang harus diimani, sehingga manusia dapat memahaminya dan mencari petunjuk melalui tadabbur (penelitian) dan tafakkur (berpikir) terhadap segala penciptaan Allah di sekitar kita. Salah satunya adalah tanaman buah labu kuning yang dimana pada bagian bijinya yang biasanya terbuang percuma ternyata memiliki khasiat sebagai antioksidan yang dapat membantu manusia dalam pengobatan. Namun untuk mengetahui khasiat dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang sudah tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya yaitu orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai obat salah satunya adalah apoteker yang mempelajari tentang obat dan penyakit sehingga akan mendorong kesembuhan atas izin Allah SWT, sebagaimana yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ
الدَّاءِ بَرَأً بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Dari Jabir r.a Nabi SAW bersabda; Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla. (HR. Muslim No. 2204) (Al-Mundziri, 2003).

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah *washilah*. Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak apabila Allah SWT belum menghendaki atau menunda penyembuhannya (Al-Ju'aisin, 2001).

Dalam hadits tersebut, Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang sangat penting mengenai penyakit dan obatnya. Beliau menyatakan bahwa Allah SWT tidak menciptakan suatu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Apabila seseorang berhasil menemukan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit tersebut pasti akan hilang atas seizin Allah SWT.

Hadits ini menjadi sebuah motivasi bagi umat Muslim untuk terus mencari pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran dan kesehatan, serta untuk tidak berputus asa dalam mencari obat bagi suatu penyakit. Hal ini juga mengajarkan umat Muslim untuk mempercayai bahwa Allah SWT memberikan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk dalam masalah kesehatan.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadits yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan segala yang ada dimuka bumi ini tidak ada yang sia-sia termasuk berbagai macam tanaman baik pada bagian akar, biji, batang, kulit, daun, buah dan lain sebagainya memiliki peruntukannya masing-masing. Sebagai umat Muslim, kita dianjurkan untuk mencari ilmu tentang tumbuhan obat dan memanfaatkannya seperti pada tanaman bagian biji labu kuning dengan melakukan penelitian yang dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental laboratorium untuk mengetahui skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dan uji aktivitas antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dengan metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic-acid).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium biologi farmasi dan kimia farmasi, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan April – September 2023

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental laboratorium.

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagian biji buah labu kuning (*Cucurbita moschata*).

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lemari pengering, rotary evaporator (IKA RV 10 basic®), timbangan analitik (AND GH-200®),

ayakan mesh 40, waterbath (Memmert[®]), blender (Advance[®]), spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-VIS[®]).

2. Bahan

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah biji labu kuning (*Cucurbita moschata*), etanol 70% (Onemed), etanol p.a, serbuk ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) (Sigma), kalium persulfat ($K_2S_2O_8$) (Merch), asam klorida (HCl), besi (III) klorida ($FeCl_3$), vitamin C (Asam askorbat) (Emsure[®]), aquadest, kertas saring.

E. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel

Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) yang telah diambil dicuci hingga bersih dengan air mengalir, kemudian di angin-anginkan lalu dikeringkan di lemari pengering. Simplisia jika sudah kering bila diremas akan mudah hancur. Kemudian simplisia dihaluskan menggunakan blender kemudian mengayak simplisia biji labu kuning dengan ayakan nomor 40 mesh dan ditimbang, selanjutnya disimpan dalam wadah yang bersih tertutup rapat dan ditempat yang sejuk.

2. Ekstraksi

Simplisia Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) diekstraksi dengan cara maserasi. Sebanyak 300 gram simplisia, dimasukkan kedalam wadah maserasi (toples) lalu direndam dengan etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Maserat dipisahkan dan proses diulang empat kali atau hingga filtrat bening dengan pelarut yang sama. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian disatukan dan diuapkan cairan penyarinya menggunakan rotary evaporator.

3. Skrining Fitokimia (Harborne, 1987)

a. Uji Flavonoid

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Dicampur dengan air panas lalu dididihkan selama lima menit dan disaring. Setelah itu ditambahkan sedikit serbuk magnesium dan 1 ml HCl pekat lalu filtrat dikocok. Terbentuknya warna merah, kuning, atau jingga menunjukkan hasil uji flavonoid yang positif.

b. Uji Fenolik

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, diberi beberapa tetes FeCl_3 1%. Terbentuknya warna hijau kecoklatan atau coklat kehitaman menunjukkan hasil uji fenolik yang positif.

c. Uji Alkaloid

Diambil 2 ml larutan ekstrak dan dimasukkan dalam tabung reaksi. Sebanyak 3 ml HCl 2N ditambahkan setelah itu dibagi ke dalam 2 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff dan tabung kedua ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer. Terbentuknya endapan jingga pada tabung pertama dan terbentuk endapan putih atau kuning tabung kedua menunjukkan hasil uji alkaloid yang positif.

d. Uji Terpenoid

Diambil 2 ml larutan ekstrak dimasukkan dalam tabung reaksi kemudian diberi 5 tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Terbentuknya cincin warna biru atau hijau dan berwarna merah atau ungu menunjukkan hasil uji terpenoid yang positif.

4. Penentuan Aktivitas Antioksidan dengan Metode ABTS (Faisal, 2019)

a. Pembuatan Larutan

- 1) Larutan ABTS 7 mM : Serbuk ABTS ditimbang sebanyak 38,4 mg dan dilarutkan dengan aquadest dalam labu tentukur 10 ml kemudian dicukupkan dengan aquadest hingga tanda batas.
- 2) Larutan $K_2S_2O_8$ 2,45 mM : Kalium persulfat ditimbang seksama sebanyak 6,6 mg dan dilarutkan dengan aquadest dalam labu tentukur 10 ml kemudian dicukupkan dengan aquadest hingga tanda batas.
- 3) Larutan stok ABTS : Dicampur larutan ABTS dan larutan kalium persulfat dalam ruang gelap dan dicukupkan 25 mL dengan etanol p.a. Diinkubasi selama 12-16 jam.

b. Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum

Sebanyak 1 ml Larutan ABTS dipipet kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 5 ml dan dicukupkan dengan etanol p.a hingga batas. Serapan diukur dengan spektrofotometri UV-Vis yang telah diatur panjang gelombangnya dari 600-800 nm, tentukan panjang gelombang saat diperoleh serapan tertinggi. Didapatkan serapan tertinggi yaitu 750 nm.

c. Pembuatan Larutan Blanko

Larutan ABTS sebanyak 1 ml dipipet ke dalam labu tentukur 5 ml dan dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a hingga tanda batas. Larutan ini kemudian diinkubasi selama 15 menit dan diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 750 nm.

d. Pembuatan Larutan Baku dan Penetapan Kurva Baku Vitamin C

1) Pembuatan larutan induk vitamin C 50 ppm

Vitamin C murni ditimbang sebanyak 2,5 mg dan dilarutkan dengan etanol p.a dalam labu tentukur 50 ml kemudian dicukupkan dengan etanol p.a hingga tanda batas.

2) Pembuatan larutan vitamin C berbagai konsentrasi

Larutan induk vitamin C dibuat seri konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm dan 10 ppm dari larutan vitamin C 50 ppm dengan cara masing-masing dipipet 200 μ l; 400 μ l; 600 μ l, 800 μ l dan 1000 μ l pada labu tentukur 5 ml. Kemudian masing-masing seri konsentrasi ditambahkan larutan stok ABTS 1 ml lalu dicukupkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 5 ml. Diinkubasi selama 6 menit lalu diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 750 nm.

e. Pengukuran serapan sampel

Ekstrak etanol biji labu kuning ditimbang sebanyak 5 mg lalu dilarutkan dengan etanol p.a dalam labu tentukur 10 ml (larutan baku konsentrasi 500 ppm). Larutan induk sampel dibuat seri konsentrasi 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm dari larutan induk sampel 500 ppm dengan cara dipipet masing-masing 200 μ l; 400 μ l; 600 μ l, 800 μ l dan 1000 μ l pada labu tentukur 5 ml. Kemudian masing-masing seri konsentrasi ditambahkan larutan ABTS 1 ml lalu dicukupkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 5 ml. Diinkubasi selama 6 menit lalu diukur serapannya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 750 nm. dilakukan triplo.

5. Analisis Data

a. Perhitungan rendemen

Ekstrak kental yang diperoleh kemudian dihitung rendemennya dengan rumus:

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{bobot ekstrak kental}}{\text{bobot serbuk}} \times 100\%$$

b. Penentuan aktivitas antioksidan

Hasil uji penangkal bebas metode ABTS pada ekstrak etanol biji labu kuning dipaparkan sebagai hasil penelitian, sehingga didapat jumlah persen penangkal antioksidan dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorbansi blanko} - \text{Absorbansi sampel}}{\text{Absorbansi blanko}} \times 100 \%$$

c. Perhitungan nilai IC₅₀ (Faisal, 2019)

Penentuan hasil dari metode pemerangkapan ABTS adalah dengan menghitung IC₅₀, di mana IC₅₀ ini menunjukkan konsentrasi substrat yang mampu meredam 50% aktivitas dari radikal bebas ABTS. Hasil perhitungan dimasukkan ke dalam persamaan regresi dengan konsentrasi sampel (ppm) sebagai absis (sumbu x) dan nilai persen aktivitas peredaman sebagai ordinat (sumbu Y). Untuk menghasilkan persamaan regresi, diperoleh dengan rumus: $y = ax + b$.

Keterangan :

x = konsentrasi sampel (ppm)

a = konsentrasi (titik potong y)

b = koefisien (variabel x)

Menurut Molyneux (2004) adapun kategori tingkat kekuatan antioksidan dalam meredam radikal bebas ABTS sebesar 50% apabila :

1. Sangat kuat : < 50 ppm
2. Kuat : 50 – 100 ppm

- 3. Sedang : 101 – 150 ppm
- 4. Lemah : 151 – 200 ppm
- 5. Sangat lemah : > 200 ppm



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning

Tabel 3. Hasil Rendemen Biji Labu Kuning

Sampel	Berat sampel (g)	Volume pelarut etanol 70 % (L)	Berat Ekstrak (g)	Persen Rendemen (%)
Biji labu kuning (<i>Cucurbita moschata</i>)	300	5	14,769	4,923

2. Hasil Skrining Fitokimia (Harborne, 1987)

Tabel 4. Hasil Skrining Fitokimia

Senyawa Metabolit	Pereaksi	Perubahan Positif	Hasil
Flavonoid	Serbuk Mg + HCl pekat	Warna merah/kuning/jingga	+
Fenolik	FeCl 1%	Warna hijau kecoklatan/coklat kehitaman	-
Alkaloid	- Dragendorff - Mayer	- Endapan jingga - Endapan Putih/ Kuning	+
Terpenoid	Lieberman-Burchard	Cincin warna biru atau hijau dan berwarna merah/ungu	-

Keterangan :

(+) Positif : mengandung senyawa aktif

(-) Negatif : tidak mengandung senyawa aktif

3. Aktivitas Antioksidan Metode ABTS

Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Sampel Ekstrak Biji Labu Kuning

Berat (mg)	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀ (ppm)
5	20	0,438	25,58	$y = 2,2157x + 18,677$ $R^2 = 0,9384$	14,136
	40	0,432	26,65		
	60	0,428	27,27		
	80	0,422	28,35		
	100	0,416	29,31		

Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Pembanding Vitamin C

Berat (mg)	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀ (ppm)
2,5	2	0,540	8,31	$y = 9,2052x + 2,2589$ $R^2 = 0,9798$	5,186
	4	0,501	14,94		
	6	0,470	20,20		
	8	0,467	20,71		
	10	0,453	23,08		

B. Pembahasan

Senyawa yang memiliki kemampuan untuk meredam radikal bebas dikenal sebagai antioksidan. Beberapa hal, seperti debu, asap, dan polusi, serta kebiasaan mengonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang tidak seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak, dapat menyebabkan radikal bebas. Rahmi (2017) menyatakan bahwa senyawa antioksidan akan memberikan satu elektron kepada radikal bebas yang tidak stabil. Akibatnya, radikal bebas tersebut akan menjadi netral kembali dan tidak akan mengganggu metabolisme tubuh. Senyawa antioksidan dapat diperoleh dari tanaman yang disebut sebagai senyawa antioksidan alami.

Tanaman di Indonesia jumlahnya berlimpah dan memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu khasiat dari tanaman yang

dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah biji labu kuning sebagai sumber antioksidan. Biji labu kuning belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat, sehingga hanya dibuang karena dianggap limbah (Patel, 2013). Padahal, biji labu kuning mengandung zat gizi yang baik (Syam dkk, 2019). Biji buah labu kuning (*Cucurbita moschata*) mengandung senyawa metabolit sekunder seperti steroid, alkaloid, flavonoid dan tanin (Abd El-Aziz.dkk, 2011). Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, antibakteri, antiinflamasi dan efek antioksidan.

Biji labu kuning mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan seperti senyawa flavonoid dan alkaloid. Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang dapat menghambat banyak reaksi oksidasi. Flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan karena mampu mentransfer sebuah elektron kepada senyawa radikal bebas. Sedangkan alkaloid berfungsi sebagai antioksidan karena mengandung atom nitrogen di dalam strukturnya, atom tersebut mempunyai pasangan elektron bebas yang berfungsi untuk meredam aktivitas radikal bebas di dalam tubuh.

Pada penelitian ini dilakukan metode maserasi yang digunakan dalam mengekstraksi biji labu kuning bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang terdapat dalam sampel. Metode maserasi dipilih karena termasuk metode sederhana dan cepat serta dapat menyari zat aktif sampel dengan maksimal serta tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak menjadi terurai. Ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi (Puspitasari & Proyogo, 2017).

Penelitian ini menggunakan pelarut etanol 70% untuk mengekstraksi karena etanol 70% adalah pelarut polar yang dapat mengekstraksi atau memisahkan berbagai macam senyawa polar dari yang polar hingga yang non-polar. Semakin tinggi konsentrasi etanol, semakin rendah tingkat polar pelarut. Larutan dapat

menarik dan melarutkan zat jika pelarut yang digunakan memiliki kepolaran yang sama (Putra & Luhurningtyas, 2021).

Pelarut etanol 70% adalah pelarut dengan tingkat kepolaran yang paling dekat dengan tingkat kepolaran senyawa bioaktif. Semakin dekat kepolaran pelarut dengan zat yang terkandung dalam ekstrak, semakin banyak komponen zat yang dapat diekstrak dan semakin banyak rendemen ekstrak yang diperoleh. Selain itu, etanol 70% adalah satu-satunya jenis pelarut yang aman atau tidak beracun saat digunakan karena memiliki tingkat toksisitas yang rendah dibandingkan dengan jenis pelarut lainnya. Karena titik didihnya yang rendah, yaitu 79°C, proses pemekatan memerlukan panas yang lebih sedikit (Prayoga, 2019).

Maserasi dilakukan selama 24 jam kemudian dimaserasi lagi dengan pelarut yang sama sebanyak 4x atau hingga bening, untuk menarik senyawa aktif agar diperoleh kadar secara keseluruhan (Depkes, 2009). Hasil ekstraksi kemudian disaring dan dipekatkan dengan menggunakan alat rotary evaporator pada suhu 60 °C. Penggunaan alat rotary evaporator dipilih untuk mempersingkat waktu proses mengisolasi dan meminimalkan rentang terhadap kondisi senyawa yang rusak pada ekstrak (Hasmita et al., 2019). Setelah dilakukan proses ekstraksi, maka dihasilkan rendemen ekstrak untuk kandungan kimia tanaman yang diinginkan.

Rendemen ekstrak dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (berat ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) dikalikan 100% (Sani dkk, 2014). Hasil rendemen dari suatu sampel sangat diperlukan karena untuk mengetahui banyaknya ekstrak yang diperoleh selama proses ekstraksi. Hasil rendemen ekstrak etanol biji labu kuning dapat dilihat pada (**tabel 3**). Syarat dari rendemen ekstrak kental yaitu nilainya tidak kurang dari 10% (Herbal F, 2017). Pada penelitian ini hasil rendemen yang diperoleh hanya 4,923% yang termasuk dalam kategori rendah. Besar kecilnya hasil rendemen yang

diperoleh dipengaruhi oleh keefektifan dalam proses ekstraksi. Menurut Febrina (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil ekstraksi adalah waktu, suhu, pengadukan dan pelarut. Selain jenis pelarut, ukuran sampel juga mempengaruhi jumlah rendemen. Semakin kecil luas permukaan sampel akan semakin memperluas kontak dan meningkatkan interaksi dengan pelarut (Sineke, 2016).

Selanjutnya dilakukan skrining fitokimia untuk mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam (Vifta & Advistasari, 2018). Skrining fitokimia merupakan tahap awal penelitian untuk memastikan bahwa tanaman yang akan diteliti memiliki senyawa aktif bersifat antioksidatif meliputi metabolit sekunder yang diantaranya adalah flavonoid, fenolik, alkaloid dan terpenoid.

Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dapat dilihat pada (**tabel 4**) yang menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) mengandung senyawa metabolit sekunder yang bersifat antioksidatif. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk (2020) yang menyatakan bahwa ekstrak biji labu kuning terdapat kandungan senyawa aktif berupa flavonoid dan alkaloid. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Ishak dkk (2018) bahwa ekstrak etanol biji labu kuning juga mengandung senyawa fenolik dan pada penelitian lain yang dilakukan oleh Ira dkk (2020) menyatakan bahwa ekstrak biji labu kuning mengandung senyawa terpenoid. Adanya perbedaan kandungan metabolit sekunder pada tumbuhan dipengaruhi oleh usia sampel dan kondisi lingkungan dimana tumbuhan itu tumbuh, meskipun secara kualitatif kandungan metabolit sekundernya hampir sama. Kandungan metabolit sekunder pada tumbuhan dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan dan faktor dalam tumbuhan itu sendiri. Menurut Handoyo (2011) menjelaskan bahwa tingkat usia dan kematangan suatu tumbuhan mempengaruhi

kandungan metabolit sekunder yang aktif secara maksimal dalam tumbuhan tersebut.

Flavonoid adalah antioksidan eksogen yang telah dibuktikan bermanfaat dalam mencegah kerusakan sel akibat stres oksidatif. Mekanisme kerja dari flavonoid sebagai antioksidan bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Flavonoid sebagai antioksidan secara langsung adalah dengan mendonorkan ion hidrogen sehingga dapat menetralkan efek toksik dari radikal bebas (Akhlaghi, 2009). Selain itu untuk senyawa alkaloid, alkaloid banyak ditemukan dalam pelarut polar karena golongan senyawa alkaloid yang berpotensi sebagai antioksidan adalah senyawa-senyawa polar yang akan terekstraksi pada pelarut yang bersifat polar (Sudirman, 2011). Mekanisme alkaloid sebagai antioksidan adalah dengan cara mendonorkan atom H pada radikal bebas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa alkaloid bekerja sebagai antioksidan primer.

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan dalam suatu tanaman sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah tanaman tersebut terbukti memiliki aktivitas pengikatan terhadap radikal bebas. Dalam penelitian ini digunakan salah satu metode pengujian aktivitas antioksidan yakni metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)). Metode ABTS merupakan metode penentuan aktivitas antioksidan yang diperoleh dari hasil oksidasi kalium persulfat dengan garam diammonium ABTS. Mekanisme metode ABTS adalah melihat kemampuan senyawa antioksidan untuk menstabilkan senyawa radikal bebas dengan mendonorkan radikal proton (Fitriana, 2016). Prinsip pengujian aktivitas antioksidan dengan metode ABTS adalah penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal kation ABTS. ABTS adalah suatu radikal dengan pusat nitrogen yang mempunyai karakteristik warna biru-hijau, yang bila tereduksi oleh

antioksidan akan berubah menjadi bentuk non radikal dari berwarna menjadi redup/ tidak berwarna. Metode ABTS sangat sensitif terhadap cahaya, bahkan pembentukan ABTS memerlukan waktu inkubasi selama 12-16 jam dalam kondisi gelap (diinkubasi) (Molyneux, 2004).

Metode ABTS pada pengujian aktivitas ekstrak etanol biji labu kuning dipilih karena metode tersebut dapat digunakan pada sistem yang berbasis air maupun organik sehingga dapat larut dalam ekstrak etanol biji labu kuning, ABTS dapat mendeteksi senyawa yang bersifat lipofilik atau hidrofilik sehingga dapat mendeteksi senyawa antioksidan dalam ekstrak etanol biji labu kuning seperti senyawa fenolik maupun non-fenolik, berbeda pada metode DPPH yang tidak dapat bekerja secara spesifik untuk komponen antioksidan tertentu (Liaudanskas dkk, 2014). ABTS memiliki waktu reaksi yang lebih cepat karena hanya memerlukan waktu 6 menit sebelum direaksikan sedangkan pada metode DPPH memerlukan waktu 30 menit sebelum direaksikan. Serta ABTS dapat bekerja pada rentang pH yang luas (Apak dkk, 2013).

Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC_{50} . Nilai IC_{50} menunjukkan nilai konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk meredam 50% aktivitas radikal bebas ABTS. Selanjutnya untuk perhitungan aktivitas antioksidan ditentukan dengan nilai IC_{50} yang dihitung menggunakan persamaan $y = ax + b$ yang diperoleh dari kurva regresi linier hubungan antara konsentrasi dan persentase inhibisi (%). Nilai IC_{50} didapatkan dari nilai x setelah mengganti $y = 50$ (Ningrum dkk, 2017). Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada sampel dapat dilihat pada (**tabel 5**) yang menunjukkan bahwa nilai IC_{50} sebesar 14,136 ppm termasuk dalam kategori aktivitas antioksidan yang sangat kuat.

Pada pengujian aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS memilih vitamin C sebagai pembanding karena berfungsi sebagai antioksidan sekunder yaitu menangkap radikal bebas, mencegah terjadinya reaksi berantai, aktivitas antioksidannya sangat tinggi dan vitamin C lebih polar dari vitamin yang lain. Vitamin C memiliki 4 gugus hidroksil yang dapat langsung bereaksi memberikan satu elektron untuk membentuk senyawa semihidroaskorbat yang bersifat tidak reaktif (Isnindar dkk, 2011). Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada pembanding vitamin C dapat dilihat pada (**tabel 6**) yang menunjukkan nilai IC_{50} sebesar 5,186 ppm termasuk dalam kategori aktivitas antioksidan yang sangat kuat. Menurut Molyneux (2004) suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat jika memiliki nilai IC_{50} kurang dari 50 ppm. Berdasarkan nilai IC_{50} yang diperoleh dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dan pembanding vitamin C dengan metode ABTS maka keduanya memiliki kategori antioksidan sangat kuat. Nilai IC_{50} ini berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan, semakin tinggi aktivitas antioksidannya, maka nilai IC_{50} semakin rendah. Kekuatan aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dikarenakan adanya kandungan senyawa flavonoid dan alkaloid.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan yakni uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) menunjukkan bahwa terdapat kandungan metabolit sekunder senyawa flavonoid dan alkaloid dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) serta memiliki aktivitas antioksidan dengan metode ABTS yang ditunjukkan oleh nilai IC_{50} sebesar 14,136 ppm sedangkan untuk pembanding vitamin C sebesar 5,186 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning dan pembanding vitamin C mempunyai aktivitas

antioksidan sangat kuat karena nilai IC_{50} tidak lebih dari 50 ppm. Semakin kecil nilai IC_{50} maka semakin besar aktivitas penangkapan radikal ABTS, sebaliknya nilai IC_{50} yang tinggi maka aktivitas penangkapan radikal ABTS semakin kecil.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil skrining fitokimia dari ekstrak etanol biji labu kuning yaitu mengandung senyawa flavonoid dan alkaloid dimana senyawa ini beraktivitas sebagai antioksidan.
2. Ekstrak etanol biji labu kuning memiliki aktivitas antioksidan dengan metode ABTS (2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)) ditujukan oleh nilai IC_{50} sebesar 14,136 ppm sedangkan untuk pembanding vitamin C sebesar 5,186 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji labu kuning dan pembanding vitamin C mempunyai aktivitas antioksidan sangat kuat karena nilai IC_{50} tidak lebih dari 50 ppm.

B. Saran

Peneliti menyarankan untuk dilakukan pengujian antioksidan pada ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dengan membandingkan metode ABTS dan metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Aziz, A. B. and Abd El-Kalek, H. H. (2011) 'Antimicrobial proteins and oil seeds from pumpkin (*Cucurbita moschata*)', *Nature and Science*, 9(3), pp. 105–119.
- Aguirre, M. C., Delporte, C., Backhouse, N., Erazo, S., Letelier, M. E., Cassels, B. K., Silva, X., Alegria, S., Negrete, R. (2006). Topical Anti -Inflammatory Activity of 2 α -Hydroxy Pentacyclic Triterpen Acids from the Leaves of *Ugni molinae*. In *Journal Bioorganic and Medicinal Chemistry*. 14(16). 5673-5677
- Ahmad, A. R., Juwita, J., & Ratulangi, S. A. D. (2015). Penetapan kadar fenolik dan flavonoid total ekstrak metanol buah dan daun patikala (*Etlingera elatior* (Jack) RM SM). *Pharmaceutical Sciences and Research*, 2(1), 1.
- Akhlaghi, M., & Bandy, B. (2009). Mechanisms of flavonoid protection against myocardial ischemia–reperfusion injury. *Journal of molecular and cellular cardiology*, 46(3), 309-317.
- Alam, M. N., Bristi, N. J., & Rafiquzzaman, M. (2013). Review on in vivo and in vitro methods evaluation of antioxidant activity. *Saudi pharmaceutical journal*, 21(2), 143-152.
- Al-Ju'aisin, Abdullah bin Ali. (2001). *Kado untuk Orang Sakit*, Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- Al-Mundziri, I. (2003). Ringkasan hadits shahih muslim. terj. Achmad Zaidun. *Jakarta: Pustaka Amina*.
- Antolovich, M., Prenzler, P. D., Patsalides, E., McDonald, S., & Robards, K. (2002). *Methods for testing antioxidant activity*. *Analyst*, 127(1), 183-198.
- Apak, R., Gorinstein, S., Böhm, V., Schaich, K. M., Özyürek, M., & Güçlü, K. (2013). Methods of measurement and evaluation of natural antioxidant capacity/activity (IUPAC Technical Report). *Pure and Applied Chemistry*, 85(5), 957-998.
- Apsari, P. D., & Susanti, H. (2011). Perbandingan Kadar Fenolik Total Ekstrak Metanol Kelopak Merah dan Ungu Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* Linn) secara Spektrofotometri. *Yogyakarta: Kerjasama Fakultas Farmasi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan*.
- Ariyanto, R. (2006). Uji Aktivitas Antioksidan, Penentuan Kandungan Fenolik dan Flavonoid Total Fraksi Kloroform dan Fraksi Air Ekstrak Metanolik Pegagan (*Centella asiatica* L. Urban). *Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada*.
- Arora, A., Nair, M. G., & Strasburg, G. M. (1998). Structure–activity relationships for antioxidant activities of a series of flavonoids in a liposomal system. *Free Radical Biology and Medicine*, 24(9), 1355-1363.
- Atenza, M., Ratnawati, D., Widiyati, E. (2009). Uji Pendahuluan Penentuan Adanya Kandungan Senyawa Flavonoid dan Triterpenoid Pada Tanaman Sayuran Serta Bioassay Brine Shrimp Menggunakan *Artemia Salina* Leach. *Bengkulu : FMIPA Universitas Bengkulu*. Halaman 1
- Berawi K N., Marini D. (2018). Efektivitas Kulit Batang Bakau Minyak (*Rhizophora apiculata*) Sebagai Antioksidan. *Journal Agromedicine*. Vol 5 (1); 412-417.
- Butarbutar, M. R. (2019). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Bawang Batak (Allium chinense L.) dengan Metode DPPH dan ABTS* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). Pengaruh suhu dan waktu maserasi terhadap karakteristik ekstrak daun bidara (*Ziziphus mauritiana* L.) sebagai sumber saponin. *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri ISSN*, 2503, 488X.
- Chanda, S., & Dave, R. (2009). In vitro models for antioxidant activity evaluation and some medicinal plants possessing antioxidant properties: An overview. *African Journal of Microbiology Research*, 3(13), 981-996.
- Croteau, R., Kutchan, T. M., & Lewis, N. G. (2000). Natural products (secondary metabolites). *Biochemistry and molecular biology of plants*, 24, 1250-1319.
- Delporte, C., Backhouse, N., Inostroza, V., Aguirre, M. C., Peredo, N., Silva, X., Negrete, R., Miranda, H. F. (2007). Analgesic Activity of *Ugni molinae* (Murtilla) in Mice Models of A cute Pain. In *Journal Bioorganic and Medicinal Chemistry*. Pages 162-165.
- DepKes RI (1995). *Materia Medika Indonesia*. Jilid VI. *Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan*, Jakarta.
- DepKes, R. I. (2009). *Profil kesehatan indonesia 2008*. Jakarta: *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- DepKes, R. I. (2020). *Farmakope Indonesia (Edisi Enam)*. Jakarta: *Departemen Kesehatan RI*.
- Faisal, H. (2019). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Buah Okra (*Abelmoschus esculentus* L. Moench) Dengan Metode DPPH (1, 1-difenil-2-pikrilhidrazil) dan Metode ABTS (2,2-azinobis-(3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid). *Ready Star*, 2(1), 1-5.
- Fa-Sheng, L., Jing, X., De-Qiang, D., Xiao-Feng, C., Ting-Guo, K., & Xue, K. H. (2009). Structures of new phenolic glycosides from the seeds of *Cucurbita moschata*. *Natural Product Communications*, 4(4), 1934578X0900400413.
- Febrina, L., Rusli, R., & Muflihah, F. (2015). Optimalisasi ekstraksi dan uji metabolit sekunder tumbuhan libo (*Ficus variegata* Blume). *Journal of Tropical Pharmacy and Chemistry*, 3(2), 74-81.
- Fitriana, W. D., Ersam, T., Shimizu, K., & Fatmawati, S. (2016). Antioxidant activity of Moringa oleifera extracts. *Indonesian Journal of Chemistry*, 16(3), 297-301.
- Giorgio, P. (2000). Flavonoid an Antioxidants. *Journal National Product*. 63 : 1035-1045.
- Glew, R. H., Glew, R. S., Chuang, L. T., Huang, Y. S., Millson, M., Constans, D., & Vanderjagt, D. J. (2006). Amino acid, mineral and fatty acid content of pumpkin seeds (*Cucurbita spp*) and Cyperus esculentus nuts in the Republic of Niger. *Plant foods for human nutrition*, 61, 49-54.
- Handoyo, 2011. *Penapisan Fitokimia Kelompok Daun Jati (Tectona grandis L.F) pada Jati Usia 1 Tahun dan Jati Usia 20 Tahun yang Tumbuh di Kabupaten Muna*. Skripsi F-KIP. Universitas Haluoleo. Kendar
- Harborne, J. B. (1987). *Metode fitokimia : penuntun cara modern menganalisis tumbuhan / J.B. Harborne; penerjemah Kosasih Padmawinata, Iwang Soediro; penyunting Sofia Niksolihin, Bandung, ITB*.
- Harborne, P., & Hendry, C. (2009). Pathways to commercial wind power in the US, Europe and Japan: The role of demonstration projects and field trials in the innovation process. *Energy Policy*, 37(9), 3580-3595.
- Haris, M. (2011). Penentuan kadar flavonoid total dan aktivitas antioksidan dari daun beluntas (*Plucea indica* L). *FMIPA UNSRAT Manado*, 95115.

- Hartanto, H. (2012). *Identifikasi potensi antioksidan minuman coklat dari kakao lindak (Theobroma cacao l.) dengan berbagai cara preparasi: metode radikal bebas 1, 1 Diphenyl-2-Picrylhydrazil (DPPH)* (Doctoral dissertation, Faculty of Agricultural Technology).
- Hartati., A. Irma S., Sahribulan & Halifah P. (2021). Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Mitragyna Speciosa Korth. *Indonesian Journal Of Fundamental Sciences*. 7(2), 77-83.
- Hasibuan, E. (2015). *Pengenalan Spektrofotometri pada Mahasiswa yang Melakukan Penelitian di Laboratorium Terpadu*. Fakultas Kedokteran USU.
- Hasmita, I., Marya, E., & Redha, F. (2019). Pengaruh Temperatur Pada Isolasi Miristin Dari Minyak Pala Menggunakan Rotary Evaporator. *Biopropal Industri*, 10, 41–48.
- Hayati, A., Puspita, N., & Pidada, I. R. (2012). Pemanfaatan Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) Untuk Pemulihan Morfologi dan Motilitas Spermatozoa Mencit (*Mus Musculus*) yang Terpapar 2-Metoksietanol. *Berkala Penelitian Hayati*, 18(1), 35-38.
- Haytowitz, D. B., & Pehrsson, P. R. (2018). USDA's National Food and Nutrient Analysis Program (NFNAP) produces high-quality data for USDA food composition databases: Two decades of collaboration. *Food chemistry*, 238, 134-138.
- Herbal, F. (2017). Herbal Indonesia Herbal. *Pocket Handbook of Nonhuman Primate Clinical Medicine*, 307-310.
- Hernani, R. M., & Rahardjo, M. (2005). Tanaman berkhasiat antioksidan. *Jakarta: Penebar Swadaya*, 46.
- Imrawati, I., Mus, S., Gani, S. A., & Bubua, K. I. (2018). Antioxidant Activity of *Muntingia calabura L.* Leaves Ethyl Acetate Fraction. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 2(2).
- Ishak, A. (2018). *Analisis Fitokimia dan Uji Aktivitas Antioksidan Biskuit Biji Labu Kuning (Cucurbita Sp.) Sebagai Snack Sehat*. Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Isnindar, S. W., & Setyowati, E. P. (2011). Isolasi dan identifikasi senyawa antioksidan daun Kesemek (*Diospyros kaki Thunb.*) dengan metode DPPH (2, 2-difenil-1-pikrilhidrazil). *Majalah Obat Tradisional*, 16(3), 157-164.
- Julianto, T. S. (2019). *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Shahih*. Bandung.
- Konan, K. V., Le Tien, C., & Mateescu, M. A. (2016). Electrolysis-induced fast activation of the ABTS reagent for an antioxidant capacity assay. *Analytical Methods*, 8(28), 5638-5644.
- Lestari, S.M. (2012). *Uji Penghambatan Ekstrak Daun Sidaguri (Sida rhombifolia L.) Terhadap Aktivitas Xantin Oksidase dan Identifikasi Golongan Senyawa pada Fraksi yang Aktif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Liaudanskas, M., Viškelis, P., Raudonis, R., Kviklys, D., Uselis, N., & Janulis, V. (2014). Phenolic composition and antioxidant activity of *Malus domestica* leaves. *The Scientific World Journal*, 2014.
- Madhavi, D. L., Deshpande, S. S., & Salunkhe, D. K. (1995). *Food antioxidants: Technological: Toxicological and health perspectives*. CRC Press.
- Markham, K.R. (1988). *Cara Mengidentifikasi Flavonoid*. Diterjemahkan Oleh: Kosasih Padmawinata. Bandung: Penerbit Itb: 1-3.
- Mbata, T. I. (2014). Antioxidant nutrients: beneficial or harmful. *Internet Journal of Food Safety*. V, 29-33.

- Miller, A.L. (1996). Antioxidant flavonoids: structure, function, and clinical usage. *Alt Med Rev.* 1:103 – 111.
- Molyneux, P. (2004). The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. *Songklanakarin J. sci. technol.* 26(2), 211-219.
- Nadesul, H. (2006). Sehat Itu Murah Jakarta PT. *Kompas Media Nusantara Nasional (BAPPENAS)*.
- Ningrum, D. W., Kusriani, D., & Fachriyah, E. (2017). Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Ekstrak Etanol Daun Johar (*Senna siamea* Lamk). *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 20(3), 123–129.
- Ningrum, R., Purwanti, E., & Sukarsono, S. (2016). Alkaloid compound identification of *Rhodomyrtus tomentosa* stem as biology instructional material for senior high school X grade. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 2(3), 231-236.
- Novioella, A. M. (2019). *Uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol dan fraksi etil asetat kulit Apel Manalagi (Malus sylvestris Mill.)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Oliveira, S. D., Souza, G. A. D., Eckert, C. R., Silva, T. A., Sobral, E. S., Fávero, O. A., ... & Baader, W. J. (2014). Evaluation of antiradical assays used in determining the antioxidant capacity of pure compounds and plant extracts. *Química Nova*, 37, 497-503.
- Panjaitan, R., Ni'mah, S., Romdhonah, & Annisa, L. (2015). "Pemanfaatan Minyak Labu Kuning (*Cucurbita moschata* Durh) Menjadi Sediaan Nanoemulsi Topical Sebagai Agen Pengembang Cosmética Antiaging". *Jurnal Khazanah*. 7(2), 61-81.
- Patel, S. (2013). Pumpkin (*Cucurbita Sp.*) Seeds As Nutraceutical: A Review On Status Quo And Scopes. *Mediterranean Journal Of Nutrition And Metabolism*, 6(3), 183-189.
- Pisoschi, A. M., & Negulescu, G. P. (2011). Methods for total antioxidant activity determination: a review. *Biochem Anal Biochem*, 1(1), 106.
- Pourmorad, F., Hosseinimehr, S. J., & Shahabimajid, N. (2006). Antioxidant activity, phenol and flavonoid contents of some selected Iranian medicinal plants. *African journal of biotechnology*, 5(11).
- Prakash, A. (2001). Antioxidant Activity. *Medallion Laboratories-Analytical Progress*, 19(2): 1-4.
- Prayoga, D.G.E., K.A. Nociantri, dan N.N.Puspawati. 2019. Identifikasi senyawa fitokimia dan aktivitas antioksidan ekstrak kasar daun pepe (*Gymnema reticulatum* br.) pada berbagai jenis pelarut. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*. 8(2): 111-121.
- Primawati, R. (2007). *Aktivitas Antioksidan dan Kadar Fenolik Total Biji Semangka (Citrullus vulgaris schrad.) dan Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata ex Poir)*. Skripsi. Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana.
- Prior, R. L., Wu, X., & Schaich, K. (2005). Standardized methods for the determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary supplements. *Journal of agricultural and food chemistry*, 53(10), 4290-4302.
- Puspitasari, A. D., & Proyogo, L. S. (2017). Perbandingan metode ekstraksi maserasi dan sokletasi terhadap kadar fenolik total ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura*). *Cendekia Eksakta*, 2(1).

- Puspitasari, A. D., Sumantri, L. M., & Fardah, U. J. (2019). *Aktivitas Antioksidan Perasan Jeruk Manis (Citrus Sinensis) Dan Jeruk Purut (Citrus Hystrix) Menggunakan Metode ABTS*. *Majalah Farmasi Dan Farmakologi*, Semarang, 23(2),
- Puspitasari, M. L., Wulansari, T. V., Widyaningsih, T. D., & Mahar, J. (2016). *Aktivitas Antioksidan Suplemen Herbal Daun Sirsak (Annona Muricata L.) Dan Kulit Manggis (Garcinia Mangostana L.): Kajian Pustaka Antioxidant Activity Herbal Supplements Of Soursop Leaf (Annona Muricata L.) And Pericarp Of Mangosteen (Garcinia Man)*. *Pangan Dan Agroindustri*, 4(1), 283-290.
- Putra Adi Surya, R., & Luhurningtyas, F. P. (2021). *Perbedaan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Parijoto Asal Bandung Dengan Variasi Konsentrasi Etanol Menggunakan Metode FRAP* (Doctoral dissertation, Universitas Ngudi Waluyo).
- Rahmi, H. (2017). *Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber Buah-buahan di Indonesia*. *Jurnal Agrotek Indonesia (Indonesian Journal of Agrotech)*, 2(1).
- Rasyd, A. (2012). *Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Teripang (Stichopus Hermani)*, *Jurnal Ilmu Dan Teknik Kelautan Tropis*, Vol.4, No 2, h. 363.
- RI, D. P. D. (1995). *Farmakope Indonesia*. Edisi IV. Depkes RI. Jakarta. hlm, 7.
- Robinson, T. (1995). *Kandungan organik tumbuhan tinggi*. Penerbit ITB. Bandung.
- Rustina. (2016). *Karya Tulis Ilmiah : Uji Aktivitas Antioksidan Dan Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata Duch. Poir)*. Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Salamah, Nina, & Erlinda Widyasari. (2015) "Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Daun Kelengkeng (Euphoria Longan (L) Steud.) Dengan Metode Penangkapan Radikal 2,2'-Difenil-1-Pikrilhidrazil". *Pharmaciana*, 5(1), 25-34.
- Sani, R. N., Nisa, F. C., Andriani, R. D., & Maligan, J. M. (2014). *Analisis rendemen dan skrining fitokimia ekstrak etanol mikroalga laut Tetraselmis chuii*. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 2(2), 121-126.
- Santoso, U. (2016). *Antioksidan Pangan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hal 197.
- Sayuti, K., & Yenrina, R. (2015). *Antioksidan Alami Dan Sintetik*. Padang. Universitas Adalas, 40.
- Setiawan, M. R. (2018). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Dan Partisi Etil Asetat Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata)* (Doctoral dissertation, Akafarma Putra Indonesia Malang).
- Shahidi, F., Wanasundara, U., & Amarowicz, R. (1995). *Isolation and partial characterization of oilseed phenolics and evaluation of their antioxidant activity*. In *Developments in Food Science* (Vol. 37, pp. 1087-1099). Elsevier.
- Shalaby, E.A., & Shanab, S.M.M. (2013). 'Comparison of DPPH and ABTS Assays for Determining Antioxidant Potential of Water and Methanol Extracts of *Spirulina platensis*', *Indian Journal of Geo-Marine Sciences*, 42(5), 556-564.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Quran*. Lentera Hati.
- Silalahi, J. (2006). *Makanan fungsional*. Kanisius. Yogyakarta.

- Sineke, F. U. (2016). Penentuan kandungan fenolik dan sun protection factor (spf) dari ekstrak etanol dari beberapa tongkol jagung (*Zea mays* L.). *Pharmacon*, 5(1).
- Sing, Y.Y., 2007. *Determination of synthetic Phenolic Antioxidant in Food Items Using HPLC and Total Antioxidants Using Fia Approaches*. Thesis. Penang University Sains Malaysia.
- Sirait, M. (2007). Penuntun fitokimia dalam farmasi. *Bandung: Penerbit ITB*, 158-159.
- Sitinjak, R. (2017). *Uji aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol kulit buah jeruk purut (Citrus hystrix DC) dengan metode pemerangkapan DPPH (1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)* (Doctoral dissertation).
- Sudirman, S. (2011). Aktivitas antioksidan dan komponen bioaktif kangkung air (*Ipomoea aquatica* Forsk). Bogor.
- Suhartati, T. (2017). *Dasar-dasar spektrofotometri UV-Vis dan spektrometri massa untuk penentuan struktur senyawa organik*.
- Suiraoaka, I. (2016). Penyakit degeneratif. Yogyakarta: Nuha Medika. *Mengenal, Mencegah dan Mengurangi faktor resiko*, 9.
- Syafei, Z. (2015). *Laporan Praktikum Biomedik 3 BM 506 Metabolisme Glukosa, Urea Dan Trigliserida (Teknik Spektrofotometri)*.
- Syam A, Kurniati Y, Zaenal, Puspitasari, Khaerani. (2019). Nutrient Content of Pumpkin Seeds (*Cucurbita moschata* Duch) in Makassar. *International Conference of Nutrition and Public Health*. Makassar: Prodi Gizi Unhas.
- Tahir, K. A., Miskad, U. A., Djawad, K., Djide, S., Khaerani, K., & Indrisari, M. (2021). Evaluation of Antioxidant Activity of Botto-Botto Leaf Fraction (*Chromolaena odorata* L.) Using DPPH and ABTS Methods. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences (OAMJMS)*, 9(A), 183-188.
- Tandi, J., Rahmawati, R., Isminarti, R., & Lapangoyu, J. (2018, December). Efek Ekstrak Biji Labu Kuning Terhadap Glukosa, Kolesterol dan Gambaran Histopatologi Pankreas Tikus Hiperkolesterolemia-Diabetes. In *Talenta Conference Series: Tropical Medicine (TM)* (Vol. 1, No. 3, pp. 144-151).
- Tetti, M. (2014). Ekstraksi, pemisahan senyawa, dan identifikasi senyawa aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2).
- Tiong, S. H., Looi, C. Y., Hazni, H., Arya, A., Paydar, M., Wong, W. F., & Awang, K. (2013). Antidiabetic and antioxidant properties of alkaloids from *Catharanthus roseus* (L.) G. Don. *Molecules*, 18(8), 9770-9784.
- Vifta, R. L., & Advistasari, Y. D. (2018). Skrining Fitokimia, Karakterisasi, dan Penentuan Kadar Flavonoid Total Ekstrak dan Fraksi-Fraksi Buah Parijoto (*Medinilla speciosa* B.). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1, 8-14
- Voight, B., & Sousa, J. (1994). Lessons from Ontake-san: a comparative analysis of debris avalanche dynamics. *Engineering Geology*, 38(3-4), 261-297.
- Watson, R. R. (Ed.). (2018). Polyphenols in plants: isolation, purification and extract preparation. *Academic Press*.
- Wijaya, H., Jubaidah, S., & Rukayyah, R. (2022). Perbandingan Metode Ekstraksi Terhadap Rendemen Ekstrak Batang Turi (*Sesbania Grandiflora* L.) Dengan Menggunakan Metode Maserasi Dan Sokhletasi. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 5(1), 1-11.
- Williams, C. A., Harborne, J. B., Greenham, J., & Eagles, J. (1994). Differences in flavonoid patterns between genera within the Velloziaceae. *Phytochemistry*, 36(4), 931-940.
- Winarsi, H. (2007). Antioksidan alami dan radikal. *Kanisius. Yogyakarta*.
- Wink, M. (2008). Ecological roles of alkaloids. *Modern alkaloids*, 3-52.


- Yadav, M., Jain, S., Tomar, R., Prasad, G. B. K. S., & Yadav, H. (2010). Medicinal and biological potential of pumpkin: an updated review. *Nutrition research reviews*, 23(2), 184-190
- Yahya, S. (2013). Spektrofotometri UV-Vis. *Jakarta: Erlangga*.
- Yanlinastuti, & Fatimah, S. (2016). Pengaruh Konsentrasi Pelarut Untuk Menentukan Kadar Zirkonium Dalam Paduan U-zr Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Uv-vis. *Pengelolaan Instalasi Nuklir*, 9(17), 22–33.
- Yong, Y. S. (2007). Determination of synthetic phenolic antioxidants in food items using HPLC and total antioxidants using FIA approaches. *Universiti Sains Malaysia, Malaysia*.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


1. Preparasi sampel




2. Ekstraksi sampel




3. Uji flavonoid




4. Uji fenolik




5. Uji alkaloid




6. Uji terpenoid



7. Pengukuran aktivitas antioksidan dengan pembanding vitamin C



8. Pengukuran aktivitas antioksidan dengan sampel



Lampiran 2. Perhitungan

A. Pembuatan larutan

1. ABTS 7 mM

$$7 \text{ mM} = 0,007 \text{ M}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{\text{mL}}$$

$$0,007 \text{ M} = \frac{g}{548,68} \times \frac{1000}{10}$$

$$g = \frac{548,68 \times 0,007}{100}$$

$$g = 0,0384 \sim 38,4 \text{ mg}$$

Dilarutkan 38,4 mg ABTS dalam 10 ml pelarut.

2. Kalium Persulfat 2,45 mM

$$2,45 \text{ mM} = 0,00245 \text{ M}$$

$$M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{\text{mL}}$$

$$0,00245 \text{ M} = \frac{g}{270,32} \times \frac{1000}{10}$$

$$g = \frac{270,32 \times 0,00245}{100}$$

$$g = 0,0066 \sim 6,6 \text{ mg}$$

Dilarutkan 6,6 mg kalium persulfat dalam 10 mL pelarut.

3. Larutan Induk Vitamin C 50 ppm

$$\text{Ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$50 = \frac{\text{mg}}{0,05}$$

$$\text{mg} = 50 \times 0,05$$

$$= 2,5 \text{ mg}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 50 ppm dengan cara ditimbang vitamin C sebanyak 2,5 mg dan dilarutkan dengan 50 mL pelarut.

4. Larutan Seri Konsentrasi Vitamin C

a. 2 ppm

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$$50 \text{ ppm} \cdot V_1 = 2 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$50 \cdot V_1 = 10$$

$$V_1 = \frac{10}{50}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ mL} \sim 200 \mu\text{l}$$

b. 4 ppm

$$50 \text{ ppm} \cdot V_1 = 4 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$50 \cdot V_1 = 20$$

$$V_1 = \frac{20}{50}$$

$$V_1 = 0,4 \text{ mL} \sim 400 \mu\text{l}$$

c. 6 ppm

$$50 \text{ ppm} \cdot V_1 = 6 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$50 \cdot V_1 = 30$$

$$V_1 = \frac{30}{50}$$

$$V_1 = 0,6 \text{ mL} \sim 600 \mu\text{l}$$

d. 8 ppm

$$50 \text{ ppm} \cdot V_1 = 8 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$50 \cdot V_1 = 40$$

$$V_1 = \frac{40}{50}$$

$$V_1 = 0,8 \text{ mL} \sim 800 \mu\text{l}$$

e. 10 ppm

$$50 \text{ ppm} \cdot V_1 = 10 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$50 \cdot V_1 = 50$$

$$V_1 = \frac{50}{50}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL} \sim 1000 \mu\text{l}$$

5. Pembuatan Larutan Induk Sampel Ekstrak 500 ppm

$$\text{Ppm} = \frac{\text{mg}}{\text{L}}$$

$$500 = \frac{\text{mg}}{0,01}$$

$$\text{mg} = 500 \times 0,01$$

$$= 5 \text{ mg}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara ditimbang sampel ekstrak sebanyak 5 mg dan dilarutkan dengan 10 ml pelarut.

6. Pembuatan Seri Konsentrasi Sampel Ekstrak

a. 20 ppm

$$M_1 \cdot V_1 = M_2 \cdot V_2$$

$$500 \text{ ppm} \cdot V_1 = 20 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$500 \cdot V_1 = 100$$

$$V_1 = \frac{100}{500}$$

$$V_1 = 0,2 \text{ mL} \sim 200 \mu\text{l}$$

b. 40 ppm

$$500 \text{ ppm} \cdot V_1 = 40 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$500 \cdot V_1 = 200$$

$$V_1 = \frac{200}{500}$$

$$V_1 = 0,4 \text{ mL} \sim 400 \mu\text{l}$$

c. 60 ppm

$$500 \text{ ppm} \cdot V_1 = 60 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$500 \cdot V_1 = 300$$

$$V_1 = \frac{300}{500}$$

$$V_1 = 0,6 \text{ mL} \sim 600 \mu\text{l}$$

d. 80 ppm

$$500 \text{ ppm} \cdot V_1 = 80 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$500 \cdot V_1 = 400$$

$$V_1 = \frac{400}{500}$$

$$V_1 = 0,8 \text{ mL} \sim 800 \mu\text{l}$$

e. 100 ppm

$$500 \text{ ppm} \cdot V_1 = 100 \text{ ppm} \cdot 5 \text{ mL}$$

$$500 \cdot V_1 = 500$$

$$V_1 = \frac{500}{500}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL} \sim 1000 \mu\text{l}$$

B. Rendemen ekstrak

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{bobot ekstrak kental (g)}}{\text{bobot simplisia (g)}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendemen} &= \frac{14,769}{300} \times 100\% \\ &= 4,92\% \end{aligned}$$

C. Perhitungan % inhibisi antioksidan

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Absorbansi blanko} - \text{Absorbansi sampel}}{\text{Absorbansi blanko}} \times 100\%$$

1. Vitamin C

$$\text{a. } 2 \text{ ppm} = \frac{0,589 - 0,540}{0,589} \times 100\% = 8,31\%$$

$$\text{b. } 4 \text{ ppm} = \frac{0,589 - 0,501}{0,589} \times 100\% = 14,94\%$$

$$\text{c. } 6 \text{ ppm} = \frac{0,589 - 0,470}{0,589} \times 100\% = 20,20\%$$

$$\text{d. } 8 \text{ ppm} = \frac{0,589 - 0,467}{0,589} \times 100\% = 20,71\%$$

$$\text{e. } 10 \text{ ppm} = \frac{0,589 - 0,453}{0,589} \times 100\% = 23,08\%$$

2. Ekstrak sampel

- a. $20 \text{ ppm} = \frac{0,589-0,4967}{0,589} \times 100 \% = 15,67 \%$
- b. $40 \text{ ppm} = \frac{0,589-0,4316}{0,589} \times 100 \% = 26,71 \%$
- c. $60 \text{ ppm} = \frac{0,589-0,4013}{0,589} \times 100 \% = 31,86 \%$
- d. $80 \text{ ppm} = \frac{0,589-0,3303}{0,589} \times 100 \% = 43,91 \%$
- e. $100 \text{ ppm} = \frac{0,589-0,3206}{0,589} \times 100 \% = 45,55 \%$

D. Perhitungan nilai IC₅₀

Melalui persamaan Linear :

$$y = ax + b$$

$$ax = y - b$$

$$x = \frac{y-b}{a}$$

1. Vitamin C

Diketahui :

$$y = 50$$

$$a = 9,2052$$

$$b = 2,2589$$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$= \frac{50-2,2589}{9,2052}$$

$$= 5,186 \text{ ppm}$$

2. Ekstrak sampel biji labu kuning

Diketahui :

$$y = 50$$

$$a = 2,2157$$

$$b = 18,677$$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$= \frac{50-18,677}{2,2157}$$

$$= 14,136 \text{ ppm}$$

Lampiran 3. Grafik


A. Pengujian Aktivitas Antioksidan Metode ABTS

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimal

Tabel 7. Hasil Running Panjang Gelombang Maksimal

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi (nm)	Panjang gelombang (nm)	Absorbansi (nm)
600	0.268	705	0.42
605	0.28	710	0.431
610	0.291	715	0.446
615	0.302	720	0.463
620	0.315	725	0.48
625	0.33	730	0.499
630	0.344	735	0.518
635	0.358	740	0.537
640	0.37	745	0.552
645	0.381	750	0.562
650	0.39	755	0.561
655	0.398	760	0.555
660	0.402	765	0.54
665	0.406	770	0.526
670	0.408	775	0.508
675	0.406	780	0.49
680	0.402	785	0.478
685	0.401	790	0.466
690	0.401	795	0.458
695	0.405	800	0.452
700	0.411		

2. Grafik panjang gelombang maksimal 750 nm




Gambar 3. Panjang Gelombang Maksimal ABTS 750 nm

3. Kurva baku vitamin C

Tabel 8. Data Absorbansi Vitamin C

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
2	0,540
4	0,501
6	0,470
8	0,467
10	0,453




Gambar 4. Kurva Baku Vitamin C

4. Kurva baku ekstrak etanol biji labu kuning

Tabel 9. Data Absorbansi Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi			Rata-rata absorbansi
	Replikasi I	Replikasi II	Replikasi III	
20	0,437	0,44	0,438	0,438
40	0,429	0,435	0,432	0,432
60	0,424	0,434	0,427	0,428
80	0,415	0,428	0,423	0,422
100	0,409	0,421	0,419	0,416




Gambar 5. Kurva Ekstrak Sampel

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 4. Sertifikat Analisis


1. ABTS




3050 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103, USA
 Website: www.sigmaaldrich.com
 Email USA: techserv@sial.com
 Outside USA: eurtechserv@sial.com

Certificate of Analysis

Product Name
2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt - $\geq 98\%$ (HPLC)


Product Number:	A1888		
Batch Number:	SLCP5590		
Brand:	SIGMA		
CAS Number:	30931-67-0		
MDL Number:	MFCD00010404		
Formula:	C ₁₈ H ₂₄ N ₆ O ₆ S ₄		
Formula Weight:	548.68 g/mol		
Storage Temperature:	Store at 2 - 8 °C		
Quality Release Date:	01 NOV 2022		
Recommended Retest Date:	AUG 2026		

Test	Specification	Result
Appearance (Color)	Faint Green to Green and Light Green-Yellow to Dark Green-Yellow	Light Green
Appearance (Form)	Powder	Powder
Solubility (Color)	Very Faint Green to Green to Green-Yellow	Green
Solubility (Turbidity) 10 mg/mL, H ₂ O	Clear to Slightly Hazy	Clear
Water (by Karl Fischer)	$\leq 2\%$	2 %
Suitability Suitable as a reagent for peroxidase	Suitable	Suitable
Purity (HPLC)	$\geq 98\%$	100 %
¹³ C NMR Identity	Conforms to Structure	Conforms
Proton NMR Spectrum	Conforms to Structure	Conforms



Brian Dulle, Supervisor
Quality Assurance
St. Louis, Missouri US

Sigma-Aldrich warrants, that at the time of the quality release or subsequent retest date this product conformed to the information contained in this publication. The current Specification sheet may be available at Sigma-Aldrich.com. For further inquiries, please contact Technical Service. Purchaser must determine the suitability of the product for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.



Version Number: 1 Page 1 of 1

Gambar 6 . Sertifikat Analisis ABTS

2. Kalium persulfat



Certificate of Analysis

1.05091.0000 Potassium peroxodisulfate for analysis EMSURE®
 Batch K53123391

Batch Values		
Assay (iodometric)	100.2	%
Chloride (Cl)	≤ 0.001	%
Heavy metals (as Pb)	≤ 0.003	%
Fe (Iron)	≤ 0.001	%
Mn (Manganese)	≤ 0.0001	%


Date of release (DD.MM.YYYY) 05.02.2021
 Minimum shelf life (DD.MM.YYYY) 29.02.2024

Claudia Wiegand
 Responsible laboratory manager quality control


This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Gambar 7 . Sertifikat Analisis Kalium Persulfat


Lampiran 5. Gambar



Gambar 8. Ekstraksi Sampel (a) Simplisia biji labu kuning; (b) Serbuk biji labu kuning; (c) Maserasi; (d) Penyaringan; (e) Penguapan dengan rotavapor; (f) Ekstrak kental biji labu kuning



Gambar 9. Hasil Skrining Fitokimia (a) Flavonoid (+); (b) Fenolik (-); (c) Alkaloid (+); (d) Terpenoid (-)



Gambar 10. Pengujian Antioksidan Metode ABTS (a) Serbuk ABTS; (b) Serbuk kalium persulfat; (c) Vitamin C; (d) Ekstrak Sampel; (e) Larutan stok ABTS; (f) Larutan baku Vitamin C; (g) Larutan baku Ekstrak sampel; (h) Variasi konsentrasi vitamin C; (i) Variasi konsentrasi sampel; (j) Proses pembuatan variasi konsentrasi; (k) Proses analisis menggunakan spektro UV-Vis

RIWAYAT HIDUP



Disa Safitri dilahirkan di Makassar, pada tanggal 30 Desember 2000. Anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Kamaruddin dan Maria Dolores Lolita K. Penulis mengawali Pendidikan di salah satu taman kanak-kanak Masrurah kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Mangkura II Makassar, lulus pada tahun 2013. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN. 4 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMK Farmasi Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa dan lulus pada tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, untuk jenjang S1 pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sampai saat biografi ini ditulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R