

**EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN PNEUMONIA
DENGAN METODE GYSSENS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) NENE MALLOMO KABUPATEN SIDRAP**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

DWI YULIANA SARI

NIM : 70100118036

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Yuliana Sari
Nim : 70100118036
Tempat/ Tgl. Lahir : Rappang/ 16 Juli 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Borong Raya
Judul : Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 8 Februari 2023

Penulis



Dwi Yuliana Sari

70100118036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap”**, yang disusun oleh **Dwi Yuliana Sari, NIM: 70100118036**, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 8 Februari 2023 M** yang bertepatan dengan **17 Rajab 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Gowa, 8 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.	(.....)
Sekretaris	: Apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si	(.....)
Pembimbing I	: Apt. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, M. Si	(.....)
Penguji I	: Apt. Khaerani, M. Farm., Klin	(.....)
Penguji II	: Dr. St Nasriah M. Sos. I	(.....)

Diketahui oleh:


Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang lebih tepat diucapkan oleh seorang hamba selain “alhamdulillah” puji syukur kepada Allah Swt, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. shalawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad Saw yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap”**, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan do’a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Drs. H. Labengnga, M. Si dan Hj. Nurlaelah, Se., M. Adm. KP atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, do’a yang selalu terpanjatkan, dukungan semangat dan dukungan moril serta materilnya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mardan, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Wahyuddin, M. Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr.

- H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dr. H. M. Faris Satrianegara, S. KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 3. Apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
 4. Apt. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. selaku pembimbing pertama yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S. Si., M. Si. selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Apt. Khaerani, M. Farm., Klin. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan atau saran dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
 7. Dr. St Nasriah, M. Sos, I. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan serta tuntunan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

8. Bapak ibu panitia seminar sebagai koordinator ujian akhir yang telah mencurahkan banyak waktu, tenaga, dan kerja keras untuk membantu pelaksanaan ujian akhir bagi peneliti.
9. Bapak Ibu Dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah Swt. membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Namun, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Swt. Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 8 Februari 2023

Penyusun,



DWI YULIANA SARI

NIM: 70100118036

UNIVERSITAS IBRAHIM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap 8	
B. Evaluasi Antibiotik Dengan Metode Gyssens	19
C. Pneumonia	26
D. Antibiotik	41
E. Tinjauan Islam Terhadap Pengobatan	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Tempat dan Waktu Penelitian	53
C. Populasi Penelitian	53
D. Sampel Penelitian	54
E. Penentuan Besar Sampel	55

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Pengambilan Sampel.....	56
H. Variabel Penelitian.....	56
I. Tahap Penelitian	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Hasil Penelitian.....	61
B. Pembahasan.....	68
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	97
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	111



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Kriteria evaluasi kualitas terapi antibiotik 24
Tabel 2	Penggolongan antibiotik berdasarkan tempat kerja..... 43
Tabel 3	Tabel sampel pasien pneumonia periode 2021 55
Tabel 4	Kelompok umur pasien pneumonia di rawat inap tahun 2021..... 55
Tabel 5	Distribusi lama pemberian antibiotik 62
Tabel 6	Distribusi jenis obat yang digunakan..... 62
Tabel 7	Evaluasi penggunaan antibiotik dengan metode gyssens 63
Tabel 8	Tabulasi silang antara X1 dan Y 64
Tabel 9	Tabulasi silang antara X2 dan Y 65
Tabel 10	Tabulasi silang antara X3 dan Y..... 65
Tabel 11	Tabulasi silang antara X4 dan Y..... 66
Tabel 12	Hasil <i>mode fit summary</i> evaluasi antibiotik..... 66
Tabel 13	Rata-rata jumlah obat yang sesuai formularium RS..... 67
Tabel 14	Kategori IVa pada pasien pneumonia..... 72
Tabel 15	kategori IIIa pada pasien pneumonia 76
Tabel 16	kategori IIIb pada pasien pneumonia..... 77
Tabel 17	Kategori IIa pada pasien pneumonia 78
Tabel 18	Kategori 0 pada pasien pneumonia..... 81
Tabel 19	Daftar obat pneumonia berdasarkan formularium RS 2021 89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Algoritma evaluasi terapi antibiotik	23
Gambar 2 Kerangka pikir penelitian	57
Gambar 3 Bagan alur penelitian	58
Gambar 4 Skema penelitian	60
Gambar 5 Karakteristik pasien pneumonia berdasarkan usia	61
Gambar 6 Karakteristik pasien pneumonia berdasarkan jenis kelamin	62
Gambar 7 Hasil uji <i>structural equation model</i> (SEM)	66



ABSTRAK

Nama : DWI YULIANA SARI
Nim : 70100118036
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap

Pneumonia merupakan suatu penyakit infeksi pada parenkim paru yang disebabkan oleh sejumlah mikroorganisme seperti virus, parasit, jamur dan bakteri. Pneumonia berada pada peringkat ke-2 dalam 10 besar penyakit terbesar rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kerasionalan penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia dengan metode gyssens di instalasi rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan secara retrospektif. Data yang diambil berasal dari rekam medik pasien pneumonia dengan total 100 sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi. Hasil evaluasi penggunaan antibiotik berdasarkan metode gyssens yaitu diperoleh penggunaan antibiotik tepat/rasional (kategori 0) sebesar 14% dan penggunaan antibiotik yang tidak rasional sebesar 86% yang terbagi dalam ada antibiotik lain yang lebih efektif (kategori IVa) sebesar 67%, penggunaan antibiotik terlalu lama (kategori IIIa) sebesar 5%, penggunaan antibiotik terlalu singkat (kategori IIIb) sebesar 13% dan penggunaan antibiotik tidak tepat dosis (kategori IIa) sebesar 1%. Pada penelitian ini dapat disimpulkan dari kategori yang dinilai bahwa penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap tidak rasional.

Kata Kunci: Pneumonia, Antibiotik, Gyssens

ABSTRACT

Name : DWI YULIANA SARI
Nim : 70100118036
Title : Evaluation of the Use of Antibiotics in Pneumonia Patients Using the Gyssens Method at the Nene Mallomo Regional General Hospital Sidrap Regency

Pneumonia is an infectious disease of the lung parenchyma caused by a number of microorganisms such as viruses, parasites, fungi and bacteria. Pneumonia is ranked 2nd in the top 10 biggest diseases of hospitalization at the Nene Mallomo Regional General Hospital, Sidrap Regency in 2021. The purpose of this study was to find out the rationale for using antibiotics in pneumonia patients with the gyssens method at the inpatient installation at Nene Mallomo District Hospital. Sidrap period 2021. This type of research is descriptive research with a quantitative approach which is carried out retrospectively. The data taken came from the medical records of pneumonia patients with a total of 100 samples that met the inclusion criteria. The results of the evaluation of the use of antibiotics based on the Gyssens method were obtained using appropriate/rational antibiotics (category 0) by 14% and 86% irrational use of antibiotics which were divided into other more effective antibiotics (category IVa) by 67%, using antibiotics too much duration (category IIIa) of 5%, use of antibiotics too short (category IIIb) of 13% and inappropriate use of antibiotics (category IIa) of 1%. In this study it can be concluded from the categories assessed that the use of antibiotics in pneumonia patients at Nene Mallomo Hospital, Sidrap Regency is irrational.

Keywords: *Pneumonia, Antibiotics, Gyssens*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang tahun 2009 dan Permenkes RI No. 72 tahun 2016 rumah sakit yakni institusi layanan kesehatan dimana menyediakan layanan rawat jalan, inap serta gawat darurat dimana menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Layanan medis yang ditawarkan rumah sakit yakni *Pharmaceutical Care* dimana berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Agar memastikan jika obat dipakai secara benar, efektif, serta aman farmasi klinis melakukan evaluasi penggunaan obat sebagai bagian dari program penjaminan mutu yang terorganisir dan berkelanjutan (Hardiana, 2021).

Evaluasi untuk mengkaji pemakaian antibiotik dimana termasuk pemilihan serta indikasi misalnya efikasi, harga, toksisitas, lama pemberian, spektrum, interval, dosis, rute, serta waktunya, dilakukan pemeriksaan kualitas penggunaan antibiotik. Teknik *gyssens* adalah pendekatan khusus yang telah banyak digunakan di beberapa negara untuk menilai efektivitas penggunaan antibiotik (Anggraini, 2020).

Pendekatan *gyssens* yang berbentuk diagram alir dapat memeriksa semua aspek peresepan antibiotik. Ini memiliki manfaat dapat meninjau penggunaan

antibiotik karena dapat menentukan apakah antibiotik digunakan secara rasional dalam kategori 0 atau tidak rasional dalam kategori I sampai VI (Anggraini, 2020).

Pneumonia yakni radang dimana di paru-paru terdapat konsolidasi serta eksudasi. Pneumonia yang diakibatkan bakteri, virus, parasite, serta jamur kebanyakan peresepan obatnya adalah antibiotik. Adapun mikroorganisme penginfeksi pneumonia yakni *Streptococcus pneumoniae*. Mikroorganisme lain membuat pneumonia misalnya *Haemophilus influenza*, *Mycoplasma pneumonia*, *Chlamydophila pneumoniae*, dan *Legionella species* (Wulandari, 2019).

Pasien dengan pneumonia mungkin mendapatkan antibiotik baik sebagai terapi definitif atau sebagai terapi empiris tergantung pada apakah proses kultur telah selesai. Resistensi antimikroba dapat dihindari dengan menggunakan antibiotik secara hemat yang pada akhirnya akan menurunkan biaya perawatan pasien, mengurangi rawat inap, menghemat uang untuk rumah sakit dan meningkatkan standar layanan rumah sakit (Anggraini, 2021).

Angka penderita pneumonia saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang masih cukup tinggi. Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang prevalensi jumlah penderita pneumonia yang ditangani pada tahun 2019 yaitu mencapai 1.143 kasus, sementara itu pada tahun 2020 meningkat 2.107 kasus.

Dari data sepuluh besar penyakit rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap tahun 2021 penyakit pneumonia berada di tingkat kedua yang paling

banyak dengan jumlah pasien sebanyak 499 orang. Di rumah sakit ini, pneumonia menyerang semua umur baik anak, dewasa maupun lansia (Mallomo, 2021).

Evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia melalui metode gyssens di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap belum pernah dilakukan. Mengingat angka penderita pneumonia saat ini masih cukup tinggi tidak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sidrap, maka penting dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik. Sehingga harus dijalankan penelitian selanjutnya mengenai “Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo di Kabupatten Sidrap”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia melalui metode gyssens pada instalasi rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode 2021?
2. Apakah antibiotik yang diresepkan sesuai dengan formularium di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Penyakit virus dimana membuat radang terhadap salah satu ataupun kedua kantung udara paru-paru disebut pneumonia.
- b. Antibiotik yakni obat yang dipakai agar mengobati infeksi bakteri.

- c. Pemakaian obat yakni kondisi yang memerlukan dosis yang tepat, pasien yang sesuai, dan frekuensi pemberian yang tepat.
- d. Rekam medis adalah berkas dimana memberikan informasi tentang pasien, antara lain informasi identitas, anamnesa, diagnosis, serta pengobatan yang diterima selama menjalani perawatan di rumah sakit.
- e. Metode Gyssens yakni teknik kualitatif dimana dipakai agar menilai pemakaian antibiotik melalui banyaknya sudut.
- f. Evaluasi yakni proses penetapan nilai suatu objek berdasarkan acuan tertentu agar menetapkan tujuan tertentu.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan penelitian yakni agar mengetahui dampak pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian dijalankan (Anggraini W. C., 2020) berjudul “Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih dengan Metode Gyssens”. Jenis penelitian ini menggunakan strategi penelitian cross-sectional dan observasional. Rekam medis pasien ISK rawat inap digunakan dalam pendataan sebanyak 27 rekam medis yang dilakukan secara retrospektif dari bulan September sampai November 2019. Hasil evaluasi kualitatif menunjukkan bahwa 20% kasus masuk dalam kategori 0 (penggunaan antibiotik yang tepat/bijak), 2,86 % kategori I (penggunaan antibiotik tidak

tepat waktu), 28,57% kategori II A (penggunaan antibiotik tidak tepat), 34,29% kategori II B (penggunaan antibiotik tidak tepat selang waktu), 11,42% kategori III B (penggunaan antibiotik terlalu singkat), dan 2,86% kategori IV A. (ada antibiotik lain yang lebih efektif).

2. Penelitian dijalankan (Anggraini, 2021) berjudul penelitian “Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia RS X di Malang”. Metodologi penelitian cross-sectional dengan menggunakan pendekatan observasional digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus hingga September 2019. Pendekatan Gyssen digunakan untuk melakukan analisis kualitatif. Evaluasi terhadap 35 sampel rekam medis yang memenuhi kriteria menunjukkan bahwa 13,24% kasus masuk dalam kategori 0; 10,29% kasus termasuk dalam kategori I; 0% kasus termasuk dalam kategori II C; 20,59% kasus termasuk dalam kategori II B; 2,94% kasus termasuk dalam kategori II A; 0% kasus termasuk dalam kategori III B; 0% kasus termasuk dalam kategori III A; 0% kasus termasuk dalam kategori IV D; 11,76% kasus termasuk dalam kategori IV C; 2,94% kasus Terdapat 13,24% kejadian wajar (kategori 0) dan situasi irasional (kategori I-IV) berjumlah 86,76%.
3. Penelitian dimana dijalankan (Usman, 2014) mengatakan jika antibiotik dimana dipakai adalah ceftriaxone, ampicillin, cefepime, ciprofloxacin, cefotaxime, ceftazidime pentohydrate, cefditoren pivoxil, cefadroxil,

meropenem, azithromycin, levofloxacin dan gentamicin. Ketepatan pemberian antibiotik pada komunitas RS Ibnu Sina berdasarkan manajemen WHO serta IDSA cukup pada 31 (62,0%) pasien serta tidak pada 18 (36,0%) pasien. Ketepatan dosis antibiotik pada pasien community-acquired pneumonia berdasarkan pengobatan RS Ibnu Sina, IDSA dan WHO cukup memadai pada 31 (62,0%) pasien serta tidak sesuai pada 18 (36,0%) pasien. Lama pemberian antibiotik pada komunitas pasien pneumonia di RS Ibnu Sina menurut manajemen IDSA dan WHO pada 29 (58,0%) pasien memenuhi syarat serta 20 (40,0%) pasien tidak layak.

E. Tujuan Penelitian

1. Agar memahami evaluasi pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia melalui metode gyssens pada instalasi rawat inap RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode 2021.
2. Agar memahami kesesuaian antibiotik dimana diresepkan formularium RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.

F. Manfaat Penelitian

1. Bisa memberi ilustrasi mengenai pemakaian antibiotik terhadap pasien pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.
2. Berguna untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.

3. Bermanfaat menjadi sumber daya agar meningkatkan kesehatan, khususnya dalam kaitannya dengan pemberian antibiotik yang efektif, efisien, dan sesuai untuk penderita pneumonia RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap

Institusi yang menyelenggarakan layanan rawat inap, gawat darurat, serta rawat jalan dengan tujuan mendapatkan pelayanan kesehatan individu yang komprehensif adalah rumah sakit (Undang-Undang RI, 2009).

1. Lokasi RSUD Nene Mallomo

- Nama Rumah Sakit : RSUD Nene Mallomo
- Kelas Rumah Sakit : Kelas C
- Status Akreditasi : Akreditasi “Penuh Tingkat Dasar”
- Alamat Lengkap : Jl. Wolter Monginsidi, No. 2-4, Rijang Pitu, Pangkajene Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
- Telp/Fax : 90009

2. Sejarah Singkat RSUD Nene Mallomo

UPT RSUD Nene Mallomo dibangun pada tahun 1985 dan difungsikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang Nomor 51/III/1994, dan ditetapkan dengan status kelas D pada tanggal 7 April 1994 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Sesuai SKL Persetujuan Menpan No.528/MENKES/SK/VI/1996 dan Peraturan Daerah No.16 Tahun 1996 tanggal 4 September 1996 dan SK Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.887/ XI/1996 tanggal 8

November 1996 UPT RSUD Nene Mallomo berubah status menjadi Rumah Sakit Kelas C pada tahun 1996. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.YM.01.10/III/398/07, 5 standar pelayanan mendapatkan Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar pada tahun 2007. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 418/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 menetapkan UPT RSUD Nene Mallomo sebagai Badan Layanan Umum Daerah Penuh. Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No. 400/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 memperpanjang Izin Operasional UPT RSUD Nene Mallomo yang akan berakhir pada tahun 2019.

Sesuai Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis UPT RSUD Nene Mallomo Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2020, maka UPT RSUD Nene Mallomo memiliki tugas & fungsi sebagai berikut :

1. UPT RSUD Nene Mallomo memiliki tugas menggalakkan kegiatan penyembuhan, pemulihan, upaya terpadu, preventif, dan rujukan serta membantu Bupati dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan pemerintah daerah.
2. UPT RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Komponen pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan memiliki tujuan:
 - a) Pengembangan kebijakan teknis pelayanan kesehatan

b) Penunjang terselenggaranya pemerintah daerah pada bidang layanan kesehatan (Mallomo, 2021).

3. Visi RSUD Nene Mallomo

“Terwujudnya rumah sakit menjadi pusat layanan kesehatan aman, terbaik, inovatif serta bermutu tinggi”.

4. Misi RSUD Nene Mallomo

1. Memahami pentingnya memberikan layanan pelanggan yang baik
2. Berusaha menyediakan layanan kesehatan yang inovatif dan aman
3. Membuat pelayanan kesehatan lebih terjangkau
4. Menyediakan berbagai layanan khusus

5. Motto RSUD Nene Mallomo

“Layananku adalah perbuatan baikku”.

6. Batas Geografis

- Sebelah utara : Jl. Wolter Monginsidi
- Sebelah selatan : Persawahan dan pemukiman penduduk
- Sebelah timur : Lingkungan dan pemukiman penduduk
- Sebelah barat : Lingkungan dan pemukiman penduduk

7. Pelayanan Kefarmasian di RSUD Nene Mallomo

Layanan kefarmasian yakni pelayanan yang diberikan dengan cara langsung serta tanggung jawab pada pasien mengenai sediaan farmasi berdasarkan tujuannya agar mengembangkan kualitas hidup pasien.

Layanan kefarmasian dipimpin apoteker yang memiliki izin serta kompeten dalam melakukan kontrol semua agenda layanan kefarmasian pada rumah sakit. Komposisi pegawai di UPT RSUD Nene Mallomo terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat kesehatan lainnya dan non medis. Untuk apoteker terdapat 12 orang yang diantaranya 9 orang PNS dan 3 orang Non PNS.

Sesuai dengan pedoman yang diatur pada Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 mengenai Standar Layanan Kefarmasian di Rumah Sakit, kegiatan kefarmasian terdiri dari:

a. Pengelolaan sediaan farmasi

Sediaan farmasi dikelola mulai pemilihan dan rancangan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengawasan, dan administrasi.

- Seleksi dan perencanaan adalah suatu rangkaian prosedur untuk memperoleh sediaan farmasi sesuai kebutuhan dan mengacu pada Fornas (Formularium Nasional) dan Formularium Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo yang merupakan daftar obat yang ditetapkan oleh direktur yang disahkan oleh tenaga medis. Untuk meningkatkan keselamatan dalam melakukan operasi tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan besar dan reaksi obat dimana tak diinginkan (ROTD), telah disusun strategi pengelolaan obat khususnya untuk obat-obatan dimana perlu untuk diwaspadai.

- Disetiap satelit layanan, penyimpanan obat-obatan, peralatan medis, serta bahan habis dipakai dilakukan sesuai akan kriteria farmasi, dimana berisi syarat keamanan serta stabilitas, kondisi higienis, kelembaban, cahaya, dan ventilasi.
- Untuk mempertahankan prinsip *First in First Out (FIFO)* serta *First Expired First Out (FEFO)*, bersama dengan sistem informasi manajemen yang kuat, alat kesehatan, farmasi, serta perbekalan kesehatan habis dipakai diatur berdasarkan kelas terapi atau menurut abjad. Pelabelan obat LASA.
- Rumah sakit pun menawarkan troli darurat yang dapat digunakan menyimpan obat-obatan darurat. Selama masih dalam pengawasan apoteker, *Emergency Trolley* ini tersedia di setiap bangsal perawatan.
- Distribusi adalah tindakan mendistribusikan/menyalurkan perbekalan kesehatan, peralatan, dan obat-obatan sebagai tanggapan atas resep tertentu dari dokter.
- Jika ada obat kadaluarsa, maka harus segera dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, Badan POM akan menarik produk farmasi yang tidak memenuhi standar (UPT RSUD Nene Mallomo, 2022).

b. Pelayanan Farmasi Klinis

Tugas layanan farmasi klinik meliputi pemberian obat, pencatatan riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, konseling, layanan informasi obat (PIO), kunjungan, PTO, MESO, serta penilaian pengobatan (EPO).

- Pemberian Obat

Penilaian akhir kesesuaian obat menggunakan resep perlu dilaksanakan sebelum diberikan pasien rawat jalan dan pasien rumah sakit. Apoteker membagikan obat-obatan sambil juga memberikan pendidikan dan konseling obat.

- Penelusuran Riwayat Penggunaan Obat dan Rekonsiliasi Obat

Proses penelusuran riwayat penggunaan obat pasien memerlukan pembelajaran tentang semua obat yang pernah digunakan atau sedang dikonsumsi pasien, serta alergi apa pun yang mungkin mereka miliki. Informasi ini dapat ditemukan melalui wawancara ataupun melalui data dari rekam medis ataupun catatan pemakaian obat pasien.

Untuk mencegah kesalahan farmasi termasuk duplikasi, obat tidak diberikan, kesalahan dosis, atau interaksi obat, rekonsiliasi obat yakni prosesi pencocokan instruksi obat melalui obat dimana sudah diterima pasien.

- Pelayanan Informasi Obat (PIO)

PIO adalah praktik penyampaian rekomendasi pengobatan yang tidak memihak, akurat, terkini, dan lengkap pada dokter, perawat, apoteker, dan petugas kesehatan yang lain dan kepada pasien serta pihak lainnya diluar rumah sakit agar mendorong penggunaan obat yang wajar.

- Konseling

Konseling obat adalah praktik apoteker yang memberikan pasien dan/atau keluarganya informasi atau rekomendasi mengenai perawatan obat. Dengan meminimalkan masalah terkait pengobatan dan meningkatkan efektivitas biaya, konseling berusaha untuk memaksimalkan manfaat terapeutik dan meningkatkan keamanan penggunaan obat.

- Visite

Pasien rawat inap dilihat oleh apoteker baik sendiri atau dalam kelompok dengan profesional kesehatan lainnya. Kunjungan dilakukan untuk segera mengevaluasi keadaan klinis pasien, melihat masalah terkait pengobatan dan mengawasi konsekuensi terapeutik dan yang tidak diinginkan dari pengobatan.

- Pemantauan Terapi Obat (PTO)

PTO adalah prosedur dimana memerlukan tindakan agar menjamin bahwa pasien menerima perawatan obat yang aman, efisien, dan masuk akal. Tugas PTO meliputi pemeriksaan pilihan obat, dosis,

teknik pemberian, respon terapeutik dan reaksi obat yang direncanakan, menawarkan saran untuk menyelesaikan masalah terkait obat dan mengawasi efisiensi dan efek negatif dari terapi obat.

- **Monitoring Efek Samping Obat (MESO)**

MESO adalah prosedur untuk melacak setiap reaksi pengobatan yang tidak menguntungkan pada dosis yang sering digunakan untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan pada manusia.

- **Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)**

EPO adalah program untuk mengevaluasi konsumsi obat secara subyektif serta statistik dengan cara terorganisir serta berkelanjutan. EPO berupaya mendapatkan pemahaman umum tentang tren konsumsi obat kontemporer (Mallomo, 2022).

8. *Pharmaceutical Care* Untuk Penggunaan Antibiotik

Meluasnya penyalahgunaan antibiotik, khususnya berkembangnya resistensi bakteri terhadap antibiotic menimbulkan sejumlah masalah dan ancaman bagi kesehatan dunia. Oleh karena itu, penting bagi seluruh tenaga kesehatan termasuk apoteker untuk ikut serta dalam upaya membatasi penyebaran kuman yang resisten terhadap antibiotik dengan menggunakan antibiotik secara bijak (Kementrian Kesehatan, 2011).

Terapi antibiotik mencakup berbagai layanan farmasi, mulai dari perencanaan hingga pemantauan pengobatan (Kementrian Kesehatan, 2011).

1. Pemilihan Dalam Rangka Perencanaan

Pemilihan jenis antibiotik yang digunakan di rumah sakit sesuai dengan formularium rumah sakit, aturan dan anjuran penggunaan antibiotik, pedoman diagnosis dan terapi, serta protokol terapi.

2. Perencanaan

Berdasarkan data epidemiologi penyakit, perencanaan dilakukan dengan melihat data rekam medis, data konsumsi masa lalu, dan perbekalan yang tersedia.

3. Pengadaan

Pencapaian strategi yang disepakati melalui penggunaan pembelian, rekonstitusi, pencampuran, pengemasan ulang, atau donasi dikenal sebagai pengadaan.

4. Penyimpanan

Penyimpanan antibiotik dalam sediaan lengkap dan formulasi yang direkonstitusi sesuai dengan persyaratan farmasi.

5. Pendistribusian

Resep individu merupakan cara yang digunakan untuk mendistribusikan antibiotik kepada pasien rawat jalan, sedangkan Unit Dose Dispensing (UDD) yang juga disertai dengan informasi farmakologis atau penyuluhan dari apoteker merupakan cara yang digunakan untuk memberikan antibiotik kepada pasien rawat inap.

6. Pengkajian Terapi Antibiotik

Untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah masalah yang terkait dengan antibiotik, tinjauan pengobatan antibiotik dapat dilakukan sebelum atau sesudah resep.

7. Peracikan

Untuk menghindari kontaminasi silang, antibiotik steril dan nonsteril diracik dengan mengikuti prosedur pembuatan obat yang baik (CPOB) dan menggunakan peralatan yang berbeda (khusus) dari peralatan peracikan non-antibiotik.

8. Pemberian

Pasien mendapatkan layanan konseling atau informasi selain pemberian antibiotik.

9. Penggunaan

Saat menggunakan antibiotik, pasien perlu memberikan perhatian persyaratan frekuensi, waktu, serta durasi rejimen pengobatan serta kondisi pasien.

10. Informasi Obat

Dokter dan perawat dapat belajar lebih banyak tentang antibiotik dari apoteker. Pemilihan, pedoman pemberian dosis, rekonstitusi, pengenceran/pencampuran antibiotik dengan larutan infus, dan penyimpanan antibiotik semuanya tercakup dalam informasi yang diberikan.

11. Konseling

Melalui konseling, pasien dapat lebih patuh dengan penggunaan antibiotiknya, resistensi bakteri dapat dihindari dan pasien serta keluarga dapat dibuat lebih sadar akan potensi efek samping dan respons pengobatan.

12. Pemantauan

Apoteker dapat memantau khasiat antibiotik sendiri atau bekerja sama dengan tim medis lainnya (ahli mikrobiologi, dokter, serta perawat).

Evaluasi pemakaian antibiotik dilakukan tujuan agar (Kementrian Kesehatan, 2011):

1. Memahami konsumsi serta jumlah pemakaian antibiotik rumah sakit
2. Memahami serta mengevaluasi kualitas pemakaian antibiotik rumah sakit
3. Sebagai dasar agar menjalankan survey

Penggunaan antibiotik dapat dinilai secara statistik atau subyektif. DDD per 100 hari rawat (DDD per 100 tempat tidur) dapat digunakan untuk memeriksa secara kuantitatif jenis serta jumlah antibiotik dipakai. Untuk penilaian kelayakan pemakaian antibiotik, salah satu cara evaluasi kualitatif adalah dengan metode gyssens.

- Penilaian Kuantitas Penggunaan Antibiotik

Jumlah keseluruhan antibiotik yang digunakan rumah sakit, dimana dihitung baik dengan cara retrospektif ataupun prospektif dari studi validasi, merupakan jumlah pemakaian antibiotik. ATC/DDD dapat

digunakan agar mengevaluasi penggunaan antibiotik secara retrospektif. Untuk indikasi dewasa tertentu, perkiraan dosis harian rata-rata antibiotik adalah DDD (Kementrian Kesehatan, 2011).

- **Penilaian Kualitas Penggunaan Antibiotik**

Evaluasi kualitas pemakaian antibiotik berupaya agar meningkatkan peraturan ataupun menciptakan inisiatif pedoman dimana lebih sesuai dengan kualitas pemakaian antibiotik. Setidaknya tiga peninjau harus secara prospektif mengevaluasi efektivitas penggunaan antibiotik menggunakan pendekatan gyssens (spesialis apoteker, infeksi, dokter dimana memberikan perawatan). Data dari Rekam Administrasi Antibiotik (RPA), catatan medis pasien, serta status klinis pasien digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan antibiotik (Kementrian Kesehatan, 2011).

B. Evaluasi Antibiotik Dengan Metode Gyssens

1. Definisi Metode Gyssens

Teknik gyssens adalah pendekatan kualitatif yang sering digunakan untuk menilai seberapa baik antibiotik diberikan dari berbagai sudut, termasuk indikasi dimana tepat, pasien tepat, obat tepat, dosis yang tepat, rute dan lama pemberian yang tepat, dan memperhatikan efek samping. Kualitas penggunaan antibiotik diukur dengan analisis mendalam dari rekam medik,

juga disebut metode gyssens. Metode gyssens tentu saja yakni metode yang paling lengkap agar menilai semua aspek terapi (Gyssens, 2005).

2. Kriteria Metode Gyssens

Untuk mengevaluasi kualitas peresepan obat antibiotik dengan kriteria gyssens dimana dikembangkan (Kunin et al 1973) telah digunakan di masa lalu. Penggunaan dikategorikan sebagai tepat, mungkin tepat, tidak sesuai sebab ada alternatif dimana lebih murah atau sama sekali tidak sesuai. Karena pembuatan kriteria agak spesifik, kriteria asli ini telah dimodifikasi oleh beberapa penulis. Mereka telah mengadaptasi atau memperluas kriteria ini agar dapat menilai parameter tertentu misalnya dosis, interval dosis, cara pemberian, memperoleh konsentrasi serum yang diperlukan untuk pemantauan, pemantauan reaksi alergi, spektrum yang luas, perbedaan antara pengobatan empiris atau definitif, waktu pemberian profilaksis bedah dan pemberian profilaksis pasca operasi (Gyssens, 2005).

3. Kelebihan dan Kekurangan Metode Gyssens

- Kelebihan Metode Gyssens (Gyssens, 2005):
 - a. Kelebihan dari metode ini yakni lebih terperinci serta teliti atau jelas.
 - b. Penggunaan antibiotik harus lebih kualitatif untuk menghindari munculnya resistensi antibiotik.
 - c. Manfaat menggunakan teknik ini adalah dapat meninjau setiap elemen antibiotik resep, termasuk penilaian resep dan alternatif yang lebih efisien, kurang berbahaya, lebih murah, dan memiliki spektrum yang

lebih kecil. Selain itu, evaluasi dilakukan pada terapi, dosis, interval, metode pemberian, dan waktu pemberian.

- Kekurangan Metode Gyssens (Gyssens, 2005)

Kekurangan dari metode gyssens adalah tidak dapat menentukan apakah pasien benar-benar menggunakan lebih sedikit atau lebih banyak antibiotik daripada yang ditunjukkan dalam rekam medis antibiotik daripada yang ditunjukkan dalam rekam medis mereka.

4. Algoritma Metode Gyssens


Berdasarkan kriteria asli Kunin, telah di kembangkan pada tahun 1972 algoritma memfasilitasi klasifikasi resep diberbagai kategori pemakaian dimana tidak sesuai. Algoritma mengevaluasi pada tiap parameter penting dimana mengenai resep obat antibiotik. Sejak tahun 1996, algoritma telah dimodifikasi untuk memasukkan sebagian besar kategori (Gambar 1. Algoritma evaluasi terapi antibiotik).

Untuk mendapatkan evaluasi yang tepat, rangkaian pertanyaan pada (tabel 1. Kriteria evaluasi kualitas terapi antibiotik) harus ditanyakan didalam urutan dimana tepat hingga tidak ada parameter penting dimana terlewat. Pertanyaan pada algoritma diklasifikasi didalam beberapa golongan untuk menyusun dan mempercepat proses evaluasi. Dengan memanfaatkan algoritma, para ahli dapat mengkategorikan kerasionalan resep individu. Perawatan pasien mungkin tidak merata untuk beberapa penyebab sekaligus dan termasuk didalam lebih dari 1 kategori. Sehingga, baik terapi definitif

ataupun empiris bisa dievaluasi ketika temuan uji mikrobiologi diketahui. Algoritme dibaca melalui atas menuju bawah agar menilai tiap parameter relevan selama prosesi evaluasi (Gyssens, 2005).



Gambar 1. Algoritma evaluasi terapi antibiotik (Gyssens, 2005)



Tabel 1. Kriteria Evaluasi Kualitas Terapi Antibiotik (Gyssens, 2005)

Kategori 0	Pemakaian antibiotik sesuai/rasional
Kategori I	Pemakaian antibiotik tak sesuai waktu
Kategori IIA	Pemakaian anibiotik tak sesuai dosis
Kategori IIB	Pemkaian antibiotik tak sesuai interval pemberian
Kategori IIC	Pemakaian antibiotik tak sesuai rute/cara pemberian
Kategori IIIA	Pemakaian antibiotik amat lama
Kategori IIIB	Pemakaian antibiotik amat singkat
Kategori IVA	Terdapat antibiotik lain dimana lebih efektif
Kategori IVB	Adanya antibiotik lain dimana kurang lebih aman/toksik
Kategori IVC	Adanya antibiotik lain dimana lebih murah
Kategori IVD	Adanya antibiotik lain dimana spektrum lebih sempit
Kategori V	Tak adanya indikasi pemakaian antibiotik
Kategori VI	Data rekam medik tidak bisa dievaluasi serta tidak lengkap

Menganalisis semua data yang tersedia adalah langkah untuk evaluasi antibiotik dimulai. Cara mengevaluasi rasionalitas penggunaan antibiotik berdasarkan kategori gyssens (Gyssens, 2005):

1. Bila data tidak lengkap, berhenti di kategori VI

Data rekam medis yang tak dapat dioperasi atau halaman yang hilang dan menghalangi evaluasi disebut sebagai data yang tidak lengkap. Jika pemeriksaan sudah dirancang untuk mendukung diagnosis, tidak diperlukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium karena

mungkin mahal. Mulai pemeriksaan fisik serta anamnesis bisa ditegakkan diagnosis kerja klinis. Apakah ada infeksi yang memerlukan penggunaan antibiotik, mengingat datanya lengkap?

2. Bila tidak ada indikasi pemberian antibiotik, berhenti di kategori V

Lanjutan pertanyaan berikut jika antibiotik direkomendasikan. Apakah pemilihan antibiotik sudah sesuai?

3. Berhenti di kategori IVa jika adanya pilihan antibiotik alternatif dimana lebih kuat. Jika tidak, teruskan membaca pertanyaan di bawah ini. Apakah ada opsi yang tidak terlalu berbahaya?

4. Berhenti pada kategori IVb jika tersedia pilihan antibiotik dimana kurang berbahaya.

Jika tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah terdapat opsi lebih murah?

5. Apabila terdapat pilihan antibiotik lebih terjangkau, berhentilah di IVc.

Apabila tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah terdapat opsi cakupannya terbatas?

6. Hentikan pada kategori IVd apabila terdapat pilihan antibiotik cakupan yang terbatas.

Lanjutkan ke bawah dengan pertanyaan, "Apakah durasi antibiotik yang diberikan terlalu lama?" jika tidak ada opsi yang lebih panjang.

7. Berhenti pada kategori IIIa jika pemberian antibiotik terlalu lama. Jika tidak, apakah durasi pemberian antibiotik terlalu pendek?
8. Berhenti di kategori IIIb jika durasi antibiotik terlalu singkat.
Jika tidak, jawablah pertanyaan berikut. Apakah antibiotik diberikan dengan dosis yang tepat?
9. Bila dosis pemberian antibiotik tidak tepat, berhenti di kategori IIa.
Jika dosisnya akurat, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya: Apakah waktu antara dosis antibiotik akurat?
10. Berhenti di kategori IIb jika interval pemberian antibiotik tidak tepat.
Lanjutkan menjawab pertanyaan berikut jika intervalnya akurat.
11. Berhenti di kategori IIc jika rute pemberian antibiotik tidak tepat.
Lanjutkan ke kotak berikutnya jika rutanya akurat.
12. Antibiotik diklasifikasikan sebagai kategori I jika tidak termasuk dalam kategori I hingga VI.

C. *Pneumonia*

1. Definisi Pneumonia

Penyakit menular parenkim paru-paru disebut pneumonia bisa diakibatkan berbagai mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, parasite, serta virus. Jaringan paru-paru menjadi meradang akibat infeksi ini, dan eksudat menumpuk di sana. Pneumonia selanjutnya digambarkan sebagai peradangan parenkim paru distal ke bronkiolus terminal, dimana meliputi bronkiolus

pernapasan serta alveoli dan menghasilkan konsolidasi jaringan paru (Dahlan, 2017) .

Pneumonia yakni infeksi parenkim paru dimana diakibatkan patogen, yakni bakteri, mikobakteri, virus, serta jamur. Ada empat jenis pneumonia: pneumonia aspirasi, pneumonia nosokomial dimana didapatkan pada rumah sakit, pneumonia pada pejamu yang sistem imunnya terganggu. Jika seorang pasien memiliki penyakit dasar yang terus-menerus, penyakit akut yang parah, sistem kekebalan yang tertekan akibat penyakit atau pengobatan, tidak dapat bergerak, atau memiliki kondisi lain yang memengaruhi proses perlindungan paru-paru yang biasa, mereka berisiko terkena pneumonia. Selain itu, pneumonia merupakan perhatian utama bagi individu lanjut usia (Puspitasari, 2019).

Menurut (Zairinayati, 2022), Infeksi akut pada jaringan paru-paru (alveoli) adalah pneumonia. Pneumonia anak selalu muncul bersamaan terhadap proses bronkial menular akut. Pernapasan cepat dan pendek karena pneumonia akut adalah salah satu gejala penyakit ini. Batas pernapasan didefinisikan sebagai laju pernapasan 60 kali atau lebih per menit pada bayi di bawah 2 bulan, 50 kali per menit pada bayi antara 2 bulan dan 1 tahun, dan 40 kali per menit pada bayi antara 1 tahun dan sekitar 5 tahun.

2. Klasifikasi Pneumonia

Klasifikasi pneumonia menurut (Puspitasari, 2019):

1) Melalui klinis serta epidemiologi:

- a. Pneumonia didapat masyarakat
 - b. Pneumonia nosokomial
 - c. Pneumonia aspirasi
 - d. Pneumonia terhadap Pasien *Immunocompromised*
- 2) Melalui bakteri penyebab:
- a. Pneumonia normal/bakteri bisa jadi ada pada semua usia. Beberapa bakteri, seperti *Staphylococcus* pada individu dengan infeksi pasca-influenza dan *Klebsiella* pada pecandu alkohol, cenderung menyerang mereka yang rentan.
 - b. Pneumonia atopik penyebabnya *Legionella*, *Mycoplasma*, serta *Chlamydia*.
 - c. Pneumonia virus
 - d. Infeksi sekunder, termasuk pneumonia jamur, selalu terjadi. Predileksi, utamanya terhadap individu dengan gangguan kekebalan.
- 3) Berdasarkan predileksi infeksi:
- a. Pneumonia lobus. Meskipun jarang terjadi pada bayi baru lahir dan orang tua, pneumonia bakterial sering terjadi. Pneumonia satu lobus atau satu segmen dapat berkembang sebagai akibat dari penyumbatan bronkial, seperti ketika benda asing atau aktivitas kanker terhirup.
 - b. Bronkopneumonia. ditandai dengan area lapang paru yang telah diinvasi dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Orang tua serta bayi jarang dikaitkan obstruksi bronkus.

c. Pneumonia interstisial.

3. Etiologi

1) Pneumonia diklasifikasikan menjadi jenis kuman dimana menyebabkannya serta terinfeksi (Puspitasari, 2019):

a. Pneumonia dimana bisa di masyarakat

Jenis pneumonia yang paling khas adalah pneumonia didapatkan dari masyarakat. Jauh dari fasilitas medis serta rumah sakit lainnya. Ini memungkinkan akibat pneumonia. Itu terjadi jauh dari rumah sakit atau fasilitas medis lainnya. Ini mungkin akibat dari:

- Mikroba. Bakteri *Streptococcus pneumoniae* adalah penyebab pneumonia yang sering. Pneumonia jenis ini bisa berkembang dengan sendirinya ataupun mengikuti flu ataupun pilek. Hal ini bisa menyebabkan pneumonia lobar, kelainan yang hanya menyerang satu lobus paru-paru.
- Mikroba patogen. Pneumonia juga dapat disebabkan oleh *Mycoplasma pneumoniae*. Gejala yang kurang parah dibandingkan dengan jenis pneumonia lainnya.
- Jamur. Orang yang memiliki masalah kesehatan kronis, sistem kekebalan tubuh lemah, serta mereka dimana sudah menghirup organisme didalam jumlah signifikan lebih mungkin terkena pneumonia jenis ini. Tergantung pada daerahnya, jamur membuat mungkin didapatkan pada kotoran burung ataupun tanah.

- Virus. Flu serta pneumonia yakni penyakit dimana bisa diakibatkan oleh virus tertentu. Penyebab sering pneumonia terhadap anak dibawah 5 tahun adalah virus.

b. Pneumonia yang didapat di rumah sakit

Saat menerima pengobatan untuk kondisi lain, beberapa pasien mengalami pneumonia. Karena bakteri yang menyebabkan pneumonia yang didapat di rumah sakit mungkin lebih kebal terhadap obat-obatan dan karena pasien yang mengidapnya sudah sakit, itu bisa berbahaya. Pneumonia jenis ini lebih mungkin menyerang mereka dimana memakai ventilator mekanis yang selalu dipakai pada unit perawatan yang intensif.

c. Pneumonia saat mendapat perawatan kesehatan

Penyakit bakteri yang dikenal sebagai "pneumonia yang didapat dari layanan kesehatan" memengaruhi pasien yang menjalani perawatan di klinik rawat jalan seperti fasilitas dialisis ginjal atau tinggal di rumah perawatan jangka panjang. Pneumonia didapatkan melalui layanan kesehatan, termasuk pneumonia dimana bisa di rumah sakit, bisa membuat kuman lebih resisten pada pengobatan.

d. Pneumonia aspirasi

Menghirup cairan, muntahan, makanan, ataupun air liur dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Apabila memengaruhi refleks muntah yang biasa, misalnya masalah menelan, cedera otak,

komsumsi alkohol ataupun obat-obatan terlarang, bentuk pneumonia ini lebih mungkin terjadi.

- 2) Pneumonia pada usia lanjut disebabkan karena infeksi kuman yang menyerang paru-paru (seperti halnya batuk kronis). Kuman penyebab pneumonia adalah *Streptococcus pneumoniae* , *Haemophilus influenza*, *Staphylococcus aerus* batang gram negatif. Karena daya tahan dan respons tubuh terhadap serangan kuman sudah tidak optimal, setiap saat bisa saja kondisi tubuh memburuk dengan cepat. Misalnya, Keseimbangan elektrolit (Na, K, dan klorida) dan berbagai penyakit metabolik sering terjadi. Gangguan pasokan udara yang cepat juga dapat mengakibatkan kekurangan oksigen dan kesulitan bernapas pada lansia. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap pneumonia karena berbagai perubahan terkait penuaan pada kapasitas cadangan paru, elastisitas, fleksibilitas, dan ventilasi yang mengakibatkan hilangnya refleks batuk dan kolapsnya saluran udara. Risiko pneumonia berlipat ganda dalam kondisi termasuk mabuk, penyakit jantung, dan pengobatan immunosupresif yang memengaruhi refleks tumpahan pelindung dan transportasi silia. Faktor penting yang berkontribusi terhadap pneumonia pada lansia adalah aspirasi flora orofaringeal. Penyebab utama kematian terkait infeksi pada lansia adalah pneumonia (Dwi Sarbini S. Z., 2019).

- 3) Beberapa penyebab terjadinya pneumonia pada anak adalah :
- a. Bayi baru lahir prematur dengan berat kurang dari 2500 gram lebih mungkin meninggal dalam beberapa hari atau minggu pertama kehidupan.
 - b. Pemberian ASI yang tidak tercukupi karena air susu ibu merupakan sumber gizi dimana sesuai kebutuhan bayi serta makanan dimana paling sempurna bagi bayi mau dari kuantitas ataupun kualitas.
 - c. Terjadinya malnutrisi (kekurangan gizi) dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - d. Tak lengkapnya imunisasi campak yang diberikan.
 - e. Bayi risiko pneumonia meningkat 4,1 kali lipat bagi mereka yang tidak mendapat vitamin A lengkap dan pemberian makan terlalu dini pada bayi mengakibatkan bayi terkena pneumonia.
 - f. Faktor orang tua seperti pendidikan orang tua secara tidak langsung mempengaruhi pemahaman ibu dan kerentanan terhadap pneumonia.
 - g. Faktor sosial ekonomi berhubungan dengan kejadian penyakit pneumonia diukur dari besarnya rumah tangga, banyaknya penghuni dalam rumah, banyak kamar. Kelompok sosial ekonomi rendah biasanya mengkonsumsi makanan padat gizi yang kurang, membuat mereka lebih rentan terhadap pneumonia.
 - h. Faktor lingkungan seperti asap rokok jika terhirup dapat mempengaruhi kejadian penyakit pneumonia 1,27 kali lebih besar,

perokok dalam rumah bersiko 2,9 kali lebih besar untuk terkena pneumonia. Kepadatan hunian minimal 10 m²/orang, bila kepadatan hunian tinggi mempengaruhi pertukaran udara dalam rumah (Putri S. M., 2019).

- 4) Penyebab pneumonia pada orang dewasa diantaranya adalah virus (virus influenza, virus parainfluenza dan virus adena), bakteri (streptokokus, pneumokokus, stafilokokus, hemophilus dan influenza), jamur, protozoa dan bahan kimia (Khotimah I. F., 2022).

4. Tanda dan Gejala

Demam, takipnea, takikardia, batuk berdahak, serta perubahan jumlah dan komposisi sputum merupakan tanda-tanda pneumonia yang sering dijumpai. Pasien juga akan mengalami rasa tidak nyaman di dada yang terasa seperti ditusuk pisau, inspirasi yang menetap, dan pembesaran dada (Puspitasari, 2019).

Tanda dan gejala pneumonia terhadap anak serta bayi tergantung mengenai beratnya infeksi, umumnya yakni berikut (Yuli Lestari I. S., 2022):

- a. Gejala infeksi umum, yakni demam, malaise, sakit kepala, gelisah, turunnya nafsu makan, mengeluarkan gastrointestinal misalnya muntah, mual, ataupun diare, terkadang didapatkan gejala infeksi ekstrapulmoner.
- b. Gejala gangguan respiratori, yakni sesak napas, batuk, takipnea, retraksi dada, air hunger, napas cuping hidung, sianosis serta merintih.

Tanda serta gejala pneumonia pada lansia akan bermanifestasi sebagai penurunan nafsu makan yang menyerupai dispepsia. Keluhan lesu dan lemah akan mendominasi bersamaan dengan kurangnya minat. Keadaan selanjutnya mungkin melihat penurunan kapasitas pasien untuk melakukan tugas sehari-hari, menyebabkan imobilitas, dan akhirnya keadaan kebingungan akut. Ada juga yang jatuh atau instabilitas postural (sering tersandung). Batuk, demam, dan sesak napas biasanya bukan tanda-tanda pneumonia pada lansia (Iwa, 2022).

Tanda dan gejala pneumonia pada orang dewasa yakni menggigil, demam, berkeringat, batuk, sakit dada sebab sesak, pleuritis, pasien lebih suka baring dengan lutut tertekuk sebab nyeri dada (Khotimah I. F., 2022).

5. Faktor risiko

Faktor risiko pneumonia menurut (Puspitasari, 2019):

- 1) Siapapun bisa terkena pneumonia, namun kelompok yang paling rentan adalah mereka yang berusia diatas 65 tahun dan anak-anak di bawah usia 2 tahun.
- 2) Pergi ke rumah sakit untuk perawatan. Jika seorang pasien dirawat di unit perawatan intensif, terutama jika dia menggunakan ventilator, kemungkinan tertular pneumonia meningkat.
- 3) Memiliki penyakit jangka panjang. Jika seseorang menderita asma, penyakit jantung, atau PPOK, mereka jauh lebih rentan terinfeksi pneumonia.

- 4) Merokok. Pertahanan alami tubuh terhadap virus dan bakteri penyebab pneumonia adalah merokok.
- 5) Kelemahan sistem imun. Pneumonia juga dapat terjadi pada penderita HIV/AIDS dimana menjalani transplantasi organ, menjalani kemoterapi jangka panjang, ataupun yang menggunakan steroid.

6. Patogenesis

Tiga elemen, termasuk kondisi pasien (imunitas), mikroorganisme yang menyerang pasien, dan interaksinya dengan lingkungan, semuanya berperan dalam patogenesis pneumonia. Pertumbuhan mikroorganisme tidak akan terjadi pada kondisi paru-paru yang sehat, kondisi diakibatkan terdapat sistem pertahanan paru. Ketika bakteri hadir pada paru-paru, sistem kekebalan, lingkungan, dan mikroba tidak seimbang yang memungkinkan kuman tumbuh dan menyebabkan penyakit.

Terdapat cara mikroorganisme menggapai permukaan, yaitu :

- 1) Inokasi langsung
- 2) Penyebaran dari darah
- 3) Inhalasi bahan aerosol
- 4) Kolonisasi pada permukaan mukosa

Metode yang paling umum di antara keempatnya adalah kolonisasi. Virus, mikroba yang tidak biasa, mikobakteri, dan jamur semuanya menghirup. Sebagian besar bakteri dengan diameter aerodinamis 0,5 hingga

2,0 mikron bisa memasuki bronkus terminal ataupun alveoli serta menyebabkan penyakit di sana. Sebagian besar infeksi paru-paru dimulai dengan kolonisasi saluran pernapasan bagian atas (hidung, orofaring) yang mengarah ke aspirasi ke saluran pernapasan bagian bawah dan inokulasi kuman. Selain 50% orang normal yang menyedot sekret orofaring saat mereka tidur, pecandu alkohol dan obat-obatan juga mengalami kondisi ini (abuse obat).

Aspirasi volume kecil sekresi orofaringeal (0,001-1,1 ml) bisa menyebabkan titer inokulum bakteri dan pneumonia dimana signifikan karena konsentrasi bakteri sekresi orofaring yang sangat tinggi yaitu 10^8 - 10^{10} /ml (Askar, 2020).

7. Patofisiologi

Eksudat (cairan inflamasi ekstrasvaskular), produk sampingan dari respons inflamasi, dapat berkembang di alveoli dan menghalangi aliran oksigen dan karbon dioksida. Penyakit saluran napas reaktif pada pasien berpotensi menyebabkan bronkospasme. Jenis bronkopneumonia yang paling khas memiliki distribusi yang homogen dan menyebar dari bronkus ke parenkim paru di sekitarnya. Pneumonia lobar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan infeksi yang mempengaruhi sebagian besar dari satu atau lebih lobus. Banyak agen mikrobiologi di berbagai lingkungan dapat menyebabkan pneumonia. Bakteri, jamur, dan virus gram negatif yang paling

umum pada anak-anak adalah Klebsiella, spesies Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Staphylococcus pneumoniae (Puspitasari, 2019).

8. Tatalaksana Pneumonia

Pemberian obat-obatan khusus untuk mengobati bakteri infeksi pneumonia tertentu merupakan metode utama pengobatan pneumonia. Sebelum antibiotik definitif diberikan, antibiotik empiris dan terapi suportif harus diberikan untuk mempertahankan keadaan pasien. Tujuan pemberian antibiotik adalah untuk menawarkan terapi kausal terhadap bakteri penyebab penyakit (Dahlan, 2017).

a. Tatalaksana pneumonia pada anak (WHO, 2014)

Amoksisilin oral dengan dosis minimal 40 mg/kg/dosis dua kali sehari (80 mg/kg/hari) selama lima hari biasanya harus diberikan kepada anak-anak dengan pneumonia pernapasan cepat yang tidak menunjukkan sesak dada atau gejala distress lainnya. Amoksisilin diberikan selama tiga hari di daerah dengan kejadian HIV rendah. Anak-anak dengan pneumonia pernapasan cepat harus memiliki pilihan untuk dirujuk ke institusi di mana terapi lini kedua cocok jika pengobatan amoksisilin lini pertama mereka gagal.

1. Pneumonia tarikan dada pada anak usia 2-59 bulan harus diobati dengan amoksisilin oral dengan dosis minimal 40 mg/kg dua kali sehari, atau 80 mg/kg sehari selama lima hari.

2. Sebagai terapi lini pertama, ampicilin parenteral (atau penisilin) dan gentamisin harus diberikan kepada anak usia 2-59 bulan yang menderita pneumonia berat. Setiap enam jam selama sedikitnya lima hari, berikan ampicilin 50 mg/kg atau benzil penisilin 50 unit per kg secara intravena (IM/IV). 7,5 mg.kg gentamisin diberikan IM / IV sekali sehari selama setidaknya lima hari. Anak-anak dengan pneumonia berat yang tidak menanggapi terapi lini pertama harus mendapatkan ceftriaxone sebagai pengobatan lini kedua.
 3. Untuk bayi baru lahir dengan infeksi HIV dan anak-anak di bawah usia lima tahun yang menderita pneumonia berat atau sulit diobati, rejimen antibiotik lini pertama disarankan untuk memasukkan amoksisilin (atau penisilin jika ampicilin tidak tersedia) bersama dengan gentamisin atau ceftriaxone.
 4. Ceftriaxone disarankan sebagai pengobatan lini kedua untuk bayi dan anak yang terinfeksi HIV dengan pneumonia berat atau pneumonia penarikan dada yang tidak menanggapi terapi ampicilin atau penisilin + gentamisin.
- b. Tatalaksana pneumonia dewasa (Society, 2019)
1. Rawat Jalan
 - Disarankan untuk pasien rawat jalan dewasa yang sehat tanpa penyakit penyerta atau faktor risiko infeksi yang kebal terhadap antibiotik:
 - a) amoksisilin 1 g tiga kali sehari

- b) Doksisisiklin 100 mg dua kali sehari
 - c) Hanya di lokasi di mana terdapat resistensi pneumokokus terhadap makrolida, makrolida (azithromycin 500 mg pada hari pertama, 250 mg setiap hari, clarithromycin 500 mg dua kali sehari, atau clarithromycin extended release 1.000 mg setiap hari) digunakan.
- Disarankan untuk pasien dewasa rawat jalan dengan penyakit penyerta seperti diabetes melitus, alkoholisme, kanker, asplenia, jantung kronis, paru-paru, hati, atau penyakit ginjal:
- a) Terapi kombinasi:
 - Dosis amoksisilin/klavulanat 500 mg/125 mg tiga kali sehari, 875 mg/125 mg dua kali sehari, 2.000 mg/125 mg dua kali sehari, atau sefalosporin (200 mg/hari atau 500 mg/hari cefpodoxime) setiap hari semuanya diterima;
 - Makrolida (azitromisin 500 mg dihari pertama selanjutnya 250 mg tiap hari, klaritromisin)
 - Doksisisiklin 100 mg dua kali sehari (rekomendasi bersyarat, kualitas bukti rendah untuk terapi kombinasi);
 - b) Monoterapi:
 - Fluoroquinolones pernapasan (levofloxacin 750 mg tiap hari, moxifloxacin 400 mg tiap hari, ataupun gemifloxacin 320 mg tiap hari) (rekomendasi kuat, kualitas bukti moderat).

2. Rawat Inap

Pada orang pneumonia dewasa yang tidak parah, direkomendasikan:

- a) B-laktam dan makrolida dalam kombinasi (1,5–3 g ampisilin sulbaktam setiap 6 jam, 1-2 g cefotaxime setiap 8 jam, 1-2 g ceftriaxone setiap hari, atau 600 mg ceftaroline setiap 12 jam) (azitromisin 500 mg setiap hari atau klaritromisin 500 mg dua kali sehari)
- b) Monoterapi inhalasi fluorokuinolon (levofloxacin 750 mg setiap hari, moxifloxacin 400 mg setiap hari).
- c) Terapi kombinasi dengan b-laktam dan doksisisiklin 100 mg dua kali sehari (ampisilin-sulbaktam, cefotaxime, ceftaroline, atau ceftriaxone, dosis seperti di atas) merupakan pilihan ketiga bagi penderita CAP yang memiliki kontraindikasi terhadap makrolida dan fluorokuinolon.

c. Penatalaksanaan medis menurut (Puspitasari, 2019) sebagai berikut:

- 1) Antibiotik tergantung pada temuan pewarnaan gram dan dosis antibiotik yang direkomendasikan (pola resistensi, faktor risiko, etiologi harus dipertimbangkan). Perawatan kombinasi adalah pilihan lain.
- 2) Hidrasi, antipiretik, obat antitusif, antihistamin, atau dekongestan hidung adalah contoh perawatan suportif.
- 3) Istirahat di tempat tidur disarankan sampai infeksi mulai membaik.

- 4) Perawatan untuk hipoksemia melibatkan perawatan oksigen.
- 5) Oksigenasi suportif meliputi penggunaan pernapasan mekanis, intubasi endotrakeal, dan pengiriman oksigen fraksional.
- 6) Jika diperlukan, obati sepsis, syok, atelektasis, efusi pleura, atau gagal napas.
- 7) Imunisasi pneumokokus disarankan untuk orang yang memiliki risiko tinggi terkena CAP.

D. Antibiotik

1. Definisi

Antibiotik yakni bahan kimia dimana dibuat bakteri serta jamur dimana mempunyai kemampuan untuk membasmi ataupun menghentikan perkembangan mikroorganisme sekaligus memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Golongan ini juga mencakup semua bahan kimia sintetis yang memiliki aktivitas antibakteri dan turunan semisintetiknya (Rahardja D. T., 2015).

Antibiotik yakni suatu obat dimana digunakan untuk membunuh atau menghambat/menginhibisi pertumbuhan bakteri. Antibiotik bisa didapatkan pada beberapa bentuk serta dan penggunaannya bisa melalui berbagai jalur pemberian seperti secara topikal, oral ataupun intravena. Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan struktur molekul sehingga mekanisme kerja didapat dari model struktur tersebut. Selain itu, antibiotik juga dibagi

berdasarkan spektrum aktivitas terhadap bakteri gram negative atau gram positif. Perbedaan pada tingkat kepekaan mikroba serta banyaknya antibiotik jenis baru dapat menyebabkan kesulitan bagi klinisi dalam mendapat antibiotik dimana sesuai agar penanganan penyakit infeksi. Hal ini dimana memicu terjadinya resistensi (Sunandar Ihsan, 2022).

Pada umumnya antibiotik Jamur ditumbuhkan dalam tangki yang cukup besar dengan nutrisi tertentu setelah disiapkan secara mikrobiologis. Untuk mempercepat perkembangan jamur dan meningkatkan sintesis antibiotik, oksigen atau udara steril disuntikkan ke dalam larutan biakan. Antibiotik ini diekstraksi dari cairan kultur, dimurnikan, dan aktivitasnya dipastikan.

- Antibiotika semisintetik, Bahan kimia inovatif tertentu diintegrasikan ke dalam antibiotik fundamental jika diberikan ke persemaian (substrat kultur). Bahan kimia sintetik adalah apa yang diproduksi, seperti penisilin-V.
- Sekarang diproduksi secara kimiawi, antibiotik sintetik tidak lagi diproduksi secara biosintetik. Kloramfenikol, misalnya (Rahardja D. T., 2015).

2. Mekanisme Kerja Antibiotik

Mekanisme kerja seperti dalam kasus kloramfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, dan linkomisin, adalah penekanan sintesis protein. Selain itu, antibiotik tertentu (seperti penisilin dan sefalosporin) memengaruhi membran sel atau dinding sel (polimiksin, poliena, dan imidazol). Sebagian

besar virus kecil kebal terhadap antibiotik, mungkin karena mereka tidak memiliki proses metabolisme sendiri dan hanya bergantung pada metabolisme inangnya (Rahardja D. T., 2015).

3. Golongan Antibiotik

Berdasarkan situs aksi, rentang aktivitas, dan struktur kimiawi antibiotik, berbagai kategori dapat dibuat (Rahmawati, 2019).

- a. Penggolongan antibiotik berdasarkan tempat kerjanya

Tabel 2. Penggolongan antibiotik berdasarkan atas tempat kerja (Rahmawati, 2019)

Tempat kerja	Proses yang dihambat	Antibiotika	Tipe Aktivitas
Dinding sel	Sintesis mukopeptida	Basitrasin	Bakteriosid
	Pengikatan silang dinding sel	Sefalosporin	Bakteriosid
	Sintesis peptida dinding sel	Sikloserina	Bakteriosid
	Pengikatan silang dinding sel	Penisilin	Bakteriosid
Membran sel	Sintesis mukopeptida	Vankomisin	Bakteriosid
	Fungsi membran sitoplasma	Amfoterisin B	Fungisid
	Sda	Nistatin	Fungisid
Ribosoma 50 S sub unit	Integritas membran	Polimiksin	Bakteriosid
	Sintesis protein	Kloramfenikol	Bakteriostatik
Ribosoma 30 S sub unit	Sda	Eritromisin	Sda
	Sda	Linkomisin	Sda
	Sintesis protein	Aminoglikosida	Bakteriosid
Asam nukleat	Sintesis protein	Tetrasiklin	Bakteriostatik
	Sintesis DNA dan mRNA	Aktinomisin	Fungisid
	Sda	Griseofulvin	Fungisid

DNA dan atau RNA	Sintesis DNA Sintesis mRNA	Mintomisin C Rifampin	Fungisid Bakteriosid
------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------

b. Penggolongan antibiotik mengenai spektrum aktivitasnya bisa terbagi beberapa bagian, yakni:

- 1) Antibiotik spektrum luas yang bekerja melawan bakteri gram positif dan gram negatif.

Turunan tetrasiklin dan amfenikol, rifampisin, beberapa turunan penisilin (termasuk ampisilin, amoksisilin, bacampin, karbenisilin, hetacillin, dan lain-lain), turunan aminoglikosida, turunan makrolida, dan sebagian besar turunan sefalosporin.

- 2) Antibiotik dengan dominasi tindakan yang lebih besar terhadap bakteri gram positif.

Contohnya termasuk eritromisin, benzil penisilin, sebagian besar turunan penisilin, kloksasilin, prokain penisilin G, dan beberapa turunan sefalosporin.

- 3) Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negative.

Sebagai contohnya adalah kolistin, polimiksin B sulfat dan sulfomisin.

- 4) Antibiotik yang aktivitasnya dominan pada *Mycobacteriae*.

Sebagai contoh adalah streptomisin, kanamisin, sikloserin, vimisin dan lain-lain.

5) Antibiotik yang aktif terhadap jamur.

Sebagai contoh adalah grisofulvin, antibiotik polien (nistatin dan amfoterisin B).

6) Antibiotik yang aktif terhadap neoplasma (anti kanker).

Contohnya adalah aktinomisin, bleomisin, mitomisin, mitramisin dan lain-lain.

c. Berdasarkan struktur kimianya antibiotik dibagi menjadi 10 kelompok yaitu:

- 1) Antibiotik beta laktam (turunan penisilin, sefalosporin dan beta laktam non klasik)
- 2) Turunan amfenikol
- 3) Turunan tetrasiklin
- 4) Aminoglikosida
- 5) Antibiotik makrolida
- 6) Antibiotik polipeptida
- 7) Antibiotik linkosamida
- 8) Antibiotik polien
- 9) Antibiotik ansamisin
- 10) Antibiotik antrasiklin

4. Resistensi Antibiotik

Ketika seseorang memiliki resistensi antimikroba, penyakit yang

disebabkan oleh jamur, bakteri, parasit, atau virus tidak dapat diobati dengan obat antimikroba sesuai dosis yang dianjurkan. Resistensi antibiotik, yang memiliki fokus yang lebih sempit daripada resistensi antimikroba dan menyangkut kapasitas obat antibakteri untuk mengobati infeksi bakteri, adalah hasil dari resistensi antimikroba. Obat antibiotik yang seharusnya hanya digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri, sebenarnya digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus dan jamur karena penggunaan antibiotik yang luas dalam mengobati gangguan infeksi (Muntasir, 2021).

Kapasitas bakteri untuk menangkal dan mengurangi kemanjuran antibiotik dikenal sebagai resistensi. Beberapa hal dapat menyebabkan hal tersebut, antara lain (Muntasir, 2021):

- 1) Menggunakan enzim yang dihasilkan untuk menghancurkan antibiotik
- 2) Memodifikasi reseptor untuk titik penangkapan antibiotik
- 3) Mengubah target fisika-kimia antibiotik dalam sel bakteri.
- 4) Dinding sel bakteri telah mengalami modifikasi yang mencegah penetrasi antibiotik ke dalamnya.
- 5) Antibiotik memasuki sel bakteri, tetapi segera keluar dari sel berkat sistem transpor aktif di luar sel.

5. Prinsip Penggunaan Antibiotik Bijak

Penggunaan antibiotik harus hati-hati untuk pencegahan munculnya

resistensi antimikroba serta mengurangi pemakaian antibiotik, dimana akhirnya dapat menurunkan biaya perawatan pasien, mempersingkat lama rawat inap, menghemat biaya rumah sakit, dan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Perlawanan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi dapat diperlambat. Berikut panduan pemakaian antibiotik dengan bijak (Muntasir, 2021):

- a. Gunakan antibiotik yang tepat, yaitu yang memiliki indikasi yang ketat, spektrum yang terbatas, serta dosis, interval, dan lama pengobatan yang tepat.
- b. Membatasi pemakaian antibiotik dan menekankan pemakaian antibiotik lini pertama merupakan dua karakteristik dari kebijakan penggunaan antibiotik.
- c. Penerapan pedoman penggunaan antibiotik, pembatasan penggunaan antibiotik, dan persetujuan penggunaan obat tertentu adalah semua cara untuk mengontrol penggunaan antibiotik (antibiotik cadangan).
- d. Langkah pertama dalam menetapkan alasan yang tegas untuk penggunaan antibiotik adalah membuktikan adanya kondisi infeksi menggunakan data klinis dan temuan tes laboratorium seperti mikrobiologi dan serologi, di antara sumber pendukung lainnya. Penyakit yang sembuh sendiri tidak diobati dengan antibiotik.
- e. Pemilihan jenis antibiotik harus berdasar pada:
 - 1) Pengetahuan tentang kisaran mikroorganisme penyebab infeksi dan

pola kerentanan antibiotiknya.

- 2) Temuan analisis mikrobiologi atau penilaian bakteri penyebab infeksi.
 - 3) Karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik antibiotik.
 - 4) Deeskalasi harus dilakukan setelah mempertimbangkan temuan mikrobiologis, keadaan klinis pasien, dan ketersediaan obat.
 - 5) Hemat biaya: Obat yang paling terjangkau dan aman dipilih.
- f. Langkah-langkah berikut digunakan untuk menerapkan penggunaan antibiotik yang bijaksana:
- 1) Meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak.
 - 2) Memperkuat laboratorium hematologi, imunologi, dan mikrobiologi atau laboratorium terkait penyakit menular lainnya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas penunjang.
 - 3) Membuat kerangka kerja untuk mengelola penyakit menular melalui kerja sama tim.
 - 4) Membuat kerangka kerja untuk mengelola penyakit menular melalui kerja sama tim.
 - 5) Membentuk tim multidisiplin untuk mengawasi dan mengelola penerapan antibiotik secara hati-hati.
 - 6) Pantau penggunaan antibiotik secara menyeluruh dan terus menerus.
 - 7) Menetapkan kebijakan dan pedoman nasional, rumah sakit, fasilitas kesehatan lain, dan masyarakat yang lebih spesifik untuk penggunaan

antibiotik.

Antibiotik digunakan dalam tiga keadaan berbeda di institusi kesehatan:

a) Antibiotik Terapi Empiris

Ketika ada infeksi tetapi penyebab bakteri tidak diketahui, pengobatan empiris, atau penggunaan antibiotik, digunakan.

b) Antibiotik untuk Terapi Definitif

Dalam situasi penyakit dimana jenis bakteri penyebabnya dan pola resistensinya diketahui, antibiotik digunakan sebagai terapi terakhir.

c) Antibiotik untuk Terapi profilaksis

Antibiotik digunakan sebagai obat pencegahan untuk mengobati penyakit dan mencegah infeksi.

E. Tinjauan Islam terhadap Pengobatan

Islam berisi penjelasan tentang terapi berdasarkan firman Allah Swt QS.

Asy Syu'ara/26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.”

Menurut pandangan Quraish Shihab, Dialah yang menyembuhkanku saat aku sakit dengan mengatur terapi sambil berserah diri kepada-Nya (Shihab, 2005).

Ayat ini menggarisbawahi suatu keyakinan yang harus dijunjung tinggi oleh umat Islam: bahwa Allah Swt lah yang menyembuhkan manusia ketika sakit. Setiap penyakit yang diderita seseorang dapat disembuhkan oleh Allah. Namun, seperti yang tertuang dalam sebuah hadits dalam biografi Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Manusia juga harus mempelajari cara mendapatkan obat ini” :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
 قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ
 عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا
 أَصِيبَ دَوَاءَ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim, No. 4084)

Hadis yang lain menyebutkan, sebagaimana diriwayatkan dari musnad

Imam Ahmad dari shahabat Usamah bin Suraik, bahwasanya Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا
 عَمْرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي

رَبَّاحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

“Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Ya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" (HR Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, No. 5246).

Hadits ini menjelaskan bahwa tidak termasuk satu penyakit, yaitu usia lanjut, setiap penyakit yang Allah turunkan ke dunia ini pasti ada penawarnya atau obatnya dengan izin-Nya. Suatu penyakit dapat disembuhkan jika diobati dengan obat yang tepat, menurut Hadits. Pemberian obat harus dipikirkan secara matang karena setiap penyakit memiliki obat tertentu yang terkait dengan terapinya. Pengiriman obat yang tidak tepat bahkan mungkin memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada pasien. Evaluasi penggunaan obat adalah langkah untuk menilai ketepatan pemberian obat.

Langkah penting dalam mencapai kesehatan yang baik adalah evaluasi penggunaan obat. Kesesuaian terapi, tidak kurang dari dan tidak lebih dari kadar yang telah ditetapkan, merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk mencapai dampak terapeutik. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai terapi pengobatan tidak melampaui apa yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan sesuai dengan perintah Allah Swt dalam QS. Al-Qamar/54: 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya :

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Menurut pemahaman Quraish Shihab, Kami telah menyusun segala sesuatu menurut ukuran menurut hikmah. Selanjutnya kita amati bahwa setiap makhluk hidup dibekali dengan senjata untuk mempertahankan diri dari serangan musuhnya atau menangkal ancaman kepunahan dalam kerangka susunan dan tingkatan yang telah Allah tetapkan untuk segala sesuatu. Ada banyak jenis senjata. Sementara ular raksasa memiliki otot yang sangat kuat tetapi jarang membawa racun, ular kecil memiliki racun atau kemampuan untuk bergerak cepat. sampai ke manusia, dan sebagainya. Tidak ada yang Allah buat tanpa tujuan yang berarti atau sia-sia, dan masing-masing diberi potensi dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi peran yang dimaksudkan (Shihab, 2005).

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui qadar (ukuran atau aturan). Dalam bidang kesehatan, kadar ini dapat dikaitkan dengan takaran obat-obatan sesuai dengan pedoman atau kadarnya. Aturan penggunaan obat yang terkait dengan interval waktu minum obat juga dapat berlaku jika melebihi batas yang dapat mengakibatkan masalah komorbiditas dan mencegah tercapainya terapi yang ditargetkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memakai pendekatan kuantitatif dan bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif, suatu teknik dimana dimulai dengan pengumpulan data, interpretasi data, serta tampilan dan hasil, adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan statistik (Sugiyono, 2019).

Pada penelitian dilakukan evaluasi memakai antibiotik pasien pneumonia secara kualitatif memakai metode gyssens dengan pengambilan data secara retrospektif. Metode gyssens bentuknya diagram alir dimana bisa mengevaluasi semua aspek persepan antibiotik kemudian dikategorikan dengan kategori 0 (rasional) serta kategori I-VI (tidak rasional).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1-30 September 2022.

C. Populasi Penelitian

(Sugiyono, 2019) menegaskan jika populasi yakni istilah luas dimana mengacu pada hal-hal atau orang yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan untuk ukuran, komposisi, dan sifat-sifat lainnya.

Semua pasien pneumonia di RS Nene Mallomo Kabupaten Sidrap antara Januari-Desember 2021 menjadi populasi penelitian.

D. Sampel Penelitian

(Sugiyono, 2019) mengklaim bahwa sampel mencerminkan ukuran dan ciri populasi.

Sampel pada penelitian yakni semua pasien Pneumonia RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode Januari-Desember 2021 dimana memenuhi kriteria eksklusi serta inklusi. Adapun kriteria pasien yakni:

1. Kriteria Inklusi

- 1) Pasien dengan diagnosa pneumonia.
- 2) Pasien berjenis kelamin perempuan serta laki-laki
- 3) Kategori semua usia (balita, anak-anak, dewasa dan lansia)
- 4) Pasien pneumonia yang mendapat pengobatan antibiotik
- 5) Pasien rawat inap di rumah sakit periode Januari-Desember 2021

2. Kriteria Eksklusi

- 1) Rekam medik pasien tidak lengkap sehingga tidak dapat di evaluasi dengan metode gyssens
- 2) Pasien yang tidak rawat inap dimana terdiagnosa pneumonia di RSUD Nene Mallomo periode Januari-Desember 2021

Tabel 3. Tabel Sampel Pasien Pneumonia Periode 2021

Bulan	Jumlah
Januari	7
Februari	3
Maret	7
April	12
Mei	1
Juni	6
Juli	9
Agustus	9
September	14
Oktober	14
November	10
Desember	8
Total	100

E. Penentuan Besar Sampel

Menurut teori (Frankel, 1993), jumlah sampel minimal untuk penelitian deskriptif adalah 100, maka besar sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan jumlah tersebut. Peneliti kemudian melakukannya rekam medik pasien pneumonia sebanyak 100 yang telah memenuhi kriteria inklusi.

a. Rata-rata populasi :

Tabel 4. Kelompok umur populasi pasien pneumonia di instalasi rawat inap tahun 2021.

Kelompok umur								
O-6 HARI	6-28 HARI	28 HARI< 1 THN	1-4 THN	4-14 THN	14-24 THN	24-44 THN	44-64 THN	>64 THN

L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	1	-	22	14	14	18	5	3	27	35	47	47	94	81	50	41

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan secara retrospektif, menggunakan rekam medis individu dengan pneumonia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan skrining rekam medik berdasarkan kriteria inklusi.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Purposive sampling menggunakan data pasien yang telah didiagnosis pneumonia dan sedang menjalani terapi antibiotik merupakan metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ini adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas.


H. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (*Variabel Independent*)

Kehadiran *variabel dependent* dapat dipengaruhi atau disebabkan oleh *variabel independent*. Penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia berfungsi sebagai variabel independen penelitian.

2. Variabel Terikat (Variabel *Dependent*)

Variabel *Dependent* adalah hasil dari variabel *Independent* (bebas). Variabel terikat pada penelitian adalah kerasionalan penggunaan antibiotik terhadap pasien pneumonia berdasarkan metode Gyssens.




Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

Pada penelitian ini peneliti meneliti mengenai kerasionalan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode Januari – Desember 2021 pada pasien pneumonia dengan metode Gyssens yang meliputi ketepatan indikasi, ketepatan

pemilihan berdasarkan efektivitas, toksisitas, harga, lama pemberian, dosis, interval pemberian, rute pemberian, dan waktu pemberian.

I. Tahap Penelitian

1. Bagan Alur Penelitian



Gambar 3. Bagan Alur Penelitian

a. Persiapan (Permohonan Izin Penelitian)

Menyusun dan menyampaikan surat permohonan izin melakukan penelitian dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi UIN Alauddin Makassar kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidrap.

b. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data dari rekam medis pasien pneumonia yang diobati dengan antibiotik harian di fasilitas rawat inap dari Januari hingga

Desember 2021, meliputi rejimen antibiotik, identitas pasien, perawatan yang diberikan kepada pasien, data klinis, dan data laboratorium.

c. Seleksi Data

- 1) Proses pemilihan rekam medik pasien yang masuk ke dalam kriteria inklusi
- 2) Pengambilan data dan pencatatan data hasil rekam medik di ruang administrasi berupa:
 - a. Nomor Rekam Medis
 - b. Identitas pasien (Nama, jenis kelamin, umur, penyakit kompliasi dan penyakit penyerta)
 - c. Tanggal perawatan
 - d. Diagnosa penyakit, riwayat penyakit pasien, dan keluhan pasien
 - e. Data penggunaan obat (jenis, regimen dosis, aturan penggunaan, rute pemberian, jumlah antibiotik yang diresepkan)

d. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan diagram alur gysses yang terbagi dalam 0-VI kategori.

e. Analisis Data

Data yang dihasilkan dari kategori gyssens kemudian di analisis menggunakan SPSS *statistic* 22.0. Setelah analisis program SPSS, data

hasil penelitian kemudian dianalisis lanjutan menggunakan metode SEM (*Structural Equation Modelling*) menggunakan IBM AMOS 22.

Metode SEM (*Structural Equation Modelling*) dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pengobatan.

2. Skema Penelitian



Gambar 4. Skema Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian

Bedasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode Januari-Desember 2021 terhadap penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia dihasilkan data pasien berjumlah 100 pasien dimana sudah memenuhi kriteria inklusi.


1. Gambaran Subjek Penelitian

a. Karakteristik Pasien

Dalam penelitian ini, jenis kelamin dan usia pasien dicatat sebagai karakteristik pasien.



Gambar 5. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Usia



Gambar 6. Karakteristik Pasien Pneumonia Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Karakteristik Antibiotik

Karakteristik antibiotik yang diamati pada penelitian ini adalah lama pemberian antibiotik dan jenis antibiotik yang digunakan

Tabel 5. Distribusi Lama Pemberian Antibiotik

Lama Terapi	Jumlah	%
1-7 hari	98	98
>7 hari	2	2
Total	100	100

Tabel 6. Distribusi Jenis Obat yang Digunakan

Jenis Obat	Jumlah	%
Inj. Anbacim (Cefuroxime)	63	63
Inj. Ceftazidime	12	12
Inj. Ceftriaxone	14	14
Inj. Viccilin+ Inj. Gentamicin	1	1
Inj. Ceftaxidime+ Inj. Gentamicin	8	8

Cefixime	1	1
Inj. Cefotaxime	1	1
Total	100	100

2. Evaluasi Penggunaan Antibiotik

a. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dengan Metode Gyssens

Tabel 7. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Menggunakan Metode Gyssens

Kategori Gyssens	Jumlah	%
Kategori IVa (Ada antibiotik lain yang lebih efektif)	67	67%
Kategori IIIa (Penggunaan antibiotik terlalu lama)	5	5%
Kategori IIIB (Penggunaan antibiotik terlalu singkat)	13	13%
Kategori IIa (Penggunaan antibiotik tidak tepat dosis)	1	1%
Kategori 0 (Penggunaan antibiotik tepat/bijak)	14	14%
Total	100	100

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil penilaian berdasarkan metode gyssens sebesar 14% untuk kategori 0 (penggunaan antibiotik rasional), 67% untuk kategori IVA (tidak rasional karena ada antibiotik lain yang lebih efektif), 5% untuk kategori IIIa (penggunaan antibiotik terlalu lama), 13% untuk kategori IIIB (penggunaan antibiotik terlalu

singkat) dan 1% untuk kategori IIa (penggunaan antibiotik tidak tepat dosis).

b. Tabulasi Silang Antara X ($X_{1,2,3,4}$) dan Y

Tabulasi silang (crosstabs) merupakan tata cara buat mentabulasikan sebagian variabel yang berbeda ke dalam matriks. Tata cara ini digunakan buat memandang presentase paling banyak dalam tiap variabel. Hasil tabulasi silang disajikan ke dalam sesuatu tabel dengan variabel- variabel yang tersusun selaku kolom serta baris.

Tabel 8. Tabel tabulasi silang antara X_1 dan Y

	Kerasionalan Antibiotik		Total
	Rasional	Tidak Rasional	
Anbacim	0	63	63
Ceftazidime	0	11	11
Ceftriaxone	13	1	15
Jenis Antibiotik Cefotaxime	1	0	1
Viccilin+Gentamicin	0	1	1
Ceftazidime+Gentamicin	0	9	9
Cefixime	0	1	1
Total	14	86	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pasien yang mendapat pengobatan rasional yang diberikan jenis antibiotik ceftriaxone (13%) dan cefotaxime (1%). Sedangkan, pasien yang mendapat pengobatan tidak rasional yang diberikan jenis antibiotik anbacim (63%), ceftazidime

(11%), kombinasi viccilin dan gentamicin (1%), kombinasi ceftazidime+gentamicin (9%) dan cefixime (1%).

Tabel 9. Tabel tabulasi silang antara X_2 dan Y

		Kerasionalan Antibiotik		Total
		Rasional	Tidak Rasional	
Umur	0-5 Tahun	0	18	18
	6-25 Tahun	3	11	14
	26-35 Tahun	0	8	8
	36-45 Tahun	3	3	6
	46-55 Tahun	2	11	13
	56-65 Tahun	4	16	20
	>65 Tahun	2	19	21
	Total	14	86	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi umur pasien yang paling banyak mendapat pengobatan yang rasional pada umur 56-65 tahun (4%), kemudian diikuti dengan umur 6-25 tahun dan umur 36-45 tahun yaitu masing-masing (3%), kemudian umur 46-55 tahun dan >65 masing-masing sebesar (2%).

Tabel 10. Tabel tabulasi silang antara X_3 dan Y

		Kerasionalan Antibiotik		Total
		Rasional	Tidak Rasional	
Jenis Kelamin	Laki-laki	10	41	51
	Perempuan	4	45	49
Total		14	86	100

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penderita berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak mendapatkan pengobatan yang


rasional yaitu sebanyak (10%) dibandingkan dengan perempuan yaitu sebanyak (4%).

Tabel 11. Tabel tabulasi silang antara X_4 dan Y

		Kerasionalan Antibiotik		Total
		Rasional	Tidak Rasional	
Lama Pemberian	1-7 Hari	14	84	98
	>7 Hari	0	2	2
Total		14	86	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pasien terbanyak mendapat pengobatan yang rasional pada pasien yang mendapat lama pemberian 1-7 hari yaitu sebanyak (15%).

c. Gambar Model SEM



Gambar 7. Hasil Uji Structural Equation Model (SEM)

- Uji Kecocokan (*Goodness of Fit*)

Tabel 12. Hasil *Mode Fit Summary* Evalausi Penggunaan Antibiotik

Model	Default Model
Probability	0,862

GFI	1,000
AGFI	0,998
TLI	1,290
RMSEA	0,000

3. Obat yang Diresepkan Sesuai Dengan Formularium Rumah Sakit

Tabel 13. Rata-rata Jumlah Obat yang Sesuai Formularium RS pada Pasien Pneumonia Periode Januari-Desember 2021

NO	Bulan	Jumlah Obat yang Sesuai Formularium RS	Jumlah Obat	%
1.	Januari	2	2	100
2.	Februari	2	2	100
3.	Maret	3	3	100
4.	April	5	5	100
5.	Mei	1	1	100
6.	Juni	3	3	100
7.	Juli	3	3	100
8.	Agustus	2	2	100
9.	September	4	4	100
10.	Oktober	4	4	100
11.	November	5	5	100
12.	Desember	4	4	100
	TOTAL	38	38	100

B. Pembahasan

1. Gambaran Subjek Penelitian

a. Karakteristik Pasien

Data distribusi pasien pneumonia berdasarkan usia pasien dilihat dari **gambar 5** yang sangat banyak terletak di kelompok umur 65 tahun ialah 20% ataupun sebanyak 20 penderita serta kelompok umur 56- 65 tahun ialah 20% dengan jumlah 20 penderita, setelah itu diiringi kelompok umur 0- 5 tahun sebanyak 18% (18 penderita), umur 6- 25 tahun sebanyak 14% (14 penderita), umur 46- 55 tahun sebanyak 13% (13 penderita), umur 26- 35 tahun sebanyak 8% (8 penderita), serta umur 36- 45 tahun sebanyak 7% (7 penderita). Lansia berumur 65 tahun yang sudah memiliki penyakit sebelumnya merupakan kelompok beresiko terkena pneumonia (Suprpto, 2022). Pneumonia biasanya disebabkan karena *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenza*, *Pseudomonas aeruginosa* dan bakteri gram negative lainnya. *Haemophilus influenza* seringkali menyerang lansia dan juga pasien yang memiliki komorbid, orang yang kecanduan alkohol dan pasien diabetes mellitus. Sedangkan, *Streptococcus pneumonia* biasanya menyerang pasien berumur dibawah 60 tahun tanpa komorbid dan pasien diatas 60 tahun dengan komorbid. Untuk *Mycoplasma pneumonia* biasanya menyebar melalui droplet dari pasien yang terkena pneumonia. Selain bakteri, virus juga merupakan penyebab tersering terjadinya pneumonia pada bayi dan anak-anak (Suprpto, 2022). Pneumonia pada anak di bawah usia lima tahun disebabkan oleh

beberapa faktor risiko, antara lain pneumonia bayi, berat badan lahir rendah (BBLR), kurangnya vaksinasi, pemberian ASI yang tidak memadai, malnutrisi, defisiensi vitamin A, tingginya prevalensi kolonisasi bakteri patogen di nasofaring, dan kontak yang terlalu lama dengan polusi udara, seperti yang disebabkan oleh asap rokok atau polusi industry (Lestari, 2022).

Presentase pasien pneumonia berdasarkan jenis kelamin dilihat dari **gambar 6** laki-laki lebih tinggi terkena pneumonia yaitu 51% (51 pasien), sedangkan pada pasien perempuan sebanyak 49% (49 pasien). Hal ini sesuai dengan data dari profil kesehatan Indonesia tahun 2019, bahwa pasien pneumonia laki-laki paling banyak yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia (Kemenkes RI, 2019). Hal ini disebabkan fakta bahwa laki-laki memiliki kromosom X lebih sedikit daripada perempuan (berdasarkan variabel keturunan), membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi. Pria juga memiliki jumlah kromosom X yang lebih sedikit daripada wanita, membuat mereka kurang tertekan kekebalannya dibandingkan wanita. Pria lebih rentan terhadap infeksi paru-paru karena mereka memiliki lebih banyak MicroRNA karena memiliki lebih banyak kromosom X. Selain itu, pria cenderung lebih aktif atau produktif daripada wanita. Karena sering beraktifitas di luar rumah, laki-laki lebih rentan terkena penyakit yang terpapar udara tercemar yang dapat menyebabkan infeksi paru (Ridwan, 2018).

b. Karakteristik Antibiotik

Data distribusi lama pemberian antibiotik pada **tabel 5** dapat disimpulkan bahwa lama terapi terbanyak adalah 1-7 hari yaitu sebanyak 98 orang. Lama rawat inap terkait erat dengan tingkat keparahan pasien dan sumber dukungan keuangan atau asuransi pasien. Menurut data WHO, anak yang membutuhkan perawatan rawat inap diberikan antibiotik selama total 5 hari. Menurut informasi dari (Society, 2019) pasien dewasa harus minum antibiotik minimal 5 hari, bahkan jika sudah mencapai stabilisasi klinis lebih awal. Total 5 hari akan cocok untuk sebagian besar pasien karena mereka akan memperoleh stabilisasi klinis selama 48 hingga 72 jam pertama dalam banyak kasus.

Data distribusi jenis antibiotik dilihat pada **tabel 6** yang paling banyak digunakan dengan jumlah 63 pasien dengan presentasi 63% adalah inj. Anbacim (cefuroxime). Cefuroxime ialah kalangan sefalosporin generasi kedua yang digunakan selaku pengobatan antibiotik empiris, kalangan sefalosporin generasi kedua tersebut kerap digunakan pada permasalahan pneumonia sebab memiliki dampak bakterisid yang kokoh. Sefalosporin ialah antibiotik opsi selaku penghambat enzim B- laktamase, penggunaannya pula yang tercantum nyaman buat kesehatan. Kalangan ini pula sangat efisien terhadap kuman gram negative semacam kuman yang bisa menimbulkan pneumonia (Natania Imanuella Worotikan, 2019).

2. Evaluasi Penggunaan Antibiotik

a. Evaluasi Penggunaan Antibiotik Dengan Metode Gyssens

Berikut ini hasil penilaian evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia menggunakan metode gyssens di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap periode 2021 pada **tabel 7**, yaitu:

1. Kategori VI (Data rekam medik tidak lengkap dan tidak dapat dievaluasi)

Informasi rekam medis yang tidak memiliki diagnosis pneumonitis atau halamannya hilang membuat tidak mungkin untuk dianalisis. Untuk lebih menentukan penggunaan antibiotik yang tepat dilakukan penilaian kelengkapan data rekam medis. Data dari seluruh rekam medis pasien pneumonia harus lengkap dan memenuhi semua kriteria gyssens, termasuk data tambahan pasien dan informasi alasan pemberian antibiotik, dosis antibiotik, durasi, interval, dan waktu pemberian antibiotik (Kemenkes RI, 2011) . Pemeriksaan dapat berlanjut ke kategori V dari kriteria gyssens karena hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua kasus berada dalam kategori VI.

2. Kategori V (Tidak ada indikasi penggunaan antibiotik)

Antibiotik diberikan kepada pasien yang keadaan klinis dan kondisi rawat inapnya tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini karena tidak ada indikasi untuk penggunaannya. Diagnosis dokter, hasil pemeriksaan pasien, keadaan pasien, dan tanda-tanda vital pasien dapat menjadi

indikator penggunaan antibiotik. Menurut temuan evaluasi, tidak semua contoh penggunaan antibiotik berada dalam kategori V, memungkinkan mereka masuk ke kriteria gyssens kategori IVa.

3. Kategori IVa (Ada antibiotik lain yang lebih efektif)

Antibiotik lain disarankan untuk digunakan sesuai dengan rekomendasi (Society, 2019) dan (WHO, 2014) karena lebih efektif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan terapi antibiotik pasien dengan terapi antibiotik yang disarankan oleh rekomendasi. Temuan evaluasi mengungkapkan bahwa 72 contoh penggunaan antibiotik termasuk dalam kategori Iva karena gagal dalam penilaian gyssens yaitu anbacim, ceftazidime, kombinasi ceftazidime+gentamicin dan cefixime.

Tabel 14. Kategori IVa pada Pasien Pneumonia

Kategori	Nomor Urut
IVa (ada antibiotik lain yang lebih efektif)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97 (lihat pada lampiran 4 dan 5)

First line pengobatan pneumonia pada orang dewasa dengan antibiotik dapat diberikan antibiotik beta-laktam yaitu amoxicilin, ampicillin, cefotaxime, seftriaxone atau fluoroquinolon atau kombinasi antibiotik beta-laktam dan makrolida (Society, 2019). Pada penelitian ini, untuk kasus dengan nomor urut 28 dikatakan ada antibiotik lain yang lebih

efektif karena pasien diberikan antibiotik cefixime dengan umur 28 tahun (lihat pada lampiran 4 dan 5), dimana cefixime tidak termasuk ke dalam first line terapi pneumonia. Cefixime adalah obat yang stabil terhadap berbagai jenis betalaktamase dan mempunyai spektrum antibakteri menyerupai spektrum mirip sefotaksim. Pemberian cefixime dapat menyebabkan pasien mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Salah satu komplikasi dari diare adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara ekstrem atau dehidrasi (Gunawan, 2016). Alasan pemberian cefixime dengan oral karena kondisi klinis pasien baik, tidak ada gangguan pencernaan seperti muntah, gangguan berat dan menelan serta kesadaran baik.

Untuk pasien dengan nomor urut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97 (lihat pada lampiran 4 dan 5) diberikan antibiotik anbacim. Dikatakan ada antibiotik lain yang lebih efektif karena anbacim tidak termasuk ke dalam firstline terapi pneumonia berdasarkan guideline. Alasan penggunaan anbacim karena cefuroxime diindikasikan untuk pengobatan infeksi sebelum bakteri yang menginfeksi teridentifikasi atau bila disebabkan oleh bakteri yang sensitive.

Untuk pengobatan pneumonia pada anak dengan pneumonia harus diobati dengan ampicillin parenteral (penicillin) dan gentamisin sebagai pengobatan lini pertama dan ceftriaxone harus digunakan sebagai pengobatan lini kedua pada anak-anak dengan pneumonia yang gagal pada pengobatan lini pertama (WHO, 2014). Pada penelitian ini, untuk kasus dengan nomor urut 4, 6, 16, 17, 21, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 51, 58, 59, 64, 69, 79, 83, 91, 94 (lihat pada lampiran 4 dan 5) dikatakan ada antibiotik lain yang lebih efektif karena diberikan antibiotik ceftazidime dan kombinasi ceftazidime+gentamicin dengan rata-rata umur 10 tahun kebawah, dimana antibiotik tersebut tidak termasuk ke dalam first line terapi pneumonia. Sefalosporin bersifat nefrotoksik, kombinasi antara sefalosporin dengan gentamicin dapat mempermudah terjadinya nefrotoksisitas. Gentamicin dengan dampak sampingnya yang bisa menimbulkan kehancuran ginjal, dampak samping ini bisa bertambah bila gentamicin dikombinasikan dengan kalangan sefalosporin. Gentamicin dapat menyebabkan kerusakan pada tubulus ginjal sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya yaitu mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal (Gunawan, 2016). Alasan penggunaan antibiotik ceftazidime digunakan sebagai terapi empiris lini pertama menggantikan penisilin karena sefalosporin memiliki spektrum luas untuk melawan bakteri gram positif maupun gram negative serta banyak digunakan untuk berbagai

jenis infeksi dan aktivitas farmakologi dari sefalosporin sama dengan penisilin yaitu diekskresi sebagian besar melalui ginjal.

4. Kategori IVb (Ada antibiotik lain yang kurang toksik/aman)

Interaksi obat yang dapat meningkatkan toksisitas dan munculnya efek samping yang tidak terduga dapat digunakan untuk menunjukkan ketersediaan antibiotik alternatif yang kurang toksik atau lebih aman. Kontraindikasi untuk pasien juga harus diperhitungkan. Temuan evaluasi mengungkapkan bahwa tidak semua contoh penggunaan antibiotik berada dalam kategori IVb, memungkinkan mereka untuk melanjutkan ke kategori IVc kriteria gyssens.

5. Kategori IVc (Ada antibiotik lain yang lebih murah)

Area ini dinilai dengan membandingkan biaya obat generik dan obat bermerek. Ketika pasien diberi antibiotik dengan nama merek atau dianggap lebih mahal pada pasien, ketika ada antibiotik generik dengan efektivitas yang sama, perbandingan obat ini dievaluasi. Temuan evaluasi mengungkapkan bahwa tidak semua contoh penggunaan antibiotik termasuk dalam kategori IVc sehingga dapat dilanjutkan ke kriteria gyssens kategori IVd.

6. Kategori IVd (Ada antibiotik lain yang spektrumnya lebih sempit)

Antibiotik lain, seperti evaluasi kesesuaian terapi antibiotik berdasarkan temuan kultur pasien, memiliki spektrum yang terbatas. Karena pemberian antibiotik ditujukan untuk pengobatan empiris, tidak

ada data rekam medis yang diperiksa yang memiliki informasi tentang temuan kultur pasien. Hasil evaluasi ditemukan bahwa tidak ada kasus penggunaan antibiotik yang masuk kategori IVd. Antibiotik cefuroxime, ceftazidime, ceftriaxone, ampicillin, gentamicin, cefixime dan cefotaxime yang diberikan pada pasien merupakan antibiotik spektrum luas yang sudah sesuai dengan guideline.

7. Kategori IIIa (Penggunaan antibiotik terlalu lama)

Ketika seorang pasien mengonsumsi antibiotik melebihi jangka waktu yang ditentukan, ini disebut sebagai penggunaan antibiotik berlebihan. Rekomendasi (Society, 2019) dan WHO (2014) digunakan untuk menentukan berapa lama terapi harus berlangsung untuk individu dengan pneumonia. (WHO, 2014) menyatakan bahwa anak yang menjalani rawat inap harus minum antibiotik selama total 5 hari. Total 5 hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut (Society, 2019), yang juga menyarankan pasien dewasa untuk minum antibiotik setidaknya selama 5 hari bahkan jika mereka telah mencapai stabilisasi klinis selama 48 hingga 72 hari pertama. jam. Berdasarkan temuan evaluasi, didapatkan 5 kasus yang mendapatkan pengobatan lebih dari 5 hari, yaitu:

Tabel 15. Kategori IIIa pada Pasien Pneumonia

Kategori	Nomor Urut
IIIa (Penggunaan antibiotik terlalu lama)	27, 43, 51, 66, 86 (lihat pada lampiran 4 dan 5)

8. Kategori IIIb (Penggunaan antibiotik terlalu singkat)

Pasien menggunakan antibiotik untuk jangka waktu yang lebih pendek dari yang disarankan, yang disebut sebagai penggunaan antibiotik yang tidak memadai. Rekomendasi (Society, 2019) dan (WHO, 2014) digunakan untuk menentukan berapa lama terapi harus berlangsung untuk individu dengan pneumonia. (WHO, 2014) menyatakan bahwa anak yang menjalani rawat inap harus minum antibiotik selama total 5 hari. Total 5 hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut (Society, 2019), yang juga menyarankan pasien dewasa untuk minum antibiotik setidaknya selama 5 hari bahkan jika mereka telah mencapai stabilisasi klinis selama 48 hingga 72 hari jam pertama. Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan 16 kasus yang masuk dalam kategori IIIb dengan lama rawat inap kurang dari 5 hari, yaitu:

Tabel 16. Kategori IIIb pada Pasien Pneumonia

Kategori	Nomor Urut
IIIb (Penggunaan antibiotik terlalu singkat)	1, 4, 10, 22, 23, 42, 44, 46, 56, 57, 61, 74, 80 (lihat pada lampiran 4 dan 5)

9. Kategori IIa (Penggunaan antibiotik tidak tepat dosis)

Penggunaan antibiotik yang salah dengan membandingkan dosis antibiotik yang sebenarnya dengan kisaran yang direkomendasikan oleh WHO. Membandingkan dosis antibiotik pasien menurut rekam medik

dengan dosis antibiotik yang diresepkan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi.

Antibiotik empiris yang digunakan pasien pneumonia anak di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap yaitu kombinasi viccilin 396 mg/ 6 jam dan gentamicin 7,2 mg/ 12 jam. Sedangkan, berdasarkan WHO (2014) dosis yang diberikan anak untuk ampicillin adalah 50 mg/kgBB, dosis gentamicin adalah 7,5 mg/kgBB dan ceftriaxone 80-100 mg/kgBB.

Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan 1 kasus yang tidak lolos kriteria gyssens dan masuk kategori IIa yaitu kombinasi viccilin+gentamicin.

Tabel 17. Kategori IIa pada Pasien Pneumonia

No.	Dosis yang diberikan	Berat Badan	Rekomendasi Dosis (WHO, 2014)
1.	Viccilin 396 mg/ 6 jam Gentamicin 7,2 mg/ 12 jam	3,6 kg	Ampicillin 180 mg/ 6 jam Gentamicin 27 mg/ 12 jam

Kombinasi ampicillin dan gentamicin digunakan sebagai antibiotik lini pertama karena memberikan efek bakterisid yang kuat, yang sebagian disebabkan oleh peningkatan ambilan obat yang timbul karena penahanan sintesa dinding sel. Penisilin mengubah struktur dinding sel sehingga memudahkan penetrasi gentamicin ke dalam kuman (Katzung, 2022).

10. Kategori IIb (Penggunaan antibiotik tidak tepat interval pemberian)

Kesenjangan antara pemberian antibiotik sehabis yang awal, kedua, serta seterusnya merupakan interval waktu. Bila acuan pemberian

antibiotik bersumber pada anjuran ialah ceftriaxone diberikan tiap 12 jam serta cefotaxime diberikan tiap 8 jam, hingga pemakaian antibiotik dikira pas frekuensi (Society, 2019). Sangat banyak dosis obat dapat beresiko, paling utama bila jumlah pemberiannya kurang hingga hendak menimbulkan tidak tercapainya dampak yang optimal. Pemberian antibiotik tidak pas interval bisa terjalin dapat kerana keadaan klinis dari penderita yang sudah membaik ataupun ketersediaan antibiotik di ruang instalasi farmasi sehingga memunculkan waktu yang lebih lama buat mengadakan obat tersebut serta mengirimkan ke ruang perawatan penderita (Kemenkes RI, 2011). Bersumber pada hasil penilaian, seluruh permasalahan pemakaian antibiotik pada penderita pneumonia rawat inap tidak terdapat yang masuk jenis IIB sehingga bisa dilanjutkan ke kriteria gysensens kategori IIC.

11. Kategori IIC (Penggunaan antibiotik tidak tepat rute pemberian)

Untuk mencapai kemanjuran yang optimal, pengobatan antibiotik pertama secara empiris pada pasien yang serius memerlukan rute pengiriman yang tepat. Pada pasien terpilih dengan respon klinis dan fungsi gastrointestinal yang memuaskan, pengobatan empiris harus diberikan secara intravena bersamaan dengan terapi penggantian (Kemenkes RI, 2011). Ketika seorang pasien bisa mendapatkan makanan enteral, gejala penyakit berkurang, dan obat oral yang diberikan memiliki tingkat bioavailabilitas yang tinggi, dianggap tidak cocok untuk

memberikan antibiotik. Sebaliknya, antibiotik parenteral harus digunakan sebagai gantinya.

Pada penelitian ini semua pasien diberikan antibiotik anbacim, ceftazidime, ceftriaxone, viccilin+gentamicin, ceftazidime+gentamicin, dan cefotaxime secara parenteral dan cefixime diberikan secara oral. Sehingga semua pasien lolos pada kategori IIc karena mendapatkan rute pemberian antibiotik secara tepat dan dapat dilanjutkan ke kriteria gyssens kategori I.

12. Kategori I (Penggunaan antibiotik tidak tepat waktu)

Jika waktu pemberian tidak tepat setiap hari, penggunaan antibiotik tidak tepat waktu. Obat harus diberikan pada saat yang tepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Namun, jika diberikan lebih sedikit, itu tidak akan memberikan dampak terapeutik yang paling besar (Kementerian Kesehatan, 2011). Antibiotik tidak segera diberikan karena keadaan klinis pasien sudah membaik atau karena dokter memerlukan waktu untuk menyetujui penggunaan antibiotik sehingga menyebabkan keterlambatan dalam memulai pemberian antibiotik.

Hasil evaluasi menunjukkan semua pasien lolos dalam kategori I dan dapat dilanjutkan ke kriteria gyssens kategori 0.

13. Kategori 0 (Penggunaan antibiotik tepat/rasional)

Pemberian antibiotik yang diberikan dengan tepat dosis, tepat waktu, tepat interval, dan tepat lama pemakaian dianggap tepat atau rasional

penggunaan antibiotik. Menurut aliran kriteria Gyssens, suatu antibiotik tergolong kategori 0 atau wajar penggunaan antibiotik jika melewati kategori I sampai VI. 14 (14% dari semua kasus resep) ditentukan oleh penilaian ini menjadi logis.

Tabel 18. Kategori 0 pada Pasien Pneumonia

Kategori	Nomor Urut
0 (penggunaan antibiotik tepat/rasional)	24, 31, 33, 40, 41, 63, 72, 75, 84, 92, 93, 96, 98, 100 (lihat pada lampiran 5)

Antibiotik tunggal lebih disukai daripada kombinasi untuk merawat pasien dewasa. Sefalosporin generasi ketiga, khususnya ceftriaxone (13%) dan cefotaxime (1%), adalah antibiotik yang paling banyak digunakan. Karena kemampuan antibakterinya yang sangat baik, spektrum yang luas, dan risiko toksisitas yang minimal, ceftriaxone adalah antibiotik yang paling masuk akal. Manfaat memiliki waktu paruh eliminasi yang panjang adalah Ceftriaxone. Antibiotik kedua yang cerdas adalah cefotaxime. Ceftriaxone dipilih daripada cefotaxime karena dapat menembus cairan tubuh lebih efektif daripada antibiotik lain dalam keluarga sefalosporin (Natania Imanuella Worotikan, 2019).

Memanfaatkan antibiotik secara bijaksana dapat menunda perkembangan resistensi antibiotik, mengurangi lama rawat inap, meringankan beban keuangan perawatan pasien, dan meningkatkan layanan rumah sakit (Kemenkes RI, 2011).

Hasil penelitian yang sudah didapatkan pemakaian anitibiotik di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap pada penderita pneumonia tidak rasional yang diakibatkan oleh sebagian aspek semacam tidak pas pemberian tipe antibiotik, tidak pas pemberian dosis serta pemakaian antibiotik sangat pendek.. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional tersebut tidak sesuai dengan QS. Al-Qamar/54: 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Terjemahnya :

“Sungguh, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran” (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat ini menarangkan bagaimana Allah menghasilkan seluruh suatu dengan memakai qadar (dimensi ataupun ketentuan). Bagi kandungan ataupun kaidahnya, kandungan dalam bidang medis ini bisa berhubungan dengan pemakaian obat- obatan. Bila melebihi jumlah tersebut, pengobatan tujuan tidak diperoleh, serta bisa menimbulkan permasalahan yang menyertai. Terdapat peraturan lain buat memakai obat- obatan yang berhubungan dengan seberapa sering meminumnya.

b. Tabulasi Silang Antara X ($X_{1,2,3,4}$) dan Y

Data tabulasi silang antara X_1 (jenis antibiotik) dan Y dilihat pada **tabel 8** jenis antibiotik yang rasional adalah injeksi ceftriaxone (14 orang).

Ceftriaxone merupakan antibiotik sepalosporin bakterisida semi saintetik

generasi ketiga, resisten terhadap bermacam tipe kuman B- Laktamase mempunyai kegiatan yang sangat baik terhadap kuman gram negative dan bermacam gram positif serta sebagian kuman anaerob tercantum *enterobacteriaceae*, *streptococcus pneumonia*, *haemophilus influenza*, *pseudomonas aeruginosa* serta *streptococci non enterococcal* yang lain (Jayesh J, 2018). Bagi literatur *first line* penyembuhan pneumonia dewasa dengan antibiotik bisa diberikan antibiotik B- Laktam ialah amoxicillin, ampicillin, cefotaxime, ceftriaxone ataupun fluoroquinolon ataupun campuran B- Laktam serta makrolida (Society, 2019). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yaitu ceftriaxone dan cefotaxime termasuk ke dalam kategori rasional. Cefixime dan anbacim tidak rasional karena tidak termasuk ke dalam terapi firstline yang dijadikan sebagai pedoman. Pada pasien pneumonia anak jenis antibiotik yang diberikan ialah ampisilin dan gentamisin sebagai terapi lini pertama dan ceftriaxone sebagai terapi lini kedua (WHO, 2014). Pada penelitian ini, antibiotik yang diberikan pada pasien pneumonia anak adalah ceftazidime, kombinasi ceftazidime dan gentamisin, kombinasi vicilin dan gentamicin. Berdasarkan guideline, obat tersebut (ceftazidime, kombinasi ceftazidime dan gentamicin) tidak rasional karena tidak termasuk ke dalam terapi lini pertama maupun kedua. Untuk kombinasi vicilin dan gentamicin dikatakan tidak rasional karena tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh WHO 2014.

Data tabulasi silang antara X_2 (umur) dan Y dilihat pada **tabel 9** pemberian obat yang rasional paling tinggi di rentang umur 56-65 tahun yaitu sebanyak 4 orang. Hal ini disebabkan karena pasien yang paling banyak terkena pneumonia berada pada rentang usia tersebut. Usia lansia memiliki resiko lebih besar terjadinya pneumonia. Hal ini karena fakta bahwa perubahan arsitektur dan fisiologi terkait penuaan memiliki dampak yang signifikan terhadap cadangan fungsional paru-paru, kapasitas tubuh untuk mengatasi penurunan kepatuhan paru-paru, resistensi saluran napas yang lebih besar terhadap infeksi, dan faktor lain seiring bertambahnya usia. Karena sistem kekebalan mereka yang terganggu, kontrol suhu yang menurun, gangguan refleks muntah, dan berbagai tingkat kelainan kardiovaskular, orang lanjut usia lebih mungkin terkena pneumonia (Suprpto, 2022). Pada riset ini lanjut usia usia 56- 65 tahun menemukan sangat banyak penyembuhan yang rasional karena dalam penggunaannyaenuhi sebagian kriteria semacam penaksiran yang pas, gejala penyakit, pemilihan obat yang pas, dosis yang pas, metode pemberian yang pas, serta interval pemberian yang pas serta pas lama pemberian. Sebaliknya, penderita yang lain tidak menemukan penyembuhan rasional sebab tidak memenuhi sebagian kriteria tersebut.

Data tabulasi silang antara X_3 (jenis kelamin) dan Y dilihat pada **tabel 10** dapat disimpulkan bahwa pasien yang paling mendapat pengobatan rasional adalah laki-laki yaitu sebanyak 10 orang. Pengobatan lebih banyak diberikan pada pasien laki-laki karena beberapa faktor diantaranya pada pasien anak

Pria dan wanita memiliki beragam sistem kekebalan dalam tubuh mereka, menurut biologi. Organ paru-paru wanita memiliki resistensi aliran udara yang lebih rendah dan konduktivitas aliran udara yang lebih baik, menghasilkan sirkulasi udara yang lebih lancar di rongga pernapasan dan pertahanan terhadap infeksi patogen di paru-paru (Fitri Ayu Wahyuni, 2019). Sedangkan, pada pasien dewasa karena laki-laki lebih cenderung melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan di luar rumah dan lebih rentan terhadap paparan polusi udara, terutama yang mengandung bahan kimia yang menyebabkan infeksi paru-paru (Ridwan, 2018). Pada penelitian ini diantara laki-laki dan perempuan, keberhasilan terapinya lebih banyak dicapai oleh laki-laki. Hal ini disebabkan karena pneumonia lebih banyak dialami oleh laki-laki dan laki-laki lebih banyak mendapat jenis antibiotik yang rasional yaitu ceftriaxone dan cefotaxime.

Data tabulasi silang antara X₄ (lama pemberian) dan Y dilihat pada **tabel 11** didapatkan hasil pasien dengan lama pemberian 1-7 hari yang paling banyak mendapat pengobatan rasional yaitu 15 orang. Dengan mempertimbangkan beberapa variabel, antara lain profil klinis penyakit infeksi dan efek terapeutik antibiotik, maka penggunaan antibiotik ditetapkan berdasarkan indikasi. Antibiotik harus diberikan dengan dosis yang tepat untuk membunuh bakteri atau virus sepenuhnya, jika tidak, bakteri atau virus akan mengembangkan resistensi terhadap obat antibakteri. Bahkan jika pasien telah mencapai stabilisasi klinis selama 48 sampai 72 jam pertama, panjang

total 5 hari akan cukup untuk sebagian besar pasien, menurut definisi penelitian ini tentang pemberian antibiotik yang masuk akal.

c. Uji SEM

Model persamaan struktural atau SEM menjelaskan hubungan antar variabel laten sehingga biasa disebut analisis variabel laten atau hubungan struktural linier. Hubungan antar variabel dalam SEM membentuk model struktural yang dapat dijelaskan dengan persamaan struktural (Solimun, 2017).

Berdasarkan **gambar 7**. Mengenai hasil uji SEM yang telah dilakukan, diketahui bahwa indikator yang paling dominan dalam variabel kualitas pengobatan adalah umur dengan *Loading Factor* sebesar 0,65. Hal ini membuktikan bahwa aspek yang paling berpengaruh terhadap kualitas pengobatan adalah umur. Umur berpengaruh terhadap kualitas pengobatan karena pasien terbanyak adalah pasien lanjut usia. Pada lanjut usia jika dibandingkan dengan usia muda, prosedur terapinya berbeda. Faktor ini disebabkan oleh proses degeneratif, penurunan imunitas, dan penurunan sirkulasi sistemik. Perawatan harus digunakan saat memilih obat untuk pasien yang lebih tua karena mereka sering mengalami perubahan fisik, perubahan farmakokinetik dan farmakodinamik, tren konsekuensi penyakit, dan munculnya polifarmasi (Anggraini, 2021).

- Uji Kecocokan (*Goodness of Fit*)

Menurut (Solimun, 2017) mengatakan ada satu ataupun lebih metode uji kelayakan model terpenuhi, maka model tersebut dianggap layak. *Goodness*

of fit dibagi menjadi tiga jenis yakni *incremental fit measure*, *absolute fit measure*, serta *parsimony fit measure*. Ukuran pencocokan mutlak mencakup *probability*, CFI, TLI, GFI, AGFI dan RMSEA. Model SEM dianggap layak jika salah satu metode uji kecocokan model terpenuhi.

Berdasarkan **Tabel 12**, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas model adalah 0,862. Model SEM dapat diterima jika nilai *probability* $\geq 0,05$ (Gardenia, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa model SEM dapat diterima.

Nilai GFI hasil analisis adalah 1,000 dikatakan baik jika $\geq 0,90$ (Gardenia, 2018). Dari hasil yang didapatkan model SEM dapat diterima.

Nilai AGFI dalam penelitian adalah 0,998. Menurut (Solimun, 2017) bahwa nilai kritis untuk AGFI adalah $\geq 0,90$. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai AGFI dalam penelitian menunjukkan model yang dibuat termasuk good fit.

Nilai TLI hasil analisis adalah 1,290. Nilai TLI dikatakan baik jika $\geq 0,95$ dan jika mendekati 0 maka dianggap tidak layak (Gardenia, 2018). Dari hasil yang didapatkan nilai TLI lebih mendekati 0,95 sehingga dianggap cukup layak.

Sedangkan nilai RMSEA hasil analisis didapatkan 0,000. Nilai RMSEA dikatakan baik jika $\leq 0,08$ (Gardenia, 2018). Sehingga dari hasil RMSEA penelitian dianggap layak.

3. Obat yang Diresepkan Sesuai Dengan Formularium Rumah Sakit

Formularium rumah sakit merupakan sebuah pedoman atau acuan bagi para tenaga medis khususnya para dokter dalam melakukan peresepan. Formularium rumah sakit dipakai menjadi acuan ketika melakukan pemilihan obat, mempermudah dalam proses perencanaan apotek rumah sakit, meningkatkan akurasi penggunaan anggaran obat secara hati-hati dan memungkinkan komunikasi profesional. Daftar obat-obatan yang dibutuhkan oleh rumah sakit dalam operasionalnya dicantumkan dalam formularium rumah sakit. Daftar ini dibuat sesuai dengan staf medis (dokter) dan Tim Farmasi dan Terapi (TFT) yang dipilih oleh direktur rumah sakit. Dengan adanya formularium rumah sakit, rumah sakit dapat lebih mudah memilih dan menentukan kriteria obat yang dapat dikonsumsi pasien dan ketersediaan obat tetap stabil (Kemenkes RI, 2020).

Tabel 19. Daftar Obat Pneumonia Berdasarkan Formularium Rumah Sakit periode 2021

Jenis Antibiotik Berdasarkan Formularium RS	Antibiotik yang Diresepkan
Ceftriaxone 1 g injeksi	✓
Cefotaxime 1 g injeksi	✓
Ceftazidime 1 g injeksi	✓
Ampisilin + Sulbaktam 1500 mg injeksi (Viccilin-SX)	✓

Natrium Cefuroxime 1 g (Anbacim)	✓
Levofloxacin infus 500 mg/100 ml	-
Levofloxacin 500 mg tablet	-
Ciprofloxacin infus 200 mg/100 ml	-
Ciprofloxacin tablet 500 mg	-
Cefadroxil kapsul 500 mg	-
Cefadroxil kapsul 500 mg	-
Cefixime kapsul 100 mg	✓
Cefixime kapsul 200 mg	-
Cefixime sirup 100 mg/5 ml	-
Amkosisilin tablet 500 mg	-
Amoksisilin sirup 125 mg/5 ml	-
Amoksisilin + Asam klavulanat tablet 625 mg (Claneksi tablet)	-

Proporsi obat yang diberikan dari Formularium Rumah Sakit ditentukan dengan menggunakan metode yang membagi jumlah total obat Formularium Rumah Sakit dengan jumlah total obat yang dikeluarkan dan dikalikan 100%. Penghitungan persepan obat menurut Formularium Rumah Sakit dan Daftar

Obat Esensial Nasional (DEN) mencoba mengidentifikasi kecenderungan persepan obat menurut kedua daftar tersebut.

100% resep obat dibuat dengan menggunakan formularium/DOEN terbaik (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Peninjauan dan perhitungan obat-obatan yang direkomendasikan oleh Formularium Rumah Sakit dilakukan untuk menghitung obat-obatan yang diresepkan oleh Formularium DOEN/RS. Daftar obat yang telah diberikan lampu hijau untuk dipakai pada rumah sakit dikenal sebagai formularium. Formularium obat rumah sakit didasarkan pada monografi obat tertentu atau klasifikasi terapeutik.

Berdasarkan **Tabel 13** hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa obat yang diresepkan Formularium RS sudah rasional yaitu 100% atau sudah sesuai karena semua obat dimana menjadi resep dokter dimana tercantum pada formularium. Kesesuaian dokter pada menulis resep sesuai formularium dapat mencegah persediaan obat yang habis, kekurangan dan kelebihan obat sehingga mempengaruhi persediaan obat. Oleh karena itu, tenaga medis harus menggunakan dan mematuhi formularium saat membuat resep atau pemesanan obat pasien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat ditarik dari temuan penelitian:

1. Didapatkan temuan pengkategorian penggunaan antibiotik dengan pendekatan gyssens. Ada 67% atau 67 penggunaan antibiotik dalam kategori IVa (ada antibiotik alternatif yang lebih efektif). Ada 5 penggunaan antibiotik dalam kategori IIIa (penggunaan antibiotik terlalu lama), yang terdiri dari 5% dari semua penggunaan. Ada 13% atau 13 penggunaan antibiotik dalam kategori IIIb (penggunaan antibiotik terlalu singkat), Kategori IIa (penggunaan antibiotik yang tidak tepat) menunjukkan 1% atau 1 penggunaan, sedangkan kategori 0 (penggunaan antibiotik yang tepat/rasional) menghasilkan 14% atau 14 penggunaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemberian antibiotik pada pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap merupakan praktik yang tidak wajar.
2. Berdasarkan hasil penelitian bisa diambil kesimpulan jika persepsan obat terhadap pasien pneumonia pada RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap sudah sesuai formularium RS 100%.

B. Saran

Adapun saran penelitian yakni:

1. Agar menggunakan rute Gyssens sebagai pedoman pemberian antibiotik, diperlukan penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan berbagai kriteria tambahan, seperti keadaan klinis, tingkat keparahan penyakit, gangguan penyerta, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan penelitian tambahan tentang distribusi kuman penyebab pneumonia komunitas, uji sensitivitasnya terkait aliran Gyssens, dan perbaikan klinis pasien.
2. Untuk meningkatkan pemakaian antibiotik rasional serta mencapai dampak terapeutik yang diinginkan pada pasien pneumonia di RSUD Nene Mallomo Kabupaten Sidrap, diperlukan pengoptimalan penerapan penggunaan antibiotik sesuai dengan standar praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementrian RI. (2019). *Al-Quran dan Terejemahannya*. Bandung: Syamil Cipta Media
- American Thoracic Society* (2019). Diagnosis and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America: Am J Respir Crit Care Med Vol 200, Iss 7, pp e45-e67.
- Anggraini, W., Candra, T. M., Maimunah, S., & Sugihantoro, H. (2020). *Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik pada Pasien Infeksi Saluran Kemih dengan Metode Gyssens*. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v2i1.2876>
- Anggraini, W. (2021). *Evaluasi Kualitatif Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia RS "X" di Malang*. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 3(1), 9-21. <https://doi.org/10.24123/kesdok.v3i1.2887>.
- Askar, M. (2020). *Patofisiologi Untuk Teknologi Laboratorium Medis*. Makassar: Politeknik Kesehatan.
- Dahlan, Z. Pneumonia. Dalam: Setiawati S., Alwi ., Sudoyo A.W., Simadibrata K.M., Setiyahadi B., Sam A.F. (2017). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 6*. Jakarta: Interna Publishing.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. (2019). *Profil Kesehatan Kabupaten Sidrap Tahun 2019*. Sidrap: Dinkes Kabupaten Sidrap.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Sidrap. (2020). *Profil Kesehatan Kabupaten Sidrap Tahun 2020*. Sidrap: Dinkes Kabupaten Sidrap.
- Dwi Sarbini, S. Z. (2019). *Gizi Geriatri*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Fitri Ayu Wahyuni, V. Y. (2019). Pola Penggunaan Antibiotik Penyakit Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie. *Prosiding Seminar Nasional Kefarmasian Ke-2*, 95-100.
- Frankel, Jack R dan Norman E. Wallen. (1993). *How to design and Evaluate Research in Education*. 2nd edition. New York: McGraw hill Inc.

- Gardenia, Yulia. (2018). *Metode Structural Equation Model (SEM) Pada Pengukuran Kualitas Website Pemesanan Makanan Online*. JSI (Jurnal Sistem Informasi) Unniversitas Suryadarma.
- Gunawan, S. G. (2016). *Farmakologi dan Terapi Edisi 6*. Jakarta: Departemen Farmakologi dan Teraupetik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Gyssens, I.C. (2005). *Audit for monitoring the quality of antimicrobial prescription*. New York: Kluwer Academic Publishers.
- Harris M, Clark J, Coote N, Fletcher P, Harnden A, McKean M, et al. (2011). *British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: Update 2011*. Thorax.; 66. Epub ahead of print 2011. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2011-200598.
- Iwa, K. R. (2022). *Keperawatan Gerontik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Iyan Hardiana, D. R. (2021). *Evaluasi Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Pneumonia Komunitas di Instalasi Rawat Inap RSPAD Gatot Subroto*. Majalah Farmasi dan Farmakologi MFF 2021, 25(1):1-6, 1-6.
- Jayesh. (2018). *Pharmacocinetics of Ceftriaxone*. Vet. Arhiv. 80:1-9.
- Katzung, B. G. (2022). *Basic & Clinical Pharmacology 15th Edition*. North America: McGraw-Hill Education.
- Kemenkes RI. (2020). *Kemenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/200/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Formularium Rumah Sakit*. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Republik Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelayanan Kefarmasian Untuk Terapi Antibiotika Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Khotimah, I. F. (2022). *Penyakit Gangguan Sistem Tubuh*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Muntasir. S.Si., M. et al. (2021). *Antibiotik dan Resistensi Antibiotik*. Jakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia.

- Natania Imanuella Worotikan, D. H. (2019). Studi Penggunaan Sefalosporin Generasi Ketiga Pada Pasien Pneumonia di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. *JOURNAL OF PHARMACEYSCIENCE AND PRACTICE I VOLUME 6I NUMBER 2I OKTOBER2019*, 66-73.
- Permenkes. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Puspitasari, S. F. (2019). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Putri, S. M. (2019). *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Pada Anak*. Gresik: Guepedia.
- Rahardja, D. T. (2015). *Obat-Obat Penting Edisi 7*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahmawati, D. (2019). *Mikrobiologi Farmasi Dasar - Dasar Mikrobiologi untuk Mahasiswa Farmasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ridwan, M. (2018). *Mengenal dan Menjaga Kesehatan Pernafasan*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 13*. Lentera Hati.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabet.
- Sunandar Ihsan, S. F. (2022). *Analisis Rasionalitas Antibiotik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suprpto, H. O. (2022). *Keperawatan Medikal Bedah*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Solimun, Achmad, Adji. R. F., Nurjannah. (2017). *Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS*. Malang: UB Press.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Jakarta. 2009.

- Usman, D. A. P., Herman, H., Emelda, A. (2014). *Evaluasi Penggunaan Antibiotika Terhadap Pasien Pneumonia Komuniti di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Jurnal Ilmiah Asy-Syifa*, 6(1), 61-72. <https://doi.org/10.33096/jifa.v6i1.34>
- UPT RSUD Nene Mallomo. (2021). *Profil UPT RSUD Nene Mallomo Tahun 2021*. Sidrap.
- UPT RSUD Nene Mallomo. (2022). *Pedoman Pelayanan dan Pengelolaan Farmasi Edisi I*. Sidrap: Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap UPT RSUD Nene Mallomo.
- World Health Organization, Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia health facilities. 2014.
- Wulandari, N. T., Listyanti, E., Dyahariesti, N., & Erwiyani, A. R. (2019). *Analisis Keefektifan Biaya Pengobatan Pada Pasien Pneumonia Balita Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2018. Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 2(2), 94–101. <https://doi.org/10.35473/ijpnp.v2i2.276>
- Yuli Lestari, I. S. (2022). *Keperawatan Anak 1*. Jawa Tengah: CV. Pustaka Indonesia.
- Zairinayati. (2022). *Lingkungan Fisik Rumah dan Penyakit Pneumonia*. Tangerang Selatan: Pascal Books.

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Ethical Exemption*



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. A.087/KEPK/FKIK/IX/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Dwi Yuliana Sari
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia dengan metode gyssens di rumah sakit umum daerah (RSUD) nene mallomo kabupaten sidrap"

"Evaluation of the use of antibiotics in pneumonia patients using the gyssens method at the nene mallomo regional general hospital sidrap regency"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 27 sep 2022 sampai dengan tanggal 27 sep 2023

This declaration of ethics applies during the period Sep 27,2022 until sep 27,2023

September 27, 2022

Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatrah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARI KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 323/IP/DPMTSP/9/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **DWI YULIANA SARI** Tanggal **05-09-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN** Nomor **8675/S.01/PTSP/2022** Tanggal **02-09-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **DWI YULIANA SARI**

ALAMAT : **BTN GRIYA MITRA MUDA MAJJETTANG BLOK A.9, KEC. MARITENGG.**

UNTUK melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **UNIVERSITAS NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

JUDUL PENELITIAN : **" EVALUASI PENGGUNAAN ANTIBIOTIK PADA PASIEN PNEUMONIA DENGAN METODE GYSSENS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) NENE MALLOMO KABUPATEN SIDRAP "**

LOKASI PENELITIAN : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) NENE MALLOMO KABUPATEN SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**

LAMA PENELITIAN : **01 September 2022 s.d 30 September 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 05-09-2022



Biaya : Rp. 0,00

Terbilang

- DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) NENE MALLOMO KABUPATEN SIDRAP
- REKTOR UNIVERSITAS NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
- PERTINGGAL

Lampiran 3 . Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO
Jalan Walter Monginsidi No. 234 Pangkajene Sidenreng Kab. Sidrap
Telp. (0421) 91493 Kode Pos 91611 Faksimile (0421) 91491 e-mail : rnenemallomo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : 435/ /RS Nene Mallomo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Purnama Kusuma Wardani, S. IP, M.M
NIP : 19831214 200212 2 002
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kabid. Pengembangan Pelayanan UPT RSUD Nene
Mallomo Kab. Sidrap

Menerangkan bahwa Mahasiswa(i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : DWI YULIANA SARI
NIM : 70100118036
Program Studi : Pakultas Kedokteran Jurusan Farmasi
Institusi : Universitas Negeri Alauddin Makassar.

Benar telah melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Penggunaan Antibiotik pada Pasien Pneumonia dengan Metode Gyssens di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Mallomo Kabupaten Sidrap" Tanggal 01 September 2022 s.d 30 September 2022.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 10 Oktober 2022

a.n.Direktur UPT RSUD Nene Mallomo
Kabid. Pengembangan Pelayanan,



A. Purnama Kusuma Wardani, S. IP, M.M
NIP. 19831214 200212 2 002

Lampiran 4. Data Profil Pasien Pneumonia

NO	Nama Pasien (Umur)	Jenis Kelamin	Tanggal Masuk/Keluar
1.	Tn. C (61 tahun)	L	4/1/2021 6/1/2021
2.	Tn. M (72 tahun)	L	8/1/2021 13/1/2021
3.	Ny. A (62 tahun)	P	7/1/2021 11/1/2021
4.	An. Am (5 tahun)	L	9/1/2021 13/1/2021
5.	Tn. M (58 tahun)	L	13/1/2021 15/1/2021
6.	By. Aj (7 bulan)	P	14/1/2021 18/1/2021
7.	Tn. S (49 tahun)	L	30/1/2021 3/2/2021
8.	Ny. Hi (57 tahun)	P	6/2/2021 10/2/2021
9.	Ny. Ss (25 tahun)	P	13/2/2021 17/2/2021
10.	Ny. H (36 tahun)	P	27/2/2021 4/3/2021
11.	By. Ma (11 hari)	L	3/3/2021 10/3/2021
12.	Ny. L (58 tahun)	P	5/3/2021 10/3/2021
13.	Tn. Th (23 tahun)	L	6/3/2021 12/3/2021
14.	Ny. F (18 tahun)	P	9/3/2021 12/3/2021
15.	Ny. Im (80 tahun)	P	14/3/2021 18/3/2021
16.	By. Aa	L	27/3/2021

	(1 tahun)		1/4/2021
17.	An. Ds (7 tahun)	L	28/3/2021 3/4/2021
18.	Tn. Ds (58 tahun)	L	6/4/2021 10/4/2021
19.	Tn. A (103 tahun)	L	12/4/2021 17/4/2021
20.	Tn. Ha (69 tahun)	L	18/4/2021 21/4/2021
21.	By. Sr (6 bulan)	L	19/4/2021 24/4/2021
22.	Tn. Am (71 tahun)	L	20/4/2021 24/4/2021
23.	Tn. Amr (70 tahun)	L	20/4/2021 24/4/2021
24.	Tn. D (57 tahun)	L	20/4/2021 23/4/2021
25.	Ny. S (31 tahun)	L	22/4/2021 26/4/2021
26.	An. Ak (2 tahun)	P	27/4/2021 2/5/2021
27.	By. Mr (10 bulan)	L	27/4/2021 3/5/2021
28.	Ny. Ns (28 tahun)	P	28/4/2021 3/5/2021
29.	Tn. As (19 tahun)	L	30/4/2021 4/5/2021
30.	Tn. Hn (80 tahun)	L	5/5/2021 9/5/2021
31.	Ny. Im (71 tahun)	P	2/6/2021 5/6/2021
32.	Ny. H (23 tahun)	P	18/6/2021 22/6/2021
33.	Ny. Sdn (23 tahun)	P	21/6/2021

			27/6/2021
34.	Tn. D (40 tahun)	L	24/6/2021 26/6/2021
35.	Ny. Na (20 tahun)	P	29/6/2021 2/7/2021
36.	By. Ap (4 bulan)	P	29/6/2021 5/7/2021
37.	By. Mf (1 tahun)	L	12/7/2021 16/7/2021
38.	By. Ma (3 bulan)	L	17/7/2021 22/7/2021
39.	By. Ap (5 bulan)	P	21/7/2021 27/7/2021
40.	Tn. Aa (51 tahun)	L	24/7/2021 28/7/2021
41.	Tn. Ht (72 tahun)	L	30/7/2021 2/8/2021
42.	Tn. Ms (65 tahun)	L	29/7/2021 2/8/2021
43.	Tn. L (65 tahun)	L	30/7/2021 6/8/2021
44.	Ny. T (58 tahun)	P	31/7/2021 3/8/2021
45.	Tn. N (50 tahun)	L	31/7/2021 7/8/2021
46.	Ny. Ng (76 tahun)	P	6/8/2021 12/8/2021
47.	Ny. M (61 tahun)	P	7/8/2021 12/8/2021
48.	Ny. Ba (19 tahun)	P	13/8/2021 19/8/2021
49.	Ny. Mr (46 tahun)	P	14/8/2021 20/8/2021

50.	Tn. Ds (63 tahun)	L	21/8/2021 28/8/2021
51.	Ny. Y (11 tahun)	P	23/8/2021 29/8/2021
52.	Ny. I (82 tahun)	P	27/8/2021 2/9/2021
53.	Ny. S (22 tahun)	P	28/8/2021 1/9/2021
54.	Tn. K (58 tahun)	L	28/8/2021 8/9/2021
55.	Ny. Sm (38 tahun)	P	3/9/2021 7/9/2021
56.	Tn. Mj (60 tahun)	L	4/9/2021 9/9/2021
57.	Ny. Ik (75 tahun)	P	10/9/2021 14/9/2021
58.	By. Aa (1 bulan)	P	9/9/2021 13/9/2021
59.	An. Ns (9 tahun)	P	10/9/2021 15/9/2021
60.	Tn. Aa (48 tahun)	L	16/9/2021 19/9/2021
61.	Ny. Sa (27 tahun)	P	17/9/2021 21/9/2021
62.	Tn. Rb (48 tahun)	L	17/9/2021 23/0/2021
63.	Tn. Mh (46 tahun)	L	17/9/2021 20/9/2021
64.	By. Ms (4 bulan)	L	20/9/2021 24/9/2021
65.	Ny. S (35 tahun)	P	23/9/2021 27/9/2021
66.	Ny. R (49 tahun)	P	24/9/2021 4/10/2021

67.	Tn. Dhm (73 tahun)	L	26/9/2021 2/10/2021
68.	TN. Ls (81 tahun)	L	26/9/2021 1/10/2021
69.	By. Mn (6 bulan)	L	3/10/2021 7/10/2021
70.	TN. Ar (39 tahun)	L	3/10/2021 11/10/2021
71.	Ny. TI (74 tahun)	P	2/10/2021 9/10/2021
72.	Ny. H (23 tahun)	P	5/10/2021 7/10/2021
73.	Tn. A (27 tahun)	L	13/10/2021 17/10/2021
74.	Ny. Al (29 tahun)	P	13/10/2021 15/10/2021
75.	Tn. Si (49 tahun)	L	15/10/2021 18/10/2021
76.	Ny. Ha (80 tahun)	P	15/10/2021 21/10/2021
77.	Ny. Il (66 tahun)	P	20/10/2021 24/10/2021
78.	Ny. Am (72 tahun)	P	22/10/2021 30/10/2021
79.	By. Nh (1 tahun)	P	25/10/2021 29/10/2021
80.	Ny. R (48 tahun)	P	24/10/2021 28/10/2021
81.	Ny. Jm (32 tahun)	P	23/10/2021 26/10/2021
82.	Ny. Is (54 tahun)	P	24/10/2021 30/10/2021
83.	By. As (2 tahun)	L	1/11/2021 4/11/2021

84.	Tn. S (18 tahun)	L	4/11/2021 9/11/2021
85.	Ny. M (56 tahun)	P	4/11/2021 8/11/2021
86.	Ny. NI (55 tahun)	P	7/11/2021 16/11/2021
87.	Tn. H (59 tahun)	L	13/11/2021 17/11/2021
88.	Ny. S (70 tahun)	P	12/11/2021 17/11/2021
89.	Tn. Mu (56 tahun)	L	15/11/2021 19/11/2021
90.	Tn. Ar (43 tahun)	L	18/11/2021 23/11/2021
91.	Tn. Mr (2 tahun)	L	22/11/2021 26/11/2021
92.	Tn. Ld (56 tahun)	L	30/11/2021 3/12/2021
93.	Tn. Bs (41 tahun)	L	1/12/2021 4/12/2021
94.	By. As (4 bulan)	P	3/12/2021 8/12/2021
95.	Ny. Ju (53 tahun)	P	12/12/2021 18/12/2021
96.	Ny. Is (60 tahun)	P	14/12/2021 20/12/2021
97.	Tn. Ar (30 tahun)	L	24/12/2021 27/12/2021
98.	Tn. R (56 tahun)	L	24/12/2021 29/12/2021
99.	Ny. Ca (80 tahun)	P	26/12/2021 30/12/2021
100.	Tn. Yu (36 tahun)	L	28/12/2021 31/12/2021

Lampiran 5. Data Penggunaan Antibiotik Pasien Pneumonia

No	Nama Antibiotik (Dosis)	Rute Pemberian	Lama Pemberian	Waktu Pemberian
1.	Inj. Anbacim (1 g /8 jam)	iv	3 hari	Pukul 08.30, 16.30 dan 00.30
2.	Inj. Anbacim (1 g/ 8 jam)	iv	6 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
3.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
4.	Inj. Ceftazidime (540 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 16.00 dan 04.00
5.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30
6.	Inj. Ceftazidime (210 mg/12 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00 dan 22.00
7.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
8.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
9.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 14.30, 22.30 dan 06.30
10.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 11.00 dan 23.00
11.	Inj. Viccilin (396 mg/ 8 jam) + Inj. Gentamicin (7,2 mg/ 8 jam)	iv	6 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
12.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
13.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30
14.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
15.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
16.	Inj. Ceftazidime (330 mg/ 12 jam)	iv	6 hari	Pukul 17.00 dan 05.00
17.	Inj. Ceftazidime (690 mg/12 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00 dan 22.00
18.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00
19.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30

20.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
21.	Inj. Ceftazidime (180 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 11.00 dan 23.00
22.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00
23.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
24.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	3 hari	Pukul 04.00 dan 16.00
25.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00
26.	Inj. Ceftazidime (360 mg/ 12 jam)	iv	6 hari	Pukul 10.00 dan 22.00
27.	Inj. Ceftazidime (270 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamicin (18 mg/ 8 jam)	iv	7 hari	Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
28.	Cefixime (100 mg/ 12 jam)	p.o	5 hari	Pukul 08.00 dan 20.00
29.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
30.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 20.00, 04.00 dan 12.00
31.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 09.00 dan 21.00
32.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 14.00, 22.00 dan 06.00
33.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00 dan 21.00
34.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 16.00, 00.00 dan 08.00
35.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00
36.	Inj. Ceftazidime (150 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 20.00 dan 10.00
37.	Inj. Ceftazidime (225 mg/ 12 jam) + Inj. Gentamisin (15 mg/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
38.	Inj. Ceftazidime (186 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamisin (12,4 mg/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00 dan 21.00 + Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
39.	Inj. Ceftazidime (150 mg/ 12 jam)+	iv	5 hari	Pukul 11.00 dan 23.00 + Pukul

	Inj. Gentamisin (10 mg/ 8 jam)			11.00, 18.00 dan 02.00
40.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 16.00 dan 04.00
41.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 17.00 dan 05.00
42.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
43.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	7 hari	Pukul 23.00, 07.00 dan 15.00
44.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 22.00, 06.00 dan 14.00
45.	Inj. Anbacim (1gr/ 8jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
46.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
47.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
48.	Inj. Anbacim (1gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
49.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30
50.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	6 hari	Pukul 09.50, 17.50 dan 01.50
51.	Inj. Ceftazidime (720 mg/ 12 jam)	iv	7 hari	Pukul 16.30 dan 04.30
52.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
53.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00
54.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	8 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
55.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 16.00, 00.00 dan 08.00
56.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
57.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 10.30, 18.30 dan 02.30
58.	Inj. Ceftazidime (105 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamisin (7 mg/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 08.00 dan 20.00 + Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00
59.	Inj. Ceftazidime (990 mg/ 12 jam)	iv	6 hari	Pukul 11.00 dan 23.00
60.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30

61.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
62.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 23.00, 07.00 dan 15.00
63.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 13.00 dan 01.00
64.	Inj. Ceftazidime (207 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamisin (13,8 mg/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 10.00 dan 22.00 + Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
65.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 14.30, 22.30 dan 06.30
66.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	8 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
67.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 21.30, 05.30 dan 15.30
68.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00, 17.00 dan 01.00
69.	Inj. Ceftadizime (222 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 18.00 dan 06.00
70.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.45, 18.45 dan 02.45
71.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 08.30, 16.03 dan 00.30
72.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	3 hari	Pukul 11.30 dan 23.30
73.	Inj. Anbacim (1 gr/ jam)	iv	5 hari	Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
74.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 12.30, 20.30 dan 04.30
75.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.30 dan 23.30
76.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
77.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
78.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 12.00, 20.00 dan 04.00
79.	Inj. Ceftazidime (228 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamicin (15,2 mg/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 12.00 dan 00.00 + Pukul 12.00, 20.00 dan 04.00
80.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 10.00, 18.00 dan 02.00
81.	Inj. Anbacim (1 gr/ jam)	iv	4 hari	Pukul 17.00, 01.00 dan 09.00

82.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30
83.	Inj. Ceftazidime (345 mg/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 11.00 dan 23.00
84.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.00 dan 21.00
85.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 08.00, 16.00 dan 00
86.	Inj. Anbacim (1 gr/ jam)	iv	7 hari	Pukul 01.30, 09.30 dan 17.30
87.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 08.00, 16.00 dan 00.00
88.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	6 hari	Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30
89.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 15.00, 23.00 dan 07.00
90.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 09.30, 17.30 dan 01.30
91.	Inj. Ceftazidime (324 mg/ 12 jam)+ Inj. Gentamisin (21,6 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 11.00 dan 23.00 + Pukul 11.00, 19.00 dan 03.00
92.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 20.00 dan 08.00
93.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 12.20 dan 00.20
94.	Inj. Ceftazidime (177 mg/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 10.00 dan 22.00
95.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 07.30, 15.30 dan 23.00
96.	Inj. Cefotaxime (1 gr/ 8 jam)	iv	5 hari	Pukul 08.00, 15.00 dan 23.00
97.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	3 hari	Pukul 11.30, 19.30 dan 03.30
98.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	5 hari	Pukul 15.00 dan 03.00
99.	Inj. Anbacim (1 gr/ 8 jam)	iv	4 hari	Pukul 08.00, 15.00 dan 23.00
100.	Inj. Ceftriaxone (1 gr/ 12 jam)	iv	4 hari	Pukul 17.00 dan 05.00

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dwi Yuliana Sari, akrab disapa Ana. Penulis lahir di Rappang, 16 Juli 2000. Anak kedua dari pasangan bapak Drs. H. Labengnga, M. Si dan ibu Hj. Nurlela, SE., M. Adm. KP. Berasal dari daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Saat ini penulis tinggal di Kompleks Delta Mas 2 Blok G No 6. Tahun 2006, penulis mulai memasuki bangku sekolah dasar. Saat itu bersekolah di SDN 10 Pangsidi. Kemudian lanjut di SMP Negeri 1 Pangsidi dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pangsidi. Pada tahun 2018 dinyatakan lulus di program studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar melalui jalur UM-PTKIN. Selama berkuliah, penulis pernah aktif dalam lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Sidrap Cabang Maritengngae.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R