


**HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN
PREEKLAMPSIA DI RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

EVITA SARAH NASUTION

NIM: 70600119021

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evita Sarah Nasution

NIM : 70600119021

Tempat/Tgl Lahir : Rantau Prapat, 23 Agustus 1999

Jurusan : Pendidikan Dokter


Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jalan Mannuruki 2, Lorong 4A, Makassar

Judul : Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian
Preeklampsia Di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa terdapat duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian besar atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Februari 2023



Evita Sarah Nasution
NIM: 70600119021


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Evita Sarah Nasution dengan NIM 70600119021, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklampsia di RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Makassar, 13 Februari 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes., Sp.PA



dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklampsia di RS Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**” yang disusun oleh Evita Sarah Nasution dengan NIM 70600119021, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 17 Februari 2023


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.Syatirah Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Miswani Mukani Syuaib, M.Kes., Sp.PA	(.....)
Penguji II	: dr. Andi Alifia Ayu Delima, M.Kes	(.....)
Penguji III	: Dr.dr.Anna Khuzaimah, M.Kes	(.....)
Penguji IV	: Dr.H. Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr.dr.Syatirah Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis diberikan petunjuk dan kemampuan dengan segala keterbatasan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hubungan Usia dan Paritas Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar”**. Salawat serta salam tak lupa senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya tantangan dan hambatan yang dilalui. Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi kepada orang tua penulis, Ahmad Nirwan Nasution dan Atika Rahma Hasibuan, dan saudara-saudara penulis, Rahwan Yusuf Nasution dan Viona Angelya Annisa Nasution, yang selama ini selalu memberikan dukungan fisik maupun mental kepada penulis dalam melaksanakan studi dan menyugesti bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama masih ada Allah swt dan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para wakil dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto, M.Kes,Sp.JP selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Miswani Mukani Syaib, M.Kes,Sp.PA selaku dosen pembimbing 1 dan dr. Alifia Ayu Delima, M.Kes selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajar dan membimbing penulis.
5. Dosen penguji kompetensi, dr. Anna Khuzaimah, M.Kes, dan dosen penguji integrasi keislaman, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran kepada penulis.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Psikiater sekaligus dosen pengajar mata kuliah Psikiatri, dr. Mutmainnah Basit, Sp.KJ yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dan juga dr. Andi Faradila, Sp.GK,M.Kes yang selalu kebersamai sejak awal masuk di pendidikan, mendengarkan keluh kesah, dan senantiasa memberikan ruang agar penulis bisa terus berkembang.
8. Sahabat-sahabat saya, NIM 70600119031 dan Dopa Dobu (Ica, Lala, Kiki, Mute,

8. Sahabat-sahabat saya, NIM 70600119031 dan Dopa Dobu (Ica, Lala, Kiki, Mute, Uci, Rahel, Ani, dan Intan) yang senantiasa kebersamai sejak masih menjadi mahasiswa baru dan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua pihak yang memiliki andil dalam penyelesaian proposal penelitian ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Sekian dan terima kasih.

Makassar, 21 Februari 2023

Penyusun,



Evita Sarah Nasution
NIM: 70600119021

DAFTAR ISI

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Hipotesis	7
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	14
F. Tujuan Penelitian.....	19
G. Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Preeklampsia.....	21

1. Definisi Preeklampsia.....	21
2. Epidemiologi	21
3. Etiologi	22
4. Faktor Risiko	29
5. Patofisiologi.....	32
6. Tanda dan Gejala.....	33
7. Penegakan Diagnosis.....	34
8. Tatalaksana	36
9. Komplikasi dan Prognosis.....	36
B. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Preeklampsia.....	37
C. Hubungan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia	39
D. Hubungan Preeklampisa dengan Berat Bayi Lahir.....	41
E. Kajian Integrasi Keislaman.....	42
F. Kerangka Teori	45
G. Kerangka Konsep.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Desain Penelitian	47
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
C. Variabel Penelitian.....	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	48
E. Teknik Pengambilan Sampel	49
F. Teknik Pengambilan Data.....	49

G. Instrumen Penelitian	49
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
I. Alur Penelitian	51
J. Penyajian Data	52
K. Etika Penelitian	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Penelitian.....	53
B. Hasil	53
1. Analisis Univariat	53
2. Analisis Bivariat	55
C. Pembahasan	59
1. Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Preeklampsia.....	59
2. Hubungan Usia Berisiko Dengan Derajat Preeklampsia	62
3. Hubungan Paritas Dengan Kejadian Preeklampsia	64
4. Hubungan Paritas Dengan Derajat Preeklampsia	66
5. Hubungan Preeklampsia Dengan Berat Bayi Lahir.....	67
7. Keterbatasan Penelitian	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	81


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional	13
Tabel 1.2	Kajian Pustaka.....	18
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Data Ibu di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2021.....	54
Tabel 4.2	Hubungan Antara Usia dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021.....	55
Tabel 4.3	Hubungan Antara Paritas dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021.....	57
Tabel 4.4	Hubungan Antara Preeklampsia dengan Berat Bayi Lahir di RSKD IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021.....	58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Kriteria Preeklampsia.....	35
Gambar 2. Kriteria Preeklampsia Berat.....	35
Gambar 3. Sirkulasi Uteroplasenta.....	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Etiopatogenesis Preeklampsia.....	33
Bagan 2. Kerangka Teori	45
Bagan 3. Kerangka Konsep.....	46



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR SINGKATAN

- AKI : Angka Kematian Ibu
AVP : Arginin Vasopressin
BBLR : Bayi Berat Badan Lahir Rendah
Ha : Hipotesis Alternatif
Ho : Hipotesis Nol
IA : Ibu dan Anak
RI : Republik Indonesia
RSKD : Rumah Sakit Khusus Daerah
SDGs : *Sustainable Development Goals*
SPSS : *Statistical Package For the Social Science*
SWT : *subhānahū wa ta'ālā*
QS : Al-Qur'an Surat
WHO : *World Health Organization*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Evita Sarah Nasution

NIM : 70600119021

Judul : Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) pada 2021, terdapat 810 perempuan meninggal setiap harinya karena komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan, dimana preeklampsia adalah salah satu jenis hipertensi dalam kehamilan dengan usia gestasi diatas 20 minggu yang disertai dengan gangguan fungsi organ yang sebelumnya normotensi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan observasional dan menggunakan metode cross sectional. Sampel diambil dengan metode *total sampling*. Jumlah sampel sebanyak 91 yang diperoleh dari rekam medik. Data diolah dan dianalisis menggunakan uji Chi square $p < 0,05$ pada program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia ($p=0,041$), terdapat hubungan yang signifikan antara paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia ($p=0,016$), dan terdapat hubungan yang signifikan antara preeklampsia dengan kejadian BBLR ($p=0,023$). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan terdapat hubungan antara preeklampsia dengan berat bayi lahir.

Kata Kunci: Preeklampsia, Usia Ibu Hamil, Paritas Ibu Hamil, Berat Bayi Lahir

ABSTRACT

Name : Evita Sarah Nasution

NIM : 70600119021

Title : Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Based on data from the World Health Organization (WHO) in 2021, 810 women die every day due to complications during pregnancy and childbirth. Preeclampsia is a complication of pregnancy, where preeclampsia is a type of hypertension in pregnancy with a gestational age above 20 weeks accompanied by impaired organ function that was previously normotensive. The purpose of this study was to determine the relationship between age and parity of pregnant women with the incidence of preeclampsia and the relationship between preeclampsia and birth weight at the Siti Fatimah Women and Children Hospital in Makassar. This research method is a quantitative research with an observational approach and using a cross sectional method. Samples were taken by total sampling method. The number of samples was 91 obtained from medical records. Data were processed and analyzed using the Chi square test $p < 0.05$ in the SPSS program. The results showed that there was a significant relationship between the age of pregnant women and the incidence of preeclampsia ($p = 0.041$), there was a significant relationship between parity of pregnant women and the incidence of preeclampsia ($p = 0.016$), and there was a significant relationship between preeclampsia and the incidence of LBW ($p = 0.023$). The conclusion of this study is that there is a relationship between the age and parity of pregnant women with the incidence of preeclampsia and there is a relationship between preeclampsia and birth weight.

Keywords: Preeclampsia, Age of Pregnant Women, Parity of Pregnant Women, Birth Weight

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) di tahun 2021 melaporkan bahwa terdapat 810 perempuan meninggal setiap harinya akibat dari komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Terdapat sekitar 295.000 wanita meninggal setelah persalinan atau dalam masa nifas. Terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 11/100.000 kelahiran hidup di negara maju dan 462/100.000 kelahiran hidup di negara berkembang. Kejadian tingginya AKI tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meliputi perdarahan hebat yang sering kali terjadi saat postpartum, infeksi yang sering terjadi saat postpartum, komplikasi persalinan, aborsi, dan preeklampsia. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), ditargetkan untuk AKI adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO, 2021). Saat ini, AKI masih menjadi atensi yang serius. AKI adalah indikator utama dalam evaluasi keberhasilan program kesehatan ibu dan juga dapat menjadi parameter derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan dari sisi aksesibilitas dan juga kualitas (Kemenkes RI, 2021). Adapun penyebab dari AKI itu sendiri terdiri dari penyebab langsung, yaitu akibat komplikasi saat kehamilan atau persalinan dan penyebab tak langsung, yaitu akibat dari penyakit yang memang sudah ada sebelumnya ataupun saat hamil sehingga memengaruhi kehamilan maupun persalinan (Pratiwi, 2020).

Menurut Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2019, AKI terjadi sebanyak 4.221 kasus dan hipertensi dalam kehamilan menempati urutan kedua tertinggi yang terjadi sebanyak 1.066 kasus, sedangkan pada tahun 2020, AKI terjadi sebanyak 4.627 kasus dan hipertensi dalam kehamilan menempati urutan kedua tertinggi yang terjadi sebanyak 1.110 kasus (Kemenkes RI, 2019). Data terbaru, menurut Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, AKI relatif mengalami peningkatan. AKI mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 7.389 kasus dan hipertensi dalam kehamilan menempati urutan keempat tertinggi yang terjadi sebanyak 1.077 kasus (Kemenkes RI, 2021).

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu masih berfluktuasi. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 133 orang atau 85,95 per 100.000 kelahiran hidup, diantaranya mencakup kematian ibu hamil 29 orang (22%), kematian ibu bersalin 36 orang (23%), kematian ibu nifas 77 orang (55%). Adapun kematian ibu menurut usia yaitu <20 tahun terdapat 8 orang, 20-34 tahun terdapat 90 orang, dan ≥ 35 tahun terdapat 35 orang. Sedangkan pada 2021, terjadi peningkatan jumlah kematian ibu, yaitu mencapai 195 orang. Sulawesi Selatan menempati urutan lima tertinggi kematian ibu akibat hipertensi dalam kehamilan, dengan kasus sebanyak 41 orang dan preeklampsia merupakan salah satu dari penyebab tersebut (Kemenkes RI, 2021).

Data yang didapatkan dari rekam medik RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah didapatkan pada tahun 2020, jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan sebanyak 471 orang dan terdapat 29 orang yang menderita preeklampsia, dan pada

tahun 2021, jumlah ibu hamil yang melakukan pemeriksaan sebanyak 639 orang dan terdapat 92 orang yang menderita preeklampsia.

Preeklampsia adalah hipertensi yang baru terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan gangguan fungsi organ yang merupakan salah satu dari penyebab kematian ibu (Prawirohardjo, 2020). Diagnosis dari preeklampsia menurut *American College Obstetricians and Gynecologists* yaitu diperoleh dari adanya peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg pada kehamilan yang disertai dengan proteinuria $\geq 1+$ dan ≥ 300 mg/24 jam atau terdapat salah satu gangguan fungsi organ (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013). Terdapat lebih dari 4 juta ibu hamil yang mengalami preeklampsia setiap tahunnya. Diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 70.000 wanita meninggal akibat preeklampsia dan 500.000 bayi meninggal. Preeklampsia merupakan penyebab 15–20% kematian ibu hamil di seluruh dunia serta penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada janin (Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan, 2022). Etiopatomekanisme dari preeklampsia sendiri masih berupa teori yang mencakup kelainan vaskularisasi plasenta, radikal bebas, iskemi plasenta, disfungsi endotel, intoleransi imunologis antara ibu dan juga janin, adaptasi kardiovaskuler, defisiensi gizi stimulus inflamasi, dan genetik (Fillandro dkk., 2019).

Preeklampsia sangat dipengaruhi oleh faktor maternal yang meliputi usia, paritas, riwayat hipertensi sebelumnya, gemeli, dan diabetes melitus. Adapun faktor maternal yang sangat berisiko mengalami preeklampsia yaitu usia, paritas,

dan Indeks Massa Tubuh (IMT) (Karrar, 2022). Usia yang ekstrem adalah <20 tahun maupun >35 tahun. Saat masih usia <20 tahun, masih terjadi pertumbuhan seperti ukuran uterus yang belum mencapai ukuran normal untuk kehamilan sehingga dapat menyebabkan peningkatan risiko preeklampsia, sedangkan pada usia >35 tahun, terjadi degenerasi yang dapat memengaruhi pembuluh darah perifer sehingga terjadi perubahan fungsional dan struktural yang berpengaruh pada perubahan tekanan darah sehingga lebih berisiko mengalami preeklampsia (Sudarman et al., 2021). Pada nulipara maupun primipara (ibu dengan paritas <1), uterus yang baru pertama kali mengandung janin saat kehamilan akan membuat tubuh ibu beradaptasi, utamanya saat plasenta terbentuk akan terjadi iskemi, implantasi plasenta, bahan trofoblas akan diserap ke dalam sirkulasi sehingga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap angiotensin II, renin, dan aldosteron sehingga dapat menyebabkan spasme pembuluh darah dan menimbulkan sindrom preeklampsia. Sedangkan pada multipara berisiko (ibu dengan paritas >3), uterus terlalu sering teregang saat terjadi kehamilan, selain itu juga angiotensin, renin, dan aldosteron menurun sehingga termanifestasi menjadi hipertensi, proteinuria, dan juga udem (Hikmawati et al., 2021). Agar dapat mengurangi kejadian preeklampsia, meminimalisir faktor risiko dengan mendeteksi dini faktor-faktor risiko dengan mengedukasi ibu tentunya akan sangat berpengaruh untuk menekan kasus preeklampsia sehingga akan berdampak pula dengan penurunan jumlah AKI. Adapun periode usia yang aman untuk melahirkan, yaitu berada direntang usia 20-30 tahun karena pada wanita di awal atau akhir usia reproduksi sangat rentan

mengalami komplikasi. Pada usia muda dengan paritas berisiko, risikonya lebih besar mengalami komplikasi kehamilan, utamanya hipertensi (Pratiwi, 2020). Berdasarkan pemaparan dan data tersebut, hipertensi dalam kehamilan masih menjadi masalah yang perlu ditangani karena masih menjadi salah satu penyebab terbanyak kematian ibu (Kemenkes RI, 2021).

Preeklampsia merupakan suatu penyakit yang dapat mempengaruhi berat lahir bayi. Ibu hamil dengan preeklampsia dapat menimbulkan retardasi pertumbuhan janin dalam rahim yang dapat melahirkan janin menjadi jauh lebih kecil dan lemah dari yang diharapkan, sehingga sangat memungkinkan bayi lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) (Titisari et al., 2019). Menurut WHO, BBLR adalah berat saat lahir kurang dari 2.500 gram. Berat lahir rendah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berkelanjutan secara global dan signifikan. Bayi dengan BBLR meningkatkan angka kesakitan dan kematian 2 (dua) kali lipat dibanding bayi yang lahir dengan berat 2.500 atau lebih. Di dunia terdapat kejadian BBLR sekitar 15,5% yang artinya sekitar 20,6 juta bayi BBLR yang lahir setiap tahun. 96,5% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang sehingga menjadi masalah utama di negara berkembang (Martini & Dewi, 2020).

Dalam Al-Qur'an sudah digambarkan keadaan wanita hamil. Firman Allah dalam QS.Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa saat mengandung, ibu hamil mengalami kesengsaraan, kesusahan, dan juga dalam keadaan yang lemah. Pada ibu hamil juga terjadi perubahan-perubahan fisiologis yang meliputi perubahan uterus sehingga berdampak pada frekuensi buang air kecil, perubahan kulit yang biasa disebut dengan linea nigra ataupun melasma, perubahan berat badan, dan masih banyak perubahan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat hamil, keadaan ibu akan sangat berbeda dengan saat tidak hamil dan tentunya penuh tantangan karena ketika hamil penuh dengan banyak risiko yang bahkan mengancam nyawanya sendiri. Tak berhenti hanya sampai saat melahirkan, ibu juga masih harus berjuang untuk merawat bayinya. Oleh karena itu, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang harus dilakukan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika mengandung dan melahirkan, ibu mengalami kesulitan yang diakibatkan oleh berbagai macam faktor risiko yang mengancam jiwanya. Salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kematian tersebut ialah preeklampsia yang merupakan salah satu penyebab AKI tertinggi. Angka AKI di tahun ini pun meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, faktor predisposisi yang menyebabkan hipertensi dalam kehamilan, khususnya preeklampsia diteliti oleh penulis agar dapat mengedukasi dan membuat masyarakat lebih sadar dan waspada untuk menghindari faktor risiko tersebut dan nantinya dapat meminimalisir faktor-faktor risiko sehingga jumlah AKI juga dapat menurun dan *outcome* kelahiran, yaitu berat bayi lahir dapat optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

“Apakah ada hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir?”

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H₀)

- a. Tidak terdapat hubungan usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.
- b. Tidak terdapat hubungan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.

- c. Tidak terdapat hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Terdapat hubungan usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.
- b. Terdapat hubungan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.
- c. Terdapat hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Dependen					
1.	Preeklampsia	Preeklampsia adalah tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg atau hipertensi yang baru terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan gangguan fungsi organ yang merupakan salah satu dari penyebab kematian ibu.	Melihat data rekam medis pasien.	Pasien yang didiagnosis preeklampsia berdasarkan American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013: a. Kriteria Preeklampsia: Tekanan darah sistolik antara $\geq 140-160$ mmHg, tekanan darah diastolik $\geq 90-110$ mmHg dan terdapat minimal 1 gejala:	Nominal

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Proteinuria : dipstick > +1 atau > 300 mg/24jam 2. Serum kreatinin > 1,1 mg/Dl 3. Edema paru 4. Peningkatan fungsi hati > 2 kali 5. Trombosit < 100.000 6. Nyeri kepala, nyeri epigastrium dan gangguan penglihatan. <p>b. Kriteria Preeklampsia Berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekanan darah sistolik \geq160 mmHg dan atau tekanan darah 	
--	--	--	---	--

			<p>diastolik ≥ 110 mmHg yang diukur pada dua kali kesempatan selama lebih 4 jam sementara pasien berada di tempat tidur.</p> <p>2. Trombositopenia (jumlah trombosit kurang dari 100.000 / mikroliter).</p> <p>3. Gangguan fungsi hati seperti yang ditunjukkan oleh konsentrasi enzim hati yang tidak normal.</p> <p>4. Insufisiensi ginjal progresif (konsentrasi kreatinin serum lebih besar dari 1,1 mg / dL atau dua kali lipat konsentrasi kreatinin</p>	
--	--	--	--	--

				serum jika tidak ada penyakit ginjal lainnya).	
				5. Edema paru.	
				6. Gangguan penglihatan.	
Variabel Independen					
2.	Usia Ibu	Perhitungan durasi kehidupan seseorang dengan parameter tahun yang dihitung sejak seseorang dilahirkan.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis.	Menurut Prawirohardjo Sarwono, 2020: -Usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) -Usia tidak berisiko (20-35 tahun)	Nominal
3.	Paritas Ibu	Jumlah anak yang pernah dikandung dan dilahirkan	Data sekunder yang diambil	Menurut Prawirohardjo Sarwono, 2020: - Berisiko (<2 atau >3)	Ordinal

		oleh ibu hamil dengan berat badan ≥ 500 gram.	melalui rekam medis.	- Tidak Berisiko (2-3)	
4.	Berat Bayi Lahir	Penimbangan terhadap berat badan bayi yang dilakukan setelah satu jam bayi tersebut dilahirkan	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis.	Menurut Ro A, Goldberg RE, Kane JB, 2018: - BBLR <2500 gram - Tidak BBLR (Normal 2500-3999 gram dan Makrosomia ≥ 4000 gram)	Nominal

Tabel 1.1 Definisi Operasional

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berfokus pada ilmu kesehatan ibu dan anak, penelitian ini dilakukan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar untuk mengetahui hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dengan melihat status rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.

E. Kajian Pustaka

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan, 2022	Hubungan Usia Ibu Hamil dengan Tingkat Kejadian Preeklampsia di Rumah	Penelitian analitik dengan desain <i>case control</i> .	42 kasus preeklampsia dan 563 tidak preeklampsia.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu.	Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dan kejadian preeklampsia.

		Sakit Umum Haji Medan				
2.	Darmawan Alifia Nurdani, dkk. 2021	Analisis Faktor- Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di Rsia Sitti Khadiyah 1 Periode Agustus- Oktober 2019	Observation al analitik dengan <i>cross</i> <i>sectional</i> .	45 sampel dengan rincian 38 ibu hamil dengan preeklampsia dan 7 preeklampsia berat.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu dan data primer dengan interview dan penggunaan kuisisioner.	Terdapat hubungan signifikan antara usia ibu, riwayat hipertensi, dan riwayat preeklampsia ibu sebelumnya terhadap kejadian preeklampsia, dan tidak terdapat hubungan signifikan antara status

						pendidikan, status pekerjaan, kepatuhan ANC, riwayat DM, jarak kehamilan, paritas, status gizi, dan status ekonomi ibu terhadap kejadian preeklampsia.
3.	Harun Ayatullah,dkk. 2019	Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Preeklampsia di	Penelitian analitik dengan melakukan pendekatan	195 sampel.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu	Tidak ada hubungan antara usia ibu dan paritas dengan kejadian preeklampsia,

		RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2019	<i>cross sectional study.</i>			Terdapat hubungan antara usia kehamilan ibu dan riwayat hipertensi terhadap kejadian preeklampsia.
4.	Martadiansyah Abarhham,dkk. 2019	Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Memengaruhinya	Penelitian observasional dengan melakukan pendekatan <i>cross sectional study.</i>	89 sampel dalam setahun sehingga total selama 3 tahun yaitu sebanyak 267 sampel.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu	Usia maternal, pekerjaan, IMT, jarak kehamilan, dan riwayat hipertensi dalam kehamilan memiliki hubungan yang signifikan

		di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Studi Prevalensi Tahun 2015, 2016, 2017).			dengan preeklampsia.
--	--	--	--	--	-------------------------

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Mengetahui hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis hubungan usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- b. Menganalisis hubungan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- c. Menganalisis hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

G. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Mediator dalam memperkaya pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang sudah didapatkan selama studi terutama mengenai hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

b. Bagi Pengetahuan

Dapat dijadikan sumber parameter bahan bacaan untuk penelitian berikutnya yang berfokus pada bidang kesehatan ibu dan anak.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi untuk masyarakat mengenai hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar sehingga masyarakat dapat meminimalisir faktor risiko yang berkaitan dengan preeklampsia.

d. Bagi Instansi

1. Bentuk dedikasi kepada institusi dalam memberikan informasi data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir.
2. Salah satu bentuk pengaplikasian tri dharma perguruan tinggi, yaitu di bidang penelitian sehingga bisa dijadikan parameter untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Preeklampsia

1. Definisi Preeklampsia

Preeklampsia ialah hipertensi yang memiliki onset setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria (Prawirohardjo, 2020). Preeklampsia adalah keadaan saat berkurangnya perfusi organ akibat vasospasme dan aktivasi endotel yang sangat khas dengan tanda utama, yaitu hipertensi dan proteinuria di usia kehamilan 20 minggu dan mayoritas nampak pada usia kehamilan 37 minggu, akan tetapi dapat pula timbul kapan saja pada pertengahan kehamilan (Lumbanraja, 2017). Preeklampsia ialah salah satu penyulit dalam kehamilan yang dapat menyebabkan sakit berat, cacat jangka panjang, dan juga kematian, baik kematian ibu, janin, maupun neonatus (Hikmawati et al., 2021). Preeklampsia disebut sebagai “sindrom preeklampsia” karena merupakan kelainan yang ditandai dengan beberapa gejala spesifik dalam kehamilan karena terlibatnya banyak sistem organ (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

2. Epidemiologi

Preeklampsia dan eklampsia masih menyumbang angka kematian ibu yang sangat tinggi secara global. Preeklampsia menyebabkan lebih dari 50.000 kematian ibu di seluruh dunia per tahun dengan frekuensi yang bervariasi secara geografis.

Negara industri mengalami peningkatan hipertensi dalam kehamilan dengan Afrika-Amerika memiliki risiko kematian lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Amerika-India dan Asia (Phipps et al., 2019).

Menurut Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2021, AKI di Indonesia sendiri mengalami peningkatan, utamanya dalam 1 tahun terakhir. Pada tahun 2020 lalu, AKI terjadi sebanyak 4.627 kasus, sedangkan pada tahun 2021, AKI mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 7.389 kasus. Kematian ibu akibat hipertensi dalam kehamilan menempati urutan keempat tertinggi yang terjadi sebanyak 1.077 kasus (Kemenkes RI, 2021).

Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu masih berfluktuasi. Jumlah kematian ibu pada tahun 2020 sebanyak 133 orang atau 85,95 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada 2021, terjadi peningkatan jumlah kematian ibu, yaitu mencapai 195 orang. Sulawesi Selatan menempati urutan lima tertinggi kematian ibu akibat hipertensi dalam kehamilan, dengan kasus sebanyak 41 orang dan preeklampsia merupakan salah satu dari penyebab tersebut (Kemenkes RI, 2021).

3. Etiologi

Pada dasarnya, etiologi dari preeklampsia masih belum diketahui secara pasti. Preeklampsia lebih sering ditemukan pada wanita hamil yang terpajan vili korialis pertama kali atau dalam konteksnya yaitu primigravida atau primipaternitas. Terpajan vili korialis berlebihan contohnya pada mola hidatidosa, terdapat riwayat

penyakit ginjal atau kardiovaskuler, dan terdapat riwayat keluarga yang preeklampsia/eklampsia (Mose & Setyorini Irianti, 2012). Selain itu, banyak teori yang mencoba menjelaskan terkait etiologi preeklampsia walaupun hingga saat ini belum ada yang memuaskan. Oleh karena itu, Zweifel menyebutkan bahwa preeklampsia ialah *the disease of theories*. Adapun teori-teori tersebut, yaitu

a. Teori Vaskularisasi Plasenta

Normalnya, uterus dan plasenta memperoleh aliran darah melalui cabang-cabang arteri uterina dan arteri ovarika yang menembus miometrium dan menjadi arteri arkuata lalu nantinya akan bercabang menjadi arteri radialis, selanjutnya arteri radialis akan bercabang lagi menjadi arteri spiralis (Prawirohardjo Sarwono, 2020). Saat terjadi kehamilan, nantinya proliferasi trofoblas akan menginvasi desidua basalis dan miometrium ke dalam 2 tahap. Tahap pertama, yaitu saat sel trofoblas endovaskuler menginvasi arteri spiralis dengan mengganti endotel dan merusak jaringan elastis pada tunika media dan jaringan otot polos dinding arteri, selain itu juga mengganti dinding arteri dengan materi fibrinoid dan akan selesai prosesnya di akhir trimester I. Pada tahap kedua, yaitu di usia kehamilan 14-16 minggu, sel-sel trofoblas menginvasi arteri spiralis lebih dalam hingga mencapai ke dalam miometrium. Proses-proses tersebut membuat turunnya resistensi vaskuler dan meningkatkan aliran darah di uteroplacenta, selain itu juga membuat aliran darah ke janin yang cukup banyak dan juga perfusi jaringan yang meningkat sehingga janin dapat tumbuh dengan baik. Proses tersebut disebut dengan *remodelling* arteri spiralis.

Remodelling arteri spiralis tersebut sangat penting untuk proses dilatasi yang cukup sehingga perfusi darah ke plasenta meningkat dan nutrisi yang optimal dapat terjaga antara sirkulasi ibu dan janin (Lumbanraja, 2017).

Pada kasus preeklampsia, terjadi gagalnya proses *remodelling* sehingga arteri spiralis kaku dan keras dan mengakibatkan tidak terjadinya distensi dan vasodilatasi. Hal tersebut membuat aliran darah uteroplasenta turun dan mengakibatkan terjadinya hipoksia dan iskemi plasenta. Terdapat 2 hal yang menjadi landasan gagalnya proses tersebut, yaitu yang pertama karena tidak semua arteri spiralis mengalami invasi oleh sel-sel trofoblas sehingga sebagian arteriola masih memiliki endotel dan lapisan muskularnya dan tidak terjadi pelebaran diameter sehingga timbul vasospasme yang pada akhirnya akan menyebabkan iskemi. Adapun yang kedua, yaitu pada arteri spiralis yang mengalami invasi, yang pada tahap pertama invasi masih normal, akan tetapi pada sel trofoblas yang menginvasi di tahap kedua tidak berlangsung sehingga bagian arteri spiralis di dalam miometrium tetap memiliki dinding muskuloelastik yang reaktif sehingga hal tersebut berarti masih ada resistensi vaskuler. Hal tersebut membuat gangguan aliran darah di daerah intervili yang menyebabkan penurunan perfusi ke plasenta sehingga terjadi iskemik dan hipoksia di plasenta (Lumbanraja, 2017).

b. Teori Iskemik Plasenta, Radikal Bebas, dan Disfungsi Endotel

Teori ini berkaitan dengan teori vaskularisasi plasenta yang menyimpulkan bahwa pada preeklampsia, terdapat invasi tofoblas yang inadekuat pada arteri

spiralis sehingga mengakibatkan gagalnya *remodelling* arteri spiralis. Kegagalan *remodelling* tersebut berdampak pada terjadinya hipoperfusi plasenta sehingga terjadi iskemi plasenta, lalu merangsang pembentukan radikal bebas, yaitu radikal hidroksil (-OH) yang bersifat sangat toksik yang akan merusak membran sel yang banyak mengandung asam lemak tak jenuh menjadi peroksida lemak, lalu peroksida lemak tadi juga akan merusak nukleus dan protein sel endotel (Lumbanraja, 2017). Pada dasarnya, terjadinya vasospasme bersama dengan radikal bebas mengakibatkan adanya jejas endotel yang merupakan awal pelepasan zat-zat vasoaktif yang nantinya mengakibatkan timbulnya sindrom preeklampsia (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

c. Teori Adaptasi Kardiovaskuler

Secara fisiologis, saat terjadi kehamilan, pembuluh darah tidak peka dengan rangsangan vasopresor karena lindungan dari sintesis prostaglandin di sel endotel pembuluh darah. Pada hipertensi dalam kehamilan, pembuluh darah menjadi sangat peka terhadap bahan vasopresor. Hal tersebut terjadi karena kepekaan pembuluh darah terhadap bahan vasopresor sudah hilang. Peningkatan kepekaan pada kehamilan tersebut yang nantinya akan menjadi hipertensi dalam kehamilan dapat ditemukan pada usia gestasi 20 minggu (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Pada kehamilan didapatkan bahwa terdapat adanya peningkatan copeptin di akhir trimester 2 atau awal trimester 3, dimana copeptin ini merupakan peptida penting dalam pembentukan dan sekresi Arginin Vasopressin (AVP)

yang memiliki efek menarik cairan melakukan reabsorpsi cairan pada tubular renal ke dalam vaskuler dan memberikan efek vasokonstriksi pada vaskuler sehingga kedua kombinasi ini akan meningkatkan tekanan darah secara drastis. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka progres terjadinya preeklampsia akan meningkat dan akan memengaruhi maternal secara sistemik. AVP dan copeptin juga terindikasi memiliki hubungan dengan disregulasi pada sistem imun yang juga dapat mengakibatkan pembentukan preeklampsia akibat inflamasi tersebut (Santillan et al., 2014).

d. Teori Intoleransi Immunologi

Preeklampsia lebih sering ditemukan pada primigravida, hiperplasentosis, kehamilan dengan inseminasi donor. Adanya reaksi penolakan janin oleh ibu diakibatkan oleh adanya perubahan histologis di perbatasan sel/jaringan ibu dan plasenta sehingga terjadi gangguan pembentukan *blocking antibodies* di daerah tersebut, utamanya pada primigravida atau multigravida dengan suami atau sperma yang baru dan biasanya akan semakin sempurna pembentukannya pada kehamilan berikutnya (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

e. Teori Genetik

Hipertensi dalam kehamilan tak terlepas dari keturunan dan famili. Preeklampsia itu sendiri ialah kelainan multifaktor dan poligenetik (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

Genotipe ibu lebih mendominasi apabila dibandingkan dengan genotipe janin. Hal tersebut terbukti dengan hasil penelitian ibu dengan preeklampsia,

26% anak perempuannya akan preeklampsia dan hanya 8% anak menantu yang preeklampsia (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Pada penelitian yang menggunakan Genome Wide Association Scans (GWAS) juga ditemukan hasil yang sama, yaitu ibu yang pernah atau memiliki riwayat mengalami preeklampsia akan menyebabkan keturunannya memiliki peluang kemungkinan besar mengalami hal yang sama karena gen yang diturunkan juga menurunkan faktor predisposisi yang besar kemungkinannya mengalami preeklampsia juga seperti keturunan hipertensi dan keturunan diabetes yang keduanya merupakan dua faktor predisposisi kuat seseorang mengalami preeklampsia (Steinhorsdottir et al., 2020).

f. Teori Defisiensi Gizi

Pada penelitian terakhir, mengonsumsi minyak ikan dapat mengurangi risiko preeklampsia. Hal tersebut terjadi karena pada minyak ikan terdapat banyak asam lemak tak jenuh yang bisa menghambat produksi tromboksan dan aktivasi trombosit serta mencegah vasokonstriksi pembuluh darah. Pada penelitian lain disebutkan bahwa terjadinya defisiensi kalsium mengakibatkan risiko terjadinya preeklampsia (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Terjadinya defisiensi vitamin D akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan pada sistem imun terutama pada sistem Th1 dan Th2 sehingga Th1 akan mengalami pembentukan yang berlebihan dan membuatnya aktif tidak terkendali yang nantinya akan berujung pada kesalahan pada pengenalan terhadap embrio sehingga sistem imun akan menyerang embrionya

sendiri sehingga hal ini akan berujung pada terjadinya inflamasi yang akan mengakibatkan preeklampsia karena efek oleh mediator-mediator inflamasi dan mediator yang dilepaskan oleh sistem imun akan juga merusak sistem dari vasodilatasi pembuluh darah sehingga pembuluh darah akan cenderung mengalami vasokonstriksi yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah (Behjat Sasan et al., 2017).

g. Teori Stimulus Inflamasi

Pada preeklampsia, stres oksidatif mengalami peningkatan dan peningkatan tersebut sinkron dengan produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas. Hal tersebut mengakibatkan beban reaksi inflamasi dalam darah ibu meningkat sangat drastis lalu akan memicu aktivasi sel endotel dan sel makrofag/granulosit yang lebih besar sehingga menyebabkan reaksi sistemik inflamasi yang bermanifestasi menjadi gejala preeklampsia (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Pada teori stimulus inflamasi, terjadi peningkatan kerja dari agen pro-inflamatori dan penurunan agen anti inflamasi. Peningkatan agen pro-inflamasi seperti TNF- α , interleukin -6 dan interleukin-17, normalnya memang banyak di produksi selama kehamilan namun juga terjadi penurunan agen anti inflamasi sehingga penyebaran agen pro-inflamasi dalam darah semakin menjadi leluasa dalam menyerang plasenta yang berujung pada beberapa masalah pada area plasenta, plasenta mengalami gangguan disfungsi vaskuler akibat efek samping pada jantung dan juga pembuluh darah makin tidak dapat menggunakan kemampuannya dalam ber vasodilatasi sehingga pembuluh darah juga ini

sebenarnya akan memberikan efek samping berupa tekanan darah meningkat dan berujung pada kerusakan ginjal akibat tekanan darah yang tinggi sehingga protein akan lebih gampang keluar bersamaan dengan prosesi buang air kecil (Harmon et al., 2016).

4. Faktor Risiko

Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya preeklampsia. Adapun faktor risiko yang dimaksud, yaitu meliputi:

a. Status Paritas

Pada primipara, uterus yang baru pertama kali mengandung janin saat kehamilan akan membuat tubuh ibu beradaptasi, utamanya saat plasenta terbentuk akan terjadi iskemi, implantasi plasenta, bahan trofoblas akan diserap ke dalam sirkulasi sehingga dapat meningkatkan sensitivitas terhadap angiotensin II, renin, dan aldosteron sehingga dapat menyebabkan spasme pembuluh darah dan menimbulkan sindrom preeklampsia. Pada multipara dan juga grandemultipara, uterus terlalu sering teregang saat terjadi kehamilan, selain itu juga angiotensin, renin, dan aldosteron menurun sehingga termanifestasi menjadi hipertensi, proteinuria, dan juga udem (Hikmawati et al., 2021).

b. Hiperplasentosis

Hiperplasentosis adalah kelainan trofoblas yang merupakan faktor risiko preeklampsia karena trofoblas yang berlebihan dapat menurunkan perfusi uteroplasenta yang akan memengaruhi aktivasi endotel dan mengakibatkan

terjadinya vasospasme, di mana vasospasme adalah patofisiologi dasar kejadian preeklampsia. Adapun contoh kasus hiperplacentosis adalah pada kasus mola hidatidosa, diabetes melitus, kehamilan multiple, dan makrosomia (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

c. Usia

Dalam hal ini, yaitu usia ekstrem pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun ataupun lebih dari 35 tahun berisiko mengalami preeklampsia. Hal ini berkaitan dengan fisik dan psikis pada ibu hamil yang masih muda belum siap mengalami kehamilan dan persalinan. Pada ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun cenderung terjadi disfungsi diastolik yang berhubungan dengan berkurangnya tingkat estrogen pada ibu hamil yang lanjut, dimana hormon estrogen berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsi jantung dalam memengaruhi metabolisme di mitokondria, dan pada penelitian terbaru ditemukan bahwa rendahnya estrogen-2 (E2) plasma dapat memicu terjadinya preeklampsia (Hinele et al., 2021).

d. Riwayat Preeklampsia/Eklampsia

Ibu primigravida dengan riwayat preeklampsia/eklampsia memiliki risiko 7 kali lipat mengalami preeklampsia di kehamilan berikutnya (Wilkerson & Ogunbodede, 2019).

e. Riwayat Penyakit

Beberapa riwayat penyakit seperti diabetes meningkatkan terjadinya preeklampsia hingga 4 kali lipat karena diabetes akan menimbulkan stres oksidatif yang dapat berujung pada inflamasi sistemik termasuk pembuluh darah maternal dan sampai ke plasenta akan mengalami peradangan. Riwayat hipertensi kronik juga akan sangat menambah tingkat kemungkinan terjadinya preeklampsia karena sejak awal sudah memiliki tekanan darah tinggi, maka dengan segala perubahan fisiologis, akan besar kemungkinan mengalami preeklampsia, bahkan penyakit ginjal juga meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia karena ginjal sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pengaturan fungsi regulasi cairan tubuh yang nantinya berpengaruh ke volume darah yang tentunya sangat memengaruhi tekanan darah (Wilkerson & Ogunbodede, 2019).

f. Obesitas

Ibu hamil dengan obesitas atau $IMT \geq 25\text{kg/m}^2$ berisiko mengalami preeklampsia karena terjadinya peningkatan adiponektin yang menekan ekspresi molekul adhesi pada sel endotelial vaskuler dan sitokin (Pratiwi Dian, 2020).


g. Asupan Makanan

Asupan makan dapat berhubungan dengan preeklampsia karena pola makan selama kehamilan akan memengaruhi kondisi ibu dan janin. Kekurangan sumber antioksidan seperti vitamin E, vitamin C, vitamin D, selenium, dan zink menyebabkan peningkatan radikal bebas di darah sehingga menyebabkan terjadinya stres oksidatif.

5. Patofisiologi

Pada dasarnya, vasospasme merupakan awal dari terjadinya preeklampsia. Vasospasme ialah gagalnya invasi trofoblas ke dalam lapisan otot polos pembuluh darah, reaksi imunologis, ataupun radikal bebas yang menyebabkan terjadinya jejas endotel lalu mengakibatkan kadar vasokonstriktor dan vasodilator tidak seimbang serta gangguan sistem pembekuan darah (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

Terdapat teori yang dikenal dengan ‘teori 2 tahap/*two-stage disorder*’ yang memberikan penjelasan mengenai etiopatogenesis preeklampsia yang terilustrasi pada bagan di bawah:



Bagan 1. Etiopatogenesis Preeklamsia

(Mose & Setyorini Irianti, 2012)

6. Tanda dan Gejala

Preeklamsia adalah suatu sindrom dengan penanda utama hipertensi dan proteinuria pada usia gestasi lebih dari 20 minggu pada ibu hamil yang sebelumnya normotensi. Hipertensi dan proteinuria yang baru saja terjadi pada kehamilan merupakan definisi klasik preeklamsia. Jika hanya terdapat hipertensi, maka kondisi tersebut tidak tergolong preeklamsia karena pada preeklamsia harus didapatkan gangguan organ spesifik akibat dari preeklamsia tersebut (Persatuan

Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2016). Gejala-gejala seobjektif lainnya ialah gangguan penglihatan, sakit kepala hebat karena vasospasme atau edema otak, nyeri epigastrium, dan edem (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

7. Penegakan Diagnosis

Seperti yang disebutkan sebelumnya, preeklampsia ialah hipertensi yang baru terjadi pada kehamilan dengan usia gestasi di atas 20 minggu yang disertai dengan gangguan organ, maka apabila hanya terdapat hipertensi, kejadian tersebut tidak termasuk dalam preeklampsia. Parameter untuk hipertensi ialah dengan batas sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg. Mayoritas kasus preeklampsia ditegakkan dengan adanya proteinuria, akan tetapi jika tidak didapatkan proteinuria, maka salah satu gejala dan gangguan lain dapat dijadikan untuk penegakan diagnosis, seperti gangguan ginjal dengan penanda kreatinin serum $> 1,1$ mg/dL atau meningkatnya kadar kreatinin serum tanpa ada kelainan ginjal yang lain, gangguan hepar dengan penanda meningkatnya konsentrasi transaminase 2 kali normal dan atau adanya nyeri daerah epigastrium serum kreatinin $> 1,1$ mg/dL, udem paru, peningkatan fungsi hati lebih dari 2 kali, trombosit $< 100.000/mm^3$, nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium (Mose & Setyorini Irianti, 2012).

Kriteria Minimal Preeklampsia	
Hipertensi	:Tekanan darah sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolik pada dua kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama
Dan	
Protein urin	:Protein urin melebihi 300 mg dalam 24 jam atau tes urin dipstik > positif 1
Jika tidak didapatkan protein urin, hipertensi dapat diikuti salah satu dibawah ini:	
Trombositopeni	:Trombosit < 100.000 / mikroliter
Gangguan ginjal	:Kreatinin serum diatas 1,1 mg/dL atau didapatkan peningkatan kadar kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi dimana tidak ada kelainan ginjal lainnya
Gangguan Liver	:Peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal dan atau adanya nyeri di daerah epigastrik / regio kanan atas abdomen
Edema Paru	
Gejala Neurologis	:Stroke, nyeri kepala, gangguan visus
Gangguan Sirkulasi	:Oligohidramnion, <i>Fetal Growth Restriction</i> (FGR) atau didapatkan
Uteroplasenta	adanya <i>absent or reversed end diastolic velocity</i> (ARDV)

Gambar 1. Kriteria Preeklampsia
(Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2016)

Kriteria Preeklampsia berat (diagnosis preeklampsia dipenuhi dan jika didapatkan salah satu kondisi klinis dibawah ini :	
Hipertensi	:Tekanan darah sekurang-kurangnya 160 mmHg sistolik atau 110 mmHg diastolik pada dua kali pemeriksaan berjarak 15 menit menggunakan lengan yang sama
Trombositopeni	:Trombosit < 100.000 / mikroliter
Gangguan ginjal	:Kreatinin serum diatas 1,1 mg/dL atau didapatkan peningkatan kadar kreatinin serum dari sebelumnya pada kondisi dimana tidak ada kelainan ginjal lainnya
Gangguan Liver	:Peningkatan konsentrasi transaminase 2 kali normal dan atau adanya nyeri di daerah epigastrik / regio kanan atas abdomen
Edema Paru	
Gejala Neurologis	:Stroke, nyeri kepala, gangguan visus
Gangguan Sirkulasi	:Oligohidramnion, <i>Fetal Growth Restriction</i> (FGR) atau didapatkan
Uteroplasenta	adanya <i>absent or reversed end diastolic velocity</i> (ARDV)

Gambar 2. Kriteria Preeklampsia Berat
(Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, 2016)

8. Tatalaksana

Tatalaksana yang sistematis dan terstruktur dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas akibat dari preeklampsia. Prinsip dari penatalaksanaan preeklampsia/eklampsia terdiri dari:

- a. Mencegah/mengatasi kejang
- b. Menurunkan tekanan darah
- c. Berhati-hati cairan
- d. Melahirkan bayi di sikon yang optimal untuk ibu dan juga bayi (Lumbanraja, 2017).

Tatalaksana komprehensif dilakukan dengan edukasi istirahat dan restriksi garam, terapi aspirin dosis rendah, terapi antihipertensi, suplementasi kalsium, suplementasi antioksidan, dan manajemen aktif perawatan preeklampsia. Perawatan primer berupa pencegahan kejang preeklampsia-eklampsia dilakukan dengan pemberian $MgSO_4$ yang merupakan antikonvulsan (Amalia, 2020).

9. Komplikasi dan Prognosis

Komplikasi yang paling buruk dari preeklampsia ialah kematian ibu dan janin. Komplikasi maternal dari preeklampsia meliputi terjadinya eklampsia, sindrom *hemolysis, elevated liver enzyme, low platelet count* (HELLP) yang terjadi karena adanya peningkatan enzim hati dan penurunan trombosit, ablasi retina, gagal ginjal, udem paru, kerusakan hati, penyakit kardiovaskuler, dan gangguan syaraf,

sedangkan komplikasi pada janin meliputi terjadinya pertumbuhan janin terhambat, prematuritas, dan fetal distress (Lumbanraja, 2017).

B. Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Preeklampsia

Usia ibu adalah salah satu faktor predisposisi yang berpengaruh cukup besar pada kejadian preeklampsia. Mayoritas preeklampsia didapatkan pada masa awal dan akhir usia reproduktif, yaitu usia remaja atau di atas 35 tahun (Baiti & Cahyanti, 2018).


Usia ekstrem pada ibu hamil adalah kurang dari 20 tahun ataupun lebih dari 35 tahun. Usia tersebut berisiko mengalami preeklampsia. Hal ini berkaitan dengan fisik dan psikis pada ibu hamil yang masih muda belum siap mengalami kehamilan dan persalinan. Pada ibu hamil yang berusia lebih dari 35 tahun cenderung terjadi disfungsi diastolik yang berhubungan dengan berkurangnya tingkat estrogen pada ibu hamil yang lanjut, dimana hormon estrogen berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsi jantung dalam memengaruhi metabolisme di mitokondria, dan pada penelitian terbaru ditemukan bahwa rendahnya estrogen-2 (E2) plasma dapat memicu terjadinya preeklampsia (Hinelo et al., 2021). Ibu dengan usia lebih dari 35 tahun juga tentunya akan mengalami perubahan fisiologis tubuh, seperti spasme, aktivasi berlebihan sistem koagulasi, dan gangguan hormonal, ditambah seiring bertambahnya usia maka dinding pada pembuluh darah akan mengalami penebalan dan mengeras dikarenakan keelastisitasannya berkurang sehingga tekanan darah

akan meningkat dan ini tentunya akan berujung ke peningkatan kemungkinan terjadinya preeklampsia. (Martadiansyah et al., 2019).

Pada ibu hamil yang sudah memasuki usia melebihi 35 tahun, faktor-faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia juga akan semakin meningkat, penyakit penyakit kronis seperti diabetes melitus dan hipertensi bahkan kerusakan atau kelainan pada ginjal dan jantung juga akan sangat memengaruhi terjadinya preeklampsia. Diabetes sendiri memiliki kecenderungan mengakibatkan stres oksidatif ditambah dengan hipertensi yang sebagian besar akan dialami pada orang-orang yang sudah menua juga menambah parah keadaan ibu hamil sehingga tingkat terjadinya preeklampsia akan semakin meningkat. Kerusakan ginjal juga akan memengaruhi kemungkinan terjadinya preeklampsia karena ginjal sendiri memiliki peranan penting dalam mengatur keseimbangan cairan termasuk regulasi dari tekanan darah itu sendiri sehingga bila ginjal mengalami gangguan tentu akan sangat berdampak pada sistem yang mengatur tekanan darah. Kerusakan pada organ jantung juga akan berdampak pada kejadian preeklampsia dikarenakan jantung sendiri merupakan bagian dari sistem kardiovaskuler yang sangat memengaruhi keadaan tekanan darah (Sari et al., 2021).

Teori yang berkesinambungan dengan hubungan usia ibu dengan kejadian preeklampsia adalah teori iskemik plasenta dan radikal bebas yang membahas mengenai gagalnya *remodelling* arteri spiralis. Usia <20 tahun dan >35 tahun dapat menyebabkan gagalnya *remodelling* arteri spiralis karena plasenta yang mengalami iskemi sehingga membuat hipoperfusi plasenta akibat iskemi plasenta, lalu memicu

pembentukan radikal bebas yang sangat toksik, yaitu radikal hidroksil yang dapat merusak membran sel yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak, lalu peroksida lemak akan merusak nukleus dan protein sel endotel sehingga kejadian tersebut mengakibatkan preeklampsia.



Gambar 3. Sirkulasi Uteroplasenta
(Cunningham, 2018)

C. Hubungan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia

Paritas adalah jumlah janin yang pernah dilahirkan hidup maupun mati dengan berat badan ≥ 500 gram. Nulipara dan primipara (ibu dengan paritas <1) lebih berisiko tinggi apabila dibandingkan dengan multipara, terutama pada primipara muda. Pada wanita dengan paritas >3 , bahaya pada masa kehamilan yang dapat timbul salah satunya adalah preeklampsia yang disebabkan karena paritas yang tinggi akan menyebabkan aliran darah menurun ke plasenta sehingga terjadi gangguan plasenta dan mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin. Jika merujuk

pada paritas, maka paritas yang tidak berisiko adalah pada paritas ke 2-3. (Prawirohardjo Sarwono, 2020).

Preeklampsia disebut sebagai penyakit kehamilan pertama karena tingginya angka kejadian pada paritas berisiko (ibu dengan paritas <1). Baik pada nulipara maupun primipara, keduanya berisiko lebih besar mengalami preeklampsia dibandingkan dengan multipara dikarenakan kematangan yang belum mencapai targetnya sehingga ada banyak organ bagian tubuh yang belum siap menerima dan harus mencoba menyesuaikan dulu terhadap perkembangan janin tersebut (Nurbaniwati, 2021). Teori yang berkesinambungan dengan hubungan paritas dengan kejadian preeklampsia adalah teori intoleransi imunologis, di mana pada primigravida akan terpapar vili korionik pertama kalinya, sedangkan respon imun Human Leukocyte Antigen-G (hLA-G) belum terbentuk sempurna dan cenderung sangat protektif sehingga mengganggu invasi trofoblas ke desidua arteri spiralis dan menyebabkan kegagalan *remodelling* pembuluh darah pada peredaran darah uteroplasenta (Martadiansyah et al., 2019). Adanya reaksi penolakan janin oleh ibu diakibatkan oleh adanya perubahan histologis di perbatasan sel/jaringan ibu dan plasenta sehingga terjadi gangguan pembentukan *blocking antibodies* di daerah tersebut, utamanya pada primigravida atau multigravida dengan suami atau sperma yang baru hal ini dikarenakan pada pergantian pasangan maka sistem imun dari ibu akan mencoba menyesuaikan dengan sperma dari pasangan barunya, dan biasanya akan semakin sempurna pembentukannya pada kehamilan berikutnya sampai nanti setelah melewati beberapa kehamilan maka risiko mengalami preeklampsia akan

kembali dikarenakan uterus yang sudah terlalu sering mengalami peregangan akhirnya menjadi tidak sempurna lagi untuk dijadikan tempat tumbuh berkembangnya janin dan malah akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin (Mose & Setyorini Irianti, 2012). Pada paritas berisiko (ibu dengan paritas >3), lingkungan endometrium di sekitar tempat implantasi kurang sempurna dan tidak siap menerima hasil konsepsi sehingga pemberian nutrisi dan oksigenisasi ke hasil konsepsi kurang sempurna dan mengakibatkan pertumbuhan hasil konsepsi akan terganggu dan meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia (Tarigan & Yulia, 2019).

D. Hubungan Preeklampsia dengan Berat Bayi Lahir

Tumbuh dan kembang bayi di dalam janin sangat dipengaruhi dengan banyak faktor, termasuk faktor dari ibu, seperti bagaimana keadaan umum ibu, kebiasaan ibu sehari-hari, dan bagaimana ibu merawat dirinya. Tumbuh kembang bayi di dalam rahim tentu saja akan memengaruhi ukuran bayi saat lahir. Salah satu hal yang dipengaruhi adalah berat bayi. Berat bayi sangat dipengaruhi dengan jumlah pasokan nutrisi dan oksigen ke janin di dalam rahim, dimana semakin banyak pasokan nutrisi dan oksigen ke janin di dalam rahim, maka akan semakin ideal berat badan lahir bayi. Akan tetapi, bila terjadi masalah pada pasokan nutrisi dan oksigen yang mengakibatkan janin tidak mendapatkan pasokan nutrisi dan oksigen yang cukup, maka hal ini akan memicu lahirnya anak yang memiliki berat badan lahir yang rendah (Wubetu et al., 2021). Normalnya berat badan bayi yang lahir memiliki

berat 2500 gram sampai dengan 4000 gram. Jika berat badan lahir di bawah 2500 gram, maka kondisi ini dapat dikatakan sebagai berat badan lahir rendah (BBLR). Bayi yang terlahir dengan BBLR memiliki banyak risiko kesehatan yang dapat terjadi, sehingga BBLR menjadi salah-satu hal yang pemerintah masih mencoba mengatasinya (Gill et al., 2013; Shantanam & MUELLER, 2018).

E. Kajian Integrasi Keislaman

Dalam Islam sudah dijelaskan awal proses penciptaan manusia, dalam rahim seorang ibu. Selain itu, terdapat juga proses perkembangan seorang manusia seperti firman Allah dalam QS.Al-Mu'minun/23:12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik.”

Dari ayat tersebut, Allah merupakan sebaik-baiknya pencipta. Tanah yang dimaksudkan di ayat tersebut menjelaskan mengenai representatif dalam pembuatan Adam. Saripati tanah berasal dari makanan manusia, tumbuhan maupun

hewan yang berasal dari tanah. Sari pati tanah adalah yang diproduksi oleh saluran pencernaan dari bahan makanan lalu menjadi darah yang kemudian berproses hingga menjadi sperma saat koitus. Arti kata نطفة (sedikit air yang bisa menumpahi) adalah ketika terjadinya koitus, yaitu saat bertemunya sel sperma dan ovum (Shihab, 2017).

Bertemunya sperma dan ovum nantinya akan membelah dan terus membelah. Tiap-tiap sel baru membentuk jalinan yang kuat di antara mereka. Setelah mulai terbentuk, sel-sel calon manusia itu mencari tempat berlabuhnya di dinding rahim atau uterus ibu. Sel-sel tersebut melekat kuat dan membentuk jaringan penghubung antara si calon manusia dengan ibu. Jaringan penghubung ini biasa kita kenal sebagai plasenta. Tahap inilah yang dalam dunia kedokteran modern disebut zigot. Hal ini menunjukkan tanda kekuasaan Allah swt sekaligus kebenaran Al-Qur'an.

Sembari membangun interaksi dengan sang ibu, sel-sel baru itu terus diatur oleh Allah swt untuk membelah hingga menjadi segumpal daging kemudian membelah dan membentuk bagian-bagian tubuh manusia. Tangan, kaki, kepala, jantung, otak, dan semua organ terbentuk dengan bimbingan Allah swt. Setelah semua bagian lengkap, Allah swt menyempurnakan bentuknya menjadi bentuk yang sama sekali berbeda dari saat pertama kali sperma dan ovum bertemu.

Dalam proses perkembangan manusia dalam rahim menjadikan seorang ibu mengalami kesulitan sudah digambarkan oleh Allah swt dalam QS. Al-Ahqaf/46:15


وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اأَنُدَّهُ وَبَلَغَ اأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اأُوزِعْنِي أَن اأَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي اأَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَن اأَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
نُذِبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika mengandung dan melahirkan, ibu sangat bersusah payah bahkan hingga mengorbankan dirinya sendiri, dalam hal ini, yaitu salah satunya ibu memiliki berbagai macam faktor risiko yang mengancam jiwanya. Salah satu faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kematian tersebut ialah preeklampsia yang merupakan salah satu penyebab AKI tertinggi.


F. Kerangka Teori



Bagan 2. Kerangka Teori

(Abraham Martadiansyah, Anugrah Qalbi, n.d.; Birukov et al., 2019; Martadiansyah et al., 2019; Martini & Dewi, 2020; Raia-Barjat et al., 2021)

G. Kerangka Konsep



Keterangan:



: variable dependen



: variabel independen



: variabel independen yang tidak diteliti



: hubungan yang diteliti

Bagan 3. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* yang mempelajari kolerasi antara paparan atau faktor risiko (*independent*) dengan akibat atau efek (*dependent*). Pengumpulan data dilakukan serentak bersamaan dalam satu waktu, jadi semua variabel, yaitu variabel dependen dan independen diobservasi pada waktu yang sama (Anggita.I., 2018). Desain studi ini difokuskan untuk menganalisis hubungan antara usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2022 di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah usia dan paritas ibu hamil dan berat bayi lahir.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi merupakan objek maupun subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulan (Anggita.I., 2018). Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu hamil dengan preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada tahun 2021, yaitu sebanyak 91 kasus.

2. Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *total sampling*. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu hamil yang didiagnosis mengalami preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 kasus preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada tahun 2021. Adapun kriteria inklusi untuk sampel adalah:

- 1) Ibu hamil dengan preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- 2) Memiliki data rekam medik yang lengkap di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Sedangkan untuk kriteria eksklusi untuk sampel kasus adalah:

- 1) Ibu yang memiliki riwayat penyakit ginjal.
- 2) Ibu yang mengalami kehamilan ganda.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *total sampling*. *Total sampling* adalah pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi (Anggita.I., 2018). Sampel didapatkan dengan memperoleh data ibu hamil yang mengalami preeklampsia melalui rekam medik RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2021.

F. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu melalui data rekam medik ibu hamil yang mengalami preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2021.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah data rekam medik pasien yang menjadi sampel penelitian di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2021.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang telah diperoleh terdiri dari beberapa langkah yang meliputi pengecekan kembali dengan memeriksa kelengkapan dan kebenaran data (*editing*), lalu dilanjutkan dengan tahap pengkodean jawaban (*coding*), memindahkan data ke master tabel (*transferring*), dan yang terakhir adalah menyusun data dalam tabel distribusi frekuensi untuk meringkas data yang masuk ke dalam tabel yang telah disiapkan agar proses analisa data menjadi lebih muda (*tabulating*) (Anggita.I., 2018).

2. Analisis Data


a. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah suatu analisis yang dilakukan pada masing-masing variabel secara deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari variabel dependen serta variabel independen (Anggita.I., 2018).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas yang diteliti, yaitu usia ibu, paritas ibu, dan berat bayi lahir dengan variabel terikat, yaitu kejadian preeklampsia. Analisis bivariat pada penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Chi Square* dengan bantuan software uji statistik (Anggita.I., 2018).

I. Alur Penelitian



J. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk tabel dan penjelasan data dijelaskan dalam bentuk narasi.

K. Etika Penelitian

Peneliti sudah mendapatkan *ethical clearance* dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan dan Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebelum dilakukannya penelitian. Penelitian juga dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal yang meliputi:

- a. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian dengan tidak mencantumkan identitas lengkap pasien atau nomor rekam medik pasien saat proses pengambilan data, akan tetapi dengan menggunakan inisial nama sebagai keterangan yang bertujuan untuk menjaga privasi pasien dan kerahasiaan data rumah sakit.
- b. Masing-masing subjek penelitian mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama untuk diacak dan diambil sebagai sampel penelitian.
- c. Memberikan kebermanfaatan dengan mengetahui hubungan antara usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSKD IA Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jalan Gunung Merapi No.75, Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji hubungan usia ibu, paritas ibu, dan berat bayi lahir dengan kejadian preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar tahun 2021. Data yang dikumpulkan diambil dari data rekam medik dan dicatat melalui table bantu penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel 2010 dan *Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) for Windows 23*.

B. Hasil

1. Analisis Univariat

Tujuan dari analisis univariat adalah untuk mengetahui karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 91 sampel. Adapun distribusi sampel penelitian tersebut, yaitu:

ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Data Ibu di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2021

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia Ibu Hamil		
<20 atau >35 Tahun	40	44.0
20-35 Tahun	51	56.0
Paritas Ibu Hamil		
Berisiko (<2 atau >3)	48	52.7
Tidak Berisiko (2-3)	43	47.3
Berat Bayi Lahir		
BBLR	39	42.9
Tidak BBLR	52	57.1

Sumber: Data Sekunder, Rekam Medik RSKD IA Siti Fatimah (2021)

Pada tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik ibu berdasarkan usia dan paritas serta berat bayi lahir. Berdasarkan karakteristik usia dengan penggolongan usia berisiko (<20 tahun dan >35 tahun) dan tidak berisiko (20-35 tahun), sebagian besar terdiri dari tidak berisiko (20-35 tahun), yaitu sebanyak 51 orang (56,0%). Berdasarkan karakteristik paritas dengan penggolongan paritas berisiko (1 kali melahirkan dan >3 kali melahirkan) dan paritas tidak berisiko (2-3 kali melahirkan) sebagian besar terdiri dari paritas berisiko dengan 48 kasus (52,7%). Selanjutnya untuk berat bayi lahir dengan penggolongan BBLR dan tidak BBLR, sebagian besar terdiri dari berat bayi lahir tidak BBLR, yaitu 52 bayi (54,9%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir. Dalam penelitian ini, setiap variabel independen akan diuji ada atau tidaknya hubungan dan uji kebermaknaan dengan variabel dependen. Adapun analisis hubungan variabel usia dan paritas dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hubungan Antara Usia Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021

Usia Ibu Hamil	Diagnosis		Total	<i>p-value</i>	PR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
<20 atau >35 Tahun	26 (28.6%)	14 (44.0%)	40 (44.0%)	0.041	2.653	1.127-6.246
20-35 Tahun	21 (23.1%)	30 (33.0%)	51 (56.0%)			
Total	47 (51.6%)	44 (48.4%)	91 (100.0%)			

Sumber: SPSS, 2023

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia berisiko (<20 tahun atau >35 tahun) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 26 orang (28.6%) dan yang mengalami preeklampsia sebanyak 14 orang (44,0%), sedangkan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 21 orang (23,1%) dan mengalami preeklampsia sebanyak 30 orang (33,0%).

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,041$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara usia ibu dengan kejadian preeklampsia. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 2,063 dengan 95% CI 1,127-6,246 menunjukkan bahwa ibu dengan usia <20 atau >35 tahun berisiko 2 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu dengan usia 20-35 tahun.

Tabel 4.3 Hubungan Antara Paritas dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD
IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021

Paritas Ibu Hamil	Diagnosis		Total	p-value	PR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
Berisiko (<2 atau >3)	31 (34.1%)	17 (18.7%)	48 (52.7%)			
Tidak Berisiko (2-3)	16 (17.6%)	27 (29.7%)	43 (47.3%)	0.016	3.077	1.308-7.241
Total	47 (51.6%)	44 (48.4%)	91 (100.0%)			

Sumber: SPSS, 2023

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden ibu dengan paritas berisiko (<2 kali melahirkan dan >3 kali melahirkan) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 31 orang (34,1%) dan preeklampsia sebanyak 17 orang (18,7%) dan paritas tidak berisiko (2-3 kali melahirkan) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 16 orang (17,6%) dan yang mengalami preeklampsia sebanyak 27 orang (29,7%).

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,016$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara paritas ibu dengan kejadian preeklampsia. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 3,077 dengan 95% CI 1,308-7,241 menunjukkan bahwa ibu dengan paritas berisiko (<2 kali melahirkan dan >3 kali melahirkan) berisiko 3 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan dengan ibu dengan paritas tidak berisiko (2-3 kali melahirkan).

Tabel 4.4 Hubungan Antara Preeklampsia dengan Berat Bayi Lahir di RSKD
IA Siti Fatimah Makassar Tahun 2021

Berat Bayi Lahir	Diagnosis		Total	<i>p-value</i>	PR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
BBLR	26 (28.6%)	13 (14.3%)	39 (42.9%)	0.023	2.952	1.242-7.019
Tidak BBLR	21 (23.1%)	31 (34.1%)	52 (57.1%)			
Total	47 (51.6%)	44 (48.4%)	91 (100.0%)			

Sumber: SPSS, 2023

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa berat bayi lahir BBLR (berat bayi lahir <2500 gram) dengan ibu riwayat preeklampsia berat sebanyak 26 bayi (28,6%) dan ibu dengan riwayat preeklampsia sebanyak 13 bayi (14,43%), sedangkan pada jumlah bayi tidak

BBLR (berat bayi >2500) dengan ibu riwayat preeklampsia berat sebanyak 21 bayi (14,3%) dan ibu riwayat preeklampsia sebanyak 31 bayi (34,1%).

Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,023$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara preeklampsia dengan berat bayi lahir. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 2,952 dengan 95% CI 1,242-7,019 menunjukkan bahwa ibu dengan preeklampsia berisiko 3 kali lebih besar melahirkan bayi dengan BBLR dibandingkan dengan ibu dengan tidak preeklampsia.

C. Pembahasan

1. Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Preeklampsia

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh usia ibu dengan kejadian preeklampsia dari 91 sampel, berdasarkan hasil pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan usia berisiko (<20 tahun atau >35 tahun) yang mengalami preeklampsia sebanyak 26 orang (28,6%) dan yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 14 orang (44,0%), sedangkan ibu dengan usia tidak berisiko (20-35 tahun) yang mengalami preeklampsia sebanyak 21 orang (23,1%) dan mengalami preeklampsia berat sebanyak 30 orang (33,0%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,041$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara usia kehamilan dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan pada tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan sampel sebanyak 42 kelompok kasus dan 42 kelompok kontrol didapatkan hasil $p\text{-value}=0,000$ yang artinya usia ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Dari kesimpulan penelitian, ibu dengan usia hamil berisiko di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Alifia Nurdani, dkk pada tahun 2021 di RSIA Siti Khadijah 1 dengan sampel sebanyak 45 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSIA Siti Khadijah 1.

Ibu hamil dengan usia kehamilan yang terlalu muda di bawah 20 atau yang sudah melewati usia 35 ke atas lebih besar risikonya mengalami preeklampsia. Usia yang terlalu muda, di bawah 20 tahun, membuat seorang ibu yang hamil untuk pertama kalinya akan terkejut secara fisik dan psikisnya, sehingga membutuhkan waktu untuk melakukan adaptasi terhadap fungsi-fungsi tubuh seperti regulasi hormon yang mungkin baru saja mengalami haid dan sekarang harus mengubah lagi regulasi hormonnya sehingga membuat sang ibu rahim dan plasentanya nanti tidak akan siap dalam perubahan atau *remodelling* arteri spiralis yang tentunya akan berujung ke pelepasan zat-zat berbahaya dan

inflamasi sekitar sehingga mengakibatkan kerusakan aliran atau pasokan darah sehingga dapat mengakibatkan preeklampsia. Usia kehamilan yang juga terlalu tua, di atas 35 tahun, bisa menjadi faktor risiko terjadinya preeklampsia karena saat sudah melewati usia 35 tahun, fungsi degeneratif tubuh seorang ibu akan dimulai dan hal ini tentu memengaruhi keadaan kehamilan seorang ibu. Pada ibu yang sudah berusia 35 tahun ke atas, pembentukan estrogen sudah mulai berkurang, sedangkan estrogen sangat memengaruhi banyak rantai fungsional sistem pada tubuh termasuk dalam fungsi jantung sampai ke metabolisme mitokondria. Estrogen memengaruhi kontraktilitas jantung sehingga kurangnya jumlah estrogen akan memengaruhi kontraktilitas jantung dan mengakibatkan fungsi diastol ventrikel kiri bermasalah sehingga hal ini akan berujung pada kurangnya darah yang dikeluarkan dari jantung dan akan terjadi penumpukan darah di ventrikel kiri yang berujung pada terhambatnya aliran darah yang masuk dari paru-paru ke bagian kiri jantung dan akan mengakibatkan hipertensi pulmonal. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan menimbulkan hipertensi secara umum pada tubuh ibu dan ditambah semakin kakunya dinding pembuluh darah seiring dengan usia yang bertambah akan mendukung terbentuknya keadaan hipertensi yang tentunya dapat mengakibatkan preeklampsia bila ibu dalam keadaan hamil. Tidak hanya itu, penambahan usia diatas 35 juga dapat berujung pada tumbuhnya penyakit-penyakit degeneratif lainnya selain hipertensi tadi seperti diabetes melitus tipe 2, kerusakan ginjal dan lain-lainnya

yang akan memperparah keadaan ibu. (Brosens et al., 2015; Hinele et al., 2021; Martadiansyah et al., 2019; Sari et al., 2021; Shumin Li, n.d.)

Pada penelitian ini usia ibu hamil merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia. Faktor risiko merupakan faktor yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian preeklampsia dalam hal ini ibu yang memiliki usia saat hamil tidak ideal, terlalu muda (dibawah 20 tahun) atau terlalu tua (diatas 35 tahun), dapat berisiko tinggi mengalami preeklampsia. Oleh karena itu, diharapkan seorang perempuan memiliki perencanaan usia dalam mempersiapkan kehamilan dengan melakukan tindakan pencegahan seperti penggunaan kontrasepsi setelah menikah bila usia belum mencukupi ideal untuk kehamilan.

2. Hubungan Usia Berisiko Dengan Derajat Preeklampsia

Salah satu faktor risiko terjadinya preeklampsia adalah usia ibu. Ibu hamil yang berumur <20 tahun atau >35 tahun berisiko lebih besar mengalami preeklampsia berat (Laput & Dkk, 2016). Teori ini sinkron dengan hasil penelitian pada tabel 4.2, dimana usia berisiko lebih banyak yang mengalami preeklampsia berat daripada preeklampsia.

Ibu dengan usia muda atau <20 tahun lebih rentan mengalami ketegangan akibat belum siapnya secara psikologis, hal ini dapat menimbulkan ketegangan pada ibu yang bisa berdampak pada munculnya stress. Pada umur

kehamilan muda, sering kali ibu mengalami rasa ambivalen pada trimester pertama ditambah lagi rasa mual muntah dan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Sedangkan ibu yang berusia di atas 35 tahun (*Advanced Maternal Age* (AMA)) memiliki risiko 4,5 kali lipat menderita preeklampsia berat (Tyas et al., 2020). Usia ibu yang semakin tua akan meningkatkan resiko gangguan medis kronis. Peningkatan usia akan berbanding lurus dengan stres oksidatif, dimana ketika usia meningkat, maka stres oksidatif juga akan meningkat. Nantinya, stres oksidatif akan berperan dalam pembentukan radikal hidroksil yang merupakan senyawa oksidan. Senyawa tersebut dapat merusak membran sel yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh, sehingga akan membentuk peroksidase lipid yang bersifat toksik. Peroksidase lipid tersebut akan merusak membran nukleus dan protein sel endotel sehingga akan mengakibatkan disfungsi endotel vaskular yang berperan besar dalam terjadinya tekanan darah tinggi pada preeklampsia. Disfungsi endotel mengakibatkan gangguan metabolisme vasodilator prostasiklin (PGE₂) karena prostasiklin diproduksi oleh sel endotel. Dampak dari gangguan tersebut ialah berkurangnya produksi prostasiklin sebagai vasodilator kuat dan akan terjadi agregasi sel trombosit pada sel endotel yang rusak sehingga menyebabkan produksi berlebihan vasokonstriktor tromboksan (TXA₂). Pada preeklampsia dengan komplikasi, kadar tromboksan jauh lebih tinggi dibandingkan kadar prostasiklin sehingga terjadi vasokonstriksi terus menerus dan peningkatan tekanan darah.

Selanjutnya disfungsi endotel akan menyebabkan gangguan yang lebih luas seperti perubahan struktur sel endotel kapiler glomerulus (glomerular endotheliasis), peningkatan produksi endotelin sebagai bahan vasospresor, peningkatan permeabilitas sehingga lebih tinggi kemungkinan untuk mengalami preeklampsia berat (Nyoman Hartati et al., 2018).

3. Hubungan Paritas Dengan Kejadian Preeklampsia

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh paritas dengan kejadian preeklampsia dari 91 sampel, berdasarkan hasil pada tabel 4.3 memperlihatkan ibu dengan paritas berisiko (<2 kali melahirkan dan >3 kali melahirkan) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 31 orang (34,1%) dan preeklampsia sebanyak 17 orang (18,7%) dan paritas tidak berisiko (2-3 kali melahirkan) yang mengalami preeklampsia berat sebanyak 16 orang (17,6%) dan yang mengalami preeklampsia sebanyak 27 orang (29,7%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,016$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara paritas ibu dengan kejadian preeklampsia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Ariesta pada tahun 2018 di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan sampel sebanyak 133 kelompok kasus dan 133 kelompok kontrol didapatkan hasil $p\text{-value}=0,001$ yang artinya paritas ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dari kesimpulan

penelitian ibu dengan paritas berisiko yaitu nulipara, primipara dan multipara berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi Yulita pada tahun 2021 di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan sampel sebanyak 130 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Ibu hamil yang baru pertama kali hamil nulipara maupun primipara yang berisiko memiliki tingkat kemungkinan terjadinya preeklampsia sangat tinggi, hal ini karena pada wanita yang pertama kali hamil akan mengalami perubahan drastis pada tubuhnya, dimana perubahan tersebut sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya sehingga akan ada adaptasi-adaptasi yang dialami wanita selama masa kehamilan pertamanya. Kematangan tubuh, termasuk uterus atau rahim ibu, sangat memengaruhi tingkat kemungkinan terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklampsia. Respon imun seperti Human Leukocyte Antigen-G yang masih aktif-aktifnya akan menganggap bagian dari plasenta seperti vilus korionik merupakan benda asing, hal ini akan memicu reaksi imun dan akan mengganggu proses invasi trofoblas ke sel desidua arteri spiral dan menyebabkan kegagalan *remodelling* arteri spiral yang menjadi peredaran darah uteroplasenta. Jika penolakan oleh imun ini terus-menerus terjadi, maka dapat memicu terbentuknya *Blocking Antibodi* di area tersebut dan akan terus-menerus menyerang plasenta dan akan mengganggu aliran

darah ke janin yang berujung pada terjadinya preeklampsia. Hal ini akan berkurang saat terjadi kehamilan-kehamilan selanjutnya sampai pada kehamilan tertentu (multipara berisiko) dan akan kembali akibat uterus yang terus-menerus digunakan akan meregang dan menjadi lemah dindingnya sehingga sudah tidak sekuat dan selayak dulu bagi janin untuk berimplantasi dan berkembang (Galaviz-hernandez et al., 2019; Martadiansyah et al., 2019; Mose & Setyorini Irianti, 2012; Tarigan & Yulia, 2019).

Pada penelitian ini, paritas ibu merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia. Faktor risiko merupakan faktor yang dapat berpotensi menimbulkan kejadian preeklampsia. Ibu yang memiliki paritas berisiko, yaitu paritas nol dan pertama (nulipara dan primipara) atau paritas lebih dari 3 (multipara berisiko) berisiko tinggi mengalami preeklampsia. Oleh karena itu, diharapkan seorang ibu memiliki perencanaan dan persiapan dalam mempersiapkan kehamilan pertama dan atau kehamilan yang sudah lebih dari 3 dengan melakukan tindakan pencegahan seperti penggunaan kontrasepsi setelah hamil anak ketiga dan mempertimbangkan bila ingin memiliki anak lebih dari tiga.

4. Hubungan Paritas Dengan Derajat Preeklampsia

Paritas <1 atau kehamilan adalah kehamilan yang baru pertama kali diproses dalam tubuh ibu, dimana alat reproduksi belum matang untuk hamil sedangkan pada wanita yang telah berulang kali mengalami

persalinan, kondisi tubuhnya mengalami regenerasi dan penurunan fungsi tubuh serta otot-otot serabut dalam rahim yang mengalami kemunduran dan kemungkinan untuk terkena preeklampsia berat lebih besar.

Ibu yang memiliki paritas >3 berisiko mengalami preeklampsia berat dibandingkan ibu yang memiliki paritas 1–3. Pada multipara berisiko, lingkungan endometrium disekitar tempat implantasi kurang sempurna dan tidak siap menerima hasil konsepsi, sehingga pemberian nutrisi dan oksigenisasi kepada hasil konsepsi kurang sempurna dan mengakibatkan pertumbuhan hasil konsepsi akan terganggu sehingga dapat menambah risiko terjadinya preeklampsia berat.

5. Hubungan Preeklampsia Dengan Berat Bayi Lahir

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh preeklampsia dengan berat bayi lahir dari 91 sampel, berdasarkan hasil pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah BBLR (berat bayi lahir <2500 gram) dengan ibu riwayat preeklampsia berat sebanyak 26 bayi (28,6%) dan ibu dengan riwayat preeklampsia sebanyak 13 bayi (14,43%), sedangkan pada jumlah bayi tidak BBLR (berat bayi >2500) dengan ibu riwayat preeklampsia berat sebanyak 21 bayi (14,3%) dan ibu riwayat preeklampsia sebanyak 31 bayi (34,1%). Hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,023$ atau $p<0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara preeklampsia dengan berat bayi lahir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyuni dan Erika Puspitasari pada tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul Wonosari dengan sampel sebanyak 170 kelompok kasus dan 170 kelompok kontrol didapatkan hasil $p\text{-value}=0,004$ yang artinya preeklampsia pada ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Kidul Wonosari. Dari kesimpulan penelitian ibu hamil dengan preeklampsia berpeluang lebih besar untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir yang rendah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Risnawati dan Ely Kurniati pada tahun 2018 di Rumah Sakit Umum H. Andi Sultan di Radja Bulukumba dengan sampel sebanyak 45 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara ibu hamil yang mengalami preeklampsia dengan tingkat kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah di Rumah Sakit Umum H. Andi Sultan di Radja Bulukumba.

Ibu hamil yang mengalami preeklampsia memiliki tingkat kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pada ibu hamil yang mengalami preeklampsia terjadi kerusakan ataupun disfungsi pada endotel pembuluh darah sehingga hal ini akan mengakibatkan vasospasme dan mengakibatkan pembuluh darah pada uteroplasenta mengalami konstriksi sehingga ibu hamil akan mengalami pengurangan aliran darah pada uteroplasenta dan akan

mengakibatkan kurangnya pasokan oksigen dan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Janin akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat dan cenderung terhambat, bila hal ini terus menerus terjadi maka bayi dapat mengalami beberapa komplikasi kedepannya termasuk bayi lahir dengan berat badan yang rendah (Dwi Wahyuni, 2021; Risnawati, 2018).

Pada penelitian ini, preeklampsia pada ibu hamil merupakan faktor risiko terhadap kelahiran bayi yang mengalami berat badan lahir rendah. Faktor risiko merupakan faktor yang dapat berpotensi menimbulkan kelahiran bayi yang mengalami berat badan lahir rendah, yaitu dalam hal ini ibu yang memiliki preeklampsia dapat berisiko tinggi melahirkan bayi yang mengalami berat badan lahir rendah. Oleh karena itu, diharapkan seorang ibu memiliki perencanaan dan persiapan dalam mempersiapkan kehamilan-kehamilannya dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya preeklampsia dengan melakukan tindakan pencegahan seperti melakukan *screening* dengan rutin mengikuti jadwal ANC dan memperhatikan faktor-faktor risiko preeklampsia sejak dini.

6. Hubungan Derajat Preeklampsia Dengan Berat Bayi Lahir

Semakin berat preeklampsia yang diderita oleh ibu, maka berat bayi yang dilahirkan semakin rendah, begitu pula sebaliknya, semakin ringan preeklampsia yang diderita ibu, maka berat badan bayi yang dilahirkan tidak

terlalu rendah (Nyoman Hartati et al., 2018). Pada hasil tabel 4.4, ibu dengan preeklampsia berat lebih banyak yang melahirkan bayi yang BBLR daripada ibu yang mengalami preeklampsia. Hal ini terjadi akibat terjadinya disfungsi endotel maternal yang lebih parah apabila dibandingkan dengan preeklampsia sehingga terjadi iskemia plasenta dan menyebabkan sirkulasi plasenta terganggu serta berkurang dan menyebabkan bayi tidak mendapatkan pasokan nutrisi serta oksigen yang cukup sehingga menimbulkan BBLR.

Akan tetapi, pada tabel 4.4 juga tidak semua kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) dilahirkan dari ibu hamil dengan preeklampsia. Meskipun kedua kejadian ini saling berhubungan, namun kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) tidak selalu disebabkan karena ibu dengan preeklampsia karena masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan bayi berat lahir rendah (BBLR) antara lain usia kehamilan preterm, kehamilan ganda, perdarahan antepartum dan lain-lain (Titisari et al., 2019).

Selain itu juga, terdapat bayi yang tidak BBLR dengan riwayat ibu preeklampsia. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti seorang ibu yang memiliki perencanaan dan persiapan dalam mempersiapkan kehamilan-kehamilannya dan menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya dampak preeklampsia terhadap *outcome* kelahiran dengan melakukan tindakan pencegahan seperti melakukan screening dengan rutin mengikuti jadwal ANC

dan memperhatikan faktor-faktor risiko preeklampsia sejak dini (Titisari et al., 2019).

7. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSKD IA Siti Fatimah Makassar dari November-Desember 2022 untuk mengetahui hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir memiliki beberapa keterbatasan selama penelitian yang meliputi:

- a. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan rekam medik yang tidak *balance* sehingga data rekam medik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
- b. Penelitian ini menggunakan data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan usia dan paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan hubungan preeklampsia dengan berat bayi lahir, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar tahun 2021 dengan *p-value* sebesar 0,041.
2. Terdapat hubungan antara paritas ibu hamil dengan kejadian preeklampsia di RSKD IA Siti Fatimah Makassar tahun 2021 dengan *p-value* sebesar 0,016.
3. Terdapat hubungan antara preeklampsia dengan berat bayi lahir di RSKD IA Siti Fatimah Makassar tahun 2021 dengan *p-value* sebesar 0,023.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih banyak lagi *outcome* kelahiran bayi agar memperoleh ruang lingkup studi yang lebih luas mengenai hubungan preeklampsia dengan *outcome* kelahiran bayi.
2. Bagi petugas kesehatan diharapkan untuk dapat memberikan edukasi secara rutin terutama kepada ibu dan meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya kehamilan yang berisiko untuk mencegah risiko kejadian preeklampsia.

3. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor kejadian preeklampsia sehingga dapat menerapkan pencegahan agar dapat mencegah preeklampsia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. F. (2020). Pengaruh Penggunaan MgSO₄ Sebagai Terapi Pencegahan Kejang pada Preeklampsia. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 7(1).
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013). Hypertension in Pregnancy. *The American College of Obstetricians and Gynecologists*, 122(5), 1124.
- Anggita.I., M. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan. Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK)*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Baiti, B. N., & Cahyanti, R. D. (2018). Kualitas Rujukan Ibu Hamil dengan Preeklampsia/Eklampsia di UGD Obstetri-Ginekologi RSUP Dr. Kariadi Semarang Periode Tahun 2013-2016. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 7(1), 81–99.
- Behjat Sasan, S., Zandvakili, F., Soufizadeh, N., & Baybordi, E. (2017). The Effects of Vitamin D Supplement on Prevention of Recurrence of Preeclampsia in Pregnant Women with a History of Preeclampsia. *Obstetrics and Gynecology International*, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/8249264>
- Brosens, I., Benagiano, G., & Brosens, J. J. (2015). *The potential perinatal origin of placentation disorders in the young primigravida*. *May*, 580–585.
- Cunningham, F. G. (2018). *Obstetri Williams* (23rd ed., Vol. 1). EGC.
- Dwi Wahyuni, Erika Puspitasari. (2021). View of The Relationship Between Preeclampsia and Low Birth Weight (Lbw) In Wonosari, Gunungkidul Regional Hospital (1).pdf. *Epidemiology and Society Health Review*, 3.
- Fillandro, J., Setyawan, D., Wiryanthini Ida Ayu Dewi, & Tianing, N. W. (2019). Gambaran Kadar Protein Urine Pada Ibu Hamil Preeklampsia dan Eklampsia di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2017. *Medika Udayana*, 8(12). <https://ojs.unud.ac.id>

- Galaviz-hernandez, C., Sosa-macias, M., Teran, E., Garcia-ortiz, J. E., Lazalde-ramos, B. P., & Galaviz-hernandez, C. (2019). *Paternal Determinants in Preeclampsia*. 9(January), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01870>
- Harmon, A. C., Cornelius, D. C., Amaral, L. M., Faulkner, J. L., Cunningham, M. W., Wallace, K., & LaMarca, B. (2016). The role of inflammation in the pathology of preeclampsia. In *Clinical Science* (Vol. 130, Issue 6, pp. 409–419). Portland Press Ltd. <https://doi.org/10.1042/CS20150702>
- Hikmawati, Purnamasari, N. I., & Rahmawati. (2021). 8. Jurnal Alamiah Obsgyn: Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Obsgin*, 13(3).
- Hinelo, K., Sakung, J., & Pramana, C. (2021). Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 8(4).
- Karrar, S. A., & Hong, P. L. (2022). Preeclampsia. *NCBI Bookshelf. A Service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570611/>
- Kemenkes RI. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia 2019*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Kemenkes RI.
- Lumbanraja, S. N. (2017). *Kegawatdaruratan Obstetri*. USU Press.
- Martadiansyah, A., Qalbi, A., & Santoso, B. (2019). Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Studi Prevalensi Tahun 2015, 2016, 2017). *Sriwijaya Journal of Medicine*, 2(1), 14–25.
- Mose, J. C., & Setyorini Irianti. (2012). *Obstetri Patologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi* (D. Martaadisoebata, F. F. Wirakusumah, & J. S. Effendi, Eds.; 3rd ed.).

- Nurbaniwati, N. (2021). Gambaran Faktor Risiko dan Tanda Klinis Pasien Bersalin Dengan Preeklampsia. *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, 7(1). <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/tumed>
- Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2016). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Diagnosis dan Tata Laksana Preeklampsia. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 6–9.
- Phipps, E. A., Thadhani, R., Benzing, T., & Karumanchi, S. A. (2019). Pre-eclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. In *Nature Reviews Nephrology* (Vol. 15, Issue 5, pp. 275–289). Nature Publishing Group. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0119-6>
- Pratiwi Dian. (2020). Faktor Maternal yang Mempengaruhi Kejadian Preeklampsia Pada Kehamilan. *Jurnal Medika Utama*, 2(1).
- Prawirohardjo Sarwono. (2020). *Ilmu Kebidanan* (Saifuddin Abdul Bari, Ed.; 4th ed.). PT.Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Risnawati, E. K. (2018). View of The Relationship Between Preeclampsia And Low Birth Weight Infants In H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba (1).pdf. *Jurnal Life Birth*, 2.
- Santillan, M. K., Santillan, D. A., Scroggins, S. M., Min, J. Y., Sandgren, J. A., Pearson, N. A., Leslie, K. K., Hunter, S. K., Zamba, G. K. D., Gibson-Corley, K. N., & Grobe, J. L. (2014). Vasopressin in preeclampsia: A novel very early human pregnancy biomarker and clinically relevant mouse model. *Hypertension*, 64(4), 852–859. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.114.03848>
- Sari, A. R., Titisari, I., & Sendra, E. (2021). The Correlation of Maternal Age and the Incidence of Preeclampsia at Aura Syifa Hospital. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 8(3), 368–372. <https://doi.org/10.26699/jnk.v8i3.art.p368-372>
- Abraham Martadiansyah, Anugrah

- Qalbi, B. S. (n.d.). *Martadiansyah, A., Qalbi, A., & Santoso, B. (2019). Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang , (1).pdf.*
- Birukov, A., Andersen, L. B., Herse, F., Rakova, N., Kitlen, G., Kyhl, H. B., Golic, M., Haase, N., Kräker, K., Müller, D. N., Jørgensen, J. S., Andersen, M. S., Dechend, R., & Jensen, B. L. (2019). Aldosterone, Salt, and Potassium Intakes as Predictors of Pregnancy Outcome, including Preeclampsia. *Hypertension*, 74(2), 391–398. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.119.12924>
- Brosens, I., Benagiano, G., & Brosens, J. J. (2015). *The potential perinatal origin of placentation disorders in the young primigravida. May*, 580–585.
- dwi wahyuni, elika puspitasari. (2021). View of THE RELATIONSHIP BETWEEN PREECLAMPSIA AND LOW BIRTH WEIGHT (LBW) IN WONOSARI, GUNUNGKIDUL REGIONAL HOSPITAL (1).pdf. *Epidemiology and Society Health Review*, 3.
- Galaviz-hernandez, C., Sosa-macias, M., Teran, E., Garcia-ortiz, J. E., Lazalde-ramos, B. P., & Galaviz-hernandez, C. (2019). *Paternal Determinants in Preeclampsia. 9(January)*, 1–7. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01870>
- Gill, S. V., May-Benson, T. A., Teasdale, A., & Munsell, E. G. (2013). Birth and developmental correlates of birth weight in a sample of children with potential sensory processing disorder. *BMC Pediatrics*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/1471-2431-13-29>
- Hinelo, K., Sakung, J., & Pramana, C. (2021). Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, 8(4).
- Laput, D. O., & Dkk. (2016). Hubungan Usia Ibu dengan Kejadian Preeklampsia Berat di Ruang Bersalin BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng Tahun 2016. *Jurnal*

Wawasan Kesehatan, 1(2), 132–141.

- Martadiansyah, A., Qalbi, A., & Santoso, B. (2019). Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Studi Prevalensi Tahun 2015, 2016, 2017). *Sriwijaya Journal of Medicine*, 2(1), 14–25.
- Martini, S., & Dewi, R. K. (2020). Hubungan Ibu Hamil Dengan Preeklamsia Berat (Peb) Terhadap Angka Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr). *Coping: Community of Publishing in Nursing*, 8(4), 455. <https://doi.org/10.24843/coping.2020.v08.i04.p15>
- Mose, J. C., & Setyorini Irianti. (2012). *Obstetri Patologi: Ilmu Kesehatan Reproduksi* (D. Martaadisoebrata, F. F. Wirakusumah, & J. S. Effendi (eds.); 3rd ed.).
- Nyoman Hartati, N., Dewa Ayu Ketut Surinati, I., Nyoman Diah Vitri Pradnyaningrum, N., & Keperawatan Politeknik Kesehatan Denpasar, J. (2018). Preeklampsia Dengan Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Pada Ibu Bersalin. *Jurnal Gema Keperawatan*, 000, 1–9.
- Raia-Barjat, T., Sarkis, C., Rancon, F., Thibaudin, L., Gris, J. C., Alfaidy, N., & Chauleur, C. (2021). Vitamin D deficiency during late pregnancy mediates placenta-associated complications. *Scientific Reports*, 11(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-00250-5>
- Risnawati, E. K. (2018). View of The Relationship Between Preeclampsia And Low Birth Weight Infants In H.Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba (1).pdf. *Jurnal Life Birth*, 2.
- Sari, A. R., Titisari, I., & Sendra, E. (2021). The Correlation of Maternal Age and the Incidence of Preeclampsia at Aura Syifa Hospital. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 8(3), 368–372. <https://doi.org/10.26699/jnk.v8i3.art.p368-372>

- Shantanam, S., & MUELLER. (2018). 乳鼠心肌提取 HHS Public Access. *Physiology & Behavior*, 176(1), 139–148. <https://doi.org/10.1016/j.ypped.2018.10.012>
- Shumin Li, A. A. G. (n.d.). Li S, Gupte AA. *The Role of Estrogen in Cardiac Metabolism and Diastolic Function. Methodist Debaquey Cardiovasc J. 2017 Jan-Mar;13(1)4-8. doi 10.14797/mdcj-13-1-4 PMID 28413575 PMCID PMC5385797.*
- Tarigan, R. A., & Yulia, R. (2019). Parity Relationship With The Occurrence Of Preeclampsia in Pregnant Women. *Journal of Health*, 8(2), 105.
- Titisari, I., Antono, S. D., & Chumaida, I. (2019). the Relationship Preeclampsia and the Incidence of Low Birth Weight Babies in Rsud Gambiran, Kediri City. *Jurnal Kebidanan Kestra (Jkk)*, 2(1), 61–67. <https://doi.org/10.35451/jkk.v2i1.247>
- Tyas, B. D., Lestari, P., & Aldika Akbar, M. I. (2020). Maternal Perinatal Outcomes Related to Advanced Maternal Age in Preeclampsia Pregnant Women. *Journal of Family & Reproductive Health*, 13(8), 191–200. <https://doi.org/10.18502/jfrh.v13i4.2646>
- Wubetu, A. D., Amare, Y. E., Haile, A. B., & Degu, M. W. (2021). Newborn Birth Weight and Associated Factors Among Mother-Neonate Pairs in Public Hospitals, North Wollo, Ethiopia. *Pediatric Health, Medicine and Therapeutics, Volume 12*, 111–118. <https://doi.org/10.2147/phmt.s299202>
- Steinthorsdottir, V., McGinnis, R., Williams, N. O., Stefansdottir, L., Thorleifsson, G., Shooter, S., Fadista, J., Sigurdsson, J. K., Auro, K. M., Berezina, G., Borges, M. C., Bumpstead, S., Bybjerg-Grauholm, J., Colgiu, I., Dolby, V. A., Dudbridge, F., Engel, S. M., Franklin, C. S., Frigge, M. L., ... Morgan, L. (2020). Genetic predisposition to hypertension is associated with preeclampsia in European and

Central Asian women. *Nature Communications*, 11(1).
<https://doi.org/10.1038/s41467-020-19733-6>

Sudarman, M Tendean, H. M., & Wagey, F. W. (2021). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Preeklampsia. *E-Clinic Universitas Sam Ratulangi*, 9(1). <https://doi.org/10.35790/ecl.9.1.2021.31960>

Tarigan, R. A., & Yulia, R. (2019). Parity Relationship With The Occurrence Of Preeclampsia in Pregnant Women. *Journal of Health*, 8(2), 105.

Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan. (2022). Hubungan Usia Ibu Hamil dengan Tingkat Kejadian Preeklampsia di Rumah Sakit Umum Haji Medan. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 11(1), 882–887. <https://doi.org/10.1109/TSMC.1976.4309487>

WHO. (2021). *New Global Targets to Prevent Maternal Deaths*.
<https://www.who.int/news/item/05-10-2021-new-global-targets-to-prevent-maternal-deaths>.

Wilkerson, R. G., & Ogunbodede, A. C. (2019). Hypertensive Disorders of Pregnancy. In *Emergency Medicine Clinics of North America* (Vol. 37, Issue 2, pp. 301–316). W.B. Saunders. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2019.01.008>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil SPSS

UNIVARIAT

Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia Ibu Hamil		
<20 atau >35 Tahun	40	44.0
20-35 Tahun	51	56.0
Paritas Ibu Hamil		
Berisiko (<2 atau >3)	48	52.7
Tidak Berisiko (2-3)	43	47.3
Berat Bayi Lahir		
BBLR	39	42.9
Tidak BBLR	52	57.1

Statistics

		Usia Ibu Hamil	Paritas Ibu Hamil	Berat Bayi Lahir
N	Valid	91	91	91
	Missing	0	0	0
Mean		29.27	1.81	2676.70
Std. Deviation		7.990	1.719	683.686
Minimum		15	0	1000
Maximum		45	9	4200

Usia Ibu Hamil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 atau >35 Tahun	40	44.0	44.0	44.0
	20-35 Tahun	51	56.0	56.0	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

Paritas Ibu Hamil

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko (<2 atau >3)	48	52.7	52.7	52.7
	Tidak Berisiko (2-3)	43	47.3	47.3	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

Berat Bayi Lahir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BBLR	39	42.9	42.9	42.9
	Tidak BBLR	52	57.1	57.1	100.0
	Total	91	100.0	100.0	

BIVARIAT

Hubungan Usia Ibu Hamil Terhadap Preeklampsia

Usia Ibu	Diagnosis		Total	<i>p</i> value	OR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
<20 atau >35 Tahun	26 (28.6%)	14 (44.0%)	40 (44.0%)	0.041	2.653	1.127- 6.246
20-35 Tahun	21 (23.1%)	30 (33.0%)	51 (56.0%)			
Total	47 (51.6%)	44 (48.4%)	91 (100.0%)			

Crosstab

Usia Ibu Hamil	<20 atau >35 Tahun	Count	Diagnosis		Total
			Preeklampsia Berat	Preeklampsia	
		26	14	40	
		Expected Count	20.7	19.3	40.0

20-35 Tahun	% within Usia Ibu Hamil	65.0%	35.0%	100.0%
	% within Diagnosis	55.3%	31.8%	44.0%
	% of Total	28.6%	15.4%	44.0%
	Count	21	30	51
	Expected Count	26.3	24.7	51.0
	% within Usia Ibu Hamil	41.2%	58.8%	100.0%
	% within Diagnosis	44.7%	68.2%	56.0%
	% of Total	23.1%	33.0%	56.0%
Total	Count	47	44	91
	Expected Count	47.0	44.0	91.0
	% within Usia Ibu Hamil	51.6%	48.4%	100.0%
	% within Diagnosis	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.6%	48.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.095 ^a	1	.024		
Continuity Correction ^b	4.186	1	.041		
Likelihood Ratio	5.154	1	.023		
Fisher's Exact Test				.034	.020

Linear-by-Linear Association	5.039	1	.025		
N of Valid Cases	91				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.34.

b. Computed only for a 2x2 table

	Risk Estimate		
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Ibu Hamil (<20 atau >35 Tahun / 20-35 Tahun)	2.653	1.127	6.246
For cohort Diagnosis = Preeklampsia Berat	1.579	1.059	2.353
For cohort Diagnosis = Preeklampsia	.595	.368	.962
N of Valid Cases	91		

Hubungan Paritas Ibu Hamil Terhadap Preeklampsia

Paritas Ibu Hamil	Diagnosis		Total	<i>p</i> -value	OR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
Berisiko (<2 atau >3)	31	17	48			

	(34.1%)	(18.7%)	(52.7%)	0.016	3.077	1.308-
Tidak Berisiko (2-3)	16	27	43			7.241
	(17.6%)	(29.7%)	(47.3%)			
Total	47	44	91			
	(51.6%)	(48.4%)	(100.0%)			

Crosstab

Paritas Ibu Hamil	Berisiko (<2 atau >3)	Count	Diagnosis		Total
			Preeklampsia Berat	Preeklampsia	
Ibu Hamil	Berisiko (<2 atau >3)	Count	31	17	48
		Expected Count	24.8	23.2	48.0
		% within Paritas Ibu Hamil	64.6%	35.4%	100.0%
		% within Diagnosis	66.0%	38.6%	52.7%
		% of Total	34.1%	18.7%	52.7%
Ibu Hamil	Tidak Berisiko (2-3)	Count	16	27	43
		Expected Count	22.2	20.8	43.0
		% within Paritas Ibu Hamil	37.2%	62.8%	100.0%
		% within Diagnosis	34.0%	61.4%	47.3%
		% of Total	17.6%	29.7%	47.3%
Total		Count	47	44	91
		Expected Count	47.0	44.0	91.0
		% within Paritas Ibu Hamil	51.6%	48.4%	100.0%

	% within Diagnosis	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.6%	48.4%	100.0%



Chi-Square Tests


	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.806 ^a	1	.009		
Continuity Correction ^b	5.754	1	.016		
Likelihood Ratio	6.890	1	.009		
Fisher's Exact Test				.012	.008
Linear-by-Linear Association	6.731	1	.009		
N of Valid Cases	91				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.79.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

Value	95% Confidence Interval	
	Lower	Upper



Odds Ratio for Paritas Ibu Hamil (Berisiko (<2 atau >3) / Tidak Berisiko (2-3))	3.077	1.308	7.241
For cohort Diagnosis = Preeklampsia Berat	1.736	1.117	2.698
For cohort Diagnosis = Preeklampsia	.564	.361	.881
N of Valid Cases	91		

Hubungan Preeklampsia Terhadap Berat Bayi Lahir

Berat Bayi Lahir	Diagnosis		Total	<i>p</i> value	OR	95% CI
	Preeklampsia Berat (%)	Preeklampsia (%)				
BBLR	26 (28.6%)	13 (14.3%)	39 (42.9%)	0.023	2.952	1.242-7.019
Tidak BBLR	21 (23.1%)	31 (34.1%)	52 (57.1%)			
Total	47 (51.6%)	44 (48.4%)	91 (100.0%)			

Crosstab

		Diagnosis			
		Preeklampsia Berat	Preeklampsia	Total	
Berat Bayi Lahir	BBLR	Count	26	13	39
		Expected Count	20.1	18.9	39.0
		% within BBLR	66.7%	33.3%	100.0%
		% within Diagnosis	55.3%	29.5%	42.9%
		% of Total	28.6%	14.3%	42.9%
	Tidak BBLR	Count	21	31	52
		Expected Count	26.9	25.1	52.0
		% within BBLR	40.4%	59.6%	100.0%
		% within Diagnosis	44.7%	70.5%	57.1%
		% of Total	23.1%	34.1%	57.1%
Total	Count	47	44	91	
	Expected Count	47.0	44.0	91.0	
	% within BBLR	51.6%	48.4%	100.0%	
	% within Diagnosis	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	51.6%	48.4%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.164 ^a	1	.013		
Continuity Correction ^b	5.157	1	.023		
Likelihood Ratio	6.254	1	.012		

Fisher's Exact Test				.019	.011
Linear-by-Linear Association	6.096	1	.014		
N of Valid Cases	91				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.86.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Berat Bayi Lahir (BBLR / Tidak BBLR)	2.952	1.242	7.019
For cohort Diagnosis = Preeklampsia Berat	1.651	1.109	2.457
For cohort Diagnosis = Preeklampsia	.559	.340	.919
N of Valid Cases	91		

Lampiran 2: Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.334/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : EVITA SARAH NASUTION
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN
PREEKLAMPSIA DI RS KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
MAKASSAR"**

*"THE RELATIONSHIP OF AGE AND PARITY OF PREGNANT MOTHERS WITH PREECLAMPSIA IN
SITI FATIMAH MOTHER AND CHILD REGIONAL SPECIAL HOSPITAL, MAKASSAR"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.


Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.

This declaration of ethics applies during the period October 24th, 2022 until October 24th, 2023.

October 24th, 2022
and Chairperson,
Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

MAKASSAR

Lampiran 3: Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 10755/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSKDIA Siti Fatimah
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 551 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: EVITA SARAH NASUTION
Nomor Pokok	: 70600119021
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RS KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 15 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
---	---

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

M A K A S S A R

Lampiran 4: Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
Jl. Gunung Merapi No.75 Telp. 3624956, 3620803 Fax. (0411) 3625784
MAKASSAR 90112

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 138 /UPT- RSKD.IA.SF/01/1/2023

Berdasarkan surat dari Dinas PTSP Provinsi Sulawesi-Selatan No: 13230/S.01/PTSP/2022 Tanggal 12 Desember 2022 perihal tersebut diatas, maka yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menerangkan bahwa ;

Nama : **Evita sarah nasution .**
Nomor Pokok : 190013182
Program studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan : mahasiswa (S1)
Alamat : JL. H.M.Yasin limpo No. 36 Romang polong -Gowa

Telah selesai melakukan penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tanggal 17 Oktober 2022 s/d 15 Desember 2022 dengan judul
" HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PREEKLAMIA DI RSKDIA SITI FATIMAH MAKASSAR "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 24 Januari 2023


a.n DIREKTUR UPT RSKDIA SITI FATIMAH

Kepala Diklat

MICHA ERAWATI, S.ST,SKM,M.Kes.
Nip. 19730614 199803 2 007

MAKASSAR

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



MAKASSAR