

**ANALISIS KANDUNGAN ASAM LEMAK OMEGA-3 DARI SEDIAAN
KAPSUL MINYAK IKAN SALMON (*Onchorhynchus nerka*) LOKAL DAN
IMPOR SECARA KROMATOGRAFI GAS-SPEKTROMETRI MASSA
(GC-MS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**FIRDA NURSAPUTRI
NIM : 70100116012**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firda Nursaputri
NIM : 70100116012
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 21 November 1998
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Poros Malino. Bontomanai
Judul : “Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 Dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 27 Februari 2023

Penulis,



Firda Nursaputri
70100116012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 Dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)*" yang disusun oleh Firda Nursaputri, NIM: 70100116012, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin yang bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2023 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Samata, 27 Februari 2023

6 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Syamsuri Syakri, S.Farm, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm.	(.....)
Penguji II	: Dr. Asriyah, Mpd.I.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.

19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikutnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak diakhirat. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa banyak kesulitan, hambatan dan juga rintangan yang terus menerus menghampiri, namun peneliti meyakini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Peneliti juga meyakini bahwa dibalik semua itu Allah SWT telah merencanakan sesuatu yang lebih baik bagi hamba-Nya. Proses penyelesaian skripsi ini juga tak lepas dari do'a, dukungan, motivasi dan semangat yang tak henti-hentinya dari orang-orang baik di sekitar peneliti.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga peneliti sampaikan kepada orang yang sangat berharga dalam hidup peneliti yakni kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Sahabuddin dan Ibu Salmawati, yang tak henti-hentinya selalu mengirimkan do'a, memberikan dukungan dan dorongan, serta motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti juga berterima kasih kepada suami Feriyanto, kepada anak Faaz Arshaka Putra, dan juga kepada saudari Siti Nur Fatimah yang selama ini selalu mendukung dan menjadi salah

satu penyemangat peneliti agar tidak menyerah dalam menempuh pendidikan. Tak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada keluarga besar peneliti yang mungkin tak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., selaku Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing, memberikan masukan dan mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S. Si. M. Si, selaku Pembimbing Kedua yang dengan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya memberikan masukan, mengoreksi dan mengarahkan peneliti dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu apt. Nur azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm, selaku Penguji kompetensi yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Asriyah, Mpd.I, selaku Penguji agama yang telah memberikan kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya serta seluruh Staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Kepada Laboran Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang dengan senantiasa memberikan arahan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian.
10. Kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu ada memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga peneliti dapat sampai di tahap penyelesaian skripsi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan "D16OXIN" yang selalu memberikan do'a, bantuan dan support hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan tulus.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan. Namun, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus dalam bidang farmasi dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Samata, 27 Februari 2023

Penulis



Firda Nursaputri
NIM. 70100116012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
BAB II TINJAUAN TEORITS.....	10
A. Uraian Sampel Ikan Salmon	10
B. Minyak dan Lemak	14
C. Minyak Ikan	22
D. Sediaan Farmasi.....	24
E. Kromatografi Gas.....	25
F. Tinjauan Islam dalam Pemanfaatan Hewan.....	31
BAB III	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sampel.....	37
D. Instrumen Peneliitian	37
E. Prosedur Penelitian	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan.....	48
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	59
RIWAYAT HIDUP	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Deret PUFA yang penting dan sumbernya	19
Tabel 2.1 Hasil Analisis Senyawa Asam Lemak Omega-3 Sampel A	42
Tabel 2.2 Hasil Analisis Senyawa Asam Lemak Omega-3 Sampel B.....	42
Tabel 2.3 Hasil Analisis Senyawa Asam Lemak Omega-3 Sampel C.....	43
Tabel 2.4 Hasil Analisis Senyawa Asam Lemak Omega-3 Sampel D	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikan Salmon.....	10
Gambar 2.1 Struktru Kimia Asam Lemak	16
Gambar 2.2 Struktur Asam Lemak Jenuh	18
Gambar 2.3 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Tunggal	18
Gambar 2.4 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Ganda	19
Gambar 3. Skema Aalat Kromatografi Gas	26
Gambar 4.1 Kromatogram Sampel A.....	39
Gambar 4.2 Kromatogram Sampel B.....	40
Gambar 4.3 Kromatogram Sampel C.....	40
Gambar 4.4 Kromatogram Sampel D.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Sampel Sediaan Minyak Ikan Salmon.....	59
Lampiran 2. Keterangan Komposisi Sampel Sediaan Minyak Ikan Salmon	60
Lampiran 3. Skema Kerja	62
Lampiran 4. Gambar Analisis Asam Lemak Omega-3.....	63
Lampiran 5. Hasil Kromatgram Sampel dengan GC-MS	65
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian.....	67



ABSTRAK

Nama : Firda Nursaputri
NIM : 70100116012
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : ANALISIS KANDUNGAN ASAM LEMAK OMEGA-3 DARI SEDIAAN KAPSUL MINYAK IKAN SALMON (*Onchorhynchus nerka*) LOKAL DAN IMPOR SECARA KROMATOGRAFI GAS-SPEKTROMETRI MASSA (GC-MS)

Telah dilakukan penelitian analisis kandungan asam lemak omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon (*Onchorhynchus nerka*) lokal dan impor secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS). Kapsul Minyak ikan salmon memiliki kandungan Omega 3 yang dapat menurunkan kolesterol buruk (LDL), antioksidan, antiinflamasi, anti agregasi platelet, analgesik, dan juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala koloid. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan asam lemak omega-3 apa saja yang terdapat dalam sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental laboratorium. Tahapan ini dari teknik pengambilan sampel, metilasi minyak ikan, dan analisis asam lemak. Hasil yang diperoleh sampel sediaan minyak ikan salmon lokal hanya mengandung komponen senyawa asam lemak omega-3 jenis ETA (Eicosatetraenoic acid), ETE (Eicosatrienoic acid), dan ALA (Linoleic acid) sedangkan pada sampel sediaan minyak ikan salmon impor mengandung komponen asam lemak omega-3 jenis DPA (Docosapentaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid), DHA (Docosahexaenoic acid), ETA (Eicosatetraenoic acid), ALA (Linoleic acid), dan ETE (Eicosatrienoic acid). Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada sediaan sampel minyak ikan salmon lokal hanya mengandung dua sampai tiga komponen senyawa asam lemak omega-3 saja, sedangkan pada sampel sediaan minyak ikan salmon impor mengandung lima sampai enam komponen senyawa asam lemak omega-3.

Kata Kunci : Asam lemak omega-3, minyak ikan salmon, kapsul, GC-MS.

ABSTRACT

Name : Firda Nursaputri
Student ID Number : 70100116012
Departement : Pharmacy
Thesis Title : ANALYSIS OF THE CONTENT OF OMEGA-FATTY ACIDS FROM LOCAL AND IMPORTEI SALMON (*Onchorhynchus nerka*) OIL CAPSULE BY GAS CHROMATOGRAPHY-MAS SPECTROMETRY (GC-MS)

Analysis of the content of omega-3 fatty acids from local and imported salmon (*Onchorhynchus nerka*) oil capsules has been carried out by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). Salmon fish oil capsules contain Omega 3 which can lower bad cholesterol (LDL), antioxidant, anti-inflammatory, anti-platelet aggregation, analgesic, and is also beneficial for curing colloid symptoms. So this study aims to find out what omega-3 fatty acids are contained in local and imported salmon oil capsule preparations. This study uses a type of laboratory experimental research. This stage is from sampling techniques, fish oil methylation, and fatty acid analysis. The results obtained from local salmon oil samples only contained components of omega-3 fatty acid compounds of the types ETA (Eicosatetraenoic acid), ETE (Eicosatrienoic acid), and ALA (Linoleic acid), while samples of imported salmon oil contained omega fatty acid components. -3 types of DPA (Docosapentaenoic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid), DHA (Docosahexaenoic acid), ETA (Eicosatetraenoic acid), ALA (Linoleic acid), and ETE (Eicosatrienoic acid). The conclusion of this study was that local salmon oil samples contained only two to three omega-3 fatty acid compounds, while imported salmon oil samples contained five to six omega-3 fatty acid compounds.

Keywords: Omega-3 fatty acids, salmon oil, capsules, GC-MS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Luasnya perairan Indonesia menghasilkan produk perikanan yang melimpah, dan stok ikan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pangan. Banyak orang telah menggunakan ikan sebagai bahan makanan sejak berabad-abad. Hal ini dikarenakan ikan mengandung protein, lemak, vitamin, mineral yang sangat baik dan menjanjikan (Panagan et al., 2012). Masyarakat nusantara banyak menggemari olahan makanan yang berbahan dasar ikan.

Selain sebagai sumber protein, perikanan dan peternakan juga dikenal sebagai “pangan fungsional”. Pangan fungsional didefinisikan sebagai pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi dasar tubuh, tetapi juga memiliki fungsi lain (Tapsel, 2009). Contoh pangan fungsional adalah ikan yang diolah menjadi minyak ikan yang berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung koroner karena mengandung PUFA (asam lemak tak jenuh ganda), asam lemak kaya omega-3 (eicosapentaenoic acid atau EPA dan asam docosahexaenoic atau DHA dan asam linolenat atau ALA). Hal ini karena mengandung asam lemak tak jenuh rantai panjang yang cukup banyak (Heruwati, 2002).

Salmon merupakan salah satu ikan yang banyak mengandung nilai gizi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air laut dan merupakan salah satu hasil perikanan yang banyak dikonsumsi masyarakat. Ikan salmon selain bisa dimakan juga bisa dibuat kapsul dan dijadikan obat. Minyak ikan salmon bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit.

Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Minyak lemak hasil ekstraksi tersebut berasal dari minyak lemak hati segar *Gadus morhua Linne* dan spesies lain dari familia *Gadidae*. Minyak ikan sangat berbeda dengan minyak lainnya, yang dicirikan dengan variasi asam lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak atau lemak lainnya, jumlah asam lemaknya lebih banyak, panjang rantai karbon mencapai 20 atau 22, lebih banyak mengandung jenis asam lemak tak jenuh jamak (ikatan rangkap sampai dengan 5 dan 6) dan lebih banyak mengandung jenis Omega-3 dibandingkan Omega-6 (Ditjen POM, 1995; Estiasih, 2009).

Salah satu senyawa penting dalam ikan adalah omega-3. asam lemak omega-3 termasuk dalam kelompok asam lemak esensial karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan hanya dapat diperoleh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Asam lemak omega-3 telah banyak terbukti memiliki manfaat bagi kesehatan, karena berperan penting dalam kecerdasan anak atau perkembangan dan pertumbuhan sel otak, dapat menurunkan kolesterol, mencegah penggumpalan trombosit sehingga terhindar dari penyumbatan pembuluh darah (aterosklerosis) dan mencegah Penyakit jantung mengurangi risiko diabetes dan tekanan darah tinggi, serta berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin (Astawan, 2004). Sumber alami asam lemak omega-3 pada ikan adalah EPA dan DHA yang memiliki efek antiaterosklerotik, terutama EPA (Suriawira, 2002).

Asam lemak alami yang termasuk asam lemak omega-3 adalah asam linolenat atau ALA (C18, n-3), asam eicosapentaenoic atau EPA (C20, n-3) dan asam eicosapentaenoic atau DHA (C22, n-3). (1989). Lemak ikan didominasi oleh EPA dan DHA (Husaini, 1989). Asam lemak omega-3 banyak terdapat pada berbagai makanan laut seperti alga dan ikan laut. Jenis ikan laut seperti salmon,

tuna, herring dan mackerel (Handayani *et al.*, 2013).

Ada dua jenis asam lemak esensial, termasuk Omega-3 (asam linolenat) dan Omega-6 (asam linoleat). Asam linolenat diubah menjadi asam *eicosapentaenoic* (EPA) dan asam *docosahexaenoic* (DHA) di dalam tubuh, namun proses perubahan asam linolenat pada setiap orang berbeda, dan tidak semuanya efektif. Padahal, ibu hamil memang membutuhkan EPA dan DHA untuk perkembangan otak bayinya. Minyak ikan dikenal sebagai sumber utama EPA dan DHA, oleh karena itu asupan minyak ikan yang tinggi sangat dianjurkan untuk ibu hamil (Pranowo dan Muchalal, 2004).

Kapsul minyak ikan salmon mengandung Omega 3 hingga 70%, yang dapat menurunkan kolesterol jahat (LDL) dan meningkatkan kolesterol baik (HDL), meningkatkan sel darah merah hingga 47%, memperbaiki retina mata, mengatasi asma, DHA dapat mempertajam pikiran, sehingga tidak mudah lupa dan cerdas, EPA mencegah kanker, pembekuan darah, stroke, tekanan darah tinggi, astaxanthin karotenoid, zat anti aging, dan antioksidan yang berkali lipat lebih kuat dengan vitamin C dan E serta mengandung vitamin A dan D untuk pertumbuhan anak dan membentuk sumber protein tubuh.

Beberapa penggunaan minyak ikan masih dalam bentuk kapsul sebagai suplemen makanan. Kapsul seperti itu mengurangi bau berminyak dan rasa tidak enak, melindungi dari kontak langsung dengan udara dan sinar matahari, dan lebih mudah dimakan (Eastman, 2010).

Kromatografi adalah metode fisika untuk pemisahan komponen-komponen yang terdistribusi antara dua fasa. Pemisahan dengan kromatografi didasarkan pada perbedaan kesetimbangan komponen-komponen campuran di antara fasa stasioner dan fasa gerak. Salah satu contoh metode kromatografi adalah kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk

pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran dan biasanya sampai suhu 400⁰C. Fasa gerak pada kromatografi gas biasanya gas helium, hidrogen, atau nitrogen. Pemilihan gas sebagai fasa gerak bergantung pada karakteristik detektor (Gandjar dan Rohman, 2012).

Dalam konteks islam, Allah SWT. Telah mengisyaratkan tentang pemanfaatan dan penggunaan keanekaragaman hayati baik itu tumbuhan, hewan, ataupun sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman hayati tersebut diciptakan oleh Allah bukan hanya sebagai tanda kekuasaan-Nya namun agar manusia bisa memanfaatkannya termasuk pemanfaatn sebagai obat (Abdul M, 2015). Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Yunus/10:57 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qu’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Maka tidak satu pun jenis penyakit, baik penyakit hati maupun jasmani melainkan dalam Alqur’an ada cara yang membimbing kepada obat dan sebab kesembuhannya. Dalam Alqur’an manusia telah diberi petunjuk tentang penyembuh bagi penyakit-penyakit, dan salah satu petunjuk itu adalah keanekaragaman hayati sebagai nikmat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terkandung manfaat yang sangat beragam yaitu tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pengobatan.

Di Indonesia, penggunaan obat dari keanekaragaman hayati baik hewan maupun tumbuhan banyak digunakan masyarakat. Salah satu realitas penggunaan obat dari keanekaragaman hayati adalah penggunaan sediaan kapsul minyak ikan salmon di masyarakat. Berdasarkan pengalaman dan realitas yang didapatkan

penulis dilapangan, pada umumnya masyarakat menggunakan sediaan kapsul minyak ikan salmon untuk menambah berat badan atau sebagai suplemen makanan. Meskipun pada umumnya masyarakat tidak mengetahui kandungan, dosis, dan sebagainya penggunaan kapsul minyak ikan salmon tersebut, akan tetapi penggunaannya masih eksis dimasyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap kandungan sediaan kapsul minyak ikan pada ikan salmon dengan judul “Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 Dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Senyawa asam lemak omega-3 apa saja yang terkandung dalam sediaan kapsul minyak ikan salmon (*Onchorhynchus nerka*) lokal dan impor secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)?
2. Apakah ada perbedaan kandungan senyawa asam lemak omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor dipasaran?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh.
 - b. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kegunaan umum dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan

dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran.

- c. Lemak merupakan trigliserida yang terkandung dalam minyak dan padat pada suhu kamar.
- d. Omega-3 (EPA dan DHA) termasuk asam linoleanat yang berfungsi untuk pembentukan spingomielin dan merupakan komponen struktural sel saraf (mielin). EPA berfungsi untuk pembentukan membran sel. Spingomielen dibentuk oleh EPA dan DHA tadi digunakan untuk membentuk membran sel otak dan mielin sel saraf. Apabila EPA dan DHA pada otak cukup maka sinyal yang disampaikan dari otak akan diteruskan ke akson dan mielin akan mempercepat jalannya sinyal yang disampaikan oleh otak.
- e. Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak.
- f. Ikan salmon adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah Trout. Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain: salmon bermigrasi, sedangkan trout hidup menetap. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah laboratorium murni yang meliputi penggunaan bahan alam.

D. Kajian Pustaka

Secara umum kajian atau penelitian-penelitian analisis kandungan hewan atau tumbuhan sudah banyak dilakukan oleh kalangan akademis. Terkait

dengan penelitian ini, ada beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Almudany T. Panangan, Heni Yohandini, Jojor Uli Gulton yang meneliti tentang Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Lemak Tak Jenuh Omega-3 dari Minyak Ikan Patin (*Pangasius pangasius*) dengan Metoda Kromatografi Gas pada tahun 2011. Hasil dari penelitian Almudany, dkk menunjukkan bahwa kadar minyak ikan patin rata-rata dengan berat 650-879 gram adalah 3,827%. Hasil ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kadar minyak ikan Cod (*Gadus morrhua*) yaitu sebesar 0,4%. Akan tetapi kadar ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar lemak ikan laut dalam yaitu sekitar 4,8%.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maruba Pandiangan, Jamaran Kaban, Basuki Wirjosentono, Jansen Silalahi yang meneliti tentang Analisis Kandungan Asam Lemak Omega 3 dan Omega 6 pada Minyak Ikan Mas (*Cyprinus carpio*) pada tahun 2019. Penelitian dari Maruba Pandiangan, dkk menunjukkan bahwa komposisi asam lemak dalam minyak ikan mas sebagai berikut : asam lemak jenuh (SFA) sebanyak 27,54%, asam lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) sebanyak 43,92%, asam lemak tidak jenuh jamak (PUFA) sebanyak 21,25%. Asam lemak Omega 3 sebanyak 2,83% yang terdiri dari asam linolenat 1,49%, asam eikosatrienoat 0,87%, asam eikosapentaenoat (EPA) 0,11%, asam dekosahexaenoat (DHA) 0,36%, dan Omega 6 sebanyak 17,36% yang terdiri dari asam linoleat 16,44%, asam arakidonat (ARA) 0,92%. Dilihat dari kandungan asam lemak minyak ikan mas mengandung Omega 3 dan Omega 6 sehingga sangat baik dikonsumsi untuk meningkatkan kesehatan manusia.

Ketiga, hasil penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Seno Handayani, Erin Ryanti Gunawan, Lely Kurniawati, Murniati, Lalu Haris Budiarto yang meneliti tentang Analisis Asam Lemak Omega 3 dari Minyak Kepala Ikan Sunglir (*Elagatis bipinnulata*) melalui Esterifikasi Enzimatis pada tahun 2013. Hasil penelitian Sri Seno Handayani, dkk menunjukkan bahwa pada kepala ikan Sunglir terkandung empat jenis asam lemak Omega 3 yaitu asam linolenat (ALA), Eikosatrienoat (ETA), Eikosapentaenoat (EPA), dan Dokosaheksaenoat (DHA). Persentasi komposisi asam linolenat (ALA), Eikosatrienoat (ETA), Eikosapentaenoat (EPA), dan Dokosaheksaenoat (DHA) masing-masing adalah 0,85%, 2,80%, 0,73%, dan 2,41%. Sehingga bagian kepala ikan Sunglir yang biasanya tidak dimanfaatkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber alternatif asam lemak Omega 3.

Berdasarkan uraian pada kajian pustaka diatas maka dapat dikatakan bahwa letak persamaannya adalah tujuan dari penelitian yang berusaha menganalisis kandungan asam lemak omega-3 minyak ikan. Sedangkan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi kajian pustaka diatas adalah sampel, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui kandungan senyawa Asam Lemak Omega-3 Dari Sediaan Kapsul Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS)

- b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kandungan senyawa asam lemak omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian informasi mengenai kandungan yang terdapat dalam minyak ikan salmon lokal dan impor.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai data kualitatif berupa jenis-jenis asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam minyak ikan salmon lokal dan impor dan data kuantitatif berupa kadar masing-masing asam lemak tak jenuh omega-3 yang memiliki peran penting bagi kesehatan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Sampel Ikan Salmon



Gambar 1. Ikan Salmon (Marine, 2015)

1. Deskripsi

Salmon adalah nama umum untuk beberapa spesies ikan dalam famili Salmonidae. Beberapa ikan lain dari famili ini disebut trout; Penyebarannya disebabkan oleh usia migrasi salmon dibandingkan dengan perilaku reproduksi ikan trout, yang merupakan perbedaan penting untuk genus Salmon. Salmon hidup di Atlantik (spesies migrasi *Salmo salar*) dan Pasifik dan Great Lakes (sekitar selusin spesies dalam genus *Oncorhynchus*).

Salmon merupakan salah satu spesies ikan dengan siklus hidup yang unik, karena ikan ini menetas di sungai namun tumbuh dan hidup di lautan. Saat salmon dewasa, mereka berenang kembali ke hilir untuk bertelur dan kemudian mati.

a. Sistem Reproduksi Ikan Salmon

Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenisnya ataupun kelompoknya. Ikan salmon, melakukan reproduksi secara eksternal. Pembuahan secara eksternal berarti pembuahan yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup tersebut. Jadi ikan salmon ketika ingin bereroduksi ia akan kembali ke air tawar dan melakukan pembuahan

ketika mendapatkan tempat ia rasa aman untuk bertelur. Ketika salmon betina mengeluarkan sel telurnya, salmon jantan akan datang untuk membuahi sel telur yang telah dikeluarkan oleh salmon betina. Untuk menaruh telur, salmon betina mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah untuk mengangkat kerikil agar tersapu arus, menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah dapat menampung 5000 telur, menutupi area sekitar $2,8 \text{ m}^2$. Warna telur bervariasi dari oranye hingga merah. Satu atau lebih salmon jantan akan mendekati betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil lalu pergi bertelur di tempat lain.

Salmon betina dapat melakukannya sebanyak tujuh kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi umum terjadi pada tahap ini, yang sebagian besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia.

b. Cara Adaptasi Ikan Salmon

Kita tahu bahwa habitat alami ikan salmon ini adalah di perairan air tawar. Namun, salmon dapat bermigrasi ke air laut. Yang muda hidup di perairan air tawar tempat mereka dilahirkan selama tiga tahun sebelum pindah ke laut. Ini karena salmon dapat beradaptasi dengan kondisi air tawar dan kondisi air laut, yang membantu tubuhnya beradaptasi dengan air laut dan salinitas air tawar.

Ikan salmon pada umumnya termasuk spesies dari anadromous, yang dimana spesies ini bermigrasi guna berkembang biak. Salmon berasal dari jenis air tawar kemudian bermigrasi ke lautan dan kembali ke air tawar guna untuk bereproduksi (Nims, 2015).

Fenomena migrasi ikan salmon dieksplorasi banyak oleh peneliti guna untuk mempelajari tingkah laku migrasi. Ikan salmon dewasa akan menghabiskan banyak waktunya di perairan laut dan hanya akan kembali ke perairan tawar untuk melakukan pemijahan. Pemijahan ikan salmon biasanya terjadi pada musim dingin dan musim gugur di hulu sungai. Larva dari ikan salmon akan kembali ke laut guna mendapatkan makanan, tetapi perjalanan kembali ke laut sangat bergantung pada ketersediaan makanan di sekitar larva. Salmon Atlantik baru akan melakukan migrasi setelah 1 hingga 6 tahun atau lebih sedangkan salmon Pasifik sekitar 2-3 tahun (Fahmi, 2010).

c. Fisiologi Ikan Salmon

Ikan salmon merupakan ikan yang dapat hidup di air tawar dan di air laut. Adaptasi fisiologi ikan yang hidup di air tawar dan di air laut. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian di makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Adaptasi fisiologis terhadap hewan air dibedakan menjadi 2, yaitu : Adaptasi ikan air laut dan air tawar. Ikan air tawar : adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai, dan danau, dengan salinitas kurang dari 0,05%. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Untuk bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologi yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. 41% dari seluruh spesies ikan diketahui berada di air tawar. Hal ini karena spesies yang cepat yang menjadikan habitat yang terpecah menjadi mungkin untuk ditinggali. Ikan air tawar berbeda secara fisiologis dengan air laut dalam beberapa aspek. Insang mereka harus mampu mendifusikan air sembari menjaga kadar garam dalam cairan tubuh secara simultan. Adaptasi pada bagian sisik juga memainkan peran

penting; ikan air tawar yang kehilangan banyak sisik akan mendapatkan kelebihan air yang berdifusi di dalam kulit dan dapat menyebabkan kematian pada ikan.

Karakteristik lainnya terkait dengan ikan air tawar adalah ginjalnya yang berkembang dengan baik. Ginjal ikan air tawar berukuran besar banyak air yang melewatinya. Banyak spesies bereproduksi di air tawar namun menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Mereka dikenal dengan nama ikan anadromous, meliputi salmon, trout, dan stickleback. Spesies yang bermigrasi antara air laut dan air tawar membutuhkan adaptasi kedua lingkungan. Ketika berada di dalam air laut mereka harus menjaga konsentrasi garam dalam tubuh mereka lebih rendah pada air lingkungannya. Ketika berada di air tawar mereka harus menjaga kadar garam berada di atas konsentrasi lingkungan sekitarnya. Banyak spesies yang menyelesaikan masalah ini dengan berasosiasi dengan habitat berbeda pada berbagai tahapan hidup. Belut, bangsa salmon, dan lamprey memiliki toleransi salinitas di berbagai tahap kehidupan mereka. Inilah yang dapat menyebabkan sehingga ikan salmon dapat hidup di air tawar dan air laut. Perbedaan fisiologis yang dapat terlihat ketika ikan salmon bermigrasi ke air laut, sisik ikan salmon akan tampak menyala karena penyesuaian kadar garam di air laut.

Ikan merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia yang meliputi sepertiga dari spesies ikan di dunia. Minyak ikan dapat dihasilkan dari perebusan ikan atau sisa pembuatan tepung. Minyak ikan mengandung PUFA (*Poly Unsaturated Fatty Acid*) khususnya Omega 3 yaitu EPA dan DHA (KKP, 2015; Sahena *et al.*, 2010). Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa minyak ikan memiliki aktivitas analgesik dan antioksidan (Gammone, 2018; Faizah, 2019).

EPA dan DHA dalam ikan diperoleh karena ikan mengonsumsi alga yang memiliki kedua asam lemak tersebut (Haris, 2004). EPA merupakan senyawa metabolit ALA yang dihasilkan pada tubuh manusia melalui reaksi enzimatik

desaturasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa EPA memiliki manfaat dalam menurunkan resiko penyakit jantung coroner, sebagai antiplatelet, menurunkan kadar LDL (*Low Density Lipoprotein*). Sedangkan, DHA berperan dalam tumbuh kembang otak serta indera penglihatan..

B. Minyak dan Lemak

Lemak merupakan trigliserida yang terkandung dalam minyak dan padat pada suhu kamar. Lemak yang mengandung asam lemak dengan titik lebur rendah biasanya berwujud cair pada suhu kamar, dan lemak yang mengandung asam lemak yang bertitik lebur tinggi, cenderung berwujud setengah padat atau padat pada suhu kamar (Rohman, 2016; Pranowo dan Muchalal, 2004).

Dalam teknologi makanan, lemak dan minyak memegang peran yang penting karena minyak dan lemak memiliki titik didih yang tinggi (sekitar 200 °C) maka biasanya dipergunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng akan kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi kering. Pada bidang biologi dikenal sebagai salah satu bahan penyusun dinding sel dan penyusun bahan-bahan biomolekul. Bidang gizi, minyak dan lemak merupakan sumber biokalori yang cukup tinggi nilai kilokalorinya yaitu sekitar 9 Kilokalori setiap gramnya. Selain itu juga merupakan sumber asam-asam lemak tak jenuh yang essensial yaitu linoleat dan linolenat (Sudarmadji *et al.*, 1989).

Lemak dan minyak adalah golongan dari lipid (latin yaitu *lipos* yang artinya lemak). Terutama lipid tidak bisa larut dalam air, tetapi larut dalam larutan non polar seperti eter. Lemak atau minyak adalah triester dari gliserol dan disebut trigliserida. Apabila minyak atau lemak di didihkan dengan alkali, kemudian mengasamkan larutan yang dihasilkan, maka akan didapatkan gliserol dan campuran asam lemak. Reaksi ini disebut penyabunan (Hard, 2003).

Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak

tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein (Rohman, 2016; Panagan *et al*, 2012).

Minyak dan lemak termasuk salah satu anggota golongan lipid yaitu lipid netral. Lipid diklasifikasikan dalam empat kelas yaitu lipid netral, fosfatida, spingoli, dan glikolipid. Minyak dan lemak yang telah dipisahkan dari jaringan asalnya mengandung sejumlah kecil komponen selain trigliserida yaitu lipid kompleks (leshitin, cephalin, fosfatida, dan glikolipid), sterol (berada dalam keadaan bebas atau terikat dengan asam lemak), asam lemak bebas, lilin, pigmen yang larut dalam lemak dan hidrokarbon (Ketaren, 2008).

Minyak juga termasuk golongan lipid. Suatu sifat yang khas dan mencirikan golongan lipid (termasuk minyak dan lemak) adalah kelarutannya dalam pelarut organik (pelarut non polar) dan sebaliknya ketidaklarutannya dalam pelarut air dan pelarut polar lainnya. Kelompok-kelompok lipid dapat dibedakan berdasarkan polaritasnya atau berdasarkan struktur kimia tertentu. Kelompok-kelompok lipid tersebut adalah (Rohman dan Sumantri, 2013).


- a. Kelompok trigliserida (minyak, lemak).
- b. Kelompok turunan asam lemak (lilin, aldehid asam lemak).
- c. Fosfolipid dan serebrosid (termasuk glikolipid).
- d. Sterol-sterol dan steroid.
- e. Karotenoid.

1. Asam Lemak

Asam lemak adalah asam organik yang terdiri dari rantai karbon lurus dengan gugus hidroksil (COOH-) di satu ujung dan gugus metil (-CH₃) di ujung

lainnya. Asam lemak alami biasanya memiliki rantai dengan jumlah karbon genap dari 4 hingga 20 karbon (Almatsier, 2006).

Asam lemak adalah asam monokarboksilat rantai lurus, tidak bercabang yang bahkan mengandung atom karbon mulai dari C-4, tetapi yang paling umum adalah C-16 dan C-18. Asam lemak dapat dikelompokkan berdasarkan panjang rantai, ikatan rangkap, dan ada tidaknya isomer trans-cis. Asam lemak juga diklasifikasikan menurut jumlah atom karbon yang dikandungnya, yaitu rantai pendek (6 atom karbon atau kurang), rantai sedang (8-12 atom karbon), rantai panjang (14-18 atom karbon) dan rantai sangat panjang (20 atom karbon atau lebih). (Rohman, 2016; Almatsier, 2016). Struktur kimia Asam Lemak dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Kimia Asam Lemak (Almatsier, 2016).

Asam lemak dapat dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhan, yaitu asam lemak jenuh (*saturated fatty acid*/SAFA) dan asam lemak tidak jenuh (*unsaturated fatty acid*) yang terdiri dari *monosaturated fatty acid* dan *polyunsaturated fatty acid*. Perbedaan antara asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh juga terdapat pada ikatan rangkapnya. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap antar karbonnya sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki ikatan rangkap antar karbonnya. Asam lemak tak jenuh memiliki titik cair lebih rendah daripada asam lemak jenuh. Keberadaan ikatan rangkap dalam struktur asam lemak mengakibatkan adanya konfigurasi, yaitu konfigurasi *cis* bila ikatan rangkapnya terletak pada sisi yang sama dengan gugus hidrogen dan konfigurasi *trans* apabila ikatan rangkapnya terletak di sisi yang berlawanan (Hames dan Hooper, 2005).

Asam-asam lemak sering kali dinamai dengan nama umumnya (*trivial name*) dibanding terminologi nama standard *International Union of Pure and Applied Chemistry* (IUPAC). Beberapa nama umum mempunyai kesulitan untuk diingat seperti kombinasi-kombinasi berikut: kaproat, kaprilat, dan kaprat; arakidat dan arakidonat; linoleat, linolenat, γ -linolenat, dan dihomogamma-linolenat. Asam lemak yang mempunyai berat molekul yang paling besar di dalam molekul gliserida juga merupakan bagian yang reaktif. Sehingga asam lemak mempunyai pengaruh yang besar terhadap lemak dan minyak (Rohman, 2016; Sastroamidjojo, 2009).

Perbedaan ikatan kimia antara lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh menyebabkan terjadinya perbedaan sifat kimia dan fisik, diantaranya asam lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolestrol dalam darah. Semakin panjang rantai karbon dan semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin besar kecenderungan untuk menurunkan kadar kolestrol dalam darah (O'keefe, 2002).


a. Klasifikasi asam lemak

Asam lemak yang telah diketahui yang terdapat di alam dari 1000 jenis, tetapi hanya sejumlah kecil yaitu sekitar 20-50 yang banyak diulas dan diteliti. Secara umum jenis-jenis asam lemak tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu asam lemak jenuh, asam lemak dengan satu ikatan rangkap, asam lemak tak majemuk, dan asam lemak yang mempunyai gugus fungsi lain (Estiasih, 2009).

1) Asam Lemak Jenuh (*Saturated Fatty Acid/SAFA*)

Asam lemak jenuh adalah asam lemak alami dan rantai karbonnya jenuh atau tidak memiliki ikatan rangkap. Panjang rantai asam lemak bervariasi dari 2 hingga lebih dari 22 atom karbon, tetapi jumlah atom karbon yang paling umum adalah 12-22 (Estiasih, 2009).


Struktur Asam Lemak Jenuh (*Saturated Fatty Acid*) dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Asam Lemak Jenuh (*Saturated Fatty Acid*)
(Almatsier,2016).

- 2) Asam Lemak Dengan Tak Jenuh Satu Ikatan Rangkap atau Asam Monoenoat (*Monounsaturated Fatty Acid-MUFA*)

Asam monoenoat adalah asam lemak dengan ikatan rangkap di lokasi tertentu. Asam lemak ini biasanya merupakan senyawa olefin dengan konfigurasi *cis* dan ikatan rangkap biasanya terdapat pada posisi tertentu. Jenis yang paling umum dari gugus asam lemak ini adalah n-9 atau omega-9, yang memiliki ikatan rangkap pada atom ke-9 dari gugus karboksil (Estiash, 2009). Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Tunggal (*Mono Unsaturated Fatty Acid*) dapat dilihat pada Gambar 2.3.




Gambar 2.3 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Tunggal (*Mono Unsaturated Fatty Acid*) (Almatsier, 2016).

- 3) Asam Lemak Tak Jenuh Majemuk atau Asam Poliena (*Polyunsaturates FattyAcids-PUFA*)

Asam lemak tak jenuh majemuk (PUFA) terutama terdiri dari atas asam poliolefinik dengan posisi ikatan rangkap yang teratur. Jumlah ikatan rangkap beragam dari 2 sampai 6 dengan konfigurasi *cis* (Estiasih, 2009).

Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Ganda (*Poly Unsaturated Fatty Acid*)

dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Struktur Asam Lemak Tak Jenuh Ganda (*Poly Unsaturated Fatty Acid*) (Almatsier, 2016).

PUFA dikelompokkan menjadi beberapa seri atau famili. PUFA alami disintesis dalam tubuh organisme hidup sebagai kelompok asam lemak. Rangkaian PUFA terpenting adalah asam lemak omega-6 dan asam lemak alfa-linolenat-omega-3. Seri PUFA lainnya, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil, adalah seri asam lemak omega-9 dan omega-7. Deret PUFA yang penting dan sumber asam lemak tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deret PUFA yang penting dan sumbernya (Estiasih, 2009).

Deret	Asam lemak	Sumber
Omega-3	Linolenat	Minya nabati, kacang-kacangan
	Eikosapentanoat	
	Docosaheksanoat	Ikan
Omega-6	Linoleat	Minyak nabati
	Arakhidrat	Jaringan lemak hewan
Omega-9	Oleat	Minyak Nabati

2. Asam lemak Omega-3

Asam lemak omega-3 termasuk dalam kelompok asam lemak essensial. Asam lemak ini disebut essensial karena tidak dapat dihasilkan oleh tubuh dan hanya bisa didapatkan dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Asam lemak essensial yaitu linolenat (18:3 ω -3) dan linoleat (18:2 ω -6). Kedua jenis ini

dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan fungsi normal semua jaringan. Masing-masing mempunyai ikatan rangkap pada karbon ke-6 dan ke-3 dari ujung gugus metil. Hewan dan manusia tidak dapat menambahkan ikatan rangkap pada karbon ke-6 dan karbon ke-3 pada asam lemak yang ada sehingga tidak dapat mensintesis kedua jenis asam lemak tersebut (Almatsier, 2004).

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada karbon nomor 3 dihitung dari atom karbon terjauh dari gugus karboksil atau karbon omega atau karbon gugus metil (CH₃) nomor 1. Pada tubuh deret asam lemak omega-3 disintesis dari asam linoleat melalui proses denaturasi (pengurangan kejenuhan) dan elongasi (penambahan panjang rantai) (Estiasih, 2009).

Asam lemak omega-3 merupakan asam lemak yang terdapat pada ikan. Asam lemak ini termasuk essensial yang dianggap memiliki beberapa keaktifan biologis terutama EPA dan DHA. Minyak ikan terutama yang hidup di air dalam dan dingin kaya akan EPA dan DHA. Plankton laut mengandung asam lemak omega-3. Ikan dapat mengubah asam lemak linolenat menjadi EPA dan DHA (Almatsier, 2004).

Dari deret asam lemak omega-3 tersebut, asam lemak omega penting dalam minyak ikan adalah asam linolenat, asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat (DHA).

1. Asam Linolenat (*Linolenat Acid*)

Asam linolenat diproduksi dalam tubuh tumbuhan oleh alfa-12 dan alfa-15 denaturasi asam oleat. Posisi ikatan rangkap berada pada atom nomor 9, 12 dan 15 dihitung dari gugus karboksil. EPA (*eicosapentaenoic acid*).

EPA (*eicosapentoic acid*) adalah senyawa dengan 20 rantai karbon, lima ikatan rangkap, dimana ikatan rangkap pertama berada di posisi 3 ujung gugus

metil. (Maulana, 2013)

2. DHA (*Docosahexanoic Acid*)

DHA (*docosahexanoic acid*) adalah senyawa dengan 22 rantai karbon dan enam ikatan rangkap, dimana ikatan rangkap pertama berada pada posisi karbon ketiga ujung metil. DHA diklasifikasikan sebagai asam lemak omega-3, dengan ikatan rangkap terletak pada atom 4, 7, 13, 16, dan 19 dari gugus karboksil. DHA sangat penting karena mendorong perkembangan jaringan otak dan sistem saraf (Maulana, 2013).

b. Peran Asam Lemak Omega-3

Omega-3 (EPA dan DHA) termasuk asam linoleanat yang berfungsi untuk pembentukan spingomielin dan merupakan komponen struktural sel saraf (mielin). EPA berfungsi untuk pembentukan membran sel. Spingomielin dibentuk oleh EPA dan DHA tadi digunakan untuk membentuk membran sel otak dan mielin sel saraf. Apabila EPA dan DHA pada otak cukup maka sinyal yang disampaikan dari otak akan diteruskan ke akson dan mielin akan mempercepat jalannya sinyal yang disampaikan oleh otak. Pesan yang disampaikan oleh otak kemudian diteruskan oleh neurotransmitter sesuai dengan perintah otak sehingga perkembangan gerak motorik tubuh yang dihasilkan menjadi cepat dan berkembang baik. Sebaliknya jika EPA dan DHA jumlahnya kurang di otak maka membran sel mati sehingga hantaran sinyal yang diteruskan ke akson tidak lancar akibatnya neurotransmitter tidak bekerja dan gerak motorik tubuh menjadi lambat dan perkembangan motorik pun menjadi lambat. Neurotransmitter berfungsi sebagai penyampai pesan dari sel saraf (Diana, 2013).

Adapun peran omega-3 dalam pencegahan penyakit adalah sebagai berikut:

1. Peran Asam lemak Omega-3 dalam Pencegahan Penyakit Jantung

Asam lemak omega-3 berperan dalam pencegahan penyakit jantung melalui penurunan resiko trombosis dan aterosklerosis akibat perubahan profil lipid plasma dan sintesis eikosanoid. Sintesis eikosanoid dari asam lemak omega-3 berperan dalam mencegah agregasi platelet pada proses trombosis dan berperan sebagai vasodilator pembuluh darah. Asam lemak omega-3 menurunkan pembentukan LDL dan VLDL kolestrol yang beresiko terhadap penyakit jantung (Estiasih, 2009).

2. Peran Asam Lemak Omega-3 dalam Pencegahan dan Terapi Penyakit Kanker

Mekanisme yang diduga berperan pada pada penghambatan perkembangan kanker oleh asam lemak omega-3 adalah perubahan sintesis eikosanoid, penghambatan proses mitosis, apoptosis, induksi diferensiasi, penekanan angiogenesis, dan perubahan metabolisme estrogen (Estiasih, 2009).

3. Peran Asam Lemak Omega-3 dalam Perkembangan Otak dan Retina

DHA adalah asam lemak terpenting untuk perkembangan otak dan retina. DHA terkandung dalam struktur fosfolipid yang merupakan komponen membran otak dan retina (Estiasih, 2009).

C. Minyak Ikan

Minyak ikan adalah salah satu zat gizi yang mengandung asam lemak kaya manfaat karena mengandung sekitar 25% asam lemak jenuh dan 75% asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA diantaranya DHA dan EPA yang dapat membantu proses tumbuh-kembangnya otak (kecerdasan), perkembangan indra penglihatan, dan sistem kekebalan tubuh bayi dan balita. Kandungan minyak di dalam ikan ditentukan beberapa faktor yaitu jenis ikan, jenis kelamin, umur (tingkat kematangan), musim, siklus bertelur, letak geografis perairan dan jenis makanan yang dikonsumsi ikan tersebut. Minyak dalam ikan

terdapat dalam daging ikan baik daging yang berwarna merah maupun putih. Kebanyakan daging yang berwarna merah mengandung minyak lebih tinggi. (Panagan *et al*, 2012; Estiasih, 2009).

Minyak ikan juga merupakan minyak lemak hasil destearisasi sebagian dari minyak lemak hati segar *Gadus Morhua Linne* dan spesies lain dari familia *Gadidae*. Pemerian minyak ikan yaitu encer, berbau khas, tidak tengik, rasa dan bau seperti ikan. Mempunyai sifat sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam eter, kloroform, karbon disulfida dan etil asetat. Mengandung vitamin A tidak kurang dari 225 µg dan vitamin D tidak kurang dari 2,125 µg per gram minyak ikan. Memiliki berat jenis antara 0,918 g/cm³ dan 0,927 g/cm³ (Ditjen POM, 1995).

Minyak ikan berasal dari jaringan ikan yang berminyak. Minyak ikan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh ganda atau *Polynsaturated Fatty Acids* (PUFA), asam lemak tak jenuh ganda yang banyak terdapat pada ikan yaitu asam lemak Omega-3, terutama Eikosapentanoat (EPA) dan asam Dokosaheksanoat (DHA). Ikan salmon mempunyai kandungan asam lemak omega yang tinggi, asam lemak omega termasuk golongan asam lemak esensial. Asam lemak esensial merupakan lemak yang tidak dihasilkan oleh tubuh dan hanya bisa diperoleh dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari (Rasyid, 2003).

Minyak ikan merupakan salah satu zat gizi yang mengandung asam lemak dan kaya manfaat, minyak ikan mengandung sekitar 25% asam lemak dan 75% asam lemak tidak jenuh. Minyak ikan mengandung sumber pakan yang kaya akan asam lemak Omega 3 yang diperoleh dari minyak ikan laut. Minyak ikan penyuplai utama dalam asam lemak yang mempunyai rantai panjang yang tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh dibedakan menjadi dua bagian yaitu asam lemak

tak jenuh tunggal (*Monounsaturated Fatty Acids*) MUFA dan asam lemak tak jenuh ganda (*Polysaturated Fatty Acids*) PUFA (Maulana, dkk., 2014).

Lemak dan minyak ikan adalah suatu trigliserida atau trigliserol. Perbedaan antara suatu lemak dan minyak adalah lemak berbentuk padat dan minyak berbentuk cair pada suhu kamar. Lemak tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak adalah bahan-bahan yang tak dapat larut dalam air (Almunady *et al*, 2011).

D. Sediaan Farmasi

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM, 2004), obat dalam artian pembuatan adalah produk yang diproduksi oleh industri farmasi atau industri farmasi atau industri makanan. Selain obat-obatan, industri farmasi juga memproduksi suplemen makanan. Suplemen makanan yang dapat diproduksi oleh industri farmasi adalah cairan atau bubuk yang berbentuk cairan. Sediaan farmasi yang umum meliputi aerosol, kapsul, tablet, serbuk, emulsi dan gel (Ditjen POM, 1995).

Kapsul adalah sediaan yang mengandung satu macam obat atau lebih yang dimasukkan kedalam cangkang atau wadah kecil yang umumnya dibuat dari gelatin (Suparman, 2019). Kebanyakan kapsul yang beredar dipasaran adalah kapsul yang semuanya dapat ditelan oleh pasien. Selain itu terdapat juga sediaan kapsul yang dapat disisipkan kedalam rektum sehingga obat dilepaskan dan diabsorpsi ditempat tersebut, atau isi kapsul dapat dipindahkan dari cangkang gelatin dan digunakan sebagai pengukur yang dini dari obat-obat bentuk serbuk. Cangkang dapat larut dan dipisahkan dari isinya. 1 kapsul lunak (*Soft Capsule*) : berisi bahan obat berupa minyak/larutan obat dalam minyak. 2 kapsul keras (*Hard Capsule*) : berisi bahan obat yang kering (Ansel, 2011)

Kapsul merupakan sediaan padat yang biasanya terdiri dari satu atau lebih bahan obat serbuk atau cair yang diisi ke dalam cangkang kapsul gelatin keras atau lunak yang mudah larut (Kemenkes, 2020). Keunggulan dibuat sediaan kapsul yaitu dapat mengatasi rasa dan bau yang tidak menyenangkan, tidak sulit untuk dikonsumsi, proses penyiapannya mudah, bahan obat dapat terlindungi dari pengaruh luar (Wulandari, 2020). Pada formulasi sediaan kapsul dapat menambahkan ekspien seperti zat pengisi (*filler*), penghancur (*disintegrant*), pelincir (*glidant*), dan pelicin (*lubricant*) (Hadisoewignyo, 2016)

E. Kromatografi Gas


Kromatografi gas merupakan metode pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Kegunaan umum dari kromatografi gas adalah untuk melakukan pemisahan dinamis dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga untuk melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran (Hendayana, 2006).

Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran dan biasanya sampai suhu 400⁰C, dengan menggunakan gas sebagai fase gerak. Fase diam dapat berupa zat padat atau cair (Gandjar dan Rohman, 2012).

Prinsip identifikasi sampel dengan kromatografi gas adalah sebagai berikut: Sampel diinjeksikan, sehingga sampel tersebut masuk ke dalam Sample Injection Port. Gerbang injeksi dipanaskan, sehingga sampel-sampel cair akan menguap dengan cepat. Sampel sebanyak beberapa mikroliter dalam bentuk cairan, dimasukkan dengan menggunakan syringe. Uap, yang terjadi dibawa masuk ke dalam kolom oleh gas pembawa. Kolom akan memisahkan komponen-komponen analit dari cuplikan berdasarkan volatilitas analit dan afinita atau

interaksi yang terjadi antara analit dengan fasa diam. Setelah analit terelusi dalam kolom, selanjutnya analit dideteksi oleh detektor dan sinyal dalam puncak akan dihasilkan oleh pencatat (Sastrohamidjojo, 2009)

Adapun skema kromatografi gas dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Skema Alat Kromatografi Gas

Keunggulan kromatografi gas

1. Kecepatan

- a. Gas yang merupakan fasa gerak sangat cepat mengadakan kesetimbangan antara fasa bergerak dengan fasa diam
- b. Dapat diperoleh waktu pemisahan yang relatif sangat cepat (diukur dalam menit) dengan kecepatan gas yang tinggi.

2. Sensitif

Kromatografi gas sangat sensitif. Alat yang paling sederhana dapat mendeteksi konsentrasi dalam ukuran 100 ppm. Alat-alat GC yang lebih rumit dapat mendeteksi senyawa yang konsentrasinya hanya beberapa ppm saja.

Karena sensitifitasnya yang tinggi dari GC maka hanya diperlukan sejumlah kecil dari cuplikan, biasanya dalam ukuran mikroliter saja.

3. Pemisahan

Dengan kromatografi gas memungkinkan untuk memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran, dimana hal ini tidak mungkin dipisahkan

dengan cara-cara yang lain. Misalnya pemisahan metil ester seperti asam laurat dari metil ester lain seperti asam miristat, asam palmitat, dan lain-lain. Senyawa tersebut tak mungkin dianalisis dengan cara destilasi atau dengan cara ekstraksi, tetapi sangat mudah dipisahkan dengan GC.

4. Alat kromatografi gas dapat dipakai dalam waktu yang lama dan berulang-ulang (Sastrohamidjojo, 2009).

Komponen-komponen instrumentasi pada kromatografi gas yaitu :

1. Gas pembawa (fasa gerak)

Gas pembawa ditempatkan dalam tabung silinder bertekanan tinggi dengan tekanan sebesar 150 atm. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu gas pengangkut, yaitu :

a. *Inert*, yaitu tidak bereaksi dengan cuplikan, pelarut dan material dari kolom.

b. Murni dan mudah diperoleh serta murah.

c. Sesuai dan cocok untuk detektor dan harus memenuhi difusi gas.

Gas-gas yang sering dipakai sebagai fase gerak pada GC adalah helium atau argon. Gas tersebut sangat baik, tidak mudah terbakar, tetapi sangat mahal harganya. Gas pembawa berada dalam tangki bertekanan tinggi. Pengatur tekanan digunakan untuk memberikan tekanan yang seragam pada injektor sehingga diperoleh laju alir yang tetap (Winarno, 2002).

2. Gerbang suntik (injektor)

Injektor adalah alat untuk memasukkan sampel yang akan dianalisis ke dalam sistem GC dengan pertolongan jarum injeksi yang biasa disebut syringe. Tempat injeksi alat GC selalu dipanaskan, aturan pertama untuk pengaturan suhu ini adalah suhu tempat injeksi dipanaskan 50°C lebih tinggi dari titik didih campuran cuplikan yang mempunyai titik didih paling tinggi (Sastrohamidjojo,

2009).

3. Detektor

Detektor pada GC akan memberikan informasi mengenai segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan GC. Detektor yang banyak digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa organik adalah FID (Flame Ionisation Detector). Pada FID cuplikan yang dibawa oleh gas pembawa mengalir ke dalam nyala dan diuraikan menjadi ion. Ion ini meningkatkan arus listrik yang mengalir antara kedua elektroda dan kemudian arus tersebut diperkuat dan direkam (Gritterer, 1991).

Ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh detektor, yaitu :

- 1) Memberikan respon yang spesifik untuk setiap senyawa yang diukur
- 2) Mempunyai linieritas yang lebar
- 3) Mempunyai kepekaan yang tinggi dan dapat diperkirakan
- 4) Tidak merusak komponen yang diukur
- 5) Memberikan informasi kualitatif pada puncak yang dideteksi.

Kromatografi gas adalah instrumen yang paling banyak digunakan di laboratorium penelitian dan industri. Hal ini disebabkan karena tingkat keberhasilannya yang tinggi, waktu analisis yang cepat, efisiensi pemisahan yang baik dan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk analisis relative sedikit. Selain dengan menggunakan kromatografi gas analisis asam lemak juga dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi lapis tipis

4. Kolom

Kolom pada GC merupakan bagian yang sangat penting, sebab pada kolom terjadi proses pemisahan komponen yang akan dianalisis. Proses pemisahan dapat dipandang sebagai serangkaian dari partisi dimana cuplikan

masuk ke dalam larutan dari fasa cair dan selang beberapa waktu akan teruapkan lagi. Jadi fasa cair menahan molekul-molekul cuplikan dan gerakan cuplikan dilakukan oleh fasa bergerak. Afinitas cuplikan terhadap fasa cair menentukan berapa lama cuplikan ditahan. Senyawa-senyawa yang mempunyai afinitas rendah (tidak suka) terhadap fasa diam akan keluar dari kolom pertama. Sedangkan senyawa-senyawa dengan afinitas besar (larut dengan baik) terhadap fasa diam akan keluar dari kolom kemudian (Satrahamidjojo, 2009)..

Ada dua tipe kolom yang tersedia untuk kromatografi analisis yaitu kolom packing dan kolom kapiler. Saat ini kolom packing bukan merupakan pilihan utama dalam analisis rutin asam lemak hal ini disebabkan karena resolusinya yang rendah dan membutuhkan sampel dalam jumlah yang lebih besar. Bila dibandingkan dengan kolom packing kolom kapiler membutuhkan sampel yang jauh lebih sedikit dan mampu menghasilkan resolusi pemisahan yang lebih tinggi (Whitaker, 2005).

Kolom berfungsi sebagai jantung pada kromatografi gas. Kolom yang biasa digunakan sangat bermacam-macam dan bentuknya sangat beragam. Panjang kolom yang digunakan mulai dari 1 m sampai dengan 30 m. Diameter kolom biasanya antara 0,3 mm hingga 0,5 mm. Isi kolom berupa padatan pendukung dari fase diam yang berfungsi untuk mengukut fase diam tersebut. Padatan atau *diatomite* berupa tanah diatom yang telah dipanaskan atau dikeringkan. Persyaratan padatan pendukung yang baik :

- 1) *Inert*, tidak mudah menguap.
- 2) Kuat, stabil pada suhu tinggi.
- 3) Memiliki luas permukaan yang besar : 1-20 m²/g.
- 4) Permukaan yang teratur, ukuran yang sama, ukuran pori sekitar 10 µl (Sastrohamidjojo, 2009).

Pada instrument GC-MS, terdapat dua blok utama yaitu kromatografi gas dan spektrometri massa. Kromatografi gas memisahkan asam lemak yang terdapat pada sampel sediaan minyak ikan. Pemisahan ini berdasarkan kemampuan masing-masing asam lemak dalam fase gerak berinteraksi dengan fase diam pada kolom kromatografi. Pemisahan ini ditunjukkan dengan adanya retention time (waktu retensi) yang berbeda dari setiap asam lemak. Retention time ini ditunjukkan dengan adanya puncak-puncak pada kromatogram. Luas puncak pada kromatogram ini setara dengan kosentrasi atau kadar asam lemak yang terdapat pada sampel. Asam lemak yang dianalisis sebelumnya diubah dalam bentuk ester supaya asam lemak tersebut mempunyai titik didih yang rendah (Almunady *et al*, 2011; Hendayana, 2006; Khopkar, 1990).

Setelah asam lemak dipisahkan oleh kromatografi, asam lemak masuk ke detektor spektrometri massa. Disini asam lemak diionisasi dan difragmentasi sehingga terpecah menjadi fragmen-fragmen yang dapat dideteksi dengan rasio massa dan muatan. Jenis asam lemak akan ditampilkan dalam bentuk pola fragmentasi yang menunjukkan berat molekul atau rumus molekul dari senyawa yang terdeteksi. Pola fragmentasi ini akan dibandingkan dengan pola fragmentasi yang terdapat pada base komputer sehingga diketahui jenis asam lemak yang diidentifikasi (Hendayana, 2006).

F. Tinjauan Islam dalam Pemanfaatan Hewan.

Islam adalah agama yang ajarannya sangat kompleks dan lengkap, membimbing manusia dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain, dijelaskan dan diatur dalam ajaran Islam pada sumber hukum Islam, yaitu Alqur'an dan Hadits.

Kesehatan merupakan salah satu prinsip yang ditekankan dalam ajaran islam. Islam menganjurkan terhadap pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan thoyyiban (halal dan baik). Halal adalah suatu hal yang dibolehkan secara agama, sedangkan thoyyib adalah sesuatu yang baik pada dasarnya, tidak merusak fisik dan pikiran, serta harus memenuhi syarat dari segi kebersihan, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada ayat Alqur'an Q.S Al-Baqarah/2:168 dibawah ini:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِن مَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Ayat diatas ditunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia sekelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan dengan merugikan yang lain, maka bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk memakan yang halal yang ada di bumi (M.Quraish, 2006).

Allah juga melarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur'an Q.S. Al-A'raf/7:31 dibawah ini:

يَنْبَغِ مَا دَمَ خُدُّوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Alasan turunnya ayat ini, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa jahiliah, seorang wanita berthawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang, hanya kemaluannya yang ditutupi dengan searcik kain. Sambil berthawaf ia bersyair “Hari ini sebagian atau seluruhnya kelihatan, dan bagian yang kelihatan tidak aku halalkan”. Maka turunlah ayat,”.... *Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid....*”

Dalam *Tafsir al-Mishbah* karya M.Quraish Shihab mrnjelaskan bahwa kata “ *Pakailah pakaianmu yang indah*” yakni menutup aurat, jika membukanya pasti buruk. Lakukan itu *setiap memasuki masjid*, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas. *Makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi *serta minumlah* yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan *janganlah berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam hal ibadah dengan menambah cara atau kadarya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena *sesungguhnya Allah tidak menyukai* yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi *orang yang berlebih-lebihan* dalam hal apapun.

Dalam *Tafsir al-Mishbah* karya M.Quraish Shihab dalam konteks berlebih-lebihan ditemukan pada pesan Nabi SAW,” tidak ada wajah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi putra Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalau pun harus (memenuhi perut), maka hendaklah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi

untuk pernafasannya”. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui Miqdam Ibnu Ma’ dikarib).

Penggunaan obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun hewan merupakan metode pengobatan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimasa ini penggunaan obat dari tanaman maupun hewan banyak digunakan oleh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Namun sebagai muslim harus memahami bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi baik itu makanan, minuman termasuk obat-obatan harus halal hukumnya berdasarkan ajaran Islam.

Obat-obat yang berasal dari hewan tentunya harus hewan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT karena ada beberapa hewan yang diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi yaitu sebagai berikut:

1. Hewan babi.
2. Hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsa dan beberapa hewan peliharaan seperti singa, serigala, macan, kucing dan anjing.
3. Binatang yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah.
4. Jallalah yaitu binatang yang memakan kotoran. Namun jika binatang tersebut dijauhkan oleh kotoran dalam waktu yang lama dan diberi makanan yang suci maka akan menjadi baik dan bisa dikonsumsi .

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2:173 berikut ini.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۚ لَيْسَ فِي اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah”.

Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab dalam konteks “Haram” bukanlah yang haram itu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tapi sesungguhnya yang haram bagi kalian, orang-orang beriman itu adalah bangkai binatang yang mati bukan karena disembelih, daging babi dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah tapi atas nama berhala dan sejenisnya.

Di sisi yang lain hewan-hewan yang diharamkan di atas, Allah swt. memberikan pengecualian pada kondisi tertentu dan kondisi terdesak maka hewan yang sebelumnya diharamkan menjadi boleh untuk dimakan.

Hal tersebut sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An’am/6:119 bawah ini:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.

Tafsir Al-Muyassar dan apa saja yang menghalangi kalian (wahai kaum muslimin), untuk memakan sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada kalian seluruh makanan yang diharamkannya atas kalian? Akan tetapi, dalam kondisi darurat yang disebabkan oleh kelaparan, dari barang-barang yang diharamkan atas kalian seperti bangkai, sesungguhnya menjadi boleh dimakan bagi kalian. Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang sesat pasti akan menyesatkan para

pengikut mereka dari jalan Allah dalam urusan penghalalan barang-barang yang diharamkan dan pengharaman barang-barang halal dengan dorongan hawa nafsu mereka lantaran kebodohan mereka. Sesungguhnya tuhanmu (wahai rasul), lebih mengetahui orang yang melampaui batas dalam perkara tersebut. Dan Dia lah yang akan menangani perhitungan perbuatan orang itu dan balasan baginya.

Terkait dengan adanya pengecualian terhadap bolehnya mengkonsumsi atau memakan hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam keadaan darurat, ada beberapa syarat atau batasan kondisi darurat tersebut antara lain:

1. Kondisi darurat tersebut memang ada atau nyata serta tidak dibuat-buat, spekulatif dan sebagainya.
2. Tidak adanya jalan atau cara lain selain menggunakan sesuatu yang diharamkan tersebut dan jika tidak menggunakannya akan menimbulkan bahaya.
3. Harus memenuhi uzur diperbolehkannya melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut.
4. Tidak menyalahi prinsip dasar Islam.
5. Melakukan sesuatu yang haram hanya pada batasan untuk bertahan saja.
6. Bertanya kepada ahli agama dan sebagainya yang memiliki ilmu dan dapat dipercaya (Nur Asia H, 2020).

Jadi berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan mengkonsumsi hewan baik itu memakan atau menggunakannya sebagai obat harus sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, sangat penting untuk tidak mengkonsumsi barang atau hewan yang telah jelas dilarang oleh Islam. Namun sesuatu yang dilarang oleh Allah boleh untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan jika dalam kondisi darurat seperti penjelasan di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium yang bertujuan untuk menganalisis kandungan asam lemak omega-3 pada produk minyak ikan salmon lokal dan impor.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratoriu Kimia Analisis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan September 2022 sampai selesai.

C. Sampel

Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah empat sediaan kapsul minyak ikan salmon dimana dua produk sediaan kapul minyak ikan salmon lokal dan dua produk sediaan kapsul minyak ikan salmon impor yang beredar dipasaran dengan nama sampel A, sampel B, sampel C, dan sampel D.

D. Instrumen Peneliitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa instrumen alat maupun bahan yang akan digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah botol vial, pipet tetes ukur, gunting, kromatografi gas-spektrometri massa (GC-MS).

b. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor, aquadest, tissue, dan n-heksan

E. Prosedur Penelitian

a. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sampel yang digunakan adalah sediaan kapsul minyak ikan salmon (*Onchorhynchus nerka*) lokal dan impor.

b. Metilasi Minyak Ikan

Sampel diambil sebanyak 0,25 ml kemudian dimasukkan kedalam botol vial dan ditambahkan n-heksan sebanyak 1,5 ml lalu dihomogenkan dengan cara digoyang-goyangkan (Syarifuddin, 2022).


c. Analisis Asam Lemak

Diinjeksikan sebanyak 1 µl sampel untuk dianalisis dengan menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). Instrumen GC-MS yang digunakan adalah *Thermo Scientific Trace 1310-ISQ 7000*. Kolom yang digunakan adalah RTX-5, suhu injektor diatur 250°C, suhu detektor 250°C, dengan gas He sebagai pembawa. Suhu awal kolom diatur 140°C ditahan selama 2 menit, kemudian dinaikkan laju konstan 4°C/menit hingga dicapai suhu 260°C yang kemudian ditahan selama 2 menit. Jadi total lamanya waktu analisis GC-MS untuk setiap sampel adalah 34 menit (Pandiangan, *et.al*, 2018).


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Hasil analisis dengan GC-MS yang diperoleh adalah dalam bentuk kromatogram, dan kromatogram dari asam lemak pada masing-masing sampel berbeda. Kromatogram dari keempat sampel dapat dilihat pada Gambar 4.1 sampai dengan 4.4.




Gambar 4.1 Kromatogram sampel A



Gambar 4.2 Kromatogram sampel B



Gambar 4.3 Kromatogram sampel C



Gambar 4.4 Kromatogram sampel D

Berdasarkan dari Gambar 4.1 sampai dengan Gambar 4.4, analisis dilakukan sampai pada menit ke-34, terlihat bahwa kromatogram dari keempat sampel tersebut memiliki komposisi asam lemak yang berbeda-beda. Perbedaan terlihat pada waktu retensi, intensitas, luas area, dan komposisi asam lemak dari masing-masing sampel. Tinggi dan luas area kromatogram merupakan penentu komposisi dari asam lemak. Asam lemak yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan 3 jenis asam lemak yaitu SFA, MUFA, dan PUFA (Estiasih, 2009).

Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil berupa kromatogram. Berdasarkan kromatogram yang diperoleh terlihat bahwa komposisi asam lemak minyak ikan didapat dalam bentuk persen (%). Komposisi asam lemak yang diperoleh dari masing-masing sampel juga berbeda-beda, bergantung pada tinggi dan luas area kromatogram dari masing-masing sampel. Komposisi dari asam lemak omega-3 dalam sediaan minyak ikan yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan GC-MS dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sampai Tabel 2.4

Tabel 2.1 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam sediaan kapsul minyak ikan sampel A

Peak	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul	Aktivitas Farmakologis
8	11.799, 11.401	Eicosatetraenoic acid	0.19, 0.16	$C_{20}H_{32}O_2$	304.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)
9	11.935	Eicosatrienoic acid	0.18	$C_{20}H_{34}O_2$	306.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)

Tabel 2.2 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam sediaan kapsul minyak ikan sampel B

Peak	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul	Aktivitas Farmakologis
12	31.035, 27.328	Linoleic acid	0.27, 0.06	$C_{18}H_{32}O_2$	280.4	Antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, dan antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012)
13	3.711	Eicosatrienoic acid	0.24	$C_{20}H_{34}O_2$	306.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)
19	1.775	Eicosatetraenoic acid	0.08	$C_{20}H_{32}O_2$	304.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)

Tabel 2.3 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam sediaan kapsul minyak ikan sampel C

Peak	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul	Aktivitas Farmakologis
1	28.589, 24.994, 26.576, 28.504, 32.160, 31.814	Docosapentaenoic acid	5.89, 3.74, 2.36, 1.31, 0.80, 0.79	$C_{22}H_{34}O_2$	330.5	-
2	24.634, 24.702, 24.726, 24.579, 24.658, 28.130, 28.504, 28.763, 28.004, 28.688	Eicosapentaenoic acid	5.35, 4.73, 3.43, 2.53, 2.03, 1.73, 1.31, 0.77, 0.54, 0.35	$C_{20}H_{30}O_2$	302.5	Antiinflamasi, analgesik, mampu menurunkan risiko kematian mendadak akibat jantung koroner (Haris, 2004) Antiagregasi platelet, menurunkan kolesterol dalam darah

						khususnya LDL (Maulana, 2013)
3	28.317, 28.344, 28.242, 28.164, 28.208, 28.130 28.763, 28.688	Docosahexa enoic acid	5.25, 4.68, 3.36, 2.93, 1.95, 1.73, 0.77, 0.35	$C_{22}H_{32}O_2$	328.5	Antiinflamasi, anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; Faizah, 2019) Menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala keloid (Olaitan, <i>et.al</i> ,

						2011)
6	24.464, 24.848, 28.004, 24.318	Eicosatetrae noic acid	3.95, 1.54, 0.54, 0.44	$C_{20}H_{32}O_2$	304.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)
35	25.246, 25.590	Linoleic acid	0.65, 0.12	$C_{18}H_{32}O_2$	280.4	Antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, serta antihepatotoksi k dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012)

Tabel 2.4 Hasil analisis senyawa Asam lemak Omega-3 yang terkandung dalam sediaan kapsul minyak ikan sampel D

Peak	Waktu Retensi	Nama Senyawa	Peak Area %	Rumus Molekul	Berat Molekul	Aktivitas Farmakologis
1	24.654, 24.573, 24.542, 24.600, 28.110	Eicosapenta noic acid	5.15, 3.35, 1.98, 1.11, 1.00	$C_{20}H_{30}O_2$	302.5	Antiinflamasi, analgesik, mampu menurunkan risiko kematian

						mendadak akibat jantung koroner (Haris, 2004) Antiagregasi platelet, menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL (Maulana, 2013)
8	20.730, 26.542	Docosapent aenoic acid	3.36, 1.15	$C_{22}H_{34}O_2$	330.5	-
10	28.270, 28.528, 28.236, 28.299, 28.195, 28.161, 28.481, 28.110, 28.181, 28.130, 28.144,	Docosahexa enoic acid	3.02, 3.00, 1.86, 1.48, 1.35, 1.25, 1.03, 1.00, 0.81, 0.58, 0.58,	$C_{22}H_{32}O_2$	328.5	Antiinflamasi, anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; Faizah, 2019) Menurunkan kolesterol dalam darah

	28.736, 28.868		0.34, 0.22			<p>khususnya LDL, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala keloid (Olaitan, <i>et al</i>, 2011)</p>
14	16.318, 20.794, 27.998, 28.481 24.797, 28.736, 24.393, 24.328	Eicosatetrae noic acid	2.17, 1.03, 0.43, 0.40, 0.39, 0.34, 0.31, 0.27	$C_{20}H_{32}O_2$	304.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)
24	20.995, 21.423, 16.883	Linoleic acid	1.47, 1.14, 1.09	$C_{18}H_{32}O_2$	280.4	Antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, serta

						antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012)
47	20.563, 24.797	Eicosatrienoic acid	0.42, 0.39	$C_{20}H_{34}O_2$	306.5	Antiinflamasi (Dennis, 2015)

B. Pembahasan

Lemak dan minyak adalah suatu trigliserida atau triasilgliserol. Lemak tersusun oleh asam lemak jenuh sedangkan minyak tersusun oleh asam lemak tak jenuh. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Minyak lemak hasil ekstraksi tersebut berasal dari minyak lemak hati segar *Gadus morhua Linne* dan spesies lain dari familia *Gadidae*. Minyak ikan sangat berbeda dengan minyak lainnya, yang dicirikan dengan variasi asam lemaknya lebih tinggi dibandingkan dengan minyak atau lemak lainnya, jumlah asam lemaknya lebih banyak, panjang rantai karbon mencapai 20 atau 22, lebih banyak mengandung jenis asam lemak tak jenuh jamak (ikatan rangkap sampai dengan 5 dan 6) dan lebih banyak mengandung jenis Omega-3 dibandingkan Omega-6 (Ditjen POM, 1995; Estiasih, 2009).

Analisis kualitatif asam lemak omega-3 pada kapsul minyak ikan salmon dilakukan dengan menggunakan instrumen GC-MS untuk mengidentifikasi asam lemak omega-3 pada kapsul minyak ikan salmon. Sediaan kapsul minyak ikan salmon harus diubah menjadi metil ester karena salah satu syarat senyawa yang akan dianalisis dengan GC-MS adalah senyawa volatile (senyawa mudah menguap).

Metode analisis kualitatif dilakukan karena metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif.

Metode GC-MC digunakan karena kromatografi gas merupakan metode dinamis untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa volatile (senyawa yang mudah menguap) serta menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Keuntungan utama spektrometri massa sebagai metode analisis adalah lebih sensitif dan spesifik untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui atau untuk menentukan keberadaan senyawa tertentu (Silverstein, *et al*, 1986).

Sebelum di analisis dengan GC-MS terlebih dahulu sampel diderivatisasi. Derivatisasi pada kromatografi gas merupakan proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas (Rohman, 2009). Dalam hal ini derivatisasi dilakukan melalui metilasi. Proses metilasi dilakukan dengan cara sampel diambil sebanyak 0,25 ml kemudian dimasukkan kedalam botol vial dan ditambahkan n-heksan sebanyak 1,5 ml setelah itu dihomogenkan dengan cara digoyang-goyangkan (Syarifuddin, 2022).

Dilakukan analisis kandungan asam lemak omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor menggunakan instrument GC-MS dengan cara diinjeksikan sebanyak 1 μ l sampel untuk dianalisis dengan menggunakan kromatografi gas. Instrumen GC-MS yang digunakan adalah *Thermo Scientific Trace 1310-ISQ 7000*. Kolom yang digunakan adalah RTX-5, suhu injektor diatur 250°C, suhu detektor 250°C, dengan gas He sebagai pembawa. Suhu awal kolom diatur 140°C ditahan selama 2 menit, kemudian dinaikkan laju konstan 4°C/menit

hingga dicapai suhu 260°C yang kemudian ditahan selama 2 menit. Jadi total lamanya waktu analisis GC-MS untuk setiap sampel adalah 34 menit (Pandiangan, dkk., 2018). Hasil analisis kandungan omega-3 dari sediaan kapsul minyak ikan salmon lokal dan impor dengan GC-MS dapat dilihat pada tabel 2.1 untuk sampel A, tabel 2.2 untuk sampel B, tabel 2.3 untuk sampel C dan tabel 2.4 untuk sampel D.

Pada tabel 2.1 sampel A terlihat ada dua komponen senyawa asam lemak omega-3 yaitu : pertama, eicosatetraenoic acid (ETA) (0.19%), dan (0.16%) dengan waktu retensi 11.799 dan 11.401. Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015). Kedua, eicosatrienoic acid (ETE) (0.18) dengan waktu retensi 11.935. Senyawa eicosatrienoic acid (ETE) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015).

Pada tabel 2.2 sampel B terlihat ada tiga komponen senyawa asam lemak omega-3 yaitu : pertama, linoleic acid (ALA) (0.27%), dan (0.06%) dengan waktu retensi 31.035, dan 27.328. Senyawa linoleic acid (ALA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012). Kedua, eicosatrienoic acid (ETE) (0.24%) dengan waktu retensi 3.711. Senyawa eicosatrienoic (ETE) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015). Ketiga, eicosatetraenoic acid (ETA) (0.08) dengan waktu retensi 1.775. Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015).

Pada tabel 2.3 sampel c terlihat ada lima komponen senyawa asam lemak omega-3 yaitu : pertama, docosapentaenoic acid (DPA) (5.89%), (3.74%), (2.36%), (1.31%), (0.80%), dan (0.79%) dengan waktu retensi 28.589, 24.994,

26.576, 28.504, 32.160, dan 31.814. Kedua, eicosapentaenoic acid (EPA) (5.35%), (4.73%), (3.43%), (2.53%), (2.03%), (1.73%), (1.31%), (0.77%), (0.54%), dan (0.35%) dengan waktu retensi 24.634, 24.702, 24.726, 24.579, 24.658, 28.130, 28.504, 28.763, 28.004, dan 28.688. Senyawa eicosapentaenoic acid (EPA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi, analgesik, mampu menurunkan risiko kematian mendadak akibat jantung koroner (Haris, 2004). Antiagregasi platelet, menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL (Maulana, 2013). Ketiga, docosahexaenoic acid (DHA) (5.25%), (4.68%), (3.36%), (2.93%), (1.95%), (1.73%), (0.77%), dan (0.35%) dengan waktu retensi 28.317, 28.344, 28.242, 28.164, 28.208, 28.130, 28.763, dan 28.688. Senyawa docosahexaenoic acid (DHA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi, anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; Faizah, 2019). Menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala koloid (Olaitan, *et al*, 2011). Keempat, eicosatetraenoic acid (ETA) (3.95%), (1.54%), (0.54%), dan (0.44%) dengan waktu retensi 24.464, 24.848, 24.004, dan 24.318. Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015). Kelima, linoleic acid (ALA) (0.65%), dan (0.12%) dengan waktu retensi 25.246, dan 25.590. Senyawa linoleic acid (ALA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012).

Pada tabel 2.4 sampel D terlihat ada enam komponen senyawa asam lemak omega-3 yaitu : pertama, eicosapentaenoic acid (EPA) (5.15%), (3.35%), (1.98%), (1.11%), dan (1.00%) dengan waktu retensi 24.654, 24.573, 24.542, 24.600, dan 28.110. Senyawa eicosapentaenoic acid (EPA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, analgesik, mampu menurunkan risiko kematian mendadak

akibat jantung koroner (Haris, 2004). Antiagregasi platelet, menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL (Maulana, 2013). Kedua, docosapentaenoic acid (DPA) (3.36%), dan (1.15%) dengan waktu retensi 20.730, dan 26.542. Ketiga, docosahexaenoic acid (DHA) (3.02%), (3.00%), (1.86%), (1.48%), (1.35%), (1.25%), (1.03%), (1.00%), (0.81%), (0.58%), (0.58%), (0.34%), dan (0.22%) dengan waktu retensi 28.270, 28.528, 28.236, 28.299, 28.195, 28.161, 28.481, 28.110, 28.181, 28.130, 28.144, 28.736, dan 28.868. Senyawa docosahexaenoic acid (DHA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, anti agregasi platelet, antioksidan, analgesik (Gammone, 2018; Faizah, 2019). Menurunkan kolesterol dalam darah khususnya LDL, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, juga bermanfaat terhadap penyembuhan gejala koloid (Olaitan, *et al*, 2011). Keempat, eicosatetraenoic acid (ETA) (2.17%), (1.03%), (0.43%), (0.40%), (0.39%), (0.34%), (0.31%), dan (0.27%) dengan waktu retensi 16.318, 20.794, 27.998, 28.481, 24.797, 28.736, 24.393, dan 24.328. Senyawa eicosatetraenoic acid (ETA) memiliki efek farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015). Kelima, linoleic acid (ALA) (1.47%), (1.14%), dan (1,09%) dengan waktu retensi 20.995, 21.423, dan 16.883. Senyawa linoleat acid (ALA) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, antioksidan, serta antihepatotoksik dalam jumlah tertentu (Atolani, 2012). Keenam, eicosatrienoic acid (ETE) (0.42%), dan (0.39%) dengan waktu retensi 20.563, dan 24.797. Senyawa eicosatrienoic acid (ETE) memiliki aktivitas farmakologi sebagai antiinflamasi (Dennis, 2015).

Pada sampel A dan B intensitas peak rendah dengan peak yang begitu kecil sehingga tidak terlihat jelas pada kromatogram dan hanya teridentifikasi 2-3 kandungan senyawa asam lemak omega-3 yaitu, asam eikosatetraenoat (ETE), asam eikosatrienoat (ETA), dan asam linoleat (ALA). Hal ini menunjukkan bahwa

sampel terlalu encer. Sedangkan pada sampel C dan D nampak 5-6 peak asam lemak, yaitu asam eikostetraenoat (ETE), asam eikosatrienoat (ETA), asam linoleat (ALA), asam dokosapentaenoat (DPA), asam dokosaheksaenoat (DHA), dan asam eikosapentaenoat (EPA) akan tetapi terlihat pula peak asing selain asam lemak. Peak asing ini terlihat karena intensitas peak yang masih terlalu rendah yang menyebabkan peak-peak kecil menjadi terlihat. Oleh karena itu, jumlah injeksi perlu ditambahkan (Solikhah *et al*, 2015)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada sampel A terdapat dua komponen senyawa asam lemak omega-3 yang teranalisis yaitu, EPA (*Eicosatetraenoic acid*) dan ETE (*Eicosatrienoic acid*). Pada sampel C terdapat tiga komponen senyawa asam lemak omega-3 yang teranalisis yaitu, ALA (*Linoleic acid*), ETE (*Eicosatrienoic acid*), dan ETA (*Eicosatetraenoic acid*). Pada sampel C terdapat lima komponen senyawa asam lemak omega-3 yang teranalisis yaitu, DPA (*Docosapentaenoic acid*), EPA (*Eicosapentaenoic acid*), DHA (*Docosahexaenoic acid*), ETA (*Eicosatetraenoic acid*), dan ALA (*Linoleic acid*). Pada sampel D terdapat enam komponen senyawa asam lemak omega-3 yang teranalisis yaitu, EPA (*Eicosatetraenoic acid*), DPA (*Docosapentaenoic acid*), DHA (*Docosahexaenoic acid*), ETA (*Eicosatetraenoic acid*), ALA (*Linoleic acid*), dan ETE (*Eicosatrienoic acid*).
2. Terdapat perbedaan kandungan senyawa asam lemak omega-3 pada sampel sediaan minyak ikan salmon lokal dengan sampel sediaan minyak ikan salmon impor dimana 2 sampel minyak ikan salmon impor kandungan asam lemak omega-3nya lebih banyak dibandingkan dengan 2 sampel sediaan minyak ikan salmon lokal.

B. Saran

Disarankan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dilihat dari manfaat minyak ikan salmon.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidh Al Qarni. 2008. *Tafsir al Muyassar*. Jakarta: Qisthi.
- Almatsier, S. 2016. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Almunady T Panangan *et al.* 2011. *Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Lemak Tak Jenuh Omega-3, Omega-6 dan Karakterisasi Minyak Ikan Patin (Pangasius pangasius)*. *Jurnal Penelitian Sains*, No. 3 Vol. 15.
- Ansel, H. C., Popovich, N. G., Allen, L.,V. 2011. *Pharmaceutical Form and Drug delivery System Ninth edition*. London, New York.
- Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 1980. *Official Methods of Analysis*. Washington, DC.
- Astawan M. 2004. *Sehat Bersama Aneka Sehat Pangan Alami*. Solo. Tiga Serangai.
- Christie, W. 2006. *Gas Chromatography and Lipids: A Practical guide*. Scotland: The Oily Press.
- Dennis, E. A., Norris PC. 2015. *Eicosanoid Storm in Infection and Inflammation*. *Nature Review. Immunology*.
- Diana, Fivi Melva. 2013. *Omega 3 dan Kecerdasan Anak*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. No. 2 Vol. 2.
- Ditjen POM. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Eastman, C. 2010. *BM Handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors*. John Wiley & Sons.
- Estiasih, T. 2009a. *Minyak Ikan: Teknologi dan Penerapannya untuk Pangan dan Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Estiasih, Teti, Ahmadi. 2009b. *Teknologi Pengolahan Pangan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Fahmi, M. R. 2010 *Phenotypic Platisity Kunci Sukses Adaptasi Ikan Migrasi Studi Kasus Ikan Sidat (Angulia sp.)*. *Prosiding Forum Inovasi Teknologi Akuakultur*. Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Depok.

- Faizah, A. K., Andhiarto, Y. and Riwanti, P. 2019. *In Vivo analgesic Activity of Omega-3 on Mice Induced Peripheral Pain*. Biomedical and Pharmacology Journal.
- Faizah, A. K. and Kresnamurti, A. 2019. *Evaluation of Antiinflammatory Activity of Marine Omega-3 In Rats*. Indonesian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research.
- Gandjar, I, G dan Abdul, R. 2012. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gammone, M.A., Riccioni, G., Parinello, G, and D'Orazio, N. 2019. *Omega-3 polyunsaturated fatty acids: benefits and endpoints in sport*. Nutrients.
- Gritter, R. J., Bobbit, J. M. dan Schwarting, A. E. 1991. *Pengantar Kromatografi, diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata*. Edisi II, 107. Bandung: ITB.
- Hadisoewignyo, L. 2016. *Sediaan Solida* (jendro Yuniarto (ed.); Revisi). Pustaka Pelajar.
- Hames D, Hooper N. 2005. *Biochemistry*, 3th. New York. Taylor dan Francis.
- Handayani, Sri S. *et al.* 2013. *Analisis Asam Lemak Omega-3 dari Minyak Kepala Ikan Sunglir (Elagatis bipinnulata) Melalui Esterifikasi Enzimatis*. Jurnal Natur Indonesia, No. 2 Vol. 15.
- Hard *et al.* 2003. *Kimia Organk Terjemah Achmadi S Edisi 11*. Jakarta. Erlangga.
- Haris, W. S. 2004. *Review: Fish Oil Supplementation: Evidence For Health Benefits*, Cleveland Clinic Journal of Medicine.
- Hendayana, S. 2006. *Kimia Pemisahan Metode Kromatografi dan Elektroforesis Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Heruwati, Endang S. 2002. *Pengolahan Ikan Secara Tradisional: Prospek dan Peluang Pengembangan*. Jakarta. Jurnal Litbang Pertanian.
- Husaini. 1989. *Kecukupan Konsumsi Zat Besi Pada Wanita Lebih Banyak*. Buletin Gizi. Persagi. Jakarta. No.1 Vol 13.
- Kementrian Kesehatan RI. 2020. *Farmakope Indonesia (VI)*. Kementrian Kesehatan RI.

- Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2015. *Analisis data pokok Kelautan dan Perikanan menurut Provinsi tahun 2015*. Pusat data, statistik dan informasi sekretariat Jederal Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Ketaren, S. 2008. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Khopkar, S. M. 1990. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta : UI-Press.
- Maulana, I.T, et al. 2013. *Pemisahan Asam Elaidat (Trans-9-Octadetonon Acid) dan Asam Lemak Jenuh Serta Peningkatan Kandungan EPA dan DHA dari Minyak Limbah Perusahaan Pengolahan Ikan*. Jurnal Program Studi Farmasi Institusi Teknologi Bandung, Vol. 1, 121-130, 2014.
- Maruba Pandiangan, Jamaran Kaban, Basuki Wirjosentono, Jansen Silalahi. 2018. *Analisis Kandungan Asam Lemak Omega 3 dan Omega 6 pada Minyak Ikan Mas (Cyprinus Carpio)*. Sumatera Utara: Publisher Universitas Sumatera Utara.
- Marinetti, G.V. 1989. *Disorders of Lipid Methabolism*. New York and London: Pleneum Press.
- Marine Harvest. 2015. *Salmon Farming Industry Handbook 2015*. The Marine Harvest ASA. www.merineharvest.com/investor.
- Nims, C. 2005. *Northwest Homegrown Cookbook Series Salmon*. United States of America: WestWinds Press.
- Nur Aisa, Haris Munandar. 2020. *Farmasi dalam Perspektif Islam*. Medan Manhaji.
- Olaitan, P. B. Chen, I-Ping, Norris, J.E.C. Feinn, R., Oluwatosin, O. M., Reichenberger, E. J. 2011. *Inhibitory Activities of Omega-3 Fatty Acids and Araditional African Remedies on Keloid Fibroblasts*. Wound.
- O'keefe, S.F. 2002. *Nomenclature and Classification Of Lipids dalam Food Lipids: Chemistry, Nutrition and Biotechnology Edisi II*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Panagan, A. T., Yohandani, H., dan Wulandari, M. 2012. *Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Lemak Tak Jenuh Omega-3, Omega-6 dan Karakterisasi Minyak Ikan Patin (Pangasius pangasius)*. Jurnal Penelitian Sains. Vol 15 Nomor 3 ©.
- Pranowo, D., dan Muchalal, M. 2004. *Analisis Kandungan Asam Lemak pada Minyak Kedelai dengan Kromatografi Gas-Spektroskopi Massa*.

Indonesian Journal of Chemistry. Vol 4 (1).

- Quraish Shiihab, Muhammad. 2003. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Rasyid, Abdullah. 2003. *Asam Lemak Omega-3 Dari Minyak Ikan*. Pusat Penelitian Oseanografi. No 28 Vol 3.
- Rohman, A. 2016. *LIPID: Sifat Fisika-Kimia dan Analisisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI).
- Sahena F, Zaidul ISM, Jinap S, Jahurul MHA, Khatib A, Nurolaini NAN. 2010. *Extraction of fish oil from the skin of Indian mackerel using supercritical fluids*. Journal of Food Engineering 99; 63-69.
- Sastroamidjojo H. 2009. *Kromatografi Edisi I Cetakan I*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Sastroamidjojo, H. 2012. *Kimia Organik: Stereokimia, Karbohidrat, Lemak, dan protein*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Silverstein, R.M., Bassler, G.C., dan Morrill, T.C. 1986. *Laboratory Investigations In Organic Chemistry*. Penerjemah: Hartono, dkk. *Penyidikan Spektrometri Senyawa Organik*. Jakarta: Erlangga.
- Solikhah, M.D., Pratiwi, F.T. and Diaztuti, M.D., 2015. Penentuan Metode Analisis Komposisi Asam Lemak dan Metil Ester pada Biodiesel dengan Gc-ms tanpa Metilasi. *Prosiding Semnastek*.
- Sulaekhah, Siti dan Yuli K. 2005. *Halal dan Haram Makanan dalam Islam* Suhuf 18, No. 1.
- Sumantri, A. R. (2007). *Analisis Makanan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suriawiria, Unus. 2002. *Budidaya Jamur Tiram*. Yogyakarta. Kanisius.
- Sudarmadji, Slamet *et al.* 1989. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Sri Seno., Handayani. 2013. *Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 dan 6 pada Bagian Kepala dan Badan Ikan Lele (Clarias sp) Melalui Reaksi Enzimatik*. Prosiding Seminar Nasional Kimia, ISBN : 978-602-0951-00-3 Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya.
- Syarifuddin K.A, Yusriyani, Simson Lamhot S. 2022. *Analisis Asam Lemak Ikan Bandeng (Chanos chanos Forsskal) Pada Bagian Kepala, Badan, Dan*


Ekor Dengan Cromatography Gas. Makassar: Universitas Pancasakti Makassar. Fito Medicine Volume 14 Nomor 1 (Juli) 2022.

Tapsell, L.C. 2009. *Nutrients Food and Diets : Challengng Functional Food Development*. Aust. J. Dairy Technology.

Winarno, F.G. 2002. *Kimia Pangan Dan Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Whitaker. 2005. *Validasi Metode Modifikasi Metilasi Minyak Nabati Untuk Penentuan Kandungan Asam Lemak Secara Kromatografi Gas*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Wulandari, F. 2020. *Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Kapsul Ekstrak Daun Cincin Hijau (Cyclea barbata Miers) Sebagai Antiinflamasi*. Orphanet Journal of Rare Diseases, 12(1), 1–9.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar sampel sediaan minyak ikan salmon lokal dan impor



Gambar 1. Sampel A



Gambar 1. Sampel B



Gambar 1. Sampel C



Gambar 1. Sampel D

Lampiran 2. Keterangan komposisi yang terkandung dalam setiap sampel produk minyak ikan salmon lokal dan impor sesuai dengan label kemasan

1. Sampel A

Kandungan setiap butir softgel

Bahan yang terkandung
Asam lemak omega 3, 6 dan 9
568 IU Vitamin A
57 IU Vitamin D

Diproduksi oleh PT. INTRA ARIES JAKARTA INDONESIA
No. Reg POM SI 064 321 741

2. Sampel B

Tiap kapsul mengandung

Bahan yang terkandung
Oleum onchorhynchus nerka oleum 500 mg

Diproduksi oleh PT. Najasyi Sukses Bersama – Depok, Jakarta
Didistribusikan oleh CV. Zayunaf Aisyam Group – Keranganyar,
Indonesia
No. Reg POM TR 223001411

3. Sampel C

Tiap kapsul mengandung minyak ikan alami 600 mg setara dengan

Bahan yang terkandung
EPA (Eicosapentaenoic acid) 180 mg
DHA (Docosahexaenoic acid) 120 mg

Bahan tambahan :

- Gelatin (Bovine)
- Glycerin (Vegetable)
- Purified water

Diproduksi oleh RPI-Santa Ana CA 92704-USA
Diimpor dan dikemas oleh PT. Ultra Sakti – Jakarta, Indonesia
No. Reg SI 164 306 741

4. Sampel D

Tiap kapsul lunak mengandung

Bahan yang terkandung	
Salmon oil	1000 mg
EPA	390 mg
DHA	240 mg
Natural Vitamin E	10 IU
Soy Lecithin	50 mg

Bahan tambahan :

- Gelatin sapi
- Vegetable glycerin

Diproduksi oleh Natures Product, Inc. U.S.A


Diimpor oleh CV. Abad Dua Satu Makmur – Jakarta, Indonesia

No. Reg SI 104 301 871




Lampiran 3. Skema kerja

1. Metilasi minyak ikan



2. Analisis Asam Lemak Omega-3



M A K A S S A R

Lampiran 4. Gambar Analisis Asam Lemak Omega-3

Dimasukkan 0,25 ml sampel A ke dalam vial



Dimasukkan 0,25 ml sampel B ke dalam vial



Dimasukkan 0,25 ml sampel C ke dalam vial



Dimasukkan 0,25 ml sampel D ke dalam vial



Ditambahkan n-heksan ke dalam vial sampel A



Ditambahkan n-heksan ke dalam vial sampel B



Ditambahkan n-heksan ke dalam vial sampel C



Ditambahkan n-heksan ke dalam vial sampel D



Dimasukkan vial sampel A kedalam alat GC-MS




Dimasukkan vial sampel B kedalam alat GC-MS




Dimasukkan vial sampel C kedalam alat GC-MS




Dimasukkan vial sampel D kedalam alat GC-MS


Lampiran 5. Gambar Hasil Kromatogram sampel dengan GC-MS

Kromatogram sampel A

M A K A S A R
Kromatogram sampel B



Kromatogram sampel C



Kromatogram sampel D

ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 0041 /Un.06/LP2M/PP.00.9/8/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMO Provinsi Sulawesi Selatan
 di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : FIRDA NURSAPUTRI
 NIM : 70100116012
 Semester/T.A. : XIII (Tiga Belas)/T.A. 2022-2023
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Farmasi
 Alamat : Jln. Poros malino. Bontomanan
 No. HP : 082197198498

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Analisis Kandungan Asam Lemak Omega-3 Dari Sediaan Minyak Ikan Salmon (*Onchorhynchus nerka*) Lokal dan Impor Secara Kromatografi Gas.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Labolatorium SAINTEK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** dari tanggal **September - Selesai.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


 Muhammad Ramli, M.Si.
 NRP. 196005064897031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Firda Nursaputri biasa dipanggil Firda atau Idda. Dilahirkan di Makassar, pada tanggal 21 November 1998. Dibesarkan oleh keluarga yang sederhana, dimana dia merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sahabuddin dan Ibu Salmawati. Peneliti telah menikah pada tahun 2021 dan memiliki buah hati seorang anak laki-laki ditahun 2022. Nama suami Feriyanto dan nama anak Faaz Arshaka Putra, yang merupakan *support system* terbesar peneliti. Peneliti memulai pendidikan di Bangku Taman Kanak-Kanak (TK) pada usia 6 tahun selama setahun di TK PAUD BONTOMANAI. Kemudian melanjutkan studi dibangku Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun di SD NEGERI UNGGULAN BONTOMANAI, setelah duduk dibangku Sekolah Dasar, kemudian si peneliti masuk Sekolah Menengah Pertama di MTS. NEGERI BALANG-BALANG selama 3 tahun mulai dari 2010-2013. Pada tahun 2013 si peneliti masuk Sekolah Menengah Atas di SMA. NEGERI 1 SUNGGUMINASA (SALIS) dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu sipeneliti mengikuti tes masuk perguruan tinggi jalur SPAN-PTKIN di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR dan Alhamdulillah lulus di jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dimana itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan oleh Allah SWT kepada si peneliti, semoga dari sini awal kesuksesan akan diraih kelak. Aamiin Ya Robbal Alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R