

**GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA  
ANAK DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTISME (GSA)  
DI SLB NEGERI 1 MAKASSAR 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter  
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**FIRJATULLAH FENIAH SABIR**

NIM: 70600118003

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firjatullah Fenhiah Sabir  
NIM : 70600118003  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 22 Oktober 1999  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Toddopuli Raya Timur No 171 D  
Judul : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 26 Februari 2023



penyusun

*Firjatullah Fenhiah Sabir*  
Firjatullah Fenhiah Sabir

NIM : 70600118003

## PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL : GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTISME (GSA) DI SLB NEGERI 1 MAKASSAR 2022

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN DISETUJI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER


Makassar, 16 Februari 2023

PEMBIMBING I



(dr. Raully Ramadhani, M.Kes.)

PEMBIMBING II



(Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes.)

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022**” yang disusun oleh Firjatullah Fenhia Sabir NIM 70600118003 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 27 Februari 2023  
6 Sya'ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)

Pembimbing I : dr. Raully Ramadhani, M.Kes (.....)

Pembimbing II : Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M.A (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701200604 2 002

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan limpahan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi dengan judul, **“Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022”** dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju ke zaman yang terang benderang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang tuaku yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku **Ayahanda Muh. Sabir Amran dan Ibunda Budiasni Nuzula serta Ke 3 kakak saya** atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan, serta motivasi yang diberikan selama penyusunan skripsi.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat, dan penghargaan yang tak terhingga, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.

2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
Dr.dr.Syatirah, Sp.A., M.Kes.
3. dr.Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. dr.Rauly Ramadhani, M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberikan  
masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Dr.dr.H.Najamuddin, M.Kes selaku pembimbing II dan juga sebagai  
penasehat akademik yang telah memberikan masukan, arahan dan motivasi  
untuk penyelesaian skripsi ini.
6. dr.Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M selaku penguji I yang telah memberikan  
masukan, arahan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M. A selaku penguji II yang telah memberikan  
masukan, arahan dan motivasi untuk skripsi ini.
8. Kepada seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus  
dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menempuh  
pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin  
Makassar.
9. Kepada sahabat – sahabat saya serta seluruh sejawat saya angkatan 2018  
“FIBRONEKTIN” Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar  
yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama mengenyam

pendidikan hingga saat ini dalam keadaan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Kepada sahabat saya arie puspita rehulina dan azzahra adiarti yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis.

Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT., Aamiin. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, 06 Desember 2022

FIRJATULLAH FENIAH SABIR



## DAFTAR ISI


<b>JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kajian Pustaka .....</b>	<b>15</b>
<b>E. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>21</b>
<b>F. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Teoritis.....</b>	<b>23</b>
<b>1. Definisi .....</b>	<b>23</b>
<b>2. Faktor Penyebab.....</b>	<b>25</b>
<b>3. Karakteristik .....</b>	<b>39</b>
<b>4. Klasifikasi .....</b>	<b>41</b>
<b>5. Kriteria Diagnosis.....</b>	<b>43</b>
<b>6. Tanda dan Gejala.....</b>	<b>45</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>48</b>
<b>C. Kerangka Konsep.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
<b>A. Jenis Penelitian.....</b>	<b>50</b>

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel penelitian.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Pengelolaan Data.....	52
G. Analisis Data.....	52
H. Penyajian Data.....	53
I. Etika Penelitian.....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Analisis Univariat.....	55
B. Pembahasan.....	65
C. Keterbatasan Penelitian.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

**LAMPIRAN.....90**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....110**



## DAFTAR SINGKATAN

ADHD	: Attention Deficit Hiperactivity Disorder
APA	: American Psychiatric Association
ASD	: Autism Spectrum Disorder
BBLR	: Bayi Berat Lahir Rendah
CDC	: Centers for Disease Control and Prevention
CDD	: Childhood Disintergrative Disorder
DSM	: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder
EDC	: Endocrine Disruptor Chemical
FAS	: Fetal Alcohol Syndrome
FASD	: Fetal Alcohol Spectrum Disorders
GSA	: Gangguan Spektrum Autisme
ICD	: International Classification of Diseases
IDAI	: Ikatan Dokter Anak Indonesia
PDD-NOS	: Pervasive developmental disorder not otherwise specified
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SPSS	: Statistical Package For the Social Sciences
SSP	: Sistem Saraf Pusat
UNESCO	: United Nations Educational , Scientific , and Cultural Organization
Vaksin MMR	: Vaksin Measles , Mumps , Rubella
WHO	: World Health Organization

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Formulir <i>Informed Consent</i> .....	<b>90</b>
<b>Lampiran 2.</b> Kuesioner Penelitian .....	<b>91</b>
<b>Lampiran 3.</b> Persuratan .....	<b>96</b>
<b>Lampiran 4.</b> Pengolahan Data Penelitian .....	<b>102</b>
<b>Lampiran 5.</b> Dokumentasi .....	<b>109</b>




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Definisi Operasional.....	<b>6</b>
<b>Tabel 1.2</b> Kajian Pustaka.....	<b>15</b>
<b>Tabel 2.1</b> Kriteria Diagnosis Autisme Berdasarkan DSM V.....	<b>43</b>
<b>Tabel 4.1</b> Distribusi Frekuensi Usia Anak GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>55</b>
<b>Tabel 4.2</b> Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>56</b>
<b>Tabel 4.3</b> Distribusi Frekuensi Genetik Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>56</b>
<b>Tabel 4.4</b> Distribusi Frekuensi Usia Ayah Saat Ibu Mengandung Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>57</b>
<b>Tabel 4.5</b> Distribusi Frekuensi Usia Ibu Saat Mengandung Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>58</b>
<b>Tabel 4.6</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Pendidikan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>59</b>

<b>Tabel 4.7</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Rokok Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>59</b>
<b>Tabel 4.8</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Terpapar Pestisida Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>60</b>
<b>Tabel 4.9</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Alkohol Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>60</b>
<b>Tabel 4.10</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>61</b>
<b>Tabel 4.11</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>61</b>
<b>Tabel 4.12</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Infeksi Saat Kehamilan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>62</b>
<b>Tabel 4.13</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Pendarahan Antepartum Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>62</b>
<b>Tabel 4.14</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Preeklamsia Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar .....	<b>63</b>
<b>Tabel 4.15</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Prematur Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>63</b>


<b>Tabel 4.16</b> Distribusi Frekuensi Riwayat BBLR Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>64</b>
<b>Tabel 4.17</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Asfiksia Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>64</b>
<b>Tabel 4.18</b> Distribusi Frekuensi Riwayat Kejang Demam Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.....	<b>65</b>



## DAFTAR BAGAN

**Bagan 2.1** Kerangka Teori.....48

**Bagan 2.2** Kerangka Konsep.....49



## ABSTRAK

Nama : Firjatullah Fenia Sabir  
NIM : 70600118003  
Judul : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022

---

Gangguan Spektrum Autisme (GSA) adalah kelainan kondisi perkembangan sistem saraf yang dapat terjadi sejak lahir atau masa bayi. Anak yang mengalami ASD memiliki kesulitan dalam membangun hubungan sosial dengan orang lain. Kondisi autisme ini mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terlihat sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* yang menggambarkan faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.

Hasil penelitian ini didapatkan mayoritas anak memiliki faktor genetik (59,0%). Usia ayah saat ibu mengandung anak tertinggi adalah kategori usia 29 – 30 tahun dan usia ibu saat mengandung anak tertinggi di usia 32-34 Tahun. Pendidikan ibu terbanyak didapatkan pada jenjang pendidikan SMA (60,7%). Hampir semua ibu memiliki riwayat merokok pasif (90,2 %). Tidak ada ibu yang memiliki riwayat terpapar peptisida, konsumsi alkohol, konsumsi obat antidepresan, dan konsumsi obat antiepilepsi. Hampir semua ibu tidak memiliki riwayat preeklamsia (90,2%).

Sebagian besar terdapat riwayat prematur (67,0%) dan riwayat BBLR (55,7%). Hampir semua anak memiliki riwayat asfiksia (95,1%). Sebagian besar anak memiliki riwayat kejang demam (70,5%).

Kesimpulan yang didapatkan yakni faktor risiko yang banyak dijumpai pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar yaitu riwayat genetik, usia ayah 29-30 tahun dan usia ibu 32-34 tahun, riwayat pendidikan SMA, riwayat perokok pasif, riwayat prematur, riwayat BBLR, riwayat asfiksia dan riwayat kejang demam.

**Kata Kunci: Gangguan Spektrum Autisme, faktor risiko, prevalensi.**



## ABSTRACT

*Name : Firjatullah Feniah Sabir*

*Reg. Number : 70600118003*

*Title : Overview Of Risk Factors In Children With Autism Spectrum Disorder (ASD) At SLB Negeri 1 Makassar 2022*

---

*Autism Spectrum Disorder (ASD) is a disorder of nervous system development that can occur from birth or infancy. Children with ASD have difficulty building social relationships with others. This autism condition affects social interaction, communication, and behavior seen before the child reaches the age of 3 years. The purpose of this research was to determine the picture of risk factors in children with ASD in SLB Negeri 1, Makassar. This research describes risk factors in kids with ASD in SLB Negeri 1 Makassar using a descriptive study with a cross-sectional approach.*

*The results of this study obtained the majority of children had genetic factors (59.0%). The age of the father when the mother is pregnant with the highest-born child is in the age category of 29–30 years, and the age of the mother when carrying the child is at the age of 32–34 years. Most maternal education is obtained at the high school education level (60.7%). Almost all mothers had a history of passive smoking (90.2%). None of the mothers had a history of exposure to pepticide, alcohol consumption, consumption of anti-depressant drugs, or consumption of anti-epileptic*

*drugs. Almost all mothers had no history of preeclampsia (90.2%). Most of them had a history of prematurity (67.0%) and low birth weight (55.7%). Almost all children had a history of asphyxia (95.1%). Most children had a history of febrile seizures (70.5%).*

*The conclusion obtained is that risk factors that are commonly found in children with ASD at SLB Negeri 1 Makassar are genetic history, paternal and maternal ages of 29–30 years and 32–34 years, histories of high school education, histories of passive smoking, histories of prematurity and low birthweight, histories of asphyxia, and histories of febrile seizures.*

***Keywords : Autism Spectrum Disorder , Risk Factors , Prevalence***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang menonjol pada anak ASD adalah anak yang bersangkutan akan kesulitan dalam membina hubungan sosialnya (Biran & Nurhayati, 2018). Autisme anak akan mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terlihat sebelum usia 3 tahun. Hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi anak yang sulit dipahami oleh orang lain, perilaku hiperaktif di tandai dengan gerakan aktif yang ditimbulkan oleh anak dan gerakan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas seperti melompat-lompat, berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, berlari-lari dan tidak dapat duduk tenang dalam waktu lama. Perilaku hiperaktif yang terus menerus menyebabkan anak tidak dapat menerima stimulus dengan baik saat belajar, sulitnya anak untuk beradaptasi dengan lingkungan karena gerakan yang berlebihan yang berakibat kurangnya pemahaman orang lain dan lingkungan sulit menerima keadaan anak dengan GSA. Perilaku defisit kebalikan dari perilaku hiperaktif, ditandai anak dengan cenderung duduk diam, suka menangis, tidak mau diajak bermain, mendengarkan suara selalu menutup kuping, dan tidak peduli dengan aktivitas yang ada di lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya

menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap perkembangan anak GSA kedepan. Anak yang menderita GSA memiliki gangguan perkembangan yang kompleks (Risda, 2016).

GSA merupakan masalah besar sehingga menuntut orang tua untuk lebih peduli dan ikut mengambil alih peran dalam kemajuan perkembangan anak. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan kebutuhan anak ke sekolah dan pembantunya dikarenakan kesibukan bekerja dan lainnya. Keluarga kurang mengetahui perkembangan perilaku anak mengarah ke hiperaktif atau defisit. Orang tua atau keluarga tidak menyadari kalau dukungan lingkungan fisik, lingkungan sekolah, dan sosial keluarga sekitar anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku (Risda, 2016).

Meskipun GSA tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat mengakibatkan dampak negatif kepada penyandang, keluarga, lingkungan sosial, dan negara. Hal tersebut terjadi karena anak dengan GSA mengalami gangguan dalam aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa, perilaku, emosi, persepsi sensoris serta motorik. Keadaan tersebut akan mengakibatkan masalah yang sangat besar bagi sumber daya manusia di masa mendatang (Lubis, 2017).

Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa diperkirakan 1 dari 160 anak di seluruh dunia termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika Utara mengidap ASD (WHO, 2018). Berdasarkan laporan Centers for Disease Control and Prevention tahun 2018, sekitar 1 dari 44 anak di Amerika Serikat di diagnosis dengan GSA (CDC, 2021). United Nations Educational, Scientific, and

Cultural Organization (UNESCO) melaporkan kejadian ASD di Asia terutama Hongkong dengan prevalensi 1,68 per 1000 untuk anak di bawah usia 15 tahun yang terdiagnosis (UNESCO, 2011 ).

Prevalensi anak dengan GSA mengalami peningkatan secara dramatis selama dekade terakhir, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Prevalensi anak dengan GSA di negara maju lebih tinggi dikarenakan tingkat kesadaran yang tinggi atas kejadian GSA sehingga dilakukan deteksi dini dengan memanfaatkan penggunaan skrining standar, instrumen diagnostik dan layanan pada anak yang menunjukkan gejala GSA. Sedangkan di negara berkembang prevalensi anak dengan GSA lebih rendah dikarenakan layanan untuk anak-anak yang mengalami segala bentuk kebutuhan khusus masih kurang maju dan anak dengan GSA dianggap perilaku yang normal oleh beberapa budaya di negara berkembang (Uwaezeko, 2015).

Badan Pusat Statistik saat ini di Indonesia terdapat sekitar 270,2 juta penduduk dengan perbandingan pertumbuhan anak GSA sekitar 3,2 juta anak (BPS, 2020). Pusat Data Statistik Sekolah Luar Biasa mencatat jumlah siswa GSA di Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 144.621 siswa (Kemendikbud, 2021). Angka tersebut naik dibanding tahun ajaran 2019/2020 tercatat sebanyak 144.102 siswa GSA di Indonesia (Kemendikbud, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2021, terdapat 10 provinsi tertinggi dengan angka siswa yang mengalami GSA dan Sulawesi Selatan menduduki peringkat ke 9 pada tahun ajaran 2020/2021 yaitu sebanyak 4.559 (Kemendikbud, 2021). Di Makassar prevalensi anak dengan GSA terdapat pada kelompok anak umur 18 bulan

sampai 6 tahun sebanyak 1,69% anak dengan GSA pada tahun 2018 (Maddepungen,2019). Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SLB Negeri 1 Makassar Tahun 2022 mencatat terdapat 308 anak yang mengalami kebutuhan khusus. Sebanyak 61 anak yang mengalami GSA (Data SLB Negeri 1 Makassar, 2022).

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua dan juga sebuah ujian yang harus di pertanggungjawaban (Nurlina , 2019). Sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anfaal (8):28 Allah SWT berfirman :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ؕ

Terjemahnya :

*Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.*

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Ketahuiilah, bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai sebab cobaan atau fitnah untuk mengetahui apakah kamu menjalankan amanah atau menyia-nyiaikan dengan menjaga harta serta mendidik anak. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. Pemberiannya jauh lebih baik bagi kalian daripada harta dan anak, maka jangan kalian sia-siakan hak Allah dan perhatikanlah kemaslahatan

harta dan anak-anak kalian. Peranan orang tua dalam membentuk anak untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal sangat menentukan. Orang tua harus memberikan kasih sayang pada anak, bagaimanapun kondisinya (Muhtadi, 2018).

Di Indonesia, penelitian mengenai kejadian GSA pada anak sudah banyak dilakukan. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang faktor-faktor risiko dan kaitannya dengan kejadian GSA masih belum banyak diteliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti “Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA?



## C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

VARIABEL INDEPENDEN						
No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
1	Usia Ayah	Lama waktu hidup ayah saat ibu mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. usia < 25 tahun 2. usia 25 – 29 tahun 3. usia 30 – 34 tahun 4. usia 35 – 39 tahun 5. usia ≥ 40 tahun	Ordinal
2	Usia Ibu	Lama waktu hidup ibu saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. usia < 25 tahun 2. usia 25 – 29 tahun 3. usia 30 – 34 tahun	Ordinal

					<p>tahun</p> <p>4. usia 35 – 39 tahun</p> <p>5. usia <math>\geq</math> 40 tahun</p>	
3	Genetik	Memiliki riwayat keluarga yang mengalami GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	<p>1. Ya: Jika terdapat riwayat GSA pada keluarga</p> <p>2. Tidak: Jika tidak terdapat riwayat GSA pada keluarga</p>	Nominal
4	Pendidikan Ibu	Lama waktu jenjang ibu menempuh pendidikan	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	<p>1. SD</p> <p>2. SMP</p> <p>3. SMA</p> <p>4. Sarjana</p>	Nominal

5	Riwayat Rokok	Ibu yang terpapar asap rokok dan merokok saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Perokok pasif 2. Perokok aktif	Nominal
6	Riwayat Terpapar Pestisida	Ibu yang terpapar pestisida saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu terpapar pestisida 2. Tidak: Jika ibu tidak terpapar pestisida	Nominal
7	Riwayat Konsumsi Alkohol	Ibu yang mengonsumsi alkohol saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu mengonsumsi alkohol 2. Tidak: Jika ibu tidak mengonsumsi	Nominal

					alkohol	
8	Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan	Konsumsi obat antidepresan saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu mengonsumsi obat antidepresan 2. Tidak: Jika ibu tidak mengonsumsi obat antidepresan	Nominal
9	Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi	Konsumsi obat antiepilepsi saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu mengonsumsi obat antiepilepsi 2. Tidak: Jika ibu tidak mengonsumsi obat antiepilepsi	Nominal

10	Riwayat Infeksi Saat Kehamilan	Ibu yang pada saat hamil terpapar infeksi	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu mengalami infeksi 2. Tidak: Jika ibu tidak mengalami infeksi	Nominal
11	Riwayat Pendarahan Antepartum	Pendarahan yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 28 minggu	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu mengalami pendarahan antepartum 2. Tidak: Jika ibu tidak mengalami pendarahan antepartum	Nominal


12	Riwayat Preeklamsia	Ibu yang memiliki riwayat preeklamsia saat mengandung anak dengan GSA	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: jika ibu memiliki riwayat preeklamsia 2. Tidak : jika ibu tidak memiliki riwayat preeklamsia	Nominal
13	Riwayat Prematur	Ibu yang melahirkan kurang dari 37 minggu	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: Jika ibu melahirkan kurang dari 37 minggu 2. Tidak: Jika ibu melahirkan lebih dari 37 minggu	Nominal
14	Riwayat Bayi Berat	Ibu yang melahirkan	Lembar pengumpulan	Wawancara dan menyebarkan	1. Ya: Jika ibu melahirkan	Nominal

	Lahir Rendah	anak dengan berat badan kurang dari 2500 gram	kuesioner	kuesioner	anak dengan berat badan kurang dari 2500 gram 2. Tidak: Jika ibu melahirkan anak dengan berat badan lebih dari 2500 gram	
15	Riwayat Asfiksia	Ibu yang memiliki anak dengan GSA mengalami asfiksia	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: jika ibu memiliki anak dengan riwayat asfiksia 2. Tidak: jika ibu tidak memiliki anak dengan riwayat asfiksia	Nominal

16	Riwayat Kejang demam	Ibu yang memiliki anak dengan GSA mengalami kejang demam	Lembar pengumpulan kuesioner	Wawancara dan menyebarkan kuesioner	1. Ya: jika ibu memiliki anak dengan riwayat kejang demam 2. Tidak: jika ibu tidak memiliki anak dengan riwayat kejang demam	Nominal
<b>VARIABEL DEPENDEN</b>						
1	Anak dengan gangguan spektrum autisme	Anak yang telah di diagnosis sebagai penderita gangguan autisme di SLB Negeri 1 Makassar	Data milik SLB Negeri 1 Makassar	Melihat data milik SLB Negeri 1 Makassar	1. Ya: Apabila menderita GSA 2. Tidak: Apabila tidak menderita GSA	Nominal

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar untuk mengetahui Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan GSA.



#### D. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
1	Alman Pratama Manalu (2013)	Faktor-Faktor Penyebab Penyakit Autisme Anak di Bina Autis Mandiri Palembang	a) Metode penelitian : <i>Obeservasional</i> analitik b) Lokasi : di Bina Autis Mandiri Palembang c) Populasi : semua ibu anak autis di Bina Mandiri	30 sampel	Hasil analisis univariat penelitian ini didapatkan bahwa persentase rentang usia ayah terbanyak adalah 30-34 tahun yaitu sebesar 40,0%. Sedangkan pada persentase rentang usia terbanyak pada ibu adalah 25-29 tahun yaitu sebesar 46,7% (14 orang). Persentase riwayat ibu yang mengonsumsi obat yaitu sebesar 0%. Persentase riwayat berat lahir bayi dibawah 2500 gram hanya sebesar 3,3%. Persentase riwayat infeksi virus saat ibu mengandung anak autis yaitu sebesar 13,3%. Persentase riwayat perdarahan prenatal saat ibu

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
			Palembang		mengandung anak autis yaitu sebesar 13,3%. Persentase riwayat lama kehamilan yang terbanyak adalah cukup bulan (37-42 minggu) yaitu sebesar 86,7%.
2	Risda Selvia Saragih (2016)	Pengaruh lingkungan fisik, lingkungan sekolah, dan dukungan sosial	a) Metode penelitian: Survei b) Lokasi: Yayasan Sekolah Pelatihan	30 sampel	Hasil dari penelitian ini adalah Lingkungan fisik memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku anak autis. Lingkungan sekolah memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku anak autis. Terdapat pengaruh

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
		keluarga terhadap perilaku anak autis di Kota Pekanbaru	Terapi Anak Mandiri dan Yayasan Special Kids Pekanbaru c) Analisis data: Analisis deskriptif dan Chi Square		yang bermakna antara dukungan sosial keluarga terhadap perilaku anak autis.

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
3	Tahta Alfinna (2019)	Faktor Risiko Kejadian <i>Autism Spectrum Disorder</i> Pada Anak di Kota Semarang Tahun 2018	a) Metode penelitian: <i>observasional analitik</i> b) Desain : <i>Case control</i>	51 sampel	Hasil analisis bivariat penelitian ini didapatkan hubungan yang signifikan antara kejadian <i>autism spectrum disorder</i> dengan beberapa faktor risiko seperti berat badan lahir rendah (<2500 gram) , riwayat pendarahan antepartum , riwayat preeklamsia , riwayat kelahiran prematur, riwayat persalinan tindakan , riwayat <i>stress</i> kehamilan yang tinggi dan riwayat konsumsi obat antidepresan. Sedangkan untuk riwayat asfiksia dan partus lama (>18 jam) tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan kejadian <i>autism spectrum disorder</i> .

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
4	Yulina Dwi Hastuti (2020)	Gambaran Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Autisme Anak di SLB Negeri Autis Sumatera Utara	a) Metode penelitian: studi survei analitik b) Lokasi: SLB Negeri Autis Sumatera Utara c) Analisis data: Uji Chi Square	56 sampel	Hasil analisis bivariat penelitian ini didapatkan bahwa beberapa faktor telah diuji usia ibu, perdarahan, bayi berat lahir rendah, dan kejang pada anak berhubungan dengan kejadian autis.
5	Atika Indah Sari (2022)	Gambaran Faktor Risiko Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) di Sekolah Anak	a) Metode Penelitian: deskriptif observasional b) Desain ; <i>cross sectional</i>	97 sampel	Hasil analisis univariat pada penelitian ini didapatkan banyak pada anak yang tidak memiliki faktor genetik (90,7%). Jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan (3,21 : 1). Sebagian besar anak tidak memiliki riwayat gangguan psikiatrik pada keluarganya (68,0%). Usia orang

No	Penulis/tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil Penelitian
		Berkebutuhan Khusus di Padang	c) Lokasi : Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus di Padang		tua saat anak lahir tertinggi adalah >29 – 34 tahun. Kebanyakan anak memiliki riwayat penyakit dahulu atau sekarang (67,0%). Lebih dari setengah subjek tidak memiliki riwayat komplikasi saat kehamilan (50,5%). Sebagian besar ibu memiliki riwayat penggunaan obat selama kehamilan (66,0%). Prevalensi berat lahir tertinggi adalah 2500 – 4000 gram. Jenis persalinan terbanyak adalah persalinan normal tanpa bantuan alat apa pun.

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko usia ayah dan ibu pada anak dengan GSA.
- b. Untuk mengetahui gambaran faktor genetik pada anak dengan GSA.
- c. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat pendidikan ibu pada anak dengan GSA.
- d. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat rokok pada anak dengan GSA.
- e. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat terpapar pestisida pada anak dengan GSA.
- f. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi alkohol pada anak dengan GSA.
- g. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi obat antidepresan pada anak dengan GSA.
- h. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat konsumsi obat antiepilepsi pada anak dengan GSA.
- i. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat infeksi saat kehamilan pada anak dengan GSA.

- j. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat pendarahan antepartum pada anak dengan GSA.
- k. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat preeklamsia pada anak dengan GSA.
- l. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat prematur pada anak dengan GSA.
- m. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat BBLR pada anak dengan GSA.
- n. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat asfiksia pada anak dengan GSA.
- o. Untuk mengetahui gambaran faktor risiko riwayat kejang demam pada anak GSA.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Bagi Peneliti**

Sebagai sarana dalam pengaplikasian teori yang didapatkan selama perkuliahan serta menambah wawasan, memberikan pengalaman, dan mempertajam analitik peneliti.

### **2. Manfaat Bagi Institusi**

Sebagai referensi dalam membuat kebijakan untuk program pencegahan kejadian GSA.

### **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi untuk mencegah kejadian GSA.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Teoritis

##### 1. Definisi

Autisme atau disebut dengan *Autistic Spectrum Disorder* (ASD), hingga kini belum diketahui pasti penyebabnya. Meski demikian, saat ini sudah ada beberapa langkah tepat untuk penderita autisme agar dapat memiliki kemampuan bersosialisasi, bertingkah laku dan berbicara (Kosasih, 2012). Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkan sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatar belakangi karena anak autisme pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seseorang pun yang mau mendekatinya selain orang tuanya (Soetjiningsih, 2015).

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autisme berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autisme. Anak-anak autisme dianggap gila, tidak waras

dan sangat berbahaya sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan mendapatkan perhatian secara penuh (Biran dan Nurhayati, 2018).

Ditinjau dari segi perilaku, anak-anak penderita autisme cenderung untuk melukai dirinya sendiri, tidak percaya diri, bersikap agresif, menanggapi secara kurang atau bahkan berlebihan terhadap suatu stimuli eksternal dan menggerak-gerakan anggota tubuhnya secara tidak wajar. Mereka mungkin melakukan tindakan-tindakan tidak wajar, seperti menepuk-nepuk tangan mereka, mengeluarkan suara yang diulang-ulang, atau gerakan tubuh yang tidak bisa dimengerti seperti menggigit, memukul, atau menggaruk-garuk tubuh mereka sendiri. Kebanyakan, tindakan ini mungkin berasal dari kurangnya kemampuan mereka untuk menyampaikan keinginan serta harapan kepada orang lain dan juga sebagai usaha untuk melepaskan diri dari ketegangan (Biran dan Nurhayati, 2018).

Sehubungan dengan aspek sosial kemasyarakatan, disebutkan bahwa anak penderita autisme terbiasa untuk sibuk dengan dirinya sendiri ketimbang bersosialisasi dengan benda-benda mati. Selain itu, anak-anak penderita autisme tidak memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan persahabatan, menunjukkan rasa empati, serta memahami apa yang diharapkan oleh orang lain dalam beragam situasi sosial. Apabila mereka berada satu ruangan dengan orang lain, maka penderita autisme akan cenderung menyibukkan diri dengan aktivitas yang melibatkan diri mereka

sendiri, yang umumnya dengan benda-benda mati. Ketika dipaksa untuk bergabung dengan yang lainnya, mereka akan kesulitan untuk melakukan tatap muka atau berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Mereka condong untuk memainkan permainan yang dapat dilakukan seorang diri. Permainan mereka cenderung lebih sederhana, kurang kreatif, serta mempergunakan lebih sedikit mainan dibandingkan anak normal (Maharani, 2018).

Anak penderita autisme hanya memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh tangannya saja. Mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka saat bermain sebelum mereka benar-benar siap hanya akan mengakibatkan krisis emosional. Permasalahan yang sama juga mungkin timbul sebagai akibat sesuatu yang sangat sepele, seperti menambahkan suatu perabot baru di rumah atau mengubah aktivitas rutin mereka. Pada sisi lain, pikiran mereka mudah kacau serta kerap mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian. Mereka punya masalah baik permasalahan emosional maupun beragam akibat pada pola perilaku mereka (Maharani, 2018).

## **2. Faktor Penyebab**

Penyebab dari GSA belum diketahui secara pasti tetapi beberapa penelitian meyakini adanya pengaruh lingkungan dan genetik terhadap kejadian GSA. Faktor-faktor lingkungan terjadinya GSA dibagi menjadi 3 periode selama kehamilan yaitu prenatal, perinatal dan neonatal (Manalu, 2013). Para ilmuwan menyebutkan autisme terjadi karena kombinasi

berbagai faktor, termasuk faktor genetik yang di picu faktor lingkungan. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan anak autisme (Grabrucker, 2018).

a. Faktor Genetik

Peningkatan jumlah penderita ASD dapat dikaitkan dengan perubahan genetik secara langka yang diwariskan atau terjadi mutasi lebih lanjut sehingga gen kandidat semakin meningkat untuk diidentifikasi. Selain beberapa gen spesifik tunggal yang dapat dikaitkan dengan autisme, teori saat ini juga mendukung pewarisan poligenik, yang berarti bahwa banyak gen yang kemungkinan terlibat dalam mempengaruhi seseorang untuk berkembang menjadi autisme (Grabrucker, 2018).

Periode prenatal menunjukkan bahwa proses neurulasi terjadi sejak usia gestasi 4 minggu. Selain mutasi genetik, komplikasi yang terjadi pada periode ini akan mempengaruhi proses neurogenesis sehingga dapat memicu terjadinya ASD (Hamidah dkk, 2015).

b. Faktor Risiko

1) Usia Orang Tua

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa peningkatan usia orang tua baik usia ayah maupun ibu antara 30-40 tahun mempunyai risiko sebesar 1,31-1,90 kali lebih besar untuk memiliki anak dengan gangguan autisme. Tetapi, penelitian Fibriana Ika Arulita & Ningrum Pangestu (2017) menyatakan

bahwa autisme terjadi pada usia ibu lebih dari 30 tahun dan usia ayah lebih dari 35. Mekanisme biologis dari pengaruh peningkatan usia terhadap autisme belum diketahui. Peningkatan usia ayah akan menyebabkan adanya mutasi genetik pada spermatogonia. Mutasi tersebut akan menimbulkan gangguan autisme. Pada peningkatan usia ibu, risiko terjadinya abnormalitas kromosom ikut meningkat. Salah satu abnormalitas kromosom tersebut adalah gangguan triplet nukleotida yang berhubungan dengan risiko (Fibriana & Ningrum, 2017).

## 2) Riwayat Pendidikan

Sosial ekonomi yang sangat rendah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ke depannya. Di dalam UU RI No. 20 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya bimbingan, pengajaran dan pelatihan untuk peran di masa mendatang. Pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang dalam mencari dan menerima informasi sehingga semakin banyak pengetahuan yang di milikinya (Nurochim dkk, 2017).

## 3) Riwayat Rokok

Pada saat ibu hamil terpapar asap rokok maka zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam akan masuk kemudian beredar di dalam pembuluh darah dan menuju ke janin yang

mengakibatkan terganggunya proses pembentukan organ atau organogenesis pada minggu ke tiga hingga ke delapan usia kehamilan. Mengakibatkan terjadinya mutasi gen hingga terjadinya kelainan kongenital pada bayi akibat dari reaksi teratogenetik (Sadler, 2021). Nikotin yang terdapat dalam kandungan asap rokok yang merupakan zat vasokonstriktor yang dapat mengakibatkan detak jantung janin berdenyut lambat yang akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem saraf janin (Amiruddin, 2018).

Ibu hamil yang merokok menyebabkan hipoksia janin dan malnutrisi yang dapat menyebabkan perkembangan saraf menjadi buruk, dengan manifestasi subklinis halus dari kejadian ini adalah kemampuan akademis yang berkurang. Gangguan pertumbuhan janin pada ibu perokok aktif selama kehamilan dapat menjadi penanda cukup tinggi paparan agen penyebab yang mengarah ke peristiwa yang mengakibatkan defisit perkembangan saraf (Burstyn et al., 2021).

#### 4) Riwayat Terpapar Pestisida

Pestisida adalah semua bahan kimia, serta bahan lain, termasuk jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas tanaman dan hewan yang merusak pertanian, dan menumbuhkan bagian tanaman yang diinginkan (Menteri Pertanian Republik Indonesia, 2014)

Pestisida seperti golongan organofosfat, organoklorin, karbamat, dan golongan lainnya juga diketahui merupakan *endocrine disruptor chemical* (EDC) atau pengganggu sistem endokrin. EDC melakukan inhibisi terhadap reseptor hormon estrogen, androgen, dan hormon lainnya sehingga hormon tersebut tidak dapat bekerja. Salah satu hormon yang dipengaruhi oleh EDC ini adalah hormon tiroid (Mnif et al ., 2020)

Paparan pestisida yang terjadi terus menerus pada ibu hamil dapat menyebabkan adanya inhibisi pada hormon tiroid sehingga terjadilah kondisi hipotiroid. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada neurotransmitter otak sehingga hal tersebut sejalan dengan teori model neuroanatomi dan teori hipotesis neurokimia yang menjadi penyebab terjadinya autisme (Widyawati dan Kaligis, 2017).

#### 5) Riwayat Konsumsi Alkohol

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berikut golongan minuman beralkohol baik yang diproduksi dalam negeri ataupun dari luar negeri (Irmayanti , 2013) :

- a) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar 1% sampai dengan 5%, Jenis minuman ini paling banyak dijual di minimarket atau supermarket yaitu bir. Minuman tradisional yang termasuk minuman golongan A yaitu tuak dengan kadar alkohol 4%.
- b) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%. Jenis minuman yang termasuk digolongan ini adalah aneka jenis anggur atau wine.
- c) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% sampai dengan 55%. Jenis minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain *whisky, liquor, vodka, Johnny Walker*, dan lain-lain.

*Fetal alcohol spectrum disorders* (FASD) adalah sekelompok kondisi yang terkait dengan efek paparan alkohol prenatal dan ditandai dengan perubahan somatik dan neuropsikologi. Paparan alkohol prenatal dapat mengakibatkan gangguan fungsi otak, mempengaruhi setiap tahap perkembangan saraf. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa tingkat paparan alkohol dalam rahim yang tinggi dapat dikaitkan tidak hanya

dengan FASD, tetapi juga dengan peningkatan risiko ASD (Carpita et al ., 2022).

#### 6) Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan

Paparan obat antidepresan golongan penghambat pelepasan selektif serotonin atau *selective serotonin reuptake inhibitor* (SSRI) saat masa kehamilan akan menyebabkan tingkat serotonin yang tidak normal. Contoh obat tersebut adalah fluoxetine , citalopram dan sertraline. Mekanisme dari obat antidepresan SSRI akan meningkatkan ekstraseluler dari neurotransmitter serotonin dengan cara membatasi reabsorpsi ke dalam sel *presynaptic* , terjadinya peningkatan serotonin di celah sinaps ini untuk mengikat pasca-sinaptik. Mereka memiliki berbagai tingkat selektivitas untuk transporter monoamine lainnya, dengan SSRI murni hanya memiliki afinitas yang lemah untuk norepinefrin dan dopamin transporter (Boukhris et al .,2016).

Selama masa kehamilan, serotonin akan mencapai organ target dengan sangat cepat dan mendahului neurotransmitter lain. serotonin bersifat mengganggu perkembangan organ target (trofik), menentukan penambahan dan pembentukan dendrit, sinaptogenesis, neurogenesis dan organisasi korteks. Tidak normalnya tingkat serotonin akan mengakibatkan gangguan maturasi neuron target dan gangguan pembentukan dendrit dan sinaps. Hilangnya serotonin pada periode awal perkembangan

fetus menyebabkan pengurangan permanen jumlah neuron di hipokampus dan korteks otak. Perkembangan otak pada janin akan terganggu dengan tidak normalnya tingkat serotonin dan kemudian menyebabkan GSA (Fibriana & Ningrum, 2017).

#### 7) Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi

Paparan prenatal terhadap obat-obatan antiepilepsi berhubungan dengan meningkatnya risiko malformasi kongenital mayor yang terkait dengan dosis. Dinyatakan bahwa paparan prenatal terhadap sodium valproat (VPA) berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif pada anak yang terpapar, sehingga hal ini meningkatkan kewaspadaan mengenai efek jangka panjang paparan prenatal terhadap obat antiepilepsi lainnya. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari hubungan antara paparan anti-konvulsan lain seperti karbamazepin, lamotrigin, fenitoin, dan fenobarbital dengan keterlambatan perkembangan neuron pada anak, namun Bromley et al. (2014) menyatakan bahwa data-data penelitian tersebut kurang signifikan, sehingga hasilnya kurang valid (Bromley et al., 2014).

Anak-anak yang terpapar dengan valproat selama di dalam kandungan memperlihatkan tanda *fetal valproat syndrome*. Kerusakan spesifik yang tampak pada *fetal valproat syndrome* adalah *neural tube defects*, *trigonocephaly*, *radial ray defect*, gangguan paru, koloboma iris, IQ verbal yang rendah serta tanda-

tanda ASD. Mekanisme teratogenik obat ini masih belum diketahui secara pasti. Diperkirakan terdapat peran dari inhibisi valproat terhadap *histone deacetylase* (HDAC) yang dapat merubah ekspresi gen yang berhubungan. Teori lain menyebutkan bahwa valproat dapat meningkatkan kadar stres oksidatif fetus yang terfokus di otak fetus. Salah satu struktur yang terkena dampak adalah cerebellum (Bromley et al., 2014).

#### 8) Riwayat Infeksi Saat Kehamilan

Mekanisme infeksi ibu selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan saraf seperti autisme belum diketahui dengan jelas (Zerbo et al., 2015). Penelitian sebelumnya telah menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat infeksi selama masa kehamilan dengan kejadian autisme di Kota Semarang dengan p value = 0,006 ( $p < 0,05$ ) (Fibriana & Ningrum, 2017). Ibu yang mengalami infeksi pada trimester pertama kehamilannya akan meningkatkan risiko autisme. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menduga bahwa peningkatan risiko autisme dapat terjadi secara langsung, yaitu masuknya organisme infeksius melalui plasenta dan kemudian memasuki janin atau secara tidak langsung yaitu melalui aktifnya sistem imun ibu. Aktifnya sistem imun ibu hamil akan meningkatkan jumlah sitokine yang kemudian dapat

menyebabkan perkembangan yang tidak normal pada otak seperti autisme (Zebro et al ., 2015).

#### 9) Riwayat Pendarahan Antepartum

Komplikasi kehamilan yang paling sering dikaitkan dengan GSA yaitu perdarahan antepartum, preeklamsia dan hiperemesis gravidarum. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam proses perkembangan otak, sehingga para ahli mengemukakan hipotesis bahwa awal terjadinya GSA yaitu sebelum lahir (Lubis , 2017).

Perdarahan antepartum dianggap sebagai keadaan yang berpotensi mengganggu fungsi otak janin. Perdarahan selama kehamilan paling sering disebabkan karena komplikasi plasenta, di antaranya plasenta previa dan abrupsi plasenta. Kondisi tersebut mengakibatkan gangguan transportasi oksigen dan nutrisi ke bayi yang mengakibatkan gangguan pada otak janin. Berdasarkan hasil meta analisis dari 40 studi yang pernah dilakukan sebelumnya, Gardner dkk mendapatkan perdarahan antepartum, hiperemesis gravidarum dan preeklamsia sebagai faktor risiko terjadinya GSA. Di antara ketiga komplikasi tersebut, perdarahan antepartum memiliki risiko paling besar untuk mengakibatkan GSA pada anak (Lubis , 2017).

#### 10) Riwayat Preeklamsia

Preeklamsia merupakan suatu keadaan hipertensi dengan tekanan darah  $\geq 140/90$  mmHg yang terjadi pada masa kehamilan dengan usia kehamilan ibu  $\geq 20$  minggu dan terjadi proteinuria (Dachew et al .,2018).

Pada preeklamsia, terdapat gangguan invasi arteri spiral uterus maternal ke dalam trofoblas plasental. Hal ini mengakibatkan perfusi plasental berkurang sehingga terjadi hipoksia pada fetus dan plasenta. Kurangnya suplai oksigen ke fetus semasa kehamilan dapat mengakibatkan gangguan pada perkembangan neuron. Terbatasnya oksigen dan nutrisi ke janin juga dapat mengakibatkan terjadi stres oksidatif, terkhususnya pada otak janin. Rendahnya suplai oksigen dan peningkatan stres oksidatif ini memungkinkan peningkatan risiko kejadian autisme dan *Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD)* (Dachew et al .,2018).

#### 11) Riwayat Prematur

Anak yang lahir kurang bulan memang sering mengalami keterlambatan pertumbuhan perkembangan. Makin kecil usia kehamilan dan makin kecil berat lahir, makin tinggi risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang. Belum matangnya susunan saraf pusat pada bayi prematur ikut berkontribusi pada tingginya risiko autisme. Usia kehamilan yang

kecil menandakan belum matangnya organ pada anak yang dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak (Alfinna,2019).

#### 12) Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Lahir Rendah atau BBLR adalah bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang masa gestasi (Sembiring et al. 2019). Penelitian yang dilakukan Yuliana Dwi Hastuti menunjukkan bahwa BBLR memiliki hubungan yang signifikan dengan GSA di Sumatera Utara dengan hasil (73,21%) dari total sampel (Hastuti, 2020).

Anak yang lahir dengan BBLR dapat diakibatkan karena nutrisi yang kurang baik pada saat masih dalam kandungan. Gangguan nutrisi akan mengakibatkan peredaran darah dari ibu ke janin turun sehingga kebutuhan glukosa maupun oksigen di otak tidak terpengaruhi dengan baik. Akibatnya dapat menyebabkan asfiksia dan iskemia otak, iskemia otak menyebabkan kerusakan sel-sel otak. Bayi yang lahir dengan BBLR dapat mengalami gangguan metabolisme yaitu hipoglikemia dan hipoksia, keadaan ini dapat menyebabkan terjadi metabolisme anaerob sehingga otak mengalami kerusakan pada periode perinatal (Andri Moh, 2019).

#### 13) Riwayat Asfiksia

Menurut IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) asfiksia pada bayi baru lahir adalah kegagalan nafas secara spontan dan

teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir. Terjadinya Gangguan pertukaran gas dan transport oksigen selama masa kehamilan dan persalinan akan mempengaruhi oksigenasi sel-sel pada tubuh yang kemudian akan mengakibatkan gangguan fungsi sel. Pada tingkat awal, gangguan pertukaran gas dan transport oksigen menimbulkan asidosis respiratorik dan selanjutnya akan terjadi asfiksia. Apabila gangguan tersebut terus berlanjut, akan terjadi metabolisme anaerobik pada tubuh, yang berakibat pada terganggunya perkembangan otak janin. Terganggunya perkembangan otak janin kemudian menyebabkan anak mengalami autisme (Fibriana & Ningrum, 2017).

#### 14) Riwayat Kejang demam

Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi ketika suhu tubuh berada di atas  $38^{\circ}\text{C}$  yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Klasifikasi dari kejang demam dibagi menjadi kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana adalah kejang demam yang berlangsung dalam waktu secara singkat, kurang dari 15 menit dan biasanya hilang sendiri. Sedangkan kejang demam kompleks adalah kejang lama yang berlangsung lebih dari 15 menit, kejang pada satu sisi atau sebagian, atau kejang umum yang didahului oleh kejang parsial dan kejang berulang atau lebih dari sekali dalam 2 jam (pusponegoro et al., 2016).

Demam dengan kenaikan suhu 1°C akan mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen akan meningkat 20%. Pada kenaikan suhu tubuh tertentu dapat terjadi perubahan keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu yang singkat terjadi difusi dari ion Kalium maupun ion Natrium melalui membran tersebut dengan akibat terjadinya lepas muatan listrik. Lepas muatan listrik tersebut dapat meluas ke seluruh sel maupun ke membran sel di sebelahnya dengan bantuan neurotransmitter sehingga terjadi kejang, sehingga anak yang mengalami kejang demam dapat membuat anak mengalami gangguan autisme (Ismet, 2017).

15) Riwayat Vaksin *Measles, Mumps, Rubella* (MMR)

Vaksin MMR merupakan vaksin kombinasi yang terbuat dari mikroorganisme yang dilemahkan, sehingga diharapkan reaksi samping berkurang dan terjadi pembentukan zat anti yang menyerupai infeksi alamiah. Vaksinasi MMR telah berhasil menurunkan kejadian penyakit campak, gondongan dan rubella (Destafano & Shimabukuro, 2019).

Studi yang dilakukan oleh Andrew Wakefield pada tahun 1998 didapatkan hipotesis bagaimana vaksin MMR dapat menyebabkan patologi usus yang dapat mempengaruhi toksisitas sistem saraf pusat pada anak dan kemungkinan mengalami GSA (Destafano & Shimabukuro, 2019). Setelah publikasi yang

dilakukan oleh Andrew Wakefield ini memberikan dampak pada beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Jepang sehingga memutuskan untuk melakukan studi terkait hubungan antara vaksin MMR dan GSA tetapi masing-masing negara tidak menemukan adanya risiko GSA setelah vaksin MMR. Sehingga pada tahun 2010 Inggris akhirnya memutuskan untuk mencabut publikasi makalah Andrew Wakefield karena tidak terdapat bukti bahwa vaksin MMR menyebabkan GSA (Destafano dan Shimabukuro, 2019).

### 3. Karakteristik

Diagnosis autisme menggunakan parameter *triad of impairments*, yaitu tiga area kesulitan dalam belajar dan berkomunikasi seorang anak yang tampak dalam perkembangan anak tersebut di sebelum dia berusia tiga tahun. Bukan berarti semua anak di diagnosis sebelum tiga tahun, tetapi berdasarkan observasi pada orang tua dan observasi lainnya, tampak bahwa pola kesulitan yang dialami seorang anak diawali sebelum usianya tiga tahun. Ketiga area kesulitan tersebut meliputi :

#### a) Kesulitan dalam berbahasa dan berkomunikasi

Area ini meliputi kemampuan anak untuk memahami segala bentuk bahasa dan komunikasi. Bahkan hanya bahasa lisan yang terpengaruh, tetapi juga *gesture* (gerak isyarat), ekspresi wajah, dan segala bentuk bahasa tubuh. Anak-anak penderita autisme memiliki kemampuan komunikasi yang sangat rendah dan ketika mereka masuk

pada tahap awal berbicara, mereka hampir selalu memberikan “label” untuk hal apapun yang mereka lihat atau inginkan dan mengulang apa yang mereka dengar dari orang lain, sering kali tanpa arti dan bukan melibatkan diri dalam berdialog dengan orang lain.

- b) Kesulitan dalam berinteraksi sosial dan pemahaman terhadap sekitarnya

Anak-anak penderita autisme biasanya dikatakan “penyendiri” dan “hidup di dunianya sendiri”. Tetapi, deskripsi itu tidak berlaku untuk semua anak. Banyak anak-anak yang tampak aktif secara sosial dalam suatu tertentu dan dengan orang-orang yang dia kenal. Kesulitan bersosialisasi pada anak autisme lebih disebabkan oleh kurangnya “pemahaman sosial” dan bukan “ketertarikan sosial”. Beberapa anak bisa saja tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam permainan seperti kejar-kejaran atau berguling-guling yang anak-anak biasa lakukan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana melakukan permainan itu dengan benar. Sulitnya anak untuk berinteraksi dengan sekitarnya berakar dan kurangnya empati sosial, dengan anak sulit memahami apa yang dipikirkan dan di rasakan oleh orang lain.

- c) Kurangnya fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak laku

Aspek ini muncul dalam berbagai cara tergantung dari usia, kepribadian, minat, dan kemampuan anak. Hal ini dapat di amati ketika anak-anak senang menirukan gerakan, tertarik pada pola-pola tertentu (biasanya berupa garis lurus dan lingkaran), menyusun mainan mereka

dan bukan memainkannya, menjadi sangat bersikeras untuk melakukan kegiatan rutinnnya, seperti ketika dia pergi ke toko, ingin menonton video yang sama berulang-ulang atau memiliki ketertarikan pada mainan tertentu atau karakter dalam cerita atau film.

Tingkah laku semacam ini dapat ditemukan pada anak-anak normal pada umumnya, tetapi anak autisme mengalaminya lebih lama. Selain itu, tingkah laku tersebut dapat menjadi alasan kepanikan dan kemarahan bagi seorang penderita autis, ketika dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan atau harapkan (Manipuspika et al ., 2011).

#### **4. Klasifikasi**

Klasifikasi autisme menurut ICD (International Classification of Diseases) dan APA (American Psychiatric Association) di dalam buku DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) adalah sebagai berikut :

##### **a. *Childhood Autism* (autisme masa kanak-kanak)**

Yaitu gangguan perkembangan yang gejalanya tampak sebelum anak mencapai usia 3 tahun. Ciri-ciri gangguan autisme masa kanak-kanak:

- 1) Komunikasi, antara lain : Perkembangan bicara terlambat, bahasa stereotip (diulang-ulang) dan tidak mampu bermain imajinatif.
- 2) Interaksi sosial, antara lain : Kegagalan untuk bertatap muka, ketidakmampuan untuk berempati dan kegagalan membina hubungan sosial dengan teman sebaya.

3) Perilaku, antara lain : Adanya gerakan-gerakan motorik aneh yang diulang, menunjukkan emosi yang tidak wajar dan adanya preokupasi yang terbatas pada perilaku yang abnormal.

b. *Pervasive developmental disorder not otherwise specified (PDD- NOS)*

Gangguan autis yang tidak umum dan terdapat ketidakmampuan pada beberapa perilaku. Ciri-ciri PDD-NOS, yaitu: Masih dapat bertatap mata, ekspresi muka tidak terlalu datar dan masih bisa diajak bergurau.

c. *Rett's syndrome*

Gangguan perkembangan yang hanya dialami oleh anak perempuan. Ciri- ciri sindrom rett, yaitu: Kehamilan, kelahiran normal dan lingkar kepala normal saat lahir, Perkembangan mengalami kemunduran pada usia 6 bulan, Pertumbuhan kepala berkurang pada usia 5 bulan – 4 tahun, Gerakan yang terarah hilang dan disertai dengan gangguan komunikasi serta penarikan diri secara sosial.

d. *Childhood disintegrative disorder* (gangguan disintegrasi masa kanak-kanak)

Gangguan perkembangan yang sangat baik selama beberapa tahun sebelum terjadi kemunduran yang hebat. Ciri-ciri CDD, yaitu: Bicara mendadak berhenti, mulai menarik diri dan perilaku stereotip.

e. *Asperger syndrome*

Gangguan perkembangan yang dialami pada masa anak-anak dan lebih banyak terdapat pada anak laki-laki daripada wanita. Ciri-ciri

*Asperger syndrome*, yaitu: Mengalami gangguan dalam komunikasi, interaksi sosial perilaku, pandai bicara tetapi agak terlambat, komunikasi hanya berjalan searah, memiliki otak yang cerdas dan daya ingat yang kuat, serta memiliki sifat yang kaku dan sulit dalam belajar bersosialisasi (American Psychiatric Association , 2013).

### 5. Kriteria Diagnosis

Menurut American Psychiatric Association (APA) dalam panduan penetapan diagnosis dan gangguan perkembangan mental yang biasa digunakan adalah DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)

**Tabel 2.1** Kriteria Diagnosis Autisme Berdasarkan DSM V

<b>Kriteria A</b>	<p>Kurangnya komunikasi dan interaksi sosial yang bersifat menetap pada berbagai konteks,yang di manifestasikan pada tanda-tanda di bawah ini, baik pada saat ini atau dari riwayat sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kemampuan komunikasi sosial dan emosional. Contohnya pendekatan sosial yang tidak normal dan kegagalan untuk melakukan komunikasi dua arah, kegagalan untuk berinisiatif atau merespon pada interaksi sosial.</li> <li>2. Terganggunya perilaku komunikasi non-verbal yang digunakan untuk interaksi sosial. Contohnya integrasi komunikasi verbal dan non-verbal yang sangat parah, hilangnya kontak mata, bahasa tubuh dan ekspresi wajah.</li> <li>3. Kurangnya mengembangkan, mempertahankan dan mengerti</li> </ol>
-------------------	--

	<p>hubungan. Contohnya kesulitan menyesuaikan perilaku pada berbagai konteks sosial, kesulitan dalam bermain imajinatif atau berteman, tidak adanya ketertarikan terhadap teman sebaya.</p>
<p><b>Kriteria B</b></p>	<p>Pola perilaku yang terbatas dan berulang, ketertarikan atau aktivitas termanifestasikan paling tidak pada dua dari berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergerakan motor repetitif atau stereotipi, penggunaan obyek atau bahasa. Contohnya : perilaku stereotip yang sederhana, membariskan mainan atau membalikkan obyek, ekolalia dan frase tidak biasa.</li> <li>2. Perhatian yang berlebihan pada kesamaan, rutinitas yang kaku atau pola perilaku verbal atau non-verbal yang diritualkan. Contohnya : stress ekstrim pada pada suatu perubahan yang kecil, kesulitan pada saat adanya proses perubahan, pola pikir yang kaku, ucapan ritual, mengambil rute yang sama atau makan makanan yang sama setiap hari.</li> <li>3. Sangat terbatas, terpaku pada ketertarikan dengan intensitas atau fokus yang tidak normal .Contohnya : kelekatan yang kuat atau preokupasi pada obyek yang tidak biasa, pembatasan atau ketertarikan yang berlebihan.</li> <li>4. Reaksi yang berlebihan (<i>hyperreactive</i>) atau sangat kekurangan (<i>hyporeactive</i>) terhadap rangsang sensoris atau ketertarikan yang tidak biasa terhadap aspek sensoris lingkungan. Contohnya : sikap tidak peduli pada rasa sakit atau suhu, respon yang berlawanan</li> </ol>

	pada suara atau tekstur tertentu, penciuman yang berlebihan atau sentuhan dari obyek, kekaguman visual pada cahaya atau gerakan.
<b>Kriteria C</b>	Gejala harus muncul pada periode perkembangan awal (tapi mungkin tidak termanifestasi secara penuh sampai tuntutan sosial melebihi kapasitas yang terbatas, atau mungkin tertutupi dengan strategi belajar dalam kehidupannya).
<b>Kriteria D</b>	Gejala menyebabkan gangguan yang signifikan pada kehidupan sosial, pekerjaan atau hal penting lain dalam kehidupan.
<b>Kriteria E</b>	Gangguan ini tidak disebabkan oleh disabilitas intelektual atau keterlambatan perkembangan global. Disabilitas intelektual dan GSA sering muncul bersamaan, sehingga diagnosis ditegakkan sebagai GSA dan disabilitas intelektual, kemampuan komunikasi sosial harus di bawah kemampuan rerata anak seusianya.

(American Psychiatric Association , 2013)

## 6. Tanda dan Gejala

Tanda dan gejala autisme menurut National Institute of Mental Health dalam buku *Autism Spectrum Disorder* (2015) bahwa tidak semua orang dengan GSA akan menunjukkan semua perilaku ini , akan tetapi Sebagian besar akan menunjukkan beberapa. Berikut beberapa tanda dan gejala :


- a. Mengulangi perilaku tertentu atau tingkah laku yang tidak biasa.
- b. Memiliki minat yang terlalu terfokus ,seperti dengan memindahkan objek atau bagian dari objek.

- c. Memiliki minat yang intens dalam topik-topik tertentu , seperti angka, detail atau fakta.
- d. Kesal jika ada sedikit perubahan dalam rutinitas atau sedang di tempatkan dalam situasi yang baru.
- e. Tidak melakukan kontak mata.
- f. Cenderung untuk melihat dan mendengarkan lebih sedikit terhadap objek atau kegiatan dan menunjukkan sesuatu kepada orang lain.
- g. Jarang mencari dan berbagi kesenangan mereka terhadap objek atau kegiatan dan menunjukkan kepada orang lain.
- h. Menanggapi dengan tidak biasa ketika orang lain menunjukkan kemarahan , kesusahan , atau kasih sayang.
- i. Gagal atau lambat menanggapi nama mereka sendiri atau upaya verbal.
- j. Memiliki kesulitan dalam membolak-balikan percakapan.
- k. Sering berbicara Panjang lebar tentang subjek *favorite* tetapi tidak akan mengizinkan siapapun untuk menanggapi dan acuh tak acuh ketika orang lain bereaksi.
- l. Mengulangi kata atau frasa yang mereka dengar, perilaku yang disebut ekolalia.
- m. Menggunakan kata-kata yang tampak aneh , tidak pada tempatnya, atau memiliki kata istimewa artinya hanya diketahui oleh mereka yang akrab dengan cara orang itu berkomunikasi.

- n. Memiliki ekspresi wajah dan gerakan yang tidak cocok dengan apa yang mereka katakan.
- o. Memiliki nada suara yang tidak biasa terdengar nyanyian atau datar bahkan seperti robot.
- p. Memiliki kesulitan memahami sudut pandang orang lain dan tidak dapat memprediksi atau memahami orang lain (National Institute of Mental Health, 2015).




## B. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori


### C. Kerangka Konsep



: Variabel Independen



: Variabel yang tidak diteliti



: Variabel Dependen

**Bagan 2.2** Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *cross sectional* yang menggambarkan faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 04 Januari - 24 Januari 2023.

#### **C. Populasi dan Sampel penelitian**

##### 1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar pada 4 Agustus 2022 yakni 308 siswa/i

##### 2. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria penelitian dengan menggunakan metode teknik total *sampling*.

Dilakukan pembagian kuesioner pada sampel yaitu ibu yang memiliki

anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar. Total sampel dalam penelitian ini adalah 61 sampel.

Sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditentukan. Adapun Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini :

a. Kriteria inklusi

- 1) Ibu yang memiliki anak dengan GSA yang terdaftar di SLB Negeri 1 Makassar.
- 2) Anak dengan GSA mulai dari kelas 1-12 dan semua jenis kelamin.
- 3) Bersedia menjadi responden.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Tidak menderita penyakit akut.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden atau ibu yang mempunyai anak dengan GSA.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari dokumentasi yang diperoleh dari instansi atau pihak lain yang terkait kejadian GSA.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang berisi data faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA.

Berdasarkan uji validitas telah dilakukan pada kuesioner dengan jumlah responden 30 didapatkan dengan  $r_{tabel}$  (0,361) pada taraf signifikan 5% (0,05) didapatkan 20 pertanyaan  $r_{hitung} > 0,361$  sehingga dinyatakan valid. Sedangkan uji reabilitas menggunakan Cronbach's alpha dengan tingkat kesalahan 5% pada 20 pertanyaan yang valid didapatkan hasil yaitu semua pertanyaan dinyatakan reliabel dengan nilai  $r_{hitung}$  0,611.

## **F. Pengelolaan Data**

### 1. Editing

Memeriksa data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan dan memeriksa kelengkapan dan kesalahan.

### 2. Coding

Mengkode data merupakan kegiatan mengklasifikasikan data memberikan kode untuk masing-masing kelas terhadap data yang diperoleh dan sumber data yang telah diperiksa.

### 3. Tabulating

Dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data sedemikian rupa agar mudah dapat dijumlahkan, disusun dan ditata untuk disajikan dan dianalisa.

## **G. Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan SPSS 20.0.

## 1. Analisis Univariat

Analisis univariat adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian. Analisis univariat yang dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian dengan menggunakan label distribusi frekuensi sehingga menghasilkan distribusi dan presentase setiap variabel penelitian.

### **H. Penyajian Data**

Data yang telah diolah dan dianalisis dengan menggunakan SPSS, selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan narasi untuk membahas hasil penelitian.

### **I. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian wajib mengajukan surat permohonan persetujuan etika penelitian kepada komite etik penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SLB Negeri 1 Makassar. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah populasi seluruh ibu yang memiliki anak dengan GSA di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode teknik total *sampling* dengan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 61 responden atau ibu yang memiliki anak dengan GSA. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang berisi data faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA. Penelitian ini dilaksanakan mulai 04 Januari - 24 Januari 2023. Data terkumpul selanjutnya di editing, coding dan tabulating. Hasil penelitian ini berupa hasil analisis univariat dan masing-masing variabel yang diteliti.



## 1. Analisis Univariat

### a. Karakteristik responden

**Tabel 4.1** Distribusi Frekuensi Usia Anak GSA di SLB Negeri 1 Makassar

Usia Anak	Frekuensi	Persentase (%)
7 Tahun	2	3.3
8 Tahun	8	13.1
9 Tahun	11	18.0
10 Tahun	9	14.8
11 Tahun	11	18.0
12 Tahun	3	4.9
13 Tahun	4	6.6
14 Tahun	3	4.9
15 Tahun	3	4.9
16 Tahun	6	9.8
17 Tahun	1	1.6
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan distribusi frekuensi untuk usia anak dengan GSA terbanyak pada usia 9 tahun dan 11 tahun sebanyak 11 (18,0%). Sedangkan distribusi frekuensi usia anak dengan GSA terendah pada usia 17 tahun sebanyak 1 anak dengan GSA (1,6%). Sisanya, pada usia 7 tahun sebanyak 2 anak dengan GSA (3,3%), usia 8 tahun sebanyak 8 anak dengan GSA (13,1%), usia 10 tahun sebanyak 9 anak dengan GSA (14,8%), usia 12, 14 dan 15 tahun sebanyak 3 anak dengan GSA (4,9%), usia 13 tahun

dengan 4 anak dengan GSA (6,6%) dan pada usia 16 tahun sebanyak 6 anak dengan GSA (9,8%).

**Tabel 4.2** Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	51	83.6
Perempuan	10	16.4
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan distribusi frekuensi untuk jenis kelamin anak dengan GSA terbanyak yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 51 anak dengan GSA (83,6%). Sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 10 anak dengan GSA (16,4%).

#### b. Faktor Risiko GSA

**Tabel 4.3** Distribusi Frekuensi Genetik Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

Genetik	Frekuensi	Presentase (%)
Ya	36	59,0
Tidak	25	41,0
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan distribusi frekuensi untuk yang memiliki riwayat genetik terbanyak yaitu 36 responden (59,0%) sedangkan

distribusi frekuensi yang tidak memiliki riwayat genetik terendah sebanyak 25 responden (41,0%).

**Tabel 4.4** Distribusi Frekuensi Usia Ayah Saat Ibu Mengandung Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Usia Ayah Saat Ibu Mengandung</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
25 - 26 Tahun	1	1.6
27 - 28 Tahun	4	6.6
29 - 30 Tahun	15	24.6
31 - 32 Tahun	9	14.8
33 - 34 Tahun	8	13.1
35 - 36 Tahun	14	23.0
37 - 38 Tahun	2	3.3
39 - 40 Tahun	6	9.8
41 - 42 Tahun	2	3.3
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan distribusi frekuensi usia ayah saat ibu mengandung anak dengan GSA terbanyak pada rentang usia 29-30 tahun sebanyak 15 responden (24,6%) sedangkan distribusi frekuensi usia ayah saat ibu mengandung anak dengan GSA terendah pada rentang usia 25-26 tahun sebanyak 1 responden (1,6%).

**Tabel 4.5** Distribusi Frekuensi Usia Ibu Saat Mengandung Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Usia Ibu Saat Mengandung</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
20-22 Tahun	2	3.3
23-25 Tahun	4	6.6
26-28 Tahun	11	18.0
29-31 Tahun	15	24.6
32-34 Tahun	19	31.1
35-37 Tahun	5	8.2
38-40 Tahun	5	8.2
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan distribusi frekuensi usia ibu saat mengandung anak dengan GSA terbanyak pada rentang usia 32-34 tahun sebanyak 19 responden (31,1%). Sedangkan distribusi frekuensi usia ibu saat mengandung anak dengan GSA terendah pada rentang usia 20-22 tahun sebanyak 2 responden (3.3%).



**Tabel 4.6** Distribusi Frekuensi Riwayat Pendidikan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
SD	2	3.3
SMP	9	14.8
SMA	37	60.7
Sarjana	13	21.3
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.6 distribusi frekuensi pendidikan ibu terbanyak yaitu SMA sebanyak 37 responden (60,7%) sedangkan distribusi pendidikan ibu terendah yaitu SD sebanyak 2 responden (3,3%). Sisanya, SMP sebanyak 9 responden (14,8%), dan ibu dengan pendidikan sarjana sebanyak 13 responden (21,3%).

**Tabel 4.7** Distribusi Frekuensi Riwayat Rokok Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Rokok</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pasif	55	90.2
Aktif	6	9.8
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.7 distribusi frekuensi ibu merokok terbanyak pada ibu dengan perokok pasif sebanyak 55 responden (90,2%) sedangkan

distribusi frekuensi ibu merokok terendah yaitu pada ibu dengan perokok aktif sebanyak 6 responden (9,8%).

**Tabel 4.8** Distribusi Frekuensi Riwayat Terpapar Pestisida Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Terpapar Pestisida</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	61	100
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.8 distribusi frekuensi ibu yang tidak terpapar pestisida sebanyak 61 responden (100%).

**Tabel 4.9** Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Alkohol Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Konsumsi Alkohol</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	61	100
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.9 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsumsi alkohol sebanyak 61 responden (100%).

**Tabel 4.10** Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	61	100
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.10 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsumsi obat antidepresan sebanyak 61 responden (100%).

**Tabel 4.11** Distribusi Frekuensi Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	61	100
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.11 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengonsumsi obat antiepilepsi sebanyak 61 responden (100%).



**Tabel 4.12** Distribusi Frekuensi Riwayat Infeksi Saat Kehamilan Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Infeksi Saat Kehamilan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	8	13.11
Tidak	53	86.89
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.12 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengalami infeksi saat kehamilan sebanyak 53 responden (86,89%) dan frekuensi ibu yang mengalami infeksi saat kehamilan sebanyak 8 responden (13,11%).

**Tabel 4.13** Distribusi Frekuensi Riwayat Pendarahan Antepartum Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Pendarahan Antepartum</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tidak	61	100
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.13 distribusi frekuensi ibu yang tidak mengalami pendarahan antepartum sebanyak 61 responden (100%).

**Tabel 4.14** Distribusi Frekuensi Riwayat Preeklamsia Pada Ibu dari Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Preeklamsia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	6	9.8
Tidak	55	90.2
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.14 distribusi data frekuensi ibu yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 55 responden (90,2%) dan frekuensi ibu yang mengalami preeklamsia sebanyak 6 responden (9,8%).

**Tabel 4.15** Distribusi Frekuensi Riwayat Prematur Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Prematur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 37 Minggu	24	39.3
> 37 Minggu	37	60.7
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.15 distribusi frekuensi anak lahir prematur terbanyak pada usia >37 minggu sebanyak 37 responden (60,7%) sedangkan distribusi frekuensi anak lahir prematur terendah pada usia <37 minggu sebanyak 24 responden (39,3%).

**Tabel 4.16** Distribusi Frekuensi Riwayat BBLR Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
< 2500 g	27	44.3
> 2500 g	34	55.7
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.16 distribusi frekuensi bayi berat lahir rendah terbanyak pada berat >2500 gram sebanyak 34 responden (55,7%) sedangkan distribusi frekuensi bayi berat badan lahir terendah dengan berat <2500 gram sebanyak 27 responden (44,3%).

**Tabel 4.17** Distribusi Frekuensi Riwayat Asfiksia Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Asfiksia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	3	4.9
Tidak	58	95.1
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.17 distribusi data frekuensi anak yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 58 responden (95,1%) dan frekuensi anak yang mengalami asfiksia sebanyak 3 responden (4,9%).

**Tabel 4.18** Distribusi Frekuensi Riwayat Kejang Demam Pada Anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar

<b>Riwayat Kejang Demam</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Ya	18	29.5
Tidak	43	70.5
<b>Total</b>	<b>61</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 4.18 distribusi frekuensi anak tanpa riwayat kejang demam sebanyak 43 responden (70,5%) sedangkan distribusi frekuensi anak dengan riwayat kejang demam sebanyak 18 responden (29,51%).

## **B. Pembahasan**

### 1. Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak GSA Di Slb Negeri 1 Makassar

Penelitian tentang gambaran faktor- faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar 2022 telah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Pada penelitian ini tidak dilakukan analisis secara statistik terkait tentang hubungan faktor-faktor risiko dengan kejadian GSA pada anak. Faktor-faktor risiko pada penelitian ini didapatkan dengan cara membagikan lembar kuesioner ataupun *google form* kepada responden dan melakukan wawancara.

a. Genetik

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar subjek penelitian memiliki faktor risiko genetik terdapat 36 responden (59,0%) yang memiliki faktor genetik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggriani dkk (2020) didapatkan hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan terjadinya GSA dengan hasil nilai  $P = 0,001$ . Studi yang dilakukan oleh Dodds et al. (2011) menunjukkan hasil yang serupa, yaitu 6,8% kasus GSA memiliki saudara yang juga menderita GSA.

Studi kromosom menunjukkan bahwa ada hubungan antara genetik dengan GSA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 2 hingga 4 % sanak saudara dari penderita GSA mengalami gangguan spektrum autisme (Saha,2009). Kejadian GSA meningkat pada keluarga yang memiliki riwayat GSA (Schaefer, 2013).

b. Usia Orang Tua

Hasil penelitian faktor risiko usia orang tua pada anak GSA untuk usia ayah banyak didapatkan pada rentang usia 29-30 tahun sebanyak 15 responden (24,6%) Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2022) pada kelompok usia ayah didapatkan rentang usia >29-34 tahun sebanyak 35 responden (36,1%).

Hasil penelitian faktor risiko usia orang tua pada anak GSA untuk usia ibu banyak didapatkan pada rentang usia 32-34 tahun sebanyak 19

responden (31,1%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2022) pada kelompok ibu didapatkan rentang usia >29-34 tahun sebanyak 36 responden (37,1%).

Penelitian meta-analisis mengindikasikan bahwa kedua orang tua yang semakin tua saat melahirkan anak memiliki risiko yang lebih tinggi untuk memiliki anak dengan GSA. Mekanisme biologi yang mendasari hal ini belum diketahui dengan pasti. Usia ibu yang semakin tua diduga terkait dengan risiko abnormalitas kromosom pada sel telur atau ketidakstabilan trinukleotida. Reichenberg et al menyatakan bahwa hubungan usia ayah dengan autisme dikarenakan mutasi spontan *de novo* yang berkaitan dengan peningkatan usia spermatogonia atau dipengaruhi oleh faktor sosial-kultural lingkungan (Jokiranta et al., 2013).

#### c. Riwayat Pendidikan

Hasil penelitian faktor risiko riwayat pendidikan pada ibu dari anak dengan GSA terbanyak didapatkan pada SMA sebanyak 37 responden (60,7%) sedangkan distribusi pendidikan ibu terendah yaitu SD sebanyak 2 responden (3,3%). Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak ibu yang riwayat pendidikannya SMA terkait faktor risiko GSA pada anak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ruminem (2020) didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kejadian autisme ( $p = 0.79 > 0,05$ ).

#### d. Riwayat Rokok

Hasil penelitian faktor risiko riwayat rokok pada ibu dari anak GSA didapatkan terbanyak pada ibu dengan perokok pasif sebanyak 55 responden (90,2%) dan perokok aktif sebanyak 6 responden (9,8%). Pada penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2014) paparan rokok tidak berhubungan dengan kejadian autisme ( $p=1,000$ ), hal ini kemungkinan terjadi karena dalam penelitian ini jumlah sampel yang terpapar berjumlah sangat minim yaitu 6 orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbayatin dkk (2015) didapatkan hampir setengah ibu hamil yang perokok pasif dengan jumlah 17 ibu hamil perokok pasif (34%). Tidak didapatkan hubungan yang signifikan dengan antara ibu hamil sebagai perokok pasif dengan GSA ( $P = 1,000$ ).

Paparan asap rokok yang terhirup oleh ibu hamil sama bahayanya dengan orang yang merokok secara langsung, asap rokok mengandung nikotin yang merupakan zat vasokonstriktor yang akan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga meningkatkan kontraksi jantung, akibatnya akan mempengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke jantung janin. Pasokan oksigen ke janin menjadi tidak adekuat yang dapat menyebabkan hipoksia dan pertumbuhan janin terganggu. Selain itu, penurunan suplai nutrisi akan menyebabkan janin kekurangan nutrisi dan mengganggu pertumbuhan janin (Hanum, 2017).

e. Riwayat terpapar pestisida

Hasil penelitian faktor risiko riwayat terpapar pestisida pada ibu dari anak GSA tidak didapatkan pada semua ibu namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juanda dkk (2020) menyebutkan bahwa adanya zat kimia seperti pestisida yang memiliki efek EDC atau memiliki sifat antitiroid juga merupakan faktor yang menyebabkan autisme. Beberapa jenis pestisida yang memiliki efek EDC antara lain 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), mancozeb, acetochlor, aminotriazole, aminotrole, bromoxynil, pendamethalin, dan 84 thiourea. Bahan-bahan dapat berkompetisi dengan reseptor hormon tiroid sehingga menyebabkan hormon tiroid tidak dapat berikatan dengan reseptor atau kerja hormon tiroid dapat terhambat dan terjadilah kondisi hipotiroid. Penurunan kadar tiroid dapat menurunkan kemampuan dari pertumbuhan dari dendrit pada sel purkinje di cerebellum yang diperantarai oleh hormon tiroid. Hal tersebut dapat mempengaruhi neuroanatomi dan neurokimia berupa neurotransmitter pada otak sehingga dapat menyebabkan kondisi autisme (Juanda, 2020).

f. Riwayat konsumsi Alkohol

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi alkohol selama kehamilan yaitu tidak ada sama sekali atau nol persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara

riwayat konsumsi alkohol dengan terjadinya disabilitas pada anak di Sekolah Holistic Inklusi Pelangi Kota Pekalongan ditunjukkan dengan hasil  $P$ -value = 0,468.

Menurut WHO pada tahun 2011 ibu hamil yang mengonsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan terjadinya *Fetal Alcohol Syndrome* (FAS) yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin (WHO,2011). Berdasarkan prevalensi FAS tertinggi menurut WHO pada tahun 2017 terdapat di negara Eropa sebanyak 2% dan untuk negara-negara Timur Tengah dan Afrika sebanyak 0,01%. Untuk negara Indonesia belum ada data tentang FAS (Lange et al.,2017).

Mengonsumsi alkohol pada trimester pertama dapat terjadi peningkatan anomali wajah dan otak pada janin. Pada trimester kedua meningkatkan kejadian abortus spontan. Sedangkan pada trimester 3 dapat mengakibatkan penurunan pada berat badan , tinggi badan dan volume otak janin sehingga nantinya dapat menyebabkan terjadinya retardasi mental (Vaux, 2016).

Islam melarang meminum *khamar* (minuman keras) dan perintah larangan ini berlaku untuk seluruh umat islam tanpa kecuali. Sebagaimana yang terdapat pada Q.S Al-Maidah (5) : 90 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

g. Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi obat tertentu seperti obat antidepresan selama kehamilan yaitu tidak ada sama sekali atau nol persen. Pada penelitian yang dilakukan Alfinna (2019) terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat konsumsi obat antidepresan saat kehamilan dan melahirkan anak dengan ASD pada anak di Kota Semarang ( $P 0,001$ ;  $OR=20,06$ ), hal ini berarti ibu yang memiliki riwayat konsumsi obat antidepresan berisiko 20 kali lebih besar melahirkan anak dengan ASD dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat konsumsi obat antidepresan.

h. Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi

Hasil penelitian faktor risiko riwayat mengonsumsi obat antiepilepsi selama kehamilan yaitu tidak ada sama sekali atau nol persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Manalu (2013) didapatkan presentase riwayat ibu yang mengonsumsi obat seperti misoprostol dan asam valproat yaitu sebanyak 0%. Hampir seluruh responden mengatakan bahwa mereka mengonsumsi vitamin selama kehamilan. Obat asam valproat dapat

mengakibatkan adanya malformasi somatik seperti *neural tube defect* (Bromley et al., 2014).

i. Riwayat Infeksi Saat kehamilan

Hasil penelitian faktor risiko riwayat infeksi saat kehamilan pada anak GSA terbanyak didapatkan pada Ibu yang tidak mengalami infeksi saat kehamilan sebanyak 53 responden (86,9%). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fibriana dkk (2017) di Kota Semarang bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ibu yang mengalami infeksi selama kehamilan dengan kejadian GSA dengan  $P$  value = 0,006 ( $P < 0,05$ ). Hubungan antara infeksi pada masa awal kehidupan anak dengan autisme juga telah ditelusuri. Beberapa penelitian menyebutkan timbulnya tiba-tiba onset autisme setelah terjadinya herpes ensefalitis. Infeksi lain yang dapat menyebabkan hidrosefalus sekunder seperti meningitis berdampak juga terhadap autisme meskipun laporan kasusnya masih sedikit. Penelitian kasus-kontrol oleh Deykin MacMahon mengumpulkan data penyakit karena virus di 18 bulan awal kehidupan dan didapatkan campak, cacar air, demam tanpa sebab yang jelas dan infeksi telinga berhubungan dengan risiko autisme. (Parner et al, 2012)

j. Riwayat Pendarahan Antepartum

Hasil penelitian faktor risiko riwayat pendarahan antepartum pada anak GSA tidak ada sama sekali atau nol persen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2014) bahwa tidak ada hubungan antara pendarahan antepartum dengan kejadian autisme ( $p=0,640$ ), namun lebih berhubungan terhadap kejadian persalinan prematur dan BBLR yang kemudian dapat berhubungan dengan kejadian GSA. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017) didapatkan pendarahan antepartum mengalami risiko peningkatan pada kejadian GSA ( $P = 0,002$ ).

Ketika terjadi pendarahan pada ibu hamil akan menyebabkan berkurangnya suplai oksigen dan glukosa yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya metabolisme anaerob, kurangnya ATP dan terjadinya penimbunan asam laktat yang akan mempercepat proses kerusakan sel-sel otak dan juga menyebabkan kerusakan pompa ion sehingga terjadi depolarisasi anoksik yang mengakibatkan keluarnya ion  $K^+$  dan masuknya ion  $Na^+$  dan  $Ca^{2+}$  ke dalam sel bersamaan dengan masuknya ion  $Na^+$  dan  $Ca^{2+}$  air juga ikut masuk dan akan menyebabkan edema kemudian mengakibatkan kerusakan sel otak pada janin (Fibriana & Ningrum, 2017).

#### k. Riwayat Preeklamsia

Hasil penelitian faktor risiko riwayat preeklamsia pada ibu dari anak GSA didapatkan pada ibu yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 55 responden (90,2%) dan yang mengalami preeklamsia sebanyak 6 responden (9,8). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfinna (2019) didapatkan hasil sebanyak 13 orang (29,5%) yang mengalami preeklamsia dan sebanyak 31 orang (70,5 %) yang tidak mengalami preeklamsia. Berdasarkan hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat preeklamsia dengan kejadian ASD pada anak di Kota Semarang ( $p=0,031$  ;  $OR= 4,2$ ), hal ini berarti ibu yang memiliki riwayat preeklamsia berisiko 4,2 kali lebih besar melahirkan anak dengan ASD dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat preeklamsia (Alfinna , 2019).

#### l. Riwayat Prematur

Hasil penelitian faktor risiko riwayat prematur pada anak GSA didapatkan sebanyak 37 responden (60,7%) yang tidak mengalami kelahiran prematur dan sebanyak 24 responden (39,3%) yang mengalami kelahiran prematur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfinna (2019) didapatkan hasil sebanyak 15 orang (34,1%) yang mengalami prematur dan sebanyak 29 orang (65,9 %) yang tidak mengalami prematur. Berdasarkan hasil

analisis bivariat yang dilakukan oleh Alfinna (2019) menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat kelahiran prematur dengan kejadian ASD pada anak di Kota Semarang ( $p = 0,010$ ;  $OR=5,1$ ), hal ini berarti anak yang memiliki riwayat kelahiran prematur berisiko 5,1 kali lebih besar mengalami ASD dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki riwayat kelahiran prematur.

Usia kehamilan tidak normal terjadi lebih sering pada kelahiran anak-anak yang nantinya berkembang menjadi autisme. Dikelompokkan bahwa kehamilan umur 35 minggu atau 42 minggu sebagai abnormal, dan terdapat hubungan yang signifikan dengan risiko autisme (Zhang, 2010).

m. Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Hasil penelitian faktor risiko riwayat BBLR pada anak GSA terbanyak didapatkan pada ibu yang bayi berat lahirnya  $>2500$  gram sebanyak 34 responden (55,7%). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hultman et al (2012) didapatkan 86% kasus autisme infantil lahir dengan berat  $>2500$  gram. Meskipun hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas berat lahir anak dengan GSA pada penelitian ini adalah normal, ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Ini bisa disebabkan karena jumlah sampel yang diperoleh hanya merupakan jumlah sampel minimum untuk menggambarkan faktor risiko anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut secara analisis statistik untuk menentukan

apakah berat lahir termasuk faktor risiko GSA atau tidak di SLB Kota Makassar.

n. Riwayat Asfiksia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko riwayat asfiksia pada anak GSA terbanyak didapatkan pada anak yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 58 responden (95,1%) dan pada anak yang mengalami afiksia sebanyak 3 responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi (2014) dengan jumlah yang tidak mengalami asfiksia 20 orang (34,4%) dan yang mengalami asfiksia sebanyak 9 orang (15%).

o. Riwayat Kejang Demam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor risiko riwayat kejang demam pada anak GSA terbanyak didapatkan pada anak yang tidak memiliki riwayat kejang demam sebanyak 43 responden (70,5%) dan yang memiliki riwayat kejang demam sebanyak 18 responden (29,5%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2014) sebanyak 12 orang (20,6%) yang memiliki riwayat kejang demam dan sebanyak 17 orang (29,3%) yang tidak memiliki riwayat kejang demam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Affandi dkk (2014) riwayat kejang demam dinilai berhubungan dengan kejadian autisme ( $p=0,019$ ).

Pada dasarnya tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadits yang secara langsung menyebutkan tentang GSA, karena konsep ini tidak dikenal

pada masa kedatangan Nabi Muhammad saw. Namun, Al-Qur'an dan hadits memiliki banyak ayat dan hadits yang menekankan pentingnya menghormati dan memperlakukan orang-orang dengan lebih baik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti GSA. Ayat Al-Qur'an yang menekankan hal ini terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2):195 Allah SWT berfirman :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :


*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Semua ayat dan hadits dalam Al-Qur'an dan hadits mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling membantu, dan saling memperlakukan dengan baik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti GSA (Al Asyqar, 2023).

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan di SLB Negeri 1 Makassar selama tanggal 04 Januari – 24 Januari 2023 untuk mengetahui gambaran faktor- faktor risiko GSA dengan beberapa keterbatasan yang didapatkan selama penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah orang tua dalam menemani ataupun mengantar anaknya secara langsung di sekolah sehingga peneliti harus meminta nomor telepon responden untuk mengisi *google form*.
2. Hasil penelitian ini tergantung pada kejujuran responden dalam memberikan jawaban kepada peneliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Bedasarkan hasil penelitian tentang gambaran faktor-faktor risiko pada anak dengan GSA di SLB Negeri 1 Makassar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi genetik pada anak GSA lebih banyak terdapat pada anak yang memiliki riwayat genetik yaitu 36 responden (59,0%).
2. Distribusi frekuensi untuk usia ayah saat ibu mengandung anak dengan GSA terbanyak didapatkan pada rentang usia 29-30 tahun yaitu 15 responden (24,6%). Sedangkan untuk usia ibu saat mengandung anak dengan GSA terbanyak didapatkan pada rentang usia 32-34 tahun sebanyak 19 responden (31,1%).
3. Distribusi frekuensi riwayat pendidikan pada ibu dari anak dengan GSA terbanyak didapatkan pada jenjang pendidikan SMA sebanyak 37 responden (60,7%).
4. Distribusi frekuensi riwayat rokok pada ibu dari anak dengan GSA banyak didapatkan pada ibu perokok pasif sebanyak 55 responden (90,2%).
5. Distribusi frekuensi ibu yang tidak terpapar pestisida sebanyak 61 responden (100%).
6. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi alkohol sebanyak 61 responden (100%).

7. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat antidepresan sebanyak 61 responden (100%).
8. Distribusi frekuensi ibu yang tidak memiliki riwayat mengonsumsi obat antiepilepsi sebanyak 61 responden (100%).
9. Distribusi frekuensi riwayat infeksi saat kehamilan banyak didapatkan pada ibu yang tidak mengalami riwayat infeksi saat kehamilan sebanyak 53 responden (86,9%).
10. Distribusi frekuensi ibu yang tidak mengalami riwayat pendarahan antepartum sebanyak 61 responden (100%).
11. Distribusi frekuensi preeklamsia pada ibu dari anak dengan GSA banyak didapatkan pada ibu yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 55 responden (90,2%).
12. Distribusi frekuensi riwayat prematur pada anak dengan GSA banyak didapatkan pada usia >37 minggu sebanyak 37 responden (60,7%).
13. Distribusi frekuensi riwayat BBLR pada anak dengan GSA banyak didapatkan >2500 gram sebanyak 34 responden (55,7%).
14. Distribusi frekuensi riwayat asfiksia pada anak dengan GSA banyak didapatkan pada anak yang tidak mengalami asfiksia sebanyak 58 responden (95,1%).
15. Distribusi frekuensi riwayat kejang demam pada anak dengan GSA banyak didapatkan pada anak tanpa riwayat kejang demam sebanyak 43 responden (70,5%).

## **B. Saran**

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan skala penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru yang lebih akurat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan menghindari lahirnya anak dengan GSA dengan cara meningkatkan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai GSA.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, dan Pratiwi, U.H. (2014). Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Autisme pada Anak Di Kota Cirebon." *Tunas Medika Jurnal Kedokteran & Kesehatan* 1.2
- Alfinna, T.(2019). Faktor Risiko Kejadian Autism Spectrum Disorder pada Anak di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Semarang.
- Al Asyqar, Muhammad Sulaiman. Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir. Diakses tanggal 5 (2023).
- American Psychiatric Association. (2013). Autism spectrum disorder. Dalam: *Diagnostic and statistical manual of mental disorder*. Edisi ke-5. Washington DC: APA publishing.
- Andri Moh, E. P. H. B. (2019). Faktor Risiko Autis Untuk Mengurangi Generasi Autis Anak Indonesia. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*.
- Anggriani, H. dkk. (2020) Hubungan antara Usia Ayah dan Ibu Saat Hamil serta Riwayat Keluarga dengan Terjadinya Autisme di Kota Cirebon. FK Universitas Swadaya Gunung Jati.
- Biran, M .I ., Nurhastuti. (2018). *Pendidikan Anak Autisme*. Penerbit: Goresan Pena. Jakarta.
- Boukhris,T.,et al. (2016). Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. *JAMA Pediatr*.

- Bromley, et al.(2014). Treatment for epilepsy in pregnancy: neurodevelopmental outcomes in the child (review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 10(1):1465- 858.
- Burstyn, I., et al . (2021). The Role of Maternal Smoking in Effect of Fetal Growth Restriction on Poor Scholastic Achievement in Elementary School. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 408-420.
- Carpita,B., et al .(2022). Autism Spectrum Disorder and Fetal Alcohol Spectrum Disorder. *Brain Sciences*.
- Christensen, J., et al.(2013). Prenatal valproate exposure and risk of autism spectrum disorders and childhood autism. *Jama*, 309(16), 1696–1703.
- Dachew, B. A., et al.(2018). Pre-eclampsia and the risk of autism-spectrum disorder in offspring: meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 1-6
- DeStefano, F., and Shimabukuro, T.T.(2019) The MMR Vaccine and Autism . *Annu Rev Virol*.
- Dodds, L.,et al. (2011). The role of prenatal, obstetric and neonatal factors in the development of autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 41(7), 891–902.
- Fibriana, I. A., dan Ningrum , P. (2017). Faktor Risiko Kejadian Autisme. *Higea Journal Of Public Health Research and Development*. ISSN 1475-362846.

Francis ,K., et al. (2021) Prevention in Autism Spectrum Disorder: A Lifelong Focused Approach. Brain Sciences.

Grabrucker, A. M., (2018). Environmental Factors in Autism. (A. Reif, Ed.) Frontiers in Psychiatry, 3, 1-13.

Guinchat , V., et al. (2018). Pre-,Pri, And Neonatal Risk Factor For Autism. ACTA Obstetrician Et Gynecologica.

Hamidah, N., Maddepungeng,M., dan Daud, D.(2015). Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Sebagai Faktor Risiko Autism Spectrum Disorder Pada Anak. Makassar.Ilmu Kesehatan Anak . FK Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Hanum, H.(2017).Pengaruh Paparan Asap Rokok Pada Ibu Hamil Terhadap Kejadian BBLR.Tesis Sarjana. Lampung:Universitas Lampung

Hastuti,Y.,D. (2020). Gambaran Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Autisme Anak di SLB Negeri Autis Sumatera Utara. Jurnal Vol. 15 No.3 September – Desember 2020.

Hermawati, D., dkk. (2019). Analisis Gen Gstm1 Null, Gstt1 Null, Rasio Gsh/Gssg Dan Kadar Logam Berat Terhadap Derajat Autism Spektrum Disorder. Semarang. JNH (Journal of Nutrition and Health) Vol.7, No.2,hal 2.

Irmayanti, A. (2013). Penyalahgunaan Alkohol Di Kalangan Mahasiswa. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

- Ismet. (2017). 'Kejang Demam', *Jurnal Kesehatan Melayu*, 1(1), pp. 41–44.
- Jokiranta.,et al.(2013). Parental psychiatric disorders and autism spectrum disorders. *Psychiatry Research*, 207(3), 203–211.
- Juanda, G.R. (2020). Pengaruh Paparan Pestisida Pada Masa Kehamilan Terhadap Kejadian Autisme. *Journal of Health Science and Physiotherapy* 2.1 : 81-87.
- Judarwanto, W. (2017) Pencegahan Autis Pada Anak. Resume.
- Kosasih, E. (2012). Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Cet 1. Bandung : Yrama Widya.
- Lange,S., et al.(2017).Global Prevalence of Fetal Alcohol Spectrum Disorder Among Children and Youth: A Systematic Review and Meta-analysis. *JAMA Pediatr*.
- Lubis, R. (2017). Komplikasi Kehamilan Sebagai Faktor Risiko Gangguan Spektrum Autistik Pada Anak. *Jurnal Kesehatan*, 8-12.
- Maddepungen, M.(2019). Autism Spectrum Disorder.
- Maharani, S. (2018). Mengenali dan Memahami Berbagai Gangguan Kesehatan Anak. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media Group. 136-137.
- Manalu, A.P.(2013). Faktor-Faktor Penyebab Penyakit Autisme Anak Di Bina Autis Mandiri Palembang.FK.Muhammadiyah Palembang.

Maniuspika, Y.S., Christie and phil. (2011). First Steps In Intervention With Your Child. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Maenner, M. J., et al. (2021). Prevalance and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Age 8 years—Autism and Develppmental Disabilities Monitoring Network , 11 sites, United States 2018.MMWR Surveil summ Vol.70 No.11.

Menteri Pertanian Republik Indonesia. (2014). Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 107 tahun 2014 tentang pengawasan pestisida. Jakarta : Sekretariat Negara.

Mnif ,W., et al. (2020). Effect of endocrine disruptor pesticides: a review. Int. J. Environ. Res. Public Health Vol 8, 2265-2303.

Muhtadi., dkk.(2018). Tafsir Al-Wasith / Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili (Al-Faatihah – At-Taubah ). Jakarta : Gema Insani.

National Institute of Mental Health. (2015). Autism Spectrum Disorder. United States of America: National Institutes of Health.

Nisa.(2020). Analisis Faktor Risiko Terjadinya Disabilitas Pada Anak Di Sekolah Holistic Inklusi Pelangi Kota Pekalongan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rahmadiani,N., Rahim, R., & Fitriani,R.(2022). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Anak Autis Di SLB Negeri Pembina Makassar Dan SLB Negeri 1 Makassar 2020.Humantech : jurnal ilmiah multidisiplin Indonesia, 2(special issues 1) 29-37.

Nurbayatin,A.,dkk.(2015). Faktor Risiko yang Berpengaruh pada Periode Kehamilan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan Autisme.BIMABI,3 (1): 1-6. Salman, A.,

Nurlina. (2019). Peran Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Era Digital. Bone . Jurnal Studi Gender dan anak. Vol. 12. No 1.

Nurochim, E., Indarto, D., & Prayitno, A. (2017). Association between Maternal Age at Pregnancy, Socioeconomic Status, Physical Environment, Prenatal, Perinatal, Postnatal History, and the Risk of Mental Retardation. Journal of Maternal and Child Health, 119-130.

Parner, E.T., et al.(2012). Parental age and autism spectrum disorders. Annals of Epidemiology, 22(3), 143–150.

Prawirohardjo, S. (2014). Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Nasional. Ed 1.281-294.

Pusponegoro, H.D. et al. (2016) Konsensus Penatalaksanaan Kejang Demam.

- Risda, S.S., dan Zulkarnaini.(2016).Pengaruh Lingkungan Fisik Lingkungan Sekolah Dan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Perilaku Anak Autis Di Kota Pekanbaru. Jurnal Vol. 7 No.1.
- Ruminem.(2020).Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Tentang Austisme Dengan Partisipasi Ibu Dalam Penanganan Anak Autis Di Rumah Di Kota Balikpapan.Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan 2.1 :1-11.
- Sadler, T. W. (2021). Langman's Medical Embryology (14th ed). Jakarta: EGC.
- Saha. (2009).Advanted Paternal Age and Maternal Age.American Academy of Pediatric.
- Sari, A. I., Yanis, A., dan Koerniati, I. (2022). Gambaran faktor-faktor risiko anak dengan gangguan spektrum autisme (GSA) di Sekolah Anak Berkebutuhan Khusus di Padang. Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.7 No.11.
- Schaefer,G.B.,et al.(2013).Clinical Genetics Evaluation In Identifying The Etiology of Autism Spectrum Disorders. ACMG Practice Guidelines.
- Sembiring., et al . (2019). "Hubungan Usia, Paritas Dan Usia Kehamilan Dengan Bayi Berat Lahir Rendah Di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan." 2(1):38. Doi: 10.33085/Jbk.V2i1.4110.
- Soetjningsih., dkk. (2015). Pedoman Pelatihan Deteksi Dini dan Diagnosis Gangguan Spektrum Autisme. FK. UNUD Denpasar.

Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2020/2021. ( 2021). Pusat data dan Teknologi Informasi- Jakarta : Sekjen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

United Nation Education, Scientific, and Cultural Organization. (2011). Understanding and responding to children's needs in inclusive classroom. Paris. UNESCO Publisher.

Uwaezeko, S. N. (2015). Autism Spectrum Disorder In Children :The Disparities Between The Developed And Developing Countries. Autism Open Access Journal Vol. 5.

Vaux, K.K. (2016).Fetal alcohol syndrome. Medscape.

Widyawati, I., Kaligis, F. (2017). Buku ajar psikiatri : gangguan spectrum autism. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 494 p.

World Health Organization .(2018). Autism Spectrum Disorders.

World Health Organization .(2011).The Global Status Report On Alcohol and Health.Geneva : World Health Organization Press.

Zhang, X., Lv, C.C., Tian, J., et al.(2010). Prenatal and Perinatal Risk Factors for Autism in China. Journal of Autism Developmental Disorder, 40, 1311–1321.

Zerbo, O., et al . (2015). Maternal Infection during Pregnancy and Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism Developmental Disorder, 4015–4025.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Formulir *Informed Consent*

#### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya telah SETUJU untuk menjadi subjek penelitian dengan sukarela dan tanpa paksaan pada

Judul penelitian : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar

Nama peneliti : Firjatullah Feniah Sabir

Instansi peneliti : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini dengan catatan bila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Mengetahui,  
peneliti

(Firjatullah Feniah Sabir)

Makassar, ..... 2023

Yang menyatakan,  
Peserta penelitian

(.....)

## Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

Bersama ini saya meminta kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar pertanyaan (kuesioner). Informasi yang anda berikan akan dipergunakan sebagai bahan penelitian dengan judul **“Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022”** serta akan digunakan sebagai bahan tinjauan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor risiko yang mempengaruhi GSA. Semua data dan informasi yang diperoleh dari Bapak/ibu merupakan data yang bersifat **RAHASIA** dan jawaban Saudara **tidak akan mempengaruhi prestasi dan kinerja** di tempat kerja saudara. Peneliti berharap Saudara dapat memberikan informasi dengan jujur dan apa adanya. Atas perhatian dan kerja sama serta kepedulian Saudara dalam kesediaan mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih

#### a. Identitas Responden

Nama :

Usia :

Nama Anak :

Usia Anak :

Jenis kelamin Anak : L/P

Total skor : 1-10 = Tidak berisiko mengalami GSA

11-20 = Berisiko mengalami GSA

**b. Jawablah Pertanyaan Berikut ini:**

Isilah pertanyaan dan berikan tanda (X) pada setiap pertanyaan dibawah ini sesuai dengan yang anda alami !

1. Berapa usia suami saat ibu mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?
  - a. Ya (> 30 tahun)
  - b. Tidak (< 30 tahun)
2. Berapakah usia ibu saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?
  - a. Ya (> 30 tahun)
  - b. Tidak (< 30 tahun)
3. Apa pendidikan terakhir anda ?
  - a. Ya (SD-SMA)
  - b. Tidak (Sarjana)
4. Apakah anda memiliki riwayat keluarga yang menderita gangguan spektrum autisme ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Apakah ibu terpapar rokok saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

6. Apakah ibu merokok saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?
- Ya
  - Tidak
7. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan A dengan kadar 1%-5% (seperti tuak dan bir) saat hamil ?
- Ya
  - Tidak
8. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan B dengan kadar 5%-20% (seperti anggur atau wine) saat hamil ?
- Ya
  - Tidak
9. Apakah ibu mengonsumsi alkohol golongan C dengan kadar 20%-55% (seperti whisky, liquor, vodka dan Johny Walker) saat hamil ?
- Ya
  - Tidak
10. Apakah ibu terpapar pestisida saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?
- Ya
  - Tidak
11. Apakah Ibu mengonsumsi obat antidepresan (seperti : fluoxetine , citalopram dan sertraline) saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya
- b. Tidak

12. Apakah ibu mengonsumsi obat antiepilepsi (seperti : valproat) saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya
- b. Tidak

13. Apakah ibu mengalami infeksi saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme , seperti demam, menggigil, terdapat bintil menonjol, dan cepat lelah ?

- a. Ya
- b. Tidak

14. Apakah ibu mengalami pendarahan saat mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya
- b. Tidak

15. Apakah ibu memiliki riwayat preeklamsia sebelum mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya
- b. Tidak

16. Berapa lama ibu mengandung anak yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya (<37 minggu)
- b. Tidak (> 37 minggu)

17. Berapa bayi berat lahir anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme ?

- a. Ya (<2500 gram)
- b. Tidak (>2500 gram)

18. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki riwayat asfiksia ?

- a. Ya
- b. Tidak

19. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki riwayat kejang demam sederhana (onset kurang dari 15 menit) ?

- a. Ya
- b. Tidak

20. Apakah anak ibu yang mengalami gangguan spektrum autisme memiliki riwayat kejang demam kompleks (onset lebih dari 15 menit) ?

- a. Ya
- b. Tidak



### Lampiran 3. Persuratan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-151/Un.06/FKIK/PP.09/1/2023 Gowa, 03 Januari 2023  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Pengajuan Kode Etik**

**Yth. Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

di-  
Tempat

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Firjatullah Feniah Sabir  
NIM : 70600118003  
Program Studi : Pendidikan Dokter  
Judul Penelitian : Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022  
Dosen Pembimbing : 1. dr. Raully Ramadhani, M.Kes  
2. Dr.dr.H. Najamuddin, M.Kes

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalam*



**Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**  
**Wakil Dekan Bidang Akademik**

**Gemy Nastity Handayany**



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

No: E.052/KEPK/FKIK/II/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Firjatullah Fenh Sabir  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Gambaran Faktor-Faktor Resiko pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) di SLB Negeri 1 Makassar Tahun 2022"**

*"Overview of Risk Factors in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) at SLB Negeri 1 Makassar in 2022"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024.

*This declaration of ethics applies during the period February 6th, 2023 until February 6th, 2024.*

February 6th, 2023  
Professor and Chairperson.

  
DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

ALAUDDIN  
MAKASSAR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879  
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 1604 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan**  
di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Firjatullah Feniab Sabir  
NIM : 70600118003  
Semester/T.A. : IX (Sembilan)/T.A. 2023-2024  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jurusan/Prodi : Kedokteran  
Alamat : Toddopuli Raya Timur 171D  
No. HP. : 085217490453

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Gambaran Faktor-Faktor Risiko Pada Anak Dengan Gangguan Spektrum Autisme (GSA) Di SLB Negeri 1 Makassar 2022.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Di Lembaga Pendidikan SLB Negeri 1 Makassar** dari tanggal **januari-februari 2023.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

16 Januari 2023  
  
**Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.**  
NIP. 196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
- pertinggal

Scanned with CamScanner

M A K A S S A R



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **12796/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Kepala SLB Negeri 1 Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1604/UN.06/LP2M/PP.00.9.1/2023 tanggal 01 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FIRJATULLAH FENIAH SABIR**  
Nomor Pokok : **70600118003**  
Program Studi : **Pendidikan Dokter**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTISME (GSA) DI SLB NEGERI 1 MAKASSAR 2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 Januari s/d 24 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 04 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth  
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*

Nomor: 12796/S.01/PTSP/2023

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampulard hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**

**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**

NOMOR REGISTRASI 20230109650301



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN

UPT. SP. SLB. NEGERI 1 MAKASSAR

Jalan : Daeng Tata Raya Kel Bontoduri Kec Tamalate Kota Makassar  
Telp/Fax 0411-865383, Email pembina@slb1n1@gmail.com Kode Pos 90224



SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : 800/UPT.SP.SLUN 1/MKS/2023/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Hamjan, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19730927 200701 1 014  
Jabatan : Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Makassar  
Alamat Sekolah : Jl. Daeng Tata Raya Bontoduri Tamalate


Menerangkan bahwa :

Nama : FIRJATULLAH FENIAJI SABIR  
Nomor Pokok : 70600118003  
Program Studi : Pendidikan Dokter  
Pekerjaan/lembaga : Mahasiswa (SI)  
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa

Benar telah melaksanakan penelitian pada UPT SLB Negeri 1 Makassar, pada tanggal, 04 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023, dengan judul :

"GAMDARAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO PADA ANAK DENGAN GANGGUAN SPEKTRUM AUTISME (GSA) DI SLB NEGERI 1 MAKASSAR 2022"

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagai mestinya



MAKASSAR

## Lampiran 4. Pengolahan Data Penelitian

```

FREQUENCIES VARIABLES=UA JK AGSA Gen UAy UIb PendiIb Rokok Pepti Alkohol KOAD
KOE ISK PA
  Preeklamsia Premature BBLR Asfiksia KD
  /ORDER=ANALYSIS.

```

### Frequencies

Notes		
Output Created		05-FEB-2023 21:00:11
Comments		
Input	Data	D:\Olah Data Feni\Olah Data Feni.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=UA JK AGSA Gen UAy UIb PendiIb Rokok Pepti Alkohol KOAD KOAE ISK PA Preeklamsia Premature BBLR Asfiksia KD...
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.10

[DataSet1] D:\Olah Data Feni\Olah Data Feni.sav

**Statistics**

		Usia Anak	Jenis Kelamin	Genetik	Usia Ayah Saat Ibu Mengandung	Usia Ibu Saat Mengandung
N	Valid	61	61	61	61	61
	Missing	0	0	0	0	0

**Statistics**

		Riwayat Pendidikan	Riwayat Merokok	Riwayat Terpapar Pestisida	Riwayat Konsumsi Alkohol	Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan
N	Valid	61	61	61	61	61
	Missing	0	0	0	0	0

**Statistics**

		Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi	Riwayat Infeksi Saat Kehamilan	Riwayat Perdarahan Anterpartum	Riwayat Preeklamsia	Riwayat Prematur
N	Valid	61	61	61	61	61
	Missing	0	0	0	0	0

**Statistics**

		Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah	Riwayat Asfiksia	Riwayat Kejang Demam
N	Valid	61	61	61
	Missing	0	0	0

**Frequency Table**



### Usia Anak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7 Tahun	2	3.3	3.3	3.3
	8 Tahun	8	13.1	13.1	16.4
	9 Tahun	11	18.0	18.0	34.4
	10 Tahun	9	14.8	14.8	49.2
	11 Tahun	11	18.0	18.0	67.2
	12 Tahun	3	4.9	4.9	72.1
	13 Tahun	4	6.6	6.6	78.7
	14 Tahun	3	4.9	4.9	83.6
	15 Tahun	3	4.9	4.9	88.5
	16 Tahun	6	9.8	9.8	98.4
	17 Tahun	1	1.6	1.6	100.0
Total		61	100.0	100.0	

### Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	51	83.6	83.6	83.6
	Perempuan	10	16.4	16.4	100.0
Total		61	100.0	100.0	

### Genetik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	36	59.0	59.0	59.0
	Tidak	25	41.0	41.0	100.0
Total		61	100.0	100.0	

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

### Usia Ayah Saat Ibu Mengandung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25-26 Tahun	1	1.6	1.6	1.6
	27-28 Tahun	4	6.6	6.6	8.2
	29-30 Tahun	15	24.6	24.6	32.8
	31-32 Tahun	9	14.8	14.8	47.5
	33-34 Tahun	8	13.1	13.1	60.7
	35-36 Tahun	14	23.0	23.0	83.6
	37-38 Tahun	2	3.3	3.3	86.9
	39-40 Tahun	6	9.8	9.8	96.7
	41-42 Tahun	2	3.3	3.3	100.0
Total	61	100.0	100.0		

### Usia Ibu Saat Mengandung

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-22 Tahun	2	3.3	3.3	3.3
	23-25 Tahun	4	6.6	6.6	9.8
	26-28 Tahun	11	18.0	18.0	27.9
	29-31 Tahun	15	24.6	24.6	52.5
	32-34 Tahun	19	31.1	31.1	83.6
	35-37 Tahun	5	8.2	8.2	91.8
	38-40 Tahun	5	8.2	8.2	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

### Riwayat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	3.3	3.3	3.3
	SMP	9	14.8	14.8	18.0
	SMA	37	60.7	60.7	78.7
	Sarjana	13	21.3	21.3	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

#### Riwayat Merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	6	9.8	9.8	9.8
	Pasif	55	90.2	90.2	100.0
Total		61	100.0	100.0	

#### Riwayat Terpapar Pestisida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	100.0	100.0	100.0

#### Riwayat Konsumsi Alkohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	100.0	100.0	100.0

#### Riwayat Konsumsi Obat Antidepresan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	100.0	100.0	100.0

#### Riwayat Konsumsi Obat Antiepilepsi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	100.0	100.0	100.0

#### Riwayat Infeksi Saat Kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	8	13.1	13.1	13.1
	Tidak	53	86.9	86.9	100.0
Total		61	100.0	100.0	

### Riwayat Perdarahan Anterpartum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	61	100.0	100.0	100.0

### Riwayat Preeklamsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	6	9.8	9.8	9.8
	Tidak	55	90.2	90.2	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

### Riwayat Prematur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 37 Minggu	24	39.3	39.3	39.3
	> 37 Minggu	37	60.7	60.7	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

### Riwayat Bayi Berat Lahir Rendah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2500 g	27	44.3	44.3	44.3
	> 2500 g	34	55.7	55.7	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

### Riwayat Asfiksia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	3	4.9	4.9	4.9
	Tidak	58	95.1	95.1	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

### Riwayat Kejang Demam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	18	29.5	29.5	29.5
	Tidak	43	70.5	70.5	100.0
	Total	61	100.0	100.0	

## Lampiran 5. Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Firjatullah Feniah Sabir  
NIM : 70600118003  
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar , 22 Oktober 1999  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Fakultas : Pendidikan Dokter/ Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Muh.Sabir Amran  
Ibu : Budiasni Nuzula  
Alamat : Jl. Toddopuli Raya Timur No 171 D  
Telepon : 08527490453  
Email : [feniahsabiir@gmail.com](mailto:feniahsabiir@gmail.com)  
Riwayat pendidikan :  
1. SDIT Al-Falah (2006-2012)  
2. SMP Integral Hidayatullah (2012- 2015)  
3. SMA Negeri 1 Timika (2015-2018)  
4. Prodi Pendidikan Dokter FKIK UIN Alauddin Makassar (2018-2023)

