

**FORMULASI, UJI AKTIVITAS, DAN UJI STABILITAS FISIK KRIM
TABIR SURYA EKSTRAK ETIL ASETAT RIMPANG LEMPUYANG
GAJAH (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FITRAWATI AMALIA ASHAR

NIM: 70100118049

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitrawati Amalia Ashar
NIM : 70100118049
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 26 Agustus 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kompleks Agraria Blok Q/13
Judul : Formulasi, Uji Aktivitas dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Romangpolong, 23 Februari 2023

Penyusun



Fitrawati Amalia Ashar

NIM : 70100118049

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Formulasi, Uji Aktivitas dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)" yang disusun oleh Fitrawati Amalia Ashar, NIM: 70100118049, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis 23 Februari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 23 Februari 2023 M
2 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.
Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si
Pembimbing I : Haeria, S.Si., M. Si
Pembimbing II : Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si
Penguji I : apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M Si.
Penguji II : Dr. Hj. Rosmiaty Azis, M.Pd.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Formulasi, Uji Aktivitas, dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm), dapat diselesaikan dengan baik. terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Dahniar dan Ayahanda (alm) Ashar Salahuddin yang tak henti-hentinya memberi doa serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu Apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si selaku Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Ibu Haeria, S. Si., M. Si selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing dan mengarahkan peneliti dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
13. Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si Selaku Penguji Kompetensi yang telah memberi saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

14. Ibu Dr. Hj. Rosmiaty Azis, M. Pd. I selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M Si selaku Pelaksana Ujian Akhir yang telah sangat berkontribusi dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
16. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
17. Rekan, saudara, teman seperjuangan “Suspensi” yang telah banyak membantu dan telah berjuang bersama dari awal hingga akhir, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang sediaan Farmasi.

Romangpolong, 23 Februari 2023

Penyusun



Fitrawati Amalia Ashar

NIM : 70100118049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Uraian Tumbuhan	8
1. Klasifikasi.....	8
2. Nama Daerah.....	8
3. Deskripsi	9
4. Uraian senyawa kimia	9
B. Antioksidan	10
C. Tabir Surya.....	12
D. Krim	16
E. Ekstraksi.....	22
F. Spektrofotometri UV-Vis.....	26
G. Tinjauan Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	32

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Lokasi Penelitian	32
3. Waktu Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sampel.....	32
D. Instrumen Penelitian	32
1. Alat yang digunakan.....	32
2. Bahan yang digunakan	33
E. Prosedur Kerja	33
1. Penyiapan Sampel	33
2. Ekstraksi	33
3. Pembuatan Krim.....	34
4. Uji Stabilitas Krim	35
5. Uji Potensi Tabir Surya	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Hasil Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah	39
2. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF)	39
3. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi	40
4. Hasil Evaluasi Krim	43
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
LAMPIRAN	58
RIWAYAT HIDUP PENELITI	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF.....	15
Tabel 2. Nilai EE x I pada panjang gelombang 290-320 nm.....	15
Tabel 3. Penggolongan potensi tabir surya	15
Tabel 4. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya	34
Tabel 5. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah	39
Tabel 6. Nilai SPF Krim 3%	39
Tabel 7. Nilai SPF Krim 6%	40
Tabel 8. Nilai SPF Krim 9%	40
Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 3%.....	40
Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3%	41
Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 6%.....	41
Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%	42
Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 9%.....	42
Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 9%.....	42
Tabel 15. Hasil Pengujian Organoleptik Krim.....	43
Tabel 16. Hasil Pengujian Homogenitas Krim	43
Tabel 17. Hasil Pengujian pH Krim	44
Tabel 18. Hasil Pengujian Daya Sebar Krim	44
Tabel 19. Hasil Pengujian Viskositas Krim	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (A) Daun , (B) Rimpang Lempuyang Gajah	8
Gambar 2. Tanaman Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L). Roscoe ex Sm.....	71
Gambar 3. Kurva Pengujian SPF Krim 3%	72
Gambar 4. Nilai Absorbansi Krim 3%	72
Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 6%	73
Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 6%	73
Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 9%	74
Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 9%	74
Gambar 9. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 3%	75
Gambar 10. Persen Transmisi Eritema Krim 3%	75
Gambar 11. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 6%	76
Gambar 12. Persen Transmisi Eritema Krim 6%	76
Gambar 13. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 9%	77
Gambar 14. Persen Transmisi Eritema Krim 9%	77
Gambar 15. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3%	78
Gambar 16. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3%	78
Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%	79
Gambar 18. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%	79
Gambar 19. Kurva Persen Pigmentasi Krim 9%	80
Gambar 20. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 9%	80
Gambar 21. Uji Organoleptik pada kondisi sebelum penyimpanan	81
Gambar 22. Uji Organoleptik pada kondisi setelah penyimpanan.....	81
Gambar 23. Uji homogenitas pada kondisi sebelum penyimpanan	82
Gambar 24. Uji homogenitas pada kondisi setelah penyimpanan	82
Gambar 25. Uji pH pada kondisi sebelum penyimpanan.....	83
Gambar 26. Uji pH pada kondisi setelah penyimpanan.....	83
Gambar 27. Uji daya sebar pada kondisi sebelum penyimpanan.....	84
Gambar 28. Uji daya sebar pada kondisi setelah penyimpanan.....	84

Gambar 29. Uji viskositas pada kondisi sebelum penyimpanan.....	85
Gambar 30. Uji viskositas pada kondisi setelah penyimpanan.....	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	58
Lampiran 2. Ekstraksi Sampel	59
Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Krim.....	60
Lampiran 4. Evaluasi Sediaan Krim	61
Lampiran 5. Uji Potensi Tabir Surya	64
Lampiran 6. Perhitungan Kadar 4000 ppm.....	65
Lampiran 7. Perhitungan Nilai HLB Emulsi.....	66
Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim.....	67
Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi	68
Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi	69
Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi	70
Lampiran 12. Tanaman Lempuyang Gajah.....	71
Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 3%	72
Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 6%	73
Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 9%	74
Lampiran 16. Hasil Uji Eritema Krim 3%	75
Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 6%	76
Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 9%	77
Lampiran 19. Hasil Uji Pigmentasi Krim 3%	78
Lampiran 20. Hasil Uji Pigmentasi Krim 6%	79
Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 9%	80
Lampiran 22. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim	81
Lampiran 23. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim	82
Lampiran 24. Hasil Evaluasi Uji pH Krim.....	83
Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim.....	83
Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim.....	85

ABSTRAK

Nama : Fitrawati Amalia Ashar
NIM : 70100118049
Judul Skripsi : Formulasi, Uji Aktivitas, dan Uji Stabilitas Fisik Krim Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbet* (L). Roscoe Ex Sm)

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi dan penentuan potensi tabir surya dari krim ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber Zerumbet* (L). Roscoe Ex Sm). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah yang efektif dalam formulasi sediaan krim tabir surya, mengetahui karakteristik fisik sediaan krim tabir surya, serta potensi rimpang lempuyang gajah sebagai tabir surya terkait nilai SPF, persen transmisi eritema, dan persen transmisi pigmentasi. Krim dibuat dalam 3 formula dengan variasi konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3% (F1), 6% (F2), 9% (F3). Uji stabilitas fisik menggunakan metode cycling test dengan cara menyimpan sediaan pada suhu $4^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam lalu menyimpannya pada suhu $40^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$, selama 24 jam, waktu penyimpanan pada dua suhu yang berbeda tersebut dianggap sebagai satu siklus dan dilakukan selama 12 hari. Parameter stabilitas adalah pengamatan organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, viskositas dan hasil uji cycling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga formulasi krim stabil selama penyimpanan. Kemudian diukur efektivitas tabir surya dari sediaan berdasarkan nilai SPF, persen transmisi eritema, serta persen transmisi pigmentasi. Hasil menunjukkan bahwa ketiga krim memenuhi persyaratan evaluasi fisik sediaan krim yang baik, serta memiliki aktivitas tabir surya yakni F1 dengan nilai SPF 11,332 memberi efek proteksi maksimal, F2 dengan nilai SPF 13,128 memiliki efek proteksi maksimal, serta F3 dengan nilai SPF 20,689 memberi efek proteksi ultra. Ketiga krim memiliki nilai persen eritema <1 maka digolongkan dalam kategori sunblock. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F1, F2, F3 memiliki aktivitas tabir surya.

Kata Kunci : *Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm, Tabir Surya, Transmisi Eritema, Transmisi Pigmentasi, Spektrofotometer UV-Vis

ABSTRACT

Name : Fitrawati Amalia Ashar

NIM : 70100118049

Title : Formulation, Activity Test, and Physical Stability Test Sunscreen Cream Ethyl Acetate Extract Lempuyang Gajah Rhizome (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)

Research has been carried out on the formulation and determination of sunscreen potency from ethyl acetate extract cream of emptying elephant rhizome (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm). This study aims to determine the effective concentration of lempuyang elephant rhizome extract in the formulation of sunscreen cream preparations, to determine the physical characteristics of sunscreen cream preparations, as well as the potential of lempuyang elephant rhizome as a sunscreen in terms of SPF value, percentage of erythema transmission, and percentage of pigmentation transmission. The cream was made in 3 formulas with varying concentrations of elephant lempuyang rhizome extract 3% (F1), 6% (F2), and 9% (F3). Physical stability test using the cycling test method by storing the preparation at $4^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ for 24 hours and then storing it at $40^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$, for 24 hours, storage time at two different temperatures is considered as one cycle and carried out for 12 days. Stability parameters are organoleptic observations, homogeneity, spreadability, pH, viscosity, and cycling test results. The results showed that the three cream formulations were stable during storage. Then measured the effectiveness of the sunscreen from the preparation was based on the SPF value, the percentage of erythema transmission, and the percentage of pigmentation transmission. The results showed that the three creams met the requirements for a good physical evaluation of cream preparations, and had sunscreen activity, namely F1 with an SPF value of 11,332 giving a moderate protective effect, F2 with an SPF value of 13,128 having a moderate protective effect, and F3 with an SPF value of 20,689. All three creams gives a moderate protective effect. The three creams have a percentage value of erythema <1 , so they are classified in the sunblock category. So it can be concluded that F1, F2, and F3 have sunscreen activity.

Keywords : *Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm, Sunscreen, Erythema Transmission, Pigmentation Transmission, UV-Vis Spectrophotometer

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kulit merupakan bagian tubuh manusia yang membantu melindungi tubuh dari kotoran, debu dan sinar matahari. Seringkali kita tidak memperhatikan kesehatan kulit ketika tidak terasa kasar atau teriritasi. Kulit membutuhkan kelembapan dan vitamin D yang cukup, yang diproduksi tubuh di bawah pengaruh sinar matahari. Namun perlu diperhatikan bahwa sinar matahari yang mengandung sinar UV-A dan UV-B juga dapat menyebabkan masalah kulit jika kulit yang terpapar dibiarkan tidak terlindungi. Sinar matahari dapat menimbulkan gelapnya kulit, membakar kulit, dan dapat meningkatkan risiko kanker kulit (Amini *et al.*, 2020).

Paparan sinar matahari yang berlebihan dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah penggunaan tabir surya. Tabir surya adalah produk kosmetik yang dapat mencegah sinar UV menembus kulit (Salwa *et al.*, 2020). Mekanisme kerja yang dimiliki tabir surya yaitu dengan memantulkan dan membiaskan sinar UV yang dipancarkan matahari (Abdiana & Anggraini, 2017). Tabir surya dapat menyerap minimal 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290-320 nm untuk UV-B tetapi memancarkan cahaya lebih dari 320 nm untuk UV-A (Alhabsyi & Suryanto, 2014).

Selama dekade terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan fitokimia antioksidan dalam tabir surya. Secara umum, aktivitas antioksidan yang dimiliki tanaman karena mengandung senyawa metabolit sekunder / bahan aktif, antara

lain flavonoid, fenol, tanin, antosianin. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Senyawa antioksidan bekerja dengan mendonorkan elektron ke radikal bebas yang tidak stabil, sehingga radikal bebas tersebut menjadi netral dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). Antioksidan dari sumber alami menawarkan kemungkinan baru dalam pengobatan, perawatan dan pencegahan penyakit akibat sinar UV (Ashari, 2020).

Zingiber zerumbet L. adalah spesies tumbuhan dari famili Zingiberaceae yang tumbuh di daerah tropis. Rimpang tanaman ini merupakan bahan utama dalam obat tradisional Indonesia yang terkenal seperti jamu dan memiliki banyak khasiat yang dapat membantu meredakan nyeri, menjernihkan darah, menambah nafsu makan dan mengobati epilepsi. Di beberapa bagian Prefektur Okinawa, Jepang, rimpangnya digunakan sebagai bahan makanan yang berkhasiat bagi ginjal (Nakatani *et al.*, 2014). Pemanfaatan lempuyang gajah sebagai bahan obat terkait dengan kandungan metabolit sekunder yang dimiliki. Rimpang lempuyang gajah dilaporkan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan essential oil (Silalahi, 2018).

Tabir surya alami seperti senyawa fenolik yang ditemukan pada tanaman, dapat membantu melindungi jaringan tanaman dari kerusakan akibat radiasi matahari (Salwa *et al.*, 2020). Flavonoid memiliki potensi sebagai tabir surya karena mengandung gugus kromofor yang biasanya memberi warna pada tanaman. Gugus kromofor adalah sistem aromatik terkonjugasi yang menyerap cahaya kuat pada panjang gelombang UV (Putri *et al.*, 2019). Senyawa fenolik khususnya flavonoid dan tanin memiliki efek protektif dari sinar matahari karena

gugus kromogenik (ikatan tunggal terkonjugasi) mampu menyerap sinar UV-A dan UV-B (Ismail *et al.*, 2014).

Berdasarkan penelitian Rima Amaliah (skripsi belum diterbitkan), nilai IC50 ekstrak rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe e x Sm) terhadap DPPH berada pada konsentrasi 20ppm, 40ppm, 60ppm, 80ppm dan 100ppm pada ekstrak etil asetat sebesar 69.476 ppm. Aktivitas antioksidan yang diamati terutama disebabkan oleh kandungan total fenolik dan flavonoid rimpang lempuyang gajah (Bhavesih *et al.*, 2013). Potensi antioksidan kuat yang dimiliki ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah memungkinkan pembuatannya dalam bentuk tabir surya yang mampu melawan radikal bebas akibat paparan sinar matahari.

Sediaan kosmetik berbahan dasar ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti tabir surya banyak diminati masyarakat karena adanya kekhawatiran akan efek samping kosmetik berbahan dasar bahan aktif tabir surya sintetik (Daud & Musdalipah, 2018). Saat ini banyak produk tabir surya dalam berbagai bentuk sediaan yang beredar di masyarakat. Salah satunya adalah bentuk sediaan krim. Krim merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetik yang banyak diminati oleh masyarakat. Sifat fisik dan stabilitas formulasi topikal menentukan keefektifan formulasi semipadat bila diterapkan pada kulit. Selain itu sediaan krim ini mudah dibilas, tidak lengket, melembabkan kulit dan merupakan sediaan yang mudah dioleskan (Wiranto, 2021).

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik yang berasal dari bahan yang aman dan alami menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan produk tabir surya yang berasal dari tumbuhan.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian untuk mengembangkan formulasi tabir surya yang mengandung ekstrak aktif etil asetat rimpang lempuyang gajah yang efektif dan stabil secara fisik.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa konsentrasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm) yang efektif sebagai tabir surya?
2. Bagaimana stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. Formulasi

Formulasi adalah merumuskan atau menyusun sesuatu untuk menjadi bentuk yang tepat. Hal ini berarti bahwa formulasi suatu sediaan berasal dari bahan-bahan tertentu yang dibuat menjadi suatu sediaan.

b. Krim

Krim adalah sediaan setengah padat untuk pemakaian bagian luar yang mengandung ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

c. Tabir surya

Tabir surya merupakan bahan-bahan kosmetik yang secara fisik atau kimia dapat menghambat penetrasi sinar UV matahari masuk ke dalam kulit.

d. Ekstrak rimpang lempuyang gajah

Ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) adalah ekstrak kental yang diperoleh dari proses ekstraksi maserasi rimpang lempuyang gajah menggunakan pelarut etil.

e. Stabilitas fisik

Stabilitas fisik merupakan stabilitas krim yang dinilai berdasarkan parameter organoleptik, homogenitas, pH, viskositas, serta daya sebar.

f. Etil asetat

Etil asetat dengan rumus molekul ($\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$) adalah salah satu bahan kimia yang digunakan sebagai bahan pelarut terutama dalam industri farmasi dan kosmetik.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah formulasi dan uji potensi sediaan krim tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

D. Kajian Pustaka

1. Tahun 2019 telah dilakukan penelitian yang berjudul “Standardisasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbet* Smith)” oleh Dedi Hanwar, Oki Elisafitri, Andi Suhendi dan didapatkan hasil bahwa ekstrak mengandung

senyawa terpenoid, flavonoid, dan alkaloid dan kadar zerumbon pada tanaman lempuyang gajah sebesar $2,53 \pm 0,24\%$ b/b.

2. Dalam jurnal “ In Vitro Antioxidant and Antiglycation Activity of *Zingiber Zerumbet* (Wild Zinger) Rhizome Extract ” oleh Vaghasiya D. Bhavesh dkk. pada tahun 2013 menyebutkan bahwa ekstrak etil asetat Zingiber zerumbet rimpang (ZZE) menunjukkan adanya fenol, flavonoid dan terpenoid. ZZE memiliki kandungan fenolik total $331,93 \pm 1,23$ mg/ml setara asam galat dan kandungan flavonoid total setara dengan $198 \pm 2,65$ mg/ml kuersetin. ZZE juga menunjukkan aktivitas antioksidan total yang signifikan ($86,04 \pm 0,98$ mg/ml setara asam askorbat).
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emma Susanti dan Susi Lestari pada tahun 2019 dengan judul “Uji Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Etanol Tumbuhan Sembung Rambat (*Mikania Micrantha Kunth*) Secara In Vitro” menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Uji aktivitas tabir surya dilakukan dengan menghitung nilai persen transmisi eritema (% Te) dan nilai persen transmisi pigmentasi (% Tp), serta nilai SPF. Hasil perhitungan nilai persen transmisi eritema (%Te) serta kategori tabir surya pada konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm berturut-turut adalah 11,3024 % (suntan standar); 3,5238 % (proteksi ekstra); 1,3865 % (proteksi ekstra) dan 0,3838 % (sunblock). Hasil perhitungan nilai persen transmisi pigmentasi (% Tp) serta kategori tabir surya pada konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm berturut-turut adalah 11,0254; 3,7011; 1,7447 dan 0,5462 % semuanya dengan kategori sunblock. Nilai SPF pada konsentrasi 250 ppm adalah 42,8810 dengan kategori

perlindungan tinggi. Konsentrasi yang berpotensi dikembangkan menjadi sediaan tabir surya alami yaitu pada konsentrasi 250 ppm.

E. Tujuan Penelitian

1. Menentukan konsentrasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) yang efektif sebagai tabir surya
2. Menentukan stabilitas fisik sediaan krim tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

F. Manfaat Penelitian

1. Diperoleh krim ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah yang berpotensi sebagai tabir surya
2. Diperoleh data ilmiah konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah dalam sediaan yang dapat memberikan potensi tabir surya yang baik dan mendukung menunjang pengembangan dan penerapannya, khususnya dalam ilmu farmasi
3. Meningkatkan nilai ekonomis ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) sebagai bahan alami dari produk kecantikan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan



Gambar 1. (A) Daun , (B) Rimpang Lempuyang Gajah

(Silalahi, 2018)

1. Klasifikasi (Lianah, 2020)

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Ordo : Zingiberales

Famili : Zingiberaceae

Genus : Zingiber

Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.

2. Nama Daerah (Mariastuty, 2002)

a. Daerah Malaya : lampuyang gajah, lampuyang kapur, lampuyang kebo

- b. Sunda : lempuyang badak
- c. Madura : lempuyang paek
- d. Jawa : lempuyang gajah, lempuyang kapur, lempuyang kebo

3. Deskripsi

Lempuyang gajah merupakan herba tahunan (abadi) dan hidupnya berumbi. Batang semu setinggi 1-2 m, warna hijau, batang terdiri dari kumpulan pelepah daun. (Lianah, 2020). Tulang daun utama lempuyang gajah memiliki ikatan pembuluh sebanyak 10 buah, banyak kristal silika pada jaringan bunga karang, sel jaringan palisade membesar dengan ukuran 25-37,5 x 12,5–15 μm , jumlah sel epidermis pada bagian abaksial daun lebih dari 175 buah/satuan. Lempuyang gajah dapat dikenali dengan adanya pulvinus di antara dasar tangkai daun (*petiole*) dan lidah daun (*ligule*) (Silalahi, 2018).

Rimpangnya berbau aromatik, pedas, dengan rasa seperti mentol dan sedikit pahit. Rimpang agak pipih atau agak lonjong, ujung cabang pendek, tiap cabang memiliki kepala putik sepanjang 7-18 cm dan tebal 2,5-5 cm. Bagian luarnya berwarna coklat hingga kuning pucat dan berkerut memanjang, meninggalkan retakan yang tidak rata dan berserat (Hanwar, 2009).

4. Uraian senyawa kimia

Pemanfaatan *Zingiber zerumbet* sebagai bahan obat berhubungan dengan kandungan metabolit sekundernya. Sebagai bahan obat rhizoma dari *Zingiber zerumbet* digunakan sebagai antipiretik, anti inflamasi, anti ulcer, analgesik, dan anti mikroba. Rhizoma *Zingiber zerumbet* dilaporkan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, poliphenol dan essensial oil. Metabolit sekunder yang

dihasilkan tumbuhan digunakan manusia untuk berbagai tujuan, salah satu di antaranya sebagai obat. Tumbuhan menyimpan metabolit sekundernya pada organ-organ yang berbeda, tergantung fungsi dari metabolit sekunder tersebut. Sebagai contoh klorofil disimpan terutama di bagian daun, sedangkan antosianin sebagian besar disimpan di bagian bunga. Zingiberaceae sebagian besar menyimpan metabolit sekundernya khususnya minyak atsiri pada bagian rhizomanya (Silalahi, 2018).

B. Antioksidan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan oleh berbagai faktor seperti asap, debu, polusi dan kebiasaan makan fast food yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemak. Senyawa antioksidan mendonorkan elektron ke radikal bebas yang tidak stabil, sehingga radikal bebas tersebut dapat dinetralkan dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017).

Sumber antioksidan alami dapat ditemukan pada banyak makanan seperti buah-buahan, rempah-rempah, teh, coklat, daun-daunan, biji-bijian, sayur-sayuran, enzim dan protein. Secara umum aktivitas antioksidan disebabkan karena tanaman ini mengandung metabolit sekunder/senyawa aktif antara lain flavonoid, fenol, tanin dan antosianin (Rahmi, 2017).

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menyerap atau menetralkan radikal bebas untuk membantu mencegah penyakit degeneratif seperti penyakit kardiovaskular, karsinogenesis dan penyakit lainnya. Antioksidan adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk menetralkan radikal bebas dan mencegah kerusakan

radikal bebas pada sel normal, protein dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur molekul yang dapat mendonorkan elektron ke molekul radikal bebas tanpa mempengaruhi aktivitasnya dan dapat mencegah reaksi berantai radikal bebas (Parwata, 2016)

Dalam melawan bahaya radikal bebas, baik radikal bebas eksogen maupun endogen, tubuh manusia telah menyiapkan penangkal berupa sistem antioksidan yang terdiri dari 3 golongan, yaitu :

1. Antioksidan primer ialah antioksidan yang mencegah pembentukan radikal bebas baru. Antioksidan ini termasuk transferin, feritin, albumin.

2. Antioksidan sekunder ialah antioksidan yang menangkap radikal bebas dan menghentikan pembentukan radikal bebas. Antioksidan ini termasuk *Superoxide Dismutase (SOD)*, *Glutathion Peroxidase (GPx)* dan *katalase*.

3. Antioksidan tersier, atau enzim perbaikan, adalah antioksidan yang bekerja untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak akibat radikal bebas. Antioksidan ini termasuk reduktase metionin sulfosida, reduktase metionin sulfosida, enzim perbaikan DNA, protease, transferase, dan lipase.

Berdasarkan sumber antioksidan yang dapat digunakan oleh manusia, dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Antioksidan yang diproduksi dalam tubuh manusia dikenal sebagai antioksidan endogen atau enzim antioksidan *superoksida dismutase (SOD)*, *enzim glutathione peroksidase (GPx)*, dan *katalase (CAT)*.

2. Antioksidan sintetik banyak terdapat pada makanan seperti *butylated hydroxyanisole* (BHA), *butylated hydroxytoluene* (BHT), *propyl ether* dan *tert-butylated hydroxyquinone* (TBHQ).

3. Antioksidan alami diperoleh dari bagian tanaman seperti kayu, kulit kayu, akar, daun, buah, bunga, biji dan serbuk sari, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E dan senyawa fenolik (flavonoid) (Parwata, 2016).

Antioksidan memiliki dua fungsi tergantung pada mekanisme kerjanya. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai donor atom Hidrogen. Antioksidan (AH) yang memiliki fungsi utama ini sering disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat dengan cepat memberikan atom hidrogen ke radikal lipid (R^* , ROO^*) atau mengubahnya menjadi bentuk yang lebih stabil, sementara turunan radikal antioksidan (A^*) lebih stabil daripada radikal lipid. Fungsi lain yang merupakan fungsi sekunder dari antioksidan yaitu memperlambat laju autoksidasi melalui beberapa mekanisme selain mekanisme yang memutus rantai autoksidasi dengan mengubah radikal lipid menjadi bentuk yang lebih stabil (Restika, 2017).

C. *Tabir Surya*

Paparan Paparan sinar matahari yang berlebihan menyebabkan jaringan epidermis kulit tidak mampu melawan agen berbahaya seperti terjadi dermatitis ringan hingga kanker kulit. Oleh karena itu diperlukan perlindungan fisik dengan menutupi tubuh, misalnya menggunakan payung, topi atau jaket, dan pelindung dari bahan kimia, seperti tabir surya. Tabir surya dapat menyerap setidaknya 85% sinar matahari pada panjang gelombang antara 290 - 320 nm untuk UV-B tetapi

memancarkan cahaya pada panjang gelombang di atas 320 nm untuk UV-A (Alhabsyi & Suryanto, 2014). Tabir surya memiliki dua cara berbeda untuk melindungi kulit. Pertama, tabir surya dapat memantulkan sinar UV untuk mencegahnya mencapai kulit. Tabir surya lain dapat menyerap sinar UV sebelum mengenai kulit.

Nilai SPF menunjukkan kemampuan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari tanpa menimbulkan kemerahan. Bahan kimia sintetis masih banyak digunakan dalam pembuatan produk tabir surya, sedangkan bahan alami tidak banyak digunakan pembuatan produk tabir surya (Amini *et al.*, 2020).

Cara pengaplikasian menentukan keefektifan tabir surya, yang harus diperhatikan saat mengaplikasikan tabir surya, yaitu:

- a. Jumlah/ketebalan cukup dan merata
- b. Pemakaian rutin setiap hari
- c. Waktu penggunaan adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/terpapar sinar UV, dan biarkan tabir surya mengering sebelum merias wajah.
- d. Mengoleskan kembali tabir surya kurang lebih setelah 2-4 jam tergantung aktivitas, efektivitas tabir surya akan berkurang jika terkena keringat/air. Jika Anda berenang, aplikasikan kembali setelah 1 jam dengan tabir surya tahan air.
- e. Saat menggunakan atau beralih ke tabir surya baru untuk pertama kalinya, Anda disarankan untuk mengujinya di area kecil terlebih dahulu untuk menghindari efek alergi atau iritasi (Minerva, 2019)

Salah satu cara untuk mengetahui keefektifan suatu tabir surya yaitu dengan mengukur faktor perlindungan matahari atau yang dikenal dengan SPF (Sun Protecting Factor). SPF didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang diperlukan untuk menyebabkan MED (*Minimum Erythematic Dose*) pada kulit yang dilindungi oleh tabir surya atau bahan aktif dibandingkan dengan jumlah energi yang diperlukan untuk menyebabkan MED tanpa perlindungan yang diberikan oleh bahan aktif tabir surya (Ismail *et al.*, 2014).

Nilai SPF dari tabir surya dapat diukur secara *in vitro*. Metode pengukuran SPF *in vitro* umumnya dibagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah mengukur penyerapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biofilm. Cara lain adalah menentukan sifat penyerapan tabir surya dengan analisis spektrofotometri larutan encer dari produk tabir surya yang diuji (Restika, 2017).

Dalam menentukan nilai SPF sediaan krim dianalisis menggunakan metode mansur (Harjanti & Nilawati, 2020)

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

Keterangan :

- EE = Spektrum efek eritemal
- I = Intensitas spectrum sinar
- A = Serapan produk tabir surya
- CF = Faktor koreksi (10)

Menurut Food Drug Administration (FDA) Amerika Serikat, efektivitas tabir surya dalam suatu sediaan diklasifikasikan menjadi lima kelompok menurut nilai SPF-nya, antara lain (Damogalad *et al.*, 2013).

Tabel 1. Keefektifan tabir surya berdasarkan nilai SPF

SPF	Kategori Proteksi Tabir Surya
2-4	Proteksi minimal
4-6	Proteksi sedang
6-8	Proteksi ekstra
8-15	Proteksi maksimal
≥ 15	Proteksi ultra

Nilai $EE \times I$ adalah suatu ketetapan atau konstanta. Ditentukan oleh (Sayre *et al.*, 1979), yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Nilai $EE \times I$ pada panjang gelombang 290-320 nm

Panjang Gelombang (λ nm)	$EE \times I$
290	0,0150
295	0,0817
300	0,2874
305	0,3278
310	0,1864
315	0,0839
320	0,0180
Total	1

Penggolongan tabir surya berdasarkan persen transmisi sinar UV, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Widyawati *et al.*, 2019)

Tabel 3. Penggolongan potensi tabir surya

Kategori	% Transmisi	
	Eritema	Pigmentasi
Sunblock total	<1,0	3-40
Proteksi ekstra	1-6	42-86

Suntan standar	6-12	45-86
Fast tanning	10-18	45-86

Penentuan keefektifan tabir surya melibatkan penentuan nilai SPF, persentase penetrasi eritema (% Te) dan persentase penetrasi pigmen (% Tp). Penentuan nilai SPF dan %Te menunjukkan efektivitas tabir surya terhadap sinar UV-B, sedangkan %Tp menentukan efektivitas tabir surya terhadap sinar UV-A. Tabir surya dianggap baik jika memiliki nilai SPF yang tinggi dan nilai %Te dan %Tp yang rendah (Restika, 2017).

D. Krim

Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih komponen obat yang dilarutkan atau didispersikan dalam bahan dasar yang sesuai (Mokodompit *et al.*, 2013). Krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental yang mengandung air minimal 60% (Safitri *et al.*, 2014).

Sediaan krim terdiri dari dua komponen utama yaitu bahan aktif dan basis krim. Komponen dasar krim terdiri dari fase minyak dan air, yang dicampur dengan adanya pengemulsi untuk membentuk basis krim. Untuk mendapatkan basis krim yang baik, penggunaan dan pemilihan pengemulsi sangat penting. Selain itu, bahan lain seperti pengawet, zat pengkelat, pengental, pewarna, humektan, pewangi, dll. sering ditambahkan ke krim yang mendukung dan menciptakan sifat komposisi krim yang diinginkan (Pratama & Zulkarnain, 2015).

Formulasi krim menggunakan ada dua tipe basis yaitu minyak dalam air (O/W) atau air dalam minyak (W/O). Pemilihan basis tergantung pada tujuan penggunaan dan jenis bahan yang digunakan (Wiranto, 2021). Krim terdiri dari

dua fase cair dimana salah satu fase bersifat polar (contohnya air) dan fase lainnya bersifat relatif non-polar (contohnya minyak). Krim dengan sistem emulsi minyak dalam air (m/a) dimana fase minyak didispersikan sebagai butiran-butiran ke dalam fase air yang bertindak sebagai fase kontinyu. Krim dengan sistem emulsi air dalam minyak (a/m) dimana fase minyak bertindak sebagai fase kontinyu (Iswindari, 2014).

Pembuatan sediaan krim melibatkan proses peleburan dan proses emulsifikasi. Secara umum, komponen yang tidak dapat bercampur dengan air seperti minyak dan lilin dilelehkan bersama dalam penangas air pada suhu 70-75 °C, sementara semua larutan encer dari komponen yang larut dalam air dan tahan panas dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Larutan air kemudian secara perlahan ditambahkan ke campuran lemak cair dan diaduk terus menerus, pertahankan suhu selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi lilin/lemak. Campuran kemudian didinginkan perlahan dengan pengadukan konstan sampai campuran mengental. Jika larutan air tidak pada suhu yang sama dengan lemak yang meleleh, sebagian lilin akan mengeras, menyebabkan fase lemak dan fase air terpisah (Wardiyah, 2015).

Sediaan krim dapat rusak jika sistem pencampurannya terganggu, terutama karena perubahan suhu dan komposisi dari penambahan satu fasa yang berlebihan atau pencampuran dua tipe krim jika pengemulsi tidak tercampur menjadi satu. Krim hanya dapat diencerkan jika pengencer yang sesuai diketahui. Krim yang diencerkan harus digunakan dalam waktu satu bulan (Restika, 2017).

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan krim adalah sebagai berikut:

a. Asam stearat

Rumus molekul : $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat adalah padatan kristal yang keras, putih hingga agak kekuningan, atau bubuk putih hingga agak kekuningan. Baunya ringan (ambang bau 20ppm) dan rasanya berlemak. Dalam formulasi topikal, asam stearat digunakan sebagai pengemulsi dan pelarut. Asam stearat bebas larut dalam benzena, karbon tetraklorida, kloroform dan eter (95%), heksana dan propilen glikol, hampir tidak larut dalam air. Asam stearat adalah bahan yang stabil; Antioksidan juga dapat ditambahkan. Bahan ini harus disimpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk dan kering. Asam stearat tidak cocok dengan sebagian besar logam hidroksida dan mungkin tidak cocok dengan basa, zat pereduksi dan zat pengoksidasi (Sheskey *et al.*, 2017).

b. Setil alkohol

Rumus molekul : $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol hadir dalam bentuk lilin, serpihan putih, butiran, kubus. Setil alkohol memiliki bau khas yang samar dan rasa yang ringan. Setil alkohol umumnya digunakan dalam formulasi residu kosmetik dan farmasi seperti suppositoria, bentuk sediaan ester padat, emulsi, emulsi, krim dan losion. Emulsi, krim, dan losion menggunakan setil alkohol untuk sifat emolien, menyerap air, dan menyabunkan. Ini meningkatkan stabilitas, meningkatkan struktur dan kejelasan, dan meningkatkan konsistensi. Sifat emolien disebabkan oleh fakta

bahwa setil alkohol diserap dan tetap berada di epidermis, di mana ia melumasi dan melembutkan kulit, memberikan tekstur beludru yang khas.

Setil alkohol juga digunakan dalam emulsi air dalam minyak karena sifatnya yang menyerap air. Setil alkohol bertindak sebagai pengemulsi air-dalam-minyak yang lemah, memungkinkan pengurangan sejumlah kecil pengemulsi lainnya. (Sheskey *et al.*, 2017).

c. Lanolin

Lanolin muncul sebagai zat kuning pucat, tidak beraturan dengan bau khas yang samar. Lanolin cair adalah cairan bening atau hampir bening. Lanolin banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai agen pengemulsi dan emolien. Lanolin dapat digunakan sebagai pembawa hidrofobik dan untuk membuat losion dan krim air dalam minyak. Ketika dicampur dengan minyak sayur yang cocok atau dengan parafin lunak, hasilnya: krim emolien yang menembus kulit sehingga lebih mudah diserap. Lanolin bercampur dengan sekitar dua kali berat airnya sendiri, tanpa pemisahan, untuk menghasilkan emulsi stabil yang tidak mudah menjadi tengik selama penyimpanan. Produk topikal berbasis lanolin memiliki sifat emolien yang sangat baik karena kemiripan kimia dan fisik yang unik dari lanolin dengan lipid kulit manusia. Selain kemampuan semioklusifnya, produk ini juga mampu memungkinkan transportasi dua arah air (Sheskey *et al.*, 2017).

d. Tween 80

Rumus molekul : $C_{64}H_{124}O_{26}$

Polisorbat adalah cairan kental, berminyak atau padatan lilin dengan bau khas yang samar dan rasa pahit berwarna oranye-kuning atau kuning kecoklatan. Polisorbat adalah surfaktan nonionik hidrofilik yang banyak digunakan sebagai bahan pengemulsi dalam pembuatan emulsi farmasi yang stabil. Polisorbat harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya, di tempat sejuk dan kering. Nilai HLB butuh adalah 13,9 (Sheskey *et al.*, 2017).

e. Span 80

Rumus molekul : $C_{24}H_{44}O_6$

Sorbitan muncul sebagai cairan kuning krem atau padat dengan bau dan rasa yang khas. Banyak digunakan dalam formulasi kosmetik, makanan dan farmasi sebagai surfaktan nonionik lipofilik, terutama dalam formulasi farmasi sebagai pengemulsi dalam pembuatan krim, emulsi dan salep untuk penggunaan topikal. Sorbitan harus disimpan dalam wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Nilai HLB butuh adalah 4,3 (Sheskey *et al.*, 2017).

f. Metil paraben

Rumus molekul : $C_8H_8O_3$

Methylparaben terjadi sebagai kristal tidak berwarna atau bubuk kristal putih. Tidak berbau atau hampir tidak berbau dan memiliki rasa sedikit terbakar. Dalam kosmetik, methylparaben adalah pengawet antimikroba yang paling banyak digunakan, dapat digunakan sendiri atau bersama dengan paraben lain atau antimikroba lainnya. Paraben efektif dalam kisaran pH yang luas dan memiliki spektrum aktivitas antimikroba yang luas (Sheskey *et al.*, 2017).

g. Propil paraben

Rumus molekul : $C_{10}H_{12}O_3$

Propylparaben adalah bubuk putih, kristal, tidak berbau dan tidak berasa. Propylparaben banyak digunakan sebagai pengawet antimikroba dalam kosmetik, makanan, dan obat-obatan. Ini dapat digunakan sendiri, dalam kombinasi dengan ester paraben lain atau agen antimikroba lainnya. Ini adalah salah satu pengawet yang paling umum digunakan dalam kosmetik (Sheskey *et al.*, 2017).

h. α -Tokoferol

Rumus molekul : $C_{29}H_{50}O_2$

Alpha-tocopherol adalah produk alami, cairan berminyak kental bening, tidak berwarna atau kekuningan-coklat. Alpha-tocopherol adalah senyawa yang sangat lipofilik, pelarut yang sangat baik untuk banyak obat yang sulit larut dan dapat meningkatkan stabilitas formulasi. Tokoferol dinilai dalam produk farmasi berbasis minyak atau lemak dan biasanya digunakan pada konsentrasi 0,001-0,05% v/v (Sheskey *et al.*, 2017).

i. Trietanolamin

Rumus molekul : $C_6H_{15}NO_3$

Triethanolamine adalah cairan kental, bening, tidak berwarna atau kuning pucat dengan bau amonia yang samar. Triethanolamine banyak digunakan dalam formulasi farmasi topikal, terutama dalam pembentukan emulsi. Ketika dicampur dalam proporsi yang sama dengan asam lemak seperti: asam stearat atau asam oleat, trietanolamina membentuk sabun anionik dengan pH sekitar 8, yang dapat digunakan sebagai pengemulsi untuk menghasilkan emulsi minyak dalam air yang

stabil dan berbutir halus. Emulsifikasi biasanya menggunakan 2-4% volume triethanolamine dan asam lemak 2-5 kali lebih banyak (Sheskey *et al.*, 2017).

Kombinasi asam stearat dan TEA, seperti TEA yang dikombinasikan dengan asam lemak bebas membentuk emulsi m/a yang sangat stabil. Asam lemak yang cocok dikombinasikan dengan TEA adalah asam stearat, karena asam stearat tidak berubah warna, krim dengan asam stearat dan triethanolamine stabil selama penyimpanan (Saryanti *et al.*, 2019). Triethanolamine dan asam stearat membentuk pengemulsi anionik dengan membentuk garam basa. Triethanolamine memiliki bentuk yang stabil sebagai pengemulsi dalam emulsi m/a (Nining *et al.*, 2019).

E. Ekstraksi

Ekstraksi adalah pemisahan zat target dan zat yang tidak berguna dimana teknik pemisahan didasarkan pada perbedaan distribusi zat terlarut antara dua atau lebih pelarut yang saling bercampur. (Sudarwati & Fernanda, 2019). Pembagian metode ekstraksi cukup beragam, salah satunya metode ekstraksi berdasarkan suhu dapat dibedakan menjadi, sebagai berikut:

a. Cara dingin

Metoda ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa yang karena pemanasan. Jenis ekstraksi dingin adalah :

1. Maserasi

Maserasi adalah metode filtrasi sederhana. Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk Simplisia dalam pelarut. Cairan penyaring menembus dinding

sel dan memasuki rongga sel yang berisi obat, obat larut karena perbedaan konsentrasi larutan obat di dalam sel dan larutan di luar sel, setelah itu larutan pekat dipindahkan. Proses ini diulangi sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan larutan di dalam sel (Sudarwati & Fernanda, 2019).

Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah membutuhkan waktu lama, menggunakan banyak pelarut dan mungkin menghilangkan beberapa senyawa. Beberapa senyawa sulit diekstraksi bahkan pada suhu kamar. Di sisi lain, kerusakan senyawa yang labil terhadap panas dapat dihindari dengan proses maserasi (Mukhriani, 2014).

2. Perkolasi

Perkolasi Perkolasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan melewati pelarut yang sesuai secara perlahan melalui simplisia dalam perkolat. Perkolasi bertujuan supaya zat berkhasiat tertarik sempurna dari bahan aktif dan biasanya dilakukan pada bahan yang tidak tahan pemanasan. Cairan penyari mengalir melalui bubuk dari atas ke bawah, cairan filter melarutkan zat aktif dalam sel yang dilaluinya hingga jenuh. Gerakan ke bawah bergantung pada gravitasinya sendiri dan gravitasi cairan di atasnya, dikurangi gaya kapiler yang cenderung menahan. Gaya yang bekerja pada perkolasi adalah misalnya gravitasi, viskositas, kelarutan, tegangan permukaan, difusi, osmosis, adhesi, aksi kapiler dan gaya geser (gesekan) (Sudarwati & Fernanda, 2019).

Keuntungan dari metode ini adalah pelarut baru selalu ditambahkan ke dalam sampel. Namun kelemahannya adalah jika sampel tidak homogeny dalam perkolasi, maka pelarut akan sulit menjangkau semua bagian. Selain itu, cara ini

juga membutuhkan pelarut yang banyak dan waktu yang lama (Mukhriani, 2014).

b. Cara panas

Pastinya metoda ini melibatkan panas dalam prosesnya. Adanya panas secara otomatis mempercepat proses filtrasi dibandingkan metode dingin. Metodanya adalah :

1. Refluks

Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah refluks. Metode ini digunakan bila pelarut yang mudah menguap digunakan dalam sintesis. Dalam keadaan ini, jika pemanasan normal dilakukan, pelarut akan menguap sebelum reaksi berlangsung. Prinsip proses refluks adalah pelarut yang volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, tetapi akan didinginkan di dalam kondensor, sehingga pelarut uap mengembun di dalam kondensor dan jatuh kembali ke bejana reaksi, meninggalkan pelarut selama reaksi. Sedangkan aliran gas N₂ diatur agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang dapat masuk, terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik, karena bersifat reaktif. (Sudarwati & Fernanda, 2019).

2. Sokletasi

Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terkandung dalam suatu padatan dengan cara penyaringan berulang kali menggunakan pelarut tertentu sehingga semua komponen yang diinginkan dapat diisolasi. Sokletasi digunakan dalam pelarut organik tertentu. Dengan memanaskan sehingga uap yang naik setelah pendinginan terus menerus

membasahi sampel, pelarut dikembalikan secara berkala ke dalam labu yang berisi senyawa kimia yang akan diisolasi. Pelarut yang membawa senyawa kimia ke dalam penyuling diuapkan menggunakan rotary evaporator untuk memungkinkan pelarut dihilangkan kembali, ketika padatan bertemu dengan campuran organik dalam bentuk cair atau padat dapat diekstraksi dengan pelarut yang diinginkan. (Sudarwati & Fernanda, 2019).

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksinya kontinyu, sampel diekstraks dari kondensat dengan pelarut murni, sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang labil terhadap panas dapat terurai karena ekstrak yang diperoleh selalu berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

3. Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan konstan pada suhu yang lebih tinggi dari suhu kamar yaitu pada suhu 40-50°C (Hasrianti *et al.*, 2016).

4. Infus

Infus adalah metode ekstraksi dimana pelarutnya adalah air. Selama proses infusdasi, suhu pelarut air harus 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan terhadap air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gram maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah memanaskan serbuk dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit dihitung mulai suhu mencapai 90°C (Sudarwati & Fernanda, 2019).

5. Dekok

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada suhu 90°C selama 30 menit (Hasrianti *et al.*, 2016).

F. Spektrofotometri UV-Vis

Spektrofotometri UV-Vis merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur energi transisi elektron pada ikatan molekul. Rentang pengukuran panjang gelombang elektromagnetik yaitu 200-400 nm (UV) dan 400-800 nm (cahaya tampak). Transisi elektron dalam rentang UV jauh (panjang gelombang di bawah 200 nm) tidak dapat diukur menggunakan alat ini (Septiannisa, 2020).

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis (Ultra Violet-Visible) didasarkan pada penyerapan cahaya, dimana atom dan molekul berinteraksi dengan cahaya (Ahriani, 2021). Prinsip spektrofotometri UV-Vis, dimana radiasi berada pada rentang panjang gelombang 200-800 nm, dilewatkan melalui larutan senyawa. Elektron dalam ikatan di dalam molekul tereksitasi untuk pindah ke keadaan kuantum yang lebih tinggi, menyerap sebagian energi yang melewati larutan. Semakin longgar elektron tetap berada dalam ikatan molekul, semakin panjang panjang gelombang radiasi yang diserap (energi lebih rendah). (Restika, 2017).

Spektrofotometri UV-Vis didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Ketika cahaya monokromatik melewati persimpangan, sebagian cahaya diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian dipancarkan. Cermin berputar di dalam spektrofotometer membagi sinar yang berasal dari sumber cahaya menjadi dua bagian (Ahriani, 2021).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sumber cahaya dianggap ideal dalam spektrofotometer UV-Vis, antara lain intensitas cahaya yang kuat dan seragam pada semua panjang gelombang untuk mencapai rentang pengukuran pada rentang UV-Vis. , intensitas sumber cahaya tidak boleh bervariasi secara signifikan pada panjang berapa pun. gelombang yang berbeda dan intensitas sumber cahaya tidak berubah dalam jangka pendek dan panjang (Sastrohamidjojo, 2018).

Untuk sampel berupa larutan dalam menggunakan spektrofotometer UV-Vis, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampel telah benar-benar larut.
- b. Pelarut yang digunakan tidak berwarna dan tidak memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dalam struktur molekulnya.
- c. Tidak ada interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis.
- d. Memiliki kemurnian tinggi.

Pelarut yang digunakan adalah yang transparan dalam kisaran UV, contohnya air, etanol, metanol, dan n-heksan. Konsentrasi sampel juga harus diperhatikan untuk mendapatkan spektrum UV-Vis yang baik (Suhartati, 2017).

G. Tinjauan Islam

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman tumbuhannya. Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah SWT. baik seluruh alam semesta termasuk bumi dengan segala isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah SWT. menciptakan berbagai tumbuhan yang baik dan juga mengandung berbagai kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia.

Seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-Naba“ (78) ayat 13-15:

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَمَرًا ۝ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
وَنَبَاتًا ۝

Terjemahnya:

“Dan Kami menjadikan pelita yang terang-benderang (matahari), dan Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras ,agar Kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-tanaman” (Kementerian Agama, 2019).

Ayat-ayat diatas menguraikan tentang langit serta manfaat yang diperoleh manusia dari penciptaannya. Allah SWT. Berfirman: Dan, di samping yang tersebut diatas, Kami juga telah bangun di atas kamu tujuh lapis langit yang kukuh dan dapat bertahan selama mungkin sampai kami menetapkan kerapuhannya, dan Kami telah menjadikan pelita, yakni matahari, yang sangat terang lagi menghasilkan panas sampai batas waktu yang kami kehendaki dan Kami telah menurunkan dari awan yang telah terkumpul padanya uap-uap dari laut air yang tercurah deras supaya Kami mengeluarkan, dengannya, yakni tumbuhan, dengan air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat, antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan.

Berkaitan dengan matahari, penemuan ilmiah telah membuktikan bahwa suhu permukaan matahari mencapai enam ribu derajat. Pada saat yang sama, panas matahari mencapai tiga puluh juta derajat disebabkan oleh materi-materi bertekanan tinggi yang ada pada matahari. Sinar matahari menghasilkan energi berupa radiasi ultraviolet 9%, cahaya 46%, dan inframerah 45%. Karena itulah ayat suci diatas dinamai matahari sebagai (سِرَاجًا) *sirajān/ pelita* karena

mengandung cahaya dan panas secara bersamaan (Tafsir al-Muntakhab). Kata (وَهَاجًا) *wahhājan* terambil dari kata *wahaja* yang berarti bercahaya atau berkerlap kelip atau menyala (Quraish Shihab, 2002)

Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala yang diciptakan Allah SWT. di bumi ini termasuk tumbuh-tumbuhan semua ada manfaatnya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S Asy-Syu'ara'(26) ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?”(Kementerian Agama, 2019).

Pada firman-Nya pada ayat ini (*أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ*) *awalam yarâ ilâ al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi* merupakan kata yang mengandung makna *batas akhir*. Ini bertujuan untuk memperluas garis pandang hingga batasnya. Dengan demikian, ayat ini mengundang manusia untuk mengarahkan pandangan hinggavbatas kemampuannya memandang, termasuk mencakup seluruh bumi dengan berbagai tanah dan tumbuh-tumbuhannya serta berbagai keajaiban yang tersebar pada tumbuh-tumbuhannya (Quraish Shihab, 2002).

Dapat dipahami bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, terutama tumbuhan. Dengan mengamati tumbuh-tumbuhan, seseorang dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus dipahami bahwa tumbuhan ciptaan Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, maka selain pengamatan sederhana juga harus dilakukan pengamatan tentang perkembangan tumbuhan tersebut. Salah satunya adalah

mempelajari kandungan tumbuhan dan manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan manusia agar tercipta rasa syukur dan meningkatkan keimanan terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah (Quraish Shihab, 2002).

Kata (زَوْجٍ) *zauj* berarti *pasangan*. Pasangan yang dimaksud ayat ini adalah pasangan tumbuh-tumbuhan karena tumbuhan muncul dicelah-celah tanah yang terhampar dibumi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa tumbuh-tumbuhan pun memiliki pasangan-pasangan guna pertumbuhan dan perkembangannya. Ada tumbuhan yang memiliki benang sari dan putik sehingga menyatu dalam diri pasangannya dan dalam penyerbukannya ia tidak membutuhkan pejantan dari bunga lain, dan ada juga yang hanya memiliki salah satunya saja sehingga membutuhkan pasangannya. Yang jelas setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Karena itu, ayat di atas memulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak melihat, pertanyaan yang mengandung unsur keheranan terhadap mereka yang tidak memfungsikan matanya untuk melihat bukti yang sangat jelas itu (Quraish Shihab, 2002).

Kata (كَرِيمٍ) *karim* digunakan antara lain untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang baik untuk objek apapun yang disifatinya. Tanaman yang baik setidaknya yang berbuah dan bermanfaat.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra, dari Nabi saw bersabda ; “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya”. (H.R. Al-Bukhari)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari penyakit. Penyakit yang dialami manusia terdiri dari penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit jasmani seringkali muncul karena dipengaruhi oleh faktor penyakit rohani seperti berlebih-lebihan makanan 1/3, minum 1/3, nafas 1/3 (Faiz, 1991).

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu, setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya. Karena setiap penyakit pasti ada obatnya, bukan berarti tumbuhan yang menyembuhkan tetapi atas seizin Allah SWT. Dalam pandangan islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah SWT tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian. Yang dalam hal ini salah satu obatnya yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan seizin Allah SWT. Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan formulasi, uji aktivitas, dan uji stabilitas fisik krim tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Farmasetik, Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Farmasetik Universitas Indonesia Timur.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2022 – Januari 2023

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi tabir surya dalam sediaan krim ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

C. Sampel

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu rimpang tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah timbangan analitik, gegep, gelas ukur, gelas kimia, cawan porselen, kuvet, hotplate, waterbath, lumpang dan alu, kertas saring, blender, ayakan, *rotary evaporation*, corong, pH meter, viskometer *Brookfield*, dan spektrofotometri uv-vis.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan adalah ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah, asam stearat, setil alkohol, lanolin, span 80, tween 80, metil paraben, propil paraben, α -tokoferol, trietanolamin. Pelarut yang digunakan meliputi etil asetat dan aquades.

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel rimpang lempuyang gajah diperoleh dari daerah Sinjai, Sulawesi Selatan. Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dari bagian tumbuhan lainnya dan dicuci dengan air yang mengalir (Handayani *et al.*, 2014).

b. Pengolahan sampel

Sampel yang diambil disortir basah untuk memisahkan sampel dari pengotor atau benda asing lainnya. Sampel kemudian dicuci dengan air mengalir, dipotong kecil-kecil, dikeringkan dalam lemari pengering dan kemudian diblender (Handayani *et al.*, 2014)

2. Ekstraksi

Metode yang digunakan dalam ekstraksi rimpang lempuyang gajah adalah maserasi yang bertujuan untuk mengekstraksi bahan aktif yang terkandung dalam

sampel. Kemudian serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang sebanyak 500 gram dan dimaserasi dengan etil asetat selama 9 x 24 jam dan setiap 3 x 24 jam pelarut diganti dengan yang baru, kemudian maserat di uapkan dalam *rotary evaporator* pada suhu 60 °C (Podungge *et al.*, 2017).

3. Pembuatan Krim

a. Rancangan Formula

Formulasi pembuatan krim diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurisyah *et al.*, 2020) dengan modifikasi

Tabel 4. Rancangan Formula Sediaan Krim Tabir Surya

Nama Bahan	F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)	Kegunaan
Ekstrak rimpang lempuyang gajah	3	6	9	Zat Aktif
Asam stearat	10	10	10	Pengemulsi
Setil alkohol	5	5	5	Pengental
Lanolin	3	3	3	Pelembab
Tween 80	2,5	2,5	2,5	Emulgator
Span 80	2,5	2,5	2,5	Emulgator
Nipagin	0,18	0,18	0,18	Pengawet
Nipasol	0,02	0,02	0,02	Pengawet
TEA	2	2	2	Pengemulsi
α – Tokoferol	0,05	0,05	0,05	Antioksidan
Aquadest	Ad 100 mL	Ad 100 mL	Ad 100 mL	Pelarut

b. Prosedur Pembuatan Krim

Alat dan bahan yang digunakan disiapkan. Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan perhitungan. Fase minyak dibuat dengan cara melebur berturut-turut bahan yang merupakan fase minyak yaitu lanolin, asam stearat, setil alkohol, nipasol, span 80 pada suhu 70 °C dalam gelas kimia. Kemudian bahan yang merupakan fase air yaitu nipagin, tween 80, trietanolamin, dan aquadest

dipanaskan pada suhu 70°C. Fase air dimasukkan ke dalam fase minyak sedikit-sedikit sambil diaduk hingga terbentuk emulsi. Kemudian sedikit demi sedikit ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah ditambahkan, gerus dalam mortir sampai terbentuk emulsi yang homogen. Terakhir ditambahkan α -tokoferol dan aduk hingga homogen. Tipe emulsi krim adalah A/M (Nurisyah *et al.*, 2020).

4. Uji Stabilitas Krim

Salah satu pengujian stabilitas adalah dengan metode *Cycling test*. Satu siklus sediaan krim disimpan pada suhu 4°C selama 24 jam lalu dikeluarkan dan ditempatkan pada suhu 40°C selama 24 jam. Percobaan ini diulang sebanyak 6 siklus, dimana tiap siklus diamati perubahan fisik krim meliputi organoleptik, homogenitas, pH, daya sebar dan viskositas. Kondisi fisik krim dibandingkan selama percobaan dengan sediaan sebelumnya (Zam Zam & Musdalifah, 2022).

a. Uji Organoleptik

Pengamatan sensori dilakukan terhadap sediaan, meliputi pengamatan warna, bau dan bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah penyimpanan (Nonci *et al.*, 2017)

b. Uji Homogenitas

Pengujian ini dilakukan dengan cara krim dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain, dimana bahan diambil dari tiga bagian yakni bagian atas, tengah, dan bawah, krim dianggap homogen jika tidak ada gumpalan atau partikel yang tidak tercampur (Wahyuddin *et al.*, 2020).

c. Uji pH

Pengukuran pH dilakukan menggunakan pH meter. Pengujian ini dilakukan dengan cara mencelupkan alat/elektroda ke dalam krim yang akan diuji, kemudian menunggu beberapa detik hingga angka di layar stabil dan pembacaan pH terekam. Kisaran pH yang dapat diterima kulit adalah antara 4,5-6,5 (Nurisyah *et al.*, 2020).

d. Uji Daya Sebar

Sebanyak 0,5 g krim diletakkan ditengah kaca bulat transparan dan ditutup dengan jenis kaca yang sama, kemudian diberi pemberat 150 g pada penutup dan dibiarkan selama 1 menit. Diukur diameter penyebarannya dengan penggaris (Hasbullah *et al.*, 2020). Daya sebar yang baik untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm (Leboe, 2020).

e. Uji Viskositas

Pengujian viskositas krim menggunakan viskometer *Brookfield* dengan spindle nomer 64. Krim yang akan diuji viskositasnya dimasukkan kedalam gelas kimia 100 mL, kemudian spindle diletakkan ditengah gelas kimia. Viskositas sediaan krim akan terbaca setelah menekan “run” dan ditunggu sampai muncul hasilnya pada layar alat (Mudhana & Pujiastuti, 2021).

5. Uji Potensi Tabir Surya

Efektivitas tabir surya ditentukan dengan menentukan nilai SPF secara *in vitro* dengan spektrofotometri UV-Vis, menimbang 0,1 g masing-masing krim ekstrak etil asetat (3%, 6, dan 9%), dan ditambahkan etanol sebanyak 25 mL lalu diaduk hingga homogen. Spektrofotometer UV-Vis pertama kali dikalibrasi

dengan etanol. Sebanyak 1 mL etanol ditambahkan ke dalam kuvet, kemudian kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV-Vis untuk proses kalibrasi. Selanjutnya dibuat kurva serapan uji dalam kuvet dengan panjang gelombang antara 290-320 nm menggunakan etanol 70% sebagai blanko. Kemudian tentukan absorbansi rata-rata pada interval 5 nm (Damogalad *et al.*, 2013).

Hasil absorbansi untuk masing-masing konsentrasi krim dicatat dan kemudian dihitung nilai SPF dengan menggunakan rumus (Harjanti & Nilawati, 2020):

$$SPF = CF \times \sum_{290}^{320} EE(\lambda) \times I(\lambda) \times A(\lambda)$$

Keterangan :

CF : Faktor koreksi bernilai 10

EE : Efek eritmogenik radiasi pada panjang gelombang (λ)

I : Spektrum simulasi sinar surya (λ)

A : Nilai absorbansi pada panjang gelombang (λ)

Penentuan persen transmisi eritema dan persen transmisi pigmentasi kemudian diukur serapannya menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang yang dapat menyebabkan eritema dan pigmentasi yaitu 292,5-317,5 nm untuk menentukan nilai %Te dan pada panjang gelombang 322,5-372,5 nm untuk menentukan nilai %Tp dengan interval panjang gelombang 5 nm (Sami *et al.*, 2015).

Persentase transmisi eritema dan persentase transmisi pigmentasi dihitung menggunakan rumus (Widyawati *et al.*, 2019) :

$$\% Te = \frac{Ee}{\sum fe} = \frac{\sum(T \times Fe)}{\sum fe}$$

$$\% Tp = \frac{Ep}{\sum fp} = \frac{\sum(T \times Fp)}{\sum fp}$$

Keterangan :

Te : Nilai Persen Transmisi Eritema

Fe : Fluks Eritema

Ee : Banyaknya Fluks Eritema yang Diteruskan oleh Tabir Surya

Tp : Nilai Persen Transmisi Pigmentasi

Fp : Fluks Pigmentasi

Ep : Banyaknya Fluks Pigmentasi yang Diteruskan oleh Tabir Surya



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah

Setelah dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan rimpang lempuyang gajah 500 mg dalam 5 liter larutan etil asetat secara maserasi diperoleh berat ekstrak kental sebanyak 34,2 g dengan persen rendeman 6,84%.

Tabel 5. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendeman
Ekstrak Kental	500 gram	34,2 gram	6,84%

2. Hasil Nilai Sun Protection Factor (SPF)

a. Krim 3%

Tabel 6. Nilai SPF Krim 3%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I (Sayre et al.,1979)	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,195	0,015	0,017925	11,332	Proteksi maksimal
295	1,258	0,0817	0,102779		
300	1,185	0,2874	0,340569		
305	1,114	0,3278	0,365169		
310	1,071	0,1864	0,199634		
315	1,054	0,0839	0,088431		
320	1,044	0,018	0,018792		
Σ			1,1332		

b. Krim 6%

Tabel 7. Nilai SPF Krim 6%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I (Sayre <i>et al.</i> , 1979)	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,289	0,015	0,019335	13,128	Proteksi maksimal
295	1,419	0,0817	0,115932		
300	1,359	0,2874	0,390577		
305	1,297	0,3278	0,425157		
310	1,257	0,1864	0,234305		
315	1,251	0,0839	0,104959		
320	1,252	0,018	0,022536		
Σ			1,3128		

c. Krim 9%

Tabel 8. Nilai SPF Krim 9%

Panjang gelombang (nm)	Absorbansi	EE x I (Sayre <i>et al.</i> , 1979)	EE x I x A	SPF	Keterangan
290	1,646	0,015	0,02469	20,689	Proteksi ultra
295	2,476	0,0817	0,202289		
300	2,980	0,2874	0,856452		
305	3,699	0,3278	1,212532		
310	3,754	0,1864	0,699746		
315	3,959	0,0839	0,33216		
320	3,996	0,018	0,071928		
Σ			2,0689		

3. Hasil Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi Pigmentasi

a. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 3%

Tabel 9. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 3%

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe) (Cumpelik, 1972)	T x Fe	%Te	Ket

292.5 nm	0,037	0,1105	0,004088	0,4695	Sunblock
297.5 nm	0,160	0,6720	0,10752		
302.5 nm	0,425	1,0000	0,425		
307.5 nm	0,819	0,2008	0,164455		
312.5 nm	1,216	0,1364	0,165862		
317.5 nm	1,610	0,1125	0,181125		
Σ		2,2322	1,0480		

Tabel 10. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3%

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp) (Cumpelik, 1972)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	9,856	0,1079	1,0634624	11,2625
327.5 nm	9,986	0,1020	1,018572	
332.5 nm	10,195	0,0936	0,954252	
337.5 nm	10,338	0,0798	0,8249724	
342.5 nm	10,478	0,0669	0,7009782	
347.5 nm	10,754	0,0570	0,612978	
352.5 nm	11,351	0,0488	0,5085248	
357.5 nm	12,437	0,0456	0,5671272	
362.5 nm	14,058	0,0356	0,5004648	
367.5 nm	16,51	0,0310	0,51181	
372.5 nm	19,611	0,0260	0,509886	
Σ		0,6942	7,8184	

b. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 6%

Tabel 11. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 6%

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe) (Cumpelik, 1972)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,021	0,1105	0,002320	0,2822	Sunblock
297.5 nm	0,097	0,6720	0,065184		
302.5 nm	0,260	1,0000	0,26		
307.5 nm	0,500	0,2008	0,1004		
312.5 nm	0,721	0,1364	0,098344		
317.5 nm	0,923	0,1125	0,103837		
Σ		2,2322	0,6300		

Tabel 12. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp) (Cumpelik, 1972)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	5,192	0,1079	0,5602168	6,0583
327.5 nm	5,188	0,1020	0,529176	
332.5 nm	5,252	0,0936	0,4915872	
337.5 nm	5,258	0,0798	0,4195884	
342.5 nm	5,284	0,0669	0,3534996	
347.5 nm	5,441	0,0570	0,310137	
352.5 nm	5,861	0,0488	0,2860168	
357.5 nm	6,692	0,0456	0,3051552	
362.5 nm	8,044	0,0356	0,2863664	
367.5 nm	10,255	0,0310	0,317905	
372.5 nm	13,311	0,0260	0,346086	
	Σ	0,6942	4,2057	

c. Persen transmisi eritema dan pigmentasi krim 9%

Tabel 13. Nilai Persen Transmisi Eritema Krim 9%

Panjang gelombang	Transmisi Eritema (Te)	Fluks Eritema (Fe) (Cumpelik, 1972)	T x Fe	%Te	Ket
292.5 nm	0,024	0,1105	0,002652	0,0172	Sunblock
297.5 nm	0,019	0,6720	0,012768		
302.5 nm	0,016	1,0000	0,016		
307.5 nm	0,014	0,2008	0,002811		
312.5 nm	0,017	0,1364	0,002318		
317.5 nm	0,018	0,1125	0,002025		
	Σ	2,2322	0,0385		

Tabel 14. Nilai Persen Transmisi Pigmentasi Krim 9%

Panjang gelombang	Transmisi Pigmentasi (Tp)	Fluks Pigmentasi (Fp) (Cumpelik, 1972)	T x Fp	%Tp
322.5 nm	3,402	0,1079	0,3670758	

327.5 nm	3,538	0,1020	0,360876	4,5333
332.5 nm	3,736	0,0936	0,3496896	
337.5 nm	3,907	0,0798	0,3117786	
342.5 nm	4,083	0,0669	0,2731527	
347.5 nm	4,325	0,0570	0,246525	
352.5 nm	4,728	0,0488	0,2307264	
357.5 nm	5,423	0,0456	0,2472888	
362.5 nm	6,497	0,0356	0,2312932	
367.5 nm	8,214	0,0310	0,254634	
372.5 nm	10,539	0,0260	0,274014	
Σ		0,6942	3,1470	

4. Hasil Evaluasi Krim

a. Uji Organoleptik

Tabel 15. Hasil Pengujian Organoleptik Krim

Krim	Sebelum penyimpanan			Setelah penyimpanan		
	Bentuk	Warna	Bau	Bentuk	Warna	Bau
F1	Semi padat	Coklat kekuningan	Khas	Semi padat	Coklat kekuningan	Khas
F2	Semi padat	Coklat	Khas	Semi padat	Coklat	Khas
F3	Semi padat	Coklat	Khas	Semi padat	Coklat	Khas

Ket : sebelum penyimpanan : kondisi normal
 setelah penyimpanan : suhu 4°C (24 jam) suhu 40°C (24 jam)
 selama 12 hari

b. Uji Homogenitas

Tabel 16. Hasil Pengujian Homogenitas Krim

Formula Krim	Sebelum penyimpanan	Setelah penyimpanan
F1	Homogen	Homogen
F2	Homogen	Homogen
F3	Homogen	Homogen

Ket : sebelum penyimpanan : kondisi normal

setelah penyimpanan : suhu 4°C (24 jam) suhu 40°C (24 jam)
selama 12 hari

c. Uji pH

Tabel 17. Hasil Pengujian pH Krim

Formula Krim	Sebelum penyimpanan	Setelah penyimpanan
F1	6.5	6.2
F2	5.5	5.5
F3	6.0	6.0

Ket : sebelum penyimpanan : kondisi normal
setelah penyimpanan : suhu 4°C (24 jam) suhu 40°C (24 jam)
selama 12 hari

d. Uji Daya Sebar

Tabel 18. Hasil Pengujian Daya Sebar Krim

Formula Krim	Sebelum penyimpanan (cm)	Setelah penyimpanan (cm)
F1	5	5,1
F2	5,2	5,5
F3	5,9	6

Ket : sebelum penyimpanan : kondisi normal
setelah penyimpanan : suhu 4°C (24 jam) suhu 40°C (24 jam)
selama 12 hari

e. Uji Viskositas

Tabel 19. Hasil Pengujian Viskositas Krim

Formula Krim	Sebelum penyimpanan (cPs)	Setelah penyimpanan (cPs)
F1	31973	31493
F2	34253	33533
F3	39712	39472

Ket : sebelum penyimpanan : kondisi normal
setelah penyimpanan : suhu 4°C (24 jam) suhu 40°C (24 jam)
selama 12 hari

B. Pembahasan

Salah satu spesies *Zingiber* yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional oleh penduduk setempat adalah lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm). Sebagian besar aktivitas biologis yang dilaporkan untuk tanaman ini dikaitkan dengan kandungan fenolik, flavonoid, dan aktivitas antioksidan (Sidoarjo & Java, 2022).

Pada penelitian ini tanaman rimpang lempuyang gajah yang digunakan sebagai formulasi krim tabir surya. Rimpang dicuci bersih, diiris tipis, kemudian dikeringkan hingga berbentuk simplisia, dan ditimbang serta dihaluskan dengan blender. Sampel kemudian ditimbang, selanjutnya sampel siap untuk diekstraksi.

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang terkandung dalam sampel. Ekstraksi dengan cara maserasi yaitu dengan merendam rimpang yang telah dihaluskan dengan pelarut etil asetat.

Setelah itu direndam selama 9 x 24 jam dan diaduk rata sekali sehari dan ganti pelarut etil asetat dengan yang baru setiap 3 x 24 jam. Selanjutnya, dilakukan proses filtrasi hasil maserasi untuk memisahkan filtrat dan residu untuk dilakukan maserasi ulang dengan tujuan mengoptimalkan penarikan senyawa dari rimpang. Filtrat yang terkumpul diuapkan pada suhu rendah dengan menggunakan alat *rotary evaporator*. Tujuan penguapan adalah untuk memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap untuk menghasilkan ekstrak yang kering dan kental (Arin, 2018).

Kemudian dibuat krim dengan mencampurkan dua fase yaitu fase air dan fase minyak serta penambahan ekstrak rimpang lembuyang gajah dengan berbagai konsentrasi untuk mengetahui potensi ekstrak tersebut sebagai tabir surya. Formulasi tabir surya ini menggunakan basis lanolin karena lanolin digunakan dalam formulasi farmasi topikal sebagai bahan dasar krim dan losion emolien (Rowe *et al.*, 2009). Fase minyak dibuat dengan cara melelehkan lanolin, asam stearat, setil alkohol, span 80 dalam penangas air suhu 70°C, kemudian ditambahkan propil paraben. Fase air kemudian dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air yang dipanaskan hingga 70°C, kemudian ditambahkan TEA dan tween 80. Emulsi dibuat dengan menambahkan fase air ke dalam fase minyak sambil diaduk dalam mortar hingga terbentuk corpus emulsi yang stabil. Kemudian masukkan ekstrak rimpang lempuyang gajah secara perlahan dan gerus dalam lumpang sampai diperoleh emulsi yang homogen membentuk krim. Tipe emulsi krim adalah w/o dimana pada saat pencampuran fase minyak sebagai fase eksternal karena dimasukkan terlebih dahulu kemudian fase air sebagai fase internal yang tersebar kedalam minyak (Nurisyah *et al.*, 2020).

Selain bahan emulsi hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan krim adalah HLB. *Hydrophilic-Lyphophilic Balance* (HLB) adalah harga yang perlu dimiliki oleh sebuah emulgator sehingga pertemuan antara fase lipofil dengan air dapat menghasilkan emulsi yang stabil. Namun, pada saat formulasi krim tidak dilakukan perhitungan HLB. Hal ini dapat membuat emulsi yang tidak stabil dan dapat menyebabkan *creaming* (Ansel, 2005). Kombinasi antara kedua surfaktan yang memiliki nilai HLB yang berbeda dapat menentukan

tipe emulsinya. Pengemulsi dengan nilai HLB rendah (4-6) larut dalam minyak dan meningkatkan emulsi air dalam minyak (W/O), sedangkan pengemulsi dengan nilai HLB tinggi (8-18) larut dalam air dan meningkatkan emulsi minyak dalam air (O/W) (Anief, 1999).

Efektivitas tabir surya suatu sediaan ditentukan dengan metode penentuan persentase eritema dan persentase pigmentasi serta nilai sun protection factor (SPF) secara spektrofotometri UV--Vis. Penentuan nilai % transmisi eritema dan % transmisi pigmentasi dilakukan pada ketiga krim konsentrasi 3%, 6%, dan 9% yang mengandung ekstrak rimpang lempuyang gajah yang telah diencerkan 4000 ppm atau 0,1 g krim dilarutkan dalam 25 ml etanol 70% yang selanjutnya diamati serapannya pada spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 292,5-317,5 nm untuk penentuan nilai %Te dan pada panjang gelombang 322,5-372,5 nm untuk penentuan nilai %Tp dengan interval panjang gelombang 5 nm (Widyawati *et al.*, 2019).

Dari pengujian didapatkan hasil bahwa krim konsentrasi ekstrak 3% memiliki % Te 0,4695 dan % Tp 11,2625. Pada konsentrasi ekstrak krim 6% memiliki %Te 0,2822 dan % Tp 6,0583. Krim dengan konsentrasi ekstrak 9% memiliki % Te sebesar 0,0172 dan % Tp sebesar 4,5333. Berdasarkan nilai transmisi eritema dan pigmentasi, dapat disimpulkan bahwa ketiga formulasi krim ini termasuk dalam kategori *sunblock / total block* untuk eritema karena berada pada range (<1 %). Sementara persen transmisi pigmentasi berada dalam kategori *sunblock / total block* karena berada pada range (3-40 %). Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka nilai persen transmisi eritema (%)

Te) dan persen transmisi pigmentasi (% Tp) semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas antioksidan dari ekstrak rimpang lempuyang gajah yang dapat mencegah terjadinya eritema dan pigmentasi (Restika, 2017).

Pengujian *Sun Protection Factor* (SPF) bertujuan untuk mengetahui kemampuan suatu tabir surya dalam menyerap radiasi yang mengenai kulit. SPF adalah nilai yang menunjukkan kekuatan tabir surya dalam melindungi kulit dari sengatan sinar UV. Pengujian SPF dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 290-320 nm setiap interval 5 nm (Harjanti & Nilawati, 2020). Sebelumnya telah dilakukan orientasi uji spf ekstrak lempuyang gajah dan hasilnya pada konsentrasi 6% termasuk dalam kategori proteksi ultra dengan nilai SPF 37,55 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *ultra* dengan range lebih dari 15 sehingga dapat dilanjutkan formulasi.

Dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah maka nilai SPF sediaan semakin tinggi, dimana pada konsentrasi ekstrak 3 % diperoleh nilai SPF sebesar 11,332 dalam hal ini termasuk dalam kategori *maksimal* dengan range 8-15, ekstrak dengan konsentrasi 6% dengan nilai SPF sebesar 13,128 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *maksimal* dengan range 8-15, sedangkan krim dengan konsentrasi ekstrak 9% dengan nilai SPF sebesar 20,689 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori *ultra* dengan range lebih dari 15. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai SPF ekstrak semakin menurun setelah ditambahkan ke dalam formula. Hal ini dapat disebabkan karena dipengaruhi oleh eksipien dari sediaan krim. Bahan

tambahan dalam sediaan mempengaruhi aktivitas ekstrak, karena sediaan dapat menghambat pelepasan kandungan senyawa aktif dari ekstrak untuk berdifusi ke dalam media, sehingga ekstrak yang terkandung dalam sediaan tidak terlepas sepenuhnya dalam media. Oleh karena itu, aktivitas sediaan yang diperoleh lebih rendah daripada aktivitas ekstrak (Ramdani *et al.*, 2021).

Setelah terbentuk krim, dilakukan uji stabilitas fisik menggunakan metode cycling test dengan cara menyimpan sediaan pada suhu 4°C selama 24 jam lalu menyimpannya pada suhu 40°C), selama 24 jam, waktu penyimpanan pada dua suhu yang berbeda tersebut dianggap sebagai satu siklus dan dilakukan selama 12 hari. Parameter stabilitas adalah pengamatan organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, viskositas dan hasil uji cycling (Zam Zam & Musdalifah, 2022).

Selanjutnya dilakukan evaluasi fisik sediaan krim yaitu uji organoleptis untuk melihat tampilan fisik sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang diperoleh, bentuk sediaan berupa setengah padat dengan warna kuning kecoklatan dan bau yang khas. Warna yang dihasilkan oleh krim ekstrak rimpang lempuyang gajah tergantung dari konsentrasi krim yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka warna krim semakin gelap. Hasil pengamatan organoleptik menunjukkan tidak terjadi perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan sebelum dan setelah penyimpanan dipercepat.

Uji homogenitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya bagian-bagian yang belum tercampur dengan baik dalam komposisi krim. Berdasarkan hasil pengujian krim 3%, 6%, 9% menunjukkan krim homogen yang dibuktikan dengan tidak adanya gumpalan pada krim. Hasil pengamatan homogenitas sebelum dan

sesudah penyimpanan menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan atau pemisahan fase yang signifikan pada krim.

Uji pH dilakukan pada ketiga krim untuk mengetahui keamanan sediaan krim saat digunakan, sehingga krim tidak menimbulkan iritasi pada kulit. pH kulit yaitu 4,5-6,5 (Nurisyah *et al.*, 2020). Agar sediaan aman dan cocok dengan kulit, maka sediaan harus berada pada rentang pH tersebut agar tidak terjadi iritasi kulit. Pengujian pH dari ketiga krim ekstrak rimpang lempuyang gajah didapatkan hasil nilai pH yang diinginkan dan aman untuk kulit yakni krim 3% berada pada pH 6,5, krim 6% berada pada pH 5,5, dan krim 9% berada pada pH 6,0. Berdasarkan hasil pengujian pH sebelum dan sesudah penyimpanan terjadi penurunan pH pada formulasi krim 3%, dimana sebelum kondisi penyimpanan dipercepat berada pada pH 6,5 dan pH setelah kondisi penyimpanan dipercepat turun menjadi 6,2. Perubahan pH dapat dipengaruhi oleh media mendekomposisi seperti suhu penyimpanan yang mana hal ini dapat meningkatkan kadar asam atau basa. Faktor lainnya termasuk sinar cahaya dari luar, suhu, penyimpanan yang kurang baik (Dewi *et al.*, 2018).

Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan massa krim sehingga dapat dilihat kemudahan pengolesan sediaan ke kulit. Daya sebar yang baik menyebabkan kontak antara obat dengan kulit menjadi luas, sehingga absorpsi obat ke kulit berlangsung cepat. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal adalah 5-7 cm (Leboe, 2020). Pengujian daya sebar pada krim didapatkan hasil yakni krim 3% memiliki daya sebar 5 cm, krim 6% dengan daya sebar 5,2 cm. Sedangkan krim 9% memiliki daya sebar 5,9 cm. Hal ini dapat disebabkan

karena peningkatan daya sebar berbanding lurus dengan nilai viskositas yang ditunjukkan pada setiap formula. Viskositas krim tersebut semakin menurun selama penyimpanan sehingga tahanan cairan untuk mengalir semakin berkurang sehingga daya sebar krim meningkat (Swastika *et al.*, 2013). Semakin besar daya sebar, luas permukaan kulit yang kontak dengan krim akan semakin luas dan zat aktif akan terdistribusi dengan baik. Krim yang baik memiliki nilai daya sebar yang besar sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah pada permukaan kulit yang luas tanpa penekanan yang berlebihan.

Uji viskositas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekentalan pada sediaan krim. Pengukuran viskositas dilakukan dengan menggunakan viskometer *Brookfield*. Hasil penelitian menunjukkan nilai viskositas krim 3% sebesar 31973 cPs, nilai viskositas krim 6% sebesar 34253 cPs, sedangkan nilai viskositas krim 9% sebesar 39712 cPs. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah dalam sediaan krim maka semakin tinggi juga nilai viskositasnya. Dari hasil pengujian viskositas sebelum dan sesudah penyimpanan, ketiga formulasi krim mengalami penurunan namun tidak terlalu besar yang kemungkinan disebabkan oleh suhu yang tidak terkontrol, kemasan yang kurang kedap udara sehingga menyebabkan krim menyerap uap air dari luar, sehingga volumenya bertambah yang akan menurunkan nilai viskositas krim (M. Safitri *et al.*, 2016). Menurut SNI 16-4399-1996 tentang standar mutu sediaan krim tabir surya, viskositas sediaan yang baik berkisar antara 2000- 50.000 cPs, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga krim tersebut memenuhi standar viskositas yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Krim ekstrak rimpang lempuyang gajah dengan konsentrasi 3% dapat memberikan perlindungan tabir surya/ SPF (*Sun Protection Factor*) sebesar 11,332 pada konsentrasi 6% dapat memberikan perlindungan tabir surya/SPF (*Sun Protection Factor*) sebesar 13,128, dan pada konsentrasi 9% dapat memberikan perlindungan tabir surya/SPF (*Sun Protection Factor*) yang lebih baik karena memiliki nilai sebesar 20,689.
2. Evaluasi fisik krim tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) memberikan kondisi yang stabil sebelum dan setelah dilakukan penyimpanan dipercepat.

B. *Saran*

Disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan perbandingan basis dan mengubah karakteristik fisik krim sehingga baik di nilai pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiana, R., & Anggraini, D. I. (2017). *Rambut jagung (Zea mays L.) Sebagai Alternatif Tabir Surya*. Jurnal Majority, 7(1), 31–35.
- Ahriani. (2021). *Analisis Nilai Absorbansi Pada Penentuan Kadar Flavonoid Daun Jarak Merah (Jatropha Gossypifolia L.)*. Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Alhabsyi, D. F., & Suryanto, E. (2014). *Aktivitas Antioksidan Dan Tabir Surya Pada Ekstrak Kulit Buah Pisang Goroho (Musa Acuminata L.)*. Pharmacon, 3(2), 107–114.
- Amini, A., Hamdin, C. D., Muliastari, H., & Subaidah, W. A. (2020). *Efektivitas Formula Krim Tabir Surya Berbahan Aktif Ekstrak Etanol Biji Wali (Brucea javanica L. Merr.)*. Jurnal Kefarmasian Indonesia, March, 50–58.
- Anief, M. (1999). *Sistem Dispersi Formulasi Suspensi Dan Emulsi*. Gadjamada University Press.
- Ansel, H. C. (2005). *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* (pp. 605–619). UI Press.
- Arin, P. S. (2018). *Pengaruh Lama Waktu Evaporasi Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Dan Kulit Batang Mangrove Sonneratia Caseolaris Dari Pesisir Pantai Serang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur*. Skripsi.
- Ashari, SN. Hanin, HP. Ida, F. Sholichah, R. (2020). *Potensi Senyawa Flavonoid Dalam Tanaman Sebagai Lotion Tabir Surya*. Proceedings National Conference PKM Center, 1(1), 164–166.
- Bhavesh, V. D., Nayak, Y., & Jayashree, B. S. (2013). *In Vitro Antioxidant And Antiglycation Activity Of Zingiber Zerumbet (Wild Zin-Ger) Rhizome Extract*. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4(4), 482–489.
- Cumpelik, B. M. (1972). *Analytical Procedures and Evaluation Of Sunscreen*. Journal of Society of Cosmetic Chemist., 2, 333–345.
- Damogalad, V., Jaya Edy, H., & Sri Supriati, H. (2013). *Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (Ananas Comosus L Merr) Dan Uji in Vitro Nilai Sun Protecting Factor (Spf)*. PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT, 2(02), 2302–2493.
- Daud, N. S., & Musdalipah. (2018). *Optimasi formula losio tabir surya ekstrak kulit buah naga super merah (Hylocereus costaricensis)*. 7(2), 44–68.

- Dewi, D. R. N., Zakkia, L. U., Khoiruddin, W., & Harismah, K. (2018). *Pengaruh Ph Terhadap Lamanya Penyimpanan Sediaan Esktrak Daun Seligi Dan Eugenol Dari Minyak Daun Cengkeh Sebagai Obat Antinyeri*. 2016–2019.
- Faiz, M. al-M. (1991). *1100 hadits terpilih: Sinar ajaran Muhammad*. Gema Insani.
- Handayani, V., Ahmad, A. R., Sudir, M., Etlingera, P., & Sm, R. M. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga dan Daun Patikala (Etlingera elatior (Jack) R . M . Sm) Menggunakan Metode DPPH*. *Pharm Sci Res*, 1(2), 86–93.
- Hanwar, D. (2009). *Pengembangan Obat Antikanker Payudara dari Lempuyang Gajah dan Lempuyang Emprit dengan Kontrol Kualitas Berbasis Senyawa Penanda Zerumbone dan Aktivitas Antikanker pada Sel T47D*. 4–8.
- Harjanti, R., & Nilawati, A. (2020). *Aktivitas Antioksidan dan Potensi Tabir Surya Serum Ekstrak Terpurifikasi Daun Wangon (Oxalis psittacorum (Willd.) Vahl.)*. *Jurnal Farmasi Indonesia*, 17(1), 18–28.
- Hasbullah, K., Nonci, F. Y., & Arsul, M. I. (2020). *Kemuning Leaves Extract Gel (Murraya panicula L.): A Study of Quality and Efficacy in Healing Burns*. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 3(1), 56–65.
- Hasrianti, Nururrahmah, & Nurasia. (2016). *Pemanfaatan Ekstrak Bawang Merah dan Asam Asetat Sebagai Pengawet Alami Bakso*. *Jurnal Dinamika*, 07(1), 9–30.
- Ismail, I., Handayany, N., Wahyuni, D. (2014). *Formulasi dan Penentuan Nilai SPF (Sun Protection Factor) Sediaan Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.)*. *Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar*, 2(1), 6–11.
- Iswindari, D. (2014). *Formulasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Krim Rice Bran Oil*. Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, September.
- Leboe, D. W. (2020). *Formulasi Dan Uji Aktivitas Krim Antioksidan Dan Ekstrak Etanol Daun Binahong(Anredera cordifolia (Ten .) Steenis) Dengan Metode DPPH (1 , 1-diphenyl-2- picrylhydrazil)*. *Jurnal Farmasi*, 8(2), 60–69.
- Lianah. (2020). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mariastuty, E. (2002). *Pengaruh Umur Tanaman Terhadap Kadar, Indeks Bias, Dan Perbandingan Kadar Relatif Sineol Dan Borneol Minyak Atrsiri Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber Zerumbet (L.) J.E. Smith) (p. 5)*.

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.


- Minerva, P. (2019). *Penggunaan Tabir Surya Bagi Kesehatan Kulit*. Jurnal Pendidikan Dan Keluarga, 11(1), 87.
- Mokodompit, A. N., Edy, H. J., & Wiyono, W. (2013). *Penentuan Nilai Sun Protective Factor (SPF) Secara In Vitro Krim Tabir Surya Ekstrak Etanol Kulit Alpukat*. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi, 2(3), 83–85.
- Mudhana, A. R., & Pujiastuti, A. (2021). *Pengaruh Trietanolamin Dan Asam Stearat Terhadap Mutu Fisik Dan Stabilitas Mekanik Krim Sari Buah Tomat*. 04(July), 113–122.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Atlantic Economic Journal, 46(4), 405–417.
- Nakatani, N., Jitoe, A., Masuda, T., & Yonemori, S. (2014). *Flavonoid Constituents of Zingiber zerumbet Smith*. Agricultural and Biological Chemistry.
- Nining, N., Radjab, N. S., & Kholifah, N. (2019). *Kombinasi Tea Stearat Dan Setil Alkohol Dalam Stabilitas Fisik Krim M/A Ekstrak Psidium Guajava L*. Scientia : Jurnal Farmasi Dan Kesehatan, 9(1), 17. <https://doi.org/10.36434/scientia.v9i1.188>
- Nonci, F. Y., Tahar, N., & Aini, Q. (2017). *Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Krim Susu Kuda Sumbawa Dengan Emulgator Nonionik Dan Anionik*. Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar, 4(4), 169–178.
- Nurisyah, N. N., Asyikin, A., & Cartika, H. (2020). *Aktivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etil Asetat Kulit Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Yang Ditetapkan Dengan Metode DPPH*. Media Farmasi, 16(2), 215. <https://doi.org/10.32382/mf.v16i2.1818>
- Parwata, M. O. A. (2016). *Antioksidan*. Kimia Terapan Program Pascasarjana Universitas Udayana, April, 1–54.
- Podungge, M. R., Salimi, Y. K., & Duengo, S. (2017). *Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Daun Miana (Coleus Scutelleroides Benth.)*. Jurnal Entropi, 12(1), 67–74.
- Pratama, W. A., & Zulkarnain, A. K. (2015). *Uji Spf In Vitro dan Sifat Fisik yang Beredar di Pasaran*. Majalah Farmaseutik, 11(1), 275–283.
- Putri, Y. D., Kartamihardja, H., & Lisna, I. (2019). *Formulasi dan Evaluasi Losion Tabir Surya Ekstrak Daun Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni M)*. Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 6(1), 32–36.

- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan ,dan Keserasian Al-Quran*. In *Lentera Hati*.
- Rahmi, H. (2017). *Review: Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber Buah-buahan di Indonesia*. *Jurnal Agrotek Indonesia*, 2(1), 34–38. <https://doi.org/10.33661/jai.v2i1.721>
- Ramdani, Y., Ananto, A. D., & Hajrin, W. (2021). Variasi Metode Ekstraksi Dan Penetapan Nilai SPF Sediaan Lotion Ekstrak Rumput Laut Merah (*Eucheuma cottonii*). 9(1), 31–43.
- Restika, E. (2017). Formulasi Dan Penentuan Potensi Tabir Surya Dari Krim Ekstrak Metanol Umbi Ubi Kelapa Ungu (*Dioscorea Alata* Var *Purpurea*).
- Rowe, R. C., Sheskey, P. J., & Quinn, M. E. (2009). *Pharmaceutical excipients. HandBook of Pharmaceutical*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820007-0.00032-5>
- Safitri, M., Zaky, M., & Erawati, E. (2016). *Pengembangan Formulasi dan Evaluasi Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol 70% Daun Labu Siam (Sechium edule (Jacq.)Swatz)*. *Farmagazine, III*(2), 7.
- Safitri, N. A., Puspita, O. E., & Yurina, V. (2014). *Optimasi Formula Sediaan Krim Ekstrak Stroberi (Fragaria x ananassa) sebagai Krim Anti Penuaan*. *Majalah Kesehata FKUB*, 9(1), 27.
- Salwa, Kadir, M. B. A., & Sulistyowati, Y. (2020). *Formulasi dan Evaluasi Sediaan Spray Gel Tabir Surya Fraksi Etil Asetat Daun Cempedak (Artocarpus integer (Thunb.) Merr.) dengan Kombinasi Basis HPMC dan Karbopol 940*. *Jurnal Kesehatan Mahasiswa UNIK.*, 2(1), 12–23.
- Sami, F. J., Nur, S., & Martani, M. M. (2015). *Uji Aktivitas Tabir Surya Pada Beberapa Spesies Dari Family Zingiberaceae Dengan Metode Spektrofotometri*. *Jurnal Ilmiah As-Syifaa*, 7(2), 164–173. <https://doi.org/10.33096/jifa.v7i2.8>
- Saryanti, D., Setiawan, I., & Safitri, R. A. (2019). *Optimasi Formula Sediaan Krim M/A Dari Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa acuminata L.)*. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 1(3), 225–237.
- Sayre, R. M., Agin, P. P., LeVee, G. J., & Marlowe, E. (1979). *a Comparison of in Vivo and in Vitro Testing of Sunscreening Formulas*. *Photochemistry and Photobiology*, 29(3), 559–566. <https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.1979.tb07090.x>
- Septiannisa, M. (2020). Pembuatan Dan Penentuan Nilai Spf (Sun Protecting Factor) Sediaan Krim Tabir Surya Dari Limbah Sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*).


- Sheskey, P. J., Cook, W. G., & Cable, C. G. (2017). Handbook of Pharmaceutical Excipients.
- Sidoarjo, U. M., & Java, E. (2022). Antioxidant activities using dpph, fic, frap, and abts methods from ethanolic extract of lempuyang gajah rhizome . 7(2).
- Silalahi, M. (2018). *Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.)*. *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 147–160.
- Sudarwati, T. P. L., & Fernanda, M. A. H. F. (2019). Aplikasi Pemanfaatan Daun Pepaya (*Carica Papaya*) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Aedes Aegypti. Graniti.
- Suhartati, T. (2017). Dasar-Dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa Organik. Anugrah Utama Raharja.
- Swastika, A., Mufrod, & Purwanto. (2013). *Antioxidant Activity Of Cream Dosage Form Of Tomato Extract (Solanum lycopersicum L.)*. *Traditional Medicine Journal*, 18(3), 2013.
- Wahyuddin, M., Dhuha, N. S., Leboe, D. W., Febriyanti, A. P., & Tahar, N. (2020). *Formulasi Dan Uji Stabilitas Krim Antioksidan Sari Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Dengan Menggunakan Variasi Emulgator*. *Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar*, 8(1), 21–31.
- Wardiyah, S. (2015). *Perbandingan Sifat Fisik Sediaan Krim, Gel, Dan Salep Yang Mengandung Etil P- Metoksisinamat Dari Ekstrak Rimpang Kencur (Kaempferia Galanga Linn.)*. Skripsi, 20–25.
- Widyawati, E., Ayuningtyas, N. D., & Pitarisa, A. P. (2019). *Penentuan Nilai Spf Ekstrak Dan Losio Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Kersen (Muntingia calabura L.) Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 1(3), 189–202. <https://doi.org/10.33759/jrki.v1i3.55>
- Wiranto, A. (2021). Formulasi Dan Penetapan Potensi Tabir Surya Ekstrak Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia L.*) Dalam Bentuk Sediaan Krim.
- Zam Zam, A. N., & Musdalifah, M. (2022). *Formulasi dan Evaluasi Kestabilan Fisik Krim Ekstrak Biji Lada Hitam (Piper nigrum L.) Menggunakan Variasi Emulgator*. *Journal Syifa Sciences and Clinical Research*, 4(2), 304–313.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




Lampiran 2. Ekstraksi Sampel




Lampiran 3. Prosedur Pembuatan Krim

Lampiran 4. Evaluasi Sediaan Krim


a. Uji Organoleptis




b. Uji Homogenitas




c. Uji pH




d. Uji Daya Sebar



e. Uji Viskositas



Lampiran 5. Uji Potensi Tabir Surya

Lampiran 6. Perhitungan Kadar 4000 ppm


$$\text{ppm} = \frac{\mu\text{g}}{\text{ml}}$$

$$4000 \text{ ppm} = \frac{\mu\text{g}}{25\text{ml}}$$

$$\mu\text{g} = 4000 \text{ ppm} \times 25 \text{ ml}$$

$$\mu\text{g} = 100000$$

$$100000 \mu\text{g} \approx 100 \text{ mg} \approx 0,1 \text{ gram}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7. Perhitungan Nilai HLB Emulsi

Diketahui :

$$\text{HLB Tween 80} = 15$$

$$\text{HLB Span 80} = 4,3$$

$$\text{HLB Lanolin} = 10$$

$$\text{HLB Asam Stearat} = 15$$

$$\text{HLB Setil Alkohol} = 15$$

Emulgator yang dibutuhkan 5%

$$\text{HLB Lanolin} = \frac{3}{18} \times 10 = 1,66$$

$$\text{HLB Asam Stearat} = \frac{10}{18} \times 15 = 8,3$$

$$\text{HLB Setil Alkohol} = \frac{5}{18} \times 15 = 4,1$$

$$\text{HLB Campuran (X)} = 1,66 + 8,33 + 4,16 = 14,06$$

Rumus :

$$(B_1 \times \text{HLB}_1) + (B_2 \times \text{HLB}_2) = (B \text{ campuran} \times \text{HLB campuran})$$

Penyelesaian :

Keterangan :

B = Berat emulgator

Misalnya berat tween 80 = a

berat span 80 = 5-a

$$(a \times 15) + (5-a) \times 4,3 = 5 \times 14$$

$$15a + 21,5 - 4,3a = 70$$

$$10,7a = 70 - 21,5$$

$$10,7a = 48,5$$

$$a = \frac{48,5}{10,7} = 4,53$$

$$5 - a = 5 - 4,53$$

$$= 0,47$$

Lampiran 8. Perhitungan Nilai SPF Krim

a. Krim 3%

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} \text{EE}(\lambda) \times \text{I}(\lambda) \times \text{A}(\lambda)$$

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} 0,0179 + 0,1027 + 0,3405 + 0,3651 + 0,1996 + 0,0884 + 0,0187$$

$$\text{SPF} = 10 \times 1,1332$$

$$\text{SPF} = 11,332$$

b. Krim 6%

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} \text{EE}(\lambda) \times \text{I}(\lambda) \times \text{A}(\lambda)$$

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} 0,0193 + 0,1159 + 0,3905 + 0,4251 + 0,2343 + 0,1049 + 0,0225$$

$$\text{SPF} = 10 \times 1,318$$

$$\text{SPF} = 13,128$$

c. Krim 9%

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} \text{EE}(\lambda) \times \text{I}(\lambda) \times \text{A}(\lambda)$$

$$\text{SPF} = \text{CF} \times \sum_{320}^{290} 0,0246 + 0,2022 + 0,8564 + 1,2125 + 0,6997 + 0,3321 + 0,0719$$

$$\text{SPF} = 10 \times 2,0689$$

$$\text{SPF} = 20,689$$

Lampiran 9. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim 3%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma(T \times F_e)}{\Sigma f_e}$$

$$\% T_e = \frac{E_e}{\Sigma f_e} = \frac{\Sigma(0,0040+0,1075+0,4250+0,1644+0,1658+0,1811)}{2,2322}$$

$$\% T_e = \frac{1,0480}{2,2322}$$

$$\% T_e = 0,4695$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma(T \times F_p)}{\Sigma f_p}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\Sigma f_p} = \frac{\Sigma(1,0634+1,0185+0,9542+0,9542+0,8249+0,7009+0,6129)}{0,5085+0,5671+0,5004+0,5118+0,509886}$$

$$\% T_p = \frac{7,8184}{0,6942}$$

$$\% T_p = 11,2625$$

Lampiran 10. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim 6%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% T_e = \frac{E_e}{\sum f_e} = \frac{\sum(T \times F_e)}{\sum f_e}$$

$$\% T_e = \frac{E_e}{\sum f_e} = \frac{\sum(0,0023+0,0651+0,2600+0,1004+0,0983+0,1038)}{2,2322}$$

$$\% T_e = \frac{0,6300}{2,2322}$$

$$\% T_e = 0,2822$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_p = \frac{E_p}{\sum f_p} = \frac{\sum(T \times F_p)}{\sum f_p}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\sum f_p} = \frac{\sum(0,5602+0,5291+0,4915+0,4195+0,3534+0,3101+0,2860+0,3051+0,2863+0,3179+0,3460)}{0,6942}$$

$$\% T_p = \frac{4,2057}{0,6942}$$

$$\% T_p = 6,0583$$

Lampiran 11. Perhitungan Persen Transmisi Eritema dan Persen Transmisi

Pigmentasi Krim 9%

a. Persen Transmisi Eritema

$$\% T_e = \frac{E_e}{\sum f_e} = \frac{\sum(T \times F_e)}{\sum f_e}$$

$$\% T_e = \frac{E_e}{\sum f_e} = \frac{\sum(0,0026+0,0127+0,0160+0,0028+0,0023+0,0020)}{2,2322}$$

$$\% T_e = \frac{0,0385}{2,2322}$$

$$\% T_e = 0,0172$$

b. Persen Transmisi Pigmentasi

$$\% T_p = \frac{E_p}{\sum f_p} = \frac{\sum(T \times F_p)}{\sum f_p}$$

$$\% T_p = \frac{E_p}{\sum f_p} = \frac{\sum(0,3670+0,3608+0,3496+0,3117+0,2731+0,2465+0,2307+0,2472+0,2312+0,2546+0,2740)}{0,6942}$$


$$\% T_p = \frac{3,1470}{0,6942}$$

$$\% T_p = 4,5333$$

Lampiran 12. Tanaman Lempuyang Gajah

Gambar 2. Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe

ex Sm

Lampiran 13. Hasil Uji SPF Krim 3%**Gambar 3. Kurva Pengujian SPF Krim 3%**

Scanning
Test Name: Default
3:47pm 26Dec22


Wavelength	Abs
290.0	1.195
295.0	1.258
300.0	1.185
305.0	1.114
310.0	1.071
315.0	1.054
320.0	1.044

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The table provides the specific absorbance values for the 3% cream sample at various wavelengths. The absorbance values are: 1.195 at 290.0 nm, 1.258 at 295.0 nm, 1.185 at 300.0 nm, 1.114 at 305.0 nm, 1.071 at 310.0 nm, 1.054 at 315.0 nm, and 1.044 at 320.0 nm.

Gambar 4. Nilai Absorbansi Krim 3%

Lampiran 14. Hasil Uji SPF Krim 6%**Gambar 5. Kurva Pengujian SPF Krim 6%**


Scanning
Test Name: _Default_
3:53pm 26Dec22

Wavelength	Abs
290.0	1.289
295.0	1.419
300.0	1.359
305.0	1.297
310.0	1.257
315.0	1.251
320.0	1.252

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Edit Measure
Baseline Graph Data Sample

Gambar 6. Nilai Absorbansi Krim 6%

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 15. Hasil Uji SPF Krim 9%**Gambar 7. Kurva Pengujian SPF Krim 9%**

Scanning
Test Name: _Default_ 5:29pm 26Dec22

Wavelength	Abs
290.0	1.646
295.0	2.476
300.0	2.980
305.0	3.699
310.0	3.754
315.0	3.959
320.0	3.996


ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

The figure is a table of absorbance values for the 9% SPF cream. The columns are 'Wavelength' and 'Abs'. The data points are: (290.0, 1.646), (295.0, 2.476), (300.0, 2.980), (305.0, 3.699), (310.0, 3.754), (315.0, 3.959), and (320.0, 3.996). The interface includes a menu with options: Collect, Baseline, Graph, Data, Edit, and Measure Sample.

Gambar 8. Nilai Absorbansi Krim 9%

Lampiran 16. Hasil Uji Eritema Krim 3%



Gambar 9. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 3%

Scanning
Test Name: _Default_
6:06pm 26Dec22


Wavelength	%T
292.5	0.037
297.5	0.160
302.5	0.425
307.5	0.819
312.5	1.216
317.5	1.610

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22

Collect	Graph	Edit	Measure
Baseline		Data	Sample

Gambar 10. Persen Transmisi Eritema Krim 3%

Lampiran 17. Hasil Uji Eritema Krim 6%




Gambar 11. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 6%

Scanning
Test Name: _Default_ 6:08pm 26Dec22
Wavelength %T
292.5 0.021
297.5 0.097
302.5 0.260
307.5 0.500
312.5 0.721
317.5 0.923
ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Edit Measure
Baseline Graph Data Sample

Wavelength	%T
292.5	0.021
297.5	0.097
302.5	0.260
307.5	0.500
312.5	0.721
317.5	0.923

Gambar 12. Persen Transmisi Eritema Krim 6%

Lampiran 18. Hasil Uji Eritema Krim 9%



Gambar 13. Kurva Persen Transmisi Eritema Krim 9%


Scanning
Test Name: _Default_ 6:17pm 26Dec22
Wavelength %T
292.5 0.024
297.5 0.019
302.5 0.016
307.5 0.014
312.5 0.017
317.5 0.018
ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Graph Edit Measure
Baseline Data Sample

Wavelength	%T
292.5	0.024
297.5	0.019
302.5	0.016
307.5	0.014
312.5	0.017
317.5	0.018

Gambar 14. Persen Transmisi Eritema Krim 9%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 19. Hasil Uji Pigmentasi Krim 3%



Gambar 15. Kurva Persen Transimi Pigmentasi Krim 3%

Scanning
Test Name: _Default_ 6:25pm 26Dec22

Wavelength	%T
322.5	9.856
327.5	9.986
332.5	10.195
337.5	10.338
342.5	10.478
347.5	10.754
352.5	11.351
357.5	12.437
362.5	14.058
367.5	16.510

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Graph Edit Measure
Baseline Data Sample


Scanning
Test Name: _Default_ 6:26pm 26Dec22

Wavelength	%T
372.5	19.611

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Graph Edit Measure
Baseline Data Sample

Gambar 16. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 3%

Lampiran 20. Hasil Uji Pigmentasi Krim 6%



Gambar 17. Kurva Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%

Scanning
Test Name: _Default_ 6:23pm 26Dec22

Wavelength	%T
322.5	5.192
327.5	5.188
332.5	5.252
337.5	5.258
342.5	5.284
347.5	5.441
352.5	5.861
357.5	6.692
362.5	8.044
367.5	10.255

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Graph Edit Measure
Baseline Data Sample


Scanning
Test Name: _Default_ 6:23pm 26Dec22

Wavelength	%T
372.5	13.311

ID#: 1
Baseline collected 26Dec22
Collect Graph Edit Measure
Baseline Data Sample

Gambar 18. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 6%

Lampiran 21. Hasil Uji Pigmentasi Krim 9%



Gambar 19. Kurva Persen Pigmentasi Krim 9%

Wavelength	%T
322.5	3.402
327.5	3.538
332.5	3.736
337.5	3.907
342.5	4.083
347.5	4.325
352.5	4.728
357.5	5.423
362.5	6.497
367.5	8.214

Wavelength	%T
372.5	10.539

Gambar 20. Persen Transmisi Pigmentasi Krim 9%

Lampiran 22. Hasil Evaluasi Uji Organoleptik Krim



Gambar 21. Uji Organoleptik pada kondisi sebelum penyimpanan





Gambar 22. Uji Organoleptik pada kondisi setelah penyimpanan

Keterangan :

F1 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 %

F2 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 %

F3 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 %

Lampiran 23. Hasil Evaluasi Uji Homogenitas Krim**Gambar 23. Uji homogenitas pada kondisi sebelum penyimpanan****Gambar 24. Uji homogenitas pada kondisi setelah penyimpanan**


Keterangan :

F1 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 %


F2 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 %

F3 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 %

Lampiran 24. Hasil Evaluasi Uji pH Krim



Gambar 25. Uji pH pada kondisi sebelum penyimpanan



Gambar 26. Uji pH pada kondisi setelah penyimpanan


Keterangan :

F1 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 %


F2 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 %

F3 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 %

Lampiran 25. Hasil Evaluasi Uji Daya Sebar Krim



Gambar 27. Uji daya sebar pada kondisi sebelum penyimpanan



Gambar 28. Uji daya sebar pada kondisi setelah penyimpanan


Keterangan :

F1 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 %

F2 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 %

F3 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 %

Lampiran 26. Hasil Evaluasi Uji Viskositas Krim



Gambar 29. Uji viskositas pada kondisi sebelum penyimpanan



Gambar 30. Uji viskositas pada kondisi setelah penyimpanan

Keterangan :

F1 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 3 %

F2 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 6 %

F3 : Krim dengan konsentrasi ekstrak rimpang lempuyang gajah 9 %

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Fitrawati Amalia Ashar dilahirkan di Sinjai pada tanggal 26 Agustus 2000. Peneliti merupakan anak kedua dari pasangan (Alm) Ashar Salahuddin dan Dahniar, dan memiliki satu orang kakak bernama Ahmad Fuad Ashar dan dua orang adik bernama Sri Reski Marhamah Ashar dan Jihan Faqiha Ashar. Saat ini peneliti berdomisili di Makassar di Kompleks Agraria Blok Q/13.

Peneliti memulai jenjang pendidikan di TK Pertiwi X Sinjai Utara pada tahun 2006, kemudian melanjutkannya di SD Negeri 3 Sinjai Utara pada tahun 2007-2012, dan memasuki SMP Negeri 2 Sinjai Utara pada tahun 2013-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Makassar pada tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di kampus peradaban Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R