

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
CEDERA KEPALA BERAT DENGAN PENURUNAN
KESADARAN MENGGUNAKAN INTERVENSI
TERAPI MUROTTAL
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


Tugas Akhir Ners

Oleh:

HAJRA, S.KEP
NIM: 70900122021

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN
CEDERA KEPALA BERAT DENGAN PENURUNAN
KESADARAN MENGGUNAKAN INTERVENSI
TERAPI MUROTTAL
DI RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HAJRA, S.KEP
NIM: 70900122021

**PROFESI NERS ANGKATAN XXI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022/2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajra, S.Kep
NIM : 70900122021
Tempat/Tgl.Lahir : Bolaromang, 22 Maret 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Cedera Kepala* dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Terapi Murottal* Di Ruang ICU RSUP.Dr Wahidin Sudirohusoso Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Juni 2023

Penyusun,

Hajra, S.Kep

NIM:70900122021


PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Hajra, S.Kep NIM: 70300122021, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Cedera Kepala* dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Terapi Muottal* Di Ruang ICU RSUP.Dr Wahidin Sudirohusoso Makassar”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 05 Juni 2023


Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing I


Andi Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Cedera Kepala Dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Hajra, S.Kep, NIM: 70300122021, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 19 Juni 2023, bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1444 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, Juni 2023 M
Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy I : Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Munaqisy II : Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed (.....)

Pembimbing I : Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Pembimbing II : Andi Budianto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Cedera Kepala* dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Terapi Murottal* Di Ruang ICU RSUP.Dr Wahidin Sudirohusoso Makassar” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.


Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ardian Adhiwijaya,S.Kep.,Ns.,M.Kep dan Andi Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhitung atas doa dan dukungannya selama ini terutama kepada kedua orang tua.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Gowa, 05 Juni 2023



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	iii
PERSETUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Medis	6
1. Definisi	6
2. Etiologi	6
3. Klasifikasi	7
4. Patofisiologi	8
5. Manifestasi Klinis	9
6. Penatalaksanaan	12
7. Pemeriksaan Penunjang	12
8. Komplikasi	13
B. Konsep Asuhan Keperawatan	15
1. Pengkajian	15
2. Diagnosis Keperawatan.....	18

3. Rencana/Intervensi Keperawatan.....	23
4. Implementasi Keperawatan.....	26
5. Evaluasi Keperawatan.....	26
6. Teori Keperawatan.....	26
C. Evidence Based Practice in Nursing	28
1. Pengertian	28
2. Tujuan	30
3. Indikasi.....	30
4. Kontraindikasi.....	31
5. Prosedur Pemberian	31
6. Kriteria Evaluasi.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Rancangan Studio Kasus.....	32
B. Subyek Studi Kasus	32
C. Fokus Studio Kasus	32
D. Instrumen Studi Kasus.....	33
E. Prosedur Pengambilan Data	35
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	36
G. Analisis Data dan Penyajian Data.....	37
H. Etika Studi Kasus	37
BAB IV LAPORAN KASUS.....	38
A. Pengkajian	38
B. Diagnosa Keperawatan.....	53
C. Rencana Tindakan Keperawatan.....	54
D. Implementasi Dan Evaluasi	57

BAB V PEMBAHASAN.....	66
A. Analisis Asuhan Keperawatan.....	66
1. Analisis Pengkajian Keperawatan	66
2. Analisis Diagnosa Keperawatan	67
3. Analisis Intervensi Keperawatan	70
4. Analisis Implementasi Keperawatan	72
5. Analisis Evaluasi Keperawatan	74
B. Analisisn Intervensi EBPN.....	76
C. Keterbatasan	80
BAB VI PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
Lampiran Jurnal Utama	88
Lampiran Dokumentasi Implementasi.....	89

ABSTRAK

Nama : Hajra

NIM :70900122021

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Terapi Murottal* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

Latar belakang: Cedera kepala merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya kecacatan dan kematian di dunia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi cedera kepala di Indonesia sebesar 11,9%. Sulawesi Selatan menempati urutan ke-6 dengan prevalensi 15% setelah NTT. Penyebab trauma kepala terbanyak adalah kecelakaan lalu lintas yaitu 36,08%. Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi klinis dari cedera kepala yang memerlukan perhatian dan penanganan segera untuk mengurangi kecacatan dan mencegah kematian. Penanganan gangguan kesadaran dapat secara farmakologis dan nonfarmakologis. Terapi nonfarmakologis yang dapat diberikan adalah *Terapi Murottal*. **Tujuan** penulisan ini adalah untuk memberikan pasien dengan trauma kepala berat dan penurunan kesadaran melalui intervensi *Terapi Murottal* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo untuk memberikan perawatan. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan keperawatan yang dengan 1 responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data adalah evaluasi kegawatdaruratan dan perawatan gawat darurat. Penelitian ini dilakukan di *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan berlangsung selama 3 hari secara berturut-turut, yakni dari tanggal 21 hingga 23 Februari 2023. **Hasil:** Setelah diberikan intervensi *Terapi Murottal* pasien mengalami peningkatan kesadaran dari GCS E2 M2 Vx menjadi GCS E3 M4 Vx yaitu pasien telah mampu mengikuti perintah untuk membuka mata, dan telah mampu menggerakkan salah satu anggota tubuhnya ketika di beri rangsangan nyeri, status hemodinamik klien mulai membaik dari 140/70mmHg turun menjadi 131/80mmHg. **Kesimpulan dan saran:** Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kasus yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan intervensi *Terapi Murottal* yang dilakukan selama tiga hari berturut-turut dapat membantu meningkatkan kesadaran pasca intervensi. Hal ini menunjukkan bahwa *Terapi Murottal* efektif mengatasi gangguan kesadaran pada pasien cedera kepala berat. Saran untuk peneliti selanjutnya: Gunakan *Terapi Murottal* secara terus menerus dan sebaiknya intervensi diberikan sebelum diberikan obat sedasi dan sebaiknya intervensi di terapkan selama 7 hari berterut-turut untuk mendapatkan hasil terbaik.

Kata Kunci: Cedera Kepala Berat, Kesadaran Menurun, *Terapi Murottal*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cedera kepala adalah suatu trauma pada kulit kepala, tulang tengkorak, atau otak, yang terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari suatu cedera, dengan atau tanpa perdarahan, yang mengakibatkan gangguan fungsi otak. Cedera kepala dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesadaran seseorang. Sampai saat ini, cedera kepala merupakan salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian di seluruh dunia (Maulidya, 2019).

Global Burden of Disease (GBD) tahun 2020 memperkirakan ada lebih dari 27 juta kasus cedera kepala setiap tahun, dengan tingkat rata-rata 369 per 100.000 orang. 90% kematian akibat cedera kepala terjadi di negara berkembang. Afrika merupakan salah satu negara berkembang dengan kasus cedera kepala yang diperkirakan sekitar 8 juta kasus per tahun dengan rata-rata 801 per 100.000 orang akibat kecelakaan lalu lintas.

Menurut WHO (*World Health Assosation*), pada tahun 2021 sejauh ini, kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia telah menelan korban satu juta orang dan 1,2 juta meninggal dunia dengan diagnosis cedera kepala berat, yaitu karena kecelakaan lalu lintas atau orang yang mengalami cedera. Korban adalah pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, pengendara sepeda motor, anak-anak, dan penumpang. (Peterson et al., 2022).

Berdasarkan data Riskesdas 2019, prevalensi cedera kepala sebesar 11,9% terjadi di Indonesia. Gorontalo menempati urutan pertama dengan cedera kepala terbanyak yaitu 17,9 %. Sementara itu, Sulawesi Selatan menempati posisi keenam setelah NTT dengan prevalensi 15 %. Penyebab cedera kepala paling banyak terjadi pada kecelakaan mobil yaitu 36,08 %. Rata-rata pada individu yang mengalami cedera kepala terjadi luka pada kepala, luka pada tubuh bagian bawah dan bagian atas dengan kesamaan 67,9 % dan 32,7 % (Kemenkes RI, 2019).

Penurunan kesadaran merupakan salah satu manifestasi klinis dari cedera kepala yang memerlukan perhatian dan penanganan segera untuk mengurangi kecacatan dan komplikasi lain seperti kejang, kematian otak, edema serebral,

perdarahan intrakranial, serta dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, peran tenaga keperawatan dalam pemberian asuhan sangat penting untuk meningkatkan keadaan kesadaran dan meminimalkan kecacatan. Berbagai intervensi keperawatan telah dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesadaran pasien, antara lain oksigenasi, pengaturan posisi, dan stimulasi visual, auditori, taktil, perasa, dan penciuman (Yusuf, Z.K., 2019). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stimulasi sensorik dapat meningkatkan keadaan kesadaran pasien dan mencegah kerusakan sel otak akibat iskemia akibat cedera kepala (Enny & Endah, 2021).

Stimulasi sensoris yang diberikan berupa stimulasi olfaktori, auditori, taktil, dan gustator karena bagian tubuh yang tetap berfungsi ketika mengalami penurunan kesadaran adalah indera pendengaran, sehingga dalam meningkatkan kesadaran intervensi yang paling berpengaruh adalah stimulus auditori sensori (Maulidya et al., 2019). Stimulus auditori sensori akan merangsang aktivitas Reticular Activating System (RAS) sehingga dapat membuat pasien sadar terhadap diri dan lingkungannya (Yusuf, 2021).

Bacaan Murottal Al-Qur'an akan menghasilkan suara, selain itu hikmah yang terkandung dalam bacaan Al-Qur'an akan membawa ketenangan bagi pasien. Murottal adalah musik dengan intensitas 50 desibel yang memberikan efek positif bagi pendengarnya. Murottal bacaan Al-Qur'an memiliki irama yang konstan, teratur, dan nada yang rendah sehingga memberikan efek relaksasi dan dapat mengurangi kecemasan, khususnya pada pasien cedera kepala yang mengalami kehilangan kesadaran untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Arief Sutiyoso, 2020, menjelaskan pengaruh bacaan murottal Al-Qur'an dalam peningkatan kesadaran.

Salah satu nama dalam Al-Qur'an adalah Asy-Syifa yang berarti obat penyembuh. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Yunus:57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Yā ayyuhan-nāsu qad jā'atukum mau'izatum mir rabbikum wa syifā`ul limā fiş-şuduri wa hudaw wa rahmatul lil-mu`minīn

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman” (Q.S Yunus:(10);57).

Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitabnya, *Zad al-Ma’ad*, bahwa Al-Qur’an adalah obat yang sempurna untuk semua penyakit fisik dan hati, serta penyakit dunia dan akhirat. Tidak semua orang memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk mengubahnya menjadi obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan berbaring pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan yang sempurna, niscaya penyakit apa pun tidak akan mampu menghadapinya.

Berdasarkan hasil pengamatan di ruangan *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo rata-rata pasien yang dirawat merupakan pasien dengan penurunan kesadaran dan beberapa diantaranya disebabkan karena cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Pemanfaatan terapi non farmakologi berupa stimulasi sensoris auditori dengan mendengarkan lantunan murottal Al-Qur’an belum dilakukan di ruangan ICU dan kadang hanya dilakukan oleh pihak keluarga pasien tapi setiap dikakukan oleh keluarga pasien tidak dilakukan evaluasi setelah dilakukan maka dari itu belum diketahui apakah ada perubahan yang terjadi pada pasien atau tidak. Sementara itu, hasil wawancara dengan salah satu perawat di ruang ICU juga mengatakan bahwa kunjungan keluarga bagi pasien yang dirawat di ruang ICU sangat dibatasi dan hanya diperbolehkan pada saat-saat kondisi tertentu seperti pasien mengalami penurunan kondisi, hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menerapkan hasil penelitian tentang stimulasi sensoris auditori/pendengaran, khususnya murottal Al-Qur’an yang diberikan pada pasien cedera kepala berat dan penurunan kesadaran, untuk meningkatkan Glasgow coma Scale Di Ruang ICU RSUP.Dr. Wahidin Sudirohusodo.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana asuhan keperawatan pada pasien trauma kepala berat yang mengalami penurunan kesadaran di ruang *Intensive Care Unit (ICU)* RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Dilakukan asuhan keperawatan dengan pemberian intervensi stimulasi *Terapi Murottal* pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- b. Menentukan diagnosis keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- c. Menyusun intervensi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- d. Melaksanakan implementasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- e. Melakukan evaluasi keperawatan pada cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.
- f. Mengetahui analisis asuhan keperawatan dengan intervensi stimulasi *Terapi Murottal* pada pasien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran di ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis keperawatan, atau sebagai alternatif pemecahan masalah pada pasien trauma kepala berat dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral menggunakan intervensi terapi murottal di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Keluarga

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi media dalam meningkatkan pengetahuan untuk mengatasi masalah terhadap anggota keluarga yang mengalami penurunan kesadaran, serta dapat menjadi acuan keluarga agar dapat membantu pasien dalam mengurangi komplikasi yang akan disebabkan oleh masalah cedera kepala dengan penurunan kesadaran yang dialami pasien.

b. Bagi Petugas

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi acuan dalam penyampaian intervensi Terapi Murottal dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus cedera kepala berat dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial menggunakan intervensi Terapi Murottal di setting yang berbeda, dalam perawatan kesehatan di masyarakat.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan tugas akhir ini dapat menjadi referensi pembelajaran atau atau berkontribusi dalam program tridharma, khususnya terkait dengan pemberian asuhan keperawatan, khususnya terkait dengan pemberian intervensi terapi murottal. Pada kasus cedera kepala berat dengan masalah seperti penurunan kesadaran atau dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Medis

1. Definisi

Traumatic brain injury adalah gangguan fungsi otak atau patologi otak yang disebabkan oleh kekuatan eksternal dan dapat terjadi di mana saja, termasuk mengemudi, di rumah, di tempat kerja, selama berolahraga, atau di medan perang (Manley, 2021).

Cedera kepala adalah trauma yang mempengaruhi struktur kepala dan dapat mengakibatkan kelainan struktur dan atau disfungsi jaringan otak. Cedera kepala merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan pada kelompok usia produktif dan paling sering terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Penilaian awal dan tindakan di IGD menentukan penatalaksanaan dan prognosis selanjutnya (Maulidya, 2019).

Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak akut yang disebabkan oleh benturan energi mekanik di kepala dari kekuatan eksternal. Identifikasi klinis TBI mencakup satu atau lebih kriteria berikut: kebingungan atau disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca-trauma, atau kelainan neurologis lainnya (gejala neurologis fokal, kejang, lesi intrakranial) (Peterson et al., 2022).

2. Etiologi

Menurut Tarwoto (2019), penyebab cedera kepala adalah karena trauma, yang terbagi menjadi beberapa faktor yaitu:

- a. Trauma primer Trauma primer disebabkan oleh benturan langsung atau tidak langsung (akselerasi dan deselerasi)
- b. Trauma sekunder Terjadi sebagai akibat truma saraf umum (melalui akson) yang meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hiperkapnea atau hipotensi sistemik
- c. Kecelakaan lalu lintas.
- d. Benturan dan luka tumpul di kepala.

- e. Terjatuh.
- f. Benturan langsung di kepala.
- g. Kecelakaan pada saat berolahraga.
- h. Kecelakaan industri/kerja.

Menurut Nanda (2021), mekanisme cedera kepala meliputi akselerasi, deselerasi, akselerasi-deselerasi, coup-contecoup, dan cedera rotasi.

- a. Cedera Akselerasi terjadi saat benda bergerak seperti saat tongkat mengenai kepala atau peluru yang ditembakkan ke kepala.
- b. Cedera Deselerasi terjadi ketika kepala yang bergerak membentur benda diam, seperti jatuh atau kecelakaan mobil dimana kepala membentur kaca depan mobil.
- c. Cedera akselerasi dan deselerasi sering terjadi pada kecelakaan bermotor dan kekerasan fisik.
- d. Cedera coup-contre-coup terjadi ketika benturan pada kepala menyebabkan otak bergerak di dalam ruang tengkorak dan mengerahkan kekuatan pada area tengkorak yang berlawanan dan area kepala yang menerima pukulan awal. Misalnya pasien mendapat pukulan di leher.
- e. Cedera rotasi terjadi ketika pukulan/benturan menyebabkan otak berputar di dalam rongga tengkorak, yang mengakibatkan peregangan atau robeknya neuron di substansi alba serta pecahnya pembuluh darah yang menghubungkan otak ke bagian dalam rongga tengkorak.

3. Patofisiologi

Cedera kepala terjadi akibat trauma kepala. Trauma yang dapat menyebabkan cedera kepala antara lain tidak sengaja jatuh, kecelakaan mobil dan bermotor, benturan dengan benda tajam dan tumpul, benturan dengan benda bergerak, dan benturan kepala pada benda yang tidak bergerak. Cedera kepala secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kepala, yang mengakibatkan cedera pada kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, dan kerusakan jaringan otak serta gangguan saraf (Manurung, 2020).

Pasien trauma kepala mengalami perdarahan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial, dan penurunan tekanan perfusi serebral. Saat kondisinya

memburuk, terjadi bradikardi (penurunan detak jantung) dan bahkan penurunan frekuensi respirasi. Tekanan darah di otak terus meningkat dan semua fungsi vital terganggu, mengakibatkan hilangnya kesadaran bahkan kematian (Widyawati, 2021).

4. Klasifikasi

Trauma kapitis diklasifikasikan menurut nilai dari Glasgow Coma Scale (GCS) yaitu :

1. Ringan

- a. GCS = 13 – 15.
- b. Kehilangan kesadaran atau amnesia dapat terjadi, tetapi berlangsung kurang dari 30 menit.
- c. Tidak ada kontusio tengkorak, tidak ada fraktur cerebral, hematoma.

2. Sedang

- a. GCS = 9 – 12.
- b. Kehilangan kesadaran dan/atau amnesia lebih dari 30 menit tetapi kurang dari 24 jam.
- c. Dapat mengalami atau mungkingterjadi fraktur tengkorak.

3. Berat

- a. GCS = 3 – 8.
- b. Kehilangan kesadaran dan/atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam.
- c. Juga meliputi atau termasuk kontusio serebral, laserasi, atau hematoma intrakranial (Nurarif & Kusuma, 2020).

Menurut Brunner and Suddarth (2020), trauma capitis terbagi menjadi dua yaitu:

1. Cedera kepala terbuka

Cedera kepala terbuka akibat cedera kepala dengan fraktur tengkorak atau luka tembus, luasnya cedera kepala pada jenis ini ditentukan oleh massa dan bentuk dari benturan, kerusakan otak juga dapat terjadi bila tulang tengkorak menembus jaringan otak serta mencederai saraf kranial,

dura mater, jaringan sel otak oleh benda tajam/tembakan, luka terbuka di kepala memungkinkan kuman patogen abses langsung ke otak.

2. Cedera kepala tertutup

Benturan kranial pada jaringan otak dikranium adalah syok mendadak. Dampaknya mirip dengan pergerakan benda yang bergerak cepat, lalu berhenti tiba-tiba dan menumpahkan cairan. Cedera kepala tertutup adalah komusio geger otak.

5. Manifestasi Klinis

Gejala yang ditimbulkan tergantung pada ukuran dan distribusi cedera/kerusakan otak.

1. Cedera Kepala Ringan (GCS 13-15).

- a. Kebingungan pada saat kejadian dan kebingungan yang berlanjut setelah cedera.
- b. Pusing terus-menerus dan sakit kepala, sulit tidur, gelisah.
- c. Sulit berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah perilaku.

Gejala ini dapat berlangsung selama sehari-hari, berminggu-minggu atau lebih lama setelah konkusio cedera otak akibat trauma ringan.

2. Cedera kepala sedang (GCS 9-12).

- a. Merasakan lemah pada salah satu tubuh disertai kebingungan bahkan koma.
- b. Kehilangan kesadaran, kelainan pupil, defisit neurologis onset mendadak, perubahan TTV, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfungsi sensorik, kejang otot, sakit kepala, pusing dan gangguan gerak.

3. Cedera kepala berat (GCS 3-8).

- a. Amnesia Tidak dapat mengingat kejadian sesaat sebelum dan sesudah terjadinya penurunan kesehatan.
- b. Pupil tidak aktual, pemeriksaan motorik tidak aktual/nyata, adanya cedera terbuka, fraktur tengkorak, dan kerusakan neurologis

- c. Nyeri, yang terus- menerus atau terlokalisir biasanya menandakan adanya fraktur.
- d. Fraktur pada kubah kranial, akan menyebabkan pembengkakan pada area tersebut (Sylvia A, 2021),

Secara morfologis cedera kepala dapat meliputi fraktur kranium, kontusio, perdarahan, dan cedera difus.

1. Fraktur kranium

Fraktur tulang tengkorak (kranium) dapat terjadi di bagian atas atau di dasar tengkorak (basiscranii) dan dapat berbentuk lurus atau linear serta terbuka atau tertutup. Pada fraktur tengkorak terbuka, robekan pada dura mater dapat menciptakan hubungan antara cedera pada kulit kepala dan permukaan otak.

2. Lesi Intrakranial

Lesi intrakranial dapat diklasifikasikan sebagai fokal atau difus, walaupun kedua jenis lesi ini sering muncul bersamaan. Cedera fokal meliputi perdarahan epidural, perdarahan subdural, memar (hematoma intraserebral), dan perdarahan intraserebral.

3. Cedera otak difusi

Cedera otak difusi berkisar dari gegar otak ringan, dimana CT scan normal, hingga cedera hipoksia-iskemik berat. Cedera otak difus yang parah biasanya disebabkan oleh hipoksia, iskemia otak yang berkepanjangan atau syok, atau periode apnea yang terjadi segera setelah trauma. Dalam kasus seperti itu, CT scan pertama sering menunjukkan tampilan normal, atau tampilan otak yang membengkak secara merata tanpa area putih atau abu-abu yang signifikan. Anomali difus lain yang umum terjadi pada cedera deselerasi, dapat memiliki banyak titik perdarahan di belahan otak yang berbatasan dengan area putih abu-abu.

4. Perdarahan epidural

Perdarahan epidural relatif jarang, lebih kurang 0,5% dari semua cedera otak dan 9% dari pasien yang mengalami koma. Hematom epidural itu secara tipikal berbentuk bikonveks atau cembung sebagai akibat dari pendorongan perdarahan terhadap duramater yang sangat melekat di tabula interna tulang kepala. Perdarahan ini sering terjadi pada area temporal atau temporoparietal dan biasanya disebabkan oleh robeknya arteri meningeal media akibat fraktur tulang tengkorak.

5. Perdarahan subdural

Perdarahan subdural lebih sering terjadi daripada perdarahan epidural, kira-kira 30% dari cedera otak berat. Perdarahan ini sering terjadi akibat robekan pembuluh darah atau vena-vena kecil di permukaan korteks serebri. Berbeda dengan perdarahan epidural yang berbentuk lensa cembung pada CT scan, perdarahan subdural biasanya mengikuti dan menutupi permukaan hemisfer otak. Perdarahan ini dapat menutupi seluruh permukaan otak. Kerusakan otak yang berada di bawah perdarahan subdural biasanya lebih berat dan prognosisnya lebih buruk daripada perdarahan epidural.

6. Kontusio dan perdarahan intraserebral

Kontusio serebri sering terjadi (20% sampai 30% dari cedera otak berat). Sebagian besar terjadi di lobus frontal dan lobus temporal, meskipun dapat juga terjadi pada setiap bagian dari otak. Kontusio serebri dapat terjadi dalam waktu beberapa jam atau hari, berkumpul menjadi perdarahan intraserebral atau kontusio yang luas (Widyawati, 2021).

6. Pemeriksaan Penunjang

Berikut adalah pemeriksaan Penunjang Pasien cedera kapitis, yaitu:

- a. CT Scan untuk mengetahui luasnya lesi, perdarahan, determinan, perubahan ventrikel, dan jaringan otak.
- b. MRI dilakukan dengan cara yang sama seperti CT scan, dengan atau tanpa bahan kontras radioaktif.

- c. Cerebral angiography menunjukkan anomaly kelainan pada sirkulasi serebral, seperti perubahan jaringan otak akibat edema, perdarahan, dan trauma.
- d. Serial EEG dapat mendeteksi perkembangan gelombang patologis.
- e. Sinar-X mendeteksi perubahan struktur tulang atau fraktur(patah tulang), perubahan struktur linier (perdarahan/edema), dan fragmen tulang.
- f. BAER mengoreksi keterbatasan fungsional dari korteks serebral dan otak kecil.
- g. PET mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak
- h. CSS untuk lumbal pungsi dapat dilakukan jika diduga terjadi perdarahan subarachnoid.
- i. Kadar elektrolit untuk mengoreksi keseimbangan elektrolit dengan peningkatan tekanan intrakranial.
- j. Screen toxilogi untuk mendeteksi efek obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran.
- k. Rontgen thoraks 2 arah (PA/AP dan lateral) menyatakan akumulasi udara/cairan pada area pleural.
- l. Thoracentesis menunjukkan darah/cairan
- m. Analisa gas darah (AGD/Astrup) (Peterson et al., 2022).

7. Penatalaksanaan

1. Resusitasi jantung paru (circulation, airway, breathing = CAB)

Pasien dengan trauma kepala berat sering terjadi hipoksia, hipotensi dan hiperkapnia akibat gangguan kardiopulmoner. Oleh karena itu urutan tindakan yang benar adalah:

- a. Sirkulasi (Circulation), hipotensi menyebabkan iskemia, yang dapat menyebabkan kerusakan sekunder. Hipotensi disebabkan oleh hipovolemia akibat perdarahan eksternal, ruptur organ dalam, trauma dada dengan temponade jantung atau pneumotoraks, dan syok septik. Efeknya adalah menghentikan perdarahan, meningkatkan fungsi jantung dan mengganti darah yang hilang dengan plasma atau darah.

- b. Jalan nafas (Airway), jalan nafas bebas dari lidah yang menggantung ke belakang dengan kepala ekstensi dengan menempatkan oropharyngeal airway (OPA) atau tabung endotrakeal, bersihkan sisa muntahan, darah, lendir, atau gigi palsu. Isi perut atau lambung dikosongkan melalui selang nasogastrik untuk mencegah aspirasi muntah.
 - c. Pernafasan (Breathing), gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh gangguan sentral dan perifer. Abnormalitas sentral adalah depresi pernapasan pada lesi medulla oblongata, respirasi cheyne, stokesia, dan hyperventilation neurogenik sentral. Penyebab perifer adalah aspirasi, trauma dada, edema paru, emboli paru, infeksi. Gangguan pernafasan dapat menyebabkan hipoksia dan hiperkapnia. lakukan tindakan dengan pemberian O₂ kemudian cari dan eliminasi faktor penyebab dan gunakan ventilator bila perlu.
2. Penanganan kasus-kasus cedera kepala di unit gawat darurat didasarkan atas patokan pemantauan dan penanganan terhadap “6 B” yakni:
- a. *Breathing*, Perlu diperhatikan mengenai frekuensi dan jenis pernafasan pasien. Adanya sumbatan jalan napas harus segera dihilangkan dengan cara: suction, inkubasi, trakeostomi. Pasokan oksigenasi yang cukup atau jika perlu, hiperventilasi merupakan tindakan penting sehubungan dengan edema cerebral.
 - b. *Blood*, Meliputi pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium darah (Hb, leukosit). Peningkatan tekanan darah dan penurunan denyut nadi menandakan peningkatan tekanan intrakranial, sedangkan penurunan tekanan darah dan denyut nadi lebih cepat menandakan adanya syok hipovolemik akibat perdarahan dan membutuhkan transfusi.
 - c. *Brain*, menilai kondisi otak berfokus pada respons okular, motorik, dan verbal (GCS). Perubahan respon ini menunjukkan peningkatan, memerlukan evaluasi lebih lanjut status pupil (ukuran, bentuk, dan respon terhadap cahaya) dan gerakan bola mata.

- d. *Bladder*, Kandung kemih harus selalu dikosongkan (pemasangan kateter) karena kandung kemih yang penuh mendorong pengerahan tenaga dan karenanya tekanan intrakranial cenderung meningkat.
- e. *Bowel*, perlu dilakukan pemantauan pengeluaran urin selama perawatan pasien. Ketika keluaran urin tertahan di kandung kemih, tekanan intrakranial (TIK) dapat meningkat.
- f. *Bone*, Mencegah luka dekubitus, kontraktur sendi dan infeksi sekunder (Sylvia A, 2021).

8. Komplikasi

Berikut komplikasi yang dapat disebabkan oleh cedera kepala yaitu:

- a. Perdarahan intra cranial.
- b. Kejang.
- c. Parese saraf cranial.
- d. Meningitis atau abses otak.
- e. Infeksi.
- f. Edema cerebri.
- g. Kebocoran cairan serospinal (Peterson et al., 2022).

B. Konsep Dasar Keperawatan Cedera Kepala Berat

1. Pengkajian

Penting bagi perawat untuk mengetahui bahwa setiap adanya riwayat trauma pada servikal merupakan hal yang penting diwaspadai.

1. Identitas pasien yaitu nama, umur, jenis kelamin, status, agama, pendidikan, pekerjaan, alamat.

2. Riwayat Penyakit

- a. Keluhan Utama

Cedera kepala berat muncul dengan gejala utama yang berbeda-beda tergantung lokasi cedera dan luas cedera. Gejal paling umum adalah nyeri, mati rasa, kaku pada leher atau punggung, dan kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah.

- b. Riwayat Penyakit Saat Ini

Pengkajian ini sangat penting untuk menentukan derajat kerusakan dan adanya kehilangan fungsi neurologik. Fungsi neurologis dan sumsum tulang belakang dapat terluka oleh berbagai mekanisme, dengan cedera primer yang melibatkan satu atau lebih dari proses dan kekuatan berikut: kompresi akut, benturan, destruksi, laserasi dan trauma tembak.

- c. Riwayat Penyakit Dahulu

penderita cedera medulla spinalis dapat disebabkan oleh berbagai penyakit seperti reumatoid arthritis, pseudohipoparatiroid, Spondilitis, ankilosis, osteoporosis maupun tumor ganas.

- d. Riwayat Penyakit Keluarga

Riwayat keluarga dengan kondis, tanyakan tentang riwayat penyakit keluarga dengan kondisi medis yang dapat memperparah cedera kepala.

3. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik mengacu pada pengkajian B1-B6 dengan pengkajian fokus ditujukan pada gejala-gejala yang muncul akibat cedera kepala berat. Keadaan umum (Arif muttaqin 2017) pada keadaan

cedera kepala berat umumnya mengalami penurunan kesadaran. Adanya perubahan pada tanda-tanda vital, meliputi bradikardi dan hipotensi.

a. B1 (*Breathing*)

Perubahan sistem pernapasan tergantung pada derajat blok saraf parasimpatis, klien mengalami kelumpuhan otot-otot pernapasan dan perubahan karena adanya kerusakan pada jalur simpatik desendens akibat trauma tulang belakang sehingga jaringan saraf terputus, pemeriksaan fisik dari sistem ini mengarah pada hasil sebagai berikut: pemeriksaan umum batuk klien, peningkatan produksi sputum, sesak napas.

b. B2 (*Blood*)

Pengkajian pada sistem kardiovaskular ditemukan bahwa syok hipovolemik adalah kejadian umum pada pasien dengan cedera kepala berat. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tekanan darah menurun, nadi bradikardi, dan jantung berdebar-debar. Dalam keadaan lain, mungkin terjadi peningkatan hormon antidiuretik, yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengkompensasi.

c. B3 (*Brain*)

Pengkajian ini meliputi tingkat kesadaran, pengkajian fungsi otak, dan pengkajian saraf kranial. Pengkajian tingkat kesadaran : tingkat kesadaran dan respon terhadap lingkungan adalah indikator yang paling sensitif dari disfungsi sistem saraf. Pengkajian fungsi serebral: keadaan mental, observasi penampilan klien, perilaku, nilai gaya bicara dan aktivitas motorik. Kelumpuhan dicatat pada ekstermitas bawah, baik paralis, dan paraplegia. Pengkajian sistem sensoris terhadap perubahan sensasi pada klien cedera kepala berat sesuai dengan segmen yang mengalami gangguan.

d. B4 (*Bladder*)

Kaji status urin, termasuk warna, volume dan karakteristik urin, termasuk berat jenis urin. Mungkin ada penurunan jumlah urin yang

dihasilkan dan peningkatan retensi cairan dapat terjadi akibat penurunan aliran darah ke ginjal.

e. B5 (*Bowel*)

Pada keadaan syok spinal, sering ditemukan neuropraxia dengan adanya ileus paralitik, dengan klinis hilangnya bising usus, disertai abdomen, dan tidak ada defekasi. Ini adalah gejala awal syok tulang belakang yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

f. B6 (*Bone*)

Kelumpuhan motorik dan organ dalam tergantung pada tingkat lesi di atas saraf yang mengalami trauma. Gejala perubahan motorik sesuai dengan distribusi segmental saraf yang terkena, dengan kelemahan dan kelumpuhan menjadi disfungsi motorik yang paling umum di ekstremitas bawah. Kaji warna kulit, suhu, kelembaban, dan turgor kulit.

4. Pemeriksaan penunjang

1) Pemeriksaan diagnostik

- a. X-ray/CT Scan: hematoma serebral, edema serebral, perdarahan intrakranial, fraktur tulang tengkorak.
- b. MRI: dengan/tanpa menggunakan kontras.
- c. Angiografi serebral: menunjukkan kelainan pada aliran darah.
- d. EEG: menunjukkan adanya atau perkembangan gelombang patologis.
- e. BAER (Brain Auditory Evoked Respon): menentukan fungsi korteks dan batang otak.
- f. PET (Positron Emission Tomography): menunjukkan perubahan aktivitas metabolisme pada otak.

2) Pemeriksaan laboratorium

- a) AGD: PO₂, pH, HCO₃: untuk menilai kecukupan ventilasi (mempertahankan AGD dalam kisaran normal untuk memastikan

perfusi serebral yang memadai) atau untuk mencari masalah oksigenasi yang dapat meningkatkan TIK

- b) Elektrolit serum: cedera kepala dapat dikaitkan dengan gangguan pengaturan natrium, retensi Na berakhir dapat beberapa hari, diikuti diuresis Na, peningkatan letargi, konfusi dan kejang akibat ketidakseimbangan elektrolit.
- c) Hematologi: leukosit, Hb, albumin, globulin, protein serum.
- d) CSS: Menentukan kemungkinan adanya perdarahan subarachnoid (warna, komposisi, tekanan).
- e) Pemeriksaan toksikologi: Mendeteksi obat yang menyebabkan gangguan kesadaran.
- f) Kadar antikonvulsan Darah : Untuk mengetahui kadar terapi yang sangat efektif dalam mengatasi kejang.

2. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul pada klien dengan ptrauma capitis berat (SDKI PPNI, 2017), yaitu sebagai berikut:

1. Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

a. Definisi

Ketidakmampuan membersihkan ekskresi atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten.

b. Penyebab

Fisiologis	Situasional
a) Spasme jalan napas	a) Meroko aktif
b) Jipersekresi jalan napas	b) Merokok pasif
c) Disfungsi neuromuskular	c) Terpajan polutan
d) Adanya jalan napas buatan	
e) Sekresi tertahan	
f) Hiperplasia dinding jalan napas	
g) Proses infeksi	
h) Defek agen farmakologis (mis. Anastesi)	

c. Gejala Dan Tanda Mayor Minor

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
<i>objektif</i> : tidak tersedia	<i>objektif</i> : Dispnea, sulit bicara, ortopnea
<i>Objektif</i> : Batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing dan/atau ronkhi kering, mekonium di jalan napas (pada neonatus)	<i>Objektif</i> : Gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah

d. Kondisi Klinis Terkait

- a) Gullian Barre Syndrom.
- b) Sklerosis multipel
- c) Myasthenia gravis.
- d) Prosedur diagnostik
- e) Depresi sitem saraf pusat.
- f) Cedera kepala.
- g) Stroke.
- h) Kuadriplegia.
- i) Sindrom Aspirasi mekonium
- j) Infeksi saluran Napas.

2. Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial

1. Defenisi

Gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial.

2. Penyebab

- a. Lesi menempati ruang (mis. *Space-occupying lesion* akibat tumor, abses)
- b. Gangguan metabolisme (mis. Akibat hiponatremia, ensefalopati hepatikum, uremikum, ketoasidosis diabetik, septikemia)

- c. Edema serebral (mis. Akibat cedera kepala (hematoma epidural, hematoma subarchnoid, hematoma intraserebral), stroke iskemik, stroke hemoragik, hipoksia, ensefalopati iskemik, pascaoperasi)
- d. Peningkatan tekanan vena (mis. Akibat trombosis sinus vena serebral, gagal jantung, trombosis/obstruksi vena jugularis atau vena kava superior)
- e. Obstruksi aliran cairan serebrospinalis (mis. Hidrosefalus)
- f. Hipertensi intrakranial idiopatik.

3. Gejala dan Tanda Mayor Minor

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
<i>Objektif</i> : sakit kepala	<i>Objektif</i> : tidak tersedia
<i>Objektif</i> : tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi melebar, bradikardia, pola napas ireguler, tingkat kesadaran menurun, respon pupil melambat atau tidak sama, refleks neurologis terganggu	<i>Objektif</i> : Gelisah, agitasi, muntah tanpa disertai mual, tampak lesu/lemah, fungsi kognitif terganggu, tekanan intrakranial (TIK) ≥ 20 mmHg, papiledema, postur debrasi

4. Kondisi klinis terkait

- a. Cedera kepala.
- b. Iskemia Serebral.
- c. Hidrosefalus.
- d. Hematoma kranial.
- e. Pembentukan Arteriovenous.
- f. Edema vasogenik atau atau sitotoksik serebral
- g. Hipertermia.
- h. Obstruksi.

3. Nyeri akut

1. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

2. Penyebab

- a. Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, iskemia, neoplasma)
- b. Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- c. Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan).

3. Gejala dan Tanda Mayor

Gejala dan tanda mayor	Gejala dan tanda minor
<i>Objektif</i> : Mengeluh Nyeri	<i>Objektif</i> : tidak tersedia
<i>Ojektif</i> : Tampak meringis, bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri), gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur	<i>Objektif</i> : Tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, roses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaphoresis

4. Kondisi klinis terkait

- a. Kondisi pembedahan.
- b. Cedera traumatis.
- c. Infeksi.
- d. Sindrom koroner akut.
- e. Glaukoma.

4. Risiko Infeksi

1. Defisni

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

2. Faktor Risiko

- a. Penyakit kronis (mis diabetes militus).
- b. Efek prosederul invasif.
- c. Malnutrisi.
- d. Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan.
- e. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer.
- f. Gangguan peristaltik.
- g. Kerusakan integritas kulit.
- h. Preubahan pH.

- i. Penurunan kerja siliaris.
 - j. Ketuban pecah lama.
 - k. Merokok.
 - l. Statis cairan tubuh.
 - m. Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer.
 - n. Penurunan hemoglobin.
 - o. Imunosupresi.
 - p. Leukopenia.
 - q. Supresi respon inflamasi.
 - r. Vaksinasi tidak adekuat.
3. Kondisi Klinis Terkait
- a. AIDS
 - b. Luka bakar.
 - c. Penyakit Paru obstruktif kronik.
 - d. Diabetes militus.
 - e. Tindakan invasif.



3. Intervensi Keperawatan

NO	agnosis (SDKI, 2017)	Kriteria Hasil (SLKI, 2019)	Tindakan Keperawatan (SIKI, 2018)	Rasional
1.	(D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka bersihan jalan napas membaik dengan kriteria hasil: a. Batuk efektif meningkat b. Produksi sputum menurun c. Mengi menurun d. Wheezing menurun e. Dispnea membaik f. Gelisah membaik g. Frekuensi napas membaik h. Pola napas membaik	Manajemen Jalan Napas Observasi a. Monitor pola napas b. Monitor bunyi napas tambahan (mis: gurgling, mengi, wheezing, ronghi) c. Monitor sputum (jumlah, warna, aroma) Terapeutik a. Pertahankan kepatenan jalan napas b. Posisikan semi fowler atau fowler c. Lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik Edukasi a. Anjurkan asupan cairan 2000ml/hari, jika tidak kontraindikasi Kolaborasi a. Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu b. Pemantauan Respirasi	Manajemen Jalan Napas a. Mengetahui pola nafas klien b. Mengetahui bunyi nafas tambahan klien c. Mengetahui jumlah dan warna sputum klien Terapeutik a. Menjaga kebersihan jalan nafas klien b. Pmengatur posisi klien dengan kepala lebih tinggi c. Membersihkan jalan nafas kurang dari 15 detik Edukasi Menyarankan pemberian asupan cairan 2000ml Kolaborasi a. Bekerjasama dalam pemberian obat pengencer lendir b. Memantau pernapasan
2.	(D.0066) Nyeri akut	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: a. Keluhan nyeri menurun b. Meringis menurun c. Gelisah menurun d. Kesulitan tidur menurun e. Frekuensi nadi membaik f. Pola napas membaik g. Tekanan darah membaik	Manajemen Nyeri Observasi a. Lakukan pengamatan pada lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. b. Identifikasi skala nyeri. c. Perhatikan respon nyeri pada wajah klien. d. Identifikasi faktor yang memperberat serta meringankan nyeri. e. Identifikasi pengetahuan tentang nyeri.	manajemen Nyeri Observasi a. Agar mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri b. Mengetahui skala nyeri c. Melihat respon nyeri pada wajah klien d. Mengetahui factor yang memperberat nyeri

			<ul style="list-style-type: none"> f. Identifikasi budaya terkait respon nyeri. g. Pantau keberhasilan terapi komplementer yang telah dilakukan. h. Pantau efek samping pemberian obat anti nyeri. <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beri teknik non farmakologis agar rasa nyeri berkurang. b. Kontrol lingkungan agar rasa nyeri bisa menurun. c. Bantu fasilitasi istirahat dan tidur d. Pada saat pemilihan strategi untuk mengatasi nyeri itu patut untuk mempertimbangkan sumber dan jenis dari nyeri itu sendiri. <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Beri penjelasan tentang penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri b. Ajarkan tentang cara meredakan nyeri c. Anjurkan untuk memonitor rasa nyeri sendiri <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kolaborasikan tentang pemberian analgesic untuk meredakan nyeri 	<ul style="list-style-type: none"> e. Menilai tingkat pengetahuan nyeri terhadap nyeri f. Mengetahui budaya terkait respon nyeri g. Mengetahui keberhasilan dari terapi komplementer yang dilakukan h. Mengetahui tingkat kondisi pasien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengurangi rasa nyeri b. Untuk mengurangi nyeri c. Untuk memberi kenyamanan kepada klien <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar pasien mengetahui penyebab, periode dan pemicu timbulnya rasa nyeri b. Agar pasien tau cara meredakan nyeri c. Mengetahui frekuensi nyeri <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bekerja sama dalam menurunkan rasa nyeri
3.	(D.0066)Penurunan kapasitas adaptif intrakranial	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil: <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kesadaran meningkat b. Gelisah menurun c. Tekanan darah membaik d. Tekanan nadi membaik e. Bradikardia membaik 	<p>Pemantauan tekanan intracranial</p> <p>Obervasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi menempati ruang, gannguan metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan serebrospinal, hipertensi intrakranial, idiopatik) b. Monitor peningkatan TD c. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih 	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui penyebab meningkatnya TIK b. Mengetahui peningkatan TD c. Mengetahui tekanan nadi pasien d. Kinerja jantung yang menurun akan menyebabkan terjadinya hipoksia e. Kesadaran menurun karena

		<ul style="list-style-type: none"> f. Pola napas membaik g. Respon pupil membaik h. Refleks neurologis membaik i. Tekanan intrakranial membaik 	<p>TDS dan TDD)</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Monitor penurunan frekuensi jantung e. Monitor penurunan tingkat kesadaran f. Monitor perlambatan atau ketidaksimestrison respon pupil g. Monitor kadar CO₂ dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan h. Monitor tekanan perfusi serebral <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertahankan sterilisasi sistem pemantauan b. Pertahankan posisi kepala dan leher netral c. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien d. Berikan tehnik non farmakologis e. Dokumentasikan hasil pemantauan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan b. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu 	<p>kurangnya oksigen di dalam tubuh akibat dari suatu penyakit seperti trauma</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Pupil yang normal akan bereaksi terhadap cahaya g. Mengetahui kadar CO₂ h. Mengetahui tekanan perfusi serebral <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah terjadinya infeksi b. Posisi kepala yang netral akan mempertahankan perfusi serebral c. Mengetahui kondisi pasien d. Bahan acuan untuk melakukan implementasi selanjutnya <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien dan keluarga pasien mengetahui tujuan pemantauan b. Pasien dan keluarga pasien mengetahui hasil pemantauan
	(D.0142)Risiko infeksi		<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Batasi jumlah pengunjung b. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien c. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu 	<p>Pencegahan infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Mencegah terjadinya infeksi silang c. Untuk mengurangi kontaminasi silang d. Mengurangi infeksi pasca-prosedur yang berpotensi menular <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencegah infeksi

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat membantu proses perawatan pada klien. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi harus spesifik hal ini untuk menangani berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan (Nursalam, 2019).

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, terarah, dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan, dan memutuskan apakah melanjutkan, mengubah atau menghentikan rencana asuhan.

Pendokumentasian pada tahap evaluasi merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan kondisi pasien setelah pelaksanaan. Evaluasi sedang berlangsung, melibatkan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap kelima dalam rangkaian proses keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan intervensi keperawatan yang dilakukan terpenuhi atau diperlukan pendekatan yang berbeda (Nursalam, 2019)

6. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Berdasarkan kasus yang dikelola, khususnya klien yang mengalami cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran. Oleh karena itu klien membutuhkan layanan perawatan yang komprehensif dan menyeluruh.

Dalam hal ini permasalahan sesuai dengan teori bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan melindungi pasien. Oleh sebab itu, masalah pada kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Teori Watson (2020) menjelaskan dalam *Theory of Human Care*, adalah bahwasannya hubungan dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi klien sebagai manusia. (human being). Hubungan yang terbentuk harus dipertanggungjawabkan secara profesional. Keperawatan yang manusiawi menjadi suatu seni, ilmu klinis yang manusiawi yang kemudian menjadi isu penting dalam profesi keperawatan dan dalam proses penyembuhan. Diyakini bahwa perilaku caring dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien serta adanya proses fasilitas dalam promosi kesehatan.

Proses keperawatan terdiri dari komitmen untuk melindungi, meningkatkan, dan memulihkan nilai-nilai kemanusiaan melalui proses pemulihan martabat, keharmonisan batin, dan memfasilitasi penyembuhan. Caring dapat diartikan sebagai memperhatikan dan menghargai orang. Di sisi lain, caring juga dapat diartikan sebagai pendukung orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu mereka kembali ke keadaan semula (Nursalam, 2019).

Keterkaitan antara teori caring dan kasus cedera kepala yang diteliti oleh penulis adalah bahwasannya pasien cedera kepala otak traumatis yang dirawat di ruangan ICU, dalam keadaan koma dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bahwa mereka termasuk pasien yang benar-benar dalam keadaan koma dan bergantung sepenuhnya pada perawatke (total care). Oleh karena itu, pentingnya teori keperawatan terus diterapkan pada pasien yang dirawat di ruang ICU, agar dapat pemberian perawatan profesional, baik fisik maupun emosional, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan pasien serta mendukungnya dalam hidupnya untuk kembali ke kondisi yang lebih baik.

C. Evidence Based Nursing (EBN)

1. Pengertian Terapi Murottal

Al-Qur'an merupakan terapi non-farmakologis yang efektif untuk memperbaiki fungsi vital dan meningkatkan saturasi oksigen. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an memberikan ketenangan pikiran, perasaan lega, relaksasi dan suasana santai (Hakim et al., 2021). Al-Qur'an juga merupakan kitab surgawi umat Islam, mencakup semua dimensi kehidupan manusia dan salah satunya berkaitan dengan pengobatan penyakit (Zuhriana, 2019). Stimulasi pendengaran dengan Murottal Al-Qur'an merupakan salah satu terapi di mana gelombang suara dikirim ke otak, sehingga merangsang perubahan pada reseptor.

Menurut (widaryanti 2021) menjelaskan tentang terapi murottal Al- Qur'an menggunakan terapi musik karena membaca Al-Qur'an dianggap sama dengan terapi musik. Seperti yang disampaikan oleh Musbikin (2019) menegaskan bahwa bacaan Al-Qur'an dengan murottal adalah membaca dengan ritme teratur, tanpa perubahan yang berarti, nada rendah dan tempo antara 60 sampai 70, sesuai dengan standar musik sebagai terapi. (Grap et al., 2019). Hal ini juga dibenarkan oleh (Suhriani, 2019) yang menyatakan bahwa pemberian terapi Al-Qur'an tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologis dan nilai spiritual, tetapi juga berperan sebagai neuroprotektif otak melalui stimulasi auditori/pendengaran. Oleh karena itu, stimulasi sensorik dalam hal ini terapi Al-Qur'an dapat digunakan sebagai intervensi perawatan alternatif untuk meningkatkan proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran yang ditandai dengan peningkatan skor GCS.

Berdasarkan intervensi yang diberikan yaitu terapi murottal, dimana penulis mengaplikasikan terapi murottal dengan lantunan surah Al-Fatihah dan Surah Ar-Rahman, dimana surah Al-Fatihah merupakan surah syifa(penyembuh) dimana ayat dalam Al-Qur'an yang dikhususkan untuk menyembuhkan penyakit atas izin Allah SWT, dan keutamaaan surah Al-Fatihah sebagai obat penawar penyakitpun telah diungkapkan dalam salah satu firman Allah yaitu surah Al-Isra Ayat 82. Dan surah Ar-Rahman, selain

lantunannya yang indah yang terkandung didalamnya, surah Ar-Rahman ini pula mempunyai arti untuk selalu mengingat kenikmatan yang Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat, terapi murottal ini di berikan selama kurang lebih 20 menit mengikut dari durasi pemutaran murottal surah Al-Fatihah dan Surah Ar-Rahman dan dalam waktu 20 menit juga itu di anggap waktunya pas agar lebih efektif karena tidak mengambil waktu terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Waktu pemberian murottal diberikan setiap jam 18:30 dan 30 menit sebelum pemberian obat analgetik, dan terapi murottal diberikan melalui Handpone yang didekakan secara langsung didekat telinga pasien. Dalam penelitian Jurnal Kedokteran Brawijaya 2020, mengatakan terdapat penurunan signifikan intensitas nyeri setelah diberikan terapi murottal surah Ar-Rahman dan dapat meningkatkan kadar endorphin dan dapat meningkatkan status GCS. Hal tersebut diatas dinyatakan dalam QS Al- Isra [17] :82 :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

”Dan Kami turunkan dari Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”(QS.Al-Isra,17:82).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan dari hadits riwayat Abu Said Al-Khudri, Rasulullah saw bersabda: “Ketika kamu mengunjungi orang sakit, hiburilah mereka saat menghadapi takdir.” Itu tidak akan menyangkal papun, tetapi dapat memperbaiki keadaan mental orang sakit.” Sementara dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Mas’ud diriwayatkan dari Nabi saw bahwa ia berkata: “Jika seorang hamba ditimpa duka, maka ia berkata. “Ya Allah. Aku adalah hambamu kepadaku ada di tanganmu dan berjalan (selalu mengikuti) hukummu, bahwa kamulah yang Maha Adil. Takdirmu, aku mohon setiap nama yang kau sebut dirimu, atau yang engkau cantumkan dalam kitabmu, atau ajarkan pada salah satu hambamu, atau sembunyikan di alam gaibmu, agar Al-Qur’an ini menjadi penyejuk hatiku, jadikanlah cahaya di dadaku, penghilang

kesedihanku. Ketika seorang hamba melakukan ini, kesedihannya pasti akan hilang dan digantikan dengan kegembiraan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa telah diturunkan Al-Qur'an sebagai penawar dan rahmat, dimana penawar yang di maksud salah satunya yaitu sebagai penawar segala penyakit. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penelitian yang dilakukan oleh (Zuhriana K. Yusuf 2019) menjelaskan bahwa melakukan terapi Al-Qur'an tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologis dan nilai spiritual, tetapi juga berperan sebagai neuroprotektor otak melalui stimulasi pendengaran. Oleh karena itu, stimulasi sensori dalam hal ini terapi Al-Qur'an dapat digunakan sebagai intervensi perawatan alternatif untuk meningkatkan proses pemulihan pasien.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan status kesadaran pasien dengan nilai GCS meningkat
- b. Memperbaiki status hemodinamik dalam tubuh yaitu tanda-tanda vital dalam keadaan stabil
- c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang di timbulkan oleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021).

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami cedera kepala berat (GCS<8)
- b. pasien pasca craniectomy
- c. Pasien dengan penurunan kesadaran
- d. Pasien dengan *Traumatic Brain Injury* (TBI) yang sedang dirawat di ruang ICU

4. Kontraindikasi

- a. Pasien dengan kondisi telinga yang mengeluarkan darah/cairan
- b. pasien yang mempunyai gangguan pendengaran.

5. Prosedur Pemberian

Pra interaksi

- a. Siapkan alat-alat
- b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi
- c. Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya

- d. Memperkenalkan diri
- e. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien Tahap kerja
- f. Mencuci tangan
- g. Melakukan penilain GCS 5 menit sebelum melakukan intervensi.
- h. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit sebelum melakukan intervensi
- i. Terapi murottal diberikan 30 menit sebelum obat sedasi diberikan.
- j. Mengatur volume handpone dan mendekatkan handphone didekat telinga pasien
- k. Berikan tearapi murottal selama 20 menit
- l. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit setelah intervensi
- m. Melakukan penilaian GCS 5 menit setelah melakukan intervensi

Fase Terminasi

- a. Merapikan alat-alat
- b. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada pasien
- c. Mengucapkan salam
- d. Mencuci tangan
- e. Mendokumentasikan kegiatan

Kriteria Evaluasi

- a. Nilai GCS klien meningkat
- b. Status hemodinamik klien membaik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 1 responden. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang berfokus pada suatu kasus yang terdiri dari proses keperawatan dan memiliki tujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, intensif, detail dan rinci mengenai latar belakang, karakter ataupun sifat pada suatu kasus tersebut. Penelitian dalam metode studi kasus dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

B. Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

1.. Kriteria Inklusi

- a. Responden berada ditempat pada saat penelitian
- b. Tidak mengalami gangguan pendengaran
- c. Pasien dengan penurunan kesadaran (GCS <8)
- d. Pasien dengan *Traumatic Brain Injury* (TBI) yang sedang dirawat di ruang ICU

2. Kriteria Eksklusi

Responden dengan TBI yang mengalami penurunan kesadaran dengan kondisi telinga yang mengeluarkan cairan/darah.

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada pasien TBI dengan penurunan kesadaran menggunakan intervensi *Terapi Murottal*.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan GADAR (Gawat dan Darurat), pengukuran Gasloww Coma Scale (GCS), serta instrumen proteksi diri berupa handscoon dan masker, alat pemeriksaan fisik berupa stetoskop, tensi meter, termometer, timbangan, *penlight*, dan arloji dengan detik.

1. Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah utama, pengkajian primer *aiway, breathing, circulation, disability, ekxposure*, pengkajian sekunder *breathing, blood, neurologis, bladder, bowel, bone*, pengkajian rasa aman dan nyaman, aktivitas, istirahat, tidur, riwayat sosial, riwayat psikologi, spiritual, tanda-tanda vital, diagnostik, dan laboratorium. Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang ditemukan dari pasien.
2. Format analisis data terdiri dari: data, etiologi dan masalah.
3. Format diagnosa keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan
4. Format rencana keperwatan terdiri dari: diagnosa keperawatan, luaran/hasil keperawatan menggunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan SIKI, dan rasional menggunakan dongoes dan artikel.
5. Format implementasi/pelaksanaan dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosa keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan.

SOP Terapi Murottal.

1. Definisi

Terapi murottal adalah terapi yang dilaksanakan dengan cara mendengarkan/membaca ayat Al-Qur'an (Ismoyowati, 2021).

2. Tujuan

- a. membantu otak dalam memproduksi zat kimia, yakni neuropeptide yang dapat menguatkan reseptor tubuh dan memberikan umpan balik berupa kenikmatan dan kenyamanan
- b. Meningkatkan status kesadaran pasien dengan nilai GCS meningkat
- b. Memperbaiki status hemodinamik dalam tubuh yaitu tanda-tanda vital dalam keadaan stabil
- c. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang di timbulkanoleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021).

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami cedera kepala berat (GCS<8)
- b. Pasien pasca craniectomy
- c. Pasien dengan penurunan kesadaran
- d. Pasien dengan *Traumatic Brain Injury* (TBI) yang sedang dirawatdi ruang ICU

4. Kontraindikasi

- a. Pasien dengan kondisi telinga yang mengeluarkan darah/cairan
- b. pasien dengan gangguan pendengaran

5. Prosedur Pemberian

Pra interaksi

- a. Siapkan alat-alat
- b. Identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkankontraindikasi

Pra Orientasi

- a. Berikan salam dan panggil pasien dengan namanya
- b. Memperkenalkan diri
- c. Jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada pasien

6.Tahap kerja

- a. Mencuci tangan
- b. Melakukan penilain GCS 5 menit sebelum melakukan intervensi.
- c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit sebelum melakukan intervensi
- d.. Terapi murottal diberikan 30 menit sebelum obat sedasi diberikan.
- e. Mengatur volume handpone dan mendekatkan handphone didekat telinga pasien
- f. Berikan tearapi murottal selama 20 menit
- g. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital 2 menit setelahintervensi
- h. Melakukan penilaian GCS 5 menit setelah melakukan intervensi

Fase Terminasi

- a. Merapikan alat-alat
- b. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada pasien
- c. Mengucapkan salam
- d. Mencuci tangan
- e. Mendokumentasikan kegiatan

Kriteria Evaluasi

- a.. Nilai GCS klien meningkat
- b. Status hemodinamik klien membaik

E. Prosedur Pengambilan Data

1. Persiapan

Persiapan dengan konsultasi kasus

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi

3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

F. Tempat dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di ruangan ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 19-22 Februari 2023.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data dalam studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta yang terdapat dalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus dilakukan dengan menggunakan lima proses keperawatan, dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis data untuk merumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan indonesia, untuk selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria luaran yang akan ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia hasil keperawatan. Kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP yang khusus merawat pasien dengan intervensi terapi murottal, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif yaitu review dari hasil evaluasi dijelaskan.

H. Etika Studi Kasus

Pertimbangan etis diperhitungkan dalam penelitian ini. Pertimbangan etik berfungsi untuk mencegah timbulnya masalah etik selama penelitian. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang muncul. Ada tiga prinsip etik umum yang berlaku untuk penanganan masalah etik, yaitu *nonmaleficence* dan *beneficence*, *respect to person*, serta *justice* (Bect 2018).

a. Nilai Ilmiah

Dalam penelitian ini, tidak ada potensi kerugian dari eikutsertaan subjek dalam penelitian ini karena prosedur dilakukan secara mandiri oleh peneliti dan di bawah pengawasan perawat yang bertugas.

b. Manfaat

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan mendapatkan manfaat secara

langsung dengan memberikan stimulus murottal Al-Qur'an untuk meningkatkan kesadaran klien. Selain itu, dapat menjadi referensi petugas kesehatan dalam memberikan intervensi *Terapi Murottal* pada pasien yang mengalami masalah cedera kepala berat dan penurunan kesadarannya.

c. *Informed Consent*/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP)

Responden dan keluarga responden dan keluarganya diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum penelitian dilaksanakan. Keluarga responden memiliki hak mutlak untuk ikut serta atau menolak menjadi responden. Pada *Informed Consent* disebutkan bahwa data diperoleh secara eksekutif untuk memperluas ilmu.

d. Rahasia (*Privacy*)

Responden atau keluarga responden memiliki hak meminta agar data atau informasi yang diberikan dapat dijaga kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pendataan, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan sebagai hasil penelitian. Identitas responden dalam karya tulis ilmiah ini hanya menggunakan berdasarkan inisial.

e. *Justice*

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa membedakan responden dengan pasien lain.

BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

PRIMARY SURVEY		
Nama Pasien : Tn. A	Umur : 33 tahun	Jenis Kelamin : Laki-laki RM : 01009752
Nama Keluarga : Tn. H Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan swasta Alamat Rumah : Bone Telp/Hp : 082193968642 Diagnosa Medis : Traumatic Brain Injury Tanggal Masuk ICU : 15 Februari 2023		
Datang tanggal : 15/02/2023	Pukul : 03.16	Asal Ruangan : IGD (IRNA)
Alat terpasang : <input checked="" type="checkbox"/> Infus <input checked="" type="checkbox"/> Kateter <input checked="" type="checkbox"/> NGT <input checked="" type="checkbox"/> Ventilator <input checked="" type="checkbox"/> Monitor <input type="checkbox"/> Transfusi <input type="checkbox"/> CVC <input type="checkbox"/> Lainnya		
KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1		
Keluhan Utama : Penurunan kesadaran Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : Klien mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Februari 2023 dan di bawa ke rumah sakit Faisal kemudian dirujuk ke rumah sakit Wahidin karena klien mengalami penurunan kesadaran setelah 4 jam mengalami kecelakaan, Pasien juga datang dengan keluhan luka terbuka pada daerah belakang kepala, Riwayat penurunan kesadaran ada, riwayat muntah ada. Istri klien mengatakan bahwa klien mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba telur yang di bonceng pasien terjatuh, pasien menoleh ke belakang dan secara tidak sengaja menekan gas motor. Kondisi saat ini, pasien post operasi craniectomy hari ke-5 kesadaran semi koma dengan nilai GCS E2 M2 Vx seluruh aktivitas klien menggunakan bantuan total. Riwayat Kesehatan Keluarga : Istri klien mengatakan bahwa keluarganya tidak memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Orientasi (tempat, waktu, dan orang) :		

Tidak dapat dikaji karena klien mengalami penurunan kesadaran dengan nilai verbal yaitu V1x.

Pengkajian Keperawatan	Masalah/ Dignosis Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan dan Kriteria Hasil (SIKI)	Intervensi Keperawatan (SLKI)
<p>A. <i>Airway</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak bebas : Terdapat Sputum, pasien terasang ETT - Suara napas: Rhonki - Lain-lain: Pasien tampak tidak mampu batuk - Sianosis (+/-) ; - RR : 28 x/menit HR : 110 x/menit <p>Ada Masalah (Ya)</p>	Bersihkan jalan napas tidak efektif	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi sputum menurun - Frekuensi napas membaik 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas - Monitor sputum <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu
<p>B. <i>Breathing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas: takipneu - Frekuensi napas: 28x/mnt - Bunyi napas: terdengar ronkhi - Irama napas √ Teratur Tidak teratur - Tanda distress Pernapasan Penggunaan otot bantu ada, Retraksi dada/interkost ada, Cuping hidung tidak ada - Jenis pernapasan: Pernapasan dada dan perut - Lain-lain: Tidak ada - Sianosis (-/-): tidak ada - Warna Kulit: coklat - <i>Diaphoresis</i> (-/-): tidak ada - Kesadaran: GCS E2 M2 V1, RR 28x/menit HR : 110x/menit 	Bersihkan jalan napas tidak efektif	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi sputum menurun - Frekuensi napas membaik 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas - Monitor sputum <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu

Ada Masalah (Ya)			
<p>C. Circulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akral: Hangat √Dingin - Pucat : √Ya Tidak - Sianosis : Ya √Tidak - Pengisian Kapiler : 3 detik √< 3 detik > 3 detik - Nadi: a. Frekuensi 110 x/mnt b. Irama: √Reguller Irreguler c. Kekuatan: d. √KuatLemah Palpitasi (+/-) ; tidak Nadi Perifer: 110 x/menit, teraba kuat - TD 140/77 mmHg - Kelembaban kulit : Lembab √Kering Warna Kulit ; coklat - Turgor: Normal √Kurang Lain-lain - Suara Jantung (S3/S4) ; tidak ada suara jantung tambahan <p><i>Ejection Fraction (EP)</i> :sulit dikaji</p> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat - Tekanan darah membaik - Tekanan nadi membaik - Pola napas membaik - Tekanan intrakranial membaik 	<p>Pemantauan tekanan intrakranialObservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatanTIK - Monitor peningkatan TD - Monitor tingkat kesadaran - Monitor kadar CO2 dan pertahankanpada rentang yang diindikasikan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan sterilitas - Pertahankan posisi kepala dan lehernetral - Atur interval sistem pemantauansesuai kondisi pasien - Dokumentasikan hasil pemantauan
<p>D. Disability</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran : Stupor - Nilai GCS E2 M2 Vx, - Pupil √ Isokor Anisokor Respon Cahaya : +/- Refleks pupil (+/+) Diameter : 2.5 mm 	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat 	<p>Pemantauan tekanan intrakranialObservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK - Monitor peningkatan TD - Monitor tingkat kesadaran - Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan

<p>Ekstremitas Sensik Ya/Tidak Motorik Ya Tidak Reflex patella ka/ki: -/ Reflex tendon dalam bisept/trisept: sulit dikaji Refleks Patologis: Babinski(+/-): sulit dikaji Refleks <i>Chaddock</i> (+/-): - /<i>Hoffman</i> (+/-): sulit dikaji Kernig sign (+/-): sulit dikaji Brudinsky (+/-): sulit dikaji</p> <p>- Kekuatan otot : (menurun)</p> <p>$\frac{1}{1} \frac{1}{1}$</p> <p>- Range Of Motion : (<i>Pasif</i>)</p> <p>- Keadaan Umum: lemah</p> <p>- Tanda vital TD : 140/77 mmHg HR: 110 x/menit Pernapasan : 28 x/menit Suhu : 37,8 ° C SPO2 :97 %</p> <p>Ada Masalah (Ya)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan darah membaik - Tekanan nadi membaik - Pola napas membaik - Tekanan intrakranial membaik 	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan sterilitas sistem pemantauan - Pertahankan posisi kepala dan leher netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien - Dokumentasikan hasil pemantauan
<p>E. Exposure</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya trauma pada daerah: kepala dengan SDH dan ICH - Adanya jejas/luka pada daerah: kepala - Kedalaman luka: pasien post op craniectomy hari ke 5 dan luka dalam kondisi terjahit sehingga sulit dikaji kedalamannya <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Risiko Infeksi</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan badan meningkat - Kadar sel darah putih membaik 	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

**COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING
ASSESMENT**

Riwayat Kesehatan Lalu :

MIST

Mekanisme Cedera: Klien mengalami Kecelakaan lalu lintas, dan terdapat luka terbuka pada bagian kepala, klien mengalami penurunan kesadaran.

Injury : terdapat Jejas di bagian kepala

Sign & Symptom: klien mengalami luka terbuka pada kepala dan nyeri yang dirasakan serta mengalami penurunan kesadaran

Treatment Pre Hospital: -

SAMPLE

S: Sign & Symptom: luka terbuka pada kepala, nyeri, penurunan kesadaran

A (Allergies) = tidak ada M (Medications) = telah dilakukan operasi craniectomy

P (Past Illness) = tidak ada

L (Last Meal) = tidak dapat dikaji

E (Event Leading) = tidak ada

AIUEO

A Alkohol) : tidak ada

I (Insulin) : tidak ada

U (Uremia) : tidak ada

E (Epilepsi) : tidak ada

O (Over dosis) : tidak ada

Pengkajian B1-B6B1 (Breathing)

- Bentuk dada: Normochest
- RR : 28 x/menit
- Pola Nafas
- Terpasang OPA (+): tampak terpasang
OPA pada klien NPA (+/-): tidak
- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): ya, ada retraksi otot dada pada pasien
- Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak
- Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: terpasang ventilator pada pasien
- Suara Nafas: ronkhi
- Suara nafas tambahan : Wheezing (+/-): - Stridor (+/-): - Gargling (+/-): - Ronkhi (+/-) : +
Snoring (+/-) : -

Masalah : Bersihan jalan napas tidak efektif

B2 (Circulation)

- Tekanan Darah : 140/77mmHg
- CRT : < 3 detik
- Sianosis (+/-): tidak
- Konjunctiva: tidak anemis
- Nadi : 110 x/menit
- Suhu : 37,8 °C

Masalah : Perfusi Perifer Tidak Efektif

B3 (Neurologi)

- Tingkat Kesadaran : Somnolen
- GCS E 2 M 2 Vx
- Refleks Kornea (+/-): +/+
- Refleks Cahaya (+/-): +/+
- Reflek Pupil (+/-): +/+
Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 / 2.5)
- Refleks Motorik (bisep +/+ trisep +/+ patella +/+): sulit dikaji
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): sulit dikaji

Masalah : Penurunan kapasitas adaptif intrakrania

B4 (Bladder)

- Edema Vagina/Scrotum (+/-): tidak ada
- Produksi Urine: 200 ml/ 24 jam
- Warna Urine: pekat
- Bau Urine: amonia
- Sedimen Urine (+/-): - darah (+/-): -
- Distensi Uretra (+/-): -
- Terpasang kateter Urine (+/-): iya Jenis: foley
- Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) :Input:
Fentanyl 30 mcg
Metamizole 1 gr
Ceftriaxon 1 gr
Asam traneksamat 500 mg
Monitol 20% 125 cc
Fenitoin 100 mg
Nikardipin 1 mg
Metoclopramid 10 mg
Respiredon 2 mg
Asetazolamid 1 tab/20 cc
Paracetamol 1 gr
Propranolol 20 mg
Susu 400
Infus 1000 ccOutpute Urine 200 ml
IWL : 15 x 60 x 24 / 24 Jam = 900
Perhitungan BC: 2.505- 2.740= -235 cc

Masalah : tidak

B5 (Bowel)

- Terpasang NGT (+/-): +, ukuran: 18 Fr, sudah terpasang 6 hari
- Kebutuhan Cairan: 1000 cc/24 J
- Kebutuhan Nutrisi Parenteral 700/24 J, Jenis: susu dan bubur saring
- Retriksi Cairan (+/-): tidak
- Residu lambung banyak \pm 10 cc
- Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris
- Distensi Abdomen (+/-): -
- Asites (+/-):-
- Mual (+/-):-
- Muntah (+/-):-
- Peristaltik Usus: 8 x/menit

Masalah : tidak

B6 (Bone)

- Warna Kulit: coklat
- Decubitus (+/-): +, bagian bokong
- Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif
- Kekuatan Otot :

$$\frac{1}{1} \bigg| \frac{1}{1}$$

- Lesi (+/-): terdapat lesi pada tangan dan kak
- Fraktur (+/-): -
- Dekubitus (+/-): -
- Luka terbuka (+/-): +, terdapat luka pada bagian kepala
- Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op craniectomi hari ke- 5
Ukuran : -
Area : kepala



Keterangan Gambar : Operasi Craniectomy evakuasi hematoma + dekompresi

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman

- Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci: PQRST



Pengkajian Nyeri Face Analogue Scale pada pasien dengan kesadaran menurun

Kategori	Penilaian	Skor
Ekspresi wajah	Tidak ada ekspresi wajah tertentu/ tersenyum	0
	Menyeringai sekali-kali/ mengerutkan dahi, muram, ogah-ogahan	1 √
	Dagu gemetar dan rahang dikecap berulang	2
Ekstremitas	Posisi normal/ santai	0
	Gelisah, resah dan tegang	1 √
	Menendang/menarik kaki	2
Gerakan	Rebahan dengan tenang, posisi normal, bergerak dengan Mudah	0
	Mengerang/merengek	1 √
	Menangis tersedu-sedu, menejrit, terisak-isak, menggerutu berulang-ulang	2
Kemampuan ditenangkan	Senang, santai	0
	Dapat ditenangkan dengan sentuhan, pelukan atau berbicara, dapat dialihkan	1 √
	Sulit/tidak dapat ditenangkan dengan pelukan, sentuhan atau distraksi	2
	Total	4

Interpretasi

0 = tidak nyeri

1-3 = nyeri ringan

4-6 = nyeri sedang

7-10 = nyeri berat

- Apakah ada riwayat pembedahan ?
Ya. Pasien post op craniectomy hari ke lima

Pengkajian Aktivitas, Istirahat dan Tidur

• **AKTIFITAS**

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Istri klien mengatakan bahwa suaminya sesekali berolahraga
- Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Istri klien mengatakan bahwa dulu sebelum kecelakaan suaminya tidak menggunakan alat bantu dalam beraktivitas
- Istri klien mengatakan bahwa suaminya akan bangun pagi-pagi dan berangkat kerja
- Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci. Selama sakit klien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan kesadaran. Klien hanya mampu berbaring di tempat tidur, klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya. Skor barthel index: 0 (ketergantungan total)

• **ISTIRAHAT**

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Istri klien mengatakan sebelum sakit suaminya biasa tidur
- siang 1 jam dan tidur malam sekitar 8 jam
- Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? Istri klien mengatakan bahwa suaminya akan berkumpul denganteman-temannya di mesjid
- Istri klien mengatakan bahwa suaminya kadang tidur siang
- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? Istri klien mengatakan bahwa suaminya sering mengaji untuk mengisi waktu luang
- Saat ini klien tampak hanya berbaring di tempat tidur

• **TIDUR**

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lama, nyenyak/tidak?) Istri klien mengatakan bahwa suaminya tidur siang sekitar 1 jam dan tidur malam 8 jam, pola tidur teratur
- Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?: Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Istri klien mengatakan bahwa suaminya tidak menggunakan obat penenang
- Istri klien mengatakan bahwa suaminya akan menonton TV terlebih dahulu
- Bagaimana kebiasaan tidur? Istri klien mengatakan bahwa klien tidur sesuai dengan kebiasaannya yaitutidur siang dan malam
- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? Istri klien mengatakan bahwa tidur suaminya tampaknyenyak
- Apakah klien sering terjaga saat tidur? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? : Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

Pengkajian Riwayat Sosial :

- Apakah klien mempunyai teman dekat? Istri klien mengatakan bahwa suaminya mempunyai teman dekat
- Siapa yang dipercaya klien? Istri klien mengatakan bahwa dia dan suaminya saling mempercayai
- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Suami klien mengatakan bahwa istrinya biasa ikut pegajian dan dakwah
- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Istri klien mengatakan bahwa semua yangdilakukan klien dulu sesuai kemampuannya

Pengkajian Riwayat Psikologi:

- Status Emosi.
 - Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Suami klien mengatakan bahwa klien akan langsung mengekspresikan perasaannya jika sedih atau senang
 - Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
- Konsep diri:
 - Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Hal-hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Bagaimana klien memandang diri sendiri? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun
 - Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

Pengkajian Riwayat Spiritual :

- Apakah klien menganut satu agama? Klien menganut agama islam
- Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Klien mengalami penurunan kesadaran sehingga klien tidak mampu melaksanakan sholat
- Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama: Sulit dikaji, pasien dalam keadaan kesadaran menurun

PEMERIKSAAN TANDA-TANDA VITAL

1. TANDA VITAL

TD : 140/77 mmHg
HR : 110 x/menit
RR : 28 x/menit
S : 37,8⁰c
SPO2 : 98 % ETCO2 : -
PAIN : -

2. Pemeriksaan Fisik Kepala dan Leher

- a. Inspeksi : bentuk normal, kepala tampak botak, tampak ada luka post operasi
Telinga : bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga
Mata : mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor, refleks cahaya +/+, refleks pupil +/+, kedua mata bisa terbuka, tidak ada lesi pada mata
Hidung : bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah
Mulut : mukosa bibir agak kering, tidak ada luka/ lesi, terdapat sekret pada mulut, tidak ada tonsilitis, gigik putih
Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP

3. Thoraks

- a. Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas
- b. Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- c. Perkusi : suara sonor
- d. Auskultasi : ronkhi

4. Pelvis

- a. Inspeksi : tampak bersih, tidak ada benjolan
- b. Palpasi : tidak ada benjolan

5. Ekstremitas atas/bawah

- a. Inspeksi :
Atas : klien tidak mampu menggerakkan tangannya karena penurunan kesadaran
Bawah : klien tidak mampu menggerakkan kakinya karena penurunan kesadaran
- b. Palpasi :
Atas : sulit dikaji,
teraba hangat
Bawah :
sulit dikaji, teraba hangat

6. Punggung

- a. Inspeksi : tidak ada edema, tidak ada lesi
- b. Palpasi : sulit dikaji

7. Genitalia

- a. Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine sejak tanggal 24 agustus 2022, tidak ada edema, ada lukadekubitus pada bokong
- Palpasi : Sulit dikaji

**PEMERIKSAAN
DIAGNOSTIK**

-SCAN USG -lain:

Hasil :

Foto Thoraks AP (tanggal 15/02/2023):

- Terpasang CVC pada hemithorax kanan melalui v.subclava kanan dengan tip setinggi paravertebral kanan CV T8 kesan pada cavoatrial junction
- Pneumonia kiri

MSCT Brain (tanpa kontras) (15/02/ 2023)

- Pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml
- Brain edema
- Defek of frontotemporoparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op)
- Multihematosinus

MSCT Kepala 3 Demensi (tanpa kontras) (15/02/ 2023)

- Fraktur linear pada os temporalis kiri
- Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml
- Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan
- Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm
- Brain edema
- Panhematosinus
- Subgaleal hematoma regio temporalis kiri

**PEMERIKSAAN
LABORATORIUM**

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
HEMATOLOGI			
Hematologi Rutin			
WBC	16.4	4.00-10.00	10 ³ /uL
RBC	2.36	4.00-6.00	10 ⁶ /uL
HGB	6.6	12.0-16.0	gr/dl
HCT	20	37.0-48.0	%
MCV	83	80.0-97.0	fL
MCH	28	26.5-33.5	pg
MCHC	34	31.5-35.0	gr/dl
PLT	207	150-400	10 ³ /uL
RDW-SD		37.0-54.0	fL
RDW-CV	15.4	10.0-15.0	fL
PDW	00,0	10.0-18.0	fL
MPV	0,00	6.50-11.0	fL
P-LCR		13.0-43.0	%
PCT	0.20	0.15-0.50	%
NEUT	64.7	52.0-75.0	%
LYMPH	18.8	20.0-40.0	%
MONO	11.2	2.00-8.00	%
EO	3.0	1.00-3.00	10 ³ /uL
BASO	2.3	0.00-0.10	10 ³ /uL
RET		0.00-0.10	10 ³ /uL
LED I		(L < 10, P <20)	10 ³ /uL
LED II Jam II			mm
Koagulasi			
PT	11.9	10-14	detik
INR	1.10	-	
APTT	33.1	22.0-30.0	detik
KIMIA DARAH			
Glukosa			
GDS	72	140	mg/dl
Fungsi Ginjal			
Ureum	284	10-50	mg/dl
Kreatinin	14.42	L 9< 1.3);P (<1.1)	mg/dl
Fungsi Hati			
SGOT	183	<38	U/L
SGPT	173	<41	U/L
Albumin	2.9	3.5-5.0	gr/dl
Elektrolit			
Natrium	125	136-145	mmol/l
Kalium	6.1	3.5-5.1	mmol/l
Klorda	99	97-111	
Analisa Gas Darah			
PH	7.670	7.35 – 7.45	
SO ₂	99.9	95 – 98	%
PO ₂	189.6	80.0 – 100.0	mmHg
ctO ₂	14.9	15.8 – 22.3	ml/dl
PCO ₂	37.3	35.0 – 45.0	mmHg
ctCO ₂	27.9	23 – 27	mmol/l
HCO ₃	26.7	22 – 26	mmol/l
BE	2.7	-2 s/d +2	mmol/l

ANALISA DATA

N O	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>DS: Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer - Kesadaran semi koma dengan GCS , E2 M2 Vx - Pasien nampak tidak mampu batuk dan mengeluarkan secret dari dalam mulutnya - HR: 110 x/menit - RR: 28 x/menit 	<p>Spasme jalan nafas</p> <p>Hipersekresi jalan nafas</p> <p>Sekresi yang tertahan</p>	<p>Bersihkan jalan napas tidak efektif</p>
2.	<p>DS : Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas - Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS E2 M2 Vx - MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema , Defek of frontotemporo-parietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus. - MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kiri, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematoma regio temporalis kiri - TD : 140/77 mmHg - HR : 110x/menit <p>Post op</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat benturan kepala - Riwayat muntah 2x - Riwayat tidak sadar 	<p>Gangguan metabolisme</p> <p>Edema serebral</p>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>

3.	<p>DS: Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat luka post op craniectomy pada kepala - Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan - Skala nyeri 4 dengan VAS <p>Tanda-tanda vital</p> <p>TD : 140/77 mmHg</p> <p>HR : 110x/menit</p> <p>- RR : 28 x/menit</p>	<p>Agen pencedera fisiologis</p> <p>Agen pencedera fisik</p>	<p>Nyeri akut</p>
4.	<p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien post op craniectomy hari ke 5 - Terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu - Terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu - Hasil Hematologi rutin: <p>WBC 16.4 (Normal: 4.00-10.00 10³/uL)</p> <p>HGB 6.6 (Normal: 12.0-16.00 gr/dl)</p> <p>HCT 20 (Normal: 37.0-48.0%)</p>	<p>Efek prosedur infasif</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>Resiko infeksi</p>
5.	<p>DS: tidak ada</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HGB 6.6 - HCT 20 - Akral teraba dingin - Warna kulit pucat - Turgo kulit menurun 	<p>Penurunan konsentrasi hemoglobin</p>	<p>Perfusi perifer tidak efektif</p>

Diagnosis Keperawatan

No	DIAGNOSA KEPERAWATAN
1.	<p>(D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer - Kesadaran semi koma dengan GCS E2 M2 Vx - Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya - HR: 110 x/menit - RR: 28x/menit
2.	<p>(D.0066) Penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan: DS : Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas - Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS E2 M2 Vx - MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema , Defek of frontotemporoparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus. - MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kiri dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kanan, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematoma regio temporalis kiri - TD : 140/77 mmH - HR : 110 x/menit
3.	<p>(D.0077) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala) dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat luka post op craniectomy pada kepala - Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan - Skala nyeri 4 dengan VAS - Tanda-tanda vital <p>TD : 140/77 mmHg</p> <p>HR : 110 x/menit</p> <p>RR : 28 x/menit</p>
4.	<p>(D.0142) Risiko infeksi dibuktikan dengan dengan efek prosedur invasif dibuktikan dengan: Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien post op craniectomy hari ke 5 - Terpasang NGT ukuran 18 Fr terpasang sejak 6 hari yang lalu - Terpasang kateter urine terpasang sejak 6 hari yang lalu - Hasil <p>Hematologi rutin: WBC 16.4</p> <p>HGB 6.6</p> <p>HCT 20</p>
5.	<p>(D.0009) Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin</p> <p>DS: tidak ada</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HGB 6.6 - HCT 20 - Akral teraba dingin - Warna kulit pucat - Turgo kulit menurun

Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencana Intervensi	Raional
1.	<p>(D.0149) Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer - Kesadaran semi koma dengan GCS, E2 M2Vx - Pasien tampak mampu batuk tapi tidak mampu mengeluarkan secret dari dalam mulutnya - HR: 110 x/menit - RR: 28 x/menit 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produksi sputum menurun - Frekuensi napas membaik 	<p>Manajemen Jalan Napas Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas - Monitor sputum <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu 	<p>Manajemen Jalan Napas Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas - Untuk mengetahui pola nafas atau suara nafas seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi. - Mengetahui adanya jumlah, warna sputum serta produksi sputum <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction - Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction - Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk melebarkan saluran pernapasan pasien.
2.	<p>(D.0066) Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema cerebral dibuktikan dengan: DS : Tidak dapat dikaji DO:</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3 x 24 jam maka penurunan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan kriteria hasil:</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK - Monitor peningkatan TD 	<p>Pemantauan tekanan intrakranial Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui penyebab peningkatan TIK - Mengetahui peningkatan TD

	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas - Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS, E2 M2 Vx - MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema , Defek of frontotemporoparietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op), Multihematosinus. - MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/- 7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kiri, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematoma regio temporalis kiri - TD : 140/77 mmH - HR : 110 x/menit 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesadaran meningkat - Tekanan darah membaik - Tekanan nadi membaik - Pola napas membaik - Tekanan intrakranial membaik 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor tingkat kesadaran - Monitor kadar CO2 dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan sterilitas sistem pemantauan - Pertahankan posisi kepala dan leher netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien - Berikan terapi non farmakologi - Dokumentasikan hasil pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui tingkat kesadaran - Mengetahui kadar CO2 pasien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kebersihan sistem pemantauan - Mencegah terjadinya peningkatan tekanan intrakranial - Memantau kondisi pasien - Bukti dan informasi yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan
3.	<p>(D.0077) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencederafisik (trauma kepala) dibuktikan dengan: DS: Tidak dapat dikaji DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat luka post op craniectomy pada kepala - Pasien tampak mengerang dan mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan - Skala nyeri 4 dengan VAS - Tanda-tanda vital TD : 140/77 mmHg 	<p>Tingkat nyeri Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam maka nyeri berkurang, kenyamanan meningkat. Kriteria Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meringis dapat menurun - Fekkuensi nadi membaik - TD kanan darah membaik 	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hipnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui skala nyeri pasien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengurangi rasa nyeri melalui teknik nonfarmakologi <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bekerja sama dengan profesi lain untuk menurunkan nyeri yang dialami pasien

4.	<p>(D.0142)Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedurinvasif dibuktikan dengan: Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien post op craniectomy hari ke 5 - Terpasang NGT ukuran 18 Fr masuk kerumah sakit tanggal 15 Februari2023 - Terpasang kateter urine sejak tanggal 15Februari 2023 - Hasil Hematologi rutin: - WBC 16.4 - HGB 6.6 - HCT 20 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan badan meningkat - Kadar sel darah putih membaik 	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokaldan sistemik <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontakdengan pasien dan lingkungan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasienberisiko tinggi <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian antibiotic, jikaperlu</p>	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kontaminasi bakteri - Untuk mengurangi kontaminasi silang - Mengurangi risiko infeksi pasca- prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika Perlu
5.	<p>(D.0009)Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin DS: tidak ada DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HGB 6.6 - HCT 20 - Akral teraba dingin - Warna kulit pucat - Turgo kulit menurun - TD: 140/77 mmHg - Nadi : 110x/menit 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan keadekuatan aliran darah meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna kulit pucat menurun - Pengisian kapiler membaik - Akral membaik - Turgo kulit membaik 	<p>Perawatan Sirkulasi (I.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer - Identifikasi faktor resiko <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pencegahan infeksi - Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan perawatan kulit 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk melihat dan penyebab peerfusi perifer pasien - untuk mengidentifikasi resiko yang sehingga pasien mnegalami risiko perfusi perifer <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk menjaga kebersihan sehingga tidak terjadi infeksi - Supaya tekanan darah tetap normal <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk memperbaiki kondisi kulit

Implementasi dan Evaluasi

Hari/Tanggal/Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI
<p>Selasa, 21 Februari 2023</p> <p>14:10 WITA</p> <p>14.30WITA</p> <p>15.30 WITA</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : frekuensi napas 28 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak bernapas dengan dada dan perut - Monitor bunyi napas Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Monitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : klien di suction setiap 15 menit <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi napas 28 x/menit - Retraksi otot dada ada - Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Terpasang oksigen 5-6 liter per menit <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas - Monitor bunyi napas - Monitor sputum - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir - Berikan oksigen - Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu
<p>14:20 WITA</p> <p>15:00 WITA</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-5 - Monitor peningkatan TD Hasil : 140/77 mmHg - Monitor tingkat kesadaran Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E 2 M 2 V1 - Monitor kadar CO₂ dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan Hasil : pernapasan 28x/menit, SPO₂ 98% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 140/77 mmHg - Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 138/79 mmHg - Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 110 x/menit - Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 110 x/menit - Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 28 x/menit - Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 28 x/menit - Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi


16:10 WITA	<ul style="list-style-type: none"> - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit - Berikan terapi non farmakologis Hasil : klien diberi terapimurottal selama 15-20menit - Dokumentasikan hasil pemantauan - Hasil : Nilai GCS 5 Menit - sebelum terapi GCS E2 M2Vx, setelah terapi E2 M2 Vx. TTV 2 menit sebelum terapi TD 140/77 mmHg, HR 110 x/i, RR 38 x/i, S : 37,8^oC, SPO₂ 98%, - Setelah terapi TD 138/79 mmHg, HR 110 x/i, RR 28 x/i, S: 37,8^oC, SPO₂ 98% 	<p>selama sehari yaitu 37,8^oC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama sehari yaitu 37,8^oC - Nilai GCS sebelum intervensi selama sehari yaitu GCSE2 M2 Vx - Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS E2 M2 Vx <p>A: masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK - Monitor peningkatan TD - Monitor tingkat kesadaran - Pertahankan posisi kepala dan leher netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien - Berikan terapi non farmakologis - Dokuemntasikan hasil pemantauan
<p>14.05 WITA</p> <p>14.35 WITA</p> <p>15:20 WITA</p>	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan. Skala nyeri klien 4 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) Hasil : klien diberikan kompres dingin <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skala nyeri 4 - Pasien tampak masih gelisah - TD : 138/79 mmHg - HR : 110 x/menit - RR : 28 x/menit - S : 37,8^oC <p>A : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri - Berikan terapi non farmakologi - Kolaborasi pemberian analgetik

15.30 WITA	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil : suhu klien 37,8°C, tidak ada pus pada luka post operasi</p>	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu tubuh 37,8°C - Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik - Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU - WBC : 16.6
15.35 WITA	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung <p>Hasil : jumlah pengunjung dibatasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien <p>Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Hasil : teknik aseptik dipertahankan</p>	<p>A : masalah infeksi belum teratasi</p> <p>P : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien
17:30 WITA	<p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p>	
21.00 WITA		
15.40 WITA	<p>Perawatan Sirkulasi (I.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer <p>Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin , turgor kulit menurun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor resiko <p>Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20%</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan infeksi <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur <p>Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin</p>	<p>S : - Tidak ada</p> <p>O : - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin</p> <p>Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20%</p> <p>A : Masalah perfusi perifer belum tertasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer - Identifikasi faktor resiko - Lakukan pencegahan infeksi - Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur
15.45 WITA		
17:50 WITA	<p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan kulit 	
21.20 WITA		

Hari/Tanggal/Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI
<p>Rabu, 22 Februari 2023</p> <p>21:10 WITA</p> <p>21.30WITA</p> <p>22.30 WITA</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : frekuensi napas 29 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak bernapas dengan dada dan perut - Monitor bunyi napas Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Monitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : klien di suction setiap 15 menit <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi napas 28 x/menit - Retraksi otot dada ada - Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Terpasang oksigen 5-6 liter per menit <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas - Monitor bunyi napas - Monitor sputum - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir - Berikan oksigen - Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu
<p>21:20 WITA</p> <p>21:40 WITA</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-5 - Monitor peningkatan TD Hasil : 140/77 mmHg - Monitor tingkat kesadaran Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E 2 M 2 V1 - Monitor kadar CO₂ dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan Hasil : pernapasan 26 x/menit, SPO₂ 98% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 140/78mmHg - Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 137/77 mmHg - Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 103 x/menit - Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 101 x/menit - Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 29 x/menit - Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 28 x/menit - Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi selama sehari yaitu 37,9°C - Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama

21:50 WITA	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan terapi non farmakologis Hasil : klien diberi terapimurottal selama 15-20menit - Dokumentasikan hasil pemantauan - Hasil : Nilai GCS 5 Menit - sebelum terapi, GCS E2 M2 Vx setelah terapi E2 M3 Vx. - TTV 2 menit sebelum terapi TD 140/78 mmHg, HR 103 x/i, RR 29 x/i, S : 37,9°C, SPO₂ 96%, Setelah terapi TD 137/77 mmHg, HR 101 x/I, RR 28 x/i, S: 37,7°C, SPO₂ 99% 	<p>sehari yaitu 37,7°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai GCS sebelum interensi selama dua hari yaitu GCS E2 M2 Vx - Nilai GCS setelah intervensi selama dua hari yaitu GCS E2 M3 Vx <p>A: masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK - Monitor peningkatan TD - Monitor tingkat kesadaran - Pertahankan posisi kepala dan leher netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien - Berikan terapi non farmakologis - Dokuemntasikan hasil pemantauan
<p>21.05 WITA</p> <p>21.35 WITA</p> <p>06:20 WITA</p>	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan. Skala nyeri klien 4 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) Hasil : klien diberikan kompres dingin <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skala nyeri 4 - Pasien tampak masih gelisah - TD : 137/77 mmHg - HR : 101x/menit - RR : 28 x/menit - S : 36,7°C <p>A : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri - Berikan terapi non farmakologi - Kolaborasi pemberian analgetik
<p>21.30 WITA</p> <p>21.35 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : suhu klien 37,8°C, tidak ada pus pada luka post operasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung Hasil : jumlah pengunjung dibatasi 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu tubuh 37,7°C - Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik - Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU

22:30 WITA	<ul style="list-style-type: none"> - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : tehnik aseptik dipertahankan <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam 	<ul style="list-style-type: none"> - WBC : 16.6 <p>A : masalah infeksi belum teratasi P : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien
<p>21.35 WITA</p> <p>21.40 WITA</p> <p>22:50WITA</p>	<p>Perawatan Sirkulasi (I.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin , turgor kulit menurun - Mengidentifikasi faktor resiko Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan infeksi Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam - Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan kulit 	<p>S : - Tidak ada O : - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat, akral teraba dingin</p> <p>Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20%</p> <p>A : Masalah perfusi perifer belum tertasi P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer - Identifikasi faktor resiko - Lakukan pencegahan infeksi - Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur



Hari/Tanggal/Jam	IMPLEMENTASI	EVALUASI
<p>Kamis, 23 Februari 2023</p> <p>05:10 WITA</p> <p>05.30WITA</p> <p>05.40 WITA</p>	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) Hasil : frekuensi napas 27 kali/menit, retraksi otot dada ada, pasien tampak bernapas dengan dada dan perut - Monitor bunyi napas Hasil : terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Monitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan dengan tekstur kental <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi Hasil : pasien diberikan posisi semi fowler - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : klien di suction setiap 15 menit <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik, jika perlu Hasil : pasien di nebulizer sebelum disuction 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi napas 26 x/menit - Retraksi otot dada ada - Ada bunyi napas tambahan yaitu ronkhi - Terpasang oksigen 5-6 liter per menit <p>A : Masalah bersihan jalan napas belum teratasi</p> <p>P : lanjutkan intervensi manajemen jalan napas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor pola napas - Monitor bunyi napas - Monitor sputum - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir - Berikan oksigen - Kolaborasi pemberian bronkodilator, mukolitik, jika perlu
<p>21:20 WITA</p> <p>21:40 WITA</p>	<p>Pemantauan tekanan intrakranial</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK Hasil : pasien mengalami trauma kepala dengan ICH dan SDH, pasien post op craniectomy hari ke-5 - Monitor peningkatan TD Hasil : 138/79 mmHg - Monitor tingkat kesadaran Hasil : kesadaran stupor dengan nilai GCS E2 M3 V1 - Monitor kadar CO₂ dan pertahankan pada rentang yang diindikasikan Hasil : pernapasan 26 x/menit, SPO₂ 98% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan posisi kepala dan leher netral Hasil : posisi kepala klien dalam keadaan netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai rata-rata TD sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 138/79mmHg - Nilai rata-rata TD setelah pemberian intervensi yaitu 131/80 mmHg - Nilai rata-rata HR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 94 x/menit - Nilai rata-rata HR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 90 x/menit - Nilai rata-rata RR sebelum pemberian intervensi selama satu hari yaitu 27 x/menit - Nilai rata-rata RR setelah pemberian intervensi selama satu hari yaitu 26 x/menit - Nilai rata-rata suhu sebelum pemberian intervensi selama sehari yaitu 37,9°C - Nilai rata-rata suhu setelah pemberian intervensi selama

06:100 WITA	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan terapi non farmakologis Hasil : klien diberi terapimurottal selama 15-20menit - Dokumentasikan hasil pemantauan - Hasil : Nilai GCS 5 Menit sebelum terapi , GCS E2 M3 Vx, Setelah terapi E3 M4 Vx TTV 2 menit sebelum terapi, TD 138/79 mmHg, HR 94 x/i, RR 27 x/i, S : 37,9°C, SPO₂ 98%, - Setelah terapi TD 131/80 mmHg, HR 90 x/i, RR 26 x/i, S: 37,6°C, SPO₂ 99% 	<p>sehari yaitu 37,6°C</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai GCS sebelum interensi selama tiga hari yaitu GCS E2 M3 Vx - Nilai GCS setelah intervensi selama sehari yaitu GCS E3 M4 Vx <p>A : masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK - Monitor peningkatan TD - Monitor tingkat kesadaran - Pertahankan posisi kepala dan leher netral - Atur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien - Berikan terapi non farmakologis - Dokuemntasikan hasil pemantauan
<p>21.05 WITA</p> <p>21.35 WITA</p> <p>06:20 WITA</p>	<p>Manajemen nyeri</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri diukur dengan VAS, klien tampak menyeringai sekali-kali, gelisah, mengerang sekali-kali, dan dapat ditenangkan dengan sentuhan. Skala nyeri klien 4 <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam, terapi murattal) Hasil : klien diberikan kompres dingin <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu. Hasil : klien diberi metamizole 1 gram setiap 8 jam 	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skala nyeri 4 - Pasien tampak masih gelisah - TD : 131/80 mmHg - HR : 90 x/menit - RR : 26 x/menit - S : 37,6°C <p>A : masalah nyeri akut belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi skala nyeri - Berikan terapi non farmakologi - Kolaborasi pemberian analgetik

<p>21.30 WITA</p> <p>21.35 WITA</p> <p>22:30 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Hasil : suhu klien 37,9°C, tidak ada pus pada luka post operasi</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung <p>Hasil : jumlah pengunjung dibatasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien <p>Hasil : perawat selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Hasil : teknik aseptik dipertahankan</p> <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p>	<p>S : tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suhu tubuh 37,6°C - Perawat tampak mencuci tangan sebelum melakukan tindakan aseptik - Tidak ada kunjungan bagi pasien yang dirawat di ruang ICU - WBC : 16.4 <p>A : masalah infeksi belum teratasi</p> <p>P : intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien
<p>21.30 WITA</p> <p>21.35 WITA</p> <p>22:30 WITA</p>	<p>Perawatan Sirkulasi (I.02079)</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa sirkulasi perifer <p>Hasil : Pasien tampak lemah, warna kulit pucat,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi faktor resiko <p>Hasil : Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20%</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencegahan infeksi <p>Hasil : pasien diberi ceftriaxone 1 gram setiap 8 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur <p>Hasil : Pasien pernah diberikan nicardipin</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan melakukan perawatan kulit 	<p>S : - Tidak ada</p> <p>O : - Pasien tampak lemah, warna kulit pucat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil lab HGB :6.6 gr/dl , HCT : 20% <p>A : Masalah perfusi perifer belum tertasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer - Identifikasi faktor resiko - Lakukan pencegahan infeksi - Anjurkan meminum obat pengontrol tekanan darah secara teratur

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis asuhan keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian adalah proses pengumpulan data dan informasi baik subyektif maupun obyektif, seperti: mewawancarai pasien dan anggota keluarga, meemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik, serta peninjauan riwayat penyakit pasien di rekam medis. Selain pengumpulan data yang aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu mengidentifikasi peluang dan risiko promosi kesehatan yaitu mencegah potensi penyakit atau masalah yang dapat ditunda (Nurarif & Kusuma, 2020).

Berdasarkan hasil pengkajian, diketahui kronologis pasien mengalami kecelakaan lalu lintas pada tanggal 15 Februari 2023 dan dibawa ke RS Faisal. Beberapa jam kemudian, pasien dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo karena pasien mengalami penurunan kesadaran setelah 4 jam mengalami kecelakaan. Pasien mengalami penurunan kesadaran yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang dialami pasien antara lain luka terbuka di belakang kepala, dan riwayat muntah ada setelah kecelakaan. Sesuai dengan penelitian (Andra Safitri, 2021), dimana pasien Cedera Kepala biasanya memiliki keluhan utama yang berbeda-beda seperti gangguan kesadaran, perdarahan di otak, hilang ingatan sementara, sakit kepala, mual dan muntah, gangguan pendengaran, edema paru, kejang, infeksi, tanda-tanda prolaps otak, hemiparesis, gegar otak, patah tulang tengkorak.

Dari hasil pengkajian saat ini pasien post op craniectomy hari ke 5, hasil pemeriksaan fisik Tn.A didapatkan luka berat di kepala. Cedera kepala diklasifikasikan berdasarkan skor Glasgow Coma Scale (GCS), dengan skor GCS untuk Tn.A: 5 E: 2 M: 2 V:1. Skor GCS 8 atau kurang didefinisikan sebagai cedera kepala berat, cedera kepala sedang memiliki skor GCS 9-13, dan cedera kepala ringan memiliki skor GCS 14-15 (Nurarif & Kusuma, 2020).

Berdasarkan hasil pengkajian Tn.A didapatkan data objektif dengan penurunan kesadaran dan status Hemodinamik. Didapatkan hasil untuk Tn.A dengan tekanan darah 140/77, nadi 110 x/menit, pernafasan 26 x/menit dan suhu 37,8°C. Ketidakstabilan hemodinamik yang terjadi pada Tn.A dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dengan pengurangan volume untuk memenuhi kebutuhan nutrisi saat stabilitas hemodinamik tercapai dan dengan terjadinya perubahan hemodinamik pada pasien cedera kepala, sehingga suplai oksigen ke seluruh tubuh yang mempengaruhi fungsi jantung (Widya,2023). Hal ini sesuai dengan penelitian yang oleh (Diana Christine Lalenoh,2021). Pada kasus TBI, pasien mengalami berbagai peningkatan status hemodinamik seperti peningkatan suhu tubuh. Hipertermi merupakan salah satu pemicu meningkatkan laju metabolisme basal otak dan selanjutnya terjadi peningkatan aliran darah otak, yang diikuti dengan peningkatan tekanan intrakranial.

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah penilaian klinis terhadap respon klien terhadap proses kehidupan yang dialaminya, baik masalah kesehatan saat ini maupun aktual dan potensial (PPNI, 2017). Diagnosa keperawatan yang mungkin terjadi pada klien dengan cedera kepala berat antara lain: pola nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif, nyeri akut, penurunan kapasitas adaptif intrakranial, perfusi perifer tidak efektif, hipertermia/hipotermia, risiko gangguan integritas kulit dan jaringan, dan risiko infeksi, risiko cedera, dan risiko defisit nutrisi (Padila, 2012).

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data didapatkan diagnosa keperawatan yang muncul pada Tn A sebagai berikut:

- a. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan.

Diagnosa keperawatan yang paling penting dalam kasus ini adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, bersihan jalan nafas tidak efektif adalah

ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau sumbatan jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas yang paten (SDKI, 2017).

Dari hasil pengkajian didapatkan terdapat suara nafas tambahan, ronchi, terdapat sputum dengan jumlah banyak, konsistensi encer, pasien nampak tidak mampu batuk dan mengeluarkan sekret dari dalam mulutnya, dari data tersebut menunjukkan terdapat suara tambahan berarti menandakan adanya penebalan bronkial karena lendir, oleh karena itu, penumpukan sekret menyebabkan saluran udara yang cenderung menyempit sehingga udara yang masuk kedalam tubuh lebih sedikit (Rendy M. Clevo, 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Widya, 2023) yang menyatakan bahwa pasien cedera kepala mengalami kesulitan bernafas. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksadaran pada klien yang mencegahnya membersihkan sekret dari tubuhnya, atau ketidakmampuan pasien untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas paten.

- b. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan edema serebral.

Masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah terganggunya mekanisme dinamis intrakranial dalam untuk mengkompensasi rangsangan yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial (SDKI, 2017).

Dari hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami cedera kepala dan mengalami penurunan kesadaran akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami, cedera kepala adalah cedera yang mengenai bagian kepala yang dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul maupun luka karena benda tajam dari cedera tersebut dapat menyebabkan gangguan atau cedera otak yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran (Yulia, 2020). Kesadaran klien menurun dengan nilai GCS, E2 M2 Vx, hasil pemeriksaan MSCT Brain: pendarahan intracerebri lobus temporalis dextra dengan volume +/- 14 ml, Brain edema, Defek of frontotemporo-parietal dextra dengan terpasang drain tip kesan pada regio frontal dextra (post op),

Multihematosinus, MSCT Kepala: fraktur linear pada os temporalis kiri, Pendarahan intracerebri lobus temporalis kanan dengan volume +/-7.17 ml, Pendarahan subdural regio frontoparietooccipitalis kiri, Midline shift ke kiri sejauh +/- 0.54 cm, Brain edema, Panhematosinus, Subgaleal hematom regio temporalis kiri, TD : 140/77 mmH, HR : 110 x/menit. Dari data objektif pasien terlihat adanya penurunan kesadaran dan peningkatan hemodinamik pasien yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti: aliran darah yang tidak mencukupi menyebabkan transportasi oksigen yang tidak mencukupi ke jaringan yang menyebabkan gangguan di otak karena trauma, perubahan metabolisme pada tubuh, ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh, ketidakseimbangan elektrolit tubuh menyebabkan tidak optimalnya fungsi organ dan kerja kelistrikan otak (Zuhriana K, 2021).

c. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala).

Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, memiliki onset yang tiba-tiba atau lambat, intensitas ringan hingga berat, dan berlangsung kurang dari 3 bulan (SDKI,2017).

Dari hasil pengkajian didapatkan Terdapat luka post op craniectomy pada kepala, Pasien tampak mengerutkan dahi jika kepalanya ditekan, Skala nyeri 4 dengan VAS,. Menurut (Rini, et al., 2019), Pasien dengan cedera kepala mengalami kerusakan jaringan otak akibat dari benturan langsung dan tidak langsung, yang mengganggu fungsi otak. Fungsi penting sistem saraf di otak bergantung pada oksigen, glukosa, dan zat lainnya. Jika pasokan oksigen terganggu, dapat terjadi penurunan kesadaran, dan sel-sel otak mati dalam waktu 3-4 menit. Pasokan oksigen yang berkurang menyebabkan otak melakukan metabolisme energi anaerobik. Sisa metabolisme anaerobik berupa asam laktat dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan nyeri.

d. Risiko infeksi

Risiko infeksi didefinisikan sebagai peningkatan resiko terinfeksi oleh organisme patogen (SDKI,2017). Data obyektif pasien menunjukkan bahwa pasien post Op craniectomy ditemukan pada hari ke 5, terpasang NGT, terpasang drainase, terpasang kateter urin, WBC 16,4 (normal: 4.00-10.00 $10^3/uL$), HGB 6.6, (normal: 12.0-16.0 gr/dl), HCT 20, (normal: 37.0-48.0) dari data di atas menunjukkan bahwa risiko infeksi bagi pasien disebabkan oleh efek prosedur invasif dan peningkatan paparan terhadap patogen lingkungan, organisme dan penurunan hemoglobin (Padila,2021).

e. Perfusi perifer tidak efektif

Perfusi perifer yang tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah pada tingkat kapiler, yang dapat mengubah metabolisme tubuh (SDKI,2017). Dari hasil pengkajian didapatkan data obyektif pada pasien dengan warna kulit pucat, pengisian kapiler kurang dari 3 detik, akral teraba dingin, HGB 6,6. Perfusi perifer tidak efektif salah satu penyebabnya adalah penurunan konsentrasi hemoglobin (PPNI, 2017).

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan asuhan keperawatan pada pasien dibuat dengan menggunakan buku “Standar Intervensi Keperawatan Indonesia” dan “Standar Luaran Keperawatan Indonesia” dan rencana ini hanya dapat dibuat setelah data yang dikumpulkan telah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi masalah pasien dengan langkah-langkah tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

prosedur keperawatan untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif adalah manajemen jalan nafas, dengan fiksasi pada posisi semi fowler, dan aspirasi mukus setiap 15 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam penelitian oleh (Rudi Haryono,2021) bahwa masalah jalan nafas tidak efektif dilakukan posisi semi fowler karena dapat mengurangi sesak nafas dan untuk membuka jalan nafas. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kriteria hasil: peningkatan

produksi sputum, peningkatan frekuensi nafas, Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi masalah pasien dalam fase tindakan melalui observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi (PPI,2017).

Kemudian untuk diagnosa kedua yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi pemantauan tekanan intrakranial serta pemberian terapi muototal, sesuai dengan penelitian oleh (Rahmawati,2020) yang mengatakan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam pemberian terapi muototal, khususnya untuk meningkatkan status GCS dan hemodinamik pasien. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai kriteria hasil: Diharapkan masalah penurunan adaptabilitas intrakranial dapat meningkat dengan kriteria hasil: penurunan GCS meningkat status hemodinamik meningkat, tingkat kesadaran meningkat, tekanan darah membaik, pola nafas membaik, respon pupil membaik, tekanan intracranial membaik, tekanan nadi membaik (SLKI,2019).

Kemudian pada diagnosis ketiga yaitu nyeri akut diberikan intervensi manajemen nyeri, dimana pada intervensi ini memiliki tujuan dengan kriteria hasil: rasa meringis menurun, frekuensi nadi membaik, TD membaik. Menurut (Sahrir, 2004). Dalam penelitiannya nyeri cedera kepala dibagi menjadi nyeri kepala primer dan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala primer adalah nyeri kepala tanpa penyebab structural organik. Nyeri kepala sekunder adalah nyeri kepala yang diakibatkan oleh trauma kepala atau nyeri kepala posttrauma, infeksi otak, atau penyakit lainnya.

Untuk diagnosis keempat yaitu risiko infeksi dilakukan intervensi pencegahan infeksi. Rencana dibuat untuk mengatasi masalah pasien pada tahap tindakan, berdasarkan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi, dengan kriteria hasil: kadar sel darah putih membaik, kebersihan badan meningkat, karena risiko infeksi meningkatkan risiko serangan patogen, organisme dapat meningkat (SDKI,2017).

Kemudian pada diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan intervensi perawatan sirkulasi dengan kriteria hasil: pengisian kapiler membaik, tekanan daraah membaik, warna kulit puct menurun, akral

membaik dan turgo kulit membaik (SLKI,2019).

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien berlangsung selama tiga hari perawatan mulai tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2023 diruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pelaksanaan berlangsung sesuai dengan rencana yang disusun berdasarkan SDKI dan SIKI. Implementasi berlangsung sesuai dengan rencana yang dikembangkan dan sesuai dengan masalah perawatan pasien yang ditemukan.

Pelaksanaan tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tn A dengan diagnosis keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif yaitu manajemen jalan nafas berupa monitor pola napas dan bunyi napas setiap 2 jam sekali, monitor sputum, pemberian posisi semi fowler dan suction setiap 15 menit, serta terapi oksigen 5-6 liter/menit. Posisi semi fowler diberikan kepada pasien untuk menjaga bersihan jalan nafas pada pasien. Hal ini sesuai dengan penelitian (Adika, 2022) bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan nafas pada pasien. Menerapkan manajemen jalan nafas dengan menempatkan pasien pada posisi semi fowler terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal (Musri & Yudistirawati, 2021).

Kemudian pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial di berikan tindakan keperawatan yaitu pemantauan tekan intrakranial dengan pemberian terapi non farmakologis untuk meningkatkan GCS dan status hemodinamik pada pasien. Tindakan non farmakologi yang dilakukan berupa terapi murottal 3 hari berturut-turut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arif Setyo Upoyo,2021) yang diperoleh hasil setelah dilakukan stimulasi Al-Qur'an terdapat perbedaan skor GCS yang signifikan sebelum dan sesudah intervensi ($p=0,034$). Terdapat perbedaan yang bermakna peningkatan skor GCS antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol ($p=0.013$). Stimulasi mendengarkan murottal Al Quran berpengaruh positif terhadap

meningkatkan kesadaran pasien, sehingga direkomendasikan untuk pasien yang mengalami gangguan kesadaran akibat cedera kepala.

Pengaruh terapi murottal Al-Qur'an dengan penurunan status hemodinamik (tekanan darah sistolik, diastolik, MAP, HR dan RR) dan intervensi pendengaran murottal diperkuat oleh penelitian (Ernawaty,2021) yang menunjukkan bahwa penurunan tekanan darah dapat berhasil jika prosedur murottal Al Qur'an dijadwalkan, itu dilakukan selama 3 hingga 7 hari. Efektivitas murottal Al-Qur'an pada keadaan hemodinamik akibat cedera kepala.

Kemudian intervensi Nyeri Akut diberikan tindakan keperawatan berupa manajemen nyeri dengan pemberian tehnik non farmakologis seperti kompres hangat dan pemberian terapi murottal, dimana kompres hangat merupakan salah kegiatan mandiri perawat yang diberikan kepada pasien untuk mengatasi masalah hipertermia dan nyeri akut di samping tindakan kolaboratif pemberian analgetik. Menurut (Haryani & Adimayanti, 2021), penerapan kompres hangat memiliki efek penyaluran sinyal hipotalamus melalui keringat dan vasodilatasi perifer, sehingga proses perpindahan panas terjadi melalui proses konduktif dan evaporatif. Kemudian pada pemberian terapi murottal dimana Menurut penelitian yang dilakukan (Noor Khalilati,2019), salah satu teknik distraksi yang efektif adalah Terapi Murottal (mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an) yang dapat mengurangi rasa nyeri fisiologis, stres dan kecemasan dengan cara mengalihkan seseorang dari rasa nyeri. Dengan mengalihkan perhatian pada bunyi alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an melalui metode dengar, hal ini dapat menimbulkan rasa nyaman sehingga responden tidak terpaku pada nyeri.

Setelah itu pada diagnosis resiko infeksi diberikan tindakan keperawatan yaitu pencegahan infeksi berupa tetap mempertahankan tehnik aseptik atau kebersihan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, serta menjaga agar pasien tidak terkena ulkus dikubitus, dimana seperti yang kita ketahui bahwa jika tirah baring lama akan menyebabkan luka ulkus dikubitus, dimana

Ulkus decubitus adalah kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian kulit hingga jaringan dibawahnya, bahkan dapat menembus otot hingga tulang dan dapat mengganggu proses pemulihan pasien. Sebagai aturan, ada rasa nyeri yang terus menerus bahkan infeksi dapat berkembang sehingga proses pemulihan pasien semakin memakan waktu lama dan dapat meningkatkan durasi perawatan (Abdul Herman, 2021).

Kemudian pada diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan tindakan keperawatan berupa perawatan sirkulasi dengan pemantauan sirkulasi, serta melakukan pencegahan infeksi, serta pengontrolan tekanan darah secara teratur dengan pemberian obat pengontrol tekanan darah seperti nicardipin.

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif setelah diberikan intervensi selama 3 hari maka diperoleh bahwa frekuensi napas klien sedikit membaik meskipun belum stabil yaitu dari RR 28 x/menit menjadi RR 26 x/menit di hari ketiga. Selain itu, pada hari ke tiga suara nafas tambah sudah ada perubahan atau suara nafas tambahan sudah tidak terlalu parah, kemudian pada pernapasan dan intervensi dilanjutkan hingga kondisi klien stabil. Hal ini sejalan dengan penelitian Adika (2022) bahwa posisi semi fowler efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien.

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intrakranial setelah 3 hari intervensi terjadi peningkatan nilai GCS pada pasien yaitu pada hari pertama GCS E2 M2 Vx, hari kedua GCS E2 M3 Vx, hari ke tiga GCS E3 M4 Vx. Dan status hemodinamik pada klien juga mulai stabil setelah pemberian intervensi pada status hemodinamik pasien mengalami perubahan meskipun tidak signifikan yaitu hari pertama pre TD 140/77 post 136/80, pre HR 110 x/menit post 90 x/menit, pre RR 28 x/menit post RR 26 x/menit. Salah satu intervensi efektif yang dilakukan pada masalah penurunan adaptabilitas intrakranial dengan penurunan GCS dan status hemodinamik adalah terapi mendengarkan Murotal Al-Qur'an, yang memiliki efek positif pada sensitasi pasien dan oleh karena itu direkomendasikan untuk pasien yang

sedang mengalami penurunan kesadaran akibat cedera kepala (Zuhriana K,2019).

Evaluasi sumatif pada masalah keperawatan nyeri selama 3 hari intervensi terjadi penurunan skala nyeri dari 4 menjadi 3, klien masih tampak gelisah. Kemudian, masalah hipertermi sudah teratasi di mana suhu klien sudah mulai stabil yaitu mulai dari suhu 37,8 menjadi 37,5. Jika pasokan oksigen terganggu, dapat terjadi ketidaksadaran dan sel-sel otak mati dalam waktu 3-4 menit. Pasokan oksigen yang berkurang menyebabkan otak melakukan metabolisme energi anaerobik. Sisa metabolisme anaerob berupa asam laktat dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan nyeri (Rini, et al., 2019).


Evaluasi sumatif risiko infeksi setelah 3 hari intervensi ditemukan bahwa suhu klien mulai stabil yaitu 37,5 namun hasil lab WBC klien belum membaik yaitu 16.4. Menurut SDKI,(2017) yang menjelaskan tentang resiko infeksi yang didefinisikan sebagai berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

Evaluasi sumatif pada perfusi perifer tidak efektif setelah 3 hari intervensi ditemukan pasien tampak lemah dan warna kulit pucat namun hasil lab belum membaik yaitu HGB 6.6 gr/dl HCT 20% Menurut SDKI,(2017) salah satu penyebabnya dari perfusi perifer tidak efektif yaitu penurunan konsentrasi hemoglobin serta peningkatan tekanan darah (PPNI, 2017).

B. Analisis Intervensi EBPN

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Tn A yang dengan masalah Cidera Kepala berat atau *traumatik brain injury* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan intervensi terapi murottal selama 3 hari intervensi. Intervensi diberikan 1 kali sehari dengan cara memperdengarkan kepada klien dengan hasil pemantauan terjabarkan pada diagram berikut ini:

Diagram Pemantaun TTV




Berdasarkan hasil pemantauan tanda-tanda vital (status hemodinamik) pada pasien dari hari pertama sampai hari ke tiga maka diperoleh hasil bahwa terjadi perbedaan tekanan darah sebelum dan setelah intervensi dengan hasil perbedaan yang signifikan yaitu perubahan TTV sebelum dilakukan intervensi di dapatkan hari pertama TD:140/77 mmHg menjadi 138/79mmHg, N:110x/menit menjadi N:110x/menit, RR: 28x/menit menjadi RR:28x/menit, S: 37,8t menjadi 37,8, Spo2:97% menjadi 98%. Hari kedua didapatkan TTV sebelum dilakukan intervensi di dapatkan TD:140/78 mmHg menjadi 137/77mmHg, N:110x/menit menjadi N:103x/menit, RR: 28x/menit menjadi RR:29x/menit, S: 37,9 menjadi 37,7, Spo2:99% menjadi 99%. Hari ketiga didapatkan TTV: TD:138/79 mmHg menjadi 131/80mmHg, N:97x/menit menjadi N:90x/menit, RR: 27x/menit menjadi RR:26x/menit, S: 37,9 menjadi 37,6, Spo2:96% menjadi 99%.

Dari hasil analisis diatas klien mengalami perubahan pada status hemodinamik yaitu tekanan darah setelah diberikan intervensi berupa *Terapi Murottal*, dari hari pertama sampai hari ketiga didapatkan status hemodinamik

klien membaik yaitu dari TTV 140/77mmHg menjadi 131/80mmHg, N: 110Xx/menit menjadi 90x/menit, RR: 28x/menit menjadi 26x/menit, S: 37,8 menjadi 37,6 Spo2:97 menjadi 99%. Hal ini, menunjukkan bahwa penurunan kapasitas adaptif intrakranial pada klien membaik. Salah satu tanda dan gejala terjadinya penurunan kapasitas adaptif intrakranial yaitu tekanan darah meningkat penyebabnya yaitu edema serebral karena cedera kepala dan iskemik serebral (PPNI, 2017).

Dengan demikian, peneliti berasumsi bahwa terjadi perubahan status hemodinamik yaitu tekanan darah pada klien cedera kepala berat dengan penurunan kesadaran yang menggunakan intervensi *Terapi Murottal* selama tiga hari berturut-turut. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Siti Mutiah, 2022), yang menyatakan bahwa manfaat terapi mendengarkan lantunan Al-Qur'an merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang efektif untuk memperbaiki tanda vital dan meningkatkan saturasi oksigen, yaitu Mendengarkan dengan bacaan Al-Qur'an memberikan ketenangan jiwa, rasa lega, relaksasi dan suasana santai. Menurut sebuah studi oleh (Nejad et al Nejad et al.,2021), mendengarkan Al-Qur'an terbukti telah dapat menstabilkan hemodinamik pasien.

Diagram Pemantauan GCS



Berdasarkan pemantauan nilai GCS selama 3 hari terdapat hasil yang diperoleh yang signifikan yaitu terjadi peningkatan nilai GCS mulai dari hari pertama sampai hari ke tiga setelah pemberian intervensi. Sebelum pemberian intervensi nilai GCS E2 M2 Vx dan setelah intervensi hari pertama hasil nilai masi tetap dengan GCS E2 M2 Vx, selanjutnya pada hari ke dua nilai sebelumnya GCS E2 M2 Vx menjadi GCS E2 M3 Vx, dan hasil pemantauan hari ketiga didapatkan sebelum dilakukan intervensi GCS E2 M3 Vx menjadi GCS E3 M4 Vx. Hal ini menunjukkan terdapat hasil peningkatan nilai GCS dari 4 yaitu ssemi koma ke GCS 7 yaitu Somnolen karena semakin tinggi nilai GCS yang di peroleh pasien maka semakin bagus pula perubahan tingkat kesadaran pasien

Penelitian lain yang juga yang dilakukan oleh (Ismoyowati,2021) menyatakan bahwa stimulasi auditory dapat meningkatkan skor Glasgow Coma Scale (GCS) atau keadaan kesadaran dari stimulasi auditory yang diberikan yaitu *Terapi Murottal*. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Zuhriana K. Yusuf 2019) yang menjelaskan bahwa melakukan terapi Al-Qur'an tidak hanya sebagai bentuk dukungan psikologis dan nilai spiritual, tetapi melalui kemampuan pendengaran serta stimulasi bertindak sebagai neuroprotektif otak.

Dengan demikian peneliti berasumsi bahwa terjadi peningkatan pada status GCS pada pasien yang mendapatkan terapi murottal selama tiga hari berturut-turut. Oleh karena itu, stimulasi sensorik dalam hal ini terapi Al- Qur'an dapat digunakan intervensi perawatan alternatif untuk meningkatkan proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran yang ditandai dengan peningkatan skor GCS. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan manfaat dan efektivitas terapi murottal dan dipublikasikan oleh (Arif Setyo Upoyo,2021) yang menemukan bahwa pemberian terapi murottal Al-Qur'an pada pasien cedera kepala dapat mempengaruhi meningkatkan GCS. Stimulus audiotori meningkatkan kesadaran pasien dan mencegah aliran darah yang tidak efektif ke jaringan otak. Terapi murottal Al-Qur'an mempengaruhi aliran darah ke jaringan otak dengan merangsang syaraf sensorik, seperti pelindung, dan mempercepat proses pemulihan pasien dengan penurunan kesadaran ,yang diawali dengan peningkatan GCS.

Dari hasil penelitian diatas dapat di kaitkan dengan integrasi keislaman yang menjelaskan terkait manfaat dan keefektifan terapi murottal, dimana mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an mentransmisikan sinyal dan mengembalikan aktivitas saraf dalam tubuh pasien. Pada stabilitas itu akan bekerja dengan baik. Membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan benar ilmu akan membawa rahmat dan mendatangkan keberkahan serta manfaat berupa ketenangan jiwa dan hati bagi yang membaca dan mendengarkannya, menambah kecintaan kepada Allah SWT, menemukan ketenangan hati dan pikiran serta makna Al-Qur'an.

Sebagaimana disampaikan dalam firman Allah:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Wa izaa quri'al Quraanu fastami'uu lahuu wa ansituu la 'allakum turhamuun

Terjemahnya:

“Apabila dibacakan Al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat.” (QS. al-A'raf: 204).

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2004) Allah menyebutkan bahwa Al- Qur'an adalah bukti yang nyata petunjuk dan rahmat bagi umat manusia, dan Allah SWT memerintahkan diam ketika Al-Qur'an dibaca. Sebagai dukungan dan penghormatan terhadapnya, bertentangan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum kafir dari kaum Quraisy dalam pidatonya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ayat ini diturunkan karena para sahabat sholat di belakang Rasulullah ketika beliau sedang berbicara. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mencemati Al-Quran. Anda harus mendengarkan atau memahami isinya sebaik mungkin, mengambil pelajaran darinya dan mempraktikkannya dengan tulus (Tafsir Ringkas kemenag RI).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Ayat tersebut memaparkan manfaat dari mendengarkan ayat Al- Qur'an yaitu sekiranya seseorang diam dan mendengarkan dengan baik saat lantunan ayat suci Al-Qur'an diperdengarkan

karena terdapat rahmat dari mendengarkannya salah satunya yaitu memperoleh ketenangan dan rahmat penyembuh segala penyakit dari Allah SWT melalui Al-Qur'an.

C. Keterbatasan

Intervensi yang diberikan dalam penelitian ini merupakan intervensi mandiri yang dapat dilakukan oleh perawat untuk membantu meningkatkan kesadaran pada klien sehingga klien dapat kembali beraktivitas seperti semula. Namun, selain intervensi non farmakologis diberikukan juga intervensi farmakologis seperti pemberian obat monitol 20% untuk tekanan intrakranial dan propranolol 20 mg untuk tekanan darah tinggi pada klien. Sehingga, memungkinkan terjadinya bias dalam penelitian ini. Namun, tidak bisa dipungkiri dari bebagai penelitian telah menemukan bahwa intervensi *Terapi Murottal* terbukti dapat meningkatkan nilai GCS pada pasien dengan cedera kepala berat. Sehingga, penggunaan intervensi ini dapat digunakan sebagai kombinasi antara terapi farmakologis dan terapi nonfarmakologis. Hal ini sejalan dengan peran perawat sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan secara langsung maupun tidak langsung kepada klien yang meliputi pengkajian, perumusan diagnosis keperawatan, penusunan intervensi keperawatan, melaksanakan implementasi keperawatan dan melakukan evaluasi keperawatan(Kemenkes, 2022).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengkajian Keperawatan

Dari hasil Pengkajian yang didapatkan pada Tn A di *primary survey* menunjukkan bahwa klien mengalami penurunan kesadaran, datang ke IGD dengan kategori 1 yaitu pasien prioritas utama yang harus segera diberikan pertolongan. Mekanisme cedera yang dialami oleh pasien yaitu klien mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami penurunan kesadaran setelah 4 jam mengalami kecelakaan, terpasang ventilator pada klien dengan tingkat kesadaran koma nilai GCS E1 M1 Vx, TD 126/71 mmHg, HR 112 x/i, suhu 36,6°C, RR 25 x/i dengan intubasi. Kondisi saat ini post craniectomy hari ke 5 dengan kesadaran semi koma nilai GCS E2 M2 Vx, TD 140/77 mmHg, HR 110 x/menit, RR 28 x/menit, suhu 37,8°C, SPO2 97%.

2. Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan pengkajian dan analisa data diperoleh 5 diagnosis keperawatan yang ditegakkan pada klien Tn A yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan, penurunan kapasitas intrakranial berhubungan dengan edema serebral, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik (trauma kepala), Risiko infeksi berhubungan dengan efek prosedur invasif, Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan kontraksi hemoglobin.

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif diberikan manajemen jalan napas, untuk diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan terapi pemantauan tekanan intrakranial dan terapi nonfarmakologis yaitu terapi muototal, kemudian diagnosis nyeri akut diberikan manajemen nyeri, kemudian diagnosis risiko infeksi diberikan intervensi pencegahan infeksi dan diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan intervensi perawatan sirkulasi.

4. Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan dilakukan pada klien selama tiga hari berturut-turut yaitu pada tanggal 21-23 Februari 2023 di ruang ICU RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, khusus diagnosis penurunan kapasitas adaptif intrakranial diberikan 3 hari sebagai upaya untuk meningkatkan nilai GCS klien. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI.

5. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi tindakan keperawatan terhadap klien diperoleh bahwa semua intervensi pada diagnosis keperawatan masih harus dilanjutkan meskipun sudah teratasi sebagian mengingat klien adalah pasien cedera kepala dengan post operasi hari-8 dan masih membutuhkan bantuan dan dukungan secara total.

6. Intervensi EBPN

Intervensi EBPN yang diberikan sebagai salah satu tindakan mandiri perawat dalam membantu meningkatkan nilai GCS pada klien yaitu *Terapi Murottal*. Dalam pemberian intervensi diperoleh bahwa terdapat peningkatan nilai GCS yaitu dari GCS 4 menjadi GCS 7, hal ini telah didukung beberapa penelitian bahwa terapi Murottal berpengaruh terhadap peningkatan GCS pasien.

B. Saran

1. Bagi Mahasiswa

Terapi Murottal sebaiknya diberikan dengan menjaga lingkungan disekitar pasien tetap kondusif yaitu tidak ada suara atau kebisingan yang mengganggu jalannya terapi, dan terapi sebaiknya diberikan sebelum obat sedasi diberikan dan sebaiknya intervensi diberikan selama 7 hari berturut-turut agar lebih efektif.

2. Bagi Perawat

Penerapan terapi murottal ini dapat dilakukan secara terus menerus pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS dan yang mengalami

peningkatan tanda-tanda vital (hemodinamik) dan dapat mengurangi intensitas nyeri serta mengurangi gejala kecemasan yang dirasakan oleh klien.



DAFTAR PUSTAKA


- Aripratiwi, C., & Jon Hafan Sutawardana, M. H. (2020). Pengaruh Familiar Auditory Sensory Training *Terapi Murottal Pada Tingkat Kesadaran. Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 137–146. <https://doi.org/10.17509/jpki.v6i2.26917>
- ATLS. (2021). *Abdominal and Pelpic Trauma: In: Advanced Trauma Life Support for Doctors ATLS Student Course Manual 8th*. American College of Surgeons. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1993.tb07026.x>.
- Bect, P. &. (2021). *Resource Manual for Nursing Research. Generating and Assessing Evidance for Nursing Practice Ninth Edition*. Lippincott.
- Brunner and Suddarth. (2020). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*.
- EGC. Enny, V. Y., & Endah, D. A. (2021). Pengaruh Stimulasi Auditorik Terapi Musik Terhadap Nilai Glasgow Coma Scale (GCS) Pada Pasien Cedera Otak Sedang. In *STIKes Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto*. STIKES Bina Sehat PPNI.
- Grap MJ, Munro CL, Wetzel PA, K., & JM, Ketchum JS, Anderson WL, et al. (2019). *Stimulation of critically ill patients: relation_ship to sedation. Am J Crit Care*. <https://doi.org/DOI:10.4037/AJCC2016269>
- Haddad, S.H., & Arabi, Y. M. (2019). *Critical care manajemntof severe traumatic brain injury in adults. Scan J Trauma ResuscEmerg Med* 20 (12) :1-15.
- Ismoyowati, T. W. (2021). Stimulasi Auditori pada Pasien Cedera Kepala dengan Penurunan Kesadaran. *Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12.
- Kementrian Kesehatan, R. (2019). *Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2018*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementrian Kesehatan, R. (2022). *Peran Perawat Sebagai Konselor: YankesKemkes*.
- Manurung, N. (2018). *Keperawatan Medikal Bedah Konsep, Mind Mapping dan NANDA NIC NOC (TIM (ed.))*.
- Meilin, A., Sidabutar, B., Patty, R. A., & Simanjuntak, S. (2019).

Gambaran Pengetahuan Perawat Tentang Perawatan Luka Modern Dressing Di Satu Rumah Sakit Swasta Di Indonesia Barat. 1. <https://doi.org/10.33088/Jkr.V>

- Musri, & Yudistirawati, N. (2021). Comparison Of Positioning Between Semi- Fowler's And Left Lateral To Oxygen Saturation In Ventilated Patients: A Quasi-Experimental Study: Comparison Of Positioning Between Semi- Fowler's And Left Lateral To Oxygen Saturation In Ventilated Patients: A Quasi. *Quality : Jurnal Kesehatan*, 15(2), 142–152, 2.
- Muttaqin, A. (2020). *Asuhan Keperawatan Klien Dengan Gangguan Sistem Persarafan*. Salemba Medika.
- Nasution, S. H. (2020). MILD HEAD INJURY. *In Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Medula*, 2(4).
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2019). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC Jilid 1. Medication*.
- Nursalam. (2019). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. SalembaMedika.
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Defenisi dan Indikator Diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Tindakan Keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil* (1st ed.). DPP PPNI.

LAMPIRAN

A. Pathway



Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan Penurunan Kesadaran di Ruang ICU

Zuhriana K. Yusuf, Asriyanto Rahman

Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo

E-mail: nunu.fkung@ung.ac.id

ABSTRAK

Pasien dengan penurunan kesadaran masih tinggi angka kejadiannya. Salah satu terapi untuk menangani pasien dengan penurunan kesadaran adalah dengan pemberian stimulasi Al-Qur'an. Tujuan penelitian mengetahui pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU). Jenis penelitian Pre Experiment dengan one grup pre-post test design. Populasi adalah pasien dengan penurunan kesadaran sebanyak 14 pasien. Sampel berjumlah 10 pasien dengan teknik non probability sampling jenis accidental sampling. Data dikumpul melalui observasi, pengukuran Glasgow Coma Scale sebelum dan sesudah intervensi. Dianalisis dengan uji T berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat peningkatan nilai Glasgow Coma Scale antara sebelum dan setelah pemberian stimulasi Al-Qur'an dengan hasil uji komputerisasi T Berpasangan didapatkan nilai P value = 0,003 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaruh stimulasi Al-Qur'an terhadap Glasgow Coma Scale pasien dengan penurunan kesadaran di ruang Intensive Care Unit (ICU).

Kata kunci: Stimulasi Al-Qur'an, Glasgow Coma Scale, Kesadaran

ABSTRACT

Patients with decreased awareness still have a high incidence. One of the therapies to restore patients with decreased awareness is to provide Qur'anic stimulation. The aim of the study was to determine the effect of Qur'anic stimulation on GCS patients in ICU. Type of research is pre experiment with one group pre-post test design. The sample amounted to 10 patients with accidental sampling. The results showed an increase in GCS value (p-value 0.003 < alpha 0.05). The conclusion of this study is there is an influence of Qur'anic stimulation on GCS patient in ICU.

Keywords: Qur'anic stimulation, GCS, awareness

PENDAHULUAN

Intensive Care Unit (ICU) merupakan suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf khusus dan perlengkapan yang khusus. Pasien yang layak dirawat di ruang ini yaitu pasien yang memerlukan intervensi medis segera, pemantauan kontinyu serta pengelolaan fungsi sistem organ tubuh secara terkoordinasi oleh tim intensive care. Hal tersebut dilakukan supaya pasien terhindar dari dekomposisi fisiologis serta dapat dilakukan pengawasan yang konstan, terus menerus dan pemberian terapi titrasi dengan tepat (Kemenkes RI,2012).

Menurut Patient and Family Support Committee of the Society of Critical Care Medicine (2002) dalam Berger & Pichard (2012) bahwa permasalahan umum yang sering terjadi pada pasien kritis yang dirawat di ruang rawat intensif antara lain gangguan neurologis, perdarahan, ketidakstabilan hemodinamik dan cairan elektrolit, syok, gagal napas akut dan kronik, infeksi nosokomial, gagal ginjal, nyeri dada, sepsis serta Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS). Diperkirakan bahwa sekitar 13 sampai dengan 20 juta orang pertahun membutuhkan dukungan kehidupan di unit perawatan intensif di

C. Riwayat Hidup



Hajra merupakan penulis Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Cedera Kepala Berat dengan Penurunan Kesadaran Menggunakan Intervensi *Terapi Murottal* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo”.

Lahir di Gowa pada tanggal 22 Maret 2000. Anak ke tiga dari tiga bersaudara dari Bapak Yaman dan Ibu Murni. Menempuh pendidikan dasar di MI Maarif Bolaromang pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di Mts Maarif Bolaromang, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 6 Sinjai. Karena kecintaan yang lebih terhadap dunia kesehatan akhirnya penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya yaitu profesi ners di tahun 2022 di Universitas yang sama.



Lampiran Dokumentasi implementasi

