

**UJI AKTIVITAS PENGHAMBATAN ENZIM α -GLUKOSIDASE
EKSTRAK METANOL KLIKA ANAK DARA
(*Croton oblongus* Burm F.)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
HERAWATI
NIM : 70100119032
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herawati

NIM : 70100119032

Tempat/ Tgl. Lahir : Sinjai, 10 Juli 2001

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. H.M. Yasin limpo, Romangpolong

Judul : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak
Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 10 Juli 2023

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HERAWATI

NIM : 70100119032

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Uji Aktivitas Penghambatan Enzim Alfa Glukosidase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton oblongus Burm F.)*" yang disusun oleh Herawati, NIM: 70100119032, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Agustus 2023
1 Shafar 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatrah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah swt karena berkat taufik dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)”. Shalawat dan salam senantiasa terucapkan kepada junjungan nabi Muhammad saw, kepada sahabat-sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis sejak penulis menginjak bangkuk perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan sistem perkuliahan dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana farmasi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi. Dengan adanya skripsi ini, penulis berharap menjadi salah satu referensi dalam pembuatan sediaan farmasi berbasis alam, dan dapat menjadi manfaat yang baik untuk orang banyak.

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Ernawati serta ketiga kakak penulis Nurfaidah, Ardiansyah dan Nurjannah beserta keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing dan merawat saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada kedua orang tua atas semua dukungan yang diberikan baik dukungan material maupun non material.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku wakil rektor I bidang Akademik Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
3. Bapak Prof. H. Wahyuddin, M.Hum. selaku wakil rektor II bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
4. Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag. selaku wakil rektor III bidang Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil rektor IV bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin M.Kes., Sp.A. selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si. selaku wakil dekan I (Bidang Akademik) FKIK UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. M. Faiz Satrianegara, S.KM., MARS. selaku wakil dekan II (Bidang Administrasi dan Keuangan) FKIK UIN Alaudin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku wakil dekan II (Bidang Kemahasiswaan) FKIK UIN Aluddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan farmasi FKIK UIN Aluddin Makassar, dan juga selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan saran, dan arahan, serta bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi penulis.
11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku sekertaris jurusan farmasi FKIK UIN Alauddin Makassar.

12. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan saran dan bimbingannya dalam memperbaiki penulisan penulis.
13. Ibu apt. Dr. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah memberikan banyak saran dan arahan atas kekeliruan skripsi penulis.
14. Ibu Dra. Audah Mannan, M.Ag. selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukkan tentang pandangan agama Islam berkaitan dengan skripsi penulis.
15. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Jurusan Farmasi beserta laboran atas bantuan dan kerja samanya yang telah diberikan dalam menegerjakan skripsi dan penelitian kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 (INTERFERON) yang telah menemani, dan menyemangati, serta peduli kepada penulis dari awal masuk perkuliahan hingga sampai saat ini.
17. Teman-teman CIWIT yang telah menemani, membantu, menyemangati dan selalu ada memberikan dorongan dan semangat dari awal kuliah sampai tahap skripsi ini selesai.
18. Terima kasih teman-teman posko KKN ANGKATAN 69 Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai terkhusus untuk teman penulis Megawati Muin dan Lani Adelia dan juga ANTI WACANA yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini

19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekeliruan dalam skripsi ini dan besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti selanjutnya khususnya dalam bidang sediaan farmasi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gowa, 10 Juli 2023

Penulis,

HERAWATI
NIM: 70100119032



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Tanaman Anak Dara.....	9
B. Diabetes Mellitus dan Enzim α -glukosidase	10
C. Akarbose	28
D. Ekstraksi.....	30
E. Elisa Reader	35
F. Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan	37
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Sampel.....	44
D. Instrumen Penelitian.....	44
E. Prosedur Kerja.....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63
RIWAYAT HIDUP.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Hasil Ekstraksi Klika Anak Dara	50
Tabel 2. Hasil Uji Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm F.)	50
Tabel 3. Hasil Uji Kontrol Positif (Akarbose).....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanaman anak dara (<i>Croton Oblongus</i> Burm F.).....	9
Gambar 2. Inhibisi Enzim α -glukosidase dari Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (<i>Croton Oblongus</i> Burm F.)	51
Gambar 3. Grafik inhibisi Kontrol Positif (Akarbose).....	52
Gambar 4. Pembuatan Ekstrak Metanol Klika Anak Dara	75
Gambar 5. Pengujian Ekstrak Metanol klika Anak Dara dan Pembanding	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	63
Lampiran 2. Perhitungan % Rendamen	70
Lampiran 3. Perhitungan % Inhibisi.....	71
Lampiran 4. Perhitungan Nilai IC ₅₀	74
Lampiran 5. Gambar Pengujian Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara.....	75



ABSTRAK

Nama Penulis : Herawati
NIM : 70100119032
Judul : Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Diabetes melitus merupakan salah satu kerusakan metabolisme tubuh yang menyebabkan naiknya kadar gula dalam darah di atas ambang batas normal. Di Indonesia, salah satu tanaman yang memiliki kandungan flavonoid dan fenolik yang berpotensi sebagai penghambat enzim α -glukosidase yakni ekstrak metanol klika anak dara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui aktivitas ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dalam menghambat α -glukosidase, 2) mengetahui nilai IC_{50} ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sebagai penghambat enzim α -glukosidase.

Klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut metanol. Uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase ekstrak metanol klika anak dara ini menggunakan p-nitrophenyl- α -D-Glucopyranoside (pNPG) sebagai substrat dan akardose sebagai pembanding. Hasil hidrolisis enzim α -glukosidase terhadap pNPG berupa p-nitrofenol yang berwarna kuning dibaca menggunakan *ELISA reader* pada panjang gelombang 405 nm.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol klika anak dara tidak memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase dengan nilai IC_{50} sebesar 574,975 ppm sedangkan nilai IC_{50} akardose sebesar 0,085784 ppm. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) tidak memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase.

Kata Kunci : Enzim α -glukosidase, Klika anak dara, IC_{50} .

ABSTRACT

Author Name : Herawati

NIM : 70100119032

Thesis Title : α -Glucosidase Enzyme Inhibitory Activity Test of Methanol Extract of Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.).

Diabetes mellitus is one of the damage to the body's metabolism cause blood sugar levels to rise above the normal threshold. In Indonesia, one of the plants that contain flavonoids and phenolics that have the potential to inhibit the α -glucosidase enzyme is methanol extract of klika dara. The purpose of this study was to: 1) determine the activity of methanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) in inhibiting α -glucosidase, 2) determine the IC_{50} value of methanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) as an inhibitor of the enzyme α -glucosidase.

The calf klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) was extracted using the maceration method using methanol as a solvent. The inhibitory activity of the α -glucosidase enzyme of methanol klika anak dara extract was tested using p-nitrophenyl- α -D-glucopyranoside (pNPG) as a substrate and acarbose as a comparison. The result of the hydrolysis of the α -glucosidase enzyme on pNPG in the form of p-nitrophenol which is yellow in color is read using an ELISA reader at a wavelength of 405 nm.

The results of this study showed that the methanol extract of klika anak dara had no activity in inhibiting the α -glucosidase enzyme with an IC_{50} value of 574.975 ppm while an IC_{50} value of acarbose was 0.085784 ppm. From this study it can be concluded that the methanol extract of klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) has no activity in inhibiting the α -glucosidase enzyme.

Keywords : α -glucosidase enzyme, klika anak dara , IC_{50} .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi glukosa darah dalam tubuh yang terjadi akibat pankreas tidak dapat memproduksi insulin atau insulin yang dihasilkan tidak dapat digunakan secara efektif oleh tubuh. International Diabetes Federation (IDF) mencatat bahwa prevalensi diabetes di dunia yakni sebesar 1,9 %. Angka tersebut menjadikan diabetes Mellitus sebagai penyebab kematian ke 7 di dunia. Prevalensi diabetes Mellitus pada penduduk dewasa di Indonesia yaitu sebesar 6,9 % di tahun 2013 kemudian melonjak keangka 8,5 % di tahun 2018. WHO memprediksi bahwa kenaikan jumlah penyandang diabetes Mellitus di Indonesia dari 8,4 juta tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030 (Vena, 2022).

Kadar glukosa darah dapat dikontrol dengan menggunakan enzim α -glukosidase. Penghambatan enzim α -glukosidase merupakan salah satu strategi untuk dapat mengontrol kadar glukosa darah. Penghambatan enzim α -glukosidase dapat membatasi kadar glukosa darah dengan memperlambat atau menunda proses hidrolisis karbohidrat (Holidah *et al.*, 2018).

American Association of Clinical Endocrinologists telah merekomendasikan penghambat α -glukosidase sebagai lini pertama terapi diabetes Mellitus. Obat oral anti diabetes yang termasuk dalam golongan α -glukosidase adalah akarbose yang bekerja dengan menghambat aktivitas enzim α -glukosidase dalam mengurai karbohidrat kompleks di permukaan membran usus halus tanpa menyebabkan hipoglikemia. Namun, obat golongan ini memberikan efek samping berupa perut kembung, sakit perut, hingga diare, yang dapat menyebabkan kepatuhan pasien menurun. Untuk mengatasi efek samping tersebut, perlu ditemukan obat alami yang

berpotensi sebagai α -glukosidase sehingga dapat digunakan sebagai pilihan alami mengatasi diabetes Mellitus. Beberapa senyawa metabolit sekunder yang terbukti dapat menjadi α -glukosidase adalah flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan senyawa fenolik (Kusumawati *et al.*, 2021).

Tanaman Anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) telah digunakan oleh masyarakat Sinjai, Sulawesi Selatan secara turun temurun sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah. Masyarakat Dusun Bongkong Kabupaten Sinjai Tengah telah menggunakan tanaman ini sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit. Tanaman Anak dara juga dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016). Beberapa penelitian terkait tanaman ini antara lain potensi sebagai antimikroba (Mukhriani, 2015), aktivitas penghambatan terhadap sel hela (Tahar, 2015), kandungan senyawa flavonoid, terpenoid, dan fenolik di dalam tanaman Anak dara (Haeria, 2016), potensi sebagai tabir surya (Haeria, 2014), dan aktivitas antioksidan (Awaluddin, 2019).

Kandungan flavonoid dan fenolik yang ada pada klika anak dara berpotensi dalam menghambat enzim α -glukosidase. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haeria (2014) tentang Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Hasil yang diperoleh dari masing-masing senyawa yaitu dengan konsentrasi total fenolik 5,47%, flavonoid total 1,92%, dan total karotenoid 0,044%.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian mengenai uji penghambatan enzim α -glukosidase dari ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase?
2. Berapa nilai IC_{50} ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sebagai penghambat enzim α -glukosidase?

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

- a. Enzim α -glukosidase adalah enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan. Enzim ini dapat meningkatkan kadar gula darah. Sehingga untuk mencegah naiknya gula darah maka dibutuhkan suatu inhibitor enzim α -glukosidase.
- b. Ekstrak adalah suatu hasil dari proses ekstraksi yang mengandung senyawa-senyawa kimia aktif baik itu dari tumbuhan, hewan, dan mineral.
- c. Metanol merupakan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi berbagai macam sampel karena bersifat semi polar.
- d. Inhibition Concentration 50% (IC_{50}) yaitu konsentrasi sampel yang dapat menghambat kerja enzim α -glukosidase sebanyak 50%.
- e. Klika artinya kulit kayu.
- f. Tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) adalah salah satu spesies tumbuhan famili Euphorbiaceae yang banyak tumbuh di Daerah Sinjai.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium murni untuk melakukan uji penghambatan enzim α -glukosidase dari ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.). Adapun metode yang digunakan adalah metode penghambatan enzim α -glukosidase secara *in vitro*. Pelarut atau cairan penyari yang digunakan yakni penyari metanol.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan jurnal Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar total fenolat, flavonoid, dan karotenoid ekstrak metanol pada korteks anak dara (*Croton oblongus* Burm F.). Ekstraksi kandungan kimia anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dilakukan dengan metode maserasi menggunakan metanol hingga filtrat jernih. Kandungan total fenolik diuji menggunakan standar asam galat, total flavonoid quercetin diuji menggunakan standar, dan kandungan total karotenoid diuji menggunakan standar B- karoten. Untuk mengetahui konsentrasi total senyawa dalam ekstrak metanol korteks anak dara (*Croton oblongus* Burm F.), analisis senyawa dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer Uv- Vis. Hasil yang diperoleh dengan konsentrasi total fenolik 5,47%, flavonoid total 1,92%, dan total karotenoid 0,044%. Pada penelitian ini menyatakan bahwa Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki kandungan flavonoid sehingga berpotensi untuk menghambat enzim α -glukosidase.

Berdasarkan jurnal Nur Rahma Lavenia Syahputri Br P1, Rudi Hendra yang berjudul Uji Penghambatan Alfa Glukosidase dari Ekstrak Paku Kelakai (*Stenochlaena palustris*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi Ekstrak Paku Kelakai (*Stenochlaena palustris*) dalam menghambat Alfa Glukosidase. Uji aktivitas antidiabetes menggunakan metode penghambatan enzim α -glukosidase secara in vitro. Cara kerja dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan enam tahapan yaitu, penyiapan larutan ekstrak tanaman, pengujian blanko (B0), pengujian blanko (B1), pengujian sampel (S0), pengujian sampel (S1) dan pengujian kontrol positif dengan menggunakan akarbose. Hasil penelitian menunjukkan nilai IC50 ekstrak n-heksana >500 $\mu\text{g/mL}$, ekstrak diklorometana 406,26 $\mu\text{g/mL}$, ekstrak etil

asetat >500 $\mu\text{g}/\text{mL}$, dan ekstrak air >500 $\mu\text{g}/\text{mL}$. Berdasarkan nilai IC_{50} yang diperoleh, ekstrak diklorometana berpotensi dalam menghambat enzim α -glukosidase. Pada jurnal ini, penulis akan melakukan pengerjaan dengan mengikuti tahapan dari penelitian tersebut, tetapi dengan menggunakan variasi konsentrasi yang berbeda dan hanya menggunakan satu pelarut yaitu menggunakan pelarut metanol.

Berdasarkan jurnal Uji Aktivitas Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Daun Kersen (*Muntingia Calabura L.*) Terhadap Penghambatan Enzim A-Glukosidase Secara In Vitro. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar flavonoid serta menguji aktivitas ekstrak etanol 96% dan fraksi etil asetat daun kersen terhadap enzim α -glukosidase. Ekstrak etanol 96% didapatkan melalui maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Fraksi etil asetat didapatkan dari fraksinasi cair-cair ekstrak etanol 96% menggunakan pelarut etil asetat. Uji aktivitas ekstrak etanol 96% dan fraksi etil asetat daun kersen terhadap penghambatan enzim α -glukosidase menggunakan p-nitrophenyl- α -D-Glucopyranoside (pNPG) sebagai substrat. Hasil hidrolisis enzim α -glukosidase terhadap pNPG berupa p-nitrofenol yang berwarna kuning dibaca menggunakan ELISA reader pada λ 405 nm. Hasil pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dengan ekstrak etanol 96% menunjukkan nilai IC_{50} sebesar $310,880 \pm 21,191$ $\mu\text{g}/\text{mL}$ dan kadar flavonoid total sebesar $66,532 \pm 0,731$ $\mu\text{g}/\text{mg}$, sementara nilai IC_{50} fraksi etil asetat sebesar $270,286 \pm 4,034$ $\mu\text{g}/\text{mL}$ dan kadar flavonoid total sebesar $162,503 \pm 1,360$ $\mu\text{g}/\text{mg}$. Nilai IC_{50} akarbosa sebesar $31,626 \pm 6,361$ $\mu\text{g}/\text{mL}$, digunakan sebagai pembanding dalam uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase. Kadar flavonoid fraksi etil lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak etanol 96%. Nilai ini menunjukkan bahwa inhibisi fraksi etil asetat terhadap enzim α -glukosidase lebih tinggi dibandingkan ekstrak etanol 96%, namun tidak lebih poten daripada akarbosa. Pada penelitian ini penulis tidak lagi melakukan fraksinasi terhadap klika anak dara karena telah dilakukan

penelitian sebelumnya terkait hal tersebut. Jadi penulis hanya melakukan uji penghambatan enzim α -glukosidase terhadap ekstrak metanol klika anak dara dengan menggunakan pengujian ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm. Uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase ekstrak metanol klika anak dara ini juga menggunakan p-nitrophenyl- α -D Glucopyranoside (pNPG) sebagai substrat dan hasil hidrolisis enzim α -glukosidase terhadap pNPG dapat berupa p-nitrofenol yang berwarna kuning.

Berdasarkan jurnal Uji Aktivitas Penghambatan Enzim alfa glucosidase Ekstrak Air dan Ekstrak Etanol Kayu Kuning (*Arcangelisia flava*). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktifitas penghambatan kerja enzim α -glukosidase oleh ekstrak air dan ekstrak etanol dari daun, batang dan akar dari kayu kuning (*Arcangelisia flava*) secara in vitro. Aktifitas enzim α -glukosidase diukur pada panjang gelombang 400 nm berdasarkan jumlah p-nitrofenol yang dihasilkan. Daya hambat kerja enzim α -glukosidase ini dilihat dari nilai IC_{50} . Dari nilai IC_{50} untuk ekstrak air daun, batang dan akar sebesar 195,161; 138,9881 dan 48,68632 g/mL dan ekstrak etanol daun, batang dan akar sebesar 365,8793; 123,0814 dan 66,9616 g/mL, bagian akar mempunyai potensi yang lebih baik untuk menghambat aktifitas enzim α -glukosidase daripada bagian daun dan batang kayu kuning, dimana ekstrak air akar kayu kuning mempunyai potensi paling baik untuk menghambat kerja enzim α -glukosidase daripada ekstrak lainnya walaupun potensinya lebih rendah dari akarbose. Dari uji fitokimia didapatkan pada ekstrak air daun mengandung alkaloid, flavonoid, steroid, saponin dan tanin, dan pada ekstrak etanol daun terdapat alkaloid, flavonoid, triterpenoid, saponin dan tannin, dan pada ekstrak air maupun ekstrak etanol batang kayu kuning mengandung alkaloid, flavonoid, triterpenoid, dan saponin, sedangkan pada ekstrak air akar terdapat alkaloid, flavonoid, triterpenoid dan tanin, dan pada ekstrak etanol akar mengandung alkaloid, flavonoid, triterpenoid,

saponin dan tanin. Ekstrak air dan ekstrak etanol dari akar kayu kuning (*Arcangelisia flava*) berpotensi menghambat kerja enzim α -glucosidase. Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan satu pelarut yaitu pelarut metanol untuk mengekstraksi sampel karena pelarut metanol merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu mengikat semua komponen kimia yang terdapat pada tumbuhan bahan alam baik yang bersifat non polar, semi polar dan polar. Dan jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini melakukan pengujian dengan menguji aktivitas enzim alfa glukosidase dari semua bagian tanaman. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan klica atau kulit batang dari tanaman.




E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dalam menghambat α -glukosidase.
2. Untuk mengetahui nilai IC_{50} ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sebagai penghambat enzim α -glukosidase.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data ilmiah mengenai uji penghambatan ekstrak metanol klika anak dara (*Croton Oblongus* Burm F.) terhadap penyakit diabetes sehingga penggunaannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat menjadi dasar penggunaan dalam kehidupan manusia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Anak Dara

1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malpighiales
Famili	: Euphorbiaceae
Genus	: Croton
Spesies	: <i>Croton oblongus</i> Burm F. (Dalimartha.S, 2006: 26).



Gambar 1. Tanaman anak dara (*Croton Oblongus* Burm F.) (Ninin, 2016).

2. Morfologi

Uraian Tanaman anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) berupa tanaman semak dengan tinggi tanaman sekitar 2-3 m. Bentuk batang tegak, bulat, berambut dan berwarna hijau, dengan daun tunggal, berseling dan lojong. Bentuk tepi daun bergerigi dengan ujung yang runcing. Panjang daun sekitar 3-5 cm, dengan lebar daun sekitar 1-4 cm. Bentuk tangkai silindris dengan panjang 2-3 cm, bentuk pertulangan menyirip dan berwarna hijau. Bunga tanaman majemuk dengan bentuk bulir, berada di ujung batang dengan kelopak membulat, memiliki banyak benang sari dengan mahkota berbentuk corong. Buah tanaman berbentuk bulat dengan diameter sekitar 0,5 cm dan berwarna hijau (Dalimartha.S, 2006: 26).

3. Kegunaan

Tanaman Anak dara juga dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016).

4. Habitat

Tumbuhan ini tersebar di berbagai tempat, kadang-kadang di rawa dan di hutan dengan ketinggian 700 m. Sebagian besar di lereng bukit dan pegunungan, kadang-kadang di alluvial. Biasanya pada tanah berpasir, namun dapat pula ditemukan pada tanah liat dan tanah berkapur.

B. *Diabetes Mellitus dan Enzim A-glukosidase*

1. Pengertian Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia. Hal ini terkait dengan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dan mengakibatkan komplikasi kronis

termasuk gangguan mikrovaskuler, makrovaskuler, dan neuropatik. Diabetes adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan resistensi terhadap aksi insulin, sekresi insulin tidak mencukupi, atau keduanya (Dipiro *et al.*, 2015).

Diabetes Mellitus atau penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes Mellitus (DM) disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Penyakit DM dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik makrovaskuler maupun mikrovaskuler. Penyakit DM dapat mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang dimana merupakan penyakit yang terbilang cukup serius jika tidak secepatnya diberikan penanganan sehingga mampu meningkatkan penyakit hipertensi dan infark jantung (Lestari *et al.*, 2021).

2. Klasifikasi Diabetes Mellitus

Klasifikasi etiologis Diabetes Mellitus menurut American Diabetes Association 2010 (ADA 2010), dibagi dalam 4 jenis yaitu :

a. Diabetes Mellitus Tipe 1 atau *Insulin Dependent Diabetes Mellitus/IDDM*

Diabetes mellitus 1 terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada Diabetes tipe ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin dapat ditentukan dengan level protein c-peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. Manifestasi klinik pertama dari penyakit ini adalah ketoasidosis.

b. Diabetes Mellitus Tipe 2 atau *Insulin Non-dependent Diabetes Mellitus /NIDDM*

Penderita Diabetes Mellitus Tipe ini terjadi hiperinsulinemia tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi

resistensi insulin yang merupakan turunya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Oleh karena terjadinya resistensi insulin (reseptor insulin sudah tidak aktif karena dianggap kadarnya masih tinggi dalam darah) akan mengakibatkan defisiensi relatif insulin. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya sekresi insulin pada adanya glukosa bersama bahan sekresi insulin lain sehingga sel beta pankreas akan mengalami desensitasi terhadap adanya glukosa. Onset Diabetes Mellitus ini terjadi perlahan-lahan karena itu gejalanya asimtomatik. Adanya resistensi yang terjadi perlahan-lahan akan mengakibatkan sensitivitas reseptor akan glukosa berkurang. Diabetes mellitus tipe ini sering terdiagnosis setelah terjadi komplikasi.

c. Diabetes Mellitus Tipe Lain

Diabetes Mellitus ini terjadi karena etiologi lain, misalnya pada defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, iatrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun dan kelainan genetik lain.

d. Diabetes Mellitus Gestasional

Diabetes Tipe ini terjadi selama masa kehamilan, dimana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Diabetes mellitus gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. Penderita diabetes mellitus gestasional memiliki resiko lebih besar untuk menderita diabetes mellitus yang menetap dalam jangka waktu 5-10 tahun setelah melahirkan (Ndraha, 2014).

3. Etiologi dan Patofisiologi Diabetes Mellitus

Etiologi dari penyakit diabetes yaitu gabungan antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Etiologi lain dari diabetes yaitu sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Diabetes mellitus dapat muncul akibat penyakit eksokrin pankreas ketika terjadi kerusakan pada mayoritas islet dari pankreas. Hormon yang bekerja sebagai antagonis insulin juga dapat menyebabkan diabetes (Putra, 2015).

Resistensi insulin pada otot adalah kelainan yang paling awal terdeteksi dari diabetes tipe 1. Adapun penyebab dari resistensi insulin yaitu: obesitas/kelebihan berat badan, glukokortikoid berlebih (sindrom cushing atau terapi steroid), hormon pertumbuhan berlebih (akromegali), kehamilan, diabetes gestasional, penyakit ovarium polikistik, lipodistrofi (didapat atau genetik, terkait dengan akumulasi lipid di hati), autoantibodi pada reseptor insulin, mutasi reseptor insulin, mutasi reseptor aktivator proliferasi peroksisom, mutasi yang menyebabkan obesitas genetik (misalnya: mutasi reseptor melanokortin), dan hemochromatosis (penyakit keturunan yang menyebabkan akumulasi besi jaringan) (Lestari et al., 2021).

Pada diabetes tipe I, sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun, sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Hiperglikemia puasa terjadi karena produksi glukosa yang tidak dapat diukur oleh hati. Meskipun glukosa dalam makanan tetap berada di dalam darah dan menyebabkan hiperglikemia postprandial (setelah makan), glukosa tidak dapat disimpan di hati. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang telah disaring. Oleh karena itu ginjal tidak dapat menyerap semua glukosa yang disaring. Akibatnya, muncul dalam

urine (kencing manis). Saat glukosa berlebih diekskresikan dalam urine, limbah ini akan disertai dengan ekskreta dan elektrolit yang berlebihan. Kondisi ini disebut diuresis osmotik. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan buang air kecil (poliuria) dan haus (polidipsia).

Kekurangan insulin juga dapat mengganggu metabolisme protein dan lemak, yang menyebabkan penurunan berat badan. Jika terjadi kekurangan insulin, kelebihan protein dalam darah yang bersirkulasi tidak akan disimpan di jaringan. Dengan tidak adanya insulin, semua aspek metabolisme lemak akan meningkat pesat. Biasanya hal ini terjadi di antara waktu makan, saat sekresi insulin minimal, namun saat sekresi insulin mendekati, metabolisme lemak pada DM akan meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan mencegah pembentukan glukosa dalam darah, diperlukan peningkatan jumlah insulin yang disekresikan oleh sel beta pankreas. Pada penderita gangguan toleransi glukosa, kondisi ini terjadi akibat sekresi insulin yang berlebihan, dan kadar glukosa akan tetap pada level normal atau sedikit meningkat. Namun, jika sel beta tidak dapat memenuhi permintaan insulin yang meningkat, maka kadar glukosa akan meningkat dan diabetes tipe II akan berkembang (Lestari *et al.*, 2021).

4. Patogenesis Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya kekurangan insulin secara relatif maupun absolut. Defisiensi insulin dapat terjadi melalui 3 jalan, yaitu :

- a. Rusaknya sel β pankreas karena pengaruh (virus dan zat kimia)
- b. Desensitasi atau penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas
- c. Desensitasi atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer (Fatimah, 2015).

5. Penyebab dan Gejala Diabetes Mellitus

Diabetes sering disebabkan oleh faktor genetik dan perilaku atau gaya hidup seseorang. Selain itu faktor lingkungan sosial dan pemanfaatan pelayanan kesehatan juga menimbulkan penyakit diabetes dan komplikasinya. Diabetes dapat memengaruhi berbagai sistem organ tubuh manusia dalam jangka waktu tertentu, yang disebut komplikasi. Komplikasi diabetes dapat dibagi menjadi pembuluh darah mikrovaskular dan makrovaskuler. Komplikasi mikrovaskuler termasuk kerusakan sistem saraf (neuropati), kerusakan sistem ginjal (nefropati) dan kerusakan mata (retinopat) (Lestari *et al.*, 2021).

Faktor risiko kejadian penyakit diabetes Mellitus tipe 2 antara lain usia, aktivitas fisik, terpapar asap, indeks massa tubuh (IMT), tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya riwayat keluarga, kolesterol HDL, trigliserida, DM kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa dan kelainan lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2012) menyatakan bahwa riwayat keluarga, aktivitas fisik, umur, stres, tekanan darah serta nilai kolesterol berhubungan dengan terjadinya DM tipe 2, dan orang yang memiliki berat badan dengan tingkat obesitas berisiko 7,14 kali terkena penyakit DM tipe dua jika dibandingkan dengan orang yang berada pada berat badan ideal atau normal.

Gejala dari penyakit DM yaitu antara lain:

a. Poliuri (sering buang air kecil)

Buang air kecil lebih sering dari biasanya terutama pada malam hari (poliuria), hal ini dikarenakan kadar gula darah melebihi ambang ginjal (>180mg/dl), sehingga gula akan dikeluarkan melalui urine. Guna menurunkan konsentrasi urine yang dikeluarkan, tubuh akan menyerap air sebanyak mungkin ke dalam urine sehingga urine dalam jumlah besar dapat dikeluarkan dan sering buang air kecil. Dalam keadaan normal, keluaran urine harian

sekitar 1,5 liter, tetapi pada pasien DM yang tidak terkontrol, keluaran urine lima kali lipat dari jumlah ini. Sering merasa haus dan ingin minum air putih sebanyak mungkin (poliploidi). Dengan adanya ekskresi urine, tubuh akan mengalami dehidrasi atau dehidrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita selalu ingin minum air terutama air dingin, manis, segar dan air dalam jumlah banyak.

b. Polifagi (cepat merasa lapar)

Nafsu makan meningkat (polifagi) dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita DM sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula sehingga otak juga berfikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan, maka tubuh kemudian berusaha meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan alarm rasa lapar.

c. Berat badan menurun

Ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Dalam sistem pembuangan urine, penderita DM yang tidak terkontrol bisa kehilangan sebanyak 500 gr glukosa dalam urine per 24 jam (setara dengan 2000 kalori perhari hilang dari tubuh). Kemudian gejala lain atau gejala tambahan yang dapat timbul yang umumnya ditunjukkan karena komplikasi adalah kaki kesemutan, gatal-gatal, atau luka yang tidak kunjung sembuh, pada wanita kadang disertai gatal di daerah selangkangan (pruritus vulva) dan pada pria ujung penis terasa sakit (balanitis) (Simatupang, 2017).

- d. Keletihan (rasa cepat lelah) dan kelemahan yang disebabkan penggunaan glukosa oleh sel menurun.
- e. Kulit kering, lesi kulit atau luka yang lambat sembuhnya, dan rasa gatal pada kulit.
- f. Sakit kepala, mengantuk, dan gangguan pada aktivitas disebabkan oleh kadar glukosa intrasel yang rendah.
- g. Kram pada otot, iritabilitas, serta emosi yang labil akibat ketidakseimbangan elektrolit
- h. Gangguan penglihatan seperti pemandangan kabur yang disebabkan karena pembengkakan akibat glukosa.
- i. Sensasi kesemutan atau kebas di tangan dan kaki yang disebabkan kerusakan jaringan saraf.
- j. Gangguan rasa nyaman dan nyeri pada abdomen yang disebabkan karena neuropati otonom yang menimbulkan konstipasi.
- k. Mual, diare, dan konstipasi yang disebabkan karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit serta neuropati otonom.

6. Komplikasi Diabetes Mellitus

Komplikasi dari diabetes mellitus menurut Smeltzer et al, (2013) dan Tanto et al, (2014) diklasifikasikan menjadi komplikasi akut dan komplikasi kronik. Komplikasi akut terjadi karena intoleransi glukosa yang berlangsung dalam jangka waktu pendek yang mencakup:

a. Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah keadaan dimana glukosa dalam darah mengalami penurunan dibawah 50 sampai 60 mg/dL. disertai dengan gejala pusing, gemetar, lemas, pandangan kabur, keringat dingin, serta penurunan kesadaran.

b. Ketoasidosis Diabetes (KAD)

KAD adalah suatu keadaan yang ditandai dengan asidosis metabolik akibat pembentukan keton yang berlebih.

c. Sindrom nonketotik hiperosmolar hiperglikemik (SNHH)

Suatu keadaan koma dimana terjadi gangguan metabolisme yang menyebabkan kadar glukosa dalam darah sangat tinggi menyebabkan dehidrasi hipertonik tanpa disertai ketosis serum.

Komplikasi kronik menurut Smeltzer et al, (2013) biasanya terjadi pada pasien yang menderita diabetes mellitus lebih dari 10 - 15 tahun. Komplikasinya mencakup:

- a. Penyakit makrovaskular (Pembuluh darah besar): biasanya penyakit ini memengaruhi sirkulasi koroner, pembuluh darah perifer, dan pembuluh darah otak.
- b. Penyakit mikrovaskular (Pembuluh darah kecil): biasanya penyakit ini memengaruhi mata (retinopati) dan ginjal (nefropati); kontrol kadar gula darah untuk menunda atau mencegah komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular.
- c. Penyakit neuropatik: memengaruhi saraf sensorik motorik dan otonom yang mengakibatkan beberapa masalah, seperti impotensi dan ulkus kaki.

7. Terapi Antidiabetes

Terapi antidiabetes dapat secara farmakologi maupun dengan nonfarmakologi.

a. Terapi farmakologi

Terapi farmakologi diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan (gaya hidup sehat). Terapi farmakologi terdiri dari obat oral dan bentuk suntikan (insulin) (Perkeni, 2012).

1. Sulfonilurea

Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Efek samping utama adalah hipoglikemian dan peningkatan berat badan. Hati-hati menggunakan golongan sulfonilurea pada pasien dengan risiko tinggi hipoglikemia (orang tua, gangguan hati, dan ginjal) (PERKENI, 2015).

Efek Samping yang terjadi adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, mulas anoreksia, diare dan rasa logam mungkin terjadi dengan pemberian sulfonilurea dan biasanya ringan serta tergantung dosis, nafsu makan dapat meningkat dan berat badan meningkat mungkin terjadi. Ruam kulit dan priuritis mungkin dan fotosensitivitas telah dilaporkan. Ruam biasanya reaksi hipersensitivitas dan dapat berkembang jadi gangguan yang lebih serius. Kemerahan pada wajah dapat terjadi pada pasien dengan pemberian sulfonilurea terutama klorpropamid (Sweetman, 2009).

2. Glinid

Glinid merupakan obat yang kerjanya sama dengan sulfonilurea, dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari dua macam obat yaitu repaglinid (derivate asam benzoate) dan nateglinid (derivate fenilalanin). Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian secara oral dan diekskresi secara cepat melalui hati. efek samping dari obat golongan ini adalah berat badan naik dan hipoglikemia (PERKENI, 2011).

3. Biguani

Mekanisme kerja pasti dari biguanid masih belum diketahui, tetapi efek primer obat golongan ini adalah mengurangi produksi glukosa hati melalui pengaktifan enzim AMP-activated protein kinase (AMPK, protein kinase yang diaktifkan oleh AMP). Golongan ini mempunyai efek utama mengurangi produksi glukosa hati (glukoneogenesis), dan memperbaiki ambilan glukosa di jaringan perifer. Metformin merupakan pilihan pertama pada sebagian besar kasus diabetes mellitus tipe 2. Dosis metformin diturunkan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal (GFR 30-60 ml/menit/1.73 m²). Metformin tidak boleh diberikan pada beberapa keadaan seperti : GFR <30 mL/menit/1.73 m², adanya gangguan hati, serta pasien-pasien dengan kecenderungan hipoksemia (misalnya penyakit serebrovaskular, sepsis dan gagal jantung). Efek samping yang mungkin berupa gangguan saluran pencernaan seperti gejala dispepsia (PERKENI, 2015).

Efek Samping pada saluran cerna termasuk anoreksia, mual, muntah, dan diare, mungkin terjadi penurunan berat badan. Terganggunya penyerapan zat-zat makanan termasuk vitamin B12. Reaksi pada kulit jarang dilaporkan. Pada hipoglikemia, biguanide jarang diberikan sendirian. Pada kasus metformin terjadi pada pasien dengan kontraindikasi obat, terutama pasien dengan gangguan ginjal (Sweetman, 2009).

4. Inhibitor α -glukosidase (Akarbose)

Obat ini bekerja dengan memperlambat absorpsi glukosa dalam usus halus, sehingga mempunyai efek menurunkan kadar glukosa darah sesudah makan. Penghambat glukosidase alfa tidak digunakan pada keadaan GFR \leq 30ml/min/1.73 m², gangguan faal ginjal yang berat. Efek samping yang terjadi berupa penumpukan gas dalam usus sehingga sering menimbulkan

flatus. Untuk mengurangi efek samping pada awal diberikan dosis kecil (PERKENI, 2015). Efek samping dari golongan obat ini adalah flatulens, tinja lembek (PERKENI, 2011).

Efek Samping dari obat ini adalah menyebabkan gangguan pencernaan, terutama karena aksi bakteri tidak diabsorpsi sehingga menyebabkan perut kembung karbohidrat dalam usus besar. Ditensi abdomen, diare dan nyeri dapat terjadi reaksi kulit telah jarang terjadi. Sangat jarang edema telah dilaporkan (Sweetman, 2009).

5. Thiazolidindion

Thiazolidindion merupakan agonis dari *Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma* (PPAR-Gamma), suatu reseptor inti yang terdapat antara lain di sel otot, lemak dan hati. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di jaringan perifer. Thiazolidindion meningkatkan retensi cairan tubuh sehingga dikontraindikasikan pada pasien dengan gagal jantung karena dapat memperberat edema/retensi cairan. Hati-hati pada gangguan faal hati secara berkala (PERKENI, 2015).

Golongan ini mempunyai efek terapi menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa perifer. Efek samping dari golongan ini adalah Edema (PERKENI, 2011).

6. Dipeptidyl peptidase four inhibitor (DPP- 4)

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) merupakan suatu hormon peptida yang dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Peptida ini disekresi oleh sel mukosa usus bila ada makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. GLP-1 merupakan perangsang kuat pelepasan insulin dan sekaligus sebagai

penghambat sekresi glucagon. Namun demikian, secara cepat GLP-1 diubah oleh enzim dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), menjadi metabolit GLP-1 yang tidak aktif. Sekresi GLP-1 menurun pada DM tipe-2, sehingga upaya yang ditujukan untuk meningkatkan GLP-1 bentuk aktif merupakan hal rasional dalam pengobatan DM tipe 2. Peningkatan konsentrasi GLP-1 dapat dicapai dengan pemberian obat yang menghambat kinerja enzim DPP-4) penghambat DPP-4), atau memberikan hormon asli. Berbagai obat yang masuk golongan DPP-4 inhibitor, mampu menghambat kerja DPP-4 sehingga GLP-1 tetap dalam konsentrasi yang tinggi dalam bentuk aktif dan mampu merangsang pelepasan insulin serta menghambat pelepasan glucagon. Efek samping yang bisa terjadi yaitu muntah (PERKENI, 2011).

d. Terapi Non Farmakologi

Terapi diabetes dilakukan dengan memberikan terapi yang efektif dan konsisten dalam suatu regimen sehingga terikat pada kepatuhan pasien untuk menciptakan terapi yang optimal. Terapi antidiabetes meliputi hal sebagai berikut:

Menurut Perkeni (2006) cara mengidentifikasi dan mengurangi faktor resiko seperti:

- a) faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi riwayat keluarga dengan diabetes yaitu resiko untuk menderita intoleransi glukosa meningkat seiring dengan meningkatnya usia. usia ≥ 45 harus dilakukan pemeriksaan diabetes mellitus, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan bayi > 4000 gram atau riwayat pernah menderita diabetes mellitus gestasional (DMG)
- b) Faktor resiko yang bisa dimodifikasi yaitu berat badan lebih (IMT > 23 kg/m²), Hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg), Dislipidemia (HDL ≤ 35 mg/dl dan trigliserida

≥ 250 mg/dl), Diet tak sehat (unhealthy diet) diet dengan tinggi gula dan rendah serat meningkat resiko menderita prediabetes dan diabetes mellitus tipe 2.

Terapi non farmakologi menurut PERKENI (2015), yaitu:

a. Edukasi

Edukasi bertujuan promosi kesehatan supaya hidup menjadi sehat. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dan bisa digunakan sebagai pengelolaan DM secara holistik.

b. Terapi nutrisi medis (TNM)

Penyandang DM perlu diberikan pengetahuan tentang jadwal makan yang teratur, jenis makanan yang baik beserta jumlah kalorinya, terutama pada penyandang yang menggunakan obat penurun gula darah maupun insulin.

c. Latihan jasmani atau olahraga

Penyandang DM harus berolahraga secara teratur yaitu 3 sampai 5 hari dalam seminggu selama 30-45 menit, dengan total 150 menit perminggu, dan dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari berturut-turut. Jenis olahraga yang dianjurkan bersifat aerobik dengan intensitas sedang yaitu 50 sampai dengan 70% dengan denyut jantung maksimal seperti: jalan cepat, sepeda santai, berenang, dan jogging. Dengan jantung maksimal dihitung dengan cara: $220 - \text{usia penyandang}$.

d. Menghentikan merokok

8. Pencegahan Diabetes Mellitus

a. Pencegahan primer

Merupakan pencegahan yang dilakukan pada seseorang yang belum terkena diabetes (Tandra, 2017). Tujuannya untuk mencegah terjadinya DM. Yang harus dilakukan dalam pencegahan primer yaitu:

- 1) Kontrol kesehatan, yaitu melakukan cek kadar gula darah secara rutin di fasilitas pelayanan kesehatan dan menghindari obat-obatan yang dapat menimbulkan DM.
- 2) Diet, yaitu mengusahakan agar berat badan dalam batas normal dengan cara makan sehari-hari harus seimbang dan tidak berlebihan.
- 3) Olahraga secara teratur dan tidak banyak diam (Wijayakusuma dan Hembing, 2010).

b. Pencegahan sekunder

Merupakan pencegahan yang dilakukan apabila diabetes sudah muncul dan belum terjadi komplikasi (Tandra, 2017). Prasyarat untuk mencegah komplikasi adalah menjaga gula darah dan kadar lemak darah dalam kisaran normal melalui pola makanyang benar, olahraga teratur dan tidak merokok. Pengaturan makanan pada penyandang DM sama seperti untuk orang biasa. Hindari makan-makanan seperti kue, abon, dendeng, sarden, susu kental manis, sirup, dan makanan lainnya. Sangat disarankan untuk makan sayur, banyak buah, makan lauk pauk berprotein tinggi, dan batasi konsumsi makanan manis, asin, dan tinggi lemak. Tindakan pencegahan sekunder dilakukan dengan cara mengontrol kadar glukosa darah sesuai tujuan dan memberikan metode pengobatan terbaik untuk mengontrol faktor risiko kompleks lainnya. Melakukan deteksi dini adanya penyulit merupakan bagian dari pencegahan sekunder. Tindakan ini dilakukan sejak awal pengelolaan penyakit DM. Program penyuluhan memegang peran penting untuk meningkatkan kepatuhan penyandang dalam menjalani program pengobatan sehingga mencapai target yang diharapkan. Penyuluhan dilakukan sejak pertemuan pertama dan perlu selalu diulang pada pertemuan berikutnya (PERKENI, 2015).

Pengendalian stres juga dapat dilakukan untuk mengurangi timbulnya komplikasi DM. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu menerima diri sendiri sebagaimana adanya, berbuat sesuai kemampuan dan minat, berpikiran positif, membicarakan persoalan yang dihadapi dengan orang yang dapat dipercaya, memelihara kesehatan diri sendiri, membina persahabatan dengan orang lain, meluangkan waktu untuk diri sendiri dan jika merasa tegang dan letih luangkan waktu untuk istirahat dan rekreasi, lakukan relaksasi 10-15 menit setiap hari untuk mengendurkan ketegangan otot. Aktifitas fisik harus dilakukan secara rutin atau teratur untuk mempertahankan stamina tubuh. Aktivitas fisik untuk penyandang diabetes yang sangat direkomendasikan yaitu latihan fisik aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda dan berenang. Aktivitas fisik dilakukan minimal 30 menit/hari selama seminggu (p2ptm kemenkes, 2019).

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah kecacatan lebih lanjut dari komplikasi penyakit yang sudah terjadi. Pencegahan yang dimaksud yaitu mencegah terjadinya kebutaan jika menyerang pembuluh darah mata, gagal ginjal, kronik jika menyerang pembuluh darah ginjal, stroke jika menyerang pembuluh darah otak, dan gangren jika terjadi luka (Wijayakusuma dan Hembing, 2010).

Sebelum kecacatan berlanjut, penyandang harus dirawat dengan rehabilitasi secepat mungkin. Dalam pekerjaan pencegahan, konsultasi masih diberikan untuk keluarga dan penyandang. Materi penyuluhan termasuk upaya rehabilitasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal. Pencegahan tersier membutuhkan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi antar disiplin yang terkait, terutama di rumah sakit rujukan. Untuk

menunjang keberhasilan pencegahan tersier diperlukan kerjasama yang baik antara para ahli di berbagai disiplin ilmu (jantung, ginjal, mata, neurologi, ortopedi, bedah vaskuler, radiologi, rehabilitasi medik, gizi, podiatris, dan lain-lain) (PERKENI, 2015).

9. Pengertian Enzim α -glukosidase

Enzim α -glukosidase adalah enzim yang dikeluarkan dari epitel usus kecil yang bertanggung jawab atas degradasi karbohidrat. Enzim α -glukosidase bekerja dengan menghidrolisis karbohidrat kompleks menjadi glukosa yang lebih sederhana untuk diabsorpsi oleh tubuh. Sebelumnya karbohidrat dicerna terlebih dahulu oleh enzim amilase didalam mulut menjadi oligosakarida, kemudian akan disederhanakan kembali di usus hingga menjadi monosakarida (Apriliani & Saputri, 2018).

Enzim α -glukosidase adalah enzim yang berperan dalam konversi karbohidrat menjadi glukosa. Proses pencernaan karbohidrat di dalam mulut menyebabkan pankreas melepaskan enzim α -glukosidase ke dalam usus yang akan mencerna karbohidrat menjadi menjadi oligosakarida yang kemudian akan di ubah lagi menjadi glukosa oleh enzim α -glukosidase yang dikeluarkan oleh selsel usus halus yang kemudian diserap ke dalam tubuh. Inhibitor enzim α -glukosidase menghambat pemecahan sukrosa, maltosa, maltotriosa dan senyawa oligosakarida yang lain menjadi glukosa, galaktosa dan fruktosa. Fungsi dari penghambatan enzim ini ditandai dengan berkurangnya pemecahan senyawa karbohidrat kompleks sehingga absorpsi karbohidrat di sepanjang usus halus (duodenum dan bagian atas jejunum) menjadi lebih lambat. Dengan dihambatnya kerja enzim α -glukosidase, kadar glukosa dalam darah dapat dikembalikan dalam batas normal.

Laju reaksi enzim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, konsentrasi substrat dan pH. Peningkatan suhu akan meningkatkan laju reaksi karena meningkatnya kinetik dan frekuensi tumbukan molekul-molekul yang bereaksi. Peningkatan suhu yang terlalu tinggi dapat denaturasi enzim. Suhu optimal untuk sebagian besar enzim pada manusia adalah antara 35 - 40 °C dan mulai mengalami denaturasi pada suhu di atas 40 °C. Enzim α -glukosidase bekerja secara optimum pada suhu \pm 37 °C dan pH 6,3 – 7,1.

10. Inhibitor Enzim α -glukosidase

Kontrol hiperglikemia postprandial diyakini penting dalam pengobatan diabetes mellitus. Inhibitor α -glukosidase bekerja dengan memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat secara kompetitif dengan memblokir aktivitas enzim α -glukosidase. Penghambatan enzim α -glukosidase mengakibatkan enzim tidak mampu mengubah karbohidrat kompleks menjadi glukosa sederhana untuk diserap tubuh. Inhibitor enzim α -glukosidase akan mencegah pemecahan polisakarida menjadi glukosa. Sehingga dapat mengurangi peningkatan kadar glukosa postprandial pada penderita diabetes (Apriliani & Saputri, 2018).

Inhibitor α -glukosidase dapat digunakan sebagai monoterapi dan dapat diikuti dengan diet diabetes yang sesuai dan olahraga, atau inhibitor α -glukosidase dapat digunakan bersamaan dengan obat antidiabetes lainnya. Obat anti diabetes oral yang termasuk golongan inhibitor α -glukosidase yaitu akarbosa, miglitol dan voglibose. Penggunaan obat oral tersebut memberikan efek samping seperti kembung, mual, dan diare. Selain penggunaan obat antidiabetes oral, penghambatan kerja enzim α -glukosidase juga dapat dilakukan dengan menggunakan bahan alami seperti tanaman. Senyawa dari fitokimia yang terkandung pada tanaman seperti polifenol termasuk flavonoid

memiliki aktivitas dalam menghambat aktivitas enzim α -glukosidase (Yunitasari et al., 2015).

C. Akarbose

1. Uraian Akarbose

Akarbose adalah penghambat α -glukosidase, terutama sukrase. Ini memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat di usus kecil dan karenanya mengurangi peningkatan konsentrasi glukosa darah setelah beban karbohidrat. Diberikan dalam pengobatan diabetes Mellitus tipe 2 baik sendiri atau dengan sulfonilurea, biguanida, atau insulin (Brayfield, 2014).

2. Kontraindikasi Akarbose

Akarbose dikontraindikasikan pada penyakit radang usus, terutama jika ada ulserasi terkait, dan pada obstruksi gastrointestinal atau pasien yang cenderung mengalaminya. Ini harus dihindari pada pasien dengan penyakit usus kronis yang secara signifikan mempengaruhi pencernaan atau penyerapan, dan pada kondisi yang dapat memburuk akibat peningkatan pembentukan gas, seperti hernia. Asetol telah menjadi Persiapan Memiliki Akarbose juga dikontraindikasikan pada pasien dengan gangguan hati dan nilai enzim hati harus dipantau, terutama selama 6 sampai 12 bulan pertama terapi dan pada dosis tinggi. Akarbose yang diberikan sendiri seharusnya tidak menyebabkan hipoglikemia, tetapi dapat mempotensiasi efek sulfonilurea dan insulin. Jika dosis hipoglikemia berkembang pada pasien yang menerima Akarbose, perlu diobati dengan glukosa, karena aksi Akarbose menghambat hidrolisis disakarida (Brayfield, 2014).

3. Interaksi Akarbose

Interaksi Akarbose dapat meningkatkan efek antidiabetes lain, termasuk insulin, dan pengurangan dosisnya mungkin diperlukan. Penggunaan dengan adsorben gastrointestinal dan persiapan enzim pencernaan dapat mengurangi efek Akarbose dan harus dihindari. Neomycin dan colestyramine dapat meningkatkan efek Akarbose dan pengurangan dosisnya mungkin diperlukan. Akarbose dapat menghambat penyerapan digoksin (Brayfield, 2014).

4. Farmakokinetik

Setelah menelan Akarbose, sebagian besar obat aktif yang tidak berubah tetap berada di lumen saluran pencernaan untuk mengerahkan aktivitas farmakologisnya dan dimetabolisme oleh enzim usus dan oleh flora mikroba. Kurang dari 2% dosis diserap tidak berubah, tetapi sekitar 35% diserap dalam bentuk metabolit. Akarbose diekskresikan dalam urin dan feses (Brayfield, 2014).

5. Efek Samping

Akarbose sering menyebabkan gangguan pencernaan, terutama perut kembung akibat aksi bakteri pada karbohidrat yang tidak diserap di usus besar. Distensi perut, diare, dan nyeri dapat terjadi. Penurunan dosis dan kebiasaan diet yang lebih baik dapat mengurangi efek samping ini, dan umumnya berkurang seiring berjalannya waktu. Ileus jarang dilaporkan. Peningkatan nilai enzim hati sementara dan reversibel dapat terjadi, dan Akarbose harus dihentikan jika peningkatan tetap ada; ada juga laporan langka penyakit kuning dan hepatitis termasuk hepatitis fulminan yang fatal (Brayfield, 2014).

a. Efek pada saluran pencernaan

Pneumatosis cystoides intestinalis telah dilaporkan setelah penggunaan penghambat alfa-glukosidase termasuk Akarbose, miglitol, dan voglibose. Gejala yang paling umum adalah perut kembung dan nyeri; haematochezia (darah dalam tinja) juga dilaporkan. Interval antara memulai terapi dan timbulnya pneumatosis sangat bervariasi, mulai dari 7 hari sampai 11 tahun.

b. Efek pada hati

Kerusakan hati hepatoseluler dan peningkatan serum aminotransferase, dengan atau tanpa ikterus, telah dilaporkan pada pasien yang menerima Akarbose.

c. Efek pada kulit

Eritema multiforme umum dan eosinofilia terjadi pada pasien diabetes pria 13 hari setelah memulai Akarbose. Reaksi hipersensitivitas dikonfirmasi oleh tantangan ulang (Brayfield, 2014).

D. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian atau penarikan komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, biota laut dengan pelarut organik tertentu (Dirjen POM, 1986: 4). Ekstraksi juga dapat diartikan sebagai pemisahan antara bahan dengan pelarut yang sesuai. Prinsip ekstraksi yaitu menyeimbangkan konsentrasi senyawa dalam pelarut dan konsentrasi yang berada dalam sel suatu tanaman. Setelah kedua konsentrasi seimbang maka proses ekstraksi dihentikan dan dilanjutkan dengan proses penyaringan untuk memisahkan pelarut dengan sampel (Mukhriani, 2014).

2. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Pemisahan secara ekstraksi didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut(Purwandari *et al.*, 2018).

3. Mekanisme ekstraksi

Ekstraksi disebabkan oleh gelombang kejut dari meletusnya kavitasasi gelembung yang dihasilkan dari gelombang ultrasonik. Hal ini yang menyebabkan reduksi ukuran partikel atau rusaknya permukaan molekul atau dinding sel dari sampel sehingga senyawa kimia yang terdapat di dalam bahan alam dapat tersekstrak. Proses ekstraksi lebih efektif karena membutuhkan waktu yang lebih singkat dan tidak memerlukan suhu tinggi (Fauziah & Wakidah, 2019).

4. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Ekstrak

Faktor biologi yang mempengaruhi mutu ekstrak meliputi beberapa hal yaitu:

- a. Identitas jenis (spesies): jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi jenis (spesies)
- b. Lokasi tumbuhan asal: lokasi berarti faktor eksternal yaitu lingkungan (tanah dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energi (cuaca, temperatur, cahaya) dan materi (air, senyawa organik dan anorganik)
- c. Periode pemanenan hasil tumbuhan
- d. Penyimpanan bahan tumbuhan

- e. Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan.

Selain kelima faktor tersebut untuk bahan tumbuhan dari hasil budaya ada lagi faktor GAP (*Good Agriculture Practice*) sedangkan untuk bahan dari tumbuhan liar (*wild crop*) ada faktor kondisi proses pengeringan yang umumnya dilakukan di lapangan (Dirjen POM, 2000: 7).

Sedangkan faktor kimia baik untuk bahan dari tumbuhan liar maupun dari tumbuhan obat hasil budaya meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Faktor internal meliputi jenis senyawa aktif, komposisi kuantitatif senyawa aktif, komposisi kualitatif senyawa aktif dan kadar total rata – rata senyawa aktif.
- b. Faktor eksternal meliputi metode ekstraksi perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan, kandungan logam berat, kandungan pestisida (Dirjen POM, 2000: 7).

5. Jenis-jenis metode ekstraksi

Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat dilakukan, antara lain :

- a. Maserasi

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa

sen-yawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya sen-yawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

b. Ultrasound - Assisted Solvent Extraction

Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantu-an ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20 kHz). Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultra-sonic dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi (Mukhriani, 2014).

c. Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

d. Soxhlet

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux.

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

e. Reflux dan Destilasi Uap

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu.

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014).

f. Digesti

Digesti dilakukan dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), umumnya dilakukan pada temperatur 40- 50°C (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2000)

g. Infus

Pada cara infus, ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air, dimana bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih (temperatur 96-98°C) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2000)

h. Dekok

Dekok adalah ekstraksi cara infus pada waktu yang lebih lama (≥ 30 menit) dan temperatur sampai titik didih air (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2000).

E. *Elisa Reader*

1. Pengertian Elisa Reader

ELISA (singkatan bahasa Inggris: *Enzyme-linked immunosorbent assay*) atau 'penetapan kadar immunosorben taut-enzim' merupakan uji yang umum digunakan di berbagai laboratorium imunologi. Uji ini memiliki beberapa keunggulan seperti teknik pengerjaan yang relatif sederhana, ekonomis, dan memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. ELISA diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Peter Perlmann dan Eva Engvall untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelapor (reporter label) (Santosa, 2020).

2. Penggolongan Elisa Reader

Umumnya ELISA dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *competitive assay* yang menggunakan konjugat antigen enzim atau konjugat antibodi enzim, dan *non-competitive assay* yang menggunakan dua antibodi. Pada ELISA *non-competitive assay*, antibodi kedua dikonjugasikan dengan enzim sebagai indikator. Teknik kedua ini seringkali disebut sebagai "*Sandwich*" ELISA (Santosa, 2020).

3. Kelebihan dan Kekurangan Teknik Elisa

a. Kelebihan Teknik Elisa

- 1) Teknik pengerjaan relatif sederhana
- 2) Relatif ekonomis (karena jenis a antibodi yang digunakan hanya satu saja, sehingga menghemat biaya untuk membeli banyak jenis antibodi) Hasil memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi.
- 3) Dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen walaupun kadar antigen tersebut sangat rendah (hal ini disebabkan sifat interaksi antara antibodi atau antigen yang bersifat sangat spesifik)
- 4) Dapat digunakan dalam banyak macam pengujian.

b. Kekurangan Teknik Elisa

- 1) Jenis antibodi yang dapat digunakan pada uji dengan teknik ELISA ini hanya jenis antibodi monoklonal (antibodi yang hanya mengenali satu antigen)
- 2) Harga antibodi monoklonal relatif lebih mahal daripada antibodi poliklonal, sehingga pengujian teknik ELISA ini membutuhkan biaya yang relatif mahal.
- 3) Pada beberapa macam teknik ELISA, dapat terjadi kesalahan pengujian akibat kontrol negatif yang menunjukkan respons positif yang disebabkan inefektivitas dari larutan blocking sehingga antibodi sekunder atau antigen asing dapat berinteraksi dengan antibodi bertaut enzim signal dan menimbulkan signal.
- 4) Reaksi antara enzim signal dan substrat berlangsung relatif cepat, sehingga pembacaan harus dilakukan dengan cepat (pada perkembangannya, hal ini dapat diatasi dengan memberikan larutan untuk menghentikan reaksi) (Santoso, 2020)

F. Tinjauan Islam tentang Pemanfaatan Tumbuh-tumbuhan

Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks-teks keagamaan ialah *dawa'* (bentuk tunggal) atau *adwiyah* (bentuk jamak) yang berarti obat. Sedangkan kata *da'* yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit (Rahim, Naid, Abu Nawas 2007, 1-3).

Tumbuh-tumbuhan dapat memunculkan beberapa zat untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya mulai beberapa vitamin-vitamin, minyak dan masih banyak lainnya. Dalam firman-Nya Allah swt QS Al-An'am/6 : 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurangi tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Kementerian Agama, 2017).

Ayat ini masih mengenai lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt. Ayat-ayat yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya, supaya ia dapat sampai pada kesimpulan bahwa Allah swt Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan. Yang dipaparkan untuk diamati pada ayat-ayat yang lalu adalah hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan

biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang, selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal usul dan kehadirannya di bumi. Nah, ayat ini menguraikan kumpulan hal-hal yang disebut di atas, bermula dengan menegaskan bahwa dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau (Shihab, 2002; 215).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma menguraitangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah swt) bagi orang-orang yang beriman (Shihab, 2002; 215)

Ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan daya matahari itu dengan perantaraan klorofil, untuk kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk bahan makanan organik yang dibentuknya (Shihab, 2002; 216).

Dari penjelasan ini dapat diambil pemahaman bahwa Allah swt memberikan gambaran :

- a. Tentang proses tumbuh-tumbuhan sebagai gambaran bagi manusia untuk berusaha itu harus butuh proses.

- b. Dan dalam proses tersebut tentunya manusia butuh berinteraksi dengan manusia lain (baik berupa berekonomi) untuk mencapai tanaman yang bagus dan baik.
- c. Kemudian dari proses tumbuhan yang membagi-bagikan zat-zat yang di dapat oleh bagian dari tumbuhan kepada buah dan bijinya itu, menggambarkan kepada manusia untuk selalu berbagi dengan sesama.
- d. Perlunya cahaya matahari dan air hujan dalam hal bercocok tanam.
- e. Pemahaman bagi manusia tentang Maha Kuasanya Allah swt. (Shihab:2011;573-577).

Tumbuhan mengalami proses pertumbuhan yang sangat rumit. Mulai dari berkecambah dengan melakukan penyerapan air dari dalam tanah tumbuhan pun memulai perkembangannya. Biji yang tadinya tumbuh menjadi kecambah kulitnya pun mulai robek karena perkembangannya. Selanjutnya tumbuhan mulai mengeluarkan akar dan menembus ke dalam tanah untuk mencari makanan dan masih panjang lagi perjalanan tumbuhan menjalani proses pertumbuhannya.

Allah swt telah menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt yang memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Hal ini telah terangkum dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi saw. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS Thaha/20 : 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا

بِهِ أَرْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥٣

Terjemahnya :

Yang Telah menjadikanmu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan- jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis- jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam – macam (Kementrian Agama, 2017).

Allah swt menurunkan air dari langit berupa hujan dan juga mata-mata air dan sungai-sungai serta lautan, lalu ditumbuhkan dari air itu aneka macam dan jenis tumbuhan lalu Allah swt. memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya dan itu semua merupakan ayat-ayat, yakni tanda-tanda tentang hidayah dan rububiyah ketuhanan dan pemeliharaan Allah swt. hal-hal tersebut harus dicamkan oleh kaum yang berakal (Shihab, 2011; 605-607).

Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan adalah isyarat keberadaan manusia di pentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah allah swt. Menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya juga adalah bagian dari hidayah-Nya (Shihab, 2011; 605-607).

Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2011; 605-607).

Maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam beralih menjadi persona pertama (KAMI) sedang sebelumnya adalah persona ketiga (DIA). Dia yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Pengalihan bentuk redaksi tersebut bertujuan mengisyaratkan bahwa penumbuhan aneka tumbuhan dengan bermacam-macam jenis bentuk dan rasanya

itu merupakan hal-hal yang sungguh menakjubkan lagi membuktikan betapa agung penciptanya. Pengalihan redaksi itu juga bertujuan mengundang perhatian pendengar dan mirta bicara agar mengarahkan pandangan dan pikirannya kepada hal-hal yang disebut itu, gaya bahasa semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan konteks uraian yang sama (Syihab;2011;605-607).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Allah swt memberikan manusia akal dan pikiran untuk menggunakannya dengan baik. Manusia bisa saja membuat suatu obat untuk suatu penyakit tetapi dalam proses penyembuhan Allah swt yang mempunyai peranan penting. Suatu penyakit dapat disembuhkan apabila Allah swt sudah mengizinkan untuk sembuh. tersebut manusia dapat membuat suatu obat dan setiap penyakit dapat disembuhkan apabila Allah swt mengizinkannya.

Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim, hadis no. 4084:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :


Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, maka wajib bagi setiap orang untuk berobat dan setiap pengobatan itu harus disesuaikan dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt, yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. memerintahkan kita untuk berobat dan melarang kita pasrah tanpa melakukan usaha dan ikhtiar maksimal. Karena usaha dan ikhtiar dalam berobat sama sekali tidak bertentangan dengan sikap tawakkal. Allah swt pun menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan (Ibnu Qayyim, 2010).

Hadis ini mengajak untuk melakukan penelitian medis, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya. Selain itu, Rasulullah saw menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya. Dengan demikian, umat Islam telah benar-benar mencapai puncak kejayaannya dalam bidang kedokteran, yang kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dari berbagai ilmuwan muslim yang pernah dilahirkan tersebut, pastilah terdapat berbagai yang sampai saat ini masih bertahan dan dapat dilestarikan sebagai alternatif pengobatan yang sangat penting (Ibnu Qayyim, 2010).

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya ketika Allah swt menciptakan suatu penyakit, Allah swt juga menurunkan obatnya, namun karena Allah swt Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah swt akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Dalam penelitian ini, maka ditemukan spesies tanaman anak dara (*Croton oblongus* Burn F.) sebagai tanaman obat. Untuk pemanfaatan dan mutu tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoretis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam penetapan mutu ekstrak daun klika anak dara.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif, untuk mengetahui potensi ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dalam menghambat enzim α -glukosidase.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dalam laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melaksanakan proses pengolahan sampel klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sampai didapatkan ekstrak metanol dari klika anak dara, dan laboratorium penelitian dan pengujian Universitas Muslim Indonesia untuk melaksanakan pengujian akhir yaitu uji penghambatan enzim α -glukosidase ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental laboratorium. Metode eksperimental adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara satu variabel dengan variabel lainnya.

C. Sampel

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.). Khusus untuk penelitian ini, sampel Klika Anak Dara diambil dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

D. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *rotary evaporator*, timbangan analitik, lemari pengering, corong pisah, pipet mikro, alat gelas, dan *Elisa reader*, spatel, penangas air, erlenmeyer, blender, gelas ukur, ayakan 40, labu ukur, beaker glass, tabung reaksi, rak tabung reaksi, kertas saring, kertas ph, mortir dan stemper, batang pengaduk.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah klika anak dara (*Croton oblongus* Burm. F), metanol, aquadest, enzim α -glukosidase, p-nitrofenil- α -Dglukopiranosida (pNPG), dan *buffer* fosfat, Na_2CO_3 , akarbose.

E. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) diambil dari daerah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

2. Pengolahan Sampel

Sampel klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang telah dikupas kulitnya dibersihkan dari kotoran yang menempel pada sampel, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, lalu diangin-anginkan, dan dikeringkan di lemari pengering selama 3 hari. Setelah kering, lalu diserbukkan hingga halus dengan ayakan no. 40, lalu ditimbang sebanyak 500 gram kemudian sampel siap untuk diekstraksi (Salmia, 2016).

3. Ekstraksi Sampel

Sampel klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 500 gram, dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut metanol sebanyak 1000 mL. Dibiarkan selama 24 jam terlindung dari cahaya, sambil sesekali diaduk. Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari metanol yang baru. Hal ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Ekstrak metanol yang diperoleh dipekatkan dengan alat *rotary evaporator* (Salmia, 2016).

4. Penyiapan Sampel Uji

a. Pembuatan larutan enzim α -glukosidase

Larutan Induk. Enzim α -glukosidase ditimbang sebanyak 1 mg dan dilarutkan dalam 100 mL buffer fosfat pH 7.

Larutan Enzim 0,25 U/mL. Larutan induk dipipet 0,089 mL dan volumenya dicukupkan hingga 10 mL dengan buffer fosfat pH 7 (Maryam *et al.*, 2020).

b. Pembuatan larutan Natrium Karbonat (Na_2CO_3) 200 mM

Na_2CO_3 ditimbang sebanyak 5,3 g kemudian dilarutkan dalam 250 mL air bebas CO_2 hingga diperoleh konsentrasi 200 mM (Maryam *et al.*, 2020).

c. Pembuatan larutan akarbose

Akarbose ditimbang sebanyak 1 mg dan dilarutkan dalam 100 mL buffer fosfat pH 7. Diperoleh larutan konsentrasi 10 ppm. Setelah itu dibuat dalam lima variasi konsentrasi yaitu 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, dan 1 ppm (Maryam *et al.*, 2020).

d. Pembuatan larutan ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Ekstrak ditimbang sebanyak 10 mg dan dilarutkan dalam 10 mL buffer fosfat pH 7 hingga homogen. Diperoleh larutan induk konsentrasi 1000 ppm. Setelah itu dibuat dalam lima variasi konsentrasi yaitu 200, 400, 600, 800, dan 1000 ppm (Maryam *et al.*, 2020).

5. Uji Penghambatan Enzim α -glukosidase

a. Pengujian kontrol blanko (B0)

Buffer fosfat pH 7 sebanyak 36 μ L dan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (pNPG) 5 mM sebanyak 17 μ L dimasukkan ke dalam well, kemudian diinkubasi pada waterbath selama 20 menit pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi selesai, Na₂CO₃ 200 mM ditambahkan sebanyak 100 μ L untuk menghentikan reaksi. Absorbansinya diukur dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm (Maryam *et al.*, 2020).

b. Pengujian blanko (B1)

Buffer fosfat pH 7 sebanyak 36 μ L dan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (pNPG) 5 mM 17 μ L dimasukkan ke dalam well dan diinkubasi pada waterbath selama 5 menit pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi selesai, enzim α -glukosidase sebanyak 17 μ L ditambahkan ke dalam well dan diinkubasi lagi pada waterbath selama 15 menit pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi kedua selesai, Na₂CO₃ 200 mM ditambahkan sebanyak 100 μ L untuk menghentikan reaksi dan diukur absorbansinya dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm (Maryam *et al.*, 2020).

c. Pengujian kontrol sampel (S0)

Buffer fosfat pH 7 sebanyak 36 μ L dimasukkan ke dalam well, kemudian ekstrak metanol klika anak dara dengan konsentrasi 100 ppm sebanyak 30 μ L dimasukkan ke dalam well, begitu juga untuk ekstrak metanol

klika anak dara konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 1000 ppm. Substrat p-nitrofenil- α -Dglukopiranosida (pNPG) 5 mM ditambahkan sebanyak 17 μ L dan diinkubasi pada waterbath selama 20 menit pada suhu 37 °C, setelah masa inkubasi selesai, Na₂CO₃ 200 mM ditambahkan sebanyak 100 μ L untuk menghentikan reaksi. Sampel kemudian diukur absorbansinya dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm (Maryam *et al.*, 2020).

d. Pengujian sampel (S1)

Buffer fosfat pH 7 sebanyak 36 μ L dimasukkan ke dalam well, kemudian ekstrak metanol klika anak dara konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 1000 ppm sebanyak 30 μ L dimasukkan ke dalam well. Substrat p-nitrofenil- α -Dglukopiranosida (pNPG) 5 mM ditambahkan sebanyak 17 μ L dan diinkubasi pada waterbath selama 5 menit pada suhu 37 °C, setelah masa inkubasi selesai, enzim α -glukosidase ditambahkan sebanyak 17 μ L pada masing-masing well dan diinkubasi lagi pada waterbath selama 15 menit pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi selesai, Na₂CO₃ 200 mM ditambahkan sebanyak 100 μ L untuk menghentikan reaksi. Sampel kemudian diukur absorbansinya dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm. (Maryam *et al.*, 2020).

e. Pengujian kontrol positif

Dapar fosfat pH 7 sebanyak 36 μ L dimasukkan ke dalam well, kemudian pembanding dengan konsentrasi 0,2 ppm sebanyak 30 μ L dimasukkan ke dalam well, begitu juga untuk pembanding dengan konsentrasi 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm, dan 1 ppm. Substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (pNPG) 5 mM ditambahkan sebanyak 17 μ L dan diinkubasi pada waterbath selama 5 menit pada suhu 37 °C, setelah masa inkubasi selesai

enzim α -glukosidase ditambahkan sebanyak 17 μ L pada masing-masing well dan diinkubasi lagi pada waterbath selama 15 menit pada suhu 37 °C. Setelah masa inkubasi selesai, Na_2CO_3 200 mM ditambahkan sebanyak 100 μ L untuk menghentikan reaksi. Sampel kemudian diukur absorbansinya dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm (Maryam *et al.*, 2020).

6. Perhitungan % Rendamen

Rendaman ekstrak dihitung menggunakan rumus :

$$\times 100\%$$

Penentuan rendamen ini berfungsi untuk mengetahui kadar metabolit sekunder yang terbawa oleh pelarut tersebut namun tidak dapat menentukan jenis senyawa yang terbawa oleh pelarut.

7. Perhitungan Nilai IC_{50}

Perhitungan % inhibisi enzim α -glukosidase dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\times 100\%$$

Keterangan :

B1 : Kontrol blanko

B0 : Blanko

S1 : Kontrol sampel

S0 : Sampel

Nilai IC_{50} dihitung menggunakan rumus persamaan regresi linear untuk menentukan $y = ax + b$. Aktivitas inhibisi dinyatakan dengan inhibition concentration 50% (IC_{50}) yaitu konsentrasi sampel yang dapat menghambat kerja enzim α -glukosidase sebanyak 50%. Nilai IC_{50} diperoleh dari nilai x setelah mengganti y 50.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstrak Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Penelitian dilakukan menggunakan 500 gram serbuk klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang dimaserasi menggunakan larutan penyari metanol sebanyak 3000 mL, sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 328 gram.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Klika Anak Dara

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia	Berat Ekstrak	% Rendamen
Ekstrak kental	500 gram	328 gram	65,6%

2. Hasil Uji Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)


Tabel 2. Hasil Uji Penghambatan Enzim α -glukosidase Ekstrak Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Konsentrasi (ppm)	Pengujian Sampel (μ L)				% Inhibisi	IC50 (ppm)
	Blanko (B1)	Kontrol Blanko (B0)	Sampel (S1)	Kontrol Sampel (S0)		
200	1,269	0,062	1,159	0,163	17,48136	574,975
400	1,269	0,062	0,975	0,224	37,77962	
600	1,269	0,062	0,95	0,381	52,85833	
800	1,269	0,062	0,823	0,44	68,26843	
1000	1,269	0,062	0,742	0,547	83,84424	

3. Hasil Uji Inhibisi Kontrol Positif (Akarbose)


Konsentrasi (ppm)	Pengujian Akarbose (μL)				% Inhibisi	IC50 (ppm)
	Blanko (B1)	Kontrol Blanko (B0)	Sampel (S1)	Kontrol Sampel (S0)		
0,2	1,333	0,054	0,671	0,104	55,66849	0,085784
0,4	1,333	0,054	0,628	0,138	61,68882	
0,6	1,333	0,054	0,509	0,207	76,3878	
0,8	1,333	0,054	0,461	0,243	82,95543	
1	1,333	0,054	0,4	0,281	90,69586	

4. Grafik Inhibisi Enzim α -glukosidase dari Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)



Gambar 2. Inhibisi Enzim α -glukosidase dari Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)

5. Grafik Kontrol Positif (Akarbose)



Gambar 3. Grafik kontrol positif (Akarbose)

B. Pembahasan

Tanaman Anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) telah digunakan oleh masyarakat Sinjai, Sulawesi Selatan secara turun temurun sebagai kosmetik tradisional yaitu masker pada wajah. Masyarakat Dusun Bongkong, Kabupaten Sinjai Tengah telah menggunakan tanaman ini sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat mengencangkan kulit. Tanaman Anak dara juga dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim dan penghilang bau badan (Awainah, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Haeria (2014) tentang Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.). Hasil yang diperoleh dari masing-masing senyawa yaitu dengan konsentrasi total fenolik 5,47%, flavonoid total 1,92%, dan total karotenoid 0,044%. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hanwar (2019) tentang Uji Aktivitas Ekstrak Etanol dan Fraksi Etil Asetat Daun Kersen (*Muntingia calabura* L.) terhadap Penghambatan Enzim

α -Glukosidase Secara In Vitro. Hasil pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase dengan ekstrak etanol 96% menunjukkan nilai IC_{50} sebesar $310,880 \pm 21,191 \mu\text{g/mL}$ dan kadar flavonoid total sebesar $66,532 \pm 0,731 \mu\text{g/mg}$, sementara nilai IC_{50} fraksi etil asetat sebesar $270,286 \pm 4,034 \mu\text{g/mL}$ dan kadar flavonoid total sebesar $162,503 \pm 1,360 \mu\text{g/mg}$. Nilai IC_{50} akar bosa sebesar $31,626 \pm 6,361 \mu\text{g/mL}$, digunakan sebagai pembanding dalam uji aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kadar flavonoid yang ada pada suatu tanaman dapat berpotensi sebagai penghambat enzim α -glukosidase.

Cara kerja flavonoid sebagai anti diabetes dapat melalui cara mengurangi aldose reductase dan meregenerasi sel-sel pankreas, serta meningkatkan pelepasan insulin dan penyerapan ion kalsium. Flavonoid menurunkan kadar glukosa darah melalui dua mekanisme adalah mekanisme ekstra pankreas dengan cara menghambat aktivitas enzim α -glukosidase yang mengakibatkan terjadinya pengurangan absorpsi glukosa dan mekanisme intra pankreas melalui aktivitas antioksidan yang mencegah kerusakan sel beta pankreas. Flavonoid dapat juga meningkatkan lapisan mukosa usus, sehingga asupan glukosa ke dalam usus akan terhambat (Marpaung, 2018).

Pada penelitian ini, Sampel kluak anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang telah diambil kemudian dikupas kulitnya dibersihkan dari kotoran yang menempel pada sampel, lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, lalu diangin-anginkan, dan dikeringkan di lemari pengering selama 3 hari. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada simplisia agar terhindar dari pembusukan yang dapat menurunkan mutu simplisia dan mematikan jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya hidrolisis terhadap kandungan senyawa simplisia oleh enzim (Harborne, 1987). Setelah kering, lalu diserbukkan hingga halus dengan ayakan no. 40. Penyerbukkan simplisia

dilakukan untuk meningkatkan kontak pelarut dalam melarutkan senyawa yang ada pada simplisia. Lalu ditimbang sebanyak 500 gram kemudian sampel siap untuk diekstraksi (Salmia, 2016).

Kemudian dilakukan proses penyaringan zat-zat kimia/ ekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Sampel klica anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) yang telah diserbukkan ditimbang sebanyak 500 gram, dimasukkan dalam wadah maserasi. Ditambahkan pelarut metanol sebanyak 1000 mL. Metanol dipilih karena memiliki struktur molekul kecil yang mampu menembus semua jaringan tanaman untuk menarik senyawa aktif keluar. Metanol dapat melarutkan hampir semua senyawa organik baik senyawa polar ataupun non polar dan juga sifatnya yang mudah menguap sehingga mudah dipisahkan dari ekstrak (Rahayu, 2015).

Metanol berfungsi untuk melarutkan senyawa metabolit yang terkandung dalam sampel yang diuji. Setelah itu dibiarkan selama 24 jam terlindung dari cahaya, sambil sesekali diaduk. Selanjutnya, Disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya ampas dimaserasi kembali dengan menggunakan cairan penyari metanol yang baru. Hal ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan alat *rotary evaporator* agar didapatkan hasil ekstraksi kental (Salmia, 2016).

Setelah didapatkan hasil ekstrak yang kental, selanjutnya dilakukan perhitungan % rendamen. Dari ekstraksi serbuk simplisia 500 gram dengan metanol menghasilkan hasil ekstrak sebesar 328 gram dengan persentase rendamen 65,6 %. Besar kecilnya nilai rendemen menunjukkan keefektifan proses ekstraksi. Semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan menandakan ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Rendemen suatu ekstrak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah ukuran partikel. Semakin kecil ukuran

partikel sampel maka kontak permukaan antara sampel dan solven semakin besar sehingga penetrasi pelarut ke dalam sel dan difusi zat terlarut meningkat. Ukuran partikel lebih kecil dari 0,5 mm sangat ideal untuk ekstraksi yang efisien (Azwanida, 2015).

Selanjutnya dilakukan penyiapan sampel uji yang meliputi pembuatan larutan enzim α -glukosidase dengan membuat larutan induk lalu membuat enzim 0,25 U/mL. Selanjutnya pembuatan larutan natrium karbonat (Na_2CO_3) hingga diperoleh konsentrasi 200 mM, natrium karbonat pada uji ini digunakan untuk menghentikan reaksi dimana dengan penambahan natrium karbonat akan menyebabkan PH meningkat yang mengakibatkan enzim akan terdenaturasi (terurai). Pembuatan larutan akarbose dengan lima variasi konsentrasi yaitu 0,2 ppm, 0,4 ppm, 0,6 ppm, 0,8 ppm dan 1 ppm. Dan pembuatan larutan ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) dengan lima variasi konsentrasi yaitu 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, dan 1000 ppm. Pengujian dilakukan pada beberapa konsentrasi yang berbeda untuk melihat pengaruh penambahan konsentrasi pada peningkatan daya hambat enzim alfa glukosidase.

Uji inhibisi α -glukosidase dilakukan pada kondisi optimum kinerja α -glukosidase, yaitu pada pH 7, suhu 37°C , dan waktu inkubasi selama 15 menit. Penggunaan buffer fosfat pada penelitian ini untuk dijadikan sebagai pelarut. Karena telah diketahui bahwa enzim merupakan protein yang bersifat termolabil sehingga dalam pengerjaannya, suhu dan pH harus dijaga dalam keadaan optimum.

Pada penelitian ini, digunakan juga substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida sebagai model yang mempresentasikan karbohidrat dalam tubuh, dimana enzim akan memecah substrat menjadi glukosa dan p-nitrofenol. Sesuai dengan prinsip dari pengujian ini yaitu pengukuran aktivitas enzim berdasarkan

hasil absorbansi p-nitrofenol yang merupakan hasil hidrolisis dari substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida (pNPG). Semakin tinggi kemampuan komponen tanaman dalam menghambat enzim α -glukosidase maka semakin kecil pula produk p-nitrofenol yang terbentuk yang ditandai dengan perubahan warna pada substrat yaitu warna kuning yang memudar. Kemampuan aktivitas inhibisi enzim α -glukosidase suatu ekstrak dapat diketahui melalui nilai IC₅₀ sampel terhadap enzim α -glukosidase (Maryam *et al.*, 2020).

Akarbose dipilih sebagai pembanding karena akarbose merupakan obat antidiabetes yang bekerja dalam menghambat enzim α -glukosidase yang beredar di Indonesia dan juga akarbose sudah menjadi pembanding yang diakui secara internasional. Selain itu, dalam hal struktur, akarbose memiliki struktur yang hampir sama dengan substrat p-nitrofenil- α -D-glukopiranosida. Secara garis besar, senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan steroid memiliki cara kerja yang hampir sama dengan akarbose dalam menurunkan kadar glukosa darah, yaitu dengan menghambat kerja enzim α -glukosidase dalam memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa yang akan mengakibatkan penundaan penyerapan glukosa pada usus sehingga kadar glukosa dalam darah dapat menurun (Yuniarto, 2018).

Dalam pengukurannya, digunakan instrumen *Enzyme-Linked Immunosobent Assay* (ELISA reader) dan diukur pada panjang gelombang 405 nm. ELISA reader memiliki kelebihan yaitu dalam teknik pengerjaan yang relatif cepat, sensitivitas tinggi, serta hasil yang lebih akurat walaupun larutan uji yang digunakan dalam jumlah sangat kecil.

Pada penelitian ini, nilai persen inhibisi yang didapatkan digunakan untuk menghitung nilai IC₅₀ (konsentrasi yang dibutuhkan untuk menghambat 50% aktivitas enzim) dari sampel maupun pembanding dan nilai IC₅₀ tersebut

digunakan untuk mengetahui kekuatan penghambatan ekstrak terhadap enzim. Pengamatan penghambatan terhadap aktivitas enzim dilakukan dengan membandingkan nilai persen inhibisi dan konsentrasi ekstrak yang dilihat dalam bentuk regresi linier. Persen inhibisi diperoleh dengan membandingkan serapan yang dihasilkan oleh larutan sampel (S) dan larutan blanko (B). Larutan kontrol sampel (S0) adalah larutan uji dengan ekstrak. Larutan kontrol blanko (B0) adalah larutan uji tanpa sampel/ekstrak, namun perlakuannya sama dengan larutan sampel. Masing-masing larutan tersebut dikoreksi dengan kontrol sampel dan kontrol blanko. Sampel (S0) memiliki perlakuan yang sama seperti sampel, hanya saja terjadi penambahan enzim dan penambahan natrium karbonat diberikan untuk menghentikan reaksi enzimatik. Blanko (B0) pun perlakuannya sama dengan kontrol sampel yaitu menambahkan enzim, hanya saja dilakukan tanpa sampel.

Hasil ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) menunjukkan nilai IC_{50} sebesar 574,975 ppm sedangkan nilai IC_{50} akarbose sebesar 0,085784 ppm. Jika dibandingkan nilai IC_{50} akarbose dan sampel ekstrak, menunjukkan bahwa ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) Seperti yang dikutip dari penelitian Maryam (2020) bahwa tingkat kekuatan inhibisi terhadap enzim α -glukosidase dikatakan sangat aktif jika $IC_{50} \leq 25 \mu\text{g/mL}$, aktif jika $25 \mu\text{g/mL} \leq IC_{50} \leq 50 \mu\text{g/mL}$, kurang aktif jika $50 \mu\text{g/mL} \leq IC_{50} \leq 100 \mu\text{g/mL}$, dan tidak aktif jika $IC_{50} > 100 \mu\text{g/mL}$.

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maryam (2020) tentang Uji Aktivitas Penghambatan Enzim α -Glukosidase Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat Sangrai (*Persea Americana* Mill.) Secara In Vitro. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi ekstrak etanol biji buah alpukat dalam menghambat enzim α -Glukosidase. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu ekstrak etanol biji alpukat sangrai (*Persea americana* Mill.)

memiliki aktivitas penghambatan dalam kategori aktif dengan nilai IC_{50} 34,300 $\mu\text{g/mL}$. Nilai IC_{50} tersebut lebih efektif dalam menghambat enzim α -Glukosidase dibandingkan dengan nilai IC_{50} pada penelitian ini dikarenakan pada ekstrak lebih banyak senyawa yang terkandung di dalamnya. Metode yang dilakukan pada penelitian ini hampir sama dengan metode penelitian yang telah dilakukan. Namun yang membedakan hanya variasi konsentrasi pada sampel, dimana pada ekstrak etanol biji alpukat sangrai (*Persea americana* Mill.) menggunakan variasi konsentrasi 125 ppm, 150 ppm, 175 ppm, dan 200 ppm. Sedangkan pada ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) menggunakan variasi konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm.

Ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) tidak memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase dapat dipengaruhi oleh proses dilakukannya penyiapan sampel, dilakukan proses ekstraksi, kurangnya ketelitian pada saat pengujian maupun kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya. Dimana, di dalam akarbose terdapat satu senyawa aktif yang secara efektif dapat menghambat kerja enzim α -glukosidase, sedangkan pada sampel ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) masih mengandung beberapa senyawa aktif yang memungkinkan terjadinya reaksi kompetisi antara senyawa yang ada di dalam sampel ekstrak sehingga dapat mempengaruhi daya hambat terhadap enzim α -glukosidase.

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang sudah tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari *tabib* atau dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya yaitu orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai obat salah satunya adalah apoteker agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati

sehingga akan mendorong kesembuhannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh HR. Muslim, hadis no. 4084:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami (Harun bin Ma'ruf) dan (Abu Ath Thahir) serta (Ahmad bin 'Isa) mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami (Ibnu Wahb); Telah mengabarkan kepadaku ('Amru) yaitu Ibnu Al Harits dari ('Abdu Rabbih bin Sa'id) dari (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (HR. Muslim, hadis no. 4084).

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah *washilah*. Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak, apabila Allah SWT belum menghendaki atau menunda suatu penyembuhan. (Ibnu Qayyim, 2010).

Hadis diatas menjelaskan bahwa setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan jika obat tepat mengenai penyakitnya maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Dalam dunia kesehatan ayat ini dapat diartikan bahwa obat akan memberikan efek ketika obat telah berikatan dengan reseptor obat tersebut. Setiap penyakit terjadi akibat dari berbagai macam faktor, salah satunya adalah enzim α -Glukosidase. Karena itu untuk menghambat enzim enzim α -Glukosidase tersebut maka dilakukan penelitian pengujian ekstrak metanol klika anak dara dalam menghambat enzim α -Glukosidase.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak metanol klica anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) tidak memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase.
2. Nilai IC_{50} dari ekstrak metanol klica anak dara sebesar 574,975 ppm sedangkan nilai IC_{50} sebesar 0,085784 ppm.

B. Saran

Hasil penelitian ini perlu didukung dengan penelitian lebih lanjut, yaitu dengan menggunakan ekstraksi yang lain dengan pelarut yang berbeda untuk mengetahui bahwa klica anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) ini memiliki aktivitas dalam menghambat enzim α -glukosidase.



DAFTAR PUSTAKA


- Apriliani, N.D., Saputri, F.A., 2018. Review: Potensi Penghambatan Enzim α -Glukosidase Pada Tanaman Obat Tradisional Indonesia. *Farmaka Suplemen*. 16 (1): 169-177.
- Al-Juziyah, Ibnu Qayyim, *Praktek Kedokteran Nabi SAW: Penyembuhan di bawah bimbingan Wahyu*, HIKAM PUSTAKA, Jogjakarta: 2010, Terj. At-Thibbun Nabawi.
- Anonim, 1979. *Farmakope Edisi III*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Azwanida, N. N., 2015. A Review on The Extraction Methods Use in Medical Plants, Principle, Strength, and Limitation. *Medical & Aromatic Plants*, 4(3), 1-6
- Brayfield, A., 2014. *Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition*. Pharmaceutical Press, London.
- Dalimartha, S., 2006. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid 4*. Jakarta : Puspa Swara
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1986. *Sediaan Galenika*. Jakarta: Depkes RI.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.
- Fatimah, R.N. 2015. Diabetes Melitus Tipe 2. Jakarta: *J MAJORITY*. Vol. 4, No. 5:93-99
- Fauziah, L., & Wakidah, M. (2019). Extraction of Papaya Leaves (*Carica papaya* L.) Using Ultrasonic Cleaner. *EKSAKTA: Journal of Sciences and Data Analysis*, 19, 35–45. <https://doi.org/10.20885/eksakta.vol19.iss1.art4>
- Haeria, H., Ningsi, S., Riaji, A. D. (2014). Penentuan Kadar Fenolik, Flavonoid, dan Karotenoid Ekstrak Metanol Kalika Anak Dara (*Croton oblogus* Burm.f.). *Jurnal Framasi*. Vol. 2, No. 4: 5-7
- Harborne, J.B., 1987. *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata dan Imam Sudiro, Edisi I, 9-10, ITB. Bandung.
- Holidah, D., Yasmin, Christianty, F.M., 2018. Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Teh Hitam Dan Teh Hijau Secara In Vitro Menggunakan Metode Inhibisi Enzim α -Glukosidase. *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*. 6 (2): 235-239.
- Kementrian Agama RI. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Kopkar, S., 1990. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.

- Kusumawati, N., Haryoto, Indrayudha, P., 2021. Penghambatan Enzim Alpha-Glukosidase oleh Daun Mimba (*Azadirachta indica*) dan Rimpang Temu Mangga (*Curcuma mangga*). *Jurnal Kefarmasian Indonesia*. 11 (1): 56-64.
- Lestari, Zulkarnain, Sijid, A., 2021. Diabetes Mellitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. *Prosiding Biologi Achieving the Sustainable Development Goals with Biodiversity in Confronting Climate Change*. 237-241.
- Marwati., Lallo, S., Rifai, Yusnita., 2018. Fraksinasi Senyawa Penghambat Enzim A-Glukosidase dari Ekstrak Etanol Daun Sambung Nyawa (*Gynura procumbens* (Lour) Merr.). *Majalah Farmasi dan Farmakologi*. 22(1):27-30.
- Marpaung, M. P., & Handayani, D. W. 2018. The effect of solvent concentration on antioxidant activity of akar kuning (*Fibraurea chloroleuca* Miers) extract. *AIP Conference Proceedings*, 2049.
- Maryam,S.T., Suhaena,A., Amrullah, N,F. 2020. Uji Aktivitas Penghambatan Enzim A-Glukosidase Ekstrak Etanol Biji Buah Alpukat Sangrai (*Persea americana* Mill.) Secara In Vitro. *As-Syifaa Jurnal Farmasi*. 12(1):51-56.
- Mukhriani, 2014, Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal-Kesehatan*. 7 (2), Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar, Makassar.
- Ndraha, S. 2014. Diabetes Mellitus Tipe 2 dan Tatalaksana Terkini. *Departemen Penyakit Dalam*. Fakultas Kedokteran Univeritas Krida Wacana Jakarta. Vol (27). No (2).
- p2ptm kemenkes (2019) *Latihan fisik dan kondisi khusus untuk penyakit tidak menular, kementerian kesehatan republik indonesia*. Available at: www.P2ptm.Kemkes.go.id.
- PERKENI, 2011. *Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia*. PERKENI, Jakarta.
- PERKENI, 2015. *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia*, PERKENI, Jakarta.
- Purwandari, R., Subagiyo, S., & Wibowo, T. (2018). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Jambu Biji. *Walisono Journal of Chemistry*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.21580/wjc.v2i2.3104>.
- Rahma, R., Hendra, Rudi., 2021. Uji Penghambatan A-Glukosidase Dari Ekstrak Paku Kelakai (*Stenochlaena Palustris*). *Kampus Bina Widya Pekanbaru*. Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 11, Vol. 15.
- Shihab, M. Quraish. Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2011.


- Simatupang, R. 2017. Pengaruh pendidikan kesehatan melalui media leaflet tentang diet DM terhadap pengetahuan pasien DMDI RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Kohesi*. 1(2): 163-174.
- Sweetman, S. C., 2009. *Martindale: The Complete Drug Reference*. 36th ed. London: Pharmaceutical Press.
- Syihab, Quraish M., 2011. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Tandra, H. (2017). *Segala Sesuatu Yang Harus Anda Ketahui Tentang Diabetes Panduan Lengkap Mengenal Dan Mengatasi Diabetes Dengan Cepat Dan Mudah Edisi Kedua Dan Paling Komplit*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Vena, Rutri., Yuantari, M.G., Catur. (2022). Kajian Literatur: Hubungan antara Pola Makan dengan Kejadian Diabetes Mellitus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 9 (2): 255-266.
- Wijayakusuma dan Hembing. (2010). *Bebas Diabetes Mellitus Ala Hembing*. Jakarta: Puspa Swara.
- Yuniarto A, Selifiana N. Aktivitas inhibisi enzim alfa-glukosidase dari ekstrak rimpang bangle (*Zingiber cassumunar* Roxb.) secara in vitro. *Media Pharmaceutica Indonesiana*. 2018.
- Yunitasari, I., Aminin, A.L.N., Anam, K., 2015. Aktivitas Inhibisi α -Glukosidase Dan Identifikasi Senyawa Dalam Fraksi Aktif Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*). *Jurnal Kimia Sains Dan Aplikasi* 18 (3): 110 – 115.

Lampiran 1. Skema Kerja

1. Pengolahan Sampel




2. Ekstraksi Sampel




3. Penyiapan sampel uji



a) Pembuatan larutan enzim α -glukosidase



b) Pembuatan larutan Natrium Karbonat (Na_2CO_3) 200 mM




c) Pembuatan larutan akarbose


d) Pembuatan larutan ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)

4. Uji Penghambatan Enzim A-glukosidase


a. Pengujian kontrol blanko (B0)




- Diinkubasi pada waterbath selama 20 menit pada suhu 37 °C




b. Pengujian blanko (B1)



c. Pengujian sampel (S0)




d. Pengujian sampel (S1)



- Diukur absorbansi p-NPG dengan alat ELISA reader pada panjang gelombang 405 nm

Hasil Pengujian

e. Pengujian kontrol positif



Lampiran 2. Perhitungan % Rendamen

Rendaman ekstrak dihitung menggunakan rumus : $\times 100\%$

$\times 100\%$

65,6%

Lampiran 3. Perhitungan % Inhibisi**1. Perhitungan % inhibisi ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)**

x 100%

a. Konsentrasi 200 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

b. Konsentrasi 400 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

c. Konsentrasi 600 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

d. Konsentrasi 800 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

e. Konsentrasi 1000 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

2. Perhitungan % Inhibisi kontrol positif (akarbose)

x 100%

a. Konsentrasi 0,2 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

b. Konsentrasi 0,4 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

c. Konsentrasi 0,6 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

d. Konsentrasi 0,8 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

e. Konsentrasi 1 ppm

x 100%

x 100%

x 100%

%

Lampiran 4. Perhitungan nilai IC50

1. Perhitungan nilai IC50 ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.)

Dilihat pada gambar 2. Dapat diketahui :

$$y = 0,0816x + 3,082$$

$$R^2 = 0,9965$$

Dimana,

$$y = 50 \quad a = 0,0816$$

$$b = 3,082$$

Ditanyakan x (IC50) =?

$$\text{IC50} =$$

$$\text{IC50} =$$

$$\text{IC50} = 574,975 \text{ mg/mL}$$

2. Perhitungan nilai IC50 kontrol positif (akarbose)

Dilihat pada gambar 3. Dapat diketahui :

$$y = 45,661x + 46,083$$

$$R^2 = 0,9801$$

Dimana,

$$y = 50$$

$$a = 45,661$$

$$b = 46,083$$

Ditanyakan x (IC50) =?

$$\text{IC50} =$$


$$\text{IC50} =$$

$$\text{IC50} = 0,085784 \text{ mg/mL}$$

Lampiran 5. Gambar pengujian aktivitas penghambatan enzim α -glukosidase ekstrak metanol klika anak dara



Gambar 4. Pembuatan ekstrak metanol klika anak dara



Gambar 5. Pengujian ekstrak metanol klika anak dara dan perbandingan

RIWAYAT HIDUP



Herawati dilahirkan di Sinjai pada tanggal 10 Juli 2001. Peneliti merupakan anak ke empat dari pasangan Pak Hasanuddin dan Ibu Ernawati dan memiliki tiga orang kakak. Kakak pertama bernama Nurfaida, kakak kedua bernama Ardiansyah dan kakak ketiga bernama Nurjannah. Saat ini peneliti berdomisili di Jl. H.M. Yasin Limpo, Romangpolong.

Peneliti memulai menjenjang pendidikan di TK Perwanida II Barambang pada tahun 2006, kemudian melanjutkannya di SD Negeri 81 Katute pada tahun 2007-2013, dan memasuki SMP Negeri 1 Sinjai Borong pada tahun 2013-2016, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Sinjai pada tahun 2016-2019. Pada 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi. Selama berkuliah selain menekuni bidang akademik, penulis juga mengeksplor kegiatan diluar bangku perkuliahan dengan aktif dalam Lembaga kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi sebagai anggota di divisi akhlak dan moral pada tahun 2019-2021, Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) Al-'Afiyah sebagai sekretaris umum pada tahun 2021-2022 serta Dewan Pengurus Cabang (DPC) HIPPMAS Sinjai Borong sebagai sekretaris umum pada tahun 2022-2023.

Peneliti sangat merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT serta doa restu dan dukungan penuh orang tua, keluarga besar dan teman-teman karena berkat doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Peneliti akan selalu bersemangat untuk memberikan persembahan terbaik untuk orang-orang sekitar terkhusus pada orang tua.