

**ANALISIS KANDUNGAN BAHAN KIMIA OBAT (BKO) NATRIUM
DIKLOFENAK PADA PRODUK JAMU PEGAL LINU MENGGUNAKAN
METODE SPEKTROSKOPI FTIR (*FOURIER TRANSFORM INFRA-RED*)
DENGAN KOMBINASI KEMOMETRIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA

NIM. 70100117078

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ibrahim Tasrikh Syafaat Assawala

NIM : 70100117078

Tempat, Tanggal Lahir : Luhu, 28 Maret 1999

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Kompleks Hartaco Permai, Tamalanrea

Judul : Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Pada Produk Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*) Dengan Kombinasi Kemometrik

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau buatan orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 09 Agustus 2023

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Ibrahim Tasrikh Syafaat Assawala
70100117078

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Pada Produk Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra-Red) dengan Kombinasi Kemometrik*" yang disusun oleh Ibrahim Tasrikh Syafaat Assawala, NIM: 70100117078, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 15 Juni 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 09 Juni 2023 M
20 Dzulqa'dah 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm.	(.....)
Munaqisy I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Pada Produk Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra-Red) Dengan Kombinasi Kemometrik”**. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Sang pembawa risalah, penerus, dan penyempurna ajaran Nabi-nabi terdahulu, serta yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan luar biasa saat ini.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan do'a, dan dukungan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta Bapak Yas'a Assawala dan Ibu Sri Suzana Wati Heluth, atas kasih sayang dan rasa cinta yang tulus, do'a yang selalu terpanjatkan, dukungan semangat, moril serta materilnya yang tak terhingga. Ucapan terima kasih yang tulus, penghormatan serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluuh jajarannya yang telah memberikan

kesempatan menyelesaikan studi di Kampus Peradaban tercinta UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap pegawai dan staff akademik Fakultas yang telah berkontribusi dalam mengelola serta administrasi dan memberi pelayanan kepada penulis semasa menjalanipendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar..
7. Dr. Hj. Apt. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan atas kontribusi legalitas administrasi dan pelayanan di Fakultas
8. Dr.H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas kontribusi legalitas administrasi dan pelayanan di Fakultas..
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas kontribusi legalitas administrasi dan pelayanan di Fakultas.
10. apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Program Studi Farmasi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji kompetensi saya yang telah banyak memberikan masukan atau saran dalam tahap penyelesaian skripsi saya. Terima kasih banyak juga atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan arahan-arahan yang membangun sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

11. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si selaku pembimbing pertama sekaligus sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi yang selalu meluangkan dan meyisihkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis walaupun ditengah kesibukan Ibu sebagai sekretaris jurusan, pengajar dan juga seorang ibu rumah tangga masih sempat membimbing saya dengan setulus hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Homat yang setinggi-tingginya atas segala ilmu yang ditranferkan kepada saya selama masa-masa penyelesaian skripsi ini.
12. apt. Munifah Wahyudin, S.Farm., M.Sc. selaku pembimbing kedua yang selalu meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaannya atas bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis. Terima kasih juga atas dorongan Ibu kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya menjadikan salah satu sumber semangat dan motivasi terbesar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Hildawati Almah, S. Ag., S. S., M.A. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan serta tuntunan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi penulis. Saran-saran dari Ibunda membuat penulis kembali membuka dan menelaah beberapa kitab tafsir yang sudah lama tidak dipelajari Terima kasih juga atas nasehat-nasehat yang diberikan.
14. apt. Nurul Muhlisah Maddepungeng, S.Si., M.Si., apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M.Farm., Fitrid Imani, S.Farm, selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
15. apt. Sukri, S.Farm. selaku Laboran Laboratoium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Awaluddin Iwan Perdana, S.Si, M.Si. selaku Laboran Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi atas bimbingan dan izin penggunaan alat serta fasilitas di laboratoriumnya.
16. Seluruh Dosen Jurusan Farmasi yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt. membalas jasa-jasa Bapak/Ibu serta seluruh staf

Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis.

17. Teman-teman Mahasiswa seperjuangan Jurusan Farmasi Angkatan 2017 (Kovalen) atas kebersamaan dan kerja-kerja kolektif dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan tahapan perkuliahan secara keseluruhan.
18. Teman-teman di CSSMoRA UIN Alauddin Makassar, terima kasih telah kebersamai saya selama di kampus ini.
19. Tak lupa pula Keluarga Besar Pondok Pesantren Shuffah Hizbullah Maluku di Ambon, Keluarga Besar Assawala, Selan, dan Heluth di Iha Luhu, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. *Aamiin*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 15 Juni 2023

Penyusun,

Ibrahim Tasrikh Syafaat Assawala
NIM: 70100117078

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Ruang Lingkup.....	10
G. Kajian Pustaka.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Obat Tradisional.....	15
B. Ketepatan Penggunaan Obat Tradisional	18
C. Jamu	21
D. Kebijakan di Indonesia Terkait Obat Tradisional	23
E. Bahan Kimia Obat.....	25
F. Natrium Diklofenak	28
1. Definisi	28
2. Fisikokimia.....	28
G. Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infra-Red)	29

H. Kemometrik.....	32
I. Tinjauan Keislaman Terkait Keutamaan Makanan Halal dan Thayyib	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian	41
3. Waktu Penelitian	41
B. Instrumen Penelitian.....	41
1. Alat-alat yang digunakan.....	41
2. Bahan-bahan yang digunakan.....	42
3. Sampel Penelitian	42
C. Prosedur Kerja.....	43
1. Ekstraksi Sampel	43
2. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR.....	43
3. Analisis data menggunakan Kemometrik.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Obat Tradisional.....	16
Gambar 2. Struktur Natrium Diklofenak	28
Gambar 3. Prinsip Kerja FTIR.....	30
Gambar 4. Spektrum Standar Natrium Diklofenak.....	46
Gambar 5. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 1	47
Gambar 6. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 2.....	47
Gambar 7. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 3	48
Gambar 8. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 4.....	48
Gambar 9. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 5.....	49
Gambar 10. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 6.....	49
Gambar 11. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 7.....	50
Gambar 12. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dan Sampel 8.....	50
Gambar 13. Score Plot PCA-1 dan PC-2	51
Gambar 14. Jamu Pegal Linu Sabdo Palon.....	68
Gambar 15. Jamu Pegal Linu Reumatik Cap Sinar Serambi	68
Gambar 16. Jamu Pegal Linu 10	69
Gambar 17. Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar	69
Gambar 18. Jamu Pegal Linu Plus Ginseng.....	70
Gambar 19. Jamu Pegal Linu Lengkap.....	70
Gambar 20. JSR Pegal Linu.....	71
Gambar 21. Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari.....	71
Gambar 22. Penimbangan Sampel.....	72
Gambar 23. Penambahan Etanol 96%.....	72
Gambar 24. Perendaman Sampel.....	73
Gambar 25. Penyaringan Sampel.....	73
Gambar 26. Hasil Ekstraksi.....	74
Gambar 27. Dilakukan Evaporator	74
Gambar 28. Ekstrak Sampel.....	75
Gambar 29. KBr.....	75

Gambar 30. N-hexane	76
Gambar 31. KBr dicampur dengan Sampel	76
Gambar 32. Film yang terbentuk	77
Gambar 33. Pengujian FTIR	77
Gambar 34. Perangkat FTIR	78
Gambar 35. Spektrum Jamu Sabdo Palon A	79
Gambar 36. Spektrum Jamu Sabdo Palon B	79
Gambar 37. Spektrum Jamu Sabdo Palon C	80
Gambar 38. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi A	80
Gambar 39. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi B	81
Gambar 40. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi C	81
Gambar 41. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 A	82
Gambar 42. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 B	82
Gambar 43. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 C	83
Gambar 44. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat A	83
Gambar 45. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat B	84
Gambar 46. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat C	84
Gambar 47. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng A	85
Gambar 48. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng B	85
Gambar 49. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng C	86
Gambar 50. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap A	86
Gambar 51. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap B	87
Gambar 52. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap C	87
Gambar 53. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR A	88
Gambar 54. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR B	88
Gambar 55. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR C	89
Gambar 56. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari A	89
Gambar 57. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari B	90
Gambar 58. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari C	90
Gambar 59. Standar Natrium Diklofenak dan Semua Sampel	91
Gambar 60. Score Plot PCA PC-1 dan PC-3	92

Gambar 61. Score Plot PCA PC-1 dan PC-4	92
Gambar 62. Score Plot PCA PC-1 dan PC-5	93
Gambar 63. Score Plot PCA PC-1 dan PC-6	93
Gambar 64. Score Plot PCA PC-1 dan PC-7	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Sampel Jamu Pegal Linu	45
Tabel 1. Data Analisis Spektrum standar Natrium Diklofenak dan sampel	45
Tabel 3. Hasil Skor Plot PCA Sampel Jamu Pegal Linu.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Kerja	66
Lampiran 2. Gambar Pengerjaan.....	68
Lampiran 3. Gambar Spektrum.....	79
Lampiran 2. Gambar Score Plot.....	92



ABSTRAK

Nama : IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA
NIM : 70100117078
Judul : Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Pada Produk Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*) dengan Kombinasi Kemometrik

Bahan Kimia Obat (BKO) adalah senyawa sintetik atau zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang seringkali ditambahkan pada obat tradisional atau jamu untuk meningkatkan efek terapeutik dari obat tradisional tersebut. Adanya BKO pada produk Obat Tradisional dalam hal ini jamu pegal linu dapat membahayakan konsumen, misalnya kontraindikasi pada pasien yang menderita penyakit tertentu. Selain membahayakan konsumen produk jamu yang mengandung kimia obat berpotensi mengganggu perkembangan obat herbal tradisional karena produsen menambahkan BKO untuk menghasilkan efek terapi yang lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan natrium diklofenak dalam sediaan jamu pegal linu dengan menggunakan Metode FTIR yang dikombinasikan dengan kemometrik. Sedangkan metode pengumpulan sampel yaitu dengan mengumpulkan 8 jenis jamu yang beredar di kota Makassar, kemudian mengekstraksi sampel tersebut dan menganalisisnya menggunakan metode FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*) yang dikombinasikan dengan kemometrik. Data dari hasil analisis FTIR berupa spektra kemudian dikombinasikan dengan PCA (*Principial Component Analysis*) sehingga dapat digunakan untuk melihat persamaan sampel jamu pegal linu dan standar kimia farmasi. Kombinasi kedua metode tersebut sangat akurat dan efektif dalam menganalisis keberadaan BKO di Jamu Pegal Linu. Hal ini ditunjukkan pada hasil spektrum yang spesifik (khas) antara standar BKO dengan sampel Jamu Pegal Linu. Hasil analisis PCA kemudian menunjukkan adanya kandungan bahan kimia obat pada sampel 8 jamu pegal linu cap Bunga Matahari[®] yang berada pada kuadran yang sama dengan standar natrium diklofenak

Kata Kunci: *Natrium Diklofenak, Jamu Pegal Linu, FTIR, Kemometrik, PCA*

ABSTRACT

Name : IBRAHIM TASRIKH SYAFAAT ASSAWALA

NIM : 70100117078

Title : *Analysis of Medicinal Chemical Ingredients from Diclofenac Sodium in Herbal Medicine Products Using FTIR Spectroscopy (Fourier Transform Infra-Red) method with Chemometric Combination.*

Medicinal chemicals (BKO) are synthetic compounds or chemical substances used as the main ingredients of chemical drugs which are often added to traditional medicines or herbs to enhance the therapeutic effects of these traditional medicines. The presence of BKO in Traditional Medicine products, in this case, pegal linu herbs, can endanger consumers, for example, they are contraindicated in patients suffering from certain diseases. Apart from endangering consumers, herbal medicine products containing medicinal chemicals have the potential to disrupt the development of traditional herbal medicines because producers add BKO to produce more therapeutic effects. This study aims to analyze the sodium content of diclofenac in the pegal linu herbs preparations using the FTIR method combined with chemometrics. While the sample collection method is to collect 8 types of herbs circulating in the city of Makassar, then extract the samples and analyze them using the FTIR (Fourier Transform Infra-Red) method combined with chemometrics. The data from the results of the FTIR analysis are in the form of spectra, which are then combined with PCA (Principal Component Analysis) so that they can be used to see the similarities between the aching pegal linu herb samples and pharmaceutical chemistry standards. The combination of these two methods is very accurate and effective in analyzing the presence of BKO in Pegal linu herbs. This is shown in the specific (typical) spectral results between the BKO standard and the Pegal linu herb sample. The results of the PCA analysis then showed the presence of medicinal chemicals in the sample of eight Pegal linu herbs from Bunga Matahari®, which were in the same quadrant as the standard diclofenac sodium.

Keywords: *Diclofenac Sodium, Pegal Linu Herbs, FTIR, Chemometrics, PCA*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jamu adalah obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan dapat ditemukan hampir di setiap pelosok tanah air. Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjalani kehidupan yang sehat, terutama di masa pandemi virus Corona, industri jamu Indonesia mengalami lonjakan perkembangan yang pesat. Tren ini tercermin secara global, dengan pangsa pasar menunjukkan tren positif. Kenaikan ini telah menyebabkan banyak industri pengolahan jamu baru bermunculan. Untuk meraih kepercayaan konsumen, produsen jamu dan jamu harus menciptakan produk yang berkualitas (Batubara dkk., 2020).

Pada tahun 2016 lalu, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia) mengeluarkan peringatan masyarakat tentang obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Peringatan tersebut diberi label Peringatan Masyarakat No. HM. 03.03.1.431.11.16.4010, tercantum 43 obat tradisional yang ditemukan mengandung BKO, antara lain fenilbutazon, allopurinol, deksametason, natrium diklofenak. Lebih dari 50 obat tradisional dan suplemen kesehatan dilaporkan mengandung senyawa sintesis terapeutik dan bagian yang dibatasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa banyak dari pengobatan tradisional ini telah dicampur dengan bahan kimia obat, terutama yang dirancang untuk nyeri pegal linu dan rematik, jamu penambah stamina (Pratama, 2020).

Meningkatnya penggunaan obat alami disebabkan oleh semakin berkurangnya daya beli obat bahan rekayasa, serta pemahaman masyarakat bahwa obat herbal sebagai obat tradisional relatif lebih aman dibandingkan obat buatan atau obat yang ada saat ini. Meningkatnya minat terhadap obat herbal di pasaran membuat pembuat yang kurang ajar menambahkan sintesis restoratif (BKO) ke produk mereka demi meningkatnya jumlah penjualan (Kamar dkk., 2021).

Pada tahun 2016, BPOM mengeluarkan Peringatan Publik. Dengan Nomor 03.03.1.431.11.16.4010 Sehubungan dengan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat (BKO) dan telah ditemukan 43 obat yang terkontaminasi BKO. Bahan kimia obat yang ditemukan diantaranya adalah fenilbutazon, allopurinol, deksametason, dan natrium diklofenak, antara lain. Selain itu, lebih dari 50 obat tradisional dan produk kesehatan dilaporkan mengandung bahan kimia restoratif dan bahan terlarang. Siaran pers mengatakan bahwa obat penghilang rasa sakit (untuk rematik, rematik) dan herbal penambah energi adalah bahan paling umum dalam obat tradisional yang dicampur dengan BKO (Sidoretno & Oktaviani Rz, 2018).

Selanjutnya Pada tahun 2021, jumlah obat tradisional yang ditemukan BKO mengalami peningkatan menjadi 53 kasus dalam waktu setengah dekade. Produk Gan Mau Tong, misalnya, mengandung BKO Sodium diklofenak. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa BKO masih sering ditambahkan dalam produk obat tradisional, seperti pada penelitian Elliya Rosyada tahun 2019 tentang jamu pereda nyeri yang

dijual di kota Mataram, ditemukan bahwa tiga dari 10 sampel jamu pereda nyeri mengandung BKO diklofenak. natrium, yang dilarang untuk digunakan dalam produk jamu (Rosyada dkk., 2019).

Pada Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 menyatakan bahwa obat tradisional tidak boleh mengandung BKO. Menurut Pasal 6 ayat 1 Pendaftaran Obat Tradisional, setiap obat tradisional yang diperbolehkan beredar di Indonesia harus memenuhi kriteria keamanan dan mutu bahan bakunya. Sementara pada pasal 7 ayat 1 juga mengamanatkan bahwa dalam obat, tidak diperbolehkan ada penambahan BKO yang diperoleh melalui isolasi atau cara sintetik. Badan POM telah melakukan pengujian terhadap produk jamu pegal linu yang mengandung BKO dan ditemukan kandungan natrium diklofenak, fenilbutazon, parasetamol, antalgin, deksametason, prednison dan piroksikam (Fatimah dkk., 2017).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak untuk mengkonsumsi barang dan jasa tanpa mengorbankan keselamatan, keamanan dan kenyamanan. Ini juga menjamin informasi yang jujur tentang kondisi dan jaminan seputar konsumsi tersebut. Sayangnya, produk yang dijual sebagai obat tradisional di pasaran seringkali mengandung bahan kimia obat, sangat bertentangan dengan amanat tersebut.

Tuntunan Islam menganjurkan umatnya untuk mengutamakan konsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan yang halal dan sehat sebagai sarana untuk mencapai pola hidup sehat sebagaimana perintah Allah swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2014).

Firman Allah swt. tersebut menguraikan konsep atribut dari makanan dan minuman (dalam hal ini juga termasuk produk jamu) yang dikonsumsi mematuhi prinsip halal dan *thayyib*. Sementara halal mencerminkan kepatuhan beragama, *thayyib* mencakup standar kesehatan dan kelayakan manusia. Standar-standar ini melayani kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam Islam, kesehatan tidak hanya terkait dengan kesejahteraan fisik tetapi juga mencakup kesejahteraan psikologis (Sholeh, 2015).

Senada dengan ayat diatas, Allah swt. juga memerintahkan kepadakita untuk menjauhi makanan yang membahayakan tubuh dan menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Hal ini dapat kita simak dalam firman Allah swt. pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat/2:172 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah” (Kementerian Agama RI, 2014).

Bahan Kimia Obat (BKO) adalah senyawa sintetik atau zat-zat kimia yang digunakan sebagai bahan utama obat kimiawi yang digunakan dalam pengobatan kontemporer. Kehadiran BKO dalam produk herbal dapat membahayakan penggunaannya dengan membuatnya berbahaya bagi mereka

yang menderita penyakit tertentu, misalnya. Karena BKO ditambahkan ke produk jamu oleh produsen untuk meningkatkan pendapatan, jamu yang dibuat dari bahan kimia berpotensi merugikan perkembangan jamu tradisional. BKO ditambahkan untuk memberikan dampak terapeutik yang lebih besar dan untuk mengobati penyakit secara instan (Anggreani dkk., 2015).

Beberapa jenis bahan herbal yang sering dianggap sebagai campuran BKO antara lain obat penurun panas reumatik herbal, bahan untuk daya tahan tubuh pria, obat flu, suplemen kesehatan tanpa henti untuk menggembungkan tubuh. Jenis obat sintetik berbahaya yang sering digunakan adalah Diclofenk Sodium, Phenylbutazone, Dexamethasone, Paracetamol, Allopurinol dan CTM (Wahyuni & Susanti, 2021).

Kehadiran KBO tertentu dalam jamu membuatnya berbahaya dan berpotensi menyebabkan efek samping yang merugikan dan bahkan kematian. Salah satu bahan kimia tersebut merupakan natrium diklofenak. Natrium diklofenak diklasifikasikan sebagai Obat Anti-Inflamasi Non-Steroid (NSAID) dan diketahui menyebabkan beberapa efek samping seperti tekanan darah tinggi dan rasa perih di bagian lambung (Idacahyati dkk., 2020).

Ada beberapa metode spektroskopi yang bisa digunakan untuk menganalisis kandungan BKO di dalam suatu produk jamu, termasuk HPLC, spektrofotometri UV-VIS, kromatografi lapis tipis (KLT), dan TLC-densitometer. Namun, pendekatan yang paling hemat biaya dan sederhana adalah metode FTIR. Metode analitik ini menawarkan analisis BKO yang cepat dan mudah, sekaligus ramah anggaran dan ketersediaan alat. Selain itu, FTIR juga memberikan hasil dalam waktu yang relatif singkat (Hughes dkk., 2013).

Pengolahan data spektrum FTIR dapat dilakukan melalui penerapan metodologi kemometrik. Pendekatan ini telah memperoleh popularitas luas di bidang analisis kimia, khususnya dalam menilai kesamaan antara berbagai komponen kimia. Dengan menggunakan teknik multivariat, kemometrik dapat secara akurat menggambarkan hubungan antara banyak sampel dan variabel. Minitab adalah salah satu program perangkat lunak yang menggabungkan kimia dan statistik, menjadikannya alat yang ampuh untuk analisis kemometrik.

(Risal, 2020).

Melihat adanya kasus pencampuran BKO dalam produk jamu dan efek samping yang ditimbulkan maka perlu dilakukan penelitian analisis kandungan BKO Natrium diklofenak dalam jamu pegal linu. Berbagai jenis produk jamu pegal linu yang berasal dari berbagai merek di Makassar kemudian akan dianalisis menggunakan metode FTIR dengan kombinasi kemometrik.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sampel jamu pegal linu yang dianalisis, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak?
2. Bagaimana hasil pembacaan spektrum yang terbentuk dari Standar Natrium Diklofenak dan sampel jamu pegal linu yang diolah menggunakan metode spektroskopi FTIR?
3. Bagaimana hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada sampel jamu pegal linu menggunakan metode Spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan kemometrik?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada sampel jamu pegal linu.
2. Untuk mengetahui hasil pembacaan spektrum yang terbentuk dari Standar Natrium Diklofenak dan sampel jamu pegal linu yang diolah menggunakan metode spektroskopi FTIR.
3. Untuk mengetahui hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada sampel jamu pegal linu menggunakan Spektroskopi FTIR dengan kombinasi kemometrik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang bermanfaat bagi instansi terkait seperti BPOM, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) mengenai metode analisis yang cepat dan mudah untuk menganalisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam pengobatan tradisional ini adalah Jamu Pegal Linu.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, serta memberikan gagasan untuk upaya pencegahan Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada Jamu Pegal Linu

- c. Memberikan pengetahuan berupa referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait penggunaan metode Spektroskopi FTIR dengan kombinasi Kemometrik.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk masyarakat umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat akan bahaya dan efek samping Bahan Kimia Obat (BKO) yang terkandung dalam Produk Obat Tradisional.
- b. Untuk kalangan pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Kesehatan dan BPOM dalam upaya pengendalian dan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Jamu Pegal Linu.
- c. Untuk kalangan akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai, mengukur dan memperbaiki atau menyempurnakan analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Jamu Pegal Linu menggunakan Metode Spektroskopi *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR) dengan Kombinasi Kemometrik.

E. Definisi Operasional

1. Jamu Pegal Linu merupakan ramuan yang digunakan untuk meredakan nyeri linu, nyeri tulang dan otot, memperlancar peredaran darah, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meredakan nyeri tubuh secara keseluruhan.

2. Bahan Kimia Obat atau disebut BKO, merupakan bahan yang dilarang dan biasa dimasukkan ke dalam obat tradisional atau produk makanan olahan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas pengobatan tradisional.
3. Natrium Diklofenak merupakan obat anti inflamasi non-steroid (OAINS) non selektif berasal dari asam fenilasetat dan termasuk dalam kelas asam asetat sebagai penghambat COX yang kuat, secara efektif mengurangi peradangan, mengurangi rasa sakit, dan menurunkan demam. Mekanisme kerjanya melibatkan penekanan produksi prostaglandin yang memediasi rasa sakit, menjadikannya pilihan pengobatan yang manjur untuk migrain, asam urat, dan semua jenis rasa nyeri.
4. FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*) adalah *instrument analysis* yang biasa digunakan untuk melihat pergerakan suatu molekul dengan mendeskripsikan struktur senyawa kimia. Biasanya digunakan dalam menganalisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO).
5. Kemometrik merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi secara statistika korelasi antara informasi yang telah diketahui dari sampel dengan data spektrum.
6. Analisis komponen utama (AKU) atau *Principyal Component Analysis* (PCA) adalah prosedur ilmiah untuk mengubah faktor unik yang masih terkait satu sama lain menjadi variabel lain.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan bahan dan metode penentuan adanya senyawa Natrium Diklofenak menggunakan Spektroskopi FTIR dengan metode kemometrik untuk mendapatkan hasil yang akurat

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian (Tahir dkk., 2018) dengan judul “*Analisis BKO Natrium Diklofenak Pada Sediaan Jamu Pegal Linu yang Beredar di Makassar*”, dapat disimpulkan bahwa Kromatografi lapis tipis (KLT) digunakan untuk analisis kualitatif, dan spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk analisis kuantitatif dalam penelitian eksperimental ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan kimia obat natrium diklofenak dalam ekstrak Jamu Pegal Linu yang diambil dari beberapa toko di Makassar dengan menggunakan random sampling dan kriteria jamu yang banyak diminati atau digunakan oleh masyarakat. Tujuh jenis herbal yang berbeda digunakan untuk mendapatkan sampel sakit dan nyeri herbal, yang masing-masing diidentifikasi dengan simbol unik. Efek samping dari eksplorasi yang diarahkan oleh Masdiana menunjukkan bahwa natrium diklofenak ditemukan pada 3 dari 7 sampel yang beredar di Kota Makassar.

Perbedaan antara eksplorasi ini dengan penelitian Tahir 2018 adalah penggunaan metodenya. Pada Penelitian tersebut Metode Analisis kualitatifnya menggunakan kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sedangkan di penelitian ini Metode analisis kualitatifnya menggunakan Spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*).

Berdasarkan penelitian (Rosyada dkk., 2019) dengan judul “*Analisis Kandungan BKO Natrium Diklofenak dalam Jamu Pegal Linu yang dijual di*

Kota Mataram”, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar natrium diklofenak (BKO) dalam sediaan herbal rematik pegal linu. Natrium diklofenak, termasuk BKO, adalah pereda nyeri umum yang dapat ditemukan dalam pengobatan herbal untuk nyeri rematik. Strategi yang digunakan dalam pemeriksaan subyektif adalah kromatografi lapis tipis (*tenderloving care*) dengan derivasi asam etil asetat: menggunakan spektrofotometri UV-Vis untuk analisis kuantitatif dan n-heksana (7:3) sebagai fase gerak. Teknik ini dipilih karena mudah dikerjakan dan efektif untuk pemeriksaan subjektif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rosyada tahun 2019 yakni pada metode yang digunakan. Pada Penelitian tersebut Metode Analisis kualitatifnya menggunakan kromatografi Lapis Tipis (KLT). Sedangkan di penelitian ini Metode analisis kualitatifnya menggunakan Spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*).

Berdasarkan penelitian (Pertwi & Suariyani, 2020) dengan judul penelitian “*Kandungan BKO Tradisional yang Beredar di Pasaran*” disimpulkan bahwa Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel obat tradisional yang telah diuji di Balai POM Denpasar yaitu metode Total Sampling, Deskripsi obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini juga mengolah data dengan menggunakan teknik editing, coding, dan analisis. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan metode univariat. Frekuensi dan persentase masing-masing variabel akan disortir, disajikan, dan direpresentasikan secara grafis dengan menggunakan metode ini.

Metode pengambilan sampel inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Pertiwi & Suariayanti tahun 2020. Penelitian tersebut menggunakan metode *Total Sampling* serta menggunakan data sekunder yang telah tersedia, sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan data primer dari hasil analisis menggunakan spektroskopi FTIR.

Berdasarkan penelitian (Kamar dkk., 2021) dengan judul penelitian “*Identifikasi Parasetamol dalam Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis*” dijelaskan bahwa Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya parasetamol BKO dalam sediaan herbal reumatik rematik yang ada di Kota Langsa. Teknik Kromatografi Lapis Mungil (perawatan penuh kasih sayang) digunakan dalam tahap penelitian khusus dan uji coba di Lab Sains dan Farmakognosi Fakultas Sains Cut Nyak Dhien Langsa. Lima sampel jamu dikumpulkan dengan menggunakan metode Random Sampling. Dengan nilai Rf 0,27, 0,33, dan 0,22 untuk tiga kali pengulangan, sampel jamu SB tidak mengandung parasetamol yang ditentukan dengan nilai RF TLC. Sementara itu, parasetamol terdeteksi pada sampel nyeri herbal SA, SC, SD, dan SE, dengan RF = 1 untuk setiap pengulangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa satu sampel herbal mengandung BKO Paracetamol, dan empat sampel herbal positif mengandung BKO Paracetamol.

Salah satu perbedaan pada penelitian Kamar dkk pada tahun 2019 dalam penelitian ini terletak pada jenis Bahan Kimia Obat (BKO) yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan BKO Parasetamol sedangkan pada penelitian ini menggunakan BKO Natrium diklofenak.

Berdasarkan penelitian Jurnal Artikel Review (Anggraini Syahfitri dkk., 2021) dengan judul “*Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat pada*

Jamu” dijelaskan bahwa Artikel Review ini bertujuan untuk merangkum beberapa metode yang digunakan dalam proses analisis bahan kimia obat yang terkandung dalam jamu yang sumber datanya menggunakan studi literatur. Kesimpulan penelitian adalah pereda nyeri rematik, penurunan berat badan, penambah daya tahan tubuh, diabetes, antihipertensi, dan suplemen makanan mengandung BKO. Parasetamol, natrium diklofenak, piroksikam, ibuprofen, deksametason, asam mefenamat, fenolftalein, sibutramine, fenfluramine, sildenafil, tadalafil, thiosyldenafil, kafein, efedrin, nifedipin, dan glibenklamid adalah bahan obat yang digunakan. Jamu dianalisis dengan metode KLT (Kromatografi Lapis Tipis), Kromatografi Densitometri, Kromatografi Lapis Tipis-Spektrofotometri, Kromatografi Lapis Tipis SERS, HPLC (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi), HPLC-ESI-MS/MS (cairan kinerja tinggi kromatografi - elektropray ionisasi spektrometri massa tandem), HPLC-Densitometry (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi densitometri), UHPLC-Q-ORTIP HERMS (kromatografi cair kinerja ultra-tinggi-Quadrupole-orbitrap spektrometri massa resolusi tinggi), UPLC/Q-TOF MS (kromatografi cair ultra-kinerja (UPLC) digabungkan dengan spektrometri massa quadrupole-time-of-flight (Q-TOF MS), Elektroforesis kapiler (CE), GC-MS (Kromatografi Gas-Spektrometri Massa), Spektrometri LC-MS (*Liquid Chromatograph Mass*), Prototipe Test-Strip, dan Spektroskopi inframerah (FTIR)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anggraini Syahfitri dkk. Yang dilakukan di tahun 2021 terletak pada jenis atau sifat Penelitian. Jenis Penelitian tersebut adalah Studi Literatur. Sedangkan pada penelitian ini bersifat Eksperimental yang dilaksanakan di Laboratorium UIN Alauddin Makassar.

Berdasarkan penelitian (Risal, 2020) dengan judul “*Analisis Kemometrik Senyawa Inhibitor Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer Ir (FTIR)*” dijelaskan bahwa penelitian ini Arbutin dan asam aspartat dari berbagai strain antara lain temulawak, kunyit putih, lavender, ekstrak selasih, ekstrak kemukus, ekstrak cabai jawa, dan ekstrak lempuyang menggunakan alat spektrofotometer infra merah (FTIR), dan data dianalisis menggunakan metode PCA dan CA. Karena PCA menggunakan senyawa yang menghambat tirosinase pada kuadran yang sama, seperti senyawa asam kojic, ekstrak lempuyang, ekstrak kemangi, dan ekstrak lavender, maka PCA menggunakan data dengan composite eigenvalue 99,8%. Pada analisis CA, asam kojic ditemukan memiliki kemiripan dengan spektrum ekuivalensi 75,85 dan radius Euclidean 0,202. Berdasarkan data dari analisis kemometrik, plot skor menunjukkan total empat kelompok, dengan asam kojic sebagai kelompok keempat dengan tiga ekstrak lempuyang, lavender, dan arbutin sebagai dua penghambat tirosinase. Senyawa arbutin kekurangan gugus dari urutan yang dihasilkan sebagai hasilnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Risal di tahun 2020 yang terletak pada jenis sampel dan senyawa yang dianalisis. Sampel yang diteliti adalah dari ekstrak tumbuhan, kemudian senyawa yang akan dianalisis adalah senyawa inhibitor tirosinase. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan produk jamu pegal linu sebagai sampel dan senyawa yang akan dianalisis secara kualitatif adalah natrium diklofenak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat Tradisional

Sediaan galenik atau campurannya, selain komponen tumbuhan, hewan, dan mineral, merupakan komponen obat tradisional yang digunakan untuk pengobatan berdasarkan kearifan budaya. Biasanya, obat tradisional diberikan secara oral atau topikal, seperti dalam bentuk bubuk, kapsul, tablet, dan larutan. Walaupun tersedia dalam berbagai bentuk, untuk saat ini belum ada obat tradisional dalam bentuk suntikan atau aerosol (Aulani, 2019).

Secara konsep Farmakologi menyatakan bahwa obat harus memiliki efek samping, ciri yang lebih menonjol pada obat sintetik (obat modern) daripada obat tradisional. Obat-obatan sintetik memiliki efek primer yang lebih kuat, tetapi senyawa aktif murninya membuat mereka berisiko lebih tinggi menyebabkan efek samping yang lebih parah. Hal ini berbeda dengan obat tradisional yang terbuat dari ekstrak yang mengandung banyak senyawa dengan kadar kandungan kimia yang berbeda-beda (Sutrisna, 2016).

Berdasarkan data Statistik dari World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa Obat tradisional digunakan oleh kurang lebih 60% masyarakat di negara maju dan 80% masyarakat di negara berkembang. Manfaat yang cukup besar dari pengobatan alami dan obat tradisional dibandingkan alternatif sintetik adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengobatan alami, berbagai senyawa aktif menghasilkan hasil yang saling melengkapi.
2. Kehadiran banyak senyawa aktif memungkinkan bahan alami untuk memberikan efek farmakologis yang lebih luas

3. Sebagian besar obat-obatan konvensional ada dalam bentuk ekstrak yang tidak dimurnikan, dan meskipun mengandung banyak senyawa, jumlah masing-masingnya relatif rendah. Akibatnya, setiap reaksi merugikan yang disebabkan oleh obat-obatan ini cenderung lebih ringan.

Selain kelebihan yang telah disebutkan diatas, obat tradisional juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Masih sedikitnya obat tradisional yang telah tervalidasi melalui uji klinis penelitian ilmiah.
2. Kurangnya standarisasi bahan obat tradisional
3. Resistensi dari para pelaku kesehatan atau dokter karena belum adanya uji klinis tadi (Sutrisna, 2016).

Dominasi penyakit terus-menerus terus meningkat dan ketidakmampuan untuk melibatkan obat-obatan yang ada saat ini untuk penyakit tertentu serta luasnya akses ke informasi tentang pengobatan konvensional adalah alasan di balik meningkatnya penggunaan resep tradisional. Karena berbagai macam bahan alami, hal ini menyebabkan peningkatan produksi tahunan obat tradisional. BPOM membagi obat tradisional menjadi tiga kategori yakni sediaan herbal, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka untuk mempermudah perizinan dan regulasi (Dewi, dkk. 2019).



Gambar 1. Logo Obat Tradisional

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (Badan POM) mengategorikan obat alami, juga dikenal sebagai obat tradisional, menjadi tiga kategori di Indonesia: fitofarmaka dan obat herbal terstandar (BPOM, 2014).

1. *Jamu*

Jamu adalah obat tradidisional campuran bahan tanaman, biasanya diberikan sebagai bubuk, pil, atau cairan. Resep obat jenis ini biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya, mengandung antara 5 sampai 10 tanaman obat, bahkan terkadang lebih.

Jamu beroperasi berdasarkan bukti empiris, bukan uji klinis atau validasi ilmiah. Meskipun demikian, masih mematuhi persyaratan keselamatan yang ketat dan standar kualitas yang telah ditetapkan dan dijunjung tinggi selama berabad-abad. Catatan keamanannya yang terbukti dan manfaat kesehatan langsung untuk penyakit tertentu menjadikannya pilihan tepercaya bagi banyak orang yang mencari pengobatan alternatif. (Suharmiati & Handayani, 2006)

Jamu harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain (Ninla Elmawati Falabiba, 2019):

- a) Aman
- b) Demonstrasi efektivitas dapat dicapai melalui bukti empiris.
- c) Mampu memenuhi standar kualitas yang relevan

2. *Obat Herbal Terstandar*

Obat Herbal Terstandar (OHT) melibatkan ekstraksi komponen hewani, tumbuhan atau mineral alami. Membuat obat-obatan ini adalah proses kompleks yang tidak hanya membutuhkan peralatan mahal, tetapi juga tenaga kerja terampil yang mampu mengekstraksi senyawa yang diperlukan. Bukti ilmiah bahwa obat herbal terstandar ini berkhasiat diperoleh melalui

penelitian praklinis, yang meliputi uji toksisitas dan memastikan standarisasi bahan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak yang higienis (Suharmiati & Handayani, 2006).

Untuk obat herbal terstandar, diperlukan kriteria khusus yang digariskan berikut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019):

- a) Aman
- b) Demonstrasi efektivitas secara ilmiah atau pra-klinis adalah mungkin.
- c) Memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi sesuai persyaratan
- d) Standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk akhir.

3. *Fitofarmaka*

Fitofarmaka mirip dengan pengobatan modern, dengan standar produksi ditentukan oleh penelitian ilmiah dan uji klinis pada manusia. Pembuatan obat-obatan tersebut melibatkan investasi yang signifikan dalam peralatan modern, tenaga ahli, dan sumber daya keuangan yang besar (Suharmiati & Handayani, 2006).

Untuk Fitofarmaka harus memiliki kriteria antara lain (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

- a) Aman
- b) Menegaskan validitas ilmiah, didukung oleh uji pra-klinis dan klinis.
- c) Pastikan bahwa kriteria kualitas terpenuhi

B. *Ketepatan Penggunaan Obat Tradisional*

Pengobatan tradisional sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman daripada pengobatan modern. Ini berasal dari fakta bahwa resep tradisional memiliki efek samping yang lebih sedikit daripada obat buatan, karena digunakan secara akurat. Penggunaan yang tepat tersebut memerlukan faktor-faktor seperti

ketepatan dosis, pemilihan bahan, waktu pemberian, metode penggunaan, dan pencocokan obat dengan informasi terkait (Purwanto, 2016).

Obat tradisional memiliki efek samping yang relatif sedikit bila digunakan dengan benar. Memanfaatkan obat tradisional secara tepat meliputi:

1. *Kebenaran Bahan*

Khasiat zat obat bergantung pada keakuratannya. Keanekaragaman bahan obat di Indonesia, sehingga banyak tanaman obat yang bervariasi dalam spesies dan sulit untuk dibedakan. Sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam memilih bahan karena setiap komponen membawa dampak terapeutik yang unik (Sumayyah & Salsabila, 2017).

Kunci untuk mencapai efek yang diinginkan terletak pada bahan yang digunakan. Misalnya, membedakan berbagai jenis lempuyang bisa menjadi tantangan. Lempuyang Emprit, ditandai dengan ukurannya yang kecil, rona kuning, dan rasa pahit, bekerja secara ajaib sebagai penambah nafsu makan. Lempuyang gajah, sebaliknya, berukuran lebih besar, berwarna kuning, dan sama efektifnya dalam meningkatkan nafsu makan. Terakhir, lempuyang Wangi menonjol dengan penampilannya yang agak putih dan wangi yang menyenangkan. Tidak seperti rekan-rekannya, itu membantu dalam penurunan berat badan (Elenora & Ristiawati, 2019).

2. *Ketepatan dosis*

Kepatuhan terhadap aturan yang ditentukan dan tingkat dosis adalah yang terpenting, seperti mengikuti resep dokter. Meskipun demikian, menggunakan tanaman obat tidak berarti penggunaan yang tidak terbatas. Dosis tetap harus diikuti secara ketat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dan perlu dicatat bahwa mereka dapat memiliki efek samping (Sumayyah & Salsabila, 2017).

Sama seperti obat-obatan sintetik, tanaman obat memerlukan cara konsumsi yang tepat. Sangat penting untuk mematuhi dosis yang dianjurkan, mirip dengan resep dokter. Misalnya, buah mahkota dewa hanya bisa dikonsumsi dengan perbandingan satu buah dengan tiga gelas air. Demikian pula, daun mindi hanya bisa dimanfaatkan jika direbus dengan air yang telah ditentukan jumlahnya; tujuh daun yang direkomendasikan (Elenora & Ristiawati, 2019).

3. Ketepatan waktu penggunaan

Dalam hal tanaman obat, dosis dan konsumsi yang tepat hanyalah bagian dari persamaan. Untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan, pengaturan waktu juga penting. Potensi tanaman ini sangat ditentukan oleh waktu penggunaan yang tepat (Sumayyah & Salsabila, 2017).

Contohnya kunyit, sebagai tanaman obat telah lama digunakan untuk meredakan nyeri haid dan dapat ditemukan dalam ramuan asam kunyit. Namun, kehati-hatian harus dilakukan saat menggunakannya selama awal kehamilan karena risiko keguguran. Waktu penggunaan obat tradisional sangat penting untuk mencapai hasil pengobatan yang diinginkan (Elenora & Ristiawati, 2019).

4. Ketepatan cara penggunaan

Sangat penting untuk dicatat bahwa tidak semua tanaman efektif saat direbus dan dikonsumsi. Misalnya, daun kecubung yang berfungsi sebagai bronkodilator sebaiknya dihirup, bukan diseduh. Menelannya dalam bentuk yang terakhir bisa mengakibatkan mabuk (Sumayyah & Salsabila, 2017).

5. Ketepatan pemilihan obat untuk penyakit tertentu

Ada banyak zat aktif dalam beberapa tanaman obat yang dapat mengobati penyakit tertentu. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keefektifannya dan efek samping yang menyertainya (Sumayyah & Salsabila, 2017).

Penggunaan obat tradisional yang tidak tepat dapat menimbulkan bahaya yang tidak terduga. Misalnya, *Momordica charantia*, yang biasa digunakan sebagai sayuran, diketahui memiliki sifat anti-HIV-AIDS. Namun bijinya juga mengandung triterpenoid yang dapat menghambat aktivitas spermatozoa. Oleh karena itu, mengandalkan biji pare untuk mengobati HIV-AIDS dapat menyebabkan kemandulan pria. Untuk menghindari reaksi obat yang tidak diinginkan, sangat penting untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menggunakan obat herbal dengan benar sebelum memasukkannya ke dalam rencana perawatan seseorang (Elenora & Ristiawati, 2019).

Selain itu, penggunaan obat tradisional seperti jamu tetap harus memperhatikan petunjuk penggunaannya, ini termasuk memastikan bahwa produk tersebut memiliki izin edar dari BPOM dan meninjau dengan cermat informasi yang terkandung dalam kemasan sebelum digunakan. Informasi seperti petunjuk penggunaan, tanggal kedaluwarsa, peringatan, kontraindikasi, dan kemanjuran harus diperhitungkan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kemasannya utuh dan fisik produk dalam kondisi baik. Namun, obat tradisional tidak dianjurkan diandalkan untuk situasi darurat atau situasi yang mengancam jiwa (Rianoor, 2022).

C. Jamu

Masyarakat menggunakan jamu, obat tradisional, untuk mengobati penyakit ringan, menguatkan tubuh, dan mencegah penyakit. Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, jamu memiliki arti penting dalam sistem kesehatan, dengan hampir 70 hingga 80% populasi bergantung padanya. Tidak seperti pengobatan konvensional, pengobatan herbal dianggap tidak beracun dan kecil kemungkinannya untuk menghasilkan efek samping. Khasiat ramuan Jamu

didukung oleh bukti empiris, waktu, usia, dan sejarah selama ratusan tahun (Muliasari dkk., 2019).

Bahan-bahan alami seperti jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, daun asam, daun salam, dan daun sirih menjadi bahan dasar jamu. Yang membedakan jamu adalah ketergantungannya pada sumber daya organik dan tidak adanya bahan kimia sintetik. Pemrosesan tradisional melibatkan merebus tanaman ini dan mengonsumsi air yang diekstraksi. Namun, perkembangan modern telah menyebabkan jamu disajikan dalam bentuk kapsul, pil, cairan, dan kaplet (Daud & Novrimansyah, 2022).

Jamu didasarkan pada data empiris dan tidak membutuhkan bukti klinis atau bukti ilmiah untuk ditetapkan. Meskipun demikian, standar keamanan tertentu harus dipenuhi, dan persyaratan kualitas harus dipenuhi setelah membuktikan keefektifannya melalui data empiris. Jamu umumnya terdiri dari berbagai tanaman obat, mulai dari 5 hingga 50, disajikan dalam bentuk bubuk, pil, minuman, atau cairan yang berasal dari beberapa tanaman. Beberapa contoh jamu tersebut antara lain Jamu Nyonya Mener, Antangin, dan Kuku Bima Gingseng (Rahayuda, 2016).

Pemerintah Indonesia mengamanatkan bahwa setiap jamu atau obat tradisional yang diproduksi, didistribusikan, atau diekspor di dalam negeri harus memenuhi standar kualitas. Untuk mencapai hal tersebut, obat tradisional harus disetujui dan didaftarkan oleh Menteri Kesehatan. Konsekuensinya, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk pendaftaran obat tradisional tersebut yaitu:

- 1) Keamanan dan efektivitas obat harus ditetapkan melalui bukti empiris sebelum dapat dianggap layak untuk dikonsumsi manusia,

- 2) Bahan dan cara produksi obat tradisional harus memenuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan
- 3) Produk ini sama sekali tidak mengandung senyawa sintetis dan zat apa pun yang dikategorikan sebagai narkotika atau obat keras (Yunus & Pratiwi, 2022).

Berdasarkan persyaratan dasar terkait jamu, yaitu mengikuti komposisi yang benar, tidak adanya perubahan fisiko-kimia, dan kurangnya zat asing adalah penentu utama kualitas. Di antaranya, komposisi yang tepat adalah yang tertinggi. Diperlukan kepatuhan yang ketat terhadap formulasi simplisia, seperti yang tertera pada formulir pendaftaran. Penambahan nutrisi atau bahan kimia asing apa pun dilarang keras (Yuliani & Virginia, 2021).

D. Kebijakan di Indonesia Terkait Obat Tradisional

Peraturan perundang-undangan mengenai obat tradisional, termasuk peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan RI. Pedoman ini registrasi atau pendaftaran langsung, hibah pembuatan, peredaran, kewajiban pelaku usaha, pengawasan impor dan ekspor barang serta pembuatan obat tradisional (Bolendea, 2019).

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK, 1999).

Pasal 4 UUPK mengatur tentang pelanggaran hak konsumen, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha yang terlibat dalam produksi obat tradisional berbahan kimia obat. Pasal 8 ayat 3 lebih menegaskan perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi obat tersebut, semuanya sesuai dengan UUPK pasal 8 ayat 3 (UUPK, 1999).

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional

Pasal 7 terdapat obat tradisional dilarang mengandung:

- a) Kandungan etil alkohol melebihi 1%, kecuali digunakan dalam bentuk sediaan tingtur;
- b) Bahan kimia obat (BKO) yaitu senyawa terapeutik yang timbul dari isolasi atau cara sintetik;
- c) Obat-obatan dengan efek narkotika atau psikotropika;
- d) dan/atau bahan lain yang dapat berdampak negatif pada kesehatan (Depkes, 2012).

3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar Dan Fitofarmaka

Menurut penjelasan Pasal 2 peraturan ini, obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka yang diproduksi atau diedarkan di Indonesia wajib didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari Kepala BPOM. Adapun langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin edar untuk resep konvensional, obat tumbuh normal dan fitofarmaka diuraikan berikut:

- a) Menggunakan bahan dan aditif efektif yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat;
- b) Diproduksi sesuai dengan Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;
- c) Penandaan memuat informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional, obat herbal terstandar, dan

fitofarmaka secara tepat, rasional, dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dalam rangka pendaftaran (BPOM, 2005).

4. *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik.*

Menerangkan bahwa masyarakat Indonesia sangat membutuhkan pengobatan tradisional. GMP, atau Good Drug Manufacturing Practice, adalah cara membuat obat dan/atau bahan obat untuk memastikan memenuhi persyaratan dan baik untuk penggunaan yang dimaksudkan (BPOM, 2018).

E. Bahan Kimia Obat

Pengobatan konvensional adalah pilihan pengobatan elektif karena diterima secara umum lebih aman daripada pengobatan sintetik yang direayasa. Namun, kebersihan obat tradisional sering kali mengandung Restorative Synthetics (BKO) yang bila dikonsumsi dapat membahayakan kesehatan. Upaya produsen untuk segera meningkatkan khasiat jamu adalah dengan penambahan BKO. Biasanya BKO yang ditambahkan pada obat herbal tidak banyak tertera pada labelnya, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesehatan seseorang (Andini dkk, 2022).

Bahan Kimia Obat (BKO) pada dasarnya adalah senyawa kimia yang dapat mengakibatkan kerusakan apabila tidak digunakan sesuai indikasi. seperti interaksi dengan senyawa kimia lain dan kondisi pemakaian seperti sebelum atau sesudah makan atau bangun tidur. Terlepas dari porsi/porsinya, pengaturan ini juga dapat memengaruhi cara kerja obat di dalam tubuh. Ini karena bahan kimia obat secara langsung mempengaruhi organ vital, jadi jika digunakan dengan cara yang bertentangan dengan aturan ini, mereka akan membuat organ tersebut bekerja dan berfungsi secara berbeda. Penggunaan dan dosis yang tidak tepat justru akan merugikan tubuh daripada menyembuhkannya. Akibatnya

pemanfaatan senyawa sintesis restoratif tidak mungkin dilakukan sembarangan. Misalnya, kesehatan konsumen akan sangat terganggu jika profesional farmasi atau medis mencampurkan bahan kimia obat ke dalam obat herbal (Wahyuni & Susanti, 2021).

Efek jangka panjang penggunaan BKO tanpa dosis yang jelas adalah kerusakan fungsi organ yang tidak dapat ditentukan per kemasannya. Oleh karena itu, BPOM sebagai organisasi yang berwenang diharuskan untuk mencegah produsen jamu yang meragukan memasukkan BKO di antara banyak produk jamu yang ada di pasaran (Andini dkk, 2022).

Badan POM menemukan bahwa berbagai jenis obat tradisional sering dicampur dengan BKO tertentu selama kegiatan pengawasannya. Misalnya, nyeri rematik/ramuan rematik sering mengandung Phenilbutazone, antalgin (metampyrone), natrium diklofenak, piroksikam, parasetamol, prednison, dan deksametason; jamu pelangsing sering mengandung Sibutramine HCl; dan obat herbal untuk diabetes sering mengandung glib. Selain itu, sildenafil sitrat atau turunannya banyak ditemukan dalam obat herbal untuk peningkatan kekuatan dan stamina pria (Pertiwi & Suariyani, 2020).

Meski BPOM telah berupaya untuk mengontrol peredaran produk obat tradisional, penambah kesehatan, dan produk perawatan kecantikan yang mengandung Bahan Kimia Restoratif (BKO) atau bahan terlarang yang dapat mengganggu kesehatan, namun produk tersebut masih tetap mengalir. Antara Juli 2020 dan September 2021, BPOM menemukan 53 produk obat tradisional, satu suplemen kesehatan, dan 18 produk perawatan kecantikan mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan. Beberapa temuan BKO yaitu Sildenafil Sitrat dan turunannya, Tadalafil, Dexamethasone, Phenylbutasone, Alopurinol, Prednisone, Paracetamol, Acetosal, Furosemide, Sibutramin HCl, Cyproheptadine

HCl, Tramadol, dan Natrium Diklofenak. Selama peninjauan terhadap 3.382 kantor produksi dan pengangkutan untuk pengobatan tradisional dan suplemen kesehatan, ditemukan banyak produk ilegal yang mengandung BKO. Selain itu, ditemukan pelanggaran tambahan dengan memeriksa 4.862 fasilitas manufaktur dan distribusi kosmetik (BPOM, 2021).

Efek negatif atau bahaya BKO yang sering ditambahkan pada ramuan tersebut diatas. Misalnya, fenilbutazon dalam obat-obatan herbal dapat mengiritasi saluran pencernaan dan menyebabkan gejala seperti mual dan diare, serta pendarahan dan luka di perut. Efek samping sekunder juga telah diperhitungkan, pembesaran jantung (*angioedema*), pembatasan rute penerbangan (*bronkospasme*), pusing, kehilangan pendengaran dan darah dalam kencing (*hematuria*). Selain itu, *fenilbutazon* telah dikaitkan dengan hepatitis, gangguan pembentukan darah yang dapat menyebabkan anemia aplastik, defisiensi sel darah putih (*leukopenia*), defisiensi trombosit (*trombositopenia*), ketidakmampuan tubuh untuk membentuk granulosit, sejenis sel darah putih, (*agaranulositosis*) dan berbagai kondisi yang berpotensi fatal lainnya. Adanya deksametason dalam obat herbal untuk nyeri rematik, asam urat, atau rematik, yang berpotensi menimbulkan gangguan jiwa dan euforia, adalah contoh lainnya. Dexamethasone dapat menyebabkan diabetes dan osteoporosis pada orang tua, dan komponen kimianya dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak, termasuk pertumbuhan janin pada ibu hamil. Sementara itu, jamu kuat (stamina pria) yang mengandung sildenafil sitrat telah dikaitkan dengan serangan jantung dan kematian (Wahyuni & Susanti, 2021).


F. *Natrium Diklofenak*

1. Definisi

Natrium diklofenak adalah obat golongan antiinflamasi nonsteroid (NSAID), menawarkan sifat antiinflamasi paling kuat dengan efek samping yang relatif lebih ringan daripada rekannya indometasin dan piroksikam. Sebagai turunan garam natrium dari fenilasetat, natrium diklofenak diresepkan untuk meredakan nyeri, migrain, dan asam urat. Absorpsi dari Natrium diklofenak sangat cepat dan lengkap dan jumlah yang diabsorpsi tidak berkurang walaupun diberikan secara bersama dengan makanan (Tjay & Rahardja, 2015).

Obat-obat golongan NSAID, termasuk natrium diklofenak, bekerja dalam meredakan peradangan dengan membatasi enzim COX-1 dan COX-2. Penghambatan enzim ini mengurangi produksi prostaglandin, khususnya PGE2 dan PGI2, yang dapat mempersempit pembuluh darah dan menyebabkan vasokonstriksi. Namun, penurunan produksi prostaglandin tidak hanya menyebabkan vasokonstriksi tetapi juga meningkatkan retensi cairan. Oleh karena itu, ketergantungan pada obat ini dapat menyebabkan hipertensi, edema, gangguan fungsi ginjal, dan perdarahan gastrointestinal (Lovell & Ernst, 2017).

2. Fisikokimia



Gambar 2. Struktur Natrium Diklofenak (NCBI, 2022).

Fisikokimia dari Natrium Diklofenak yaitu (Walker, 2012):


- Nama IUPAC : 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetic acid
- Sinonim : *Kalium diklofenak diclofenac, diclofenac potassium natrium diklofenak, diclofenac sodium, diclofenac sodium, QTG126297Q, Voltaren, 15307-79-6, diclofenac sodium salt*
- Rumus Umum : $C_{14}H_{10}Cl_2NaO_2$
- BM : 318,1
- Pemerian : Kristal putih, tidak berbau, dan sedikit higroskopis
- Titik lebur : $283^{\circ}C - 285^{\circ}C$
- Kelarutan : Mudah larut dalam metanol, larut dalam etanol, agak sukar larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter

G. Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infra-Red*)

Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) adalah metode lanjutan untuk mendeteksi dan menganalisis hasil spektrum inframerah. Interferometer Michelson, yang merupakan perangkat yang memungkinkan analisis frekuensi yang ada dalam sinyal komposit, adalah inti dari spektroskopi FTIR. Dalam pengoperasian FTIR, sampel dikenai transmisi cahaya, dengan intensitas cahaya yang diukur oleh detektor. Intensitas ini kemudian dibandingkan dengan intensitas tanpa sampel, dan seluruh proses diulang untuk panjang gelombang yang berbeda (Sri, 2018).

Memfaatkan interferensi radiasi antara dua berkas cahaya, spektrofotometer FTIR menghasilkan interferogram. Sinyal ini terwujud sebagai produk sampingan dari variasi panjang jalur antara berkas cahaya, yang dapat dibalik menggunakan transformasi Fourier, sebuah teknik matematika yang dapat menukar dua domain jarak dan frekuensi (Zuhairiah dkk, 2021)

Gambar yang ditampilkan di bawah mengilustrasikan elemen dasar spektrofotometer FTIR. Dimulai dari sumber cahaya, radiasi melewati interferometer dan selanjutnya, sampel sebelum mencapai detektor. Komponen frekuensi tinggi dihilangkan oleh filter selama amplifikasi sinyal, dan informasinya didigitalkan oleh konverter analog-ke-digital. Akhirnya, data mengalami transformasi Fourier setelah dikirim ke komputer (Rohman, 2021)



Gambar 3. Prinsip Kerja FTIR

Komponen yang digunakan dalam spektrofotometer FTIR meliputi Spektrofotometer FTIR memiliki berbagai komponen yang tidak terpisahkan dari fungsinya. Daerah tengah menggunakan sumber cahaya global atau Nernst. Interferometer Michelson membagi seberkas cahaya menjadi dua berkas dan membuat salah satunya menempuh jarak yang berbeda dari yang lain. Ini terdiri dari dua cermin, satu yang statis dan yang lainnya terus bergerak. Ada dua jenis detektor yang umum digunakan untuk pengukuran spektral di wilayah dekat. Terakhir, komputer membaca spektrum dari instrumen yang dipindai dan mendigitalkannya. Spektrum digital ini dapat dimanipulasi untuk berbagai keperluan seperti derivatisasi, pengurangan, penjumlahan, dan overlay antar spektrum (Rohman, 2021).

Spektrofotometri FTIR menganalisis sampel dalam keadaan cair, gas, dan padat, masing-masing membutuhkan penanganan yang berbeda. Secara khusus, sampel padat dapat dimanipulasi dengan salah satu dari tiga cara:

- 1) Untuk menghasilkan KBR transparan, pelet KBR menjalani proses penumbukan dengan sampel padat pada rentang konsentrasi 0,1% hingga 2%. Campuran ini kemudian ditekan menggunakan cetakan dengan tekanan tinggi
- 2) Setelah pencampuran pasta padat dengan minyak pasta, campuran yang dihasilkan dilapisi ke dua titik NaCl untuk membentuk zat padat seperti pasta
- 3) Untuk membuat lapisan tipis, larutkan padatan dalam pelarut yang mudah dibuat. Setelah larut, teteskan campuran tersebut ke piring NaCl. Saat pelarut campuran menguap, lapisan tipis akan terbentuk di pelat (Suoth, 2022).

Fourier Transform Infra Red (FTIR) merupakan metode pemrosesan data yang memberikan wawasan penting ke dalam struktur, sifat konformasi, perubahan yang diinduksi, tekanan, dan reaksi kimia polialloy dan polimer. Teknik ini melibatkan pantulan cahaya inframerah melalui ruang kristal dan ke permukaan sampel padat. Dengan memantau frekuensi getaran molekul sampel, degradasi atau oksidasi yang disebabkan oleh panas atau cahaya dapat dideteksi dengan cepat. Interferometer pada FTIR menghasilkan interferogram yang menunjukkan intensitas sinyal detektor berdasarkan frekuensi getaran molekuler (Sjamsiah, 2018).

Pemanfaatan spektrofotometer untuk analisis menghadirkan dua keuntungan signifikan dibandingkan metode tradisional. Pertama, dapat digunakan sebagai stimulan pada frekuensi sumber cahaya apa pun, memungkinkan analisis cepat tanpa metode sekuensial atau pemindaian. Kedua, metode ini dicirikan oleh sensitivitas tinggi, karena tidak adanya celah di mana radiasi memasuki sistem detektor. Akibatnya, lebih banyak radiasi memasuki

sistem, membuatnya lebih unggul daripada metode dispersi dalam hal sensitivitas (Sjamsiah, 2018).

Teknologi FTIR menawarkan beberapa keunggulan, termasuk jangkauan luas pita bilangan gelombang inframerah dan resolusi tinggi, bersama dengan kemampuan pemindaian cepat perangkat kontemporer. Selain itu, teknik ini tidak mengganggu, yang memungkinkan analisis sampel dengan metode lain. Teknik FTIR juga memastikan hasil yang cepat, tidak memerlukan pretreatment sampel, tidak seperti pendekatan kromatografi, yang melibatkan prosedur pemrosesan sampel yang berlarut-larut (Benjamin, 2019).

H. Kemometrik

Kemometrik adalah metode analisis data yang sangat terspesialisasi, memanfaatkan teknik matematika dan statistik. Aplikasinya beragam, termasuk pengumpulan dan analisis data protokol multivariat, pemodelan dan kalibrasi proses, kompresi sinyal, klasifikasi, dan pengenalan pola. Teknik kemometri, terutama Analisis Komponen Utama (PCA) atau Analisis Komponen Utama (AKU), sangat efektif dalam menganalisis senyawa campuran dengan profil spektral yang tumpang tindih (Lorenza dkk., 2021).

Analisis Komponen Utama (PCA) adalah alat statistik yang kuat untuk mengklasifikasikan grup tanpa pengetahuan sebelumnya tentang keanggotaan mereka. Ini menggunakan kurva plot skor untuk memperkirakan struktur data dan mengubah banyak variabel menjadi lebih sedikit, namun tetap menjadi variabel karakteristik. Pengurangan ini membuat interpretasi data lebih mudah tanpa kehilangan esensi dari variabel aslinya (Yuliantini, 2020)

Pemanfaatan teknik kemometrik juga biasanya digunakan dalam Studi metabolomik umumnya menggunakan teknik kemometrik untuk membantu analisis dan interpretasi data. Pada tahap akhir penelitian metabolisme tanaman,

analisis data sangat penting. Beberapa aplikasi instrumen metabolomik digunakan untuk melakukan analisis, dan hasilnya dapat diinterpretasikan menggunakan berbagai pendekatan statistik multivariat, seperti PCA. Tidak seperti teknik lainnya, PCA tidak memerlukan variabel atau parameter penjelas untuk menetapkan perbedaan atau pengelompokan sampel. Dengan mengidentifikasi metabolit yang umum pada beberapa jenis sampel, metode ini dapat mengelompokkan sampel secara efektif berdasarkan kesamaan kecenderungan metabolisme (Ikram & Putri, 2018).

Untuk membantu analisis data yang berasal dari spektrum FTIR, kemometrik berfokus pada prinsip dasarnya. Spektrum FTIR berisi semua informasi ikatan dalam molekul, termasuk gerakan rotasi dan vibrasi. Kualitas ini menjadikan spektroskopi FTIR sebagai alat yang sangat efektif untuk analisis kualitatif, yang memungkinkan untuk membedakan antara variabel dalam sampel. Proses pengukuran bekerja dengan mendeteksi perubahan yang terjadi ketika cahaya inframerah memantulkan sampel (Rafi dkk., 2016).

Untuk mengevaluasi komposisi sampel, pendekatan kemometri melibatkan perolehan data bilangan gelombang dari pengukuran berulang (*replikasi*) yaitu sebuah proses yang dilakukan tiga kali untuk setiap sampel. Data ini kemudian diolah dan analisis secara kemometrik agar hasil yang diinginkan dapat akurat (Puspitasari dkk., 2021).

Teknik PCA terbukti sangat bermanfaat untuk digunakan saat menangani data dengan sejumlah besar variabel yang menunjukkan korelasi. Ini memerlukan pemilihan variabel awal dan mengubahnya menjadi variabel baru dengan nilai yang sama tetapi dimensi yang lebih sedikit. Pendekatan ini membantu merampingkan data yang kompleks dengan banyak variabel yang saling terkait (Nasution, 2019)

PCA adalah metode proyeksi yang secara efisien menyampaikan informasi variabel asli dengan memproyeksikannya ke sekumpulan variabel laten yang dikenal sebagai Komponen Utama atau PC. PC ini mampu mengenkapsulasi semua informasi yang disimpan dalam data asli, dengan PC pertama berisi varian paling signifikan dibandingkan yang lain. Karena setiap PC kemudian dimuat, jumlah informasi yang disimpannya berkurang. Melalui analisis PCA, kelompok sampel yang berbeda dapat diidentifikasi berdasarkan kesamaan atau perbedaan yang terdapat pada sampel, sehingga dapat mengungkapkan variabel penting yang terkait dengannya (Munawar & Hasanuddin, 2020).

Menangani data spektra inframerah yang rumit dan memproses data kromatogram volume tinggi bukanlah hal yang mudah tanpa bantuan perangkat lunak komputer. Untuk menyederhanakan tugas ini, beberapa struktur statistik yang menggunakan teknik kemometri telah diperkenalkan. Pilihan perangkat lunak berbayar dan gratis tersedia, masing-masing dengan kelebihanannya sendiri. Misalnya, Unscumbler® adalah perangkat lunak statistik yang menawarkan metode standar untuk analisis multivariat seperti prinsip analisis komponen (PCA). Sementara itu, program perangkat lunak yang dilengkapi dengan spektrofotometer FTIR dan instrumen kromatografi dilengkapi dengan alat algoritme canggih yang dapat mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan konten informasi spektrum analisis multi komponen. Penggunaan yang tepat dari alat ini dapat secara drastis mempercepat pemrosesan data dan menyederhanakan interpretasi data (Rohman dkk, 2021).

Pada metode PCA pengelompokan sampel yang diuji disajikan dalam 4 kuadran. PCA dapat memisahkan sesuai dengan komponen terbesar yang dimiliki suatu sampel dan dapat mengelompokkan sesuai kemiripan. Ini menunjukkan bahwa score plot dapat membuat perbedaan berdasarkan intensitas serapan yang

dimasukkan ke dalam software. Aturan pada kuadran score plot adalah bahwa semakin dekat letak titik (plot) dari sampel maka makin besar kemiripannya/sampel merupakan kelompok yang sama (Zilhadia dkk, 2018).

I. Tinjauan Keislaman Terkait Keutamaan Makanan Halal dan Thayyib

Mengonsumsi makanan, minuman maupun obat-obatan yang halal lagi baik adalah hal yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini menjadi landasan kepada manusia agar mengamalkan hidup yang sehat sebagaimana termaktub dalam firman Allah swt. pada al-Quran Surah al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai sekalian manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Kementerian Agama RI, 2014).

Sebagaimana dinyatakan dalam Tafsir Al-Misbah, ajakan ayat diatas tersebut tidak hanya dikhususkan untuk orang beriman saja melainkan belaku kepada semua ummat manusia untuk mengambil bagian dalam rezeki yang halal seperti terbaca di atas. Meskipun bumi mengandung banyak karunia, tidak semuanya diperbolehkan untuk dikonsumsi. Misalnya dalam produksi Allah swt. terhadap ular yang memiliki racun, bukan untuk memakannya tetapi untuk menggunakan racunnya sebagai obat, antara lain. Sementara itu, burung-burung tertentu diciptakan untuk mengendalikan serangga pemakan tumbuhan. Meskipun

dibuat untuk kepentingan manusia, sangat jelas bahwa tidak semua yang ada di Bumi ditujukan untuk konsumsi manusia. Dengan demikian, Allah swt. mematuhi praktik makanan halal saat memesan.

Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, artinya bertentangan dengan syariat agama. Makanan najis dapat dibagi menjadi dua kategori: yang mengandung babi, darah, dan bangkai, antara lain, dan karenanya najis; Selain itu, yang haram adalah karena sesuatu yang tidak berwujud, misalnya makanan yang tidak boleh dimakan atau digunakan oleh pemiliknya. Sedangkan makanan halal, di sisi lain mengecualikan kedua kategori ini dan karenanya dianggap bersih dan dapat diterima untuk dikonsumsi.

Meskipun makanan halal sering dianggap baik, tidak selalu demikian. Klasifikasi makanan halal dibagi menjadi empat kategori: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Namun, tidak semuanya halal sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada hal-hal yang sah-sah saja bermanfaat bagi seseorang dengan masalah kesehatan tertentu, namun ada juga hal-hal yang merugikan dirinya meskipun bermanfaat bagi orang lain. Makanan bisa sehat tetapi tidak menggugah selera, namun tetap legal, pada saat itu menjadi tidak enak.

Menurut kitab suci di atas, dianjurkan melakukan apa yang benar dan halal. Terlebihnya dari perikop ini mengingatkan para pembaca untuk tidak mengikuti pimpinan Setan dengan mengingatkan mereka bahwa makanan atau fungsi tubuh sering dieksploitasi olehnya untuk mengelabui orang (Shihab, 2005).

Berdasarkan Tafsir M. Quraish Shihab diatas dapat disimpulkan bahwa anjuran mengkonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan perintah universal untuk manusia. Manusia bertugas memelihara dirinya dengan menghindari mengkonsumsi sesuatu haram dan kotor yang dapat mengganggu kesehatannya. Dalam firman-Nya ini juga menegaskan bahwa hukum halal dan

haram adalah takdir ilahi dan bukan untuk dimanipulasi oleh manusia. Ini juga menyoroti dampak mendalam dari makanan terhadap perilaku manusia, karena konsumsi makanan haram dapat membuat seseorang rentan terhadap pengaruh setan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa makanan tidak hanya memenuhi standar halal saja atau hanya baik saja melainkan harus kedua-duanya halal menurut hukum Allah dan juga baik untuk memelihara (Hasanah dkk, 2021).

Dalil selanjutnya dalam hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim nomor 2204 berbunyi:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla” (HR Muslim).

Menurut Imam An-Nawawi yang dikutip dari Kitab Syarah Shahih Muslim bahwa hadits diatas menjelaskan secara gamblang karena sejalan dengan pandangan para profesional medis yang menyatakan bahwa “Sakit adalah ketika kondisi tubuh tidak normal”. Oleh karena itu, perawatan ditujukan untuk memulihkan tubuh ke keadaan optimalnya, sambil menjaga kesehatan yang baik memerlukan upaya berkelanjutan untuk kembali ke keadaan normal ini. Mengonsumsi makanan bergizi salah satunya dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan ini.

Oleh karenanya Hippocrates pernah berkata, "Penyakit-penyakit dapat diobati dengan lawannya." Namun, ada kalanya banyak orang yang tidak mengetahui sifat penyakit atau obat yang digunakan untuk mengobatinya, sehingga terjadi penurunan kepercayaan terhadap antagonis penyakit tersebut. Misalnya, seseorang percaya suatu penyakit terkait dengan unsur panas, tetapi kemudian ditemukan bahwa penyakit itu bisa saja berasal dari unsur dingin atau lainnya. Atau memang penyakitnya memang dari faktor intensitas, namun suhu intensitasnya lebih rendah dari yang diperkirakan, sehingga belum membawa kemaslahatan.

Namun, pernyataannya bahwa “*Setiap penyakit ada obatnya*” tetap sah sebagaimana ditegaskan diakhir sabdanya “*Dengan izin Allah Azza wa Jalla*” yang mengisyaratkan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Kurangnya pengetahuan tentang sifat pengobatan dapat menjelaskan mengapa beberapa penyakit tidak dapat disembuhkan (An-Nawawi, 2013).

Pada penelitian ini menggunakan instrumen Spektroskopi FTIR yang cara kerjanya berdasarkan refleksi sinar (cahaya) infra-merah. Didalam Quran sendiri telah dijelaskan mengenai cahaya sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nur/24:35 yang berbunyi:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ
الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca (dan) tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah memberi

petunjuk kepada cahaya-Nya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kementerian Agama RI, 2014).

Sebagaimana dinukil dari Tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memulai ayat ini dengan menyebutkan cahaya-Nya (اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi,” Kemudian menyebutkan cahaya orang mukmin: “Perumpamaan cahaya orang yang beriman kepada-Nya.” Yaitu seorang pemuja yang Allah menyuntikkan keyakinan dan Alquran ke dalam dadanya, Allah swt. menyamakan tuntunan Alquran dan syariat yang dimintanya dengan minyak zaitun yang baik, bening, bercahaya, tegak lurus, tidak kotor dan tidak bengkok, serta memposisikan kesucian hati seorang mukmin dengan lentera berbahan tipis berkilau kaca. Firman Allah (كَمِشْكُوتَةٍ) “Seperti sebuah lubang yang tak tembus,” Misykaah adalah tempat sumbu pada lampu. Firman Allah (فِيهَا مِصْبَاحٌ) “Yang didalamnya ada pelita besar”, yaitu cahaya yang terdapat didalam lentera.

Firman Allah, (الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ) “Pelita itu didalam kaca,” yang penting adalah bahwa cahaya mentransmisikan kaca bening. Makna tersebut dianalogikan dengan metafora hati bagi orang beriman. Dalam Firman Allah, (الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ) “(Dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti Mutiara”. Firman Allah, (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ) “yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya”, yang didapat dari minyak zaitun, pohon yang kaya akan khasiat, khususnya pohon zaitun. Dalam kalimat, kedudukan kata (زَيْتُونَةٍ) adalah badal atau ‘athaf bayan. Firman Allah (لَا شَرْقِيَّةَ وَلَا غَرْبِيَّةَ) “Yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya),” Lokasi penanaman zaitun tidak di sebelah timur agar tidak terlalu banyak mendapat sinar matahari di sore hari, juga tidak di sebelah barat sehingga tidak terlalu banyak mendapat sinar matahari sampai sore hari. sehingga minyak zaitun bening yang dihasilkannya dapat terlihat.

Firman Allah, (يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ) “(Yaitu) yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api,” yaitu disebabkan oleh kilauan minyak yang bercahaya. Selanjutnya Firman Allah, (نُورٌ عَلَى نُورٍ) “Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),” Ketika cahaya api dan cahaya minyak bergabung, titik tersebut akan bersinar. karena jika tidak dipasangkan, keduanya tidak akan bersinar. Demikian pula, cahaya iman dan cahaya Alquran tidak bisa bersinar bersama kecuali mereka bersatu.

Firman Allah ta’ala (وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ) “Dan Allah membuat perumpamaan - perumpamaan bagi manusia”. Disini, Setelah menyebutkan perumpamaan cahaya-Nya dan Hidayah-Nya dalam hati seorang mukmin, Allah kemudian menutup ayat ini dengan firman-Nya (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) “Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Yaitu, Dia Maha mngetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan juga siapa yang berhak disesatkan (Abdullah, 2004)

Dalam ayat ini, sumber cahaya dikaitkan dengan Allah swt. Cahaya dikaruniai sifat unik oleh Allah swt. yaitu mengubah kecepatan dan panjang gelombangnya ketika melintasi medium dengan kepadatan berbeda. Dengan demikian, energi yang dihasilkan oleh cahaya memanifestasikan dirinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contoh dari radiasi tersebut adalah pada cahaya infra merah yang memiliki sifat panjang gelombang relatif lebih pendek dari radiasi gelombang radio, Namun sifat panjang gelombang juga relatif lebih panjang dari cahaya tampak (Sjamsiah, 2018).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dari pengujian laboratorium menggunakan Thermo Scientific iS10 FTIR Spectrometer[®] kemudian diolah kembali menggunakan metode kemometrik PCA menggunakan software Unscrambler X 10.4 melalui perangkat Laptop Lenovo[®]. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau deskripsi analisis kandungan (BKO) natrium diklofenak pada produk herbal pegal linu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Analisis FKIK dan Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2022.

B. Instrumen Penelitian

1. Alat-alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, botol kaca, cawan porselin, gelas kimia, kertas alumunium, kertas saring, labu alas bulat ml, neraca analitik, pipet tetes, spektrofotometer FTIR, tissue, *vacum rotary evaporator*, cawan uap, plat kristal, dan vial.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aquadest, etanol 96%, Natrium Diklofenak, *n-hexana*, dan Kalium Bromida (KBr).

3. Sampel Penelitian

Pemilihan sampel pada penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, yaitu Teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini biasa digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak bertujuan untuk menggeneralisasi sampel temuan (Astuti dkk, 2019).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini dipilih dengan ketentuan yaitu 8 jenis produk Jamu Pegal Linu yang diambil secara acak di kota Makassar yang tergolong murah.

Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini bukan untuk membuat generalisasi dalam sebuah populasi tertentu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menggali secara mendalam masalah tertentu pada penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang subjek yang sedang dipilih (Heryana, 2018).

Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi atau fakta yang terjadi pada produk jamu pegal linu itu yang diamati. Sehingga hasil dari penelitian ini bukan untuk menggambarkan kondisi seluruh jamu pegal linu yang beredar di kota Makassar

C. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Sampel

Pada sampel diekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Tujuan dari ekstraksi yang dilakukan adalah untuk mengekstrak semua bahan kimia dan bahan aktif dalam sampel herbal (Marjoni, 2016). Selanjutnya pelarut yang digunakan adalah etanol 96% Alasan pemilihan pelarut ini adalah karena sifat absorbsinya yang baik serta zat pengganggu yang larut terbatas (Ade Wirastuti, 2016). Ekstrak yang diperoleh adalah ekstrak cair sehingga mesti dilakukan pemekatan sebelumnya menggunakan *rotary evaporator* selanjutnya dilakukanan pengeringan pada sampel menggunakan cawan uap (Andriansyah dkk, 2021).

2. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR

Sampel berupa ekstrak dan Natrium Diklofenak yang digunakan sebagai pembanding ditetaskan pada plat kristal kemudian ditambahkan dengan 200 mg Kalium Bromida (KBr) kemudian diratakan dan dihaluskan setelah itu dibentuk menjadi film, lalu diuji ke FTIR. Spektrum FTIR dicatat pada bilangan gelombang $4000-400\text{cm}^{-1}$. Setiap selesai pengukuran plat dibersihkan dengan *n-hexana* sebanyak dua kali sampai tidak ada sampel minyak yang tertinggal lalu keringkan menggunakan tissue (Purwakusumah, 2014).

3. Analisis data menggunakan Kemometrik

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan asimilasi radiasi elektromagnetik infra merah adalah sebagai pembawa dan penyerap informasi dunia lain. Menggunakan perangkat lunak Uncrambler X dan program analisis komponen utama (PCA), spektra turunan FTIR kemudian diproses

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tabel

Tabel 1. Data Sampel Jamu Pegal Linu

Sampel	Nama Sampel	Nomor BPOM	Status pada BPOM
Sampel 1	Jamu Pegal Linu Sabdo Palon r [®]	Tidak ada	Tidak terdaftar
Sampel 2	Jamu Pegal Linu Reumatik Cap Sinar Serambi [®]	993 299 961	Tidak terdaftar
Sampel 3	Jamu Pegal Linu 10 [®]	083 284 321	Terdaftar
Sampel 4	Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar [®]	003 202 171	Tidak terdaftar
Sampel 5	Jamu Pegal Linu Plus Ginseng [®]	083 289 921	Terdaftar
Sampel 6	Jamu Pegal Linu Lengkap [®]	082 278 121	Terdaftar
Sampel 7	JSR Pegal Linu [®]	Tidak ada	Tidak terdaftar
Sampel 8	Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari [®]	003 202 921	Tidak terdaftar


Tabel 2. Data Analisis Spektrum FTIR Standar Natrium Diklofenak dan Sampel

Standar	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	Gugus fungsi
3386	3397	3404	3394	3403	3404	3411	3391	0	NH (Amina)
0	0	0	0	0	0	0	0	3375	
0	0	0	0	0	0	0	0	3323	
3257	0	0	0	0	0	0	0	0	OH (Asam Karboksilat)
0	0	0	0	0	0	0	0	3096	
3079	0	0	0	0	0	0	0	0	CH (Aldehid)
2970	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2927	2934	2927	2926	2927	2939	2927	2925	
0	2855	0	2856	2855	2855	0	2855	2854	C=O Asam karboksilat
0	1708	0	1715	1710	1712	0	0	0	


Tabel 3. Hasil Skor Plot PCA Sampel Jamu Pegal Linu

Kurva Skor Plot	Nilai PC		Akumulasi	Sampel dengan kuadran yang sama dengan standar
	x	y		
Pertama	PC-1 = 36%	PC-2 = 28%	64%	Sampel 8
Kedua	PC-1 = 36%	PC-3 = 13%	49%	Sampel 4, 5, 7
Ketiga	PC-1 = 36%	PC-4 = 8%	44%	Sampel 7
Keempat	PC-1 = 36%	PC-5 = 7%	43%	Sampel 4, 5, 8
Kelima	PC-1 = 36%	PC-6 = 4%	40%	Sampel 5, 8
Keenam	PC-1 = 36%	PC-7 = 3%	39%	Sampel 4, 5


2. Gambar




Gambar 4. Spektrum Standar Natrium Diklofenak




Gambar 5. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 1
Jamu Pegal Linu Sabdo Palom




Gambar 6. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 2
Jamu Pegal Linu Cap Sinar Serambi




Gambar 7. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 3
Jamu Pegal Linu 10




Gambar 8. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 4
Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar




Gambar 9. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 5
Jamu Pegal Linu Plus Ginseng



Gambar 10. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 6
Jamu Pegal Linu Lengkap




Gambar 11. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 7 Jamu Pegal Linu JSR



Gambar 12. Spektrum Standar Natrium Diklofenak dengan Sampel 8 Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari

3. Hasil Analisis Menggunakan Kemometrik



Gambar 13. Score Plot PCA PC-1 dan PC-2

B. Pembahasan

Sampel Jamu yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Jamu pegal linu yang diambil sebanyak 8 merk jamu yang beredar di Kota Makassar. Sedangkan metode sampling menggunakan strategi purposive sampling untuk melaksanakan prosedur pengambilan sampel. Dalam proses pengambilan sampel, dimana pemilihan sampel merujuk pada harga yang lebih murah, yang tertera nomor registrasi BPOM RI maupun yang tidak tertera nomor registrasi BPOM RI pada kemasan produk jamu pegal linu.

Sampel kemudian diekstraksi menggunakan cairan penyari etanol 96%. Hasil ekstrak jamu yang kemudian diteteskan pada plat kristal dan ditambahkan dengan 200 mg KBr kemudian diratakan dan dihaluskan setelah itu dibentuk menjadi film tipis, lalu diuji ke FTIR. Spektrum FTIR dicatat pada bilangan gelombang 4000-400 cm^{-1} .

Hasil pembacaan spektrum standar Natrium Diklofenak *Fourier Transform Infrared* (FTIR) pada bilangan gelombang 4500-4000 cm^{-1} dapat dilihat pada

gambar 4. Berdasarkan hasil pembacaan spektrum yang terbentuk menggunakan metode FTIR dapat ditentukan gugus fungsi serta intensitasnya dari standar Natrium diklofenak. Penelitian oleh Swain dkk (2015) yang menggunakan metode Fourier Transform Infrared (FTIR) mendeteksi bahwa Standar Natrium diklofenak menunjukkan intensitas yang baik pada daerah Panjang gelombang $1602,85 \text{ cm}^{-1}$ yakni berada pada gugus C=C. kemudian pada daerah panjang gelombang $3203,76 \text{ cm}^{-1}$ yang berada pada gugus OH (Asam karboksilat) dan juga pada daerah panjang gelombang $3387,00 \text{ cm}^{-1}$ yang terletak pada gusus NH amina.

Pada tabel 2 diatas ditemukan kesamaan pada sampel jamu pegal linu 8 ditemukan 2 puncak panjang gelombang yang identik berada pada gugus fungsi yang sama dengan Standar Natrium diklofenak yaitu pada Gugus fungsi N-H. Pola serapan pada sampel 8 menunjukkan ikatan N-H amina yang terletak pada daerah panjang gelombang 3375 cm^{-1} dan 3323 cm^{-1} begitupun Standar Natrium diklofenak yang terletak di daerah panjang gelombang 3386 cm^{-1} dan 3257 cm^{-1} .

Selanjutnya pada tabel diatas, sampel 8 pada bilangan gelombang 3096 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus O-H asam karboksikat yang juga ditunjukkan pada standar Natrium diklofenak yang terletak pada Panjang gelombang 3079 cm^{-1} . Kemudian pada bagian lain, Sampel 8 juga menunjukkan adanya gugus C=C aromatis yang berada pada daerah Panjang gelombang 1577 cm^{-1} . Hal yang sama juga ditunjukkan pada Standar natrium diklofenak yang terletak pada Panjang gelombang 1575 cm^{-1} .

Daerah ulur hidrogen ($3700\text{--}2700 \text{ cm}^{-1}$) Getaran ulur atom hidrogen dengan atom lain menyebabkan munculnya puncak. Mengingat frekuensinya jauh lebih tinggi, interaksi dapat diabaikan. Peregangan vibrasi O-H atau N-H menyebabkan puncak serapan muncul pada kisaran $3700\text{--}3100 \text{ cm}^{-1}$. Puncak melebar sebagai akibat dari ikatan hidrogen, dan bilangan gelombang bergeser ke

arah panjang gelombang yang lebih kecil. Antara 3000 dan 2850 cm^{-1} , terjadi vibrasi C-H alifatik. Puncak akan bergerak mendekati maksimum sebagai akibat dari perubahan struktur ikatan C-H. Pada 3300 cm^{-1} , terdapat ikatan C=H. Puncak pada 2745–2710 cm^{-1} dihasilkan oleh hidrogen pada gugus aldehida karbonil. Dengan mengamati atom H melalui deuterium, puncak vibrasi ulur CH dapat diketahui.

Di daerah ikatan rangkap tiga (2700–1850 cm^{-1}), pertemuan yang tertahan dibatasi, misalnya, untuk getaran pemanjangan ikatan rangkap yang terjadi di daerah 2250–2225 cm^{-1} (Misalnya: untuk $\text{C}\equiv\text{N}$ pada 2120 cm^{-1} dan $\text{C}\equiv\text{C}$ dan $\text{N}\equiv\text{N}$ masing-masing pada 2260 cm^{-1}). Bagian atas untuk SH berada pada 2600–2550 cm^{-1} untuk pH pada 2240–2350 cm^{-1} dan untuk SiH pada 2260–2090 cm^{-1} .

Vibrasi ulur gugus karbonil dapat dijelaskan di sini di daerah ikatan rangkap (1950 - 1550 cm^{-1}), di mana aldehida, asam, aminol, dan karbonat semuanya menunjukkan puncak pada 1700 cm^{-1} . Pada 1770–1725 cm^{-1} , ester, asam halida, dan anhidrida asam teradsorpsi. Puncak serapan diturunkan dengan konjugasi menjadi 1700 cm^{-1} . Untuk tujuan mengidentifikasi olefin, puncak yang dihasilkan oleh vibrasi ulur $\text{C}=\text{C}$ dan $\text{C}=\text{N}$ ditemukan pada 1690–1600 cm^{-1} . Cincin aromatik memperlihatkan puncak antara 1650 dan 1450 cm^{-1} , sementara cincin aromatik dengan tingkat substitusi sedang menunjukkan puncak antara 1600 dan 1580 cm^{-1} dan antara 1500 dan 1450 cm^{-1} .

Distribusi puncak serapan akan bergeser di daerah sidik jari antara 1500 dan 1700 cm^{-1} karena variasi kecil dalam struktur dan susunan molekul. Di sini, untuk menjamin suatu senyawa alami adalah melalui pemeriksaan dengan perbandingan. Karena berbagai interaksi, tidak mungkin untuk secara tepat menginterpretasikan pita serapan.

Hasil pada pengukuran spektrum yang diolah pada FTIR selanjutnya dianalisis kembali menggunakan kemometrik. Penggunaan kemometrik kerap dimanfaatkan dalam ilmu statistik untuk pemrosesan data kimia. Manfaat menggunakan kemometrik ini adalah dapat mengelompokkan serta menghubungkan hubungan dari banyak sampel. Metode kemometrik yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode PCA (*Principal Component Analysis*) atau dikenal sebagai AKU (Analisis Komponen Utama). Tujuan metode PCA adalah untuk mengurangi dimensi besar dari ruang data (variabel yang diamati) ke dimensi yang lebih kecil dari ruang fitur (variabel independen) yang diperlukan untuk menggambarkan data dengan lebih mudah (Rismawati, 2018). Data yang digunakan adalah pada daerah serapan 4000- 400 cm^{-1} dengan mengambil rata-rata dari tiap replikasi menggunakan software The Unscramble X. Analisis PCA (*Principal Component Analysis*) dapat dimanfaatkan dalam analisis untuk mencari informasi data yang diperoleh, hasilnya dapat dilakukan pengenalan pola berdasarkan komponen kimianya (Amin, 2016).

Berdasarkan analisis PCA didapatkan 6 *score plot*. Hasil kurva *score plot* pertama pada gambar 13. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-2 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 64% (PC-1 = 36% dan PC-2= 28%). Dapat dilihat pada gambar 12, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 8 di kuadran IV. Pada kuadran I hanya terdapat terdapat sampel 3. Pada kuadran II terdapat sampel 4, sampel 5 dan sampel 7. Sedangkan sampel 1, sampel 2 dan sampel 6 berada pada kuadran III.

Pada kurva *score plot* kedua pada gambar 60. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-3 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 49% (PC-1 = 36% dan PC-3= 13%). Dapat dilihat pada

gambar 60, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 4, sampel 5 dan sampel 7 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 1 dan sampel 3. Pada kuadran III hanya terdapat sampel 6. Sedangkan pada kuadran IV hanya terdapat sampel 8.

Pada kurva *score plot* ketiga pada gambar 61. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-4 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 44% (PC-1 = 36% dan PC-4= 8%). Dapat dilihat pada gambar 61, standar natrium diklofenak yang berada pada kuadran yang sama dengan sampel 7 di kuadran IV. Pada kuadran II terdapat sampel 1 dan sampel 3. Pada kuadran I terdapat sampel 4, sampel 5 dan sampel 8. Sedangkan pada kuadran IV hanya terdapat sampel 6.

Pada kurva *score plot* keempat pada gambar 62. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-5 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 43% (PC-1 = 36% dan PC-5= 7%). Dapat dilihat pada gambar 62, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 4, sampel 8 dan sampel 5 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 3 dan sampel 6. Pada kuadran III terdapat sampel 1 dan sampel 2. Sedangkan pada kuadran IV hanya terdapat sampel 7.

Pada kurva *score plot* kelima pada gambar 63. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-6 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 40% (PC-1 = 36% dan PC-6= 4%). Dapat dilihat pada gambar 63, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 5 dan sampel 8 di kuadran IV. Pada kuadran II hanya terdapat sampel 3. Pada kuadran I terdapat sampel 4 dan sampel 7. Sedangkan pada kuadran III terdapat sampel 1, sampel 2 dan sampel 6.

Pada kurva *score plot* keenam pada gambar 64. menunjukkan nilai akumulatif dari PC-1 dan PC-7 untuk standar natrium diklofenak dan sampel jamu pegal linu adalah sebesar 39% (PC-1 = 36% dan PC-7= 3%). Dapat dilihat pada gambar 64, standar natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama dengan sampel 4 dan sampel 5 di kuadran I. Pada kuadran II terdapat sampel 2 dan sampel 6. Pada kuadran III terdapat sampel 1 dan sampel 3. Sedangkan pada kuadran IV terdapat sampel 7 dan sampel 8.

Untuk nilai PC (*Principal Component*) digunakan nilai PC dengan persentasi yan paling besar. Pada PC-1 berisi data dengan persentasi varian paling besar begitu selanjutnya diikuti dengan PC-2 yang memiliki persentase varian terbesar kedua (Martono, 2012). Dari 6 *score plot*, penelitian ini menggunakan PC-1 dan PC-2 karena konsentrasi yang didapatkan adalah sebesar 64%, dapat dilihat pada gambar 13, yang menunjukkan adanya empat kuadran pemisah yang dapat membedakan antara sampel dan Bahan Kimia Obat (BKO) natrium diklofenak. Analisis PCA mengungkapkan bahwa jarak yang berbeda ditetapkan untuk setiap sampel. Tingkat kesamaan antar sampel ditunjukkan oleh jaraknya; semakin jauh jaraknya, semakin tidak mirip setiap sampel. Terlihat pada gambar 12 bahwa BKO natrium diklofenak teletak dalam kuadran yang sama dengan sampel 8 dengan nilai akumulasi *score plot* sebesar 64%.

Menurut Esbensen dkk (1994), sampel yang berada dalam satu kuadran adalah sama dengan yang lain dan berbeda dengan sampel yang terdapat pada kuadran yang lain. Artinya sampel yang berada pada posisi berdekatan memiliki karakteristik yang sama. Hasil PCA menunjukkan bahwa sampel 8 dengan Standar Natrium diklofenak berada pada kuadran yang sama (kuadran IV). Hal ini menunjukkan bahwa sampel 8 Jamu pegal linu terindikasi memiliki kandungan Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak (Ayuningtyas, 2019).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari ke-delapan sampel jamu pegal linu, terdapat satu sampel yang diujikan secara kualitatif terindikasi positif mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) natrium diklofenak yakni pada sampel 8
2. Spektrum yang terbentuk dari sampel jamu pegal linu yang diolah menggunakan metode spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infrared*) dapat mendeteksi keberadaan kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak yakni pada sampel 8. Hal ini berdasarkan kesamaan pada daerah Panjang gelombang yang identik antara Sampel 8 dan Standar Natrium diklofenak, selain itu pada pada sampel 8 juga memiliki kesesuaian gugus fungsi yang sama dengan standar Natrium diklofenak yaitu pada gugus fungsi C=C, O-H dan N-H.
3. Hasil analisis kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak pada jamu pegal linu menggunakan metode spektroskopi FTIR kombinasi kemometrik berdasarkan hasil kurva *plot score* PC-1 dan PC-2 menunjukkan sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terletak di area kuadran yang berbeda dengan standar Natrium Diklofenak. Adapun sampel jamu pegal linu yang terletak pada kuadran yang sama dengan standar Natrium Diklofenak yaitu sampel 8. Selain itu kurva *plot score* pada PC-1 dan PC-2 juga memiliki nilai akumulasi score plote paling tinggi yakni sebesar 64%.

Hal ini menunjukkan bahwa sampel 8 tersebut terindikasi memiliki kandungan BKO Natrium Diklofenak.

B. *Saran*

Saran dan harapan untuk para peneliti selanjutnya, yaitu agar dapat mengembangkan metode dalam mendeteksi sampel obat tradisional lain yang beredar dengan menggunakan alat atau instrumen analisis yang lebih modern. Dengan menggunakan instrumen yang lebih modern tentu akan membantu proses analisis yang semakin akurat. Olehnya kepada Peneliti agar sebaiknya juga untuk meneliti terkait kandungan beberapa bahan kimia obat lain pada produk jamu yang telah beredar dimasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*. Bogor Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ad-Dymasyqi, A. 2000. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung Sinar Baru
- Andriansyah, Ivan., Wijaya, Hilman. N. M & Purwaniati (2021) *Analisis Adulteran Pada Kopi Luwak Dengan Metode Fourier Transform Infrared (FTIR) Jurnal Kimia Riset, Volume 6 No.1,*
- Anggraini Syahfitr, S., Misfadhila, S., & Asra, R. (2021). *Analysis of Medicinal Chemicals Contained on Jamu: A Review. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development, 9(2), 33–46.*
- Anggreani, D. L., Rusdi, B., & W, H. A. (2015). *Pengembangan metode analisis parasetamol dan deksametason pada jamu pegal linu menggunakan metode ekstraksi fasa padat dan kromatografi air kinerja tinggi. Prosiding Penelitian SPeSIA Unisba, V (Kesehatan dan Farmasi), 104–110.*
- An-Nawawi, Imam. (2013) *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*. Jakarta: Darus Sunnah
- Amin, Astuti. (2016). *Determinasi Dan Analisis Finger Print Daun Miana (Coleus scutellarioides Linn.) Sebagai Bahan Baku Obat Tradisional Dengan Metode Spektroskopi FTIR dan Kemometrik. Jurnal Farmasi UIN Alauddin Makassar Vol. 4 No. 2* <https://doi.org/10.24252/jurfar.v4i2.2248>
- Astuti, D. Y., Handayani, E. S., Sunaini, S., Rahmawati, U., & Winarni, W. (2021). *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi Maxim Terhadap Kepuasan Pelanggan. Research in Accounting Journal (RAJ), 1(3), 412-419.*
- Aulani, F. N. (2019). *Keamanan Obat Tradisional di Masyarakat. Jurnal Farmasetika 3(2), 24.* <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v3i2.21620>
- Ayuningtyas, F., Restuhadi, F., & Kurnia, D. (2019). *Analisis Pemetaan Penilaian Responden Terhadap Atribut Video Penyuluhan Komoditas Cabai Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 16(1), 11-19.*
- Batubara, I., Purnaningsih, N., & Mawasti, T. (2020). *Profile of Micro, Small, and Medium Industrial Herbal Medicine Products in Sukoharjo Regency. Jurnal Jamu Indonesia, 5(3), 106–113.* <https://doi.org/10.29244/jji.v5i3.186>

- BPOM RI. (2020). *Pedoman Penggunaan Herbal dan Suplemen Kesehatan dalam Menghadapi Covid-19 di Indonesia*.
- BPOM RI (2021) *Siaran Pers: Public Warning Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Mengandung Bahan Kimia Obat/Bahan Dilarang Tahun 2021*
- Dewi, R. S., Wahyuni., Pratiwi, Erniza., & Muharni, Septi. (2019) *Penggunaan Obat Tradisional oleh Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia* 8 (1)
- Esbensen, et al. (1994). *Multivariate Analysis in Practice*. Wennbergs Trykkeri, AS, Trondheim
- Elenora, Ruth & Ristiawati, Nita. (2019). *Ketepatan Penggunaan Obat Tradisional serta Pengalaman Penyuluhan di Lingkungan RW 02 dan RW 03 Kelurahan Jatipadang Jakarta Selatan. Bulletin Dharmesti Niramaya Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1*
- Fatimah, S., Rahayu, M., & Indari, D. F. (2017). *Analisis Antalgin dalam Jamu Pegal Linu yang Dijual di Pasar Beringharjo Yogyakarta. Journal of Health, 4(1)*, 29. <https://doi.org/10.30590/vol4-no1-p29-34>
- Firdaus, M. I., & Utami, P. I. (2009). *Analisis Kualitatif Parasetamol pada Sediaan Jamu Serbuk Pegal Linu yang Beredar di Purwokerto. Journal Pharmacy, 06(02)*, 1–5.
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). *Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* <https://doi.org/10.31219/osf.io/5ezdy>
- Heryana, A. (2018). *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmiah Universitas Esa Unggul, 25*, 15.
- Hughes, J., Ayoko, G., Collett, S., & Golding, G. (2013). *Rapid Quantification of Methamphetamine: Using Attenuated Total Reflectance Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) and Chemometrics. PLoS ONE, 8(7)*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0069609>
- Idacahyati, K., Nofianti, T., Aswa, G. A., & Nurfatwa, M. (2020). *Hubungan Tingkat Kejadian Efek Samping Antiinflamasi Non Steroid dengan Usia dan Jenis Kelamin. Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia, 6(2)*, 56. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v6i22019.56-61>
- Ikram, M. M. M., & Putri, S. P. (2018). *Aplikasi Pendekatan Metabolomik untuk*

Ilmu Pematangan Buah. In Bunga Rampai Forum Peneliti Muda Indonesia (Vol. 8, Nomor 1).

Kamar, I., Fazrina Zahara, D. Y., & Umairah, R. U. (2021). *Identifikasi Parasetamol dalam Jamu Pegal Linu Menggunakan Metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Quimica : Jurnal Kimia Sains dan Terapan. Jurnal Kimia Sains dan Terapan, 3(April), 1.*

Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Quran

Lorenza, P. N. F. P., Pandhita, A. K., Mahemba, D. N. R. P., Pede, A. P. N., Seran, T. D. G., Setyaningsih, D., & Riswanto, F. D. O. (2021). *Pemanfaatan Teknik Kemometrika Pengenalan Pola Pada Analisis Kuantitatif Senyawa Obat Kombinasi Tanpa Tahap Pemisahan*. *MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana), 3(4), 253–267.*
<https://doi.org/10.24123/mpi.v3i4.4719>

Lovell, A. R., & Ernst, M. E. (2017). *Drug-Induced Hypertension: Focus on Mechanisms and Management*. *Current Hypertension Reports, 19(5).*
<https://doi.org/10.1007/s11906-017-0736>

Marjoni, R. 2016. *Dasar-Dasar Fitokimia*. Jakarta: Trans Info Media. Hal: 5-17.

Martono, G. H. (2012). *Penggunaan Principal Component Analysis dan Pohon Keputusan untuk Mendeteksi Penyakit Jantung Koroner*. Universitas Gadjah Mada.

Muliasari, H., Ananto, A. D., & Andayani, Y. (2019). *Inovasi Dan Peningkatan Mutu Produk Jamu Pada Perajin Jamu Gendong Di Kota Mataram. Prosiding PEPADU, 1(September), 72–77.*

Munawar, Agus. A., & Hasanuddin. (2020) *Analisis Data Multivariat The Unscrambler X*. Syiah Kuala University Press

Nasution, M. Z. (2019). *Penerapan Principal Component Analysis (PCA) Dalam Penentuan Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus : SMK Raksana 2 Medan)*. *Jurnal Teknologi Informasi No 3 Vol (1) 41 2019* <https://doi.org/10.36294/jurti.v3i1.686>

Ninla, Elmawati Falabiba. (2019). *Pengobatan Tradisional Di Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman Studi Kasus: Ayam Sebagai Media Mengidentifikasi Penyakit*. *Jurnal 1–11.246, 218799.*

- Pertiwi, P. L. A., & Suariyani, N. L. P. (2020). *Kandungan Bahan Kimia Obat Pada Obat Tradisional Yang Beredar Di Pasaran*. *Archive of Community Health*, 7(2), 95. <https://doi.org/10.24843/ach.2020.v07.i02.p08>
- Pratama, M. R. A. (2020). *Pengetahuan Dan Praktek Konsumsi Jamu Jun Pada Masyarakat Semarang*. *Umbara*, 3(2), 76. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i2.25573>
- Puwanto, Budhi. (2016). *Obat Herbal Andalan Keluarga*. Flashbook: Yogyakarta
- Purwakusumah, E. D., Rafi, M., Safitri, U. D., Nurcholis, W., & Adzkiya, M. A. Z. (2014). *Identifikasi Dan Autentikasi Jahe Merah Menggunakan Kombinasi Spektroskopi FTIR Dan Kemometrik (Identification and Authentication of Jahe Merah Using Combination of FTIR Spectroscopy and Chemometrics)*. *Jurnal Agritech*, 34(01), 82–87. <http://dx.doi.org/10.22146/agritech.9526>
- Puspitasari, L., Mareta, S., & Thalib, A. (2021). *Karakterisasi Senyawa Kimia Daun Mint (Mentha sp.) dengan Metode FTIR dan Kemometrik*. *Sainstech*, 14(1). <https://ejournal.istn.ac.id/index.php/saintechfarma/article/view/931>
- Rafi, M., Anggundari, W. C., & Irawadil, T. T. (2016). *Potensi Spektroskopi Ftir-Atr Dan Kemometrik Untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, Dan Sapi*. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 5(3), 229–234.
- Rahayuda, I. G. S. (2016). *Identifikasi Jenis Obat Berdasarkan Gambar Logo Pada Kemasan*. *Jurnal Ilmu Komputer (KLIK)*, 03(02), 125–134.
- Rianoor, Nalisha Putri. Rianoor. (2022). *Penggunaan Obat Tradisional dalam Upaya Swamedikasi atau Pengobatan Sendiri di Indonesia*. *Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, 12 (1). <http://dx.doi.org/10.33846/2trik12101>
- Risal, Y. (2020). *Analisis Kemometrik Senyawa Inhibitor Tirosinase Menggunakan Spektrofotometer IR (FTIR)*. *Majalah Farmasi dan Farmakologi*, 24(2), 59–62. <https://doi.org/10.20956/mff.v24i2.10610>
- Rismawati, S. N. (2018). *Analisis kemometrik menggunakan PCA (Principal Component Analysis) dan LDA (Linear Discriminant Analysis) pada sampel minyak babi dan minyak zaitun berbasis data FTIR-Spectroscopy*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Rohman, Abdul. (2021) *Spektroskopi Vibrasional: Teori dan Aplikasinya Untuk Analisis Farmasi*. Gadjah Mada University
- Rohman, Abdul., Irnawati., Riswanto, Florentinus D. O. (2021) *Kemometrika*.

Gadjah Mada University Press


- Rosyada, E., Muliastari, H., & Yuanita, E. (2019). *Analisis kandungan bahan kimia obat natrium diklofenak dalam jamu pegal linu yang dijual di Kota Mataram. Jurnal Ilmiah Farmasi*, 15(1), 12–19. <https://doi.org/10.20885/jif.vol15.iss1.art2>
- Shafirany, M. Z., Susilawati, Y., & Musfiroh, I. (2019). *Aplikasi Kemometrik dalam Penentuan Mutu Tumbuhan Obat. Pharmauho: Jurnal Farmasi, Sains, dan Kesehatan*, 4(2). <https://doi.org/10.33772/pharmauho.v4i2.6257>
- Shihab, M, Quraish. (2005) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera
- Sholeh, A. N. (2015). *Jaminan Halal Pada Produk Obat: Kajian Fatwa MUI dan Penyerapan Dalam UU Jaminan Produk Halal. Journal of Islamic Law Studies*, 1(November), 70–87.
- Sidoretno, W. M., & Oktaviani Rz, I. (2018). *Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat Yang Terdapat Didalam Obat Tradisional. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 177–123. <https://doi.org/10.36341/jpm.v1i2.453>
- Sjamsiah. (2018). *Kimia Instrumen*. Alauddin University Press. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/536/1/sjamsiah.pdf>
- Sri, S. H. (2018). *Profil Gugus Fungsional Dan Masa Molekul Ekstrak Kasar Hipokotil Brugiera gymnorhiza (L) Lamk. Fase Matang (mature phase). Jurnal Teknologi Pangan*, 11(2). <https://doi.org/10.33005/jtp.v11i2.891>
- Suharmiati, & Handayani, Lestari. (2006). *Cara Benar Meracik Obat Tradisional*. Agromedia Pustaka,.
- Sumayyah, S., & Salsabila, N. (2017). *Obat Tradisional : Antara Khasiat dan Efek Sampingnya. Jurnal Farmasetika* 2(5) 1. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v2i5.16780>
- Suoth, Elly Juliana. (2022) *Spektrofotometri dan Kromatografi*. Penerbit Lakeshi
- Sutrisna, Em. (2016). *Herbal Medicine: Suatu Tinjauan Farmakologis*. Muhammadiyah University Press
- Swain, R. P., Nagamani, R., & Panda, S. (2015). *Formulation, in vitro characterization and stability studies of fast dispersing tablets of diclofenac sodium. Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 5(7), 94–102. <https://doi.org/10.7324/JAPS.2015.50715>

- Tahir, M., Maryam, S., & Wahdania, A. (2018). *Analisis Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak Pada Sediaan Jamu Pegal Linu Yang Beredar Di Makassar*. *Jurnal Kesehatan*, 1(4), <http://jurnal.fkmumi.ac.id/index.php/woh/article/view/woh1401>
- Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2015). *Obat-Obat Penting: Kasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*. PT Elex Komputindo.
- Wahyuni, K., & Susanti, V. (2021). *Viktimisasi Konsumen Jamu Berbahan Kimia Obat Merek Tawon Liar*. *Syntax Literate: Jurnal ilmiah Indonesia*, 6(1), 1 <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/4869>
- Wirastuti, Ade., Dahlia, A. A., & Najib, Ahmad. (2016) *Pemeriksaan Kandungan Bahan Kimia Obat (BKO) Prednison Pada Beberapa Sediaan Jamu Rematik*. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, Vol. 3 No.1
- Yuliani, S. H., Putri, D. C. A., & Virginia, D. M. (2021). *Kajian Risiko Peracikan Obat*. Sanata Dharma University Press.
- Yuliantini, A. (2020). *Deteksi Tespong (Oenanthe Javanica) pada Bahan Baku Daun Ashitaba (Angelica Keiskei) Menggunakan Metode Ftir yang Dikombinasikan dengan PCA*. *Indonesia Natural Research Pharmaceutical Journal*, 5(2), 114-123.
- Yunus, A., & Pratiwi, I. A. (2022). *Identifikasi Bahan Kimia Obat Prednison Dan Natrium Diklofenak Dalam Jamu Rematik Dan Jamu Pegal Linu Di Wilayah Pasar Tradisional Kabupaten Maros*. *Prosiding Simposium Kesehatan Nasional*, 1(1), 441-447.
- Zilhadia, Z., Kusumaningrum, F., Betha, O. S., & Supandi, S. (2018). *Diferensiasi gelatin sapi dan gelatin babi pada gummy vitamin c menggunakan metode kombinasi Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Principal Component Analysis (PCA)*. *Pharmaceutical Sciences and Research*, 5(2), 6.


LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Sampel



2. Pengujian dengan FTIR



3. Analisis Data menggunakan Kemometrik

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan serapan dari radiasi elektromagnetik sinar inframerah berupa data spectra transmitan dan absorben

↓

Spektra hasil dari FTIR yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis kemometrik PCA dengan software *Unscrambler*®

Lampiran 2. Gambar Pengerjaan



Gambar 14. Jamu Pegal Linu Sabdo Palon



Gambar 15. Jamu Pegal Linu Reumatik Cap Sinar Serambi



Gambar 16. Jamu Pegal Linu 10



Gambar 17. Jamu Pegal Linu-Rat Cap Sido Mekar



Gambar 18. Jamu Pegal Linu Plus Ginseng



Gambar 19. Jamu Pegal Linu Lengkap



Gambar 20. JSR Pegal Linu



Gambar 21. Asam Urat Pegal Linu Cap Bunga Matahari



Gambar 22. Penimbangan Sampel



Gambar 23. Penambahan Etanol 96%



Gambar 24. Perendaman Sampel



Gambar 25. Penyaringan Sampel



Gambar 26. Hasil Ekstraksi



Gambar 27. Dilakukan Evaporator



Gambar 28. Ekstrak Sampel



Gambar 29. KBr



Gambar 30. N-hexane



Gambar 31. KBr dicampur dengan Sampel



Gambar 32. Film yang terbentuk




Gambar 33. Pengujian FTIR




Gambar 34. Perangkat FTIR




Lampiran 3. Gambar Spektrum




Gambar 35. Spektrum Jamu Sabdo Palon




Gambar 36. Spektrum Jamu Sabdo Palon B




Gambar 37. Spektrum Jamu Sabdo Palon C




Gambar 38. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi A




Gambar 39. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi B




Gambar 40. Spektrum Jamu Pegal Linu Reumatik Sinar Serampi C




Gambar 41. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 A




Gambar 42. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 B




Gambar 43. Spektrum Jamu Pegal Linu 10 C




Gambar 44. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat A




Gambar 45. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat B




Gambar 46. Spektrum Jamu Pegal Linu-Rat C




Gambar 47. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng A




Gambar 48. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng B




Gambar 49. Spektrum Jamu Pegal Linu Plus Ginseng C




Gambar 50. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap A




Gambar 51. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap B




Gambar 52. Spektrum Jamu Pegal Linu Lengkap C




Gambar 53. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR A




Gambar 54. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR B




Gambar 55. Spektrum Jamu Pegal Linu JSR C




Gambar 56. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari A



Gambar 57. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari B




Gambar 58. Spektrum Jamu Pegal Linu Cap Bunga Matahari C




Gambar 59. Standar Natrium Diklofenak dan Semua Sampel


Lampiran 4. Gambar Score Plot




Gambar 60. Score Plot PCA PC-1 dan PC-3



Gambar 61. Score Plot PCA PC-1 dan PC-4




Gambar 62. Score Plot PCA PC-1 dan PC-5




Gambar 63. Score Plot PCA PC-1 dan PC-6

ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar 64. Score Plot PCA PC-1 dan PC-7



RIWAYAT HIDUP



Ibrahim Tasrikh Syafaat Assawala, sering di sapa Ibe atau Iki. Lahir di Luhu pada 28 Maret 1999. Masa kecil penulis sebagian besar dihabiskan di kampung halamannya Desa Iha kecamatan Huamual kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Yasa Assawala dan Suzana Wati Heluth.

Ibrahim kecil memulai pendidikan formal di SD Negeri Iha Kulur. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Modern Shuffah Hizbullah Maluku tepatnya di Dusun Oli Desa Hitu Kecamatan Leihitu pada tingkat Wustha dan MA

Pada Tahun 2017 Penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar dengan mengambil program studi S1 Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan melalui program beasiswa PBSB dari Kementerian Agama RI.

Selama di UIN Alauddin Makassar, Penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, diantaranya HMJ Farmasi sebagai anggota Medpub dan CSSMoRA UIN Alauddin sebagai kepala departemen Kominfo.