

**UJI AKTIVITAS ANALGESIK, ANTIPIRETIK dan ANTIINFLAMASI**

**EKSTRAK ETANOL BATANG PARANG ROMANG (*Boehmeria Virgata***

**[Forst] Guill) PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Oleh:**

**Mariya Ulfah**

**NIM: 70100118005**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**JURUSAN FARMASI**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mariya Ulfah  
NIM : 70100118005  
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 10 Oktober 1999  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Aspol Tello Baru Blok A no.17  
Judul : Uji Aktivitas Analgesik, Antipiretik dan Antiinflamasi  
Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata*  
[Forst] Guill) Pada Mencit (*Mus Muculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 21 Maret 2023

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Penulis

Mariya Ulfah  
NIM: 70100118005

## PENGESEHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "UJI AKTIVITAS ANALGESIK, ANTIPIRETIK, dan ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL BATANG PARANG ROMANG (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill) PADA MENCIT (*Mus musculus*)" yang disusun oleh Mariya Ulfah, NIM: 70100118005, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa yang bertepatan tanggal 21 Maret 2023 M dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Maret 2023 M

29 Sya'ban 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm.,M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Indah S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dra. Audah Mannan, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes

NIP : 19800701 200604 2002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتِمَ النَّبِيِّينَ . أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Analgesik, Antipiretik, Dan Antiinflamasi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill) Pada Mencit (*Mus Muculus*)”. Tak lupa pula kami hantarkan salam dan shalawat atas junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat islam sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan maupun rintangan yang penulis hadapi tetapi hambatan yang kami hadapi bisa dilalui dengan adanya pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan kami begitupun kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak M. Asaf dan Ibu Hamdana, serta terima kasih atas segala doa, bantuan, dukungan, waktu dan semangat yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga kami mampu berada dititik ini dan menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Farmasi (S1) di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang membantu kami dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar serta Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. H. Wahyuddin, M.Hum selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kerjasama.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, apt., Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
3. apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Nur Syamsi Dhuha, S. Farm.,M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I, apt. Nurshalati Tahar, S. Farm, M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa mengarahkan serta meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. apt. Indah S.Si., M.Si., selaku Penguji Kompetensi, Dra. Audah Mannan, M.Ag., selaku penguji agama yang telah memberi saran, kritikan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan dengan ikhlas berupa ilmu dan pelayanan yang baik kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
8. Suami tercinta A.Arman Saputra, kedua putri hebatku A.Aliyah NurShodiqah dan Andi Azkiyah Syakilah, serta saudara terkasihku Ahmad Maulana Fajri, Khaeruddin, dan Dini Andriyani yang senantiasa memberi dukungan, do'a dan waktunya kepada peneliti.
9. Teman-teman goodmeners 18 (Alumni pondok pesantren DDI Mangkoso Angkatan 2018) yang pada umumnya Marina Yasinta Umar, Almh.Fauziatul Khaeriah, Nur Aulia Husnihita M, Nur Mayyadah, Nurhidayah Rahman, Hasanatul Muasyarah, Magfirah Awaliyah, Luthfiyah Nur Alfiyani Zulfikrah, St. Rabiatul Adewiah, dan Rahmania Maharani yang terus memberi do'a, dukungan dan motivasi kepada peniliti.
10. Teman-teman Suspensi Jurusan Farmasi Angkatan 2018 terkhusus untuk Sri Muliani Indarwati, Megawati, Fitri Rahmadhani Darwis, Tasya Nurqolbi Firdaus dan Wahyuni Sudirman yang dengan ikhlas terus membantu serta memberi dukungan kepada peniliti.
11. Ustadz Hasanuddin, Ririn Aprinda, Mariana Umar, guru-guru Islamiyah serta teman sejawat Nurul Mukarramah yang senantiasa memberi doa, dukungan dan semangat kepada peneliti.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan do'a dan semangat kepada peneliti.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Namun penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti – peneliti selanjutnya.

Gowa, 21 Maret 2023

Penulis

**Mariya Ulfah**

**NIM : 70100118005**



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12
A. Uraian Tanaman .....	12
B. Nyeri.....	14
C. Antipiretik .....	19
D. Inflamasi.....	23

E. Hewan coba .....	33
F. Ekstrak Sampel.....	35
G. Landasan Teori Flavonoid Sebagai Efek Farmakologi .....	38
H. Paracetamol .....	39
I. Natrium Diklofenak.....	42
J. Metode Pengujian.....	45
K. Bahan Penginduksi.....	46
L. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Tanaman Obat 50	
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	55
B. Waktu Penelitian .....	55
C. Pendekatan Penelitian .....	55
D. Populasi dan Sampel .....	55
E. Instrument Penelitian.....	56
F. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan .....	56
G. Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Hasil .....	63
B. Pembahasan.....	67
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode Etik.....	87
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Universitas Muslim Indonesia .....	88
Lampiran 3. Skema Kerja Persiapan Ekstraksi Sampel .....	89
Lampiran 4. Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Analgesik .....	90
Lampiran 5 Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antipiretik.....	91
Lampiran 6. Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antiinflamasi .....	92
Lampiran 7. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Batang Parang Romang .....	93
Lampiran 8. Perhitungan Kontrol Positif Paracetamol .....	94
Lampiran 9. Perhitungan Kontrol Positif Natrium Diklofenak.....	95
Lampiran 10. Dosis Pemberian Uji Analgesik.....	96
Lampiran 11. Dosis Pemberian Uji Antipiretik .....	97
Lampiran 12. Dosis Pemberian Antiinflamasi .....	98
Lampiran 13. Perhitungan Besar Penghambatan Jumlah Geliat .....	99
Lampiran 14. Perhitungan Persentase Daya Antipiretik .....	101
Lampiran 15. Perhitungan Persentase Daya Antiinflamasi.....	103
Lampiran 16. Dokumentasi proses pengerjaan .....	105
Lampiran 17. Konversi Dosis .....	110
Lampiran 18. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Analgesik .....	111
Lampiran 19. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antipiretik.....	112
Lampiran 20. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antiinflamasi .....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tanaman Parang Romang .....	12
Gambar 2. Rata-rata Penurunan Jumlah Geliat Terhadap Uji Aktivitas Analgesik .....	63
Gambar 3. Persentase Efektivitas Penghambatan Rangsangan Nyeri Terhadap Uji Aktivitas Analgesik.....	64
Gambar 4. Rata-rata Penurunan Suhu Rektal Terhadap Uji Aktivitas Antipiretik	65
Gambar 5. Persentase Efektivitas Daya Antipiretik Terhadap Uji Aktivitas Antipiretik .....	65
Gambar 6. Rata-Rata Penurunan Edema Pada Mencit Terhadap Uji Aktivitas Antiinflamasi.....	66
Gambar 7. Persentase Penghambatan Volume Edema Terhadap Uji Aktivitas Antiinflamasi.....	67
Gambar 8. Proses Pengambilan Sampel Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] Guill) .....	105
Gambar 9. Proses Pengeringan Sampel Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] Guill) .....	105
Gambar 10. Penyaringan Hasil Rendaman/Maserasi.....	105
Gambar 11. Proses Rotary Evaporator.....	105
Gambar 12. Ekstrak Kental Batang Parang Romang (Boehmeria Virgata [Forst] Guill) .....	106
Gambar 13. Penimbangan Bahan.....	106
Gambar 14. Pembuatan Larutan Stok Na-CMC .....	106
Gambar 15. Pembuatan Larutan Induksi.....	106
Gambar 16. Proses Adaptasi Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus).....	107
Gambar 17. Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) .....	107
Gambar 18. Penimbangan Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) .....	107
Gambar 19. Pemberian Larutan Induksi Secara Intraperitoneal .....	107
Gambar 20. Respon Geliat Hewan Percobaan Mencit (Mus Musculus) Terhadap Uji Analgesik.....	108
Gambar 21. Pengukuran Suhu Rektal Mencit (Mus Musculus) Terhadap Uji Antipiretik .....	108
Gambar 22. Pemberian Larutan Induksi Secara Intraplantar .....	108
Gambar 23. Pembentukan Edema Pada Kaki Mencit (Mus Musculus).....	108
Gambar 24. Pemberian Larutan Uji Secara Oral Pada Mencit (Mus Musculus) .	109
Gambar 25. Pengukuran Volume Edema Pada Kaki Mencit (Mus Musculus) Dalam Pletismometer.....	109
Gambar 26. Pletismometer Digital.....	109

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Analgesik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang ( <i>Boehmeria virgata</i> (Forst.) Guill).....	63
Tabel 2. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang ( <i>Boehmeria virgata</i> (Forst.) Guill).....	64
Tabel 3. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang ( <i>Boehmeria virgata</i> (Forst.) Guill).....	66
Tabel 4. Data Uji Analgesik.....	99
Tabel 5. Data Uji Antipiretik .....	101
Tabel 6. Data Uji Antiinflamasi .....	103



## ABSTRAK

**Nama** :Mariya Ulfah  
**NIM** :70100118005  
**Judul** :Uji Aktivitas Analgesik, Antipiretik dan Antiinflamasi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill) Pada Mencit (*Mus Muculus*)

---

Parang romang atau *Boehmeria virgata* (Forst) Guil (*B. virgata*) merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam suku *Urticaceae*. Batang parang romang atau *Boehmeria virgata* (Forst) Guil memiliki senyawa flavonoid yang berperan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang romang pada mencit jantan dengan beberapa variasi dosis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas dan dosis efektif ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada mencit (*Mus Musculus*).

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental terhadap 3 pengujian farmakologi. Uji analgesik dilakukan menggunakan metode geliat (*writhing test*) yang diberikan larutan asam asetat sebagai penginduksi secara intraperitoneal. Pengujian antipiretik dilakukan dengan memberikan larutan pepton sebagai bahan penginduksi terhadap hewan coba secara intraperitoneal. Sedangkan pengujian antiinflamasi dilakukan dengan metode pembentukan edema buatan yang diberi larutan penginduksi karagenan secara intraplantar.

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa setiap kelompok pemberian sampel memiliki perbedaan nyata antara kelompok kontrol negatif. Sedangkan untuk analisis perbedaan antara kelompok kontrol positif dengan kelompok pemberian sampel dilanjutkan dengan analisis uji Duncan. Hasil penelitian uji analgesik menunjukkan bahwa dosis pemberian 25 mg/kgBB menunjukkan efek yang sama dengan pemberian larutan paracetamol yaitu sebesar 36,96% dan 35,51%. Adapun hasil penelitian uji antipiretik menunjukkan bahwa dosis 100 mg/kgBB memiliki efektivitas sebesar 61,2% atau sebanding dengan kelompok pemberian larutan paracetamol dengan persentase efektivitas sebesar 69,3%. Sedangkan hasil pengujian antiinflamasi menunjukkan bahwa dosis 100 mg/kgBB sampel dapat menurunkan volume edema pada kaki mencit dengan presentase sebesar 55%. Hasil tersebut menunjukkan efek yang sama dengan natrium diklofenak sebagai larutan pembanding dengan presentase efektivitas sebesar 66%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa batang parang romang yang memiliki senyawa flavonoid dapat memberi efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi.

Kata kunci : analgesik, antipiretik, antiinflamasi, batang parang romang, mencit

## ABSTRACT

**Name** : Mariya Ulfah  
**NIM** : 70100118005  
**Title** : Analgesic, Antipyretic and Anti-inflammatory Activity Test of Parang Romang Stem Ethanol Extract (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill) in Mice (*Mus Muculus*)

---

Parang romang or *Boehmeria virgata* (Forst) Guill (*B. virgata*) is a plant belonging to the Urticaceae tribe. Parang romang stem or *Boehmeria virgata* (Forst) Guill has flavonoid compounds which act as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory. This study was conducted to determine the analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activities of the ethanol extract of parang romanang stems in male mice with several dose variations. The purpose of this study was to determine the activity and effective dose of parang romang stem ethanol extract (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) as analgesic, antipyretic and anti-inflammatory in mice (*Mus Musculus*).

This research was conducted experimentally on 3 pharmacological tests. Analgesic test was carried out using the stretching method (*writhing test*) which was given an acetic acid solution as an inducer intraperitoneally. Antipyretic testing was carried out by giving peptone solution as an inducer to experimental animals intraperitoneally. Meanwhile, the anti-inflammatory test was carried out using the artificial edema formation method by instilling a carrageenan-inducing solution.

The results of the ANOVA test analysis showed that each sampling group had a significant difference between the negative control group. Meanwhile, for the analysis of differences between the positive control group and the group giving the sample, it was continued with an analysis of Duncan's test. The results of the analgesic test showed that the dose of 25 mg/kgBW showed the same effect as giving paracetamol solution, namely 36.96% and 35.51%. The results of the antipyretic test showed that a dose of 100 mg/kg has an effectiveness of 61.2% or comparable to the group given paracetamol solution with an effectiveness percentage of 69.3%. Meanwhile, the results of the anti-inflammatory test showed that a dose of 100 mg/kg BW of the sample reduced the volume of edema in the mice's legs by a percentage of 55%. These results show the same effect as diclofenac sodium as a comparison solution with an effectiveness percentage of 66%. From these results, it can be concluded that the parang romanang stem which has flavonoid compounds can provide analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects.

**Keywords** : analgesic, antipyretic, anti-inflammatory, parang romang stem, mice

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. *Latar Belakang*

Indonesia memiliki lebih dari 30.000 jenis tanaman berkualitas tinggi, dimana 7.000 diantaranya diketahui khasiatnya, namun kurang lebih 300 jenis tanaman saja yang sering digunakan sebagai bahan baku industri farmasi. Sekitar 1.000 spesies tanaman telah diidentifikasi secara lengkap dari aspek botani sistematis tanaman tersebut. Pada tahun 2008, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan bahwa 86% dari populasi dunia masih bergantung pada sistem pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman untuk mengobati penyakit. Lebih dari 80% populasi dunia menggunakan tanaman obat untuk mendukung kesehatan mereka (Rahmiani, 2019).

Tanaman obat secara umum dapat didefinisikan sebagai jenis tanaman yang sebagian, seluruh, dan atau eskudat (isi sel) tanaman tersebut sebagai obat, bahan, serta ramuan obat-obatan. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan tanaman obat atau *medicinal plants* sebagai tanaman yang digunakan dengan tujuan pengobatan dan merupakan bahan asli dalam pembuatan obat herbal. Kementerian pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai institusi pemerintah yang menangani produksi tanaman obat menyatakan bahwa yang dimaksud tanaman obat adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah umbi (rimpang) ataupun akar (Rose, 2017).

Tanaman obat sangat bermanfaat dalam dunia farmasi khususnya sebagai bahan baku obat tradisional. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi obat tradisional yang diakibatkan oleh isu gaya hidup *back to nature* dan mahal nya obat-obat modern membuat permintaan tanaman obat semakin meningkat (Rose, 2017).

Pada umumnya tumbuhan mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, steroid, tanin dan saponin sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Tumbuhan yang digunakan sebagai obat herbal telah tersebar luas secara turun temurun dari generasi ke generasi oleh masyarakat Indonesia, berdasarkan pengalaman dan keterampilan nenek moyang terdahulu. Penggunaan tanaman obat ini lebih disukai karena efek samping dan racun yang lebih sedikit bagi tubuh. Bahan baku dari tanaman obat juga memiliki ketersediaan tinggi dan harga yang lebih murah. Hal tersebut mendorong pengembangan tanaman obat dalam jumlah yang lebih luas sehingga dapat dikonsumsi lebih aman dan lebih resmi oleh masyarakat umum (Rahmiani, 2019).

Flavonoid merupakan senyawa metabolit dalam tanaman yang dapat berfungsi sebagai antiinflamasi (Angreani *et al.*, 2020). Flavonoid selain berefek antiinflamasi, juga diduga dapat berefek sebagai analgesik dan antipiretik (Hesti dkk., 2019).

Dalam artikel perbandingan metode ekstraksi terhadap kadar flavonoid total dan aktivitas antioksidan batang *Boehmeria virgata* menunjukkan hasil aktivitas antioksidan (Uji DPPH) ekstrak *Boehmeria virgata* (Forst) Guill yang diperoleh melalui metode refluks lebih baik daripada dengan metode maserasi ( $IC_{50}$  pada 30,58  $\mu\text{g/mL}$ ) karena menunjukkan kandungan flavonoid lebih tinggi (sampel

2,554 mg QE/g) (Rusdi *et al.*, 2018). Berdasarkan penelitian uji antihiperqlikemik fraksi ekstrak batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) terhadap mencit (*Mus musculus*) jantan menjelaskan bahwa fraksi n-Heksan, etil asetat, dan etanol 70% batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) memiliki efek antihiperqlikemik dan fraksi yang paling efektif sebagai antihiperqlikemik yaitu fraksi n-Heksan (Rusdi *et al.*, 2016). Penelitian lain menjelaskan bahwa aktivitas antituberkulosis ekstrak batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) untuk menguji aktivitas ekstrak parang romang terhadap *Mycobacterium tuberculosis* menunjukkan bahwa konsentrasi hambat minimum *Mycobacterium tuberculosis* dihasilkan dari ekstrak larut n-Heksan 100 g/ml mampu menghambat pertumbuhan *Mycobacterium tuberculosis* strain H37RV (Rusdi *et al.*, 2021). Adapun uji efek hipoglikemik ekstrak etanol batang parang romang *Boehmeria virgata* (Forst) Guill terhadap mencit (*Mus Musculus*) jantan yang dilakukan dengan tujuan mengetahui efek hipoglikemik dari beberapa macam konsentrasi ekstrak batang parang romang terhadap penurunan glukosa darah pada mencit jantan menunjukkan bahwa ekstrak etanol batang parang romang dengan dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB, 150 mg/kg BB, 200 mg/kg BB, memiliki efek hipoglikemik lebih besar bila dibandingkan dengan kontrol negatif (Na-CMC 1%) dan efeknya berbeda nyata dengan tablet glibenklamid 0,017 mg/kg BB (Rusdi *et al.*, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang romang (*boehmeria virgata* (forst) guill) pada mencit (*mus musculus*).

## B. *Rumusan masalah*

1. Apakah pemberian ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*)?
2. Pada dosis berapa ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) menunjukkan efektivitas analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*)?

## C. *Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian*

### 1. **Definisi Operasional**

#### a. Uji aktivitas

Uji aktivitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui dan menelusuri aktivitas senyawa terhadap indikasi terapi yang diinginkan.

#### b. Analgesik

Analgesik adalah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri.

#### c. Antipiretik

Antipiretik adalah obat yang berkhasiat untuk menurunkan suhu tubuh, dan suhu yang tinggi menjadi normal.

#### d. Antiinflamasi

Antiinflamasi adalah sebutan untuk obat yang dapat menghilangkan radang yang disebabkan karena respon cedera jaringan dan infeksi.

e. Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dari proses menarik senyawa kimia atau zat aktif yang ada pada simplisia batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill).

f. Parang romang

Parang romang merupakan tanaman yang digunakan sebagai sampel penelitian untuk diuji aktivitas farmakologinya.

g. Mencit

Mencit merupakan hewan coba yang diberi perlakuan sebagai respon pengujian terhadap sampel. Mencit yang digunakan ialah mencit jantan galur swiss.

h. OAINS (Obat Antiinflamasi Non-Steroid)

OAINS (Obat Antiinflamasi Non-Steroid) adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan rasa nyeri. OAINS merupakan salah satu indikator pembandingan yang digunakan dalam pengukuran efektivitas pemberian sampel.

## 2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstraksi batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill), kemudian dilakukan uji analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada hewan coba mencit (*Mus musculus*).

### D. Kajian Pustaka

1. M.Rusdi, dkk ; 2018 dalam jurnal “Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*” Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode

ekstraksi terhadap kandungan flavonoid total dan aktivitas antioksidan ekstrak batang *Boehmeria virgata*. Batang *Boehmeria virgata* diekstraksi melalui dua metode ekstraksi yaitu refluks dan maserasi. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode aluminium klorida dan dihitung sebagai ekivalen kuersetin (QE). Aktivitas antioksidan diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas antioksidan (Uji DPPH) ekstrak *Boehmeria virgata* (Forst) *Guill* yang diperoleh melalui metode refluks lebih baik daripada dengan metode maserasi (IC50 pada 30,58  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ) karena menunjukkan kandungan flavonoid lebih tinggi (sampel 2,554 mg QE / g) (Rusdi *et al.*, 2018).

2. Bajuber, dkk ; 2020 dalam jurnal "Efek Analgesik Ekstrak Etanol Zingiber cassumunar Roxb. pada Mencit dengan Metode Writhing Test" bertujuan untuk menguji efek analgesik ekstrak etanol Zingiber cassumunar Roxb. pada mencit yang diinduksi dengan asam asetat. Penelitian ini merupakan penelitian eksperiment posttest only control design, menggunakan metode writhing test. Sampel penelitian terdiri dari 25 mencit terbagi dalam tiga kelompok perlakuan ekstrak Zingiber cassumunar Roxb.; P1, P2, dan P3, dengan masing-masing dosis 100 mg/kgBB, 200 mg/kgBB, 400 mg/kgBB, kelompok kontrol negatif aquades (K-), serta kelompok kontrol positif aspirin (K+). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (P1) dan (P2) signifikan menurunkan jumlah geliat pada mencit dibandingkan (K-) ( $p < 0,05$ ), dengan persentase penurunan jumlah geliat sebesar 49,53% dan 57,01%,

sedangkan (P3) tidak menunjukkan aktivitas analgesik. Ekstrak Zingiber cassumunar Roxb. dosis 100 mg/kgBB dan 200 mg/kgBB tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap (K+) untuk mengurangi rasa nyeri (Bajuber *et al.*, 2020).

3. Sa'adah, dkk ; 2022 dalam jurnal "Efek analgesik ekstrak daun trembesi (*Samanea Saman* (jacq.) Merr.) terhadap mencit putih (*Mus musculus*)" menunjukkan hasil ekstrak daun Trembesi dosis 100 mg/kgBB memberikan efek analgesik yang lebih besar yaitu 76,62% dibandingkan dengan ekstrak daun Trembesi dosis 25 mg/kgBB (24,63%) dan 50 mg/kgBB (49,34%). Nilai signifikansi hasil uji Kruskal Wallis sebesar 0,001 sehingga dapat diartikan terdapat perbedaan efektivitas analgesik ekstrak daun Trembesi yang signifikan antar kelompok. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat efek analgesik ekstrak daun Trembesi (*Samanea saman* (Jacq.) Merr.) pada mencit putih (*Mus musculus*) (Sa'adah *et al.*, 2022).
4. Bidanti, dkk ; 2020 dalam jurnal "Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Kecombrang (*Etilingera Elatior* (Jack) R.M. S.M.) Terhadap Kelinci Jantan Lokal (*Oryctolagus cuniculus*)" yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas antipiretik batang kecombrang (*Etilingera elatior* (Jack) R.M. S.m.) dengan konsentrasi 20%, 40%, 60% dengan menggunakan induksi pepton 5%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimental dengan menggunakan 15 ekor kelinci lokal jantan yang dibagi dalam 5 kelompok yaitu kontrol negatif (Suspensi Na-CMC 1%), kelompok kontrol positif (Suspensi paracetamol) dan kelompok uji yaitu pemberian ekstrak

batang kecombrang 20%, 40%, 60%. Analisis data yang digunakan yaitu uji ANOVA satu arah dilanjutkan dengan uji Tukey dihasilkan sebesar 0,000 atau nilai  $p < 0,05$  yang menunjukkan adanya aktivitas antipiretik. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai senyawa yang terkandung pada kecombrang (*Etilingera elatior* (Jack) R.M. S.m.) yang berefek sebagai antipiretik (Bidanti *et al.*, 2020).

5. Rahmi, dkk ; 2021 dalam jurnal “Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Sembung (*Blumea Balsamifera*) Secara In Vivo Terhadap Mencit Putih Jantan (*Mus Musculus*)” bertujuan untuk membuktikan efek antipiretik ekstrak etanol daun sembung terhadap mencit putih jantan (*Mus musculus*). Penelitian ini menggunakan mencit putih jantan yang sehat sebanyak 30 ekor dengan bobot badan rata-rata 20-30 gram yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan, dimana setiap kelompok terdiri dari 6 ekor mencit. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif sedangkan kelompok 2-4 sebagai kelompok perlakuan dan kelompok 5 sebagai kontrol positif. Dalam penelitian ini digunakan pepton 5% sebagai penginduksi demam pada mencit dengan menggunakan metode secara in vivo. Pengukuran suhu mencit dilakukan pada rektal mencit dengan interval waktu 30 menit hingga 120 menit. Penurunan suhu mencit dianalisis dengan uji one way anova dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan dosis 100, 150 dan 200 mg/BB gram mencit dapat menunjukkan adanya aktivitas antipiretik pada mencit (Rahmi *et al.*, 2021).

6. Dermiati, dkk ;2018 dalam jurnal "Uji Antiinflamasi Ekstrak Etanol Kulit Batang Ceremai (*Phyllanthus Acidus L.Skell*) Terhadap Edema Kaki Tikus" menjelaskan bahwa kulit batang cermai memiliki kandungan kimia seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tannin dan steroid yang diduga memiliki efek antiinflamasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antiinflamasi ekstrak etanol kulit batang cermai dan menentukan dosis efektif sebagai antiinflamasi. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji statistik (ANSIRA) pada taraf kepercayaan 95% yang menggunakan 25 ekor tikus putih jantan dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Kelompok I diberikan Na-CMC 0,5% sebagai kelompok kontrol negatif, kelompok II sebagai kontrol positif dengan pemberian Natrium diklofenak, kelompok III, IV, V sebagai kelompok perlakuan yang diberikan ekstrak etanol kulit batang cermai dengan dosis masing-masing 250 mg/kg BB, 500 mg/kg BB dan 750 mg/kg BB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pembentukan Edema Buatan dengan menggunakan induksi karagenan 1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang cermai dengan dosis 250 mg/kg BB, 500 mg/kg BB dan 750 mg/kg dapat memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih jantan. Berdasarkan uji lanjut (BNJ) diperoleh hasil bahwa dosis ekstrak kulit batang yang efektif adalah 250 mg/kg BB (Dermiati *et al.*, 2018).
7. Abdul Aziz, dkk : 2016 dalam jurnal " Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper Crocatum Ruiz And Pav*) Sebagai Antiinflamasi Pada

Tikus Putih Jantan Galur Sprague-Dawley". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sirih merah sebagai antiinflamasi. Inflamasi adalah suatu respon protektif tubuh terhadap jejas. Pengobatan inflamasi yang banyak digunakan masyarakat adalah Obat Antiinflamasi Non Steroid (OAINS) sebagai terapi antiinflamasi, namun memiliki efek samping berupa perdarahan pada saluran cerna. Penelitian uji aktivitas antiinflamasi menggunakan metode edema buatan pada telapak kaki tikus dengan menggunakan karagenan 1% sebagai zat pembuat udem. Uji efek antiinflamasi menggunakan tikus putih jantan galur Sprague-dawley sebanyak 24 ekor tikus terbagi dalam 6 kelompok perlakuan yaitu kelompok kontrol normal (Na-CMC), kelompok kontrol positif (Na diklofenak), kelompok kontrol negatif dan kelompok perlakuan ekstrak dengan variasi dosis 10mg/200gBB, 20mg/200gBB dan 30mg/200gBB yang diberikan secara per oral. Pengukuran volume udem kaki tikus diukur menggunakan alat pletismometer, dilakukan setiap 1 jam selama 6 jam. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih merah memberikan efek antiinflamasi pada tikus putih jantan yang diinjeksi karagenan 1%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna antara setiap kelompok perlakuan dengan kontrol normal. Pada dosis ekstrak 10mg/200gBB, 20mg/200gBB dan 30mg/200gBB menunjukkan tidak ada perbedaan secara bermakna dengan kontrol positif pada taraf uji 0,05 (Setiawan *et al.*, 2016).

#### E. *Tujuan Penelitian*

1. Untuk mengetahui aktivitas pemberian ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*).
2. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) yang dapat memberikan efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*).

#### F. *Manfaat Penelitian*

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang aktivitas ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill) sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi.
2. Menambah inventaris tanaman obat tradisional yang berkhasiat sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Uraian Tanaman*



Gambar 1 Tanaman Parang Romang

#### 1. **Klasifikasi Tanaman**

Kingdom : *Plantae*  
Divisi : *Spermatophyta*  
Sub divisi : *Angiospermae*  
Kelas : *Dicotyledoneae*  
Sub kelas : *Monochlamydeae*  
Ordo : *Urticales*  
Familia : *Urticaceae*  
Genus : *Boehmeria*  
Spesies : *Boehmeria virgata (Forst) Guillem*

(Wilmot-Dear & Friis, 2013)

#### 2. **Nama Daerah**

Makassar : Parang romang

Toraja : Bo'to laki

Sunda :Haramay (Rusdi *et al.*, 2018)

### 3. Morfologi Tanaman

Tumbuhan berumah satu, tegak, cepat tumbuh atau semak kecil, tinggi 1-2 m dan 3 m, dengan rimpang panjang dan akar bulat. Batangnya hampir tidak bercabang, berdiameter 8-16 mm, awalnya hijau dan berbulu, tetapi kemudian coklat dan berkayu (Wilmot-Dear & Friis, 2013).

Daun dari tanaman ini memiliki tiga rusuk, satu menempel pada daun penyangga dan ketiak daun, berbentuk tombak linier, panjang 1,5 cm, tangkai daunnya memiliki panjang sekitar 6-12 cm. Tepi daun bergerigi, ujung daun biasanya runcing, dan warna daunnya hijau dan licin pada permukaan daun, tetapi permukaan bawah daun mengkilat dan hijau (Wilmot-Dear & Friis, 2013).

Jenis bunga tanaman ini ialah majemuk tak terbatas di ketiak daun, bunga batang asli, bunga di batang induk, kemudian batang induk memegang cabang dan cabang. Oleh karena itu, ia juga disebut rumbai majemuk dengan panjang 3-8 cm, dan setiap cabang dipisahkan oleh singularitas (kelamin tunggal). Tanaman ini memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina. Rumpun bunga jantan jumlahnya sedikit, sekitar 3-10 bunga. Kelompok bunga betina memiliki jumlah yang lebih banyak dari bunga jantan, yaitu sekitar 10-30 bunga. Bunga jantan bertangkai pendek, bunga beralur 3-5, benang sari sebanyak alur. Bunga betina memiliki 2-4 rongga, putik berwarna kehijauan sampai merah muda dan memiliki bakal biji, termasuk satu bakal biji. (Wilmot-Dear & Friis, 2013).

### 4. Kandungan Kimia

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan kimia yang dimiliki

oleh tanaman ini ialah fenolik, flavonoid, alkaloid, dan terpenoid. Kandungan senyawa tersebut dapat kita jumpai pada beberapa bagian tanaman seperti daun, batang dan akar (Paramita, 2017).

Flavonoid merupakan senyawa kimia yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan, anti-aterosklerosis, penghambatan agregasi trombosit, anti ulkus, anti virus, anti inflamasi, anti rematik, dan anti diare. Quercetin merupakan salah satu senyawa kandungan flavonoid yang dapat memblokir jalur lipoksigenase dan siklooksigenase dalam metabolisme asam arakidonat dan mengganggu sintesis prostaglandin dan leukotrien (Sari, 2019).

## 5. Kegunaan

*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill selektif dapat digunakan sebagai obat anti kanker dan dikembangkan secara berkelanjutan sebagai obat anti kanker. Daun Parang Romang menunjukkan efek antiproliferatif pada sel Hela melalui aktivasi caspase 3 dan protein p53. Adapun akar parang romang juga dijelaskan dalam sebuah penelitian bahwa ekstrak tersebut memiliki aktivitas toksisitas akut. Sedangkan hasil fraksinasi batang parang romang mempunyai efek antihiperlikemik (Rusdi *et al.*, 2018).

## B. Nyeri

### 1. Pengertian Nyeri

Nyeri adalah perasaan sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan sehingga terjadi kerusakan jaringan. Tingkat nyeri dan ambang nyeri setiap orang berbeda-beda. Tingkat nyeri timbul jika terjadi rangsangan mekanik, termal, kimia, atau listrik yang melampaui nilai ambang tertentu (Nilai ambang nyeri).

Rangsangan reseptor nyeri terjadi akibat adanya kerusakan jaringan yang menyebabkan pembebasan mediator nyeri.

Nyeri adalah mekanisme protektif untuk menimbulkan kesadaran terhadap kenyataan bahwa sedang atau akan terjadi kerusakan jaringan. Karena nilainya bagi kelangsungan hidup, nosiseptor (reseptor nyeri) tidak beradaptasi terhadap stimulasi yang berulang atau berkepanjangan. Simpanan pengalaman yang menimbulkan nyeri dalam ingatan membantu kita menghindari kejadian – kejadian yang berpotensi membahayakan di masa mendatang (Sherwood, 2019).

Berdasarkan tempat terjadinya, nyeri dibagi atas nyeri somatik dan nyeri dalam (viseral). Nyeri somatik kemudian terbagi atas nyeri permukaan dan nyeri dalam, nyeri somatik dapat ditandai dengan rasa nyeri yang timbul dari kulit, otot, persendian, tulang, atau dari jaringan ikat. Sedangkan nyeri dalam (viseral) atau nyeri perut terjadi antara lain pada tegangan organ perut, kejang otot polos, aliran darah kurang dan penyakit yang disertai radang.

Rasa nyeri dapat di bagi menjadi dua rasa nyeri utama, yaitu rasa nyeri cepat dan rasa nyeri lambat. Bila di berikan stimulus nyeri, maka rasa nyeri cepat timbul dalam waktu kira-kira 0,1 detik, sedangkan rasa nyeri lambat timbul setelah 1 detik atau lebih dan kemudian secara perlahan bertambah selama beberapa detik dan kadangkala bahkan beberapa menit. Rasa nyeri cepat juga di gambarkan dengan banyak nama pengganti, seperti rasa nyeri tajam, rasa nyeri tertusuk, rasa nyeri akut, dan rasa nyeri elektrik. Jenis rasa nyeri ini akan terasa bila sebuah jarum di tusukkan ke dalam kulit, bila kulit tersayat pisau, atau bila kulit terbakar secara akut. Rasa nyeri ini juga akan terasa bila subyek mendapat syok elektrik. Rasa

nyeri cepat, nyeri tajam tak akan terasa di sebagian besar jaringan dalam dari tubuh (Hall, 2020).

Rasa nyeri dapat dirasakan melalui berbagai jenis rangsangan, yaitu rangsang nyeri mekanis, nyeri suhu, dan nyeri kimiawi yang dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Beberapa zat kimia yang merangsang jenis nyeri kimiawi meliputi bradikinin, serotonin, histamin, ion kalium, asam, dan asetilkolin. Selain itu, prostaglandin dan substansi P meningkatkan sensitivitas ujung-ujung serabut nyeri tetapi tidak secara langsung merangsangnya. Serabut saraf aferen tak bermielin mengandung beberapa neuropeptida terutama substansi P dan *Calcitonin gene-related peptide* (CGRP). Zat-zat ini dilepaskan sebagai mediator di pusat dan di perifer dan berperan penting dalam mekanisme nyeri (Hall, 2020).

## 2. Mekanisme nyeri

Nyeri akut (nosiseptor) adalah nyeri yang bersifat somatik (sumber nyeri ada di kulit, tulang, sendi, otot atau jaringan ikat) atau visceral (organ dalam seperti usus besar atau pankreas) dan berlangsung kurang dari 6 bulan. Nosiseptor adalah tahap awal yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri, sehingga merangsang ujung saraf bebas. Reseptor ini ditemukan dalam struktur visceral dan somatik dan teraktivasi akibat rangsangan mekanik, termal (panas), dan kimia. Pelepasan bradikinin,  $K^+$ , prostaglandin, histamin, leukotrien dan serotonin dapat menyebabkan sensitivitas atau mengaktifkan nosiseptor (Sherwood, 2019).

Mekanisme nyeri nosiseptor dapat dijelaskan melalui empat proses yaitu transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Transduksi adalah suatu proses rangsangan yang mengganggu, menyebabkan depolarisasi nosiseptor dan memicu

stimulus nyeri. Transmisi nyeri melibatkan proses penyaluran impuls nyeri dari tempat transduksi melewati saraf perifer hingga sampai ke otak. Modulasi nyeri melibatkan aktivitas saraf melalui jalur-jalur saraf desendens dari otak yang dapat mempengaruhi transmisi nyeri. Modulasi juga melibatkan faktor-faktor kimiawi yang menimbulkan atau meningkatkan aktivitas di reseptor nyeri aferen primer. Persepsi nyeri adalah pengalaman subjektif nyeri yang dihasilkan oleh aktivitas transmisi nyeri oleh saraf.

Nyeri kronis (neuropatik) disebabkan oleh pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh sistem saraf pusat atau perifer yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Terdapat beberapa sindrom nyeri neuropatik yang seringkali sulit diobati, misalnya nyeri pinggang, neuropati diabetik, nyeri kanker (Sherwood, 2019).

### 3. Analgesik

Analgesik adalah obat atau senyawa yang dalam dosis terapeutik dapat meringankan atau menekan rasa nyeri tanpa memiliki kerja anestesi umum. Menurut Tjay dan Rahardja (2022), atas dasar kerja farmakologisnya, analgesik dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu analgesik perifer (non narkotik) dan analgesik narkotik. Untuk analgesik non narkotik, terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral, sedangkan untuk analgesik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat, seperti pada fraktura dan kanker (Tjay & Rahadja, 2022).

Berdasarkan proses terjadinya, rasa nyeri dapat dilawan dengan beberapa cara, yaitu dengan :

- a. Analgesik perifer, yang merintangai terbentuknya rangsangan pada

reseptor nyeri perifer

- b. Anestetik lokal, yang merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris
- c. Analgesik sentral (narkotik), yang memblokir pusat nyeri di SSP dengan anestesi umum.
- d. Antidepresiva trisiklis, yang digunakan pada nyeri kanker dan saraf, mekanisme kerjanya belum diketahui, misal amitriptilin.
- e. Antiepileptika, yang meningkatkan jumlah neurotransmitter di ruang sinaps pada nyeri, misal pregabalin, karnamazepin, okskarbazepin, fenitoin, valproat (Tjay & Rahadja, 2022).

#### 4. Tinjauan Mengenai Uji Aktivitas Analgesik

Metode-metode pengujian aktivitas analgesik bertujuan untuk menentukan secara reproduibel suatu zat uji terhadap ambang nyeri dengan mengukur respon refleksnya terhadap rangsangan syok panas, tekanan, listrik dan kimia. Induksi nyeri meliputi mekanik, elektrik dan kimia. Pada umumnya daya kerja analgesik pada hewan dinilai dengan :

- a. Mengukur besarnya peningkatan stimulus nyeri yang harus diberikan sampai ada respon nyeri.
- b. Jangka waktu ketahanan hewan terhadap stimulus nyeri.
- c. Besarnya frekuensi respon nyeri (R.Domer, 1971).

### C. *Antipiretik*

#### 1. **Pengertian Demam**

Demam merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan suhu di atas normal. Bila diukur pada rektal suhunya mencapai  $> 38^{\circ}\text{C}$ , jika diukur pada oral, suhunya di atas  $37,8^{\circ}\text{C}$  dan jika diukur melalui aksila suhunya di atas  $37,2^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ ). Sedangkan menurut NAPN (*National Association of Pediatrics Nurse*) disebutkan bahwa demam terjadi bila bayi yang berumur kurang dari 3 bulan memiliki suhu rektal melebihi  $38^{\circ}\text{C}$ , pada anak dengan umur lebih dari 3 bulan suhu aksila dan oralnya lebih dari  $38,3^{\circ}\text{C}$ .

Demam mengacu pada peningkatan suhu tubuh yang berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang, misalnya terhadap toksin bakteri, peradangan, dan rangsangan pirogenik lain. Bila produksi sitokin pirogen secara sistemik masih dalam batas yang dapat ditoleransi maka efeknya akan menguntungkan tubuh secara keseluruhan, tetapi bila telah melampaui batas kritis tertentu maka sitokin ini membahayakan tubuh. Batas kritis sitokin pirogen sistemik tersebut sejauh ini belum diketahui secara pasti karena sangat sulit melakukan penelitian mengenai hal tersebut (Sherwood, 2019).

#### 2. **Mekanisme Demam**

Demam terjadi sebagai bentuk respon terhadap rangsangan pirogenik, maka monosit, makrofag, dan sel-sel Kupffer mengeluarkan suatu zat kimia yang dikenal sebagai pirogen endogen IL-1 (*Interleukin 1*), TNF $\alpha$  (*Tumor Necrosis Factor  $\alpha$* ), IL-6 (*Interleukin 6*), INF (*Interferon*) yang bekerja pada pusat termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan patokan termostat. Hipotalamus

mempertahankan suhu di titik patokan yang baru dan bukan di suhu normal. Sebagai contoh, pirogen endogen meningkatkan titik patokan menjadi  $38,9^{\circ}\text{C}$ , hipotalamus merasa bahwa suhu normal pra demam sebesar  $37^{\circ}\text{C}$  sudah terlalu dingin untuk suhu tubuh, sehingga organ ini memicu mekanisme-mekanisme respon dingin untuk meningkatkan suhu tubuh (Ganong, 2015).

Berbagai laporan penelitian memperlihatkan bahwa peningkatan suhu tubuh berhubungan langsung dengan tingkat sitokin pirogen yang diproduksi untuk mengatasi berbagai rangsang. Rangsangan endogen seperti eksotoksin dan endotoksin menginduksi leukosit untuk mengeluarkan pirogen endogen diantaranya, IL-1 dan TNF $\alpha$ , selain IL-6 dan IFN. Pirogen endogen ini akan bekerja pada sistem saraf pusat tingkat OVLT (Organum Vasculosum Laminae Terminalis) yang dikelilingi oleh bagian medial dan lateral nucleus preoptik, hipotalamus anterior, dan septum palusolum. Sebagai respon terhadap sitokin tersebut maka pada OVLT terjadi sintesis prostaglandin, terutama prostaglandin E<sub>2</sub> melalui metabolisme asam arakidonat jalur COX-2 (Cyclooxygenase 2), dan menimbulkan peningkatan suhu tubuh yang biasa disebut dengan istilah demam (Ganong, 2015).

### 3. **Penyebab Demam**

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam adalah respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme kedalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. Demam bisa juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan (*Overhating*),

dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan sistem imun (Lubis, 2016).

#### 4. Penerapan Klinis

Demam pada anak dapat diukur dengan menempatkan termometer ke dalam rektal, mulut, telinga, serta dapat juga di ketiak segera setelah air raksa diturunkan, selama satu menit dan dikeluarkan untuk segera dibaca (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F. *et al.*, 2017).

Pengukuran suhu mulut aman dan dapat dilakukan pada usia di atas 4 tahun, karena sudah dapat bekerjasama untuk menahan termometer di mulut. Pengukuran ini juga lebih akurat dibandingkan dengan suhu ketiak (aksila). Pengukuran aksila mudah dilakukan, namun hanya menggambarkan suhu perifer tubuh yang sangat dipengaruhi oleh vasokonstriksi pembuluh darah dan keringat sehingga hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut kurang akurat. Pengukuran suhu tubuh melalui rectal cukup akurat karena lebih mendekati suhu tubuh yang sebenarnya dan paling sedikit terpengaruh oleh suhu lingkungan, namun pemeriksaannya tidak nyaman bagi anak-anak. Pengukuran suhu melalui telinga (*Infrared Tympanic*) tidak dianjurkan karena dapat memberikan hasil yang tidak akurat sebab liang telinga masih sempit dan basah (Lubis, 2016).

Pemeriksaan suhu tubuh dengan perabaan tangan tidak dianjurkan karena tidak akurat sehingga tidak dapat mengetahui dengan cepat jika suhu mencapai tingkat yang membahayakan. Pengukuran suhu inti tubuh yang merupakan suhu tubuh yang sebenarnya dapat dilakukan dengan mengukur suhu di dalam

tenggorokan atau pembuluh arteri paru. Namun hal ini sangat jarang dilakukan karena terlalu invasif (dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F. *et al.*, 2017).

Adapun kisaran nilai normal suhu tubuh adalah :

- a. Suhu oral, antara  $35,5^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$
- b. Suhu aksila, antara  $34,7^{\circ}\text{C} - 37,3^{\circ}\text{C}$
- c. Suhu rektal, antara  $36,6^{\circ}\text{C} - 37,9^{\circ}\text{C}$
- d. Suhu infrared tympanic, antara  $35,7^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$

Suhu tubuh yang diukur di mulut akan lebih rendah  $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$  dari suhu rektal, dan jika suhu tubuh yang diukur di ketiak akan lebih rendah  $0,8 - 1,0^{\circ}\text{C}$  dari suhu oral. Suhu tubuh yang diukur di timpani akan lebih rendah  $0,5 - 0,6^{\circ}\text{C}$  dari suhu ketiak.

## 5. **Macam-Macam Demam**

Ada beberapa macam demam yang telah diklasifikasikan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu :

- a. Demam Septik

Pada setiap demam septik suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali pada ke tingkat di atas normal pada pagi hari. Demam ini disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Bila demam yang paling tinggi tersebut turun ke tingkat yang normal maka hal tersebut disebut sebagai demam hektik.

- b. Demam Remiten

Pada tipe demam remiten suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat dapat

mencapai dua derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik.

c. Demam intermiten

Pada demam intermiten suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Bila demam seperti ini terjadi setiap dua hari sekali disebut tersiana dan bila terjadi dua hari bebas demam diantara dua serangan demam disebut kuartana.

d. Demam kontinyu

Pada setiap demam kontinyu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari satu derajat celcius. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia.

#### D. *Inflamasi*

Inflamasi berasal dari Bahasa latin *inflammare*, yang berarti “membakar”, merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan (Hardiyanti, 2019).

Inflamasi merupakan suatu respons protektif setempat yang dapat ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan, yang dapat berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau mengurung (sekuestrasi) baik agen pencedera maupun jaringan yang cedera tersebut.

Proses peradangan melibatkan sederet peristiwa yang dapat disebabkan oleh berbagai stimulus (misalnya zat-zat penginfeksi, iskemia, interaksi antigen-antibodi, serta cedera karena panas atau cedera fisik lain). Setiap jenis stimulus memicu suatu pola respon yang khas dan menunjukkan keragaman yang relative kecil. Pada tingkat mikroskopik, respon tersebut biasanya disertai dengan tanda-tanda klinis yang umum berupa eritema, edema, yang sangat peka terhadap nyeri (*hyperalgesia*) dan nyeri. Sehingga respon peradangan terjadi dalam tiga fase yang berbeda, masing-masing tampak diperantarai oleh mekanisme yang berbeda diantaranya : fase singkat akut, yang ditandai oleh vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler : fase subakut lambat, yang dimana tanda yang paling menonjol berupa infiltrasi sel leukosit dan sel fagosit : fase proliferasi kronik, pada fase ini terjadi kerusakan jaringan dan fibrosis (Gilman, 2018).

### 1. Tanda-Tanda Inflamasi

#### a. Warna kemerahan (*Rubor*)

Kemerahan merupakan suatu hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami inflamasi. Arteriol mengalami dilatasi sehingga memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke dalam mikrosirkulasi lokal. Kapiler-kapiler yang mulanya kosong, mulai meregang dan terisi penuh dengan darah. Sehingga hal ini disebut dengan hiperemia atau kongesti, yang menyebabkan kemerahan lokal pada tempat inflamasi akut.

#### b. Panas (*calor*)

Terjadi bersamaan dengan kemerahan pada saat inflamasi akut. Area yang mengalami inflamasi menjadi lebih hangat dari sekelilingnya karena lebih banyak

darah yang dialirkan dari dalam tubuh ke permukaan daerah yang mengalami inflamasi dari pada daerah yang normal.

c. Pembengkakan (*tumor*)

Pembengkakan lokal dihasilkan oleh cairan dan sel-sel yang tertimbun di area inflamasi disebut eksudat. Pada awal reaksi inflamasi, sebagian besar eksudat adalah cairan. Kemudian sel darah putih dan leukosit meninggalkan aliran darah dan tertimbun sebagai bagian besar dari eksudat.

d. Nyeri (*dolor*)

Perubahan pH atau konsentrasi ion-ion tertentu pada area inflamasi dapat merangsang ujung-ujung saraf. Selain itu, ketika terjadi proses inflamasi maka menyebabkan pembengkakan jaringan pada area tersebut yang menyebabkan peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan nyeri.

e. Gangguan fungsi (*functio laesa*)

Perubahan fungsi merupakan suatu hal lazim dalam reaksi inflamasi. Bagian-bagian yang bengkak, nyeri, disertai sirkulasi abnormal dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal, seharusnya memiliki fungsi yang abnormal. Akan tetapi, bagaimana cara fungsi jaringan yang meradang tersebut terganggu tidak dipahami secara terperinci.

## 2. Jenis-Jenis Inflamasi

a. Inflamasi akut

Peradangan akut adalah sifat lokal yang relatif berumur pendek dan terbatas pada area peradangan (Setyo, 2016). Reaksi akut adalah reaksi terhadap infeksi atau trauma yang terjadi secara dini dan dipicu oleh stimulasi trombosit. Setelah leukosit

mencapai area target, mereka mempertahankan respons akut dengan melepaskan mediator inflamasi di area yang meradang (Chen *et al.*, 2018). Tahap ini ditandai dengan eksudasi cairan dan protein plasma ke dalam jaringan lunak dan akumulasi leukosit terutama neutrofil (Tazuyyun, 2020).

Neutrofil adalah sel darah putih pertama yang bergerak dan menumpuk di lokasi cedera. Neutrofil merupakan jenis sel yang mendominasi pada area inflamasi. Sel-sel ini sangat penting sebagai garis pertahanan pertama dari sistem kekebalan bawaan karena fagositosis dan fungsi bakterisida. Monosit dan makrofag kemudian menuju ke tempat inflamasi dan mengeliminasi sisa-sisa sel apoptosis fagosit dan neutrofil tanpa memperpanjang inflamasi yang terjadi (Tazuyyun, 2020).

Jika reaksi inflamasi akut tidak menghilangkan patogen atau stimulus berbahaya, proses inflamasi kembali ke kondisi inflamasi kronis jangka panjang yang lebih stabil (Tazuyyun, 2020).

Fase inflamasi akut ditandai dengan vasodilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapiler (Patel, 2018). Proses penyembuhan radang akut memakan waktu 3 hari sampai 3 minggu dan biasanya tidak meninggalkan bekas. (Susanti, 2018).

#### b. Inflamasi kronis

Peradangan kronis terjadi ketika mekanisme yang terlibat dalam peradangan akut tidak dapat memperbaiki kerusakan jaringan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kardiovaskular, aterosklerosis, diabetes tipe 2, rheumatoid arthritis, dan kanker (Chen *et al.*, 2018). Peradangan kronis berlangsung

selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (Tazuyyun, 2020).

Selama fase inflamasi kronis, jaringan ditandai dengan degenerasi dan fibrosis (Patel, 2018). Tahap inflamasi ini dapat berlangsung relatif lama. Sehingga zat penyebab luka terus merusak jaringan. Proses inflamasi kronis dapat melemahkan dan sekaligus berakibat fatal atau mematikan (Susanti, 2018).

### 3. **Penyebab Inflamasi**

Inflamasi disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. Rangsangan fisik yang menyebabkan inflamasi berupa benda asing, tekanan, panas atau dingin berlebihan, listrik, sinar matahari, sinar rontgen dan radiasi.
- b. Rangsangan kimia yang menyebabkan inflamasi berupa asam dan basa kuat, keracunan obat, karagenan dan asam arakidonat.
- c. Rangsangan mikrobiologi yang menyebabkan inflamasi berupa kuman patogen, bakteri, parasite, dan virus (Hardiyanti, 2019).

### 4. **Mekanisme Inflamasi**

Proses inflamasi dimulai dari stimulus yang mengakibatkan kerusakan sel, sebagai reaksi terhadap kerusakan sel maka sel tersebut akan melepaskan beberapa fosfolipida yang diantaranya adalah asam arakidonat. Senyawa ini merupakan mediator radang yang merupakan komponen utama lipid dan hanya terdapat dalam keadaan bebas dengan jumlah kecil yang sebagian besar berada dalam fosfolipida membran sel. Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan maka enzim fosfolipase diaktivasi untuk mengubah fosfolipida tersebut menjadi asam arakidonat. Setelah asam arakidonat tersebut bebas akan diaktifkan oleh beberapa

enzim, diantaranya lipooksigenase dan siklooksigenase. Enzim tersebut merubah asam arakidonat ke dalam bentuk yang tidak stabil (hidroperoksida dan endoperoksida) yang selanjutnya dimetabolisme menjadi leukotrien, prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Bagian leukotrien dan prostaglandin bertanggung jawab terhadap gejala-gejala peradangan (Katzung *et al.*, 2019).

Lipooksigenase merupakan enzim yang menghasilkan leukotrien, leukotrien adalah senyawa sisteinil yang dibentuk sebagai hasil metabolisme asam arakidonat, zat ini juga merupakan mediator radang dan nyeri. Leukotrien pertama yang dihasilkan disebut leukotrien A<sub>4</sub> (LTA<sub>4</sub>) yang tidak stabil, yang oleh hidrolase diubah menjadi LTB<sub>4</sub> (menyebabkan peradangan) melalui hidrolisis enzimatik. LTB<sub>4</sub> merupakan agen kemotaksis dan menyebabkan agregasi neutrofil. LTC<sub>4</sub> dan metabolit berikutnya, LTD<sub>4</sub> dan LTE<sub>4</sub> menyebabkan vasokonstriksi, bronkospasme dan meningkatkan permeabilitas vascular.

Siklooksigenase terdiri dari dua iso enzim, yaitu COX-1 dan COX-2. Iso enzim COX-1 terdapat kebanyakan di jaringan seperti di ginjal, paru-paru, platelet dan saluran cerna. Zat ini berperan pada pemeliharaan perfusi ginjal, homeostatis vaskuler dan melindungi lambung dengan jalan membentuk bikarbonat dan lendir, serta menghambat produksi asam. Tromboksan yang disintesis trombosit oleh COX-1, menyebabkan vasokonstriksi jantung dan menstimulasi agregasi darah (trombosit). Prostaskilin terutama dibentuk di dinding pembuluh menyebabkan vasodilatasi (bronkus, lambung, rahim dan lain-lain) antitrombotis, dan juga memiliki efek melindungi mukosa lambung dan ginjal sehingga bertanggung jawab untuk efek samping iritasi lambung-usus. COX-2 dalam keadaan normal tidak

terdapat di jaringan, tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Prostaglandin merupakan metabolit utama jalur siklooksigenase yang menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan pemeentukan edema. Prostaglandin juga berperan dalam patogenesis nyeri dan demam pada inflamasi, meningkatkan sensitivitas nyeri terhadap berbagai rangsang dan berinteraksi dengan sitokin yang menyebabkan demam (Tjay & Rahadja, 2022).

## 5. Mediator Inflamasi

Peradangan disebabkan oleh pelepasan mediator dan migrasi sel dari jaringan yang rusak. Mediator kimiawi spesifik tergantung pada jenis inflamasi (radang), seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, interleukin (Hardiyanti, 2019).

### a. Histamin

Histamin adalah mediator pertama yang dilepaskan di antara mediator lain dan muncul dengan cepat dalam hitungan detik, kemunculan histamin ini kemudian menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler. Bradikinin dan kalidin bereaksi secara lokal menyebabkan nyeri, vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler dan meningkatkan efikasi prostaglandin. Asam arakidonat adalah prekursor berbagai mediator inflamasi. Senyawa ini adalah komponen utama lipid seluler dan hanya ada dalam keadaan bebas dengan jumlah yang kecil terutama dalam bentuk fosfolipid membran sel. Ketika membran sel dirusak oleh rangsangan kimia, fisika, atau mekanik, maka enzim fosfolipase A<sub>2</sub> diaktifkan dan fosfolipid diubah menjadi asam arakidonat (Hardiyanti, 2019).

Histamin merupakan salah satu mediator kerusakan jaringan, dan zat ini memiliki efek vasodilatasi, berkontraksinya sel endotel dan meningkatkan permeabilitas. Bradikinin bekerja pada pembuluh darah dengan merangsang pelepasan prostasiklin, oksida nitrat, atau faktor hiperpolarisasi yang diturunkan dari endotelium. Bradikinin menyebabkan kontraksi otot polos, meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, dan merupakan mediator nyeri yang penting (Hardiyanti, 2019).

b. Prostaglandin

Prostaglandin adalah produk metabolisme asam arakidonat melalui jalur siklooksigenase dan menunjukkan efek fisiologis seperti peningkatan permeabilitas pembuluh darah, vasodilatasi, dan induksi kemotaksis neutrofil (Hardiyanti, 2019)

Prostaglandin (PG) bekerja dengan lemah dan dapat bekerja dengan potensi kuat setelah bergabung dengan mediator atau zat lain yang dilepaskan secara lokal (seperti histamin, serotonin, leukotrien). Prostaglandin dapat menginduksi vasodilatasi pembuluh darah dalam beberapa menit dan terlibat dalam proses perkembangan nyeri, inflamasi dan demam (Hardiyanti, 2019).

c. Leukotrien

Leukotrien memiliki efek kemotaktik yang kuat pada eosinofil, neutrophil dan makrofag, sehingga terjadi peningkatan bronkokonstriksi dan perubahan permeabilitas vaskular. Prostaglandin dan leukotrien adalah penyebab sebagian besar gejala inflamasi. Endoperoksida dan asam hidroperoksi melepaskan radikal oksidatif, yang juga berperan dalam timbulnya rasa nyeri (Hartono, 2018).

## 6. Obat-Obat Antiinflamasi

Berdasarkan agen terapeutiknya obat antiinflamasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (Katzung *et al.*, 2019) :

### a. Obat Antiinflamasi Golongan Steroid

Obat golongan ini adalah kelompok utama agen hormonal yang diketahui memiliki sifat limfolitik. Glukokortikoid menghambat produksi mediator inflamasi seperti leukotrien, prostaglandin, histamin, dan bradikinin. Berbeda dengan steroid, kortikosteroid *in vivo* menghambat produksi prostaglandin, serta menghambat enzim fosfolipase A<sub>2</sub>, sehingga menghambat pembentukan asam arakidonat, substrat untuk enzim COX dan lipoksigenase. Sehingga pelepasan mediator inflamasi diblokir. Golongan obat ini umumnya digunakan untuk menekan respon imun arthritis akibat melemahnya imunitas (Katzung *et al.*, 2019).

### b. Obat Antiinflamasi Non-Steroid (OAINS)

Obat antiinflamasi non-steroid adalah sekelompok obat yang berbeda secara kimiawi dengan efek antipiretik, analgesik, dan antiinflamasi yang lain. Tugas utama obat ini ialah menghambat enzim siklooksigenase, tetapi tidak dengan enzim lipoksigenase. Mekanisme kerja efek antipiretik dan antiinflamasi salisilat didasarkan pada penghambatan sintesis prostaglandin di pusat termoregulasi dan area target perifer hipotalamus. Selain itu, dengan mengurangi sintesis prostaglandin, salisilat juga mencegah sensitisasi reseptor nyeri terhadap rangsangan mekanik dan kimia. OAINS memiliki tiga efek terapeutik utama: mengurangi peradangan (anti-inflamasi), mengurangi rasa sakit (analgesik), dan mengurangi demam (antipiretik) (Mycek, 2019).

#### a. Farmakokinetik OAINS

OAINS yang diberikan secara oral diserap dengan sangat cepat, biasanya dalam waktu 15-30 menit. Setelah absorpsi, 90% obat berikatan dengan albumin dan bersirkulasi dengan albumin. Kondisi hypoalbuminemia menyebabkan pelepasan banyak obat, dan efek samping yang disebabkan bahkan lebih besar. (Sudewa & Budiarta, 2017)

Hati memetabolisme hampir semua OAINS dan ekskresinya terjadi melalui ginjal atau empedu. Sirkulasi enterohepatik terjadi ketika OAINS atau metabolitnya diekskresikan dalam empedu dan diserap kembali di usus. Sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat iritasi gastrointestinal akibat efek samping OAINS berkorelasi positif dengan penurunan fungsi ginjal pada sirkulasi usus hati (Katzung et al., 2019). Sehingga perlu untuk mengurangi dosis obat agar memperpanjang waktu paruh obat. Adapun gangguan hati menghambat metabolisme OAINS, sehingga meningkatkan toksisitas obat (Sudewa & Budiarta, 2017).

#### b. Farmakodinamik OAINS

OAINS bekerja dengan cara memblokir rute COX. Pada jalur ini, sebagian besar OAINS bekerja secara reversibel dengan mencegah asam arakidonat mengenai situs aktif enzim COX dan menghambat biosintesis prostaglandin. Karena COX, efeknya tidak dapat diubah. (Williams, C.S., et al: 2017) Beberapa OAINS juga memiliki efek tambahan seperti penghambatan kemotaksis, pengurangan produksi interleukin-1, dan pengurangan produksi radikal bebas (Sudewa & Budiarta, 2017).

Umumnya OAINS menurunkan sensitivitas pembuluh darah terhadap bradikinin dan histamin, menghentikan produksi limfokin dari limfosit T, dan melawan vasodilatasi yang terjadi pada waktu inflamasi. OAINS bersifat analgesik, antiinflamasi, dan hampir seluruhnya mengganggu agregasi platelet. Kebanyakan OAINS juga bersifat mengiritasi lambung, nefrotoksik (lantaran penghambatan terhadap prostaglandin yang berperan pada autoregulasi aliran darah ginjal), dan hepatotoksik (Sudewa & Budiarta, 2017).

Berdasarkan farmakodinamik ini, efek samping yang dapat dialami dengan mengonsumsi OAINS biasanya berada dalam kisaran berikut:

1. Sistem saraf pusat: sakit kepala, tinitus, pusing.
2. Kardiovaskular: retensi cairan, hipertensi, edema, infark miokard, gagal jantung kongestif.
3. Saluran pencernaan: sakit perut, displasia, mual, muntah, bisul, pendarahan.
4. Hematologi: trombositopenia, neutropenia, anemia aplastik.
5. Hati: Disfungsi hati, gagal hati.
6. Kulit: ruam, gatal
7. Ginjal: insufisiensi ginjal, gagal ginjal, hiperkalemia, proteinuria.

#### E. *Hewan coba*

##### 1. **Klasifikasi Hewan**

Kerajaan	: <i>Animalia</i>
Filum	: <i>Chordata</i>
Sub Filum	: <i>Vertebrata</i>
Kelas	: <i>Mammalia</i>
Sub Kelas	: <i>Theria</i>
Intra Kelas	: <i>Eutheria</i>
Ordo	: <i>Rodentia</i>
Famili	: <i>Muridae</i>

Genus : *Mus*  
Spesies : *Mus musculus*

(Zapino & Fitri, 2022)

## 2. Deskripsi Hewan Coba

Mencit adalah jenis tikus berukuran kecil. Hewan ini sering ditemukan di rumah-rumah dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Diperkirakan, jumlah mencit yang hidup di perkotaan lebih banyak daripada mencit yang hidup liar di hutan. Hewan ini termasuk hewan pengganggu karena sering menggigit perabot rumah seperti mebel dan barang-barang kecil lainnya. Mencit adalah binatang asli Asia dan Eropa Barat, tetapi sekarang ini mencit telah menyebar di seluruh dunia. Mencit kadang-kadang dijadikan hewan peliharaan. Mencit peliharaan bersifat diurnal yang memiliki periode kegiatan selama siang dan malam. Sebagian besar mencit digunakan untuk penelitian biomedis, pengujian, dan pendidikan. Mencit dewasa memiliki berat badan sekitar 25-40 g untuk mencit betina dan 20-40 g untuk mencit jantan (Zapino & Fitri, 2022).

## 3. Nilai-Nilai Fisiologi Normal

Mencit dan tikus memiliki persamaan, yaitu keduanya merupakan hewan nokturnal. Mencit lebih penakut, tetapi lebih sosial dan teritorial di alam. Telinga mencit besar dan tidak kaku. Ukuran mencit lebih kecil dibandingkan tikus (panjang 12–20 cm termasuk ekor dan mencit dewasa memiliki berat 20–45 gram). Warna mencit putih, cokelat, atau abu-abu. Mencit menghasilkan 40–100 kotoran per hari. Ekor mencit panjang, tipis, dan berbulu. Sedangkan moncongnya berbentuk segitiga dengan kumis panjang.

Tikus memiliki tubuh yang lebih besar (panjang 40 cm atau lebih, berat lebih besar dari mencit). Pada permukaan yang tersentuh, akan didapatkan tanda lemak. Warna tikus abu-abu, putih, coklat, atau hitam. Tikus menghasilkan 20–50 kotoran per hari. Ekornya panjang, biasanya tidak berbulu dan bersisik serta moncongnya lebih tumpul daripada mencit.

Sama halnya dengan tikus, mencit juga memiliki nilai-nilai fisiologi normal, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan nilai fisiologi pada tikus. Berikut adalah nilai-nilai fisiologi normal pada mencit (R.Domer, 1971).

- a. Suhu tubuh : 95-102,5° F (35–39° C)
- b. Denyut jantung : 320–840 bpm
- c. Respirasi : 84–280
- d. Berat lahir : 2–4 gram
- e. Berat dewasa : 20–40 gram (jantan) & 25–45 gram (betina)
- f. Masa hidup : 1–2 tahun
- g. Maturitas seksual : 28–49 hari
- h. Target suhu lingkungan : 68–79° F (17,78–26,11°C)
- i. Target kelembapan lingkungan : 30–70%
- j. Gestasi : 19–21 hari
- k. Minum : 6–7 ml/hari (R.Domer, 1971).

#### F. *Ekstrak Sampel*

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan suatu pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dll. Diketahui senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. Tujuan utama dari ekstraksi adalah untuk mendapatkan atau memisahkan sebanyak mungkin zat-zat yang memiliki khasiat obat (Depkes, 2006).

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa sediaan kental, kering atau cair yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai (Depkes, 2006).

Pembagian ekstrak yaitu :

1. Ekstrak cair adalah ekstrak dari bahan alami dan masih mengandung pelarut.
2. Ekstrak kental merupakan ekstrak cair bebas pelarut yang telah mengalami proses penguapan, namun konsistensinya tetap cair pada suhu kamar.
3. Ekstrak kering adalah ekstrak yang telah mengalami proses penguapan, bebas pelarut dan berbentuk padat (kering).

Metode ekstraksi dapat dibagi menjadi 2 yaitu, cara dingin dan cara panas.

#### 1. **Cara Dingin**

##### a. Maserasi

Pelunakan atau maserasi adalah proses ekstraksi sederhana yang menggunakan pelarut dan berulang kali dikocok atau diaduk pada suhu kamar (ruangan). Maserasi adalah penambahan pelarut secara berulang setelah filtrasi pertama dari maserasi pertama (Depkes, 2006).

## b. Perkolasi

Perkolasi merupakan ekstraksi dengan penggunaan pelarut yang segar sampai hasil sempurna. Biasanya metode ini dilakukan menggunakan suhu ruangan. Proses ini terdiri dari tahap pengembangan material, tahap maserasi antara, tahap perkolasi aktual (penetesan / penampung ekstrak), uji ini terus menerus dilakukan hingga memperoleh hasil perkolat. Perkolasi dapat dihentikan dengan menguji tetes terakhir dengan reagen tertentu (Depkes, 2006).

## 2. Cara Panas

### a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2006).

Pelarut dan simplisia diletakkan di dalam labu destilasi atau Erlenmeyer, kemudian dipanaskan pada temperatur titik didihnya. Pelarut akan menyari kandungan kimia pada simplisia. Setelah proses refluks selesai, maka maserat dapat diambil dan disaring. Metoda refluks ini memiliki kelebihan waktu yang singkat dan pelarut yang digunakan lebih sedikit jumlahnya. Metoda ini dipilih untuk metabolit sekunder yang termostabil (Depkes, 2006).

### b. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes, 2006).

c. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengaduk kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur kamar, yaitu secara umum dilakukan pada temperature 40-50° C (Depkes, 2006).

d. Infudasi

Infudasi adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature penangas air (bejana infus dimasukkan dalam penangas air mendidih, temperatur 90° C selama 15 menit ) (Depkes, 2006).

e. Dekoktasi

Dekoktasi adalah proses penyarian dengan pemanasan menggunakan pelarut air pada temperatur 90° C selama 30 menit (Depkes, 2006).

## G. *Landasan Teori Flavonoid Sebagai Efek Farmakologi*

### 1. **Efek Analgesik**

Efektivitas flavonoid sebagai analgesik dilakukan dengan menghambat kerja enzim siklooksigenase, sehingga akan mengurangi produksi prostaglandin oleh asam arakidonat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin (Wardani *et al.*, 2021).

### 2. **Efek Antipiretik**

Senyawa flavonoid menurunkan demam dengan cara menempel di sel imunitas serta memberikan sinyal intraseluler dan mengaktifkan kerja sistem imun yang lebih baik. Senyawa flavonoid bekerja dengan menghambat asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari membran sehingga terjadi pemblokiran jalur

siklooksigenase (COX) serta jalur lipooksigenase yang berefek pada penurunan sejumlah kadar prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Berbagai macam flavonoid dapat menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, monoaminoksidase, protein kinase, DNA polimerase dan lipooksigenase. Penghambatan siklooksigenase (COX) dapat menimbulkan pengaruh lebih luas karena reaksi siklooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju ke hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan. Prostaglandin penting dalam peningkatan termoregulatori set point dari hipotalamus. Mekanisme penghambatan inilah yang menjelaskan kerja efek antipiretik dari metabolit sekunder flavonoid (Tjay & Rahadja, 2022).

### 3. Efek Antiinflamasi

Efek penghambatan melalui jalur lipooksigenase dapat menimbulkan pengaruh yang lebih luas karena pengaruh lipooksigenase merupakan langkah pertama pada jalur yang menuju hormon eikosanoid seperti prostaglandin dan tromboksan. Mekanisme flavonoid dalam penghambat asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari endotelial sehingga menghambat proliferasi dan eksudasi dari proses radang. Terhambatnya pelepasan asam arakhidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan kurang tersedianya substrat arakhidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur lipooksigenase (Hardiyanti, 2019).

#### H. *Paracetamol*

Nama lain dari parasetamol merupakan para amino fenol. Parasetamol digunakan dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgesik dan antipiretik. Bertindak sebagai analgesik bekerja dengan cara mengurangi dan menghilangkan

nyeri ringan sampai sedang. Parasetamol (asetaminofen) merupakan salah satu obat analgesik dan antipiretik yang banyak digunakan di dunia sebagai obat lini pertama sejak tahun 1950 (Katzung *et al.*, 2019).

### 1. Farmakokinetik

Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu  $\frac{1}{2}$  jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Paracetamol sedikit terikat dengan protein plasma dan sebagian dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati dan diubah menjadi asetaminofen sulfat dan glukuronida, yang secara farmakologi tidak aktif (Katzung *et al.*, 2019). Paracetamol diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu  $\frac{1}{2}$  jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar keseluruh cairan tubuh. Dalam plasma, 25% paracetamol terikat protein plasma. Obat ini dimetabolisme oleh enzim mikrosom hati, sebagian paracetamol (80%) dikonjugasi dengan asam glukuronat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu obat ini juga dapat mengalami hidrosilasi. Metabolit hasil hidrosilasi ini dapat menimbulkan methemoglobinemia dan hemolisis eritrosit. Obat ini dieksresikan melalui ginjal, sebagian kecil sebagai parasetamol (3%) dan sebagian besar dalam bentuk terkonjugasi (Tjay & Rahadja, 2022)

### 2. Farmakodinamik

Paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga juga berdasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek analgesiknya serupa salisilat yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol

merupakan penghambat biosintesa PG yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan perdarahan lambung tidak terlihat dengan obat ini, demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa.

### 3. Efek Samping

Reaksi alergi terhadap parasetamol jarang terjadi, manifestasinya berupa eritem atau urtikaria dan gejala yang lebih berat berupa demam dan lesi pada mukosa. Pada dosis terapi, kadang-kadang timbul peningkatan ringan enzim hati dalam darah tanpa disertai ikterus, keadaan ini reversibel bila obat dihentikan (Katzung *et al.*, 2019). Pada penggunaan kronis dari 3-4 g sehari dapat terjadi kerusakan hati, pada dosis di atas 6 g mengakibatkan nekrose hati yang tidak reversibel (Tjay & Rahadja, 2022).

### 4. Dosis

Oral: dewasa tiap 3-4 jam 325-650 mg, maksimum 4 g sehari. Untuk anak: 10-20 mg/kgBB/dosis per oral/1x pemberian, maksimal 5x pemberian/ hari atau 80 mg/kgBB/hari.

### 5. Interaksi

Paracetamol memperkuat daya kerja antikoagulasi, antidiabetika oral, dan metotreksat. Efek obat encok probenesid dan sulfinpirazon berkurang bila disertai dengan penggunaan paracetamol, begitu pula dengan diuretika furosemid dan spironolakton. Kerja analgesiknya diperkuat oleh antara lain kodein dan d-propoksifen. Penggunaan alkohol disertai paracetamol akan meningkatkan resiko perdarahan lambung usus. Karena efek antitrombotiknya yang mengakibatkan

perdarahan meningkat, penggunaan paracetamol perlu dihentikan satu minggu sebelum pencabutan gigi (Tjay & Rahadja, 2022)

### I. *Natrium Diklofenak*

Natrium diklofenak merupakan derivat fenilasetat yang terkuat daya anti radangnya dengan efek samping yang kurang kuat dibandingkan dengan obat lainnya (piroksikam, indometasin). Dosis secara oral tiga kali sehari 25-50 mg. Diklofenak diabsorpsi dengan cepat dan sempurna setelah pemberian oral. Konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 2 sampai 3 jam (Hardiyanti, 2019).

Absorpsi obat ini melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap yang 99% pada protein plasma mengalami efek lintas awal (first-past) sebesar 40-50%. Walaupun waktu paruh singkat yakni 1-3 jam, natrium diklofenak diakumulasi di cairan sinovillia yang menjelaskan efek terapi di sendi jauh lebih panjang waktu paruh obat tersebut. Efek samping yang lazim terjadi ialah mual, gastritis, eritema kulit, dan sakit kepala. Dosis orang dewasa 100-150 mg sehari terbagi 2 atau 3 dosis (Hardiyanti, 2019).

Obat ini dianjurkan untuk kondisi peradangan kronis seperti artritis rematoid dan osteoarthritis serta untuk pengobatan nyeri otot rangka akut. Efek samping yang dapat terjadi meliputi distress gastrointestinal dan timbulnya ulserasi lambung, sekalipun timbulnya ulkus lebih jarang terjadi daripada dengan beberapa obat antiinflamasi non-stroid (OAINS) lainnya (Katzung et al., 2019). Natrium diklofenak merupakan serbuk hablur putih, higroskopik, mudah larut dalam metonal, larut dalam etanol dan agak sukar larut dalam air dan praktis tidak larut

dalam kloroform dan dalam eter (Depkes, 2006).

Mekanisme kerja natrium diklofenak yaitu bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis, maka enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakidonat. Sebagian asam lemak poli-tak jenuh ini kemudian diubah oleh enzim siklooksigenase yang terdiri dari dua iso-enzim, yaitu COX-1 (tromboxam 1 dan prostacilin) dan COX-2 (prostaglandin). Kebanyakan COX-1 terdapat di jaringan, antara lain dipelat-pelat darah, ginjal dan saluran cerna. COX-2 dalam keadaan normal tidak terdapat di jaringan tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang. Penghambatan COX-2 yang memberikan efek anti radang dari obat OAINS. OAINS yang ideal hanya menghambat COX-2 (peradangan) dan tidak COX-1 (perlindungan mukosa lambung) (Tjay & Rahadja, 2022).

Obat ini adalah penghambat siklooksigenase yang relatif nonselektif dan kuat, juga mengurangi bioavailabilitas asam arakidonat. Natrium diklofenak digunakan untuk mengurangi rasa nyeri akibat peradangan disebabkan karena penghambatan pembentukan prostaglandin dan asam arakidonat pada enzim siklooksigenase (Tjay & Rahadja, 2022).

#### 1. Farmakokinetik

Natrium diklofenak cepat diabsorpsi melalui saluran cerna. Konsentrasi plasma puncak obat dicapai dalam 30 – 60 menit, berikatan dengan protein plasma sebesar 99,7% dan mengalami *first pass* sebesar 40-50%. Natrium diklofenak dimetabolisme di hati oleh enzim yang dihasilkan oleh sitokrom P450 (CYP2C9) menjadi 4-hidroksinatrium diklofenak. Hasil dari proses glukoronidase dan sulfasi

diekskresi di urin dan empedu. Walaupun memiliki waktu paruh yang singkat yaitu 1-2 jam, natrium diklofenak diakumulasi di cairan sinovial sehingga efek terapi di sendi jauh lebih panjang daripada waktu paruh obat (Katzung *et al.*, 2019).

## 2. Farmakodinamik

Natrium diklofenak adalah salah satu obat golongan OAINS yang merupakan derivat dari asam fenilasetat. Natrium diklofenak merupakan inhibitor COX non-selektif (COX-1 dan COX-2) yang memiliki efek antiinflamasi, analgesik dan antipiretik. Mekanisme kerja obat tersebut adalah menghambat sintesis prostaglandin, prostasiklin dan tromboksan. Pada tubuh manusia COX-1 merupakan komponen yang esensial karena berfungsi dalam pemeliharaan berbagai fungsi di berbagai jaringan khususnya saluran cerna, ginjal, serta trombosit. Aktivasi COX-1 menghasilkan tromboksan  $A_2$  yang menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos dan prostasiklin yang bersifat sitoprotektif pada mukosa lambung. Sedangkan COX-2 diinduksi oleh berbagai stimulus inflamasi seperti sitokin, endotoksin, dan faktor pertumbuhan. Aktivasi COX-2 akan mensintesis prostasiklin yang ada di endotel makrovaskular. Prostasiklin yang disintesis oleh COX-2 bersifat kebalikan dengan tromboksan yang disintesis oleh COX-1 (Katzung *et al.*, 2019).

## 3. Indikasi

Diklofenak sering digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan akibat inflamasi serta mengurangi kekakuan sendi karena artritis seperti reumatoid artritis, osteoartritis, gout artritis, dan lain-lain. Diklofenak juga dapat digunakan untuk mengurangi nyeri akut hingga sedang pada orang dengan

dismenorea dan migrain (Katzung *et al.*, 2019).

#### 4. Efek Samping

Secara umum diklofenak berpotensi menyebabkan efek samping pada organ saluran cerna, ginjal, dan hati. Efek samping yang sering terjadi adalah induksi tukak peptik (tukak duodenum dan tukak lambung) yang kadang disertai anemia sekunder karena perdarahan saluran cerna, sehingga pemakaian diklofenak pada pasien yang memiliki riwayat tukak lambung perlu dikombinasi dengan misoprostol atau omeprazol untuk melindungi mukosa lambung dari efek samping diklofenak. Diklofenak dengan dosis 150 mg/hari dapat mengganggu aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. Selain itu, peningkatan aminotransferase serum lebih sering terjadi pada diklofenak dibanding OAINS yang lainnya (Katzung *et al.*, 2019).

### J. Metode Pengujian

#### 1. Uji Analgesik

Salah satu dari metode rangsangan kimia ini adalah metode *writhing test*. Prinsip dari metode ini adalah melihat dan mengamati jumlah respon geliat pada hewan uji (mencit) yang disebabkan oleh pemberian induksi asam asetat secara intraperitoneal. Larutan asam asetat ini berfungsi sebagai pemicu rasa nyeri pada mencit. Larutan asam asetat juga diketahui dapat berguna sebagai iritan yang cocok untuk menghasilkan respon geliat (Anwar *et al.*, 2019).

Respon geliat ini ditandai dengan bagian perut menyentuh dasar kaki tempat berpijak, terjadi kontraksi perut atau tarikan pada bagian perut, kedua pasang kaki ditarik ke belakang, badan meliuk, dan membengkokkan kepala ke belakang

(Anwar *et al.*, 2019).

## 2. Uji Antiinflamasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pembentukan edema buatan. Metode ini didasarkan dari pengamatan pengukuran volume dari edema buatan. Volume edema diukur sebelum dan sesudah pemberian bahan uji. Contoh iritan yang dipakai adalah formalin, kaolin, ragi, dan dekstran. Iritan yang umum digunakan dan memiliki kepekaan yang tinggi adalah karagen (Triswanto Sentat, 2018).

Metode pengujian efek antiinflamasi suatu bahan obat dilakukan berdasarkan kemampuan obat uji mengurangi atau menekan derajat edema pada hewan percobaan. Induksi edema dilakukan pada kaki hewan percobaan, dengan cara menyuntikkan suspensi karagenan secara intraplantar. Kemudian obat diberikan secara topikal. Ukuran udema kaki mencit diukur dengan alat yang bekerja berdasarkan hukum arhimedes (*pletysmometer*) (Triswanto Sentat, 2018).

## K. *Bahan Penginduksi*

### 1. Uji Analgesik

Asam asetat adalah senyawa asam organik yang berfungsi sebagai iritan yang dapat merusak jaringan secara lokal dan menyebabkan nyeri rongga perut pada pemberian intraperitoneal. Asam asetat digunakan sebagai penginduksi rasa nyeri pada pengujian efek analgesik. Dalam pengujian ini, asam asetat menyebabkan peradangan pada dinding rongga perut sehingga menimbulkan respon geliat berupa kontraksi otot atau peregangan otot perut. Timbulnya respon geliat akan muncul maksimal 5-20 menit setelah pemberian asam asetat dan

biasanya geliat akan berkurang 1 jam kemudian (Puente, *et al.*, 2015).

Asam asetat secara tidak langsung bekerja dengan cara mendorong pelepasan prostaglandin sebagai hasil produk dari COX ke dalam peritoneum. Asam asetat juga dapat merangsang sensitifitas nosiseptif terhadap obat OAINS, sehingga asam asetat cocok digunakan untuk mengevaluasi aktivitas analgesik. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan ion H<sup>+</sup> akibat turunnya pH dibawah 6 yang akan menyebabkan luka pada abdomen sehingga menimbulkan rasa nyeri. Penggunaan asam asetat sebanyak 10 ml/KgBB pada metode *writhing test* diketahui dapat menimbulkan respon geliat yang baik pada mencit mulai dari 5 menit pertama setelah penyuntikan (Gupta, *et al.*, 2015).

## 2. Uji Antipiretik

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai induksi demam pada mencit. Demam dapat disebabkan gangguan otak atau akibat bahan toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan suhu. Protein merupakan salah satu jenis pirogen yang dapat menyebabkan efek perangsangan terhadap pusat pengaturan suhu sehingga menimbulkan demam. Pemerian pepton berupa serbuk, kuning kemerahan hingga coklat, memiliki bau khas tetapi tidak busuk. Larut dalam air membentuk larutan coklat kekuningan, bereaksi sedikit asam, tidak larut dalam etanol dan dalam eter (Anonim, 2020).

Pepton merupakan derivat protein yang larut dalam air, yang didapat dari hidrolisis parsial protein oleh asam atau enzim dalam pencernaan. Pepton juga sering digunakan sebagai media pada pembiakan bakteri. Pepton diduga dapat membentuk pirogen endogen, yang merupakan salah satu zat yang dapat

menimbulkan demam (Anonim, 2020).

Demam dapat timbul dari terpaparnya tubuh terhadap pirogen eksogen karena ketika pirogen eksogen masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan terstimulasinya pirogen endogen untuk melindungi tubuh dan menciptakan kekebalan melawan pirogen eksogen tersebut. Contoh pirogen endogen yang ada dalam tubuh adalah interleukin-1 (IL-1),  $\alpha$ -interferon, dan tumor nekrosis faktor (TNF). IL-1 berperan penting dalam mekanisme pertahanan tubuh yaitu antara lain dapat menstimulasi limfosit T dan B, mengaktifasi netrofil, merangsang sekresi reaktan (C-reactive protein, haptoglobin, fibrinogen) dari hepar, mempengaruhi kadar besi dan seng plasma dan meningkatkan katabolisme otot. IL-1 bereaksi sebagai pirogen yaitu dengan merangsang sintesis prostaglandin E2 di hipotalamus, yang kemudian bekerja pada pusat vasomotor sehingga meningkatkan produksi panas sekaligus menahan pelepasan panas, sehingga menyebabkan demam. TNF (cachectin) juga mempunyai efek metabolisme dan berperan juga pada penurunan berat badan yang kadang-kadang diderita setelah seseorang menderita infeksi. TNF bersifat pirogen melalui dua cara, yaitu efek langsung dengan melepaskan prostaglandin E2 dari hipotalamus atau dengan merangsang pelepasan IL-1. Sedangkan, alpha-interferon (IFN- $\alpha$ ) adalah hasil produksi sel sebagai respons terhadap infeksi virus.

Prostaglandin yang dihasilkan pirogen-pirogen itu kemudian mensensitisasi reseptor dan diteruskan oleh reseptor sampai hipotalamus yang akan menyebabkan peningkatan derajat standar panas hipotalamus (*Hypothalamic Thermostat*). Peningkatan derajat standar panas hipotalamus inilah yang akan memicu sistem

pengaturan suhu tubuh (termoregulation) untuk meningkatkan suhu, maka terjadilah demam.

### 3. Uji Antiinflamasi

Iritan yang digunakan untuk efek antiinflamasi beragam jenisnya salah satu diantaranya adalah karagen. Karagen adalah senyawa polisakarida yang berasal dari rumput laut *Chondrus crispus*. Karagen diperoleh sebagai hasil ekstraksi karaginofit dengan air dan larutan alkali. Proses ekstraksi karagen dilakukan melalui proses modifikasi dengan alkali, filtrasi, presipitasi atau koagulasi dengan alkohol, pengeringan dan terakhir penghancuran menjadi tepung karagen (Triswanto Sentat, 2018).

Karagenan merupakan rumput laut dari famili *Euchema*, *Chondrus* dan *Gigartina*. Bentuknya berupa serbuk berwarna putih hingga kuning kecoklatan ada yang berbentuk butiran kasar hingga serbuk halus, tidak berbau serta memberi rasa berlendir di lidah 80° C (Hardiyanti, 2019).

Karagenan dipilih menjadi induktor karena dapat menyebabkan peradangan dalam waktu yang relatif singkat, tidak meninggalkan bekas, menunjukkan respon yang lebih sensitif terhadap obat anti-inflamasi daripada yang mengandung senyawa stimulan lainnya. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh karagenan ialah perkembangan pembentukan radang lebih lambat, sehingga jaringan dapat normal kembali dalam waktu 1-2 hari.. Peradangan yang disebabkan oleh karagenan terlihat jelas dan tidak menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan di sekitar peradangan (Triswanto Sentat, 2018).

Proses pembentukan edema yang diinduksi oleh karagenan terjadi dalam

dua fase dan melibatkan beberapa mediator inflamasi. Fase pertama terjadi selama 3 jam setelah induksi karagenan dimana terjadi pelepasan mediator histamin, serotonin, bradikinin dan peningkatan sintesis prostaglandin disekitar jaringan yang luka. Fase kedua terjadi mulai dari jam keempat sampai jam kelima dan terjadi pelepasan prostaglandin, protease dan lisosom. Umumnya fase kedua ini sensitif terhadap obat-obat antiinflamasi.

#### L. *Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Tanaman Obat*

Pemanfaatan tumbuhan untuk kepentingan bersama merupakan bentuk pemberdayaan potensi alam sebagai wujud kebesaran ciptaan Allah swt dengan segala keanekaragamannya. Manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang diberkahi dengan kesempurnaan akal untuk berpikir, perlu merenungi lebih dalam bahwa tidak ada ciptaan yang sia-sia dalam bentuk apapun. Allah swt selalu memiliki kebijaksanaan dan manfaat dalam penciptaannya, sama seperti penciptaan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Allah swt berfirman di dalam al-qur'an surah Taha/20: 53, yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya :

“(Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan”( *Terjemah Kemenag 2019*).

Dalam tafsir jalalain menjelaskan bahwa Dia (yang telah menjadikan bagi kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan)

tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khithab untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam). Penjelasan tentang tumbuhan juga diperjelaskan dalam QS Asy-Syu'ara/26 :7, yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” ( *Terjemah Kemenag 2019*).

Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 10, menjelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraian-uraiannya keniscayaan keesaan Allah swt. Karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keduanya konstan. Itu semua tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Di sisi lain tanah yang gersang melalui hujan yang diturunkan-Nya menghidupkan yang mati. Demikian juga manusia yang mati dan telah terkubur di bumi. Kuasa Allah menghidupkan mereka kembali. Serupa dengan menghidupkan pepohonan yang tumbuh di tanah yang gersang itu (Shihab, 2006)

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.

Berdasarkan uraian ayat di atas Allah swt. menjelaskan begitu banyak nikmat yang berikan kepada kita umat manusia salah satunya dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka untuk digunakan sebagaimana mestinya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini mempunyai kegunaan dan fungsi masing-masing agar manusia bisa mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat muslim dalam kitab shahih muslim nomor 2900 bahwa :

صحيح مسلم ٢٩٠٠: حَدَّثَنَا ابْنُ نُؤْمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya :

“Shahih Muslim 2900: Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Atha` dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya (Baqii, 1991).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan termasuk tumbuhan memiliki manfaat yang besar, salah satu manfaat tersebut ialah sebagai bahan obat. Penggunaan tanaman sebagai bahan obat merupakan salah satu hal yang kini banyak digunakan oleh masyarakat. Sebab dalam keadaan sakit masyarakat akan cenderung mencari cara atau obat yang dapat digunakan untuk menjadi sehat kembali. Sebagaimana Rasulullah saw memerintahkan kita untuk

berobat bila terkena penyakit.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, jenis, dan klasifikasi penyakit akan semakin banyak sehingga penemuan obat baru juga akan semakin bertambah. Oleh karena itu, banyaknya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai obat maka Rasulullah saw memerintahkan kita untuk berobat bila mengidap suatu penyakit. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah yang memberi kesembuhan. Akan tetapi, Allah swt. Menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya sehingga mendorong kesembuhan bagi yang mengidap penyakit.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Sehingga, setiap pengobatan hendaknya ditangani oleh para ahlinya. Islam mengenalkan beberapa cara pengobatan dalam menyembuhkan penyakit. Di antaranya penyembuhan dengan air, bekam, doa, dan obat-obat tradisional.

Dengan demikian, khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung dibidang kesehatan hendaknya senantiasa terus menggali dan berbagi ilmu, salah satunya yaitu dengan cara melakukan penelitian agar diperoleh penemuan-penemuan obat baru, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, maka akan dilakukan pengujian terhadap batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) sebagai tanaman yang dapat berpotensi obat antipiretik, analgesik dan antiinflamasi yang nantinya dapat

dimanfaatkan oleh manusia.

Hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional dari masa ke masa telah ditinjau kembali oleh para ahli pengobatan tradisional yang bereksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar pengobatan. Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaannya. Diiringi keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah lah yang menjadikan semua itu. Mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat dengannya hukumnya mubah.

Oleh karena itu, penyakit yang diturunkan Allah swt. pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Jika Allah swt. menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga dapat mempermudah dalam proses penyembuhannya. Penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah swt. dan apabila berhasil semoga dapat memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah eksperimen laboratorium, yang menggunakan bagian batang tanaman parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) sebagai sampel yang diuji coba pada hewan mencit (*Mus musculus*).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian uji analgesik dan antipiretik dilakukan di laboratorium farmakologi dan biologi farmasi jurusan farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sedangkan penelitian uji antiinflamasi dilakukan di laboratorium praklinik jurusan farmasi Universitas Muslim Indonesia.

#### **B. *Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli tahun 2022 hingga selesai pada Januari tahun 2023.

#### **C. *Pendekatan Penelitian***

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimental.

#### **D. *Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah tanaman parang romang

(*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang tumbuh di daerah Sulawesi Selatan.

## 2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang tumbuh di Malino, kabupaten Gowa.

### E. *Instrument Penelitian*

#### 1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang pengaduk, bejana maserasi, blender(cosmos), corong (pyrex), Erlenmeyer (pyrex), gelas kimia (pyrex), gelas ukur (pyrex), kandang hewan uji, labu ukur, penangas air, pletismometer digital (Panlab Harvard), pipet tetes, Rotary evaporator (IKA RV 10 Basic), sendok tanduk, sonde oral, spoit injeksi (*Disposable Syringe*), tabung reaksi, timbangan analitik, kertas saring, alu dan lumpang.

#### 2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etanol 70%, natrium diklofenak, aquadest, Na-CMC, karagenan, paracetamol, asam asetat glasial, pepton dan mencit.

### F. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan*

#### 1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak batang tanaman parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) yang diperoleh di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

## **2. Pengolahan sampel**

Sampel yang telah diambil di daerah Malino kemudian dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir. Setelah itu dipotong lalu dikeringkan di dalam lemari pengering kemudian dihaluskan, dan dilakukan ekstraksi maserasi (Musdar, 2012; Winangsih *et al.*, 2013).

## **3. Metode Ekstraksi**

Sebanyak 200 gram serbuk simplisia batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill), dimasukkan dalam labu alas bulat 1000 mL, ditambahkan 800 mL etanol 70% sebanyak 2 kali selama 24 jam, didiamkan lalu disaring menggunakan kain kasa dan kertas saring. Ekstrak cair yang diperoleh dikumpulkan, kemudian diuapkan dengan *rotary evaporator* dan diperoleh ekstrak kental batang parang romang (Rusdi *et al.*, 2018).

## **4. Pembuatan Suspensi Na-CMC 1%**

Suspensi Na – CMC dibuat dengan cara ditimbang 1 gram Na–CMC, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang berisi 50 mL aquades panas (suhu 70°C) dan didiamkan selama 30 menit hingga diperoleh massa yang transparan, diaduk lalu diencerkan dengan aquades hingga 100 mL (Prof. Drs. Moh. Anief, 2019).

## **5. Pembuatan Suspensi Paracetamol**

Tablet paracetamol ditimbang sebanyak 20 tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet dan didapatkan rata-ratanya yaitu 602,95 mg. dimasukkan semua tablet paracetamol di dalam lumpang dan digerus hingga halus dan homogen. Kemudian ditimbang tablet paracetamol yang telah dihaluskan sebanyak

46 mg yang disuspensikan dalam larutan Na-CMC 1% sebanyak 20 ml.

#### **6. Pembuatan Suspensi Natrium Diklofenak**

Ditimbang tablet natrium diklofenak sebanyak 10 tablet, kemudian dihitung berat rata-rata tiap tablet. Tablet dimasukkan ke dalam lumpang dan digerus hingga halus. Hitung berat serbuk natrium diklofenak yang akan digunakan lalu masukkan kedalam lumpang dan disuspensikan dengan NaCMC 1% sambil digerus hingga homogen. Kemudian masukkan ke dalam labu tentukur 100 mL kemudian dicukupkan volumennya dengan suspensi Na-CMC 1% hingga tanda batas.

#### **7. Pembuatan Asam Asetat 1%**

Larutan uji asam asetat 1% dibuat dengan mengencerkan asam asetat glasial 1 ml dalam 100 ml aquades pada labu ukur. Volume asam asetat yang akan diberikan pada mencit ialah 10 mL/kgBB.

#### **8. Pembuatan Pepton 1%**

Larutan pepton 1% dibuat dengan menimbang 1 g pepton kemudian dilarutkan dalam 100 ml aquades.

#### **9. Pembuatan Suspensi Karagenan 1%**

Karagenan ditimbang sebanyak 1 gram, ditambah larutan NaCl 50 ml, dihomogenkan kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

#### **10. Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang**

Ditimbang ekstrak etanol batang parang romang sesuai dengan dosis pemberian setiap pengujian, kemudian digerus di dalam lumpang, lalu disuspensikan dengan Na CMC 1% sedikit demi sedikit sambil digerus hingga

homogen. Suspensi kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur dan dicukupkan volumenya sampai 10 mL (Jannah, 2021).

## 11. Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini ialah mencit jantan (*Mus musculus*) yang memiliki kondisi tubuh yang sehat serta kondisi fisik sempurna tanpa ada cacat dan dengan bobot 20-30 gram. Hewan uji yang digunakan pada setiap pengujian sebanyak 15 ekor yang dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan, tiap kelompok perlakuan terdiri dari 3 ekor mencit jantan.

## 12. Perlakuan Hewan Uji

### A. Uji Analgesik

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. Pertama-tama hewan coba diberi perlakuan dengan larutan uji, 15 menit kemudian diinduksi demam menggunakan asam asetat 1% dengan volume pemberian 0,2ml/20 gram BB mencit secara intraperitoneal. Jumlah geliat langsung diamati setiap 5 menit selama 60 menit. Adapun masing-masing kelompok yang diberi perlakuan sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif
- b. Kelompok 2 : diberikan suspensi paracetamol sebagai kontrol positif

- c. Kelompok 3 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 25 mg/KgBB mencit jantan.
- d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 50 mg/KgBB mencit jantan.
- e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 100 mg/KgBB mencit jantan.

#### B. Uji Antipiretik

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. Pertama-tama diukur suhu rektal awal mencit, kemudian diinduksi demam menggunakan pepton 1% dengan volume pemberian 1 ml/30 gram BB mencit secara subkutan. 30 menit setelah pemberian larutan induksi, suhu rectal mencit kemudian diukur kembali dengan menggunakan termometer digital, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif
- b. Kelompok 2 : diberikan suspensi paracetamol sebagai kontrol positif
- c. Kelompok 3 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 100mg/BB mencit jantan.
- d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 150mg/BB mencit jantan.

- e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 200mg/BB mencit jantan.

### C. Uji Anti-inflamasi

Hewan uji masing-masing ditimbang berat badannya dan dikelompokkan menjadi 5 kelompok, hewan dalam 1 kelompok ditempatkan bersama dalam 1 kandang. Pada kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 2 sebagai kontrol positif sedangkan kelompok 3 sampai 5 diberi ekstrak etanol batang parang romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) secara oral sesuai dengan tingkatan dosis. Pertama-tama diukur volume awal edema kaki mencit, kemudian diinduksi karagenan dengan volume pemberian 1 ml/30 gram BB mencit secara intraplantar. 1 jam setelah pemberian larutan induksi, volume edema kaki mencit kemudian diukur kembali dengan menggunakan pletismometer digital, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut :

- a. Kelompok 1 : diberikan Na-CMC 1 % sebagai kontrol negatif
- b. Kelompok 2 : diberikan suspensi natrium diklofenak sebagai kontrol positif
- c. Kelompok 3 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 100 mg/ Kg BB mencit jantan.
- d. Kelompok 4 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 125 mg/Kg BB mencit jantan.
- e. Kelompok 5 : pemberian suspensi ekstrak etanol batang parang romang 150 mg/Kg BB mencit jantan.

### G. *Analisis Data*

Analisis data menggunakan perangkat software yaitu SPSS. Data diuji distribusi normal dan homogenitas variannya ( $p < 0,05$ ), selanjutnya data diuji dengan One-Way ANOVA (Luliana *et al.*, 2017).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Pengamatan Analgesik


Tabel 1. Hasil Analisis Uji Analgesik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

No	Kelompok perlakuan	Jumlah Geliat			Rata-rata (Jumlah) ± SEM
		Replikasi			
		1	2	3	
1	Kontrol negatif Na-CMC	107	155	153	138,33 ± 15,67 <sup>+</sup>
2	Kontrol positif paracetamol	86	99	83	90,33 ± 4,66*
3	Dosis 25mg/kgBB EEBPR	83	81	99	87,67 ± 5,69 <sup>+</sup>
4	Dosis 50mg/kgBB EEBPR	74	76	70	73,33 ± 1,76 <sup>++</sup>
5	Dosis 100 mg/kgBB EEBPR	56	65	57	59,33 ± 2,84 <sup>++</sup>


Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC

\* = berbeda signifikan dengan paracetamol



Gambar 2. Rata-rata Penurunan Jumlah Geliat Terhadap Uji Aktivitas Analgesik



Gambar 3. Persentase Efektivitas Penghambatan Rangsangan Nyeri Terhadap Uji Aktivitas Analgesik

## 2. Pengamatan Antipiretik


Tabel 2. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

No	Kelompok perlakuan	Suhu Rektal			Rata-rata (Jumlah) ± SEM
		Replikasi			
		1	2	3	
1	Kontrol negatif Na-CMC	38	38,2	37,8	38 ± 0,115 <sup>+</sup>
2	Kontrol positif paracetamol	35,7	36,8	36,4	36,3 ± 0,321*
3	Dosis 100 mg/kgBB EEBPR	38,8	36,4	37,1	36,7 ± 0,202 <sup>+</sup>
4	Dosis 150 mg/kgBB EEBPR	36,5	35,7	36,1	36,1 ± 0,23 <sup>+</sup>
5	Dosis 200 mg/kgBB EEBPR	35,7	35,9	35,7	35,7 ± 0,667 <sup>+</sup>


Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC

\* = berbeda signifikan dengan paracetamol



Gambar 4. Rata-rata Penurunan Suhu Rektal Terhadap Uji Aktivitas Antipiretik



Gambar 5. Persentase Efektivitas Daya Antipiretik Terhadap Uji Aktivitas Antipiretik

### 3. Pengamatan Antiinflamasi


Tabel 3. Hasil Analisis Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill)

No	Kelompok perlakuan	Volume edema			Rata-rata (Jumlah) ± SEM
		Replikasi			
		1	2	3	
1	kontrol negatif Na-CMC	0,147	0,148	0,147	1,03 ± 0,003 <sup>+</sup>
2	kontrol positif Na.Diklofenak	0,092	0,124	0,055	0,08 ± 0,02*
3	Dosis 100 mg/kgBB EEBPR	0,141	0,127	0,095	0,11 ± 0,014 <sup>+</sup>
4	Dosis 125 mg/kgBB EEBPR	0,107	0,095	0,082	0,09 ± 0,005 <sup>+</sup>
5	Dosis 150 mg/kgBB EEBPR	0,087	0,088	0,077	0,07 ± 0,003 <sup>+</sup>


Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

+ = berbeda signifikan dengan Na-CMC

\* = berbeda signifikan dengan natrium diklofenak



Gambar 6. Rata-Rata Penurunan Edema Pada Mencit Terhadap Uji Aktivitas Antiinflamasi



Gambar 7. Persentase Penghambatan Volume Edema Terhadap Uji Aktivitas Antiinflamasi

## B. *Pembahasan*

Ekstraksi batang parang romang dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Ekstraksi dilakukan untuk mencari senyawa yang bersifat polar dan semi polar sehingga digunakan pelarut etanol 70%. Menurut Depkes RI, 2000 bahwa etanol merupakan senyawa yang mudah menguap sehingga akan mempermudah proses penguapan pelarut. Disamping itu, ekstrak yang diperoleh nantinya akan diujikan hewan, sehingga penggunaan etanol lebih tepat karena lebih non-toksik dari metanol (Depkes, 2006).

Batang parang romang yang telah diambil, dibersihkan, dikeringkan tersebut selanjutnya dihaluskan menggunakan blender dengan kecepatan rendah agar tidak merusak senyawa pada sampel. Serbuk batang parang romang kemudian dimasukkan kedalam wadah untuk dimaserasi selama  $2 \times 24$  jam dan diaduk secara berkala. Maserat kemudian disaring menggunakan kertas saring (filtrat I) dan ampasnya dimaserasi kembali selama 1 hari dan disaring kembali (filtrat II). Filtrat

I dan filtrat II dikumpulkan dan diuapkan dengan *rotary evaporator* dengan kecepatan 50 rpm dan suhu 40°C untuk memisahkan ekstrak dan pelarutnya. Ekstrak yang diperoleh setelah pemekatan, kemudian disimpan dalam eksikator untuk menghindari kerusakan senyawa kimia. Dari hasil maserasi yang dilakukan diperoleh ekstrak kental batang parang romang sebanyak 35 gram dan rendamennya 8,13 %.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mencit (*Mus musculus*) sebagai uji analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang romang. Hewan coba dibagi dalam 5 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 3 ekor hewan coba (replikasi). Tujuan dilakukannya replikasi sebanyak 3 kali adalah untuk mengoptimalkan terjadinya kesalahan dalam pengujian. Ketika hasil dari replikasi menunjukkan hasil yang konsisten, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki hasil yang baik (Umar, 2014).

Hewan coba atau mencit yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencit jantan dengan berat badan 20-30 gram. Hewan sebagai model atau sarana percobaan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, antara lain persyaratan genetik, atau keturunan dan lingkungan yang memadai dalam pengelolaan, di samping faktor ekonomis, mudah diperoleh, dan mampu memberikan reaksi biologis yang mirip pada reaksi biologis manusia (Zapino & Fitri, 2022).

### 1. **Analgesik**

*Writhing test* merupakan salah satu metode kimia yang digunakan untuk mneguji aktivitas analgesik suatu senyawa. Prinsip kerja dari metode ini adalah

mengamati respon geliat yang terjadi karena pemberian rangsangan nyeri oleh suatu iritan. Geliat merupakan respon nyeri yang diperlihatkan oleh mencit yang ditandai dengan menariknya kedua kaki ke belakang dan menempelnya perut ke permukaan kandang. (Lara *et al.*, 2021).

Pemberian asam asetat 1% pada hewan percobaan yang digunakan sebagai penginduksi nyeri karena menyebabkan rasa sakit akibat iritasi yang berat pada mukosa membran rongga perut sehingga kaki tertarik ke belakang, meregang dan abdomen menyentuh dasar plate form. Nyeri tersebut diakibatkan karena penurunan pH di rongga perut yang mengakibatkan terjadinya luka. Nyeri seperti ini termasuk nyeri dalaman (viseral) atau nyeri perut mirip sifat menekan dan disertai reaksi vegetatif. Nyeri ini disebabkan oleh adanya rangsang yang merangsang syaraf nyeri di daerah visceral terutama dalam rongga dada dan perut (Afrianti *et al.*, 2015).

Pemberian asam asetat dilakukan secara intraperitoneal, dikarenakan melalui rute ini absorpsi yang terjadi akan cepat dan konstan sehingga nyeri yang dihasilkan akan cukup lama, dengan waktu nyeri yang cukup lama ini maka geliat dapat terhitung selama 60 menit. Pengamatan geliat ini dilakukan selama 60 menit setiap 5 menit. Total geliat hasil pengamatan selama 60 menit kemudian dianalisis menggunakan *one way* ANOVA dan dilanjutkan dengan uji Duncan (Lara *et al.*, 2021).

Pada kelompok kontrol hewan coba diberikan larutan Na-CMC 1% untuk melihat pemulihan geliatan tanpa diberi obat sedangkan pembanding diberikan suspensi paracetamol yang merupakan obat yang lazim digunakan sebagai antipiretik dan analgetik pada masyarakat dan sudah dikonversikan untuk

pemberian pada mencit.

Pada penelitian ini pemberian sediaan dilakukan 30 menit sebelum diberi penginduksi. Hal ini bertujuan untuk melihat kerja dari ekstrak dalam memberikan efek proteksi terhadap rasa nyeri yang akan ditimbulkan oleh penginduksi, dan untuk menyembuhkan nyeri dengan menurunkan jumlah geliatan sampai sembuh dan menyesuaikan dengan pemakaian yang biasa dipakai oleh manusia.

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 0,05$ , hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji duncan. Dari hasil analisis uji Duncan pada lampiran 16 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian paracetamol sebagai kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel. Efek analgesik suatu bahan uji dapat dilihat dari jumlah geliat hewan coba.

Total geliat yang ditunjukkan mencit menandakan kuat lemahnya nyeri yang dirasakan akibat dari induksi asam asetat yang diberikan. Semakin sedikit total geliat yang ditunjukkan oleh mencit maka dapat diartikan semakin lemah pula nyeri yang dirasakannya dengan kata lain semakin besar efek analgesik yang dihasilkan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa rata-rata total kumulatif geliat pada kelompok kontrol negatif paling tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kelompok kontrol negatif tidak menggunakan zat yang dapat mengurangi rasa nyeri. Dimana pada kelompok kontrol negatif tersebut hanya digunakan Na CMC yang bersifat sebagai

pembawa yang tidak memberikan efek apapun. Selain itu terdapat penurunan total geliat yang nyata dari ketiga kelompok pemberian sampel yang dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan pemberian zat uji berupa ekstrak batang parang romang dapat mengurangi nyeri yang ditimbulkan akibat pemberian asam asetat yang ditandai dengan terjadinya penurunan jumlah geliat pada mencit (Lara *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 2 dan 3, pemberian Na-CMC memiliki jumlah geliat terbanyak yaitu 138,33, hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian larutan tersebut tidak memberi pengaruh terhadap penurunan rasa nyeri yang dirasakan oleh hewan coba, sehingga persentase penurunan geliatnya 0%. Sedangkan pemberian paracetamol memiliki rata-rata penurunan respon nyeri terhadap hewan coba sebanyak 89,33 dengan persentase sebesar 35,51%. Begitupun dengan pemberian larutan sampel, respon geliat yang ditunjukkan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya dosis pemberian. Jumlah geliat dengan dosis pemberian 25mg/kgBB memiliki hasil yang sebanding dengan paracetamol, yaitu sebesar 87,66 atau 36,96%, sedangkan pada dosis pemberian 100mg/kgBB memiliki jumlah geliat sebesar 59,33 atau 57,25%.

Berdasarkan hasil penelitian Zulkifli & Octaviany dalam Uji Efek Analgetik Ekstrak Akar Binasa (*Plumbago indica* L) Asal Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Mencit Dengan Metode *Writhing Reflex Test* menunjukkan bahwa pada pengamatan jumlah geliat terdapat perbedaan efek yang signifikan atau ada perbedaan efek yang bermakna antara semua perlakuan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ekstrak akar binasa konsentrasi 1%, 3% dan 5% b/v. Dimana

pemberian ekstrak akar binasa dengan konsentrasi 1% b/v rata-rata persentase penurunan jumlah geliat sebesar 28,01%, ekstrak akar binasa konsentrasi 3% b/v rata-rata sebesar 43,97%, dan pemberian ekstrak akar binasa konsentrasi 5% b/v rata-rata sebesar 62,64%, sedangkan untuk pemberian asam mefenamat 0,2% b/v sebagai pembanding menunjukkan rata-rata persentase penurunan jumlah geliat sebesar 94,92%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi yang digunakan makin semakin besar pula efek analgesik yang ditimbulkan. Pada konsentrasi 5% b/v dapat memberikan efek analgesik yang efektif karena terdapat senyawa yang lebih besar daripada konsentrasi 1% dan 3% b/v (Zulkifli & Octaviany, 2019).

Aktivitas analgesik yang ditimbulkan diduga karena adanya kandungan senyawa flavonoid dari ekstrak batang parang romang. Flavonoid berperan sebagai analgesik yang mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim siklooksigenase. Dimana enzim siklooksigenase berperan dalam menstimulasi pelepasan mediator nyeri, yaitu prostaglandin (Darmayanti *et al.*, 2020). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar dosis pemberian ekstrak etanol batang parang romang yang diberikan kepada hewan coba, maka semakin besar pula efek analgesik yang dihasilkan, sehingga jumlah geliat pada hewan coba semakin sedikit.

## 2. **Antipiretik**

Pepton merupakan protein yang digunakan sebagai penginduksi demam pada hewan coba. Senyawa pepton bersifat pirogen sehingga dapat meningkatkan suhu tubuh hewan coba. Induksi pepton umumnya menggunakan hewan coba

mencit dan setelah suhu naik dapat dilakukan pengukuran untuk aktivitas antipiretik senyawa uji. Pepton merupakan protein yang terhidrolisa, pepton sebagai pemicu demam dan tidak mempunyai sifat toksik (Odding, 2016).

Protein yang berlebihan pada tubuh mencit akan menyebabkan demam pada mencit. Pemberian protein berupa pepton yang berlebih pada mencit ini juga dapat merubah keseimbangan protein dalam darah sehingga akan menyebabkan demam. Pepton menginduksi terjadinya demam pada mencit melalui reaksi tubuh. Sesaat setelah penyuntikan pepton  $\pm$  5 menit, mencit mengalami berbagai hal yaitu menggigil, mengantuk, peningkatan rasa haus dan demam. pengukuran suhu demam pada mencit yang dilakukan pada rektal optimal pada waktu 1 jam sesudah penyuntikan. Pada waktu tersebut mencit mengalami demam yang optimal.

Demam dapat didefinisikan sebagai suhu rektal diatas  $38^{\circ}\text{C}$  ( $100,4^{\circ}\text{F}$ ), suhu aksila diatas  $37,5^{\circ}\text{C}$  dan suhu oral diatas  $37,8^{\circ}\text{C}$ . Bayi yang berusia kurang dari 3 bulan dapat dikatakan demam apabila pengukuran suhu rektalnya diatas  $38^{\circ}\text{C}$  sedangkan pada bayi berusia lebih dari 3 bulan suhu oral dan aksilanya lebih dari  $38,3^{\circ}\text{C}$ . Pengukuran suhu tubuh melalui mulut dilakukan dengan meletakkan ujung termometer kedalam mulut selama  $\pm$  3 menit. Namun, perubahan suhu mulut dapat disebabkan karena merokok, makanan, dan minumam yang panas atau dingin maka pengukuran suhu tubuh melalui mulut tidak akan akurat. Pengukuran suhu lainnya dapat melalui aksila dengan meletakkan ujung termometer dekat arteri aksila dengan menekan lengan atas kearah dada selama 3-5 menit. Suhu aksila biasanya memiliki suhu yang lebih rendah  $1^{\circ}\text{C}$ - $2^{\circ}\text{C}$  dari suhu inti. Sementara, pada orang dewasa pengukuran suhu rektal dilakukan dengan memasukkan termometer

sedalam 3,5 cm. Pengukuran demam paling tepat yaitu menggunakan suhu rektal karena mewakili suhu inti tubuh dan hasilnya tidak bervariasi terhadap perubahan lingkungan (*reliable*). Selain itu, suhu rektal juga telah lama digunakan sebagai standar memperkirakan suhu inti karena memiliki selisih nilai lebih  $0,1^{\circ}\text{C}$  dari suhu inti. Rongga pada rektum diyakini dapat menahan panas lebih lama dibandingkan tempat pengukuran suhu lainnya sehingga hasilnya dianggap lebih akurat. Namun, suhu dubur dapat menjadi satu derajat lebih tinggi daripada suhu oral pada kondisi tertentu seperti kolera (Haulani, 2020).

Penentuan efek penurunan demam dilakukan dengan mengukur suhu setelah pemberian obat hingga rentang waktu 30 menit-1 jam. Kondisi demam pada mencit ditentukan dengan mengukur suhu melalui rektal menggunakan termometer digital setiap 10 menit selama 1 jam. Penurunan suhu dicatat, diamati lalu dianalisis dengan uji anova dan uji Duncan.

Hasil analisis uji anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi  $< 0,05$ , hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kelompok memiliki perbedaan. Selanjutnya perbedaan setiap kelompok dianalisis melalui uji duncan. Dari hasil analisis uji Duncan pada lampiran 17 menunjukkan bahwa, kelompok perlakuan dengan pemberian Na-CMC sebagai kontrol negatif berbeda nyata dengan kelompok perlakuan lain. Sedangkan kelompok pemberian paracetamol sebagai kontrol positif menunjukkan efek yang sama dengan kelompok perlakuan pada hewan coba dengan pemberian larutan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 4 dan 5, suhu rektal pemberian Na-CMC sebesar  $38,03^{\circ}\text{C}$  hasil tersebut menunjukkan bahwa keadaan mencit

masih dalam kondisi demam, hal tersebut disebabkan karena pemberian larutan tersebut hanya memiliki efektivitas antipiretik sebesar 6,6% atau tidak memberi pengaruh terhadap penurunan demam pada hewan coba. Sedangkan pemberian paracetamol suhu rektal mencit telah mencapai 36,32 °C, hal tersebut menunjukkan persentase efektivitas obat dalam penurunan suhu rektal mencit sebesar 69,3%. Begitupun dengan pemberian larutan sampel dengan dosis 100mg/kgBB suhu mencit telah mencapai 36,81 °C atau efektivitas pemberian larutan sampel sebanding dengan pemberian paracetamol yaitu 61,2% dan terus berkurang hingga dosis 200mg/kgBB sampel yaitu sebesar 35,79 °C atau 104,1%.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmi dkk dalam uji aktivitas antipiretik ekstrak etanol daun sembung (*Blumea balsamifera*) terhadap mencit putih jantan (*Mus musculus*) yang telah dilakukan, kemudian dianalisis menggunakan metode statistika *One Way Anova* dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat pengaruh penurunan suhu rektal mencit terhadap pemberian ekstrak daun sembung. Hasil analisis varians (ANOVA) yang dilakukan adalah untuk membandingkan ada atau tidaknya perbedaan pada pemberian perlakuan. Pada analisis tersebut menghasilkan data yang normal pada kelompok perlakuan positif, dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol dengan selisih penurunan suhu mencit rata-rata terdapat pada menit ke 30, 60, 90 dan 120 menit. Untuk dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 30 masing-masing mengalami penurunan suhu sebesar 0.5, 0.33, 0.43 dan 0.3 °C. Kemudian dengan dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 60 mengalami penurunan suhu sebesar 0.26, 0.3, 0.36 dan 0.2 °C. Kemudian dengan

dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit, dan paracetamol pada menit ke 90 mengalami penurunan suhu sebesar 0.2, 0.06, 0.36 dan 0.3 °C. Kemudian dosis 100, 150, 200 mg/BB gram mencit dan paracetamol pada menit ke 120 mengalami penurunan suhu sebesar 0.4, 0.2, 0.3, dan 0.16 °C setelah diinduksi pepton (Rahmi *et al.*, 2021).

Berdasarkan hasil analisis varians (ANOVA) menunjukkan bahwa pada pemberian ekstrak daun sembung (*Blumea Balsamifera L*) yang diuji dengan menggunakan *one away* ANOVA dan dilanjutkan dengan uji duncan memberikan hasil yang signifikan dalam menurunkan suhu rektal mencit demam (Rahmi *et al.*, 2021).

Menurut Putra *et al* (2015) penurunan yang bervariasi ini disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhi seperti hormon, lingkungan, kondisi lambung, dan dapat pula disebabkan oleh faktor psikologis seperti stres yang dialami akibat pengukuran berulang pada rektum mencit.

Penurunan suhu rektal yang terjadi karena adanya senyawa flavonoid pada tanaman. Flavonoid bekerja sebagai inhibitor biosintesis prostaglandin dengan menghambat enzim siklooksigenase – 2 (COX-2) sehingga dapat menurunkan suhu tubuh sampai normal kembali (Widyasari *et al.*, 2018). Struktur kimia dari flavonoid hampir menyerupai paracetamol dimana masing – masing struktur terdapat cincin benzena dan golongan fenol, karena hal inilah flavonoid juga diduga memiliki efek antipiretik yang lebih baik daripada obat sintetis (Samiun *et al.*, 2020).

### 3. **Antiinflamasi**

Metode uji yang digunakan dalam pengujian antiinflamasi ialah metode edema buatan yang ditimbulkan dengan menginjeksikan karagenan 1% yang dilarutkan dalam larutan fisiologis NaCl 0.9%, sebanyak 0,1 mL pada telapak kaki mencit secara intraplantar. Volume awal kaki mencit diukur sebelum diberi perlakuan, dengan menggunakan pletismometer, dengan cara telapak kaki mencit yang telah ditandai sebatas mata kaki dimasukkan (sampai tanda) pada pletismometer (Widianti, 2017).

Pletismometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume kaki hewan uji. Pletismometer terdiri atas tabung yang lebih besar, yang digunakan untuk memasukan kaki hewan coba, dan yang lebih kecil, dimana terdapat transduser. Sebelum melakukan pengukuran dengan pletismometer, kaki hewan coba diberikan batas pada bagian sendi tibiotarsal terlebih dahulu agar setiap pengukuran dilakukan pada batas yang sama. Selanjutnya bagian telapak kaki belakang dicelupkan hingga batas tersebut dan menyebabkan tingkat cairan di kedua tabung berubah. Nilai volume telapak kaki dicatat berdasarkan waktu, dan di ambil rata-rata volume telapak kaki (Widianti, 2017).

Sebelum perlakuan, masing-masing mencit ditimbang berat badannya, hal ini bertujuan untuk mengetahui volume pemberian obat yang sesuai, lalu diukur volume awal kaki mencit dengan menggunakan pletismometer, untuk mengetahui volume kaki sebelum diberi perlakuan lebih lanjut. Setelah itu, tiap kelompok perlakuan diinduksi karagenan dengan cara disuntikan secara intraplantar pada bagian kaki mencit. Senyawa karagenan merupakan senyawa iritan yang

melepaskan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin pada jam-jam pertama dan berlangsung selama 90 menit. Ini merupakan fase pembentukan edema. Fase kedua yaitu pelepasan bradikinin yang terjadi selama 1,5 jam- 2,5 jam. Fase ketiga terjadi pelepasan prostaglandin pada 3 jam setelahnya. Kemudian edema berkembang cepat dan bertahan selama 6 jam. Setelah diinduksi karagenan ditunggu selama 1 jam. Hal ini karena 1 jam setelah pemberian karagenan terjadi pelepasan mediator-mediator inflamasi seperti histamin dan serotonin. Kemudian diukur volume kaki mencit setelah diinduksi (Dermiati *et al.*, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 6 terlihat bahwa pemberian larutan Na-CMC tidak mempengaruhi penurunan volume radang kaki mencit. Pada kelompok Na-CMC volume radang yang dihasilkan meningkat dan terus berlangsung sampai pada jam ke-6. Hal ini karena Na-CMC hanya sebagai pelarut media obat sehingga tidak ada rangsangan berupa obat untuk mengurangi edema akibatnya edema akan terus meningkat dan proses penghilangan mediator-mediator inflamasi dalam tubuh mencit hanya terjadi secara alamiah, sehingga volume edemnya sebesar 0,14 ml dengan persentase efektivitas sebesar 0%.

Obat perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium diklofenak 50 mg. Obat ini umum digunakan karena mempunyai efek antiinflamasi yang kuat dan mudah didapatkan. Penurunan volume edema natrium diklofenak memiliki efek yang hampir sama dengan dosis 100mg/kgBB dengan persentase efektivitas sebesar 66% dan 55%. Pada pemberian ekstrak etanol batang parang romang dosis 125 mg/kgBB terjadi penurunan volume edema sebesar 0,09 ml atau 78%, adapun pada dosis 150 mg/kgBB volume edema menurun hingga 0,08 ml

namun persentase efektivitasnya hanya sebesar 56%. Penurunan efektivitas pemberian sampel pada dosis 150 mg/kgBB tersebut disebabkan karena adanya perbedaan berat badan pada hewan coba yang akan menyebabkan perbedaan kenaikan volume cairan pada tabung. Oleh karena itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menyesuaikan berat badan hewan coba pada setiap kelompok untuk menghindari terjadinya perbedaan yang signifikan (Dermiati *et al.*, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Yulistia Budianti Soemarie dalam Uji Aktivitas Antiinflamasi Kuersetin Kulit Bawang Merah (*Allium Cepa L.*) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus Musculus*) menunjukkan bahwa kontrol positif natrium diklofenak memiliki persentase penghambatan sebesar 62,92% dan dosis yang daya antiinflamasinya melebihi perlakuan kontrol positif ialah dosis III 200 mg/kgBB daya antiinflamasi sebesar 73,75% sementara untuk dosis I 50 mg/kgBB dan dosis II 100 mg/kgBB daya antiinflamasinya mendekati dengan perlakuan kontrol positif. Adanya penurunan pada Dosis I, Dosis II dan Dosis III menunjukkan bahwa kuersetin kulit bawang merah dapat berkhasiat sebagai antiinflamasi karena kemampuan menurunkan volume radang pada kaki mencit (Soemarie, 2016).

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan diketahui bahwa kuersetin kulit bawang merah mampu menghambat pembentukan radang pada telapak kaki mencit yang diakibatkan oleh induksi karagenin. Penurunan volume radang pada kaki mencit diduga karena aktivitas dari senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam kulit bawang merah yaitu senyawa flavonoid dimana salah satu senyawa yang diduga memberikan aktivitas antiinflamasi ialah senyawa kuersetin. Senyawa flavonoid dapat menghambat inflamasi dengan cara menghambat enzim

siklooksigenase dan enzim lipooksigenase pada saat metabolisme asam arakhidonat, sehingga mediator inflamasi leukotrin, histamin, bradikinin, tromboksan dan prostaglandin terhambat. Flavonoid bekerja dengan menghambat fase penting dalam biosintesis prostaglandin, yaitu pada jalur enzim siklooksigenase (Soemarie, 2016).

Salah satu tinjauan Islam yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dijelaskan melalui surah Asy- Syu'ara/26: 7. Dimana Allah swt. Berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” ( *Terjemah Kemenag 2019*)

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh, Tuhanmu Dialah Yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut, Allah menunjukkan bukti kemahakuasaan-Nya dengan menciptakan muka bumi beserta seluruh isinya termasuk tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak Allah tumbuhkan yang luasnya sampai batas mata memandang. Dari tumbuhan itu sungguh berbagai kebaikan yang Allah berikan termasuk tumbuhan obat-obatan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Salah satu tumbuhan ciptaan Allah swt. adalah tumbuhan parang romang. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa batang parang romang dapat dimanfaatkan sebagai obat analgesik (anti nyeri), antipiretik (penurun demam), dan antiinflamasi (anti radang).



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan :

1. Kandungan kimia flavonoid yang dimiliki ekstrak etanol batang parang romang terbukti memiliki efek analgesik, antipiretik dan antiinflamasi pada mencit (*Mus Musculus*).
2. Setiap kelompok perlakuan uji diberikan variasi dosis yang berbeda-beda, dosis efektif uji analgesik ditunjukkan oleh pemberian ekstrak sampel dengan dosis 25 mg/kgBB, sedangkan dosis efektif pemberian uji antipiretik dihasilkan oleh dosis 100 mg/kgBB, adapun dosis efektif pemberian uji antiinflamasi ditunjukkan oleh dosis pemberian 100 mg/kgBB.

#### B. *Saran*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat dikemukakan saran kepada peneliti selanjutnya bahwa untuk menghasilkan kualitas hasil uji coba yang lebih berefek, sebaiknya menggunakan dosis yang lebih bervariasi dari penelitian sebelumnya, baik itu dosis yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Selain itu, diharapkan kepada peneliti selanjutnya juga menggunakan waktu yang lebih bervariasi agar memperoleh hasil uji coba yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA. Hesti Wulan S., Uning Rininingsih EM., dan I. P. S. (2019). *Uji Efek Analgetik Antipiretik Ekstrak Etanol Alfalfa (Medicago Sativa) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar*. 71–77.
- Afrianti, R., Yenti, R., & Meustika, D. (2015). Uji Aktifitas Analgetik Ekstrak Etanol Daun Pepaya (*Carica papaya L.*) pada Mencit Putih Jantan yang di Induksi Asam Asetat 1%. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.29208/jsfk.2014.1.1.12>
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. (2022). Kompleks Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd.
- Angreani, D., Sangi, M. S., & Fatimah, F. (2020). Aktivitas Anti-Inflamasi Ekstrak Etanol Tepung Pelepah Aren (*Arenga Pinnanta*). *Chemistry Progress*, 13(2), 123–127. <https://doi.org/10.35799/cp.13.2.2020.31894>
- Anwar, K., Riswandi, M., & Nurlily, N. (2019). Perbandingan Aktivitas Analgetik Infusa dan Ekstrak Etanol Umbi Akar Tawas Ut (*Ampelocissus rubiginosa Lauterb.*). *Jurnal Pharmascience*, 6(2), 40. <https://doi.org/10.20527/jps.v6i2.7349>
- Bajuber, Q., Indiastuti, D. N., & Kusuma, E. (2020). Efek Analgesik Ekstrak Etanol Zingiber cassumunar Roxb. pada Mencit dengan Metode Writhing Test. *Jurnal Medik Veteriner*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.45-50>
- Baqii, M. F. A. (1991). *Shohibul Muslim*.
- Bidanti, H. A., Slamet, & Prambu, D. B. (2020). Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Batang Kecombrang (*Etingera elatior ( Jack ) R . M . S . m .*) Terhadap Kelinci Jantan Lokal (*Oryctolagus cuniculus*) Antipyretic Activity Test Of Ethanol Extract Of Kecombrang Stem (*Etingera elatior ( Jack ) R*. *Skripsi*, 1–5.
- Chen, L., Deng, H., Cui, H., Fang, J., Zuo, Z., Deng, J., Li, Y., Wang, X., & Zhao, L. (2018). Inflammatory responses and inflammation-associated diseases in organs. *Oncotarget*, 9(6), 7204–7218. [www.impactjournals.com/oncotarget/](http://www.impactjournals.com/oncotarget/)
- Darmayanti, N. P. O., Artini, N. P. R., & Budhi Setiawan, P. Y. (2020). Uji AKTIVITAS ANALGETIK EKSTRAK ETANOL 96% DAUN BELIMBING WULUH (*Averrhoa bilimbi L.*) DENGAN METODE GELIAT PADA MENCIT PUTIH (*Mus musculus L*) GALUR SWISS WEBSTER. *Widya Kesehatan*, 2(2), 30–34. <https://doi.org/10.32795/widyakesehatan.v2i2.963>
- Depkes. (2006). *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*.
- Dermiati, T., Kamal, A., Tibe, F., & Anggi, V. (2018). Uji Antiinflamasi Ekstrak Etanol Kulit Batang Ceremai (*Phyllanthus Acidus L.Skell*) Terhadap Edema Kaki Tikus. *Farmakologika Jurnal Farmasi*, XV(1), 1–8.

- dr. Iwan Alfanie, M.Kes., Sp.F., S. ., dr. Nila Nirmalasari, M.Sc., S. F., & Arizal, dr. M. H. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Malang Fakultas Kedokteran UNIBRAW.
- Ganong, W. f. (2015). *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran* (24th ed.). EGC.
- Gilman, G. (2018). The Pharmacological Basis of Therapeutics Dalam Dasar Farmakologi Terapi 12th edition. In *Fundamentals of Antimicrobial Pharmacokinetics and Pharmacodynamics* (edisi 13). [https://doi.org/10.1007/978-0-387-75613-4\\_9](https://doi.org/10.1007/978-0-387-75613-4_9)
- Hall, G. and. (2020). Medical Physiology Twelfth Edition. In *edisi 14* (Vol. 4, Issue 1). penerbit Buku Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Hardiyanti, R. (2019). Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Jeruk Purut (*Citrus Hystrix D.C*) Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan. *Skripsi, Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara*, 95.
- Hartono, I. R. (2018). Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Buah Labu Siam [*Sechium Edule* (Jack.)Sw.] Terhadap Jumlah Leukosit Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Karagenan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Haulani, J. (2020). Uji Antipiretik Ekstrak Etanol Herba bandotan (*Ageratum conyzoides L.*) Pada Mencit (*Mus musculus*) yang diinduksi Dengan Ragi. *Skripsi*, 1–79.
- Jannah, M. (2021). *Uji Aktivitas Antidiare Ekstrak Etanol Daun Ciplukan(Physalis angulata Linn.) Pada Tikus Jantan Yang Diinduksi Oleum Ricini*. 6.
- Katzung, B., Masters, S., & Trevor, A. (2019). *Basic and Clinical Pharmacology* (12th ed.). McGraw Hill Medical.
- Lara, A. D., Elisma, & Sani, F. K. (2021). Uji Aktivitas Analgesik Infusa Daun Jeruju (*Acanthus ilicifolius L.*) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*) Test The Analgesic Activity Of Jeruju Leaf Infusion (*Acanthus ilicifolius L.*) On Male White Mice (*Mus musculus*). *Indonesian Journal of Pharma Science*, 3(2), 71–80.
- Lubis, N. L. (2016). *Depresi Tinjauan Psiologi*. Prenada Media Group.
- Luliana, S., Susanti, R., & Agustina, E. (2017). Antiinflammatory Activity Test of Aqueous Extracts Herb of Ciplukan (*Physalis angulata L.*) in Caragenan Inducted Wistar Rat (*Rattus norvegicus L.*). *Majalah Obat Tradisional*, 22(3), 199. <https://doi.org/10.22146/mot.31556>
- Musdar, musdar azizi. (2012). *Uji Aktivitas Anti Diare Ekstrak Etanol Daun Salam (Poliyanthi folium) Pada Mencit (Mus musculus) Yang Diinduksi Oleum Ricini*. *Kolisch 1996*, 49–56.
- Odding, H. A. (2016). Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Srikaya (*Annona Squamosa Linn.*) Terhadap Mencit (*Mus Musculus*) Jantan. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://w>

ww.revistaalad.com/pdfs/Guias\_ALAD\_11\_Nov\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.

- Paramita, A. T. (2017). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Akar Parang Romang (*Boehmeria Virgata* (Forst.) Guill) Terhadap Penurunan Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*). In *Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Prof. Drs. Moh. Anief, A. (2019). *Ilmu Meracik Obat*. Gadjah Mada University Press.
- R.Domer, F. (1971). *Animal Experiments in Pharmacological Analysis*. Charles Thomas Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=Wjr9u1AAht4C>
- Rahmi, A., Afriani, T., & Sari, L. P. (2021). Uji Aktivitas Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Sembung (*Blumea balsamifera*) secara In Vivo terhadap Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*). *Majalah Farmasi Dan Farmakologi*, 25(1), 7–10. <https://doi.org/10.20956/mff.v25i1.11961>
- Rahmiani, D. (2019). Penetapan Parameter Non Spesifik Ekstrak Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata* (Forst) Guill. ). 45(45), 95–98.
- Rose, S. (2017). info komoditi tanaman obat. *Learning Disability Practice*, 5(4), 28–29. <https://doi.org/10.7748/ldp.5.4.28.s16>
- Rusdi, M., Hasan, T., Ardillah, A., & Evianti, E. (2018). Perbandingan Metode Ekstraksi terhadap Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Batang *Boehmeria virgata*. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.24252/djps.v1i1.6426>
- Rusdi, M., Ida, N., & Vebriana, A. (2016). Uji Antihiperlipemik Fraksi Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst) Guill) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) Jantan. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 9(2). <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.9.2.i-iii>
- Rusdi, M., Ikhlas, M., & Kartikasari, N. P. (2021). Antituberculosis Activity of Parang Romang (*Boehmeria virgata* (Forst.) Guill) Stem Extract. *Ad-Dawaa' Journal of Pharmaceutical Sciences*, 4(1), 26–30. <https://doi.org/10.24252/djps.v4i1.21359>
- Sa'adah, N., Chasanah, N., Pertami, S. D. I., Rohmaniar, P. D., Adriansyah, A. A., & Ulah, A. M. (2022). Efek analgesik ekstrak daun trembesi (*Samanea Saman* (jacq.) Merr.) terhadap mencit putih (*Mus musculus*). *Padjadjaran Journal of Dental Researchers and Students*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.24198/pjdrs.v6i2.38880>
- Sari, K. W. (2019). Uji Efektivitas Antiinflamasi Kombinasi Ekstrak Herba *Seledri* (*Apium Graveolens* L.) Dan Daun Binahong (*Anredera Cordifolia* (Ten.) Steenis) Pada Tikus Putih. 45(45), 95–98.
- Setiawan, A. A., Megawati, S., & Nisa, D. (2016). Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah (*Piper Crocatum* Ruiz And Pav) Sebagai Antiinflamasi Pada Tikus Putih Jantan Galur Sprague-Dawley. III(1), 1–6.
- Sherwood, L. (2019). Fisiologi Manusia Dari Sel ke Sistem. *Departemen*

*Farmakologi Dan Terapeutik Farmakologi Dan Terapi.*, 9. Jakarta

- Shihab, M. Q. (2006). *tafsir al-misbah*. penerbit Lentera hati.
- Soemarie, Y. B. (2016). Uji Aktivitas Antiinflamasi Kuersetin Kulit Bawang Merah (*Allium cepa* L.) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*). *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 1(2), 163–172.
- Sudewa, I. B. A., & Budiarta, I. G. (2017). Siklooksigenase, Jalur Arakidonat, Dan Nonsteroidal Antiinflammatory Drugs. *Anestesiologi Dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana*, 1–19.
- Tazuyyun, S. . (2020). *Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum citriodorum) Terhadap Kadar Superoksida Dismutase (SOD) Paru Tikus Wistar Setelah Paparan Asap Rokok*. 000, 137.
- Tjay, D. H., & Rahadja, D. K. (2022). *Obat-obat Penting Edisi Delapan* (edisi VIII). PT Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=gk5JDwAAQBAJPT>. elex media komputindo
- Triswanto Sentat, F. H. (2018). *Uji Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Biji Lamtoro (Leucaena Leucocephala L.) Terhadap Udem Telapak Kaki Mencit Yang Diinduksi Karagenin*. 6(1), 84–89.
- Wardani, I. G. A. A. K., Putra, I. M. A. S., Adrianta, K. A., & Udayani, N. N. W. (2021). Efektivitas Analgesik Ekstrak Etil Asetat Daun Kersen ( *Muntingia Calabura* L.) Pada Mencit Putih ( *Mus Musculus*) Dengan Metode Rangsangan Panas (Hot Plate Method). *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 7(1), 8–12. <https://doi.org/10.36733/medicamento.v7i1.1385>
- Widianti, Z. (2017). Efek antiinflamasi ekstrak etanol daun zaitun (*Olea europaea* L.) pada edema telapak kaki tikus galur Sprague-Dawley jantan yang diinduksi karagenan. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Wilmot-Dear, C. M., & Friis, I. (2013). The Old World species of *Boehmeria* (Urticaceae, tribus Boehmerieae). A taxonomic revision. In *Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography* (Vol. 58, Issue 2). <https://doi.org/10.3767/000651913X674116>
- Winangsih, Prihastanti, E., & Parman, S. (2013). Pengaruh Metode Pengeringan Terhadap Kualitas Simplisia. *Buletin Anatomi Dan Fisiologi*, 21(1), 19–25.
- Yuliani, N. N., Sambara, J., & Setyarini, Y. (2016). Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Kulit Batang Faloak (*Sterculia* sp.) Pada Mencit Putih Jantan (*Mus musculus*) Yang Diinduksi Vaksi DPT-HB. *Jurnal Info Kesehatan*, 14(2), 1208–1226.
- Zapino, T., & Fitri, C. (2022). *Kamus Nomenklatur Flora & Fauna*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=uzZjEAAAQBAJ>
- Zulkifli, & Octaviani, E. E. (2019). Uji Efek Analgetik Ekstrak Akar Binasa (*Plumbago indica* L) Asal Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap Mencit Dengan Metode Writhing Reflex Test. *Jurnal Herbal Indonesia*, 1(1), 43–49.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kode Etik



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED*  
"ETHICAL EXPEDITED"

No. A.0109/KEPK/FKIK/III/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Maria Ulfa  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"UJI AKTIVITAS ANTIPIRETIK, ANALGESIK DAN ANTIINFLAMASI EKSTRAK ETANOL BATANG PARANG ROMANG  
(Boehmeria Virgata [Forst] Guill) PADA MENCIT (Mus musculus)"**

"ANTIPIRETIC, ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY TESTS OF MAKE ROMANG (Boehmeria Virgata  
[Forst] Guill) ETHANOL EXTRACT IN MICE (Mus musculus)"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024  
*This declaration of ethics applies during the period March 8, 2023 until March 8, 2024*


March 8, 2023

and Chairperson,



DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian Universitas Muslim Indonesia



Kami selaku Kepala Laboratorium Pengujian Praktek Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Mariya Ulfah  
 NIM : 70100118005  
 Institusi : Prodi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Telah selesai melakukan penelitian di Laboratorium Pengujian Praktek Farmasi Universitas Muslim Indonesia dengan judul penelitian sebagai berikut :

**Uji aktivitas analgesik, antipiretik dan antiinflamasi ekstrak etanol batang parang romang (*boehmeria virgata* (forst) guill) pada mencit (*mus musculus*)**


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 FEBRUARI 2023  
 Kepala Laboratorium Pengujian Praktek  
 Fakultas Farmasi UMI  
  
 apt. Bayu Putra, S.Farm., M.Sc.


Lampiran 3. Skema Kerja Persiapan Ekstraksi Sampel




Lampiran 4. Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Analgesik



## Lampiran 5 Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antipiretik



Lampiran 6. Skema Kerja Proses Uji Aktivitas Antiinflamasi



## Lampiran 7. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

## Ekstrak Etanol Batang Parang Romang (EEBPR)

Berat simplisia basah parang romang : 5,7 kg

Berat simplisia kering parang romang : 4,5 kg

Berat serbuk simplisia parang romang : 0,43 kg (430 gr)

Berat EEBPR : 35 gr

$$\text{Susut pengeringan} = \frac{\text{berat simplisia basah} - \text{berat simplisia kering}}{\text{berat simplisia basah}} \times 100\%$$

$$= \frac{5700 - 4500}{4500} \times 100\%$$

$$= 26,6\%$$

$$\text{Randemen} = \frac{\text{berat ekstrak kental yang diperoleh}}{\text{berat simplisia yang dimaserasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{35 \text{ gr}}{430 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 8,13\%$$

### Lampiran 8. Perhitungan Kontrol Positif Paracetamol

Dosis paracetamol 500 mg untuk manusia, dan factor konversi manusia 70 kg BB untuk mencit 30 gr adalah 0,0026.

$$\begin{aligned} \text{Dosis hewan} &= DO \times FK \times \frac{\text{berat mencit ditimbang}}{\text{berat mencit standar}} \\ &= 500 \text{ mg} \times 0,0026 \times \frac{30 \text{ gr}}{20 \text{ gr}} \\ &= 1,95 \text{ mg} \end{aligned}$$

Menurut FI edisi III penetapan kadar tablet = 20 tablet, maka diambil 20 tablet paracetamol, digerus, dan ditimbang berat totalnya = 12059 mg

$$\begin{aligned} \text{Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 20 tablet}}{20} \\ &= \frac{12059 \text{ mg}}{20} \\ &= 602,95 \text{ mg} \\ \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{\text{dosis hewan}}{DO} \times \text{berat rata-rata} \\ &= \frac{1,95 \text{ mg}}{500 \text{ mg}} \times 602,95 \text{ mg} \\ &= 0,0039 \times 602,95 \text{ mg} \\ &= 2,3 \text{ mg} \end{aligned}$$

Pembuatan sediaan suspensi paracetamol : ditimbang 230 mg (2,3 mg × 100 ml) paracetamol yang telah digerus, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC 1%.

### Lampiran 9. Perhitungan Kontrol Positif Natrium Diklofenak

Dosis natrium diklofenak 50 mg untuk manusia, dan factor konversi manusia 70 kg BB untuk mencit 30 gr adalah 0,0026.

$$\begin{aligned} \text{Dosis hewan} &= DO \times FK \times \frac{\text{berat mencit ditimbang}}{\text{berat mencit standar}} \\ &= 50 \text{ mg} \times 0,0026 \times \frac{30 \text{ gr}}{20 \text{ gr}} \\ &= 0,195 \text{ mg} \end{aligned}$$

Jadi, untuk membuat larutan natrium diklofenak : ditimbang 10 tablet natrium diklofenak = 1,8 g atau 1800 mg

$$\begin{aligned} \text{Berat rata-rata} &= \frac{\text{berat 10 tablet}}{10} \\ &= \frac{1800 \text{ mg}}{10} \\ &= 180 \text{ mg} \\ \text{Berat yang ditimbang} &= \frac{\text{dosis hewan}}{DO} \times \text{berat rata-rata} \\ &= \frac{0,195 \text{ mg}}{50 \text{ mg}} \times 180 \text{ mg} \\ &= 0,0039 \times 180 \text{ mg} \\ &= 2,3 \text{ mg} \end{aligned}$$

Volume maksimal peroral mencit = 1 ml

$$\begin{aligned} \text{Yang akan dibuat 100 ml, jadi} &= \frac{100 \text{ ml}}{1 \text{ ml}} \times 0,702 \text{ mg} \\ &= 70,2 \text{ mg} \end{aligned}$$

Pembuatan sediaan suspensi natrium diklofenak: ditimbang 7,020 mg (70,2 mg × 100 ml) paracetamol yang telah digerus, kemudian dilarutkan dalam 100 ml Na-CMC 1%.

## Lampiran 10. Dosis Pemberian Uji Analgesik

Rata-rata berat mencit = 30 gr

$$a. \text{ Dosis } 25 \text{ mg/kg BB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 25 \text{ mg} = 0,75 \text{ mg}$$

$$b. \text{ Dosis } 50 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 50 \text{ mg} = 1,5 \text{ mg}$$

$$c. \text{ Dosis } 100 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 100 \text{ mg} = 3 \text{ mg}$$

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 3 mg/ml. jadi, untuk membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 300 mg sktrak sampel batang parang romang.

Volume pemberian pada mencit :

$$1. \text{ Dosis } 25 \text{ mg/kg BB} = \frac{25 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 33 \text{ gr} = 0,825 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{0,825 \text{ mg}}{3 \text{ mg/ml}} = 0,275 \text{ ml}$$

$$2. \text{ Dosis } 50 \text{ mg/kgBB} = \frac{50 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 23 \text{ gr} = 1,15 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{1,15 \text{ mg}}{3 \text{ mg/ml}} = 0,383 \text{ ml}$$

$$3. \text{ Dosis } 100 \text{ mg/kgBB} = \frac{100 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 27 \text{ gr} = 2,7 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{2,7 \text{ mg}}{3 \text{ mg/ml}} = 0,9 \text{ ml}$$

## Lampiran 11. Dosis Pemberian Uji Antipiretik

Rata-rata berat mencit = 30 gr

$$a. \text{ Dosis } 100 \text{ mg/kg BB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 100 \text{ mg} = 3 \text{ mg}$$

$$b. \text{ Dosis } 150 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 150 \text{ mg} = 4,5 \text{ mg}$$

$$c. \text{ Dosis } 200 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 200 \text{ mg} = 6 \text{ mg}$$

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 6 mg/ml. jadi, untuk membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 600 mg sktrak sampel batang parang romang.

Volume pemberian pada mencit :

$$1. \text{ Dosis } 100 \text{ mg/kg BB} = \frac{100 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 30 \text{ gr} = 3 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{3 \text{ mg}}{6 \text{ mg/ml}} = 0,5 \text{ ml}$$

$$2. \text{ Dosis } 150 \text{ mg/kgBB} = \frac{150 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 29 \text{ gr} = 4,35 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{4,35 \text{ mg}}{6 \text{ mg/ml}} = 0,725 \text{ ml}$$

$$3. \text{ Dosis } 200 \text{ mg/kgBB} = \frac{200 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 26 \text{ gr} = 5,2 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{5,2 \text{ mg}}{6 \text{ mg/ml}} = 0,86 \text{ ml}$$

## Lampiran 12. Dosis Pemberian Antiinflamasi

Rata-rata berat mencit = 30 gr

$$\text{a. Dosis } 100 \text{ mg/kg BB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 100 \text{ mg} = 3 \text{ mg}$$

$$\text{b. Dosis } 125 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 125 \text{ mg} = 3,75 \text{ mg}$$

$$\text{c. Dosis } 150 \text{ mg/kgBB} = \frac{30 \text{ gr}}{1000 \text{ gr}} \times 150 \text{ mg} = 4,5 \text{ mg}$$

Larutan stok ekstrak etanol batang parang romang 4,5 mg/ml. jadi, untuk membuat 100ml larutan stok maka dibutuhkan 450 mg sktrak sampel batang parang romang.

Volume pemberian pada mencit :

$$1. \text{ Dosis } 100 \text{ mg/kg BB} = \frac{100 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 23 \text{ gr} = 2,3 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{2,3 \text{ mg}}{4,5 \text{ mg/ml}} = 0,5 \text{ ml}$$

$$2. \text{ Dosis } 125 \text{ mg/kgBB} = \frac{125 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 29 \text{ gr} = 3,6 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{3,6 \text{ mg}}{4,5 \text{ mg/ml}} = 0,8 \text{ ml}$$

$$3. \text{ Dosis } 150 \text{ mg/kgBB} = \frac{150 \text{ mg}}{1000 \text{ gr}} \times 27 \text{ gr} = 4,05 \text{ mg}$$

$$\text{Volume pemberian} = \frac{4,05 \text{ mg}}{4,5 \text{ mg/ml}} = 0,9 \text{ ml}$$

## Lampiran 13. Perhitungan Besar Penghambatan Jumlah Geliat

Tabel 4. Data Uji Analgesik

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-												Total
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Suspensi Na-CMC	1	20	16	13	12	9	9	6	5	6	5	4	2	107
	2	27	23	20	19	21	10	11	8	7	4	3	2	155
	3	25	19	17	15	17	15	13	9	10	4	5	4	153

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-												Total
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
Suspensi paracetamol	1	15	13	10	9	9	8	7	5	4	3	2	1	86
	2	15	13	12	10	11	9	8	7	5	4	3	2	99
	3	15	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	83

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-												Total
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
EEBPR 25 mg/kgBB	1	12	10	11	8	9	8	5	6	4	5	3	2	83
	2	10	11	9	8	7	7	8	5	6	4	3	3	81
	3	15	18	12	9	8	9	8	7	5	4	3	1	99

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-												Total
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
EEBPR 50 mg/kgBB	1	11	10	11	8	7	5	5	6	5	4	1	1	74
	2	13	11	9	9	7	6	7	5	4	2	2	1	76
	3	11	10	9	8	7	7	6	4	3	3	1	1	70

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-												Total
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
EEBPR 100 mg/kgBB	1	8	6	7	5	9	6	6	4	3	1	0	1	56
	2	10	8	9	6	5	7	6	4	5	3	1	1	65
	3	8	9	7	6	5	5	4	5	3	4	1	0	57

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

Jumlah geliat Na-CMC = 138

Jumlah geliat paracetamol = 89

Jumlah geliat dosis 25mg/kgBB EEBPR = 87

Jumlah geliat dosis 50mg/kgBB EEBPR = 73

Jumlah geliat dosis 100mg/kgBB EEBPR = 59

% penghambatan =  $100 - \left( \frac{\text{jumlah kumulatif geliat hewan uji setelah pemberian obat}}{\text{jumlah kumulatif geliat kel.kontrol negatif}} \right)$

× 100%

Contoh perhitungan persentase penghambatan uji analgesik:

$$\begin{aligned} \text{Paracetamol} &= 100 - \left( \frac{89}{138} \right) \times 100\% \\ &= 100 - 64,49 \\ &= 35,51\% \end{aligned}$$

## Lampiran 14. Perhitungan Persentase Daya Antipiretik

Tabel 5. Data Uji Antipiretik

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-								Rata-rata
		T0	T1	10	20	30	40	50	60	
Suspensi Na-CMC	1	35,2	38,6	40,1	39,7	38,6	37,5	37,2	37,1	38
	2	35,6	38,7	39,5	38,9	39,1	38,5	37,8	37,9	38,2
	3	35,8	38,4	39,2	38,8	38,3	37,9	37,5	37	37,8

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-								Rata-rata
		T0	T1	10	20	30	40	50	60	
Suspensi paracetamol	1	35,2	38,5	35,9	35,6	35,3	35,1	35,1	34,9	35,7
	2	35,4	38,4	37,7	37,4	36,6	36,7	36,4	35,8	36,8
	3	35,1	38,1	37,6	37,1	36,5	36,2	35,7	35,5	36,4

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-								Rata-rata
		T0	T1	10	20	30	40	50	60	
EEBPR dosis 100 mg/kgBB	1	35,6	38,6	37,5	36,9	37,1	36,8	36,5	36,1	36,8
	2	35,4	38,5	37,8	36,9	36,7	36,3	35,8	34,1	36,4
	3	35,7	38,7	38,7	38,3	37,6	36,4	36,1	35,5	37,1

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-								Rata-rata
		T0	T1	10	20	30	40	50	60	
EEBPR dosis 150 mg/kgBB	1	35,2	38,7	36,7	37,1	36,4	36,3	36,1	35,9	36,5
	2	35,5	38,2	35,7	35,4	36,2	35,3	35,1	34,8	35,7
	3	35,3	38,5	36,7	37,1	36,1	35,8	35,7	34,1	36,1

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-								Rata-rata
		T0	T1	10	20	30	40	50	60	
EEBPR dosis 200 mg/kgBB	1	35,1	38,4	36,8	35,5	35,3	34,7	35,2	34,9	35,7
	2	35,8	38,1	37,2	36,8	35,5	34,7	34,7	34,5	35,9
	3	35,6	38,4	35,9	35,6	35,3	35,1	35,1	34,9	35,7

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

$$\% \text{ daya antipiretik} = \frac{T_1 - t_n}{T_1 - T_0} \times 100\%$$

Ket :

$T_0$  = suhu sebelum diinduksi

$T_1$  = suhu setelah diinduksi

$T_n$  = suhu pada menit (10,20,30.....)

Contoh perhitungan persentase daya antipiretik :

$$\begin{aligned} T_{10} &= \frac{T_1 - t_n}{T_1 - T_0} \times 100\% \\ &= \frac{38,5 - 39,6}{38,5 - 35,5} \times 100\% \\ &= \frac{-1,1}{3} \times 100\% \\ &= -36,6\% \end{aligned}$$

## Lampiran 15. Perhitungan Persentase Daya Antiinflamasi

Tabel 6. Data Uji Antiinflamasi

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-							Jumlah
		T0	T1	30	60	90	120	150	
Suspensi Na-CMC	1	0,05	0,15	0,15	0,16	0,17	0,18	0,17	1,03
	2	0,05	0,15	0,14	0,16	0,18	0,17	0,19	1,04
	3	0,05	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	1,03

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-							Rata-rata
		T0	T1	30	60	90	120	150	
Natrium Diklofenak	1	0,05	0,12	0,14	0,09	0,09	0,08	0,08	0,65
	2	0,06	0,19	0,15	0,13	0,12	0,11	0,11	0,87
	3	0,04	0,07	0,08	0,07	0,06	0,04	0,03	0,39

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-							Rata-rata
		T0	T1	30	60	90	120	150	
EEBPR dosis 100 mg/kgBB	1	0,08	0,21	0,17	0,15	0,14	0,13	0,11	0,99
	2	0,05	0,12	0,16	0,15	0,16	0,13	0,12	0,89
	3	0,05	0,13	0,11	0,1	0,1	0,09	0,09	0,67

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-							Rata-rata
		T0	T1	30	60	90	120	150	
EEBPR dosis 125 mg/kgBB	1	0,06	0,15	0,14	0,12	0,1	0,1	0,08	0,75
	2	0,07	0,12	0,11	0,1	0,09	0,09	0,09	0,67
	3	0,05	0,11	0,1	0,1	0,09	0,07	0,06	0,58

Kelompok perlakuan	Mencit ke-	Pengamatan menit ke-							Rata-rata
		T0	T1	30	60	90	120	150	
EEBPR dosis 150 mg/kgBB	1	0,05	0,12	0,1	0,1	0,09	0,08	0,07	0,61
	2	0,05	0,13	0,12	0,1	0,09	0,07	0,06	0,62
	3	0,04	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,05	0,54

Keterangan : EEBPR = Ekstrak Etanol Batang Parang Romang

Perhitungan persentase edema dan persentase inhibisi edema berdasarkan rumus dibawah ini:

$$\% \text{ edema} = \frac{V_t - V_0}{V_0} \times 100\%$$

Keterangan :

V<sub>t</sub> : volume telapak kaki mencit tiap kelompok pada waktu

V<sub>0</sub> : volume telapak kaki mencit tiap kelompok sebelum perlakuan apapun

Contoh perhitungan persentase volume edema :

$$\begin{aligned} T_{30} &= \frac{0,14-0,05}{0,05} \times 100\% \\ &= \frac{0,09}{0,05} \times 100\% \\ &= 180\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ inhibisi edema} = \frac{a-b}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

A : % edema kelompok kontrol negatif

B : % edema pada kelompok perlakuan

Rata-rata persentase volume edema setiap kelompok adalah :

$$\text{Na-cmc} = 228\%$$

$$\text{Na. Diklofenak} = 76\%$$

$$\text{Dosis 100mg/kgBB EEBPR} = 102\%$$


$$\text{Dosis 125mg/kgBB EEBPR} = 49\%$$

$$\text{Dosis 150mg/kgBB EEBPR} = 100\%$$

Contoh perhitungan persentase inhibisi edema :

$$\begin{aligned} \text{Na-diklofenak} &= \frac{228-76}{228} \times 100\% \\ &= \frac{152}{228} \times 100\% \\ &= 66,6\% \end{aligned}$$

## Lampiran 16. Dokumentasi proses pengerjaan




Keterangan :

Gambar 8. Proses Pengambilan Sampel Parang Romang (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill)

Gambar 9. Proses Pengeringan Sampel Parang Romang (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill)

Gambar 10. Penyaringan Hasil Rendaman/Maserasi

Gambar 11. Proses Rotary Evaporator



Keterangan :

Gambar 12. Ekstrak Kental Batang Parang Romang (*Boehmeria Virgata* [Forst] Guill)

Gambar 13. Penimbangan Bahan

Gambar 14. Pembuatan Larutan Stok Na-CMC

Gambar 15. Pembuatan Larutan Induksi




Keterangan :

Gambar 16. Proses Adaptasi Hewan Percobaan Mencit (*Mus Musculus*)

Gambar 17. Hewan Percobaan Mencit (*Mus Musculus*)

Gambar 18. Penimbangan Hewan Percobaan Mencit (*Mus Musculus*)

Gambar 19. Pemberian Larutan Induksi Secara Intraperitoneal




Keterangan :

Gambar 20. Respon Geliat Hewan Percobaan Mencit (*Mus Musculus*) Terhadap Uji Analgesik

Gambar 21. Pengukuran Suhu Rektal Mencit (*Mus Musculus*) Terhadap Uji Antipiretik

Gambar 22. Pemberian Larutan Induksi Secara Intraplantar

Gambar 23. Pembentukan Edema Pada Kaki Mencit (*Mus Musculus*)



Keterangan :

Gambar 24. Pemberian Larutan Uji Secara Oral Pada Mencit (*Mus Musculus*)

Gambar 25. Pengukuran Volume Edema Pada Kaki Mencit (*Mus Musculus*) Dalam Pletismometer

Gambar 26. Pletismometer Digital

## Lampiran 17. Konversi Dosis

	<b>Mencit 20 gr</b>	<b>Tikus 200 gr</b>	<b>Marmot 400 gr</b>	<b>Kelinci 1,5 kg</b>	<b>Kucing 2 kg</b>	<b>Kera 4 kg</b>	<b>Anjing 12 kg</b>	<b>Manusia 70 kg</b>
<b>Mencit 20 gr</b>	1,0	7,0	12,25	27,8	29,7	64,1	124,2	387,9
<b>Tikus 200 gr</b>	0,14	1,0	1,74	3,9	4,2	9,2	17,8	56,0
<b>Marmut 400 gr</b>	0,08	0,57	1,0	2,25	2,4	5,2	10,2	31,5
<b>Kelinci 1,5 kg</b>	0,04	0,25	0,44	1,0	1,08	2,4	4,5	14,2
<b>Kucing 2 kg</b>	0,03	0,23	0,41	0,92	1,0	2,2	4,1	13,0
<b>Kera 4 kg</b>	0,016	0,11	0,19	0,42	0,45	1,0	1,9	6,1
<b>Anjing 12 kg</b>	0,008	0,06	0,1	0,22	0,24	0,52	1,0	3,1
<b>Manusia 70 kg</b>	0,0026	0,018	0,031	0,07	0,076	0,16	0,32	1,0

Keterangan:

- i.v : Intravena
- i.m : Intramuskular
- i.p : Intraperitoneal
- s. c : Subkutan
- p.o : Peroral

## Lampiran 18. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Analgesik

## Descriptives

jumlah geliat

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
kontrol negatif Na-CMC	3	138.33	27.154	15.677	70.88	205.79	107	155
kontrol positif Paracetamol	3	90.33	8.083	4.667	70.25	110.41	83	99
dosis EEBPR 25 mg/KgBB	3	87.67	9.866	5.696	63.16	112.17	81	99
dosis EEBPR 50 mg/KgBB	3	73.33	3.055	1.764	65.74	80.92	70	76
dosis EEBPR 100 mg/KgBB	3	59.33	4.933	2.848	47.08	71.59	56	65
Total	15	89.80	29.936	7.729	73.22	106.38	56	155

## ANOVA

jumlah geliat

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)	10679.067	4	2669.767	14.297	.000
	Linear Term	9187.500	1	9187.500	49.201	.000
	Deviation	1491.567	3	497.189	2.663	.105
Within Groups		1867.333	10	186.733		
Total		12546.400	14			

## jumlah geliat

		kelompok percobaan	N	Subset for alpha = 0.05		
				1	2	3
Duncan <sup>a</sup>	dosis EEBPR 100 mg/KgBB		3	59.33		
	dosis EEBPR 50 mg/KgBB		3	73.33	73.33	
	dosis EEBPR 25 mg/KgBB		3		87.67	
	kontrol positif Paracetamol		3		90.33	
	kontrol negatif Na-CMC		3			138.33
	Sig.				.238	.176

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## Lampiran 19. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antipiretik

## Descriptives

suhu rectal

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
kontrol negatif Na-CMC	3	38.000	.2000	.1155	37.503	38.497	37.8	38.2
kontrol positif paracetamol	3	36.300	.5568	.3215	34.917	37.683	35.7	36.8
dosis 100 mg/kgBB EEBPR	3	36.767	.3512	.2028	35.894	37.639	36.4	37.1
dosis 150 mg/kgBB EEBPR	3	36.100	.4000	.2309	35.106	37.094	35.7	36.5
dosis 200 mg/kgBB EEBPR	3	35.767	.1155	.0667	35.480	36.054	35.7	35.9
Total	15	36.587	.8601	.2221	36.110	37.063	35.7	38.2

## ANOVA

suhu rectal

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)	9.064	4	2.266	17.521	.000
	Linear Term	6.533	1	6.533	50.515	.000
	Deviation	2.531	3	.844	6.522	.010
Within Groups		1.293	10	.129		
Total		10.357	14			

## suhu rectal

Duncan<sup>a</sup>

kelompok uji	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
dosis 200 mg/kgBB EEBPR	3	35.767		
dosis 150 mg/kgBB EEBPR	3	36.100	36.100	
kontrol positif paracetamol	3	36.300	36.300	
dosis 100 mg/kgBB EEBPR	3		36.767	
kontrol negatif Na-CMC	3			38.000
Sig.		.113	.055	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## Lampiran 20. Tabel Hasil Analisis Statistik Uji Antiinflamasi

**Descriptives**

volume edema

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
kontrol negatif Na-Cmc	3	1.0333	.00577	.00333	1.0190	1.0477	1.03	1.04
kontrol positif Natrium Diklofenak	3	.0867	.03512	.02028	-.0006	.1739	.05	.12
Dosis 100mg/kgBB EEBPR	3	.1167	.02517	.01453	.0542	.1792	.09	.14
Dosis 125mg/kgBB EEBPR	3	.0900	.01000	.00577	.0652	.1148	.08	.10
Dosis 150mg/kgBB EEBPR	3	.0767	.00577	.00333	.0623	.0910	.07	.08
Total	15	.2807	.39016	.10074	.0646	.4967	.05	1.04

**ANOVA**

volume edema

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	(Combined)	2.127	4	.532	1307.598	.000
	Linear Term	1.094	1	1.094	2691.221	.000
	Contrast	1.033	3	.344	846.391	.000
	Deviation					
Within Groups		.004	10	.000		
Total		2.131	14			

**volume edema**Duncan<sup>a</sup>

kelompok percobaan	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Dosis 150mg/kgBB EEBPR	3	.0767		
kontrol positif Natrium Diklofenak	3	.0867	.0867	
Dosis 125mg/kgBB EEBPR	3	.0900	.0900	
Dosis 100mg/kgBB EEBPR	3		.1167	
kontrol negatif Na-Cmc	3			1.0333
Sig.		.458	.112	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## RIWAYAT HIDUP



Mariya ulfah atau kerab disapa Ulfah adalah anak kedua dari empat bersaudara dan merupakan buah cinta dari pasangan bapak M.Asaf dan Hamdana yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1999.

Penulis memulai pendidikan awal di TK Pertiwi Takalala selama 1 tahun, kemudian tahun 2006 penulis melanjutkan pendidikannya dibangku Sekolah Dasar 136 Labessi selama 6 tahun. Seusai tamat pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di Pesantren DDI Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan selama 6 tahun. Pendidikan Pesantren Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah setara dengan sekolah pada umumnya. Setelah tamat di Pesantren tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dengan mengambil konsentrasi studi jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.