

**UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN
KEMANGI (*Ocimum basilicum L.*) TERHADAP BAKTERI
ULKUS DIABETIK**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MIFTAHUL FATIHAH
70100118012

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Fatihah
NIM : 70100118012
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 28 September 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Pao-Pao Permai F7/29
Judul : “Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa dia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 11 April 2023

Penyusun



Miftahul Fatihah
NIM. 70100118012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum.L*) terhadap Bakteri Ulkus Diabetik" yang disusun oleh Miftahul Fatihah, NIM: 70100118012, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 April 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 11 April 2023
21 Ramadhan 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Apt., H. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Apt., Munifah Wahuddin, S. Farm., M. Sc	(.....)
Penguji I	: Dr. apt., Mukhriani, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Asrul Muslim, S. Ag., M. Pd	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai Rahmatan lil’alamin dan menyebarkan dakwah Islam sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Salam serta shalawat juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Dalam perjalanan menyelesaikan studi selama ini penulis tidak memungkiri adanya dukungan-dukungan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta kepada ayahanda Bapak Nadering dan Ibunda Harlina Sani yang telah mendoakan, memberikan seluruh kasih dan sayang serta pengorbanaan dan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis. Serta kepada wali orangtua terkasih bapak Wahyuddin, S. Pd dan Ibu Andi Tenri Yampa, S. Pd, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. M. Faris Satrianegara S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik.
7. Ibu apt. Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak apt. H. Muh. Rusdi., S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
9. Ibu apt. Munifah Wahyuddin, S. Farm., M.Sc., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.

10. Ibu Dr. apt. Mukhriani, S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd., selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukan dalam bidang ilmu Agama Islam di skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tulus dan ikhlas dalam memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, semoga Allah swt membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Teman-teman SUSPENSI Farmasi Angkatan 2018 yang tidak henti-hentinya saling menyemangati dan merangkul selama penyusunan skripsi
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan Farmasi dan masyarakat, serta bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 11 April 2023

Penulis




Miftahul Fatimah
NIM. 70100118012

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	4
D. <i>Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu</i>	5
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	8
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. <i>Uraian Tanaman</i>	9
B. <i>Ulkus Diabetik</i>	12
C. <i>Antibakteri</i>	19
D. <i>Uji Efektivitas Antibakteri</i>	20
E. <i>Senyawa Aktif Antibakteri dari Daun Kemangi (<i>Ocimum bacilisium L</i>)</i>	24
F. <i>A Metode Ekstraksi Bahan Alam</i>	27
G. <i>Pemilihan Pelarut</i>	31
H. <i>Tinjauan Islam</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. <i>Jenis Penelitian</i>	36
B. <i>Pendekatan Penelitian</i>	36
C. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	36
D. <i>Alat dan Bahan</i>	37

E. <i>Prosedur Kerja</i>	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. <i>Hasil Penelitian</i>	43
B. <i>Pembahasan</i>	47
BAB V PENUTUP	60
A. <i>Kesimpulan</i>	60
B. <i>Saran</i>	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Wagner-Merrit	15
Tabel 2. Tingkat keparahan ulkus erugino secara klinis	16
Tabel 3. Pengukuran Diameter Zona Hambat	41
Tabel 4. Hasil Ekstraksi Daun Kemangi	43
Tabel 5. Hasil Uji Skrining Fitokimia	44
Tabel 6. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	44
Tabel 7. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Providencia stuartii</i>	45
Tabel 8. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Citrobacter freundii</i>	45
Tabel 9. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Pseudomonas luteola</i>	45
Tabel 10. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Burkholderia cepacia</i>	46
Tabel 11. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Acinetobacter bumannii</i>	45
Tabel 12. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri <i>Proteus merabillis</i>	46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tumbuhan Kemangi (<i>Ocimum basilicum L</i>) (Depkes, 2001).....	9
Gambar 2. Patofisiologi Ulkus Diabetik	14
Gambar 3. Regimen Antibiotik untuk Ulkus Diabetikum.....	19
Gambar 4. Sampel Daun Kemangi (<i>Ocimum basilicum L</i>).....	75
Gambar 5. Skrining Fitokimia.....	76
Gambar 6. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba.....	77
Gambar 7. Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri <i>Pseudomonas eruginos</i>	78
Gambar 8. Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri <i>Providencia stuartii</i>	78
Gambar 9. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri <i>Citrobacter freundii</i> 79	
Gambar 10. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri <i>Pseudomonas luteola</i>	79
Gambar 11. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri <i>Burkholderia cepacia</i>	80
Gambar 12. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri <i>Acinetobacter baumannii</i>	80
Gambar 13. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri <i>Proteus mirabillis</i> ..	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian.....	65
Lampiran 2. Skema Kerja.....	66
Lampiran 3. Perhitungan Seri Konsentrasi Ekstrak Kemangi.....	74
Lampiran 4. Gambar Daun Kemangi	75
Lampiran 5. Hasil Skrining Fitokimia.....	76
Lampiran 6. Pengujian Aktivitas Antibakteri.....	77
Lampiran 7. Hasil Uji Daya Hambat.....	78
Lampiran 8. Perhitungan daerah hambat ekstrak etanol daun kemangi (<i>Ocinum basilicum L.</i>) dengan Metode Analisis Regresi Sederhana pada masing-masing bakteri uji.	82
Lampiran 9. Surat Kode Etik Penelitian.....	87
Lampiran 10. Surat Determinasi Tumbuhan.....	88
Lampiran 11. Surat Penelitian RSP Universitas Hasanuddin	89



ABSTRAK

Nama : Miftahul Fatihah
NIM : 70100118012
Jurusan : Farmasi
Judul Penelitian : Uji Efektivitas Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap Bakteri Ulkus Diabetik

Penderita diabetes di seluruh dunia di tahun 2021 sebesar 537 juta jiwa, pada tahun 2030 menjadi 643 juta jiwa, dan tahun 2045 menjadi 783 jiwa diperkirakan meningkat sebesar 46%. Ulkus diabetikum di Indonesia sebesar 15%, angka amputasi menunjukkan sebesar 30%, selain itu angka kematian 1 tahun setelah amputasi sebesar 14,8%. Salah satu tanaman yang memiliki potensi sebagai antibakteri alami adalah kemangi (*Ocimum basilicum L.*) yang mengandung flavonoid, tannin, dan minyak atsiri yang bersifat sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi dan komponen kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kemangi. Dilakukan uji daya hambat menggunakan metode difusi agar dengan berbagai konsentrasi ekstrak yaitu 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm. Pada uji efektivitas antibakteri diantara kelima perbandingan konsentrasi ekstrak etanol daun kemangi pada konsentrasi 1000 ppm memberikan efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri ulkus diabetikum dengan nilai diameter berbeda-beda : *Pseudomonas aeruginosa* 11 mm (kuat), *Providencia stuartii* 8,6 mm (sedang) , *Citrobacter freundii* 8,5 mm (sedang), *Pseudomonas luteola* 9,3 mm (sedang), *Burkholderia cepacia* 8,5 mm (sedang), *Acinetobacter baumannii* 9,5 mm (sedang), *Proteus merabilis* 6,6 mm (sedang). Berdasarkan hasil analisis data pada hasil uji anova ($\alpha < 0,05$) berbeda makna dari beberapa bakteri ulkus diabetik berpengaruh terhadap konsentrasi ekstrak kemangi terhadap pertumbuhan bakteri.

Kata kunci: *Ocimum basilicum L.*, Ulkus diabetik, difusi agar (*paper disk*).

ABSTRACT

Name : Miftahul Fatihah
Student Registration Number : 70100118012
Departement : Pharmacy
Research Title : Antibacterial Activity Test of Basil Leaf Extract
(*Ocimum basilicum L.*) Against Diabetic Ulcer
Bacteria

Diabetics worldwide in 2021 will be 537 million people, in 2030 it will be 643 million people, and in 2045 it will be 783 people which is expected to increase by 46%. Diabetic ulcers in Indonesia are 15%, the amputation rate is 30%, besides that the mortality rate 1 year after amputation is 14.8%. One of the plants that has potential as a natural antibacterial is basil (*Ocimum basilicum L.*) which contains flavonoids, tannins, and essential oils which have antibacterial properties. This study aims to determine the antibacterial activity of the ethanol extract of basil leaves and the chemical components contained in the ethanol extract of basil leaves. The inhibition test was carried out using the agar diffusion method with various extract concentrations, namely 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, and 1000 ppm. In the antibacterial effectiveness test among the five concentrations of ethanol extract of basil leaves at a concentration of 1000 ppm, it gave the greatest antibacterial effectiveness on the growth of diabetic ulcer bacteria with different diameter values: *Pseudomonas aeruginosa* 11 mm (strong), *Providencia stuartii* 8.6 mm (medium), *Citrobacter freundii* 8.5 mm (medium), *Pseudomonas luteola* 9.3 mm (medium), *Burkholderia cepacia* 8.5 mm (medium), *Acinetobacter baumannii* 9.5 mm (medium), *Proteus merabilis* 6.6 mm (medium). Based on the results of data analysis on the results of the ANOVA test ($\alpha < 0.05$) it differs in meaning from several diabetic ulcer bacteria affecting the concentration of basil extract on bacterial growth.

Keywords: *Ocimum basilicum L.*, Diabetic ulcer, agar diffusion (*paper disc*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ulkus diabetikum adalah kondisi yang biasa dialami oleh penderita diabetes. Kondisi ini ditandai dengan luka terbuka di permukaan kulit sebagai komplikasi penyakit makrovaskular yang menyebabkan kerusakan jaringan pembuluh darah dan neuropati, serta dapat berkembang menjadi infeksi oleh invasi bakteri atau virus yang menjadi tempat strategis pertumbuhan bakteri. (Hendra et al., 2019). Berdasarkan laporan IDF 2021, mengenai prevelensi DM pada tahun 2021 di dunia sebesar 537 juta jiwa (10,5%), pada tahun 2030 menjadi 643 juta jiwa (11,3%), dan pada tahun 2045 menjadi 783 juta jiwa (12,2%) diperkirakan meningkat 46%. Sedangkan penderita DM di wilayah asia tenggara mencapai 90 juta jiwa (10%) meningkat ditahun 2030 sebesar 113 juta jiwa (10,9%) dan 151 juta jiwa (11,3%) di tahun 2045 (IDF 2021). Data Riskesdas tahun 2018, prevelensi diabetes melitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter meningkat di tahun 2013 penduduk dengan umur ≥ 15 tahun sebanyak 1,5%, kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 2%. Prevelensi ulkus diabetikum di Indonesia sebesar 15%, amputasi menunjukkan angka sebesar 30%, selain itu angka kematian 1 tahun setelah amputasi sebesar 14,8%. Prevalensi diabetes berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan perkiraan jumlah penderita diabetes di Indonesia lebih dari 16 juta orang dan jumlah ini terus meningkat. Sebesar 60% mengalami ulkus diabetik sekitar 85% mengalami amputasi terkait diabetes disebabkan oleh ulkus diabetikum. Dan diperkirakan hanya satu dari lima pasien yang melakukan pengobatan untuk masalah ulkus diabetik.

Pada penelitian ini digunakan beberapa jenis bakteri yang menginfeksi pasien ulkus diabetikum antara lain; *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus mirabilis*. Penggunaan bakteri uji ini dikarenakan bakteri tersebut termasuk ke dalam beberapa bakteri patogen yang dapat menginfeksi luka bagian tubuh manusia terutama pada pasien ulkus diabetikum. Salah satu pengobatan ulkus diabetik adalah penggunaan terapi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi antibiotik dan pengobatan yang kurang efektif. Pada penelitian Kuswandi (2011) menunjukkan bahwa untuk mengobati infeksi diperlukan antibiotik yang mampu membunuh kuman secara selektif dan resistensi terjadi jika antibiotik tersebut tidak mampu membunuh kuman atau bakteri, karena tidak dapat mencapai efek terapi yang diinginkan.

Banyak antibiotik sintetik yang telah dikembangkan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, namun penggunaan antibiotik sintetik seringkali dapat menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan bagi tubuh (Aliero, 2008). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan bahan alam seperti bahan antibakteri alami. Pengobatan penyakit menular melibatkan penggunaan agen antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab penyakit infeksi. Agen antibakteri kini telah ditemukan, tetapi beberapa diantaranya tidak digunakan secara efektif karena banyaknya bakteri yang resisten dan efek samping yang merugikan bagi pasien. Oleh karena itu, studi dan penelitian terus dilakukan pada produk antibakteri baru yang berasal dari bahan alam (Wasito, 2011:3).

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati yang kaya, sehingga pengobatan herbal di Indonesia kini banyak disukai (Budiman, dkk. 2014). Dalam

pandangan islam tumbuhan sangat jelas dalam Al-Qur'an. Tumbuhan telah disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai hadiah terbesar. Selain digunakan sebagai bahan makanan, tanaman ini juga memiliki manfaat untuk digunakan sebagai obat. Oleh karena itu, Allah menurunkan tumbuh-tumbuhan untuk dua tujuan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai sumber pangan dan obat-obatan (Budiman, dkk., 2007:223). Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, bahkan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat. Tumbuhan obat telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama ratusan tahun, dicampur dalam satu atau lebih ramuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman (Mangsana,2008:1).

Firman-Nya dalam QS As-Syu'ara/26:7 yaitu:

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama RI, 2018:367).

Salah satu tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional yang memiliki potensi sebagai antibakteri alami adalah kemangi (*Ocimum basilicum* L). Daun kemangi memiliki efek antidiabetes, antibakteri, hipoglikemik, dan antioksidan. Daun kemangi ini mengandung flavonoid, tannin, minyak atsiri yang memiliki sifat antibakteri. Minyak atsiri adalah bahan utama dalam kemangi. Kandungan minyak atsiri daun kemangi dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Bacillus cereus*, *Pseudomonas fluorescens*, *Candida albicans*, *Streptococcus alfa*, dan *Bacillus subtilis* (Threonesia & Ramadhian, 2019). Daun kemangi dapat menghasilkan metabolit sekunder berupa zat antibakteri. Senyawa antibakteri yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri pada ekstrak daun kemangi mampu dikembangkan sebagai sumber bahan antibakteri (Purnamaningsih & Supadmi, 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk menguji efektivitas dari ekstrak daun kemangi dibandingkan dengan antibiotik meropenem terhadap diameter zona hambat bakteri ulkus diabetikum dengan metode difusi agar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Berapa konsentrasi ekstrak etanol 96% daun kemangi (*Ocimum basilicum. L.*) yang memiliki efektivitas antibakteri terhadap ulkus diabetik?
2. Apa saja golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum. L.*)?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Terdapat beberapa macam istilah yang ada pada judul skripsi peneliti, diantaranya:

a. Efektivitas Antibakteri

Efektivitas antibakteri adalah kemampuan ekstrak antibakteri untuk menghambat atau bahkan membunuh pertumbuhan bakteri berbahaya.

b. Ekstrak

Ekstrak adalah zat atau pemisahan senyawa yang dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi dari tanaman obat. Sediaan pekat diperoleh dengan mengekstraksi bahan aktif dari komponen tanaman atau hewan dengan pelarut yang sesuai dan kemudian menguapkan semua atau hampir semua pelarut.

c. Kemangi

Kemangi adalah tanaman semak semusim yang memiliki rasa dan bau khas, di Indonesia biasa dimakan bersama lalapan. Selain itu, kemangi memiliki manfaat bagi kesehatan.

d. Ulkus diabetik

Ulkus diabetik adalah luka terbuka pada penderita diabetes yang terletak di telapak kaki bagian bawah atau samping.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Mikrobiologi RSP Universitas Hasanuddin.

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka mengulas beberapa penemuan hasil peneliti sebelumnya untuk melihat transparansi petunjuk, kegunaan dan letak dari penelitian sebelumnya.

1. Berdasarkan penelitian Rosita (2013) pengaruh minyak atsiri daun kemangi (*Ocimum sanctum L.*) sebagai agen penghambat pembentukan biofilm *Streptococcus mutans*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi minyak atsiri daun kemangi 0,0625%, 0,125%, 0,25%, 0,5%, dan 1% dapat menghambat pembentukan biofilm *S. mutans* sebesar 4,451%, 40,121%, 80,416%, 88,586%, dan 94,812%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah minyak atsiri daun kemangi (*Ocimum sanctum L.*) menghambat pembentukan biofilm *Streptococcus mutans* dengan IC50 pada konsentrasi 0,168%. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik dengan metode Kirby bauer.

2. Berdasarkan penelitian Melati Yulia Kusumastuti (2021) aktivitas antibakteri beberapa fraksi daun kemangi terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* dan melihat fraksi mana yang paling aktif. Hasil skrining fitokimia ekstrak etanol mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tannin dan steroid. Sedangkan hasil skrining fitokimia fraksi kloroform mengandung alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin. Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol dan fraksi kloroform memiliki daya hambat. Konsentrasi 500mg/ml ekstrak etanol dan fraksi kloroform pada bakteri *Staphylococcus aureus* menghasilkan daya hambat sebesar 26,90 - 24,67 mm. Selain itu, pada bakteri *Escherichia coli* menghasilkan 23,84 - 22,67 mm. Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak etanol memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi daripada fraksi kloroform terhadap *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah menguji pengaruh ekstrak kemangi terhadap bakteri ulkus diabetic dengan menggunakan pelarut etanol 96% selama proses perendaman.
3. Berdasarkan penelitian Atika Threnesia (2019) Perbandingan Efek Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (*Ocimum sanctum L.*) terhadap Daya Hambat Pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella typhi* Secara In Vitro. Penelitian ini menggunakan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella typhi* yang diujikan dengan ekstrak etanol daun kemangi pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% kemudian diukur zona hambat yang terbentuk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata diameter zona hambat pada bakteri *Staphylococcus aureus* sebesar 14,96 mm dan *Salmonella typhi* sebesar 8,04 mm. Hasil analisis penelitian dengan menggunakan uji t tidak berpasangan didapatkan $p < 0,05$. Ekstrak

daun kemangi memiliki aktifitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella typhi*. Dan ekstrak etanol daun kemangi tidak dapat melebihi kontrol positif pada penelitian. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik dengan metode Kirby bauer.

4. Berdasarkan penelitian Mittal (2018) Aktivitas antimikroba ekstrak dan minyak daun *Ocimum sanctum*. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek antimikroba ekstrak etanol, heksana dan kloroform daun *O. sanctum* terhadap bakteri patogen untuk mengetahui potensinya sebagai agen antibakteri. *Ocimum sanctum* Linn dikenal sebagai *Holy Basil* adalah tanaman aromatik asli daerah tropis Asia dan Afrika yang menjadi tanaman obat penting dalam keluarga *Lamiaceae*. Famili *Lamiaceae* merupakan salah satu famili tanaman obat yang paling banyak dimanfaatkan di seluruh dunia tidak hanya sebagai sumber tanaman obat tetapi juga dengan minyak atsirinya yang berharga digunakan sebagai bumbu dan penyedap berbagai produk makanan. Daun dipisahkan dari batangnya, dicuci dengan air jernih dan dikeringkan sampai cukup kering untuk digiling (dikeringkan selama 7 hari). Daun kering diserbuk secara terpisah dalam penggiling listrik sampai diperoleh bubuk yang homogen. Ekstrak etanol, Heksana, Kloroform dibuat dari bubuk yang diperoleh dengan menggunakan “metode ekstraksi dingin”. Aktivitas ekstrak Tulsi terhadap *K. pneumonia* & *Staphylococcus aureus* ditemukan lebih tinggi pada konsentrasi 100% diikuti oleh 75% & 50% masing-masing. Zona hambat maksimum ditemukan 21&11mm terhadap *Klebsiella pneumonia* dan 18&15mm terhadap *Staphylococcus aureus*. Khasiat antimikroba dari daun *Ocimum sanctum* menunjukkan bahwa tanaman tersebut memiliki

sifat antimikroba yang kuat serta *Ocimum* tersebar luas di India, dapat direkomendasikan sebagai sumber agen antimikroba yang mudah tersedia dan diperbarui daripada bahan kimia sintetis. Adapun perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah uji efektivitas ekstrak kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik dengan metode Kirby bauer.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol 96% daun kemangi (*Ocimum basilicum. L*) yang memiliki efektivitas antibakteri terhadap ulkus diabetik.
2. Untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kemangi (*Ocinum basilicum. L*).

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan oleh UIN Alauddin Makassar sebagai tambahan pengetahuan efektivitas antibakteri ekstrak etanol 96% daun kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik.

2. Untuk Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini merupakan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta wawasan tentang efektivitas antibakteri ekstrak etanol 96% daun kemangi terhadap bakteri ulkus diabetik.

3. Untuk Masyarakat

Bagi masyarakat, memeberikan dasar ilmiah mengenai penggunaan ekstrak etanol 96% daun kemangi sebagai antibakteri alami.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Daun Kemangi (*Ocimum basilicum. L*)



Gambar 1. Tumbuhan Kemangi (*Ocimum basilicum L*) (Depkes, 2001).

2. Nama Lokal

Kemangi, kemangen (Indonesia, Jawa), Kamangi (Makassar), Lampes (Jawa Tengah), Uku-uku (Bali), Lufe-lufe (Ternate), Saraung (Sunda), Kemanghi (Madura), Lemon basil (UK), Cedar basil (Prancis), dan Maenglak (Thailand).

a. Klasifikasi Daun Kemangi (*Ocimum basilicum. L*)

Klasifikasi Daun Kemangi (*Ocimum basilicum. L*) menurut Depkes (2001) sebagai berikut:

Regnum : *Plantae*
Divisi : *Spermatophyta*
Kelas : *Dicotyledonae*
Ordo : *Solanales*
Famili : *Lamiaceae*
Genus : *Ocimum*
Species : *Ocimum basilicum L*

b. Morfologi Daun Kemangi

Tumbuhan ini banyak tumbuh di daerah tropis, berupa rerumputan tegak, tinggi 0,3-1,5 m. tubuh utama tidak mencolok, biasanya berwarna hijau keunguan, berbulu atau tidak. Daunnya sederhana, berlawanan dari bawah ke atas. Panjang tangkai daun 0,25- 3 cm, tiap helai daun lonjong sampai elips, lonjong dan runcing atau tumpul di ujungnya. Pangkal daun membulat, kedua sisinya berbulu.

Bunga kemangi disusun pada batang bunga yang tegak. Bunga hermafrodit, berwarna putih dan beraroma ringan. Bunganya bersisik ganda dengan daun pelindung berbentuk bulat Panjang atau bulat telur sepanjang 0,5- 1 cm di ketiak daun. Kelopak berbentuk bibir, permukaan luar kelenjar, ungu atau hijau, buah cembung. Mahkota bunga berwarna putih dengan benang sari terpasang di pangkal mahkota dan ujung kuncup bercabang tetapi tidak sama. Buahny berbentuk kotak, berwarna coklat tua, tegak dan cekung dengan ujung membulat menyerupai mata kail. Panjang kelopak buah 6-9 mm, bijinya kecil, keras, berwarna coklat dan membengkak saat dipetik. Buah ini memiliki empat biji berwarna putih kotor (Kusuma, 2012; 6-8).

c. Kandungan Kimia Daun Kemangi (*Ocimum basilicum. L*)

Daun kemangi mengandung tannin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin, glikosida, asam amino primer dan sekunder (Sarah SM, 2015). Secara umum tanaman yang mengandung minyak atsiri memiliki aktivitas antibakteri yang besar. Selain itu juga mengandung flavon apigenin, luteolin, flavon O-glukosida apigenin 7-O glukuronida, luteolin 7-O glukuronida, flavon C-glukosida orientin, molludistin dan asam ursolat. Sementara itu, pada daun kemangi hasil studi fitokimia mengandung flavonoid, glikosida, asam galat dari esternya, asam kafeat dan minyak atsiri yang mengandung eugenol. Minyak atsiri dari daun kemangi mengandung aldehida, alkaloid, asam askorbat, beta-

karoten, karvakrol, cineole, eugenol, eugenol-metil-eter, glikosida, linalon, metil chavicol, limatrol, caryofilin, asam ursolat, n- triacontanol dan fenol. Komposisi biji selasih ungu antara lain beta-sitosterol, lemak, asam linoleate, asam oleat, asam palmiat, pentosa dan protein. Komponan kimia daun kemangi yang mempunyai efek membunuh bakteri adalah augenol dan methyl chavicol (Fitriani Tallama, 2014).

d. Manfaat

Kemangi (*Ocimum basilium. L*) mempunyai banyak khasiat antara lain adalah:

1. Sebagai obat

Kemangi berkhasiat meningkatkan nafsu makan, memperlancar pencernaan, menyehatkan jantung, menurunkan panas, mengurangi sesak nafas, dan mengobati diare (Hasanah ustavian, 2010). Menurut beberapa penelitian, kemangi juga telah terbukti bertindak sebagai acetaminophen akut dalam bentuk nekrosis hati yang fatal. Nekrosis tubular ginjal dan koma hipoglikemik juga dapat terjadi. Namun yang plaing umum adalah untuk mual, muntah dan kehilangan nafsu makan.

2. Fungisida, bakterisida, nematisida, dan repellen

Minyak atsiri daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherchia coli* sehingga bekerja seperti antibiotic. Aksi fungisida adalah mengendalikan *pyricularia oryzae* yang merupakan penyebab embun tepung dan menyerang padi. Kandungan eugenol dapat menekan pertumbuhan nematoda (Hasanah ustavian, 2010). Selain itu, kemangi telah terbukti efektif sebagai penolak serangga.

3. Penghasil minyak atsiri

Minyak atsiri kemangi disebut minyak kemangi, minyak ini digunakan sebagai bahan pembuatan wewangian, shampoo, dan aromaterapi (Hasanah Ustavian, 2010).

4. Sayuran dan minuman penyegar

Daun kemangi digunakan sebagai lauk pauk atau lalapan untuk menambah nafsu makan. Selain itu, daunnya memiliki biji selasih sering dijadikan minuman penyegar. Biji selasih dapat menurunkan kolesterol, meningkatkan daya ingat dan kekencangan kulit (Hasanah Ustavian, 2010).

B. Ulkus Diabetik

a. Definisi Ulkus Diabetik

Ulkus diabetik adalah luka terbuka pada permukaan kulit yang disebabkan oleh penyakit pada pembuluh darah besar yang menyebabkan kekurangan sel darah merah dan gangguan pada syaraf. Ulkus diabetik dapat dengan mudah berkembang menjadi infeksi akibat iinvansi kuman atau bakteri. Karena gula darah yang tinggi merupakan tempat yang strategis bagi bakteri untuk tumbuh (Hendra et al., 2019). Ulkus diabetik merupakan kondisi medis yang terjadi pada pasien diabetes akibat gangguan saraf dan arteri perifer yang menyebabkan infeksi ulseratif dan kerusakan jaringan pada kulit kaki (Rosa, 2015). Ulkus diabetik adalah kemantian jaringan akibat uklusi pembuluh darah perifer yang menyertai penderita diabetes sebagai komplikasi kronis dari diabetes itu sendiri.

b. Etiologi Ulkus Diabetik

Menurut Desalu (2011) penyebab luka diabetik adalah neuropati, penyakit pembuluh darah dan infeksi. Gangguan sensorik dimulai dengan hilangnya sensasi nyeri dan ketidakmampuan untuk merasakan luka pada kaki.

Selain itu, atrofi otot tungkai menjadi titik tumpul sehingga menyebabkan borok kaki. Penyakit pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke kaki (Desalu, 2011). Pada gangguan perifer menyebabkan penyakit aterosklerotik kronis yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah perifer terutama pada ekstremitas bawah. Hal ini menyebabkan iskemia, yaitu suatu kondisi dimana aliran darah di arteri terhambat, sehingga suplai oksigen ke jaringan berkurang. Kerusakan akibat neuropati, penyakit arteri perifer, dan iskemia menyebabkan infeksi kaki. Infeksi yang terjadi sering dikaitkan dengan pertumbuhan bakteri. Hiperglikemia menurunkan respons kekebalan tubuh, mencegah sel darah putih melawan bakteri yang masuk (Claytown, 2009).

Ulkus diabetik dapat disebabkan oleh bakteri, sehingga infeksi dan kerusakan dapat terjadi di bagian tubuh manapun, termasuk bagian distal tungkai bawah (Ayu Yulyastuti et al. 2021). Ulkus diabetik disebabkan oleh hiperglikemia yang kemudian menyebabkan neuropati dan gangguan pembuluh darah. Kelainan saraf menyebabkan perubahan pada kulit dan otot serta distribusi tekanan pada telapak kaki berubah, sehingga mempercepat pembentukan ulkus. Luka yang telah terinfeksi akan menyebabkan amputasi yang lebih besar (Akbar.j.T., 2014).

c. Patofisiologi Ulkus Diabetik

Menurut Frykberg dkk., 2006 mendefinisikan patofisiologi ulkus diabetik sebagai berikut.


1. Neuropati perifer sensorik.

Ketidakmampuan merasakan luka merupakan penyebab utama ulkus diabetik. Sekitar 45-60% dari seluruh pasien ulkus disebabkan oleh neuropati, dimana 45% merupakan kombinasi dari neuropati dan iskemia. Neuropati perifer dibagi menjadi 3 bagian, yaitu neuropati tekanan tinggi pada luka di kaki yang menyebabkan kelainan bentuk kaki, neuropatik sensorik yaitu hilangnya rasa kaku

dan akhirnya neuropati otonom yaitu kurangnya kelenjar keringat. Ekskresi menyebabkan kaki kering, pecah-pecah sehingga membuka jalan masuknya bagi bakteri untuk tumbuh.

2. Gangguan pembuluh darah perifer (Peripheral Vascular Disease atau PVD).

PVD adalah faktor langsung terjadinya ulkus. Namun, pasien maag membutuhkan waktu lama untuk sembuh dan risiko amputasi meningkat karena insufisiensi arteri. Gangguan pembuluh darah perifer terbagi menjadi gangguan makrovaskular dan mikrovaskular, keduanya menghambat upaya dalam pengobatan infeksi akibat kekurangan oksigen dan sulitnya pemberian antibiotic pada bagian yang terinfeksi. Oleh karena itu, penting untuk penatalaksanaan ulkus diabetik.



Gambar 2. Patofisiologi Ulkus Diabetik

d. Bakteri Penyebab Ulkus Diabetik

Bakteri yang bertanggung jawab untuk infeksi adalah polimikrobia. Penyebab utama infeksi pada pasien maag adalah bakteri aerob (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*) dan bakteri anaerob (*Peptostreptococcus sp.*) yang menjadi penyebab utama infeksi dan menghambat proses penyembuhan

(Kannan et al., 2014). Banyak penelitian menunjukkan bahwa *Staphylococcus aureus* adalah bakteri paling umum yang menyebabkan infeksi ulkus, dan pada penderita diabetes sekitar 23% hingga 76% (Gardner, 2008).

Bakteri *Staphylococcus aureus* banyak ditemukan pada infeksi luka diabetic. Bakteri tersebut mampu menghambat pembentukan koagulase dan mampu berkembang (Kusuma, 2009). Pada kondisi kulit yang rusak akibat penimbunan glukosa, sangat rentan terhadap infeksi bakteri jenis tersebut. Diketahui, glukosa merupakan sumber nutrisi bagi bakteri dan tumbuh pada suhu optimal 37°C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25° C) (Jawetz, Melnick, & Adelberg's., 2008).

Menurut penelitian Patel et al, bakteri yang paling banyak ditemukan pada 79,6% ulkus purulent adalah bakteri gram negative lainnya *Pseudomonas aeruginosa*, (19,75%), *Klebsiella pneumoniae* (17,9%), *Acinetobacter sp* (16,7%) dan *Escherchia coli* (14,8%), *Proteus sp* (4,9%), *Citrobacter sp* (4,3%), *Enterobacter sp* (1,2%). Bakteri gram positif diantaranya 20,4% adalah *Staphylococcus aureus* (13,6%), *Staphylococcus negative koagulase (CONS)* (3,7%) dan *Enterococcus sp* (3,1%) (Otta, Debata, and Swain 2019).

e. Klasifikasi Ulkus Diabetik

Salah satu klasifikasi tingkat keparahan ulkus yang diketahui saat ini adalah klasifikasi Wagner. Klasifikasi Wagner mengklasifikasikan ulkus menjadi enam tingkatan sesuai dengan luas dan dalamnya lesi tetapi tidak mengalami iskemia, infeksi atau komorbiditas.

Tabel 1. Klasifikasi Wagner-Merrit (Lipsky et al. 2012)

Stadium	Keterangan
0	Tidak ada ulkus, pembentukan kalus
1	Ulkus superfisial secara klinis tidak ada infeksi
2	Ulkus dalam, sering dengan selulitis, abses atau infeksi tulang
3	Tukak dalam yang melibatkan tulang atau pembentukan abses
4	Gangren (ibu jari, kaki, tumit)

5	Gangren seluruh kaki
---	----------------------

Klasifikasi klinis keparahan ulkus diabetic berdasarkan diagnosis dan pengobatan infeksi kaki diabetic dijelaskan pada tabel berikut.

Tingkat keparahan	Keterangan
Tidak terinfeksi	Tidak ada tanda-tanda peradangan.
Ringan	Terjadi nanah, kemerahan, sakit, nyeri, dan panas atau hangat. Cellulitis \leq 2 cm di luar ulkus.
Sedang	Cellulitis $>$ 2 cm, abses yang dalam, ganggren, melibatkan otot, tulang, atau tulang sendi.
Berat	Terjadi toksisitas sistemik atau ketidakstabilan metabolisme, demam, kekacauan atau kebingungan, takikardi, dan hiperglikemia.

Tabel 2. Tingkat keparahan ulkus diabetic secara klinis (Lipsky, et al.,2012)

f. Penatalaksanaan Ulkus Diabetik.

Pola penggunaan antibiotik pada pasien ulkus diabetic IRNA RSUP DR. M. Djamil dari penyakit dalam, Padang. Antibiotik empiris digunakan sendiri, kombinasi dengan 2 antibiotik dan kombinasi 3 antibiotik. Antibiotik empiris diberikan sebagai pengobatan awal pada pasien dengan infeksi bakteri. Antibiotic yang biasa diresepkan untuk pasien adalah sefalosporin dan nitroimidazole generasi ketiga, yaitu ceftriaxone (13%) dan metronidazole (13%). Ceftriaxone telah diresepkan karena dapat menghambat sintesis dinding sel bakteri, dimana ia paling aktif melawan Enterobacteriaceae, termasuk strain penghasil beta-laktamase. Meskipun metronidazole adalah antibiotik dengan mekanisme kerja aktif melawan protozoa, merupakan faktor paling mendasar yang dipertimbangkan dalam pemilihan antibiotic empiris (Katzung B, 2014). Pemilihan antibiotik secara empiris harus tepat, kesalahan pemilihan akan berhubungan dengan tingkat resistensi antibiotik.

Pola pengobatan kombinasi menggunakan dua antibiotic yang paling sering diresepkan, sefalosforin generasi 3 dan nitroimidazol yaitu ceftriaxone dan metronidazole (26,1%) dimana pengobatan pilihan untuk infeksi sedang hingga

berat adalah ruam ulseratif dapat berupa sulbaktam dari kelompok ampisilin atau antibiotik dari kelompok ampisilin. Sefalosforin generasi 3 dalam kombinasi dengan metronidazole (Lipsky BA, 2012). Kombinasi antibiotik sefalosforin dan metronidazole efektif sebagai pengobatan empiris infeksi kaki karena akan memperpanjang aktivitas antibakteri hingga mampu melawan bakteri gram positif dan anaerob (Leekha S, 2011).

Penggunaan ciprofloxacin pada pasien ulkus diabetik diindikasikan untuk pengobatan infeksi jaringan lunak, tendon, dan tulang serta infeksi yang disebabkan oleh bakteri multidrug-resistant (MDR) seperti *Pseudomonas* sp (Katzung B, 2014). Kombinasi sefalosforin generasi ketiga, fluoroquinolon, dan nitroimidazole diharapkan dapat mencapai efek terapeutik yang lebih luas dan memaksimalkan efek terapi karena mekanisme kerja obat ini adalah penghambatan total melalui sintesis DNA, penghambatan pertumbuhan bakteri, dan aktivitas melawan pertumbuhan protozoa serta kematian sel pada bakteri (Brunton L, 2010).

Selain itu, kombinasi fluoroquinolone, carbapenem, dan nitroimidazole juga menjadi pilihan dalam terapi empiris, terutama untuk pasien dengan komplikasi sedang hingga berat yaitu ciprofloxacin, meropenem, dan metronidazole (4,3%), levofloxacin, meropenem dan metronidazole (4,3%). Antibiotik golongan karbapenem menjadi pilihan pengobatan tidak hanya untuk terapi empiris tetapi juga untuk pengobatan setelah kultur bakteri dan uji kepekaan antibiotik. Meropenem adalah antibiotik spektrum luas yang bekerja dengan cara menghambat sebagian besar bakteri gram positif, gram negatif dan anaerob merupakan kelompok bakteri yang paling umum yang menyebabkan infeksi pada pasien ulkus diabetik.

Berdasarkan hasil kultur bakteri yang dilakukan pada tiga pasien maag, ditemukan *Staphylococcus aureus* dan *Staphylococcus coagulase* sebagai bakteri penyebab infeksi. Uji kepekaan dan resistensi antibiotic menunjukkan bahwa ceftriaxone, ciprofloxacin dan cefotaxime digunakan untuk pengobatan resistensi secara empiris. Peresepan ceftriaxone dan ciprofloxacin masih banyak digunakan sebagai pengobatan empiris dengan pertimbangan penggunaan antibiotik pada pasien lain.

Keterbatasan hasil kultur bakteri dan uji kepekaan antibiotic yang dilakukan menjadi penyebab dan pertimbangan dalam pemilihan antibiotic pada pasien maag. Penggunaan antibiotic empiris selama lebih dari 3-4 hari tanpa hasil kultur harus dipertimbangkan, terutama untuk antibiotik ceftriaxone dan ciprofloxacin yang diresepkan secara luas atau dalam kombinasi. Menurut penelitian Decroli (2008) tentang model ulkus dan penelitian Hatanta (2013) tentang penelitian penggunaan antibiotic pada pasien ulkus diabetic di RSUP Dr. M. Djamil Padang, beberapa bakteri resisten terhadap antibiotik cefotaxime, ceftriaxone dan ciprofloxacin. Pemilihan antibiotik untuk pasien maag dilakukan secara hati-hati agar tercapai efek terapi penggunaan antibiotik yang rasional bagi pasien.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Illness severity	Additional factors	Usual pathogens ¹	Preferred empirical regimen ¹
Mild	No complicating features	GPC	S-S pen; 1st gen ceph
	β -lactam allergy or intolerance	GPC	Clindamycin; FQ; T/S; macrolide; doxy
	Recent antibiotic exposure	GPC+GNR	β -Lase-1; T/S; FQ
	High risk for MRSA	MRSA	Linezolid; T/S; doxy; macrolide
Moderate or Severe ²	No complicating features	GPC+GNR	β -Lase 1; second/third gen ceph
	Recent antibiotics	GPC+GNR	β -Lase 2; 3rd gen ceph; group 1 carbapenem (depends on prior therapy; seek advice)
	Macerated ulcer or warm climate	GNR, including Pseudomonas	β -Lase 2; S-S pen + rifampin; S-S pen + ceph; group 2 carbapenem
	Ischemic limb/necrosis/gas forming	GPC+GNR+ Anaerobes	β -Lase 1 or 2; group 1 or 2 carbapenem; 2nd/3rd gen ceph + clindamycin or metronidazole
	MRSA risk factors	MRSA	Consider adding or substituting with glycopeptides; linezolid; daptafloxacin; fusidic acid; T/S (not)**; doxycycline
	Risk factors for resistant GNR	ESBL	Carbapenem; FQ; aminoglycoside and colistin

Gambar 3. Regimen Antibiotik untuk Ulkus Diabetikum

C. Antibakteri

1. Definisi Antibakteri

Antibakteri adalah zat yang menghambat pertumbuhan atau reproduksi bahkan membunuh bakteri. Obat antibakteri dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu antibakteri bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri dan antibakteri bakterisidal yang membunuh bakteri. Obat antibakteri harus mampu menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri tanpa merugikan inangnya. Untuk itu, antibiotik harus menghancurkan sistem metabolisme atau struktur dinding sel bakteri. Antibakteri dapat memiliki aktivitas bakteriostatik dalam aktivitas bakterisida jika kadarnya meningkat melebihi konsentrasi hambat minimum (KHM) (Shofiana, 2020).

2. Mekanisme Kerja Antibakteri

Klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja dalam menghambat mikroorganisme sebagai berikut :

- a. Antibakteri dapat menghambat pembentukan dinding sel.

Dinding sel bakteri penting dalam mempertahankan struktur sel. Bahan antibakteri kemudian dapat merusak dinding sel dan merusak dinding sel sehingga dapat mempengaruhi bentuk dan struktur sel, akhirnya dapat membunuh sel bakteri tersebut.

- b. Antibakteri yang dapat merusak sel.

Membran sel memiliki fungsi pengaturan penting untuk mengangkut nutrisi dan metabolit ke dalam dan keluar sel. Membran sel juga memiliki fungsi pernapasan dan berlangsungnya aktivitas kehidupan di dalam sel. Beberapa jenis

zat antibakteri dapat mengganggu sel sehingga mempengaruhi aktivitas sel bakteri.

c. Antibakteri dapat mengganggu metabolisme asam nukleat

Agen antibakteri memiliki kemampuan untuk menghambat biosintesis DNA. Proses replikasi DNA yang terjadi di dalam sel merupakan sirkuit penting untuk keberlangsungan hidup sel dengan demikian mempengaruhi tahap pertumbuhan lengkap bakteri.

d. Antibakteri penghambat sintesis protein

Sintesis protein merupakan berbagai proses termasuk transkripsi di mana DNA di transkripsi menjadi mRNA dan terjemahan hasil terjemahan pesan RNA lalu diterjemahkan menjadi protein. Agen antibakteri dapat menghambat sintesis protein. Tingkatan antibakteri dapat ditentukan berdasarkan nilai MIC dan MBC dari hasil uji pertumbuhan bakteri. Konsentrasi minimum yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri disebut konsentrasi hambat minimum (MIC). Konsentrasi terendah yang diperlukan untuk membunuh 99,9% pertumbuhan bakteri disebut konsentrasi bunuh minimum (MBC). Zat dikatakan sangat efektif sebagai antibakteri bila digunakan dalam konsentrasi rendah memiliki daya hambat yang besar (Shofiana, 2020).

D. Uji Efektivitas Antibakteri

Pengujian efektivitas antibakteri dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode-metode ini adalah metode difusi, pengenceran (dilusi) dan biologis. Difusi dan biotografi adalah teknik kualitatif karena hanya menunjukkan ada tidaknya senyawa dengan aktivitas antibakteri. Selain itu, metode dilusi digunakan

untuk menentukan hasil kuantitatif yang diperoleh dengan menentukan konsentrasi hambat minimum (MIC) (Shofiana, 2020).

Uji sensitivitas antibakteri secara *in vitro* bertujuan untuk mengetahui zat antibakteri mana yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi oleh bakteri tersebut. Uji kepekaan antibiotic pada dasarnya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu metode difusi cakram dan metode dilusi atau metode untuk menentukan penghambatan minimum (KHM) (Saptiani, 2011).

a. Metode dilusi

Metode ini merupakan metode uji antibakteri berdasarkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme pada media cair setelah didapati zat antibakteri atau pada media pekat yang diencerkan setelah dicampurkan zat antibakteri dengan cara mengamati kekeruhan larutan cair dan mengamati kekeruhan larutan padat pada tingkat ternedah. Konsentrasi yang menghambat pertumbuhan antibakteri digunakan untuk agen antibakteri yang larut sempurna (Rollando,S.Farm.,M.Sc., 2019). Kelebihan metode ini adalah dapat mendeteksi pola resistensi tertentu yang tidak dapat dideteksi dengan metode difusi. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi hambat minimum (MIC) suatu senyawa aktif (Mustapa, 2014).

Sejumlah agen antibakteri dimasukkan ke dalam media bakteri padat atau cair. Media diinokulasi dengan bakteri yang akan diuji dan diinkubasi. Tujuan dari metode ini adalah untuk menentukan jumlah agen antiibakteri yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Pengujian sensitivitas dengan metode dilusi menggunakan waktu lama dan penggunaanya terbatas dalam beberapa masalah (Jawet, et, al.,2007).

Menurut (Ratnasari,2009), terdapat beberapa cara untuk uji dilusi antara lain.

1. Cara penapisan lempeng agar

Larutan agen antibakteri dibuat menjadi beberapa pengenceran dengan konsentrasi yang berbeda. Hasil pengenceran dicampur dengan media agar yang telah dicairkan pada suhu 45°C- 50°C, perbandingan zat antibakteri dan 9 bagian media. Campuran media kemudian dituangkan ke dalam cawan petri steril dan dibekukan.

Setiap cawan petri dikulturkan dengan suspensi bakteri yang mengandung kurang lebih 10^5 - 10^6 CFU/mL, kemudian media cawan petri dibalik dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Setiap pengenceran menggunakan control negatif. Hasil pengamatan pada konsentrasi hambat minimum (KHM) dibaca sebagai konsentrasi terendah yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba, jika pertumbuhan bakteri tidak terlihat dapat diperoleh kultur pertumbuhan bakteri tersebut.

2. Cara pengenceran

Agen antibakteri dilarutkan dalam pelarut yang sesuai dan diencerkan secara bergantian dengan media cair dalam sejumlah tabung yang diatur hingga konsentrasi minimum yang diinginkan. Pada setiap tabung berisi media dan zat antibakteri dengan konsentrasi berbeda-beda lalu diinokulasi dengan suspensi bakteri yang mengandung 10^5 - 10^6 CFU/mL. Kemudian dikulturkan dalam tabung reaksi yang berisi media dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam.

Pertumbuhan bakteri dapat diamati dengan melihat kekeruhan pada tabung yang disebabkan oleh bakteri yang dikultur. Larutan uji antibakteri yang tampak bening tanpa pertumbuhan mikroba disebut MIC. Selanjutnya larutan diinokulasikan ulang pada media baru, tanpa penambahan mikroorganisme uji atau agen antimikroba. Kemudian diinkubasi selama 18- 24 jam, setelah diinkubasi ditetapkan sebagai MBC.

3. Turbidimetri

Pengukuran kekeruhan dilakukan dengan memurnikan protein dan mengkulturkan dalam unit turbidimetri. Hasil dari reaksi metode turbidimetri adalah pengerasan jaringan yang sangat teraba, dengan diameter 10 mm atau lebih yang terjadi dalam waktu 48-72 jam setelah penyuntikan. Uji ini diukur dengan spektrofotometer UV-Vis dengan Panjang gelombang 530 nm.

b. Metode Difusi

Metode ini merupakan metode uji antibakteri berdasarkan difusi agen antibakteri dalam media padat dengan mengamati zona pertumbuhannya. Biasanya metode ini digunakan untuk agen antibakteri yang larut dan tidak larut. Secara umum, metode yang digunakan adalah disuse cakram. Kertas cakram yang berisi zat diletakkan diatas permukaan media padat yang telah diinokulasikan bakteri yang telah diuji sebelumnya. Setelah inkubasi, diameter zona inhibisi disekitar kertas cakram diukur sebagai derajat inhibisi organisme uji. Selain interaksi sederhana antara zat dengan organisme, beberapa faktor fisik dan kimia juga dapat mempengaruhi hasil metode difusi (Jawetz, 2001).

Menurut Ratnasari (2009) metode difusi dapat dibagi menjadi beberapa cara antara lain:

1. Metode silinder gelas

Metode silinder dilakukan dengan meletakkan beberapa silinder kaca atau stainless steel diatas agar yang telah dinokulasi bakteri. Silinder ditempatkan sedemikian rupa sehingga bertumpu pada agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan inkubasi. Setelah inkubasi, amati pertumbuhan bakteri untuk melihat apakah ada zona hambat disekitar silinder.

2. Metode kertas cakram *disk diffusion*

Metode kertas cakram melibatkan penmpatan kertas yang telah direndam dalam larutan uji diatas permukaan media padat yang telah diinokulasi bakteri. Setelah inkubasi, amati pertumbuhan bakteri untuk melihat apakah ada zona hambat atau zona bening disekitar kertas.

3. Metode cetak lubang (metode sumur)

Metode sumur yang melibatkan pembuatan sumur dalam agar pada yang diinokulasikan dengan bakteri yang akan diuji. Kemudian lubang diisi dengan larutan uji. Setalh itu, diinkubasi, amati pertumbuhan bakteri dengan melihat apakah terdapat zona hambat disekitar lubang (Ratnasari, 2009).

E. Senyawa Aktif Antibakteri dari Daun Kemangi (*Ocimum bacilisium L*)

Pada kulit batang, daun dan batang Kemangi (*Ocimum bacilisium L*), yang dapat digunakan sebagai inhibitor dan antibakteri, komponen ini meliputi:

a. Alkaloid

Alkaloid dalah metabolit sekunder paling umum yang mengandung atom nitrogen. Alkaloid dapat ditemukan diberbagai bagian tanaman seperti akar, batang, daun dan biji. Alkaloid memiliki manfaat Kesehatan antara lain merangsang sistem saraf, meningkatkan atau menurunkan tekanan darah, dan melawan infeksi bakteri (Shofiana, 2020).

Ekstrak daun kemangi yang ditambahkan 5 ml HCl dan pereaksi Wagner (mengandung yodium dan kalium) memberikan warna kuning kecokelatan dan endapan coklat. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mengandung senyawa alkaloid (Kumalasari & Andiarna, 2020).

Alkil adalah basa organic yang mengandung unsur nitrogen (N). biasanya berasal dari tanaman dengan efek fisiologis yang kuat pada manusia. Kegunaan farmakologi alkaloid adalah untuk merangsang sistem saraf, meningkatkan

tekanan darah, dan melawan infeksi bakteri (Wullur et al., 2012). Alkaloid berpotensi sebagai agen antibakteri. Mekanisme yang terjadi karena adanya gangguan pada komponen struktur peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga dinding sel tidak terbentuk sempurna sehingga menyebabkan kematian sel (Amaliyyah, 2021).

b. Flavonoid

Senyawa fenolik berupa flavonoid, flavonol dan flavon dapat berperan sebagai antioksidan. Aktivitas flavonoid sangat bergantung pada jumlah dan letak gugus -OH yang dalam hal ini berperan dalam menetralkan radikal bebas. Kemampuan flavonoid untuk menangkis radikal bebas dan potensi donornya. Hal ini adalah alasan hubungan antara kandungan fenolik total fenol dan flavonoid, semakin besar kapasitas antioksidan untuk menghambat pertumbuhan radikal bebas. Komponen fenolik atau flavonoid merupakan senyawa utama yang berperan sebagai antioksidan (Nur et al., 2019).

Flavanoid adalah metabolit sekunder dari polifenol banyak ditemukan antaranya pada tumbuhan dan memiliki efek energetik yang luas, termasuk antivirus, antikanker, dan zat lainnya. Akibat radikal bebas dari enzim tertentu (Shofiana, 2020).

Beberapa tetes FeCl_3 ditambahkan pada ekstrak daun kemangi menunjukkan warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa daun kemangi mengandung senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenolik dengan banyak gugus OH. FeCl_3 yang ditambahkan pada ekstrak daun kemangi yang mengandung senyawa fenolik akan membentuk kompleks dengan ion Fe^{3+} membentuk larutan berwarna hitam (Kumalasari & Andiarna, 2020).

Selain itu, flavonoid memiliki sifat sebagai antiradang, antihepatotoksik, antikanker, antibakteri, dan antivirus. Aksi flavonoid sebagai agen antibakteri dapat mempercepat pengobatan jerawat karena kemampuan mereka untuk merusak protein kompleks ekstraseluler larut dalam dinding sel. Flavonoid berlemak juga merusak sel germinal. Selaput sel dan dinding sel akan rusak sehingga menyebabkan pelepasan produk metabolisme (Amaliyyah, 2021).

c. Fenolik

Fenolik adalah zat aktif yang berasal dari bahan tumbuhan sekunder terdapat pada organisme dan memiliki fungsi mencegah kerusakan atau membatasi kelangsungan hidup organisme (Shofiana, 2020). Senyawa fenolik diketahui memiliki berbagai efek biologis seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme seperti agen pereduksi, penangkap radikal bebas, pengikatan logam, pengurangan pembentukan oksigen beracun, dan donor elektron (Nur et al., 2019).

Fenol dapat menghambat aktivitas mikroorganisme pada konsentrasi tertentu, fenol merupakan senyawa yang sangat beracun dengan sistem kerjanya yaitu mengganggu kerja sitoplasma bakteri, termasuk mengganggu transport aktif dan kekuatan proton (Hastuti, 2016).

d. Tanin

Tanin merupakan senyawa aktif fitokimia memiliki banyak sifat, seperti astringent, anti-diare, anti-inflamasi bakteri dan antioksidan (Shofiana, 2020). Tanin diketahui dapat digunakan sebagai antivirus, antibakteri, dan antitumor. Tannin tertentu dapat menghambat selektivitas replikasi HIV dan juga digunakan sebagai diuretik. Tanin terkandung dalam minuman seperti kopi, anggur, dan bir memberikan aroma dan rasa sedap yang khas. Bahan kunyahan seperti gambir memanfaatkan tannin yang terkandung di dalamnya untuk memberikan rasa kelat

ketika makan sirih. Sifat pengelat atau pengerut (astrigensia) itu dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Tanin yang terkandung dalam the memiliki korelasi positif antara kadar tanin pada the dengan aktivitas antibakterinya terhadap penyakit diare yang disebabkan oleh *Enteropathogenic Escherichia coli* (EPEC) pada bayi (Taniata siska wardani, 2021).

Ekstrak daun kemangi direbus dengan menambahkan 20 ml aquadest ke dalam tabung rekasi, kemudian disaring dengan kertas saring dan beberapa tetes FeCl^{3+} hingga membentuk warna biru kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung senyawa tannin. Gugus fenol yang terdapat pada senyawa tannin akan membentuk kompleks dengan ion Fe^{3+} sehingga menimbulkan warna seperti tinta biru atau biru kehitaman (Kumalasari & Andiarna, 2020).

Uji senyawa tannin dari ekstrak daun kemangi yang diendapkan dengan beberapa tetes 0,1 % FeCl_3 akan menghasilkan warna biru tinta biru menandakan adanya senyawa tannin. Daun kemangi mengandung minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, saponin, tannin. Senyawa tersebut berperan sebagai antipiretik, antijamur, analgesic, antiseptic, antibakteri, hepatoprotektor, imunomodulator, antirepulsif, dan antiemetik (Kumalasari & Andiarna, 2020).

F. A Metode Ekstraksi Bahan Alam

1. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses penarikan zat terlarut dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan cairan pelarut. Simplisia yang diekstraksi mengandung zat aktif yang larut dan tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain (Firdaus, Prihanto, & Nurdiani, 2013).

Metode ekstraksi meliputi metode ekstraksi pelarut, distilasi, pengepresan dan sublimasi sesuai dengan prinsip ekstraksi. Ekstraksi pelarut adalah metode

yang paling banyak digunakan. Ekstraksi bahan alami seperti langkah-langkah berikut: (1) pelarut menembus substrat padat; (2) zat terlarut yang larut dalam pelarut; (3) zat terlarut berdifusi keluar dari matriks padat; (4) diperoleh zat terlarut yang dihasilkan (Wen, Lin, & ye,2018).

2. Jenis-jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan panas atau dingin. Ekstraksi panas adalah perendaman, perkolasi dan soxhlation (Sudjadi,1988).

Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam ekstraksi, diantaranya yaitu:

a. Maserasi

Metode maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi dengan cara merendam sampel dalam pelarut yang sesuai. Perendaman sampel dalam pelarut menyebabkan perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel sehingga dinding sel pecah dan metabolit sekunder yang terkandung didalamnya dapat larut dalam pelarut. Selama maserasi, semakin lama sampel terkena pelarut semakin banyak metabolit yang terlarut karena vaktaknya dinding sel yang pecah. Proses ini akan berlanjut hingga terjadi keseimbangan intraseluler dan ekstraseluler pada sampel. Metode maserasi memiliki kelebihan yaitu zat aktif yang dihasilkan tidak akan rusak, namun kekurangannya banyak pelarut yang digunakan dalam proses perendaman (Chairunnisa, 2019).

Maserasi adalah proses ekstraksi yang paling cocok dimana zat yang telah dimurnikan memungkinkan untuk direndam dalam pelarut hingga menyerap dan melunakkan struktur seluler, sehingga zat terlarut yang terkandung di dalamnya larut. Perendaman adalah ekstraksi paling sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut selama beberapa hari pada

suhu kamar dan jauh dari cahaya, dimana pelarut akan masuk ke dalam sel melalui dinding sel.

b. Perkolasi

Perkolasi adalah salah satu metode ekstraksi yang dilakukan dengan melewatkan cairan penyari pada sampel sehingga senyawa 29erugin akan ikut terbawa bersama dengan cairan tersebut. Proses ekstraksi dilakukan dalam 29eruginosa, sampel dibasahi dengan perlahan dengan cairan penyari yang ditambahkan pada bagian atas sampel dan dibiarkan menetes perlahan di bagian bawah. Kelebihan dari penggunaan metode ini yaitu sampel bahan alam senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel tidak terendam maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area serta membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya (Mukhriani., 2014).

c. Sokletasi

Metode ekstraksi ini dilakukan dengan penempatan serbuk simplisia dalam sarung selulosa (dapat diganti dengan kertas saring) pada klonsong yang diletakkan di bagian bawah kondensor dan di bagian atas labu. Cairan penyari yang sesuai kemudian dituangkan ke dalam labu kemudian diatur suhu penangas dengan suhu yang lebih rendah dari suhu reflux. Keuntungan dari metode ini yakni proses ekstraksi yang berulang memungkinkan sampel dapat terekstraksi oleh cairan penyari hasil kondensasi pada reflux sehingga pelarut yang digunakan lebih hemat dan tidak membutuhkan banyak waktu dalam prosesnya. Kerugian dari metode ini ialah senyawa yang memiliki sifat tidak stabil terhadap perubahan suhu dapat mengalami degradasi terus berada pada titik didih (Mukhriani., 2014).

d. Refluks

Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pemanasan dalam prosesnya. Pemanasan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses ekstraksi

dimana senyawa yang terkandung dapat lebih mudah ditarik oleh cairan penyari. Prinsip dalam metode ekstraksi ini ialah menguapkan pelarut pada suhu tinggi, uap dari pelarut yang mengembun pada dinding dalam kondensor akan menetes turun kembali ke wadah. Hasil ekstraksi yang didapatkan kemudian disaring dan dipisahkan menggunakan rotary evaporator. Kelebihan yang dimiliki metode ini ialah penggunaan waktu yang singkat dan hemat dalam penggunaan pelarut. Disamping kelebihan tersebut, kekurangan yang dimiliki metode ini ialah sampel yang digunakan harus tahan pada suhu panas (Kiswandono, 2011).

3. Ekstraksi Secara Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari. Maserasi dapat dilakukan dengan modifikasi seperti:

- a. Digesti yaitu cara maserasi menggunakan pemanasan lemah, seperti pada suhu antara 40-50°C. cara maserasi ini hanya dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya hanya tahan terhadap pemanasan.
- b. Maserasi dengan mesin pengadukan merupakan maserasi yang dilakukan dengan menggunakan mesin pengadukan yang berputar terus-menerus, lama waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6 hingga 12 jam.
- c. Remaserasi yaitu penyarian dimana cairan penyari dibagi menjadi dua. Seluruh serbuk simplisia dimaserasi dengan cairan penyari pertama, lalu diendapkan, dituang dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang baru.

- d. Maserasi melingkar merupakan penyarian yang digunakan dengan cairan penyari yang selalu mengalir kembali secara terus-menerus melalui serbuk simplisia dan melarutkan zat aktifnya.
- e. Maserasi melingkar bertingkat merupakan metode penyarian yang menggunakan peralatan yang sama dengan maserasi melingkar, namun dengan jumlah bejana penampungan yang perlu disesuaikan dengan keperluan (lebih banyak) (Dirjen POM,1986).

G. Pemilihan Pelarut

Cara pengikatan zat aktif biasanya dengan memilih jenis pelarut yang sesuai, sehingga diperoleh rendemen yang tinggi (Kurniawati, 2016). Faktor penting dalam proses ekstraksi adalah pemilihan pelarut (Harborne, 1987). Ada dua syarat penggunaan pelarut dalam proses ekstraksi, yaitu pelarut harus menjadi pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi dan pelarut dapat terpisah dengan cepat setelah dikocok. Toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, suhu kritis rendah dan tekanan kritis harus dipertimbangkan ketika memilih pelarut untuk mengurangi biaya operasi dan reaktivitas (Amiarsih, 2006).

Proses ekstraksi pelarut tergantung pada sifat kepolaran zat dalam pelarut pada saat ekstraksi. Senyawa polar hanya larut dalam pelarut polar seperti etanol, butanol dan air. Senyawa non-polar hanya larut dalam pelarut non-polar seperti eter, kloroform dan n-heksana (Gritter, Bobbit, & Schwarting, 1991). Pelarut non-polar (n-heksana, aseton) dapat mengekstrak likopen, triterpenoid dan karotenoid dalam jumlah kecil, sedangkan xanthines dan senyawa polar lainnya diekstraksi dalam pelarut polar (etanol). Sedangkan pelarut semi polar mampu menarik senyawa seperti likopen, b-karoten, vitamin C, TDS, dan total fenol. Pelarut yang digunakan harus dapat melarutkan zat yang diinginkan, memiliki titik didih yang rendah, murah, tidak beracun dan mudah terbakar (Harborne, 1987).

Saat memilih pelarut, hal-hal berikut harus diperhatikan, antara lain:

1. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan derajat kepolaran gugus senyawa yang akan digunakan.
2. Pelarut yang digunakan harus tidak beracun jika penelitian yang dilakukan ditujukan untuk pengobatan.

H. Tinjauan Islam

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat yang sangat besar. Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha/20: 53:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ۝٥٣

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama RI, 2006: 408).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah SWT, Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2002,7:604-605).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yaitu menciptakan berbagai macam-tumbuhan yang didalamnya terdapat banyak manfaat baik sebagai makanan dan sebagai pengobatan penyakit. Masyarakat Indonesia sendiri banyak memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan untuk pengobatan dan juga sebagai bahan makanan. Adapun dalam penelitian ini daun kemangi digunakan sebagai sampel tanaman dengan tujuan untuk mengetahui manfaat lain dari daun kemangi yaitu mengetahui efektivitas ekstrak daun kemangi dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab ulkus, hal tersebut dikarenakan banyak bakteri pathogen yang dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia.

Tumbuhan yang memiliki manfaat sebagai bahan obat adalah tumbuhan yang memiliki kandungan atau khasiat khusus yang dapat dikembangkan menjadi sumber agen pengobatan alami. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait tanaman berkhasiat tersebut.

Selain itu, penyembuhan manusia dari suatu penyakit yang dideritanya adalah kekuasaan Allah swt. bukan kekuasaan manusia, kerna segala sesuatu penyakit datangnya dari-Nya dan Dia-lah yang akan menurunkan obatnya. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma’ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahib; Telah mengabarkan kepadaku ‘Amru, yaitu Ibnu al-Harits dari ‘Abdu Rabbih bin Sa’id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obatnya yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah ‘azza wajalla.” (HR. Muslim, IV, 1729).

Hadist diatas menjelaskan tentang semua penyakit yang dialami oleh manusia maka Allah swt menurunkan obatnya. Terkadang ada orang yang menemukan obatnya, ada pula yang belum menemukan obatnya. Hadist tersebut menjadi motivasi kepada para peneliti untuk senantiasa mencari obat untuk berbagai penyakit yang dapat merusak tubuh manusia. Jadi tradisi pengobatan yang dijalankan Nabi saw. Tidak akan berhenti hanya sampai pada masa pembelajaran Nabi saw. Dan para sahabatnya. Namun, akan tetap berlanjut hingga akhir zaman nanti untuk mendorong manusia terus meneliti dan menjalankan pengobatan Nabi saw. Dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana kesehatan yang lebih modern dan mutakhir.

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman mengenai tumbuh-tumbuhan yang baik yaitu dalam firman-Nya QS. As-Syu’ara/26:7:

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama RI,2006:368).

Kata (إِلَى) *ila/ke* pada firman-Nya di awal ayat ini (أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) *awalam yara ila al-ardh/apakah mereka tidak melihat ke bumi merupakan kata yang mengandung makna batas akhir*. Dengan demikian, ayat ini memandang sampai mencakup segala isi bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya dan

aneka keajaiban yang terhampar pada tumbuh-tumbuhan (Shihab,2002,9:187-188).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit dan merupakan anugerah Allah swt. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan adalah daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah, dan bijinya (Savitri, 2008:5).

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia baik dari sebagai pangan maupun ilmu pengetahuan dan obat-obatan. Segala sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan sia-sia, akan tetapi perlu dilakukan penelitian dan eksperimental dalam mengkaji ilmu dan pengalaman secara teori dan empiris untuk pemanfaatannya sebagai obat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif untuk mengetahui efektivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum sanctum L*) terhadap bakteri ulkus diabetik dengan metode difusi agar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekperimental laboratorium berupa pengujian fitokimia dan uji efektivitas antibakteri ekstrak daun kemangi (*Ocimum sanctum L*) menggunakan metode difusi agar.

Penelitian eksperimental adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain penelitian eksperimental mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimental yang diberi perlakuan dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan (Gulo,W.2002:20).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk melakukan proses ekstraksi sampel dan Laboratorium Mikrobiologi RSP Universitas Hasanuddin untuk melakukan sterilisasi bahan dan alat-alat yang akan digunakan, dan juga untuk melakukan uji efektivitas antibakteri pada ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L*).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2022.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah autoklaf, 37erugi, blender, corong (Pyrex[®]), cawan petri, Erlenmeyer (Pyrex) 100 ml, gelas kimia (IwakiPyrex[®]), incubator (Marmer[®]), jarum ose, kurs porselin, labu tentukur (IwakiPyrex[®]), McFarland, micro pipet, oven, pinset, pH meter, rotary vacuum evaporator (Heidolph[®]), triangle, timbangan analitik, tabung reaksi, dan water pump.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah aquadest, amil alcohol, aluminium foil, biakan murni bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*. Ekstrak Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*), HCl pekat, paper disk Metronidazole, kertas cakram (Paper disc), kertas saring, larutan etanol 96%, label, Muller Hilton Agar (MHA), NA (Nutrient Agar), serbuk Mg, NaCl, FeCl₃, H₂SO₄, serbet, dan tissue.

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

Sampel Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*) diperoleh di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pada pukul 10.00 WITA. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Sebelum sampel dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*) disortasi basah untuk memisahkan sampel dari

kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun. Setelah proses pencucian, sampel dirajang kecil-kecil kemudian daun diangin-anginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L*). Daun kemangi yang sudah kering berbentuk bubuk, kemudian daun pedada dimasukkan kedalam wadah tertutup. Ditambahkan dengan pelarut etanol 96% lalu dikocok kemudian direndam dan ditutup dengan aluminium foil. Proses ekstraksi dilakukan secara maserasi selama 3x24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dan didapatkan filtratnya. Filtrat yang didapat kemudian diuapkan pelarutnya dengan *rotary evaporator* pada suhu 5°C hingga didapat ekstrak kental yang bebas dari pelarut. Ekstrak daun kemangi yang dihasilkan akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Setelah itu, ekstrak yang dihasilkan dihitung % rendemen ekstraknya.

$$\% \text{ rendamen ekstrak} = \frac{\text{bobot ekstrak}}{\text{berat bobot simplisia}} \times 100$$

2. Sterilisasi Alat Dan Bahan

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian aktivitas antibakteri ini disterilkan terlebih dahulu. Sebelum alat-alat dimasukkan ke dalam autoklaf terlebih dahulu dengan kertas perkamen atau kertas hvs. Alat-alat gelas dan media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15-20 menit, sedangkan jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dibakar langsung menggunakan spirtus. Sterilisasi alat-alat yang berbahan dasar plastik dilakukan dengan cara kimiawi yaitu menggunakan 70% (Lusi, 2016). Bahan- bahan yang terbuat dari karet disterilkan dengan direndam dengan alcohol 70% dan jarum ose dirterilkan dengan pijarakan menggunakan nyala

Bunsen. Alat- alat kaca non presisi seperti tabung reaksi, beaker gelas dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Cawan petri dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastic tahan panas dan disterilkan dengan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. *Laminar air flow* disterilkan dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alcohol 70%. Sterilisasi *laminar* ini dilakukan sebelum dan sesudah bekerja didalamnya (Pertiwi, 2010).

3. Skrining fitokimia

a. Uji Flavanoid

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 2-3 ml air panas dan sedikit serbuk Mg ditambahkan kedalam ekstrak. Kemudian ditambahkan 4-5 tetes HCL pekat. Jika menunjukkan warna coklat kekuningan maka ekstrak positif mengandung Flavanoid.

b. Uji saponin

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan 3 mL air panas kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa didiamkan selama 1 menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCL 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin.

c. Uji tanin

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 3 ml air hangat. Diteteskan dengan FeCl₃ 1%, jika terjadi perubahan warna kehijauan menjadi kehitaman maka positif mengandung tanin.

d. Uji Alkaloid

Sebanyak 3 mL ditambahkan 5 mL HCl 2N diaduk dan kemudian didinginkan pada suhu ruangan. Setelah dingin, kemudian pada sampel ditambahkan

0,5 g NaCl lalu diaduk dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2N sebanyak 3 tetes, ditambahkan pereaksi Mayer, apabila terbentuk endapan putih pada pereaksi mayer. Maka menunjukkan adanya alkaloid.

4. Pembuatan Media

a. Nutrient Agar

Komposisi :

Ekstrak Beef 5,0 gram

Pepton 10,0 gram

Agar 15,0 gram

Air suling hingga 1000 ml

Pembuatan:

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Pembuatan Mac Conkey

Ditimbang sebanyak 50 gram kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquadest lalu dipanaskan sambil diaduk sampai 40erugino. Kemudian media disterilkan dalam autoclave selama 15 mneit dengan suhu 121°C dan tekanan 2 atm.

5. Peremajaan bakteri

Peremajaan bakteri menggunakan agar miring NA, peremajaan bakteri uji. Bakteri diambil satu ose menggunakan ose steril selanjutnya digoreskan pada

permukaan agar miring dengan cara silang (zig-zag) dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C (Nurchayani, 2011).

6. Pembuatan larutan uji

Konsentrasi ekstrak etanol Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L*) ditentukan berdasarkan uji pendahuluan. Larutan sampel dibuat dengan cara menimbang ekstrak kental Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L*) masing-masing kemudian tiap konsentrasi diencerkan dengan pelarut aquadest hingga volumenya 5 ml. Kontrol positif menggunakan antibiotik meropenem, kontrol negatif menggunakan aquadest steril sebanyak 5 ml (Lusi, 2016).

7. Uji Aktivitas Antibakteri

Tabel 3 . Pengukuran Diameter Zona Hambat (David dan Stout, 1971).

Diameter zona hambat = Diameter zona bening – Diameter kertas cakram	
Diameter	Kategori
≥ 20 mm	Sangat kuat
10-20 mm	Kuat
5-10 mm	Sedang
≤ 5 mm	Lemah

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi, dengan menggunakan kertas cakram berdiameter 5 mm. Disiapkan medium *nutrient agar* yang telah disterilkan dimasukkan kedalam cawan petri steril masing-masing sebanyak 10 mL dan dicampur dengan 0,2 µl bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara kedalam cawan petri steril dan didibiarkan memadat pada suhu kamar. Selanjutnya kertas cakram yang telah dijenuhkan. Ditimbang sebanyak 20 gram ekstrak kental dan dilarutkan dalam 100 ml aquadest lalu diencerkan dengan masing-masing seri konsentrasi sampel 1000 ppm, 800 ppm, 600 ppm, 400 ppm, 200 ppm(g/ml) serta kontrol positif dengan antibiotik meropenem dan kontrol negative aquadest lalu dibiarkan hingga jenuh kedalam kertas cakram.

Diletakkan diatas permukaan medium dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan yang lain lebih kurang 3 cm dan jarak dari pinggir cawan petri 2 cm. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam, lalu diamati zona hambat yang terbentuk yang ditandai dengan adanya zona bening diukur menggunakan jangka sorong (Atikah, 2013).

F. Pengumpulan Data

Data penelitian yang diperoleh dari data primer. Data primer didapatkan dari hasil uji laboratorium. Uji laboratorium yang dilakukan dimulai dari uji fitokimia dan uji daya hambat.

G. Analisis Data

Parameter yang dilakukan adalah parameter kualitatif, yaitu rata-rata diperoleh dari daya hambat pengukuran diameter daerah hambatan yang terlihat di sekitar kertas cakram. Hasil dari uji antibakteri penentuan zona hambat dengan menggunakan metode cakram dilakukan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis Regresi Linear Sederhana dimana dapat dilihat hubungan antara satu dependen dengan independen. Selanjutnya dilakukan uji ANOVA (*Analysis of variance*) menggunakan program SPSS.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Determinasi

Determinasi sampel tanaman kemangi dari Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia Fakultas Farmasi UMI pada tanggal 8 Desember 2022. Bagian tanaman yang dideterminasi adalah daun. Hasil determinasi menyatakan bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah spesies *Ocimum basilicum L.*

2. Hasil Ekstraksi Daun Kemangi (*Ocimum sanctum L.*)

Setelah dilakukan ekstraksi daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) sebanyak 500 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari etanol 96% diperoleh ekstrak etanol kental. Maka diperoleh berat ekstrak seperti pada tabel:

Tabel 4. Hasil Ekstraksi Daun Kemangi

Jenis Sampel	Pelarut	Berat Sampel	Berat Simplisia	Bobot Ekstrak	% Rendamen
Daun Kemangi	Etanol 96%	3,496 Kg	500 gram	20,371 gram	4,0742

3. Hasil Uji Identifikasi Golongan Senyawa

Uji fitokimia dilakukan di Laboratorium Fitokimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil ekstrak etanol 96% daun kemangi kemudian diuji golongan senyawa kimianya untuk mengetahui kandungan-kandungan senyawa yang ada didalam daun kemangi meliputi uji senyawa alkaloid, Flavanoid, saponin dan tanin. Berdasarkan uji skrining fitokimia terhadap ekstrak daun kemangi, maka hasil yang didapatkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Skrining Fitokimia

No.	Skrining Fitokimia	Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	Uji Alkaloid	Reagen Mayer	Terbentuk endapan putih	+
2.	Uji Flavanoid	HCl Pekat + serbuk Mg	Terbentuk warna coklat kekuningan	+
3.	Uji Saponin	HCl 2N	Terbentuk busa stabil	+
4.	Uji Tanin	NaCl 10% + FeCl ₃	Terbentuk warna hitam kehijauan	+

Keterangan: (+) Mengandung senyawa uji

4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel ekstrak etanol 96% daun kemangi. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan ekstrak etanol 96% daun kemangi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	8	7	5	6,6	Sedang
2.	400 ppm	8	7,5	7	7,5	Sedang
3.	600 ppm	9	8,5	8	8,5	Sedang
4.	800 ppm	11	8,5	8	9,1	Sedang
5.	1000 ppm	13	9	11	11	Kuat
6.	Meropenem	20	18	21	19,6	Kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

Tabel 7. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Providencia stuartii*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	6	5	6	5,6	Sedang
2.	400 ppm	8	7	7,5	7,5	Sedang
3.	600 ppm	8,5	8	7	7,8	Sedang
4.	800 ppm	8,5	9	8	8,5	Sedang
5.	1000 ppm	9,5	8,5	8	8,6	Sedang
6.	Meropenem	31	28	21	26,6	Sangat kuat
7.	Aquadest	-	-	-	-	-

Tabel 8. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Citrobacter freudii*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	8	7,5	5	6,8	Sedang
2.	400 ppm	6,5	7	10	7,8	Sedang
3.	600 ppm	10,5	8	7	8,5	Sedang
4.	800 ppm	10	8	9	9	Sedang
5.	1000 ppm	10,5	8	8,5	9	Sedang
6.	Meropenem	19	26	23	22,6	Sangat kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

Tabel 9. Hasil uji akktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas luteola*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	6	6	8	6,6	Sedang
2.	400 ppm	6	9	7	7,3	Sedang
3.	600 ppm	7	7	8	7,3	Sedang
4.	800 ppm	7	8	9	8	Sedang
5.	1000 ppm	9	9	10	9,3	Sedang
6.	Meropenem	33	29	31	31	Sangat kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

Tabel 10. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Burkholderia cepacia*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	5	0	7	4	Lemah
2.	400 ppm	0	7	7	4,6	Lemah
3.	600 ppm	0	9	7	5,3	Sedang
4.	800 ppm	7,5	0	9	5,5	Sedang
5.	1000 ppm	10	8	7,5	8,5	Sedang
6.	Meropenem	28	28	27	27,6	Sangat kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

Tabel 11. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii*

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	6,5	-	7	4,5	Lemah
2.	400 ppm	7	8	6	7,6	Sedang
3.	600 ppm	8	9	7,5	8,1	Sedang
4.	800 ppm	8,5	8	9	8,5	Sedang
5.	1000 ppm	9	10	9,5	9,5	Sedang
6.	Meropenem	31	28	26	28,3	Sangat kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

Tabel 12. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Proteus mirabilis*.

No	Konsentrasi	Diameter zona hambat (mm)			Rata-rata	Keterangan
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1.	200 ppm	8	6,5	0	4,8	Lemah
2.	400 ppm	9	7,5	0	5,5	Sedang
3.	600 ppm	9,5	8	0	5,8	Sedang
4.	800 ppm	10	9	0	6,3	Sedang
5.	1000 ppm	11	9	0	6,6	Sedang
6.	Meropenem	31	28	26	28,3	Sangat kuat
7.	Aquadest	0	0	0	0	-

B. Pembahasan

Penyakit merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, namun Allah tidak memberikan sesuatu melainkan didalamnya memiliki hikmah yang amat besar dan tidak mungkin di luar kemampuan dan pengetahuan manusia. Seperti halnya dengan penyakit yang diberikan oleh Allah, pasti menyertakan obatnya.

Al-Qur'an dan hadist dalam hal ini adalah pedoman dalam melakukan berbagai pengobatan, agar sesuai dengan syariat islam. Terapi pengobatan dan doa tidak dapat dipisahkan, namun kesembuhan yang sebenarnya bersumber dari-Nya, seperti pengobatan tradisional ataupun dengan pengobatan medis. Salah satu ciptaannya yang digunakan sebagai pengobatan adalah tumbuhan.

Allah Subhanahu Wa Ta'al telah menciptakan dua kebutuhan utama manusia yaitu sumber makanan yang memadai dan pengobatan serta kebutuhan manusia lainnya (Budiman, 2007: 223). Firman-Nya dalam surah As- Syu'ara/26: 7 adalah:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Departemen Agama RI, 2018: 367).

Jenis tumbuhan yang paling baik dalam hal ini adalah yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan dalam pengobatan (Savitri, 2008: 5). Salah satu jenis tumbuhan adalah tanaman kemangi. Tanaman daun segar kemangi memiliki bau khas dan memiliki banyak khasiat, seperti antiinflamasi (antiradang), mencegah rambut rontok, menghilangkan bau

badan, dan peluruh air seni. Beberapa kandungan metabolit sekunder yang ada di dalamnya antara lain alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin (A, B, dan C) (Hariana, 2008: 183).

Berdasarkan uraian diatas bahwa daun kemangi memiliki bau khas yang dimana dengan adanya kandungan senyawa metabolit sekunder yang dapat mengatasi berbagai masalah penyakit. Hal ini Allah swt menciptakan tumbuhan sebagai pengobatan. Dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rahman/55:12:

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۚ ۱۲

“Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya” (Departemen Agama RI, 2018).

Ayat diatas menjelaskan bahwa bumi bukan hanya sekedar hamparan, tetapi juga menyediakan bahan pangan dan kenyamanan hidup makhluk, karena didalamnya yakni dihamparkan-Nya itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang tempat buah-buahnya sebelum buah itu muncul. Dan ada juga biji-bijian yang berkulit atau berdaun dan bunga-bunga yang harum aromanya.

Kata (لَحَبٌ) al-habb dipahami dalam arti tumbuhan yang merupakan makanan pokok, seperti beras dan gandum. Kata (أَلْعَصْفِ) al-ashf pada ayat ini adalah daun atau daun kering. Kata itu sendiri berarti bergerak. Daun dinamai ‘ashf karena ia digerakkan oleh angin. Penyebutan kata tersebut untuk memperindah gaya bahasa sambil mengingatkan anugerah keindahan yang diciptakan Allah pada tumbuhan itu.

Kata (لَرِيحَانٌ) raihan terambil dari kata ra'ihah yaitu aroma. Raihan adalah kembang-kembang yang memiliki aroma yang harum, seperti Ros, Yasmin, Kemuning dan lain-lain. ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti daun yang hijau yakni sebagai antonim dari al- 'ashfl daun yang kering (Shihab, 2002,13:502-503).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah swt menciptakan segala sesuatu kepada hambanya berupa makanan dan segala macam rezeki dengan menumbuhkan beraneka macam tumbuhan yang memiliki aroma harum. Dalam hal ini, tumbuhan yang dimaksud adalah daun kemangi yang memiliki aroma yang harum. Selain dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan digunakan sebagai wewangian, juga dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt dimuka bumi ini, tidak ada yang sia-sia.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) yang didapatkan dari Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Sebelum sampel digunakan terlebih dahulu dilakukan uji determinasi yang bertujuan untuk membuktikan bahwa jenis tanaman yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan yang dimaksudkan, sehingga tidak ada kesalahan dalam pengambilan sampel. Kebenaran dalam penggunaan tanaman dalam penelitian merupakan syarat penting dalam penelitian untuk menjamin bahwa tanaman yang digunakan benar-benar spesies tanaman yang digunakan bukan spesies tanaman yang lain. Hasil keputusan yang diambil dari laboratorium Farmakognosi-Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia Makassar diambil pernyataan bahwa

tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*).

Selanjutnya dilakukan uji identifikasi golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kemangi. Uji fitokimia yang dilakukan meliputi uji senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin dan steroid. Uji kandungan tanin, saponin dan alkaloid menunjukkan hasil positif. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Aminah et al, (2020) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung senyawa, dan minyak atsiri. Senyawa aktif yang didapatkan pada penelitian Surahmaida (2019) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun kemangi mengandung alkaloid, saponin, tanin, terpenoid, steroid, dan minyak atsiri. Ekstrak daun kemangi mengandung senyawa metabolit sekunder berupa senyawa minyak atsiri, karbohidrat, fitosterol, alkaloid, fenol, tanin, lignin, pati, saponin, flavonoid, terpenoid, antrakuinon, minyak volatile termasuk metil sinamat, metil heptenon, metil nonilketon, kamfor, dan sitrat (Dhale D, 2012). Perbedaan kandungan metabolit sekunder pada daun kemangi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama faktor lingkungan yaitu suhu, kelembapan, ketersediaan air, cahaya matahari, sifat fisika dan kimia tanah, dan iklim (Alvita, 2015).

Menurut Yuhana *et al*, daun kemangi mengandung senyawa metabolit yaitu senyawa fenol. Senyawa bersifat lipofilik yang akan merusak dinding sel bakteri. Mekanisma kerja sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa kompleks dengan

protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membrane sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Yuhana SA,2013). Senyawa saponin dapat menghambat sintesis protein karena terakumulasi dan menyebabkan kerusakan komponen-komponen penyusun sel bakteri. Saponin termasuk ke dalam kelompok antibakteri yang bersifat bakterisidal. Hal ini didasari mekanisme kerja saponin yang berinteraksi dengan sterol sehingga membuat dinding sel bakteri rusak dan terjadi pelepasan komponen penting dari dalam sel bakteri yang pada akhirnya sel bakteri mengalami lisis. Senyawa alkaloid yaitu dengan menghambat komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga menyebabkan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan terjadi kematian sel (Pelczar M J & Chan ECS. 2006).

Adapun pengujian selanjutnya dilakukan pengukuran diameter zona hambat dimana didapatkan hasil menunjukkan bahwa setiap konsentrasi sampel memberikan ukuran diameter hambatan yang berbeda-beda. Zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 6,6 mm, 7,5 mm, 8,5 mm, 9,1 mm, dan 11 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Proidencia stuartii* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 5,6 mm, 7,5 mm, 7,8 mm, 8,5 mm, dan 8,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Citrobacter freudii* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 6,8 mm, 7,8 mm, 8,5 mm, 9 mm, dan 9 mm. Adapun

zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Pseudomonas luteola* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 6,6 mm, 7,3 mm, 7,3 mm, 8 mm, dan 9,3 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Burkholderia cepacia* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 4 mm, 4,6 mm, 5,3 mm, 5,5 mm, dan 8,5 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Acinetobacter baumannii* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 4,5 mm, 7,6 mm, 8,1 mm, 8,5 mm, dan 9,5 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk perlakuan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm dengan bakteri uji *Proteus mirabilis* setelah masa inkubasi 24 jam berturut-turut adalah 4,8 mm, 5,5 mm, 5,8 mm, 6,3 mm, dan 6,6 mm.

Bakteri pada pengujian ini yang digunakan adalah bakteri gram negatif. Adapun pemilihan bakteri uji ini karena bakteri gram negatif secara umum lebih resisten terhadap ekstrak tumbuhan daripada bakteri gram positif. Hal ini disebabkan karena perbedaan morfologi dinding sel kedua bakteri tersebut. Bakteri gram negatif memiliki lapisan luar lipopolisakarida hidrofilik yang tingkat resistensinya lebih tinggi terhadap penetrasi agen antibakteri dan memiliki beberapa enzim di periplasma yang dapat memecah molekul antibakteri (Famuyide *et al.*, 2019). Pengujian dilakukan terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri gram negatif yang bersifat patogen bagi manusia sehingga dapat menyebabkan berbagai infeksi

dimana infeksi tersebut sulit untuk diobati karena *P. aeruginosa* adalah bakteri yang resisten terhadap sebagian besar antibiotik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya biofilm pada bakteri *P. aeruginosa*., *Proidencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholdseria cepacia*, *Acinetobacter bumanni* dan *Proteus merabillis*. Selain itu, bakteri terbanyak yang terisolasi pada pasien yang menjalani amputasi adalah *Proteus mirabilis* dengan presentase sebanyak 80%. Berdasarkan penelitian Salim, ditemukan 84 isolat bakteri pada pasien ulkus diabetik yang teregistrasi di Laboratorium Mikrobiologi RSUP Klinik Sanglah, dimana 63 isolat bakteri gram negatif dan 21 isolat bakteri gram positif. Tiga bakteri gram negatif terbanyak yaitu *Klebsiella pneumoniae sp*, *Proteus mirabilis*, *Acinetobacter baumannii*. Dari 84 isolat bakteri yang ditemukan pada pasien kaki yang teregistrasi di Laboratorium Mikrobiologi RSUP Klinik Sanglah, sebagian besar bakteri gram negatif sensitive terhadap amikacin, ertapenem, dan meropenem (Salim et al., 2020). Bakteri ini ditemukan pada pasien yang mengalami infeksi ulkus diabetikum.

Pembanding yang digunakan dalam penelitian ini adalah antibiotik meropenem. Kontrol positif menggunakan antibiotik meropenem menunjukkan hasil dengan kategori zona hambat sangat kuat. Antibiotik meropenem termasuk antibiotik yang efektif dalam mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Klebsiella sp* dan umum dipakai secara luas (Afifah dkk, 2017).

Diameter daerah hambatan yang dibentuk oleh meropenem terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 19,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji *Proidencia stuartii*

setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 26,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji *Citrobacter freudii* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 22,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji *Pseudomonas luteola* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 31 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji *Burkholderia cepacia* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 27,6 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk bakteri uji *Acinetobacter bumannii* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 28,3 mm. Adapun zona hambat yang terbentuk untuk bakteri uji *Proteus merabillis* setelah masa inkubasi 24 jam berturut- turut adalah 28,3 mm.

Aquadest digunakan sebagai kontrol negatif, tidak terbentuk zona hambat dan tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri karena aquadest termasuk senyawa netral (Suciari dkk, 2017). Aquadest juga digunakan untuk melarutkan sampel uji. Dimana aquadest digunakan sebagai kontrol negatif untuk mengetahui apakah aquadest memiliki aktivitas atau sampel uji yang bekerja.

Faktor paling utama dapat menentukan efektivitas kerja dari zat antibakteri adalah konsentrasi, waktu yang diberikan pada bahan tersebut untuk bekerja, suhu, jumlah dan tipe organisme (Volk dan Wheller, 1988). Perbedaan besarnya zona hambat yang dihasilkan dipengaruhi berdasarkan perbedaan jumlah kandungan zat aktif pada masing- masing konsentrasi. Daerah zona hambat yang diamati terlihat bahwa besar diameter zona hambat juga sejalan dengan tingginya kadar konsentrasi. Perbedaan diameter zona hambat juga dapat dipengaruhi oleh jenis bakterinya,

dimana setiap bakteri memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel uji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata diameter hambatan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri pertama, bakteri *Pseudomonas aeruginosa* terlihat pada konsentrasi 1000 ppm memiliki rata-rata diameter 11 mm berada pada range 10-20 mm yang artinya menunjukkan aktivitas antibakteri dengan kategori kuat. Untuk konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm yang berada pada range 5-10 mm yang termasuk kategori sedang.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri kedua, ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Providencia stuartii*, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri ketiga, ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Citrobacter freundii*, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri keempat, ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Pseudomonas luteola*, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri kelima, dimana ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Burkholderia*

cepacia, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk kategori sedang. Untuk konsentrasi 200 ppm dan 400 ppm memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range < 5 mm termasuk dalam kategori lemah.

Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri keenam, dimana ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Acinobacter baumannii*, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk kategori sedang. Untuk konsentrasi 200 ppm memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range < 5 mm termasuk dalam kategori lemah. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan pada bakteri ketujuh, dimana ekstrak etanol daun kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Proteus mirabilis*, aktivitas antibakteri terlihat pada konsentrasi 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm, dan 1000 ppm yang berada pada range 5-10 mm termasuk kategori sedang. Untuk konsentrasi 200 ppm memiliki nilai rata-rata diameter yang berada pada range < 5 mm termasuk dalam kategori lemah.

Diameter daerah hambatan yang dihasilkan oleh antibiotik meropenem dengan bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* dengan range 19,6 mm termasuk dalam daya antibakteri kuat. Sedangkan untuk bakteri uji *Providencia stuartii* *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholdseria cepacia*, *Acinetobacter bumanni* dan *Proteus merabilis* berturut-turut adalah 26,6 mm, 22,6 mm, 31 mm, 27,6 mm, 28,3 mm, dan 28,3 mm termasuk dalam kategori daya antibakteri sangat kuat.

Menurut David dan Stout (1971), daya antibakteri berdasarkan diameter zona hambat terdiri dari: sangat kuat (zona hambat lebih dari 20 mm), kuat (zona hambat 10-20 mm), sedang (zona hambat 5-10 mm), dan lemah (zona hambat kurang dari 5 mm). Suatu agen antibakteri dapat dikatakan mempunyai aktivitas yang baik atau tinggi bila diameter zona hambat minimal terjadi pada kadar antibakteri yang rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya hambat yang tinggi (Absor,2006:7).

Data diameter hambatan kemudian dihitung dengan metode regresi linear sederhana untuk melihat adanya hubungan antara konsentrasi ekstrak daun kemangi dengan aktivitas penghambatan bakteri *Pseudomonas aeruginosa.*, *Proidencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholdseria cepacia*, *Acinetobacter bumanni* dan *Proteus merabillis*. Hal ini dapat dilihat pada hasil analisis varians dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna atau ada pengaruh perlakuan konsentrasi ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa.*, *Proidencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholdseria cepacia*, *Acinetobacter bumanni* dan *Proteus merabillis*.

Dilihat dari hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Pseudomonas aureginosa* sebesar 0,968 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 96,8%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Pseudomonas aureginosa* sebesar 0,968 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar

96,8%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Citrobacter freundii*. sebesar 0,899 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 89,9%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Pseudonas luteola* sebesar 0,841 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 84,1%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Bukholderia cepacia*. sebesar 0,811 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 81,1%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Acinetobacter baumannii* sebesar 0,900 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 90%. Hasil koefisien determinasi (R Square) pada tabel ANOVA bakteri *Proteus merabillis* sebesar 0,877 yang berarti variabel bebas (bakteri uji) memiliki pengaruh terhadap variable terikat (Konsentrasi ekstrak) adalah sebesar 87,7%.

Data hasil diameter zona hambat yang dianalisis secara statistik. Berdasarkan hasil tabel ANOVA pada bakteri *Pseudomonas aureginosa*, *Proidencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholdseria cepacia*, *Acinetobacter bumanni* dan *Proteus merabillis* menunjukkan hasil (α 0,00) berarti tingkat toleransi kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5% ($\alpha < 0,05$).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kemangi (*Ocimum basilicum L.*) dapat menghambat beberapa bakteri ppatogen khususnya bakteri ulkus 59erugino (*Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*), yang ditandai dengan adanya zona bening di luar paper disk yng berarti tidak ditumbuhi oleh bakteri. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak etanol daun kemangi dengan konsentrasi 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm mampu menghambat pertumbuhan bakteri ulkus diabetikum dengan membentuk ukuran diameter hambatan yang berbeda- beda. Pada konsentrasi 1000 ppm memiliki efektivitas paling besar. Hal ini disebabkan karena adanya senyawa alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin didalam sampel daun kemangi yang bersifat antibakteri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) pada konsentrasi 1000 ppm memberikan efektivitas paling besar sebagai agen antibakteri alami terhadap bakteri ulkus (*Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter bumannii*, dan *Proteus merabillis*).
2. Komponen senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) adalah alkaloid, flavanoid, saponin dan tanin.

B. Saran

1. Sebaiknya manusia selalu bersyukur atas nikmat yang Allah swt berikan termasuk daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) karena memiliki manfaat sebagai antibakteri alami dan manusia juga harus lebih memperhatikan ciptaan Allah swt termasuk daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) yang kemungkinan memiliki manfaat lain selain antibakteri.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengisolasi senyawa metabolit sekunder pada ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) sehingga dapat diperoleh senyawa tunggal yang berefek sebagai antibakteri.
3. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kemenag RI. (2011). Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia.
- Amaliyyah, R. (2021). *Studi Literatur Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis)*.
- Ayu Yulyastuti, Dyah et al. 2021. *Pencegahan Dan Perawatan Ulkus Diabetikum*. Kediri: Strada Press.
- Afifah, Afifah, Tunggul, A, P., dan Dewa S, P, P. 2017. *Resistensi Klebsiella sp Terhadap Meropenem di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto*. Scripta Biologica. Vol.4. No. 2. Hal. 135- 137.
- Agistia, N., Mukhtar, H. and Nasif, H. (2017), *Efektifitas Antibiotik pada Pasien Ulkus Kaki Diabetik"*, Jurnal Sains Farmasi & Klinis, 4(1), pp. 43–48. Doi:10.29208/jsfk.2017.4.1.144.
- Ainurrochmah, A., Ratnasari, E., dan Lisdiana, L. 2012. *Efektivitas Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia) terhadap Penghambatan Pertumbuhan Bakteri Shigella flexneri dengan Metode Sumuran*. Lentera Bio. 2(3): 233 – 237.
- Amiarsih, D.Y., Murtiningsih dan Sjaifullah. 2006. *Pengaruh jenis dan perbandingan pelarut terhadap hasil ekstraksi minyak atsiri mawar*. Indonesia Jurnal. Hort, 16(4): 356-359.
- Atikah, Nur. 2013. *Uji Aktivitas Antimikroba Ekstrak Herba Kemangi (Ocimum americanum L.) Terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans*. Skripsi.
- Akbar G.T., Karimi J. and Anggraini D., 2014, *Pola Bakteri dan Resistensi Antibiotik Pada Ulkus Diabetik Grade Dua di RSUD Arifin Achmad Periode 2012*, JOM, 1 (2), 1–15.
- Baldwin, C, M., Lyseng, W., dan Susan J, K. 2008. *Meropenem: A review Of Its Usen In Treatment Of Serious Bacterial Infections*. Drugs Monit. Vol. 25. No. 5. Hal. 593- 599
- Budiman, A., R.D. Kusumaningtyas, Y. S. Pradana, dan N. A. Lestari. 2014. *Biodiesel Bahan Baku, Proses dan Teknologi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Budiman, Arief. Dkk. 2017. *"Biodiesel Bahan Baku, Proses dan Teknologi"*. Yogyakarta. Gadjah Mada Press.
- Brunton L, Keith, Donald L. *Goodman & Gillman's Manual of Pharmacology and Therapeutics*. Diterjemahkan oleh July Manurung. Jakarta: ECG; 2010.
- Chairunnisa, S., Wartini, N. M., & Suhendra, L. (2019). *Pengaruh Suhu dan Waktu Maserasi terhadap Karakteristik Ekstrak Daun Bidara (Ziziphus mauritiana L.) sebagai Sumber Saponin*. Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Agroindustri, 7(4), 551. <https://doi.org/10.24843/jrma.2019.v07.i04.p07>.
- Clayton W, Elasy TA., 2009. *A Review of The Pathophysiology, Classification, And Treatment of Foot Ulcers in Diabetic Patients*. Clin Diabetes. 27(2): 52-58.
- Davis, W. W. dan T. R. Stout. 1971. *Disc plate methods of microbiological antibiotic assay*. Microbiology 22: 659-665.
- Decroli E, Jazil K, Asman M, dan Syafril S. *Profil Ulkus Diabetik Pada Penderita Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang*. Majalah Kedokteran Indonesia. 2008;58(1):1–7.


- Desalu, O.O. et al. 2011. *Diabetic Foot Care: Self Reported Knowledge and Practice Among Patients Attending Three Tertiary Hospital In Nigeria*. Ghana Medical Journal. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3158533/>. Diakses 30 Januari 2017.
- Dhale D, Birari A, Dhulgande S. *Preliminary screening of antibacterial and phytochemical studies of ocimum americanum Linn*. Jecobiotechnology. 2012; 2: hal.11–3
- Firdaus M, Prihanto AA, Nurdiani R. *Tanaman Bakau: Biologi dan Bioaktivitas*. Universitas Brawijaya Press; 2013.
- Frykberg, R. G. 2002. *Diabetic Foot Ulcers: Pathogenesis and Management*. American Family Physician J. 66 (9):1655-22.
- Garrity. G. M., Bell. J. A. and Lilburn, T.G. 2008. *Taxonomic Outline of The Prokaryotes bergey's Manual of Systematic Bacteriology*. 2th Edition. United States of America, Springer, New York Berlin Heidelberg.
- Gritter, R. J, Schwerting, A. E.1991. *Pengantar Kromatografi*. Edisi Kedua. Terjemahan Kosasih Panwawita. Penerbit ITB : Bandung.
- Hariana, A. 2009. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya Seri 3. Cet.5*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hatanta, A. *Kajian Penggunaan Antibiotik Pada Pasien Infeksi Ulkus Kaki Diabetik IRNA Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Djamil Padang. (Tesis)*. Universitas Andalas. Padang; 2013.
- Harbourne, JB, 1987, *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*, Terbitan II, Bandung Penerbit ITB, halaman 6 dan 7.
- Hendra, M., Nugraha, S., Wahyuni, N., Ayu, P., & Saraswati, S. (2019). *Neuromuscular Facilitation Pada Ulkus Diabetikum the Effectiveness of Low Power Laser Therapy and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation on Grade 2 Diabetic Foot Ulcers*. 43–50.
- IDF. 2017. *132 Diabetes Research and Clinical Practice New IDF Clinical Practice Recommendations for Managing Type 2 Diabetes in Primary Care*.
- Insiyah & Hastuti, R. T. (2016). *Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Tentang Diet Diabetes Mellitus pada Pasien Diabetes Mellitus di Puskesmas Sibela Kota Surakarta*. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, V (5), 01-109.
- Jawetz, Melnick, & Adelberg, Ed.23, *Translation of Jawetz, Melnick, and Adelberg's Medical Microbiology*, 23th Ed. Alih 62erugi oleh Hartanto, H., et. Al. Jakarta: EGC
- Jawetz, E., Melnick, J. L. & Adelberg, E. A., 2001, *Mikrobiologi Kedokteran*, edisi pertama, diterjemahkan oleh bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UNAIR, 224-227, 233-235, Surabaya, Salemba Medika.
- Katzung B, Susan B, Masters, Anthony J. *Basic of Clinical Pharmacology 10th edition*. USA: McGraw-Hill Companies; 2014.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI.
- Kuswandi, M., 2011, *Strategi Mengatasi Bakteri yang Resisten terhadap Antibiotika*, 10-12, Pidato pengukuhan jabatan guru besar pada Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kusuma, Weda, 2010. *Efek ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L) terhadap kerusakan hepatosit mencit akibat minyak sawit dengan pemanasan berulang*. Surakarta: fakultaskedokteran Universitas sebelas maret.

- Kurniawati, I., Maftuch, & Hariati, A. M. (2016). *Penentuan Pelarut Dan Lama Ekstraksi Terbaik Pada Teknik Maserasi Gracilaria Sp. Serta Pengaruhnya Terhadap Kadar Air Dan Rendemen*. Samakia: Jurnal Ilmu Perikanan, 7(2),7277. <http://www.samakia.aperiki.ac.id/index.php/JSAPI/article/view/106>.
- Kumalasari, M. L. F., & Andiarna, F. (2020). *Uji Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum basilicum L)*. Indonesian Journal for Health Sciences, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24269/ijhs.v4i1.2279>
- Leekha S, Terrell CL, Edson RS. *General principles of antimicrobial therapy: Mayo Clinic Proceeding*. 2011;86(2):156-67.
- Lipsky BA, Anthony R, Berendt, Paul BC, James CP, Edgar JGP, David GA, Gunner DH, Jhon ME, Warren SJ, Adolf WK, Michael SP, Eric S. *Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline: IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections*. 2012;54(1):132-147.
- Lipsky BA, Anthony R, Berendt, Paul BC, James CP, Edgar JGP, David GA, Gunner DH, Jhon ME, Warren SJ, Adolf WK, Michael SP, Eric S. *Infectious Diseases Society of America Clinical Practice Guideline: IDSA Guidelines for Diabetic Foot Infections*. 2012;54(1):132-147.
- Lusi, L. R. H. D. F. W. A. (2016). *Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (Moringa Oleifera L.) Terhadap Bakteri Escherichia Coli dan Staphylococcus Aureus*. Pharmacon, 5(2), 282–289.
- Mangsana, H. dan Mulyati R. *Telaah Etnobotani Croton tiglium L. sebagai Obat Tradisional dan Prospek Perkembangannya di Bengkulu*. Bogor: Puslitbang LIPI, 2008.
- Mustapa, M. A. (2014). *Tumbuhan Senyawa Penghambat Bakteri*. In Ideas Publishing (pp. 1–70).
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif*. Atlantic Economic Journal, VII (2), 361–367. <https://doi.org/10.1007/s11293-018-9601-y>.
- Nur, S., Sami, F. J., Awaluddin, A., & Afsari, M. I. A. (2019). *Korelasi Antara Kadar Total Flavonoid dan Fenolik dari Ekstrak dan Fraksi Daun Jati Putih (Gmelina Arborea Roxb.) Terhadap Aktivitas Antioksidan*. Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy) (e-Journal), 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2019.v5.i1.12034>.
- Otta, Sarita, Nagen Kumar Debata, and Bichitrananda Swain. 2019. *“Bacteriological Profile of Diabetic Foot Ulcers.”* CHRISMED Journal of Health and Research 6(1): 7.
- Pelczar, M.J., dan Chan, E.C.S..1988. *Dasar – Dasar Mikrobiologi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Purnamaningsih, N., & Supadmi, F. R. S. (2020). *Potensi Ekstrak Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) Sebagai Antibakteri Terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923*. Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwifery, Environment, Dentist), 15(3), 522–525. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v15i3.875>.
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rollando, S. Farm., M.Sc., A. (2019). *Senyawa Antibakteri dari Fungi Endofit*.
- Roza, RL., Afriant, R., Edward, Z., (2015). *Faktor Risiko Terjadinya Ulkus Diabetikum pada Pasien Diabetes Mlitus yang Dirawat Jalan dan Inap*. Jurnal Kesehatan Andalas; 4(1).

- Sarah SM dan Lamia A.M. 2015. *Estimation of the phitochemical constituens and biological activity of 64erug Ocimum sanctum L. extracts*. Int J Pharm Bio Sci 2015 Jan.; 6(1): (B) 999 – 1007.
- Savitri, E. Sandi. *Rahasia Tumbuhan Bekhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang. Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, & Keserasian Al-Qur'an. Volume 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, dan 15*; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofiana, I. (2020). *Uji Aktivitas Antibakteri Pada Bakteri Salmonella sp. Dengan Ekstrak Kulit Batang, Daun dan Buah Mangrove Sonneratia caseolaris*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43075>.
- Threenesia, A., & Ramadhian, M. R. (2019). *Perbandingan Efek Pemberian Ekstrak Etanol Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) terhadap Daya Hambat Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Salmonella typhi Secara In Vitro*. J Agromedicine, 6(1), 120–124.
- Ustavian Hasanah. 2010. *Daya Bunuh Ekstrak Daun Kemangi Ungu (Ocimum sanctum) Terhadap Larva Anopheles aconitus*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Wasito, Hendri. (2011). *Obat Tradisional Kekayaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Graham Ilmu.
- Wullur, A., Schaduw, J., & Wardhani, A. (2012). *Identifikasi Alkaloid Pada Daun Sirsak (Annona muricata L.)*. Jurnal Ilmiah Farmasi Poltekkes Manado, 3(2), 96483.
- Yuhana SA, Kusdarwati R, Meles K, *Daya antibakteri ekstrak daun kemangi (Ocimum sanctum L.)*. Surabaya: Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga; 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2. Skema Kerja

a. Penyiapan Sampel




b. Pembuatan Medium NA (*Nutrient Agar*)




c. Pembuatan Medium *Mac Conkey*




d. Peremajaan Bakteri




e. Pembuatan Suspensi Bakteri




f. Sterilisasi Alat dan Bahan



g. Pengujian Aktivitas Daya Hambat



h. Skema kerja Skrining Fitokimia



Lampiran 3. Perhitungan Seri Konsentrasi Ekstrak Kemangi

Larutan Stok :

$$20 \text{ gram } (20 \times 1000) = 20.000 \text{ mg}$$

20 mL Aquadest

Untuk 1000 ppm :

$$PPM = \frac{mg}{L} = \frac{20.000 \text{ mg}}{20 \text{ ml}} = 1000 \text{ ppm}$$

Untuk 800 ppm :

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 800 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{4000}{1000} = 4 \text{ mL}$$

Untuk 400 ppm :

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 400 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{2000}{1000} = 2 \text{ mL}$$

Untuk 600 ppm :

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times 600$$

$$V_1 = \frac{3000}{1000} = 3 \text{ mL}$$

Untuk 200 ppm :


$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 5 \text{ ml} \times$$

$$V_1 = \frac{1000}{1000} = 1 \text{ mL}$$



Lampiran 4. Gambar Daun Kemangi




Gambar 4. Sampel Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*)

Keterangan:

- a. Daun Kemangi (*Ocimum basilicum L.*),
- b. Sortasi basah daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*),
- c. Pengeringan sampel daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*)
- d. Penimbangan sampel kering daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*)


Lampiran 5. Hasil Skrining Fitokimia



Gambar 5. Skrining Fitokimia

- Keterangan :
- a. Penimbangan ekstrak untuk uji fitokimia
 - b. Bahan yang digunakan untuk uji fitokimia (HCL Pekat, HCL 1%, serbuk Mg, dan FeCl_3)
 - c. Hasil uji tanin ekstrak etanol
 - d. Hasil uji saponin ekstrak etanol
 - e. Hasil uji alkaloid ekstrak etanol
 - f. Hasil uji terpenoid ekstrak etanol

Lampiran 6. Pengujian Aktivitas Antibakteri




Gambar 6. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan:

- a. Peremajaan bakteri uji.
- b. Diinokulasikan bakteri di atas nutrient agar menggunakan cotton swab steril.
- c. Dijenuhkan kertas cakram larutan uji.
- d. Diletakkan piper disk yang telah dijenuhkan di atas medium.
- e. Paper disk Antibakteri Meropenem.

Lampiran 7. Hasil Uji Daya Hambat

a. Bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Providencia stuartii*



Gambar 7. Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Keterangan:

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* percobaan 3




Gambar 8. Hasil pengujian aktivitas daya hambat Bakteri *Providencia stuartii*

Keterangan :

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Providencia stuartii* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Providencia stuartii* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Providencia stuartii* percobaan 3


b. Bakteri *Citrobacter freundii* dan *Pseudomonas luteola*.



Gambar 9. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri *Citrobacter freundii*

Keterangan:

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Citrobacter freundii* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Citrobacter freundii* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Citrobacter freundii* percobaan 3



Gambar 10. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri *Pseudomonas luteola*

Keterangan :

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas luteola* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas luteola* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Pseudomonas luteola* percobaan 3

c. Bakteri *Burkholderia cepacia* dan *Acinetobacter baumannii*.



Gambar 11. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri *Burkholderia cepacia*.

Keterangan:

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Burkholderia cepacia* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Burkholderia cepacia* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Burkholderia cepacia* percobaan 3




Gambar 12. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri *Acinetobacter baumannii*.

Keterangan:

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii* percobaan 3

b. Bakteri *Proteus mirabilis*.



Gambar 13. Hasil pengujian aktivitas daya hambat bakteri *Proteus mirabilis*.

Keterangan:

- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Proteus mirabilis* percobaan 1
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Proteus mirabilis* percobaan 2
- Hasil uji daya hambat ekstrak etanol daun kemangi terhadap bakteri *Proteus mirabilis* percobaan 3

Lampiran 8. Perhitungan daerah hambat ekstrak etanol daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) dengan Metode Analisis Regresi Sederhana pada masing-masing bakteri uji.

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap *Pseudomonas auroginosa*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.682	.662	1.022

a. Predictors: (Constant), *Pseudomonas aeurigoonasa*

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.799	1	35.799	34.295	.000 ^b
	Residual	16.701	16	1.044		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), *Pseudomonas aeurigoonasa*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.236	.607		.389	.703
	<i>Pseudomonas aeurigoonasa</i>	.313	.054	.826	5.856	.000

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Tabel 2. Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap *Citrobacter freundii*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.511	.481	1.266

a. Predictors: (Constant), *Citrobacter freundii*

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.837	1	26.837	16.731	.001 ^b
	Residual	25.663	16	1.604		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Citrobacter freudii

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.211	.634		1.910	.074
	Citrobacter freudii	.215	.053	.715	4.090	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap *Pseudomonas luteola*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.714 ^a	.510	.479	1.268

a. Predictors: (Constant), Pseudomonas luteola

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.769	1	26.769	16.646	.001 ^b
	Residual	25.731	16	1.608		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Pseudomonas luteola

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.885	.496		3.801	.002
	Pseudomonas luteola	.139	.034	.714	4.080	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap *Burkholderia cepacia*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.718 ^a	.515	.485	1.262

a. Predictors: (Constant), Burkholderia cepacia

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.036	1	27.036	16.988	.001 ^b
	Residual	25.464	16	1.591		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Burkholderia cepacia

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.205	.433		5.096	.000
	Burkholderia cepacia	.140	.034	.718	4.122	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.564	1.16087

a. Predictors: (Constant), Acinetobacter bumanni

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.938	1	30.938	22.957	.000 ^b
	Residual	21.562	16	1.348		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Kosentrasi

b. Predictors: (Constant), Acinetobacter bumanni

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.714	.462		3.705	.002
	Acinetobacter bumanni	.162	.034	.768	4.791	.000

a. Dependent Variable: Kosentrasi

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap bakteri *Providencia stuartii*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.491	1.253

a. Predictors: (Constant), Providencia stuartii

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.373	1	27.373	17.431	.001 ^b
	Residual	25.127	16	1.570		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Providencia stuartii

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.694	.524		3.233	.005
	Providencia stuartii	.167	.040	.722	4.175	.001

a. Dependent Variable: Konsentrasi

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana ekstrak daun kemangi (*Ocimum basilicum L.*) terhadap *Proteus merabillis*.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 ^a	.409	.372	1.39311

a. Predictors: (Constant), Proteus merabillis

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	21.448	1	21.448	11.051	.004 ^b
	Residual	31.052	16	1.941		
	Total	52.500	17			

a. Dependent Variable: Konsentrasi

b. Predictors: (Constant), Proteus merabillis

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.372	.472		5.024	.000
	Proteus merabillis	.118	.035	.639	3.324	.004

a. Dependent Variable: Konsentrasi



Lampiran 9. Surat Kode Etik Penelitian



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXPEDITED
"ETHICAL EXPEDITED"

No. A099/KEPK/FKIK/XI/2022.

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : MIFTAHUL FATIHAH
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Daun Kemangi (Ocimum Santum L.) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetikum"

"Antibacterial Effectiveness Test of 96% Ethanol Extract of Basil Leaves (Ocimum sanctum. L) Against Diabetic Ulcer Bacteria."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Nov 2022 sampai dengan tanggal 24 Nov 2023.

This declaration of ethics applies during the period Nov 24, 2022 until Nov 24, 2023.

Nov 24, 2022
Professor and Chairperson.

DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.



Lampiran 11. Surat Penelitian RSP Universitas Hasanuddin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245

Website www.rs.unhas.ac.id Email info@rs.unhas.ac.id Telp: (0411) 591331 Fax: (0411) 591332

Nomor : 12374/UN4.24.1.1/PT.01.05/2022
Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

22 Desember 2022

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Miftahul Fatihah
NIM : 70100118012
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar Makassar
Kode Penelitian : 221207_1

Telah menyelesaikan penelitian di Rumah Sakit Unhas.

Terhitung pada tanggal : 16 Desember 2022

Dengan Sampel : Data Primer: Pemeriksaan Kultur

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

"UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL 96% DAUN KEMANGI (*Ocimum sanctum*. L) TERHADAP BAKTERI ULKUS DIABETIK"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Manajer Pendidikan dan Penelitian,



dr. Aslim Tassim, Sp. Onk. Rad, M.Kes
NIP. 198304252012121003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miftahul Fatihah, lahir di Sinjai, 28 September 2000 dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Nadering dan Harlina Sani. Ketika berumur 6 tahun, ia memulai Pendidikan di SDN 103 Bontompare. Kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMP 1 Sinjai di tahun 2015. Selepas lulus dari SMP kemudian dia melanjutkan sekolah lagi ke SMAN 5 Sinjai. Setelah lulus dari SMA di tahun 2018 dia melanjutkan pendidikannya mengambil Jurusan Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R