

**FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS PADA IBU HAMIL TERHADAP
KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RSKD IBU ANAK SITI FATIMAH**

MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MOCH. AFIF FACHRUL

NIM: 70600119031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Afif Fachrul
NIM : 70600119031
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 02 Juni 2001
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTP Blok H No. 807
Judul : Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Ibu Hamil
terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu
Anak Siti Fatimah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Februari 2023




Moch. Afif Fachrul
NIM : 70600119031

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Moch. Afif Fachrul, NIM: 70600119031, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: "Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Ibu Hamil terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 19 Februari 2023

Pembimbing 1



dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed

Pembimbing 2



Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Ibu Hamil terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah**” yang disusun oleh Moch. Afif Fachrul, NIM 70600119031, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, bertepatan dengan 27 Rajab 1444, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 19 Februari 2023

28 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : dr. Rini Fitriani, M.Kes (.....)


Pembimbing I : dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed (.....)

Pembimbing II: Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Halimah Sa'diyah, Sp.PD (.....)

Penguji II : Prof. Siti Aisyah, MA., Ph.D (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan anugerah-Nya penulis diberikan petunjuk dan kemampuan dengan segala keterbatasan untuk menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul **“Faktor Risiko Diabetes Mellitus pada Ibu Hamil terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar”**. Salawat serta salam tak lupa senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan hasil penelitian, penulis menyadari banyaknya tantangan dan hambatan yang dilalui. Penulis menyampaikan banyak terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama proses penyusunan hasil penelitian kepada orang tua penulis, Muh. Patarai dan Lilis Suharianti, dan saudari penulis, Alya Meutya Indira, yang selama ini selalu memberikan dukungan fisik maupun mental kepada penulis dalam melaksanakan studi dan menyugesti bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selama masih ada Allah swt dan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para wakil dekan dan staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan

kepada penulis selama menjalankan pendidikan.

3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto, M.Kes,Sp.JP selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. dr. Nadyah Haruna, M.Kes selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajar dan membimbing penulis.
5. Dosen penguji kompetensi, dr. Halimah Sa'diayh, M.Kes, Sp.PD dan dosen penguji integrasi keislaman, Prof. Siti Aisyah, MA., Ph.D yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran kepada penulis.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Pembimbing akademik saya Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes yang selalu kebersamai sejak awal masuk di pendidikan, mendengarkan keluh kesah, dan senantiasa memberikan ruang agar penulis bisa terus berkembang.
8. Manusia-manusia supportif yang ada disekitar saya, NIM 70600119021, Teman-teman KT (Didin, Firyal, Aini, Aura, dan Jeje), teman-teman Inte9rin, senior-senior saya yang sangat membantu saya yang senantiasa kebersamai sejak masih menjadi mahasiswa baru dan yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Sekali lagi, terima kasih banyak kepada semua pihak yang memiliki andil dalam penyelesaian proposal penelitian ini, semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 13 Februari 2023

Penulis,



Moch. Afif Fachrul



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	5
B. Integrasi Keislaman.....	7
C. Rumusan Masalah	12
D. Hipotesis	12
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kajian Pustaka	16
G. Tujuan Penelitian	19
H. Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Diabetes mellitus.....	18
B. Diabetes dalam Kehamilan	30
C. Preeklampsia.....	37
D. Kerangka Teori	47
E. Kerangka Konsep.....	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47

A.	Desain Penelitian.....	47
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C.	Populasi dan Sampel	47
D.	Instrumen Penelitian.....	48
E.	Teknik Pengambilan Sampel.....	48
F.	Teknik Pengolahan/Analisis Data.....	48
G.	Metode Pengumpulan Data	50
H.	Etika Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		51
A.	Gambaran Umum Penelitian.....	51
B.	Hasil	51
C.	Pembahasan	63
D.	Keterbatasan Penelitian	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....		77

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Definisi operasional	13
Tabel 1. 2 Kajian Pustaka	16
Tabel 4. 1 Karakteristik sampel penelitian	52
Tabel 4. 2 Analisis Hubungan Diabetes Mellitus Terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar	55
Tabel 4. 3 Analisis Hubungan Usia Ibu Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	56
Tabel 4. 4 Analisis Hubungan IMT Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	57
Tabel 4. 5 Analisis Hubungan Abortus Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	58
Tabel 4. 6 Analisis Hubungan Riwayat Preeklampsia Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	58
Tabel 4. 7 Analisis Hubungan Jumlah Paritas Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	60
Tabel 4. 8 Analisis Hubungan Anemia Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	61
Tabel 4. 9 Analisis Hubungan Leukosit Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Klasifikasi Etiologi Berdasarkan Jenis diabetes	23
Gambar 2. 2 Faktor risiko Diabetes mellitus tipe	24
Gambar 2. 3 Patomekanisme Diabetes mellitus.....	26
Gambar 2. 4 Standar diagnosis PERKENI 2021.....	33
Gambar 2. 5 Patomekanisme Diabetes Gestasional terhadap Preeklampsia	36
Gambar 2. 6 Etiologi Preeklampsia.....	40
Gambar 2. 7 Kerangka Teori	47
Gambar 2. 8 Kerangka Konsep	48
Gambar 3. 1 Metode Pengumpulan Data.....	50

Faktor Risiko Diabetes Mellitus Pada Ibu Hamil Terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah 2021

Moch. Afif Fachrul¹, Andi Irhamnia Sakinah¹, Nadyah Haruna¹, Halimah Sa'diyah¹, Siti Aisyah Kara²

¹Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

²Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: afiffachrul23@gmail.com

ABSTRAK

Preeklampsia merupakan keadaan seorang ibu hamil mengalami hipertensi pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih yang disertai dengan gangguan fungsi organ yang dapat ditandai dengan terjadinya proteinuria. Sampai saat ini preeklampsia masih menjadi salah satu keadaan yang sangat membahayakan ibu hamil dan menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak ibu hamil. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor risiko diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia dan hubungan beberapa variabel lainnya seperti usia, IMT, riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu dan anemia terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan *Case-Control*. Metode pengambilan sampel adalah dengan teknik total sampling dan diperoleh sebanyak 182 sampel dengan persebaran 91 sampel kasus dan 91 sampel kontrol dan diambil melalui rekam medik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 182 sampel, terdapat 9 ibu hamil (4,9%) dengan diabetes mellitus yang mengalami preeklampsia, terdapat 31 ibu hamil (17%) dengan usia <20 dan >35 tahun yang mengalami preeklampsia, terdapat 62 ibu hamil (34,1%) dengan IMT berisiko yang mengalami preeklampsia, terdapat 16 ibu hamil (8,8%) dengan

riwayat abortus yang mengalami preeklampsia, terdapat 35 ibu hamil (19,2%) dengan riwayat preeklampsia yang mengalami preeklampsia, terdapat 64 ibu hamil (35,2%) dengan jumlah paritas berisiko <2 atau >3 yang mengalami preeklampsia, terdapat 56 ibu hamil (30,8%) dengan anemia yang mengalami preeklampsia, Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor risiko diabetes mellitus, IMT, dan abortus pada ibu hamil dengan kejadian preeklampsia dan terdapat hubungan yang signifikan antara usia, riwayat preeklampsia, jumlah paritas, dan anemia pada ibu hamil dengan kejadian preeklampsia..

Kata Kunci: Preeklampsia, Diabetes Mellitus, Faktor Risiko



*Risk Factor of Diabetes Mellitus in a Pregnant Woman on The
Incidence of Preeclampsia in Women and Children Special Regional Hospital
Siti Fatimah Makassar*

*Moch. Afif Fachrul¹, Andi Irhamnia Sakinah¹, Nadyah Haruna¹, Halimah
Sa'diyah¹, Siti Aisyah Kara²*

*¹Medical Education Study Program, Faculty of Medicine and Health Sciences
UIN Alauddin Makassar*

²Faculty of Law and Syariah UIN Alauddin Makassar


Email: afiffachrul23@gmail.com

ABSTRACT

Preeclampsia is a condition where a pregnant woman having hypertension that occurs after 20 weeks of gestation accompanied with impaired organ function which can be marked by proteinuria. To this day, preeclampsia pose a very dangerous threat to pregnancy and has become the leading cause of death on pregnant women. The purpose of this study was to determine the relationship between risk factor of diabetes mellitus of pregnant woman with the incidence of preeclampsia and the relationship of other variables like age, body mass index, history of abortion, history of preeclampsia, parity and anemia with the incidence of preeclampsia at Siti Fatimah Makassar Woman and Children Regional Special Hospital in 2021. This type of research was an analytic observational study with a case control approach. The sampling method was the total sampling technique and 182 samples which 91 case sample and 91 control sample were obtained through medical records. The result showed that of the 182 sample, there were 9 pregnant women (4,9%) with diabetes mellitus who had preeclampsia, 31 pregnant women (17%) age <20 and >35 who had preeclampsia, 62 pregnant woman (34,1%) with risky BMI who had preeclampsia, 16 pregnant woman (8,8%) with history of

previous abortion who had preeclampsia, 35 pregnant woman (19,2%) with history of previous preeclampsia who had preeclampsia, 64 pregnant woman (35,2%) with parity <2 and >3 who had preeclampsia, 56 pregnant woman (30,8%) with anemia who had preeclampsia. Conclusion: there is no significant relationship between risk factor of diabetes mellitus, BMI, and previous history of abortion with the incidence of preeclampsia and there is a significant relationship between age, previous history of preeclampsia, parity, and anemia with the incidence of preeclampsia.

Keywords: Preeclampsia, Diabetes Mellitus, Risk Factor



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu kesehatan ibu dan anak masih merupakan salah satu hal yang membutuhkan perhatian lebih oleh dunia khususnya di Indonesia. Salah satu indikator penting dalam penilaian terhadap berhasilnya sebuah negara dalam penanganan kesehatan ibu dan anak adalah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Semakin kecil AKI di suatu daerah maka semakin baik penilaian terhadap penanganan kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut. Data WHO menunjukkan di tahun 2017 AKI mencapai 295.000 wanita yang berarti sekitar 810 wanita yang meninggal setiap harinya di dunia ini dan 94% dari AKI tersebut terjadi di negara dengan pendapatan per kapita rendah sampai menengah dengan rasio kematian 462 per 100.000 lahir hidup di negara berkembang dan pada negara maju rasio kematiannya hanya 11 per 100.000. Menurut WHO, sebagian besar kematian tersebut diakibatkan oleh komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang sebenarnya bisa dicegah. Komplikasi penyebab utama yang menjadi penyebab kematian ibu salah satunya adalah preeklampsia yang bila digabungkan dengan komplikasi utama lainnya seperti *postpartum hemorrhage* (PPH) dan infeksi saat dan setelah bersalin maka hampir mencapai angka 75% penyebab kematian maternal (WHO, UNICEF, 2019; WHO, 2021). Preeklampsia merupakan keadaan terjadinya hipertensi pada umur kehamilan di atas 20 minggu yang disertai gangguan atau kerusakan organ seperti ginjal yang dapat ditandai dengan adanya proteinuria pada

ibu hamil tersebut. Preeklampsia menjadi salah satu penyebab kematian maternal terbanyak. Preeklampsia sendiri sudah mencakup 2-8% dari ibu hamil di seluruh dunia dengan tingkat kematian mencapai 9-26% di negara berkembang dan di negara maju mencapai 16% tingkat kematian yang berarti lebih dari 50.000 kematian maternal di seluruh dunia dan sekitar 500.000 kematian janin (S.A Karrar, 2022).

Preeklampsia merupakan salah satu bentuk hipertensi yang muncul setelah umur kehamilan 20 minggu disertai dengan kerusakan organ seperti ginjal yang ditandai dengan proteinuria. Menurut teori, tingkat kemungkinan terjadinya preeklampsia akan meningkat apabila faktor risikonya ada dan salah satu faktor risiko terjadinya preeklampsia adalah wanita yang memiliki riwayat diabetes (sebuah keadaan terjadinya peningkatan gula dalam darah yang terjadi akibat beberapa faktor). Diabetes sendiri diderita oleh 422 juta penduduk dunia dengan jumlah kematian langsung akibat diabetes sebanyak 1,5 juta tiap harinya (WHO, UNICEF, 2019; WHO, 2021). Sekitar 15-20% ibu dengan preeklampsia merupakan pengidap diabetes tipe 1 dan sekitar 10-14% merupakan pengidap diabetes tipe 2 (Weissgerber & Mudd, 2015).

WHO mencatat dari tahun 2010-2017 AKI di Indonesia mencapai 30.100 kematian, di tahun 2017 sendiri AKI mencapai 8600 dengan rasio rerata 177 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Profil Kesehatan Indonesia per tahun 2021, kematian maternal di Indonesia mencapai 7.389 kematian dan terkhusus kematian akibat hipertensi pada kehamilan sudah menempati urutan keempat setelah COVID-19, PPH, dan lain-lainnya dengan angka kejadian sebanyak 1.077 kasus dan preeklampsia merupakan salah satu dari penyebab kematian tersebut sedangkan

kematian akibat masalah metabolik seperti diabetes berada pada urutan ke-7 dengan jumlah kasus sebanyak 80 kematian (Riskesdas, 2021).

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia per tahun 2021, dalam 4 tahun terakhir, jumlah kematian ibu masih terus meningkat dan hanya sempat turun di tahun 2019 dan kembali meningkat. Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 7.389 kematian dengan Sulawesi Selatan menempati urutan ketujuh dengan jumlah kematian ibu 195 kematian per tahun 2021 dan hipertensi dalam kehamilan menyumbang jumlah kematian ibu sebanyak 41 kematian, sedangkan masalah metabolik seperti diabetes menyumbang kematian sejumlah 2 kematian (Riskesdas, 2021).

B. Integrasi Keislaman

Begitu banyak risiko-risiko yang menanti seorang ibu selama kehamilannya yang dapat mengakibatkan kematian sehingga berbakti kepada ibu sangat diwajibkan oleh agama kita bahkan dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 Allah Swt. berfirman:

وَحَمَلُهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا أُمَّهُ ۖ حَمَلَتْهُ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ الْأُنثَىٰ وَوَصَّيْنَا
نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزَعْنِي رَبِّ قَالَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ بَلَغَ إِذَا ۖ حَتَّىٰ شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصْلُهُ ۖ
إِلَيْكَ تُبْتُ إِنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلُ وَأَنْ وَالِدِي وَعَلَىٰ عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَإِنِّي

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan

mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.

Dalam tafsir Al-Misbah pada surah ini, al-Qur'an memaparkan pengorbanan yang dalam dan mulia, yang diberikan kaum ibu. Pengorbanan yang tidak akan pernah dapat dibalas oleh anak, meskipun dengan melaksanakan pesan Allah dalam surah ini sebaik-baiknya (Shihab, 2006).

Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Redaksi kalimat dan untaian kata-kata pada ayat itu mempersonifikasikan penderitaan, perjuangan, kelelahan, dan kepenatan. "Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah". Dia bagaikan orang sakit yang berjuang dengan dirundung kemalangan, memikul beban berat, bernapas dengan susah payah, dan tersengal-sengal. Itulah gambaran saat dia mengandung, terutama menjelang kelahiran anak. Itulah gambaran persalinan, kelahiran dan aneka kepedihan (Shihab, 2006).

Di dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 Allah Swt. berfirman:

وَالْجِبَارَةُ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِينَ آيَّهَا يَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتَصُونَ لَا شِدَادَ غِلَظَ مَلَائِكَةَ عَدِّيْهَا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis (Shihab, 2006).

Di dalam Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah 32 Rasulullah saw. bersabda:

لَا: قَالَ ﷺ اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخُدْرِيُّ سِنَانُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سَعْدِ سَعِيدِ أَبِي عَنْ فِي مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْنَدًا، وَغَيْرُهُمَا وَالِدَارْفُطْنِي مَاجَهُ ابْنُ رَوَاهُ. حَسَنٌ حَدِيثٌ «ضَرَارٌ وَلَا ضَرَرَ يُقْوِي طَرِيقَ وَلَهُ سَعِيدٍ، أَبَا فَاسْقَطٍ ﷺ النَّبِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُرْسَلِ الْمُوْطَأِ بَعْضًا بَعْضًا.

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]”

Hadits Arbain di atas membahas tentang janganlah bertindak atau melakukan hal-hal yang dapat memberikan bahaya kepada diri masing-masing seperti seseorang

sudah mengetahui memiliki faktor risiko yang besar untuk mengakibatkannya mengalami preeklampsia namun saat melakukan program kehamilan dia tidak melakukan kontrol yang rutin memantau keadaan kesehatannya di dokter sehingga akhirnya membahayakan keadaannya sendiri.

Di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 Allah Swt. berfirman:

ذٰلِكَ فِىۡ اِنَّ ۙ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ اِلَيْهَا لِتَسْكُنُوْا اَزْوَاجًا اَنْفُسِكُمْ مِّنۡ لَّكُمْ خَلْقًا اَنْ اٰيٰتِهِۦ وَمِنْ يَّتَفَكَّرُوْنَ لِقَوْمٍ لَّاۤ اٰيٰتٍ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat enam di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. dan di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah (Shihab, 2006).

Di dalam Hadits Al-Bukhari No. 1772 Rasulullah saw. bersabda:

لِلْفَرْجِ، وَأَحْصَنُ لِلْبَصْرِ أَغْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجْ، الْبَاءَةُ مِنْكُمْ اسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ، مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ، فَعَلَيْهِ يَسْتَنْطِعُ لَمْ وَمَنْ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas’ūd -radīyallāhu ‘anhu- secara marfū’, “Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya”

Hadits Al-Bukhori di atas menggambarkan bahwa bila seseorang sudah memenuhi syarat dalam menikah maka menikahlah dan secara tidak langsung juga menggambarkan bila seseorang belum memenuhi syarat untuk menikah seperti pola pikir dan keadaan fisik maka tidak disarankan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini saat seseorang terlalu muda maka keadaan fisiknya belum terlalu matang sehingga berisiko untuk mendapatkan berbagai macam komplikasi kehamilan.

Dari hadits dan tafsir ayat tersebut bisa disimpulkan tentang bagaimana susah payahnya orang tua terutama ibu dalam mengandung dan melahirkan, bertaruh dengan berbagai macam faktor risiko yang bahkan mungkin dapat mengancam jiwa dan menyebabkan kematian bagi ibu juga dihimbau bagi kita untuk menjaga keluarga kita termasuk ibu dalam segala bahaya yang mungkin mengancam termasuk saat dalam keadaan hamil. Maka dari itu dalam Islam posisi ibu sangat dimuliakan dan diutamakan untuk mengabdikan kepadanya. Oleh karena itu, deteksi terkait faktor risiko yang dapat

mengancam jiwa ibu selama hamil sangat penting untuk diketahui, terutama untuk risiko preeklampsia yang merupakan penyebab AKI keempat tertinggi setelah COVID-19, PPH, dan lain-lainnya. Banyaknya jumlah pengidap diabetes pada ibu yang diduga merupakan faktor predisposisi terjadinya preeklampsia juga membuat penelitian ini menarik untuk diteliti oleh peneliti dan juga penelitian ini diharapkan membuka kepedulian lebih lagi terhadap pencegahan preeklampsia untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) khususnya di Sulawesi Selatan Kota Makassar (Risksedas, 2021).

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang tertera, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah diabetes mellitus merupakan faktor risiko kejadian preeklampsia pada ibu hamil.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kejadian preeklampsia.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Diabetes mellitus merupakan faktor risiko dari kejadian preeklampsia.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					
1.	Preeklampsia	Preeklampsia adalah tekanan darah >140/90 mmHg atau hipertensi yang baru terjadi setelah umur kehamilan 20 minggu disertai dengan gangguan fungsi organ	Melihat data rekam medis pasien dan atau menyesuaikan sesuai standar POGI 2016	0 = tidak mengalami preeklampsia 1 = mengalami preeklampsia	Nominal
Variabel Dependen					
2.	Diabetes mellitus tipe 1 dan 2	Diabetes mellitus adalah keadaan meningkatnya gula dalam darah	Melihat data rekam medis pasien dan atau menyesuaikan standar PERKENI 2021 dan	0 = mengalami diabetes 1 = tidak mengalami diabetes	Nominal

Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan)

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
		<p>seseorang di atas normal</p> <p>Gula Darah Puasa (GDP) ≥ 126 mg/dl</p> <p>atau</p> <p>Tes Toleransi Glukosa Oral (TTGO) 2 jam ≥ 200 mg/dl</p> <p>atau</p> <p>Hemoglobin A1c (HbA1c) $\geq 6,5\%$</p> <p>dengan diabetes mellitus tipe 1 terjadi sejak lahir dan diabetes mellitus tipe 2 tidak terjadi sejak lahir</p>	<p>American Diabetes Association 2022</p>		

Tabel 1. 1 Definisi Operasional (lanjutan)

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
3	Diabetes mellitus gestasional	Diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dimana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes	Melihat data rekam medis pasien dan atau menyesuaikan sesuai standar PERKENI 2021 dan American Diabetes Association 2022	0 = mengalami diabetes 1 = tidak mengalami diabetes	Nominal

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dengan menilai apakah diabetes mellitus merupakan faktor risiko preeklampsia di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dengan menarik data dari status rekam medik dibutuhkan.

F. Kajian Pustaka

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
1.	Diba Aulia, Rodiani, Risti Graharti/2018	Hubungan Diabetes mellitus dengan Kejadian Preeklampsia di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Periode 1 Januari - 30 Juni 2018	Analitik observasional dengan rancangan case control	Sebanyak 32 kasus dan 32 kontrol	Data sekunder yang diperoleh dari status kebidanan rekam medik RSAM Lampung periode 1 Januari sampai 30 Juni 2018	Terdapat hubungan Diabetes mellitus dengan kejadian preeklampsia pada ibu bersalin di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung periode 1

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
						Januari – 30 Juni 2018.
2.	Sri Ayu Rezeki, Amlah, Eka Rahmawaati/2021	Hubungan Diabetes Militus, Obesitas dan Riwayat Hipertensi dengan Kejadian Preeklamsi di Puskesmas Kertapati	kuantitatif menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional	Jumlah sampel sebanyak 99 sampel	Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat bantu checklist	Ada hubungan yang bermakna antara diabetes mellitus, obesitas dan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklampsia
3.	Artika Dewie, Anna V. Pont,	Hubungan Umur	Penelitian kuantitatif	62 sampel menggunakan	Penelitian ini menggunakan data sekunder	hasil penelitian

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
		Kehamilan Dan Obesitas Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklampsia Di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Baru Kota Luwuk	dengan desain analitik observasional yaitu case control	<i>Purposive Sampling</i>	dari buku KIA	menunjukkan ada hubungan antara umur kehamilan dengan kejadian preeklampsia dan ada hubungan yang bermakna
4.	Leoita Dwi Agustin, Adesy Asta, Dara Anggun Prasasti/2020	Hubungan Diabetes Militus dan Obesitas dengan Kejadian	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat survey	Sampel penelitian ini menggunakan metode random sampling.	Data sekunder dari rekam medik	Hasil analisa bivariat ditemukan ada hubungan Diabetes

Tabel 1. 2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Instrumen Penelitian	Hasil
		Preeklamsi pada Ibu Hamil	analitik dengan pendekatan cross sectional	Sampel penelitian ini berjumlah 40 responden		Mellitus dan ada hubungan obesitas dengan kejadian Preeklampsia pada ibu hamil

G. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

- b. Mengetahui jumlah angka kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- c. Mengetahui jumlah angka kejadian diabetes mellitus di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar
- d. Menganalisis hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

H. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan dan wawasan serta tempat untuk mengaplikasikan pengetahuan yang sudah terlebih dahulu didapatkan di perkuliahan khususnya terkait faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian preeklampsia.

2. Bagi Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan ibu dan anak terkhususnya terkait faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian preeklampsia.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat untuk mengenal dan mengetahui faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian

preeklampsia sehingga masyarakat terkhusus ibu yang akan dan sedang mengandung bisa mencoba untuk melakukan tindakan preventif terhadap faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian preeklampsia.

4. Bagi Instansi

- a) Memberikan tambahan data dan referensi terkhusus dalam bidang kesehatan ibu dan anak terkait hubungan faktor risiko diabetes mellitus dengan tingkat kejadian preeklampsia
- b) Bentuk pengabdian diri terhadap perguruan tinggi dengan memenuhi salah satu dari tridharma perguruan tinggi terkait bidang penelitian sehingga dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian mahasiswa selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar terkhusus pada Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diabetes mellitus

1. Definisi

Diabetes merupakan salah satu masalah kesehatan yang sudah menjadi isu global yang menyebar luas di penjuru dunia dan belum terselesaikan bahkan Diabetes sendiri diderita oleh 422 juta penduduk dunia dengan urutan kematian ke 9 jumlah kematian langsung akibat Diabetes sebanyak 1,5 juta tiap harinya dan terus-menerus menjadi isu sampai sekarang dan kebanyakan terjadi di negara pendapatan rendah sampai menengah. *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa pada tahun 2016 kematian akibat Diabetes di Indonesia mencapai 99.400 kematian (*World Health Organization, 2022*).

Diabetes adalah suatu kelainan jumlah gula darah meningkat melebihi kadar normalnya dikarenakan adanya gangguan pada sistem regulasi pada metabolisme glukosa atau gula dalam tubuh akibat kurangnya produksi insulin dan juga dapat karena efek insulin sudah tidak dapat dipakai akibat adanya resistensi insulin. Kadar gula darah normal yang paling sering dipakai dan menjadi salah satu rujukan yaitu pedoman *American Diabetes Association (ADA) 2011* dan konsensus *Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI) 2021* yaitu, $GDP \geq 126$ mg/dl atau TTGO 2 jam ≥ 200 mg/dl atau $HbA1c \geq 6,5\%$ (*Khairani, 2019; Soelistijo, 2020*).

Diabetes merupakan kelainan metabolik. Seseorang yang mengalami Diabetes memiliki jumlah gula darah dan konsentrasi gula darah yang tinggi diatas normal.

Diabetes dapat didiagnosis dengan cara melakukan pengecekan kadar gula darah dan berdasarkan penggolongannya terhadap gula darah terbagi menjadi beberapa seperti Diabetes (gula darah puasa ≥ 126 mg/dl atau TTGO 2 jam ≥ 200 mg/dl atau HbA1c $\geq 6,5\%$), pre-Diabetes (gula darah puasa 100-125mg/dl atau 140-199 mg/dl atau HbA1c 5,7-6,4%), normal (gula darah puasa 70-99 mg/dl atau 70-139 mg/dl atau $< 5,7\%$) (Soelistijo, 2020).

2. Epidemiologi

Diabetes adalah permasalahan kesehatan yang penting dan sering terjadi pada masyarakat di seluruh dunia, utamanya di negara berkembang atau negara dengan pendapatan bawah sampai menengah salah satunya Indonesia. Hal ini didukung juga dengan faktor bahwa masyarakat kita sangat terbiasa makan nasi dengan porsi yang banyak dan bila tidak dibarengi dengan pengeluaran kalori yang seimbang maka hal ini tentu menjadi salah satu faktor pendukung penyebab terjadinya diabetes. Kelainan ini merupakan salah satu penyebab munculnya banyak penyakit lain dan menjadi penyebab disabilitas kronik yang berdampak besar terhadap aktivitas dalam kehidupan seseorang sehari-harinya dan tentu saja hal ini juga akan berdampak ke masalah ekonomi dan kesejahteraan sosialnya. Penduduk dunia yang mengalami Diabetes berjumlah sekitar 422 juta orang diseluruh dunia dengan sebagian besar pengidapnya tersebar di negara-negara berkembang seperti Indonesia (World Health Organization, 2022).

Perbedaan prevalensi diabetes terhadap gender tampaknya berbeda tergantung *Lifestyle* dan gendernya meskipun memang ada kecenderungan risiko diabetes terhadap

wanita lebih tinggi daripada pria, contohnya pada pria memiliki risiko mengalami diabetes meningkat sesuai dengan *Body Mass Index* (BMI) dan pola hidupnya seperti rokok, alkohol, dan lainnya, sementara pada wanita memiliki tingkat risiko mengalami diabetes meningkat seiring dengan meningkatnya umur, BMI, dan jenjang pendidikannya. Prevalensi diabetes adalah 14,1% pada pria dan 14,5% pada wanita. Kelebihan berat badan, obesitas, hipertensi, dan kadar *Triglyceride* (TG) yang tinggi merupakan faktor risiko independen untuk diabetes pada kedua jenis kelamin. Pada pria, tingkat *High Density Lipoprotein Cholesterol* (HDL-C) yang tinggi merupakan faktor protektif independen untuk diabetes. pada wanita, umur lanjut, aktivitas fisik, dan kadar *Low Density Lipoprotein Cholesterol* (LDL-C) yang tinggi merupakan faktor risiko independen peningkatan terjadinya Diabetes (Zhang et al., 2019).

Diabetes merupakan masalah kesehatan yang dialami oleh 233 juta wanita di dunia ini dan 16,7% dari kelahiran hidup atau 21,1 juta kelahiran di dunia ini mengalami diabetes dalam masa kehamilan kebanyakan dikarenakan diabetes Gestasional dan hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur saat kehamilan dan puncaknya pada umur 45 tahun ke atas akan memiliki risiko mengalami diabetes dalam kehamilan lebih tinggi, bahkan 1 dari 6 kehamilan mengalami diabetes Gestasional. Kejadian diabetes kebanyakan terjadi pada negara-negara berkembang atau negara yang memiliki pendapatan rendah sampai menengah. Adapun prevalensi diabetes pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan pada *South-East Asia* 6,8 juta, *North America and Carribean* 1,3 juta, *South and Central America* 1 juta, *Western*

Pasific 3,9 juta, *Europe* 1,6 juta, *Africa* 4,1 juta, *Middle East and North Africa* 2,4 juta (International Diabetes Federation, 2021).

Angka kejadian diabetes di Indonesia terbilang masih cukup tinggi berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi kejadian diabetes di Indonesia mencapai 10,7 juta bahkan yang tercatat di IDF pertahun 2021 sudah mencapai 19,5 juta dengan prevalensi 10,8%. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada umur ≥ 15 tahun sebesar 2%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan prevalensi diabetes mellitus pada penduduk ≥ 15 tahun pada hasil Riskesdas 2013 sebesar 1,5%. Namun, prevalensi diabetes mellitus menurut hasil pemeriksaan gula darah meningkat dari 6,9% pada 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018 dengan prevalensi tertinggi diabetes mellitus pada tahun 2018 terdapat pada 4 provinsi yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Angka ini menunjukkan bahwa baru sekitar 25% penderita Diabetes yang menyadari dan mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes (Khairani, 2019).

3. Etiologi

Penyebab dari diabetes tergantung dari tipe diabetes apa yang menjadi kelainannya, contohnya diabetes tipe 1 terjadi akibat kesalahan penyandian gen sehingga terjadi kesalahan pada sistem imun yang berujung pada penyerangan sel tubuh oleh sistem imun sendiri atau *autoimmune*, dalam hal ini sel tubuh yang diserang adalah sel beta pankreas. Sel beta pankreas adalah sel yang bertanggung jawab untuk membentuk insulin yang berfungsi untuk membantu proses memasukkan gula dalam

darah ke sel tubuh termasuk otot sehingga dengan rusaknya sel ini akibat penyerangan oleh sistem imun mengakibatkan absennya insulin dalam tubuh sehingga gula dalam darah tertumpuk (Amit Sapra, 2020).

Diabetes tipe 2 terjadi akibat adanya resistensi reseptor insulin terhadap insulin sehingga insulin tidak dapat bekerja pada sel target sehingga gula akan tetap beredar di dalam darah dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Resistensi reseptor insulin dapat terjadi dipicu oleh beberapa hal seperti obesitas, hiperandrogen, akantosis nigrikan dan lainnya. Beberapa hal tadi akan mengakibatkan kerusakan pada reseptor insulin di permukaan sel-sel atau hanya sekedar membuatnya tidak berfungsi terlalu baik sehingga terjadi resistensi reseptor insulin. Bila hal ini terus terjadi maka akan mengakibatkan tubuh menganggap sedang dalam keadaan kurang insulin sehingga akan membuat sel beta pankreas membentuk insulin lebih banyak lagi sehingga sel beta pankreas akan bekerja secara berlebihan dan mengakibatkan kerusakan pada sel beta pankreas tersebut. Hal tersebut akan mengakibatkan produksi insulin menjadi berkurang karena sel yang bertanggung jawab membentuknya menjadi berkurang atau bahkan sudah tidak ada lagi. Ada juga diabetes yang disebabkan oleh karena penggunaan obat seperti obat-obatan antihipertensi dan obat-obat yang memengaruhi kinerja dari sistem imun, obat-obatan ini dapat mengakibatkan berkurangnya produksi insulin, meningkatnya produksi glukosa hepar, dan kerusakan pada reseptor insulin. Infeksi dari beberapa virus seperti Cocksackie B4 yang diduga merusak langsung sel beta atau reseptornya dan juga infeksi kronik hepatitis c juga menjadi salah satu alasan terjadinya diabetes (Mabel Yau, 2021).

Klasifikasi	Deskripsi
Tipe 1	Destruksi sel beta pankreas, umumnya berhubungan dengan defisiensi insulin absolut <ul style="list-style-type: none"> - Autoimun - Idiopatik
Tipe 2	Bervariasi, mulai yang dominan resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai resistensi insulin.
Diabetes melitus gestasional	Diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua atau ketiga kehamilan dimana sebelum kehamilan tidak didapatkan diabetes
Tipe spesifik yang berkaitan dengan penyebab lain	<ul style="list-style-type: none"> - Sindroma diabetes monogenik (diabetes neonatal, <i>maturity – onset diabetes of the young</i> [MODY]) - Penyakit eksokrin pankreas (fibrosis kistik, pankreatitis) - Disebabkan oleh obat atau zat kimia (misalnya penggunaan glukokortikoid pada terapi HIV/AIDS atau setelah transplantasi organ)

Gambar 2. 1 Klasifikasi Etiologi Berdasarkan Jenis diabetes mellitus (Soelistijo, 2020)

4. Faktor Risiko

Faktor risiko yang menyebabkan seseorang mengalami diabetes termasuk ibu hamil disebabkan oleh banyak hal termasuk genetik, pola hidup, obesitas, merokok, alkohol dan edukasi yang tidak baik sehingga ada ketidaktahuan terhadap pola hidup yang baik dan benar untuk mengantisipasi munculnya diabetes terutama pada ibu hamil. Usia ibu sangat memengaruhi tingkat kejadian diabetes terutama bila sudah berusia 35 tahun ke atas risiko terjadinya diabetes juga akan meningkat seiring bertambahnya usia, apalagi pada etnis Asia yang kebanyakan merupakan negara agraris yang makanan bakunya adalah nasi yang memiliki kadar karbohidrat yang tinggi sehingga tingkat kemungkinan terjadinya obesitas sangat tinggi. Hal ini tentu berbahaya bila dibarengi dengan pola aktivitas yang rendah dan gaya hidup yang tidak sehat, tentu ini akan mengakibatkan penumpukan karbohidrat yang tinggi dalam tubuh.

Genetik turunan yang sudah membawa diabetes apalagi bila memang memiliki riwayat dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya diabetes pada seseorang termasuk ibu hamil hal ini dikarenakan genetik langsung memberikan kesalahan pada penyandian gen sehingga terjadi kerusakan sel beta pankreas akibat diserang oleh sel imun sendiri dan berujung ke defisiensi insulin akibat disfungsinya sel yang seharusnya membentuk insulin. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan toleransi glukosa yang menurun dan mengakibatkan resistensi pada insulin bila hal itu terus menerus terjadi. Pada penderita *polycystic ovary syndrome* (PCOS) ditemukan keadaan resistensi insulin yang tinggi diakibatkan oleh gangguan pada hormonal dan memengaruhi jalur hormon lain sehingga berujung pada keadaan diabetes tipe 2 (Tanoey & Becher, 2021).




Gambar 2. 2 Faktor risiko diabetes mellitus tipe 2 (Banday et al., 2020)

5. Patomekanisme

Patomekanisme diabetes beragam namun pada umumnya terjadi karena dua faktor utama yaitu gen dan pengaruh lingkungan seperti serangan patogen, pengaruh pola diet, pola aktivitas fisik dan beberapa faktor yang tidak diketahui. Kesalahan pada genetik dapat memicu terjadinya *autoimmune* yang akan mengakibatkan inflamasi akibat serangan oleh sistem imun tersendiri sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada sel pankreas utamanya pada sel beta pankreas. Pengaruh eksternal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dapat memicu stres metabolik dan berujung pada disfungsi pada sel beta pankreas. Hal tersebut bila terjadi akan mengakibatkan kekurangan insulin sehingga akan mengakibatkan glukosa dalam darah tidak akan bisa dibawa masuk ke dalam sel sehingga menumpuk di dalam darah. Hal ini akan mengakibatkan masalah pada pembuluh darah yang akan berujung ke komplikasi pada beberapa organ tubuh seperti pada organ-organ dengan *microvascular* seperti mata, ginjal dan saraf. Pada organ-organ tersebut dapat terjadi kelainan seperti *retinopathy*, *nephropathy*, dan *neuropathy*, sedangkan pada organ-organ dengan *macrovascular* seperti pada peredaran darah jantung dan otak dapat mengakibatkan kelainan seperti stroke dan penyakit jantung koroner (Skyler et al., 2017).

Patomekanisme diabetes dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini



Gambar 2. 3 Patomekanisme diabetes mellitus (Skyler et al., 2017)

6. Gejala dan Tanda

Diabetes merupakan suatu penyakit metabolik yang memiliki efek sistemik sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tergantung organ apa yang diserangnya atau yang terdampak olehnya dan harus segera dicari penyebabnya. Anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium sederhana berguna dalam mengevaluasi penderita diabetes. Gejala umumnya berupa sering buang air kecil lebih sering frekuensinya dari orang normal, sering kehausan, merasa lapar terus-menerus meskipun sudah makan, cepat lelah, penglihatan mengabur, lebih mudah terkena infeksi dibanding orang normal, luka yang mengalami penyembuhan lama, berat badan

terus-menerus menurun meskipun sering makan, dan merasakan keram kesemutan dan mati rasa pada ujung-ujung kaki dan tangan (Diabetes, 2020).

Pada pemeriksaan fisik biasanya akan ditemukan luka-luka yang sudah mulai menjadi ulkus pada orang-orang yang mengalami diabetes dikarenakan pengaruh dari diabetes itu sendiri sehingga luka akan sulit untuk sembuh dan cenderung melebar. Pengidap diabetes juga akan terlihat sangat kurus bila sudah mengidap diabetes secara kronis akibat dari metabolisme glukosa yang tidak baik sehingga tubuh akan kekurangan asupan energi dan pasien juga akan terlihat lemah dan lesu (Diabetes, 2020)

7. Penegakan Diagnosis

Penegakan diagnosis yang dilakukan terhadap ibu yang mengalami diabetes perlu ditegaskan dengan meliputi pertanyaan-pertanyaan medis terkait riwayat keluarga, riwayat diabetes atau kondisi penyakit kronis, obat-obat yang pernah dan sedang digunakan, frekuensi urine, perdarahan dan pekerjaan dan aktivitas sosialnya. Setelah melakukan anamnesis pemeriksaan fisik dan riwayat medis juga penting untuk mengetahui gejala apa saja yang sudah memengaruhi fisik ibu tersebut seperti terjadinya penurunan berat badan sehingga badan menjadi kurus, adanya luka yang tidak sembuh atau luka diabetes, hiperpigmentasi seperti pada area belakang leher, perdarahan kecil-kecil di dalam makula mata sehingga penglihatan menjadi kabur, dan adanya mati rasa dan kesemutan pada alat ekstremitas tubuh seperti ujung-ujung tangan dan kaki, selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah puasa dan atau pemeriksaan HbA1C yaitu memeriksa jumlah glukosa yang terikat pada

hemoglobin darah. American Diabetes Association (ADA) 2022 dan konsensus Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENDI) 2021 menetapkan dan memberi standar nilai dalam pemeriksaan gula darah bila GDP ≥ 126 mg/dl atau TTGO 2 jam ≥ 200 mg/dl atau HbA1c $\geq 6,5\%$ maka tergolong diabetes, GDP 100-125 mg/dl atau TTGO 2 jam 140-199 mg/dl atau HbA1c 5,7%-6,4% maka tergolong prediabetes, dan apabila GDP < 100 mg/dl atau TTGO 2 jam < 140 mg/dl atau HbA1c $< 5,7\%$ maka tergolong normal (Amit Sapra, 2020; Soelistijo, 2020).

Pemeriksaan gula darah juga harus diutamakan pada ibu yang memang memiliki faktor risiko yang membuatnya sangat mungkin mengalami Diabetes mellitus. Hal ini tentunya juga untuk menghindari, mengantisipasi dan menyiapkan tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap ibu yang terdeteksi diabetes dan memiliki rencana untuk memiliki anak agar komplikasi dari diabetes gestasional tidak terjadi (Amit Sapra, 2020).

8. Tatalaksana

Terapi diabetes dapat dilakukan baik secara farmakoterapi maupun secara non-farmakoterapi. Adapun obat yang dapat digunakan salah satunya golongan insulin sensitizing seperti biguanid contohnya metformin yang terdapat dalam konsentrasi tinggi pada usus dan hati. Obat ini tidak dimetabolisme, tetapi secara cepat dikeluarkan melalui ginjal. Mekanisme obat ini yaitu menurunkan glukosa dalam darah yang dipengaruhi oleh insulin pada tingkat sel dan menurunkan glukosa hati. Selanjutnya, glitazone yang bekerja secara selektif dan poten yang diabsorpsi dengan cepat dan

konsentrasi tertinggi setelah 1-2 jam. Waktu paruhnya berkisar 3-4 jam (Dyah Purnamasari, 2014).

Selanjutnya, terapi dengan non-farmakologi dapat dilakukan dengan Terapi Nutrisi Medis (TNM) adapun kunci keberhasilan TNM yaitu keterlibatan secara menyeluruh dari petugas medis, penderita diabetes mellitus, dan keluarganya. Teknik ini pada dasarnya dilakukan dengan mengatur pola makan yang disandingkan pada status gizi, kebiasaan makan, dan kondisi atau komplikasi yang diderita pasien. Selain itu, pasien juga dapat melakukan latihan fisik karena selama latihan fisik kebutuhan terhadap energi akan meningkat dan dapat dipenuhi dari pemecahan glikogen dan pembongkaran trigliserida dengan berbagai macam usaha yang diberikan. Harapannya dapat mengendalikan glikemia pada penderita diabetes mellitus sehingga ketika terjadi komplikasi kronik penyakit ini dapat dicegah dan pasien diabetes mellitus dapat berbahagia dengan penyakit yang dideritanya (Dyah Purnamasari, 2014).

9. Komplikasi dan Prognosis

Tidak terkontrolnya diabetes mellitus dapat menyebabkan banyak komplikasi, baik akut maupun kronis. Penyakit seperti masalah pada kardiovaskular dan gagal ginjal dapat disebabkan oleh diabetes mellitus. Komplikasi akut pada diabetes mellitus dapat berupa hipoglikemia, ketoasidosis diabetikum, hiperosmolar hiperglikemik, dan koma diabetik hiperglikemik. Komplikasi mikrovaskular kronis dapat berupa nefropati, neuropati, dan retinopati sedangkan komplikasi makrovaskular kronis dapat berupa penyakit arteri koroner, penyakit arteri perifer, dan serebrovaskular. Bahkan pada ibu hamil diabetes dapat memicu terjadinya preeklampsia, diabetes sendiri

merupakan salah satu faktor risiko hipertensi dalam kehamilan, 20% ibu hamil dengan diabetes tipe 1 mengalami preeklampsia sedangkan 10-14% pada ibu hamil dengan diabetes tipe 2 juga mengalami preeklampsia (Weissgerber & Mudd, 2015).

Diabetes mellitus dapat dikaitkan dengan adanya peningkatan masalah kardiovaskular seperti aterosklerotik dan peningkatan tekanan darah di atas normal. Penggunaan statin, olahraga teratur, dan berhenti merokok sangat penting untuk mengurangi risiko. Saat ini, dengan adanya farmakoterapi untuk penderita hiperglikemia, serta kolesterol LDL dapat diturunkan dan tekanan darah yang dikelola dapat menggunakan terapi *Angiotensin Converting Enzyme* (ACE). Adapun dengan obat hipertensi lain dan aspirin dalam pencegahan sekunder, komplikasi vascular dapat dikelola secara tepat dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas (Pouwer & Speight, 2019).

B. Diabetes dalam Kehamilan

Diabetes dalam kehamilan terjadi dapat akibat sudah memiliki bawaan Diabetes sebelumnya atau baru muncul saat mengalami kehamilan atau yang biasanya disebut sebagai diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah diabetes yang terdeteksi dan muncul pertama kali sejak kehamilan dan biasanya pada umur 24-28 minggu dan terbagi menjadi dua tipe juga yaitu diabetes gestasional tipe 1 dan diabetes gestasional tipe 2, diabetes gestasional yang dikelola tanpa obat dan responsif terhadap terapi nutrisi adalah diabetes gestasional yang dikontrol diet atau diabetes gestasional tipe A1 (A1GDM). Di sisi lain, diabetes gestasional yang dikelola dengan obat-obatan untuk

mencapai kontrol glikemik yang memadai adalah diabetes gestasional tipe A2 (A2GDM) (Mahdy., 2022).

Diabetes pada kehamilan terjadi 16,7% dari kelahiran hidup atau 21,1 juta kelahiran di dunia ini mengalami diabetes dalam masa kehamilan kebanyakan dikarenakan diabetes gestasional. Hal ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur saat kehamilan dan puncaknya pada umur 45 tahun ke atas akan memiliki risiko mengalami diabetes dalam kehamilan lebih tinggi, bahkan 1 dari 6 kehamilan mengalami diabetes gestasional. Hal ini tentu saja menjadi perhatian besar mengingat kematian akibat diabetes di dunia berada pada urutan ke 9 dengan total kematian 1,5 juta orang setiap harinya (International Diabetes Federation, 2021).

Skrining terhadap diabetes gestasional bisa dilakukan dengan melakukan beberapa tes yang sudah diberi standar oleh American Diabetes Association yaitu dengan melihat GDP ≥ 92 mg/dl dan bila di Tes Toleransi Glukosa Oral/TTOG 75 gr gula maka hasil 1 jam pertama ≥ 180 mg/dl dan hasil setelah 2 jam ≥ 153 mg/dl maka butuh salah satu dari ketiga tersebut untuk bisa melakukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis lebih lanjut dengan cara kembali melakukan cara Tes Toleransi Glukosa Oral/TTOG sebanyak 50 gr dalam 1 jam kepada ibu hamil bila didapatkan hasilnya ≥ 140 mg/dl maka harus dilakukan tes selanjutnya lagi untuk melakukan konfirmasi terkait hasil sebelumnya yaitu dengan cara melakukan TTOG 100 gr dalam 3 jam dengan nilai di jam pertama ≥ 180 mg/dl, di jam kedua ≥ 155 mg/dl, dan di jam ketiga ≥ 140 mg/dl, bila 2 dari 3 kriteria di atas terpenuhi maka ibu hamil tersebut dikonfirmasi mengalami diabetes gestasional, sedangkan menurut WHO standar yang

digunakan untuk mendeteksi diabetes gestasional adalah gula darah puasa 92-125 mg/dl dan bila dilakukan TTOG maka 1 jam pertama hasilnya ≥ 180 mg/dl dan hasil 1 jam selanjutnya 153-199 mg/dl bila salah satu dari ketiga nilai standar di atas terpenuhi atau dengan menemukan komplikasi dari diabetes gestasional maka dapat diberikan diagnosis abnormal (Erin M. Cleary, MD, Stephen F. Thung, MD, MSCI, and Elizabeth O. Buschur, MD, 2021; Langi, 2021).

Di Indonesia sendiri Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI membuat standar pemeriksaan diagnostik terhadap ibu hamil dengan diabetes gestasional yang mirip dengan standar dari beberapa organisasi sebelumnya. PERKENI menetapkan standar dengan membuat beberapa alternatif bila ibu hamil memiliki satu dan lain hal sehingga tidak bisa melakukan pemeriksaan secara normal, standar diagnosis menurut PERKENI terlampir dalam gambar di bawah ini

TTGO baku	Pemeriksaan TTGO glukosa darah vena dengan puasa
<i>Nilai diagnostik DMG adalah:</i>	
GDP ≥ 92 mg/dL ; atau	
GD 1 jam ≥ 180 mg/dL ; atau	
GD 2 jam ≥ 153 mg/dL	
Alternatif 1	Jika pemeriksaan glukosa darah vena tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemeriksaan glukosa darah kapiler.
Pemeriksaan TTGO glukosa darah kapiler dengan puasa	
<i>Nilai diagnostik DMG adalah:</i>	
GDP ≥ 95 mg/dL ; atau	
GD 1 jam ≥ 191 mg/dL ; atau	
GD 2 jam ≥ 162 mg/dL	
Alternatif 2	Jika pasien tidak mampu berpuasa, maka tetap dilakukan pemberian larutan 75 gram glukosa tanpa didahului puasa.
Pemeriksaan TTGO tanpa melakukan puasa	
<i>Nilai diagnostik DMG adalah:</i>	
Menggunakan darah vena:	
GD 1 jam ≥ 180 mg/dL ; atau	
GD 2 jam ≥ 153 mg/dL	
Menggunakan darah kapiler:	
GD 1 jam ≥ 191 mg/dL ; atau	
GD 2 jam ≥ 162 mg/dL	
Diagnosis diabetes melitus gestasional (DMG) dapat ditegakkan bila:	
Pada ibu dengan usia kehamilan,	
≥ 24 minggu : minimal terdapat 1 nilai diagnostik DMG pada TTGO yang dilakukan	
< 24 minggu : minimal terdapat 2 nilai diagnostik DMG pada TTGO yang dilakukan	


Gambar 2. 4 Standar diagnosis PERKENI 2021 (Soelistijo, 2020)

Diabetes gestasional memiliki pengaruh terhadap terjadinya preeklampsia pada ibu hamil hal ini disinggung oleh beberapa penelitian yang membuktikan tingginya tingkat terjadinya preeklampsia pada ibu hamil yang memiliki diabetes. Bahkan pada ibu hamil yang memiliki diabetes tipe 1 sebanyak 15-20% terdiagnosis

dengan preeklampsia dan 10-14% ibu hamil dengan diabetes tipe 2 terdeteksi mengalami preeklampsia (Weissgerber & Mudd, 2015).

Secara teori, hubungan antara diabetes dengan preeklampsia memang terdapat garis penghubung yang bila di kombinasikan kedua penyakit ini membawa kerusakan pada sistem pengaturan pembuluh darah bahkan dapat merusaknya secara langsung, keduanya memiliki faktor risiko yang sama seperti obesitas, penambahan umur, dan kehamilan multipel bahkan dalam hal patomekanisme keduanya melibatkan keadaan stress oksidatif, pelepasan faktor pro-inflamasi, dan disfungsi terhadap sistem endotelial, dari situ korelasi antara diabetes dan preeklampsia memiliki kemungkinan terjadi. Patomekanisme terjadinya preeklampsia akibat diabetes dikarenakan diabetes akan mengakibatkan beberapa keadaan pada tubuh ibu hamil yang pertama adalah penghambatan pergerakan trofoblas sehingga mengakibatkan defisiensi dalam *remodeling* arteri spiral yang berujung ke iskemik pada plasenta dan nantinya akan mengakibatkan stress oksidatif pada plasenta. Plasenta yang mengalami gangguan ini akan melepaskan banyak mediator-mediator anti *angiogenic* faktor seperti *soluble fms-like tyrosine kinase-1* (sFlt1) dan *soluble endoglin*. Hal ini akan mengakibatkan inflamasi pada maternal dan disfungsi pada endotelial pembuluh darah, dan ujungnya akan berakhir pada masalah sistemik. Tingginya kadar gula darah juga akan mengakibatkan trofoblas mengalami inflamasi atau peradangan dan berujung pada autofagi dan bahkan dapat mengakibatkan gangguan migrasi dan invasi oleh trofoblas. Pada keadaan diabetes Neutrofil Extracellular Traps atau NETs juga akan menjadi terlalu aktif dan bekerja secara berlebihan. NETs yang terlalu banyak juga akan

mengganggu dan menghalangi aliran darah di ruang villous sehingga darah tidak lancar mengalir dan plasenta akan mengalami iskemik. Jumlah gula darah yang terlalu melimpah juga memicu dan memperparah keadaan stres oksidatif seperti pembentukan *Advanced Glycation End Products (AGEs)* dan beberapa oksigen reaktif lainnya. Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya sirkulasi *Nitric Oxide (NO)* dan mengganggu pembentukannya hal ini akan merugikan dikarenakan NO dibutuhkan dalam regulasi vasodilatasi sehingga sistem vasodilatasi akan mengalami disfungsi. Selain itu, sitokin pro-inflamasi serum tumor nekrosis faktor- α (TNF- α) dan interleukin-6 (IL-6) juga ditemukan meningkat dalam sirkulasi darah ibu hamil dengan diabetes gestasional, yang berhubungan dengan disfungsi endotel, dan juga meningkat pada wanita dengan preeklampsia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa TNF- α , IL-6, dan protein C-reaktif (CRP) merupakan faktor risiko independen untuk preeklampsia pada wanita dengan diabetes gestasional, dan yang lain menunjukkan bahwa selain peningkatan kadar CRP, ketidakseimbangan interleukin-17/interleukin-35 mungkin juga terlibat dalam patogenesis diabetes gestasional yang rumit dengan preeklampsia. Semua model patomekanisme yang sudah dibahas tersebut akan berujung ke preeklampsia sehingga akan membahayakan keadaan ibu hamil, terlebih lagi bahwa ibu hamil yang memiliki diabetes akan memiliki faktor risiko besar untuk mengalami preeklampsia dan bila tidak ditindak lanjuti lebih cepat akan mengancam nyawa ibu dan anak sehingga hal ini juga perlu mendapat perhatian lebih (Skills & Teaching, 2022).



Gambar 2. 5 Patomekanisme diabetes gestasional terhadap preeklampsia (Skills & Teaching, 2022)

Tingkat mortalitas yang ditimbulkan oleh preeklampsia yang berkorelasi dengan diabetes sangat membahayakan untuk nyawa ibu bahkan di dalam agama sangat mewajibkan untuk mengormati ibu untuk segala pengorbanan yang ibu lewati selama masa-masa kehamilan. Dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 Allah Swt. berfirman:

وَحَمَلُهُ كُرْهًا وَوَضَعْتُهُ كُرْهًا أُمَّهُ ۖ حَمَلْتُهُ إِحْسَانًا بِوَالِدِيهِ الْإِنْسَانَ وَوَصَّيْنَا
نِعْمَتَكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزَعْنِي رَبِّ قَالَ سَنَةً أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ بَلَغَ إِذَا ۖ حَتَّىٰ شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفَصَّلَهُ
إِلَيْكَ تُبْتُ أَنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحْ تَرْضَاهُ صَالِحًا أَعْمَلُ وَأَنْ وَالِدِي وَعَلَىٰ عَلَيَّ أَنْعَمْتَ الَّتِي
الْمُسْلِمِينَ مِنْ وَاتِي

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

C. Preeklampsia

1. Definisi

Preeklampsia adalah salah satu bentuk gangguan hipertensi yang terjadi pada ibu hamil yang dialami oleh 2-8% kehamilan di dunia ini. Total kematian ibu hamil pada negara dengan pendapatan bawah sampai menengah 9-26%nya merupakan komplikasi atau akibat dari preeklampsia sedangkan pada negara dengan pendapatan tinggi mencapai 16% dari total kematian maternal. Hipertensi sendiri didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah di atas standar yang sudah ditetapkan oleh beberapa organisasi termasuk dalam Joint National Committee VII yang mengelasifikasikan tekanan darah dalam beberapa kategori yaitu, normal dengan tekanan darah sistole <120 mmHg dan atau diastole <80 mmHg, prehipertensi dengan tekanan darah sistole 120-139 mmHg dan atau diastole 80-89 mmHg, hipertensi stadium 1 dengan tekanan darah sistole 140-159 mmHg dan atau diastole 90-99 mmHg, dan terakhir hipertensi stadium 2 dengan tekanan darah sistole ≥ 160 mmHg dan atau diastole ≥ 100 mmHg. Sedangkan preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi yang baru muncul saat kehamilan dengan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg dalam 2x kejadian yang berlangsung selama setidaknya 4 jam atau selama 2 jam dengan tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg dan semuanya harus baru terjadi setelah umur kehamilan 20 minggu dan ditandai dengan adanya proteinuria (Committee, 2003; Karrar & Hong, 2022; Leveno, 2009; Prwairohardjo, 2011)


2. **Epidemiologi**

Preeklampsia sendiri sudah mencakup 2-8% dari ibu hamil di seluruh dunia dengan tingkat kematian mencapai 9-26% di negara berkembang dan di negara maju mencapai 16% tingkat kematian yang berarti lebih dari 50.000 kematian maternal di seluruh dunia dan sekitar 500.000 kematian janin. WHO mencatat dari tahun 2010-2017 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai 30.100 kematian, di tahun 2017 sendiri AKI mencapai 8600 dengan rasio rerata 177 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia per tahun 2021, dalam 4 tahun terakhir, jumlah kematian ibu masih terus meningkat dan hanya sempat turun di tahun 2019 dan kembali meningkat. Jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebanyak 7.389 kematian dengan Sulawesi Selatan menempati urutan ketujuh dengan jumlah kematian ibu 195 kematian per tahun 2021 dan hipertensi dalam kehamilan menyumbang jumlah kematian ibu sebanyak 41 kematian (Kemenkes RI., 2021).

3. **Etiologi**

Etiologi dari preeklampsia ada beragam mengingat preeklampsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang sangat ditakuti sehingga mengetahui penyebabnya merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian. Salah satu bentuk penyebab preeklampsia yang utama adalah adanya riwayat hipertensi sebelumnya terutama bila memang merupakan pengidap hipertensi sejak lama maka risiko terkena preeklampsia sangat tinggi. Obesitas dan diabetes juga merupakan dua faktor risiko yang memiliki peranan besar dalam pembentukan keadaan preeklampsia ini, keduanya akan merusak metabolisme seseorang sehingga sirkulasi darah akan terpengaruh akibat kerusakan-

kerusakan organ yang diakibatkannya. Kelainan pada sistem endokrin juga bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan darah yang drastis dan memicu terjadinya preeklampsia. Selanjutnya umur tua juga mengakibatkan pembuluh darah mengalami kekakuan sehingga tekanan darah akan cenderung meningkat sehingga risiko mengalami preeklampsia akan semakin meningkat seiring bertambahnya umur wanita tersebut. Jumlah kehamilan juga ikut memengaruhi, bahkan infeksi seperti infeksi SARS CoV-2 yang mengakibatkan inflamasi sistemik akibat pelepasan mediator radang ke seluruh tubuh juga dapat memicu inflamasi pada plasenta dan berujung pada iskemik plasenta terutamanya akan mengakibatkan preeklampsia. Infeksi kecil dengan tingkat inflamasi kecil seperti permasalahan pada periodontal juga dapat menjadi kemungkinan terjadinya faktor risiko preeklampsia. Reaksi *autoimmune* juga menjadi salah satu penyebab terjadinya preeklampsia dikarenakan kemungkinan penolakan oleh maternal terhadap fetal sehingga menyerang plasenta yang dapat memicu terjadinya peradangan dan iskemik pada pembuluh darah plasenta. Kehamilan mola juga ditemukan berdampak terhadap peningkatan terjadinya preeklampsia dikarenakan peningkatan jumlah sFlt-1 yang signifikan pada kehamilan mola bahkan gangguan tidur juga diduga memiliki dampak dalam peningkatan tekanan darah dan peningkatan sFlt-1 (Jung et al., 2022; Lumbanraja, 2017; Wei et al., 2013).



Gambar 2. 6 Etiologi preeklampsia (Jung et al., 2022)

4. Faktor Risiko

Pedoman *National Institute for Health and Care Excellence* (NICE) 2019 mengklasifikasikan seorang wanita berisiko tinggi preeklampsia jika memiliki riwayat penyakit hipertensi selama kehamilan sebelumnya atau memiliki penyakit yang parah termasuk penyakit ginjal kronis, penyakit autoimun, diabetes, atau hipertensi kronis. Wanita berada pada risiko jika mereka nulipara, memiliki indeks massa tubuh (BMI) ≥ 35 kg/m², riwayat keluarga preeklampsia, kehamilan multifoetal, atau interval kehamilan lebih dari 10 tahun. Adanya satu faktor risiko tinggi, atau dua atau lebih faktor risiko sedang, digunakan untuk membantu memandu profilaksis aspirin, yang

efektif dalam mengurangi risiko preeklampsia jika diberikan sebelum 16 minggu kehamilan (Fox et al., 2019).

Wanita yang memiliki usia terlalu muda < 20 tahun dan usia terlalu tua juga memiliki risiko mengalami preeklampsia, hal ini dikarenakan pada wanita dengan usia yang terlalu muda tubuhnya masih belum dapat mengimbangi adaptasi yang diperlukan selama proses kehamilan pertamanya dengan semua perubahan fungsi normal tubuh, hal ini sesuai dengan yang di cantumkan di integrasi keislaman pada bab sebelumnya dalam kutipan surah dan hadits yang menganjurkan untuk menikah saat sudah mampu dan jangan menjatuhkan diri dalam keadaan yang berbahaya sehingga seorang wanita dapat terhindar dari mortalitas akibat salah satu komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi akibat menikah di bawah usia 20 tahun seperti preeklampsia. kehamilan yang banyak, kehamilan > 3 kali, juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya preeklampsia, hal ini dikarenakan pada ibu yang hamil berkali-kali maka uterus atau rahimnya akan terus menerus digunakan dan keadaannya sudah tidak sekuat dulu lagi untuk menopang janin melekat, meskipun di dalam agama diajarkan bahwasanya memiliki anak merupakan pembuka pintu rezeki namun wajib bagi kita mengutamakan keselamatan terlebih dahulu seperti yang diperintahkan untuk tidak menjatuhkan diri dan orang lain dalam bahaya. Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah satu akademisi dari Perguruan Tinggi Islam Negeri untuk meluruskan tafsir dari hadits dan ayat kutipan sebelumnya. Prof. Siti Aisyah Kara, seorang tokoh agama dan akademisi Universitas Islam Negeri Makassar, mengatakan “Tujuan perkawinan adalah [mewujudkan keluarga] ‘sakinah, mawadah, warahmah’. Pada perkawinan anak

tidak ditemukan hal ini. Dalam Islam, semua perbuatan yang berdampak negatif atau banyak mudaratnya pada kelangsungan hidup manusia harus dihindari. Ada lima prinsip dasar perkawinan yang harus dijaga dalam Islam: Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Kalau jiwanya tidak stabil maka perkawinan itu harus ditunda. Oleh karena itu, perkawinan anak itu dilarang karena menghalangi tercapainya [tujuan] sakinah, mawadah, warahmah itu” (Arwan & Sriyanti, 2020; Primadata, 2022; Shihab, 2006; Yahya & Syaraf, 2007).

5. Patomekanisme

Pada kehamilan dengan preeklampsia, respons plasentasi pembuluh darah ibu tidak adekuat. Perubahan pembuluh darah hanya ditemukan pada segmen desidua arteri uteroplasenta, sedangkan segmen miometrium arteriol spiralis terus menunjukkan karakteristik muskuloelastiknya, sehingga sangat responsif terhadap pengaruh hormon. Kejadian iskemia plasenta yang menimbulkan gejala klinis preeklampsia dikatakan berkaitan dengan produksi faktor plasenta yang memasuki sirkulasi ibu, sehingga menyebabkan disfungsi sel endotel. Plasenta menghasilkan protein, yaitu soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt-1). Protein ini bekerja dengan berikatan di reseptor vascular endothelial growth factor (VEGF) serta placental like growth factor (PLGF). Jika kadar protein ini meningkat dalam sirkulasi ibu, kadar VEGF dan PLGF bebas menurun. Hal ini menyebabkan disfungsi sel endotel. Biasanya kadar sFlt-1 meningkat di dalam serum ibu dan plasenta pada preeklampsia dibandingkan kehamilan normal. Peningkatan kadar sFlt-1 berkaitan dengan derajat penyakit. Pada kehamilan, produksi prostanoïd meningkat pada jaringan ibu dan fetoplasenta. Prostaglandin dihasilkan oleh

endotel pembuluh darah serta korteks ginjal. Prostaglandin merupakan vasodilator kuat dan inhibitor agregasi trombosit, sedangkan tromboxan A₂ (TXA₂) dihasilkan oleh trombosit dan trofoblas, merupakan vasokonstriktor kuat dan agregator trombosit. Ketidakseimbangan produksi prostanoide atau katabolisme ini berkaitan dengan preeklampsia. Peroksida lipid dan radikal bebas juga berkaitan dengan patogenesis preeklampsia (Ganot et al., 2017).

6. Gejala dan Tanda

Ibu hamil akan mengalami peningkatan tekanan darah berupa tekanan darah sistolik >140 mmHg atau diastolik > 90 mmHg 2x dengan durasi 4 jam (tidak terjadi bila terapi medikamentosa antihipertensi segera diberikan). Tekanan darah meningkat baru ditemukan pada umur kehamilan 20 minggu ke atas pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, trombositopenia (jumlah trombosit <100.000), disfungsi organ hati (peningkatan enzim transaminase hati melebihi konsentrasi normal), nyeri kuadran kanan atas persisten berat atau nyeri epigastrium tidak responsif terhadap pengobatan dan tidak ada diagnosis alternatif, atau keduanya. Disfungsi kerja ginjal ditandai dengan peningkatan kreatinin serum lebih besar dari 1,1 mg/dL, atau dua kali lipat dari kreatinin serum *baseline* laboratorium rumah sakit yang bersangkutan tanpa di latar belakang penyakit ginjal sebelumnya. Gangguan neurologis berupa nyeri kepala atau bahkan sampai penurunan penglihatan. Sebelumnya, salah satu kriteria preeklampsia adalah proteinuria yang didefinisikan sebagai ekskresi >300 mg protein dalam urin 24 jam atau rasio protein/kreatinin minimal 0,3 (masing-masing diukur sebagai mg/dL). Metode dipstick tidak digunakan

kecuali hanya metode itu yang tersedia. Protein 1+ dianggap sebagai *cut off* untuk diagnosis proteinuria. *Task Force on Hypertension in Pregnancy* juga menyarankan untuk mengeliminasi kriteria proteinuria masif, yang didefinisikan sebagai proteinuria >5 g, karena kurangnya bukti bahwa kuantitas protein berhubungan dengan luaran kehamilan dengan preeklampsia. Pertumbuhan janin terhambat juga bukan lagi indikasi preeklampsia berat mengingat tatalaksana Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) pada kehamilan dengan atau tanpa preeklampsia tidak berbeda (Ganot et al., 2017; Prawirohardjo, 2020).

7. Penegakan Diagnostik

Secara internasional, preeklampsia didefinisikan sebagai hipertensi gestasional onset baru (tekanan darah sistolik 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik 90 mmHg) yang berhubungan dengan onset baru setidaknya satu proteinuria yang didapatkan dari uji dipstick, disfungsi organ ibu (hati, neurologis, hematologi, atau keterlibatan ginjal), atau disfungsi uteroplasenta pada atau setelah umur kehamilan 20 minggu (Fox et al., 2019; Johannes C.Mose, 2018; POGI, 2016).

8. Tatalaksana

Pemantauan tekanan darah dan pencegahan *seizure* atau kejang merupakan hal yang penting dilakukan dalam bentuk tatalaksana terhadap preeklampsia. Medikamentosa yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dapat berupa methyldopa, labetalol atau nifedipine meskipun ada juga beberapa yang menganjurkan penggunaan amlodipine yang masih kontroversial. Pemberian kortikosteroid pada umur kehamilan 34 minggu untuk menyiapkan kematangan paru-paru bayi bila


ternyata bayi lahir kurang bulan dan juga pencegahan kejang menggunakan magnesium sulfat (Rana et al., 2019).




9. Komplikasi dan Prognosis

Diagnosis dini, intervensi medis tepat waktu, dan pengawasan ibu dan janin yang tepat secara signifikan meningkatkan hasil ibu dan janin. Karena preeklampsia terus bertanggung jawab atas hingga seperempat kematian ibu di latar belakang etnis tertentu (populasi Karibia dan Amerika Latin, diikuti oleh populasi Asia dan Afrika), perawatan yang cepat dan pemantauan rutin menurunkan morbiditas dan mortalitas. Keterlambatan kelahiran janin pada pasien preeklampsia pada periode prematur akhir meningkatkan risiko hipertensi berat, dengan konsekuensi berat seperti eklampsia, sindrom hemolisis *elevated liver enzyme low platelet* (HELLP), edema paru, infark miokard, sindrom gangguan pernapasan akut, stroke, cedera ginjal dan retina, dan janin. Komplikasi termasuk pembatasan pertumbuhan janin, solusio plasenta, atau kematian janin atau ibu (Karrar & Hong, 2022).

D. Kerangka Teori



Gambar 2. 7 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep**Gambar 2. 8** Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Observasional analitik dengan desain *case control* mengambil data dari sebuah rekam medik medis berupa kejadian preeklampsia pada ibu hamil yang telah melahirkan di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022-Januari 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang menjalani ANC atau melahirkan di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang tidak pernah didiagnosis menderita penyakit ginjal, infeksi sistemik, atau hipertensi kronik, dengan data rekam medis terkait status diabetes mellitus, tekanan darah, dan pemeriksaan laboratorium yang terdokumentasi dengan baik. Populasi kasus penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang menjalani ANC atau melahirkan di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang didiagnosis preeklampsia pada tahun 2021. Populasi kontrol seluruh ibu hamil yang selama kehamilannya tidak pernah didiagnosis dengan preeklampsia pada tahun 2021.

2. Sampel

Cara pengambilan sampel dengan cara *total sampling*. Sampel kasus dalam penelitian ini sesuai dengan seluruh jumlah populasi kasus, sedangkan jumlah sampel kontrol *matching* dengan jumlah sampel kasus dengan perbandingan 1:1.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekam medik di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dari Januari-Desember 2021.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *total sampling* yang didapatkan dari data rekam medik di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dari Januari-Desember 2021.

F. Teknik Pengolahan/Analisis Data

Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang didapatkan adalah hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Analisis data dalam penelitian ini menguji risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap preeklampsia.

1. Analisis Univariat


Analisis univariat dilakukan secara deskriptif tiap variabel yang digunakan dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kategorik dan data kontinyu disajikan berdasarkan hasil analisis distribusi normalitas. Data kontinyu dengan

distribusi normal disajikan dalam bentuk $\text{mean} \pm \text{SD}$, sedangkan data distribusi tidak normal disajikan dalam bentuk median (IQR)

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *chi square* dan *odds ratio* dengan bantuan *software* uji statistik. Uji statistik *chi square* digunakan untuk mengetahui terdapat hubungan bermakna antara variabel independen dan dependen dengan menggunakan tabel 2x2 dan dengan bantuan aplikasi *Statistical Program for Social Science* (SPSS) dengan syarat uji *chi square* dapat digunakan apabila selnya mempunyai nilai *expected* kurang dari 5 atau maksimal 20% dari jumlah sel, tetapi bila tidak terpenuhi maka alternatif uji *chi square* untuk tabel 2 x 2 adalah uji *fisher*. Apabila dari uji *chi square* didapatkan kebermaknaan maka besar risiko akan dicari menggunakan uji statistik *odds ratio* (OR). Uji statistik *odds ratio* (OR) digunakan untuk mengetahui perbandingan faktor risiko terhadap sampel kasus dan sampel kontrol, bila pada hasil perhitungan OR perhitungan nilai $p < 0,05$ maka pada perhitungan interval kepercayaan (IK.), nilai 1 tidak akan tercakup di dalam intervalnya

G. Metode Pengumpulan Data



Gambar 3. 1 Metode Pengumpulan Data

H. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jalan Gunung Merapi No. 75, Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia dikaji di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2021. Data yang dikumpulkan semuanya berasal dari rekam medik dan dicatat menggunakan tabel penelitian yang sesuai. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *Microsoft Excel 365* dan *Statistical Program for The Social Sciences (SPSS) for windows 23*.

B. Hasil

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan distribusi dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 182 sampel yang terdiri atas 91 sampel kelompok kasus dan 91 sampel kelompok kontrol dengan menggunakan rasio 1:1. Adapun distribusi sampel penelitian dijabarkan pada tabel dalam bentuk sosial demografi sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Karakteristik Sampel Penelitian

Variabel		n (%)
Usia Ibu	< 20 Tahun	11 (6.0%)
	20-35 Tahun	141 (77.5%)
	> 35 Tahun	30 (1.5%)
IMT	Overweight	114 (62.6%)
	Normal	68 (37.4%)
DM	Ya	20 (11.0%)
	Tidak	162 (89.0%)
Abortus	Ya	31 (17.0%)
	Tidak	151 (83.0%)
Riwayat Preeklamsia	Ya	36 (19.8%)
	Tidak	146 (80.2%)
Jumlah Paritas	< 2	100 (54.9%)
	2-3	69 (37.9%)
	> 3	13 (7.1%)
Hemoglobin	< 11g/dl	96 (52.7%)
	≥ 11g/dl	86 (47.3%)
Proteinuri Pada Kelompok Preeklamsia	1	42 (46.0%)
	2	28 (31.0%)
	3	16 (17.5%)
	4	5 (5.5%)
Tekanan Darah	Normal	63 (34.6%)
	Prehipertensi	50 (27.4%)
	Hipertensi 1	69 (38.0%)

Tabel 4. 1 Karakteristik Sampel Penelitian (lanjutan)

Variabel		n (%)
Leukosit	Leukositosis	88 (48.4%)
	Normal	94 (51.6%)

Distribusi karakteristik sampel penelitian berdasarkan usia ibu, IMT, diabetes mellitus, riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu, hemoglobin, GDP, proteinuria pada kelompok preeklampsia, tekanan darah, dan leukosit disajikan dalam tabel 4.1. Berdasarkan kelompok usia sampel dari seluruh total sampel didapatkan median usia 27 (23-34) tahun, dengan median usia 18 (17-19) tahun pada kelompok usia < 20 tahun, dengan median usia 26 (23-31) tahun pada kelompok usia 20-35 tahun, dan dengan median usia 40 (38-42) tahun pada kelompok usia > 35. Berdasarkan karakteristik IMT dari seluruh total sampel didapatkan median IMT 25.9 (23.1-27.9) Kg/m², dengan median IMT 27.3 (26.1-27.3) Kg/m² pada kelompok IMT *overweight*, dan dengan median IMT 22.3 (21.225-23.775) Kg/m² pada kelompok IMT normal. Berdasarkan karakteristik hemoglobin dari seluruh total sampel didapatkan median jumlah hemoglobin 10.9 (9.8-11.825)g/dl, dengan median hemoglobin 11.8 (11.2-12.7)g/dl pada kelompok hemoglobin ≥ 11g/dl, dan dengan median hemoglobin 9.9 (9.1-10.4)g/dl pada kelompok hemoglobin < 11g/dl. Berdasarkan karakteristik leukosit dari seluruh total sampel didapatkan median leukosit 14900 (10842,5-18262,5)mm³, dengan median leukosit 18350 (16662,5-21286,5) mm³ pada kelompok leukositosis, dan dengan median leukosit 10925 (9228-12840) mm³ pada kelompok leukosit normal. Berdasarkan karakteristik DM yang didiagnosis melalui nilai GDP hanya diperiksa

pada beberapa sampel yang memiliki indikasi menurut pihak RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar terdapat 20 sampel yang memiliki DM dengan jumlah 20 (11.0%) orang dengan median nilai GDP 158.25(148-169)mg/dl. Berdasarkan karakteristik tekanan darah yang ditetapkan oleh Joint National Committee VII (JNC7) didapatkan kelompok hipertensi 1 merupakan yang paling banyak dengan jumlah 69 (38.0%) orang, hipertensi 1 memiliki tekanan sistole 140-159 mmHg dan atau diastole 90-99 mmHg, kemudian kelompok tekanan darah normal dengan jumlah 63 (34.6%) orang, tekanan darah normal memiliki tekanan sistole < 120 mmHg dan atau diastole < 80 mmHg, dan terakhir kelompok prehipertensi dengan jumlah 50 (27.4%) orang, prehipertensi memiliki sistole 120-139 mmHg dan diastole 80-89 mmHg. Berdasarkan karakteristik proteinuria yang hanya ada pada kelompok preeklampsia didapatkan dari seluruh sampel kelompok proteinuria 1 merupakan yang paling banyak dengan jumlah 42 (46.0%) orang, dengan jumlah 28 (31.0%) orang pada kelompok proteinuria 2, dengan jumlah 16 (17.5%) orang kelompok proteinuria 3, dan dengan jumlah 5 (5.5%) orang pada kelompok proteinuria 4.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan dengan tujuan untuk mengetahui adanya hubungan faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia dan juga hubungan beberapa variabel tambahan seperti usia, IMT, riwayat abortus, riwayat preeklampsia, jumlah paritas ibu, dan anemia terhadap kejadian preeklampsia. Dalam penelitian ini, setiap variabel independen akan diuji ada

tidaknya hubungan dan uji kebermaknaan dengan variabel dependen. Adapun analisis hubungan variabel diabetes mellitus dan beberapa variabel lainnya dengan kejadian preeklampsia dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Analisis Risiko Diabetes Mellitus terhadap Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

DM	Preeklampsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Ya	9 (9.9%)	11 (12.0%)	20 (10.9%)			
Tidak	82 (90.1%)	80 (88.0%)	162 (89.1%)	1.000	1.000	0.378- 2.647
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.2 disajikan analisis risiko diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 9 orang (9.9%) mengalami diabetes mellitus dan 82 orang (90.1%) tidak mengalami diabetes mellitus sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 11 orang (12.0%) mengalami diabetes mellitus dan 80 orang (88.0%) tidak mengalami diabetes mellitus. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 1,000 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 1,000 dengan CI 95% (0.378-2.647) menunjukkan bahwa ibu dengan diabetes mellitus

memiliki risiko 1 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu yang tidak memiliki diabetes mellitus.

Tabel 4. 3 Analisis Risiko Usia Ibu terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

Usia Ibu	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
<20 atau >35 Tahun	31 (34.1%)	10 (11.0%)	41 (22.5%)			
20-35 Tahun	60 (65.1%)	81 (89.0%)	141 (77.5%)	0.000	4.185	1.905-9.194
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.3 disajikan analisis risiko usia ibu terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 31 orang (34.1%) merupakan ibu dengan usia berisiko dan 60 orang (65.1%) merupakan ibu dengan usia tidak berisiko sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 10 orang (11.0%) merupakan ibu dengan usia berisiko dan 81 orang (89.0%) merupakan ibu dengan usia tidak berisiko. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 4,185 dengan CI 95% (1.905-9.194) menunjukkan bahwa ibu dengan usia berisiko <20 atau >35 tahun memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu yang memiliki usia tidak berisiko 20-35 tahun.

Tabel 4. 4 Analisis Risiko IMT terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

IMT	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Berisiko (\geq) 25 Kg/m ²	62 (68.1%)	52 (57.1%)	114 (62.6%)	0.168	1.603	0.875-2.938
Tidak Berisiko (<25) Kg/m ²	29 (31.9%)	39 (42.9%)	68 (37.4%)			
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.4 disajikan analisis risiko IMT terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 62 orang (68.1%) merupakan ibu dengan IMT berisiko dan 29 orang (31.9%) merupakan ibu dengan IMT tidak berisiko sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 52 orang (57.1%) merupakan ibu dengan IMT berisiko dan 39 orang (42.9%) merupakan ibu dengan IMT tidak berisiko. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,168 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 1,603 dengan CI 95% (0.875-2.938) menunjukkan bahwa ibu dengan IMT berisiko \geq 25 Kg/m² memiliki risiko 1,6 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu dengan IMT tidak berisiko < 25 Kg/m².

Tabel 4. 5 Analisis Risiko Abortus terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

Riwayat Abortus	Preeklampsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Ya	16 (17.6%)	15 (16.5%)	31 (17.0%)			
Tidak	75 (82.4%)	76 (83.5%)	151 (83.0%)	1.000	1.081	0.499-2.342
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.5 disajikan analisis risiko riwayat abortus terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 16 orang (17.6%) merupakan ibu dengan riwayat abortus dan 75 orang (82.4%) merupakan ibu tanpa riwayat abortus sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 15 orang (16.5%) merupakan ibu dengan riwayat abortus dan 76 orang (83.5%) merupakan ibu tanpa riwayat abortus. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 1,000 yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna. Nilai odd ratio (OR) sebesar 1,081 dengan CI 95% (0.499-2.342) menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat abortus memiliki risiko 1,08 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu tanpa abortus.

Tabel 4. 6 Analisis Risiko Riwayat Preeklampsia terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

Riwayat Preeklamsia	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Ya	35 (38.5%)	1 (1.1%)	36 (19.8%)			
Tidak	56 (61.5%)	90 (98.9%)	146 (80.2%)	0.000	56.250	7.495-422.154
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.6 disajikan analisis risiko riwayat preeklamsia terhadap kejadian preeklamsia. pada kelompok kasus ditemukan 35 orang (38.5%) merupakan ibu dengan riwayat preeklamsia dan 56 orang (61.5%) merupakan ibu tanpa riwayat preeklamsia sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 1 orang (1.1%) merupakan ibu dengan riwayat preeklamsia dan 90 orang (98.9%) merupakan ibu tanpa riwayat preeklamsia. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 56,250 dengan CI 95% (7.495-422.154) menunjukkan bahwa ibu dengan riwayat preeklamsia memiliki risiko 56 kali lebih besar untuk mengalami preeklamsia dibandingkan ibu tanpa riwayat preeklamsia.

Tabel 4. 7 Analisis Risiko Jumlah Paritas terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

Jumlah Paritas Ibu	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Berisiko (<2 atau >3)	64 (70.3%)	49 (53.8%)	113 (62.1%)	0.032	2.032	1.104-3.739
Tidak Berisiko (2-3)	27 (29.7%)	42 (46.2%)	69 (37.9%)			
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.7 disajikan analisis risiko jumlah paritas ibu terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 64 orang (70.3%) merupakan ibu dengan jumlah paritas berisiko dan 27 orang (29.7%) merupakan ibu jumlah paritas tidak berisiko sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 49 orang (53.8%) merupakan ibu dengan jumlah paritas berisiko dan 46 orang (46.2%) merupakan ibu jumlah paritas tidak berisiko. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,032 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 2,032 dengan CI 95% (1.104-3.739) menunjukkan bahwa ibu dengan jumlah paritas berisiko memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu dengan jumlah paritas tidak berisiko.

Tabel 4. 8 Analisis Risiko Anemia terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar

Anemia	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Ya	56 (61.5%)	40 (44.0%)	96 (52.7%)			
Tidak	35 (38.5%)	51 (56.0%)	86 (47.3%)	0.026	2.040	1.129-3.685
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.8 disajikan analisis risiko anemia terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 56 orang (61.5%) merupakan ibu dengan anemia dan 35 orang (38.5%) merupakan ibu tanpa anemia sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 40 orang (44.0%) merupakan ibu dengan anemia dan 51 orang (56.0%) merupakan ibu tanpa anemia. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,026 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 2,040 dengan CI 95% (1.129-3.685) menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu tanpa anemia.

Tabel 4. 9 Analisis Risiko Leukosit Terhadap Tingkat Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti terhadap Makassar

Leukosit	Preeklamsia		Total	p value	OR	95% CI
	Kasus (%)	Kontrol (%)				
Leukositosis	65 (71.4%)	23 (25.3%)	88 (48.4%)	0.000	7.391	3.835- 14.244
Normal	26 (28.6%)	68 (74.7%)	94 (51.6%)			
Total	91 (100.0%)	91 (100.0%)	182 (100.0%)			

Pada tabel 4.9 disajikan analisis risiko jumlah leukosit ibu terhadap kejadian preeklampsia. pada kelompok kasus ditemukan 65 orang (71.4%) merupakan ibu dengan leukositosis dan 26 orang (28.6%) merupakan ibu jumlah leukosit normal sementara itu pada kelompok kontrol ditemukan 23 orang (25.3%) merupakan ibu dengan leukositosis dan 68 orang (74.7%) merupakan ibu jumlah leukosit normal. Dari hasil analisis bivariat chi-square didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kelompok kasus dan kontrol. Nilai odd ratio (OR) sebesar 7,391 dengan CI 95% (3.835-14.244) menunjukkan bahwa ibu dengan leukositosis memiliki risiko 7 kali lebih besar untuk mengalami preeklampsia dibandingkan ibu dengan leukosit normal.

C. Pembahasan

1. Hubungan Diabetes Mellitus dengan Kejadian Preeklampsia

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.2 menyatakan bahwa diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yushida dan Evi Zahara (2020) di Pusat Kesehatan Meureubo dan Johanalawan, Aceh Barat dengan sampel sebanyak 21 kelompok kasus dan 21 kelompok kontrol didapatkan hasil p-value sebesar 0,48 yang artinya ibu dengan diabetes mellitus tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia. Dari kesimpulan penelitian, ibu dengan diabetes mellitus memiliki peluang yang tidak lebih besar dibandingkan ibu hamil tanpa diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Hafsa Mohamed Mohamud dan Istianah Surury (2019) di Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara dengan jumlah sampel 394 orang juga menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Ibu hamil dengan diabetes mellitus secara teori memiliki tingkat risiko mengalami preeklampsia yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mengalami preeklampsia. Hal ini dikarenakan pada ibu yang mengalami diabetes akan mengakibatkan beberapa keadaan pada tubuh ibu hamil yang pertama adalah penghambatan pergerakan trofoblas sehingga mengakibatkan defisiensi dalam

remodeling arteri spiral yang berujung ke iskemik pada plasenta dan nantinya akan mengakibatkan stress oksidatif pada plasenta. Plasenta yang mengalami gangguan ini akan melepaskan banyak mediator-mediator anti *angiogenic* faktor seperti *soluble fms-like tyrosine kinase-1* (sFlt1) dan *soluble endoglin*. Hal ini akan mengakibatkan inflamasi pada maternal dan disfungsi pada endotelial pembuluh darah, dan ujungnya akan berakhir pada masalah sistemik dan berpengaruh pada pembentukan preeklampsia, diabetes mellitus juga dikenal memiliki efek jangka panjang dalam merusak atau mempercepat degenerasi pada pembuluh darah yang tentunya akan mengakibatkan malafungsi pada pembuluh darah dan tentunya akan berujung pada disregulasi sistem vascular, bila hal ini terus terjadi maka tekanan darah akan terus menerus meningkat dikarenakan vaskular yang rusak dan akan semakin rusak lagi oleh keadaan hipertensi yang terbentuk sehingga aliran uteroplasenta akan terganggu dan menyebabkan hipoperfusi pada janin dan akan berakibat fatal bila dibiarkan. Akan tetapi, preeklampsia juga memiliki banyak faktor risiko lainnya seperti yang juga terdata pada penelitian ini yaitu, usia ibu yang berisiko (<20 atau >35 tahun), riwayat preeklampsia sebelumnya, paritas berisiko (<2 atau >3), anemia, dan peningkatan leukosit, gangguan ginjal juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya preeklampsia. hal ini dikarenakan ginjal memiliki peranan yang sangat besar pada pengaturan sistem sirkulasi cairan tubuh termasuk aliran darah, sehingga kerusakan pada ginjal tentunya akan mengganggu homeostasis pada aliran darah dan berujung pada disregulasi pengaturan aliran darah yang dapat berakibat pada pembentukan preeklampsia. Riwayat hipertensi juga merupakan penyebab preeklampsia. hipertensi

yang sudah terjadi bertahun-tahun pada seseorang dapat merusak pembuluh darah dan beberapa fungsi organ akibat tekanan yang diberi dan efek hipoperfusi yang terjadi akibat tekanan yang terlalu tinggi. Tekanan yang terlalu tinggi yang terjadi terus-menerus juga akan mengakibatkan kebocoran plasma pada jaringan sekitar sehingga dapat memicu terjadinya edema pada jaringan sekitar, bila hal ini terjadi pada ibu hamil maka plasenta yang merupakan pintu masuk nutrisi dan oksigen masuk melalui darah yang dihantarkan oleh pembuluh darah juga dapat terkena dampaknya. Kerusakan pada plasenta akibat pembuluh endotel pembuluh darah yang mengalami kerusakan akibat tekanan darah yang tinggi dan terus-menerus akan mengakibatkan gangguan pada aliran uteroplasenta. Gangguan pada aliran uteroplasenta akan mengganggu pasokan nutrisi dan oksigen yang dibawa oleh darah untuk janin dan tentunya akan mengakibatkan preeklampsia. akan tetapi pada penelitian ini gangguan pada ginjal tidak dapat dinilai hal ini dikarenakan pada rekam medik tidak menampilkan fungsi ureum kreatinin. sehingga diabetes mellitus bukan merupakan satu-satunya faktor risiko yang mutlak mengakibatkan preeklampsia (Fasrah & Kemal, 2021; Kattah, 2020; Khalil, 2017; Mohamud & Surury, 2019; Safitri & Siahaan, 2022; Yushida & Zahara, 2020).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.3 menyatakan bahwa usia berisiko < 20 atau > 35 tahun merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari Deshinta dan Hardy Hasibuan pada tahun 2022 di

Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan sampel sebanyak 42 kelompok kasus dan 42 kelompok kontrol didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,000 yang artinya usia ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan usia hamil berisiko di bawah 20 tahun dan di atas 50 tahun berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan Alifia Nurdani, dkk pada tahun 2021 di RSIA Siti Khadijah 1 dengan sampel sebanyak 45 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSIA Siti Khadijah 1

Pada ibu hamil yang memiliki usia di bawah 20 tahun tubuhnya masih perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan drastis yang akan terjadi bila hamil di usia dini, hal ini dikarenakan fungsi reproduksi yang belum terlalu matang sehingga perubahan regulasi yang tiba-tiba akan membuat tubuh ibu tersebut cenderung tidak siap termasuk dalam proses remodelling arteri spiralis yang bila proses ini terganggu maka akan mengakibatkan terjadinya preeklampsia, pada ibu dengan usia di atas 35 tahun tubuh sudah mengalami kemunduran atau degeneratif pada fungsi normalnya sehingga regulasi tubuh yang seharusnya mampu mengikuti perubahan-perubahan fungsi yang dibutuhkan saat hamil menjadi tidak dapat lagi diikuti oleh tubuh ibu. pada ibu yang sudah berusia 35 tahun ke atas produksi estrogen semakin berkurang sedangkan menurut teori estrogen sangat memengaruhi fungsi jantung dalam bekerja.

Estrogen memengaruhi kontraktilitas jantung sehingga kurangnya jumlah estrogen akan menurunkan fungsi kontraktilitas jantung dan mengakibatkan fungsi diastole ventrikel kiri tidak efisien, hal ini akan berujung pada kurangnya darah yang dikeluarkan dari jantung sehingga akan terjadi akumulasi darah di ventrikel kiri yang memicu terhambatnya aliran darah yang masuk dari paru-paru ke bagian kiri jantung dan akan mengakibatkan hipertensi pulmonal, bila hal ini terus-menerus terjadi maka akan menimbulkan hipertensi secara sistemik pada tubuh dan bila hal ini terjadi pada ibu hamil maka tentu saja dapat memengaruhi aliran uteroplasenta, oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan umur yang berisiko memiliki hubungan signifikan terhadap kejadian preeklampsia (Arwan & Sriyanti, 2020; Brosens et al., 2015; Dewie et al., 2020; Li et al., 2017; Weissgerber & Mudd, 2015).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.4 menyatakan bahwa IMT berisiko $\geq 25\text{Kg/mm}^3$ bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alamsyah Azis, Aditya Wibowo, Nadia Larastri Almira, dan Tjut Sutjighassani pada tahun 2020 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan sampel sebanyak 40 orang didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,602 yang artinya IMT ibu hamil tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan IMT berisiko $\geq 25\text{Kg/mm}^3$ tidak berpeluang lebih besar untuk

mengalami preeklampsia dibandingkan dengan yang memiliki IMT tidak berisiko < 25Kg/mm³.

Menurut teori pada ibu yang memiliki IMT berisiko $\geq 25\text{Kg/mm}^3$ juga memiliki kemungkinan besar mengalami sindrom metabolik dan memicu terjadinya diabetes dan tentunya akan berujung ke beberapa komplikasi dengan mekanisme yang sama seperti yang diabetes mellitus akibatkan. Oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan pada kategori IMT berisiko $\geq 25\text{Kg/mm}^3$ meskipun tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia namun memiliki risiko lebih untuk memicu preeklampsia dibanding dengan ibu hamil dengan IMT yang tidak berisiko < 25Kg/mm³ (Arwan & Sriyanti, 2020).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.5 menyatakan bahwa riwayat abortus bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renita Muzalfah, Yunita Dyah Puspita Santik, dan Anik Setyo Wahyuningsih pada tahun 2017 di Puskesmas Sirampog dengan sampel sebanyak 35 kelompok kasus dan 35 kelompok kontrol didapatkan hasil *p-value* sebesar 1,000 yang artinya riwayat abortus ibu hamil tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Puskesmas Sarompog. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan riwayat aborsi berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohammedain, dkk pada tahun 2022 di RS Abuelela, Khartoum, Sudan dengan sampel sebanyak 180

sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan tidak adanya hubungan yang signifikan antara riwayat aborsi pada ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Abuelela .

Pada ibu yang pernah mengalami aborsi maka tubuh sudah terbiasa atau sudah pernah terpapar dengan perubahan-perubahan drastis pada tubuhnya sehingga mengurangi risiko terjadinya preeklampsia pada kehamilan-kehamilan selanjutnya, oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan aborsi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia (Mohamedain et al., 2022).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.6 menyatakan bahwa riwayat preeklampsia merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny Susanti pada tahun 2021 di Klinik Pratama Umami Talango dengan sampel sebanyak 46 didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,000 yang artinya riwayat preeklampsia ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Klinik Pratama Umami Talango. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan riwayat Preeklampsia berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia.

Pada ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia juga memiliki kecenderungan mengalami preeklampsia lagi, hal ini dikarenakan pada ibu hamil yang memiliki riwayat mengalami preeklampsia biasanya memiliki faktor-faktor risiko yang masih ada padanya dan cenderung semakin parah. Oleh karena itu, pada hasil penelitian

yang disajikan riwayat mengalami preeklampsia sebelumnya memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian preeklampsia (English et al., 2015; Setyorini et al., 2017).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.7 menyatakan bahwa jumlah paritas berisiko <2 atau >3 merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita Ariesta pada tahun 2018 di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak dengan sampel sebanyak 133 kelompok kasus dan 133 kelompok kontrol didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,001 yang artinya paritas ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan paritas berisiko yaitu nullipara, primipara dan multipara berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emi Yulita pada tahun 2021 di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dengan sampel sebanyak 130 sampel, pada penelitian ini juga menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara paritas ibu hamil dengan tingkat kejadian preeklampsia di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Pada ibu yang memiliki jumlah paritas <2 atau >3 berisiko mengalami preeklampsia, hal ini dikarenakan pasien yang memiliki paritas di bawah 2 sama halnya dengan usia tubuhnya belum memiliki adaptasi terhadap perubahan-perubahan dengan baik termasuk adaptasi oleh sistem imun, respon imun seperti Human Leukocyte Antigen-G yang masih aktif-aktifnya akan menganggap bagian dari plasenta seperti

vili korialis merupakan benda asing, hal ini akan memicu penyerangan imun dan akan mengganggu proses invasi trofoblas ke sel desidua arteri spiralis dan menyebabkan kegagalan remodelling arteri spiralis yang menjadi peredaran darah uteroplasenta. Bila penolakan oleh imun ini terus-menerus terjadi maka dapat memicu terbentuknya Blocking Antibodi di area tersebut dan akan terus-menerus menyerang plasenta dan akan mengganggu aliran darah ke janin yang berujung pada terjadinya preeklampsia. Sementara itu pada ibu dengan paritas di atas 3 maka uterus yang terus menerus mengalami degenerasi akan tidak sekuat seperti sebelumnya dalam memfasilitasi tempat nidasi, oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan ibu dengan jumlah paritas berisiko memiliki hubungan yang signifikan (Arwan & Sriyanti, 2020; Galaviz-Hernandez et al., 2019; Setyorini et al., 2017; Tarigan & Yulia, 2019).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.8 menyatakan bahwa anemia merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almaz Aklilu Getu pada tahun 2019 di Rumah Sakit Rujukan Barat Amhara, Ethiopia, dengan sampel sebanyak 277 kelompok kasus dan 554 kelompok kontrol didapatkan hasil $p\text{-value} < 0,05$ yang artinya anemia pada ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Rumah Sakit Rujukan Barat Amhara, Ethiopia. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan anemia berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia.

Pada ibu hamil dengan anemia memiliki kecenderungan mengalami preeklampsia akibat kurangnya pasokan nutrisi ke janin termasuk antioksidan sehingga mudah terjadi inflamasi setempat sehingga dapat mengakibatkan preeklampsia. Oleh karena itu pada hasil penelitian yang disajikan ibu dengan anemia memiliki hubungan yang signifikan (Getu et al., 2019; Nanda & Semarawisma, 2021).

Berdasarkan pada hasil yang disajikan di tabel 4.9 menyatakan bahwa leukositosis merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelle Angelina pada tahun 2019 di Poliklinik atau Instalasi Gawat Darurat Kebidanan RSUP Sanglah, Denpasar, dengan sampel sebanyak 30 kelompok kasus dan 30 kelompok kontrol didapatkan hasil *p-value* sebesar 0,001, nilai $p < 0,05$ yang artinya peningkatan leukosit pada ibu hamil memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kejadian preeklampsia di Poliklinik atau Instalasi Gawat Darurat Kebidanan RSUP Sanglah, Denpasar. Dari kesimpulan penelitian ibu dengan peningkatan leukosit berpeluang lebih besar untuk mengalami preeklampsia.

Peningkatan leukosit dalam darah sudah lama menjadi salah satu penanda bahwa telah terjadi infeksi yang mengharuskan sel imun seperti leukosit harus memperbanyak jumlahnya untuk mengatasi invasi oleh patogen berbahaya tersebut, tetapi seringkali respon dari sistem imun terkadang berlebihan sehingga mengakibatkan banyak masalah termasuk pada ibu hamil respon imun yang tidak terkendali akan menyebabkan preeklampsia. Reaksi inflamasi yang berlebih akan mengakibatkan

banyak pelepasan mediator radang yang salah satu efek sampingnya tentu saja akan merusak endotel pembuluh darah termasuk pembuluh darah yang berada pada sistem sirkulasi uteroplasentas, bila infeksi terjadi pada plasenta dan memicu terjadinya reaksi inflamasi maka akan memicu pelepasan radikal-radikal bebas, *reactive oxygen species (ROS)*, dan beberapa sitokin inflamasi yang tentunya akan mengakibatkan disfungsi pada endotel sehingga plasenta akan mengalami hipoperfusi dan berujung pada pembentukan preeklampsia (Angelina et al., 2019).

Dari beberapa hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan bahwa diabetes mellitus bukanlah merupakan satu-satunya faktor risiko pemicu terjadinya preeklampsia. Teori menunjukkan bahwa etiologi dan mekanisme terjadinya preeklampsia belum jelas diketahui sehingga tidak berhubungannya antara diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap angka kejadian preeklampsia adalah hal yang bisa terjadi pada penelitian ini.

Pada penelitian ini diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko kejadian preeklampsia mutlak didukung dengan pada hasil menunjukkan tidak adanya signifikansi antara diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia. Oleh karena itu ibu hamil diharapkan memperhatikan beberapa faktor risiko tersebut agar ke depannya hal-hal yang seperti ini dapat dihindari.

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar selama bulan Desember Tahun 2022 hingga Januari Tahun 2023 untuk mengetahui apakah diabetes mellitus merupakan faktor risiko terhadap kejadian preeklampsia memiliki beberapa keterbatasan yang didapatkan selama penelitian, antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian ini menggunakan data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.
2. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan rekam medik yang tidak lengkap sehingga data rekam medik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
3. Peneliti kurang banyak mengambil variabel karena keterbatasan waktu sehingga penelitian yang harusnya lebih baik lagi tidak tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang faktor risiko diabetes mellitus pada ibu hamil terhadap kejadian preeklampsia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ibu hamil dalam penelitian yang dilakukan ini di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2021 memiliki persebaran usia < 20 tahun sebanyak 11 orang (6,0%), 20-35 tahun sebanyak 141 orang (77,5%), dan > 35 tahun sebanyak 30 orang (16,5%). Persebaran IMT berat berlebih sebanyak 114 orang (62,6%) dan normal sebanyak 68 orang (37,4%). Persebaran ibu pernah abortus sebanyak 31 orang (17%) dan ibu yang tidak pernah abortus sebanyak 151 orang (83%). Persebaran ibu dengan riwayat preeklampsia sebanyak 36 orang (19,8%) sedangkan jumlah ibu tanpa riwayat preeklampsia sebanyak 146 orang (80,2%). Persebaran ibu dengan jumlah paritas < 2 sebanyak 100 orang (54,9%), ibu dengan jumlah paritas 2-3 sebanyak 69 orang (37,9%), ibu dengan jumlah paritas > 3 sebanyak 13 orang (7,1%) . Jumlah ibu dengan anemia sebanyak 96 orang (52,7%) sedangkan jumlah ibu tanpa anemia sebanyak 86 orang (47,3%). Dan terakhir jumlah ibu dengan leukositosis sebanyak 88 orang (48,4%) sedangkan jumlah ibu tanpa leukositosis sebanyak 94 orang (51,6%).

2. Jumlah ibu hamil dengan preeklampsia di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2021 dalam penelitian ini sebanyak 91 orang.
3. Jumlah ibu hamil dengan diabetes mellitus di RSKD Ibu Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2021 dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.
4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara diabetes mellitus terhadap kejadian preeklampsia sehingga diabetes mellitus bukan merupakan faktor risiko dari kejadian preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya mengambil data dari rekam medik dan sebisa mungkin mengambil secara primer melalui kuesioner atau wawancara langsung, diharapkan juga dapat meneliti variabel lainnya lebih banyak dan lebih dalam lagi agar dapat memperoleh ruang lingkup studi yang lebih luas mengenai faktor-faktor risiko lainnya yang berpeluang mempengaruhi kejadian preeklampsia sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi kesehatan sebagai langkah untuk menurunkan kejadian preeklampsia, .
2. Bagi petugas kesehatan diharapkan untuk dapat memberikan edukasi secara rutin terutama kepada ibu dan meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya kehamilan yang berisiko untuk mencegah risiko kejadian preeklampsia

3. Bagi masyarakat khususnya ibu hamil diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor kejadian preeklampsia sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amit Sapra, P. B. (2020). Diabetes Mellitus. *Ferri's Clinical Advisor 2020*, 512(58), 432–441. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-67254-2.00255-2>
- Angelina, M., Surya, I. G. P., & Agung Suwardewa, T. G. (2019). High sensitivity C-Reactive Protein dan leukosit serum yang tinggi merupakan faktor risiko terjadinya preeklampsia. *Medicina*, 50(1), 123–128. <https://doi.org/10.15562/medicina.v50i1.201>
- Arwan, B., & Sriyanti, R. (2020). Relationship between Gravida Status, Age, BMI (Body Mass Index) and Preeclampsia. *Andalas Obstetrics and Gynecology Journal*, 4(1), 25127. <http://jurnalobgin.fk.unand.ac.id/index.php/JOE>
- Banday, M. Z., Sameer, A. S., & Nissar, S. (2020). Pathophysiology of diabetes: An overview. *Avicenna Journal of Medicine*, 10(04), 174–188. https://doi.org/10.4103/ajm.ajm_53_20
- Brosens, I., Benagiano, G., & Brosens, J. J. (2015). *The potential perinatal origin of placental disorders in the young primigravida*. *May*, 580–585.
- Committee, J. N. (2003). *Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure*.
- Dewie, A., Pont, A. V., & Purwanti, A. (2020). Hubungan Umur Kehamilan Dan Obesitas Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklampsia Di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Baru Kota Luwuk. *10*, 21–27.
- Diabetes, C. (2020). Good to Know: Diabetes Symptoms and Tests. *Clinical Diabetes*, 38(1), 108–108. <https://doi.org/10.2337/cd20-pe01>
- Dyah Purnamasari. (2014). Diagnosis dan Klasifikasi Diabetes Melitus Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi VI. In *Interna Publishing*.
- English, F. A., Kenny, L. C., & Mccarthy, F. P. (2015). *Risk factors and effective management of preeclampsia*. 7–12.
- Erin M. Cleary, MD, Stephen F. Thung, MD, MSCI, and Elizabeth O. Buschur, MD, F. (2021). Gestational diabetes. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 51(2), 135–136. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2005.12.001>
- Fasrah, D., & Kemal, T. A. (2021). Hubungan Riwayat Hipertensi Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Preeklampsia Di Rumah Sakit Ibu Dan Anak (RSIA) Banda Aceh. In *Jurnal Sains Riset* (Vol. 11, Issue 2, pp. 412–416).
- Fox, R., Kitt, J., Leeson, P., Aye, C. Y. L., & Lewandowski, A. J. (2019). Preeclampsia: Risk factors, diagnosis, management, and the cardiovascular impact on the offspring. *Journal of Clinical Medicine*, 8(10), 1–28.

- <https://doi.org/10.3390/jcm8101625>
- Galaviz-Hernandez, C., Sosa-Macias, M., Teran, E., Garcia-Ortiz, J. E., & Lazalde-Ramos, B. P. (2019). Paternal determinants in preeclampsia. *Frontiers in Physiology*, *10*(JAN), 1–7. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01870>
- Ganot, S., Iswari, W. A., Pardede, T. U., Darus, F., Puspitasari, B., Santana, S., Abidin, F., & Endjun, J. J. (2017). Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia Berat Tidak Tergantung Proteinuria. *Cdk-255*, *44*(8), 576–579. http://www.kalbemed.com/Portals/6/23_255Praktis-Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia Berat Tidak Tergantung Proteinuria.pdf
- Getu, A. A., Fikadu, G. A., Yenesew, M. A., & Getie, S. A. (2019). Does anemia risk for pre-eclampsia? A multi-center, Case control study in Amhara region, Ethiopia. *Research Square*. <https://doi.org/10.21203/rs.2.14936/v1>
- International Diabetes Federation. (2021). *No IDF Diabetes Atlas*.
- Johanes C. Mose, U. S. (2018). Obstetri Patologi. In *EGC* (p. 94).
- Jung, E., Romero, R., Yeo, L., & Gomez-lopez, N. (2022). The etiology of preeclampsia, Expert Review. *The American Journal of Obstetrics & Gynecology*, *226*(2), S844–S866. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2021.11.1356>
- Karrar, S. A., & Hong, P. L. (2022). *Preeclampsia*. 4–7.
- Kattah, A. (2020). Preeclampsia and Kidney Disease: Deciphering Cause and Effect. *Current Hypertension Reports*, *22*(11). <https://doi.org/10.1007/s11906-020-01099-1>
- Kemkes RI. (2021). *Profil Kesehatan Indo-nesia*.
- Khairani. (2019). Hari Diabetes Sedunia Tahun 2018. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 1–8.
- Khalil, G. (2017). Preeclampsia: Pathophysiology and the Maternal-Fetal Risk. *Journal of Hypertension and Management*, *3*(1), 1–5. <https://doi.org/10.23937/2474-3690/1510024>
- Langi, Y. A. (2021). *Pedoman Diagnosis dan Penatalaksanaan Hiperglikemia dalam Kehamilan 2021*.
- Leveno, K. J. (2009). *Williams Manual of Obstetrics ed 21*.
- Li, S., Ph, D., Gupte, A. A., & Ph, D. (2017). *The Role of Estrogen in Cardiac Metabolism and Diastolic Function. 1*, 4–8.
- Lumbanraja, S. N. (2017). Kegawatdaruratan Obstetri. In *USU Press*. <http://usupress.usu.ac.id>
- Mabel Yau, M. (2021). Etiology and pathogenesis of diabetes mellitus. *Kazan Medical Journal*, *62*(4), 60–63. <https://doi.org/10.17816/kazmj86918>
- Mahdy., B. S. Q. R. H. (2022). Gestational diabetes. *Journal of Midwifery & Women's Health*, *51*(2), 135–136. <https://doi.org/10.1016/j.jmwh.2005.12.001>
- Mohamedain, A., Rayis, D. A., Alhabardi, N., & Adam, I. (2022). Association between previous spontaneous abortion and preeclampsia: a case – control study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1–5. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05053-8>
- Mohamud, hafsa mohamed, & Surury, I. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Tingkatan Preeklampsia Pada Ibu Hamil di RSUD Koja Jakarta Utara.

- MOTORIK Journal Kesehatan*, 1, 35–44.
- Nanda, A. W., & Semarawisma, A. (2021). Association between anemia and preeclampsia: a case control study in Gorontalo region, Indonesia. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20215031>
- POGI. (2016). *PNPK Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia*. 1–48.
- Pouwer, F., & Speight, J. (2019). Diabetes mellitus, type 2. *Cambridge Handbook of Psychology, Health and Medicine: Third Edition*, 481–482. <https://doi.org/10.1016/b978-3-437-42502-8.00154-6>
- Primadata, A. P. et. all. (2022). *Kesetaraan Gender , Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Knowledge Sector Initiative.
- Rana, S., Lemoine, E., Granger, J., & Karumanchi, S. A. (2019). Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. *Circulation Research*, 124(7), 1094–1112. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276>
- Safitri, N. P. D., & Siahaan, S. C. P. T. (2022). Hubungan Diabetes Mellitus Gestasional dengan Preeklampsia dan Luaran Neonatal di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. *NJM*, 8(1).
- Setyorini, D., Santoso, B., & Martini, S. (2017). *Risk Factors of Preeclampsia and Eclampsia in Surabaya*. 2(7), 63–66.
- Shihab, M. Q. (2006). Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14).
- Skills, C., & Teaching, P. (2022). *Gestational Diabetes Mellitus and Preeclampsia : Correlation and Influencing Factors*. 831297(June 2021), 1–32.
- Skyler, J. S., Bakris, G. L., Bonifacio, E., Darsow, T., Eckel, R. H., Groop, L., Groop, P. H., Handelsman, Y., Insel, R. A., Mathieu, C., McElvaine, A. T., Palmer, J. P., Pugliese, A., Schatz, D. A., Sosenko, J. M., Wilding, J. P. H., & Ratner, R. E. (2017). Differentiation of diabetes by pathophysiology, natural history, and prognosis. *Diabetes*, 66(2), 241–255. <https://doi.org/10.2337/db16-0806>
- Soelistijo, S. A. (2020). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2015. (2015). PB PERKENI. In *PB PERKENI*. www.ginasthma.org.
- Tanoey, J., & Becher, H. (2021). Diabetes prevalence and risk factors of early-onset adult diabetes: results from the Indonesian family life survey. *Global Health Action*, 14(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/16549716.2021.2001144>
- Tarigan, renny adelia, & Yulia, R. (2019). *Parity Relationship With The Occurrence Of Preeclampsia in Pregnant Women*. *Journal of Health*, 8(2), 105 (3).pdf.
- Wei, B. J., Chen, Y. J., Yu, L., & Wu, B. (2013). Periodontal Disease and Risk of Preeclampsia: A Meta-Analysis of Observational Studies. *PLoS ONE*, 8(8), 1–10. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070901>
- Weissgerber, T. L., & Mudd, L. M. (2015). Preeclampsia and Diabetes. *Current Diabetes Reports*, 15(3), 1–17. <https://doi.org/10.1007/s11892-015-0579-4>
- WHO, UNICEF, U. and the W. B. (2019). *Maternal mortality 19. September*, 1–5. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- WHO. (2021). New global targets to prevent maternal deaths. *WHO*, 1.

<https://www.who.int/news/item/05-10-2021-new-global-targets-to-prevent-maternal-deaths>

World Health Organization. (2022). *Gestational diabetes is hyperglycaemia with blood glucose values above normal but below those. September, 1–5.*

Yahya, M., & Syaraf, B. I. N. (2007). *Hadits Arba'in Nawawiyah.*

Yushida, Y., & Zahara, E. (2020). The risk factors toward preeclampsia events of pregnant women in meureubo and johan pahlawan community health center west aceh. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 8(E), 670–673. <https://doi.org/10.3889/OAMJMS.2020.5531>

Zhang, H., Ni, J., Yu, C., Wu, Y., Li, J., Liu, J., Tu, J., Ning, X., He, Q., & Wang, J. (2019). Sex-based differences in diabetes prevalence and risk factors: A population-based cross-sectional study among low-income adults in China. *Frontiers in Endocrinology*, 10(SEP), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00658>

Lampiran 1: Hasil SPSS

Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Usia	Based on Mean	6.878	1	180	.009
	Based on Median	6.905	1	180	.009
	Based on Median and with adjusted df	6.905	1	177.343	.009
	Based on trimmed mean	7.112	1	180	.008
IMT	Based on Mean	7.763	1	180	.006
	Based on Median	6.962	1	180	.009
	Based on Median and with adjusted df	6.962	1	171.182	.009
	Based on trimmed mean	7.889	1	180	.006
Paritas	Based on Mean	10.690	1	180	.001
	Based on Median	6.210	1	180	.014
	Based on Median and with adjusted df	6.210	1	155.360	.014
	Based on trimmed mean	8.692	1	180	.004
DM	Based on Mean	.000	1	180	1.000
	Based on Median	.000	1	180	1.000
	Based on Median and with adjusted df	.000	1	180.000	1.000
	Based on trimmed mean	.000	1	180	1.000
Abortus	Based on Mean	.154	1	180	.695
	Based on Median	.038	1	180	.845
	Based on Median and with adjusted df	.038	1	179.882	.845
	Based on trimmed mean	.154	1	180	.695
Riwayat Preeklamsia	Based on Mean	798.151	1	180	.000
	Based on Median	50.751	1	180	.000

	Based on Median and with adjusted df	50.751	1	98.248	.000
	Based on trimmed mean	718.759	1	180	.000
HB	Based on Mean	1.389	1	180	.240
	Based on Median	1.135	1	180	.288
	Based on Median and with adjusted df	1.135	1	179.986	.288
	Based on trimmed mean	1.448	1	180	.230
Hipertensi	Based on Mean	115.054	1	180	.000
	Based on Median	18.526	1	180	.000
	Based on Median and with adjusted df	18.526	1	102.271	.000
	Based on trimmed mean	89.353	1	180	.000
Protein Urine	Based on Mean	208.004	1	180	.000
	Based on Median	164.172	1	180	.000
	Based on Median and with adjusted df	164.172	1	90.000	.000
	Based on trimmed mean	213.591	1	180	.000

ANOVA

Leukosit

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Si g.
Between Groups	113683.0098.659	1	113683.0098.659	5.2.205	.000
Within Groups	391973.8822.857	180	217763.26.794		
Total	505656.8921.516	181			

MAKASSAR

Uji Normalitas

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Usia	.126	182	.000	.959	182	.000
Paritas	.198	182	.000	.843	182	.000
DM	.531	182	.000	.340	182	.000
Abortus	.504	182	.000	.454	182	.000
Riwayat Preeklamsia	.492	182	.000	.487	182	.000
Hipertensi	.389	182	.000	.624	182	.000
Protein Urine	.296	182	.000	.779	182	.000
IMT	.406	182	.000	.613	182	.000
HB	.341	182	.000	.636	182	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	L	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
eukosit	L	.1	8	.0	.8	8	.0
	Evated	.46	8	.00	.84	8	.00
	Normal	.0	9	.2	.9	9	.0
		.60	4	.00*	.75	4	.66

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

ALAUDDIN
MAKASSAR

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Usia	Mean	28.49	.532	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	27.45	
		Upper Bound	29.54	
	5% Trimmed Mean	28.24		
	Median	27.00		
	Variance	51.489		
	Std. Deviation	7.176		
	Minimum	15		
	Maximum	48		
	Range	33		
	Interquartile Range	11		
	Skewness	.495	.180	
	Kurtosis	-.563	.358	
	Usia	Mean	2.1044	.03442
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	2.0365	
		Upper Bound	2.1723	
5% Trimmed Mean		2.1160		
Median		2.0000		
Variance		.216		
Std. Deviation		.46429		
Minimum		1.00		
Maximum		3.00		
Range		2.00		
Interquartile Range		.00		
Skewness		.367	.180	
Kurtosis		1.335	.358	
IMT		Mean	25.6093	.22640

	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	25.1626		
		Upper Bound	26.0560		
	5% Trimmed Mean		25.6137		
	Median		25.9000		
	Variance		9.329		
	Std. Deviation		3.05427		
	Minimum		19.00		
	Maximum		36.00		
	Range		17.00		
	Interquartile Range		4.80		
	Skewness		-.041	.180	
	Kurtosis		-.152	.358	
	IMT	Mean		1.37	.036
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.30	
Upper Bound			1.44		
5% Trimmed Mean		1.36			
Median		1.00			
Variance		.235			
Std. Deviation		.485			
Minimum		1			
Maximum		2			
Range		1			
Interquartile Range		1			
Skewness		.527	.180		
Kurtosis		-1.742	.358		
Paritas		Mean		1.49	.113
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.27		
		Upper Bound	1.71		
	5% Trimmed Mean		1.35		

	Median		1.00	
	Variance		2.307	
	Std. Deviation		1.519	
	Minimum		0	
	Maximum		9	
	Range		9	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		1.399	.180
	Kurtosis		3.257	.358
Jumlah Paritas	Mean		1.51	.048
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.42	
		Upper Bound	1.61	
	5% Trimmed Mean		1.46	
	Median		1.00	
	Variance		.417	
	Std. Deviation		.646	
	Minimum		1	
	Maximum		3	
	Range		2	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		.892	.180
	Kurtosis		-.278	.358
	DM	Mean		1.90
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	1.86	
		Upper Bound	1.94	
5% Trimmed Mean			1.95	
Median			2.00	
Variance			.090	
Std. Deviation			.299	

	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-2.710	.180
	Kurtosis		5.401	.358
Abortus	Mean		1.83	.028
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.77	
		Upper Bound	1.88	
	5% Trimmed Mean		1.87	
	Median		2.00	
	Variance		.142	
	Std. Deviation		.377	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-1.769	.180
	Kurtosis		1.140	.358
	HB	Mean		10.8621
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	10.6310	
		Upper Bound	11.0932	
5% Trimmed Mean			10.8726	
Median			10.9000	
Variance			2.497	
Std. Deviation			1.58024	
Minimum			6.40	
Maximum			14.50	
Range			8.10	

	Interquartile Range		2.03	
	Skewness		-.017	.180
	Kurtosis		-.136	.358
Anemia	Mean		1.50	.037
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.43	
		Upper Bound	1.57	
	5% Trimmed Mean		1.50	
	Median		1.50	
	Variance		.251	
	Std. Deviation		.501	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		1	
	Skewness		.000	.180
	Kurtosis		-2.022	.358
	Riwayat Preeklamsia	Mean		1.80
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	1.74	
		Upper Bound	1.86	
5% Trimmed Mean			1.84	
Median			2.00	
Variance			.160	
Std. Deviation			.399	
Minimum			1	
Maximum			2	
Range			1	
Interquartile Range			0	
Skewness			-1.530	.180
Kurtosis			.344	.358

Tekanan Darah	Mean		2.23	.084	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	2.06		
		Upper Bound	2.39		
	5% Trimmed Mean		2.19		
	Median		2.00		
	Variance		1.280		
	Std. Deviation		1.132		
	Minimum		1		
	Maximum		4		
	Range		3		
	Interquartile Range		2		
	Skewness		.379	.180	
	Kurtosis		-1.262	.358	
	Protein Urine	Mean		.91	.083
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.74	
Upper Bound			1.07		
5% Trimmed Mean			.81		
Median			.00		
Variance			1.256		
Std. Deviation			1.121		
Minimum			0		
Maximum			4		
Range			4		
Interquartile Range			2		
Skewness			1.043	.180	
Kurtosis			.087	.358	
Protein Urine		Mean		1.91	.083
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.74	
	Upper Bound		2.07		

	5% Trimmed Mean		1.81	
	Median		1.00	
	Variance		1.256	
	Std. Deviation		1.121	
	Minimum		1	
	Maximum		5	
	Range		4	
	Interquartile Range		2	
	Skewness		1.043	.180
	Kurtosis		.087	.358
GDS	Mean		1.89	.023
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.84	
		Upper Bound	1.94	
	5% Trimmed Mean		1.93	
	Median		2.00	
	Variance		.098	
	Std. Deviation		.314	
	Minimum		1	
	Maximum		2	
	Range		1	
	Interquartile Range		0	
	Skewness		-2.515	.180
	Kurtosis		4.376	.358

Descriptives

		Leukosit	Statistic	Std. Error
Leukosit	Elevated	Mean	19477.57	396.951
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	18688.58
			Upper Bound	20266.55
		5% Trimmed Mean	19180.40	

	Median		18350.00	
	Variance		13866184.317	
	Std. Deviation		3723.733	
	Minimum		15070	
	Maximum		32590	
	Range		17520	
	Interquartile Range		4624	
	Skewness		1.216	.257
	Kurtosis		1.097	.508
Normal	Mean		10954.77	250.547
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	10457.23	
		Upper Bound	11452.30	
	5% Trimmed Mean		11009.89	
	Median		10925.00	
	Variance		5900717.256	
	Std. Deviation		2429.139	
	Minimum		5050	
	Maximum		14920	
	Range		9870	
	Interquartile Range		3612	
	Skewness		-.220	.249
	Kurtosis		-.710	.493

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAUDDIN
M A K A S S A R

Persentil
Percentiles

		Preeklamsia	Percentiles						
			5	10	25	50	75	90	95
Weighted Average(Definitio n 1)	Usia	Kasus	17.60	19.00	22.00	28.00	35.00	40.00	41.00
		Kontrol	20.00	21.00	23.00	27.00	33.00	38.60	42.40
	Usia	Kasus	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
		Kontrol	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000
	IMT	Kasus	21.540 0	22.300 0	24.300 0	26.000 0	27.900 0	29.400 0	30.400 0
		Kontrol	19.500 0	20.340 0	22.200 0	25.700 0	27.800 0	29.560 0	30.240 0
	IMT	Kasus	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
		Kontrol	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	Paritas	Kasus	.00	.00	.00	1.00	2.00	4.00	5.00
		Kontrol	.00	.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.40
Jumlah Paritas	Kasus	Kasus	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00
		Kontrol	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.40
DM	Kasus	Kasus	1.00	1.20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		Kontrol	1.00	1.20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Abortus	Kasus	Kasus	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		Kontrol	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
HB	Kasus	Kasus	8.1000	8.9000	9.6000	10.500 0	12.000 0	13.400 0	13.800 0
		Kontrol	7.5400	9.0400	10.100 0	11.000 0	11.800 0	12.880 0	13.300 0
Anemia	Kasus	Kasus	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
		Kontrol	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Riwayat Preeklamsia	Kasus	Kasus	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		Kontrol	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Tekanan Darah	Kasus	Kasus	2.00	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00
		Kontrol	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Protein Urine	Kasus	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	4.00	

	Kontrol	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Protein Urine	Kasus	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	5.00
	Kontrol	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
GDS	Kasus	1.00	1.20	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	Kontrol	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Tukey's Hinges	Usia	Kasus			22.00	28.00	35.00	
		Kontrol			23.00	27.00	33.00	
	Usia	Kasus			2.0000	2.0000	2.0000	
		Kontrol			2.0000	2.0000	2.0000	
	IMT	Kasus			24.350 0	26.000 0	27.900 0	
		Kontrol			22.250 0	25.700 0	27.800 0	
	IMT	Kasus			1.00	1.00	2.00	
		Kontrol			1.00	1.00	2.00	
	Paritas	Kasus			.00	1.00	2.00	
		Kontrol			1.00	1.00	2.00	
Jumlah Paritas	Kasus				1.00	1.00	2.00	
		Kontrol			1.00	1.00	2.00	
DM	Kasus				2.00	2.00	2.00	
		Kontrol			2.00	2.00	2.00	
Abortus	Kasus				2.00	2.00	2.00	
		Kontrol			2.00	2.00	2.00	
HB	Kasus				9.6000	10.500 0	11.900 0	
		Kontrol			10.100 0	11.000 0	11.800 0	
Anemia	Kasus				1.00	1.00	2.00	
		Kontrol			1.00	2.00	2.00	
Riwayat Preeklamsia	Kasus				1.00	2.00	2.00	
		Kontrol			2.00	2.00	2.00	

Tekanan Darah	Kasus		2.50	3.00	4.00		
	Kontrol		1.00	1.00	2.00		
Protein Urine	Kasus		1.00	2.00	2.00		
	Kontrol		.00	.00	.00		
Protein Urine	Kasus		2.00	3.00	3.00		
	Kontrol		1.00	1.00	1.00		
GDS	Kasus		2.00	2.00	2.00		
	Kontrol		2.00	2.00	2.00		

Percentiles

			Percentiles						
			5	10	25	50	75	90	95
Weighted Average(Definition 1)	eukosit	levated	5327.00	5659.00	6662.50	8350.00	1286.50	4953.00	7609.50
	eukosit	ormal	970.00	465.00	228.00	0925.00	2840.00	4300.00	4750.00
	eukosit	levated			6675.00	8350.00	1173.00		
Tukey's Hinges	eukosit	ormal			230.00	0925.00	2820.00		

		Usia	Usia	IMT	IMT	Paritas	Jumlah Paritas
N	Valid	182	182	182	182	182	182
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		28.49	2.1044	25.6093	1.37	1.49	1.51
Std. Error of Mean		.532	.03442	.22640	.036	.113	.048
Median		27.00	2.0000	25.9000	1.00	1.00	1.00
Std. Deviation		7.176	.46429	3.05427	.485	1.519	.646
Variance		51.489	.216	9.329	.235	2.307	.417
Range		33	2.00	17.00	1	9	2
Minimum		15	1.00	19.00	1	0	1
Maximum		48	3.00	36.00	2	9	3
Percentiles	25	23.00	2.0000	23.1000	1.00	.00	1.00
	50	27.00	2.0000	25.9000	1.00	1.00	1.00
	75	34.00	2.0000	27.9000	2.00	2.00	2.00



Statistics

		Leukosit	Leukosit
N	Valid	182	182
	Missing	0	0
Mean		15075.68	1.52
Median		14900.00	2.00
Std. Deviation		5285.532	.501
Minimum		5050	1
Maximum		32590	2
Percentiles	25	10842.50	1.00
	50	14900.00	2.00
	75	18262.50	2.00

Univariat**Preeklamsia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kasus	91	50.0	50.0	50.0
	Kontrol	91	50.0	50.0	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Riwayat Preeklamsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	36	19.8	19.8	19.8
	Tidak	146	80.2	80.2	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	--	-----------	---------	---------------	--------------------

Valid	<20 atau >35 Tahun	41	22.5	22.5	22.5
	20-35 Tahun	141	77.5	77.5	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

IMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Normal	114	62.6	62.6	62.6
	Normal	68	37.4	37.4	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

DM

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	18	9.9	9.9	9.9
	Tidak	164	90.1	90.1	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Abortus

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	31	17.0	17.0	17.0
	Tidak	151	83.0	83.0	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Jumlah Paritas Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko (<2 atau >3)	113	62.1	62.1	62.1
	Tidak Berisiko (2-3)	69	37.9	37.9	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Anemia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	96	52.7	52.7	52.7
	Tidak	86	47.3	47.3	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Hipertensi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	74	40.7	40.7	40.7
	Tidak	108	59.3	59.3	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Tekanan Darah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Normal	64	35.2	35.2	35.2
	Prehipertensi	49	26.9	26.9	62.1
	Stage 1	33	18.1	18.1	80.2
	Stage 2	36	19.8	19.8	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Protein Urine

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Positif	91	50.0	50.0	50.0
	Negatif	91	50.0	50.0	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Protein Urine

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	91	50.0	50.0	50.0
	1	42	23.1	23.1	73.1

2	28	15.4	15.4	88.5
3	16	8.8	8.8	97.3
4	5	2.7	2.7	100.0
Total	182	100.0	100.0	

GDS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Normal	20	11.0	11.0	11.0
	Normal	162	89.0	89.0	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Leukosit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Elevated	88	48.4	48.4	48.4
	Normal	94	51.6	51.6	100.0
	Total	182	100.0	100.0	

Bivariat

Hubungan Usia Ibu terhadap Preeklamsia

Crosstab

		Preeklamsia			
		Kasus	Kontrol	Total	
Usia	<20 atau >35 Tahun	Count	31	10	41
		Expected Count	20.5	20.5	41.0
		% within Usia	75.6%	24.4%	100.0%
		% within Preeklamsia	34.1%	11.0%	22.5%
		% of Total	17.0%	5.5%	22.5%
20-35 Tahun	Count	60	81	141	
	Expected Count	70.5	70.5	141.0	
	% within Usia	42.6%	57.4%	100.0%	

	% within Preeklamsia	65.9%	89.0%	77.5%
	% of Total	33.0%	44.5%	77.5%
Total	Count	91	91	182
	Expected Count	91.0	91.0	182.0
	% within Usia	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	13.884 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	12.593	1	.000		
Likelihood Ratio	14.423	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	13.807	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (<20 atau >35 Tahun / 20-35 Tahun)	4.185	1.905	9.194
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.777	1.372	2.302
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.425	.243	.741
N of Valid Cases	182		

Hubungan IMT terhadap Preeklamsia

Crosstab

		Preeklamsia		Total	
		Kasus	Kontrol		
IMT	Tidak Normal	Count	62	52	114
		Expected Count	57.0	57.0	114.0
		% within IMT	54.4%	45.6%	100.0%
		% within Preeklamsia	68.1%	57.1%	62.6%
		% of Total	34.1%	28.6%	62.6%
	Normal	Count	29	39	68
		Expected Count	34.0	34.0	68.0
		% within IMT	42.6%	57.4%	100.0%
		% within Preeklamsia	31.9%	42.9%	37.4%
		% of Total	15.9%	21.4%	37.4%
Total	Count	91	91	182	
	Expected Count	91.0	91.0	182.0	
	% within IMT	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	2.348 ^a	1	.125		
Continuity Correction ^b	1.902	1	.168		
Likelihood Ratio	2.354	1	.125		
Fisher's Exact Test				.168	.084
Linear-by-Linear Association	2.335	1	.127		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for IMT (Tidak Normal / Normal)	1.603	.875	2.938
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.275	.923	1.761
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.795	.597	1.059
N of Valid Cases	182		

Hubungan DM terhadap Preeklamsia

Crosstab

DM	Ya	Count	Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
	Ya	Count	9	9	18
	Ya	Expected Count	9.0	9.0	18.0
	Ya	% within DM	50.0%	50.0%	100.0%
	Ya	% within Preeklamsia	9.9%	9.9%	9.9%
	Ya	% of Total	4.9%	4.9%	9.9%
Tidak	Tidak	Count	82	82	164
	Tidak	Expected Count	82.0	82.0	164.0
	Tidak	% within DM	50.0%	50.0%	100.0%
	Tidak	% within Preeklamsia	90.1%	90.1%	90.1%
	Tidak	% of Total	45.1%	45.1%	90.1%
Total	Total	Count	91	91	182
	Total	Expected Count	91.0	91.0	182.0
	Total	% within DM	50.0%	50.0%	100.0%
	Total	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
	Total	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	.000 ^a	1	1.000		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.000	1	1.000		
Fisher's Exact Test				1.000	.598
Linear-by-Linear Association	.000	1	1.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for DM (Ya / Tidak)	1.000	.378	2.647
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.000	.615	1.627
For cohort Preeklamsia = Kontrol	1.000	.615	1.627
N of Valid Cases	182		

Hubungan Abortus terhadap Preeklamsia

Crosstab

		Preeklamsia		Total	
		Kasus	Kontrol		
Abortus	Ya	Count	16	15	31
	Expected Count	15.5	15.5	31.0	
	% within Abortus	51.6%	48.4%	100.0%	
	% within Preeklamsia	17.6%	16.5%	17.0%	

	% of Total	8.8%	8.2%	17.0%
Tidak	Count	75	76	151
	Expected Count	75.5	75.5	151.0
	% within Abortus	49.7%	50.3%	100.0%
	% within Preeklamsia	82.4%	83.5%	83.0%
	% of Total	41.2%	41.8%	83.0%
Total	Count	91	91	182
	Expected Count	91.0	91.0	182.0
	% within Abortus	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	.039 ^a	1	.844		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.039	1	.844		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.039	1	.844		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Abortus (Ya / Tidak)	1.081	.499	2.342
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.039	.713	1.515

For cohort Preeklamsia = Kontrol	.961	.647	1.429
N of Valid Cases	182		

Hubungan Riwayat Preeklamsia terhadap Preeklamsia

Crosstab

			Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
Riwayat Preeklamsia	Ya	Count	35	1	36
		Expected Count	18.0	18.0	36.0
		% within Riwayat Preeklamsia	97.2%	2.8%	100.0%
		% within Preeklamsia	38.5%	1.1%	19.8%
		% of Total	19.2%	0.5%	19.8%
	Tidak	Count	56	90	146
		Expected Count	73.0	73.0	146.0
		% within Riwayat Preeklamsia	38.4%	61.6%	100.0%
		% within Preeklamsia	61.5%	98.9%	80.2%
		% of Total	30.8%	49.5%	80.2%
Total	Count	91	91	182	
	Expected Count	91.0	91.0	182.0	
	% within Riwayat Preeklamsia	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	40.029 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	37.709	1	.000		
Likelihood Ratio	48.759	1	.000		

Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	39.809	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.00.

b. Computed only for a 2x2 table

	Risk Estimate		
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Preeklamsia (Ya / Tidak)	56.250	7.495	422.154
For cohort Preeklamsia = Kasus	2.535	2.049	3.136
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.045	.006	.313
N of Valid Cases	182		

Hubungan Jumlah Paritas Ibu terhadap Preeklamsia

Crosstab

			Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
Jumlah Paritas Ibu	Berisiko (<2 atau >3)	Count	64	49	113
		Expected Count	56.5	56.5	113.0
		% within Jumlah Paritas Ibu	56.6%	43.4%	100.0%
		% within Preeklamsia	70.3%	53.8%	62.1%
		% of Total	35.2%	26.9%	62.1%
	Tidak Berisiko (2-3)	Count	27	42	69
		Expected Count	34.5	34.5	69.0
		% within Jumlah Paritas Ibu	39.1%	60.9%	100.0%
		% within Preeklamsia	29.7%	46.2%	37.9%
		% of Total	14.8%	23.1%	37.9%
Total		Count	91	91	182

	Expected Count	91.0	91.0	182.0
	% within Jumlah Paritas Ibu	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	5.252 ^a	1	.022		
Continuity Correction ^b	4.575	1	.032		
Likelihood Ratio	5.284	1	.022		
Fisher's Exact Test				.032	.016
Linear-by-Linear Association	5.223	1	.022		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jumlah Paritas Ibu (Berisiko (<2 atau >3) / Tidak Berisiko (2-3))	2.032	1.104	3.739
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.447	1.035	2.025
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.712	.537	.946
N of Valid Cases	182		

Hubungan Anemia terhadap Preeklamsia

Crosstab

Preeklamsia	Total
-------------	-------

			Kasus	Kontrol	
Anemia	Ya	Count	56	40	96
		Expected Count	48.0	48.0	96.0
		% within Anemia	58.3%	41.7%	100.0%
		% within Preeklamsia	61.5%	44.0%	52.7%
		% of Total	30.8%	22.0%	52.7%
Tidak		Count	35	51	86
		Expected Count	43.0	43.0	86.0
		% within Anemia	40.7%	59.3%	100.0%
		% within Preeklamsia	38.5%	56.0%	47.3%
		% of Total	19.2%	28.0%	47.3%
Total		Count	91	91	182
		Expected Count	91.0	91.0	182.0
		% within Anemia	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	5.643 ^a	1	.018		
Continuity Correction ^b	4.960	1	.026		
Likelihood Ratio	5.673	1	.017		
Fisher's Exact Test				.026	.013
Linear-by-Linear Association	5.612	1	.018		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 43.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Anemia (Ya / Tidak)	2.040	1.129	3.685
For cohort Preeklamsia = Kasus	1.433	1.055	1.947
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.703	.523	.943
N of Valid Cases	182		

Hubungan Hipertensi terhadap Preeklamsia**Crosstab**

			Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
Hipertensi	Ya	Count	73	1	74
		Expected Count	37.0	37.0	74.0
		% within Hipertensi	98.6%	1.4%	100.0%
		% within Preeklamsia	80.2%	1.1%	40.7%
		% of Total	40.1%	0.5%	40.7%
	Tidak	Count	18	90	108
		Expected Count	54.0	54.0	108.0
		% within Hipertensi	16.7%	83.3%	100.0%
		% within Preeklamsia	19.8%	98.9%	59.3%
		% of Total	9.9%	49.5%	59.3%
Total	Count	91	91	182	
	Expected Count	91.0	91.0	182.0	
	% within Hipertensi	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	118.054 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	114.798	1	.000		
Likelihood Ratio	144.390	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	117.405	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Hipertensi (Ya / Tidak)	365.000	47.594	2799.220
For cohort Preeklamsia = Kasus	5.919	3.879	9.031
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.016	.002	.114
N of Valid Cases	182		

Hubungan Protein Urine terhadap Preeklamsia

Crosstab

Protein Urine	Positif	Count	Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
		91	0	91	
		Expected Count	45.5	45.5	91.0
		% within Protein Urine	100.0%	0.0%	100.0%
		% within Preeklamsia	100.0%	0.0%	50.0%
		% of Total	50.0%	0.0%	50.0%

Negatif	Count	0	91	91
	Expected Count	45.5	45.5	91.0
	% within Protein Urine	0.0%	100.0%	100.0%
	% within Preeklamsia	0.0%	100.0%	50.0%
	% of Total	0.0%	50.0%	50.0%
Total	Count	91	91	182
	Expected Count	91.0	91.0	182.0
	% within Protein Urine	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	182.000 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	178.022	1	.000		
Likelihood Ratio	252.306	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	181.000	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for Protein Urine (Positif / Negatif)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.

Leukosit * Preeklamsia Crosstabulation

			Preeklamsia		Total
			Kasus	Kontrol	
Leukosit	Elevated	Count	65	23	88
		Expected Count	44.0	44.0	88.0
		% within Leukosit	73.9%	26.1%	100.0%
		% within Preeklamsia	71.4%	25.3%	48.4%
		% of Total	35.7%	12.6%	48.4%
	Normal	Count	26	68	94
		Expected Count	47.0	47.0	94.0
		% within Leukosit	27.7%	72.3%	100.0%
		% within Preeklamsia	28.6%	74.7%	51.6%
		% of Total	14.3%	37.4%	51.6%
Total	Count	91	91	182	
	Expected Count	91.0	91.0	182.0	
	% within Leukosit	50.0%	50.0%	100.0%	
	% within Preeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

Chi-square Tests


	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-square	38.811 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	36.985	1	.000		
Likelihood Ratio	40.332	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	38.598	1	.000		
N of Valid Cases	182				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 44.00.

b. Computed only for a 2x2 table

	Risk Estimate		
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Leukosit (Elevated / Normal)	7.391	3.835	14.244
For cohort Preeklamsia = Kasus	2.670	1.882	3.789
For cohort Preeklamsia = Kontrol	.361	.249	.525
N of Valid Cases	182		

Lampiran 2: Etik Penelitian


KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.347/KEPK/FKIK/XI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Moch. Afif Fachrul
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS PADA IBU HAMIL TERHADAP
 KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RSKD IBU ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR"**

*"RISK FACTORS OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANT WOMEN ON THE INCIDENCE OF
 PREECLAMPSIA IN SITI FATIMAH MOTHER AND CHILD REGIONAL SPECIAL HOSPITAL OF
 MAKASSAR"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.


Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2023.

This declaration of ethics applies during the period November 18th, 2022 until November 18th, 2023.


 November 18th, 2022
 and Chairperson,
 Sp.A., M.Kes

Lampiran 3: Izin Penelitian




PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 12956/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSKDIA Siti Fatimah
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-

Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 1191 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MOCH. AFIF FACHRUL	
Nomor Pokok	: 70600119031	
Program Studi	: Pendidikan Dokter	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PROPOSAL PENELITIAN FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS PADA IBU HAMIL TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RSKD IBU ANAK SITI FATIMAH "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

M A K A S S A R

Lampiran 4: Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
 UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
 Jl. Gunung Merapi No. 75 Telp. 3624956, 3620803 Fax. (0411) 3625784
 MAKASSAR 90112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03 / RSKDIA.SF/1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menerangkan bahwa :

Nama	: Moch.Afif Fachrul
Nomor Pokok	: 70600119031
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan	: mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl.H.M.Yasin limpo No.36 Romang polo -gowa

Benar telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tanggal 06 Desember 2023 s/d 06 Januari 2023 dengan judul "**FAKTOR RESIKO DIABETES MELLITUS PADA IBU HAMIL TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMPSIA RSKDIA SITI FATIMAH MAKASSAR** "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal 03 Januari 2023
 a.n DIREKTUR RSKDIA SITI FATIMAH

Kepala Diklat

 Michal Erawati, S.ST,SKM,M.Kes
 NIP. 19730614 199803 2 007



M A K A S S A R

