

**HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN
HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI RSIA
ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023**



Skripsi Penelitian

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUTHIATURRAHMAH SYAFIUDDIN

NIM: 70600118039

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muthiaturrahmah Syafiuddin

NIM : 70600118039

Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 28 Oktober 2000

Prodi : Pendidikan Dokter

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. BTN POLE INDAH MAS BLOK B/9

Judul : Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Hiperemesis
Gravidarum Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar
Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Agustus 2023

Penyusun,



Muthiaturrahmah Syafiuddin
70600118039

PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN

JUDUL : HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA KEDOKTERAN.

MAKASSAR, 16 AGUSTUS 2023

PEMBIMBING 1



dr. Rini Fitriani, M.Kes

PEMBIMBING 2



dr. Andi Irhamnia Sakinah, M. Biomed.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Kecemasan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2023” yang disusun oleh Muthiaturrahmah Syafiuddin NIM 70600118039 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 16 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 16 Agustus 2023
29 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	: dr. Rini Fitriani, M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Irhamnia Sakinah, M.Biomed.	(.....)
Penguji I	: dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Penguji II	: Dr. Azizul Hakim, M.Pd.I.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP: 19800701 200604 2

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan limpahan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga skripsi penelitian dengan judul, “Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023” dapat terselesaikan. Salam serta shalawat tiada henti dicurahkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Skripsi penelitian ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Allah Swt. yang dengan izin-Nya lah skripsi penelitian ini bisa terselesaikan.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Muhammad Syafiuddin dan ibu Safrina, kakak dan adik, serta keluarga yang selama ini telah memberikan dukungan tak terhingga kepada peneliti dalam menjalankan kehidupan dan menyelesaikan studi.
3. Kepada dr. Rini Fitriani, M. Kes. selaku pembimbing I dan dr. Andi Irhamnia Sakinah, M. Biomed selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan jajarannya, dr. Rini Fitriani, M. Kes selaku ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan segenap dosen yang telah bersedia membagikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi.

5. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman S.ked, lambeturah, dan F18RON3KTIN yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini kelak bisa bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi kita semua.

Makassar, 20 Mei 2023

Muthiaturrehman Syafiuddin

70600118039


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

MAKASSAR

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Kecemasan	8
B. Kecemasan pada Ibu Hamil.....	21
C. Hiperemesis Gravidarum.....	31
D. Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum.....	37
E. Kerangka Teori.....	39
F. Kerangka Konsep	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Desain Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
C. Variabel Penelitian	41
D. Populasi dan Sampel.....	41

E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrumen Penelitian	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	44
H. Alur Penelitian.....	46
I. Penyajian Data.....	47
J. Etika Penelitian	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil.....	48
B. Pembahasan	50
C. Keterbatasan Penelitian	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	4
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	5
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar	48
Tabel 4.2 Hubungan Kecemasan dan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Patofisiologi Kecemasan	11
Gambar 2.2 Patofisiologi Kecemasan pada Ibu Hamil.....	23



**HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPEREMESIS
GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR
TAHUN 2023**

*Muthiaturrahmah Syafiuddin(1), Rini Fitriani(2), Andi Irhamnia Sakinah(3),
Azizah Nurdin(4), Azizul Hakim(5)*

*Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar*

Email : muthia.syaf28@gmail.com

ABSTRAK

Hiperemesis gravidarum merupakan kondisi ketidakseimbangan psikologis pada ibu hamil yang ditandai dengan mual dan muntah berlebih yang dapat menyebabkan gangguan fisiologis hingga komplikasi dalam kehamilan. Perubahan psikologis berupa kecemasan kecemasan dapat memperburuk keadaan mual dan muntah yang dialami pada ibu hamil sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 dengan sampel diambil dari 185 ibu hamil trimester I yang terdiagnosis hiperemesis gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yakni kuesioner demografi dan PASS (Perinatal Anxiety Screening Scale) yang diolah menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian didapatkan nilai p-value sebesar 0,000 yang menunjukkan terdapat hubungan antara kedua variabel sehingga dalam penelitian ini hipotesis alternatif dapat diterima. Kesimpulan pada penelitian ini yakni terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023 sehingga perlu memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai dampak kecemasan yang dapat memperberat kondisi hiperemesis gravidarum.

Kata kunci: *Hiperemesis gravidarum, Kecemasan, Ibu hamil trimester I, PASS*

RELATIONSHIP BETWEEN ANXIETY AND HYPEREMESIS GRAVIDARUM IN MOTHERS PREGNANT AT RSIA ANANDA MAKASSAR IN 2023

*Muthiaturrahmah Syafiuddin(1), Rini Fitriani(2), Andi Irhamnia Sakinah(3),
Azizah Nurdin(4), Azizul Hakim(5)*

*Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences of UIN
Alauddin Makassar*

Email : muthia.syaf28@gmail.com

ABSTRAK

Hyperemesis gravidarum is a condition of psychological imbalance in pregnant women which is characterized by excessive nausea and vomiting which can cause physiological disturbances to complications in pregnancy. Psychological changes in the form of anxiety can exacerbate nausea and vomiting experienced by pregnant women, so this study aims to determine the relationship between anxiety and the incidence of hyperemesis gravidarum in pregnant women at RSIA Ananda Makassar in 2023. The research method used was a quantitative study design. *cross sectional*. This research was conducted at RSIA Ananda Makassar from December 2022 to January 2023 with samples taken from 185 first trimester pregnant women diagnosed with hyperemesis gravidarum and not hyperemesis gravidarum using *the purposive sampling*. The instruments used were demographic questionnaires and PASS (*Perinatal Anxiety Screening Scale*) which was processed using the test *Who Square*. The research results obtained *value p-value* of 0.000 which indicates that there is a relationship between the two variables so that in this study the alternative hypothesis can be accepted. The conclusion in this study is that there is a significant relationship between the level of anxiety and the incidence of hyperemesis gravidarum in pregnant women at RSIA Ananda Makassar in 2023, so it is necessary to provide education to pregnant women about the impact of anxiety that can exacerbate hyperemesis gravidarum.

Keywords: *Hyperemesis gravidarum, Anxiety, First trimester pregnant women, PASS*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kesejahteraan suatu negara. Kematian ibu menurut WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan. Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2017, angka kematian ibu di dunia masih cukup tinggi yakni sebesar 211 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2019).

Data menunjukkan tren menurun pada indikator AKI (per 100.000 kelahiran hidup) dari 390 pada tahun 1991 menjadi 230 pada tahun 2020 atau turun 1,80 % per tahun. Meski mengalami penurunan, AKI masih belum mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, yaitu 102 dan *SDGs* tahun 2030, yaitu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup (DPR RI, 2021). Angka yang belum mencapai target tersebut diperkirakan terjadi akibat adanya komplikasi selama kehamilan dengan kasus mencapai 810 ibu hamil meninggal setiap harinya di seluruh dunia (WHO, 2019).

Selama kehamilan, ibu hamil normalnya mengalami perubahan fisiologi dan psikologis. Salah satu perubahan psikologis ibu hamil yang sering dirasakan adalah kecemasan. Kecemasan disebabkan hormon kortisol yang tinggi. Ibu hamil mengalami kecemasan seperti reaksi emosional dalam mengkhawatirkan diri dan janinnya, kehamilan, dan persalinan (Ayu *et al.*, 2022). Di Indonesia, kecemasan ibu hamil mencapai 28,7%. Wabah Covid-19 memberikan dampak peningkatan kecemasan sebesar 50,7% yang meliputi kondisi kehamilan 66,7%, dan kondisi bayi 35% (Dewi *et al.*, 2021).

Perubahan psikologis selama kehamilan berupa kecemasan atau depresi dapat menjadi dianggap menjadi faktor predisposisi ibu hamil mengalami mual muntah dalam kehamilan. Ketidakseimbangan psikologis ibu hamil dalam mengatasi konflik secara serius selama kehamilan, mengalami

ketergantungan atau hilang kendali akan memperberat keadaan mual dan muntah yang dialaminya sehingga kondisi mual muntah menjadi berlanjut menjadi lebih berat atau disebut dengan hiperemesis gravidarum (Rorrong, M. dan Lumentut, 2021).

Hiperemesis gravidarum merupakan suatu keadaan yang ditandai rasa mual dan muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan dan gangguan keseimbangan elektrolit, ibu terlihat lebih kurus, turgor kulit berkurang dan mata terlihat cekung. Hiperemesis gravidarum dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, faktor psikologis, faktor paritas, faktor nutrisi, dan faktor alergi (Rahma dan Restu, 2017). Angka kejadian hiperemesis gravidarum semakin meningkat, menurut *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2013, jumlah kejadian hiperemesis gravidarum mencapai 12,5% dari seluruh jumlah kehamilan di dunia. Kunjungan pemeriksaan ibu hamil di Indonesia diperoleh data ibu dengan hiperemesis gravidarum mencapai 14,8% dari seluruh kehamilan (WHO, 2019).

Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan tubuh ibu sangat lemah, muka pucat dan frekuensi buang air kecil menurun drastis sehingga cairan tubuh semakin berkurang dan darah menjadi kental (hemokonsentrasi). Keadaan ini dapat memperlambat peredaran darah sehingga konsumsi oksigen dan makanan ke jaringan juga ikut berkurang sehingga menimbulkan kerusakan jaringan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan kesehatan janin yang dikandungnya sehingga cenderung akan membuat mereka menjadi lebih lemah dan akan meningkatkan kecemasan terhadap kejadian yang lebih parah (Zainiyah et al., 2019).

Ketidakseimbangan psikologis ibu hamil dalam mengatasi konflik secara serius, ketergantungan atau hilang kendali akan memperberat keadaan mual dan muntah yang dialami ibu hamil. Hal yang lebih ditakutkan pada keadaan mual muntah tersebut yakni terjadinya hiperemesis gravidarum (Rorrong, M. dan Lumentut, 2021).

Dalam pandangan Islam, al-Qur'an menggambarkan berbagai tingkatan kecemasan dan berbagai gejala fisik dalam tubuh yang menyertainya. Dalam

al-Qur'an kecemasan digambarkan dengan kata *khaufun*, yaitu kondisi hati tidak tenang terkait dengan perkara di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena adanya keraguan yang ada dalam hati, maka timbul sifat gelisah yang akhirnya menjadikan seseorang merasa kesusahan (Nasaruddin, 2018). Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kecemasan juga dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 155 yang berbunyi:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Menurut Syaikh Abdur Rahman al-Sa'di dalam kitab tafsir *As-Sa'di* menyatakan Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia akan menguji para hamba-Nya dengan musibah-musibah. Agar menjadi jelas siapa (di antara) hamba itu yang sejati dan pendusta, yang sabar dan berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah atas hamba-Nya. Seandainya kebahagiaan selalu menyertai kaum mukminin, tidak ada bencana yang menimpa mereka, niscaya tidak ada pemisah orang baik dan tidak baik (Kusuma, 2017).

Tercatat dalam data profil kesehatan RI tahun 2020 menunjukkan terdapat 5.256.483 ibu hamil yang tercatat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, mencakup Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah cakupan ibu hamil tertinggi ke-6 mencapai 185.004 ibu hamil, dengan Kota Makassar menjadi wilayah dengan jumlah ibu hamil terbanyak di Sulawesi Selatan mencapai 30.990 ibu hamil. Kecamatan Rappocini menempati kecamatan dengan ibu hamil terbanyak di Kota Makassar pada tahun 2019 yang menunjukkan 1.671 ibu hamil (Dinkes Makassar, 2019). Sementara RSIA Ananda Makassar menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berada di Kecamatan Rappocini, dengan data awal peneliti terdapat 2.271 ibu hamil yang terdaftar tahun 2021, dengan 240 ibu hamil didiagnosis mengalami hiperemesis gravidarum pada periode 2022 (Data Primer, 2022).

Berdasarkan uraian diatas banyaknya cakupan sampel yang telah didapatkan pada data awal menjadi pendukung dilakukannya penelitian ini dengan judul penelitian “Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023?

C. Hipotesis

H₀: Kecemasan tidak berhubungan dengan kejadian hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.

H₁: Kecemasan berhubungan dengan kejadian hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Kecemasan ibu hamil	Derajat atau tingkatan perasaan takut dan tidak nyaman yang dialami oleh ibu hamil tanpa penyebab yang jelas, diukur berdasarkan skala PASS (<i>Perinatal Anxiety Screening Scale</i>). Kuesioner PASS adalah skala pemantauan yang digunakan untuk menilai tingkat kecemasan pada ibu hamil. PASS mengukur	Pengisian PASS yang terdiri dari 31 item, dengan skala masing-masing item 0-4, dengan total skor keseluruhan 0-93 (Amiri et al., 2022).	0. Tidak Cemas (0 -20) 1. Cemas (21 – 93)	Nominal

Tabel 1.1 Definisi Operasional (lanjutan)

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala	
		frekuensi dan intensitas gejala kecemasan seperti ketegangan, rasa cemas, dan rasa takut yang dialami oleh ibu hamil selama kehamilan (Somerville <i>et al.</i> , 2015).				
Variabel Dependen						
2.	Hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan sehari-hari dan bahkan dapat membahayakan hidup ibu hamil	Diagnosis medis yang tercatat pada rekam medis	0. Tidak 1. Ya	Nominal	

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang terkait yakni sebagai berikut.

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Risa Hidayati & Evis Ritawani Hasibuan	Hubungan Tingkat Kecemasan Ibu dengan Emesis Gravidarum pada Ibu Hamil Trimester I di Puskesmas Payung Sekaki	Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan ibu dengan emesis gravidarum pada ibu hamil trimester I di Puskesmas Payung Sekaki	Jenis penelitian menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> , waktu dan tempat penelitian berbeda, jumlah sampel penelitian sebanyak 31 orang, serta teknik pengambilan sampel	Meneliti terkait hubungan tingkat kecemasan terhadap hiperemesis gravidarum serta jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis

Tabel 1.2 Kajian Pustaka (lanjutan)

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		Tahun 2019	tahun 2019 dengan <i>p-value</i> 0,000.	menggunakan teknik <i>total sampling</i> .	univariat dan bivariat.
2.	Ratih Indah Kartikasari	Derajat Kecemasan Ibu Hamil dengan Kejadian Mual Muntah pada Trimester 1 Tahun 2018	Ada hubungan yang signifikan antara derajat kecemasan ibu hamil dengan kejadian mual muntah pada trimester 1. Semakin tinggi derajat kecemasan ibu hamil, semakin tinggi pula tingkat mual muntahnya.	Jenis penelitian menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> , waktu dan tempat penelitian berbeda, jumlah sampel penelitian sebanyak 28 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan <i>simple random sampling</i> , penelitian menggunakan kuesioner HARS, serta dianalisis menggunakan uji <i>Spearman rank</i> .	Meneliti terkait hubungan tingkat kecemasan terhadap hiperemesis gravidarum serta menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik analisis univariat dan bivariat.
3.	Herawaty dkk	Faktor Risiko Umur Ibu dan Psikologis dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Tahun 2022	Faktor risiko kejadian hiperemesis gravidarum ibu hamil yang mengalami gangguan psikologis berisiko 2,95 kali lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami gangguan psikologis.	Jenis penelitian menggunakan pendekatan retrospektif, waktu dan tempat penelitian berbeda, jumlah sampel penelitian sebanyak 25 orang.	Meneliti terkait hubungan tingkat kecemasan terhadap hiperemesis gravidarum, desain penelitian <i>case control</i> , dan teknik analisis menggunakan <i>Odss Ratio</i> .

F. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang hubungan tingkat kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil.

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan keputakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang faktor risiko kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil, sehingga diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya dampak negatif pada ibu hamil dan janinnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kecemasan

1. Definisi Cemas

Kecemasan dalam Bahasa Inggris dikenal dalam istilah *anxiety* yang berasal dari bahasa latin yakni *angustus* yang berarti kaku, dan *ango, anci* yang berarti mencekik. Menurut Steven Schwartz, kecemasan bermakna sesuatu yang mirip dengan rasa takut yang ditandai oleh adanya kekhawatiran terhadap bahaya tidak terduga di masa yang akan datang. Namun tanpa fokus yang kurang spesifik, sedangkan ketakutan berasal dari respon terhadap suatu ancaman langsung (Nugroho, 2022).

Kecemasan merupakan suatu respon terhadap terjadinya kondisi tertentu yang dapat mengancam dan termasuk suatu hal normal yang dapat terjadi disertai suatu perkembangan atau perubahan, pengalaman baru, serta dalam menemukan identitas diri (Sadock dan Sadock, 2015). Kecemasan menjadi suatu sinyal yang memperingatkan atau menyadarkan seseorang terhadap adanya bahaya yang dapat mengancam dan memungkinkan seseorang mengambil suatu tindakan untuk mengatasi sebuah ancaman tersebut (Ni'mah, 2018). Kecemasan ditandai dengan adanya perasaan takut, seperti takut menghadapi ketidakpastian pada masa depan yang akan datang, perasaan khawatir, sikap emosional berupa perasaan gelisah, resah, adanya gerakan-gerakan yang berlebihan, perasaan tidak tenang secara psikologis, serta kondisi yang tidak seimbang akibat adanya tekanan psikologis seperti tuntutan pemuasan segera yang secara fisiologis merupakan suatu reaksi stres atau perubahan yang terjadi pada diri seseorang sebagai akibat dari pengaruh stres (Mellani, 2021).

2. Epidemiologi

Hasil perhitungan *Institute for Health Metrics and Evaluation* (IHME) tahun 2017 mengenai angka beban penyakit di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis gangguan jiwa yang diperkirakan diderita oleh sebagian besar penduduk Indonesia yaitu

depresi, gangguan kecemasan dan gangguan panik, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autisme, gangguan makan, dan kecacatan intelektual (IHME, 2017). Berdasarkan hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, gangguan depresi dan cemas dapat terjadi pada semua kelompok usia terutama usia 15-24 tahun dengan prevalensi mencapai 6,2% dan semakin meningkat seiring peningkatan usia (Kemenkes RI, 2018).

Gangguan cemas merupakan salah satu suatu gangguan psikiatri atau gangguan kejiwaan yang paling sering ditemukan. Hasil laporan The National Comorbidity Study menunjukkan satu dari empat orang memenuhi kriteria diagnosis dalam satu gangguan kecemasan. Selain itu, gangguan cemas ini sering ditemukan pada wanita (30,5%) dibanding pria (19,2%) (Sadock dan Sadock, 2015). Gangguan kecemasan dan depresi paling sering ditemukan pada negara berkembang dengan presentasi lebih dari 20% dibanding negara maju dengan persentase sekitar 7-20% (Harianto dan Putri, 2020).

3. Teori Penyebab Kecemasan

Terdapat dua teori terkait penyebab terjadinya kecemasan, yakni teori biologis dan teori psikologis. Teori biologis berhubungan dengan neurotransmitter dan neuroanatomi sedangkan teori psikologis terdiri dari teori psikoanalitik, teori perilaku dan teori eksistensial (Sadock dan Sadock, 2015).

a. Neurotransmitter

- 1) Norepinefrin terletak pada *locus cereolus* dan *pons*. Norepinefrin memberikan respon saat merasa nyeri dan situasi bahaya
- 2) GABA
- 3) Serotonin berhubungan dengan perasaan cemas dan depresi

b. Neuroanatomi

- 1) Limbic yaitu *locus cereolus* dan *nucleus rafe* yang mengandung norepinefrin dan serotonin

- 2) Korteks cerebral berhubungan dengan gangguan lobus temporalis dan gangguan *obsessive compulsive* (Ibrahim, 2012).

c. Teori Psikoanalitik

Psikoanalisis membagi komponen kepribadian yakni ide, ego, dan superego. Ide, ego dan superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Ide memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil (Halisa dan Maulida, 2017).

1) Contoh ide

Di tengah acara makan malam, Sinta haus, tetapi gelasinya sudah kosong. Dibanding menunggu pelayan mengisi ulang gelasinya, dia mengambil gelas Pak Budi di seberang meja lalu meminumnya, hal ini tentu sangat mengejutkan.

2) Contoh ego

Sinta haus. Namun, dia tahu bahwa pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasinya dengan air, jadi dia memilih untuk menunggu, meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Budi yang ada di seberangnya.

3) Contoh superego

Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun, Jojo mengerti mencuri itu salah, jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan.

Kecemasan diartikan sebagai sinyal adanya bahaya pada ketidaksabaran seorang pasien. Kecemasan dianggap sebagai akibat dari sebuah konflik psikis antara “keinginan tidak disadari yang bersifat agresif” dan suatu ancaman terhadap hal tersebut dari “ego” atau realitas eksternal. Bentuk “keinginan tidak disadari yang bersifat agresif” merupakan pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral. Untuk melawan keinginan tersebut maka “ego” dihadirkan sebagai respon terhadap tindakan agresif yang akan

dilakukan, hal ini akan memobilisasi mekanisme pertahanan untuk mencegah pikiran dan perasaan yang tidak dapat diterima agar tidak muncul ke kesadaran/tindakan (Sadock dan Sadock, 2015). Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan dapat menggunakan secara berlebihan salah satu atau beberapa pola tertentu dari suatu mekanisme pertahanannya (Videbeck, 2020).


d. Teori Perilaku

Dalam teori ini, kecemasan muncul karena adanya rangsangan lingkungan tertentu, pola pikir yang salah atau tidak produktif yang dapat menimbulkan perilaku maladaptif. Dalam situasi bahaya yang berlebihan dan meremehkan kemampuannya dalam menghadapi ancaman merupakan penyebab kecemasan pada diri seseorang (Stuart, 2013)

e. Teori Eksistensial

Teori ini dikaitkan dengan gangguan cemas menyeluruh tanpa adanya stimulus spesifik yang dapat dikenali sebagai penyebab perasaan cemas yang dialami. Konsep utama teori eksistensial yaitu individu yang merasa hidupnya tanpa tujuan (Sadock dan Sadock, 2015)

4. Patofisiologi Kecemasan



Gambar 2.1 Patofisiologi Kecemasan (Campbell *et al.*, 2018).

Ketika seseorang dalam keadaan stres dan tegang secara fisiologis akan mengaktifkan *Limbic Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis* (LHPA), kemudian merangsang hipotalamus dan menyebabkan disekresinya *hormon*

corticotrophin releasing hormone (CRH). Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan produksi *Sympathetic Adrenal Medular axis* (SAM), dengan adanya respon tersebut menyebabkan stimulasi pada alur *Limbic Hipotalamus Putuitary Adrenal Axis* (LHPA), kemudian merangsang hipotalamus dan menyebabkan disekresinya hormon *Corticotrophin Releasing Hormone* (CRH). Hal tersebut menyebabkan teraktivasi *Adeno Corticotrophin Hormone* (ACTH) yang akan menstimulasi produksi hormon kortisol dari korteks adrenal, selain itu akan menyebabkan teraktivasi neuron andrenergik dari *locus ceruleus* (LC) yang merupakan tempat diproduksi norepinefrin (NE) yang akan mensekresikan epinefrin (Handayani dan Ratnasari, 2019). Sistem LC bertanggung jawab untuk merespon langsung terhadap stresor dengan “melawan atau lari/*fight or flight*” (Imaniah, 2017).

5. Jenis-Jenis Kecemasan

Menurut Spilberger kecemasan dibagi dalam dua bentuk, yakni sebagai berikut.

a. *Trait anxiety*

Trait anxiety adalah rasa khawatir dan rasa terancam yang dialami seseorang terhadap suatu kondisi yang sebenarnya tidak akan berbahaya. Jenis kecemasan ini disebabkan oleh adanya kepribadian individu yang pada dasarnya memiliki potensi cemas daripada individu lainnya (Wiwikarnilah, 2022).

b. *State anxiety*

State anxiety adalah suatu kondisi emosional dan keadaan sementara dalam diri seseorang disertai adanya perasaan khawatir dan tegang yang dirasakan dalam keadaan sadar dan bersifat subjektif (Fauziah *et al.*, 2018).

Sementara itu, menurut Freud kecemasan terdiri dalam tiga jenis yakni sebagai berikut (Naru Nafis, 2021).

a. Kecemasan neurosis

Kecemasan neurosis adalah rasa cemas akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego, tetapi muncul dari dorongan ide. Kecemasan neurosis bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu sendiri, tetapi ketakutan terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting dipuaskan (Karauwan, 2020).

b. Kecemasan moral

Kecemasan ini berakar dari konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini dapat muncul karena kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas, di masa lampau sang pribadi pernah mendapat hukuman karena melanggar norma moral dan dapat dihukum kembali (Naru Nafis, 2021).

c. Kecemasan realistik

Kecemasan realistik merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar (Karauwan, 2020).

Kaplan, Sadock, dan Grebb menyebutkan kecemasan terbagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut (Sadock dan Sadock, 2015).

a. *Facilitating anxiety*

Facilitating anxiety adalah kecemasan yang sampai pada taraf tertentu dapat mendorong meningkatnya performa. Misalnya, cemas mendapat IP buruk membuat seorang mahasiswa belajar keras dan mempersiapkan diri menghadapi ujian.

b. *Debilitating anxiety*

Debilitating anxiety merupakan kecemasan yang berlebihan, sehingga sangat mengganggu. Misalnya kecemasan berlebihan saat akan ujian skripsi justru membuat seorang mahasiswa mengalami *blocking* dan tidak bisa menjawab pertanyaan.

6. Faktor yang Memengaruhi Kecemasan

Blacburn & Davidson menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya. Situasi tersebut meliputi situasi mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya (seperti keadaan emosi serta fokus kepermasalahannya (Sampoerna dan Herwandito, 2021).

Sementara Adler dan Rodman menyatakan terdapat dua faktor yang dapat menimbulkan kecemasan, antara lain sebagai berikut :

a. Pengalaman negatif pada masa lalu

Sebab utama dari timbulnya rasa cemas kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbulnya rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu menghadapi situasi yang sama dan juga menimbulkan ketidaknyamanan, seperti pengalaman pernah gagal dalam mengikuti tes (Mellani, 2021).

b. Pikiran yang tidak rasional

Pikiran yang tidak rasional seperti kegagalan katastrofik, kesempurnaan, persetujuan, generalisasi yang tidak tepat (Widigda dan Setyaningrum, 2018).

7. Tingkat Kecemasan

Menurut Nursalam dalam (Mellani, 2021), tingkat kecemasan diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

a. Kecemasan ringan

- 1) Respon fisiologis seperti ketegangan otot ringan.
- 2) Respon kognitif seperti lapang pandang meluas, memotivasi untuk belajar, kesadaran yang pasif pada lingkungan.
- 3) Respon tingkah laku dan emosi seperti suara melemah, otot-otot wajah relaksasi, mampu melakukan kemampuan/keterampilan permainan secara otomatis, ada perasaan aman dan nyaman.

b. Kecemasan sedang

- 1) Respon fisiologis seperti peningkatan ketegangan dalam batas toleransi, perhatian terfokus pada penglihatan dan pendengaran, kewaspadaan meningkat.
- 2) Respon kognitif seperti lapang persepsi menyempit, mampu memecahkan masalah, fase yang baik untuk belajar, dapat fokus pada hal-hal yang spesifik.
- 3) Respon tingkah laku dan emosi seperti perasaan tertantang dan perlu untuk mengatasi situasi pada dirinya, mampu mempelajari keterampilan baru.

c. Kecemasan berat

- 1) Respon fisiologis seperti aktivitas sistem saraf simpatik (peningkatan epinefrin, tekanan darah, pernapasan, nadi, vasokonstriksi, dan peningkatan suhu tubuh), diaforesis, mulut kering, ingin buang air kecil, hilang nafsu makan karena penurunan aliran darah ke saluran pencernaan dan peningkatan produk glukosa oleh hati, perubahan sensori seperti penurunan kemampuan mendengar, nyeri, pupil dilatasi, ketegangan otot dan kaku.
- 2) Respon kognitif seperti lapang persepsi sangat menyempit, sulit memecahkan masalah, fokus pada satu hal.
- 3) Respon tingkah laku dan emosi seperti lapang personal meluas, aktifitas fisik meningkat dengan penurunan mengontrol, contoh meremas tangan, jalan bolak-balik. Perasaan mual dan kecemasan mudah meningkat dengan stimulus baru seperti suara. Bicara cepat atau mengalami *blocking*, menyangkal, dan depresi.

d. Kecemasan sangat berat

- 1) Respon fisiologis seperti pucat, dapat terjadi hipotensi, berespon terhadap nyeri, bising dan stimulus eksternal menurun. Koordinasi motorik buruk. Penurunan aliran darah ke otot skeletal.
- 2) Respon kognitif seperti tidak terkontrol, gangguan berpikir secara logis, tidak mampu memecahkan masalah.

- 3) Respon tingkah laku dan emosi seperti perasaan marah, takut dan segan. Tingkah laku menjadi tidak biasa seperti menangis dan menggigit. Suara menjadi lebih tinggi, lebih keras, bicara cepat dan *blocking*.

Secara umum berdasarkan tingkat risikonya kecemasan dapat dikategorikan menjadi kecemasan dengan risiko rendah dan kecemasan dengan risiko tinggi. Kecemasan risiko rendah termasuk kecemasan ringan maupun dalam keadaan tidak cemas, pada keadaan ini potensi untuk mengalami penurunan kecemasan masih lebih baik dan terkontrol. Sementara itu, kecemasan risiko tinggi meliputi kecemasan sedang sampai berat yang berpotensi mengalami komplikasi apabila tidak ditangani dengan baik dan tepat.

8. Gejala Kecemasan

Menurut *National of Mental Health* dalam (Safitri, 2022), gejala kecemasan dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut.

a. Sensasi fisik

Sensasi fisik meliputi ritme nafas yang lebih cepat, detak jantung cepat ireguler, tekanan darah yang naik, mual, perut terasa terlilit, sakit kepala, otot tegang, saat menunggu sesuatu tidak bisa duduk tenang, suhu tubuh terasa panas, keringat, sulit tidur, dan sering merasa ingin BAK.

b. Sensasi psikis

Sensasi psikis meliputi perasaan gelisah, gugup, tegang, dapat terasa terasa kebas, kurang konsentrasi, dan memikirkan sesuatu berulang-ulang.

9. Tatalaksana

Kecemasan yang berlangsung terus menerus disebut dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan akan menimbulkan kondisi yang patologis serta gejala yang hiperaktivitas pada sistem gastrointestinal, kardiovaskular, genitourinarius, dan muskuloskeletal (Ströhle, Gensichen dan Domschke, 2018).

Gangguan kecemasan dapat diatasi dengan tatalaksana farmakologi maupun nonfarmakologi adalah sebagai berikut :

a. Farmakologi

Pilihan utama dalam terapi medikamentosa untuk tatalaksana gangguan cemas menyeluruh adalah antidepresan seperti *selective serotonin reuptake inhibitor* (SSRI) serta *serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor* (SNRI). SSRI bekerja dengan menghambat transporter serotonin sedangkan SNRI bekerja dengan menghambat transporter serotonin dan norepinefrin dan menyebabkan desensitisasi reseptor serotonin postsinaptik sehingga menormalkan jalur serotonergik. Kelompok obat SSRI diantaranya fluoxetine, sertraline, citalopram, escitalopram, fluvoxamine, paroxetine, dan vilazodone. Sedangkan kelompok obat SNRI yaitu venlafaxine, desvenlafaxine, dan duloxetine (Bystritsky, et al., 2013).

Pemberian antidepresan golongan *selective serotonin reuptake inhibitor* (SSRI) seperti sertraline, escitalopram dan paroxetine maupun *serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor* (SNRI) seperti duloxetine dan venlafaxine efektif terutama pada pasien gangguan cemas menyeluruh dengan gangguan depresi. Obat golongan ini menjadi pilihan utama dalam GAD karena berdasarkan studi lebih benefisial dibandingkan benzodiazepin dan buspirone. Obat golongan SSRI yang menjadi pilihan adalah sertraline dan paroxetin dibanding fluoxetine. Pemberian fluoxetine dapat meningkatkan kecemasan sementara (Ströhle, Gensichen dan Domschke, 2018).

b. Nonfarmakologi

Terapi suportif seperti psikoterapi memiliki peranan penting dalam penatalaksanaan gangguan cemas. Terapi yang dapat dilakukan adalah terapi kognitif-perilaku atau *cognitive behavioural therapy* (CBT) dan terapi suportif (Safitri, 2022).

10. Solusi Kecemasan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan solusi untuk menyikapi suatu kondisi

kecemasan yang terjadi pada ibu hamil, di antaranya dengan beberapa cara dibawah ini.

- a. Menatap masa depan dengan keimanan, ketaqwaan dan amal saleh. Hal ini terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati*” (Kemenag RI, 2019).

Ayat ini menegaskan tentang perbuatan yang baik, dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Allah menyebutkan bahwasanya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang tersebut dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya. Empat macam sifat tersebut adalah sebagai berikut

- 1) Beriman kepada Allah

Iman kepada Allah Swt. berarti meyakini Nya dengan hati lalu diucapkan dengan lisan, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah Swt. adalah rukun iman yang pertama (Qibtiyah, 2018).

- 2) Mengerjakan amal saleh

Menurut Muhammad Abduh, amal yang bermanfaat tersebut berguna bagi diri pelakunya, keluarga, masyarakat dan seluruh umat manusia, dan tidak membahayakan seseorang kecuali dalam rangka menolak bahaya yang lebih besar (Tasbih, 2018).

- 3) Menunaikan shalat

Shalat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali

dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan syara' (Istianah, 2020).

4) Menunaikan zakat.

Seorang muslim belumlah dianggap sempurna imannya, jika dari harta kekayaan yang diperolehnya tersebut tidak dikeluarkan zakatnya. Selain itu kesosialan seorang muslim dapat dilihat dari kenyataan/praktik tentang apakah ia rela dan taat dalam menunaikan kewajiban zakat yang merupakan hak fakir-miskin (Fatimah, Rustamunadi dan Risyanto, 2019).

b. Senantiasa mengingat Allah

Al-Qur'an memberikan jalan keluar bagi seseorang yang telah mengalami kecemasan yang berkelanjutan, yakni pada fase cemas menjadi sebuah gangguan. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS ar-Rad/13:28 yaitu.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”

Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat dan menyebut Allah Swt. Maksudnya, hati itu menjadi lebih baik karena bersandar kepada Allah, dan ridha Allah sebagai pelindung dan penolong. Dengan mengingat dan menyebut Allah, hati menjadi tentram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa cemas, gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya (Kemenag RI, 2019).

c. Menata Hati

Adapun hal-hal yang mendatangkan dan menimbulkan kepuasan hati, ketentraman hidup, dan ketenangan jiwa tidak dapat dipisahkan dari praktik ibadah yang dilakukan sehari-hari, bahkan berkaitan erat

dengan aqidah yang letaknya di dalam hati, sedangkan hati merupakan sumber kebaikan dan keburukan sebagaimana sabda Rasulullah saw.

اللَّهُ رَسُولٌ سَمِعَتْ : قَالَ عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ بِشِيرِ بْنِ التُّعْمَانَ اللَّهُ عَبْدُ أَبِي عَن
 وَبَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَإِنْ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنْ : يُقُولُ وَسَلَّمُ وَإِلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 لِذِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدْ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ النَّاسِ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُونَ لَا مُشْتَبِهَاتِ أُمُورِ
 الْحَمَى حَوْلَ يَزْعَى كَالرَّاعِيِ الْحَرَامِ فِي وَقَعَ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعَ وَمَنْ وَعَرَضِهِ
 وَإِنْ أَلَا مُحَارَمُهُ اللَّهُ حَمَى وَإِنْ أَلَا حَمَى مَلِكِ لِكُلِّ وَإِنْ أَلَا فِيهِ يَزْعَى أَنْ يُوشِكِ
 أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدَ فَسَدَ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدَ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضَعَّةَ الْجَسَدِ فِي
 الْبَحَارِ يَوْمَ مُسْلِمٍ رَوَاهُ - الْقَلْبُ وَهِيَ

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:” Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan (hima), dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja itu mempunyai hima, ketahuilah bahwa hima Allah subhanahu wa ta’ala adalah segala yang Allah subhanahu wa ta’ala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuhnya dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah kalbu (hati). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Secara khusus manusia mempunyai tiga potensi penting di dalam dirinya, yaitu: (1) fisik, potensi fisik jika mampu dikelola secara baik maka akan menjadikan seseorang itu kuat dan produktif untuk bekerja; (2) akal, potensi akal menjadikan pembeda antara manusia dan makhluk yang lain. Dengan akallah manusia dapat memikirkan ayat-ayat Allah

dan mengelola alam ini, sehingga manusia dapat mengelolah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan; (3) hati atau yang sering ditulis dalam al-Qur'an dengan lafaz hati (Budi, 2018).

Dalam keilmuan psikologi islam, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa nafs memiliki dorongan yang bersifat tanah, yang tidak lain adalah dorongan nafsu hewani. Oleh karena itu, seorang yang condong pada nafs akan menjadikan seseorang memiliki kepribadian nasful-amarah, yaitu tingkat nafs yang paling rendah. Jadi, antara hati dan emosi adalah dua hal yang saling bertolak belakang, hati merefleksikan cahaya ilahiyah, sedangkan emosi adalah berasal dari hawa nafsu yang dihasilkan oleh nafs. Oleh karena itu, hati adalah sesuatu yang tidak bisa dimaknai secara sempit, makna hati menjadi sangat luas dan besar ketika dikaitkan dengan perannya yang besar dalam membuat manusia menjadi baik atau menjadi buruk (Budi, 2018).

Al-Quran mempunyai kekuatan spiritual yang luar biasa dan mempunyai pengaruh mendalam atas diri manusia. Di dalam al-Quran banyak memuat ayat-ayat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit manusia termasuk menurunkan kecemasan seseorang khususnya pada ibu hamil. Tingkat efektifitas kemanjuran al-Quran tergantung pula dari seberapa jauh tingkat sugesti keimanan seorang ibu hamil. Sugesti yang dimaksud dapat diraih dengan mendengarkan dan membaca, memahami dan merenungkan, serta menerima dan melaksanakan isi kandungan al-Quran. Masing-masing tahapan perlakuan terhadap al-Quran akan membawa seseorang ke alam yang dapat menenangkan dan menyejukkan jiwa tenang/tentram distimuli dengan al-Quran sehingga dapat menurunkan kecemasan individu (Budi, 2018).

B. Kecemasan pada Ibu Hamil

1. Definisi Kecemasan pada Ibu Hamil

Kecemasan pada ibu hamil adalah kecemasan yang dirasakan seorang ibu hamil terkait dirinya sendiri dan janin di dalam kandungannya

yang dipengaruhi oleh suatu pengalaman atau kondisi pada kehamilan sebelumnya, status anak yang dikandung yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, kondisi kesehatan ibu, kemampuan dan kesiapan ekonomi keluarga, bayangan ibu terhadap kondisi bayi seperti keguguran, lahir cacat, kembar, kelahiran prematur serta pandangan ibu tentang hal-hal seputar persalinan (Mardhiyah, 2020).

Kecemasan pada ibu hamil dapat timbul pada masa kehamilan hingga saat persalinan, ibu hamil dapat merasa cemas terhadap berbagai hal seperti normal atau tidak normal bayinya lahir, nyeri yang akan dirasakan dan sebagainya. Akan tetapi, kecemasan akan berdampak negatif pada ibu hamil sejak masa kehamilan hingga persalinan, seperti janin yang gelisah sehingga menghambat pertumbuhannya, melemahkan kontraksi otot rahim, dan lain-lain (Eriani, 2019).

2. Epidemiologi


Menurut Depkes RI tahun 2008, terdapat 373.000.000 orang ibu hamil di Indonesia yang mengalami kecemasan dan sebanyak 107.000.000 orang (28,7%) ibu hamil mengalami kecemasan dalam menghadapi persalinan. Adanya perubahan-perubahan psikologis pada ibu hamil terutama kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan sangat bervariasi tingkatannya (Aniroh dan Fatimah, 2019).

Setiap kehamilan dan persalinan mempunyai sifat dan kondisi yang berbeda-beda baik dirasakan pada trimester I, trimester II, maupun trimester III, serta pada ibu primigravida maupun multigravida. Berdasarkan penelitian di Indonesia yang telah dilakukan pada primigravida trimester III, didapatkan sebanyak 33,93% mengalami kecemasan. Selain itu, didapatkan hasil ibu hamil normal dalam menghadapi persalinan mengalami 47,7% kecemasan berat, 16,9% kecemasan sedang, dan 35,4% mengalami kecemasan ringan (Safitri, 2022).

3. Etiologi

Menurut WHO (WHO, 2019) berbagai hipotesis menerangkan bahwa timbulnya cemas pada ibu hamil mulai dari teori biologi (perubahan hormonal dan neurokimia), psikologis (tipe kepribadian dan cara berpikir), dan sosial (tingkat pendidikan, penghasilan, hubungan dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga).

4. Patofisiologi Kecemasan pada Ibu Hamil



Gambar 2.2 Patofisiologi Kecemasan pada Ibu Hamil (Guyton, 2014)

Kecemasan pada ibu hamil secara fisiologis dapat menyebabkan lepasnya hormon stres antara lain *Adrenocorticotropin hormone* (ACTH), kortisol, katekolamin, β -*Endorphin*, *Growth hormone* (GH), prolaktin dan *lutening hormone* (LH)/*folicle stimulating hormone* (FSH). Lepasnya hormon-hormon stres tersebut mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi sistemik, termasuk di antaranya konstriksi vasa uteroplacenta yang menyebabkan gangguan aliran darah di dalam rahim, sehingga penyampaian oksigen ke dalam miometrium terganggu dan mengakibatkan lemahnya kontraksi otot rahim (Sari, 2019).

Menurut Guyton (2014) secara fisiologis kecemasan akan mengaktifasi amygdala yang merupakan bagian dari sistem limbik yang berhubungan dengan komponen emosional dari otak. Respon neurologis dari amygdala ditransmisikan dan menstimulasi respon hormonal dari hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan hormon CRF (*Corticotropin-*

Releasing Factor) yang menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormon lain yaitu ACTH (*Adrenocorticotropin Hormone*) ke dalam darah. ACTH sebagai gantinya menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan kortisol, suatu kelenjar kecil yang berada di atas ginjal. Semakin berat stres, kelenjar adrenal akan menghasilkan kortisol semakin banyak dan menekan sistem imun. Hipotalamus pada sistem limbik bertanggungjawab untuk respon internal laju pernafasan yang meningkatkan tekanan darah dan penyebaran darah ke otak, termasuk semakin meningkatnya denyut jantung.

Tingkat stres yang tinggi pada maternal dapat menyebabkan peningkatan kadar CRH pada kehamilan. Diketahui bahwa stres kronis selama kehamilan akan mengakibatkan peningkatan dan pelepasan hormon yang berperan dalam persalinan, diantaranya CRH, ACTH, kortisol, estrogen, progesteron, prostaglandin, dan hormon lainnya. Stres kronis akan menstimulasi pengaktifan HPA aksis. Semua proses ini yang menyebabkan persalinan preterm dan berat bayi lahir rendah (BBLR) (Cunningham, 2012; Ganong *et al.*, 2014).

5. Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan pada Ibu Hamil

Berikut ini beberapa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kecemasan ibu dalam menghadapi persalinan yakni sebagai berikut.

a. Usia

Usia merupakan lamanya ukuran waktu untuk hidup seseorang yang dihitung sejak dilahirkan. Semakin dewasa usia seseorang, maka semakin matang dan akan lebih baik cara berpikir maupun bekerja seseorang karena pengalaman jiwa yang telah dilalui akan mempengaruhi perilaku seseorang (Arilestari, 2020). Gangguan kecemasan dapat terjadi di semua usia utamanya pada usia dewasa dan lebih banyak terjadi pada wanita daripada laki-laki. Sebagian besar kecemasan terjadi pada usia 21–45 tahun (Sadock dan Sadock, 2015).

Ibu dengan usia yang terlalu muda (< 20 tahun) dan usia yang terlalu tua (\geq 35 tahun) saat menjalani masa kehamilan akan memberikan dampak terhadap perasaan takut dan cemas yang kemudian akan

semakin bertambah cemas menjelang proses persalinan. Hal itu dikarenakan ibu yang hamil pada usia tersebut termasuk kedalam kategori kehamilan berisiko tinggi. Selain itu, ibu yang hamil pada usia 35 tahun keatas berisiko melahirkan bayi preterm dan janin besar (makrosomia). Usia ibu yang paling aman dalam menjalani masa kehamilan dan persalinan adalah usia 20-35. Adapun usia ibu hamil yang memiliki resiko tinggi terhadap kehamilan adalah kurang dari usia 20 tahun atau lebih dari usia 35 tahun. Hal tersebut dikaitkan dengan jumlah kebutuhan zat besi pada usia kurang dari 20 tahun meningkat ditambah pengetahuan yang masih rendah, sedangkan pada rentang usia lebih dari 35 tahun kondisi fisik dan daya tahan tubuh dari seorang wanita sudah menurun sehingga rentan terhadap penyakit yang akan menjadi komplikasi pada masa kehamilan (Pradhan, Baru dan Dharua, 2019).

Semakin bertambah usia seorang dan semakin matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan pasien yang menderita penyakit kronis, seseorang yang lebih dewasa akan lebih percaya diri dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Makin bertambah usia seseorang semakin konsentrasi pula menggunakan koping dalam masalah yang dihadapi. Kematangan kepribadian individu akan mempengaruhi kecemasan yang dihadapinya. Kepribadian individu yang lebih matur maka lebih sukar mengalami gangguan akibat kecemasan, karena individu mempunyai daya adaptasi yang lebih besar terhadap kecemasan (Pramestia Utari, 2018).

b. Gravida

Gravida adalah seorang ibu yang dalam keadaan hamil, biasanya disimbolkan menggunakan huruf G pada status gravida. Berdasarkan jumlahnya kehamilan seorang ibu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut (Safitri, 2022).

- 1) Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya.

2) Multigravida adalah seorang wanita yang hamil dan sebelumnya sudah pernah hamil sedikitnya dua kali (Safitri, 2022).

Ibu hamil primigravida merupakan kehamilan pertama kali dialaminya sehingga menginjak trimester III akan merasakan cemas karena semakin dekat dengan proses persalinan. Ibu dengan paritas pertama kali biasanya masih mengalami kesulitan selama beradaptasi dengan kehamilannya. Selain itu, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki seputar kehamilan masih lebih sedikit dibandingkan dengan wanita paritas tinggi. Pada ibu primigravida biasanya kesulitan dalam mengenali adanya perubahan yang terjadi dalam tubuhnya sehingga akan merasakan ketidaknyamanan selama masa kehamilan, sedangkan ibu yang pernah hamil dan melahirkan sebelumnya (multigravida), perasaan cemas yang dirasakan hanya berhubungan dengan pengalaman masa lalu yang pernah dialaminya selama kehamilan dan proses persalinan (Safitri, 2022).

c. Usia Kehamilan

Pada setiap trimester kehamilan ibu mengalami perubahan fisik dan psikologis yang berbeda – beda. Pada trimester pertama banyak ibu yang merasa kecewa, melakukan penolakan, cemas, dan sedih. Pada trimester kedua terdapat dua fase perubahan psikologis, yaitu fase *prequickening* ketika ibu mulai menerima kehamilannya dan fase *postquickening* ketika ibu akan fokus pada kehamilannya dan mulai mempersiapkan kelahiran bayinya. Pada trimester ketiga, ibu mulai merasa khawatir dengan prosesi kelahiran yang akan terjadi dan kondisi bayi yang akan dilahirkannya (Harini et al., 2022).

d. Pendidikan

Pendidikan memiliki arti masing–masing bagi setiap orang. Pendidikan berperan dalam merubah pola pikir, tingkah laku, hingga pengambilan suatu keputusan. Dengan tingkat pendidikan yang cukup akan mempermudah dalam mengidentifikasi stressor dalam diri seseorang maupun dari luar dirinya (Sadock dan Sadock, 2015).

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan terdiri dari:

- 1) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;
- 2) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 3) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi (UU Sisdiknas, 2003).

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seorang ibu maka semakin baik pula pengetahuannya tentang perawatan bayi. Hal tersebut dikaitkan dengan seorang dengan pendidikan seseorang semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya dengan pendidikan yang rendah akan menghambat bertambahnya pengetahuan seseorang (Sulistiyowati, Putra dan Umami, 2017).

e. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menempatkan upaya selama waktu dan ruang tertentu dengan mengharapkan suatu penghargaan moneter (atau berupa bentuk lain), atau tanpa mengharapkan sebuah imbalan, tetapi dengan rasa kewajiban kepada orang lain. Aktivitas bekerja dapat menyita waktu ibu hamil untuk fokus ke pekerjaannya sehingga rasa cemas dapat teralihkan. Pada penelitian ini ibu rumah tangga memiliki proporsi terendah pada ibu yang tidak mengalami kecemasan dan tertinggi pada ibu yang mengalami kecemasan berat. Ibu hamil yang

bekerja juga memiliki kesempatan untuk memiliki lingkup interaksi sosial yang lebih luas sehingga dapat bertukar informasi dan menceritakan keluh kesahnya pada rekan kerjanya sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasannya (Harini et al., 2022).

f. Status Ekonomi

Status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Status ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Status ekonomi kemungkinan besar menjadi bentuk gaya hidup suatu keluarga (Hardiyanti, 2017). Penggolongan tingkat ekonomi dapat ditinjau melalui jumlah penghasilan atau pendapatan keluarga yang dapat dibagi menjadi 3 tingkat menurut tingkat ekonomi masyarakat, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Upper Class* (tingkat atas), yakni jumlah penghasilan mencapai >2x upah minimum kota (Hardiyanti, 2017). Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, hasil penetapan upah minimum kota (UMK) Makassar Tahun 2021 sebesar Rp3.255.423, sehingga pendapatan lapisan ekonomi kelas atas >2x UMP yaitu >Rp 6.510.846.
- 2) *Middle Class* (tingkat menengah), yakni jumlah pendapatan berada di antara tingkat ekonomi bawah dan atas (Hardiyanti, 2017), sehingga pendapatan ekonomi kelas menengah berdasarkan UMK yaitu berkisar Rp 3.255.423 - Rp 6.510.846.
- 3) *Lower Class* (tingkat bawah), yakni jumlah penghasilan berada di bawah UMP (Hardiyanti, 2017), sehingga pendapatan ekonomi kelas bawah berdasarkan UMK yaitu <Rp3.255.423.

Status ekonomi yang cukup memadai membuat ibu hamil lebih siap dalam menghadapi kehamilannya karena biaya-biaya yang dibutuhkan selama dan setelah kehamilan. Tingkat ekonomi yang rendah dapat

mengganggu kondisi psikologis ibu dan tingkat kecemasan akan bertambah. Tingkat ekonomi yang rendah cenderung akan susah dalam memenuhi kebutuhan setiap hari sehingga akan menimbulkan masalah-masalah baru dalam keluarga (Rahmita, 2017).

Status ekonomi orang tua akan memengaruhi kebutuhan-kebutuhan untuk anak yang nantinya akan memengaruhi pertumbuhan dengan perkembangan anak. Semakin tinggi tingkat pendapatan orang tua maka akan semakin rendah tingkat kecemasan orang tua dan semakin rendah tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat kecemasan orang tua. Status ekonomi akan memengaruhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier kemudian secara tidak langsung juga akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Tingkat pendapatan yang semakin tinggi semakin besar peluangnya untuk bisa berkesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang sehat maka semakin rendah tingkat kecemasan orang tua begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi tingkat kecemasan orang tua (Rahmita, 2017).

g. Kondisi Medis

Kondisi medis dapat diketahui dengan memeriksakan kehamilan ke pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu hamil, serta mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan. Bagi seorang ibu yang mengalami gangguan kesehatan selama kehamilan tentunya akan mengalami kecemasan. Pada mereka yang memiliki janin dengan resiko tinggi untuk kelainan bawaan kecemasan makin meningkat, sedangkan wanita dengan komplikasi kehamilan adalah dua kali cenderung memiliki ketakutan terhadap kelemahan bayi mereka atau menjadi depresi (Siallagan dan Lestari, 2018).

Status kesehatan dapat memengaruhi kecemasan hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan seorang ibu yang mengalami gangguan

kesehatan akan lebih banyak mengalami kecemasan. Bagi seorang ibu yang mengalami gangguan kesehatan selama kehamilan salah satunya tekanan darah tentunya akan mengalami kecemasan, dan wanita dengan komplikasi kehamilan adalah dua kali cenderung memiliki tingkat kecemasan yang meningkat (Siallagan dan Lestari, 2018).

h. Dukungan Suami

Apabila ibu telah akan melakukan persalinan sebaiknya dilakukan persiapan pendampingan oleh pihak keluarga terkhusus oleh suami. Dukungan suami memiliki peran penting dalam perkembangan kehamilan dan kesiapan persalinan sang ibu, sebagai contoh suami dapat membantu untuk menyiapkan berbagai kebutuhan baik dari segi nutrisi maupun dukungan psikologis bagi si ibu. Adanya suami bisa memberikan dukungan psikologis yang akan meningkatkan kepercayaan diri, dan mengontrol rasa cemas saat persalinan sang ibu. Namun, baiknya suami dapat bersinergi dengan anggota keluarga lainnya maupun kerabat dalam memberikan support dan fasilitas kepada ibu hamil dalam mempersiapkan kehamilan dan persalinannya (Sari, 2019).

6. Alat Ukur Kecemasan pada Ibu Hamil

Kuesioner *Perinatal Anxiety Screening* (PASS) merupakan kuesioner pertama yang hingga saat ini mampu menyaring dan mencatat berbagai macam gangguan kecemasan secara khusus pada periode perinatal. Pada kuesioner PASS ini dikembangkan dan telah dilakukan uji validasi pada penelitian yang berjudul *The Perinatal Anxiety Screening Scale: Development Preliminary Validation* di King Edward Memorial Hospital Australia Barat. PASS menjadi instrumen self-report yang dirancang untuk skrining masalah kecemasan pada wanita hamil dan postpartum (kurang dari 1 tahun). PASS terdiri dari 31 item pertanyaan yang terbukti valid dan reliable (Somerville et al., 2014).

Kuesioner PASS memiliki nilai sensitivitas 0,7 dan spesifisitas 0,3. Kuesioner PASS tidak perlu dilakukan pengujian *reliability* ulang karena

sudah memiliki kriteria konsisten dengan nilai reliabilitas tinggi (*cronbach's α* =0,86-0,90). PASS merupakan skala lengkap yang memiliki keandalan sangat baik (*cronbach's α* =0,96) (Somerville *et al.*, 2014). PASS terdiri dari 31 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dengan pemberian skor: 0 untuk jawaban tidak pernah, skor 1 untuk kadang-kadang, skor 2 untuk jawaban sering, dan skor 3 untuk jawaban selalu dengan kategori hasil skor yang diperoleh:

- a. 0 – 20 = tidak cemas;
- b. 21 – 26 = cemas ringan;
- c. 27 – 40 = cemas sedang;
- d. 41 – 93 = cemas berat.

C. Hiperemesis Gravidarum

1. Definisi

Menurut *Royal College of Obstetricians and Gynecologists* (RCOG), hiperemesis gravidarum (HG) didefinisikan sebagai mual muntah selama kehamilan yang menyebabkan dehidrasi signifikan, dibuktikan dengan ketonuria atau ketidakseimbangan elektrolit, disertai dengan penurunan berat badan setidaknya 5% dari berat badan sebelum hamil. Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I, mual dan muntah berlebihan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang memengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin (DA, 2021).

2. Epidemiologi

Mual (*nausea*) dan muntah (*vomiting*), pusing, perut kembung, dan badan terasa lemah dapat terjadi hampir pada 50% kasus ibu hamil, dan terbanyak pada usia kehamilan 6 -12 minggu. Keluhan mual muntah sering terjadi pada waktu pagi sehingga dikenal juga dengan "*morning sickness*". Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 20 minggu (Prawirohardjo, 2020).

3. Etiologi dan Faktor Risiko

Hiperemesis gravidarum ini penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa teori mengenai etiologi dari hiperemesis gravidarum. Faktor hormonal adalah penyebab utama hiperemesis gravidarum sering dikemukakan. Pasien yang mengalami mual di pagi hari yang parah memiliki kadar hormon yang lebih tinggi selama awal kehamilan. Selain itu, pasien dengan hiperemesis gravidarum menghasilkan hormon tertentu yang terkait dengan *morning sickness* berat. *Morning sickness* yang parah terjadi paling banyak pada minggu-minggu ketika plasenta dan korpus luteum memproduksi hormon, terutama progesteron dan *human chorionic gonadotropin* (HCG) yang diduga berhubungan dengan hiperemesis gravidarum. Hormon yang dapat terlibat pada etiologi hiperemesis gravidarum diantaranya hormon estrogen dan hormon tiroid (Verberg *et al.*, 2005).

Ada banyak faktor risiko yang berhubungan dengan hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum banyak ditemukan pada ibu muda. Kehamilan janin kembar, janin dengan Down syndrome, dan lahir mati merupakan faktor kebidanan yang umum dari hiperemesis gravidarum. Gangguan suasana hati dan kecemasan berhubungan dengan penyakit ini, tetapi hubungan sebab akibat belum ditemukan. GERD, tukak lambung, dan terutama *H. pylori* adalah faktor risiko umum dari hiperemesis gravidarum (Gabra, 2018).

4. Patofisiologi

Hipotesis bahwa faktor endokrin adalah penyebab utama hiperemesis gravidarum sering dikutip. Teori tentang bagaimana hormon kehamilan dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum menyatakan bahwa pasien yang mengalami hiperemesis gravidarum mungkin terpapar tingkat hormon yang lebih tinggi selama awal kehamilan. Pasien hiperemesis gravidarum mungkin lebih rentan terhadap efeknya, pasien hiperemesis gravidarum mungkin menghasilkan subtype atau isoform

hormon tertentu yang terkait dengan hiperemesis gravidarum. Karena hiperemesis gravidarum paling banyak terjadi pada minggu-minggu ketika plasenta dan korpus luteum memproduksi hormon, progesteron dan HCG secara khusus dianggap terkait dengan hiperemesis gravidarum (Verberg *et al.*, 2005).

Pada beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara hiperemesis gravidarum dengan kadar HCG yang tinggi. Namun, peran HCG dalam patogenesis hiperemesis gravidarum masih belum jelas. Kewaspadaan harus dilakukan dalam menyimpulkan bahwa hubungan tersebut bersifat kausal karena kondisi lain terkait dengan kadar HCG yang tinggi, seperti koriokarsinoma, tidak biasanya mengakibatkan mual dan muntah, dan banyak wanita hamil hamil dengan kadar HCG yang tinggi tidak menderita hiperemesis gravidarum. Selain itu, sebagian besar pasien dengan hiperemesis gravidarum memiliki gejala berlanjut setelah trimester pertama ketika kadar HCG menurun, dan juga pengamatan bahwa pemberian HCG sebagai fase luteal mendukung atau untuk memicu pematangan oosit tidak menyebabkan gejala mual dan muntah dalam kehamilan (Verberg *et al.*, 2005).

Menurut beberapa penelitian tersebut, hiperemesis gravidarum biasanya hadir dalam kisaran konsentrasi serum hCG rata-rata antara 114 IU/L dan 210 IU/L pada kehamilan tunggal, sedangkan rata-rata konsentrasi serum hCG pada kehamilan kembar adalah 234 IU/L (Basima SH. Al Ghazali, 2014).

Selain itu, kadar serum estrogen yang tinggi pada pasien dengan hiperemesis gravidarum menunjukkan peran hormon estrogen dalam patogenesis penyakit ini, dengan tingkat serum Estradiol berkisar lebih dari 1200 pg / ml (Simanjuntak *et al.*, 2019).

Di sisi lain, sebuah studi kasus kontrol yang dilakukan pada hubungan antara infeksi *helicobacter pylori* dan hiperemesis gravidarum.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terdapat hubungan antara infeksi *helicobacter pylori* dan hiperemesis gravidarum dengan 75% kasus hiperemesis gravidarum memiliki *helicobacter pylori* positif pada pemeriksaan feses (Sophia, 2018).

Adapun teori lain yang ditemukan yakni kadar suPAR dan IL-6 trimester pertama terbukti meningkat secara signifikan pada wanita hamil dengan hiperemesis gravidarum dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penelitian ini merupakan penelitian yang menyelidiki hubungan antara kadar *Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor* dengan HG (Desdicioglu *et al.*, 2018).

5. Klasifikasi

Batasan seberapa banyak terjadinya mual muntah yang disebut hiperemesis gravidarum belum ada kesepakatannya. Akan tetapi jika keluhan mual muntah tersebut sampai memengaruhi keadaan umum ibu dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari sudah dapat dianggap sebagai hiperemesis gravidarum (Bottomley C, 2018). Hiperemesis gravidarum, menurut berat ringannya gejala dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat I: Muntah terus menerus yang memengaruhi keadaan umum penderita, ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung.
- b. Tingkat II: Penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang kadang naik dan mata sedikit ikterus. Berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan, karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing.

- c. Tingkat III: Keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai *Encephalopathy Wernicke* dengan gejala nistagmus, diploia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan, termasuk vitamin B kompleks (Bottomley C, 2018).

6. Penatalaksanaan

Pada pasien dengan hiperemesis gravidarum dapat dilakukan penanganan yaitu sebagai berikut :

a. Medikamentosa

Berikan obat-obatan seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun, harus diingat untuk tidak memberikan obat yang teratogenik. Obat-obatan yang dapat diberikan di antaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti *pyridoxine*. Pemberian pyridoxin cukup efektif dalam mengatasi keluhan mual dan muntah. Antihistamin yang dianjurkan adalah *doxylamine* dan *diphenhydramine*. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung memengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah (DA, 2021).

Oleh karena itu diberikan obat dopamin antagonis. Dopamin antagonis yang dianjurkan diantaranya *prochlorperazine*, *promethazine*, dan *metocloperamide*. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetron (DB, Dodds dan Joseph, 2017).

Ondansetron biasanya diberikan pada pasien hiperemesis gravidarum yang tidak membaik setelah diberikan obat-obatan yang lain. Sementara itu, pemberian kortikosteroid masih kontroversial

karena dikatakan pemberian pada kehamilan trimester pertama dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan cacat bawaan (DA, 2021).

b. Terapi Nutrisi

Pada kasus hiperemesis gravidarum jalur pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah, berat ringannya depleksi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya bila memungkinkan saluran cerna harus digunakan. Bila peroral menemui hambatan dicoba untuk menggunakan *nasogastric tube* (NGT) (Bottomley C, 2018).

Saluran cerna mempunyai banyak keuntungan misalnya dapat mengabsorpsi banyak nutrien, adanya mekanisme defensif untuk menanggulangi infeksi dan toksin. Selain itu, dengan masuknya sari makanan ke hati melalui saluran porta ikut menjaga pengaturan homeostasis nutrisi (DB, Dodds dan Joseph, 2017).

Bila penderita sudah dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil tetapi sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak, suplementasi besi dihindari untuk sementara, makanan yang emetogenik dan berbau dihindari sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Pemberian diet diperhitungkan jumlah kebutuhan basal kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kkal perharinya (Atika *et al.*, 2018).

c. Isolasi

Pasien disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Mencatat cairan yang keluar dan masuk. Pasien tidak diberikan makan ataupun minum selama 24 jam. Biasanya dengan isolasi saja gejala-gejala akan berkurang atau hilang tanpa pengobatan (Susanti dkk, 2021).

d. Terapi psikologi

Perlu diyakinkan kepada pasien bahwa penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan

persalinan karena itu merupakan proses fisiologis, kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatarbelakangi penyakit ini. Mual dan muntah dijelaskan sebagai gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda, dan akan menghilang setelah usia kehamilan 4 bulan (DB, Dodds dan Joseph, 2017).

e. Cairan parenteral

Resusitasi cairan merupakan prioritas utama, untuk mencegah mekanisme kompensasi yaitu vasokonstriksi dan gangguan perfusi uterus. Selama terjadi gangguan hemodinamik, uterus termasuk organ nonvital sehingga pasokan darah berkurang. Pada kasus hiperemesis gravidarum, jenis dehidrasi yang terjadi termasuk dalam dehidrasi karena kehilangan cairan (*pure dehydration*). Maka tindakan yang dilakukan adalah rehidrasi yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang ke volume normal, osmolaritas yang efektif dan komposisi cairan yang tepat untuk keseimbangan asam basa (DA, 2021).

D. Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum

Hormon hCG, kortisol, progesteron, dan estrogen diduga berperan dalam terjadinya mual dan muntah pada kehamilan. Walaupun pengaruh ini belum diketahui dengan pasti. Salah satu mekanisme yang mungkin terjadi yakni pada saat stress terjadi peningkatan hormon kortisol yang dapat menstimulasi peningkatan progesteron. Diduga bahwa peningkatan dari hormon ini dapat merangsang sistem saraf pusat dan melambatkan pengosongan lambung (Prawirohardjo, 2020).


Progesteron memiliki efek relaksan pada otot-otot dalam saluran pencernaan dan memperlambat proses pencernaan. Ini dapat menyebabkan makanan terperangkap lebih lama di dalam saluran pencernaan dan menimbulkan gejala seperti mual, muntah, dan kembung. Progesteron juga meningkatkan produksi asam lambung, yang dapat memperburuk gejala ini (Coquoz, Regli dan Stute, 2022). Disisi lain estrogen juga memiliki efek pada sistem pencernaan, termasuk memperlambat proses pencernaan. Estrogen dapat memperlambat kontraksi otot dalam saluran pencernaan dan

memperlambat proses pencernaan (Al-Shboul *et al.*, 2019).

Berdasarkan penelitian Rorrong dkk tahun 2021, semakin tinggi tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil maka akan semakin tinggi pula peluang untuk mengalami hiperemesis gravidarum. Kecemasan yang dirasakan ibu hamil tersebut akan memperburuk keadaan mual dan muntah yang dirasakannya sehingga akan mengalami mual muntah yang lebih berat lagi, hal tersebut akan memengaruhi keadaan umum dan mengganggu aktifitas sehari-hari selain itu juga akan mengganggu asupan nutrisi ibu hamil tersebut (Rorrong, M. dan Lumentut, 2021).




E. Kerangka Teori



Skema 2.1 Kerangka Teori

A. Kerangka Konsep



Skema 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan:

: Variabel Independen

: Variabel Dependen

: Variabel Perancu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik observasional melalui pendekatan *cross sectional* yaitu dengan mempelajari hubungan antara paparan (*exposure*) dan hasil (*outcome*).

B. *Lokasi dan Waktu Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023.

C. *Variabel Penelitian*

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil.

2. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan ibu hamil.

D. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang tercatat di rekam medik di RSIA Ananda Makassar pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 yang berjumlah 240 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang diteliti (observasi) dalam penelitian adalah pasien ibu hamil di RSIA Ananda yang terdiagnosis hiperemesis gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum. Adapun kriteria inklusi pada sampel yakni sebagai berikut.

- a. Ibu hamil trimester I yang terdiagnosis hiperemesis gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum.
- b. Ibu bersedia menjadi responden terkait penelitian yang akan dilakukan.

Adapun kriteria eksklusi pada sampel yakni sebagai berikut.

- a. Ibu dengan kehamilan yang tidak dikehendaki.
- b. Ibu yang tidak bersedia diwawancarai.
- c. Ibu dengan gangguan kejiwaan sehingga kehilangan kemampuan berpikir rasional.

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus besar sampel berdasarkan rumus slovin (Sugiyono, 2013):

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat signifikansi penelitian (p)

$$n = \frac{240}{1+240(0,05^2)}$$

n = 150 sampel.

Sehingga jumlah sampel minimal yakni 150 sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung pada ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum dan tidak hiperemesis gravidarum dengan menanyakan gejala yang dirasakan serta pemberian pertanyaan baik melalui proses wawancara maupun pengisian kuesioner demografi dan PASS untuk menilai tingkat kecemasan ibu hamil.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui catatan rekam medik RSIA Ananda Makassar pada ibu yang terdiagnosis secara medis mengalami hiperemesis gravidarum dan tidak mengalami hiperemesis gravidarum.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan pemberian kuesioner. Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden. Peneliti menggunakan kuesioner terbuka dan berbentuk *checklist* atau daftar cek yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek aspek yang akan diamati.

1. Kuesioner Demografi

Kuesioner ini merupakan kuesioner yang telah dimodifikasi dari kuesioner penelitian yang telah dilakukan oleh Sinta Ratnasari (2019) yang berisikan pertanyaan terbuka dan berbentuk *checklist* atau daftar cek mengenai data demografi responden yang merupakan bagian dari variabel independen. Adapun pertanyaan yang perlu dilengkapi oleh responden dalam kuesioner demografik antara lain nama/inisial ibu, usia, gravida, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

2. Kuesioner Kecemasan

Kuesioner PASS merupakan kuesioner pertama yang hingga saat ini mampu menyaring dan mencatat berbagai macam gangguan kecemasan secara khusus pada periode perinatal.

Perinatal Anxiety Screening Scale (PASS) adalah kuesioner yang terdiri dari 31 item penilaian yang menilai gejala kecemasan pada ibu hamil. Setiap item pertanyaan diberi skor dengan skala Likert 0–3; semakin tinggi total skornya, maka semakin tinggi pula derajat kecemasannya. Skor ini berkisar dari 0 sampai 93. Kecemasan secara klinis terlihat jika skor ≥ 26 . Namun, sebuah studi lebih lanjut mengelompokkan kategori kecemasan menjadi kecemasan minimal (skor 0-20), kecemasan ringan-sedang (21-41), dan gejala kecemasan berat (42-

93). Kuesioner PASS ini mempunyai tingkat reliabilitas yang memadai ($\rho = 0,74$), dengan sensitivitas 70% dan spesifisitas 30%. PASS menunjukkan validitas konvergen yang memadai, dengan skor globalnya secara signifikan berhubungan dengan kuesioner kecemasan EPDS dan dengan skor STAI-State dan STAI-Trait; keandalan kuesioner ini dinilai sangat baik untuk seluruh skala dengan nilai Cronbach $\alpha = 0,96$ (Koukopoulos *et al.*, 2021).

PASS terdiri dari 31 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban dengan pemberian skor.

- a. Skor 0 = tidak pernah
- b. Skor 1 = kadang-kadang
- c. Skor 2 = jawaban sering
- d. Skor 3 = selalu

Berdasarkan kategori skor dan tingkatan kuesioner PASS, skor kecemasan selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tidak cemas
- b. Cemas (cemas ringan, sedang dan berat)

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Editing

Editing adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran yang diperoleh atau dikumpulkan. Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran pada data tersebut.

b. Coding

Kuesioner yang telah disunting, selanjutnya dilakukan peng “kodean” atau “coding” yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi bilangan. Hal ini bertujuan agar pengolahan data menjadi lebih mudah.

c. Transferring

Data yang telah diberi kode kemudian disusun secara berurutan sesuai dengan klasifikasi data.

d. Tabulating

Tabulasi dilakukan dengan meringkas data yang masuk dalam tabel-tabel yang telah disiapkan tabel dengan kolom dan baris yang disusun dengan cermat sesuai kebutuhan atau mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel tujuan agar data yang telah tersusun rapi mudah dibaca dan dianalisis.

2. Analisis Data

Pada tahap ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik SPSS yang meliputi analisis univariat dan analisis bivariat :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari variabel dependen serta variabel independen (Heryana, 2020).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat menjabarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *chi square* dengan menggunakan aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS 23).

H. Alur Penelitian



Penyajian Data

Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

I. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor surat keterangan layak etik E.060/KEPK/FKIK/II/2023. Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. *Respect for the person*

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri.

2. *Beneficence and nonmaleficence*

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat baik dan tidak merugikan siapapun.

3. *Justice*

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketidakmampuan masyarakat.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Analisis Univariat

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar

Variabel	Frekuensi	
	<i>n</i>	%
Usia		
a. <20tahun	0	0,0
b. 20-35 tahun	181	97,8
c. >35 tahun	4	2,2
Pekerjaan		
a. IRT	139	75,1
b. Wiraswasta	11	5,9
c. Karyawan	10	5,4
d. PNS	4	2,2
e. Guru/dosen	21	11,3
Pendidikan Terakhir		
a. Tidak sekolah	3	1,6
b. SD	7	3,8
c. SMP/MTs	15	8,1
d. SMA/SMK/MA	78	42,0
e. Diploma/S1/S2/S2	82	44,7
Riwayat Obstetri		
a. Primipara	83	44,9
b. Multipara	102	55,1
Tingkat Kecemasan Ibu Hamil		
a. Tidak cemas	101	54,6
b. Cemas	84	45,5
Hiperemesis Gravidarum		
a. Hiperemesis gravidarum	94	50,8
b. Tidak hiperemesis gravidarum	91	49,2
Total	185	100,0

(Sumber: Data Primer, 2023)

Karakteristik responden disajikan dalam tabel 4.1 yakni 185 sampel dengan ibu berusia 20-35 tahun berjumlah 181 orang (97,8%) dan ibu usia >35 tahun berjumlah 4 orang (2,2%). Pada jenis pekerjaan ibu sebagian ibu

tidak bekerja/IRT berjumlah 139 orang (75,1%), ibu dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 11 orang (5,9%), karyawan sebanyak 10 orang (5,4%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 4 orang (2,2%), dan guru/dosen non PNS sebanyak 21 orang (10,8%). Pada pendidikan terakhir ibu sebagian besar ibu berpendidikan pendidikan tinggi Diploma/S1/S2/S3 sebanyak 82 orang (44,3%), sementara pendidikan SD sebanyak 7 orang (3,8%), pendidikan SMP/MTs sebanyak 15 orang (8,1%), dan SMA/SMK/MA sederajat sebanyak 78 orang (42,2%). Berdasarkan riwayat obstetri sebagian ibu multipara sebanyak 102 orang (55,1%), sedangkan ibu primipara sebanyak 83 orang (44,9%). Berdasarkan tingkat kecemasan ibu, sebagian besar ibu tidak mengalami cemas sebanyak 101 orang (54,6%), sedangkan ibu yang mengalami cemas sebanyak 84 orang (45,4%) diantaranya cemas ringan sebanyak 39 orang (21,1%), cemas sedang sebanyak 35 orang (18,9%), dan cemas berat sebanyak 1 orang (0,5%). Pada sampel yang didapatkan ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 94 orang (50,8%), sedangkan ibu yang tidak mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 91 orang (49,2%).

2. Hasil Bivariat

Tabel 4.2 Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar

Kecemasan	Tidak Hiperemesis Gravidarum		Hiperemesis Gravidarum		Total		<i>p-value</i>
	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
Tidak Cemas	65	35,1	36	19,5	101	54,6	0,000
Cemas	26	14,1	58	31,4	84	45,4	
Total	91	49,2	94	50,8	185	100,0	

(Sumber: Data Primer, 2023)

Tabulasi silang variabel kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum dijelaskan dalam tabel 4.2. Ibu hamil yang tidak cemas tidak mengalami hiperemesis gravidarum dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang (35,1%), sedangkan ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum

sebanyak 36 orang (19,5%). Sementara ibu yang merasakan cemas tidak mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 26 orang (14,1%), sedangkan ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum sebesar 58 orang (31,4%). Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000 (nilai *p-value*<0,05).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil distribusi responden sebanyak 185 orang pada karakteristik ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023 menurut usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan riwayat obstetri menunjukkan ibu hamil berusia 20-35 tahun. Pada pekerjaan ibu hamil menunjukkan IRT, pendidikan terakhir ibu berpendidikan Diploma/S1/S2/S3, sedangkan riwayat obstetri merupakan ibu multipara.

Pada hubungan antara tingkat kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum menunjukkan ibu hamil yang tidak merasakan cemas tidak mengalami hiperemesis gravidarum dibandingkan ibu yang merasakan cemas mengalami hiperemesis gravidarum. Hasil uji *Chi-Square* menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang menunjukkan terdapat hubungan antara kedua variabel sehingga dalam penelitian ini hipotesis nol ditolak sehingga hipotesis alternatif dapat diterima yakni terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Heny dkk (2022) bahwa hampir sebagian ibu hamil mengalami stress berupa cemas dan mengalami morning sickness dengan uji *Chi-Square* menunjukkan nilai $p=0,05$, sehingga Henny dkk berasumsi bahwa kecemasan mempengaruhi derajat *morning sickness* atau kejadian hiperemesis pada ibu hamil. Faktor psikologis berupa cemas yang mempengaruhi *morning sickness* meliputi ibu hamil cemas hingga takut terhadap kehamilan dan persalinan, rumah tangga retak, atau takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu dapat mengakibatkan konflik mental yang memperberat mual muntah sebagai ekspresi terhadap keengganan menjadi hamil (Heny dkk, 2022).

Stress mempengaruhi hipotalamus serta memberi rangsangan pada pusat muntah di otak sehingga terjadi kontraksi otot abdomen dan otot dada yang disertai penurunan diafragma dan mengakibatkan naiknya tekanan dalam lambung, kemudian memaksa ibu menarik nafas dalam-dalam sehingga membuat sfingter esofagus bagian atas terbuka dan bagian bawah berelaksasi. Inilah yang memicu gejala mual dan muntah pada ibu (Susanti, Lainsamputty dan Iestari, 2021).

Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan Rorrong (2021) didapatkan hasil bahwa pasien dengan emesis gravidarum atau mual muntah memiliki skor depresi dan kecemasan lebih tinggi daripada pasien pada kasus kontrol yang tidak mengalami emesis gravidarum. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kecemasan dan depresi mungkin terlibat dalam terjadinya emesis gravidarum dan dukungan psikologis tambahan diperlukan selama perawatan dan tindak lanjut pada pasien emesis gravidarum (Rorrong, 2021).

Faktor psikososial yang memengaruhi stres memegang peranan yang penting. Stres yang terjadi pada seorang wanita hamil yang hamil dikarenakan terjadi perubahan pada masa kehamilan. Perubahan yang terjadi pada diri sang ibu akibat perubahan hormonal memengaruhi perubahan fisik pada diri ibu itu sendiri. Seperti hal perubahan bentuk tubuh yang semakin membesar, pertumbuhan jerawat yang banyak, keluhan mual dan muntah. Stres dapat terjadi pula karena tekanan psikologi. Contohnya wanita yang belum siap menerima kehamilannya, takut akan kehilangan pekerjaannya karena hamil. Perubahan yang terjadi pada waktu kehamilan tidak semua bisa diterima dengan baik oleh seorang ibu hamil. Ada ibu hamil yang dapat merespon dengan baik. Ibu hamil yang bisa menerima perubahan dengan baik akan menjalani masa kehamilannya dengan baik (Yazia dan Suryani, 2022).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Kartikasari (2018) bahwa tingkat kecemasan yang tinggi pada ibu hamil menyebabkan mual dan muntah semakin berat yang dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum. Adanya masalah psikologis pada ibu hamil dapat menjadi predisposisi dalam mengalami hiperemesis gravidarum (Kartikasari, 2018). Perubahan yang terjadi akan dianggap sebagai suatu hal normal atau wajar-wajar saja. Stres yang dirasakan ibu dapat dikendalikan

sebelum menjadi bertambah parah. Stres dapat dikendalikan dengan berolahraga, melarikan diri atau melawan (*fight or flight*) berkomunikasi dengan suami dan keluarga dengan baik, meminta dukungan suami untuk semua hal yang dilakukan. Sebagian besar responden memiliki dukungan suami yang kurang (Rorrong, 2021).

Morning sickness berdampak terhadap kondisi fisik, psikis serta kualitas hidup ibu hamil. Kondisi mual dan muntah mulai terjadi sejak minggu keempat gestasi dan keadaan ini dialami oleh 85% ibu hamil. Etiologi pasti dari kondisi ini masih belum diketahui tapi studi menunjukkan adanya korelasi antara faktor biologis, fisiologis, psikologis, dan sosiokultural. Faktor psikologis yang mempengaruhi kehamilan bisa dari kondisi latar belakang psikologis ibu sendiri dan perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan (Wulandari, 2021).

Saat kehamilan, terjadi peningkatan hormon *human chorionic gonadotropin* (HCG) dan norepinefrin di dalam tubuh ibu hamil. Fluktuasi hormon-hormon ini menyebabkan disregulasi biokimia dalam tubuh ibu hamil sehingga muncul ketegangan pada ibu hamil yang menyebabkan kesulitan untuk fokus, merasa mual, mudah tersinggung, dan gelisah (Retnoningtyas dan Dewi, 2021).

Morning sickness dalam keadaan normal tidak banyak menimbulkan efek negatif terhadap kehamilan dan janin tapi jika kondisi ini menjadi lebih parah dan berubah menjadi hiperemesis gravidarum maka terdapat risiko terjadinya gangguan kehamilan. Ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum akan berisiko tinggi mengalami dehidrasi, kekurangan karbohidrat dan lemak, serta dalam kondisi ekstrim akan menimbulkan robek pada selaput mukosa esofagus dan lambung (Miranti, 2021).

Kesehatan psikologis ibu hamil juga lebih banyak pada peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Kecemasan kerap disebabkan oleh situasi yang tengah meliputi pasien, gangguan saluran pernafasan, berkurangnya kegiatan sosial, perasaan terhadap penolakan oleh masyarakat dan dinamika sosial masyarakat yang berubah drastis (Retni dkk, 2020). Gangguan psikologi selama kehamilan dalam literasi yang ada telah dikaitkan dengan berbagai macam komplikasi seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, pertumbuhan janin terhambat, dan komplikasi pasca kelahiran. Selain itu, gangguan psikologis ini juga dikaitkan ada

dengan munculnya hipertensi saat kehamilan, preeklamsia, serta diabetes gestasional (Alamwiyah dan Mawardika, 2020).

Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian hiperemesis pada ibu hamil adalah usia, paritas, jarak kehamilan, pekerjaan dan pengetahuan. Usia 20-35 tahun dianggap usia yang produktif bagi ibu untuk menjalani masa kehamilan. Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan usia ibu 20-35 tahun sebanyak 181 responden (97,8%), usia ibu >35 tahun didapatkan 4 responden (2,2%). Ibu hamil lebih beresiko menderita hiperemesis gravidarum pada usia <20 tahun dan >35 tahun. Pada usia yang lebih muda fisiologi dan fungsional Rahim seorang ibu belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan secara psikologis belum siap untuk hamil sehingga terjadi konflik mental yang membuat ibu tidak memperhatikan nutrisinya yang dapat menyebabkan iritasi pada mukosa lambung sehingga dapat memberikan rangsangan pada pusat muntah. Sedangkan untuk ibu yang usianya lebih tua atau >35 tahun fungsi organ reproduksi sudah mulai menurun dan secara fisiologis dan secara fisiologis ibu merasa tidak sanggup lagi untuk hamil yang dapat memicu stress (Husna *et al*, 2022)

Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan ibu hamil primipara sebanyak 83 responden (44,9%) dan ibu hamil multipara 102 responden (55,1%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paskana (2020) ibu primipara yang mengalami hiperemesis gravidarum mempunyai prestasi yang lebih besar dari ibu multipara. Hal ini dapat disebabkan karena pada ibu hamil primipara belum memiliki baik secara fisik maupun psikologis dalam menghadapi perubahan selama kehamilan. Kejadian hiperemesis gravidarum 60-80% terjadi pada ibu primipara dan 40-60% terjadi pada ibu multipara. Hal ini disebabkan Ibu belum mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan peningkatan kadar hormon estrogen dan *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG) yang dapat memberikan efek mual dan muntah. Keluhan mual muntah biasanya terjadi pada pagi hari saat perut kosong dan terjadi karena peningkatan asam lambung (Paskana dan Gusnidarsih, 2020)

Selain itu, hiperemesis gravidarum dapat terjadi dengan lebih berat dikarenakan jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jarak kehamilan yang terlalu dekat

menyebabkan ibu mempunyai waktu yang singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak yang terlalu dekat beresiko terjadi hiperemesis gravidarum. Hal ini disebabkan karena keadaan ibu yang belum normal sebagaimana seperti sebelum hamil namun sudah harus bereproduksi lagi untuk kehamilan selanjutnya (Nurhasanah *et al*, 2022).

Faktor dari pekerjaan ibu hamil bukanlah salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Akan tetapi, masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab ibu hamil mengalami hiperemesis gravidarum. Berdasarkan hasil analisis univariat didapatkan bahwa IRT sebanyak 139 responden (75,1%), guru/dosen 21 responden (11,3%), karyawan 11 responden (5,9%), wiraswasta 11 responden (5,9%). Hiperemesis gravidarum lebih sering terdapat pada wanita dan keluarga tidak mampu karena wanita dari keluarga tidak mampu banyak yang belum siap mempunyai anak dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan (Nurhasanah *et al*, 2022).

Pendidikan ibu juga dapat menjadi salah satu faktor kejadian hiperemesis gravidarum. Berdasarkan analisis univariat didapatkan pendidikan ibu Diploma/S1/S2/S3 sebanyak 82 responden (44,7%), SMA/SMK/MA sebanyak 78 responden (42%), SMP/MTs 15 responden (8,1%), SD 7 responden (3,8%), tidak sekolah 3 responden (1,6%). Menurut penelitian Yulia Anggraini (2020) Ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi lebih rajin melakukan kontrol ke fasilitas kesehatan serta lebih banyak mencari informasi kesehatan baik melalui media, internet serta dari tenaga kesehatan mengenai kejadian hiperemesis gravidarum. Sedangkan ibu hamil dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, cenderung mempunyai sedikit keinginan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan sehingga kejadian hiperemesis gravidarum kurang cepat terdeteksi dan penanganannya pun akan lambat. Oleh sebab itu, cara untuk lebih meningkatkan

pengetahuan ibu hamil yaitu dapat memberikan penyuluhan tentang hiperemesis gravidarum. Perilaku yang baik didasari dari pengetahuan yang baik pula dibandingkan tidak didasari oleh keilmuan tersebut. Jadi, memberikan informasi mengenai hiperemesis gravidarum sangat penting dan dibutuhkan oleh ibu hamil selama kehamilan (Anggraini *et al*, 2022).

Maka dari itu semakin tinggi tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil maka akan semakin tinggi pula peluang untuk mengalami hiperemesis gravidarum. Kecemasan yang dirasakan ibu hamil tersebut akan memperburuk keadaan mual dan muntah yang dirasakannya sehingga akan mengalami mual muntah yang lebih berat lagi, hal tersebut akan memengaruhi keadaan umum dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan penelitian Susanti, dkk (2021) semakin tinggi tingkat kecemasan yang dirasakan oleh ibu hamil maka akan semakin tinggi pula peluang untuk mengalami hiperemesis gravidarum. Kecemasan yang dirasakan ibu hamil tersebut akan memperburuk keadaan mual dan muntah yang dirasakannya sehingga akan mengalami mual muntah yang lebih berat lagi. Hal tersebut akan memengaruhi keadaan umum dan mengganggu aktivitas sehari-hari selain itu juga akan mengganggu asupan nutrisi ibu hamil tersebut (Susanti dkk, 2021)

Al-Qur'an telah memberikan jalan keluar bagi seseorang yang telah mengalami kecemasan. Jalan keluar ini merupakan yang dapat menghadirkan rasa *tuma'ninah*, memberikan perasaan tenang dan tentram yang mendalam sebagai anugerah Allah (Nasaruddin, 2018). Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS ar-Rad/13:28 yaitu.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.”

Allah menjelaskan seseorang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat dan menyebut Allah Swt. Maksudnya, hati itu menjadi lebih baik karena bersandar kepada Allah, dan ridha Allah sebagai pelindung dan penolong. Dzikirnya seorang hamba ketika menyebut-nyebut Rabb-Nya dengan bertasbih, bertahlil (membaca *Laa ilaaha Illallah*), bertakbir dan dzikir-dzikir lainnya (Istianah, 2020).

Namun ada yang berpendapat, yang dimaksudkan dengan dzikrullah (dzikir pada ayat diatas) ialah Kitab-Nya (Al-Quran) yang diturunkan sebagai pengingat bagi kaum Mukminin. Berdasarkan pendapat ini, maka makna 'hati menjadi tenteram dengan dzikrullah' ialah, manakala hati memahami makna makna Al-Quran serta hukum-hukumnya, hati akan menjadi tentram (Nasaruddin, 2018).

Sesungguhnya makna-makna serta hukum-hukum Al-Qur-an memberikan bukti tentang kebenaran yang nyata, didukung dengan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Dengan cara demikianlah hati menjadi tenteram. Maka solusi di dalam Al-Quran untuk menanggulangi kecemasan adalah dengan membacanya, kemudian memahami makna-maknanya, mengetahui hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran yang dapat mengarahkan hidup manusia ini ke arah yang lebih baik, kemudian mengaplikasikan isi Al-Quran tersebut ke dalam segala laku kehidupan. Jadi apapun yang dilakukan, sesibuk apapun aktivitas, Al-Quran tetap menjadi prioritas, karena Al-Quran laksana oksigen bagi hamba-hamba Allah yang beriman.

Hiperemesis gravidarum diperumit oleh faktor sekunder yang dapat memperburuk gejala tetapi sendiri bukan penyebab hiperemesis gravidarum. Misalnya, disfungsi kandung empedu yang dapat memperburuk hiperemesis gravidarum, tetapi kolesistektomi tidak mampu menyembuhkan hiperemesis gravidarum. Adanya *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) pada setengah dari populasi dunia terinfeksi akan memperburuk hiperemesis gravidarum karena terjadi perubahan dalam motilitas usus dan pengosongan lambung, serta diperburuk oleh gizi buruk, dan perubahan hormonal dan imunologi kehamilan (DA, 2021). Hiperemesis gravidarum memiliki efek samping yang serius pada hampir setiap aspek hidup seorang wanita. Ketika gejala wanita diberhentikan, gejala yang lebih

parah dapat berkembang, dan wanita mungkin enggan mencari pengobatan. Ini kontraproduktif, karena pengobatan yang tertunda dapat menyebabkan gejala refrakter dan peningkatan risiko komplikasi (DA, 2021).

Wanita dengan hiperemesis gravidarum berat dapat mengalami kerusakan retina, pneumotoraks, disfungsi hati dan kandung empedu, robekan esofagus, organ pecah atau gagal, sepsis, dan banyak komplikasi yang buruk nutrisi, termasuk kerusakan jantung dan neurologis. Kematian masih terjadi karena malnutrisi, ruptur esofagus, sepsis, dan bunuh diri. Wanita dengan berkepanjangan gejala lebih cenderung mengalami hematemesis, pingsan, depresi, GERD, kecemasan, dan air liur berlebihan. Seseorang yang mengalami hiperemesis gravidarum juga lebih cenderung melaporkan masalah pasca persalinan, seperti trauma, mabuk perjalanan, kelemahan otot, dan kecemasan. Imobilitas yang berkepanjangan dapat menyebabkan otot yang parah atrofi, depresi, dan trombosis, selain sensorik gangguan pemrosesan pada anak. Risiko tromboemboli juga meningkat karena perubahan terkait kehamilan dan penggunaan kateter IV (DA, 2021).

Ibu hamil dengan kecemasan atau stres semasa kehamilan memiliki tingkat aborsi spontan yang tinggi dan meningkatkan terjadinya kelahiran prematur. Selain itu, jika seorang ibu mengalami stres yang berat pada masa kehamilan, anaknya lebih mungkin untuk mengalami masalah emosional dan kognitif. Oleh karena itu, diagnosis dini hiperemesis gravidarum sangat diperlukan secara klinis.

Hal ini juga untuk menghindari berbagai komplikasi yang mungkin terjadi seperti defisiensi vitamin B1 dan K pada ibu, *encephalopathy wernicke* pada janin, kelahiran prematur, *intrauterine growth restriction* (IUGR), dan gangguan kejiwaan pada masa dewasa. *American College of Obstetricians and Gynecologist* (ACOG) menyarankan agar pengobatan dini segera dilakukan untuk mencegah komplikasi hiperemesis gravidarum yang lebih parah (Bottomley C, 2018).

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar selama meneliti untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada

ibu hamil dengan keterbatasan yang didapatkan selama penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengetahui besar faktor risiko kecemasan ibu hamil di RSIA Ananda Makassar. Dalam melakukan penelitian ini dan peneliti selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup panjang agar mampu mengukur risiko lain yang dapat mempengaruhi hiperemesis gravidarum.
2. Beberapa responden yang mengisi kuesioner mengalami mual dan muntah yang berlebihan sehingga dalam wawancara kurang maksimal. Keterbatasan responden karena kondisi yang kurang stabil menyebabkan sampel yang didapatkan kurang objektif dalam menjawab pertanyaan pada saat wawancara, serta minat responden menjadi sampel pada penelitian ini berkurang.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023.

B. Saran

1. Bagi instansi kesehatan:
 - a. Perlunya mengadakan penyuluhan ibu hamil tentang tingkat kecemasan dan pemahaman mengenai hiperemesis gravidarum pada ibu hamil agar dapat dicegah sedini mungkin.
 - b. Perlunya untuk melakukan edukasi mengenai masalah kecemasan dan kondisi hiperemesis gravidarum pada ibu hamil saat melakukan pemeriksaan *Antenatal Care (ANC)*.
2. Bagi ibu hamil:
 - a. Diharapkan agar dapat aktif mengikuti setiap penyuluhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan serta aktif untuk berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan konsultasi dengan para dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
 - b. Diharapkan adanya penyuluhan tentang pentingnya usia reproduksi sehat, ruang dan penyediaan jasa konseling khusus bagi ibu hamil yang mengalami kecemasan dan kejadian hiperemesis gravidarum dengan menambah jadwal kelas ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat lebih rutin memeriksakan kehamilannya dan menjadi tempat berbagi pengalaman guna mengurangi tingkat kecemasan pada ibu hamil.
3. Bagi peneliti selanjutnya:

Diharapkan lebih memperhatikan variabel-variabel lain seperti pengetahuan tentang kecemasan, kondisi medis, status lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas kesehatan yang mempengaruhi kecemasan pada ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shboul, O. A. *et al.* (2019) “Changes In Gastric Smooth Muscle Cell Contraction During Pregnancy: Effect Of Estrogen,” *Journal of pregnancy*, 2019.
- Amiri, P. *et al.* (2022) “Validation Of The Persian Version Of The Perinatal Anxiety Screening Scale (Pass) Among Antenatal And Postnatal Women,” *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), hal. 1–10.
- Anggraini, Y. *et al.* (2022) “Analisis Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Tahun 2020” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), hal. 711-715.
- Aniroh, U. dan Fatimah, R. F. (2019) “Tingkat Kecemasan Ibu Primigravida dalam Menghadapi Persalinan Ditinjau dari Usia Ibu dan Sosial Ekonomi,” *Jurnal Ilmu Keperawatan Maternitas*, 2(2). doi: 10.32584/jikm.v2i2.374.
- Atika, I. *et al.* (2018) “Hubungan Hiperemesis Gravidarum dengan Usia Ibu, Usia Gestasi, Paritas, dan Pekerjaan pada Pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 3(3), hal. 171.
- Ayu, S. *et al.* (2022) “Kecemasan Ibu Hamil di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), hal. 2723–2733.
- Bottomley C, B. T. (2018) “Management strategies for hyperemesis,” *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*, 34(2).
- Bystritsky, A., Sahib, S. K., Michael, E. C., *et al.* (2013). “Current Diagnosis and Treatment of Anxiety Disorders,” *Pharmacy and Therapeutics*, 38(1).
- Campbell, E. *et al.* (2018) “Overview Of Psychophysiological Stress And The Implications For Junior Athletes,” *Am. J. Sports Sci. Med*, 6(3), hal. 72–78.
- Coquoz, A., Regli, D. dan Stute, P. (2022) “Impact Of Progesterone On The Gastrointestinal Tract: A Comprehensive Literature Review,” *Climacteric*, 25(4), hal. 337–361.
- Cunningham (2012) “Obstetri Williams,” *EGC, Jakarta*, 23.

- DA, R. (2021) "Hyperemesis Gravidarum Nutrition Care," *Journal of Nutrition and Health*, 9(1), hal. 2622–2635.
- DB, F., Dodds dan Joseph (2017) "Risk factors for hyperemesis gravidarum requiring hospital admission during pregnancy," *Obstetry Gynecology*, 66(4).
- Dewi, A. D. C. *et al.* (2021) "Kecemasan Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Covid 19 di RSUD Ibnu Sutowo Baturaja," *Jurnal Smart Keperawatan*, 8(1), hal. 64–69.
- DPRRI (2021) *DAK Fisik Bidang Kesehatan Dalam Mendukung Target Penurunan AKI*. Jakarta.
- Gabra, A., Habib, H. dan Gabra, M. (2019) "Hyperemesis Gravidarum, Diagnosis, and Pathogenesis," *Critical Care Obstetrics and Gynecology*, 05(01), hal. 1–5. Tersedia pada: <https://doi.org/10.21767/2471-9803.1000172>.
- Fauziah, N *et al.* (2018) "Parents Anxiety Towards Juvenile Delinquency Phenomenon," *NurseLine Journal*, 3(2).
- Gabra, A. (2018) "Risk Factors of Hyperemesis Gravidarum: Review Article," *Health Science Journal*, 12(6), DOI: 10.21767/1791-809X.1000603
- Ganong, W. F. *et al.* (2014) *Ganong Buku Ajar Fisiologi Kedokteran Edisi 24*, Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Guyton, A. C. dan Hall, J. E. (2014) *Guyton dan Hall Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Edisi 12.*, Elsevier Jakarta : EGC,.
- Halisa, N. dan Maulida, N. I. (2017) "Analisis Id, Ego, Dan Superego Novel Pasung Jiwa Karya Oky Madasari Menggunakan Pendekatan Psikologi Sastra," *Jurnal Bahasa dan Sastra*.
- Hamka (2017) *Tafsir Al-Azhar*. Depok: Gema Insani.
- Handayani, P. A. dan Ratnasari, R. (2019) "Pengaruh Physical Exercise Terhadap Tingkat Stress Pada Ibu Bekerja Di Sekolah Tinggi Kesehatan," *Holistic Nursing and Health Science*, 2(2), hal. 48–55.
- Hardiyanti, A. (2017) *Pengaruh Status Sosial dan Kondisi Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa SD 25 Madellokabupaten Soppeng*. Universitas Negeri Makassar.

- Harianto, M. H. dan Putri, E. A. (2020) “Hubungan Antara Tingkat Kecemasan dengan Kualitas Tidur pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III di Rumah Sakit Bersalin Jeumpa Kota Pontianak,” *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan: Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 7(3), hal. 183–188.
- Harini, I. G. A. A. D. *et al.* (2022) “Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kota Denpasar, Bali, Indonesia,” *Jurnal Medika Udayana*, 11(2).
- Husna. *et al.* (2022) “Hubungan Umur Ibu Hamil Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dhamasraya” *Preopotif Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(3).
- Ibrahim, SA (2012) “Panik Neurosis dan Gangguan Cemas. Edisi Pertama. Tangerang: Penerbit Jelajah Nusa.
- IHME (2017) “Global Burden of Disease Study 2016 (GBD 2016) Results,” *Global Burden of Disease Collaborative Network*, 2016(GBD 2016).
- Imaniah, H. N. P. (2017) “Pengaruh Keikutsertaan Senam Hamil Terhadap Skor Kecemasan Primigravida Trimester Ketiga Dalam Menghadapi Persalinan.” University of Muhammadiyah Malang.
- Istianah (2020) “Shalat Sebagai Perjalanan Ruhani Menuju Allah,” *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 1(1). doi: 10.21043/esoterik.v1i1.943.
- Kemendes RI (2018) “Laporan Nasional Riskesdas 2018,” *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Koukopoulos, A. *et al.* (2021) “Psychometric Properties Of The Perinatal Anxiety Screening Scale Administered To Italian Women In The Perinatal Period,” *Frontiers in Psychiatry*, 12, hal. 684579.
- Karauwan, M.Z. (2020) “refleksi Kecemasan Dakam Final Destination” *Universitas Sam Ratulangi*. Manado
- Kusuma, R. (2017) *Pemahaman Mahasiswa Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Atas Ayat-Ayat Musibah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan

Filsafat, 2017.

- Mardhiyah, A. (2020) “Kecemasan Menjelang Kelahiran Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga,” *SELL Journal*, 5(1).
- Mellani, N. L. P. K. (2021) “Gambaran Tingkat Kecemasan Anak Remaja pada Masa Pandemi COVID-19 Di SMA NEGERI 8 Wilayah Kerja Puskesmas III Denpasar Utara Tahun 2021.” Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Miranti, N. (2021) “Perbedaan Efektivitas Pemberian Aromaterapi Peppermint Dan Akupresur Terhadap Penurunan Emesis Gravidraum Pada Ibu Hamil Trimester I Di Tempat Praktik Mandiri Bidan Wilayah Tegineneng Pesawaran.” Poltekkes Tanjungkarang.
- Naru Nafis, W. (2021) “Perbedaan Kecemasan dalam menghadapi Dunia Kerja pada siswa SMA dan SMK Surabaya.” Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Nasaruddin, M. W. (2018) *Gangguan Kecemasan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Psikologi)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ni'mah, J. (2018) “Kecemasan Sebagai Pencetus Sindrom Dispepsia.” Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Nugroho, M. A. (2022) *The Correlation Between The Intensity Of Prayer And The Level Of Anxiety For 2018-2020 Medical Students At The University Of Muhammadiyah Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurhasanah. *et al.* (2022) “Hubungan jarak Kehamilan, Pekerjaan dan Paritas Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), hal. 736-741. doi : 10.33087/jiubj.v22i2.1800
- Paskana, K. dan Gusnidarsih, V. (2020) “Hubungan Paritas Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil” *Jurnal Asuhan Ibu dan Anak*, 5(2).
- Pradhan, K., Baru, L. dan Dharua, A. (2019) “Pregnancy Outcome In Elderly Primigravida,” *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 8(12). doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20195172.

- Pramestia Utari, D. (2018) “Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Tentang Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Dini pada Bayi Usia 0-6 Bulan.” Jurusan Kebidanan 2018.
- Qibtiyah, M. (2018) “Peningkatan Kemampuan Memahami Iman Kepada Allah Dengan Menggunakan Metode Smart Game (Tepuk Sifat Wajib Dan Mustahil) Dalam Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Pada Siswa Kelas VII B SMPN 2 PANTI Kabupaten Jember,” *Jurnal Diklat Keagamaan*, 12(2), hal. 107–119.
- Rahma, M. dan Restu, T. (2017) “Asuhan pada Ibu Hamil Trimester I dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I,” *Midwife Journal*, 2(2).
- Rahmita, N. (2017) *Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester Ketiga di Puskesmas Kecamatan Tamalanrea Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Ratnasari, S. I. (2019) *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- Retnoningtyas, R. D. S. dan Dewi, R. K. (2021) “Pengaruh Hormon Human Chorionic Gonadotropin dan Usia Ibu Hamil terhadap Emesis Gravidarum pada Kehamilan Trimester Pertama,” *Jurnal Tadris IPA Indonesia*, 1(3), hal. 394–402. doi: 10.21154/jtii.v1i3.306.
- Rorrong, J. F., M., J. J. E. W. A. dan Lumentut (2021) “Hubungan Psikologis Ibu Hamil dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum,” *e-Clinic Journal*, 9(1), hal. 218–2223.
- Sadock, B. J. dan Sadock, V. A. (2015) *Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry, 11th ed., Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry, 11th ed.*
- Safitri, A. N. K. (2022) *Analisis Faktor Risiko Kecemasan Ibu Hamil Trimester Iii Di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021*. UIN Alauddin Makassar.
- Simanjuntak, T.P. et al. (2019) “Hyperemesis gravidarum: A holistic review and approach to etiopathogenesis, clinical diagnostic and management therapy,” *Journal of SAFOG*, 11(4), hal. 266–272. Tersedia pada: <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10006-1700>.

- Sari, W. N. I. (2018) “Hubungan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester III Di Puskesmas Mlati II Sleman,” *Jurnal Ilmiah Bidan*, I(3).
- Sari, W. N. I. (2019) “Hubungan Dukungan Suami Dengan Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Pada Ibu Hamil Primigravida Trimester Iii Di Puskesmas Mlati Ii Sleman.”
- Siallagan, D. dan Lestari, D. (2018) “Tingkat Kecemasan Menghadapi Persalinan Berdasarkan Status Kesehatan, Graviditas Dan Usia di Wilayah Kerja Puskesmas Jombang,” *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 1(2). doi: 10.35473/ijm.v1i2.101.
- Somerville, S. *et al.* (2014) “The Perinatal Anxiety screening Scale: Development Preliminary Validation,” *Arch Womens Mental Helath*, 17, hal. 443–454.
- Somerville, S. *et al.* (2015) “Detecting The Severity Of Perinatal Anxiety With The Perinatal Anxiety Screening Scale (Pass),” *Journal of affective disorders*, 186, hal. 18–25.
- Ströhle, A., Gensichen, J. dan Domschke, K. (2018) “The Diagnosis And Treatment Of Anxiety Disorders,” *Deutsches Ärzteblatt International*, 115(37), hal. 611.
- Stuart, G.W. (2013) “Buku Saku Keperawatan Jiwa ed. 5” EGC, Jakarta
- Sulistyowati, A., Putra, K. W. R. dan Umami, R. (2017) “Hubungan antara Usia dan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Perawatan Payudara selama Hamil di Poli Kandungan RSUD Jasem, Sidoarjo,” *Nurse and Health: Jurnal Keperawatan*, 6(2), hal. 40–43.
- Susanti, N. M. D., Lainsamputty, F. dan Ilestari, V. (2021) “Stres dengan Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), hal. 635–642. doi: 10.35816/jiskh.v10i2.670.
- Tasbih, T. (2018) “KONSEP AMAL SALEH MENURUT AL-QURAN,” *AL ASAS*, 1(2), hal. 23–35.
- UU Sisdiknas, N. 20 (2003) “Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” *Records Management Journal*, 1(2).
- Verberg, M. F. G. *et al.* (2005) “Hyperemesis gravidarum, a literature review,”

- Human Reproduction Update*, 11(5), hal. 527–539. doi: 10.1093/humupd/dmi021.
- Videbeck, S. L. (2020) *Psychiatric-Mental Health Nursing: Eighth Edition*, Wolters Kluwer.
- Widigda, I.R, Setyanigrum, W. (2018) "Kecemasan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Riau Kepulauan Dalam Menghadapi Skripsi" *Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains*, 6(2), hal.190-199.
- WHO (2019) "WHO Maternal Mortality Paper," *WHO*.
- Wiwikarnilah, A. (2022) *Penerapan Teknik Guided Imagery Untuk Mengurangi Kecemasan Berbicara Di Depan Umum Pada Siswa Smp Negeri 7 Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Yamaluddin, H. (2017) *Hubungan Antara Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Wilayah Kerja Puskesmas Kedungbanteng Tahun 2017*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Yazia, V. dan Suryani, U. (2022) "Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Stres pada Ibu Hamil dalam Menghadapi Persalinan," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 10(4), hal. 837–856.
- Zainiyah, Z. *et al.* (2019) "Kurangi Emesis Gravidarum dengan Aroma Jeruk Nipis," *Jurnal Paradigma*, 1(2), hal. 2807–923.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Menjadi Responden

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Kedokteran. Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar:

Nama : Muthiaturrahmah Syafiuddin
NIM : 70600118039
Judul Penelitian : Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kepada saudari untuk berkenan menjadi responden dalam penelitian. Partisipasi saudari sangat dibutuhkan sebagai data penelitian dan semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tidak ada maksud lain. Semua data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti.

Dengan kesediaan dan bantuan yang telah saudari berikan, penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Makassar,2023

Peneliti

(Muthiaturrahmah Syafiuddin)

Lampiran 2: Infomed Consent

**LEMBAR INFORMED CONSENT PERSETUJUAN MENJADI
RESPONDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Usia :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia menjadi responden untuk penelitian dengan judul penelitian “Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2023”.

Dengan surat pernyataan ini saya isi dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,.....2023

Responden

(.....)

ALAUDDIN

M A K A S S A R

*Lampiran 3: Kuesioner Demografi Responden***KUESIONER DEMOGRAFI**

Petunjuk pengisian : berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

Nama Inisial : Ny.

Tanggal Lahir :

Status obstetri : G P A

Usia : Kurang dari 20 tahun

20-35 tahun

Lebih dari 35 tahun

Pendidikan terakhir : TK

SD/MI

SMP/ MTs sederajat

SMA/MA/SMK/MAK

Diploma/Sarjana/Magister/Spesialis/Doktor

Pekerjaan : Tidak Bekerja/IRT

PNS/Guru/Dosen/Dokter/Honorer

Karyawan

Wiraswasta

Lain-lain, sebutkan...

Lampiran 4: Kuesioner PASS

KUESIONER PERINATAL ANXIETY SCREENING SCALE (PASS)

Petunjuk Pengisian Kuesioner:


Berikan tanda (√) pada kolom isi sesuai dengan yang Anda pikirkan atau rasakan saat ini.

No.	Pernyataan	Tidak Pernah	Kadang-Kadang	Sering	Selalu
1.	Khawatir terhadap janin atau kehamilan				
2.	Takut jika bahaya akan datang pada janin				
3.	Merasa takut akan hal-hal buruk yang akan terjadi				
4.	Khawatir tentang banyak hal				
5.	Khawatir tentang masa depan				
6.	Merasa kelelahan				
7.	Merasa takut jarum, darah, kelahiran, nyeri, dan sakit				
8.	Mendadak merasa takut atau tidak nyaman berlebihan				
9.	Memikirkan suatu hal berulang-ulang dan sulit untuk dihentikan atau dikontrol				
10.	Sulit untuk tidur bahkan saat memiliki kesempatan untuk tidur				
11.	Merasa harus melakukan hal-hal dengan cara yang tepat dan sesuai aturan				
12.	Menginginkan segala sesuatu menjadi sempurna				

13.	Merasa perlu untuk mengendalikan segala hal				
14.	Kesulitan untuk berhenti memeriksa atau melakukan sesuatu secara berlebihan				
15.	Merasa gelisah atau mudah terkejut				
16.	Merasa khawatir akan berbagai pikiran yang datang secara berulang-ulang				
17.	Menjadi waspada atau merasa perlu untuk mengawasi sesuatu hal				
18.	Merasa terganggu akan kenangan yang datang berulang-ulang, mimpi buruk				
19.	Merasa khawatir apabila saya akan memermalukan diri saya sendiri di hadapan orang lain				
20.	Khawatir bahwa orang lain akan menilai saya negatif				
21.	Merasa sangat tidak nyaman berada ditengah-tengah keramaian				
22.	Menghindari kegiatan sosial karena hal tersebut akan membuat gugup				
23.	Menghindari hal-hal yang membuat saya merasa risau				
24.	Merasa terpisah seakan saya melihat diri saya sendiri seperti di film				
25.	Lupa mengenai waktu dan tidak mampu mengingat apa yang telah terjadi				
26.	Kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan baru				

27.	Khawatir tidak mampu melakukan suatu hal				
28.	Suatu pikiran yang tidak dapat berhenti dan membuat sulit untuk berkonsentrasi				
29.	Takut kehilangan kendali				
30.	Merasa panik				
31.	Merasa gelisah				

Sumber: (Amiri *et al.*, 2022)



Lampiran 7: Hasil SPSS 23

Frequencies**Statistics**

		Usia_Ibu	Pendidikan	Pekerjaan	Obstetri	Hiperemesis_Gravidarum	Tingkat_Kecemasan
N	Valid	185	185	185	185	185	185
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1.92	4.24	1.69	1.55	1.51	1.45
Std. Deviation		.722	.877	1.366	.499	.501	.499

Frequency Table**Usia_Ibu**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25 tahun	52	28.1	28.1	28.1
	26-30 tahun	100	54.1	54.1	82.2
	31-35 tahun	29	15.7	15.7	97.8
	>35 tahun	4	2.2	2.2	100.0
Total		185	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak sekolah	3	1.6	1.6	1.6
	SD	7	3.8	3.8	5.4
	SMP/MTs	15	8.1	8.1	13.5
	SMA/SMK/MA	78	42.2	42.2	55.7
	Diploma/S1/S2/S3	82	44.3	44.3	100.0
	Total	185	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	139	75.1	75.1	75.1
	Wiraswasta	11	5.9	5.9	81.1
	Karyawan	10	5.4	5.4	86.5
	PNS	4	2.2	2.2	88.6
	Guru/dosen	20	10.8	10.8	99.5
	Lain-lain	1	.5	.5	100.0
	Total	185	100.0	100.0	

Obstetri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Primipara	83	44.9	44.9	44.9
Multipara	102	55.1	55.1	100.0
Total	185	100.0	100.0	

Hiperemesis_Gravidarum

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak hiperemesis gravidarum	91	49.2	49.2	49.2
Hiperemesis gravidarum	94	50.8	50.8	100.0
Total	185	100.0	100.0	

Tingkat_Kecemasan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak cemas	101	54.6	54.6	54.6
Cemas	84	45.4	45.4	100.0
Total	185	100.0	100.0	

CROSSTABS

/TABLES=Hiperemesis_Gravidarum BY Tingkat_Kecemasan

/FORMAT=AVALUE TABLES

/STATISTICS=CHISQ RISK

/CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL

/COUNT ROUND CELL.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Hiperemesis_Gravidarum * Tingkat_Kecemasan	185	100.0%	0	0.0%	185	100.0%

Hiperemesis_Gravidarum * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

			Tingkat_Kecemasan		
			Tidak cemas		
Hiperemesis_Gravidarum	Tidak hiperemesis gravidarum	Count	65		
		% within Hiperemesis_Gravidarum	71.4%		
		% within Tingkat_Kecemasan	64.4%		
		% of Total	35.1%		
Hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum	Count	36		
		% within Hiperemesis_Gravidarum	38.3%		
		% within Tingkat_Kecemasan	35.6%		
		% of Total	19.5%		

Total	Count	101		
	% within Hiperemesis_Gravidarum	54.6%		
	% within Tingkat_Kecemasan	100.0%		
	% of Total	54.6%		

Hiperemesis_Gravidarum * Tingkat_Kecemasan Crosstabulation

			Tingkat_Kecemasan	
			Cemas	Total
Hiperemesis_Gravidarum	Tidak hiperemesis gravidarum	Count	26	91
		% within Hiperemesis_Gravidarum	28.6%	100.0%
		% within Tingkat_Kecemasan	31.0%	49.2%
		% of Total	14.1%	49.2%
Hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum	Count	58	94
		% within Hiperemesis_Gravidarum	61.7%	100.0%
		% within Tingkat_Kecemasan	69.0%	50.8%
		% of Total	31.4%	50.8%

	Count	84	185
Total	% within Hiperemesis_Gravidarum	45.4%	100.0%
	% within Tingkat_Kecemasan	100.0%	100.0%
	% of Total	45.4%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	20.474 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	19.159	1	.000		
Likelihood Ratio	20.900	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	20.363	1	.000		
N of Valid Cases	185				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 41.32.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Hiperemesis_Gravidarum (Tidak hiperemesis gravidarum / Hiperemesis gravidarum)	4.028	2.175	7.459
For cohort Tingkat_Kecemasan = Tidak cemas	1.865	1.399	2.487
For cohort Tingkat_Kecemasan = Cemas	.463	.322	.665
N of Valid Cases	185		

Correlations

			Tingkat_Kecem asan	Hiperemesis_Gr avidarum
Spearman's rho	Tingkat_Kecemasan	Correlation Coefficient	1.000	.838**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	185	185
	Hiperemesis_Gravidarum	Correlation Coefficient	.838**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	185	185

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No: E.060/KEPK/FKIK/II/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muthiaturrahmah Syafiuddin
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Kecemasan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil di
 RSIA Ananda Tahun 2023"**

*"The Relationship Between Anxiety and The Incidence of Hyperemesis Gravidarum in
 Pregnant Women at Ananda Mother and Child Hospital 2023"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024.

This declaration of ethics applies during the period February 23th, 2023 until February 23th, 2024.

*February 23th, 2023
 Professor and Chairperson,*


 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Meneliti



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57 (Lama : Jl. Landak Baru No.63) Makassar

Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694

Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 095/RSIA-A/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Umum dan Perlengkapan Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar, menerangkan bahwa:


Nama : Muthiaturrahmah Syafiuddin
 NIM : 70600118039
 Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
 Jurusan : Pendidikan Dokter

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda, terhitung tanggal 27 Februari-30 April 2023 guna menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 4 April 2023

Direktur Umum & Perlengkapan


 dr. As'Ari As'Ad, Sp.KN-TM

Lampiran 10: Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **12185/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2543/Un.06/LP2M/PP.00.9/2/2023 tanggal 23 Februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUTHIATURRAHMAH SYAFIUDDIN**
Nomor Pokok : **70600118039**
Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KEJADIAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM PADA IBU HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2023 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Maret s/d 30 April 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Februari 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Muthiaturrahmah Syafiuddin
2. NIM : 70600118039
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Tempat, Tanggal Lahir : Polewali, 28 Oktober 2000
6. Alamat : Polewali Mandar
7. Agama : Islam
8. Nama Orang Tua
 - a) Ayah : Drs.H.Muhammad Syafiuddin, M.Pd
 - b) Ibu : Hj. Safrina, S.Pd

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 060 PEKKABATA
2. SMP : MTs PPM AL-IKHLASH
3. SMA : SMA PPM AL-IKHLASH
4. S1 : UIN Alauddin Makassar