


**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *NON HEMORAGIC STROKE* (NHS) DENGAN MASALAH KEPERAWATAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF INTRAKRANIAL DENGAN INTERVENSI *HEAD UP 30°* DAN TERAPI MUROTTAL**



**Tugas Akhir Ners**

**Oleh :**

**NURAENI, S.Kep**  
**NIM : 70900122007**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *NON HEMORAGIC STROKE* (NHS) DENGAN MASALAH KEPERAWATAN PENURUNAN KAPASITAS ADAPTIF INTRAKRANIAL DENGAN INTERVENSI *HEAD UP 30°* DAN TERAPI MUROTTAL**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Keperawatan Pada Fakultas  
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh :**

NURAENI, S.Kep  
NIM : 70900122007

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nuraeni, S.Kep  
Nim : 70900122007  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 21 Mei 1999  
Jurusan Prodi : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Dengan Intervensi *Head Up 30°* Dan Terapi Murottal

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners Ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tugas Akhir ini merupakan Duplikat, Tiruan, Plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir Ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Juni 2023

Penyusun,

Nuraeni, S.Kep


Nim : 70900122007


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Nuraeni, S.Kep NIM: 70300122007 mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Dengan Intervensi *Head Up 30°* dan Terapi Murottal”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 12 Juni 2023

  
Andi Budiyanto Adi putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep  
Pembimbing I

  
Ardian Adhiwijaya S.Kep.,Ns.,M.Kep  
Pembimbing II

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intracranial Dengan Intervensi *Head Up 30°* Dan Terapi Murottal”, yang disusun oleh Nuraeni, S.Kep, NIM : 70900122007, Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023, Bertepatan dengan 7 Dzulhijah 1444 H , dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam Program Studi Profesi Ners, Jurusan Keperawatan ( dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Juni 2023

7 Dzulhijah 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr.Muh Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muhaemin, S.Ag.,M.Th.I., M.Ed	(.....)
Pembimbing I	: Andi Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes  
NIM : 70900122007 | 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Dengan Intervensi *Head Up 30°* Dan Terapi Murottal” dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju kealam yang terang benderang sampai sekarang ini. Tujuan penyusunan KTI ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program Profesi *Ners* pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023.

Dengan terselesaikannya penulisan KTI ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan KTI ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, terkasih, tersayang, serta sebagai sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Ayahanda tercinta H. Usman dan Ibunda tercinta Hj. Bau atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar *ners*.

Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh

pendidikan

3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku ketua prodi profesi *ners* dan Hj Sysnawati., S.Kep.,Ns.,M.Kep, Sp.Kep.J selaku sekretaris prodi profesi *ners* beserta dosen-dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu yang bermanfaat serta seluruh staf Prodi Profesi *Ners* yang telah membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Andi Budianto Adi Putra, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan karya akhir *ners*, serta motivasi yang membangun
5. Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku penguji I dan Dr. Muhaemin, S.Ag.,M.Th.I., M,Ed yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran yang membangun sehingga saya dapat menghasilkan karya yang bermanfaat bagi siapa yang akan membacanya
6. Kepada teman-teman tersayang, yang telah menemani, menyemangati dan membantu penulis selama perkuliahan sampai sekarang

Disamping itu, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon do'a semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian di masyarakat nantinya.

Samata, 15 Juni 2023  
Penulis,

Nuraeni  
NIM: 7090012207

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep Teori.....	8
1. Definisi .....	8
2. Klasifikasi.....	8
3. Etiologi .....	12
4. Manifestasi Klinis.....	17
5. Patofisiologi.....	18
6. Pemeriksaan Penunjang.....	19
7. Komplikasi .....	23
B. Konsep Keperawatan .....	24
1. Pengkajian .....	24
2. Diagnosis Keperawatan .....	26
3. Intervensi keperawatan.....	29
C. Teori Keperawatan (Self Care).....	31
D. Evidence Based Nursing .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Rancangan Studi Kasus.....	41

B. Subyek Studi Kasus .....	41
C. Fokus Studi Kasus.....	41
D. Instrumen Studi Kasus .....	42
E. Prosedur Studi Kasus .....	42
F. Tempat dan waktu pengambilan data.....	42
G. Analisis data dan penyajian data .....	42
H. Etika Studi Kasus .....	43
<b>BAB IV LAPORAN KASUS .....</b>	<b>45</b>
A. Pengkajian .....	45
B. Diagnosis Keperawatan.....	49
C. Intervensi Keperawatan.....	50
D. Implementasi Keperawatan .....	53
E. Evaluasi Keperawatan .....	59
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>90</b>
A. Analisa Kasus .....	90
B. Analisis Diagnosis keperawatan .....	94
C. Analisis intrvensi.....	95
D. Analisis Implementasi Keperawatan .....	94
E. Analisis Evaluasi Keperawatan .....	97
F. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan selain intervensi utama berbasis EBN.....	103
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>

## ABSTRACT

Nama : Nuraeni

NIM : 70900122007

Judul : “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial Dengan Intervensi *Head Up 30°* Dan Terapi Murottal”

---

**Latar Belakang:** Non Hemoragic stroke merupakan hilangnya fungsi otak akibat tersumbatnya suplai darah ke otak sehingga menyebabkan gangguan fungsi saraf lokal yang timbul secara tiba-tiba dan cepat. Salah satu Tindakan keperawatan mandiri untuk meningkatkan saturasi oksigen adalah memberikan Posisi head up 30°. **Tujuan:** untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami *Non Hemoragik stroke* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruang *Intesive care unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Metode:** penelitian ini merupakan studi kasus yaitu implementasi posisi *head up 30°* dikombinasi dengan terapi murottal pada Tn M dengan diagnosis *Non Hemoragic stroke* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruangan *Intesif Care Unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. **Hasil:** Setelah dilakukan pemberian posisi *head up 30°* dikombinasi dengan terapi murottal pada pasien *Non Hemoragic Stroke* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial adanya peningkatan kesadaran pasien (somnolen) pasien Hari pertama E4 M5 Vx didapatkan hari ketiga kesadaran (delirium) E4 M6 Vx serta peningkatan saturasi **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Tn M yaitu implementasi pemberian posisi *head up 30°* kombinasi terapi murottal terhadap Tn M dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial dengan hasil akhir adanya peningkatan terhadap kesadaran pasien.

Keyword: *Head Up 30°* dan *Non Hemoragic Stroke*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Stroke merupakan penyakit atau gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf (defisit neurologis) akibat terlambatnya aliran darah ke otak. Secara sederhana stroke akut di definisikan sebagai penyakit otak akibat terhentinya suplai darah ke otak karena sumbatan (stroke iskemik) atau perdarahan (stroke hemoragik). Stroke non hemoragik terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah ke otak (Khotimah et al, 2021). Sumbatan ini disebabkan karena adanya penebalan dinding pembuluh darah yang disebut dengan Antherosclerosis dan tersumbatnya darah dalam otak oleh emboli yaitu bekuan darah yang berasal dari Thrombus di jantung.

*Stroke non hemoragik* mengakibatkan beberapa masalah yang muncul, seperti gangguan menelan, nyeri akut, hambatan mobilitas fisik, hambatan komunikasi verbal, defisit perawatan diri, ketidakseimbangan nutrisi, dan salah satunya yang menjadi masalah yang menyebabkan kematian adalah Penurunan kapasitas adaptif intrakranial (Nuraeni, 2017). Pada pasien Stroke Non Hemoragik dapat terjadi penurunan kesadaran apabila terdapat sumbatan atau penyempitan di pembuluh darah karotis pada cabang menuju otak bagian tengah dan cabang otak bagian depan, oleh karena itu diperlukan pemantauan dan penanganan yang tepat untuk memperbaiki tingkat kesadaran pada pasien Stroke Non Hemoragik. (Susilo, 2019).

Menurut World Health Organization (2022) Lembar fakta stroke Global yang dirilis pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa risiko seumur hidup terkena stroke telah meningkat sebesar 50% selama 17 tahun terakhir dan sekarang 1 dari 4 orang diperkirakan mengalami stroke seumur hidup mereka. Dari tahun 1990 hingga 2022, telah terjadi peningkatan kejadian stroke sebesar 70% peningkatan kematian akibat stroke sebesar 43%, peningkatan prevalensi stroke sebesar 102% dan peningkatan *Disability Adjusted Life Years* (DALY) sebesar 143%. Fitur yang paling mencolok adalah bahwa sebagian besar beban stroke global (86% kematian akibat stroke dan 89% DALYs) terjadi dinegara berpehasilan rendah dan menengah kebawah. Beban yang tidak proporsional yang dialami.

Menurut Riskesdas tahun 2020 pada tahun 2020 angka penderita stroke di Indonesia mencapai 7% permil dan meningkat menjadi 10,9% permil di tahun 2018. Berdasarkan hasil rekapitulasi data kasus baru penyakit tidak menular pada tahun 2018 adalah 2.412.297 kasus. Adapun kasus stroke sebanyak 3,09% dari 2.412.297). Provinsi Kalimantan timur (14,7%) dan di Yogyakarta (14,6%) Sedangkan Sulawesi Selatan (10,6%) berdasarkan kelompok umur , kelompok tertinggi pada umur 55-64 tahun (33,3%), Umur 65-74 (22,5%), umur 45-54 (21,8%), umur >75(11,5%) dan umur 15-44(10,9%) (Riskesdas, 2020)

Tinggi nya angka kejadian maka disediakan pengobatan atau Penatalaksanaan stroke yang dapat dibagi menjadi penatalaksanaan medis dan keperawatan. Penatalaksanaan medis terdiri dari penatalaksanaan umum (fase akut dan fase rehabilitasi) pembedahan dan terapi obat-obatan. Sedangkan penatalaksanaan keperawatan Pemberian posisi *head up 30* derajat merupakan

salah satu dari penatalaksanaan keperawatan yang dapat dilakukan pada penanganan awal pasien stroke (Hasan, 2018). Posisi *head up 30* derajat adalah posisi untuk menaikkan kepala dari tempat tidur dengan sudut sekitar 30 derajat dan posisi tubuh dalam keadaan sejajar (Kusuma, et al, 2019).

Penerapan intervensi pemberian posisi *head up 30* derajat bermanfaat untuk menurunkan tekanan intracranial pada pasien yang mengalami cedera kepala. Jika terjadi peningkatan tekanan intrakranial bias terjadi herniasi yaitu kondisi ketika jaringan otak dan cairan cairan otak bergeser dari posisi normalnya, jadi penting dilakukan *head up 30* derajat (Intihanah, 2020). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pertami et al, 2021) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari posisi *head up 30* derajat pada pasien yang mengalami trauma pada kepala

Pada kondisi tertentu pasien mengalami penurunan kesadaran memerlukan perawatan dan penanganan segera untuk mengurangi kesakitan dan mencegah kematian. Oleh karena itu peran perawat sangat penting dalam melakukan asuhan keperawatan untuk meningkatkan status kesadaran dan meminimalisir kecacatan. Berbagai upaya asuhan keperawatan yang telah dikembangkan untuk membantu meningkatkan kesadaran pasien, antara lain: oksigenasi, pengaturan posisi, dan stimulasi suara dan sentuhan (Ali,2020). Salah satu jenis intervensi yang dilakukan dalam stimulasi suara yakni pemberian stimulasi Al- Qur'an.

Al-Qur'an adalah firman Allah swt yang bersifat atau berfungsi sebagai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw yang tertulis dalam mushaf, yang diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan dipandang beribadah

membacanya. Mendengarkan Al-Qur'an merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang efektif untuk memperbaiki tanda-tanda vital, meningkatkan saturasi oksigen, mendengarkan bacaan Al-Qur'an memberikan ketenangan dalam hati, perasaan lega, rileks dan suasana santai (Azzahroh & Hanifah, 2020). Pendekatan spiritual dapat membantu mempercepat pemulihan dan penyembuhan klien (Siswanti & Kalsum, 2017). Seperti halnya Al-Qur'an juga dapat menjadi obat (penawar) tertera dalam surat Al Isra ayat 82 :

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

*Dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Q.s Al Isra ayat 82.*

Tafsir Al Muyassir, dan kami menurunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Azhim ayat-ayat yang menyembuhkan hai dari emua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan kebodohan dan akan menyembuhkan jasmani melalui Ruqyah dengannya. Dan hal-hal yang menjdi penyebab teraihnya rahmat Allah melalui kandungan keimanannya. Dan tidaklah Al-Quran ini menambah bagi orang-orang kafir Ketika mendengarkannya, kecuali kekafiran dan kesesatan. Karena pendustaan mereka terhadapnya dan tidak ada keimanan dalam diri mereka.

Berdasarkan hasil observasi pada saat praktek di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar tepatnya diruangan ICU terdapat

Dari latar belakang ini maka kami tertarik untuk membahas mengenai

“Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Non Hemoragic Stroke* (NHS) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intracranial implementasi *Head Up 30°* dikombinasi dengan Terapi muotall terhadap Tingkat kesadaran Diruangan *Intensif Care Unit (ICU)* RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penullisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah bagaimana pelaksanaan implementasi posisi *head up 30°* dikombinasi dengan terapi muotall pada pasien Non Hemoragic Stroke dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial terhadap tingkat kesadaran .

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Diketuinya gambaran asuhan keperawatan pada klien yang mengalami *Non Hemoragic Stroke* dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial di ruang Intesive care unit (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketuinya hasil pengkajian pada pasien dengan *Non Hemoragic Stroke*
- b. Diketuinya diagnosis keperawatan pada pasien dengan *Non Hemoragic Stroke*
- c. Diketuinya intervensi keperawatan pada pasien dengan *Non Hemoragic Stroke*

- d. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien dengan *Non Hemoragic Stroke*
- e. Diketuainya evaluasi keperawatan pada pasien dengan *Non Hemoragic Stroke*
- f. Untuk menganalisis intervensi posisi *head up 30<sup>o</sup>* pada pasien *Non Hemoragic Stroke* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial.
- g. Untuk menganalisis intervensi terapi muottal pada pasien *Non Hemoragic Stroke* dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial

#### **D. Manfaat**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Tugas akhir profesi ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajarann dalam melakukan implementasi asuhan keperawatan pada pasien *Non Hemoragik Stroke*

##### **2. Manfaat Aplikatif**

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranal serta bersihan jalan napas tidak efektif dengan *Non Hemoragic Stroke*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Konsep Teori**

##### **1. Definisi**

Stroke adalah Perubahan Neurologis yang disebabkan oleh gangguan suplai darah ke otak, biasanya karena pembuluh darah pecah atau terhalang oleh gumpalan. Ini akan menghambat oksigen dan nutrisi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan Otak (*World Health Organization, 2018*).

Stroke non hemoragik adalah tanda klinis disfungsi atau kerusakan jaringan otak yang disebabkan kurangnya aliran darah ke otak sehingga mengganggu kebutuhan darah dan oksigen di jaringan otak. Stroke nonhemoragik dapat disebabkan oleh trombosis dan emboli, sekitar 80-85% menderita penyakit stroke non-hemoragik dan 20% persen sisanya adalah stroke hemoragik yang dapat disebabkan oleh pendarahan intraserebrum hipertensi dan perdarahan subarachnoid (Junaidi, 2021).

##### **2. Klasifikasi**

Berdasarkan etiologi Stroke dibedakan atas 2, stroke karena iskemik atau dikenal dengan Non Hemorrhagic Stroke (NHS), dan stroke karena hemoragik atau Hemorrhagic Stroke (HS) (Smeltzer & Bare, 2013).

- a. Non Hemoragic Stroke (NHS) bisa disebabkan karena adanya thrombosis atau embolik

Hampir 85% stroke di sebabkan oleh, sumbatan bekuan darah, penyempitan sebuah arteri atau beberapa arteri yang mengarah ke otak, atau embolus (kotoran) yang terlepas dari jantung atau arteri ekstrakranial (arteri yang berada di luar tengkorak). Ini di sebut sebagai infark otak atau stroke iskemik. Pada orang berusia lanjut lebih dari 65 tahun, penyumbatan atau penyempitan dapat disebabkan oleh aterosklerosis (mengerasnya arteri), hal inilah yang terjadi pada hampir dua pertiga kejadian stroke iskemik. Emboli cenderung terjadi pada orang yang mengidap penyakit jantung (misalnya denyut jantung yang cepat tidak teratur, penyakit katub jantung dan sebagainya) secara rata-rata seperempat dari stroke iskemik di sebabkan oleh emboli, biasanya dari jantung (stroke kardioembolik) bekuan darah dari jantungnya umumnya terbentuk akibat denyut jantung yang tidak teratur (misalnya fibrilasi atrium), kelainan katup jantung (termasuk katub buatan dan kerusakan katub akibat penyakit rematik jantung), infeksi di dalam jantung (di kenal sebagai endocarditis) dan pembedahan jantung (National Stroke Association, 2018).

Penyebab lain seperti gangguan darah, peradangan dan infeksi merupakan penyebab sekitar 5-10% kasus stroke iskemik, dan menjadi penyebab tersering pada orang berusia muda. Namun, penyebab pasti dari sebagian stroke iskemik tetap tidak di ketahui meskipun telah dilakukan

pemeriksaan yang mendalam. Sebagian stroke iskemik terjadi di hemisfer otak, meskipun sebagian terjadi di serebelum (otak kecil) atau batang otak. Beberapa stroke iskemik di hemisfer tampaknya bersifat ringan (Sekitar 20% dari semua stroke iskemik) stroke ini asimtomatik (tidak bergejala, hal ini terjadi ada sekitar sepertiga pasien usia lanjut) atau hanya menimbulkan kecanggungan, kelemahan ringan atau masalah daya ingat. Namun stroke ringan ganda dan berulang dapat menimbulkan cacat berat, penurunan kognitif dan demensia, biasanya terjadi saat setelah lama beristirahat, baru bangun tidur atau dipagi hari (National Stroke Association, 2018).

- b. *Hemoragic Stroke* Bisa disebabkan karena perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, aneurisme cerebral, dan malformasi arterivenous.

Stroke hemoragik di sebabkan oleh perdarahan ke dalam jaringan otak (disebut hemoragia intraserebrum atau hematoma intraserebrum) atau ke dalam ruang subaraknoid yaitu ruang sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak (disebut hemoragia subaraknoid). Ini adalah jenis stroke yang paling mematikan, tetapi relative hanya menyusun sebagian kecil dari stroke total, 10-15% untuk perdarahan intraserebrum dan 5% untuk perdarahan subaraknoid, biasanya kejadiannya saat melakukan aktivitas atau saat aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat (National Stroke Association, 2018).

2. Berdasarkan manifestasi klinik

- a. Serangan Iskemik Sepintas/Transient Ischemic Attack (TIA). gejala neurologik yang timbul akibat gangguan peredaran darah di otak akan menghilang dalam waktu 24 jam.
- b. Defisit Neurologik Iskemik Sepintas/ Reversible Ischemic Neurological Deficit (RIND). gejala neurologic yang timbul akan menghilang dalam waktu lebih lama dari 24 jam, tapi tidak lebih dari seminggu.
- c. Sroke Progresif (Progressive Stroke/ Stroke In Evaluation). gejala neurologic makin lama makin berat.
- d. Stroke komplet (Completed Stroke/Permanent Stroke). kelainan neurologic sudah menetap, dan tidak berkembang lagi.

3. Berdasarkan kausal

- a. Stroke Trombotik. terjadi karena adanya gumpalan pada pembuluh darah di otak. trombotik dapat terjadi pada pembuluh darah yang besar dan pembuluh darah yang kecil. pada pembuluh darah besar trombotik terjadi akibat aterosklerosis yang diikuti oleh terbentuknya gumpalan darah yang cepat. selain itu, trombotik juga diakibatkan oleh tingginya kadar kolestrol jahat atau Low Density Lipoprotein (LDL). sedangkan pada pembuluh darah kecil, trombotik terjadi karena aliran darah ke

pembuluh darah arteri kecil terhalang. hal ini terkait dengan hipertensi dan merupakan indicator penyakit ateroklerosis.

- b. Stroke Emboli/Non Trombotik. terjadi karena adanya gumpalan dari jantung atau lapisan lemak yang lepas. sehingga, terjadi penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan darah tidak bias mengalir oksigen dan nutrisi ke otak.

### **3. Etiologi**

Stroke non hemoragik terjadi pada pembuluh darah yang mengalami sumbatan sehingga menyebabkan berkurangnya aliran darah pada jaringan otak, thrombosis otak, ateroklerosis dan emboli serebral yang merupakan penyumbatan pembuluh darah yang timbul akibat pembentukan plak sehingga terjadi penyempitan pembuluh darah yang dikarenakan oleh penyakit jantung, diabetes, obesitas, kolesterol, merokok, stress, gaya hidup, rusak atau hancurnya neuron motorik atas (upper motor neuron) dan hipertensi (Irwan, 2018).

Faktor risiko stroke Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor atau yang sering disebut multifaktor. Faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian stroke dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan (non-modifiable risk factors) dan faktor resiko yang dapat dikendalikan (modifiable risk factors) (Irwan, 2018).

Berikut faktor-faktor yang berkaitan dengan stroke antara lain:

1. Faktor risiko tidak dapat dikendalikan

a. Umur

Semakin bertambah tua usia, semakin tinggi risikonya. Setelah berusia 55 tahun, risikonya berlipat ganda setiap kurun waktu sepuluh tahun. Dua pertiga dari semua serangan stroke terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Tetapi, itu tidak berarti bahwa stroke hanya terjadi pada orang lanjut usia karena stroke dapat menyerang semua kelompok dewasa muda dan tidak memandang jenis kelamin.

b. Jenis kelamin

Pria lebih berisiko terkena stroke daripada wanita, tetapi penelitian menyimpulkan bahwa justru lebih banyak wanita yang meninggal karena stroke. Risiko stroke pria 1,25 lebih tinggi daripada wanita, tetapi serangan stroke pada pria terjadi di usia lebih muda sehingga tingkat kelangsungan hidup juga lebih tinggi. Dengan perkataan lain, walau lebih jarang terkena stroke, pada umumnya wanita terserang pada usia lebih tua, sehingga kemungkinan meninggal lebih besar.

c. Ras

Ada variasi yang cukup besar dalam insiden stroke antara kelompok etnis yang berbeda. Orang-orang dari ras Afrika memiliki risiko lebih tinggi untuk semua jenis stroke dibandingkan dengan orang-orang dari ras kaukasia. Risiko ini setidaknya 1,2 kali lebih tinggi dan bahkan lebih tinggi untuk jenis stroke ICH (Intracerebral Hemorrhage).

d. Faktor genetik

Terdapat dugaan bahwa stroke dengan garis keturunan saling berkaitan. Dalam hal ini hipertensi, diabetes, dan cacat pada pembuluh darah menjadi faktor genetik yang berperan. Selain itu, gaya hidup dan kebiasaan makan dalam keluarga yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah juga meningkatkan risiko stroke

2. Faktor risiko dapat dikendalikan

a. Hipertensi

Hipertensi (tekanan darah tinggi) merupakan faktor risiko utama yang menyebabkan pengerasan dan penyumbatan arteri. Penderita hipertensi memiliki faktor risiko stroke empat hingga enam kali lipat dibandingkan orang yang tanpa hipertensi dan sekitar 40 hingga 90 persen pasien stroke ternyata menderita hipertensi sebelum terkena stroke. Secara medis, tekanan darah di atas 140/90 tergolong dalam penyakit hipertensi. Oleh karena dampak hipertensi pada keseluruhan risiko stroke menurun seiring dengan penambahan umur, pada orang lanjut usia, faktor-faktor lain di luar hipertensi berperan lebih besar terhadap risiko stroke. Orang yang tidak menderita hipertensi, risiko stroke meningkat terus hingga usia 90 tahun, menyamai risiko stroke pada orang yang menderita hipertensi. Sejumlah penelitian menunjukkan obat-obatan anti hipertensi dapat mengurangi risiko stroke sebesar 38 persen dan pengurangan angka kematian karena stroke sebesar 40 persen.

b. Diabetes Mellitus Pada penderita DM, khususnya Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) terdapat faktor risiko multiple stroke. Lesi aterosklerosis pembuluh darah otak baik intra maupun ekstrakranial merupakan penyebab utama stroke. Aterosklerosis pada pembuluh darah jantung akan mengakibatkan kelainan jantung yang selanjutnya dapat menimbulkan stroke dengan emboli yang berasal dari jantung atau akibat kelainan hemodinamik. Pada aterosklerosis pembuluh darah otak yang besar, perkembangannya mengikuti peningkatan tekanan darah, tetapi pada pembuluh darah kecil, misal dinding pembuluh darah penetrans, suatu end-arteries berdiameter kecil menebal karena proses jangka panjang dari deposisi hialin, produk lipid amorphous, dan fibrin. Suatu mikroaneurisma dapat terjadi pada daerah yang mengalami aterosklerosis tersebut dan selanjutnya dapat mengakibatkan perdarahan yang sulit dibedakan dengan lesi iskemik primer tanpa menggunakan suatu pemeriksaan imaging

c. Kenaikan kadar kolesterol/lemak darah

Kenaikan level Low Density Lipoprotein (LDL) merupakan faktor risiko penting terjadinya aterosklerosis yang diikuti penurunan elastisitas pembuluh darah. Penelitian menunjukkan angka stroke meningkat pada pasien dengan kadar kolestrol di atas 240 mg%. Setiap kenaikan 38,7 mg% menaikkan angka stroke 25%. Kenaikan HDL 1 m mol (38,7 mg%) menurunkan terjadinya stroke setinggi

47%. Demikian juga kenaikan trigliserid menaikkan jumlah terjadinya stroke.

d. Obesitas

Obesitas dapat meningkatkan risiko stroke baik perdarahan maupun sumbatan, tergantung pada faktor risiko lainnya yang ikut menyertainya. Fakta membuktikan bahwa stroke banyak dialami oleh mereka yang mengalami kelebihan berat badan dan bahkan sebagian kasus umumnya dialami oleh penderita obesitas.

e. Kebiasaan mengonsumsi alkohol

Mengonsumsi alkohol memiliki efek sekunder terhadap peningkatan tekanan darah, peningkatan osmolaritas plasma, peningkatan plasma homosistein, kardiomiopati dan aritmia yang semuanya dapat meningkatkan risiko stroke. Konsumsi alkohol yang sedang dapat menguntungkan, karena alkohol dapat menghambat thrombosis sehingga dapat menurunkan kadar fibrinogen dan agregasi platelet, menurunkan lipoprotein, meningkatkan HDL, serta meningkatkan sensitivitas insulin

f. Aktifitas fisik

Kurang olahraga merupakan faktor risiko independen untuk terjadinya stroke dan penyakit jantung. Olahraga secara cukup rata-rata 30 menit/hari dapat menurunkan risiko stroke

g. Merokok

Merokok merupakan faktor risiko stroke yang sebenarnya

paling mudah diubah. Perokok berat menghadapi risiko lebih besar dibandingkan perokok ringan. Merokok hampir melipat gandakan risiko stroke iskemik, terlepas dari faktor risiko yang lain, dan dapat juga meningkatkan risiko subaraknoid hemoragik hingga 3,5 persen. Merokok adalah penyebab nyata kejadian stroke, yang lebih banyak terjadi pada usia dewasa muda ketimbang usia tengah baya atau lebih tua. Sesungguhnya, risiko stroke menurun dengan seketika setelah berhenti merokok dan terlihat jelas dalam periode 2-4 tahun setelah berhenti merokok. Perlu diketahui bahwa merokok memicu produksi fibrinogen (faktor penggumpal darah) lebih banyak sehingga merangsang timbulnya aterosklerosis

#### **4. Manifestasi Klinis**

Adapun gambaran klinis pasien stroke non hemoragik menurut (Hutahalung, 2019) adalah sebagai berikut :

1. Gejala serebral (kontralateral) : motorik (kelemahan, kecanggungan, atau paralisis ekstremitas). Sedangkan sensorik (baal, parastesia) berhubungan dengan kemampuan bicara (disfasia reseptif atau ekspresif ).
2. Gejala okular (ipsilateral) : amaurosis fugaks (kehilangan pengelihatannya sementara yang digambarkan sebagai selubung yang menutupi lapang pandang)
3. Gejala serebral (atau okular) dapat sementara (serangan iskemik sementara (transient ischaemic attack, TIA) merupakan defisit neurologis

fokal atau okular yang berlangsung tidak lebih dari 24 jam) atau permanen (serangan stroke)

4. Gejala vertebrobasilar, vertigo, ataksia, sakit kepala, sinkop, parestesia bilateral, halusinasi visual.
5. Suatu bruit dapat didengar di sekitar arteri karotis, namun bukan merupakan indikator kelainan yang dapat dipercaya.

## **5. Patofisiologi**

Stroke non hemoragik disebabkan oleh trombosis akibat plak aterosklerosis yang memberi vaskularisasi pada otak atau oleh emboli dari pembuluh darah diluar otak yang tersangkut di arteri otak. Saat terbentuknya plak fibrosis (ateroma) dilokasi yang terbatas seperti di tempat percabangan arteri. Trombosit selanjutnya melekat pada permukaan plak bersama dengan fibrin, perlekatan trombosit secara perlahan akan memperbesar ukuran plak sehingga terbentuk thrombus (Hidayati et al., 2018).

Trombus dan emboli di dalam pembuluh darah akan terlepas dan terbawa hingga terperangkap dalam pembuluh darah distal, lalu menyebabkan pengurangan aliran darah yang menuju ke otak sehingga sel otak akan mengalami kekurangan nutrisi dan juga oksigen, sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan glukosa akan menyebabkan asidosis atau tingginya kadar asam di dalam tubuh lalu asidosis akan mengakibatkan natrium klorida, dan air masuk ke dalam sel otak dan kalium meninggalkan sel otak sehingga terjadi edema setempat. Kemudian kalium akan masuk dan memicu

serangkaian radikal bebas sehingga terjadi perusakan membran sel lalu mengkerut dan tubuh mengalami defisit neurologis lalu mati (Hidayati et al., 2018).

## 6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien dengan stroke non hemoragik adalah sebagai berikut (Radaningtyas et al., 2018).

### 1. Angiografi serebral

Membantu menentukan penyebab stroke secara spesifik seperti perdarahan, obstruktif arteri, oklusi / nuptur.

### 2. Elektro encefalography

Mengidentifikasi masalah didasarkan pada gelombang otak atau mungkin memperlihatkan daerah lesi yang spesifik.

### 3. Sinar x tengkorak

Menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah yang berlawanan dari masa yang luas, klasifikasi karotis interna terdapat pada trobus serebral. Klasifikasi persial dinding, aneurisma pada pendarahan sub arachnoid.

### 4. Ultrasonography Doppler

Mengidentifikasi penyakit arteriovena (masalah system arteri karotis /alioran darah /muncul plaque / arterosklerosis.

### 5. CT-Scan

Memperlihatkan adanya edema, hematoma, iskemia, dan adanya infark.

#### 6. Magnetic Resonance Imagine (MRI)

Menunjukkan adanya tekanan anormal dan biasanya ada thrombosis, emboli, dan TIA, tekanan meningkat dan cairan mengandung darah menunjukkan, hemoragi sub arachnois / perdarahan intakranial.

#### 7. Pemeriksaan foto thorax

Dapat memperlihatkan keadaan jantung, apakah terdapat pembesaran ventrikel kiri yang merupakan salah satu tanda hipertensi kronis pada penderita stroke, menggambarkan perubahan kelenjar lempeng pineal daerah berlawanan dari massa yang meluas.

#### 8. Pemeriksaan laboratorium

a. Fungsi lumbal: tekanan normal biasanya ada thrombosis, emboli dan TIA. Sedangkan tekanan yang meningkat dan cairan yang mengandung darah menunjukkan adanya perdarahan subarachnoid atau intracranial. Kadar protein total meninggal pada kasus thrombosis sehubungan dengan proses inflamasi.

b. Pemeriksaan darah rutin.

c. Pemeriksaan kimia darah: pada stroke akut dapat terjadi hiperglikemia. Gula darah mencapai 250 mg dalam serum dan kemudian berangsur-angsur turun kembali.

### **7. Penatalaksanaan**

Menurut penelitian (Padang, 2019), penatalaksanaan pada pasien stroke non hemoragik adalah sebagai berikut :

## 1. Terapi umum

- a. letakkan kepala pasien pada posisi 30°, kepala dan dada pada satu bidang; ubah posisi tidur setiap 2 jam; mobilisasi dimulai bertahap bila hemodinamik sudah stabil.
- b. Bebaskan jalan nafas, beri oksigen 1-2 liter/menit sampai didapatkan hasil analisa gas darah. Jika perlu, dilakukan intubasi.
- c. Demam diatasi dengan kompres dan antipiretik, kemudian dicari penyebabnya; jika kandung kemih penuh, dikosongkan (sebaiknya dengan kateter intermiten).
- d. Pemberian nutrisi dengan cairan isotonik, kristaloid atau koloid 1500-2000 ml dan elektrolit sesuai kebutuhan, hindari cairan mengandung glukosa atau salin isotonik. Pemberian nutrisi oral hanya jika fungsi menelannya baik.
- e. Pantau juga kadar gula darah >150mg% harus dikoreksi sampai batas gula darah sewaktu 150 mg% dengan insulin drip intravena kontinu selama 2-3 hari pertama.
- f. Tekanan darah tidak perlu segera diturunkan, kecuali bila tekanan sistol >220 mmHg, diastol >120 mmHg, Mean Arteri Blood Pressure (MAP) >130 mmHg (pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 30 menit), atau didapatkan infark miokard akut, gagal jantung kongestif serta gagal ginjal.

- g. Penurunan tekanan darah maksimal adalah 20% dan obat yang direkomendasikan yaitu natrium nitroprusid, penyekat reseptor alfa-beta, penyekat ACE, atau antagonis kalsium.
- h. Jika terjadi hipotensi, yaitu tekanan sistol <90 mmHg, diastol <70 mmHg, diberikan NaVL 0.9% 250 ml selama 1 jam, dilanjutkan 500 ml selama 4 jam dan 500 ml selama 8 jam atau sampai tekanan hipotensi dapat teratasi. Jika belum teratasi, dapat diberikan dopamine 2-2 $\mu$ g/kg/menit sampai tekanan darah sistolik 110 mmHg.
- i. Jika kejang, diberikan diazepam 5-20mg iv pelan-pelan selama 3 menit maksimal 100mg/hari; dilanjutkan pemberian antikonvulsan per oral (fenitoin, karbamazepin). Jika kejang muncul setelah 2 minggu, diberikan antikonvulsan peroral jangka panjang.
- j. Jika didapat tekanan intrakranial meningkat, diberikan manitol bolus intravena 0,25-1 g/ kgBB per 30 menit dan jika dicurigai fenomena rebound atau keadaan umum memburuk, dilanjutkan 0,25g/kgBB per 30 menit setelah 6 jam selama 3- 5 hari.

## 2. Terapi Farmakologis

Ditujukan untuk reperfusi dengan pemberian antiplatelet seperti aspirin dan antikoagulan, atau yang dianjurkan dengan trombolitik rt-PA (Recombinant Tissue Plasminogen Activator). Dapat juga diberi agen neuroproteksi, yaitu sitikoin atau pirasetam (jika didapatkan afasia)

## 8. Komplikasi

Stroke Menurut (Kurniati et al., 2013) pada pasien stroke yang berbaring lama dapat terjadi masalah fisik dan emosional diantaranya:

### 1. Bekuan darah (Trombosis)

Mudah terbentuk pada kaki yang lumpuh menyebabkan penimbunan cairan, pembengkakan (edema) selain itu juga dapat menyebabkan embolisme paru yaitu sebuah bekuan yang terbentuk dalam satu arteri yang mengalirkan darah ke paru.

### 2. Dekubitus

Bagian tubuh yang sering mengalami memar adalah pinggul, pantat, sendi kaki dan tumit. Bila memar ini tidak pengaruh dirawat dengan baik maka akan terjadi ulkus dekubitus dan infeksi.

### 3. Pneumonia

Pasien stroke tidak bisa batuk dan menelan dengan sempurna, hal ini menyebabkan cairan terkumpul di paruparu dan selanjutnya menimbulkan pneumoni.

### 4. Atrofi dan kekakuan sendi (Kontraktur)

Hal ini disebabkan karena kurang gerak dan immobilisasi.

### 5. Depresi dan kecemasan

Gangguan perasaan sering terjadi pada stroke dan menyebabkan reaksi emosional dan fisik yang tidak diinginkan karena terjadi perubahan dan kehilangan fungsi tubuh

## B. Konsep Keperawatan

### 1. Pengkajian

#### a. Pengkajian Primer

##### 1. Airway

Terdapat sumbatan/obstruksi jalan napas karena terdapat penumpukan secret sebab reflek batuk lemah. Bila terdapat sumbatan maka lakukan :

- a) Chin lift/jaw thrust
- b) Suction / hisap
- c) Guedel airway
- d) Intubasi trakhea dengan leher ditahan (imobilisasi) pada posisinetrals.

##### 2. Breathing

Kelemahan menelan/ batuk/ melindungi jalan napas, timbulnya pernapasan yang sulit dan/ atau tak teratur, suara nafas terdengar ronchi /aspirasi, wheezing, sonor, stidor/ ngorok, ekspansi dinding dada.

##### 3. Circulation

Tekanan darah dapat normal atau meningkat, hipotensi terjadi pada tahap lanjut, takikardi, bunyi jantung normal pada tahap dini, disritmia, kulit dan membran mukosa pucat, dingin, dan sianosis pada tahap lanjut

##### 4. Disability

Menilai kesadaran dengan cepat, apakah sadar, hanya respon terhadap nyeri atau sama sekali tidak sadar. Tidak dianjurkan mengukur GCS. Adapun cara yang cukup jelas dan cepat adalah

A: Awake

V (Verbal ) : Respon bicara

P (Pain) : Respon nyeri

U (Unresponsive ) : Tidak ada respon

##### 5. Exposure

Inspeksi dan palpasi seluruh tubuh pasien untuk mengetahui apakah

terdapat cedera

**b. Pengkajian Sekunder**

- 1) Identitas klien : nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, tanggal masuk rumha sakit dan askes.
- 2) Keluhan utama : nyeri pada kepala dan menurunnya kesadaran
- 3) Riwayat penyakit sekarang : demam, anoreksi dan malaise, peningkatan TIK serta gejala nerologik fokal.
- 4) Riwayat penyakit dahulu : ditanyanyak apakah pasien pernah mengalami infeksi telinga (otitis media, mastoiditis) atau infeksi paru paru (bronkiektaksis, abses paru, empiema), jantung (endokarditis), organ pelvis, gigi dan kulit).
- 5) Aktivitas / istirahatGejala : malaise  
Tanda : Ataksia, sulit jalan , lumpuh , gerakan involunter.
- 6) Sirkulasi  
Gejala : apakah ada riwayat kardiopatologi, seperti endokarditis  
Tanda : Tekanan darah mengalami peningkatan, nadi mengalami penurunan hal tersebut terjadi karena meningkatnya tekanan intracranial
- 7) Eliminasi  
Tanda : biasanya pasien mengalami sulit berkemih ataupun mengalami retensi
- 8) Nutrisi  
Gejala : kehilangan nafsu makan, disfagia (pada periode akut) Tanda : anoreksia, muntah, turgor kulit jelek, membran mukosakering.
- 9) Hygiene  
Gejala : -  
Tanda : ketergantungan terhadap semua kebutuhan, perawatan diri

(pada periode akut).

#### 10) Neurosensori

Gejala : sakit kepala, parestesia, timbul kejang, gangguan penglihatan.

Tanda : penurunan status mental dan kesadaran. Kehilangan memori, sulit dalam keputusan, afasia, mata pupil unisokor (peningkatan TIK), nistagmus, kejang umum lokal.

#### 11) Nyeri / kenyamanan

Gejala : sakit kepala mungkin akan diperburuk oleh ketegangan, leher punggung kaku.

Tanda : tampak terus terjaga, menangis / mengeluh.

#### 12) Pernapasan

Gejala : dispnea ataupun takipnea

Tanda : meningkatnya pola napas pada tahap awal, serta menurunnya kesadaran (letargi sampai koma) dan gelisah

#### 13) Keamanan

Gejala : adanya riwayat ISPA / infeksi lain meliputi : mastoiditis, telinga tengah, sinus abses gigi, infeksi pelvis, abdomen atau kulit, fungsi lumbal, pembedahan, fraktur pada tengkorak / cedera kepala

## 2. **Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian klinis mengenai respon Pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual maupun potensial (PPNI, 2017)

Diagnosa keperawatan dalam penelitian ini yaitu diagnosa aktual. Diagnosa aktual terdiri dari tiga komponen yaitu masalah (problem), penyebab (etiologi), tanda (sign), dan gejala (symptom) (PPNI, 2017). Masalah (problem) merupakan label diagnosa yang menggambarkan inti dari respons pasien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Label diagnosis terdiri dari deskriptor atau penjelas dan fokus diagnostik. Nyeri

merupakan deskriptor, sedangkan akut merupakan fokus diagnostik.

Penyebab (etiologi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan status kesehatan. Etiologi dapat mencakup empat kategori yaitu fisiologis, biologis atau psikologis, efek terapi/tindakan, situasional (lingkungan atau personal), dan maturasional. Proses penegakan diagnosis atau mendiagnosis merupakan suatu proses sistematis yang terdiri atas tiga tahap yaitu analisis data, identifikasi masalah, dan perumusan diagnosis. Metode penulisan pada diagnosa aktual terdiri dari masalah, penyebab, dan tanda/gejala. Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda/gejala (PPNI, 2017).

Diagnosa yang akan muncul pada kasus stroke non hemoragik dengan menggunakan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia dalam Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) yaitu:

1. Risiko perfusi serebral tidak efektif dibuktikan dengan embolisme.  
Definisi: Berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak
2. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (iskemia).  
Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.
3. Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan.  
Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.
4. Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan ketidakmampuan mendengar dan melihat.  
Definisi: Perubahan persepsi terhadap stimulus baik internal maupun eksternal yang disertai dengan respon yang berkurang, berlebihan atau terdistorsi.
5. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular.  
Definisi: Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih

ekstremitas secara mandiri.

6. Gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan penurunan mobilitas.

Definisi: Kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis).

7. Risiko jatuh dibuktikan dengan gangguan penglihatan (mis.ablasio retina).

Definisi: Berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh.

8. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral.

Definisi: Penurunan, perlambatan, atau ketiadaan kemampuan untuk menerima, memproses, mengirim, dan/atau menggunakan sistem simbol.

### 3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan terdiri dari intervensi utama dan pendukung. (PPNI, 2018). Luaran (*outcome*) keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi pasien keluarga atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri dari indikator-indikator atau kriteria hasil pemulihan masalah. Terdapat dua jenis luaran keperawatan yaitu luaran positif (perlu ditingkatkan) dan luaran negatif (perlu diturunkan) (Tim Pokja SLKI, 2019).

Komponen luaran keperawatan diantaranya label (nama luaran keperawatan berupa kata-kata kunci informasi luaran), ekspektasi (penilaian terhadap hasil yang diharapkan, meningkat, menurun, atau membaik), kriteria hasil (karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian hasil intervensi, menggunakan skor 1-3 pada pendokumentasian computer-based). Ekspektasi luaran keperawatan terdiri dari ekspektasi meningkat yang artinya bertambah baik dalam

ukuran, jumlah, maupun derajat atau tingkatan, menurun artinya berkurang, baik dalam ukuran, jumlah maupun derajat atau tingkatan, membaik artinya menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, atau efektif (Tim Pokja SLKI, 2019)



NO	Rencana tindakan keperawatan		
	Diagnosis	Tujuan dan kriteria hasil	Intervensi
1	<b>Penurunan Kapasitas Adaptif Intracranial</b>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama .... jam diharapkan kapasitas adaptif intrakranial (L.12106) dapat adekuat/meningkat dengan Kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesadaran meningkat (5)</li> <li>2. Tekanan Darah Membaik</li> <li>3. Pola napas membaik</li> </ol>	<p>Pemanantauan Tekanan Intrakranial</p> <p><b>Observasi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi menempati ruang, ganggua/n metabolisme, edema serebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan serebrospinal, hipertensi/i intrakranial idiopatik)</li> <li>2. Monitor peningkatan TD</li> <li>3. Monitor pelebaran tekanan nadi (selisih TDS dan TDO)</li> <li>4. Monitor penurunan tingkat kesadaran</li> <li>5. Monitor tekanan perfusi serebral</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertahankan sterilitas sistem pemantauan</li> <li>2. Pertahankan posisi kepala dan leher netral\</li> <li>3. Atur interval pemantauan sesuai kondisi pasien</li> <li>4. Dokumentasikan hasil pemantauan dan yang bertanggung jawab</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <p>Agar pasien mengetahui hasil pemantauan</p>
2	<b>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (iskemia) (D.0077).</b>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan tingkat nyeri (L.08066) menurun dengan Kriteria Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluhan nyeri menurun (5).</li> <li>2. Meringis menurun (5)</li> <li>3. Sikap protektif menurun (5)</li> <li>4. Gelisah menurun (5).</li> <li>5. TTV membaik (5)</li> </ol>	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi lokasi , karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>2. Identifikasi skala nyeri</li> <li>3. Identifikasi respon nyeri non verbal</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Berikan posisi yang nyaman</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri</li> </ol>

			(misalnya relaksasi nafas dalam) <b>Kolaborasi</b> Kolaborasi pemberian analgetik
3	<b>Defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan (D.0019).</b>	<p>elah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan status nutrisi (L.03030) adekuat/membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porsi makan dihabiskan/meningkat (5)</li> <li>2. Berat badan membaik (5)</li> <li>3. Frekuensi makan membaik (5)</li> <li>4. Nafsu makan membaik (5)</li> <li>5. Bisung usus membaik (5)</li> <li>6. Membran mukosa membaik (5)</li> </ol>	<p>Manajemen Nutrisi (I.03119) <b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi</li> <li>2. Monitor asupan makanan</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berikan makanan ketika masih hangat</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ajarkan diit sesuai yang diprogramkan</li> </ol> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian diit yang tepat</li> </ol>
4	<b>Gangguan persepsi sensori berhubungan dengan ketidakmampuan menghidu dan melihat (D.00)</b>	<p>elah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan persepsi sensori (L.09083) membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan tanda dan gejala persepsi dan sensori baik: pengelihatan, pendengaran, makan dan minum baik (5)</li> <li>2. Mampu mengungkapkan fungsi persepsi dan sensori dengan tepat (5)</li> </ol>	<p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor fungsi sensori dan persepsi: pengelihatan, penghiduan, pendengaran dan pengecapan</li> <li>2. Monitor tanda dan gejala penurunan neurologis klien</li> <li>3. Monitor tandatanda vital klien</li> </ol>
5	<b>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular (D.0054).</b>	<p>elah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan mobilitas fisik (L.05042) klien meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergerakan ekstremitas meningkat (5)</li> <li>2. Kekuatan otot meningkat (5)</li> <li>3. Rentang gerak (ROM) meningkat</li> <li>4. Kelemahan fisik menurun (5)</li> </ol>	<p>Dukungan Mobilisasi (I.05173) <b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi adanya keluhan nyeri atau fisik lainnya</li> <li>2. Identifikasi kemampuan dalam melakukan pergerakan</li> <li>3. Monitor keadaan umum selama melakukan mobilisasi</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Libatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anjurkan untuk melakukan pergerakan secara perlahan</li> <li>6. Ajarkan mobilisasi sederhana yg bisa dilakukan seperti duduk ditempat tidur, miring kanan/kiri, dan latihan rentang gerak (ROM).</li> </ol>

6	<b>Gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan penurunan mobilitas (D.0129).</b>	<p>elah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan integritas kulit/jaringan (L.14125) meningkat dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perfusi jaringan meningkat (5)</li> <li>2. Tidak ada tanda tanda infeksi (5)</li> <li>3. Kerusakan jaringan menurun (5)</li> <li>4. Kerusakan lapisan kulit (5)</li> <li>5. Menunjukkan terjadinya proses penyembuhan luka (5)</li> </ol>	<p>Perawatan integritas kulit (I.11353)</p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit</li> <li>2. Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Anjurkan menggunakan pelembab</li> <li>4. Anjurkan minum air yang cukup</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi</li> <li>6. Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya.</li> </ol>
7	<b>Risiko jatuh dibuktikan dengan kekuatan otot menurun (D.0143).</b>	<p>elah dilakukan tindakan keperawatan selama ... jam diharapkan tingkat jatuh (L.14138) menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien tidak terjatuh dari tempat tidur</li> <li>2. Tidak terjatuh saat dipindahkan</li> <li>3. Tidak terjatuh saat duduk</li> </ol>	<p>Pencegahan jatuh (I.14540)</p> <p><b>Observasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor resiko jatuh</li> <li>2. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh</li> </ol> <p><b>Terapeutik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pastikan roda tempat tidur selalu dalam keadaan terkunci</li> <li>4. Pasang pagar pengaman tempat tidur</li> </ol> <p><b>Edukasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Anjurkan untuk memanggil perawat</li> </ol>

### C. Teori Keperawatan (Self Care)

Pada hakikatnya seluruh manusia memiliki kebutuhan akan perawatan diri dan memiliki hak untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan agar mempertahankan kehidupan, kesehatan serta kesejahteraan individu baik keadaan sehat ataupun sakit yang dilakukan oleh orang itu sendiri disebut *self care* (Dorothea Orem, 2001)

Terdapat 3 teori yang saling berkesinambungan dengan teori defisit perawatan diri (*Deficit Self Care*) Orem yaitu :

1. Teori perawatan diri (*self care theory*) : memperlihatkan dan mendefinisikan tujuan serta cara seseorang merawat diri
2. Teori defisit perawatan diri (*deficit self care theory*) : memperlihatkan serta

mendefinisikan seseorang yang butuh bantuan dalam merawat diri, seperti tenaga keperawatan.

3. Teori sistem keperawatan (*nursing system theory*) : memperlihatkan serta mendefinisikan hubungan interpersonal yang harus dikerjakan serta dipertahankan seorang perawat agar dapat melakukan sesuatu secara produktif.

Berikut penjelasan ketiga teori keperawatan tersebut adalah sebagai berikut

### 1. Teori perawatan diri (*self care theory*) berdasarkan Orem terdiri dari

- a. Tindakan yang diprakarsai oleh seseorang dan diadakan berdasarkan kepentingan untuk mempertahankan gidup, fungsi tubuh yang sehat, perkembangan dan kesejahteraan disebut perawatan diri
- b. Kemampuan yang rumit dari seseorang ataupun orang dewasa agar mengetahui serta memenuhi kebutuhannya yang diberikan untuk melakukan fungsi dan perkembangan tubuh disebut agen perawatan diri (*self care agency*). Tingkat perkembangan usia, pengalaman hidup, orientasi sosial kultural tentang kesehatan dan sumber-sumber lain yang ada pada individu tersebut mempengaruhi *Self Care Agency*
- c. Tindakan perawatan diri secara total yang dikerjakan dalam kurun waktu yang ditentukan agar terpenuhinya semua kebutuhan perawatan diri orang tersebut melalui trik-trik tertentu antara lain mengatur nilai-nilai terkait pemenuhan udara yang adekuat, cairan maupun pemenuhan aktivitas yang dikerjakan agar terpenuhinya kebutuhan tersebut (upaya promosi, pencegahan, pemeliharaan dan penyediaan kebutuhan) disebut kebutuhan perawatan diri terapeutik (*therapeutic self care demands*)

Model Orem's menyebutkan ada beberapa kebutuhan *self care* atau yang disebut sebagai *self care requisite*, yaitu

- a. Kebutuhan perawatan diri universal (*Universal self care requisite*)

Hal yang umum bagi seluruh manusia meliputi pemenuhan kebutuhan yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan udara, menurut Orem pemenuhan kebutuhan udara yaitu bernapas tanpa alat bantu napas seperti oksigen

- 2) Pemenuhan kebutuhan air atau minum tanpa gangguan, menurut Orem kebutuhan air yaitu sekitar 6-8 gelas air/hari.
  - 3) Pemenuhan kebutuhan makanan tanpa gangguan, seperti mampu mengambil makanan atau peralatan makan secara mandiri
  - 4) Pemenuhan kebutuhan eliminasi dan kebersihan tubuh atau bagian bagian tubuh. Menyediakan perawatan terkait dengan proses eliminasi, seperti seseorang mampu dalam melakukan eliminasi secara mandiri seperti BAK serta BAB. Serta mampu melakukan kebersihan diri secara mandiri.
  - 5) Pemenuhan kebutuhan aktivitas dan istirahat. Agar kebutuhan aktivitas dapat terpenuhi dianjurkan untuk berolahraga serta pola tidur dijaga serta mampu mengidentifikasi gejala yang dapat mengganggu intensitas tidur.
  - 6) Pemenuhan kebutuhan menyendiri dan interaksi sosial. Bersosialisasi bersama teman sebaya, saudara dan dapat beradaptasi dengan lingkungan.
  - 7) Pemenuhan pencegahan dari bahaya pada kehidupan manusia. Bahaya yang dimaksud menurut Orem yaitu mengidentifikasi jenis bahaya yang dapat membahayakan diri sendiri, mampu mengambil tindakan untuk mencegah bahaya dan melindungi diri sendiri dari situasi yang berbahaya
- b. Kebutuhan Perkembangan Perawatan Diri (*Development self care requisite*).
- Perubahan kondisi tubuh serta status social dapat mempengaruhi proses perkembangan pada setiap orang. Tahap perkembangan pada manusia yaitu :
- 1) Menyediakan hal hal tertentu yang memudahkan proses perkembangan. Memfasilitasi seseorang untuk berkembang contohnya yaitu bersekolah.
  - 2) Terlibatnya individu untuk mengembangkan diri. Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan
  - 3) Pencegahan terhadap gangguan yang mengancam. Menurut Orem terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu kebutuhan perkembangan perawatan diri pada anak antara lain:
    - a) Pendidikan anak usia sekolah masih kurang

- b) Terdapat permasalahan pada adaptasi sosial
  - c) Gagalnya seseorang agar sehat
  - d) Kehilangan orang-orang tercinta contohnya orang tua, saudara serta teman.
  - e) Lingkungan yang baru atau lingkungan yang asing Terjadi kecacatan
- c. Kebutuhan Perawatan Diri Pada Kondisi Adanya Penyimpangan Kesehatan (*Health Deviation Self Care Requisite*).

Kebutuhan tersebut terkait dengan penyimpangan dalam aspek struktur dan fungsi manusia. Individu yang sakit, terluka mengalami kondisi patologis tertentu, kecacatan atau individu atau individu tidak mampu menjalani pengobatan tetap membutuhkan perawatan diri. Adapun kebutuhan perawatan diri pada kondisi tersebut yaitu :

- 1) Mencari bantuan kesehatan
- 2) Individu sadar terhadap resiko adanya masalah akibat dari pengobatanyang dijalani
- 3) Melakukan diagnostik, terapi, dan rehabilitatif, memahami efek buruk dari perawatan.
- 4) Terdapat modifikasi gambaran atau konsep diri.
- 5) Menyesuaikan gaya hidup yang dapat mendukung perubahan status kesehatan.

#### **D. Evidence Based Nursing**

##### 1. Definisi Head Head Up 30° \

Head up atau elevasi kepala merupakan perubahan posisi kepala yang mempengaruhi aliran darah di otak untuk mencegah terjadinya peningkatan TIK (Anderson, et al, 2017). Saat dilakukan reposisi head up aliran darah ke otak pada pasien stroke yang sebelumnya tidak lancar menjadi lebih lancar sehingga menghindari terjadinya gangguan persyarafan yang mengakibatkan gangguan proses difusi oksigen pada alveolus di paru-paru sehingga menjadi penyebab kurangnya kadar oksigen dalam darah (Ugraz, 2018). Pasien yang mengalami penurunan saturasi oksigen harus segera mendapat penanganan secara khusus. Dalam penatalaksanaan penurunan saturasi oksigen pada

pasien stroke dapat menggunakan cara farmakologi yaitu dengan pemberian O2 dan non farmakologi yaitu dengan pemberian posisi head up 30 derajat. Posisi head up 30 derajat pada pasien stroke berpengaruh pada saturasi oksigen, di mana dapat mempertahankan kestabilan fungsi dari kerja organ agar tetap lancar khususnya sistem pernafasan dan sistem regulasi dini yang bisa bekerja secara optimal serta memberikan kenyamanan bagi penderita stroke.

Peneliti berpendapat bahwa pemberian posisi head up 30 derajat merupakan tindakan mandiri keperawatan, yang dapat meningkatkan saturasi oksigen pada pasien stroke. Posisi head up 30 derajat mempengaruhi venous return menjadi maksimal sehingga aliran darah ke serebral menjadi lancar, meningkatkan metabolisme jaringan serebral dan memaksimalkan oksigenasi jaringan otak, sehingga otak dapat bekerja sesuai fungsinya.

## 2. Terapi Murottal

Terapi Murottal Al-Qur'an adalah rekaman suara Al-Qur'an yang dilagukan oleh Qori' (Pembaca Al-Qur'an). Lantunan Al-Qur'an mengandung suara manusia, sedangkan suara manusia merupakan intrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon- hormon stres dengan cara mengaktifkan hormon endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian rasa takut, cemas, serta dapat memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi dan aktivitas gelombang otak (Bahuddin, 2021).

Membaca Al-Qur'an salah satu bentuk dzikir yang dituntut oleh islam bagi umatnya kemudian dianalogika dengan meditasi transendensi dalam memberikan manfaat positif bagi tubuh, maka benar firman Allah yang berbunyi :

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

*Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar rahmat bagi orang yang beriman (Q.s. Al Isra :82)*

Mendengarkan Al-Qur'an menimbulkan efek ketenangan dalam tubuh karena adanya unsur meditasi, autosugesti dan relaksasi yang terkandung didalamnya Al-Qur'an telah diturunkan ayat sebagai berikut: "Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat" (Al-A'raf:204).

Mekanisme terapi suara menyebabkan peningkatan kadar dopamin otak melalui sistem kalomodulin-dependen. Peningkatan kadar dopamin ini menghambat aktivitas simpatik melalui reseptor dopamin  $\alpha_2$  yang dapat mengurangi tekanan darah yang selanjutnya suara dapat mengarahkan persepsi seseorang keadaan emosional yang lebih menyenangkan sehingga memicu perasaan yang berhubungan dengan aktivasi sistem limbik sehingga melepaskan endorfin yang mempengaruhi sistem fisiologi seseorang (Kuhlman, 2016).

Membaca Al-Qur'an mempengaruhi proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh manusia sehingga dapat berfungsi aktif dan sempurna. Ketika diperdengarkan Murottal, maka harmonisasi dalam murottal yang indah akan masuk telinga dalam bentuk suara (audio) yang menggetarkan gendang telinga, mengguncangkan cairan di telinga dalam serta menggetarkan sel-sel rambut di dalam koklea untuk selanjutnya melalui saraf koklearis menuju otak dan menciptakan imajinasi keindahan di otak kanan dan kiri. Hal ini akan memberikan dampak berupa kenyamanan dan perubahan perasaan. Perubahan perasaan ini diakibatkan karena murottal dapat menjangkau wilayah kiri kortek cerebri (Andoro, 2014)

Di dalam intervensi ini menggunakan salah satu surat makkiyah dalam Al-Qur'an yaitu surah Ar-Rahman yang merupakan surat ke 55 dan berjumlah 78 ayat. Dalam surat ini menerangkan bahwa Allah swt memiliki sifat murah hati kepada hamba-hambanya, yakni dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahman mempunyai karakter ayat yang penek sehingga ayat ini nyaman didengarkan dan dapat menimbulkan efek relaksasi yang bagi pendengar yang masih awam sekalipun (Lumbantobing & Anna, 2019).

Murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman merupakan terapi efektif yang bisa

menghilangkan rasa takut, gelisah & cemas. Al-Qur'an menjadi sumber ilmu kesehatan kejiwaan dan bisa diterapkan menjadi terapi mendengarkan 4 lantunan ayat Al-Qur'an atau biasa dianggap murottal Al-Qur'an (Linda Wati, 2020).

Surat Ar-Rahman merupakan surah yang menerangkan akan kepermurahan Allah SWT. kepada hamba-hamba-Nya, yaitu dengan memberikan nikmat yang tak terhingga baik di dunia maupun diakhirat kelak. Sehingga Q.S. Ar-Rahman memiliki efek yang baik dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, membuat otak menjadi rileks dan mengaktifkan sistem limbik yang akan melepaskan hormon serotonin dan mengaktifkan hormon ACTH. Akibatnya dapat menurunkan tekanan darah, memperlambat pernafasan, dan denyut nadi sehingga dapat menurunkan kecemasan (Maulidia, Z. & Muladiatin, 2018)

### 3. Tujuan

#### a. Posisi *head up* 30°

Posisi *head up* 30° memiliki tujuan agar tekanan intracranial menurun pada seseorang yang menderita trauma kepala, selain itu, posisi *head up* 30° memiliki manfaat agar oksigen ke otak meningkat. (Adithya Nugroho, 2018)

Posisi *Head up* 30° bertujuan untuk mengamankan pasien dalam pemenuhan oksigenasi untuk menghindari hipoksia pada pasien, dan tekanan intracranial dapat stabil dalam kisaran norma. Selain itu posisi ini lebih efektif untuk menjaga tingkat kesadaran karena mempengaruhi posisi anatomi tubuh manusia yang kemudian mempengaruhi hemodinamik pasien. Posisi *head up* 30° juga efektif untuk homeostasis otak dan mencegah kerusakan otak sekunder dengan stabilitas fungsi pernapasan untuk mempertahankan perfusi serebral yang memadai. (Pertami dkk, 2017)

#### b. Terapi Murottal

Adapun tujuan terapi Murottal Al-Qur'an yaitu :

1. Meningkatkan status kesadaran pasien yang ditunjukkan dengan nilai GCS meningkat.
2. Memperbaiki kondisi pasien yang ditandai dengan status hemodinamik dalam batas normal.
3. Mencegah kerusakan sel otak akibat iskemik yang ditimbulkan oleh cedera kepala (Ismoyowati, 2021).

### 4. Indikasi

- a. Posisi Head up 30°
    1. Pasien yang mengalami cedera kepala
    2. Pasien yang mengalami peningkatan Tekanan Intracranial
    3. Pasien yang mengalami sesak napas
  - b. Terapi Murottal
    1. pasien yang mengalami cedera kepala ringan sampai berat
    2. pasien pasca kraniotomi
    3. pasien yang mengalami non hemoragic stroke/ stroke hemoragic (Arif dan Atika, 2019).
4. Kontraindikasi
- a. Posisi head up 30°  
Pasien yang mengalami Fraktur Servical
  - b. Terapi Murottal  
Kontraindikasi Murottal menurut (Ika Sulistyawati, 2020) Terapi Murottal ini tidak dapat digunakan bagi pasien non muslim dan yang mengalami gangguan pendengaran.
5. Prosedur Pemberian
- a. Standar operasional prosedur pemberian posisi *head up* 30° yaitu

No	Prosedur
	<p><b>Fase orientasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberi salam terapeutik kepada keluarga klien Rasional : Salam terapeutik merupakan salah satu cara untuk membina terus antara perawat dan pasien / keluarga pasien.</li> <li>b. Memperkenalkan diri : Rasional : Memperkenalkan diri dapat menumbuhkan hubungan saling percaya kepada perawat dan keluarga klien.</li> <li>c. Menjelaskan tujuan Rasional : Dengan memberi penjelasan kepada klien / keluarga klien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, maka keluarga klien diharapkan mempunyai gambaran mengenai tindakan yang akan dilakukan dan memberi pilihan klien dan keluarga untuk tetap melanjutkan tindakan atau tidak.</li> <li>d. Kontrak Waktu</li> </ol> <p><b>Fase Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien dibaringkan dalam keadaan terlentang.</li> <li>b. Mengatur ketinggian tempat tidur dan memposisikan kepala pasien lebih tinggi sekitar 30° dan badan tetap lurus.</li> </ol>

	<p>c. Posisi kaki lurus dan tidak menekuk</p> <p><b>Fase Terminasi</b></p> <p>a. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada keluarga klien Rasional : Agar keluarga klien mengetahui tindakan selanjutnya</p> <p>b. Mengucapkan salam Rasional : Membina hubungan saling percaya</p> <p><b>Pendokumentasian:</b></p> <p>a. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama pasien, umur, jenis kelamin, dll</li> <li>b. Keluhan utama</li> <li>c. Tindakan yang dilakukan (terapi murottal)</li> <li>d. Lama tindakan</li> <li>e. Jenis terapi murottal yang diberikan</li> <li>f. Reaksi selam, setelah terapi pemberian terapi murottal</li> <li>g. Respon pasien</li> <li>h. Nama perawat</li> <li>i. Tanggal pemeriksaan</li> </ol> <p>(Ismoyowatu, 2021)</p>
--	--

Hal yang perlu diperhatikan untuk posisi head up 300 ialah fleksi, ekstensi dan rotasi kepala akan meningkat tekanan perfusi selebral yang akan mempengaruhi peningkatan tekanan intrakarnial (Dimitros dan Alred, 2002).

b. Standar operasional prosedur pemberian terapi murottal yaitu

No	Prosedur Tindakan
1	<p>Fase orientasi:</p> <p>e. Memberi salam terapeutik kepada keluarga klien Rasional : Salam terapeutik merupakan salah satu cara untuk membina terus antara perawat dan pasien / keluarga pasien.</p> <p>f. Memperkenalkan diri : Rasional : Memperkenalkan diri dapat menumbuhkan hubungan saling percaya kepada perawat dan keluarga klien.</p> <p>g. Menjelaskan tujuan Rasional : Dengan memberi penjelasan kepada klien / keluarga klien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, maka keluarga klien diharapkan mempunyai gambaran mengenai tindakan yang akan dilakukan dan memberi pilihan klien dan keluarga untuk tetap melanjutkan tindakan atau tidak.</p> <p>h. Kontrak Waktu Rasional : Menjelaskan waktu dilakukannya tindakan dan durasi serta berapa kali dilakukannya tindakan kepada keluarga klien agar klien atau keluarga klien memahami tindakan yang akan dilakukan berikutnya.</p> <p>i. Menyiapkan alat Rasional : Memudahkan perawat melakukan tindakan.</p>

2.	<p>Fase Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencuci tangan Rasional : Menghindari penyebaran mikroorganisme</li> <li>b. Membaca basmalah Rasional : Menerapkan nilai islami</li> <li>c. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan tingkat kesadaran pasien Rasional : Mengetahui keadaan umum pasien sebelum dilakukan tindakan</li> <li>d. Memberikan terapi <i>Murattal</i> selama 15-20 menit dengan menggunakan handphone Rasional : Untuk meningkatkan keadaan umum serta meningkatkan keasadaran pasien</li> <li>e. Mengatur volume musik dengan frekuensi 40 Hz (Volume sedang) Rasional : Agar klien dan keluarga klien merasa nyaman</li> <li>f. Melakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital dan kesadaran atau (GCS) pasien setelah diberikan terapi <i>Murottal</i>.</li> <li>g. Memasukkan hasil pemeriksaan ke lembar pemantauan tanda-tanda vital pasien.</li> </ol>
3.	<p>Fase Terminasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrak stimulasi selanjutnya kepada keluarga klien Rasional : Agar keluarga klien mengetahui tindakan selanjutnya</li> <li>b. Mengucapkan salam Rasional : Membina hubungan saling percaya</li> </ol>
4	<p>Pendokumentasian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Catat hasil kegiatan di dalam catatan keperawatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama pasien, umur, jenis kelamin, dll</li> <li>b. Keluhan utama</li> <li>c. Tindakan yang dilakukan (terapi murottal)</li> <li>d. Lama tindakan</li> <li>e. Jenis terapi murottal yang diberikan</li> <li>f. Reaksi selam, setelah terapi pemberian terapi murottal</li> <li>g. Respon pasien</li> <li>h. Nama perawat</li> <li>i. Tanggal pemeriksaan</li> </ol> </li> </ol> <p>(Ismoyowatu, 2021)</p>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Studi Kasus**

Menurut (Hidayat, 2019) studi kasus (Case Studies) ialah bagian dari metodologi penelitian, atau sering dibahasakan bahwa peneliti dituntut agar lebih cermat, trliti untuk mengungkapkan suatu kasus atau peristiwa, baik kasus perseorangan maupun berkelompok. Pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini jenis penelitian yang penulis gunakan ialah “Studi Kasus” dimana dalam pelaksanaannya yaitu dengan melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang menjalankan proses perawatan di rumah sakit

#### **B. Subyek Studi Kasus**

Dalam studi kasus ini subjek yang digunakan adalah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteris inklusi dan ekslusi.

1. Kriteria inklusi ialah suatu karaterisitik umum dalam subjek penelitian dari suatu populasi target yang bisa dijangkau dan diteliti (Nuralam, 2017).
  - a. Pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau GCS (3-9)
  - b. Pasien dengan Non Hemoragic Stroke / Stroke Hemoragic yang sedang dirawat di ruang ICU
2. Kriteria ekslusi ialah menghapus atau mengeluarkan subjek tidak memenuhi kriteria inklusi
  - a. Pasien yang tidak mengalami penurunan kesadaran

#### **C. Fokus Studi Kasus**

Fokus studi kasus pada penelitian ini ialah melakukan asuhan keperawatan pada pasien Non Hemoragic Stroke dengan penurunan kesadaran dan ketidakstabilan saturasi oksigen implementasi pengaturan kepala posisi 30 derajat dikombinasi dengan terapi murottal

#### **D. Instrumen Studi Kasus**

Menurut (Sugiyono, 2014) instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan berupa alat berupa bantal dimana alat ini digunakan untuk meninggikan kepala 30 ° dikombinasi dengan terapi murottal

#### **E. Prosedur pengambilan Data**

##### **1. Tahap Persiapan**

- a) Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti, kemudian mengajukan berbasis *Evidence based practice nursing* (EBPN) kepada pasien yang telah dipilih, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing institusi.
- b) Peneliti melakukan koordinasi kepada kepala ruangan tempat pasien dirawat inap yaitu ruang *Intensive care unit* (ICU) RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, serta menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan.

##### **2. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.

3. Penyusunan Laporan Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah yang telah dianjurkan oleh institusi dalam hal ini Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prodi Ners.

#### **F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Penelitian ini dilakukan di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, tepatnya di ruang Intensive Care Unit (ICU), dan dilakukan pada tanggal

#### **G. Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data dilakukan saat peneliti berada dilapangan atau ruang perawatan, pada saat pengumpulan sampai keseluruhan fakta-fakta, membandingkan dengan teori yang kemudian akan dituangkan melalui opini pada bagian pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menyusun

kalimat menjadi sebuah paragraf berdasarkan jawaban yang telah diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara, serta dokumentasi yang kemudian akan dipresentasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif berdasarkan hasil intervensi yang telah dilakukan peneliti kepada pasien.

## H. Etika Studi Kasus

Dalam penelitian studi kasus ini peneliti menekankan beberapa prinsip etik dalam keperawatan yaitu menurut (Notoatmojo, 2012).

### 1. *Autonomy* (Otonomi /Keyakinan)

Peneliti menerapkan prinsip otonomi bahwa seseorang / pasien memiliki keyakinan, keputusan, ataupun pilihan sendiri untuk memberi persetujuan kepada peneliti dalam memberikan tindakan. Dalam hal ini persetujuan tindakan yang akan diberikan kepada pasien telah melalui Informed consent (izin) kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk membantu pasien merubah posisi kepala 30°

### 2. *Non malaficiencie* (Tidak Merugikan)

Peneliti menerapkan prinsip tidak merugikan, dimana selama proses perawatan atau pemberian Posisi kepala 30° peneliti tidak akan memberikan kerugian kepada pasien dalam hal ini, tidak dapat memperburuk keadaan pasien baik secara fisik maupun psikologi. Sebagaimana Firman Allah swt dalam QS. Al-Qasas/ 28:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya :

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Al-Qasas/28:77)

Tafsir Ringkas (Kemenag, 2019) Nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni (mahdah) dan melarang memperhatikan dunia. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu di dunia, berupa kekayaan dan karunia lainnya, dengan menginfakkan dan menggunakannya di jalan Allah. Akan tetapi, pada saat yang sama janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia dengan tanpa berlebihan. Dan berbuatbaiklah kepada semua orang dengan bersedekah sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan mengaruniakan nikmat-Nya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan dalam bentuk apa pun di bagian mana pun di bumi ini, dengan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan dan akan memberikan balasan atas kejahatan tersebut. (Al-Qasas/28:77).

3. *Confidentialy* (Kerahasiaan)

Peneliti menerapkan prinsip kerahasiaan dimana informasi pasien dijaga kerahasiaannya dalam hal ini penggunaan nama diubah menjadi inisial pasien, sehingga tidak akan ada dari pihak manapun yang akan mengetahui identitas pasien

**BAB IV**  
**LAPORAN KASUS**

**A. Pengkajian**

<b>PRIMARY /SURVEY</b>			
Nama Pasien : Tn.M	Umur : 76 tahun	Jenis kelamin : L	No. RM : 01008406
Nama Keluarga : Tn.M Agama : Islam Pekerjaan : pensiunan Alamat Rumah : Toraja Telp/Hp : 082193968642 Diagnosa Medis : Non Hemoragik Stroke (NHS)Tanggal Masuk ICU : 7/02/2023			
Datang Tanggal : 7/02/2023		Pukul: 01.33	Asal Ruangan: IRD
Alat Terpasang : <input checked="" type="checkbox"/> Infus	<input checked="" type="checkbox"/> Kateter	<input checked="" type="checkbox"/> NGT	<input checked="" type="checkbox"/> Trakeostomi
Ventilator <input checked="" type="checkbox"/> Monitor	<input type="checkbox"/> Transfusi	<input checked="" type="checkbox"/> CVC	
<b>KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1</b>			
Keluhan Utama : Penurunan kesadaran Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera : Klien datang dengan keluhan penurunan kesadaran setelah pasien merasa pusing, jatuh hingga kepala terbentur kelantai dan pingsan dirumahnya. Keadaan memberat sejak 1 bulan yang lalu dimana pasien berkomunikasi tidak nyambung hingga pasien tidak dapat berkomunikasi sama sekali lalu dibawah ke RS Elim toraja lalu dirujuk keRSWS. Awalnya pasien dibawah keIGD lalu dipindahkan keHCU, terpasang ETT dan pasien didiagnosis mengalami stroke. Riwayat penurunan kesadaran ada, riwayat muntah ada dan tidak ada riwayat kejang.Klien juga pernah dirawat di RS Stella Maris dan didiagnosa memiliki tumor paru sejak 6 tahun yang lalu, riwayat batuk berlendir ada Riwayat Kesehatan Keluarga : anak pasien mengatakan saudara dari pasien mengalami stroke serta istri dari pasien mengalami hipertensi Orientasi (tempat, waktu, dan orang) :Tidak dapat dikaji			

Pengkajian Keperawatan	Masalah/Diagnosa Keperawatan (SDKI)	Luaran Keperawatan dan Kriteria Hasil (SIKI)	Intervensi Keperawatan (SLKI)
<p><b>A. Airway</b></p> <p>- Tidak bebas :</p> <p>Terdapat Sputum bercampur darah, pasien terasang Trakeostomi</p> <p>- Suara napas: Ronchi</p> <p>Lain-lain: Sianosis (+/-) ; - RR : 25 x/menit Tidak ada refleks GCS : E<sub>4</sub> M<sub>5</sub> V<sub>x</sub> (trakeostomi)</p> <p>Ada Masalah (Ya)</p>	<p>Bersihkan jalan nafas tidak efektif</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>a. Produksi sputum menurun</p> <p>b. Frekuensi napas membaik</p>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>- Monitor bunyi napas</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>- Posisikan semi fowler atau supinasi</p> <p>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 5 detik</p> <p>- Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal</p> <p>Berikan oksigen, jika perlu</p>
<p><b>B. Breathing</b></p> <p><b>1. Pola napas:</b> tidak teratur</p> <p><b>2. Frekuensi napas:</b> 25 x/mnt</p> <p><b>3. Bunyi napas:</b></p> <p>Ronchi</p> <p>- <b>Irama napas</b></p> <p>Teratur √ Tidak teratur</p> <p>- <b>Tanda distress pernapasan</b></p> <p>Penggunaan otot bantu ada</p> <p>Retraksi dada/interkost</p> <p>Cuping hidung tidak ada</p> <p>- <b>Jenis pernapasan:</b></p> <p>Pernapasan dada</p> <p>Lain-lain:</p> <p>- sesak : ada</p> <p>- oksigenasi : pasien tampak</p>	<p>Gangguan Pertukaran Gas</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>Tingkat kesadaran meningkat</p> <p>Pola napas membaik</p> <p>PCO<sub>2</sub> membaik</p> <p>pH arteri membaik</p>	<p><b>Pemantauan Respirasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>- Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas</p> <p>- Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik)</p> <p>- Monitor kemampuan batuk efektif</p> <p>- Monitor adanya produksi sputum</p> <p>- Monitor adanya sumbatan jalan napas</p> <p>- Auskultasi bunyi napas</p> <p>- Monitor SPO<sub>2</sub></p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>- Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi</p> <p>Dokumentasikan</p>

<p>terpasang NRM 10 Liter</p> <p>Sianosis (-/-) Warna Kulit: sawo matang</p> <p><i>Diaforesis</i> (-/-) Kesadaran: GCS : E<sub>4</sub> M<sub>5</sub></p> <p>V<sub>x</sub> trakeostomi</p> <p><b>Tanggal pemeriksaan : 04 Februari 2023</b></p> <p><b>Foto Thorax:</b></p> <p><b>Kesan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cardiomegaly dengan dilatasi dan elongasi</li> <li>- pneumonia bilateral</li> </ul> <p><b>Foto Thorax AP 17 Februari 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terpasang ETT Pada trachea dengan tip +/- 4.91 cm diatas carina</li> <li>- efusi pleura sinistra</li> <li>- dilatatio, elongatio et atherosclerosis aortae</li> </ul> <p><b>Hasil kimia klinik : Analisa Gas Darah (08/2/2023)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pH 7.36 (Normal: 7.40) ←</li> <li>· pCO<sub>2</sub> 79.6 mmHg (Normal: 40 mmHg) ←</li> <li>· HCO<sub>3</sub> 46.4 mmol/l (Normal: 24 mmol/l) →</li> <li>· BE<sub>ecf</sub> - 20.9 mmol/l (Normal: 0 mmol/l) →</li> </ul> <p><b>Interpretasi AGD :</b> Asidosis respiratorik terkompesasi sebagian Ada Masalah (Ya)</p>			hasil pemantauan
<p><b>C. Circulation</b></p> <p><b>1. Akral:</b></p> <p>√ Hangat                      Dingin</p> <p><b>2. Pucat :</b></p> <p>Ya                                  √Tidak</p>			

<p><b>3. Sianosis :</b></p> <p>Ya                   √Tidak</p> <p><b>4. Pengisian Kapiler : 2 detik</b></p> <p>√&lt; 3 detik       &gt; 3 detik</p> <p><b>5. Nadi:</b></p> <p>a. Frekuensi 112x/menit</p> <p>b. Irama:</p> <p>      √Reguller       Irreguler</p> <p>c. Kekuatan:</p> <p>      √Kuat Lemah</p> <p>Palpitasi (+/-) ; tidak</p> <p>Nadi Perifer: 112</p> <p>x/menit,teraba kuat</p> <p><b>6. TD 143/95 mmHg</b></p> <p><b>7. Kelembaban kulit :</b></p> <p>√ Lembab       Kering</p> <p>Warna Kulit ; sawo</p> <p>matang</p> <p><b>8. Turgor:</b></p> <p>√Normal Kurang</p> <p>Lain-lain</p> <p>Suara Jantung (S3/S4) ;</p> <p>tidakada suara jantung</p> <p>tambahan</p> <p><i>Ejection Fraction (EP) :sulit</i></p> <p><i>dikaji</i></p> <p>Ada Masalah (Tidak ada)</p>			
---	--	--	--

<p><b>D. Disability</b></p> <p><b>1. Tingkat kesadaran : Somnolen</b></p> <p><b>2. Nilai GCS</b></p> <p>E: 4 M: 5 V: x</p> <p><b>3. Pupil</b></p> <p>√Isokor                      Anisokor</p> <p>Respon Cahaya : +/+</p> <p>Refleks pupil (+/+)</p> <p>Diameter : 2.5 mm/2.5 mm</p> <p><b>4. Ekstremitas</b></p> <p>Sensorik</p> <p>Tidak</p> <p>Motorik</p> <p>Tidak</p> <p>Reflex patella ka/ki: -/-</p> <p>Reflex tendon dalam bisept/trisept: sulit dikaji</p> <p>Refleks Patologis:</p> <p>Refleks <i>Chaddock</i> (+/-): -/-</p> <p><i>Hoffman</i> (+/-): sulit dikaji</p> <p><b>Kekuatan otot :</b></p> <p>3/3</p> <p>0/0</p> <p>Tubuh terasa hangat</p> <p><b>6. Range Of Motion : (Pasif)</b></p> <p><b>Keadaan Umum:</b> lemah</p> <p><b>7. Tanda vital</b></p> <p>TD : 143/95 mmHg</p> <p>HR: 112x/menit</p> <p>Pernapasan : 25x/menit</p> <p>Suhu ; 36,7 °C</p> <p>SPO2 ; 88 %</p> <p>via canula trakeostomi</p> <p><b>5. Ada Masalah (Ya)</b></p>	<p>Penurunan kapasitas adaptif intrakranial</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan kapasitas adaptif meningkat dengan kriteria hasil</p> <p>Tingkat kesadaran meningkat</p> <p>Fungsi kognitif meningkat</p> <p>Tekanan darah membaik</p> <p>Pola nafas membaik</p> <p>Respon pupil membaik</p> <p>Refleks neurologis membaik</p> <p>Tekanan intrakranial membaik</p>	<p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial</b></p> <p><b>Observasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikasi penyebab peningkatan TIK</li> <li>- monitor tanda dan gejala peningkatan TIK</li> <li>- monitor intake dan output cairan</li> </ul> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang</li> <li>- berikan posisi semi fowler</li> <li>- pertahankan suhu tubuh normal</li> </ul> <p><b>Kolaborasi:</b></p> <p>Kolaborasi pemberian obat</p>
---	---	--	---

<p><b>E. Exposure</b></p> <p>1. Adanya trauma pada daerah: bagian belakang kepala</p> <p>Ada Masalah (ada)</p> <p><b>F. Folley Catheter</b></p> <p>1. kateter (+/-) : Terpasang kateter</p> <p>ukuran :</p> <p>2. Produksi urine : 100 cc</p> <p>3. Warna urine : kuning</p> <p>Ada Masalah (tidak)</p> <p><b>G. Gastric Tube</b></p> <p>1. NGT : Terpasang NGT</p> <p>ukuran :</p> <p>2. NGT Dekompresi (+/-)</p> <p>3. Warna Residu NGT : tidak ada</p> <p>Ada Masalah : tidak</p>			
--	--	--	--

**COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON  
GOING ASSESMENT**

**Riwayat Kesehatan Lalu :**

**AMPLE**

- A (Allergies) = tidak ada  
M (Medications) = tidak ada  
P (Past Illness) = pasien pernah didiagnosa mengalami penyakit tumor paru  
L (Last Meal) = nasi, sayur dan lauk-pauk  
E (Event Leading) = tidak ada

**AIUEO**

- A (Alkohol) : tidak ada  
I (Insulin) : tidak ada  
U (Uremia) : tidak ada  
E (Epilepsi) : tidak ada  
O (Over dosis) : tidak ada

**Pengkajian B1-B6****B1 (Breathing)**

- Bentuk dada: Normochest
- RR : 25x/menit
- Pola Nafas
- Terpasang OPA (-) :tidak NPA (+/-): tidak *Endotracheal Tube* (+/-): tidak *Tracheostomi* (+/-) : *terpasang*
- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): Ya
- Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak
- Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: Terpasang NRM 10 liter/menit melalui tracheostomi
- Suara Nafas: Ronchi
- Suara nafas tambahan : Ada ronchi (+/-): -  
Stridor (+/-): - Gargling (+/-): -  
Rochi (+/-) : +  
*Masalah : Ada*  
- Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif

**B2 (Circulation)**

- Tekanan Darah : 143/95mmHg
- CRT : 2 detik
- Sianosis (+/-): tidak
- Akral : Hangat
- Tubuh : tidak pucat
- Edema tidak  
*Masalah : tidak ada masalah*

**B3 (Neurologi)**

- Tingkat Kesadaran : Samnolen
- GCS : E 4 M 5 Vx
- Refleks Kornea (+/-): ada
- Refleks Cahaya (+/-): -/-
- Reflek Pupil (+/-): -/-  
Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 / 2.5 )
- Refleks Motorik (bisep +/- trisep +/- patella +/- ) : sulit dikaji
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): sulit dikaji
- Skor Nyeri 3 BPS  
*Masalah : Tidak*

**B4 (Bladder)**

- Edema Vagina/Scrotum (+/-): tidak ada
- Produksi Urine: 390 cc/ 24 jam
- Warna Urine: kuning pekat
- Bau Urine: amonia
- Sedimen Urine (+/-): - darah (+/-): -

- Distensi Uretra (+/-): -
- Terpasang kateter Urine (+/-): iya Jenis: silicon
- Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) :Input:  
 Susu : 600 ml Jus buah: 100 ml  
 Bubur Saring : 600 ml  
 Omeprazole : 40 mg  
 Levofloxacin : 250 mg  
 Piracetam : 1200 mg  
 Norepineprin : 0,05mg  
 Curcuma : 4000 mg  
 Bisoprolol : 2,5 mg  
 Vip Albumin : 2 caps  
 Levofloxacin : 250 mg  
 Vit K : 1 amp/8 jam  
 Vit C : 250 mg  
 Paracetamol : 500 mg  
 Asam tranexamat : 18 mg  
 Infus RL : 1000 ml

**Output :**

Urine 189 ccResidu :-

IWL ; 15X 60X 24 / 24 Jam = 900cc

**B5 (Bowel)**

- Terpasang NGT (+/-): iya ukuran: 18 Fr, terpasang sejak tanggal 30 Januari 2022
- Kebutuhan Nutrisi enteral 1711 kkal /24 jam
- Retriksi Cairan (+/-): tidak
- Residu lambung -
- Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris
- Distensi Abdomen (+/-): tidak
- Asites (+/-):-
- Mual (+/-):-
- Muntah (+/-): -
- Peristaltik Usus; 5-6 x/menit
- Pasien belum BAB sudah +/- 1 minggu

Masalah : tidak ada

**B6 (Bone)**

- Warna Kulit: sawo matang
- Decubitus (+/-): tidak

- Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): pasif
- Kekuatan Otot ;

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3 \\ \hline 0 & 0 \end{array}$$

- Lesi (+/-): tidak
- Fraktur (+/-): tidak
- Dekubitus (+/-): tidak ada
- Luka terbuka (+/-): tidak ada

#### Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman

- Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana ? jelaskan secara rinci: PQRST;Skala nyeri 3 BPS

#### Pengkajian Nyeri Behavioral Pain Scale (BPS)

Kategori	Penilaian	Skor
Ekspresi wajah	Tenang/rileks	1
	Sebagian diperketat (misalnya penurunan alis	2
	<b>Sepertinya diperketat seperti penutupan kelopak mata</b>	<b>3</b>
	Meringis	4
Anggota badan sebelah atas	Tidak ada pergerakan	1
	Sebagian ditekuk	2
	<b>Sepertinya ditekuk dengan fleksi jari-jari</b>	<b>3</b>
	Retraksi pernapasan	4
Kepatuhan dengan ventilasi	<b>Pergerakan yang dapat ditoleransi</b>	<b>1</b>
	Batuk dengan pergerakan	2
	Melawan ventilator	3
	Tidak dapat mengontrol Ventilasi	4

- Apakah ada riwayat pembedahan ?Ada,  
terpasang trakeostomi

#### Pengkajian Aktivitas,Istirahat dan Tidur

- **AKTIFITAS**

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR? Anak pasien mengatakan pasien jarang berolahraga
- Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas? Anak pasien mengatakan pasien tidak menggunakan alat bantu dalam beraktivitas
- Berapa lama melakukan kegiatan sehari? Jam berapa mulai kerja? Anak pasien mengatakan ayahnya bekerja sekitar jam 10 hingga jam 2-3 sore.
- Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci.

anak pasien mengatakan Selama sakit pasien tidak bisa beraktivitas karena klien mengalami penurunan kesadaran. Anaknya mengatakan pasien mengalami stroke sehingga badan dan kakinya tidak dapat digerakkan. pasien hanya mampu berbaring di tempat tidur, pasien dalam keadaan tidak mampu merawatdirinya

- **ISTIRAHAT**

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat? Anak pasien mengatakan pasien tidak menentu waktu istirahatnya
- Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang? Anak pasien mengatakan pasien sering berkebun, bertani dan berternak dirumahnya selama pensiun
- Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat? Anak pasien mengatakan tidak ada waktu khusus untuk istirahat
- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby? Anak pasien mengatakan aktivitas pasien sesuai dengan hobinya
- Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini? Saat ini pasien hanya bisa berbaring di tempat tidur

- **TIDUR**

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lam, nyenyak/tidak?) anak pasien mengatakan kadang pasien tidur jam 22:00 dan bangun beraktivitas dijam 07.00, pola tidur teratur
- Apakah kondisi saat ini mengganggu klien? sulit dikaji
- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Anak pasien mengatakan pasien tidak pernah mengomsumsi obat tidur

Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Anak pasien mengatakan pasien tidak memiliki kegiatankhusus sebelum tidur

- Bagaimana kebiasaan tidur? Anak pasien mengatakan pasien memiliki kebiasaan tidur yang baik
- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? anak pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidur 7-8 jam sehari,kualitas tidur nyenyak
- Apakah klien sering terjaga saat tidur? sulit dikaji

- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? sulit dikaji
- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Tidak ada gangguan saat tidur
- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur? Anak pasien mengatakan pasien tidak pernah mengomsumsi obat tidur
- Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur? Anak pasien mengatakan pasien tidak memiliki kegiatankhusus sebelum tidur
- Bagaimana kebiasaan tidur? Anak pasien mengatakan pasien memiliki kebiasaan tidur yang baik
- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya ? anak pasien mengatakan sebelum sakit pasien tidur 7-8 jam perhari,kualitas tidur nyenyak
- Apakah klien sering terjaga saat tidur? sulit dikaji
- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya? sulit dikaji
- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut? Tidak ada gangguan saat tidur

• **Pengkajian Riwayat Sosial :**

- Apakah klien mempunyai teman dekat? Anak pasien mengatakan pasien memiliki teman dekat
- Siapa yang dipercaya klien? Istrinya
- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat? Anak pasien mengatakan pasien biasa ikut kegiatan masyarakat
- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan? Anak pasien mengatakan pasien sudah pensiun dan sekarang hanya berkebun, bertani dan berternak

**Pengkajian Riwayat Psikologi:**

- Status Emosi.
  - Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji
  - Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji
  - Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji
  - Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji
- Konsep diri:
  - Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji
  - Hal-hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji
  - Bagaimana klien memandang diri sendiri? Sulit dikaji
  - Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji
  - Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji

### **Pengkajian Riwayat Spiritual :**

- Apakah klien menganut satu agama? Pasien menganut agama islam
- Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah? Klien mengalami penurunan kesadaran sehingga klien tidak mampu sholat
- Bagaimana mana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama: anak pasien mengatakan pasien rajin sholat dan mengaji

### **TANDA VITAL**

TD : 143/95 mmHg  
 HR : 112 x/menit  
 RR : 25x/menit  
 SUHU : 36,7 °C  
 SPO2 : 88%

NYERI (+/-) ; Skala 3 BPS

### **Pemeriksaan Fisik**

#### • **Kepala dan Leher**

- Inspeksi : bentuk normal, rambut warna hitam, rambut tidak mudah rontok  
 Telinga ; bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga

Mata ; mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tidak anemis, pupil isokor,refleks cahaya ; -/-, refleks pupil -/- , kedua mata tertutup, terdapat lesi pada mata  
 Hidung; bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak adadarah

Mulut ; mukosa bibir kering, tidak ada luka, terdapat sekret pada mulut bercampur darah, tidak ada tonsilitis, gigi putih

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer, terpasang trakeostomi

- Palpasi : tidak ada nyeri tekan

#### • **Thoraks**

- Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi
- Perkusi : suara sonor
- Auskultasi : terdapat ronkhi

#### • **Pelvis**

- Inspeksi : Sulit dikaji
- Palpasi : tidak ada nyeri tekan

#### • **Ekstremitas atas/bawah**

- Inspeksi :

Atas ; pasien sedikit mampu menggerakkan tangannya sendiri

Bawah : pasien tidak mampu menggerakkan kakinya sendiri,terpasang resrain terpasang CVC pada vena femoralis dextra

- Palpasi :

Atas ; sulit dikaji Bawah ; sulit dikaji

- **Punggung**

- Inspeksi : tidak ada uedema, tidak ada lesi
- Palpasi : sulit dikaji

- **Genetalia**

- Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine, tidak ada edema, tidak ada lesi
- Palpasi : Sulit dikaji



**Pemeriksaan Diagnostik**

□ RONTGEN    CT-SCAN    USG    EKG    ENDOSKOPI    Lain-lain:

**Hasil :**

**Tanggal pemeriksaan : 15 Februari 2023**

**CT Scan: MSCT Brain 3 dimensi (Tanpa Kontras)**

**Kesan:**

- Multiple pendarahan epidural pada regio occipitoparietal kiri
- Contusio cerebri lobus parietooccipital kiri
- Brain edema
- Fraktur comminutive os parietooccipital kiri
- Deffect soft tissue disertai subgaleal hematome regio parietooccipital kiri

**Hasil foto Thorax 04 Februari 2023**

**kesan :**

- cardiomegaly dengan dilatasi dan elongasi
- pneumonia bilateral

**Hasil foto Thorax AP 17 Februari 2023**

- terpasang ETT pada trachea dengan Tip +/- 4.91 cm diatas carina
- efusi pleura sinistra
- dilatatio, elongatio et atherosclerosis aortae

## Pemeriksaan Laboratorium

### Hasil kimia klinik : Analisa Gas Darah (08/2/2023)

- pH 7.36 (Normal: 7.40) ←
- pCO<sub>2</sub> 79.6 mmHg (Normal: 40 mmHg) ←
- HCO<sub>3</sub> 46.4 mmol/l (Normal: 24 mmol/l) →
- BE<sub>ecf</sub> - 20.9 mmol/l (Normal: 0 mmol/l) →

### Interpretasi AGD : Asidosis respiratorik terkompesasi sebagian

- Pemeriksaan Hematologi 25/2/2023

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
<b>HEMATOLOGI</b>			
<b>Hematologi Rutin</b>			
WBC	9.2	4.00-10.00	10 <sup>3</sup> /uL
RBC	4.14	4.00-6.00	10 <sup>6</sup> /uL
HGB	11.7	12.0-16.0	gr/dl
HCT	36	37.0-48.0	%
MCV	87	80.0-97.0	fL
MCH	28	26.5-33.5	pg
MCHC	32	31.5-35.0	gr/dl
PLT	112	150-400	10 <sup>3</sup> /uL
RDW-SD	41.6	37.0-54.0	fL
RDW-CV	13.2	10.0-15.0	%
PDW	10.3	10.0-18.0	fL
MPV	9.6	6.50-11.0	fL
P-LCR		13.0-43.0	%
PCT	0.00	0.15-0.50	%
NEUT	77.7	52.0-75.0	%
LYMPH	11.4	20.0-40.0	%
MONO	8.5	2.00-8.00	%
EO	2.1	1.00-3.00	10 <sup>3</sup> /uL
BASO	0.3	0.00-0.10	10 <sup>3</sup> /uL
RET	0	0.00-0.10	10 <sup>3</sup> /uL
LED I	95	(L < 10, P < 20)	10 <sup>3</sup> /uL
LED II Jam II			mm
<b>Koagulasi</b>			
PT	10.4	10-14	detik
INR	1.01	-	
APTT	27.5	22.0-30.0	detik
<b>KIMIA DARAH</b>			
Glukosa	199		

GDS		140	mg/dl
<b>Fungsi Ginjal</b>			
Ureum	35	10-50	mg/dl
Kreatinin	0.80	L 9< 1.3);P (<1.1)	mg/dl
<b>Fungsi Hati</b>			
SGOT	50	<38	U/LU/L
SGPT	40	<41	gr/dl
Albumin	2.9	3.5-5.0	

## B. Analisis Data

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1	DS: Tidak dapat dikaji DO: - adanya trauma pada daerah bagian belakang kepala - TD: 143/95 mmHg - N: 112x/menit - Spo2 : 88% - GCS: E4 M5 Vx - tubuh terasa hangat - Kekuatan Otot ; $\begin{array}{c c} 3 & 3 \\ \hline 0 & 0 \end{array}$	Traumatic Brain Injury ↓ Peningkatan viskositas darah ↓ peningkatan tekanan intravaskuler ↓ pembuluh darah serebral pecah ↓ proses metabolisme dalam otak terganggu ↓ penurunan suplai darah dan O <sub>2</sub> ke otak ↓ iskemik pada jaringan otak ↓ Hipoksia	<b>Penurunan adaptif tekanan intracranial</b>
2	DS: Tidak dapat dikaji DO: - Pasien terpasang trakeostomi - Terdapat sputum bercampur darah - Suara napas : Ronchi RR : 25x/menit HR : 112x/menit	Traumatic Brain Injury ↓ peningkatan TIK ↓ vasospasme pembuluh darah serebral ↓ disfungsi otak fokal ↓ gangguan neurosensori ↓ pasien terintubasi ↓ terpasang Trakeostomi	<b>Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif</b>



3	<p>DS: Tidak dapat dikaji DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pola napas tidak teratur</li> <li>- sesak : ada</li> <li>- pasien tampak terpasang</li> <li>- NRM melalui trakeostomi 10 liter/menit</li> </ul> <p>RR 25 x/menit HR : 112x/menit</p> <p><b>Hasil foto Thorax 04 Februari 2023</b></p> <p><b>kesan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cardiomegaly dengan dilatasi dan elongasi</li> <li>-pneumonia bilateral</li> </ul> <p><b>Hasil foto Thorax AP 17 Februari 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terpasang ETT pada trachea dengan Tip +/- 4.91 cm diatas carina</li> <li>- efusi pleura sinistra</li> <li>- dilatatio, elongatio et atherosclerosis aortae</li> </ul> <p><b>Hasil kimia klinik : Analisa GasDarah (08/2/2023)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pH 7.36 (Normal: 7.40) ←</li> <li>· pCO<sub>2</sub> 79.6 mmHg(Normal: 40 mmHg) ←</li> <li>· HCO<sub>3</sub> 46.4 mmol/l(Normal: 24 mmol/l) →</li> <li>· BEecf - 20.9 mmol/l(Normal: 0 mmol/l) →</li> </ul> <p><b>Interpretasi AGD :</b> Asidosis respiratorik</p>	<p>terjadi penumpukansputum</p> <p>penurunan suplai darah dan O<sub>2</sub> ke otak</p> <p>↓</p> <p>iskemik pada jaringan otak</p> <p>↓</p> <p>Hipoksia</p> <p>↓</p> <p>cedera paru</p> <p>↓</p> <p>Pneumonia Bilateral</p>	<p><b>Gangguan Pertukaran Gas</b></p>
---	--	---	---------------------------------------

	terkompetensi sebagian		
4	DS: Tidak dapat dikaji DO: -Klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya -Nilai GCS E4 M5 Vx -Terdapat sekret pada mulut -Kekuatan otot $\begin{array}{r l} 3 & 3 \\ \hline 0 & 0 \end{array}$	penurunan suplai darah dan O <sub>2</sub> ke otak ↓ Penurunan fungsi neuromotorik ↓ Imobilitas	<b>Defisit perawatan diri</b>
5	Faktor Risiko: - Terpasang NGT ukuran 18 - Peristaltic usus 5-6x/menit Hasil lab : Albumin: 2.9 (normal 3,5-5,0)	penurunan suplai darah dan O <sub>2</sub> ke otak ↓ arteri vertebra basilaris ↓ penurunan fungsi vagus dan glasofaringeus ↓ proses menelan tidak efektif ↓ Disfagia	<b>Risiko defisit nutrisi</b>
6	Faktor Risiko: - Pasien terpasang Trakeostomi - Pasien terpasang kateter urine	penurunan suplai darah dan O <sub>2</sub> ke otak ↓ gagal nafas ↓ tindakan pemasangan ETT ↓ benda asing terpasang ke dalam tubuh	<b>Risiko infeksi</b>

## RENCANA INTERVENSI

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencana Intervensi	Raional				
1	DS: Tidak dapat dikaji DO: - adanya trauma pada daerah bagian belakang kepala - TD: 143/95 mmHg - N: 112x/menit - Spo2 : 94% - GCS: E4 M5 Vx  Kekuatan otot <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> <td style="padding: 2px 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> <td style="padding: 2px 5px;">0</td> </tr> </table>	3	3	0	0	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan Kriteria Hasil: a. Tingkat kesadaran meningkat b. Tekanan darah membaik c. Pola napas membaik	<b>Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi</b> - Identifikasi penyebab peningkatan TIK (mis. lesi menempati ruang, ganggua/n metabolisme, edemaserebral, peningkatan tekanan vena, obstruksi aliran cairan serebrospinal, hipertens/i intrakranial idiopatik) 5. Monitor peningkatan TD 6. Monitor pelebaran tekanannadi (selisih TDS dan TDO) 7. Monitor penurunan tingkatkesadaran 8. Monitor tekanan perfusiserebral  <b>Terapeutik</b> 9. Pertaha nkan sterilitas sistem pemantauan 10. Pertahankan posisi kepaladan leher netral 11. Atur interval pemantauansesuai kondisi pasien	- Mengetahui penyebab peningkatan TIK - Untuk mengetahui peningkatan TD - Untuk mengetahui adanya pelebaran nadi (selisih TDS dan TDO) - Mengetahui tingkat kesadaran pasien - Mengetahui tekanan perfusi serebral  <b>Terapeutik</b> - Agar tidak terkontaminasi oleh bakteri - Agar tidak terjadi peningkatan TIK - Agar pasien tidak terganggu - Agar diketahui hasil pemantauan dan yang bertanggung jawab
3	3							
0	0							

			12. Dokumentasikan pemantauan	Dokumentasikan hasil	<b>Edukasi</b> Agar pasien mengetahui hasil pemantauan
2.	Bersihkan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan dibuktikan dengan DS: Tidak dapat dikaji DO: - Pasien terpasang trakeostomi - Terdapat sputum bercampur darah - Suara napas : Ronchi <i>RR : 25x/menit</i> <i>HR : 112x/menit</i>	Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihkan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil: a. Produksi sputum menurun b. Frekuensi napas membaik	<b>Manajemen Jalan Napas Observasi</b> - Monitor bunyi napas <b>Terapeutik</b> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu		<b>Manajemen Jalan Napas Observasi</b> - Untuk mengetahui adanya suara napas tambahan <b>Terapeutik</b> - Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction - Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction - Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh

3.	<p>Gangguan Pertukaran Gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus-kapiler dibuktikan dengan DS: Tidak dapat dikaji DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pola napas tidak teratur</li> <li>- sesak : ada</li> <li>- pasien tampak terpasang NRM melalui trakeostomi 10 liter/menit <i>RR 25 x/menit</i> <i>HR : 112x/menit</i></li> </ul> <p><b>Hasil foto Thorax 04 Februari 2023</b> <b>kesan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cardiomegaly dengan dilatasi dan elongasi</li> <li>-pneumonia bilateral</li> </ul> <p><b>Hasil foto Thorax AP 17 Februari 2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terpasang ETT pada trachea dengan Tip +/- 4.91 cm diatas carina</li> <li>- efusi pleura sinistra</li> <li>- dilatatio, elongatio et atherosclerosis aortae</li> </ul> <p><b>Hasil kimia klinik : Analisa Gas Darah (08/2/2023)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· pH 7.36 (Normal: 7.40) ←</li> <li>· pCO<sub>2</sub> 79.6 mmHg (Normal: 40 mmHg) ←</li> <li>· HCO<sub>3</sub> 46.4 mmol/l</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>Tingkat kesadaran meningkat</p> <p>Gelisah menurun</p> <p>Pola napas membaik</p> <p>PCO<sub>2</sub> membaik</p> <p>pH arteri membaik</p>	<p><b>Pemantauan Respirasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas</li> <li>- Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik)</li> <li>- Monitor kemampuan batuk efektif</li> <li>- Monitor adanya produksi sputum</li> <li>- Monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>- Auskultasi bunyi napas</li> <li>- Monitor SPO<sub>2</sub></li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi</li> <li>- Dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	<p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan bunyi napas dapat menunjukkan atelectasis, ronchi mengi menunjukkan akumulasi secret</li> <li>- Untuk mengetahui perkembangan status kesehatan pasien</li> <li>- Batuk efektif dapat mengeluarkan dahak</li> <li>- Untuk memastikan adanya sputum di saluran napas dan mengetahui seberapa parah kondisi pasien</li> <li>- Mengetahui adanya suara napas tambahan dan keektifan jalan napas</li> <li>- Mengetahui adanya suara napas tambahan</li> <li>- Mengetahui adanya perubahan nilai SPO<sub>2</sub></li> <li>- Untuk mengukur jumlah oksigen dan karbondioksida dalam darah dan menentukan tingkat keasaman atau pH darah</li> </ul>
----	--	---	--	--

	<p>(Normal: 24 mmol/l) →</p> <p>· BEecf - 20.9 mmol/l (Normal: 0 mmol/l) →</p> <p><b>Interpretasi AGD :</b> Asidosis respiratorik terkompesasi sebagian</p>			<p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengetahui keadaan napas pasien apakah teratur atau tidak</li><li>- Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah Dilakukan</li></ul>
--	---	--	--	---

4	<p>Defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan neuromuskular dibuktikan dengan  DS: Tidak dapat dikaji  DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya</li> <li>- Nilai GCS: 9 (Delirium)</li> <li>- Terdapat sekret pada mulut dan trakeostomi</li> <li>- Kekuatan otot</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>3 3</u> 0 0</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan perawatan diri meningkat dengan</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertahankan kebersihan diri meningkat</li> </ol>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, makan</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sediakan lingkungan yang terapeutik (mis.suasana hangat, rileks, privasi)</li> <li>- Siapkan keperluan pribadi</li> <li>- Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri</li> <li>- Jadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul>	<p><b>Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk menentukan intervensi lebih lanjut</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar pasien merasa aman dan rileks</li> <li>- Untuk memenuhi kebutuhan perawatan diri pasien</li> <li>- Membantu melakukan perawatan diri pada pasien yang dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya</li> </ul> <p>Untuk menjaga kebersihan pasien</p>
5.	<p>Risiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan menelan makanan  Faktor Risiko:  Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpasang NGT ukuran 18</li> <li>- Peristaltic usus 5-6x/menit</li> </ul>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Status nutrisi membaik dengan</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Serum albumin meningkat</li> </ol>	<p><b>Pencegahan Infeksi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi kontaminasi</li> </ul>	<p><b>Pemberian Makanan enteral Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- untuk memastikan ketepatan posisi NGT</li> </ul> <p>Untuk mengetahui haluan</p>

	- Hasil lab : Albumin: 2.9 normal(3,5-5,0)		<p>bakteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengurangi kontaminasi silang</li> <li>- Mengurangi risiko infeksi</li> </ul>	<p>cairan</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mencegah bakteri masuk pada selang ngt</li> <li>- Memudahkan proses pencernaan melalui NGT</li> <li>- Sebagai alarm pengingat ketika makanan parenteral telah habis</li> <li>- Untuk mengetahui output cairan pasien</li> </ul>
6	<p>Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif, ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder</p> <p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien terpasang Trakeostomi</li> <li>- Pasien terpasang kateter urine</li> </ul>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kebersihan badan meningkat</li> <li>Kadar sel darah putih membaik</li> </ol>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi jumlah pengunjung</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> </ul> <p>Pertahankan teknik aseptik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul>	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengurangi kontaminasi bakteri</li> <li>- Untuk mengurangi kontaminasi silang</li> <li>- Mengurangi risiko infeksi berpotensi menular</li> </ul> <p><b>Kolaborasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</li> </ul>

## IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

HARI/TANGGAL/JAM	IMPLEMENTASI	PARAF DAN NAMA
Senin, 27 Februari 2023 08:30	<p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial Observasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengkaji penyebab peningkatan TIK Hasil ; Traumatic brain Injury</li> <li>- memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK Hasil ;</li> </ul> TD : 140/93mmHg Kesadaran menurun ; GCS ; E 4 M 5 V ; x mengobservasi TTV 09.30 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.8°c P ; 17 x/menit, SPO2 89% 10.00 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 101x/menit S 37.5°c P ; 18 x/menit, SPO2 88% 11.00 WITA ; TD 154/ 80 mmHg N 102x/menit S 37.2°c P ; 18 x/menit, SPO2 88% 12.00 WITA ; TD 154/ 60 mmHg N 98x/menit S 37.0°c P ; 18 x/menit, SPO2 89% 13.00 WITA ; TD 142/ 80 mmHg N 100/menit S 37.0°c P ; 22 x/menit, SPO2 89% 14.00 WITA TD 155/ 70 mmHg N 100x/menit S 37.0°c P ; 22 x/menit, SPO2 89% <p><b>Terapeutik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mempertahankan sterilisasi system pemantauan hasil ; pemantauan tampak steril</li> <li>- mempertahankan posisi kepala hasil ; klien tampak nyaman dengan posisi head up 30°</li> <li>- Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : Interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit</li> <li>- Memberikan terapi nonfarmakologis Hasil : Klien diberikan terapi murottal Al-Qur'an hari pertama</li> <li>- mengatur interval pemantauanhasil : setiap jam</li> <li>- mendokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	NURAENI

	<p>hasil:</p> <p>09.30 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.8°c P ; 27 x/menit, SPO289%</p> <p>10.00 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 101x/menit S 37.5°c P ; 28 x/menit, SPO288%</p> <p>11.00 WITA ; TD 134/ 80 mmHg N 102x/menit S 37.2°c P ; 28 x/menit, SPO288%</p> <p>12.00 WITA ; TD 134/ 80 mmHg N 98x/menit S 37.0°c P ; 28 x/menit, SPO289%</p> <p>13.00 WITA ; TD 134/ 80 mmHg N 100/menit S 37.0°c P ; 27 x/menit, SPO289%</p> <p>14.00 WITA TD 140/ 70 mmHg N 100x/menit S 37.0°c P ; 25 x/menit, SPO289%</p> <p>Hasil ; Klien mengalami ketidakstabilan tekanan darah</p>	
<p>Senin, 27 Februari 2023 09.30</p>	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>- Memonitor bunyi napas Hasil : Ronchi</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <p>- memosisikan semi fowler atau supinasi Hasil : klien tampak nyaman dengan posisi head up 30°</p> <p>- melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : jalan napas dibersihkan tanpa ada tanda asianotik</p>	NURAENI
	<p><b>Pemantauan Respirasi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <p>- memonitor pola napas Hasil :</p> <p>09.30 WITA ; P 24 x/menit 10.00 WITA ; P 24 x/menit 11.00 WITA ; P 23 x/menit 12.00 WITA ; P 25 x/menit</p>	NURAENI

	<p>13.00 WITA ; P 24 x/menit  14.00 WITA ; P 23 x/menit  - Memonitor kemampuan batuk efektif  Hasil : pasien tampak tidak mampu melakukan batuk efektif  - Memonitor adanya produksi sputum  Hasil : terdapat sputum pada jalan napas dan trakeostomi bercampur darah  - Memonitor SPO2  Hasil : 09.30 WITA ; SPO2 89%  10.00 WITA ; SPO2 88%  11.00 WITA ; SPO2 88%  12.00 WITA ; SPO2 89%  13.00 WITA ;SPO2 89%  14.00 WITA ; SPO2 90%</p> <p><b>Terapeutik</b>  - mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi Hasil : pemantauan respirasi dilakukan setiap jam  - Mendokumentasikan hasil pemantauan  Hasil :  09.30 WITA ; SPO2 89%  10.00 WITA ; SPO2 88%  11.00 WITA ; SPO2 88%  12.00 WITA ; SPO2 89%  13.00 WITA ;SPO2 89%  14.00 WITA ; SPO2 89%</p>	
	<p><b>Dukungan Perawatan Diri</b>  <b>Observasi</b>  - mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, makan :  Hasil : pasien tampak tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri</p> <p><b>Terapeutik</b>  - menyiapkan keperluan pribadi  hasil : memberikan pemahaman kepada keluarga untuk menyiapkan popok, sikat gigi, dan alat mandi.  - menjadwalkan rutinitas perawatan diri  Hasil : pasien dijadwalkan untuk dimandikan setiap pagi hari</p>	NURAENI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan keperluan pribadi</li> <li>- hasil : memberikan pemahaman kepada keluarga untuk menyiapkan popok, sikat gigi, dan alat mandi.</li> <li>- menjadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul> <p>Hasil : pasien dijadwalkan untuk dimandikan setiap pagi hari</p>	
	<p><b>Pemberian Makanan Parenteral</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa NGT dengan memeriksa residu lambung Hasil : tidak terdapat residu pada selang NGT</li> <li>- Monitor rasa penuh, mual, dan muntah</li> </ul> <p>Hasil : tidak tampak tanda tanda rasa penuh, mual dan muntah</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan teknik bersih dalam pemberian makanan via NGT Hasil : menggunakan handscone bersih saat pemberian makanan</li> <li>- Meninggikan kepala tempat tidur 30-45 derajat selama pemberian makanan</li> </ul> <p>Hasil : tidak ada kontraindikasi saat diberikan makanan dalam posisi tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengukur residur sebelum pemberian makan Jumlah residu : tidak terdapat residu</li> </ul>	NURAENI
	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p>Hasil : suhu tubuh 36,8 C</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi jumlah pengunjung</li> </ul> <p>Hasil : pengunjung hanya diberikan kesempatan untuk menjenguk pasien diluar bilik pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> </ul> <p>Hasil : tidak tampak tanda kontaminasi dari perawat ke pasien maupun sebaliknya</p>	NURAENI
Selasa, 28 Februari 2023 Pukul 09:00	<p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial</b></p> <p><b>Observasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengkaji penyebab peningkatan TIK Hasil ; Traumatic Brain Injury</li> <li>- memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK Hasil ;</li> </ul> <p>TD : 134/93 mmHg Kesadaran menurun ; GCS ; E 4 M 5 V ;x</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengobservasi TTV</li> </ul> <p>09.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106 x/menit S 36.5°c P ; 22 x/menit, SPO2 93%</p>	NURAENI

	<p>10.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.5<sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 93%  11.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.5<sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 93%  12.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%  13.00 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 106/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%  14.00 WITA TD 140/ 93 mmHg N 106 x/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%</p> <p><b>Terapeutik:</b>  - mempertahankan sterilisasi system pemantauan hasil ; pemantauan tampak steril  - mempertahankan posisi kepala  hasil ; klien tampak nyaman dengan posisi head up 30<sup>o</sup>  - Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : Interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit  - Memberikan terapi nonfarmakologis  - Hasil : Klien diberikan terapi murottal Al-Qur'an hari kedua  - mendokumentasikan hasil pemantauan hasil:  09.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106 x/menit S 36.5<sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 93%  10.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.5<sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 93%  11.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 36.5<sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 93%  12.00 WITA ; TD 134/ 93 mmHg N 106x/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%  13.00 WITA ; TD 140/ 93 mmHg N 106/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%  14.00 WITA TD 140/ 93 mmHg N 106 x/menit S 37 <sup>o</sup>c P ; 22 x/menit, SPO2 95%  Hasil ;  Hasil ttv klien dalam batas normal</p>	
	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi</b>  - Memonitor bunyi napas  Hasil : Ronchi  <b>Terapeutik</b>  - memosisikan semi fowler atau supinasi  Hasil : pasien diposisikan Head up 30<sup>o</sup>  - melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik  Hasil : jalan napas dibersihkan tanpa ada tanda asianotik</p>	NURAENI
	<b>Pemantauan Respirasi</b>	NURAENI

	<p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memonitor pola napas</li> </ul> <p>Hasil : 09.00 WITA ; P 21 x/menit  10.00 WITA ; P 21 x/menit  11.00 WITA ; P 22 x/menit  12.00 WITA ; P 22 x/menit  13.00 WITA ; P 22 x/menit  14.00 WITA ; P 22x/menit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor kemampuan batuk efektif</li> </ul> <p>Hasil : pasien tampak tidak mampu melakukan batuk efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor adanya produksi sputum Hasil : terdapat sputum berkurang ada darah sedikit</li> <li>- Memonitor SPO2</li> </ul> <p>Hasil :  09.00 WITA ; SPO2 92%  10.00 WITA ; SPO2 92%  11.00 WITA ; SPO2 93%  12.00 WITA ; SPO2 93%  13.00 WITA ; SPO2 95%  14.0 WITA ; SPO2 95%</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi</li> </ul> <p>Hasil : pemantauan respirasi dilakukan setiap jam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul> <p>Hasil :  09.00 WITA ; SPO2 92%  10.00 WITA ; SPO2 92%  11.00 WITA ; SPO2 93%  12.00 WITA ; SPO2 93%  13.00 WITA ;SPO2 95%  14.00 WITA ; SPO2 95%</p>	
	<p><b>Dukungan Perawatan Diri</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias,</li> </ul>	NURAENI

	<p>makan :</p> <p>Hasil : pasien tampak tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan keperluan pribadi</li> </ul> <p>hasil : memberikan pemahaman kepada keluarga untuk menyiapkan popok, sikat gigi, dan alat mandi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menjadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul> <p>Hasil : pasien dijadwalkan untuk dimandikan setiap pagi hari</p>	
	<p><b>Pemberian Makanan Parenteral</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa NGT dengan memeriksa residu lambung</li> </ul> <p>Hasil : tidak terdapat residu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memonitor rasa penuh, mual, dan muntah</li> </ul> <p>Hasil : tidak tampak tanda tanda rasa penuh, mual dan muntah</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan teknik bersih dalam pemberian makanan via NGT</li> </ul> <p>Hasil : menggunakan handscone bersih saat pemberian makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninggikan kepala tempat tidur 30-45 derajat selama pemberian makanan</li> </ul> <p>Hasil : tidak ada kontraindikasi saat diperikan makanan dalam posisi tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengukur residur sebelum pemberian makan</li> </ul> <p>Jumlah residu : tidak ada residu</p>	NURAENI
	<p><b>Pencegahan Infeksi</b></p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> </ul> <p>Hasil : suhu normal 37 ° C,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan alat bantu napas Trakeostomi</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p>	NURAENI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membatasi jumlah pengunjung Hasil : pengunjung hanya diberikan kesempatan untuk menjenguk pasien diluar bilik pasien</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : tidak tampak tanda kontaminasi dari perawat ke pasien maupun sebaliknya</li> </ul>	
<p>Rabu, 29 Februari 2023 Pukul 9.00</p>	<p><b>Pemantauan Tekanan Intrakranial</b> <b>Observasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengkaji penyebab peningkatan TIK Hasil ; Traumatic Brain Injury</li> <li>- memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK Hasil ;</li> </ul> <p>TD : 140/86mmHg Kesadaran menurun ; GCS ; E 4 M 6 V ; x</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengobservasi TTV</li> </ul> <p>9.00 WITA ; TD 140/86 mmHg N 103x/menit S 37.0°C P ; 18 x/menit, SPO2 97%</p> <p>10.00 WITA ; TD 140/ 86 mmHg N 103x/menit S 37 °c P ; 18 x/menit, SPO2 98%</p> <p>11.00 WITA ; TD 140/ 86 mmHg N 103x/menit S 36.7°C P ; 18 x/menit, SPO2 98%</p> <p>12.00 WITA ; TD 136/ 87 mmHg N 64x/menit S 37.3°C P ; 22x/menit, SPO2 97%</p> <p>13.00 WITA ; TD 123/ 85 mmHg N 80/menit S 37.0°C P ; 22 x/menit, SPO2 97%</p> <p>14.00 WITA TD 121/ 85 mmHg N 85x/menit S 37.0°C P ; 22x/menit, SPO2 97%</p> <p><b>Terapeutik:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mempertahankan sterilisasi system pemantauan hasil ; pemantauan tampak steril</li> <li>- mempertahankan posisi kepala</li> </ul> <p>hasil ; klien tampak nyaman dengan posisi head up 30<sup>0</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengatur interval sistem pemantauan sesuai kondisi pasien Hasil : Interval sistem pemantauan diatur setiap 30 menit</li> <li>- Memberikan terapi nonfarmakologis</li> <li>- Hasil : Klien diberikan terapi murottal Al-Qur'an hari ketiga terakhir</li> <li>- mendokumentasikan hasil pemantauan hasil:</li> </ul> <p>9.00 WITA ; TD 131/86 mmHg N 103x/menit S 37.0°C P ; 18 x/menit, SPO2 97%</p> <p>10.00 WITA ; TD 129/ 86 mmHg N 103x/menit S 37 °c P ; 18 x/menit, SPO2 98%</p>	<p>NURAENI</p>

	<p>11.00 WITA ; TD 140/ 86 mmHg N 103x/menit S 36.7°c P ; 18 x/menit, SPO2 98%  12.00 WITA ; TD 136/ 87 mmHg N 64x/menit S 37.3°c P ; 22x/menit, SPO2 97%  13.00 WITA ; TD 136/ 85 mmHg N 80/menit S 37.0°c P ; 22 x/menit, SPO2 97%  14.00 WITA TD 136/ 85 mmHg N 85x/menit S 37.0°c P ; 22x/menit, SPO2 97%</p> <p>Hasil ;  Hasil TTV klien dalam batas normal</p>	
	<p><b>Manajemen Jalan Napas</b>  <b>Observasi</b>  - Memonitor bunyi napas  Hasil : Ronchi  <b>Terapeutik</b>  - memosisikan head up 30°  Hasil : pasien diposisikan head up 30°  - melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : jalan napas dibersihkan tanpa ada tanda asianotik</p>	NURAENI
	<p><b>Pemantauan Respirasi</b>  <b>Observasi</b>  - memonitor pola napas Hasil :  09.00 WITA ; P 23 x/menit  10.00 WITA ; P 23 x/menit  11.00 WITA ; P 24 x/menit  12.00 WITA ; P 22/ x/menit  13.00 WITA ; P 22x/menit  14.00 WITA ; P 22menit  - Memonitor kemampuan batuk efektif  Hasil : pasien tampak tidak mampu melakukan batuk efektif  - Memonitor adanya produksi sputum Hasil : terdapat sputum sedikit dan darah berkurang  - Memonitor SPO2 Hasil :  9.00 WITA ; SPO2 97%  10.00 WITA ; SPO2 98%  11.00 WITA ; SPO2 98%  12.00 WITA ; SPO2 97%</p>	NURAENI

	<p>13.00 WITA ;SPO2 97%  14.00 WITA ; SPO2 97%</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi</li> </ul> <p>Hasil : pemantauan respirasi dilakukan setiap jam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul> <p>Hasil :</p> <p>9.00 WITA ; SPO2 97%  10.00 WITA ; SPO2 98%  11.00 WITA ; SPO2 98%  12.00 WITA ; SPO2 97%  13.00 WITA ;SPO2 97%  14.00 WITA ; SPO2 97%</p>	
	<p><b>Dukungan Perawatan Diri Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengidentifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, makan :</li> </ul> <p>Hasil : pasien tampak tidak bisa memenuhi kebutuhan perawatan diri secara mandiri</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menyiapkan keperluan pribadi</li> </ul> <p>hasil : memberikan pemahaman kepada keluarga untuk menyiapkan popok, sikat gigi, dan alat mandi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menjadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul> <p>Hasil : pasien dijadwalkan untuk dimandikan setiap pagi hari</p>	NURAENI
	<p><b>Pemberian Makanan Parenteral Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memeriksa NGT dengan memeriksa residu lambung Hasil : tidak terdapat residu</li> <li>- Monitor rasa penuh, mual, dan muntah</li> </ul> <p>Hasil : tidak tampak tanda tanda rasa penuh, mual dan muntah</p> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan teknik bersih dalam pemberian makanan via NGT</li> </ul> <p>Hasil : menggunakan handscone bersih saat pemberian makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninggikan kepala tempat tidur 30-45 derajat selama pemberian makanan Hasil : tidak ada kontraindikasi saat diberikan makanan dalam posisi tersebut</li> <li>- mengukur residur sebelum pemberian makan</li> </ul>	NURAENI

	Jumlah residu : tidak ada residu	
	<b>Pencegahan Infeksi</b> <b>Observasi</b> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil : suhu tubuh 37 C <b>Terapeutik</b> - Membatasi jumlah pengunjung Hasil : pengunjung hanya diberikan kesempatan untuk menjenguk pasien diluar bilik pasien - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien <b>Hasil</b> : tidak tampak tanda kontaminasi dari perawat ke pasien maupun sebaliknya	NURAENI

**CATATAN PERKEMBANGAN**

Hari/Tanggal/Jam	Hasil Aessment Pasien dan Pemberi Pelayanan	Instruksi Ppa	Paraf & Nama
<p>Senin, 27 Februari 2023/10.00</p>	<p>Diagnosis 1 S: Tidak dapat dikaji O: TTV: 140/93 mmhg, Pernapasan: 27x/menit, S: 36,8 N: 102x/menit, SPO2: 88% Kesadaran menurun: GCS: E 4 M 5 V: x A: Masalah Penutupan Kapasitas Adaptif Intrakranial P: Intervensi dilanjutkan Observasi - mengkaji penyebab peningkatan TIK - memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK - mengobservasi TTV Terapeutik - mempertahankan posisi kepaladokumentasikan hasil pemantauan</p>	<p>Pemantauan tekanan intracranial sangat penting karena bertujuan untuk menjaga aliran darah dan oksigen ke otak, jika peningkatan tekanan intracranial dapat mengakibatkan iskemik serebral sehingga dapat mengancam nyawa pasien</p>	<p>NURAENI</p>
	<p>Diagnosa 2 S: Tidak dapat dikaji O: - Ronchi  - Frekuensi pernapasan 28 x/menit  - Terdapat sekret  - Pasien tidak mampu batuk  A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan - Monitor bunyi napas</p>	<p>- Pengisapan lendir pada daerah oral menggunakan teknik bersih - Pengisapan lendir paa daerah trakeostomi menggunakan teknik steril</p>	<p>NURAENI</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler atau supinasi</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>- Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p>Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak</p>		
	<p>Diagnosa 3</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RR : 24x/menit</li> <li>• SPO2 : 88%</li> <li>• AGD :</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan pertukaran gas</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p><b>Pemantauan Respirasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik)</li> </ul> <p>monitor adanya sumbatan jalan napas</p>	<p>Dengan dilakukannya pemantauan respirasi dapat mengetahui keadaan napas pasien apakah teratur atau tidak teratur</p>	<p>NURAENI</p>

	<p>Diagnosa 4</p> <p>S: Tidak dapat dikaji O:</p> <p>Klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya Nilai GCS: 9 (Samnolen) Terdapat sekret pada mulut dan Trakeostomi A: Masalah Defisit perawatan diri</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, makan</li> <li>- Sediakan lingkungan yang terapeutik (mis.suasana hangat, rileks, privasi)</li> <li>- Siapkan keperluan pribadi</li> <li>- Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri</li> </ul> <p>Jadwalkan rutinitas perawatan diri</p>	<p>Pasien dapat merasa lebih nyaman jika badannya dibantu untuk dibersihkan</p>	<p>NURAENI</p>
	<p>Diagnosa 5</p> <p>S: Tidak dapat dikaji O:</p> <p>Albumin: 2.9 gr/dl (Normal: 3,5-5,0 gr/dl) A: Masalah Risiko deficit nutrisi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan Pemberian makan enteral</p>	<p>Nutrisi ada 2 macam, yaitu nutrisi enteral dan parenteral. Nutrisi enteral secara fisiologis lebih bagus karena langsung masuk ke saluran cerna.</p>	<p>NURAENI</p>
	<p>Diagnosa6</p> <p>S: - O: Terdapat tanda-tanda infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 36.8 C</li> <li>- Perawat melakukan cuci tangan sesuai 5 momen</li> </ul> <p>A: Masalah Risiko infeksi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p>	<p>Biasakan cuci tangan 6 langkah pada 5 five moment</p>	<p>NURAENI</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> </ul> <p>Kolaborasi pemberian antibiotic</p>		
<p>Selasa, 28 Agustus 2022 Pukul 10.15</p>	<p>Diagnosis 1 S: Tidak dapat dikaji O: TTV: 144/93 mmhg, Pernapasan: 25x/menit, S: 36.5 N: 106x/menit, SPO2: 93% Kesadaran menurun: GCS: E 4 M 5 V: x A: Masalah Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial P: Intervensi dilanjutkan <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengkaji penyebab peningkatan TIK</li> <li>- memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK</li> <li>- mengobservasi TTV</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mempertahankan posisi kepala dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>	<p>Pemantauan tekanan intracranial sangat penting karena bertujuan untuk menjaga aliran darah dan oksigen ke otak, jika peningkatan tekanan intracranial dapat mengakibatkan iskemik serebral sehingga dapat mengancam nyawa pasien</p>	NURAENI
	<p>Diagnosa 2 S: Tidak dapat dikaji O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronchi</li> <li>- Frekuensi pernapasan 21 x/menit</li> <li>- Terdapat sekret berkurang ada darah sedikit</li> <li>- Pasien tidak mampu batuk</li> </ul> <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor bunyi napas</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posisikan semi fowler / head up 30°</li> <li>- Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik</li> <li>- Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal</li> <li>- Berikan oksigen, jika perlu</li> </ul> <p>Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak</p>		
	<p>Diagnosa 3  S: Tidak dapat dikaji  O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RR : 25x/menit</li> <li>• SPO2 : 93%</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan pertukaran gas P: Intervensi dilanjutkan  <b>Pemantauan Respirasi</b>  <b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik)</li> <li>• monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>• auskultasi bunyi napas</li> <li>• monitor SPO2</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi</li> </ul> <p>- dokumentasikan hasil pemantauan</p>	<p>Dengan dilakukannya pemantauan respirasi dapat mengetahui keadaan napas pasien apakah teratur atau tidak teratur</p>	<p>NURAENI</p>
	<p>Diagnosa 4  S: Tidak dapat dikaji O:  Klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya  Nilai GCS: 9 (Somnolen)  Terdapat sekret pada mulut dan Trakeostomi  A: Masalah Defisit perawatan diri</p>	<p>Pasien dapat merasa lebih nyaman jika badannya dibantu untuk dibersihkan</p>	<p>NURAENI</p>

	<p>Diagnosa 5</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Albumin: 2,9 gr/dl (Normal: 3,5-5,0 gr/dl) A:</li> </ul> <p>Masalah Risiko deficit nutrisi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Pemberian makan enteral</p>	<p>Nutrisi ada 2 macam, yaitu nutrisi enteral dan parenteral. Nutrisi enteral secara fisiologis lebih bagus karena langsung masuk ke saluran cerna.</p>	NURAENI
	<p>Diagnosa 6</p> <p>S: -</p> <p>O: Terdapat tanda-tanda infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 37° C</li> <li>- Perawat melakukan cuci tangan sesuai 5 momen A:</li> </ul> <p>Masalah Risiko infeksi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> <li>- Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</li> <li>- Kolaborasi pemberian antibiotic</li> </ul>	<p>Biasakan cuci tangan 6 langkah pada 5 five moment</p>	NURAENI
<p>Rabu, 29 Juli 2023</p> <p>Pukul 10.15</p>	<p>Diagnosis 1</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O: TTV: 140/86 mmhg, Pernapasan: 23x/menit, S: 37 N: 103x/menit, SPO2: 98%</p> <p>Kesadaran menurun</p> <p>GCS: E 4 M 6 V: x</p> <p>A: Masalah Penurunan Kapasitas Adaptif Intrakranial P: Intervensi dilanjutkan</p> <p><b>Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengkaji penyebab peningkatan TIK</li> <li>- memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK</li> <li>- mengobservasi TTV</li> </ul> <p><b>Terapeutik</b></p>	<p>Pemantauan tekanan intracranial sangat penting karena bertujuan untuk menjaga aliran darah dan oksigen ke otak, jika peningkatan tekanan</p>	NURAENI

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mempertahankan posisi kepala</li> <li>- dokumentasikan hasil pemantauan</li> </ul>		
	<p>Diagnosa 2</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ronchi</li> <li>- Frekuensi pernapasan 23 x/menit</li> <li>- Terdapat sekret sedikit dan darah berkurang</li> <li>- Pasien tidak mampu batuk</li> </ul> <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>Monitor bunyi napas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisapan lendir pada daerah oral menggunakan teknik bersih</li> <li>- Pengisapan lendir paa daerah trakeostomi menggunakan teknik steril</li> </ul>	NURAENI
	<p>Diagnosa 3</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RR : 23x/menit</li> <li>• SPO2 : 98%</li> </ul> <p>A: Masalah gangguan pertukaran gas</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <p><b>Pemantauan Respirasi Observasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik)</li> <li>• monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>• auskultasi bunyi napas</li> <li>• monitor SPO2</li> </ul>	Dengan dilakukannya pemantauan respirasi dapat mengetahui keadaan napas pasien apakah teratur atau tidak teratur	NURAENI
	<p>Diagnosa 4</p> <p>S: Tidak dapat dikaji O:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klien dalam keadaan tidak mampu merawat dirinya</li> <li>- Nilai GCS: 10 (Delirium)</li> <li>- Terdapat sekret pada mulut dan Trakeostomi</li> </ul> <p>A: Masalah Defisit perawatan diri</p>	Pasien dapat merasa lebih nyaman jika badannya dibantu untuk dibersihkan	NURAENI

	<p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, makan</li> <li>- Sediakan lingkungan yang terapeutik (mis.suasana hangat, rileks, privasi)</li> <li>- Siapkan keperluan pribadi</li> <li>- Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri</li> <li>- Jadwalkan rutinitas perawatan diri</li> </ul>		
	<p>Diagnosa 5</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <p>Albumin: 2,9 gr/dl (Normal: 3,5-5,0 gr/dl)A:</p> <p>Masalah Risiko deficit nutrisi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian makan enteral</li> </ul>	<p>Nutrisi ada 2 macam, yaitu nutrisi enteral dan parenteral. Nutrisi enteral secara fisiologis lebih bagus karena langsung masuk ke saluran cerna</p>	<p>NURAENI</p>
	<p>Diagnosa 6 S: -</p> <p>O: Terdapat tanda-tanda infeksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suhu 37 °C</li> <li>- Perawat melakukan cuci tangan sesuai 5 momen A:</li> </ul> <p>Masalah Risiko infeksi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</li> <li>- Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</li> </ul> <p>Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</p> <p>Kolaborasi pemberian antibiotic</p>	<p>Biasakan cuci tangan 6 langkah pada 5 five moment</p>	<p>NURAENI</p>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisa Pengkajian Keperawatan**

Pasien TN.M dilakukan pengkajian komprehensif sesuai dengan kondisi pasien. Proses pengkajian dilakukan dengan cara anamnesis. Dalam asuhan keperawatan ini kelompok hanya mengambil data objektif karena pasien sadar namun tidak mampu diajak berkomunikasi untuk memverbalisasi keluhannya. Pengkajian dilakukan dengan cara observasi, dan pengamatan secara langsung, dilakukan pemeriksaan fisik pada klien dan mengambil data dari catatan keperawatan serta rekam medis klien. Selain itu data pengkajian dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan radiologi MSCT Scan kepala.

Berdasarkan riwayat penyakit atau mekanisme cedera, klien dibawah oleh keluarganya dengan keluhan penurunan kesadaran setelah pasien merasa pusing , jatuh hingga kepala terbentur kelantai dan pingsan dirumahnya. Keadaan memberat sejak 1 bulan yang lalu lalu dimana pasien berkomunikasi tidak nyambung hingga pasien tidak dapat berkomunikasi sama sekali lalu dibawah ke RS Elim toraja lalu dirujuk keRSWS. Awalnya pasien dibawah keIGD lalu dipindahkan keHCU, terpasang ETT dan pasien didiagnosis mengalami stroke. Riwayat penurunan kesadaran ada, riwayat muntah ada dan tidak ada riwayat kejang.Klien juga pernah dirawat di RS Stella Maris dan didiagnosa memiliki tumor paru sejak 6 tahun yang lalu, riwayat batuk berlendir ada.

Dari hasil pengkajian diperoleh data objektif yaitu pasien mengalami Non Hemoragik Stroke, keadaan umum pasien tampak lemah, pasien post op trakeostomi, tampak terpasang trakeostomi, terdapat sputum berwarna merah dengan konsistensi kental sering keluar melalui trakeostomi dan oral pasien. Akral teraba hangat, konjungtiva tidak anemis, turgor kulit normal, terpasang NGT ukuran 18 Fr, pasien terpasang CVC. Tanda-tanda vital, suhu 36,7°c, Nadi :

21 x/menit, tekanan darah : 143/95 mmHg, SPO2 : 94%, RR : 25x/menit dengan penggunaan otot bantu pernapasan, tampak retraksi dada. Hasil pemeriksaan laboratorium HGB 11.7 (normal 12.0-16.0) HCT 36 (Normal 37.0-48.0) PLT 112 (Normal 150-400) GDS 199 (normal 140) albumin 2.9 (normal 3.5-5.0). Hasil MSCT Brain 3 dimensi dengan kesan multiple pendarahan epidural pada region occipitoparietal kiri, contusion cerebri lobus parietooccipital kiri, brain edema, fraktur communitive os parietooccipital kiri dan defect soft tissue disertai subgaleal hematoma region parietooccipital kiri. Hasil foto Thorax yaitu terpasang ETT pada trachea dengan tip setinggi +/- 4.21 cm diatas carina.

Gangguan fungsi syaraf pada stroke disebabkan oleh gangguan perdarahan pada otak non traumatic. Gangguan syaraf tersebut menimbulkan gejala antara lain kelumpuhan anggota badan, bicara tidak lancar, bicara tidak jelas (pelo) perubahan kesadaran, gangguan penglihatan dan lain-lain. (kurniawan et al.,2019)

Dari data ditemukan juga masalah yaitu klien tidak mampu merawat dirinya, terdapat secret pada mulut dan trakeostomi sehingga mengangkat deficit perawatan diri. Kelemahan dan keterbatasan pasien stroke mengalami ketergantungan pada perawat atau orang lain dalam merawat dirinya. Seperti pada gambaran klinis pasien yang mengalami stroke salah satunya gejala serebral : motoric (kelemahan, kecanggungan atau paralisis ekstremitas) (Hutahalung,2019)

Berdasarkan yang dialami pasien diatas, didalam Islam terdapat juga ayat yang menyinggung mengenai musibah yang menimpah manusia yaitu pada QS al-Bāqarah (2): 155-156

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ  
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Terjemahnya:

*(Dan sungguh Kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan) terhadap musuh, (kelaparan) paceklik, (kekurangan harta) disebabkan datangnya malapetaka, (dan jiwa) disebabkan pembunuhan, kematian dan penyakit, (serta buah-buahan) karena bahaya kekeringan, artinya Kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak. (Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar) bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran itu berupa surga.*

(Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah) bencana atau malapetaka (mereka mengucapkan, 'Innaa lillaahi') artinya sesungguhnya kita ini milik Allah; maksudnya menjadi milik dan hamba-Nya yang dapat diperlakukan-Nya sekehendak-Nya, ('wa innaa ilaihi raaji`uun') artinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kita akan kembali, yakni ke akhirat, di sana kita akan diberi-Nya balasan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun' ketika mendapat musibah, maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringi-Nya dengan kebaikan." Juga diberitakan bahwa pada suatu ketika lampu Nabi saw. padam, maka beliau pun mengucapkan istirja`, lalu kata Aisyah, "Bukankah ini hanya sebuah lampu!" Jawabnya, "Setiap yang mengecewakan (hati) orang mukmin itu berarti musibah." Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.

Menurut Syaikh Abdur Rahman al-Sa'di dalam tafsirnya menyatakan, "Allah swt memberitahukan, bahwa dia pasti akan menguji para hamba-Nya dengan bencana-bencana. Agar menjadi jelas siapa (diantara) hamba itu yang sejati dan pendusta, yang sabar dan berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah atas hamba-Nya. Seandainya kebahagiaan selalu menyertai kaum mukmin, tidak ada bencana yang menimpa mereka, niscaya terjadi percampuran, tidak ada pemisah dengan orang-orang tidak baik. Kejadian ini merupakan kerusakan tersendiri. Sifat hikmah Allah menggariskan adanya pemisah antara orang-orang baik dengan orang yang jelek.

Adapun ayat lain yang membahas tentang musibah yaitu QS At-Taubah (9):50

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemah nya:

*(Jika kamu mendapat sesuatu kebaikan) seperti mendapat kemenangan dan ganimah (mereka merasa tidak senang karenanya dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana) yaitu keadaan yang kritis (mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah memikirkan urusan kami) secara matang sewaktu kami tidak ikut berangkat (sebelumnya.") sebelum terjadinya bencana ini (kemudian mereka berpaling dengan rasa gembira) atas musibah yang telah menimpamu. (Al-Qur'an, 2019)*

Dalam buku Quraish Shihab, Al-Biq'a'I berpendapat bahwa ayat ini merupakan penjelasan mengapa neraka jahannam telah meliputi mereka. Apapun hubungan yang dipilih, yang jelas adalah hati kecil mereka tidak senang apabila Rasul menang dalam peperangan bahkan jika sesuatu kebaikan yang didapatkan oleh nabi maka kaum musyrik tidak senang. Dan kaum muslim mereka yakin bahwa siapapun tidak mampu mendatangkan manfaat atau menampik kemudharatan selain Allah swt.

Adapun ayat lain yang membahas tentang musibah yaitu QS Asy-

Syura (42):30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

*(Dan apa saja yang telah menimpa kalian) khithab ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin (berupa musibah) berupa malapetaka dan kesengsaraan (maka adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri) artinya, sebab dosa-dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Diungkapkan bahwa dosa-dosa tersebut dikerjakan*

*oleh tangan mereka, hal ini mengingatkan, bahwa kebanyakan pekerjaan manusia itu dilakukan oleh tangan (dan Allah memaafkan sebagian besar) dari dosa-dosa tersebut, karena itu Dia tidak membalasnya. Dia Maha Mulia dari menduakalikan pembalasan-Nya di akhirat. Adapun mengenai musibah yang menimpa kepada orang-orang yang tidak berdosa di dunia, dimaksudkan untuk mengangkat derajatnya di akhirat kelak.*

Al-Maraghi menafsirkan bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Namun Allah memaafkan manusia atas kejahatan yang telah dilakukan dengan tidak menghukum atas semua kejahatan tersebut. Allah menjadikan dosa sebagai sebab-sebab yang menghasilkan akibat. (Shihab, 2007)

## **B. Analisis Diagnosis keperawatan**

Menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia 2016 terdapat beberapa diagnosis yang mungkin muncul pada kasus trauma Non Hemoragic Stroke yaitu penurunan kapasitas adaptif intracranial, bersihan jalan napas tidak efektif. Gangguan pertukaran gas, deficit perawatan diri, resiko jatuh

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tamam et al, (2020), bahwa peningkatan frekuensi stroke seiring dengan peningkatan umur berhubungan dengan proses penuaan, di mana semua organ tubuh mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak. Pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan pada bagian intima, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin menyempit dan berdampak pada penurunan aliran darah ke otak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pertami, et al, (2019) dari 34 sampel yang diteliti terdapat 30 orang mengalami penurunan saturasi oksigen. Pembuluh darah dalam proses penuaan akan mengalami kemunduran fungsi, seperti pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan, mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan aliran darah ke seluruh jaringan menjadi tidak adekuat. Sehingga akan mempengaruhi nilai saturasi oksigen pada responden. Peneliti berpendapat bahwa nilai saturasi

oksigen pada setiap orang berbeda dan banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor usia dan jenis kelamin. Semakin bertambahnya usia maka peningkatan nilai saturasi oksigen semakin lambat karena terjadinya penurunan beberapa fungsi organ seperti jantung.

Usia sebagai salah satu sifat karakteristik tentang organ, peningkatan umur berhubungan dengan proses penuaan, di mana semua organ tubuh mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak yang berdampak pada penurunan aliran darah. Pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan darah ke seluruh jaringan sehingga mempengaruhi saturasi oksigen. Sedangkan jenis kelamin dalam penelitian ini lebih banyak dialami oleh perempuan karena mengalami keadaan khusus di duga sebagai pemicu yaitu kehamilan, melahirkan dan menopause yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormonal

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti kasus diatas yaitu teori self care. Pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan perawatan diri dan memiliki hak untuk melakukan perawatan diri secara mandiri, kecuali jika orang tersebut tidak mampu. Self care menurut Dorothea Orem, (2001) adalah kegiatan memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan individu baik dalam keadaan sehat maupun sakit yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Sesuai dengan teori orem, kondisi pasien pada kasus diatas berada pada kebutuhan kompensatori dimana pasien berada dalam ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri, sehingga perawat dan pasien memiliki peran yang sama dalam melakukan self care (Chloranya, 2020)

### **C. Analisis intervensi Keperawatan**

Analisis intervensi penurunan kapasitas adaptif intracranial pada pasien trauma brain injury berdasarkan (SIKI, 2018) adalah manajemen peningkatan

tekanan intracranial, terdapat beberapa intervensi yang bisa dilakukan akan tetapi tidak bisa dilakukan semua oleh penulis karena disesuaikan dengan kondisi pasien serta terdapat beberapa keterbatasan dari penulis. Adapun intervensi yang dilakukan pada pasien adalah Observasi: identifikasi penyebab peningkatan TIK, monitor tanda dan gejala peningkatan TIK. Terapeutik: berikan posisi semi fowler, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Kolaborasi: kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan. Tindakan utama yang diberikan pada diagnosis penurunan kapasitas adaptif intracranial adalah head up  $30^{\circ}$  (posisi semi fowler). Penerapan intervensi pemberian posisi head up  $30^{\circ}$  merupakan cara memposisikan kepala seseorang lebih tinggi sekitar tiga puluh derajat dari tempat tidur dengan posisi tubuh sejajar dan kaki lurus atau tidak menekuk. Posisi Head up  $30^{\circ}$  mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan intracranial pada pasien dengan cedera kepala.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertami dkk 2017 dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dari posisi head up  $30^{\circ}$  terhadap perubahan tekanan intracranial, terutama pada tingkat kesadaran dan tekanan arteri rata-rata pasien dengan cedera kepala. Posisi head up  $30^{\circ}$  dilakukan pada pasien cedera kepala karena posisi ini akan memudahkan drainase aliran darah balik dari intracranial sehingga dapat menurunkan tekanan intracranial. Tekanan intracranial akan menurun secara signifikan dari posisi head up  $0^{\circ}$  -  $35^{\circ}$  tetapi pada posisi  $40^{\circ}$  keatas, TIK akan naik lagi (Pertami dkk, 2017). Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh (Ginting, 2020) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh pemberian oksigen dan elevasi kepala  $30^{\circ}$  terhadap tingkat kesadaran pada pasien cedera kepala sedang. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Tamam et al, (2020), bahwa peningkatan frekuensi stroke seiring dengan peningkatan umur berhubungan dengan proses penuaan, di mana semua organ tubuh mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak. Pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan pada bagian intima, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin menyempit dan berdampak pada penurunan

aliran darah ke otak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Pertami, et al, (2019) dari 34 sampel yang diteliti terdapat 30 orang mengalami penurunan saturasi oksigen. Pembuluh darah dalam proses penuaan akan mengalami kemunduran fungsi, seperti pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan, mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan aliran darah ke seluruh jaringan menjadi tidak adekuat. Sehingga akan mempengaruhi nilai saturasi oksigen pada responden.

Peneliti berpendapat bahwa nilai saturasi oksigen pada setiap orang berbeda dan banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor usia dan jenis kelamin. Semakin bertambahnya usia maka peningkatan nilai saturasi oksigen semakin lambat karena terjadinya penurunan beberapa fungsi organ seperti jantung. Usia sebagai salah satu sifat karakteristik tentang organ, peningkatan umur berhubungan dengan proses penuaan, di mana semua organ tubuh mengalami kemunduran fungsi termasuk pembuluh darah otak yang berdampak pada penurunan aliran darah. Pembuluh darah menjadi tidak elastis terutama bagian endotel yang mengalami penebalan, sehingga mengakibatkan lumen pembuluh darah semakin sempit dan berdampak pada penurunan darah ke seluruh jaringan sehingga mempengaruhi saturasi oksigen. Sedangkan jenis kelamin dalam penelitian ini lebih banyak dialami oleh perempuan, karena mengalami keadaan khusus di duga sebagai pemicu yaitu kehamilan, melahirkan dan menopause yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormonal.

Hasil dari intervensi yang dilakukan yaitu pemberian posisi head up 30° kombinasi terapi Murottal Ar Rahman dengan masalah penurunan kapasitas adaptif intracranial dengan hasil akhir GCS pasien meningkat dari hari pertama E4 M5 Vx hari ketiga menjadi E4 M6 Vx TD pasien menurun serta saturasi oksigen meningkat pasien serta pasien sudah tidak mengeluarkan darah dari mulut

#### **D. Analisis Implementasi Keperawatan**

Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan keperawatan, perawat melakukan dua

intervensi yaitu mandiri/independen dan kolaborasi/interdisipliner (NANDA, 2015).

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dilakukan tiga hari perawatan pada tanggal 27-29 Februari 2023 diruang ICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada pasien. Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah bersihan jalan napas tidak efektif adalah melakukan manajemen jalan napas yaitu dengan memonitor posisi selang ETT, memonitor kulit area stoma trakeostomi, memberikan posisi semi fowler, melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik, mengganti fiksasi ETT setiap 24 jam. Selain Hal ini sejalan dengan penelitian (Adika et., al, 2022 ) bahwa posisi head up efektif dalam memperbaiki jalan napas pada pasien. Penerapan manajemen jalan nafas dengan memosisikan pasien dalam posisi head up terbukti dapat meningkatkan saturasi oksigen sehingga menghasilkan pola nafas yang optimal (Musri dan Yudistirawati, 2021).

Sementara itu, perawat dapat melakukan tindakan keperawatan pada masalah gangguan pertukaran gas adalah melakukan pemantauan respirasi, dengan memonitor frekuensi, kedalaman dan upaya jalan napas, memonitor efek ventilator terhadap status oksigen, memonitor gangguan mukosa oral, trakea dan laring, mengatur posisi kepala untuk mencegah aspirasi, melakukan perawatan mulut secara rutin, melakukan pengisapan lendir sesuai kebutuhan, mengkolaborasi pemilihan mode ventilator dan mengkolaborasi penggunaan PS/PEEP untuk meminimalkan hipoventilasi alveolus (Nurarif & Kusuma (2015).

Tindakan keperawatan pada masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial adalah pemantauan peningkatan tekanan intrakranial serta pemberian terapi nonfarmakologis berupa terapi murottal Al-Qur'an untuk meningkatkan GCS pada masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dengan

mengidentifikasi penyebab peningkatan TIK, memonitor tanda dan gejala peningkatan TIK, meminimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, memberikan posisi semi Head Up 30 Derajat Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hasil uji Wilcoxon signed rank test di peroleh nilai kemaknaan atau signifikasi  $p(0,000) < \alpha (0,05)$ ,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya ada pengaruh pada saturasi oksigen setelah dilakukan pemberian posisi head up 30 derajat pada pasien stroke di IGD RSUD dr.T.C.Hillers Maumere. Sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2018), menunjukkan hasil ada pengaruh elevasi kepala 30 derajat terhadap saturasi oksigen pada pasien stroke hemoragik, dimana pada saat posisi supinasi saturasi oksigen 96%, sedangkan saat kepala di elevasi 30 derajat selama 30 menit saturasi meningkat menjadi 98%.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ekachayaningtyas, et al, (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh posisi elevasi 30 derajat terhadap saturasi oksigen pada pasien stroke hemoragik maupun non hemoragik karena dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah ke serebral dan memaksimal oksigenasi ke jaringan serebral, dengan hasil yang didapat  $p \text{ value}=0,009 < (0,05)$ . Penelitian lainnya tentang pengaruh elevasi kepala 30 derajat terhadap saturasi oksigen pada pasien stroke hemoragik, di mana pada posisi head up 30 derajat lebih baik daripada posisi supinasi dengan selisi nilai saturasi oksigen sebanyak 2% (Mustikarani & Mustofa, 2020).

Peneliti berpendapat bahwa pasien stroke harus mendapat penanganan yang cepat dan tepat untuk meminimalisir tingkat keparahan stroke dan resiko kecacatan. Aliran darah yang tidak lancar dapat mengakibatkan gangguan hemodinamik termasuk saturasi oksigen. Salah satu tindakan mandiri keperawatan yang diberikan pada pasien stroke adalah pemberian posisi head up 30 derajat dapat mempengaruhi saturasi oksigen. , mempertahankan suhu tubuh normal dan mengkolaborasi pemberian terapi nonfarmakologis (terapi murottal Al-Qur'an). Tindakan yang dilakukan yaitu monitor tekanan intrakranial dan terapi nonfarmakologis berupa terapi murottal Al- Qur'an 3 kali dalam sehari

selama 3 hari berturut-turut.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang terapi murottal Al- Qur'an dalam menangani perubahan GCS membuktikan hal itu, bahwa terapi murottal Al- Qur'an memiliki efek pada perubahan dalam kesadaran pasien (Risnah, et.al 2021). Hal ini sejalan dengan penelitian Zuhri K. Yusuf (2019) bahwa menggambarkan efek dari terapi murottal al-Qur'an terhadap GCS. Murottal Al- Qur'an memiliki kekuatan yang kuat untuk mengubah GCS pada pasien yang mengalami kesadaran menurun (Yusuf & Rahman, 2019). Terapi Murottal sebagai salah satu jenis terapi musik yang bisa memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya, ketika seseorang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an maka akan merangsang gendang telinga kemudian diproses dan dihantarkan melalui saraf pendengaran ke korteks pendengaran otak (Siti Mutiah, 2022).

Adapun surah yang di gunakan dalam melakukan intervensi ini ialah QS Ar-Rahman yang terdiri dari 78 ayat dan terdapat dalam juz 27. Dengan susunan bahasa dialogis pada surah Ar-Rahman sehingga dapat dimengerti oleh setiap pihak serta hampir seluruh ayat dalam surah ini menggambarkan sifat pemurah dan rahman Allah kepada hambahambanya, dengan menganugerahkan berbagai nikmat yang tak terhingga, baik didunia atau pun di akhirat, yang terlihat atau pun yang tidak tampak. Terapi Murottal Al-Qur'an ini menggunakan aplikasi Al-Qur'an, dimana didalam aplikasi tersebut, terdapat surah-surah pilihan yang sudah teruji dari beberapa hasil penelitian dan dapat di aplikasikan sebagai terapi stimulus auditori berbasis islami. Pengaplikasian terapi murottal ini dilakukan menggunakan headset seperti yang dilakukan oleh Ricky (2019) bahwa penelitiannya menggunakan headset selama 15-30 menit per dua kali sehari.

Tindakan keperawatan pada masalah defisit nutrisi adalah melakukan pemberian makanan paranteral yaitu mengidentifikasi terapi yang diberikan sesuai usia, kondisi, dosis, kecepatan dan rute, memonitor produksi urine, memonitor jumlah cairan yang masuk dan keluar, memberikan label pada wadah makanan, tanggal dan waktu dan inisial perawat, mengatur laju infus, memastikan alarm infus dihidupkan dan berfungsi jika tersedia dan menghindari pengambilan

sampel darah dan pemberian obat pada selang nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral ini diberikan jika nutrisi enteral tidak memungkinkan untuk diberikan (Debora, Villyastuti, & Harahap, 2019).

Tindakan keperawatan pada masalah risiko infeksi adalah melakukan pencegahan infeksi, yaitu dengan memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungannya, mempertahankan teknik aseptik pada pasien yang berisiko tinggi dan mengolaborasi pemberian antibiotik. Berdasarkan studi kasus pada pasien semua intervensi terapi yang telah disusun dilakukan pada pasien (Abdul Herman, 2021).

#### **E. Analisis Evaluasi Keperawatan**

Evaluasi pada kasus Tn. M pada hari selasa, 28 Februari 2023 dari manajemen jalan napas (suction) untuk masalah bersihan jalan napas tidak efektif diperoleh hasil data objektif tampak sputum yang keluar di mulut dan di selat ETT pasien berkurang, bunyi napas tambahan tidak ada, RR: 25 kali/ menit, HR: 106 kali/menit,; sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan masalah bersihan jalan napas tidak efektif belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan.

Dari pemantauan respirasi untuk masalah gangguan pertukaran gas diperoleh hasil data objektif, suara napas : bronkovesikuler, hasil thoraks efusi pleura sinistra, terdapat sputum pada ETT dan oral, terpasang ventilator, perawatan mulut yang dilakukan setiap pagi hari membuat pasien tampak bersih dan terawat, dilakukan suction sesuai kebutuhan, sehingga masalah gangguan pertukaran gas belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan.

Selanjutnya dari pemantauan peningkatan tekanan intrakranial serta pemberian terapi nonfarmakologis berupa terapi murottal Al-Qur'an untuk meningkatkan GCS pada masalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial diperoleh data objektif pada hari pertama yaitu kesadaran somnolen GCS 9 E4 M5 Vx pemantauan sign pada monitor, TD : 140/93 mmHg, S : 36,8<sup>0</sup> C, RR : 21x/menit, N : 102x/menit, SPO2: 88%. Hari ke-2 didapatkan data objektif tingkat kesadaran Tn.L GCS 9 E4 M5 Vx, tanda-tanda vital pada monitor, TD

:134/93 mmHg, HR: 106 kali/menit, RR: 22 kali/menit, SPO2: 93%. Hari-3 didapatkan data objektif tingkat kesadaran delirium GCS 10 E4 M6 Vx, dengan pemantauan sign pada monitor, TD : 140/86 mmHg, HR: 103 kali/menit, RR: 23 kali/menit, SPO2: 98%. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada tingkat kesadaran pasien tetapi masalah penurunan kapasitas adaptif belum teratasi dan intervensi tetap dilanjutkan.

Terapi Murottal sebagai salah satu jenis terapi musik yang bisa memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya, ketika seseorang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an maka akan merangsang gendang telinga kemudian diproses dan dihantarkan melalui saraf pendengaran ke korteks pendengaran otak (Siti Mutiah, 2022). Hal ini didukung oleh penelitian bahwa setelah diberikan perlakuan stimulasi murottal Al-Qur'an selama tiga hari berturut-turut terjadi perubahan tingkat kesadaran/GCS. Pada penelitian ini mengalami peningkatan nilai GCS secara motorik. Setelah diberikan intervensi terapi murottal Al-Qur'an sebanyak 3 hari ketika dilakukan penilaian tingkat kesadaran oleh perawat, saat diberikan rangsangan nyeri di area prosesus xypodeus perlahan-lahan skor motorik meningkat 1-2 angka dimana pasien mampu melakukan gerakan fleksi maupun ekstensi dan pasien sudah mulai menjangkau area nyeri yang diberikan (Yusuf & Rahman, 2019).

Berdasarkan penelitian safri (2015) menjelaskan bahwa murottal Al- Qur'an dapat meningkatkan kesadaran yang peningkatannya dianggap signifikan. Secara fisiologis, sebagai koneksi antara sistem saraf dan sistem hormonal terjadi, terapi ini (stimulasi musik atau gelombang suara) dapat merangsang aktivasi dopamin, yang secara fisiologis memainkan peran penting dalam transmisi sinyal di otak (Risnah, et.al 2021).

Dari pemberian makanan parenteral observasi untuk masalah defisit nutrisi selama 3 hari diperoleh data objektif kebutuhan nutrisi parenteral 1000cc/24 jam, jenis B-Fluid dan RL 0.9%, Albumin : 3.5 gr/dl (normal 3.5-5.0). Adapun untuk pengaturan diet gizi yang seimbang, maka pasien dengan cedera kepala, harus diberikan diet tinggi kalori dan tinggi protein dan asupan vitamin serta mineral

yang mencukupi kebutuhan demi kesembuhan dan kebugaran kembali pasien (Ginting, Sitepu, 2019).

Dari pencegahan infeksi observasi untuk masalah risiko infeksi diperoleh data objektif terdapat luka bekas operasi pada kepala pasien, terpasang NGT, terpasang infuse RL, terpasang CVC, trakheostomi. sehingga masalah risiko infeksi belum teratasi pertahankan intervensi.

**F. Alternatif Pemecahan Masalah (memberikan selain intervensi utama berbasis EBN)**

Beberapa intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk kasus yang sama yaitu terapi murrottal dan guide imagery. Terapi murottal yang diperdengarkan secara teratur dan tidak memiliki perubahan irama yang mendadak meningkatkan relaksasi hingga 65 %. Pemberian terapi murottal akan mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh tubuh, menurunkan rangsangan nyeri sehingga otak mengeluarkan opioid natural endogen. Opioid ini bersifat permanen untuk memblokir nociceptor nyeri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma dkk, 2019) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh terapi murottal terhadap skala nyeri kepala

Guide imagery adalah penggunaan imajinasi dengan sengaja untuk memperoleh relaksasi atau menjauhkan dari sensasi yang tidak diinginkan. Relaksasi dengan tehnik guide imagery akan membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Dengan melakukan nafas dalam secara perlahan tubuh akan menjadi rileks. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan corticotropin releasing factor (CRF). Selanjutnya CRF merangsang kelenjar pituitary yang menghasilkan endorphen yang mempengaruhi suasana hati menjadi rileks. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pusparini, 2017) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh guide imagery terhadap nyeri

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi head up 30 derajat dan terapi murottal Al Qur'an terhadap pasien yang mengalami penurunan kapasitas adaptif intracranial, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dari hasil pengkajian pada pasien Tn Pasien TN.M dilakukan pengkajian komprehensif sesuai dengan kondisi pasien. Proses pengkajian dilakukan dengan cara anamnesis. Dalam asuhan keperawatan ini kelompok hanya mengambil data objektif karena pasien sadar namun tidak mampu diajak berkomunikasi untuk memverbalisasi keluhannya. Pengkajian dilakukan dengan cara observasi, dan pengamatan secara langsung, dilakukan pemeriksaan fisik pada klien dan mengambil data dari catatan keperawatan serta rekam medis klien. Selain itu data pengkajian dilengkapi dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium dan radiologi MSCT Scan kepala.
- b. Diagnosis keperawatan yang didapatkan pasien Tn M yaitu Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, Penurunan adaptif tekanan intracranial, Gangguan Pertukaran Gas, Defisit perawatan diri, Risiko defisit nutrisi, Risiko infeksi
- c. Intervensi keperawatan untuk diagnosis penurunan kapasitas adaptif intracranial adalah pemantauan tekanan intracranial, bersihan jalan napas tidak efektif diberikan manajemen jalan napas, gangguan pertukaran gas diberikan pemantauan respirasi, resiko infeksi

diberikan pencegahan infeksi, resiko deficit nutrisi diberikan pemberian makanan parenteral.

- d. Implementasi keperawatan pada pasien dilakukan selama 3 hari berturut-turut mulai dari 28 februari – 2 maret 2023 diruangan ICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, implementasi dilakukan sesuai intervensi yang telah disusun dengan intervensi yang dibuat dan disesuaikan dengan masalah keperawatan yang telah ditemukan pada pasien Tn M
- e. Evaluasi keperawatan pada pasien Tn M masalah teratasi Sebagian sesuai dengan kriteria hasil yang diharapkan oleh peneliti, sehingga perawat mampu mempertahankan intervensi yang dilakukan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Tn M selama 3 hari

## B. Saran

1. Bagi profesi Keperawatan tugas akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien Non Hemoragic Stroke dengan masalah keperawatan penurunan kapasitas adaptif intracranial penurunan saturasi oksigen
3. Bagi institusi pendidikan karya ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam pemberian asuhan keparawatan khususnya pada kasus Non Hemoragic Stroke dengan penurunan saturasi oksigen

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, K. (2019). *Kementerian Agama Republik Indonesia*.
- Adithya Nugroho, B. & M. (2018). *Pemenuhan Oksigenasi Otak Melalui Posisi Elevasi Kepala Pada Pasien Stroke Hemoragik By Beni*.
- Alfianto, M. A. (2015). Pemberian Posisi Kepala Flat (0o) dan Elevasi (30o) terhadap Tekanan Intrakranial pada Asuhan Keperawatan Tn. K dengan Stroke Non Hemoragik. Stikes Kusuma Husada Surakarta.
- Asdi, M. (2022). Perbandingan factor resiko stroke hemoragik dn non hemoragik pada usia muda berdasarkan gambaran pembuluh darah Di RSUP. DR. Wahidin sudirohusodo Makassar (Doctoral diseratation, Universitas Hasanudin).
- Chloranyta, S. (2020). Analisis Penerapan Teori Self Care Dorothea Orem Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik*.
- Dawodu, S. . (2015). Definition and Pathophysiology, Overview, Epidenilogy, Primary Injury.
- Debora, Y., Villyastuti, Y. W., & Harahap, M. S. (2019). Nutrisi Pada Pasien Cedera Kepala, *I*, 56–64.
- dhorothea orem. (2001). *Nursing concept of praktise*. The C.V Morby Company. Erny, Prasetyo, O., & Prasetyo, D. (2019). *Trauma Kepala pada Anak* :
- Hutahalung, M. S. (2019). *Panduan Lengkap Stroke Mencegah, Mengobati dan Menyembuhkan* (Nusa Media).
- Intihanah, A. (2020) *pengelolaan peningkatan Tekanan Intracranial*. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*
- Khotimah, N., Handayani, R. N., & Susanto, A. (2021). Asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Ny.S dengan stroke non hemoragik di ruangan anggrek RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
- Meirisa, R. (2013). *Asuhan Keperawatan Keluarga Tn. T dengan Apendisitis di RW 01 Kelurahan Cisalak Pasar Cimanggis Depok*. Naskah Publikasi UI.
- Nur'aeni Yuliatun Rini, 2017, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Stroke Non*

Hemoragik Dengan Masalah Ketidakefektifan Perfusi Jaringan Serebral Di Ruang Kenanga RSUD Dr. Soedirman Kebumen, Program Studi D III Akademik Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Gombong

Supratti, Ashriady. (2016). Pendokumentasian Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Indonesia. *Jurnal Kesehatan Manarang*, volume 2, Nomor 1

Susilo Budi Catur. 2019. *KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH PERSARAFAN*. Yogyakarta : PUSTAKA BARU PRESS.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI

Kemenag, T. (2019). *Tafsir Ringkas Kemenag*.

Harahap, S. (2018). AKTIVITAS SEHARI-HARI PASIEN STROKE NON HEMORAGIK DI RSUD Dr. PIRNGADI MEDAN TAHUN 2016. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 11(1), 69–73. <https://doi.org/10.36911/pannmed.v11i1.71>

Hidayati, A. N., Akbar, M. I. A., & Rosyid, A. N. (2018). *Gawat Darurat Medis dan Bedah*. Airlangga University Press.

Hutahalung, M. S. (2019). *Panduan Lengkap Stroke Mencegah, Mengobati dan Menyembuhkan (Nusa Media)*.

Irwan. (2018). *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. CV Budi Utama.

Junaidi, I. (2021). *Stroke Waspada! ancamannya*. C.V Andi Offset.

Kurniati, U. A., Muhammad, J., & Bararah, T. (2013). *Asuhan keperawatan panduan lengkap menjadi perawat profesional jilid 2*. Prestasi Pustakarya.

Padang, J. R. P. (2019). *Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Srtoke Hemorargik Di Ruang Stroke Center RSUD Abdul Wahab Sjahrane Samarinda*. Keperawatan Samarinda.

Pratami, S. B., Sulastyawti, & anami, P (2021) *Effect of 30° Head Up*

Position On Intracranial Pressure Change In Patients With Head Injury In Surgical Ward Of General Hospital Of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. *Public Health Of Indonesia*, 3(3), 89-95. <https://doi.org/ISSN:2477-1570>

Klasifikasi Hingga Pemantauan Jangka Panjang. 2071(September), 42–58.

Ginting, L. R. B. (2020). Pengaruh Pemberian Oksigen dan Elevasi Kepala 30 Derajat Terhadap Tingkat Kesadaran Pada Pasien Cedera Kepala Sedang. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*.

Gorr, W. L. & K. K. S. (2011). GIS TUTORIAL.

Haryono, R., & Utami, M. P. S. (2019). *Keperawatan Medikal Bedah 2*. Pustaka Baru Press.

Imtihanah, A. (2017). Pengelolaan Peningkatan Tekanan Intrakranial. *Jurnal Ilmiah Kedokteran*.

Kusuma dkk. (2019). Pengaruh Terapi Murottal Terhadap Skala Nyeri Kepala Pada Klien Cedera Di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan RSUD Banyumas. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*.

Mannurung, N. (2018). Keperawatan Medikal Bedah Konsep, Mind Mapping dan NANDA NIC NOC. TIM.

Nurarif & Kusuma. (2013). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat PPNI.


Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI*.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2019). *Standar Keperawatan Indonesia. Dewan Pengurus Pusat PPNI*.

Pertami, S. B., Sulastyawati, & Anami, P. (2017). Effect Of 30° Head-Up Position On Intracranial Pressure Change In Patients With Head Injury In Surgical Ward Of General Hospital Of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. *Public Health of Indonesia*, 3(3), 89–95. <https://doi.org/ISSN: 2477-1570>

PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. dewan pengurus pusat persatuan perawat nasional Indonesia.

- Pusparini, Y. (2017). pengaruh Guide Imagery Terhadap Nyeri Kepala Pasien CKR ( Cedera Kepala Ringan). *Jurnal Kesehatan Masada*.
- Rini, I. S., Suharsono, T., Ulya, I., Suryanto, Kartikawati, D., & Fathoni, M. (2019). *Buku Ajar Keperawatan pertolongan pertama gawat darurat*. UB Pres.
- RISKESDAS. (2020). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar.
- Radaningtyas, D. A., Try, M., & Indrwati, U. (2018). Accident Hemoragik Dengan Masalah Keperawatan. 1–4.
- Risnah, Muhsin, Sohrah, Nurul Khusnul Khotimah, Ayu Putri Ningsi, Eva Yustilawati, A., & Adhiwijaya, I. (2021). Murattal Al-Quran Therapy and Changes of Patient ' s Consciousness : A Literature Review. *PSYCHOLOGY AND EDUCATION, I*(September).
- Shihab, M. Q. (2007). Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Quran Vol IV. Lentera Hati.
- Siti Mutiah, E. D. (2022). PENGGUNAAN TERAPI AUDIO MUROTAL AL- QUR'AN DAN EFEKNYA TERHADAP STATUS HEMODINAMIK PASIEN DI DALAM PERAWATAN INTENSIF: TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Keperawatan, 14*, 473–480.
- Sudadi. (2017). Brain Protection Pada Traumatik Brain Injury. 5(November), 59– 65.
- Taufiq, S. M. ., Saragih, S. G. ., & Natalia, D. (2019). Hubungan antara Pediatric Trauma Score dan Mortalitas pada Pasien Cedera Kepala. 5, 882–891.
- WHO, world H. O. (2019). Global Status Report on Road safety. *WHO Librar*. <http://doi.org/https://doi.org/Doi:978 92 4 156506>.
- Yusuf, Z. K., & Rahman, A. (2019). Pengaruh Stimulasi Al-Qur'an Terhadap Glasgow Coma Scale Pasien Dengan penurunan Kesadaran di Ruang ICU, 1(1).



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nuraeni Lahir di Ujung Pandang pada Tanggal 21 Mei 1999 penulis merupakan anak Bungsu dari lima bersaudara dari pasangan Bapak H. Usman Yusuf dan Ibu Hj. Bau Hafsah. Penulis atau yang lebih akrab dipanggil Aeni/Neni ini mulai mengikuti pendidikan Sekolah Dasar Tabaringan Makassar Pda Tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Hangtua Makassar Pada Tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Makassar pada Tahun 2014 dan selesai di tahun 2017. Setelah itu ditahun yang sama penulis mendaftar diri ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Jalur UM-PTKIN dan diterima di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Keperawatan dan berhasil lulus S1 Keperawatan di kampus tersebut pada Tahun 2021. Kemudian pada Tahun Yang sama penulis kembali mendaftar di kampus tersebut dalam program studi profesi Ners dan diterima. Syukur Alhamdulillah penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bias melewati perjuangan keras serta doa dari Ibu dan Bapak serta keluarga dan teman-teman yang membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tulis Ilmiah yang Berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Non Hemoragic Stroke (Nhs) Dengan Masalah Keperawatan Penurunan Kapasitas Adaptif Intracranial Dengan Intervensi Head Up 30° Dan Terapi Murottal”

**1. Penyimpangan KDM**

