

PREPARASI FITOSOM EKSTRAK ETANOL BIJI LABU KUNING

(Cucurbita moschata)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi

Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

NURINAYAH DZIL IZZAH. M

70100119065

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurinayah Dzil Izzah. M

Nim : 70100119065

Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 13 April 2001

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Perum. Bukit Deltamas (Daya)

Judul : Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning
(*Cucurbita moschata*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, September 2023

Penulis

Nurinayah Dzil Izzah. M
70100119065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata)" yang disusun oleh Nurinayah Dzil Izzah. M, NIM: 70100119065, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 10 November 2023 M** yang bertepatan dengan **26 Rabiul Akhir 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 10 November 2023
26 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. M. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Indah, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.
19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)” Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Namun berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sangat spesial kepada kedua orang tua yang sangat berperan dan berjasa dalam hidup penulis Ayah Mursal dan Ibu Hj. Hadriani, S. Sos, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan setiap hari dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis hanturkan untuk keluarga kecil penulis yang senantiasa memberikan semangat, do'a dan semangat serta motivasi. Doa restu, nasihat, kesabaran serta petunjuk dari mereka merupakan dorongan moril serta materilnya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Andi Aderus, Lc., M. Ag. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Muhammad Amry, Lc., M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M. Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Isriyani Ismail, M. Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrinegara, Skm., Mars. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Patimah, S. Kep., Ns., M. Kes. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Bapak apt. Rusdi, S. Si., M. Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

11. Ibu apt. Khaerani, M.Farm.Klin. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Dr. apt. Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu apt. Indah, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Ibu Apt. Dra. Hj Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Bapak Dr. Wahyuddin G, M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang juga berperan besar dalam mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi.
17. Kepada sahabat-sahabat dan teman kelas saya (Kelas C) terima kasih atas pertemanan yang selalu meberikan semangat, bantuan, saran, diskusi serta kerja samanya.
18. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.

Gowa, 2023

Penulis

Nurinayah Dzil Izzah. M

NIM : 70100119065



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
F. Kajian Pustaka.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Uraian Sampel.....	10
B. Ekstraksi.....	13
C. Kulit	16
E. Sistem Pembawa Vesikuler untuk Penghantaran Transdermal.....	23

F. Fitosom.....	27
G. PSA (Particle Size Analyzer)	30
H. SEM (Scanning Electron Microscope).....	32
I. Tinjauan Islami.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Populasi dan Sampel	39
D. Instrumen Penelitian.....	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	50
A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN	50
KEPUSTAKAAN.....	51
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata)	43
Tabel 2. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat.....	43
Tabel 3. Efisiensi Penjerapan Obat	44
Tabel 4. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat.....	62
Tabel 5. Nilai Absorbansi Larutan Standar Flavonoid.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Biji Labu Kuning (<i>Cucurbita moschata</i>)	10
Gambar 2. Struktur Lapisan Kulit.....	17
Gambar 3. Fitosom.....	28
Gambar 4. Citra SEM dari nanopartikel emas	33
Gambar 5. Morfologi Fitosom Perbesaran 8000x Menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM)	44
Gambar 6. Kurva Baku Flavonoid	63
Gambar 7. Adsorbansi Efisiensi Penjerpan	64
Gambar 8. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Flavonoid	71
Gambar 9. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Fenolik	72
Gambar 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Kuersetin.....	72
Gambar 11. Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat	73
Gambar 12. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70%	73
Gambar 13. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70%	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Biji Labu Kuning	58
Lampiran 2. Pembuatan Fitosom	59
Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Asam Galat Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis.....	60
Lampiran 4. Skema Kerja Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata).....	61
Lampiran 5. Absorbansi Kurva Baku Asam Galat.....	62
Lampiran 6. Kadar Fenolik Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Konsentrasi 100 ppm)	62
Lampiran 7. Absorbansi Kurva Baku Flavonoid	63
Lampiran 8. Kadar Flavonoid Ekstrak 70% Biji Labu Kuning	63
Lampiran 9. Hasil Efisiensi Penjerapan	64
Lampiran 10. Perhitungan %Efisiensi Penjerapan	64
Lampiran 11. Gambar Ekstraksi Sampel Biji Labu Kuning Cucurbita moschata).....	68
Lampiran 12. Gambar Proses pembuatan fitosom	70
Lampiran 13. Gambar Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat dan Flavonoid.....	71

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurinayah Dzil Izzah. M
NIM : 70100119065
Judul Skripsi : Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning
(*Cucurbita moschata*)

Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) adalah salah satu tanaman yang memiliki banyak manfaat yang sering diabaikan oleh masyarakat dan berpotensi dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk membuat *Drug Delivery System* nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari ekstrak etanol biji labu kuning dengan menggunakan empat perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin. Fitosom dibuat dari ekstrak biji labu kuning dengan metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Digunakan fosfatidilkolin sebagai polimer dengan perbandingan 0,25 (g) 0,5 (g) 0,75 (g) dan 1 (g) terhadap 1 (g) sampel ekstrak Biji Labu Kuning. Dilakukan Pengukuran nanopartikel ini menggunakan Alat *Particle Size Analyzer* (PSA) dan Morfologi tumbuhan menggunakan alat *Scanning Electron Microscopy* (SEM). Dari hasil fitosom yang dibuat dengan empat perbandingan konsentrasi setelah dilihat ukuran partikelnya, di dapatkan hasil dari perbandingan variasi konsentrasi fosfatidilkolin dan ekstrak etanol biji labu kuning yaitu 0,25 : 1 (g); 0,5 : 1 (g); 0,75 : 1 (g); 1 : 1 (g) secara berturut-turut. Adapun ukuran partikel yang tidak dapat diukur, efisiensi penyerapan yang terlalu besar dan morfologi yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan parameter uji morfologi menggunakan mikroskop optik yang diperoleh morfologi berbentuk *spherical* tidak beraturan. Disimpulkan bahwa Biji Labu Kuning tidak dapat dibuat dalam bentuk sistem vesikular.

Kata kunci: *Cucurbita moschata*, fitosom, fosfatidilkolin, *particle size analyzer* (PSA), *scanning electron microscopy* (SEM)

ABSTRACT

Name : Nurinayah Dzil Izzah. M
NIM : 70100119065
Thesis Title : Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning
(*Cucurbita moschata*)

Pumpkin seeds (*Cucurbita moschata*) are a plant that has many benefits that are often overlooked by society and have the potential to cure various diseases. This research aims to create a Drug Delivery System for nanoparticles with a vesicular system, namely phytosomes from ethanol extract of pumpkin seeds using four comparisons of phosphatidylcholine concentrations. Phytosomes were made from pumpkin seed extract (*Cucurbita moschata*) using mechanical dispersion and solvent evaporation methods. Phosphatidylcholine was used as a polymer in a ratio of 0,25 (g) 0,5 (g) 0,75 (g) and 1 (g) to 1 (g) sample of Yellow Pumpkin Seed Extract. These nanoparticles were measured using a Particle Size Analyzer (PSA) and plant morphology using a Scanning Electron Microscopy (SEM). From the results of phytosomes made with four concentration comparisons after looking at the particle size, the results obtained from the comparison of variations in concentration of phosphatidylcholine and ethanol extract of pumpkin seeds were 0,25 : 1 (g); 0,5 : 1 (g); 0,75 : 1 (g); 1 : 1 (g) respectively. The particle size could not be measured, the adsorption efficiency was too large and the morphology did not meet the criteria based on morphology test parameters using an optical microscope which obtained an irregular spherical morphology. It was concluded that Pumpkin Seeds cannot be made in the form of a vesicular system.

Key words: *Cucurbita moschata*, phytosomes, phosphatidylcholine, particle size analyzer (PSA), scanning electron microscopy (SEM).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan daerah tropis dengan banyak tanaman seperti buah-buahan, sayuran dan biji-bijian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dikonsumsi oleh masyarakat karena kandungan nutrisinya terbukti berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan terhadap tubuh. Salah satu tanaman yang tersebar luas di Indonesia adalah labu kuning (Nurdin, 2019). Labu merupakan tanaman menjalar dan tergolong dalam tanaman semusim, yang berarti setelah berbuah dan dipanen tanaman tersebut akan langsung mati. Tanaman labu kuning merupakan tanaman yang muda tumbuh baik pada dataran tinggi maupun dataran rendah. Labu kuning memiliki biji merupakan bagian yang sering terbuang percuma dan sering dianggap sampah oleh masyarakat (Syam *et al.*, 2019). Biji labu aman untuk dikonsumsi sehari-hari dan tidak membahayakan kesehatan manusia (Batool *et al.*, 2022).

Aktivitas biji *Cucurbita moschata* memiliki kemampuan sebagai antioksidan sebesar 47,011%. Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) juga memiliki aktivitas farmakologi seperti antidiabetes, antijamur, antibakteri, antiinflamasi, dan efek antioksidan. Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) mengandung steroid, alkaloid, flavonoid, dan tanin (Abd El-Aziz & Abd El-Kalek, 2011). Biji labu kuning merupakan sumber magnesium, seng, tembaga, dan selenium. Selain itu biji labu kuning juga banyak mengandung antioksidan dan asam folat. Biji labu kuning dan minyak bijinya juga mengandung banyak nutrisi dan tumbuhan lain yang telah terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Tasya *et al.*, 2022).

Flavonoid adalah senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan mempunyai bioaktivitas sebagai obat. Kemampuan flavonoid sebagai antioksidan disebabkan struktur senyawa flavonoid memiliki kemampuan untuk merubah atau mereduksi radikal bebas dan juga sebagai anti radikal bebas. Adapun mekanisme kerja dari flavonoid yaitu sebagai antioksidan dengan mendonorkan ion hydrogen sehingga dapat menstabilkan radikal bebas yang reaktif. Kelarutan flavonoid yang rendah berakibat pada rendahnya bioavailabilitas biji labu kuning dalam tubuh. Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan pengembangan formula agar bioavailabilitas senyawa bahan alam dapat meningkat (Tahir *et al.*, 2016).

Obat herbal saat ini banyak digunakan untuk pengobatan karena kelimpahan senyawa kimianya yang berpotensi sebagai bahan obat. Namun tanaman herbal kebanyakan sediaanannya kurang larut di air dan memiliki bioavailabilitas yang kurang baik. (Masitoh & Sopyan, 2019). Nanopartikel adalah partikel berukuran 1-100 nanometer. Nanopartikel menjadi kajian yang sangat menarik, karena material yang berada dalam ukuran nano biasanya memiliki partikel dengan sifat kimia atau fisika yang lebih unggul dari material yang berukuran besar (bulk). Dalam hal ini sifat tersebut dapat diubah-ubah melalui pengontrolan ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi permukaan dan pengontrolan interaksi antar partikel (Abdassah, 2017).

Sistem penghantaran obat yang baik akan meningkatkan bioavailabilitas dan bioekivalensi, oleh karena itu ekstrak pegagan dan fitokonstituennya mulai dikembangkan teknologi penghantarannya ke dalam tubuh melalui *Drug Delivery System* (DDS) dengan sistem partikulat seperti fitosom (Chaturvedi *et al.*, 2011). Fitosom adalah teknologi yang baru diperkenalkan dan dikembangkan untuk menggabungkan ekstrak tumbuhan standar ke dalam fosfolipid untuk

menghasilkan kompleks molekuler yang kompatibel. Istilah “*phyto*” berarti tanaman sementara “*soma*” berarti sel. Fitosom adalah sistem penghantaran obat vesikular dimana fitokonstituen ekstrak herbal dikelilingi dan terikat oleh lipid atau satu molekul fitokonstituen yang terkait dengan setidaknya satu molekul fosfolipid, sehingga mampu meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitasnya. Kompleks fitosom yang terbentuk antara fitokonstituen dengan fosfolipid yang memiliki sifat mirip dengan membran sel dimana fosfolipid memiliki kepala yang bersifat polar dan bagian ekor yang bersifat nonpolar. Fosfolipid yang sering digunakan dalam pembuatan fitosom adalah fosfatidilkolin (Indalifiany *et al.*, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan dibuat preparasi fitosom ekstrak etanol biji labu kuning. Penelitian ini yaitu melihat hasil ukuran partikel fitosom dan morfologi dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*) dan SEM (*Scanning Electron Microscope*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dapat dibuat dalam bentuk fitosom?
2. Berapa ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode PSA (*Particle Size Analyzer*)?
3. Bagaimana morfologi dari fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscope*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) bisa dibuat dalam bentuk fitosom.
2. Untuk mengetahui berapa ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode PSA (*Particle Size Analyzer*).
3. Untuk mengetahui bagaimana morfologi dari fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*cucurbita moschata*) menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*) dan SEM (*Scanning Electron Microscope*)?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah terkait teknologi system penghantar dan pengaplikasian obat yang dapat dipermudah dengan menggunakan preparasi fitosom dari ekstrak etanol biji labu kuning yang memiliki absorpsi yang baik bagi kulit. Selain itu, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam fitosom ekstrak etanol biji labu kuning menggunakan PSA (*particle Size Analyzer*) dan SEM (*Scanning Electron Microscopy*).

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Fitosom merupakan gabungan fosfolipid salah satunya fosfatidikolin dalam pelarut nonpolar seperti aseton.
- b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hamper semua semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku telah ditetapkan.

- c. Etanol adalah salah satu pelarut yang banyak digunakan untuk mengekstraksi suatu senyawa aktif. Menurut *Li et al.* (2017), etanol memiliki kemampuan yang baik untuk mengekstraksi senyawa fenolik tanaman terrestrial.
- d. Biji labu kuning merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Namun pemanfaatan biji labu kuning di masyarakat masih minim. Biji labu kuning mengandung beberapa zat, antara lain sejenis asam amino seperti *m-carboxyphenylalanine*, *amino butyrate*, dan *citrulline* serta sejumlah asam amino lain yang dibutuhkan oleh kelenjar prostat seperti *alanine seminalis*, *glisin*, dan *asam glutat*. Biji ini juga mengandung unsur mineral Zn (seng) dan Mg (magnesium) yang sangat penting untuk kesehatan reproduksi.
- e. PSA (*Particle Size Analyzer*) adalah instrument yang digunakan untuk mengkarakteristik distribusi ukuran partikel dalam suatu sampel.
- f. *Scanning Electron Microscope* (SEM) merupakan salah satu jenis mikroskop electron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari gambaran permukaan suatu sampel.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini adalah Laboratorium dengan melakukan pengamatan ukuran partikel dan morfologi fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) menggunakan metode SEM (*Scanning Electron Microscope*) dan PSA (*Particle Size Analyzer*).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian (Tahir *et al.*, 2016) dengan judul “*Preparasi fitosom ekstrak etanol kulit buah kakao (Theobroma cacao L) menggunakan variasi konsentrasi fosfatidilkolin*”, bertujuan untuk membuat Drug Delivery

System nanopartikel dengan sistem vesikular yaitu fitosom dari ekstrak kulit buah kakao menggunakan dua perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin. Fitosom dibuat dari ekstrak etanol buah kakao dengan metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Digunakan fosfatidilkolin sebagai polimer dengan perbandingan 0,5 dan 0,75 (g) terhadap 1 gram sampel ekstrak kulit buah kakao. Pengukuran nanopartikel ini menggunakan alat *Particle Size Analyzer* (PSA). Hasil penelitian ini, diperoleh bahwa, dengan perbandingan fosfatidilkolin dan ekstrak kulit buah kakao 0,5 : 1 (g) dan 0,75: 1 (g) secara berturut-turut menghasilkan ukuran nanopartikel dan efisiensi penjerapan sebesar 184,99 nm 95,597% dan 199,97 nm 99,182%. Disimpulkan bahwa kulit buah kakao dapat dibuat dalam bentuk sistem vesikular yaitu fitosom.

Berdasarkan penelitian (Indrianingsih *et al.*, 2019) dengan judul “*Efek Pengeringan Pada Bagian Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata) Terhadap Aktivitas Antioksidan, Sifat Kimia Dan Struktur Morfologi*”, menyatakan bahwa Labu kuning (*C. moschata*) merupakan salah satu tanaman yang banyak terdapat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas antioksidan, struktur morfologi, dan sifat kimia dari tiga komponen tepung yakni kulit, biji dan daging buah dari labu kuning. Ekstrak biji, kulit dan daging buah labu kuning diperoleh dengan maserasi menggunakan pelarut etanol. Dua metode pengeringan yang digunakan yakni pengeringan dengan sinar matahari dan oven pada suhu 50oC. Hasil uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) menunjukkan bahwa biji labu kuning dengan metode pengeringan oven, memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi, yakni memiliki aktivitas penangkapan radikal bebas sebesar 22,6% pada konsentrasi ekstrak 400 ppm, diikuti oleh kulit dan daging buah labu kuning masing-masing sebesar 16,7 dan 14,2%. Tepung kulit, biji dan daging buah labu kuning juga sudah dilakukan

karakterisasi menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscopy*) untuk mengetahui struktur morfologi permukaan, FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) untuk mengetahui gugus fungsional senyawa dari labu kuning, XRD (*X-ray diffraction*) dan Uji Warna. Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa kandungan protein dan lemak dari biji labu kuning dengan metode pengeringan oven memiliki kandungan paling tinggi yakni sebesar 33,5% dan 33,3% sedangkan kandungan karbohidrat tertinggi dimiliki oleh daging buah labu kuning dengan pengeringan oven sebesar 75,3%. Data dianalisis menggunakan program SPSS yang dilanjutkan dengan tes Duncan. Derajat kepercayaan pada level 95% dan perbedaan pada taraf $<5\%$ tidak berbeda nyata. Setiap analisis dilakukan dengan 3 kali ulangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbedaan metode pengeringan menghasilkan karakteristik yang berbeda dari tepung labu kuning.

Berdasarkan penelitian (Indalifiany *et al.*, 2021) dengan judul “*Preparasi dan Karakterisasi Fitosom Ekstrak Etanol Spons Xestospongia sp*”, menyatakan bahwa *Xestospongia sp.* adalah salah satu spesies spons laut dari kelas *Demospongiae* yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Spons ini diketahui memiliki berbagai aktivitas seperti antikanker, antibiotik, anti jamur, kardiotonik, dan antimalaria. Pembuatan formulasi bahan alam salah satunya adalah dengan teknik vesikel fitosom. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan penetrasi senyawa melalui membran sel, mampu meningkatkan absorpsi senyawa dan meningkatkan bioavailabilitas senyawa di dalam tubuh. Tujuan: Memperoleh komposisi fitosom yang optimum pada ekstrak etanol Spons *Xestospongia sp.* dan fosfatidilkolin dengan karakteristik vesikel yang baik. Metode: Preparasi dilakukan dengan variasi ekstrak dan fosfatidilkolin menggunakan metode hidrasi lapis tipis pada perbandingan 1:1, 1:2, 2:1, dan 2:2 serta dilakukan karakterisasi

fitosom pada masing-masing formula tersebut untuk mendapatkan formula optimal. Hasil: Penelitian ini menghasilkan formula optimum fitosom yang telah memenuhi kriteria berdasarkan parameter uji morfologi menggunakan mikroskop optik yang diperoleh morfologi berbentuk bulat (*spherical*), pengamatan fisik stabil pada penyimpanan suhu $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, pengukuran pH menggunakan pH meter yang diperoleh nilai pH 4.20, dan penentuan ukuran partikel dengan menggunakan *Particel Size Analyzer* (PSA) diperoleh ukuran partikel 180.6 nm nilai distribusi partikel (IP) sebesar 0.133. Kesimpulan: Komposisi formula fitosom yang optimum pada perbandingan ekstrak dan fosfatidilkolin 1:1 dengan kategori fitosom LUV (*Large Unilamellar Vesicle*).

Berdasarkan penelitian (Haruni *et al.*, 2019) dengan judul “*Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Kopi Robusta (Coffea canephora Pierre A. Froehner) Menggunakan Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin*”, menyatakan bahwa Biji kopi robusta mengandung polifenol sebagai antioksidan. Polifenol bersifat polar yang mana mudah larut dalam air namun relatif sulit diabsorpsi. Fitosom merupakan sistem penghantaran obat baru. Fitosom dapat meningkatkan bioavailabilitas dan sangat sesuai dengan tubuh manusia. Namun, formula yang baik dari fitosom ekstrak etanol biji kopi robusta belum dianalisis. Maka, dalam penelitian ini dikembangkan preparasi fitosom ekstrak etanol biji kopi robusta menggunakan variasi konsentrasi fosfatidilkolin yang dapat menghasilkan persentase efisiensi penyerapan yang paling tinggi, dan dapat menghasilkan ukuran partikel fitosom yang sesuai dengan acuan. Hasil menunjukkan bahwa persentase efisiensi penyerapan tertinggi terdapat pada formula 1 dengan perbandingan antara ekstrak dan fosfatidilkolin adalah 1:1, dan ukuran partikel dari formula 1 adalah 1,048 μm .

Berdasarkan kajian pustaka terlebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sudah banyak penelitian tentang fitosom namun belum ada penelitian tentang fitosom biji labu kuning (*Cucurbita moschata*).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi



Gambar 1. Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)

Kingdom : *Plantae*
Division : *Magnoliophyta*
Classes : *Magnoliopsida*
Ordo : *Cucurbitales*
Famili : *Cucurbitaceae*
Genus : *Cucurbita*
Species : *Cucurbita moschata*

2. Nama Lain Tanaman Labu Kuning

Labu kuning dikenal dengan nama waluh (Jawa), labu parang (Jawa Barat), dan pumpkin (Inggris) (Sunarti, 2018).

3. Morfologi Tanaman

Cucurbita moschata berhabitus herba annual, berumah satu, yang tumbuh merayap di sepanjang tanah atau memanjat dengan sulur. Tumbuhan ini dapat menghasilkan batang hingga panjang 5 m. Batang cenderung menyebar di atas tanah, meskipun mereka juga memanjat ke vegetasi sekitarnya di mana mereka menopang diri mereka sendiri melalui sulur. Labu kuning menghasilkan buah dengan ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi karena variasi genetik yang besar. Daun muda, bunga, pucuk pucuk, buah dan biji dapat dimakan. Buah biasanya dibiarkan di tanaman hingga matang untuk panen saat musim gugur akhirnya sebagai labu musim dingin. Daun beludru berbulu, dangkal hingga lobus dalam, berbentuk bulat telur lebar hingga ginjal dengan margin bergigi dan pangkal berbentuk hati sering memiliki bintik-bintik putih pada tulang daunnya. Bunga aksial tunggal (jantan biasanya bertangkai panjang, 3 benang sari dan betina biasanya bertangkai pendek; 3 stigma berlobus dua) berwarna putih krem hingga kuning jingga dan mekar di akhir musim semi. Tangkai cenderung menebal pada titik-titik saat buah muncul. Buah umumnya memiliki daging yang khas. Buah berbentuk bulat, bulat oval, bulat melintang, bulat lonjong, segi empat dan memiliki biji berwarna putih (Dr. Yudiyanto *et al.*, 2021).

4. Kandungan Kimia Tanaman

Kandungan kimia dalam buah adalah vitamin A dan suatu senyawa *cucurbitacin*. Buah labu kuning dipakai sebagai obat urus-urus atau pencahar (Nandang, 2007). Berdasarkan penelitian (Jane Monica *et al.*, 2022) Ekstrak biji labu disaring untuk keberadaan kelas fitokimia yang berbeda yaitu alkaloid, diterpen, triterpene, flavonoid, glikosida, fenol, saponin, steroid, tanin, terpenoid, dan kuinon menggunakan prosedur standar. Biji labu kuning mengandung biji labu kuning mengandung senyawa alkaloid, saponin, steroid, triterpenoid,

kurkubitasin, lesitin, resin, stearin, senyawa fitosterol, asam lemak, squalen, β -tokoferol, tirosol, asam vanilat, vanillin, luteolin, asam sinapat. Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa dalam 100 g biji labu kuning menurut United State Department Of Agricultur (USDA) 2010, terdapat kandungan seperti fitokimia fitosterol 265 mg, serat 6 g, polyunsaturated fatty acids (PUFA) 20,9 g, dan antioksidan (vitamin C 1,9 mg; vitamin E 35,10 mg; dan beta karoten 9 μ g). Salah satu senyawa obat yang terdapat pada biji labu kuning yakni senyawa fitosterol. Fitosterol adalah sterol nabati dengan struktur mirip kolesterol (Permatasari, 2018).

5. Manfaat Tanaman

Biji labu kuning memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan manusia, di antaranya meningkatkan kesehatan jantung karena memiliki serat yang bisa menurunkan kolestrol jahat. Manfaat lainnya adalah sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang karena mengandung kalsium yang merupakan zat gizi pembentuk tulang. Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) juga mengandung antioksidan tinggi, yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas sehingga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Zat gizi yang terkandung di dalamnya sangat beragam dan baik untuk tubuh, sehingga menyebabkan biji labu kuning menjadi salah satu makanan alternative untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan (Syam *et al.*, 2019). Biji labu kuning dapat diolah menjadi minyak, dan minyak biji labu kuning ini sangat banyak sekali khasiatnya terutama dalam pengobatan, digunakan sebagai obat untuk penyakit anti aging, anti kanker, radang usus, dan anti diabetes (Julianty *et al.*, 2021). Biji labu kuning dapat mencegah penuaan dini, mengonsumsi biji labu kuning bisa menjadi salah satu triknya. Hal ini dikarenakan biji labu kuning kaya akan kandungan vitamin E, seperti alfa-tokoferol dan gamma tokoferol, yang

merupakan antioksidan super. Vitamin E yang terdapat pada biji labu kuning bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi. Untuk itu, kandungan-kandungan ini menjaga sel agar tidak cepat rusak dan mencegah penuaan dini (Syam *et al.*, 2019). Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) memiliki sifat antelmintik pada berbagai nematoda gastrointestinal. Ekstrak biji labu kuning menunjukkan aktivitas mematikan pada heligmosoides bakteri pada tikus yang terinfeksi sebesar 80%. Ekstrak biji labu kuning menyebabkan penekanan yang signifikan pada cacing dewasa dan produksi telurnya (Syam *et al.*, 2019).

B. Ekstraksi

1. Pengertian Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Kemenkes, 1995).

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Mukhriani, 2014). Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Depkes RI, 2020).

2. Metode Ekstraksi

Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada tidaknya proses pemanasan.

a. Ekstraksi cair dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan. Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan atau kamar (Depkes RI, 2020).

Maserasi adalah cara penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dengan cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat larutan aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Suhaidarwati, 2016).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator, atau ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (exhaustive extraction) umumnya dilakukan pada suhu kamar. Tujuan dari perkolasi adalah upaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Prinsip dari perkolasi adalah serbuk simplisia

ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas kebawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak kebawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (Harahap, 2010).

2. Ekstraksi Cair Panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Refluks digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip refluks adalah penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu dipanaskan, uap- uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas bulat, akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian pelarut dilakukan sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan (Harahap, 2010).


2) Soxhlet

Sokletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas kering) didalam sebuah alat ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voight, 1995).

C. Kulit

Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar yang menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit merupakan organ sensorik yang memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan dan nyeri. Luas kulit pada manusia rata-rata 2 m², dengan berat 10 kg jika ditimbang dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak, atau beratnya sekitar 16% dari berat badan seseorang. Daerah yang paling tebal (66 mm) pada telapak tangan dan telapak kaki, dan paling tipis (0,5 mm) pada daerah penis. Komponen kulit meliputi: rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf dan otot. Kulit merupakan indikator untuk memperoleh kesan umum dengan melihat perubahan yang terjadi pada kulit misalnya pucat, kekuning-kuningan dan kemerah-merahan. Suhu kulit meningkat dengan adanya kelainan pada kulit atau gangguan psikis misalnya stres, ketakutan, marah yang menyebabkan perubahan pada kulit (Widowati & Rinata, 2020).

kulit yaitu perlindungan atau proteksi, mengeluarkan zat-zat tidak berguna sisa metabolisme dari dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, menyimpan kelebihan minyak, sebagai indra peraba, tempat pembuatan vitamin D, mencegah terjadinya kehilangan cairan tubuh yang esensial (Adhisa & Megasari, 2020).



Gambar 2. Struktur Lapisan Kulit

(Adhisa & Megasari, 2020)

1. Struktur Kulit

a. Epidermis

Epidermis atau kulit ari adalah lapisan paling luar yang terdiri dari lapisan epitel gepeng, unsur utamanya adalah sel-sel tanduk (keratinosit) dan sel melanosit. “Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia dan memiliki tebal yang berbeda-beda, yaitu 400-600 μm untuk kulit tebal (kulit pada telapak tangan dan kaki) dan 75-150 μm untuk kulit tipis”. Epidermis tersusun oleh sel-sel epidermis terutama serat-serat kolagen dan sedikit serat elastis. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu: Lapisan tanduk (stratum corneum), Lapisan bening (Stratum lucidum), Lapisan berbutir (stratum granulosum), Lapisan bertaju (stratum spinosum), Lapisan benih (stratum germinativum atau stratum basale). Selain sel-sel epitel, terdapat sel utama dalam epidermis yaitu: melanosit, sel Langerhans, sel merkel, dan keratinosit.

Epidermis terdiri dari beberapa lapis sel, yaitu:

- 1) Lapisan tanduk (*stratum corneum*) Lapisan ini merupakan lapisan epidermis yang paling atas. Lapisan tanduk terdiri dari banyak lapisan sel tanduk (keratinasi), gepeng, kering, tidak memiliki inti. Zat tanduk merupakan keratin lunak yang susunan kimianya berada dalam sel-sel keratin keras.
- 2) Lapisan bening (*stratum lucidum*) Lapisan ini disebut juga dengan lapisan barrier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk, dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis dan bersifat translusen sehingga dapat dilewati sinar (tembus cahaya).
- 3) Lapisan berbutir (*stratum granulosum*) Tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya, berbutir kasar dan berinti mengkerut. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh.
- 4) Lapisan bertaju (*stratum spinosum*) Lapisan ini disebut juga dengan lapisan malphigi, terdiri atas sel-sel yang saling berhubungan dengan perantaraan jembatan-jembatan protoplasma berbentuk kubus. Kesatuan-kesatuan lapisan mempunyai susunan kimiawi yang khas; inti-inti sel dalam bagian basal lapis taju mengandung kolesterol dan asam amino.
- 5) Lapisan benih (*stratum germinativum* atau *stratum basale*) merupakan lapisan terbawah epidermis, dibentuk oleh satu baris sel silinder dengan kedudukan tegak lurus terhadap permukaan dermis. Alas sel-sel ini bergerigi dan bersatu dengan lamina basalis di bawahnya. Lamina basalis yaitu struktur halus yang membatasi epidermis dengan dermis. Di dalam

lapisan ini sel-sel epidermis bertambah banyak melalui mitosis dan sel-sel tadi bergeser ke lapisan-lapisan lebih atas, akhirnya menjadi sel tanduk. Di dalam lapisan benih terdapat pula sel-sel bening (clear-cells, melanoblas atau melanosit) pembuat pigmen melanin kulit. Selain sel-sel epitel, epidermis juga tersusun atas lapisan melanosit, sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit.

b. Dermis

Dermis atau cutan (cutaneus), yaitu lapisan kulit di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai “True Skin” karena 95% dermis membentuk ketebalan kulit. Dermis memiliki ketebalan yang bervariasi, daerah yang paling tebal yaitu pada telapak kaki \pm 3 mm. Lapisan ini elastis dan tahan lama, berisi jaringan kompleks ujung-ujung saraf, kelenjar sudorifera, kelenjar Sebacea, folikel jaringan rambut, dan pembuluh darah yang juga merupakan penyedia nutrisi bagi lapisan dalam epidermis. Keberadaan ujung-ujung saraf perasa dalam kulit jangat, memungkinkan membedakan berbagai rangsangan dari luar. Masing-masing saraf perasa memiliki fungsi tertentu, seperti saraf dengan fungsi mendeteksi rasa sakit, sentuhan, tekanan, panas, dan dingin.

c. Hipodermis

Hipodermis disebut juga panikulus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Hipodermis merupakan lapisan terdalam yang banyak mengandung sel liposit yang menghasilkan banyak lemak. Jaringan ikat bawah kulit berfungsi sebagai bantalan atau penyangga benturan bagi organ-organ tubuh bagian dalam. Ketebalan dan kedalaman jaringan lemak

bervariasi, paling tebal di daerah pantat dan paling tipis terdapat di kelopak mata (Widowati & Rinata, 2020).

D. Nanopartikel

Nanopartikel adalah partikel berukuran 1-100 nanometer dan kebanyakan metode menyarankan sebaiknya ukuran diameter partikel antara 200 dan 400 nm. Dalam bidang farmasi, terdapat dua pengertian nanopartikel yaitu senyawa obat melalui suatu cara dibuat berukuran nanometer (nanokristal) dan suatu obat dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa berukuran nanometer, yaitu nanocarrier (Rachmawati Heni, 2007). Pada sistem ini obat dapat terperangkap, dilarutkan, atau dienkapsulasi pada nanopartikel matriks (Mohanraj & Chen, 2006). Nanopartikel menurut bidang farmasi yaitu senyawa obat dengan cara tertentu dibuat berukuran nanometer disebut nanokristal atau senyawa obat dienkapsulasi dalam suatu sistem pembawa tertentu berukuran nanometer disebut nanocarrier (Ochekpe *et al.*, 2009). Nanopartikel bertujuan untuk mengatasi kelarutan zat aktif yang sukar larut, memperbaiki bioavailabilitas yang buruk, memodifikasi sistem penghantaran obat sehingga obat dapat langsung menuju daerah yang spesifik, meningkatkan stabilitas zat aktif dari degradasi lingkungan (penguraian enzimatik, oksidasi, hidrolisis), memperbaiki absorpsi suatu senyawa makromolekul, dan mengurangi efek iritasi zat aktif pada saluran cerna (Mohanraj & Chen, 2006). Jenis-jenis Nanopartikel Nanopartikel dibagi menjadi nanokristal dan nanocarrier.

Terdapat bermacam-macam nanocarrier seperti nanotube, liposom, misel, dan lain-lain.

1. Nanokristal adalah gabungan dari banyak molekul yang membentuk suatu kristal, merupakan senyawa obat murni dengan penyaluran tipis menggunakan surfaktan. Nanokristal tidak membutuhkan banyak surfaktan agar stabil karena

gaya elektrostatik sehingga mengurangi kemungkinan keracunan oleh bahan tambahan (Rawat Manju, 2006) Nanokristal memungkinkan pengembangan formulasi melalui rute pemberian dimana ukuran partikel merupakan faktor kritis, seperti obat tetes mata, cairan infus, dan obat suntik (Rachmawati Heni, 2007).

2. Nanocarrier Nanocarrier merupakan suatu sistem pembawa dalam ukuran nanometer. Nanocarrier meliputi:
 - a. Nanotube adalah lembaran atom yang diatur menjadi bentuk tube dalam skala nanometer, memiliki rongga di tengah dan struktur yang menyerupai sangkar berbahan dasar karbon. Nanotube berdinding tunggal digunakan sebagai sistem penghantaran obat dalam gen karena bentuknya menyerupai asam nukleat. Nanotube berdinding ganda digunakan sebagai pembawa untuk transformasi sel bakteri dan untuk elektroporasi sel (Rawat Manju, 2006).
 - b. Nanoliposom merupakan konsentrat vesikel lapis ganda yang terdapat cairan di dalamnya dengan dibungkus membrane lipid lapis ganda yang terbuat dari fosfolipid alam umumnya (Rawat Manju, 2006). Liposom terbentuk ketika lapisan lipid tipis terhidrasi dan sejumlah kristal cair lapis ganda mengembang. Liposom biasanya digunakan sebagai pembawa obat sediaan kosmetik untuk mempertahankan kelembaban kulit (Rachmawati Heni, 2007). Nanoliposom dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan terhadap obat dari degradasi biologis sebelum sampai pada tempat yang diharapkan (Martien *et al.*, 2012).
 - c. Nanopartikel Lipid Padat Nanopartikel lipid padat adalah pembawa koloidal berbahan dasar lipid dengan ukuran 20-1000 nanometer yang terdispersi dalam air atau larutan surfaktan dalam air, berisi inti hidrofob padat disalut

oleh fosfolipid lapis tunggal. Inti padat ini berisi senyawa obat yang didispersikan dalam matriks lemak padat yang mudah mencair (Rawat Manju, 2006).

- d. Misel merupakan agregat molekul amfipatik dalam air dengan bagian nonpolar di dalam dan polar di luar pada bagian yang terpapar air. Dengan struktur itu obat yang bersifat hidrofob terdispersi di bagian dalam inti misel sehingga cocok sebagai pembawa obat yang tidak larut air (Rawat Manju, 2006). Misel memiliki kegunaan pada stabilitas termodinamik dalam larutan fisiologis yang mengakibatkan disolusi lambat secara *in vivo* (Rachmawati Heni, 2007).
- e. Dendrimer merupakan makromolekul yang terdiri atas cabang-cabang di sekeliling inti pusat yang bentuk dan ukurannya dapat diubah sesuai yang diinginkan. Molekul obat dapat dimuat baik dalam dendrimer atau diabsorpsi pada permukaannya. Dendrimer cocok untuk zat penyalut untuk perlindungan dan penghantaran obat menuju target yang spesifik sehingga dapat mengurangi toksitas (Rawat *et al.*, 2006; Rachmawati, 2007).
- f. Nanopartikel Polimerik terbagi menjadi nanokapsul dan nanosfer. Nanokapsul terdiri dari polimer yang membentuk dinding yang melingkupi inti dalam di mana obat dijerat. Nanosfer terbuat dari matrik polimer padat dan senyawa obat terdispersi di dalamnya (Delie & Blanco-Príeto, 2005).
- g. Nanopartikel cross link merupakan nanopartikel yang terbentuk dari proses sambung silang antara elektrolit dengan pasangan ionnya. Ikatan sambung silang ini terjadi secara ionik maupun kovalen. Pembuatan nanopartikel sambung silang dilakukan menggunakan metode gelas ionik. Metode sambung silang yang biasa digunakan adalah gelas ionik, karena menggunakan pasangan ion yang lebih sesuai untuk protein dan

menghindari pengadukan berlebihan, panas tinggi, dan penggunaan pelarut organik (Vauthier *et al.*, 2007). Mekanisme pembentukan nanopartikel kitosan didasarkan pada interaksi elektrostatik antara amin dari kitosan dan muatan negatif dari polianion. Kitosan dapat dilarutkan dengan asam asetat. Polianion kemudian ditambahkan, sehingga terbentuk nanopartikel secara spontan dengan pengadukan magnetic stirrer pada suhu kamar (Sailaja *et al.*, 2010). Gelatin, albumin, dan natrium alginat (Rawat Manju, 2006).

E. Sistem Pembawa Vesikuler untuk Penghantaran Transdermal

1. Liposom

Liposom merupakan agregat yang digunakan sebagai sistem pembawa obat dan diterima sebagai pembawa potensial untuk berbagai obat, termasuk senyawa dengan berat molekul rendah, protein terapi, dan agen diagnostik. Liposom berbentuk vesikular, yang terdiri dari satu atau beberapa lipid bilayer, tanpa tegangan permukaan, yang melingkupi lingkungan air di dalamnya. Beberapa obat dapat dikirim dalam bentuk bebas, dan beberapa lainnya membutuhkan pembawa untuk mencapai organ target (Cevc dan Vierl, 2010; Pierre dan Costa, 2011).

Terdapat sebuah laporan bahwa jalur folikel pada kulit berkontribusi pada proses pengiriman obat liposom ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Pengiriman liposom melalui kulit sangat bergantung pada ukuran liposom. Liposom dengan diameter hingga 600 nm lebih mudah untuk menembus kulit, sedangkan liposom dengan diameter lebih dari 1000 nm lebih banyak yang menetap di dalam stratum korneum. Stratum korneum juga diketahui secara luas sebagai penghalang utama untuk penyerapan perkutan. Namun, ia juga dianggap sebagai rute utama untuk penetrasi. Laporan terbaru menunjukkan bahwa folikel

rambut dan kelenjar sebaceous dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengiriman rute transdermal (Pierre dan Costa, 2011).

Liposom bekerja dengan mengubah biodistribusi zat aktif yang terperangkap serta melindungi zat aktif dari inaktivasi oleh mekanisme pertahanan tubuh, ia dapat digunakan sebagai kendaraan untuk pengiriman obat spesifik ke organ target (Cevc dan Vierl, 2010).

2. Etosom

Etosom adalah vesikel fosfolipid lunak yang efisien dengan komponen yang terdiri dari fosfolipid, air dan etanol. dengan komponen utamanya adalah fosfolipid, alkohol (etanol atau isopropyl alkohol) dengan konsentrasi 20-45%, dan air. Etosom telah terbukti sangat efisien untuk meningkatkan pengiriman molekul dengan karakteristik fisikokimia yang berbeda melalui kulit. Kemampuan etosom untuk berpenetrasi melalui kulit berdeformabilitas tinggi. Etosom dapat digunakan sebagai pembawa obat yang bersifat lipofilik, hidrofilik, ataupun amfifilik. Penetrasi mendalam ke dalam kulit dan pengiriman zat aktif yang efisien ke sitoplasma ditingkatkan oleh etosom daripada dengan larutan hidrohananol atau liposom klasik (Pierre dan Costa, 2011; Ramadan dan Mun'im 2016).

Perbedaan antara etosom dan liposom adalah terdapat di komponen etanol yang digunakan dengan konsentrasi tinggi untuk etosom. Ukuran etosom yang lebih kecil dan bila dibandingkan dengan liposom konvensional, efisiensi penyerapan etosom lebih besar sehingga stabilitas dari vesikel yang digunakan dapat lebih baik. Etosom dapat digunakan untuk sediaan obat lepas lambat. Etosom memiliki ukuran yang bervariasi, yaitu mulai dari 10 nm sampai 1000 nm (Ramadan dan Mun'im 2016).

Mekanisme pemberian obat yang ditingkatkan oleh etosom disebut “ethanol effect”. Etanol dengan konsentrasi yang relative tinggi pada sistem ini dapat memberikan vesikel dengan karakteristik fleksibel yang lembut, yang mengganggu susunan lipid bilayer stratum korneum dan meningkatkan fluiditasnya (Pierre dan Costa, 2011).

3. Fitosom

Fitosom suatu teknologi meningkatkan bioavailabilitas senyawa aktif dari bahan alam (herbal) yang dikembangkan dalam formulasi yang memiliki sifat hidrofilik dengan membentuk ikatan kompleks dengan senyawa aktif (fitokonstituen) dalam fosfolipid. Tujuan pembuatan fitosom adalah agar absorpsi obat dapat meningkat sehingga bioavailabilitas dan efikasi obat juga meningkat (Ajazudin, 2010).

Fitosom memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan formulasi herbal secara konvensional, yaitu efikasi yang meningkat karena terdapat peningkatan absorpsi yang disebabkan oleh fosfatidilkolin sehingga ekstrak dengan sifat polar dapat melewati membran fosfolipid bilayer dengan lebih baik. Dosis yang digunakan pada fitosom lebih rendah dalam formulasinya karena terdapat peningkatan absorpsi dan bioavailabilitas obat (Tripathy *et al*, 2013).

Perbedaan fitosom dengan liposom terdapat pada mekanisme penangkapan senyawa obatnya, dimana pada fitosom, penangkapan molekul terjadi di bagian polar pada fosfolipid, sedangkan pada liposom, penangkapan molekul obat dengan sifat hidrofilik akan terjadi di bagian ruang diantara membran fosfolipid atau biasa disebut bagian inti (cavity) (Tripathy *et al*, 2013).

4. Transfersom

Transfersom merupakan sistem pembawa yang terbentuk dari liposom ultradeformable yang memiliki edge activator (EA, surfaktan rantai tunggal) yang

mempromosikan elastisitas dan deformabilitas dalam struktur lipid bilayer, sehingga memfasilitasi penetrasi yang cepat melalui lipid interselular stratum korneum. Beberapa jenis edge activator yang biasa digunakan adalah natrium kolat, natrium deoksilat, dikalsium glisirizinat, Tween 20, 60, 80, dan Span 60, 65, 80. Transfersom tersusun dari surfaktan sekitar 10-25% dan larutan atau hidroalkoholik sekitar 3-10% (Kumar *et al*, 2012).

Transfersom dapat melewati kulit dengan mekanisme perbedaan tekanan osmotik (Elnaggar *et al*, 2014). Perbedaan tekanan osmotik dihasilkan oleh perbedaan konsentrasi air antara permukaan kulit dan bagian dalam kulit, hal ini yang mendorong penetrasi transfersom. Transfersom dikembangkan agar dapat menembus kulit lebih dalam sehingga mencapai sirkulasi sistemik (Pierre dan Costa, 2011)

5. Prolipsom

Proliposom merupakan cara lain dalam meningkatkan formulasi liposom yang berkaitan dengan stabilitas. Proliposom adalah partikel yang mengalir bebas yang terdiri dari obatobatan, fosfolipid, dan bubuk berpori larut dalam air yang bekerja sebagai pendukung (sorbitol atau polisakarida lain) yang dapat meningkatkan permukaan lipid kering. Setelah hidrasi, dispersi liposom akan segera terbentuk, tetapi untuk sediaan yang disterilkan dapat disimpan dalam keadaan kering. Metode ini dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyimpanan liposom. Proliposom dalam jumlah banyak dapat disiapkan dan disimpan dalam keadaan kering sebelum digunakan dan diresuspensi saat dibutuhkan untuk memberikan kumpulan vesikel yang dapat direproduksi dalam jangka waktu yang lama (Pierre dan Costa, 2011).

6. Niosom


Niosom memiliki struktur dan sifat yang mirip dengan liposom, dibentuk oleh surfaktan non-ionik sintetis, menunjukkan adanya peningkatan stabilitas kimia, dan biaya bahan yang relatif rendah. Niosom terbentuk dari berbagai ampifil yang mengandung gula, polioksietilen, poligliserol, mahkota eter, dan gugus kepala hidrofilik asam amino. Pada lapisan awal kulit, membran niosom ditata ulang menjadi masing-masing komponen, namun ketika sampai di lapisan yang lebih dalam, niosom mengalami reformasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi membuat niosom dikatakan bertanggung jawab atas peningkatan penetrasi transdermal. Niosom bekerja dengan meningkatkan permeasi kulit dengan mengganggu sifat membran stratum korneum dan langsung menyatu ke dalam lapisan kulit teratas (Pierre dan Costa, 2011).

F. Fitosom

Phyto-phospholipid Complex atau dikenal sebagai Fitosom merupakan kompleks yang terbuat dari ikatan hidrogen antara fitokonstituen dengan fosfolipid yang mampu menunjang stabilitas fisik dan menunjang absorbsi fitokonstituen. Fitosom termasuk dalam sistem penghantar obat (SPO) golongan vesikuler. SPO vesikuler merupakan kumpulan konsentrat lipid yang terstruktur menjadi lapisan ganda (*bilayer formed*) ketika blok molekul-molekul ampifilik tertentu bertemu dengan air. Penggunaan SPO dalam formulasi obat dapat menjaga eksistensi obat dalam sirkulasi sistemik dan mengatur penghantaran obat dengan meminimalisir degradasi obat atau metabolisme presistemik dari zat aktif. Hal tersebut dapat menunjang penerimaan terapi pada golongan pediatri/geriatri yang memiliki perubahan fungsi fisiologis tubuh. Selain digunakan sebagai SPO rute oral, fitosom juga dapat digunakan sebagai SPO dalam rute transdermal

karena dapat menunjang perjalanan obat menembus lapisan kulit (Mugni *et al.*, n.d, 2018).

Fitosom yang juga disebut herbosom termasuk dalam teknologi formulasi fitolipid baru yang dapat mengatasi permasalahan barrier tubuh namun tetap menjaga stabilitas serta secara signifikan meningkatkan efikasi dan bioavailabilitas senyawa turunan tumbuhan (Mugni & Hasanah, 2013).



Gambar 3. Fitosom

Penggunaan fitosom pada sistem penghantaran obat dan formulasi obat dapat menjaga eksistensi obat dalam sirkulasi sistemik dan mengatur penghantaran obat dengan meminimalisir degradasi obat atau metabolisme presistemik dari zat aktif. Hal tersebut dapat menunjang penerimaan terapi pada golongan pediatri/geriatri yang memiliki perubahan fungsi fisiologis tubuh. Selain digunakan sebagai sistem penghantaran obat dengan rute oral, fitosom juga dapat digunakan sebagai sistem penghantar obat dalam rute transdermal karena dapat menunjang perjalanan obat menembus lapisan kulit (Ariana, 2016).

Fitosom telah banyak digunakan sebagai sistem penghantar obat, diantaranya yang populer yaitu formulasi sediaan mengandung asam Boswellia untuk mengatasi inflamasi, sediaan Ginko dengan fitosom sebagai penunjang kognisi dan antioksidan, sediaan Hawthorn dengan fitosom untuk kesehatan

kardiovaskuler, sediaan Sericoside dengan fitosom sebagai antikerut, serta “Meriva” sediaan Kurkumin dengan fitosom untuk kesehatan persendian.

Inti dari teknologi fitosom berasal dari komponen flavonoid (Senyawa polifenol) yang berikatan langsung dengan molekul fosfatidilkolin. Fitosom terbentuk ketika fosfolipid bereaksi dengan ekstrak herbal dalam pelarut aprotik. Fosfatidilkolin merupakan komponen amfoterik. Bagian fosfatidil bersifat lipofilik, sedangkan bagian kolin bersifat hidrofilik. Polifenol berikatan dengan bagian kolin pada fosfatidilkolin, sedangkan bagian fosfatidil membentuk kompleks tubuh dan ekor serta menyelubungi inti struktur hidrofilik dari kolin. Molekul terikat dengan ikatan kimia pada kutub kepala kolin dari fosfolipid (Chivte *et al.*, 2017).

Keunggulan fitosom dalam menghantarkan obat yaitu (Tripathy *et al.*, 2013; Kadu & Apte, 2017; Pawar & Bhangale, 2015):

1. Penyerapan fitokonstituen meningkat baik melalui rute oral maupun topikal sehingga memiliki bioavailabilitas yang lebih baik dan respon terepeutik yang optimal.
2. Dapat menghantarkan beragam kelompok obat seperti peptida dan molekul protein.
3. Dapat menghantarkan ekstrak nonlipofilik dan meningkatkan absorpsinya.
4. Membutuhkan dosis obat yang rendah dikarenakan absorpsi konstituen aktif yang meningkat.
5. Fosfatidilkolin sebagai molekul pembawa memiliki efek hepatoprotektif dan dapat menutrisi kulit.
6. Konstituen terkonjugasi dalam pembawa sehingga pembungkusan sangat efisien.

7. Memiliki profil stabilitas yang lebih baik karena adanya ikatan molekul fosfatidilkolin dengan fitokonstituen.
8. Komponen yang digunakan untuk pembuatan fitosom relatif aman dan memiliki resiko toksisitas rendah.
9. Fitosom termasuk sistem penghantar non-invasif dan pasif.
10. Pembuatan fitosom relatif mudah tanpa investasi teknis yang rumit.

Meskipun demikian adapun berbagai keunggulan fitosom, terdapat batasan penggunaan fitosom yang jarang diungkap pada pasar. Fitosom dapat menghilangkan fitokonstituen tertentu dalam sediaan dan mengurangi konsentrasi obat yang diinginkan karena cepat tereliminasi (Pawar & Bhangale, 2015). Namun jika dibandingkan dengan SPO vesikuler lain, fitosom memiliki keunggulan yaitu fitokonstituen menyatu dengan molekul fosfolipid pada kepala kolin yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada SPO lain, molekul fosfolipid hanya menjebak fitokonstituen tanpa mengikatnya secara spesifik. Selain itu, perbandingan jumlah fosfolipid dengan fitokonstituen yang terbentuk pada fitosom lebih efisien dengan rasio 1:1 atau 2:1, sedangkan pada SPO vesikuler lain, ratusan bahkan ribuan molekul fosfolipid mengelilingi beberapa molekul yang larut air. Senyawa fitosom bila dibandingkan dengan senyawa pembawa vesikuler lain lebih unggul karena adanya fitokonstituen yang menyatu dengan molekul fosfolipid pada kepala kolin yang bersifat hidrofilik. Sedangkan pada sistem penghantaran obat lain, molekul fosfolipid hanya menjebak fitokonstituen tanpa mengikatnya secara spesifik (Ariana, 2016).

G. PSA (Particle Size Analyzer)

Particle size analyzer (PSA) merupakan instrumen untuk mengkarakterisasi distribusi ukuran partikel dalam suatu sampel. PSA dapat diaplikasikan pada material padat, suspensi, emulsi, dan aerosol. Terdapat

beberapa metode untuk menganalisis partikel dalam jangkauan luas, dan terdapat beberapa metode lain yang digunakan untuk penerapan yang spesifik. PSA merupakan penerapan spesifik untuk menentukan ukuran partikel yang berbentuk lingkaran. Selain itu PSA dapat juga digunakan untuk menentukan volume setiap partikel dalam sampel, terutama ukuran partikel $0,5 \mu\text{m} - 100 \mu\text{m}$ (Nengsih et al., 2013). Analisis ukuran vesikel dilakukan dengan alat *Particle Size Analyzer* (PSA) dengan metode pemendaran cahaya dinamis atau *dynamic light scattering* pada suhu 25°C (Rasaie et al., 2014) dengan teknik ini PSA dapat diaplikasikan untuk mengukur ukuran partikel dan molekul yang terdispersi atau terlarut dalam sebuah larutan (Lusi, 2011). Pengukuran PSA pada prinsipnya adalah pendispersian partikel ke dalam media cair, sehingga partikel tidak saling beraglomerasi dan partikel yang terukur adalah single particle. Pengukuran dalam bentuk distribusi dilakukan pada suhu 25°C (Indalifiany et al., 2021). Selain itu hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk distribusi, sehingga hasil pengukuran dapat diasumsikan sudah menggambarkan keseluruhan kondisi sampel. Melalui analisis PSA, diharapkan distribusi ukuran nanopartikel yang dihasilkan berada pada rentang nanometer dengan keseragaman ukuran yang baik (Rusli, 2011).

Menurut (Rusli, 2011), penggunaan PSA untuk mengetahui ukuran partikel memiliki keunggulan sebagai berikut:

1. Lebih akurat dan mudah digunakan. Pengukuran partikel dengan menggunakan PSA lebih akurat jika dibandingkan dengan pengukuran partikel dengan alat lain seperti TEM maupun SEM. Hal ini dikarenakan partikel dari sampel yang akan diuji didispersikan ke dalam sebuah media sehingga ukuran partikel yang terukur merupakan ukuran partikel tunggal.
2. Hasil pengukuran dalam bentuk distribusi sehingga dapat menggambarkan keseluruhan kondisi sampel.

3. Sampel yang dianalisis menggambarkan keseluruhan kondisi sampel, yaitu penyebaran ukuran rata-rata partikel.

H. SEM (Scanning Electron Microscope)

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah salah satu jenis mikroskop elektron yang menggambar spesimen dengan memindainya menggunakan sinar elektron berenergi tinggi dalam scan pola raster. Elektron memiliki resolusi yang lebih tinggi daripada cahaya. Cahaya hanya mampu mencapai 200 nm sedangkan elektron bisa mencapai resolusi sampai 0,1 – 0,2 nm. Elektron berinteraksi dengan atom-atom sehingga spesimen menghasilkan sinyal yang mengandung informasi tentang topografi permukaan spesimen, komposisi, dan karakteristik lainnya seperti konduktivitas listrik (Wijayanto & Bayuseno, 2016).

Peralatan utama yang terdapat pada mikroskop electron atau SEM diantaranya adalah:


1. Pistol elektron, umumnya berupa filamen yang terbuat dari unsur yang mudah untuk melepaskan elektron misal tungsten.
2. Lensa untuk elektron, berupa lensa bersifat magnetis karena elektron yang bermuatan negatif dapat dibelokkan oleh medan magnet.
3. Sistem vakum, karena elektron sangat kecil dan ringan maka jika ada molekul udara yang lain elektron yang berjalan menuju sasaran akan terpecah oleh tumbukan sebelum mengenai sasaran sehingga menghilangkan molekul udara menjadi sangat penting.

Prinsip kerja SEM adalah sebagai berikut:

1. Sebuah pistol elektron memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda.
2. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel.

3. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh koil pemindai. Ketika elektron mengenai sampel maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor (CRT) (Wijayanto & Bayuseno, 2016).

Untuk dimensi sampel SEM hanya dibatasi oleh ukuran bilik sampel dari alat SEM itu sendiri karena sampel tidak harus ditembus oleh berkas elektron. Komponen-komponen utama dari SEM diantaranya adalah electron gun yang berfungsi untuk membangkitkan berkas elektron, beberapa lensa elektromagnetik untuk mengkondisikan berkas elektron, serta detektor untuk beberapa jenis berkas yang berbeda. Berkas elektron yang sampai ke sampel akan berinteraksi dengan sampel dan menghasilkan beberapa jenis berkas yang berbeda seperti secondary electron (SE), backscattered electron (BSE), dan characteristic xray. SE dan BSE adalah berkas yang digunakan untuk mendapatkan citra SEM. Agar berkas elektron dapat mencapai sampel dengan optimal maka mikroskop elektron dioperasikan dalam keadaan vakum. Sampel biologi memerlukan penanganan khusus sebelum diamati menggunakan mikroskop elektron karena mikroskop bekerja dalam keadaan vakum sementara sampel biologi mengandung cairan, memiliki ikatan yang lemah, serta pada umumnya memiliki banyak rongga udara (Adhika *et al.*, 2019).



Gambar 4. Citra SEM dari nanopartikel emas

I. Tinjauan Islami

Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan yang beranekaragam diantaranya tumbuhan berkayu, semak, dan herba dari jenis labu. Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuh-tumbuhan merupakan berkah dan nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Pemanfaatan bahan alam sebagai tanaman obat disebutkan dalam al-Qur'an surah Ash-shu'arā' ayat 7, Allah SWT:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”.

Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut telah dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dimuka bumi dari mulai jenis, rasa, warna dan manfaatnya. Selain itu ayat tersebut juga menyuruh manusia agar tetap beriman dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah SWT. kepada makhluk-Nya (Shihab, 2002).

Tumbuhan yang baik merupakan tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Ayat di atas menjelaskan tentang tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dan dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit. Hal ini merupakan anugerah Allah SWT. yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Menurut Amri (2014) Keampuhan pengobatan tanaman herba telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian. Pengobatan herbal lebih efektif

memberikan solusi penyembuhan dibandingkan dengan pengobatan menggunakan bahan kimia. Keunggulan pengobatan herba terletak pada bahan dasarnya yang bersifat alami sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu, tanaman obat lebih murah dan mudah didapatkan (Muaja dkk., 2013).

Salah satu tanaman yang diyakini memiliki manfaat untuk pengobatan adalah labu kuning (*Cucurbita moschata*). Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa kandungan metabolit sekunder pada labu kuning (*Cucurbita moschata*) dapat mengobati beberapa penyakit diantaranya mengobati penyakit ginjal, menyembuhkan radang, migrain, demam, dan mengurangi risiko osteoporosis (Adlhani, 2014). Menurut Suparni dan Wulandari (2012), labu kuning (*Cucurbita moschata*) juga berpotensi untuk mengatasi keracunan dalam tubuh, membersihkan pencernaan, dan dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah. Labu kuning (*Cucurbita moschata*) juga mengandung senyawa bioaktif seperti fenolat, flavonoid, dan vitamin yang dapat digunakan sebagai obat anti hipertensi, anti tumor, immunomodulator, dan anti bakteri (Suwanto dkk., 2015). Siswarini, dkk. (2017) melaporkan kandungan metabolit sekunder pada biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) memiliki efek antihelmintik. Dalam penelitian Panjaitan dkk. (2015) melaporkan pemanfaatan minyak biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dalam bidang kosmetik yaitu berpotensi untuk mencegah terjadinya penuaan dini. Dalam al-Qur'an Surah Aş- Şāffāt ayat 145-148 Allah SWT. berfirman:

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَفُّطِينَ (١٤٦) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ
أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) فَأَمَّنُوا فَمَرَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (١٤٨)

Terjemahannya:

“145. kemudian Kami lemparkan Dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam Keadaan sakit. 146. dan Kami tumbuhkan untuk Dia sebatang pohon dari jenis labu. 147. dan Kami utus Dia kepada seratus ribu orang atau lebih. 148. lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu”.

Berdasarkan tafsir Surah Aş- Şāffāt ayat 146 menurut Ath-Tabari (2009) menyatakan bahwa pohon yang ditumbuhkan kepada Nabi Yunus yaitu pohon yang tidak terdiri dari batang. Menurut طين ي (lafadz) 2003 (Muhammad ق ي pada akhir ayat tersebut bermakna pohon yang menjalar, tidak menjulang keatas, dan rusak dalam setahun termasuk yaqthiin. Shihab (2019) menafsirkan ayat tersebut yakni, untuk kepentingannya (Nabi Yunus), Kami menumbuhkan sebuah pohon yang tidak menjalar sehingga daunnya dapat digunakan untuk berlindung dari cuaca buruk.

Allah SWT menjadikan kehidupan alam dengan berbagai keanekaragaman hayati sebagai nikmat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terkandung manfaat yang sangat beragam, contohnya tumbuhan yang tumbuh disekitar kita seperti labu kuning dapat dipergunakan untuk pengobatan. Dari dulu hingga kini, pengobatan dengan tumbuhan (*herbal medicine*) masih sering digunakan sebagai alternative penyembuhan.

Menurut Syaikh Muhammad Ash-Shayim (2006), tumbuhan menjadi bahan obat yang sangat populer disamping bahan alam lainnya seperti madu dan telur dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, beliau sering menggunakan tumbuhan untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai makanan pelindung (*protector food*) dan obat penyembuh yang sering dicontohkan dalam pengobatan Rasulullah Muhammad SAW (*thibbun nabawi*) diantaranya adalah: minyak zaitun, bawang putih, bawang merah, buah delima, buah labu dan gandum. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh kepada umatnya agar berusaha mencari obat ketika tubuh sedang sakit, karena itu merupakan bentuk dari rasa sabar yang dicontohkan beliau, sebagaimana telah disebutkan dalam sabdanya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَسَأَلُوهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى قَالَ: نَعَمْ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

Artinya:

“Usama bin Syarik, dia berkata: Saya datang kepada Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, dan para sahabatnya, seolah-olah ada burung di kepala mereka. Beliau bersabda: “Berobatlah! Karena tidak ada suatu penyakit yang diturunkan Allah kecuali diturunkan pula obat penyembuhnya selain satu penyakit, yaitu kepikunan” (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga mendorong kesembuhannya.

Berdasarkan ayat dan hadist diatas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan-tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia, salah satunya yaitu terdapat pada biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) yang dapat digunakan dalam pengobatan penyakit antiaging, antikanker, antidiabetes, dan masih banyak lagi yang Allah perlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan belum mampu melewati ketentuan-ketentuan sang pencipta, sehingga dengan ayat dan hadist tersebut sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan bahwa segala jenis penyakit pasti ada obatnya tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut bisa sembuh dengan izin Allah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental dari uji ukuran partikel dan morfologi fitosom ekstrak etanol biji labu kuning menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*) dan SEM (*Scanning Electrone Microscope*).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan pada bulan Mei – Agustus 2023

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi, Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Mikrostruktur Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, dan Laboratorium Pengujian Obat Makanan dan Kosmetik Universitas Islam Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental laboratorium. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui ukuran partikel fitosom ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) dan pembuatan fitosom untuk mengetahui bentuk dari ekstrak etanol biji labu kuning (*Cucurbita moschata*).

C. Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini digunakan populasi dan sampel yaitu biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) yang diambil dari buah labu kuning. Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji dalam kondisi segar.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain:

1. Alat Penelitian

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, batang pengaduk, *beaker glass*, gelas ukur, blender, cawan porselin, *waterbath*, timbangan analitik, Centrifuse, Spektrofotometri UV-Vis, PSA (*Particle Size Analyzer*), SEM (*Scanning Electron Microscope*), dan *Vacum rotary evaporator*.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biji labu kuning (*Cucurbita moschata*), etanol 70%, aseton, fosfatidilkolin, Na_2CO_3 , aquadest, dan folin ciocalteu.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan sampel

1) Pengolahan sampel

Biji labu kuning (*Cucurbita moshata*) yang telah diambil di cuci hingga bersih dengan air mengalir, kemudian di angin-anginkan lalu dikeringkan di lemari pengering. Simplisia jika sudah kering akan mudah hancur. Kemudian simplisia dihaluskan menggunakan blender dan di ayak dengan ayakan 40 mesh kemudian ditimbang, selanjutnya disimpan dalam wadah yang bersih tertutup rapat dan ditempat yang sejuk.

b. Pembuatan Ekstrak Biji Labu Kuning

Simplisia Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) diekstraksi dengan cara maserasi 3x24 jam. Sebanyak 300 gram simplisia, dimasukkan kedalam wadah maserasi (toples) lalu direndam dengan 6 L etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya dipisahkan antara ampas dan filtratnya. Maserat dipisahkan dan proses diulang tiga kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian disatukan dan diuapkan cairan penjarinya menggunakan *rotary evaporator*.

c. Preparasi Fitosom

Pada pembuatan nanopartikel digunakan perbandingan fosfatidikolin dengan ekstrak etanol biji labu kuning dengan variasi konsentrasi dari ukuran yang paling kecil secara berturut-turut yaitu: 0,25: 1 gram, 0,5: 1 gram, 0,75: 1 gram, dan 1: 1 gram.

Setelah diperoleh konsentrasi yang paling baik lalu di uji ukuran partikel menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*) kemudian di lihat efesiensi penjerapan.

d. PSA (*Particle Size Analyzer*) dan EE (*Efisiensi Penyerapan*)

1) PSA (*Particle Size Analyzer*)

Metode pengukuran menggunakan PSA (*Particle Size Analyzer*) dapat berupa metode basah dengan menggunakan media pendispersi dan metode kering dengan memanfaatkan udara atau aliran udara untuk melarutkan partikel. PSA merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui ukuran partikel, dimana partikel didispersikan kedalam media cair sehingga partikel tidak membentuk aglomerasi (menggumpal). Data ukuran partikel yang diperoleh berupa tiga distribusi

yaitu intensitas, nomor, dan volume, sehingga dapat diamsusikan menggambarkan keseluruhan kondisi sampel.

2) EE (Efisiensi Penjerapan)

Presentase penjerapan total polifenol dapat dihitung dari rumus berikut:

$$EE = \frac{Q_t - Q_s}{Q_t} \times 100\%$$

EE adalah efisiensi penjerapan (*entrapment efficiency*), Q_t adalah jumlah total polifenol dalam Ekstrak etanol biji labu kuning yang ditambahkan, dan Q_s adalah jumlah polifenol yang terdeteksi di supernatan.

e. SEM (*Scanning Electron Microscope*)

Scanning Electron Microscope (SEM) adalah alat yang dapat membentuk bayangan permukaan spesimen secara mikroskopik. Berkas elektron dengan diameter 5-10 nm diarahkan pada spesimen. Interaksi berkas elektron dengan spesimen menghasilkan beberapa fenomena yaitu hamburan balik berkas elektron, sinar X, elektron sekunder dan absorpsi elektron.

Pengujian SEM pada hakikatnya merupakan pemeriksaan dan analisa morfologi. Data atau tampilan yang diperoleh adalah data dari bentuk morfologi atau dari lapisan yang tebalnya sekitar 20 μm dari permukaan. Gambar permukaan yang diperoleh merupakan morfologi dengan segala tonjolan, lekukan dan lubang pada permukaan.

Gambar morfologi diperoleh dari penangkapan elektron sekunder yang dipancarkan oleh spesimen. Sinyal elektron sekunder yang dihasilkan ditangkap oleh detektor dan diteruskan ke monitor. Pada monitor akan diperoleh gambar yang khas yang menggambarkan struktur permukaan

spesimen. Selanjutnya gambar dimonitor dapat dipotret dengan menggunakan film hitam putih (Kardiman *et al.*, 2018).



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 1 kg biji labu kuning kemudian di cuci dengan menggunakan air mengalir lalu dikeringkan hingga diperoleh 300 gram simplisia biji labu kuning yang dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 6 L dan dilakukan remaserasi hingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 24,0819 gram.

$$\begin{aligned} \text{Rendamen} &= \frac{\text{Berat Ekstrak}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{24 \text{ g}}{300 \text{ g}} \times 100\% = 8\% \end{aligned}$$

Tabel 1. Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)

Sampel	Berat Sampel (g)	Volume Pelarut etanol 70 % (L)	Berat Ekstrak (g)	% Rendamen
Biji Labu Kuning (<i>Cucurbita moschata</i>)	300	6	24,0819	8

2. Kurva Baku Asam Galat

Tabel 2. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi (nm)
20	0,625
30	0,643
40	0,651
50	0,665
60	0,679

3. Efisiensi Penjerapan


Tabel 3. Efisiensi Penjerapan

Fitosom	Fosfatidilkolin	Nilai Absorban (nm)	% EE
1	0,25:1	0,09	-
2	0,5:1	0,0743	-
3	0,75:1	0,0513	-
4	1:1	0,1086	-

4. Hasil Uji Ukuran Partikel

Ukuran partikel tidak dapat terdeteksi menggunakan *Particle Size Analyzer* (PSA).

5. Morfologi Fitosom



Gambar 5. Morfologi Fitosom Perbesaran 8000x Menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM)

B. Pembahasan

Biji labu kuning (*Cucurbita moschata*) merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Biji labu kuning (*Cucurbita moshata*) ini juga mengandung steroid, alkaloid, flavonoid, dan tanin (Abd El-Aziz & Abd El-Kalek, 2011).

Pada penelitian ini dilakukan mengekstraksi biji labu kuning menggunakan etanol 70% hingga didapatkan ekstrak kental. Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi. Adapun metode maserasi ini merupakan metode ekstraksi sederhana, mudah, dan tidak melalui proses pemanasan yang dilakukan dengan merendam suatu simplisia dalam bentuk serbuk dan pelarut dalam satu wadah dengan kondisi tertutup rapat dan suhu ruangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses maserasi diantaranya adalah waktu, suhu, jenis pelarut, ukuran bahan, perbandingan bahan, dan pelarut.

Ekstraksi menggunakan pelarut etanol 70% yang bersifat polar yang dapat melarutkan senyawa yang bersifat polar atau nonpolar seperti fenolik, flavonoid, saponin dan lain-lain dan dapat menarik lebih banyak senyawa dari suatu tanaman (Surahmida dan Umaruddin). Pelarut Etanol 70% adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar dan memiliki beberapa kelebihan yaitu tak beracun, netral, absorpsi baik, bercampur dengan air pada segala perbandingan, memperbaiki stabilitas bahan obat herbal larutan, dan tidak memerlukan panas tinggi untuk pemekatan, penggunaan etanol sebagai cairan penyari biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama campuran dengan air (Voight, 1995).

Pada tahap maserasi digunakan 1 kg sampel kemudian di simpan dalam wadah maserasi (toples) dan direndam dengan menggunakan pelarut etanol 70% lalu di tutup dengan penutup yang dilapisi aluminium foil dan sesekali di aduk

untuk mempercepat proses ekstraksi. Ditunggu hingga 1 x 24 jam dan disimpan dalam ruangan kedap Cahaya. Remaserasi dilakukan selama 3x24 jam. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya menggunakan kertas penyaring. Proses pemekatan atau evaporasi dilakukan menggunakan rotary evaporator dengan kecepatan 60 rpm ($T= 60^{\circ}$) hingga didapatkan ekstrak kental.

Selanjutnya dilakukan pembuatan nanopartikel. Dalam pembuatan nanopartikel digunakan metode dispersi mekanik dan penguapan pelarut. Bahan yang digunakan yaitu fosfatidilkolin atau lesitin digunakan sebagai komponen utama fitosom, hal ini dikarenakan fosfatidilkolin merupakan komponen struktural utama dari membran biologis dalam tubuh sehingga dapat dimanfaatkan untuk membawa obat dengan berbagai rute pemberian tanpa dipengaruhi oleh sifat kelarutannya (Azzahra Darmawan *et al.*, 2020).

Sistem penghantaran obat yang baik akan meningkatkan bioavailabilitas dan bioekivalensi, oleh karena itu ekstrak biji labu kuning dan fitokonstituennya mulai dikembangkan teknologi penghantarannya ke dalam tubuh melalui *Drug Delivery System* (DDS) dengan sistem partikulat seperti fitosom yang merupakan pengembangan dari liposom. Salah satu perkembangan *Drug Delivery System* dalam penghantaran transdermal yaitu sistem vesikular, salah satunya dikenal sebagai fitosom. Fitosom merupakan gabungan fosfolipid salah satunya fosfatidilkolin dalam pelarut nonpolar seperti aseton.

Fitosom adalah sistem pengiriman partikel nano yang terdiri dari fosfolipid monolayer atau double-layer yang membentuk vesikel dan digunakan untuk pengiriman senyawa alami polar atau nonpolar. Kandungan fosfolipid dalam sistem ini mampu memediasi peningkatan kelarutan dengan ikatan hydrogen interaksi antara molekul air dengan gugus fosfat dalam sistem lapisan ganda pembawa fitosom dan meningkatkan permeabilitas senyawa aktif melalui

deformasi fosfolipid membran sel dengan pembawa fitosom. Saat ini pemanfaatan fitosom telah banyak dilakukan untuk modifikasi senyawa bahan alam yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitasnya (Susilawati *et al.*, 2021).

Menurut (Khan Junaid, 2013), penyusun fitosom yaitu yang merupakan struktur misel kompleks bahan alam – fosfolipid. Menurut (Jain, 2017) bahwa komposisi fitosom bersifat aman dan komponennya diterima untuk penggunaan dalam bidang farmasi, serta absorpsi dan bioavailabilitas dari bahan alam yang larut air meningkat. Hal ini menghasilkan efek terapi yang lebih baik. Dari hasil fitosom yang dibuat dengan empat perbandingan konsentrasi dan didapatkan hasil terbaik dari perbandingan variasi konsentrasi fosfatidikolin dan ekstrak paling kecil secara berturut-turut yaitu: 0,25 : 1 gram; 0,5 : 1 gram; 0,75 : 1 gram; 1 : 1 gram.

Karakteristik fitosom umumnya meliputi ukuran partikel, distribusi ukuran partikel serta efisiensi penjerapan, Ukuran partikel umumnya dilakukan untuk menentukan ukuran partikel dan menjadi salah satu yang penting sebab dari ukuran partikel tersebut dapat ditentukan kecepatan dan kemudahan obat yang akan diserap. Dalam distribusi ukuran semakin rendah nilai semakin homogen distribusi ukuran partikel. Efisiensi penjerapan umumnya dilakukan untuk mengetahui jumlah fitokonstituen atau senyawa aktif yang terjerap dalam fosfolipid (Ariana, 2016).

Saat ini teknologi nanopartikel telah banyak dikembangkan dalam pengembangan sistem penghantaran obat. Nanopartikel adalah teknologi yang memiliki ukuran 10-1000 nm (Mutia Windy *et al.*, 2022). Penelitian ini dilanjutkan dengan mengetahui ukuran partikel dari fitosom menggunakan alat PSA yang dimana nanopartikel ini tidak dapat terbaca dikarenakan ukuran partikel yang sangat besar. Kestabilan fitosom umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor

seperti suhu dan pH, bobot jenis, distribusi ukuran partikel seperti: faktor suhu dan pH menjadi salah satu indeks penting karena berkaitan dengan kenyamanan penggunaan dan menjamin stabilitas dari zat aktif yang digunakan, pH dapat berubah, Bobot jenis, bobot jenis cukup berkaitan dengan suhu dan pH karena selama masa penyimpanan bila suhu dan pH tidak sesuai maka akan membuat perubahan nilai bobot jenis, hal ini kemungkinan terjadi disebabkan adanya pemutusan ikatan pada sistem sehingga bobot mejadi berkurang atau bertambah, dan distribusi ukuran partikel ini juga menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan untuk menentukan kualitas karena semakin besar morfologi semakin tinggi tingkat kestabilan (Ariana, 2016). Beberapa permasalahan yang sering timbul pada preparasi nanopartikel adalah terjadinya agregasi yang cepat dan ukuran partikel yang tidak merata, sehingga stabilitas sistem dispersi menjadi sulit dikontrol (Martien *et al.*, 2012)

Efisiensi penjerapan dapat dapat dilihat menggunakan instrumen UV-Vis spektrofotometri dengan mengekstraksi suspensi fitosom menggunakan sentrifugasi dan menganalisa supernatan. Dapat dilihat pada Tabel 3 hasil efisiensi penjerapan yang baik adalah pada rentang 80-100% (Surini *et al.*, 2018). Adapun diperoleh hasil dari Efisiensi Penjerapan 0,25:1 (g); 0,5:1 (g); 0,75:1 (g); 1:1 (g) yaitu: EE 124,547%, EE 125,3%, EE 126,375%, dan EE 123,65% secara berturut-turut. Menurut (Bendas & Tadros, 2007) dan (Ashok Kumar *et al.*, 2010) yang menyatakan bahwa fosfatidilkolin pada konsentrasi optimum, penambahan ataupun pengurangannya akan menyebabkan menurunnya efisiensi penjerapan vesikel. Pengurangan konsentrasi fosfatidilkolin di bawah konsentrasi optimum menyebabkan vesikel fitosom yang terbentuk lebih sedikit sehingga efisiensi penjerapannya pun menurun sedangkan pada peningkatan konsentrasi

fosfatidilkolin di atas konsentrasi optimum menyebabkan vesikel yang terbentuk terlalu lunak sehingga menyebabkan kebocoran vesikel fitosom.

Untuk uji karakteristik selanjutnya pada penelitian ini digunakan metode *Scanning Electron Micriscopy* (SEM). SEM merupakan suatu metode yang digunakan untuk meneliti bentuk maupun struktur mikro permukaan dari suatu objek yang tidak bisa dilihat oleh mata atau mikroskop optik dengan menggunakan mikroskop elektron (Jores Katja, 2004) Rentang pembesarannya yang besar dan gambarnya dalam 3 dimensi membuat hasil karakterisasi sampel dengan menggunakan SEM ini menjadi lebih mudah untuk diamati dan dianalisa. (Lidia & Mursal, 2018). Berdasarkan penelitian dapat dilihat pada Gambar 5 dari hasil Efisiensi Penjerapan yang paling tinggi itu yang diujikan dengan metode SEM dengan hasil pada pembesaran 8000x didapatkan ukuran rata-rata partikel 2,12 μm dan 3,36 μm . Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa partikel *spherical* tidak beraturan dikarenakan bentuk yang tidak sepenuhnya sferis ini mungkin disebabkan karena fitosom tersebut tersusun atas lipid, dimana lipid sifatnya sulit untuk membentuk sferis utuh (Amir Tahir & Lidjaja, 2017). Morfologi yang memenuhi syarat adalah morfologi sferis (Surini *et al.*, 2018).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak Etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) tidak dapat dibuat dalam bentuk fitosom.
2. Hasil perbandingan konsentrasi fosfatidilkolin dengan Efisiensi Penjerapan 0,25:1 gram, 0,5:1 gram, 0,75:1 gram, 1:1 gram yaitu tidak dapat terbaca atau nilai yang terlalu besar. Adapun hasil dari ukuran partikel dari fitosom menggunakan alat PSA yang dimana nanopartikel ini tidak dapat terbaca.
3. Karakteristik bentuk morfologi fitosom ekstrak etanol Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*) yang dihasilkan dari analisis SEM yaitu partikel *spherical* tidak beraturan dikarenakan bentuk yang tidak sferis.

B. SARAN

Disarankan dalam penelitian ini untuk mencari metode yang lebih lanjut yang efektif dan dibandingkan dengan metode lama untuk memastikan peningkatan kualitas preparasi fitosom pada biji labu kuning (*Cucurbita moschata*).

KEPUSTAKAAN

- Abd El-Aziz, A. B., & Abd El-Kalek, H. H. (2011). *Antimicrobial Proteins And Oil Seeds From Pumpkin (Cucurbita Moschata)*, *Nature And Science*.
- Abdassah, M. (2017). Nanopartikel Dengan Gelasi Ionik. *Jurnal Farmaka*, 15(1), 45–52.
- Adhika, D. R., Anindya, A. L., Tanuwijaya, V. V., & Rachmawati, H. (2019). *Teknik Pengamatan Sampel Biologi Dan Non-Konduktif Menggunakan Scanning Electron Microscopy*. 53–58. <https://doi.org/10.5614/Sniko.2018.9>
- Adhisa, S., & Megasari, D. S. (2020). Kajian Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe True Or False Pada Kompetensi Dasar Kelainan Dan Penyakit Kulit. *E-Jurnal*, 09(3), 82–90.
- Adlhani, E. 2014. Penapisan Kandungan Fitokimia pada Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata). *Jurnal Teknologi dan Industri*, 3 (1) : 11-16.
- Amir Tahir, K., & Lidjaja, A. (2017). Pengaruh Konsentrasi Propilen Glikol Terhadap Stabilitas Fisik Krim Antioksidan Fitosom Ekstrak Kulit Buah Kakao (Theobroma Cacao L.). In *Jf Fik Uinam* (Vol. 5, Issue 2).
- Amri, A. D. F. 2014. Uji Aktivitas Antidiabetes dari Ekstrak Etanol 70% Tumbuhan Pecah Beling Hutan (Ruellia tuberosa L.) menggunakan Metode Penghambatan Enzim α -Glukosidase secara In-Vitro. Skripsi. Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ariana, R. (2016). *Pengaruh Karakteristik Serta Stabilitas Liposom Dan Fitosom Dalam Sistem Penghantaran Obat*. 9(2), 1–23.
- Ashok Kumar, J., Pullakandam, N., Lakshmana Prabu, S., & Gopal, V. (2010). Transdermal Drug Delivery System: An Overview. In *International Journal Of Pharmaceutical Sciences Review And Research* (Vol. 3, Issue 2). www.globalresearchonline.net
- Azzahra Darmawan, D., Darusman, F., & Ega Priani, S. (2020). *Literature Review: Fitosom Sebagai Sistem Penghantaran Senyawa Polifenol Dari Bahan Alam*. <https://doi.org/10.29313/V6i2.22553>

- Batool, M., Modassar, M., Nawaz, A., Roobab, U., Manzoor, M. F., Farooq, U., Nadeem, H. R., Nadeem, M., Kanwal, R., Abdelgawad, H., Jaouni, S. K. Al, Selim, S., & Ibrahim, S. A. (2022). *Benefits Of Pumpkin (Cucurbita Sp .).*
- Bendas, E. R., & Tadros, M. I. (2007). *Enhanced Transdermal Delivery Of Salbutamol Sulfate Via Ethosomes*. [Http://Www.Aapspharmscitech.Org](http://www.aapspharmscitech.org)
- Chaturvedi, M., Kumar, M., Sinhal, A., & Saifi, A. (2011). Recent Development In Novel Drug Delivery Systems Of Herbal Drugs. *International Journal Of Green Pharmacy*, 5(2), 87–94. [Https://Doi.Org/10.4103/0973-8258.85155](https://doi.org/10.4103/0973-8258.85155)
- Chivte, P. S., Pardhi, V. S., Joshi, V. A., & Rani, A. (2017). A Review On Therapeutic Applications Of Phytosomes. *Journal Of Drug Delivery And Therapeutics*, 7(5). [Https://Doi.Org/10.22270/Jddt.V7i5.1513](https://doi.org/10.22270/jddt.v7i5.1513)
- Delie, F., & Blanco-Príeto, M. J. (2005). Molecules Polymeric Particulates To Improve Oral Bioavailability Of Peptide Drugs. In *Molecules* (Vol. 10). [Http://Www.Mdpi.Org](http://www.mdpi.org)
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)* (D. RI, Ed.).
- Depkes RI. (2020). *Farmakope Indonesia Edisi VI*. In *Departemen Kesehatan Republik Indonesia*.
- Dr. Yudiyanto, M. S., Nasrul Hakim, M. P., & Anisatu Z. Wakhidah, M. S. (2021). *Tumbuhan Obat Suku Lampung Di Wilayah Taman Nasional Way Kambas* (M. S. Prof. Dr. Marina Silalahi, Ed.). Agree Media Publishing.
- Harahap, Y. (2010). *Peran Bionalisis Dalam Penjaminan Kualitas Obat Dan Peningkatan Kualitas Hidup Pasien*. Depok: UI Press.
- Haruni, P. S., Sani, E. P., & Ratih, A. (2019). Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Biji Kopi Robusta (Coffea Canephora Pierre A . Froehner) Menggunakan Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin. *Prosiding Farmasi*, 5(1).
- Indalifiany, A., Fristiohady, A., Sadarun, B., Andriani, R., Aspadiah, V., Jurusan Farmasi, N., Farmasi, F., Halu Oleo, U., HEA Mokodompit Kampus Hijau Bumi Tridharma, J., & Tenggara, S. (2021). Preparasi

Dan Karakterisasi Fitosom Ekstrak Etanol Spons *Xestospongia* Sp.
FARMASIS: Jurnal Sains Farmasi, 2(1), 1–9.

Indrianingsih, A. W., Apriyana, W., Rosyida, V. T., Nisa, K., Nurhayati, S., & Darsih, C. (2019). Efek Pengeringan Pada Bagian Buah Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Terhadap Aktivitas Antioksidan, Sifat Kimia Dan Struktur Morfologi. *Jurnal Riset Teknologi Industri*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.26578/jrti.v13i1.4395>

Jain, D. K. (2017). *Phytosome: A Novel Drug Delivery System For Herbal Medicine At Bhopal, MP, India View Project* (Vol. 2). <https://www.researchgate.net/publication/283318972>

Jane Monica, S., John, S., Madhanagopal, R., Sivaraj, C., Khusro, A., Arumugam, P., Gajdacs, M., Esther Lydia, D., Umar Khayam Sahibzada, M., Alghamdi, S., Almeahmadi, M., & Emran, T. Bin. (2022). Chemical Composition Of Pumpkin (*Cucurbita Maxima*) Seeds And Its Supplemental Effect On Indian Women With Metabolic Syndrome. *Arabian Journal Of Chemistry*, 15(8). <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2022.103985>

Jores Katja, M. W. D. M. B. H. J. C. M. K. (2004). Investigations On The Structure Of Solid Lipid Nanoparticles (SLN) And Oil-Loaded Solid Lipid Nanoparticles By Photon Correlation Spectroscopy, Field-Flow Fractionation And Transmission Electron Microscopy. *Journal Of Controlled Release*, 95(2), 217–227.

Julianty, R., Kurniasih, E., & Sami, D. M. (2021). Pemanfaatan Biji Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Sebagai Sumber Minyak Nabati Menggunakan Metode Ekstraksi Soxhletasi. *Jurnal Teknologi*, 21(1), 46–51.

Kardiman, K., Marno, M., & Sumarjo, J. (2018). Analisis Sifat Mekanik Terhadap Bentuk Morfologi Papan Komposit Sekam Padi Sebagai Material Alternatif Pengganti Serat Kaca. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.30595/jrst.v2i1.2344>

Kemenkes. (1995). *Farmakope Indonesia Edisi Keempat*. 300, 112.

Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Syamil Qur;An.

- Khan Junaid, A. A. A. S. S. S. S. (2013). *Recent Advances And Future Prospects Of Phyto-Phospholipid Complexation Technique For Improving Pharmacokinetic Profile Of Plant Actives*. 168 (1), 50–60.
- Lidia, I., & Mursal, P. (2018). *KARAKTERISASI XRD DAN SEM PADA MATERIAL NANOPARTIKEL SERTA PERAN MATERIAL NANOPARTIKEL DALAM DRUG DELIVERY SYSTEM*.
- Lusi, L. (2011). *Cara Mengetahui Ukuran Suatu Partikel, Nanotech Indonesia*.
- Martien, R., K Irianto, I. D., Farida, V., & Purwita Sari, D. (2012a). *Perkembangan Teknologi Nanopartikel Sebagai Sistem Penghantaran Obat Technology Developments Nanoparticles As Drug Delivery Systems*. In *Dian Purwita Sari Majalah Farmaseutik* (Vol. 8, Issue 1).
- Martien, R., K Irianto, I. D., Farida, V., & Purwita Sari, D. (2012b). *Perkembangan Teknologi Nanopartikel Sebagai Sistem Penghantaran Obat Technology Developments Nanoparticles As Drug Delivery Systems*. In *Dian Purwita Sari Majalah Farmaseutik* (Vol. 8, Issue 1).
- Masitoh, A., & Sopyan, I. (2019). *Formulasi Nanopartikel Tanaman Herbal Untuk Terapi Kanker*. *Farmasetika.Com (Online)*, 4(5), 165–172. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v4i5.23111>
- Mohanraj, V. J., & Chen, Y. (2006). *Nanoparticles-A Review*. In *Tropical Journal Of Pharmaceutical Research* (Vol. 5, Issue 1). <http://www.tjpr.freehosting.net>
- Mugni, A. R., & Hasanah, N. A. (2013). *Artikel Tinjauan: Fitosom Sebagai Sistem Penghantaran Obat Transdermal*. *Farmaka*, Vol.16 No., 1–15.
- Mugni, A. R., Nur, A., Program, H., Apoteker, S. P., Farmasi, F., Padjadjaran, U., Raya, J., Sumedang, B., & 21 Jatinangor, K. M. (N.D.). *Artikel Tinjauan: Fitosom Sebagai Sistem Penghantar Obat Transdermal Formulasi Baru Obat Herbal Untuk Perkembangan Farmasetika Di Indonesia*.
- Mukhriani. (2014). *Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif*. VII No. 2.
- Mutia Windy, Y., Natasya Dilla, K., Claudia, J., & Rakhman Hakim, A. (2022). *Characterization And Formulation Of Nanoparticles Extract Of Bundung Plant (Actinoscirpus Grossus) With Variations In*

Concentration Of Chitosan And Na-TPP Bases Using The Ionic Gelation Method. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8, 25–29. <https://doi.org/10.33084/Jsm.Vxix.Xxx>

Nandang, S. (2007). *Terampil Berkreasi* (S. P. Arif Kurniawan & S. S. Reni A. Umar, Eds.; Cetakan 1). GRAFINDO Media Pratama.

Nengsih, N. Y., Putri, Heryani, P. F., Perceka, R. M., & Ramadana, R. M. (2013). *Biofungisida Nanopartikel Perak Dari Lactobacillus Delbreuckii Subsp.*

Nurdin, M. (2019). *Kadar Protein Tempe Biji Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Pembelajaran.*

Permatasari, M. W. (2018). *Isolasi Dan Identifikasi Senyawa Fitosterol Dalam Biji Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Isolation And Identification Of Phytosterol Compounds In Yellow Pump Seed (Cucurbita Moschata) Pendahuluan Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Merupakan Salah Satu.* 1–10.

Rachmawati Heni, R. S. C. L. H. M. L. W. A. Van, P. K. And B. L. (2007). Chemical Modification Of Interleukin-10 With Mannose 6-Phosphate Groups Yields A Liver-Selective Cytokine. *Drug Metabolism And Disposition*, 35 (5), 814–821.

Rasaie, S., Ghanbarzadeh, S., Mohammadi, M., & Hamishehkar, H. (2014). Nano Phytosomes Of Quercetin: A Promising Formulation For Fortification Of Food Products With Antioxidants. *Pharmaceutical Sciences*, 20(3), 96–101.

Rawat Manju, S. D. S. S. , And S. S. (2006). Nanocarriers: Promising Vehicle For Bioactive Drugs. *Institute Of Pharmacy, Pt Ravishankar Shukla University; Raipur (C.G.), Vol. 29, No. 9*, 1790–1798.

Rusli, P. R. (2011). *Pembuatan Dan Karakterisasi Nanopartikel Titanium Dioksida Fasa Anatase Dengan Metode Sol Gel.*


Shihab, M.Q. 2002. Tafsir Al Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.


Shihab, M.Q. 2019. "Tafsir Al-Misbah : QS. Yunus ayat 101 (QS. 10:101) ". <https://risalahmuslim.id>. (Diakses pada 30 Juni 2019 pukul 15.47 WIB).

- Shihab, M.Q. 2019. "The Noble Quran QS. As-Saffat ayat 146)". <http://id.noblequran.org/quran/surah-as-saffat/ayat-146>. (Diakses pada 23 Juli 2019 pukul 11.47 WIB).
- Suhaidarwati, F. (2016). Uji Aktivitas Antihipertensi Ekstrak Etanol Umbi Lapis Bawang Dayak (*Eleutherine Americana Merr.*) Pada Hewan Coba Tikus (*Rattus Norvegicus*) Jantan. *Makassar. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*.
- Sunarti. (2018). *Serat Pangan Dalam Penanganan Sindrom Metabolik* (Ruslan, Ed.). Gadjah Mada University Press, Anggota IKAPI, Anggota APPTI.
- Suparni, I. dan Wulandarai, A. 2012. *Herbal Nusantara : 1001 Ramuan Tradisional Asli Indonesia*. ANDY Yogyakarta, Yogyakarta.
- Surini, S., Mubarak, H., & Ramadan, D. (2018). Cosmetic Serum Containing Grape (*Vitis Vinifera L.*) Seed Extract Phytosome: Formulation And In Vitro Penetration Study. *Journal Of Young Pharmacists*, 10(2), S51–S55. <https://doi.org/10.5530/Jyp.2018.2s.10>
- Susilawati, Y., Chaerunisa, A. Y., & Purwaningsih, H. (2021). Phytosome Drug Delivery System For Natural Cosmeceutical Compounds: Whitening Agent And Skin Antioxidant Agent. In *Journal Of Advanced Pharmaceutical Technology And Research* (Vol. 12, Issue 4, Pp. 327–334). Wolters Kluwer Medknow Publications. https://doi.org/10.4103/Japtr.JAPTR_100_20
- Syam, A., Zainal, & Kurniati, Y. (2019). *Biji Labu Kuning Yang Menyehatkan*.
- Tahir, K., Sartini, S., & Lidjaja, A. (2016). Preparasi Fitosom Ekstrak Etanol Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao L*) Menggunakan Variasi Konsentrasi Fosfatidilkolin. *JF FIK Uiniam*, 4(4), 159–164.
- Tasya, Z., Amiruddin, R., Syam, A., & Thamrin, Y. (2022). *Pradiabetes=Preventdiabetes (Kajian Memahami Silent Killer Asimtomatik)* (I. H. Yanti, Ed.). Media Sains Indonesia.
- Voight, R. (1995). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Widowati, H., & Rinata, E. (2020). *Bahan Ajar Anatomi*. In UMSISDA Press.


Wijayanto, S. O., & Bayuseno, A. P. (2016). Wijayanto. *Analisis Kegagalan Material Pipa Ferrule Nickel Alloy N06025 Pada Waste Heat Boiler Akibat Suhu Tinggi Berdasarkan Pengujian: Mikrografi Dan Kekerasan*, 2(1), 33–39.




LAMPIRAN**Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Biji Labu Kuning**

Lampiran 2. Pembuatan Fitosom

Lampiran 3. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Asam Galat Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis




Lampiran 4. Skema Kerja Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Cucurbita moschata)



Lampiran 5. Absorbansi Kurva Baku Asam Galat

Tabel 4. Nilai Absorbansi Larutan Standar Asam Galat

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi (nm)
20	0,625
30	0,643
40	0.651
50	0,665
60	0,679



Gambar 5. Kurva Baku Asam Galat


Lampiran 6. Kadar Fenolik Ekstrak Etanol 70% Biji Labu Kuning (Konsentrasi 100 ppm)

Replikasi	Berat sampel	absorbansi	KTFe (mgGAE/g ekstrak)
I	20,2 mg	0.675	162.91
II	20,3 mg	0.689	193.34
III	20,2 mg	0.688	192.86
Rata-rata			183.0366667

Lampiran 7. Absorbansi Kurva Baku Flavonoid

Tabel 5. Nilai Absorbansi Larutan Standar Flavonoid

Konsentrasi (ppm)	Abs. Kuersetin
20	0.357
25	0.474
30	0.584
35	0.608
40	0.877



Gambar 6. Kurva Baku Flavonoid

Lampiran 8. Kadar Flavonoid Ekstrak 70% Biji Labu Kuning

Replikasi	Berat sampel	absorbansi	KTF (mgQE/g ekstrak)
I	20,0 mg	0.411	68.349
II	20,2 mg	0.469	75.045
III	20,1 mg	0.445	72.328
Rata-rata			71.90733333

Lampiran 9. Hasil Efisiensi Penjerapan

Advanced A-ZT-C 4:38pm 24Jul23
Test Name: _Default_

ID#	Abs 706.0nm
1	0.061
2	0.050
3	0.035
4	0.041
5	0.066

Page 1 of 2, Samples 1 - 5
Press ↑ or ↓ to view data

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
---------------	-----------	----------------

Advanced A-ZT-C 4:38pm 24Jul23
Test Name: _Default_

ID#	Abs 706.0nm
6	0.117
7	0.067
8	0.094

Page 2 of 2, Samples 6 - 8
Press ↑ or ↓ to view data

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
---------------	-----------	----------------

Gambar 7. Adsorbansi Efisiensi Penjerapan

Lampiran 10. Perhitungan %Efisiensi Penjerapan

0,02 g → 5 ml

↓

0,02 ml → 10 ml (Replikasi 3x ΣA: 0,684)

$$Y = 0,0013x + 0,6006$$

$$0,684 - 0,6006 = 0,0013x$$

$$x = 64,15384 \text{ ppm}$$

$$\frac{64,15384}{1000} \times \frac{10 \text{ ml}}{0,02 \text{ ml}} \times 5 \text{ ml}$$

0,02 g

$$\frac{0,0641 \times 500 \text{ ml} \times 5 \text{ ml}}{0,02 \text{ g}}$$

$$= 8000 \text{ mg/g}$$

$$= 8000 \text{ g/100 g}$$

$$= 8000\%$$

Untuk 1 gram ekstrak → 8 gram asam galat (total polifenol)

a. Untuk perbandingan 0,25 : 1 $\Sigma A = 0,09$

1 g ekstrak → 50 ml (aseton)

↓

0,05 ml → 5 ml

$$y = a + bx$$

$$0,09 = 0,6006 + 0,0013x$$

$$x = -392,769 \text{ ppm}$$

$$\frac{-392,769}{1000} \times \frac{5 \text{ ml}}{0,05 \text{ ml}} \times 50 \text{ ml}$$

1 g

$$\frac{-0,392769 \times 100 \text{ ml} \times 50 \text{ ml}}{1 \text{ g}}$$

$$= -1963,845$$

$$= -196,4\%$$

Untuk 1 g ekstrak = -1,9638 g asam galat (total polifenol)

$$EE = \frac{8 - (-1,9638)}{8} \times 100\%$$

$$= 124,5475\%$$

b. Untuk perbandingan 0,5 : 1 $\Sigma A = 0,0743$

1 g ekstrak → 50 ml (aseton)

↓

0,05 ml → 5 ml

$$y = a + bx$$

$$0,0743 = 0,6006 + 0,0013x$$

$$x = -404,846 \text{ ppm}$$

$$\frac{-404,846}{1000} \times \frac{5 \text{ ml}}{0,05 \text{ ml}} \times 50 \text{ ml}$$

$$\frac{1 \text{ g}}{-0,4048 \times 100 \text{ ml} \times 50 \text{ ml}}$$

$$= -2024 \text{ mg/g}$$

$$= -202,4\%$$

Untuk 1 g ekstrak → -2,024 g asam galat (total polifenol)

$$EE = \frac{8 - (-2,024)}{8} \times 100\%$$

$$= 125,3\%$$

c. Untuk perbandingan 0,75 : 1 $\Sigma A = 0,0513$

1 g ekstrak → 50 ml (aseton)

↓

0,05 ml → 5 ml

$$y = a + bx$$

$$0,0513 = 0,6006 + 0,0013x$$

$$x = -422,538 \text{ ppm}$$

$$\frac{-422,538}{1000} \times \frac{5 \text{ ml}}{0,05 \text{ ml}} \times 50 \text{ ml}$$

$$\frac{1 \text{ g}}{-2,110 \text{ g}}$$

$$= -211\%$$

Untuk 1 g ekstrak → -2,11 g asam galat (total polifenol)

$$EE = \frac{8 - (-2,11)}{8} \times 100\%$$

$$= 126,375\%$$

d. Untuk perbandingan 1:1 $\Sigma A = 0,1086$

1 g ekstrak → 50 ml (aseton)

↓

$$0,05 \text{ ml} \rightarrow 5 \text{ ml}$$

$$y = a + bx$$

$$0,1086 = 0,6006 + 0,0013x$$

$$x = -378,461 \text{ ppm}$$

$$\frac{-378,461}{1000} \times \frac{5 \text{ ml}}{0,05 \text{ ml}} \times 50 \text{ ml}$$

$$1 \text{ g}$$

$$\frac{-0,3784 \times 100 \text{ ml} \times 50 \text{ ml}}{1 \text{ g}}$$

$$= -1892 \text{ mg/g}$$

$$= -189,2\%$$

Untuk 1 g ekstrak \rightarrow -1,892 g asam galat (total polifenol)

$$EE = \frac{8 - (-1,892)}{8} \times 100\%$$

$$= 123,65\%$$

Lampiran 11. Gambar Ekstraksi Sampel Biji Labu Kuning Cucurbita moschata)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)

Keterangan:

- a. Proses pengeringan Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)
- b. Proses pengayakan simplisia Biji Labu Kuning (*Cucurbita moschata*)
- c. Proses ekstraksi metode maserasi
- d. Proses pemisahan pelarut dan sampel
- e. Proses penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% dengan alat *rotary evaporator*
- f. Hasil dari penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70%
- g. Penimbangan bobot ekstrak untuk perhitungan rendamen ekstrak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 12. Gambar Proses pembuatan fitosom

(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)

Keterangan:

- Penimbangan ekstrak sebanyak 1 gram
- Penimbangan fosfatidilkolin dengan 4 varian konsentrasi
- Pencampuran aseton, fosfatidilkolin (dengan masing-masing konsentrasi), dan ekstrak
- Pengadukan menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 750 rpm ($T=40^{\circ}\text{C}$)
- Disentrifugasi dengan kecepatan 600 rpm dengan waktu 2 x 75 menit kemudian didiamkan selama 1 hari didalam kulkas
- Dimasukkan kedalam vial untuk pengujian PSA
- Dituang kedalam cawan petri untuk pengujian SEM


Lampiran 13. Gambar Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat dan Flavonoid




Gambar 8. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Flavonoid




Gambar 9. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Fenolik



Gambar 10. Hasil Pengukuran Absorbansi Kuersetin



Gambar 11. Hasil Pengukuran Absorbansi Asam Galat




Advanced A-T-C 3:49pm 7Aug23
Test Name: _Default_

ID#	abs
	425.0nm
1	0.666
2	0.681
3	0.678

Page 1, Samples 1 - 3
Measure Save
Blank Data Sample

Gambar 12. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi I Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol 70%



Advanced A-T-C 5:03pm 16Aug23
Test Name: _Default_

ID#	abs
	435.0nm
1	0.000
2	0.446
3	0.444
4	0.445

Page 1, Samples 1 - 4
Measure Save
Blank Data Measure

Gambar 13. Hasil Pengukuran Absorbansi Replikasi III Kadar Total Flavonoid Ekstrak Etanol 70%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



Nurinayah Dzil Izzah. M, lahir di Makassar 13 April 2001 merupakan putri dari pasangan Bapak Mursal dan Ibu Hj. Hadriani, S.Sos. Anak pertama dari dua bersaudara ini menempuh pendidikan formal di TK Kartini Unhas Antang pada tahun 2008, SDN 195 Barae Kab. Soppeng pada tahun 2013, SMPS Buq'atun Mubarakah (2016), SMAS Buq'atun Mubarakah (2019) di Makassar dan melanjutkan perguruan tinggi Strata Satu (S1) tepatnya farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 melalui jalur UMPTKIN.