

**PENENTUAN KADAR FENOLIK, FLAVONOID TOTAL DAN
KAPASITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL 70% RIMPANG
LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet* L.)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:

ROSFIANI NURSAKINAH ROSMAN

70100119001

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosfiani Nursakinah Rosman

Nim : 70100119001

Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 09 September 2000

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Lingk Rape-Rape Kecamatan Larompong, Kabupaten
Luwu

Judul : Penentuan Kadar Fenolik, Flavonoid Total Dan
Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Rimpang
Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L.*)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Agustus 2023

Penulis



Rosfiani Nursakinah Rosman
NIM. 70100119001

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Penentuan Kadar Fenolik, Flavonoid Total Dan Kapasitas Antiloksidan Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah Zingiber zerumbet (L)*" yang disusun oleh Rosfiani Nursakinah Rosman, NIM: 70100119001, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 03 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 03 Agustus 2023 M
16 Muharram 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi. S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nurhidayat Muh.Said, S.Ag.,M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penentuan Kadar Fenolik, Flavonoid Total Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L.)” Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak rintangan, hambatan yang silih berganti. Namun berkat tekad, semangat dan kerja keras penulis serta doa-doa dari seluruh pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sangat spesial kepada kedua orang tua yang sangat berperan dan berjasa dalam hidup penulis Ayahanda Amir Wahid dan Ibunda Hj.Fitriani Mahmud, S.pd.,M.pd, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan dan doa sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga penulis hanturkan untuk keluarga besar penulis, terkhususnya untuk saudara penulis Muh. Guntur yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga kepada sepupu-sepupu penulis yang selalu memberikan do'a dan semangat serta motivasi. Doa restu, nasihat, kesabaran serta petunjuk dari mereka merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi

kelanjutan studi penulis hingga saat ini, penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak/ibu :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penasihat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran serta senantiasa memberikan solusi terkait segala permasalahan dan keluhan akademik..
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrinegara, SKM., MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Ibu apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Farmasi selaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Haeria, S.Si, M.Si. selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. apt. Nursalati Tahar, S.Farm, M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing, memberikan motivasi dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Bapak apt. Muh.Rusdi, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Bapak Dr. Nurhidayat Muh. Said, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang juga berperan besar dalam mengarahkan penulis untuk memperoleh ilmu serta minat di bidang farmasi.

17. Kepada sahabat terkhusus Arfani Fathiyah dan Maylinda Yunhi Asmarani terima kasih atas persahabatan yang suportif, bantuan, saran, diskusi serta kerja samanya.
18. Kepada teman-teman angkatan 2019 “INTERFERON” yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan kebersamaannya.
19. Keluarga besar Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan guna untuk membalas semua kebaikan dan jasa-jasa seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, namun besar harapan penulis agar hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan.

Gowa, Agustus 2023

Penulis




Rosfiani Nursakinah Rosman

NIM : 70100119001

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan penelitian.....	7
F. Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L)	9
B. Fenolik.....	12
C. Flavonoid.....	13
D. Radikal Bebas.....	14
E. Antioksidan	16
F. Metode Penentuan Kapasitas Antioksidan	18
G. Ekstraksi Senyawa.....	21
H. Spektrofotometri UV-Vis	22
I. Kerangka Konsep	27
J. Tinjauan Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31

B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sampel.....	31
E. Prosedur Kerja.....	32
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	51
B. Implikasi Penelitian.....	51
KEPUSTAKAAN	52
LAMPIRAN.....	56
RIWAYAT HIDUP	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L).....	9
Gambar 2.	Gugus Fenol.....	12
Gambar 3.	Kerangka C ₆ -C ₃ -C ₆ Flavonoid	13
Gambar 4.	Mekanisme reaksi uji CUPRAC	19
Gambar 5.	Mekanisme reaksi uji FRAP	20
Gambar 6.	Mekanisme reaksi uji DPPH.....	20
Gambar 7.	Skema alat spektrofotometri UV-Vis	24
Gambar 8.	Reaksi reduksi <i>fosfatungstat-fosfomolibdenum</i> oleh senyawa fenol	43
Gambar 9.	Reaksi pembentukan kompleks flavonoid AlCl ₃	48
Gambar 10.	Reaksi DPPH dengan antioksidan	47
Gambar 11.	Mekanisme reaksi kapasitas antioksidan metode CUPRAC	48
Gambar 12.	Reaksi Kompleks Fe ³⁺ - TPTZ Menjadi Fe ²⁺ - TPTZ	46
Gambar 13.	Grafik panjang gelombang maksimum asam galat 764 nm.....	67
Gambar 14.	Kurva baku asam galat.....	68
Gambar 15.	Grafik panjang gelombang maksimum kuarsetin 424 nm.....	68
Gambar 16.	Kurva baku kuarsetin.....	69
Gambar 17.	Grafik kurva baku trolox metode DPPH	70
Gambar 18.	Grafik kurva baku trolox metode CUPRAC.....	70
Gambar 19.	Grafik kura baku trolox metode FRAP.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Metode pengukuran kapasitas antioksidan	21
Tabel 2. Hasil ekstraksi rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L).....	40
Tabel 3. Hasil penetapan kadar fenolik total.....	40
Tabel 4. Hasil penetapan kadar flavonoid total	40
Tabel 5. Hasil Pengukuran kapasitas antioksidan metode DPPH.....	40
Tabel 6. Hasil Pengukuran kapasitas antioksidan metode CUPRAC	41
Tabel 7. Hasil Pengukuran kapasitas antioksidan metode FRAP	41
Tabel 8. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar asam galat.....	67
Tabel 9. Hasil Pengukuran Absorbansi Standar kuarsetin.....	69
Tabel 10. Hasil Pengukuran Absorbansi trolox metode DPPH	69
Tabel 11. Hasil Pengukuran Absorbansi trolox metode CUPRAC	70
Tabel 12. Hasil Pengukuran Absorbansi trolox metode FRAP	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Skema kerja ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L)	56
Lampiran 2.	Skema kerja pembuatan larutan standar asam galat menggunakan spektrofotometri UV-Vis	57
Lampiran 3.	Skema kerja penetapan kadar fenolik total ekstrak etanol 70% rim pang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L).....	58
Lampiran 4.	Skema kerja pembuatan larutan standar kuarsetin menggunakan spektrofotometri UV-Vis	59
Lampiran 5.	Skema kerja penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L)	60
Lampiran 6.	Skema kerja pembuatan larutan standar trolox metode DPPH	61
Lampiran 7.	Skema kerja pengukuran kapasitas antioksidan ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L) metode DPPH	62
Lampiran 8.	Skema kerja pembuatan larutan standar trolox metode FRAP.....	63
Lampiran 9.	Skema kerja pengukuran kapasitas antioksidan ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L) metode FRAP	64
Lampiran 10.	Skema kerja pembuatan larutan standar trolox metode CUPRAC	65
Lampiran 11.	Skema kerja pengukuran kapasitas antioksidan ekstrak etanol 70% rim pang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L) metode CUPRAC	66
Lampiran 12.	Grafik.....	67
Lampiran 13.	Perhitungan.....	68
Lampiran 14.	Gambar ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L)	68
Lampiran 15.	Gambar Penetapan Kadar Fenolik dan Flavonoid Total	72
Lampiran 16.	Gambar pengujian kapasitas antioksidan metode FRAP, CUPRAC dan DPPH sampel rimpang lempuyang gajah.....	86

ABSTRAK

Nama : ROSFIANI NURSAKINAH ROSMAN

NIM : 70100119001

Judul : PENENTUAN KADAR FENOLIK, FLAVONOID TOTAL DAN KAPASITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK ETANOL 70% RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber Zerumbet* L.)

Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L.) juga dikenal sebagai Jahe liar, merupakan tumbuhan herba tahunan. *Zingiber zerumbet* (L.) diketahui memiliki khasiat obat seperti antiinflamasi, anti tumor, anti alergi, anti piretik, anti aktivitas agregasi platelet, dan antibakteri. Tanaman ini dilaporkan mengandung seskuiterpenoid, flavonoid, senyawa aromatik, vanilin, turunan kaempferol dan senyawa polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki beberapa efek biologis termasuk aktivitas antioksidan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan total senyawa fenolik dan flavonoid serta kapasitas antioksidan yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah. Ekstraksi rimpang lempuyang gajah dilakukan menggunakan metode meserasi dengan pelarut yaitu etanol 70%. Metode pengukuran kadar senyawa menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis dan kapasitas antioksidan dengan menggunakan 3 metode DPPH, FRAP, dan CUPRAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) mengandung kadar fenolik sebesar 53,18 mg GAE/g Ekstrak, kadar flavonoid sebesar 17,11 mg QE/g Ekstrak, dan kapasitas antioksidan pada metode CUPRAC 58,32 mg Tr/g Ekstrak, metode DPPH sebesar 11,27 mg Tr/g Ekstrak dan metode FRAP sebesar 6,61 mg Tr/g Ekstrak. Ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) terhadap pembanding trolox memiliki kapasitas antioksidan tertinggi pada metode CUPRAC.

Kata kunci: *lempuyang gajah, fenolik, flavonoid, DPPH, FRAP, CUPRAC.*

ABSTRACT

Name : ROSFIANI NURSAKINAH ROSMAN

Student ID : 70100119001

Title : DETERMINATION OF TOTAL PHENOLIC, FLAVONOID CONTENT AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF 70% ETHANOL EXTRACT LEMPUYANG GAJAH RHIZOME (*Zingiber zerumbet* L.).

Lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) also known as Wild ginger, is a perennial herbaceous plant. *Zingiber zerumbet* (L.) is known to have medicinal properties such as anti-inflammatory, anti-tumor, anti-allergic, anti-pyretic, anti-platelet aggregation activity, and antibacterial. This plant is reported to contain sesquiterpenoids, flavonoids, aromatic compounds, vanillin, kaempferol derivatives and other polyphenolic compounds. Polyphenol compounds are reported to have several biological effects including antioxidant activity. The purpose of this study was to determine the total content of phenolic compounds and flavonoids as well as the antioxidant capacity contained in the rhizome of lempuyang Gajah. Extraction of lempuyang gajah rhizomes was carried out using the maceration method with a solvent, namely 70% ethanol using the method of measuring compound levels using the UV-Vis spectrophotometer method and antioxidant capacity using 3 DPPH, FRAP, and CUPRAC methods. The results showed that the 70% ethanol extract of lempuyang gajah rhizome *Zingiber zerumbet* (L) contained a phenolic content of 53.18 mg GAE/g Extract, for a flavonoid content of 17.11 mg QE/g Extract, and for the highest capacity in the CUPRAC method 58.32 mg Tr/g Extract, DPPH method of 11, 27 mg Tr/g Extract and the FRAP method of 6.61 mg Tr/g Extract.) Extract lempuyang gajah rhizome *Zingiber zerumbet* (L) against distributed trolox had the highest antioxidant capacity in the CUPRAC method.

Keywords: *lempuyang gajah, polyphenols, flavonoid, DPPH, FRAP, CUPRAC.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebiasaan hidup yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyakit keras terutama penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, kanker, jantung sampai stroke. Sehingga, penyakit degeneratif merupakan masalah kesehatan yang serius dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Stres oksidatif menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit tersebut. Stres oksidatif adalah kondisi ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah antioksidan di dalam tubuh (Kiromah et al., 2021). Radikal bebas dapat berasal dari luar tubuh maupun dalam tubuh. Radikal bebas yang berasal dari dalam tubuh yang terbentuk pada protein, karbohidrat, dan lemak sebagai sisa proses metabolisme. Radikal bebas juga bersumber dari luar tubuh seperti asap rokok, Sinar UV dan bahan kimia. Radikal bebas dapat memulai reaksi berantai yang mengakibatkan disintegrasi membran sel (Kiromah et al., 2021; Prasanto et al., 2017).

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 menyebutkan angka prevalensi penyakit kanker di Indonesia meningkat dari 1,4% menjadi 1,8%, prevalensi hipertensi meningkat dari 25,8% menjadi 34,1% dan prevalensi diabetes meningkat dari 6,9% menjadi 8,5% (Kemenkes RI, 2018). Racun dan bahan kimia dalam makanan, polusi, radiasi, dan zat lainnya dapat menyebabkan peningkatan produksi ROS karena proses biokimia. *Species Oxygen Reactive* (ROS) adalah radikal bebas turunan dari oksigen yang dihasilkan dari tubuh manusia. Sehingga, senyawa antioksidan diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Salim et al., 2020).

Senyawa antioksidan dapat menstabilkan dan menghambat oksidasi dengan mengikat radikal bebas sehingga dapat mencegah terjadinya reaksi berantai, dengan demikian penggunaan antioksidan diperlukan bagi tubuh (Rusiani et al., 2019). Antioksidan dapat menghambat pembentukan radikal bebas karena bersifat donor elektron. Terdapat dua jenis sumber antioksidan yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami mempunyai toksisitas yang relatif rendah, sehingga upaya pencarian sumber antioksidan semakin meningkat. Peningkatan ini diakibatkan oleh kekhawatiran efek samping dari antioksidan sintetik yang memicu sifat karsinogenik (penyebab penyakit kanker) (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 2021). Penggunaan antioksidan sintetik memiliki dampak negatif sangat tinggi bagi kesehatan jika dikonsumsi melebihi batas yang dianjurkan (Kiromah et al., 2021; Nirmala Sari, 2015).

Keberagaman sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan berbagai macam tanaman yang hidup di hutan tropis Indonesia dipandang sebagai sumber bahan kimia yang berpotensi untuk dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan agrokimia, obat-obatan, dan bahan kimia (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 2021). Pada beberapa jenis tumbuhan berkhasiat obat dapat menghasilkan metabolit sekunder, dimana pada masing-masing metabolit tersebut terdapat struktur dan manfaat yang berbeda-beda. Kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan dikategorikan sebagai antioksidan alami atau non-enzimatik yang mempunyai kemampuan dalam menangkap radikal bebas. Senyawa alkaloid, karotenoid, fenol, steroid, triterpenoid, dan tanin telah lama menunjukkan aktivitas antioksidan (L. Puspitasari et al., 2018).

Senyawa flavonoid merupakan metabolit sekunder dari golongan fenol dan memiliki kemampuan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas. Aktivitas flavonoid sebagai antioksidan didasarkan pada kemampuannya secara langsung

mencari dan mengumpulkan spesies oksigen reaktif dan mengkhelat radikal bebas melalui donasi atom hidrogen langsung atau transfer elektron tunggal mekanisme lain antioksidan eksogen, melalui penghelatan elemen logam seperti kuarsetin yang merupakan senyawa flavonoid yang berperan penting dalam pembentukan radikal bebas yang digunakan untuk mengkhelat ion logam, yaitu Fe^{2+} dan Cu^{2+} (Arnanda & Nuwarda, 2019).

Salah satu kekayaan alam hayati Indonesia adalah tumbuhan *Zingiber zerumbet* (Silalahi, 2018). Lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) merupakan salah satu agen antioksidan yang tumbuh melimpah di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan hasil pengujian fitokimia beberapa senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Zingiberaceae terbukti mengandung senyawa terpenoid, flavonoid dan fenol memiliki aktivitas antioksidan (Wandita & Musrifoh, 2018).

Kapasitas antioksidan dalam tumbuhan seperti dalam tumbuhan lempuyang gajah dapat diuji dengan menggunakan beberapa metode pengujian, pengujian kapasitas antioksidan digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya (reaksi kimianya) yaitu berbasis transfer elektron (*Elektron Transfer Based*) dan berbasis transfer atom hidrogen (*Hidrogen Atom Transfer Based*) (Aryanti et al., 2021). Metode HAT meliputi metode *Oxygen Radical Absorbance Capacity* (ORAC), metode *Total Peroxyl Radical-trapping Antioxidant Parameter* (TRAP), metode *2,2'-azobis (2-amidinopropane) hydrochloride* (AAPH), dan metode *bleaching β -carotene*. Sedangkan metode ET meliputi metode *2,2'-Azinobis-(3-ethylbenzothiazoline6-sulfonic acid)* (ABTS), *Trolox-Equivalent Antioxidant Capacity* (TEAC), *2,2-di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl* (DPPH), *Ferric Reducing Antioxidant Power* (FRAP), dan *Cupric Reducing Antioxidant Capacity* (CUPRAC) (Palupi & Widyanto, 2020).

Banyaknya metode uji aktivitas antioksidan dapat memberikan hasil uji yang beragam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari struktur kimiawi antioksidan, sumber radikal bebas, dan sifat fisiko-kimia sediaan sampel yang berbeda. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemilihan metode analisa aktivitas antioksidan yang tepat dan selektif untuk suatu jenis sampel tertentu (Maesaroh et al., 2018). Berdasarkan ulasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengujian kadar fenolik dan flavonoid total serta kapasitas antioksidan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah menggunakan pelarut etanol 70% dan beberapa teknik pengujian antioksidan menggunakan metode FRAP, CUPRAC, dan DPPH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Berapakah kadar total fenolik dan flavonoid ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.)?
2. Berapakah kapasitas antioksidan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) berdasarkan metode DPPH, FRAP, dan CUPRAC?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah adalah sampel yang diekstraksi dengan pelarut etanol 70% dengan metode maserasi, kemudian pelarutnya diuapkan dan didapatkan ekstrak kental rimpang lempuyang gajah.

- b. Kadar fenolik total ialah kadar senyawa fenolik dalam sampel rimpang lempuyang gajah yang dinyatakan sebagai ekuivalen asam galat dimana, untuk membuat larutan uji menjadi biru, ditambahkan pereaksi *Folin-Ciocalteu* sebelum mengukur absorbansi. Kandungan fenolik total dinyatakan dengan massa ekuivalen asam galat dengan satuan mg/g ekstrak.
- c. Kadar flavonoid total ialah kadar senyawa flavonoid dalam sampel rimpang lempuyang gajah yang dinyatakan sebagai ekuivalen kuersetin dimana, tambahan reagen Aluminium klorida (AlCl_3) sebelum mengukur absorbansi. Kandungan flavonoid total dinyatakan dengan massa ekuivalen kuersetin dengan mg.
- d. Kapasitas Antioksidan untuk mengetahui jumlah radikal bebas yang ditangkap oleh troloks yang digunakan untuk mengukur kapasitas antioksidan sampel rimpang lempuyang gajah dengan menggunakan metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian laboratoium untuk menganalisis senyawa fenolik dan flavonoid total serta kapasitas antioksidan pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) sebagai sampel dengan menggunakan metode Fenolik, Flavonoid, FRAP, CUPRAC, dan DPPH.

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan dari hasil penelitian sebelumnya yang dibahas dengan tujuan untuk memperjelas arah, manfaat dan posisi dari penelitian ini, kemudian dibandingkan dengan beberapa temuan yang dari penelitian sebelumnya.

1. Gandhi, K dan Saravanan, S. "*Phytochemical Estimation and In vitro*

Antioxidant Activity of Rhizome of Zingiber zerumbet (L.)” 2018. Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan fenol dan flavonoid dalam ekstrak metanol rimpang dan untuk mengetahui aktivitas antioksidan secara *in vitro* dengan menggunakan uji radikal 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) dan 2,2'-azino-bis (3-etil-benzotiazolin-6-sulfonat) (ABTS). Hasil penelitian menunjukkan keberadaan lima senyawa fenolik yang berbeda seperti asam galat, asam hidroksi benzoat, asam coumaric, asam vallinat dan asam sinamat dikonfirmasi dalam ekstrak rimpang *Z. zerumbet* serta *Z. zerumbet* memiliki potensi aktivitas antioksidan karena adanya sejumlah besar senyawa fenol dan flavonoid yang ada di dalamnya.

Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berkaitan dengan penelitian diatas dimana akan dilakukan penentuan kadar total fenolik dan flavonoid serta kapasitas antioksidan dengan sampel yang sama namun dengan pelarut dan metode yang berbeda.

2. Haeria, Nurshalati Tahar, Munadiyah. “penentuan kadar flavonoid dan kapasitas antioksidan ekstrak etanol kulit batang kelor (*Moringa oleifera* L) dengan metode DPPH, CUPRAC dan FRAP” 2018. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat besarnya kapasitas antioksidan dari masing-masing metode pada batang kelor (*Moringa oleifera* L) yang diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 96% menggunakan metode DPPH, CUPRAC dan FRAP. Hasil yang didapatkannya memperlihatkan adanya beberapa fitokimia yang terkandung misalnya senyawa steroid, flavonoid, alkaloid, fenolat, dan tanin pada ekstrak ekstrak etanol kulit batang kelor (*Moringa oleifera* L). Pada hasil antioksidan dengan sampel tersebut memperlihatkan kapasitas

penangkakan radikal atau kandungan antioksidan pada metode FRAP ini menunjukkan nilai kapasitas antioksidan yang kecil dibandingkan dengan metode CUPRAC dan DPPH.

Pada penelitian yang akan dilakukan terkait dengan penelitian diatas, peneliti berencana melakukan penentuan kapasitas antioksidan menggunakan metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP seperti metode yang digunakan pada penelitian diatas, namun sampel dan pelarut yang digunakan berbeda

3. Suci Wildatul Wahidah dkk. 2021 “Uji Skrining Fitokimia Dari Amilum Familia *Zingiberaceae*” bertujuan untuk mengetahui metabolit sekunder yang terdapat pada amilum familia *zingiberaceae* meliputi pemeriksaan alkalooid, flavonoid, polifenolat, tanin, kuinon, saponin, steroid dan terpenoid. Terdapat beberapa sampel yang digunakan pada penelitian ini salah satunya Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L)) Hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa amilum Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L)) mengandung senyawa flavonoid.

Penelitian yang akan dilakukan terkait berkaitan dengan penelitian diatas dimana selanjutnya akan dilakukan penentuan kadar fenolik dan flavonoid total menggunakan sampel yang sama.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menentukan kadar total fenolik dan flavonoid yang terkandung pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.))

2. Untuk mengetahui besarnya kapasitas antioksidan dari ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)) berdasarkan metode DPPH, FRAP dan CUPRAC.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta penjelasan tentang perbandingan kapasitas antioksidan antara ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah dengan beberapa metode pengujian serta dapat memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat terkait tanaman sekitar terkhusus dengan tumbuhan lempuyang gajah.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.))

1. Klasifikasi

Klasifikasi tanaman lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) menurut (Lianah, 2019) sebagai berikut:

Regnum	: <i>Plantae</i>
Divisi	: <i>Spermatophyta</i>
Subdivisi	: <i>Angiospermae</i>
Kelas	: <i>Monocotyledonae</i>
Ordo	: <i>Zingiberales</i>
Famili	: <i>Zingiberaceae</i>
Genus	: <i>Zingiber</i>
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.



Gambar 1. Rimpang *Zingiber zerumbet* (L.)

2. Morfologi

Lempuyang Gajah juga dikenal sebagai Jahe liar, merupakan tumbuhan herba tahunan (perennial). Batang semu, dapat tumbuh setinggi 1-2 meter, berwarna hijau, dengan banyak urat tengah dan dapat setinggi 1-2 meter. Daun

lempuyang gajah berbentuk lanset, memanjang, tumbuh memisah di kedua sisi batang. Ujung daun runcing (*acuminatus*), pangkal runcing (*acutus*) dan tepinya rata. Panjang daun mencapai 25-40 cm, lebar daun mencapai 10-15 cm. Jumlah daun pada batang 3-7 cm dan berwarna hijau muda sampai hijau tua, dengan urat berbulu, tangkai daun pendek dan berbulu. Lempuyang gajah tumbuh dari rimpang, bunganya kerucut pinus, panjang tangkai bunga \pm 12 cm, bunganya merah, kelopaknya terpisah. Rimpang utama Lempuyang gajah cukup besar dan kuat, bercabang banyak, daging buah berwarna kuning kecoklatan dan lebih pucat dari rimpang harum, bagian luar rimpang berwarna coklat (Arijit Chaudhuri et al., 2018; Lianah., 2019).

3. Kandungan kimia

Skrining fitokimia penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. menggambarkan berbagai senyawa kimia yang bermanfaat, yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid, fenolik, dan tannin (J. Rohmah et al., 2022). Adanya kandungan antioksidan dalam tanaman seperti senyawa fenolik, flavonoid, tanin dan proantosianin dapat digunakan untuk mengobati sejumlah penyakit, contohnya konsumsi antioksidan alami dapat menyembuhkan penyakit degradatif (Wardhani et al., 2018). Rimpang lempuyang gajah berkadar pati 60%, minyak atsiri 0,8%, dan serat 6,5%. Selain itu mengandung sesquiterpenes dan plavanoids (Evizal, 2013)

Penelitian lain yang menggunakan sampel lempuyang gajah melaporkan beberapa rendemen minyak atsiri *Zingiber zerumbet* (L) kaya akan α -tujene (1,70%); α -pinene (1,16%); *camphene* (0,98%); *sabinene* (32,96%); δ -myrcene (13,27%); α -terpinene (0,71%); *limonene* (0,86%); γ -terpinene (1,24%); *kamfer* (2,91%); *linalool* (0,77%); *1,8-sineol* (4,23%); δ -gurjunene (1,50%); *trans-*

caryophyllene (3,73%); α -*humulene* (2,72%); *germacrene* (3,04%); dan *zerumbone* (11,05%) (Batubara, et al., 2013).

4. Manfaat

Zingiber zerumbet (L) telah lama digunakan oleh berbagai suku di Indonesia sebagai obat tradisional dan jamu. *Zingiber zerumbet* (L) juga banyak digunakan sebagai bahan tambahan makanan dan minuman. Berbagai suku bangsa di Asia, India, Cina dan Arab telah lama menggunakan *Zingiber zerumbet* (L) untuk tujuan pengobatan seperti sakit kepala, kembung, masuk angin, maag, luka, kehilangan nafsu makan, kesedihan, masalah pencernaan bahkan ketidaknyamanan menstruasi. Hasil bioassay rimpang *zingiber zerumbet* (L) menunjukkan bahwa tumbuhan lempuyang gajah memiliki sifat anti-inflamasi, anti-bakteri dan analgesik (Silalahi, 2018).


Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. diketahui memiliki khasiat obat tertentu seperti antiinflamasi, anti tumor, anti alergi, anti piretik, anti aktivitas agregasi platelet, dan antibakteri. Tanaman ini dilaporkan mengandung seskuiterpenoid, flavonoid, senyawa aromatik, vanilin, turunan kaempferol dan senyawa polifenol lainnya. Senyawa polifenol dilaporkan memiliki beberapa efek biologis termasuk aktivitas antioksidan (J. Rohmah et al., 2022).

Sebagai tanaman herbal, Lempuyang Gajah memiliki berbagai macam manfaat, terutama rimpangnya dapat digunakan sebagai obat tradisional demam pada batuk, asma, bengkak, luka, kehilangan nafsu makan dan penyakit kulit. Air rebusan rimpang juga digunakan sebagai obat cacing pada anak-anak. Tunas muda dan bunganya digunakan sebagai bumbu serta suplemen makanan untuk mengurangi kolitis ulserativa eksperimental (Arijit Chaudhuri et al., 2018).

B. Fenolik

Senyawa fenolik adalah senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik dan paling banyak terdapat dalam tanaman, Senyawa ini memiliki keragaman struktural mulai dari fenol sederhana hingga kompleks maupun komponen yang terpolimerisasi (Diniyah & Lee, 2020). Senyawa fenolik memiliki kemampuan untuk menghambat aktivitas radikal bebas dan menyerap logam selain itu memiliki fungsi biologis sebagai perlindungan terhadap penyakit degeneratif secara signifikan (Yanuarti et al., 2017).

Senyawa fenolik memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai donor hidrogen atau untuk mengkelat ion logam seperti besi dan tembaga, serta dengan menghambat lipoprotein densitas rendah (LDL). Beberapa penelitian mengatakan bahwa senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis, seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme mereduksi, menangkap radikal bebas, mengkelat logam, meredam terbentuknya senglet oksigen, serta mendonor elektron



Gambar 2. Gugus Fenol (kumnadi,2018)


TPC (*Total Phenolic Content*) atau kandungan total fenol adalah proses untuk mengetahui jumlah kandungan fenol dalam sampel. Senyawa fenolik yang terkandung dalam tanaman bersifat redoks dan sifatnya memungkinkan memiliki aktivitas antioksidan. TPC dinyatakan dalam sampel mg GAE/g ekstrak (Johari & Khong, 2019). TPC menggunakan metode *Follin-Ciocalteu* dengan reaksi yang terjadi ialah reaksi reduksi-oksidasi. Senyawa follin mereduksi *fosfomolibdat*

fosfatungstat dalam *Folin-Ciocalteu* yang membentuk *molybdenum* yang berwarna biru (Sukmawaty & Afni, 2019).

asam galat yang merupakan salah satu fenolik alami dan stabil, asam galat termasuk dalam senyawa fenolik turunan asam hidroksibenzoat yang tergolong asam fenolik sederhana (Tahir et al., 2017). Aktivitas antioksidan telah terbukti berhubungan dengan keberadaan gugus hidroksil bebas dan terkonjugasi dalam senyawa fenolik seperti asam galat (Maesaroh et al., 2018). Asam galat memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, analgesik dan antioksidan (Junaidi & Anwar, 2018).

C. Flavonoid

Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki banyak gugus –OH dengan adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, hingga sifatnya polar. Senyawa golongan ini mudah terekstrak dalam pelarut etanol yang memiliki sifat polar karena adanya gugus hidroksil, sehingga mampu terbentuk ikatan hidrogen (Hadi et al., 2022).



Gambar 3. Kerangka C₆-C₃-C₆ Flavonoid

Flavonoid adalah golongan senyawa polifenol yang memiliki sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif. Flavonoid adalah senyawa yang terkandung pada sayur-sayuran, buah-buahan, serta beberapa minuman yang mempunyai berbagai macam manfaat serta efek antioksidan flavonoid terutama berupa senyawa yang larut dalam air yang dapat diekstraksi dengan etanol 70% (Padmasari et al., 2021).

Senyawa kuersetin memiliki kemampuan lebih baik menstabilkan radikal melalui delokalisasi elektron radikal ke dalam sistem poliaromatik fenol. Kuersetin merupakan senyawa flavonoid utama yang termasuk ke dalam golongan flavonol. Kuersetin banyak ditemukan dalam berbagai tanaman dan bahan makanan, buah-buahan, juga bermanfaat untuk kesehatan. Ketika flavonol kuersetin bereaksi dengan radikal bebas, kuersetin mendonorkan protonnya dan menjadi senyawa radikal. Elektron tidak berpasangan yang dihasilkan didelokalisasikan ke dalam sistem aromatik sehingga senyawa radikal kuersetin memiliki energi yang sangat rendah dan relatif kurang reaktif (Maesaroh et al., 2018).

D. Radikal Bebas

Radikal bebas adalah atom atau molekul dengan elektron tidak berpasangan di orbit luarnya, yang meningkatkan reaktivitas dan ketidakstabilan senyawa (Sopiah et al., 2019). Radikal bebas akan bereaksi dengan molekul tetangga untuk menghasilkan pasangan elektron, yang akan menciptakan stabilitas atom atau elektron. Karena elektronnya yang tidak berpasangan, radikal bebas kimia menjadi sangat energik. Radikal bebas dapat memiliki salah satu dari tiga muatan: positif (kation), negatif (anion), atau tidak sama sekali (netral) (Munteanu & Apetrei, 2021). Penyakit degeneratif berkisar dari kanker hingga kondisi autoimun dan disebabkan oleh adanya radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel atau jaringan. Dampak oksidatif radikal bebas dapat menyebabkan peradangan dan penuaan dini. Lipid yang dimaksudkan untuk menjaga kulit tampak muda malah menghasilkan lipid peroksida saat berinteraksi dengan radikal bebas, sehingga mempercepat proses penuaan. Oksigen reaktif, penyebab utama kanker, meningkatkan produksi bahan kimia karsinogenik. Selain itu, dapat meningkatkan kadar LDL (*low density lipoprotein*), yang pada akhirnya

membantu akumulasi kolesterol pada dinding pembuluh darah. sehingga dapat mencegah timbulnya aterosklerosis, juga dikenal sebagai penyakit jantung koroner (Euis, 2018). Radikal bebas berkembang di dalam tubuh dan menyebar ke seluruh tubuh sebagai akibat dari aktivitas metabolisme atau respirasi. Tubuh manusia memiliki sistem antioksidan untuk memerangi produksi radikal bebas reaktif yang sedang berlangsung dalam tubuh. Pada dasarnya, kerusakan yang diyakini disebabkan oleh radikal bebas dapat terjadi karena tubuh memproduksi lebih banyak molekul oksigen reaktif dari pada antioksidan (Salamah et al., 2015).

Sebuah radikal bebas dapat membuat radikal bebas lain dengan memberikan satu elektron, mengambil elektron dari molekul lain, atau bergabung dengan molekul yang bukan radikal bebas. Interaksi radikal bebas dan molekul radikal non-bebas merupakan tanda terjadinya reaksi berantai. Reaksi berantai ini akan berlanjut sampai radikal bebas dihilangkan melalui interaksi dengan radikal bebas lain atau sistem antioksidan tubuh. Radikal bebas dapat berinteraksi dengan elemen struktural dan fungsional, termasuk DNA dan bahan kimia yang membentuk membran sel. Sedangkan zat-zat seperti ozon, H_2O_2 , dan zat lain yang bukan radikal bebas tetapi cepat berubah menjadi mereka adalah sumber pembentukan radikal bebas (Euis, 2018).

Mekanisme kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas cukup kompleks melalui reaksi berantai hingga terjadi stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan sel (Andarina & Djauhari, 2017). Radikal bebas akan menyerang sel-sel baik pada tubuh sehingga menyebabkan hilangnya fungsi dan strukturnya (Kiromah et al., 2021). Efek negatif dari radikal bebas dapat diredam dengan antioksidan. Antioksidan merupakan zat yang mampu menahan reaksi oksidasi dengan mendonorkan elektron ke radikal bebas. Antioksidan ini berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap radikal bebas. Tubuh manusia sesungguhnya

mempunyai sistem antioksidan yang berupa enzim tetapi jumlahnya sering tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antioksidan dari luar diperlukan jika jumlah radikal bebas yang masuk melampaui batas (I. F. Kurniawati & Sutoyo, 2021).

E. Antioksidan

1. Definisi

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat radikal bebas. Antioksidan diperlukan untuk mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif adalah keadaan ketidakseimbangan antara jumlah radikal bebas dan jumlah antioksidan yang ada dalam tubuh (Ghozaly & Safitri, 2016). Antioksidan mengoksidasi radikal bebas dan melindungi molekul lain di dalam sel dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas serta spesies oksigen reaktif. Metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai antioksidan nonenzimatik atau antioksidan alami jika senyawa ini menunjukkan sifat aktivitas penangkal radikal bebas (L. Puspitasari et al., 2018)

Senyawa antioksidan mendonorkan elektron kepada radikal bebas yang tidak stabil, sehingga radikal bebas tersebut dapat dinetralkan sehingga tidak mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017). Efek merugikan dari radikal bebas dalam tubuh adalah pelepasan ROS, dan perkembangan efek ROS yang disebabkan oleh sistem antioksidan yang rendah, sehingga aktivitasnya dalam mencegah ROS menjadi kurang efektif. Dalam kondisi dimana tingkat antioksidan endogen menurun, antioksidan eksogen diperlukan untuk menghambat pembentukan ROS (Zulaikhah, 2017).

2. Klasifikasi Antioksidan

- a. Klasifikasi menurut (Silvia et al., 2016) golongan antioksidan menurut sifatnya meliputi:

1) Antioksidan Enzimatis

Antioksidan enzimatis adalah sistem pertahanan utama pada kondisi stres oksidatif. Enzim-enzim tersebut merupakan metaloenzim dan aktivitasnya sangat bergantung pada keberadaan ion logam untuk mencegah pembentukan senyawa radikal bebas baru. Contoh enzim antioksidan seperti *glutathione reductase* (GR), *catalase*, *glutathione peroxidase* (GPx), *superoxide dismutase* (SOD).

2) Antioksidan Non-Enzimatis

Antioksidan non enzimatis bisa diperoleh dari bahan makanan. Antioksidan non-enzimatis dibagi menjadi dua kategori yaitu antioksidan metabolik, contohnya *uric acid*, *lipoic acid*, bilirubin, albumin, melatonin, tranferrin *L-arginine*, *reduced glutathione* (GSH). Antioksidan nutrisi, contohnya vitamin C, vitamin E, karotenoid, flavonoid, selenium, mangan, zink, omega-3, dan lain-lain.

b. Klasifikasi antioksidan berdasarkan sumbernya

Antioksidan berdasarkan sumber dapat diperoleh dari bahan sintetis dan alami. Contoh antioksidan sintetis adalah *Butil Hidroksil Toluena* (BHT) dan *Butil Hidroksil Anisol* (BHA). Contoh antioksidan alami adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B2. Namun, penggunaan antioksidan sintetis dikhawatirkan dapat bersifat karsinogenik dan toksik dalam dosis yang tinggi. Hal ini yang membuat antioksidan alami mulai banyak digunakan karena dengan tujuan dapat digunakan sebagai pengobatan preventif (Berawi et al., 2018).

3. Mekanisme Antioksidan

Antioksidan berdasarkan fungsi dan mekanisme kerjanya dibagi menjadi antioksidan primer, sekunder dan tersier (Berawi et al., 2018).

a. Antioksidan primer bekerja dengan memutus reaksi berantai (chain-breaking antioxidant) yang bisa bereaksi dengan radikal-radikal lipid dan mengubahnya

menjadi produk-produk yang lebih stabil Contoh antioksidan primer adalah *Superoksida Dismutase (SOD)*, *Glutation Peroksidase (GPx)*, *catalase* dan protein pengikat logam. *Superoksida Dismutase (SOD)*.


- b. Antioksidan sekunder bekerja dengan cara mengikat ion-ion logam, menangkap radikal, penangkap oksigen, pengurai hidroperoksida menjadi senyawa non radikal, penyerap radiasi UV dan mencegah terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin c, isoflavon, bilirubin dan albumin
- c. Antioksidan tersier bekerja dengan memperbaiki kerusakan biomolekul yang disebabkan radikal bebas. Contoh antioksidan tersier adalah enzim-enzim yang memperbaiki DNA dan metionin sulfida reduktase.

F. Metode penentuan kapasitas antioksidan

Metode kuantitatif dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas antioksidan. Spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan untuk uji kuantitatif. Kapasitas antioksidan dalam tumbuhan dapat diuji dengan menggunakan beberapa metode pengujian, pengujian kapasitas antioksidan dikelaskan berdasarkan mekanisme kerjanya (reaksi kimianya) yaitu berbasis transfer elektron (*Elektron Transfer Based*) dan berbasis transfer atom hidrogen (*Hidrogen Atom Transfer Based*). Metode berbasis HAT mengukur aktivitas antioksidan dalam menjebak radikal bebas dengan donasi atom hidrogen, diantaranya yaitu ORAC, TRAP, β -*Caroten bleaching assay* dan lain sebagainya. Sedangkan metode berbasis ET mengukur kemampuan reduktif antioksidan terhadap radikal bebas dengan mengadakan transfer elektron, yang termasuk metode ini diantaranya FRAP, CUPRAC, FIC, DMPD dan sebagainya. Adapun DPPH, dan ABTS merupakan metode yang dianggap menggunakan kedua basis (HAT atau ET) (Aryanti et al., 2021). Berikut ini adalah beberapa metode untuk mengukur kapasitas antioksidan.

1. CUPRAC (*Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity*)


Tes CUPRAC telah diterapkan pada berbagai matriks yang mengandung antioksidan lipofilik dan hidrofilik. Prinsip metode CUPRAC yaitu berdasarkan reaksi reduksi-oksidasinya sederhana antara antioksidan dengan radikal bebas, yang dapat diukur melalui reduksi ion cupric (Cu^{2+}) menjadi cuprous (Cu^+) dengan cara donor elektron oleh antioksidan (Dontha, 2016). Metode ini menggunakan pereaksi Cu(II) neocuproin ($\text{Cu}^{2+}(\text{Nc})^2$) sebagai oksidator/agen pengkhelat. Hasil reaksi reduksi ion Cu^{2+} dapat diukur pada panjang gelombang 448 nm (Aryanti et al., 2021; Doloking et al., 2022).



Gambar 4. Mekanisme Reaksi Uji CUPRAC (Doloking et al., 2022)

2. FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*)


Prinsip penetapan aktivitas antioksidan dengan metode FRAP yaitu kemampuan antioksidan dalam mereduksi kompleks ferri (Fe^{3+}) dari *ferritripyridyl-triazine* (TPTZ) menjadi kompleks ferro (Fe^{2+}) yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru dan dapat diukur pada panjang gelombang 593 nm. Metode FRAP menggunakan senyawa antioksidan sebagai agen pereduksi (reduktan) dalam reaksi reduksi-oksidasinya (Choirunnisa et al., 2016). Mekanisme kerja metode FRAP yaitu dengan cara menginaktivasi radikal bebas dengan transfer elektron (Aryanti et al., 2021; Doloking et al., 2022).



Gambar 5. Mekanisme Reaksi Uji FRAP (Doloking et al., 2022)

3. DPPH (2,2-di(4-tert-oktilfenil)-1-pikrilhidrazil)

Uji DPPH merupakan penetralan yang bergantung pada antioksidan dalam untuk mendonorkan elektron guna menetralkan radikal DPPH. Prinsip kerja dari metode DPPH yaitu reaksi oksidasi-reduksi (Purwanti, 2019). DPPH akan beraksi dengan mengambil atom hidrogen dari senyawa antioksidan untuk mendapatkan pasangan elektron (Aryanti et al., 2021). Dengan menggunakan metode netralisasi DPPH, aktivitas antioksidan sering dilaporkan sebagai IC_{50} , yang merupakan konsentrasi efektif antioksidan yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi DPPH asli sebesar 50% (Doloking et al., 2022; Munteanu & Apetrei, 2021).



Gambar 6. Mekanisme Reaksi Uji DPPH (Doloking et al., 2022)

Tabel 1. beberapa metode untuk mengukur kapasitas antioksidan (Munteanu & Apetrei, 2021).

Teknik	Uji Kapasitas Antioksidan	Prinsip Metode	Penentuan Produk Akhir
Spektrometri	FRAP	Reaksi antioksidan dengan kompleks Fe(III)	Kolorimetri
	CUPRAC	Reduksi Cu(II) menjadi Cu(I) oleh antioksidan	Kolorimetri
	DPPH	Reaksi antioksidan dengan radikal organik	Kolorimetri

G. Ekstraksi Senyawa

Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen-komponen yang terpisah (A. Kurniawati, 2019). Faktor yang berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yaitu waktu ekstraksi dan cara ekstraksi yang digunakan (Silvia et al., 2016). Ekstraksi merupakan langkah pertama untuk memisahkan produk alami yang diinginkan dari bahan baku. Ekstraksi produk alami berlangsung melalui tahapan yaitu, pelarut menembus ke dalam matriks padat, zat terlarut larut dalam pelarut, zat terlarut terdifusi keluar dari matriks padat, zat terlarut yang diekstraksi dikumpulkan. Setiap faktor yang meningkatkan difusivitas dan kelarutan dalam langkah-langkah tersebut akan memudahkan ekstraksi. Sifat-sifat pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan baku, ransum pelarut-kepadat, suhu ekstraksi dan durasi ekstraksi juga akan mempengaruhi efisiensi ekstraksi (Zhang et al., 2018).

Secara umum, senyawa aktif yang terkandung dalam bahan alam dapat dikelompokkan menjadi dua yakni minyak atsiri dan non minyak atsiri (contohnya flavonoid). Tiap kelompok senyawa memiliki perbedaan struktur kimia yang mengakibatkan perbedaan dalam sifat masing-masing senyawa seperti stabilitas terhadap udara, cahaya, pemanasan serta, kelarutannya. Senyawa flavonoid bersifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar. Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada

kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip *like dissolve like* yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. Pelarut yang bersifat polar diantaranya adalah etanol, metanol, aseton dan air (Kemit et al., 2016).

Flavonoid dapat diekstraksi dengan metode konvensional dan modern, dengan pelarut yang paling umum adalah etanol, metanol, campuran etanol-air, dan kombinasi metanol-air. Teknik ekstraksi konvensional adalah maserasi, perkolasi, refluks, dan refluks kontinyu (Doloking et al., 2022). Pada penelitian ini metode ekstraksi yang digunakan adalah maserasi. Maserasi adalah metode ekstraksi bahan aktif dengan cara perendaman selama 3 x 9 hari, dimana setiap tiga hari sekali dilakukan penggantian pelarut dengan pengadukan sesekali. Keuntungan metode ini adalah proses pengerjaan dan peralatannya mudah digunakan, sedangkan kelemahannya adalah proses pengerjaannya cukup lama, serta membutuhkan banyak pelarut (Prawirodiharjo, 2014).

Pada ekstraksi maserasi juga sampel dan pelarut tidak mengalami proses pemanasan sehingga dapat digunakan pada senyawa yang tidak tahan panas (Hikmawanti et al., 2021). Senyawa flavonoid adalah golongan senyawa yang tidak tahan panas dan mudah teroksidasi pada suhu tinggi (Setiani et al., 2017). Komponen bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan fenol rusak pada suhu di atas 50°C karena dapat mengalami perubahan struktur serta menghasilkan ekstrak yang rendah (Yuliantari et al., 2017).

H. Spektrofotometri UV-Vis

Beberapa metode telah digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dari ekstrak tumbuhan obat. Mencakup deteksi gugus fungsi, keberadaan beberapa ikatan dan cincin, pengaturan hidrogen dan karbon serta penjelasan struktural penuh. Teknik tersebut antara lain spektroskopi massa (MS), spektroskopi


ultraviolet (UV), spektroskopi resonansi magnetik nuklir (NMR), dan spektroskopi inframerah (IR) (Rabiu, dkk., 2020). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Spektrofotometri UV-Vis.

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan dalam mengukur energi secara relatif apakah energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, serta diemisikan sebagai fungsi spektrum pada panjang gelombang tertentu, dan fotometer adalah perangkat yang mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang di serap (Khopkar, 2008: 184). Instrumen spektrofotometer UV-Vis dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, mempunyai ketelitian tinggi dengan kesalahan relatif sebesar 1-3%, analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detector dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan (S. A. A. Rohmah et al., 2021).

Kelebihan spektrofotometer dibandingkan fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih selektif dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating ataupun celah optis. Spektrofotometer juga tersusun atas sumber spektrum yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan ampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur suatu perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding (Khopkar, 2008).

Prinsip dari spektroskopi UV-Vis ialah radiasi pada rentang panjang gelombang 200-700 nm dilewatkan melalui suatu larutan senyawa. Elektron-elektron pada ikatan di dalam molekul menjadi tereksitasi sehingga menempati keadaan kuantum yang lebih tinggi dan dalam proses menyerap sejumlah energi yang melewati larutan tersebut. Semakin longgar elektron tersebut ditahan

didalam ikatan molekul, semakin panjang gelombang (energi lebih rendah) radiasi yang diserap (Watson, 2013).



Gambar 7. Skema Alat Spektrofotometer UV-Vis

Berikut merupakan fungsi masing-masing bagian (Gandjar & Rohman, 2007)

1. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang.
2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Pada gambar di atas disebut sebagai pendispersi atau penyebar cahaya. dengan adanya pendispersi hanya satu jenis cahaya atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel sampel. Pada gambar di atas hanya cahaya hijau yang melewati pintu keluar. Proses dispersi atau penyebaran VIS menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas.
3. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik.
4. Read out merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik yang berasal dari detector.

Beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar sumber cahaya pada spektrofotometer UV-Vis dianggap ideal, termasuk intensitas cahaya yang kuat dan konstan pada semua panjang gelombang, mampu mencakup rentang pengukuran pada wilayah UV-Vis, intensitas sumber cahaya mampu tetap tidak berubah pada panjang gelombang yang berbeda, dan intensitas sumber cahaya yang tidak berubah dalam jangka waktu pendek dan panjang.

Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya yang hamburkan diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum Lambert-Beer atau Hukum Beer, berbunyi “Jumlah radiasi cahaya tampak (ultraviolet, inframerah dan sebagainya) yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan” (Putri, 2017). Berdasarkan hukum Lambert-Beer, rumus yang dapat digunakan untuk menghitung banyaknya cahaya yang dihamburkan :

$$T = \frac{I_t}{I_o} \text{ atau } \%T = \frac{I_t}{I_o} \times 100\%$$

Dan absorbansi dinyatakan dengan rumus :

$$A = -\log T = -\log \frac{I_t}{I_o}$$

Dimana I_o merupakan intensitas cahaya datang I_t atau I_1 adalah intensitas cahaya setelah melewati sampel. Rumus yang diturunkan dari Hukum Beer dapat ditulis sebagai berikut :

$$A = a \cdot b \cdot c \text{ atau } A = \varepsilon \cdot b \cdot c$$

Dimana :

A = absorbansi

b = tebal larutan (tebal kuvet diperhitungkan juga umumnya 1 cm)


c = konsentrasi larutan yang diukur

ε = tetapan absorptivitas molar (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam molar)

a = tetapan absorptivitas (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm
(Gandjar & Rohman, 2007).



1. Kerangka Konsep



J. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman

Allah SWT. menciptakan seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu ciptaannya adalah makhluk hidup seperti tumbuhan yang memiliki banyak manfaat. Berbagai macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat yang merupakan anugerah, Inilah yang harus manusia pahami dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya QS Taha/20 : 53 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahan:

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan” (Kemenag, 2019).

Menurut tafsir Al-Jalalain dari ayat di atas yaitu, Dia (yang menjadikan untukmu) tempat berpijak di antara makhluk-Nya yang banyak (bumi sebagai hamparan yang luas), dan Dia (yang memudahkan) menjadikan (bagimu di bumi jalan) mudah tempat untuk berjalan-jalan (dan Dia menurunkan hujan dari langit). Kepada Nabi Musa, Allah berfirman apa yang telah Dia sebutkan sebagai nikmat dari-Nya dan khithab bagi penduduk Mekah. (Oleh karena itu, Kami turunkan air hujan dengan berbagai jenis tanaman). Lafal (شَتَّى) ini menjadi kata sifat dari pada lafal (أَزْوَاجًا), maksudnya, yang berbeda-beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Lafal (شَتَّى) ini adalah bentuk jamak dari lafal Syatiitun, wazannya sama dengan lafal Mardhaa sebagai jamak dari lafal Mariidhun. Ia berasal dari kata kerja شَتَّى artinya Tafarraqa atau berbeda-beda (Al-Mahalli, Jalaluddin, & As-suyuti, 2008).

Al-Qur’an juga secara jelas menyebutkan nama-nama tanaman dan buah-buahan. Salah satu tumbuhan yang disebut memiliki kegunaan dalam berbagai

bentuk pengolahan, baik itu dikonsumsi sebagai minuman ataupun makanan yakni jahe. Seperti yang diketahui bahwa jahe memiliki berbagai varian yang semuanya bermanfaat. Jahe liar atau disebut juga lempuyang gajah, khususnya pada bagian rimpang sering digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional dalam mengobati penyakit seperti demam. Jahe disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 17 yaitu:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahan:

“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe”
(Kementrian Agama RI, 2019).

Menurut tafsir Al-Misbah dari ayat tersebut kadar dan jenis suguhan itu telah mereka yakni para pelayan itu ukur dengan sebaik-baiknya sesuai dengan selera dan kadar yang diinginkan oleh yang disuguhi. Mereka disuguhi disana segelas minuman yang campurannya adalah jahe tapi bukan seperti jahe duniawi, jahe itu dari sebuah mata air surga yang dinamai atau ciri dan sifatnya adalah salsabil (Shihab, 2006).

Dari beberapa jenis jahe-jahean, masing-masing memiliki manfaat yang sebagian besar telah digunakan dalam pengobatan. Seiring perkembangan zaman, pengetahuan manusia akan manfaat dan kegunaan dari tanaman terus berkembang sehingga banyak penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kembali tumbuh-tumbuhan yang ada, berlandaskan catatan-catatan sejarah dan kitab suci umat manusia yaitu Al-Qur'an. Allah SWT. telah menunjukkan seberapa hebat ciptaannya yang mengisyaratkan manusia untuk senantiasa berusaha mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis muslim No.4084 :

ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Terjemahan :

“Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla." (Hadis Muslim No.4084)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. Memberikan suatu penyakit pasti memiliki penawar (obat). Setiap sembuhnya seseorang dari suatu penyakit pada dasarnya Allah SWT yang menyembuhkan, Allah SWT menghendaki agar kiranya umatnya mempelajari pengobatan sesuai ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati, serta untuk setiap penyakit tersebut dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar dapat diketahui efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan bumi beserta isinya mempunyai manfaat, salah satunya tumbuh-tumbuhan. Salah satu pemanfaatan tumbuhan yaitu mengembangkannya menjadi sebuah obat. Pengujian obat bertujuan untuk mencari solusi terhadap berbagai penyakit yang diderita umat manusia. Dengan demikian, pengujian obat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. demi tercapainya maksud dari pengobatan yang diperintahkan (Fahmi, 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui kadar total senyawa fenolik, flavonoid dan kapasitas senyawa aktif antioksidan pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental laboratorium yang merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat suatu variabel, berupa pengujian fenolik dan flavonoid total serta kapasitas antioksidan ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) dengan pelarut etanol 70% menggunakan spektrofotometri UV-Vis.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan, Di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan Laboratorium Riset Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai April hingga Juni 2023.

D. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) yang merupakan bagian rimpang diperoleh menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 70%.

E. Alat dan Bahan

1. Alat

Adapun alat yang digunakan ialah oven, seperangkat alat maserasi, spektrofotometri UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis), timbangan analitik (AND GR-200), vakum rotary evaporator (Heidolph), vortex mixer (GEMMY VM-300), dan waterbath (MEMMERT)

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan yaitu air suling, aluminium klorida (AlCl_3), asam galat, simplisia rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.), besi (III) klorida (FeCl_3), etanol 70% (onemed), *folin-ciocalteu* (Merck), kuersetin, natrium asetat, natrium karbonat, trolox, *neocuproine* (Sigma aldrich), Tembaga (II) klorida (CuCl_2), kertas saring, metanol, *1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl* (DPPH), *2,4,6-Tri-(2-Pyridyl)-5-Triazine* (TPTZ) (Sigma).

F. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Sampel

Simplisia rimpang lempuyang gajah yang telah melalui proses pengeringan kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan etanol 70% hingga simplisia terendam secara keseluruhan dan ditutup rapat. Diamkan selama 3×24 jam dengan terlindung cahaya. Kemudian disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya. Lalu ampasnya ditambahkan kembali etanol 70%. Selanjutnya ampasnya dimaserasi kembali dengan menggunakan pelarut etanol 70% hingga simplisia terendam secara keseluruhan. Hal ini dilakukan selama sembilan hari berturut-turut. Filtrat yang dihasilkan diubah menjadi ekstrak kental dengan cara diuapkan dalam rotary evaporator pada suhu $45-50^\circ\text{C}$. Setelah itu, ekstrak yang dihasilkan dihitung % rendemen ekstraknya.

$$\% \text{ rendement ekstrak} = \frac{\text{bobot ekstrak}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\%$$

2. Penetapan kadar fenolik total (Celep et al., 2015)

a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Maks) Asam Galat

Penentuan panjang gelombang maksimum asam galat dilakukan melalui *scanning* larutan asam galat pada range panjang gelombang UV-Vis 400-800 nm. Dari hasil *scanning* asam galat yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 764 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L).

b. Pembuatan Kurva Standar Asam Galat

Asam galat 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan dengan etanol 70% sebanyak 25,0 mL (500 ppm). Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 25 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,5 mL, 35 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,7 mL, 45 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,9 mL, 55 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,1 mL, dan 65 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,3 mL dan dicukupkan hingga 10 mL dengan etanol 70%. Dari larutan tersebut dipipet 0,5 mL, selanjutnya ditambahkan *Follin-Ciocalteu* 7,5% sebanyak 5 mL selanjutnya ditambahkan 4 mL pereaksi natrium karbonat (Na_2CO_3) 1M. Diamkan kembali selama 15 menit kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 764 nm

c. Penetapan Kadar Fenolik Total Dalam Sampel

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 0,5 mL larutan Selanjutnya ditambahkan 5 mL reagen *Follin-Ciocalteu* dan 4 mL pereaksi natrium karbonat (Na_2CO_3) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengukuran larutan pembanding. Terakhir didiamkan kembali selama 15 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang

gelombang 764 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali cuplik, kemudian kandungan flavonoid dalam ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen asam galat (mgGAE/g Ekstrak).

3. Penetapan Kadar Flavonoid Total (Celep et al., 2015; Haeria et al., 2018)

a. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Max) Kuarsetin

Penentuan panjang gelombang maksimum kuarsetin dilakukan dengan *scanning* larutan kuarsetin pada rentang panjang gelombang UV-Vis 400 hingga 600 nm. Dari hasil *scanning* yang dilakukan didapatkan panjang gelombang maksimum yaitu 424 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur absorbansi dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L).

b. Pembuatan Kurva Standar Kuarsetin

Kuarsetin 12,5 mg dimasukkan ke dalam labu tentukur dan dicukupkan dengan etanol 70% sebanyak 25,0 mL (500 ppm). Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 10 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,2 mL, 20 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,4 mL, 30 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,6 mL, 40 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 0,8 mL dan 50 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1 mL dan dicukupkan dengan 10 mL etanol 70%. Kemudian sebanyak 2,8 mL akuadest ditambahkan 1,5 mL metanol, 0,1 mL AlCl_3 10%, 0,1 mL natrium asetat 1M kemudian ditambahkan 0,5 mL dari masing-masing seri konsentrasi. Terakhir didiamkan kembali selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 424 nm.

c. Penetapan Kadar Flavonoid Total Dalam Sampel

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Sebanyak 2,8 mL akuadest ditambahkan 1,5 mL methanol, 0,1 mL AlCl_3 10%, 0,1 mL natrium asetat 1M kemudian

ditambahkan 0,5 mL ekstrak. Terakhir, didiamkan selama 30 menit kemudian diukur absorbansinya dengan spektrofotometri UV-Vis di panjang gelombang 424 nm dan dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali, kemudian kandungan flavonoid dalam ekstrak dinyatakan dalam ekuivalen kuarsetin (mgQE/g Ekstrak).

4. Uji kapasitas antioksidan

a. DPPH (Haeria et al., 2018)

1) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Max)

Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan melalui scanning larutan trolox pada range panjang gelombang 400-600 nm. Dari hasil running kuarsetin yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 514 nm dan data tersebut digunakan untuk mengukur serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L).

3) Pembuatan Kurva Baku Trolox

Trolox 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm) dan dibuat seri konsentrasi dengan cara mencampur secara berturut-turut 5 μ g/mL dipipet 0,5 mL, 7 μ g/mL dipipet 0,7 mL, 9 μ g/mL dipipet 0,9 mL, 11 μ g/mL dipipet 1,1 mL, dan 13 μ L dipipet 1,3 mL dan dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a. Dari masing-masing konstrasi larutan trolox dipipet 1 mL dan ditambahkan 1 mL DPPH. Kemudian didiamkan selama 30 menit diruangan yang tertutup dan gelap, lalu absorbansinya diukur pada spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 514 nm.

2) Pengujian kapasitas antioksidan sampel

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm. Dari larutan tersebut dipipet 1

mL ditambahkan 1 mL DPPH. Kemudian dilakukan pengukuran seperti pengujian aktivitas antioksidan troloks sebanyak 3 kali replikasi.

b. CUPRAC (Haeria et al., 2018)

1) Penentuan panjang gelombang maksimum (λ Max)

Pengujian dilakukan melalui scanning larutan trolox, selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 400-600 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 453 nm.

2) Pengujian antioksidan troloks

Trolox 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm), lalu dibuat dalam beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 10 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1 mL, 20 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 2 mL, 30 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 3 mL, 40 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 4 mL, dan 50 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 5 mL dan dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a. Dibuat larutan dalam vial yaitu dipipet 1 mL $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,01 M, 1 mL Neokuproin 0,0075 M, 1 mL Buffer amonium asetat 1 M kemudian ditambahkan 1 mL dari masing-masing konsentrasi trolox dan 0,1 mL aquadest. Terakhir, didiamkan selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 453 nm.

3) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm dibuat larutannya dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengujian antioksidan troloks. Terakhir, absorbansinya diamati menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 453 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi.

c. FRAP (Haeria et al., 2018)

1) Penentuan Panjang Gelombang Maksimum (λ Maks)

Pengujian dilakukan melalui scanning larutan trolox, selanjutnya diukur serapannya pada panjang gelombang 400-600 nm menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Dari hasil running yang dilakukan didapatkan nilai panjang gelombang maksimum yaitu 595 nm.

2) Pengujian antioksidan troloks

Troloks 2,5 mg dilarutkan dalam 50 mL etanol p.a (50 ppm), lalu dibuat dalam beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut 12 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,2 mL, 14 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,4 mL, 16 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,6 mL, 18 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 1,8 mL, dan 20 $\mu\text{g/mL}$ dipipet 2 mL dan dicukupkan dengan 5 mL etanol p.a. Dipipet 1 mL dari reagen FRAP ke vial kemudian ditambahkan 1 mL trolox dari masing-masing konsentrasi. Terakhir, didiamkan selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 595 nm.

3) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP

Ekstrak sampel ditimbang sebanyak 10 mg, dilarutkan dalam 10 mL etanol p.a. menghasilkan konsentrasi 1000 ppm, dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengujian antioksidan Troloks. Terakhir, di diamkan selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 595 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif, dimana hasil pengukuran larutan baku diplotkan antara kadar dan absorbansinya,

sehingga diperoleh persamaan regresi linear

$$y = bx + a$$

Dimana :

y = absorbansi

x = konsentrasi (C) mg/L

b = slop (kemiringan)

a = intersep

Hasil uji yang diperoleh dari rumus perhitungan kadar dibawah dapat dinyatakan sebagai mg/g ekuivalen kuarsetin/asam galat.

$$\text{Total Fenolik/Flavonoid} = \frac{V_{\text{Contoh}} (L) \times \text{Konsentrasi awal } (x) \times FP}{\text{bobot ekstrak}}$$

$$\text{Kapasitas antioksidan} = \frac{V_{\text{Sampel}} \times (\text{sampel}) \times FP}{\text{bobot ekstrak } (g)}$$

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)

Sampel	Berat Sampel (g)	Volume Pelarut etanol 70 % (L)	Berat Ekstrak (g)	% Rendemen
Rimpang Lempuyang Gajah <i>Zingiber zerumbet</i> (L.)	500	4	18,88	3,776

2. Penetapan Kadar Fenolik Total

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kadar Fenolik (mg GAE/g ekstrak)
I	10,01	0,3145	51,77
II	10,02	0,3214	52,91
III	10,04	0,3334	54,86
Rata-rata			53,18

3. Penetapan Kadar Flavonoid Total

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kadar Flavonoid (mg QE/g ekstrak)
I	10,02	0,2119	16,87
II	10,00	0,1937	15,17
III	10,03	0,2376	19,29
Rata-rata			17,11

4. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kapasitas Antioksidan (mg Tr/g ekstrak)
I	10,06	0,4226	11,39
II	10,05	0,4397	11,20
III	10,02	0,4565	11,23
Rata-rata			11,27

5. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kapasitas Antioksidan (mg Tr/g ekstrak)
I	10,05	1,2367	58,90
II	10,06	1,2686	59,91
III	10,02	1,1486	56,16
Rata-rata			58,32

6. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP

Replikasi	Berat Sampel (g)	Absorbansi	Kapasitas Antioksidan (mg Tr/g ekstrak)
I	10,02	1,2778	6,34
II	10,01	1,3209	6,78
III	10,05	1,3450	6,72
Rata-rata			6,61

B. Pembahasan

Senyawa yang reaktif dan memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluarnya disebut radikal bebas. Radikal bebas dapat dihasilkan dari dalam tubuh (*endogen*) dan luar tubuh (*eksogen*). Dalam jumlah sedang, radikal bebas sangat membantu kesehatan, sedangkan dalam jumlah berlebih dapat menyebabkan stres oksidatif. Maka antioksidan diperlukan dalam tubuh untuk mencegah atau menunda peristiwa oksidasi yang dibawa oleh radikal bebas. Oksidasi substrat tertentu dapat sangat diperlambat atau dicegah dengan antioksidan. Akibatnya, tubuh membutuhkan zat antioksidan untuk menghentikan radikal bebas (Kiromah et al., 2021).

Pada penelitian ini, menggunakan sampel simplisia rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) didapatkan dari *supplier* resmi, yang secara empiris telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah dipastikan memiliki komponen antioksidan. Untuk mengetahui nilai kapasitas antioksidan, dilakukan penelitian

dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis metode FRAP, CUPRAC dan DPPH.

Metode ekstraksi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode maserasi. Metode maserasi termasuk metode sederhana dan cepat serta sudah dapat menyari zat aktif sampel dengan maksimal serta tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak menjadi terurai, dimana ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi karena tidak melalui proses pemanasan untuk menghindari kerusakan kandungan yang bersifat termolabil (A. D. Puspitasari & Lean Syam Proyogo, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses maserasi antara lain waktu, suhu, jenis pelarut, ukuran cacahan bahan, perbandingan bahan dan pelarut. Pada tahap maserasi digunakan 500 gram sampel yang disari menggunakan pelarut etanol 70% dilakukan tiga tahap (3×24 jam) karena semakin lama waktu maserasi yang diberikan maka semakin lama kontak antara pelarut dan sampel yang akan memperbanyak jumlah sel yang pecah dan zat aktif yang terlarut (Brian Witanto & Wahyuningtyas, 2022).


Pemilihan pelarut yang tepat dapat meningkatkan efisiensi ekstraksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pelarut diantaranya adalah selektivitas, toksisitas, kepolaran, kemudahan untuk diuapkan, dan harga (Putri, W. S., Warditiani, N. K., Larasanty, L. P. F). Pelarut Etanol 70% adalah penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun nonpolar dan memiliki beberapa keunggulan yaitu tidak beracun, netral, daya serap yang baik, larut dengan air dalam segala perbandingan, meningkatkan stabilitas larutan bahan obat herbal, dan tidak memerlukan suhu tinggi untuk pemekatan, penggunaan etanol biasanya dicampur dengan pelarut lain, terutama dengan air (Sultriana, 2021).

Rendemen ekstrak dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (berat

ekstrak yang dihasilkan) dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) dikalikan 100% (Dewatisari et al., 2018). Adapun hasil rendamen dari ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah yaitu 18,88 gram dengan % rendamen sebanyak 3,776 %.

Pada tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan menunjukkan adanya beberapa senyawa seperti fenolik dan flavonoid memiliki potensi besar dalam menyembuhkan penyakit, karena adanya struktur cincin terkonjugasi dan gugus hidroksil, banyak senyawa fenolik berpotensi berfungsi sebagai antioksidan dengan pemulungan anion superoksida, oksigen singlet, dan radikal peroksi lipid, dan menstabilkan radikal bebas yang terlibat dalam proses oksidatif melalui hidrogenasi atau kompleks dengan spesies pengoksidasi (Asih et al., 2022). Sehingga dilakukan pengujian kandungan fenolik dan flavonoid total.

Penetapan kadar fenolik total dilakukan untuk mengetahui kandungan fenolik total yang ada pada sampel dan untuk mengetahui kemampuan dari sampel terhadap antioksidan yang jumlahnya seringkali tidak cukup untuk menetralkan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Pengujian ini dilakukan dengan metode *Folin-Ciocalteu* yang terjadi reaksi reduksi oksidasi. Pengukuran ini didasarkan pada pembentukan kompleks molibdenum-tungsten yang terbentuk akibat reduksi *fosfomolibdat-fosfotungstat* yang terkandung dalam reagen *Folin-ciocalteu* oleh senyawa fenolik yang terdapat dalam sampel (Avigail et al., 2019). Metode *Folin-Ciocalteu* merupakan metode yang sederhana, sensitif, dan teliti. Metode ini terjadi dalam suasana basa sehingga dalam penentuan kadar fenolik dengan pereaksi *Folin-Ciocalte* digunakan natrium karbonat yang bertujuan untuk membentuk suasana basa, dimana kompleks *fosfomolibdat fosfotungstat*, yang berwarna biru dalam kondisi basa, direduksi oleh senyawa fenolik (Celep et al., 2012).




Gambar 8. Reaksi reduksi *fosfotungstat-fosfomolibdenum* oleh senyawa fenol (Azlim Almeiy *et al.*, 2010)

Penggunaan asam galat sebagai standar, merupakan senyawa fenol sederhana turunan hidrobenzoat, memiliki sifat murni dan stabil sehingga dapat digunakan sebagai larutan pembanding (Wismayani *et al.*, 2022). Pada penentuan fenolik total langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum tersebut yang digunakan untuk mengukur serapan dari sampel ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L). Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan untuk mengetahui λ yang memiliki serapan tertinggi. Pengukuran sampel harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum agar kepekaannya lebih maksimal dan meminimalkan kesalahan gelombang tersebut, perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar. Pada daerah sekitar panjang gelombang maksimum, bentuk kurva absorbansi datar dan pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer terpenuhi (Winahyu & , Agustina Retnaningsih, 2019).

Hasil penelitian ini diperoleh kadar fenolik total ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumber* (L) memiliki kadar yaitu sebesar 53,18 mg GAE/g ekstrak. Semakin tinggi kandungan fenol dalam ekstrak semakin tinggi pula aktivitas antioksidan (Avigail *et al.*, 2019). Prinsip dari pengujian penentuan kadar flavanoid menggunakan prinsip kolorimetri, dimana menggunakan pereaksi AlCl₃ yaitu adanya pembentukan kompleks aluminium klorida dengan gugus keto pada atom C-4 dan gugus hidroksi pada atom C-3 atau

C-5 yang bertetangga dari golongan flavon dan flavonol (Riwanti, Izazih, & Amaliyah, 2020). Penentuan kadar flavonoid total pada sampel digunakan kuarsetin sebagai larutan standar. Kuarsetin digunakan sebagai standar, karena kuarsetin merupakan flavonoid golongan flavonol yang memiliki gugus keto pada atom C-4 dan juga gugus hidroksil pada atom C-3 dan C-5 yang bertetangga sehingga dapat membentuk kompleks warna dengan AlCl_3 (Azizah, Kumolowati, & Faramayuda, 2014).



Gambar 9. Reaksi pembentukan kompleks Flavonoid- AlCl_3 (Haeria *et al.*, 2016)

Hasil penelitian ini diperoleh kadar flavonoid total ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) sebesar 17,11 mg QE/g Ekstrak. Hasil pengujian kadar fenolik dan flavonoid total menunjukkan nilai kadar total fenol lebih tinggi dibandingkan dengan total flavonoid karena besarnya kadar fenol dalam ekstrak tidak semuanya merupakan senyawa flavonoid. Senyawa polifenol merupakan metabolit terbesar dalam tumbuhan yang dapat berupa asam fenolat, melanin, kumarin, flavonoid, lignin dan tannin (Kemit *et al.*, 2016).

Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah yang diperoleh selanjutnya dilakukan pengujian kapasitas antioksidan yang merupakan pengujian untuk mengetahui kemampuan senyawa pada sampel yang digunakan dalam mereduksi radikal bebas yang diuji menggunakan larutan pembanding. Pengukuran kapasitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH, CUPRAC, dan FRAP yang diukur menggunakan alat spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum dari masing-masing metode yang digunakan.


Pada penelitian ini digunakan antioksidan sintetik sebagai kontrol positif

yaitu troloks. Secara stuktur troloks serupa dengan α -tokoferol kecuali penggantian rantai samping hidrokarbon dengan gugus COOH. Troloks berupa bubuk berwarna putih sampai kuning dan memiliki titik leleh 189-195 °C senyawa ini stabil selama 2 bulan pada suhu 2-8 °C dan mempunyai aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan α -tokoferol, BHA, serta BHT. Troloks juga sering dipergunakan sebagai standar dalam pengukuran antioksidan.

Pada pengujian kapasitas antioksidan dengan metode DPPH merupakan metode serapan *2,2-di(4-tert-oktilfenil)-1-pikrilhidrazil* yang sederhana, cepat, mudah dan menggunakan sampel dalam jumlah yang sedikit dengan waktu yang singkat. Selain itu, metode ini akurat dan praktis. Metode DPPH ini memberikan serapan kuat pada panjang gelombang maksimum 514 nm dengan warna violet gelap. Penangkap radikal bebas menyebabkan elektron menjadi berpasangan yang kemudian menyebabkan penghilangan warna yang sebanding dengan jumlah elektron yang diambil. Radikal bebas DPPH dapat menangkap atom hidrogen dari komponen aktif ekstrak yang dicampur kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya. Senyawa aktif di dalam ekstrak yang memiliki kemampuan penangkal radikal bebas umumnya merupakan pendonor atom hidrogen (H) yang di tangkap oleh radikal DPPH (Hidrazil) untuk berubah menjadi bentuk netralnya. Radikal bebas DPPH bersifat peka terhadap cahaya, oksigen, dan pH, tetapi bersifat stabil dalam bentuk radikal bebas sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran antioksidan.

Pengukuran kapsitas antioksidan dengan metode DPPH ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi pada penelitian ini dilakukan selama 30 menit, tujuannya untuk mempercepat reaksi antara radikal DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Perubahan warna ini terjadi pada ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) dan


trolox sebagai pembanding dimana ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) perubahan warna yang tidak signifikan setelah diinkubasi. Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) hanya mendonorkan atom H-nya dalam jumlah yang sedikit.



Gambar 10. Reaksi DPPH dengan Antioksidan (Haeria et al., 2018).

Hasil uji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH yaitu untuk replikasi 1 yaitu 11,39 mg Tr/g Ekstrak, replikasi 2 sebesar 11,20 mg Tr/g Ekstrak dan replikasi 3 yaitu 11,27 mg Tr/g Ekstrak. Sehingga hasil rata-rata untuk kapasitas antioksidan metode DPPH yaitu 11,27 mg Tr/g Ekstrak. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar kapasitas maka semakin besar kemampuan sampel sebagai antioksidan.


Pada pengujian antioksidan metode CUPRAC (*Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity*) yaitu berdasarkan pada kemampuan sampel agen antioksidan dalam mereduksi kompleks Cu^{2+} menjadi kompleks Cu^+ yang secara visual hal ini dapat dilihat dari perubahan warna kompleks larutan dari biru toska menjadi kuning. Pereaksi CUPRAC merupakan pereaksi yang selektif karena memiliki nilai potensial reduksi yang rendah, yaitu sebesar 0,17 V, yang diukur pada panjang gelombang 453 nm. Warna berasal dari terbentuknya khelat Cu(I)-Nc.



Gambar 11. Mekanisme reaksi metode CUPRAC (Haeria et al., 2018)

Pada metode CUPRAC nilai kapasitas antioksidan dari ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) untuk, replikasi 1, replikasi 2 dan replikasi 3 masing-masing hasilnya yaitu 58,90 mg Tr/g Ekstrak, 59,91 mg Tr/g Ekstrak, 56,16 mg Tr/g Ekstrak dan hasil kapasitas antioksidan untuk metode CUPRAC yaitu 58,32 mg Tr/g Ekstrak. Metode CUPRAC memiliki kemampuan beradaptasi pada berbagai matriks hidrofilik dan lipofilik sehingga hasil kapasitas antioksidan metode CUPRAC lebih tinggi dibanding metode reduksi lainnya.

Pada pengujian metode ketiga yaitu metode FRAP (ferric reducing antioxidant power). Metode FRAP dapat menentukan kandungan antioksidan total yang terdapat pada suatu bahan yang digunakan berdasarkan kemampuan senyawa antioksidan untuk mereduksi ion Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} sehingga kemampuan antioksidan suatu senyawa dapat dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut, antioksidan dalam sampel nantinya akan mereduksi Fe^{3+} menjadi Fe^{2+} dengan memberikan sebuah elektron yang ditandai dengan perubahan menjadi warna biru dengan menggunakan panjang gelombang 595 nm. Kelebihan metode FRAP ialah metodenya murah, reagenya mudah disiapkan dan cukup sederhana dan cepat. Prinsip dari uji FRAP adalah reaksi transfer elektron dari antioksidan ke senyawa Fe^{3+} - TPTZ. Senyawa Fe^{3+} - TPTZ sendiri mewakili senyawa oksidator yang mungkin terdapat dalam tubuh dan dapat merusak sel-sel (Maryam, Baits, & Nadia, 2015).



Gambar 12. Reaksi Kompleks Fe^{3+} - TPTZ Menjadi Fe^{2+} - TPTZ (Haeria et al., 2018)

Pada metode ini didapatkan nilai kapasitas antioksidan yaitu 6,61 mgTr/g Ekstrak. Yang mana diperoleh dari replikasi 1 sebesar 6,34 mg Tr/g Ekstrak, replikasi 2 sebesar 6,78 mg Tr/g Ekstrak dan replikasi 3 yaitu 6,72 mg Tr/g Ekstrak.

Dari hasil penelitian dari ketiga metode ini, Metode FRAP menunjukkan nilai kapasitas antioksidan lebih rendah dibandingkan dengan metode CUPRAC dan DPPH. Menurut Haeria et al., 2018 pengukuran antioksidan dengan metode FRAP dapat berjalan akurat apabila dilakukan pada senyawaan antioksidan yang bisa mereduksi Fe(III)TPTZ pada kondisi reaksi secara termodinamika dan memiliki laju reaksi yang cukup cepat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena nilai potensial reduksi standar dari Fe(III)/Fe(II) adalah 0.77 V sehingga senyawa apapun dengan nilai potensial reduksi dibawah 0.77 V dapat mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II) dan memberikan kontribusi pada pengukuran antioksidan dengan metode FRAP. Selain itu, tidak semua antioksidan dapat mereduksi Fe(III) dengan waktu yang sesuai dengan waktu inkubasi. Menurut Pulido et al. (2000), absorbans dari beberapa senyawaan fenol seperti asam kafeat, asam ferulat, kuersetin, dan tanin tidak stabil dalam pengukuran FRAP karena waktu inkubasi yang lebih lama dibandingkan dengan waktu inkubasi FRAP. Penyebab lainnya, senyawaan pengganggu dapat memiliki serapan absorbans maksimum pada daerah pengukuran FRAP. Hal ini berlaku untuk contoh bahan

alam yang memiliki banyak senyawa pengganggu sehingga FRAP tidak cocok untuk diaplikasikan pada contoh biologis. Al-Quran banyak menyebutkan potensi tumbuh-tumbuhan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS Asy-Syu'ara/26:7 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (Kemenag, 2019)

Penafsiran ayat tersebut menyatakan bahwa setelah mengajak manusia untuk belajar dari seluruh alam semesta, Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan mereka bahwa hanya Dia yang berhak disembah. Dan jika mereka mempraktikkan kemusyrikan, apakah mereka memperhatikan berapa banyak jenis tanaman bermanfaat yang telah dikembangkan di muka bumi ini dan seberapa banyak manfaat tumbuhan bagi manusia? Bukankah itu bukti kekuasaan Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala* dan belas kasihan-Nya yang tak berkesudahan bagi manusia? (Kemenag, 2019). Allah menciptakan segala sesuatu mempunyai tujuan adanya tumbuhan yang berwarna mengisyaratkan adanya perbedaan dari setiap tujuan penciptaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) memiliki kadar fenolik total sebesar 53,18 GAE/gEkstrak dan kadar flavonoid total sebesar 17,11 mg QE/gEkstrak. Semakin tinggi nilai total fenolik dan flavonoid, maka semakin tinggi kemampuan antioksidan mendonorkan elektronnya dalam hal menekan perkembangan radikal bebas.
2. Ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) pada metode DPPH memiliki kapasitas antioksidan sebesar 11,27 mg Tr/gEkstrak, pada metode CUPRAC sebesar 58,32 mg Tr/gEkstrak dan pada metode FRAP sebesar 6,61 mg Tr/gEkstrak. Ekstrak rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L) terhadap pembanding trolox memiliki kapasitas antioksidan tertinggi pada metode CUPRAC.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai korelasi kadar fenolik dan flavonoid total terhadap kapasitas antioksidan ekstrak etanol 70% rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L).

DAFTAR PUSTAKA

- Andarina, R., & Djauhari, T. (2017). Antioksidan Dalam Dermatologi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 4(1), 39–48.
- Arijit Chaudhuri, SC Sharma, & Foziya Khan. (2018). An Overview on the Advances of Zingiber zerumbet. *Pharmaceutical and Biosciences Journal*, 6(5), 24–27. <https://doi.org/10.20510/ukjpb/6/i5/177346>
- Arnanda, Q. P., & Nuwarda, R. F. (2019). Penggunaan Radiofarmaka Teknisium-99M Dari Senyawa Glutation dan Senyawa Flavonoid Sebagai Deteksi Dini Radikal Bebas Pemicu Kanker. *Farmaka Suplemen*, 14(1), 1–15.
- Aryanti, R., Perdana, F., & Syamsudin, R. A. M. R. (2021). Telaah Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan pada Teh Hijau (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze). *Jurnal Surya Medika*, 7(1), 15–24. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i1.2024>
- Asih, D. J., Kadek Warditiani, N., Gede, I., Wiarsana, S., & Kunci, K. (2022). HUMANTECH JURNAL ILMIAH MULTI DISIPLIN INDONESIA Review Artikel: Aktivitas Antioksidan Ekstrak Amla (*Phyllanthus emblica* / *Embllica officinalis*). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(6), 674–687.
- Avigail, Y., Yudiati, E., & Pringgenies, D. (2019). Aktivitas Antioksidan dan Kandungan Total Fenolik Pada Teripang di Perairan Karimunjawa, Jepara. *Journal of Marine Research*, 8(4), 346–354. <https://doi.org/10.14710/jmr.v8i4.24600>
- Azlim Almey, A. A., Ahmed Jalal Khan, C., Syed Zahir, I., Mustapha Suleiman, K., Aisyah, M. R., & Kamarul Rahim, K. (2010). Total phenolic content and primary antioxidant activity of methanolic and ethanolic extracts of aromatic plants' leaves. *International Food Research Journal*, 17(4), 1077–1084.
- Berawi, K. N., Marini, D., Fisiologi, B., Kedokteran, F., Lampung, U., Dokter, M. P., Kedokteran, F., & Lampung, U. (2018). *Efektivitas Kulit Batang Bakau Minyak (Rhizopora apiculata) sebagai Antioksidan The Effectiveness Rhizopora apiculata Bark as an Antioxidant*. 5, 412–417.
- Brian Witanto, S., & Wahyuningtyas, D. (2022). Pengoptimalan Ukuran Daun Muda *Strobilanthes Cusia* Sebagai Pewarna Alam Indigo Melalui Proses Maserasi. *Prosiding Snast, November*, D67-76. <https://doi.org/10.34151/prosidingsnast.v8i1.4156>
- Celep, E., Aydin, A., & Yesilada, E. (2012). A comparative study on the in vitro antioxidant potentials of three edible fruits: Cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel. *Food and Chemical Toxicology*, 50(9), 3329–3335. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2012.06.010>
- Celep, E., Charehsaz, M., Akyüz, S., Acar, E. T., & Yesilada, E. (2015). Effect of in vitro gastrointestinal digestion on the bioavailability of phenolic components and the antioxidant potentials of some Turkish fruit wines. *Food Research International*, 78, 209–215. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2015.10.009>
- Dewatisari, W. F., Rumiyan, L., & Rakhmawati, I. (2018). Rendemen dan Skrining Fitokimia pada Ekstrak Daun *Sansevieria* sp. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 17(3), 197. <https://doi.org/10.25181/jppt.v17i3.336>
- Diniyah, N., & Lee, S.-H. (2020). Komposisi Senyawa Fenol Dan Potensi Antioksidan Dari Kacang-Kacangan: Review. *Jurnal Agroteknologi*, 14(01), 91. <https://doi.org/10.19184/j-agt.v14i01.17965>
- Doloking, H., Ningsi, S., & Tahar, N. (2022). *Flavonoids: A Review on Extraction, Identification, Quantification, and Antioxidant Activity*. 5(1).
- Evizal, R. (2013). *Tanaman Rempah Dan Fitofarmaka*.


- Fahmi, M. (2021). Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alquran, Hadis dan Kaedah Fiqih. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9004>
- Gandjar, I. G., & Rohman, A. (2007). *Spektroskopi molekuler untuk analisis farmasi*.
- Ghozaly, M. R., & Safitri, E. . (2016). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak N-Heksan, Etil Asetat Dan Metanol dari Varietas Umbi Wortel (*Daucus Carota L.*) dengan Metode DPPH (1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil). *Sainstech Farma*, 9(2), 13–18.
- Hadi, I., Nurfazera, A., & Rohmatika, N. (2022). Perbandingan Kandungan Fitokimia Fraksi Etil Asetat Daun Kemangi (*Ocimum basilicum Folium*) Dengan Perbedaan Ketinggian Geografis Tumbuh. *Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi*, 7(1), 31–36.
- Haeria, Hermawati, & Dg.Pine, A. T. (2016). Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bidara (*Ziziphus spinachristi L.*) Haeria,. *Journal of Pharmaceutical and Medicinal Sciences*, 1(2), 57–61.
- Haeria, Tahar, N., & Munadiah. (2018). Penentuan Kadar Flavonoid Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (*Moringa oleifera L*) Dengan Metode DPPH, CUPRAC Dan FRAP. *Jf Fik Unam*, 6(2), 88–97.
- Hikmawanti, N. P. E., Fatmawati, S., Arifin, Z., & . V. (2021). Pengaruh Variasi Metode Ekstraksi Terhadap Perolehan Senyawa Antioksidan Pada Daun Katuk (*Sauropus androgynus (L.) Merr*). *Jurnal Farmasi Udayana*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.24843/jfu.2021.v10.i01.p01>
- Junaidi, E., & Anwar, Y. A. S. (2018). Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan Asam Galat dari Kulit Buah Lokal yang Diproduksi dengan Tanase. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 14(1), 131. <https://doi.org/10.20961/alchmy.14.1.11300.131-142>
- Kemendes RI. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018. *Kementrian Kesehatan RI*, 53(9), 1689–1699.
- Kemit, N., Widarta, I. W. R., & Nocianitri, K. A. (2016). Pengaruh Jenis Pelarut dan Waktu Maserasi Terhadap Kandungan Senyawa Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Alpukat (*Persea Americana Mill*). *Jurnal Ilmu Teknologi Pangan*, 5(2), 130–141.
- Kiromah, N. Z. W., Husein, S., & Rahayu, T. P. (2021). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Ganitri (*Elaeocarpus Ganitrus Roxb .*) dengan Metode DPPH (2 , 2 Difenil-1-Pikrilhidazil) Antioxidant Activity Test of Ganitri (*Elaeocarpus Ganitrus Roxb .*) Leaf Ethanol Extract Using the DPPH (2 , 2 Difen. *Pharmacon Jurnal Farmasi Indonesia*, 18(1), 60–67.
- Kurniawati, A. (2019). Pengaruh Jenis Pelarut Pada Proses Ekstraksi Bunga Mawar Dengan Metode Maserasi Sebagai Aroma Parfum. *Journal of Creativity Student*, 2(2), 74–83. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jcs>
- Kurniawati, I. F., & Sutoyo, S. (2021). Review Artikel: Potensi Bunga Tanaman Sukun (*Artocarpus Altilis [Park.I] Fosberg*) Sebagai Bahan Antioksidan Alami. *UNESA Journal of Chemistry*, 10(1), 1–11.
- Maesaroh, K., Kurnia, D., & Al Anshori, J. (2018). Perbandingan Metode Uji Aktivitas Antioksidan DPPH, FRAP dan FIC Terhadap Asam Askorbat, Asam Galat dan Kuersetin. *Chimica et Natura Acta*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.24198/cna.v6.n2.19049>
- Munteanu, I. G., & Apetrei, C. (2021). Analytical methods used in determining antioxidant activity: A review. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(7). <https://doi.org/10.3390/ijms22073380>
- Nirmala Sari, A. (2015). Antioksidan Alternatif Untuk Menangkal Bahaya


- Radikal Bebas Pada Kulit. *Elkawnie: Journal of Islamic Science and Technology*, 1(1), 63–68.
- Padmasari, S., Azizah, F. N., & Larasati, N. (2021). Edukasi Home Pharmacy Care terhadap Kepatuhan dan Kontrol Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Sains Farmasi & Klinis*, 8(2), 182. <https://doi.org/10.25077/jsfk.8.2.182-189.2021>
- Palupi, N. S., & Widyanto, R. (2020). Pengujian Kapasitas Antioksidan Wedang Tahu dalam Rangka Meningkatkan Mutu Fungsionalnya. *Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality*, 7(1), 46–51. <https://doi.org/10.29244/jmpi.2020.7.1.46>
- Prasonto, D., Riyanti, E., & Gartika, M. (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY TEST GARLIC EXTRACT (*Allium sativum*). *ODONTO: Dental Journal*, 4(2), 122.
- Puspitasari, A. D., & Lean Syam Proyogo. (2017). Perbandingan metode ekstraksi maserasi dan sokletasi terhadap kadar fenolik total ekstrak etanol daun kersen (*Muntingia calabura*). *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*, 1(2), 1–8.
- Puspitasari, L., Rijai, L., & Herman. (2018). Identifikasi Golongan Metabolit Sekunder dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Brotowali (*Tinospora tuberculata* Beumee). *Sainstech Farma*, 11(1), 18–24.
- Putri, Lusiana. (2017). Penentuan Konsentrasi Senyawa Berwarna KMnO₄ Dengan Metoda Spektroskopi UV Visible. *Natural Science Journal*, 3(1), 391–398.
- Rahmah, S. (2018). *UJI ANTIOKSIDAN TANAMAN KASUMBA TURATE (Cartamus tinctorius Linn.) SEBAGAI ALTERNATIF FEED ADDITIVE UNTUK UNGGAS*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Rahmi, H. (2017). Review: Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Sumber Buah-buahan di Indonesia. *Jurnal Agrotek Indonesia*, 2(1), 34–38. <https://doi.org/10.33661/jai.v2i1.721>
- Rohmah, J., Rini, C. S., Asri, N. I. N., & Krisdianti, R. (2022). Antibacterial Activity of Rhizome Extracts of Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. Against *Streptococcus pneumoniae*. *Procedia of Social Sciences and Humanities: Proceedings of the 1st SENARA 2022*, 0672(c), 1007–1016. <https://pssh.umsida.ac.id>.
- Rohmah, S. A. A., Muadifah, A., & Martha, R. D. (2021). Validasi Metode Penetapan Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada Sari Kedelai di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(2), 120–127. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i2.265>
- Rusiani, E., Junaidi, S., Subiyono, H. S., & Sumartiningsih, S. (2019). Suplementasi Vitamin C dan E untuk Menurunkan Stres Oksidatif Setelah Melakukan Aktivitas Fisik Maksimal. *Media Ilmu Keolahragaan Indonesia*, 9(2), 32–37.
- Salamah, N., Widyarningsih, W., Izati, I., & Susanti, H. (2015). Aktivitas Penangkap Radikal Bebas Ekstrak Etanol Ganggang Hijau *Spirogyra* sp. dan *Ulva lactuca* dengan Metode DPPH. *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 13(2), 145–150.
- Salim, S. A., Saputri, F. A., Saptarini, N. M., & Levita, J. (2020). Review Artikel: Kelebihan dan Keterbatasan Pereaksi Folin-ciocalteu dalam Penentuan Kadar Fenol Total Pada Tanaman. *Farmaka*, 18(1), 46–57. <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/21909/pdf>
- Setiani, L. A., Sari, B. L., Indriani, L., & Jupersio. (2017). Penentuan kadar flavonoid ekstrak etanol 70% kulit bawang merah (*Allium cepa* L.) dengan metode maserasi dan MAE (Microwave Assisted Extraction). *Ekp*, 13(3),


- 1576–1580. <https://doi.org/10.33751/jf.v7i2.772>
- Shihab, M. Q. (2006). Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14).
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 147–160.
- Silvia, D., Katharina, K., Hartono, S. A., Anastasia, V., & Susanto, Y. (2016). Pengumpulan Data Base Sumber Antioksidan Alami Alternatif Berbasis Pangan Lokal Di Indonesia. *Surya Octagon Interdisciplinary Journal of Technology*, 1(2), 181–198.
- Sopiah, B., Muliastari, H., & Yuanita, E. (2019). Skrining Fitokimia dan Potensi Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Hijau dan Daun Merah Kastuba (Phytochemical Screening and Potential Antioxidant Activity of Ethanol Extract of Green Leaves and Red Leaves Kastuba). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 17(1), 27–33.
- Sultriana, E. (2021). Analisis Nilai Absorbansi dalam Penentuan Kadar Flavonoid Hasil Ekstraksi Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L.). *Skripsi*, 1–90. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19023/%0A> http://repositori.uin-alauddin.ac.id/19023/1/ELIS_SULTRIANA-FST.pdf
- Tahir, M., Muflihunna, A., & Syafrianti, S. (2017). PENENTUAN KADAR FENOLIK TOTAL EKSTRAK ETANOL DAUN NILAM (*Pogostemon cablin* Benth.) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS. *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 4(1), 215–218. <https://doi.org/10.33096/jffi.v4i1.231>
- Wandita, G. A., & Musrifoh, I. (2018). Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan. *Farmaka*, 16(2), 564–571.
- Wardhani, R. R. A. A. K., Akhyar, O., & Prasiska, E. (2018). *Screening of Phytochemical, Antioxidant Activity and Total Phenolic-Flavonoid of Leaves and Fruit Extract of Galam Rawa Gambut (Melaleuca cajuputi ROXB)*. 9(2), 2550–0716.
- Winahyu, D. A., & Agustina Retnaningsih, M. A. (2019). *PENETAPAN KADAR FLAVONOID PADA KULIT BATANG KAYU RARU (CotylelobiummelanoxylonP) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS*. 4(1), 29–36.
- Wismayani, L., Roni, A., & Minarsih, T. (2022). Penentuan Kadar Fenolik dan Flavonoid Total Ekstrak Daun Renggak (*Amomum dealbatum* Roxb.) dari Berbagai Pelarut Secara Spektrofotometri Uv-Vis. *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 5, 142–151.
- Yanuarti, R., Nurjanah, N., Anwar, E., & Hidayat, T. (2017). Profil fenolik dan aktivitas antioksidan dari ekstrak rumput laut *Turbinaria conoides* dan *Eucheuma cottonii* (Profile of Phenolic and Antioxidants Activity from Seaweed Extract *Turbinaria conoides* and *Eucheuma cottonii*). *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia*, 20, 230–237.
- Yuliantari, N. W. A., Widarta, I. W. R., & Permana, I. D. G. M. (2017). Pengaruh Suhu dan Waktu Ekstraksi Terhadap Kandungan Flavonoid dan Aktivitas Antioksidan Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Menggunakan Ultrasonik The Influence of Time and Temperature on Flavonoid Content and Antioxidant Activity of Sirsak Leaf (*Annona mur.* *Media Ilmiah Teknologi Pangan*, 4(1), 35–42.
- Zhang, Q. W., Lin, L. G., & Ye, W. C. (2018). Techniques for extraction and isolation of natural products: A comprehensive review. *Chinese Medicine (United Kingdom)*, 13(1), 1–26. <https://doi.org/10.1186/s13020-018-0177-x>
- Zulaikhah, S. T. (2017). The Role of Antioxidant to Prevent Free Radicals in The

Body. *Sains Medika*, 8(1), 39. <https://doi.org/10.26532/sainsmed.v8i1.1012>




LAMPIRAN**Lampiran 1. Skema Kerja Ekstraksi Sampel Rimpang Lempuyang Gajah*****Zingiber zerumbet* (L)**


Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Asam Galat**Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis**

Lampiran 3. Skema Kerja Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Etanol**70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)**


Lampiran 4. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Kuarsetin


Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis





Lampiran 5. Skema Kerja Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol**70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)**

**Lampiran 6. Skema Kerja Ekstraksi Pembuatan Larutan Standar Trolox
Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode DPPH**




Lampiran 7. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak**Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)****Metode DPPH**

Lampiran 8. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Trolox**Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode FRAP**


Lampiran 9. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak**Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)****Metode FRAP**

Lampiran 10. Skema Kerja Pembuatan Larutan Standar Trolox

Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis Metode CUPRAC



**Lampiran 11. Skema Kerja Pengukuran Kapasitas Antioksidan Ekstrak
Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah *Zingiber zerumbet* (L)
Metode CUPRAC**




Lampiran 12. Grafik

A. Penentuan Kadar Fenolik

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum

Grafik 1. Panjang gelombang maksimum Asam Galat 764 nm



Sample Name: 45 ppm

Collection Time

4/27/2023 10:59:34 AM

Peak Table

Peak Style

Peak Threshold

Range

Peaks

0.0100

800.0nm to400.0nm

Wavelength (nm)

Abs

764.0


0.273

2. Kurva Baku Asam Galat

Tabel 1. Data Absorbansi Kurva Baku Asam Galat

Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
25	0,1583
35	0,2177
45	0,2705
55	0,3251
65	0,3923


Grafik. 2 Kurva Baku Asam Galat



B. Penentuan Kadar Flavonoid

1. Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum

Grafik 3. Panjang gelombang maksimum Kuarsetin 424 nm



Sample Name: 20 ppm

Collection Time

5/8/2023 11:55:34 AM

Peak Style

Peaks

Peak Threshold

0.0100

Range

600.0nm to 400.0nm


Wavelength (nm)	Abs
424.1	0.256

2. Kurva baku Kuarsetin

Tabel 2. Data Absorbansi Kuarsetin

Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
10	0,1451
15	0,1854
20	0,2395
25	0,3014
30	0,3492

Grafik 4. Kurva Baku Kuarsetin




C. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH

Tabel 3. Data Kurva Baku Trolox Metode DPPH

Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
5	0,8186
7	0,7058
9	0,5773
11	0,4761
13	0,3825

Grafik 5. Kurva Baku Trolox Metode DPPH




D. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC

Tabel 4. Data Kurva Baku Trolox Metode CUPRAC

Konsetrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
10	0,2324
20	0,4218
30	0,6310
40	0,8256
50	0,9938

Grafik 6. Kurva Baku Trolox Metode CUPRAC




E. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP

Tabel 5. Data Kurva Baku Trolox Metode FRAP

Konsentrasi ($\mu\text{g/mL}$)	Absorbansi
12	1,8896
14	2,1220
16	2,3505
18	2,6011
20	2,7719

Grafik 7. Kurva Baku Trolox Metode FRAP



Lampiran 13. Perhitungan

A. Perhitungan Pembuatan Reagen Uji Fenolik Total, Flavonoid Total, DPPH, FRAP, dan CUPRAC

1. Reagen Fenolik Total

a. Pereaksi *Follin-Ciocalteu* 7,5 %

Ketentuan larutan *Follin-Ciocalteu* 7,5% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 50 mL.

$$\begin{aligned} 7,5 \% &= \frac{7,5}{100} 50 \text{ mL} \\ &= 7,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

jadi, 7,5 mL *Follin-Ciocalteu* ad 50 mL aquadest.

b. Pereaksi Natrium Karbonat 1M

$$1 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$1 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{50}$$

$$g = \frac{1 \text{ M} \times 106}{20}$$

$$g = 5,3 \text{ g}$$

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 50 ml

2. Reagen Flavonoid Total

a. Pereaksi Aluminium Klorida (AlCl_3) 10%

$$10 \% = \frac{10}{100} 25$$

$$= 2,5 \text{ g}$$

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml

b. Pereaksi Natrium Asetat 1M

$$1 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$1 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{25}$$

$$g = \frac{1 \text{ M} \times 82,03}{40}$$

$$g = 2,05 \text{ g}$$

Dilartukan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml

3. Reagen DPPH

Larutan DPPH yang dibutuhkan sebanyak 100 mL

Reagen DPPH konsentrasi 0,127 mM

$$\text{BM DPPH} = 394,32$$

$$0,127 \text{ mM} = 0,000127 \text{ M}$$

$$\begin{aligned} \text{Mg DPPH} &= M \times \text{BM} \times \text{Vol (mL)} \\ &= 0,000127 \text{ M} \times 394,32 \times 50 \text{ mL} \\ &= 2,50 \text{ mg} \end{aligned}$$

Dilartukan dengan etanol p.a pada labu tentukur 50 mL.

4. Reagen FRAPa. Pereaksi $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 20 mM

$$0,02 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$= \frac{g}{270,35} \times \frac{1000}{50}$$

$$g = \frac{0,02 \text{ M} \times 270,35}{20}$$

$$g = 0,270 \text{ g}$$

$$= 270 \text{ mg}$$

Dilarutkan dengan HCL 40 mM pada labu tentukur 50 mL.

b. HCl 40 mM

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$12,06 \times V_1 = 0,04 \text{ M} \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{0,04 \text{ M} \times 100 \text{ mL}}{12,06}$$

$$V_1 = 0,331 \text{ mL}$$

c. Pereaksi TPTZ 10 mM

$$0,01 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$= \frac{g}{312,34} \times \frac{1000}{10 \text{ mL}}$$

$$g = \frac{0,01 \text{ M} \times 312,34}{100}$$

$$g = 0,0312 \text{ g}$$

$$= 31,2 \text{ mg}$$

Dilarutkan dengan etanol p.a pada labu tentukur 10 mL.

d. Buffer Asetat pH 3,6

Dibuat dari 0,775 gram natrium asetat trihidrat ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) ditambahkan dengan 4 mL asam asetat P, kemudian dilarutkan dengan aquadest hingga 250 mL dalam labu tentukur.

e. Pembuatan reagen FRAP

Buffer asetat : TPTZ : FeCl_3 (20 : 2 : 2)

5. Reagen CUPRAC

a. $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0,01M

$$0,01 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$= \frac{g}{171} \times \frac{1000}{25}$$

$$g = \frac{0,01 M \times 171}{40}$$

$$g = 0,042 \text{ g}$$

$$= 42 \text{ mg}$$

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml

- b. Neocuproin etanolik 0,0075 M

$$0,0075 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$= \frac{g}{208,26} \times \frac{1000}{25}$$

$$g = \frac{0,0075 \text{ M} \times 208,26}{40}$$

$$g = 0,039 \text{ g}$$

$$= 39 \text{ mg}$$

Dilarutkan dengan etanol p.a pada labu tentu ukur 25 ml

- c. Buffer Amonium Asetat 1 M pH 7

$$1 \text{ M} = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{mL}$$

$$= \frac{g}{77,08} \times \frac{1000}{25}$$

$$g = \frac{1 \text{ M} \times 77,08}{40}$$

$$g = 1,927 \text{ g}$$

Dilarutkan dengan aquadest pada labu tentu ukur 25 ml

B. Perhitungan Pembuatan Kurva Baku

Rumus Pengenceran : $V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$

1. Kurva Baku Asam Galat

$$N_1 = 500 \mu\text{g/mL}$$

$$V_2 = 10 \text{ mL}$$

$$N_2 = 25 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 500 = 10 \cdot 25$$

$$V_1 = \frac{250}{500}$$

$$= 0,5 \text{ mL}$$

2. Kurva Baku Kuarsetin

$$N_1 = 500 \mu\text{g/mL}$$

$$V_2 = 10 \text{ mL}$$

$$N_2 = 10 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 500 = 10 \cdot 10$$

$$V_1 = \frac{100}{500}$$

$$= 0,2 \text{ mL}$$

3. Kurva Baku Trolox

$$N_1 = 50 \mu\text{g/mL}$$

$$V_2 = 5 \text{ mL}$$

$$N_2 = 5 \mu\text{g/mL}$$

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$V_1 \cdot 50 = 5 \cdot 5$$

$$V_1 = \frac{25}{50}$$

$$= 0,5 \text{ mL}$$

C. Perhitungan Rendemen Ekstrak Etanol 70%

$$\text{Rumus : \% Rendemen} = \frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendemen} &= \frac{18,88 \text{ g}}{500 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3,776\% \end{aligned}$$

D. Perhitungan Kadar Fenolik Total

$$\text{Bobot Ekstrak} = 0,01001 \text{ g}, 0,01002 \text{ g}, 0,01004$$

$$\text{Faktor Pengenceran} = 1$$

$$\text{Volume contoh} = 10 \text{ mL}$$

$$y = bx + a$$

$$y = 0,0058x + 0,0139$$

$$x = \text{konsentrasi (ppm = mg/L)}$$

$$a = \text{kandungan fenolik awal (X)}$$

Persamaan Linear

$$y = bx + a$$

$$y = 0,0058x + 0,0139$$

$$R^2 = 0,9982$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

1. Kandungan Fenolik Awal (X)

Replikasi 1

$$y = 0,0058x + 0,0139$$

$$0,3145 = 0,0058x + 0,0139$$

$$x = \frac{0,3145 - 0,0139}{0,0058}$$

$$= 51,8275 \text{ mg/L}$$

Replikasi 2

$$y = 0,0058x + 0,0139$$

$$0,3214 = 0,0058x + 0,0139$$

$$x = \frac{0,3214 - 0,0139}{0,0058}$$

$$= 53,017 \text{ mg/L}$$

Replikasi 3

$$y = 0,0058x + 0,0139$$

$$0,3334 = 0,0058x + 0,0139$$

$$x = \frac{0,3334 - 0,0139}{0,0058}$$

$$= 55,086 \text{ mg/L}$$

2. Kandungan Fenolik Total

Replikasi 1

$$\text{Fenolik total} = \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}}$$

$$= \frac{0,01 \times \left(51,8275 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01001 \text{ g}}$$

$$= 51,77 \text{ mg GAE/g Ekstrak}$$

Replikasi 2

$$\text{Fenolik total} = \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}}$$

$$= \frac{0,01 \times \left(53,017 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01002 \text{ g}}$$

$$= 52,91 \text{ mg GAE/g Ekstrak}$$

Replikasi 3

$$\begin{aligned} \text{Fenolik total} &= \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}} \\ &= \frac{0,01 \times \left(55,086 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01004 \text{ g}} \end{aligned}$$

$$= 54,86 \text{ mg GAE/g Ekstrak}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar Fenolik Total} &= \frac{51,77+52,91+54,86}{3} \\ &= 53,18 \text{ mg GAE/g Ekstrak} \end{aligned}$$

E. Perhitungan Kadar Flavonoid Total

$$\text{Bobot Ekstrak} = 0,01002 \text{ g}, 0,01000 \text{ g}, 0,01003$$

$$\text{Faktor Pengenceran} = 1$$

$$\text{Volume contoh} = 10 \text{ mL}$$

$$y = bx + a$$

$$y = 0,0105x + 0,0344$$

$$x = \text{konsentrasi (ppm = mg/L)}$$

$$a = \text{kandungan flavonoid awal (X)}$$

Persamaan Linear

$$y = bx + a$$

$$y = 0,0105x + 0,0344$$

$$R^2 = 0,9957$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

1. Kandungan Flavonoid Awal (X)

Replikasi 1

$$y = 0,0105x + 0,0344$$

$$0,2119 = 0,0105x + 0,0344$$

$$x = \frac{0,2119 - 0,0344}{0,0105}$$

$$= 16,904 \text{ mg/L}$$

Replikasi 2

$$y = 0,0105x + 0,0344$$

$$0,1937 = 0,0105x + 0,0344$$

$$x = \frac{0,1937 - 0,0344}{0,0105}$$

$$= 15,171 \text{ mg/L}$$

Replikasi 3

$$y = 0,0105x + 0,0344$$

$$0,2376 = 0,0105x + 0,0344$$

$$x = \frac{0,2376 - 0,0344}{0,0105}$$

$$= 19,352 \text{ mg/L}$$

2. Kandungan Flavonoid Total

Replikasi 1

$$\text{Flavonoid total} = \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}}$$

$$= \frac{0,01 \times \left(16,904 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01002}$$

$$= 16,87 \text{ mg QE/g Ekstrak}$$

Replikasi 2

$$\text{Flavonoid total} = \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}}$$

$$= \frac{0,01 \times \left(15,171 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01000}$$

$$= 15,17 \text{ mg QE/g Ekstrak}$$

Replikasi 3

$$\text{Flavonoid total} = \frac{V_{\text{contoh}} \times (x) \times fp}{\text{berat Sampel}}$$

$$= \frac{0,01 \times \left(19,352 \frac{\text{mg}}{\text{L}}\right) \times 1}{0,01003}$$

$$= 19,29 \text{ mg QE/g Ekstrak}$$

$$\text{Kadar Flavonoid Total} = \frac{16,87 + 15,17 + 19,29}{3}$$

$$= 17,11 \text{ mg QE/g Ekstrak}$$

F. Kapasitas Antioksidan Metode DPPH

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{Bobot ekstrak} = 0,0106 \text{ g}, 0,0105 \text{ g}, 0,0102 \text{ g}$$

$$\text{Faktor pengenceran} = 1$$

$$\text{Volume sampel} = 10 \text{ mL}$$

Replikasi 1

$$y = -0,0551x + 1,0879$$

$$0,4226 = -0,0551x + 1,0879$$

$$x = \frac{0,4226 - 1,0879}{-0,0551}$$

$$x = \frac{-0,6653}{-0,0551}$$

$$x = 12,074 \mu\text{M Tr}$$

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$= \frac{10 \times [12,074 \mu\text{M Tr}] \times (1 \times 10^{-3})}{0,0106 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,1207}{0,0106}$$

$$= 11,39 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

Replikasi 2

$$y = -0,0551x + 1,0879$$

$$0,4397 = -0,0551x + 1,0879$$

$$x = \frac{0,4397 - 1,0879}{-0,0551}$$

$$x = \frac{-0,6482}{-0,0551}$$

$$x = 11,764 \mu\text{M Tr}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Antioksidan} &= \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}} \\ &= \frac{10 \times [11,764 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0105 \text{ g}} \end{aligned}$$

$$= \frac{0,1176}{0,0105}$$

$$= 11,20 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

Replikasi 3

$$y = -0,0551x + 1,0879$$

$$0,4565 = -0,0551x + 1,0879$$

$$x = \frac{0,4565 - 1,0879}{-0,0551}$$

$$x = \frac{-0,6314}{-0,0551}$$

$$x = 11,459 \mu\text{M Tr}$$

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$= \frac{10 \times [11,459 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0102 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,1145}{0,0102}$$

$$= 11,23 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

$$\text{Rata-rata Kapasitas Antioksidan} = \frac{\text{Rep 1} + \text{Rep 2} + \text{Rep 3}}{3}$$

$$\text{TAC} = \frac{11,39 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak} + 11,20 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak} + 11,23 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak}}{3}$$

$$= 11,27 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

G. Kapasitas Antioksidan Metode CUPRAC

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{Bobot ekstrak} = 0,0106 \text{ g}, 0,0105 \text{ g}, 0,0102 \text{ g}$$

$$\text{Faktor pengenceran} = 1$$

$$\text{Volume sampel} = 10 \text{ mL}$$

Replikasi 1

$$y = 0,0193x + 0,0429$$

$$1,2367 = 0,0193x + 0,0429$$

$$x = \frac{1,2367 - 0,0429}{0,0193}$$

$$x = \frac{1,1938}{0,0193}$$

$$x = 61,854 \mu\text{M Tr}$$

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$= \frac{10 \times [61,854 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0105 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,6185}{0,0105}$$

$$= 58,90 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

Replikasi 2

$$y = 0,0193x + 0,0429$$

$$1.2686 = 0,0193x + 0,0429$$

$$x = \frac{1,2686 - 0,0429}{0,0193}$$

$$x = \frac{1,2257}{0,0193}$$

$$x = 63,507 \mu\text{M Tr}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Antioksidan} &= \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}} \\ &= \frac{10 \times [63,507 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0106 \text{ g}} \\ &= \frac{0,6350}{0,0106} \\ &= 59,91 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak} \end{aligned}$$

Replikasi 3

$$y = 0,0193x + 0,0429$$

$$1.1486 = 0,0193x + 0,0429$$

$$x = \frac{1,1486 - 0,0429}{0,0193}$$

$$x = \frac{1,1057}{0,0193}$$

$$x = 57,290 \mu\text{M Tr}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Antioksidan} &= \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}} \\ &= \frac{10 \times [57,290 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0102 \text{ g}} \\ &= \frac{0,5729}{0,0102} \end{aligned}$$

$$= 56,16 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

$$\text{Rata-rata Kapasitas Antioksidan} = \frac{\text{Rep 1} + \text{Rep 2} + \text{Rep 3}}{3}$$

$$\text{TAC} = \frac{58,90 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak} + 59,91 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak} + 56,16 \mu\text{mol} \frac{\text{Tr}}{\text{g}} \text{Ekstrak}}{3}$$

$$= 58,32 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

H. Kapasitas Antioksidan Metode FRAP

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$\text{Bobot ekstrak} = 0,0102 \text{ g}, 0,0101 \text{ g}, 0,0105 \text{ g}$$

$$\text{Faktor pengenceran} = 1$$

$$\text{Volume sampel} = 10 \text{ mL}$$

Replikasi 1

$$y = 0,1122x + 0,5521$$

$$1,2778 = 0,1122x + 0,5521$$

$$x = \frac{1,2778 - 0,5521}{0,1122}$$

$$x = \frac{0,7257}{0,1122}$$

$$x = 6,467 \mu\text{M Tr}$$

$$\text{Kapasitas Antioksidan} = \frac{V_{\text{sampel}} \times [\text{sampel}] \times Fp}{\text{berat sampel (g)}}$$

$$= \frac{10 \times [6,467 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0102 \text{ g}}$$

$$= \frac{0,0646}{0,0102}$$

$$= 6,34 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak}$$

Replikasi 2

$$y = 0,1122x + 0,5521$$

$$1,3209 = 0,1122x + 0,5521$$

$$x = \frac{1,3209 - 0,5521}{0,1122}$$

$$x = \frac{0,7688}{0,1122}$$

$$x = 6,852 \mu\text{M Tr}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Antioksidan} &= \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{berat sampel (g)} \\ &= \frac{10 \times [6,852 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0101 \text{ g}} \\ &= \frac{0,0685}{0,0101} \\ &= 6,78 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak} \end{aligned}$$

Replikasi 3

$$y = 0,1122x + 0,5521$$

$$1,3450 = 0,1122x + 0,5521$$

$$x = \frac{1,3450 - 0,5521}{0,1122}$$

$$x = \frac{0,7929}{0,1122}$$

$$x = 7,066 \mu\text{M Tr}$$

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Antioksidan} &= \frac{Vsampel \times [sampel] \times Fp}{berat sampel (g)} \\ &= \frac{10 \times [7,066 \mu\text{M Tr}] \times 1 \times 10^{-3}}{0,0105 \text{ g}} \\ &= \frac{0,0706}{0,0105} \\ &= 6,72 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak} \end{aligned}$$

$$\text{Rata-rata Kapasitas Antioksidan} = \frac{Rep 1 + Rep 2 + Rep 3}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{TAC} &= \frac{6,34 \mu\text{mol}^{\text{Tr}}_{\text{g}}\text{Ekstrak} + 6,78 \mu\text{mol}^{\text{Tr}}_{\text{g}}\text{Ekstrak} + 6,72 \mu\text{mol}^{\text{Tr}}_{\text{g}}\text{Ekstrak}}{3} \\ &= 6,61 \mu\text{mol Tr/g Ekstrak} \end{aligned}$$

Lampiran 14. Gambar ekstraksi sampel rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan:


- Simplisia rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L)
- Proses ekstraksi metode maserasi
- Proses pemisahan pelarut dan sampel
- Proses penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70% dengan alat *rotary evaporator*
- Hasil dari penguapan filtrat sampel ekstrak etanol 70%
- Penimbangan bobot ekstrak untuk perhitungan rendamen ekstrak

Lampiran 15. Gambar Penetapan kadar Fenolik Total dan Flavonoid Total

(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan:

- a. Deret konsentrasi larutan standar fenolik
- b. Larutan sampel fenolik
- c. Deret konsentrasi larutan standar flavonoid
- d. Larutan sampel flavonoid

Lampiran 16. Gambar pengujian kapasitas antioksidan metode FRAP, CUPRAC dan DPPH sampel rimpang lempuyang gajah



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan:

- a. Deret konsentrasi larutan standar FRAP
- b. Larutan sampel FRAP
- c. Deret konsentrasi larutan standar CUPRAC
- d. Larutan sampel CUPRAC
- e. Deret konsentrasi larutan standar DPPH
- f. Larutan sampel DPPH

RIWAYAT HIDUP



Rosfiani Nursakinah Rosman, biasa dipanggil Fina atau Ros lahir di Makassar pada tanggal 09 September 2000, anak pertama dari 2 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Rosman dan Ibunda Hj.Fitriani Mahmud, S.pd.,M.pd. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 6 tahun di TK Dharmawanita Larompong dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar pada SD Negeri 227 Larompong dan selesai pada tahun 2013, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Larompong hingga sekolah menengah keatas di SMA Negeri 3 Luwu hingga tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi negeri Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Motto yang baru-baru ini melekat pada diri penulis ialah Bismillah mundur satu langkah untuk maju seribu langkah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah *Shubhanahu Wa Ta'ala*, usaha dan do'a dari Ibunda dalam menjalani aktivitas akademik di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Penentuan Kadar Fenolik, Flavonoid Total Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet L*)".