

**HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN
KADAR *GOUT ARTHRITIS* PADA PETANI SAYUR DI DESA
KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran
dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh:
SRI WAHYUNI NINGSIH
70200119040

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten gowa*" yang disusun oleh Sri Wahyuni Ningsih, NIM: 70200119040, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 18 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 23 Agustus 2023 M
6 Shaffar 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Ranti Ekasari, SKM., M.KM	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Habibi, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Yusma Indah Jayadi, S.Gz., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadirat Allah swt.berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar Gout Arthritis Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”** Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023/2024

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta Tettaku tercinta Syamsir dan Mamaku tercinta Irmawanti atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga peneliti dapat berada di tahap ini untuk meraih gelar sarjana kesehatan Masyarakat. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing telah mengarahkan dan memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Dr. Habibi S.KM.,M.Kes selaku pembimbing I dan Yusma Indah Jayadi S.Gz., M.Kes selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penelitian, arahan referensi yang berguna untuk penelitian skripsi, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ke tahap ini serta informasi yang ter update
4. Ranti Ekasari S.KM.,M.KM selaku penguji akademik dan Prof Dr. H.M Dahlan M.Ag selaku Penguji Agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas
5. Kepada keluarga besar HMJ Kesehatan masyarakat tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang penelitian, pengabdian masyarakat yang begitu berharga sehingga saya bisa ke tahap ini
6. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Pahrul Islami tercinta yang sangat berperan penting dalam dunia perskripsianku dan selalu memberikan support dan arahan yang positif. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, menjadi rumah sekaligus pendamping dalam segala hal, menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala

hal yang kita lalui.

7. Kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Teman-teman angkatan saya GRAMOST yang telah memberikan peneliti motivasi dan pemikiran positif. Akhir kata, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Peneliti menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terima kasih.

8. Responden penelitian

Samata, 18 Agustus 2023

Peneliti
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



— Sri Wahyuni Ningsih
Nim : 70200119040

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni Ningsih

NIM : 70200119040

**Judul : Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar
Gout Arthritis Pada Petani Sayur Di Desa Kanreapia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa**

Penyakit asam urat (*gout arthritis*) terjadi ketika asam urat meningkat dalam tubuh dan terjadi penumpukan pada sendi yang membentuk kristal dan ujungnya seperti jarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan pestisida terhadap peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 216 orang petani, sehingga diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 131 responden. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara cara penyemprotan ($p\text{-value} = 0,027$) dan masa kerja ($p\text{-value} = 0,025$) dengan kadar *gout arthritis*. Sedangkan lama kerja ($p\text{-value} = 0,526$), penggunaan alat pelindung diri ($p\text{-value} = 0,339$), *personal hygiene* ($p\text{-value} = 0,131$) tidak memiliki hubungan dengan kadar *gout arthritis*. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan keracunan pestisida seperti penggunaan alat pelindung diri, *personal hygiene* setelah melakukan penyemprotan agar terhindar dari bahaya paparan pestisida yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar *gout arthritis*.

Kata Kunci: *Gout Arthritis*, Pestisida, Petani Sayur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN.....i

KATA PENGANTAR.....ii

ABSTRAK.....iii

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....viii

DAFTAR BAGAN.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Hipotesis Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	9
G. Kajian Pustaka.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Gout Arthritis.....	19
B. Faktor Paparan Pestisida yang Berhubungan dengan Gout Arthritis.....	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Pestisida.....	29
D. Hubungan Paparan Pestisida dengan Gout Arthritis.....	39
E. Integrasi Keislaman.....	40

F. Kerangka Teori.....	44
G. Kerangka Konsep.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Etika Penelitian.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	66
D. Kelemahan Penelitian.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Kajian Pustaka	11
Tabel 2.1	Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani	33
Tabel 4.1	Luas Wilayah Desa Kanreapia	54
Tabel 4.2	Wilayah Desa Kanreapia	55
Tabel 4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Usia pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	55
Tabel 4.4	Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	56
Tabel 4.5	Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	57
Tabel 4.6	Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	57
Tabel 4.7	Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa	58

	Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	
Tabel 4.8	Distribusi Responden Berdasarkan Cara Penyemprotan pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	59
Tabel 4.9	Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Alat Pelindung Diri pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	59
Tabel 4.10	Distribusi Responden Berdasarkan Personal Hygiene pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	60
Tabel 4.11	Hubungan Antara Lama Kerja dengan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	61
Tabel 4.12	Hubungan Antara Masa Kerja dengan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	62
Tabel 4.13	Hubungan Antara Cara Penyemprotan dengan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	63

Tabel 4.14	Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	64
Tabel 4.15	Hubungan Antara Personal Hygiene dengan Peningkatan Kadar Gout Arthritis pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023	65



DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Judul Bagan	Halaman
Bagan 2.1	Kerangka Teori	44
Bagan 2.2	Kerangka Konsep	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Menurut *World Health Organization* (WHO, 2018), bahwa pestisida merupakan senyawa-senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh hama, diantaranya serangga, hewan pengerat, jamur, dan tanaman yang tidak diinginkan (gulma). Pestisida digunakan dibidang kesehatan untuk melenyapkan vektor-vektor penyakit (seperti lalat, kecoa, dan nyamuk), sedangkan di bidang pertanian pestisida berperan untuk mencegah kerusakan pada tanaman pertanian atau bahkan memusnahkan hama tanaman. Walaupun demikian pestisida memiliki potensi sebagai racun bagi organisme lain termasuk manusia, maka perlu digunakan dengan hati-hati dan dibuang dengan benar.

Dampak negatif dari penggunaan pestisida secara berlebihan bagi kesehatan manusia telah dituliskan oleh Rachel Carson diantaranya, mual, gangguan hati, syaraf, kelumpuhan (*paralysis*), gangguan memori, depresi hingga penyakit mental (*schizophrenic*), kanker, *leukemia*, anemia aplastik, dan kelainan pada darah. Dari penelitian-penelitian lain diungkapkan bahwa banyak efek negatif bagi kesehatan yang berhubungan dengan pestisida kimia yaitu: terjadinya gangguan pada kulit, *gastrointestinal*, *neurologi*, *karsinogen*, pernapasan, reproduksi dan gangguan pada endokrin. Kemudian kondisi seseorang yang terpapar oleh pestisida dalam jumlah banyak karena pekerjaan, kecelakaan, atau secara sengaja dapat menyebabkan kasus rawat inap dan bahkan kematian (Purnomo et al., 2019).

Secara global, WHO memperkirakan keracunan pestisida menyebabkan 300.000 kematian per tahun dan kebanyakan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. *World Health Organization* (WHO, 2018) mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 1000 pestisida yang digunakan di seluruh dunia untuk memastikan bahan makanan tidak rusak oleh hama. Setiap pestisida memiliki sifat dan efek toksikologi yang berbeda. Hal ini juga tergantung pada rute terjadinya paparan, seperti menelan, menghirup, dan kontak langsung dengan kulit.

Food and Agriculture Organization (FAO, 2018), mengungkapkan bahwa penggunaan pestisida di dunia terus mengalami peningkatan dari 2,3 juta ton bahan aktif pada tahun 1990 menjadi 4,1 juta ton pada tahun 2018. Adapun persentase penggunaan pestisida pada tahun 2018 berdasarkan lima benua, yaitu Eropa sebesar 11,6%, Oseania 1,7%, Afrika 2%, Amerika 32,3%, dan Asia 52,4%.

Kementerian Ketenagakerjaan RI (1986), mengungkapkan bahwa petani sebanyak 95,29% di Indonesia menggunakan pestisida mulai dari awal hingga akhir siklus tanam, meliputi pengolahan tanah, penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Adapun pestisida yang terdaftar dan diizinkan di Indonesia sampai tahun 2016 mencapai 3,207 merek pestisida dari 343 perusahaan pestisida nasional. Petani dan penjamah pestisida sangat rentan terpapar bahaya pestisida. Telah banyak bukti penelitian menunjukkan adanya gangguan kesehatan pada masyarakat akibat paparan pestisida, dari yang ringan sampai berat hingga menimbulkan kematian.

Pada penelitian Lee et al (2013) ditemukan bahwa konsentrasi serum dari beberapa pestisida berhubungan positif dengan risiko *gout*

arthritis pada populasi umum. Temuan saat ini paparan latar belakang pestisida merupakan penyebab umum peningkatan *gout arthritis*. Karena sering hadir dalam populasi umum sebagai campuran bahan kimia dan hal tersebut cenderung berkorelasi tinggi. Penelitian menunjukkan risiko *gout arthritis* berkaitan dengan belakang penyakit sindroma metabolik.

Menurut Riskesdas (2018), prevalensi *gout arthritis* (asam urat) di Indonesia menduduki urutan kedua setelah *osteoarthritis* diperkirakan 1,6-13,6/100.000 orang, prevalensi penyakit asam urat berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%, prevalensi ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur.

Studi Firdayanti (2019), mengungkapkan bahwa *gout arthritis* merupakan penyakit yang banyak menyerang pria, walaupun prevalensinya meningkat pada kedua jenis kelamin tetapi pada pria meningkat 4 kali lipat dibandingkan dengan perempuan. Asam urat cenderung mengalami peningkatan pada pria karena tidak memiliki hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat dalam urin. Sedangkan pada wanita peningkatan asam urat akan meningkat apabila sudah memasuki masa menopause karena wanita memiliki hormon estrogen yang dapat membantu pembuangan asam urat lewat urin.

Indonesia menduduki posisi ke 4 terbesar di dunia yang penduduknya menderita penyakit *gout arthritis* sebanyak 35% terjadi pada pria berusia di atas 45 tahun. Di Indonesia prevalensi penyakit sendi yang terjadi pada usia 55-64 tahun sebanyak 45%. Usia 65-74 tahun sebanyak 51% dan usia >75 tahun sebanyak 54,8%. Untuk prevalensi yang

diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia sebanyak 7,3% dan berdasarkan diagnosis sebanyak 24,7%. Prevalensi yang diagnosis kesehatan menyatakan lebih tinggi pada perempuan yaitu sebanyak 13,4% dibandingkan dengan laki-laki 10,3%. Untuk prevalensi di provinsi Kalimantan Timur sendiri menduduki posisi ke 10 dari 33 provinsi yang terdapat di Indonesia, dan untuk prevalensi penyakit sendiri di daratan Borneo, Kalimantan Timur menduduki posisi ke 2 setelah Kalimantan Barat (Risikesdas, 2018).

Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang sangat memadai salah satunya adalah sektor pertanian. Kecamatan Tombolo Pao adalah sentra pertanian untuk tanaman sayuran dan hortikultura lainnya di Kabupaten Gowa bersama Kecamatan Tinggimoncong, Tombolo Pao, Biring Bulu. Sub-sektor usaha tanaman pangan hortikultura merupakan penyumbang terbesar terhadap sub-sektor pertanian yaitu tercatat sebesar 60,9% dari seluruh nilai tambah pertanian di Kabupaten Gowa. Ada beragam jenis tanaman hortikultura khas dataran menengah dan tinggi yang merupakan produksi wilayah ini seperti jenis sayuran kubis, cabe, tomat, bawang, kentang, wortel, kol bunga, brokoli dan masih banyak lagi, serta jenis buah markisa dan beraneka ragam tanaman hias yang potensial (BPS, 2017).

Berdasarkan data awal yang telah diperoleh dari pihak Puskesmas Tamaona, menunjukkan bahwa kadar asam urat dari tahun 2020 sebanyak 43 kasus mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 63 kasus, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 37 kasus, hal ini dapat terjadi karena pada saat pemeriksaan dari pihak

Puskesmas Tamaona terkendala dalam melakukan pemeriksaan yaitu kurangnya stock strip, sehingga banyak pasien yang tidak diperiksa.

Adapun studi yang dikemukakan oleh Habibi et al., (2022), bahwa keracunan pestisida merupakan masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan pertanian, keracunan pestisida khususnya pada pertanian hortikultura produksi tanaman kebun. Kabupaten Gowa khususnya di Desa Kanreapia petani menanam berbagai tanaman (hortikultura). Hasil panen sayuran yang diperoleh setiap hari dikirim ke wilayah Makassar dan Pulau Kalimantan. Setiap hari Desa Kanreapia mampu menanam daun seledri, kentang, sawi, wortel, labu siam, dan kubis.

Pada studi terdahulu yang menghubungkan antara paparan pestisida dengan gout arthritis memberikan bukti bahwa paparan insektisida dengan studi yang tersedia saat ini memberikan bukti bahwa paparan insektisida berkontribusi terhadap peningkatan risiko *Rheumatoid Arthritis* (aOR = 1,20, 95% CI = 1,12-1,28). Selain itu, spesifik dikaitkan dengan peningkatan risiko *Rheumatoid Arthritis* (aOR = 1,20, 95% CI = 1,12-1,28). Studi yang menemukan hubungan paparan insektisida dengan peningkatan risiko *Rheumatoid Arthritis* ditemukan pada aplikator insektisida (Chittrakul et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, hubungan paparan pestisida terhadap peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik dan merasa penting untuk dilakukan penelitian, melihat tingginya prevalensi *gout arthritis* dan banyaknya petani menggunakan pestisida yang terkadang berlebihan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang dikaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk “Mengetahui Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan lama kerja dengan *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- b. Mengetahui hubungan masa kerja dengan *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- c. Mengetahui hubungan cara penyemprotan dengan *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- d. Mengetahui hubungan penggunaan APD dengan *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

- e. Mengetahui hubungan *personal hygiene* dengan *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan penelitian terkait “Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.

2. Institusi

Sebagai informasi pelengkap mengenai “Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.

3. Bagi petani sayur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait “Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* pada Petani Sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini terdiri atas dua hipotesis yang bersifat sementara oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0)

1. Tidak ada hubungan lama kerja terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

2. Tidak ada hubungan masa kerja terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
3. Tidak ada hubungan cara penyemprotan terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
4. Tidak ada hubungan penggunaan APD terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
5. Tidak ada hubungan *personal hygiene* terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Hipotesis Alternatif (H_a)

1. Ada hubungan lama kerja terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
2. Ada hubungan masa kerja terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
3. Ada hubungan cara penyemprotan terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
4. Ada hubungan penggunaan APD terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
5. Ada hubungan *personal hygiene* terhadap kadar *gout arthritis* pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kadar Gout Arthritis

Penyakit asam urat (*gout arthritis*) terjadi ketika kristal asam urat menumpuk di sendi sehingga menimbulkan peradangan dan menyebabkan rasa sakit (Kementerian Kesehatan, 2022).

Kriteria Objektif (Kementerian Kesehatan, 2022) :

- a. Normal : Apabila diperoleh nilai $\leq 7,0$ mg/dL
- b. Tidak Normal : Apabila diperoleh nilai $> 7,0$ mg/dL

2. Lama Kerja

Lama kerja merupakan lamanya waktu responden dalam melakukan pekerjaan atau jam kerja yang dilakukan setiap harinya pada pekerja petani.

Kriteria Objektif (Permenaker, 1986) :

- a. Berisiko : Apabila jam kerja ≤ 5 jam per hari
- b. Tidak Berisiko : Apabila jam kerja > 5 jam per hari

3. Masa Kerja

Masa kerja merupakan jangka waktu seorang pekerja dalam menjalankan pekerjaannya sebagai petani.

Kriteria Objektif (Prasiwi & Darnoto, 2017) :

- a. Baru : Jika responden bekerja ≤ 5 tahun
- b. Lama : Jika responden bekerja > 5 tahun

4. Cara Penyemprotan

Cara penyemprotan adalah posisi responden saat melakukan penyemprotan pestisida.

Kriteria Objektif :

- a. Memenuhi Syarat : Apabila skor $\geq 50\%$
- b. Tidak Memenuhi Syarat : Apabila skor $< 50\%$

5. Penggunaan APD

APD digunakan untuk melindungi diri seorang pekerja untuk mencegah resiko terjadinya paparan penyakit akibat kerja. Jenis APD yang paling umum digunakan petani adalah *hat* (topi), protektor mata (*goggles*), protektor pernafasan (*face mask*), protektor tubuh (baju/celemek kerja), protektor tangan (*glove*), dan protektor kaki (sepatu bot) (Fajriani et al., 2019).

Kriteria Objektif :

- a. Lengkap : Apabila skor $\geq 50\%$
- b. Tidak Lengkap : Apabila skor $< 50\%$

6. *Personal Hygiene*

Personal hygiene merupakan perilaku petani dalam upaya menjaga kebersihan setelah melakukan penyemprotan pestisida.

Kriteria Objektif :

- a. Memenuhi Syarat : Apabila skor $\geq 50\%$
- b. Tidak Memenuhi Syarat : Apabila skor $< 50\%$

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.1 Kajian pustaka penelitian terkait peningkatan *gout arthritis* pada petani pengguna pestisida

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	2018	Jaliana, Suhadi, La Ode Muh. Sety	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asam Urat Pada Usia 20-44 Tahun Di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/538615	Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Pola Konsumsi Purin, Aktivitas Fisik, Stress, Riwayat Keluarga	Analitik observasional menggunakan desain <i>Case Control Study</i>	Dari hasil analisis menggunakan uji <i>chi square</i> bahwa pola konsumsi sumber purin, stres, riwayat keluarga berhubungan secara signifikan dengan kejadian asam urat pada usia 22-44 tahun di RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2017
2.	2019	Gita Nur Fajriani, Suci Rizki Nurul	Penggunaan APD saat penyemprotan pestisida dan kadar	Penggunaan APD	<i>Cross Sectional</i>	Petani yang tidak memakai full APD 83,7% dan yang memakai APD saat melakukan semprot 16,3%. Dari hasil

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
		Aeni, Dika Adhi Sriwiguna	kolinesterase dalam darah petani desa pasirhalang https://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalisis/article/view/1229			mengukur parameter kolinesterase, 14% petani keracunan kecil dan 86% petani bersahaja. Hasil analisis chi-kuadrat menunjukkan taksir 0,017 ($\alpha = 0,05$) akhirnya tersimpul bahwa adanya interaksi yang berarti tengah memakai APD.
3	2021	Putu Sintya Arlinda, Grisna Putri, Wiwit Nurwidyaningt yas	Profil Karakteristik Individu Terhadap Kejadian Hiperurisemia	Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan	Desain penelitian observasi analitik <i>cross sectional</i>	Hasil penelitian didapatkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin perempuan lebih besar 68,4 %, usia sebagian besar berusia 50-59 tahun dengan persentase 42,1%, pendidikan berasal dari jenjang perguruan tinggi sebesar 36,8

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			https://ojs.widyagama.usada.ac.id/index.php/JIK/article/view/244			%, jenis pekerjaan sebagian besar tidak bekerja/IRT sebesar 52,6% dan pendapatan sebesar >2.000.000 perbulan dengan persentase 42,1 %.
4	2019	Abdul Farid, Arum Pratiwi, Aan Dwi Auliya Fitri	Hubungan Karakteristik Petani Terhadap Persepsi Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Pada Petani Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur	Umur, tingkat pendidikan, pelatihan, lama usahatani, pendapatan, status lahan serta luas lahan terhadap persepsi penerapan K3	analisis korelasi <i>Rank Spearman</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik petani yang berhubungan dengan persepsi petani dalam penerapan K3 adalah tingkat pendidikan dan pelatihan. Sedangkan karakteristik petani yang tidak berhubungan dengan persepsi petani dalam penerapan K3 adalah umur, lama usahatani, pendapatan, status lahan dan luas lahan

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			c0085e0e0f354bc2692b1959703083f9c2Od.pdf (semanticscholar.org)			
5	2020	Hannah Marcus, Russel J de Souza	<i>Risk Factors for acute pesticide poisoning in developing countries</i> https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389	Faktor Risiko	Systematic Review	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan pandangan global tentang APP dan interkoneksinya determinan sosial. Resiko APP sangat terkait dengan keunikan seseorang terhadap profil sosial dan status ekonomi. Dengan mengkompilasi data lintas negara dari 13 negara yang berbeda hasilnya menunjukkan cakupan geografis yang luas dan keberangkatan penting dari studi khusus negara. Faktor

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						risiko yang teridentifikasi yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dapat digunakan untuk mengonfirmasi arah studi masa depan untuk memperkuat basis bukti yang sesuai.
6	2020	Nur syahidatul Aqilah jambari, Nurul izzah abdul Samad, Siti marwanis Anua, Rumaizah ruslan, Nurul ainun Hamzah	<i>Knowledge, Attitude and Practice (KAP) on pesticide exposure among farmers in kota Bharu, kelantan</i> https://www.academia.edu/90323476/Kno	Pengetahuan, Sikap, dan Praktik	<i>Cross Sectional</i>	Sekitar 85,4% dari mereka adalah laki-laki dengan usia rata-rata 48 tahun dan 66% dari mereka menyelesaikan sekolah menengah. Keluhan responden bahwa mereka pernah mengalami gejala seperti keringat berlebihan (34,7%), penglihatan kabur (27,1%) dan mati rasa di kaki (22,9%) sekitar 63\$ petani menyimpan botol pestisida di tempat yang telah ditentukan sementara 62% memakai APD dalam penyemprotan pestisida, sekitar 61,1% responden memiliki

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			wledge			pengetahuan sedang. Pestisida yang digunakan 56,3% menunjukkan tingkat sikap tidak peduli terhadap penggunaan pestisida dan 21,5% mereka menunjukkan praktik yang baik saat menangani pestisida. Korelasi signifikan diamati antara sikap dengan pengetahuan dan praktek ($p < 0,001$)
7	2021	Christine G Park, Jonathan N Hofmann, Laura E Beane Freeman, Dale P sandler	<i>Agricultural pesticides and shingles risk in a prospective cohort of licensed pesticide applicators</i>	Penggunaan Pestisida	Cohort	Dilaporkan 590 insiden positif herpes Zoster, untuk delapan insektisida yang tidak pernah digunakan, tiga fumigan, dua fungisida dan lima herbisida dan respons paparan terlihat di kuartil yang meningkat ($Q3$ dan $Q4 > Q1$) atau tertil ($T3$ DAN $T2 > T1$) untuk empat insektisida (<i>Permethrin, coumaphos, malathion</i> dan <i>lindane</i>) dua <i>fumigant</i> (Karbon tetraklorida/karbon disulfide dan metil bromida) dan tiga herbisida

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
			https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34319145			(alachlor trifluralin 60 tahun dan asam diklorofenol asetat 2,4).
8.	2022	Jiraporn Chittrakul, Ratana Sapbamrer, and Wachiranun Sirikul	<i>Pesticide Exposure and Risk of Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis</i>	Usia, jenis kelamin, bahan kimia, rasio odds	Studi kohort observasional menggunakan desain <i>cross sectional</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio odds yang disesuaikan untuk paparan pestisida pada RA adalah 1,20 untuk insektisida (95% CI = 1,12–1,28), 0,98 untuk herbisida (95% CI = 0,89–1,08), 1,04 untuk fungisida (95% CI = 0,86–1,27), dan 1,15 ini untuk pestisida nonspesifik (95% CI = 1,09–1,21). Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa paparan insektisida (terutama fonofos, karbaril, dan guanidine) berkontribusi terhadap peningkatan

No	Tahun	Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
						risiko RA.



Berdasarkan kajian pustaka tersebut, disimilaritas penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian, variabel independen dan sasaran penelitian. Pada penelitian sebelumnya dilakukan penelitian pada hubungan pestisida terhadap asam urat pada petani secara umum sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada petani sayur menggunakan pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Gout Arthritis

1. Gout Arthritis

Penyakit asam urat (*gout*) merupakan penyakit yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari. Kondisi asam urat yang meningkat dalam tubuh akan terjadi penumpukan asam urat pada sendi yang membentuk kristal dan ujungnya tajam seperti jarum. Kemudian menimbulkan respon peradangan dan kronis melalui aktivasi sistem kekebalan tubuh bawaan serta berakhir dengan serangan *gout* (Soeroso & Algristian 2011).

Gout muncul sebagai akibat kondisi hiperurisemia, dalam hal ini asam urat akan merembes masuk ke organ-organ terutama persendian. Asam urat dalam sendi susah kembali ke dalam darah. Bila kadar asam urat dalam darah mendadak turun, tubuh akan menyesuaikan kadar asam urat dalam sendi dengan mengurangi kandungan asam urat terlarutnya (Soeroso & Algristian 2011).

Asam urat sering dianggap sebagai penyakit yang banyak menyerang pria. Untuk laki-laki ambang normalnya dalam darah yaitu 7,0 mg/dL, untuk wanita normalnya adalah 6,0 mg/dL. Asam urat cenderung mengalami peningkatan pada pria karena tidak memiliki hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat dalam urin. Sedangkan pada wanita peningkatan asam urat akan meningkat apabila sudah memasuki masa menopause karena wanita memiliki hormon estrogen yang dapat

membantu pembuangan asam urat lewat urin (Soeroso & Algristian 2011).

2. Faktor Risiko Gout Arthritis

Faktor risiko yang mempengaruhi kadar asam urat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor risiko yang tidak bisa di kontrol dan faktor risiko yang bisa di kontrol. Faktor yang tidak bisa dikontrol adalah umur, jenis kelamin dan genetik. Faktor yang bisa dikontrol adalah konsumsi alkohol berlebih, IMT, asupan purin berlebih dan obat-obatan (Syarifah, 2018).

Asam urat merupakan produk sisa dari sel-sel tubuh yang mati. Sel-sel tubuh yang mati ini kemudian melepas purin yang salah satu jenis zatnya terdapat dalam setiap sel makhluk hidup. Purin juga terdapat pada makanan yang kita konsumsi. Purin merupakan salah satu penyusun asam nukleat yang terdapat pada semua sel makhluk hidup sehingga hampir semua bahan makanan dapat menyebabkan asam urat (Soeroso & Algristian 2011).

Faktor yang mempengaruhi seseorang menderita *gout arthritis* juga tergantung pada usia. Penyakit *gout arthritis* lebih sering menyerang laki-laki di atas umur 40 tahun, karena kadar asam urat pada pria cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Pada usia ini, pria mengalami penurunan kemampuan yaitu tak seenergik pria yang berusia 20 tahun karena mempunyai masalah dengan otot atau persendian. Namun angka kejadian *gout arthritis* menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Prevalensi *gout arthritis* pada pria meningkat dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak antara usia 75 dan 84 tahun (Firdayanti, Susanti, 2019).

3. Peran Gout Arthritis dalam Tubuh

Asam urat mempunyai peranan dalam setiap regenerasi sel tubuh sebagai antioksidan. Jika tubuh kekurangan antioksidan maka semakin banyak radikal bebas yang membunuh sel-sel tubuh sehingga membuat kulit kusam dan tidak sehat. Meningkatnya radikal bebas akan meningkatkan pula asam urat dalam tubuh, sehingga ketika banyak asam urat, maka semakin berisiko mengalami *gout*, namun kadar asam urat yang normal pun tidak selamanya bebas dari gout (Soeroso & Algristian 2011).

Tubuh menyediakan 85 persen senyawa purin untuk kebutuhan setiap hari, hal ini berarti bahwa kebutuhan purin dari makanan hanya sekitar 15 persen. Makanan yang mengandung zat purin yang tinggi akan diubah menjadi asam urat. asam urat dapat membentuk kristal asam urat/batu ginjal yang akan membentuk sumbatan ureter. purin yang tinggi terutama terdapat dalam *seafood*, udang, cumi, kerang, kepiting, ikan teri akibat langsung dari pembentukan asam urat yang berlebih atau akibat penurunan ekskresi asam urat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan nukleotida purinnya seperti sarden, kangkung, dan bayam akan meningkatkan produksi asam urat (Jaliana & Suhadi, 2018).

Salah satu akibat dari proses penuaan yaitu adanya defisiensi enzim *Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transferase* (HGRT). Enzim ini memiliki peran dalam mengubah purin menjadi nukleotida purin. Jika enzim ini mengalami defisiensi maka purin dalam tubuh dapat meningkat. Purin yang tidak dapat dimetabolisme oleh enzim HGRT, akan dimetabolisme oleh enzim *xanthine oxidase* menjadi

asam urat. Pada akhirnya, kandungan asam urat dalam tubuh meningkat atau terjadi hiperurisemia (Firdayanti, Susanti, 2019).

B. Faktor Paparan Pestisida yang Berhubungan dengan Gout Arthritis

1. Lama Kerja

Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85. Pasal 77 ayat 1, UU No. 13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja.

Semakin lama melakukan penyemprotan, maka pestisida yang terpapar akan semakin banyak. Kebiasaan petani untuk beristirahat setelah melakukan penyemprotan dapat mengembalikan aktivitas kolinesterase dalam darah sehingga menjadi normal kembali. Penurunan kadar *Cholinesterase* dalam plasma akan kembali normal dalam 3 minggu, Sedangkan dalam darah memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu dengan tanpa paparan kembali. Kembalinya aktivitas *Cholinesterase* tergantung sintesis enzim baru oleh organ hati (Lucki, 2018).

Tinggi frekuensi (n) penggunaan pestisida dipengaruhi oleh lama masa tanam. Penggunaan pestisida memiliki dampak terhadap keracunan akut petani. Hal tersebut terjadi apabila semakin lama petani menyemprot secara terus menerus maka dapat mengakibatkan kadarnya semakin masuk ke dalam tubuh. Paparan yang terus berulang dapat menyebabkan zat beracun menumpuk di dalam tubuh, sehingga

mengakibatkan melebihi ambang batas keracunan dan menyebabkan paparan pestisida (Istianah & Yuniastuti, 2017).

Berdasarkan penelitian Istianah & Yuniastuti, (2017) mengungkapkan bahwa Sebagian besar responden mempunyai lama penyemprotan yang buruk yaitu sebanyak 66 responden. Responden mempunyai lama penyemprotan buruk mengalami keracunan akibat pestisida sebanyak 46 orang (69,7%) dan yang tidak mengalami keracunan sebanyak 20 orang (30,3%). Sedangkan responden yang mempunyai lama penyemprotan baik sebanyak 20 orang dan yang mengalami keracunan sebanyak 9 orang (45%), dan yang tidak keracunan sebanyak 11 orang (55%). Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-square* ($p\text{-value} = 0,044$) bahwa ada hubungan antara lama setiap penyemprotan dengan kejadian keracunan.

2. Masa Kerja

Masa kerja merupakan lama waktu yang dilewati responden aktif pada saat bekerja sebagai petani penyemprot pestisida hingga pada waktu penelitian dilakukan dalam satuan tahun (Istianah & Yuniastuti, 2017).

Berdasarkan penelitian Lestari et al, (2021) menunjukkan kadar asam urat tidak normal lebih banyak terdapat pada petani yang mempunyai masa kerja >30 tahun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzi, (2018) menyebutkan adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kadar asam urat. Aktivitas fisik menjadi penyebab meningkatnya kadar asam urat dalam darah karena produksi asam laktat selama beraktivitas terutama aktivitas fisik yang berat.

3. Cara Penyemprotan Pesticida

Penggunaan pestisida akan berdampak pada kesehatan petani apabila pada saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah angin dan melakukan penyemprotan sambil makan dan minum Erwin et al, (2019). Menurut Siahaan, (2020) menyebutkan bahwa penggunaan pestisida dengan penyemprotan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan pestisida, gangguan sistem pernapasan, dan dapat menimbulkan kematian jika tidak segera diberikan pertolongan.

Berdasarkan peralatan semprot dan tangki/pompa semprot, Berikut Proses persiapan air pestisida pelarut adalah sebagai berikut :

- a. Pakai air bersih seperlunya
- b. Gunakan pH meter nitrit untuk mengukur pH air
- c. Jika pH air > 7 , tambahkan asam nitrat seperlunya
- d. Ukur kembali pH air tersebut, jika pH < 7 , maka dia bisa menggunakan air membuat larutan pestisida.

Operasi afikasi cairan semprotan belakang adalah:

- a. Tuang pestisida ke dalam ember berisi air
- b. Aduk merata
- c. Tuangkan cairan semprotan ke tangki semprot

Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengadukan dengan benar untuk mendapatkan larutan yang seragam, sebab itu larutan semprot tidak akan seragam sehingga efektivitas pestisida akan berkurang. Jika menggunakan alat penyemprot bertekanan tinggi (penyemprot listrik), terlebih dahulu encerkan pestisida tambahkan air dalam mangkuk kecil dan aduk hingga merata. Selanjutnya siapkan

wadah lebar (ember) dan tambahkan air ke volume yang dibutuhkan. Secara bertahap tambahkan larutan pestisida encer ke dalam ember berisi air bersih dan aduk hingga larutan pestisida merata (Prabaningrum & Moekasan, 2011).

4. Penggunaan APD

Harus cukup besar dan baik untuk melindungi diri. Menggunakan APD terbukti merupakan cara yang tepat, mudah dan efektif untuk mengurangi tingkat risiko kecelakaan kerja terhadap kesehatan. Maka dari itu APD sangat penting bagi pekerja agar melindungi kesehatan di lingkungan sekitar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenakertrans) Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri yaitu :

a. Pelindung Pernafasan

Perlengkapan penyokong pernapasan dan perlengkapannya ialah alat pelindung yang menaungi bagian pernafasan dengan mengarahkan hawa suci dan fit dan/atau menapis polutan kimia, bakteri, abu, terang laras (*aerosol*), setum, dan gas (Zuraida, 2012).

b. Alat Pelindung Tangan

Protector tangan (*glove*) ialah aparat protector yang dipakai untuk menaungi tangan dan jemari dari api, panas, suhu rendah, radiasi elektromagnetik, radiasi pengion, arus listrik, bahan kimia, sengatan listrik, tubrukan dan goresan serta infeksi parasit dan jenis mikroorganismenya (Sharma et al., 2019)

c. Pakaian pelindung

Pakaian pelindung digunakan untuk meneduhi separuh hingga semua tubuh dari suhu tinggi atau rendah yang lewat batas, eksplikasi bara dan barang panas, bahan kimia termal, eceran dan metal, uap panas, mesin, peralatan dan benturan bahan, luka, radiasi, binatang, manusia, mikroorganisme parasit binatang, tumbuhan dan zona seperti virus, kuman dan serat (Fajriani et al., 2019).

d. Alat pelindung kaki

Alat pelindung kaki dipakai dalam melingkupi kaki dari benda berat terhimpit atau terantuk, benda tajam terkacak, kontak dengan eceran panas atau dingin, uap panas, paparan cuaca yang bahaya, paparan bahan bala kimia dan mikroba juga terhindar dari terpeleset (Fajriani et al., 2019).

5. *Personal Hygiene*

Kebersihan pribadi dapat diartikan sebagai praktik yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama melalui kebersihan individu. Kebersihan yang baik merupakan penghalang utama untuk banyak penyakit menular, termasuk penyakit feses-oral dan yang meningkatkan kesejahteraan kesehatan. Untuk mencapai manfaat kesehatan yang signifikan, hygiene yang lebih baik harus dibangun bersamaan dengan pembangunan sanitasi dan air bersih, dan digabungkan dengan intervensi lain yang sama-sama meningkatkan pendapatan. *Personal hygiene* sangat penting untuk petani untuk memberikan kesadaran terkait kebersihan pribadi (Satish et al., 2020).

a. Pengertian *Personal Hygiene*

Setiap diri manusia harus melakukan kebersihan diri sendiri agar dapat mempertahankan kesehatan secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu ada istilah pengertian *personal hygiene* atau *hygiene* perseorangan sebagai pengertian upaya dari seseorang untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan diri sendiri (Yulianto et al., 2020).

b. Tujuan *Personal Hygiene*

Untuk mewujudkan *Personal Hygiene* tentu ada tujuan yang hendak dicapai, antara lain :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan seseorang
- 2) Memelihara kebersihan diri sendiri orang
- 3) Memperbaiki kekurangan pada personal hygiene
- 4) Melakukan pencegahan timbulnya penyakit
- 5) Menumbuhkan kepercayaan diri seseorang
- 6) Menciptakan ada kesan keindahan

c. Faktor yang mempengaruhi *Personal Hygiene*

Untuk mendukung *Personal Hygiene* ada pada diri seseorang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor itu antara lain meliputi :

- a. *Body Image* adalah gambaran individu terhadap dirinya yang sangat mempengaruhi kebersihan diri, misalnya karena ada perubahan fisik sehingga individu tidak peduli dengan kebersihan.

b. Praktik Sosial

Pada situasi ini, setiap manusia dari kecil sudah dididik dengan kebersihan diri tentu akan mengubah pola tentang kebersihan dirinya.

c. Status sosial ekonomi

Setiap mewujudkan *Personal Hygiene* tentu memerlukan biaya atau cost untuk membeli bahan-bahan untuk membersihkan diri, sehingga orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan menyisihkan anggarannya untuk perawatan diri namun sebaliknya yang berpenghasilan rendah atau ekonomi rendah sehingga mengesampingkan perawatan dirinya.

d. Pengetahuan

Seseorang akan mempunyai pengetahuan yang baik tentang *personal hygiene* akan meningkatkan kesehatan dirinya.

Dalam penelitian Amin, (2022) menunjukkan bahwa *personal hygiene* berhubungan dengan keracunan karena tidak adanya kesadaran petani dalam kebersihan tubuh dan pakaiannya, yang seharusnya mencuci tangan setelah bekerja menggunakan sabun, langsung mandi dan mencuci pakaian kerja agar pestisida yang menempel segera dibersihkan sebelum terjadinya keracunan. Namun sebagian kecil responden pada penelitian ini tidak langsung mencuci pakaian kerja yang digunakan, tapi hanya disimpan dan dipakai kembali pada saat bekerja.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pestisida

1. Pengertian Pestisida

Kata pestisida berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu *pest* (hama) dan *cide* (membunuh). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pestisida merupakan zat beracun untuk membunuh hama atau racun pembasmi hama. FAO sendiri mengartikan pestisida sebagai campuran zat yang bertujuan untuk mencegah, membunuh, atau mengendalikan hama tertentu, termasuk vektor penyakit bagi manusia dan hewan, spesies tanaman atau hewan tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerusakan selama produksi, pemrosesan, penyimpanan, transportasi, atau pemasaran bahan pertanian (Nasution, 2022)

Menurut peraturan Pemerintah No.7 tahun 1973, pengertian pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk (Nasution, 2022) :

- a. Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit penyakit yang merusak tanaman atau hasil hasil pertanian.
- b. Memberantas rerumputan.
- c. Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman atau bagian bagian tanaman , tidak termasuk pupuk.
- d. Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada 9 hewan-hewan peliharaan dan ternak.
- e. Memberantas dan mencegah hama-hama air.
- f. Memberikan atau mencegah binatang-binatang dan jasad jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan alat-alat pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang binatang

yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah, dan air.

2. Jenis Pestisida dan Cara Masuk Pestisida ke dalam Tubuh

Berdasarkan organisme target dan cara kerjanya, pestisida dapat digolongkan sebagai berikut (Nasution, 2022) :

a. Insektisida

Insektisida ialah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang dapat mematikan seluruh jenis serangga. Serangga menyerang tanaman untuk mendapatkan makanan dengan berbagai metode sesuai dengan jenis mulutnya. Insektisida yang berasal dari kata *insectum*, artinya keratin segmen tubuh. Contohnya adalah *Lirocide* dan *Sevin*.

b. Fungisida

Fungisida adalah jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan (membunuh, menghambat atau mencegah) jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit. Bentuk fungisida bermacam-macam, ada yang berbentuk tepung, cair, gas dan butiran. Fungisida yang berbentuk tepung dan cair adalah yang paling banyak digunakan. Fungisida dalam bidang pertanian digunakan untuk mengendalikan cendawan pada benih, bibit, batang, akar, daun, bunga dan buah. Aplikasinya dilakukan dengan penyemprotan langsung ke tanaman, injeksi batang, pengocoran pada akar, perendaman benih dan pengasapan (fumigan).

c. Herbisida

Herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengendalikan, mematikan, atau menghambat pertumbuhan gulma tanpa mengganggu tanaman pokok yang dapat mempengaruhi satu atau lebih proses-proses (seperti pada proses pembelahan sel, perkembangan jaringan, pembentukan klorofil, fotosintesis, respirasi, metabolisme nitrogen, aktivitas enzim dan sebagainya) yang sangat diperlukan tumbuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

d. Bakterisida

Bakterisida berasal dari kata latin bacterium, atau kata Yunani bakron, berfungsi untuk membunuh bakteri. Bakterisida adalah jenis pestisida yang dibuat dan digunakan secara spesifik untuk mengendalikan penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh bakteri. Bakterisida antara lain dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit layu bakteri, busuk bakteri, kerak bakteri, hawar daun bakteri, bercak bakteri, bacterial speck dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri lainnya.

e. Nematisida

Nematisida adalah jenis pestisida kimia yang digunakan untuk membunuh nematoda parasit tanaman. Nematisida berasal dari kata latin nematoda atau bahasa yunani berarti benang (semacam cacing yang hidup di akar). Hama jenis cacing biasanya menyerang akar dan umbi tanaman. Nematisida bersifat dapat meracuni tanaman, jadi

penggunaannya 3 minggu sebelum musim tanam. Nematisida biasanya digunakan pada perkebunan kopi atau lada.. Selain memberantas nematoda, obat ini juga dapat memberantas serangga dan jamur.

f. Akarisida

Akarisida, yang berasal dari akari (kata Yunani) dan diartikan tungau atau kutu. Akarisida sering juga disebut mitesida, yang bertujuan membunuh tungau atau kutu yang memiliki kandungan senyawa kimia beracun yang berfungsi untuk membunuh tungau dan laba-laba. Daun, batang, dan buah merupakan bagian yang dapat diserang oleh tungau dan laba-laba. Bagian tanaman yang diserang dapat secara menimbulkan perubahan warna, bentuk, tonjolan, atau buah jatuh. Contoh akarisida yaitu *Kelthane MF* dan *Trithion*.

g. Rodentisida

Rodentisida, berasal dari kata rodere dan diartikan seperti pengerat. Rodentisida merupakan bahan kimia yang apabila masuk ke dalam tubuh seperti tikus akan mengganggu metabolismenya sehingga menyebabkan tikus keracunan dan mati. Jenis pestisida ini merupakan yang paling efektif digunakan dalam membunuh hewan pengerat yang mengganggu pertumbuhan tanaman pangan dan tanaman perkebunan.

Tabel 2.1 Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani

Pestisida	Golongan	Jenis pestisida
WHO Grade I		
Beta Siflur	Pyrethoid	Insektisida
Karbofuran	Carbamate	Insektisida
Metamidofos	Organophosphate	Insektisida
Triazophos	Organophosphate	Insektisida
WHO Grade II		
Alfa Sipermetrin	Pyrethoid	Insektisida
Amitranz	Formamidine	Insektisida
Bifenthrin	Pyrethoid	Insektisida
Deltametrin	Pyrethoid	Insektisida
Difenokonazol	Azone	Insektisida
Dimehypo/Bensultup	Nereistoxin	Insektisida
Analogue		
Fenpropathrin	Pyrethoid	Insektisida
Fipronil	Pyrazol	Insektisida
Imidakloprid	Neonicotinoid	Insektisida
Karbonsulfan	Carbamate	Insektisida
Katap Hidroksida	Nereistoxin	Insektisida
Analogue		
Klofenapir	Pyrazol	Insektisida

Pestisida	Golongan	Jenis pestisida
Lamda Sihalotrin	Pyrethoid	Insektisida
MICP/Isoprokard	Carbamate	Insektisida
Permethrin	Pyrethoid	Insektisida
Profenpos	Organophosphate	Insektisida
WHO Grade III		
Cyromazine	Triazin	Insektisida
Diafenthuron	Urea	Insektisida
Iprodione	Dicarboximide	Insektisida
WHO Grade IV		
Klorantraniliprol	Diamide	Insektisida
Klorfuazuro	Urea	Insektisida
Klorpirifos	Organophosphate	Insektisida

Sumber : Moekasan & Prabaningrum, 2011

Pestisida masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya absorpsi melalui kontak kulit, tertelan, dan terhirup. Absorpsi lewat kulit atau subkutan dapat terjadi jika substansi toksik menetap di kulit dalam waktu lama. Kontaminasi lewat kulit merupakan kontaminasi yang paling sering terjadi, meskipun tidak seluruhnya berakhir dengan keracunan akut. Lebih dari 90% kasus keracunan di seluruh dunia disebabkan oleh kontaminasi lewat kulit. Risiko keracunan semakin besar jika nilai lethal dose 50 (LD₅₀) semakin kecil, konsentrasi pestisida yang menempel pada kulit semakin pekat, formulasi pestisida dalam bentuk yang mudah diserap,

kulit yang terpapar lebih mudah menyerap seperti punggung tangan, area yang terpapar luas serta jika kondisi sistem kekebalan individu sedang lemah.

Keracunan pestisida karena partikel pestisida terhisap lewat hidung merupakan yang terbanyak kedua sesudah kontaminasi kulit. Gas dan partikel semprotan yang sangat halus (misalnya, kabut asap dari fogging) dapat masuk kedalam paru-paru, sedangkan partikel yang lebih besar akan menempel di selaput lendir hidung atau di kerongkongan. Bahaya penghirupan pestisida lewat saluran pernapasan juga dipengaruhi oleh LD₅₀ pestisida yang terhirup dan ukuran partikel dan bentuk fisik pestisida. Pestisida berbentuk gas yang masuk ke dalam paru-paru dan sangat berbahaya. Partikel atau droplet yang berukuran kurang dari 10 mikron dapat mencapai paru-paru, namun droplet yang berukuran lebih dari 50 mikron mungkin tidak mencapai paru-paru, tetapi dapat menimbulkan gangguan pada selaput lendir hidung dan kerongkongan. Toksisitas droplet/gas pestisida yang terhisap ditentukan oleh konsentrasinya di dalam ruangan atau di udara, lamanya paparan dan kondisi fisik individu yang terpapar. Pekerjaan yang menyebabkan terjadinya kontaminasi lewat saluran pernafasan umumnya pekerjaan yang terkait dengan penyemprotan lahan pertanian, fogging atau alat pembasmi serangga domestik.

Cara yang ketiga adalah intake lewat mulut (oral). Peristiwa keracunan lewat mulut sebenarnya tidak sering terjadi dibandingkan kontaminasi kulit atau keracunan karena terhirup. Contoh oral intake misalnya kasus bunuh diri, makan minum merokok ketika bekerja dengan pestisida, menyeka keringat dengan sarung tangan atau kain

yang terkontaminasi pestisida, drift atau butiran pestisida yang terbawa angin masuk ke mulut, meniup nozzle yang tersumbat dengan mulut, makanan dan minuman terkontaminasi pestisida (Pamungkas, 2016).

Menurut Siahaan (2020) menyebutkan bahwa penggunaan pestisida dengan penyemprotan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti keracunan pestisida, gangguan sistem pernafasan, dan dapat menimbulkan kematian jika tidak segera diberikan pertolongan.

3. Faktor Risiko Dampak Paparan Pestisida

Keracunan pestisida pada petani terkait dengan beberapa faktor yaitu: faktor dari dalam tubuh (internal) dan dari luar tubuh (eksternal). Faktor dalam tubuh misalnya umur, jenis kelamin, genetik, status gizi, kadar hemoglobin, tingkat pengetahuan dan status kesehatan. Sedangkan faktor dari luar tubuh mempunyai peranan yang besar antara lain : banyaknya pestisida yang digunakan, jenis pestisida, dosis pestisida, frekuensi penyemprotan, pemakaian APD, cara penanganan pestisida, kontak terakhir dengan pestisida, ketinggian tanaman, suhu lingkungan, waktu penyemprotan (Hayati et al., 2018).

Hampir semua penyakit kronis yang diderita oleh petani diakibatkan oleh penggunaan pestisida semprot yang dilepaskan ke udara, yang apabila dihirup melalui hidung dan masuk melalui mulut maka zat-zat beracun tersebut dapat masuk ke paru-paru dan merusaknya, dan dengan cepat pestisida masuk ke dalam darah dan menyebar racun ke seluruh tubuh. Pertambahan usia merupakan faktor risiko penting pada pria dan wanita. Hal ini

kemungkinan disebabkan banyak faktor, seperti peningkatan kadar asam urat serum (penyebab yang paling sering adalah karena adanya penurunan fungsi ginjal), peningkatan pemakaian obat diuretik, dan obat lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat serum (Firdayanti, Susanti, 2019)

4. Toksisitas Pestisida

Toksisitas (*toxicity*) atau daya racun pestisida merupakan sifat bawaan pestisida yang menggambarkan potensi pestisida tersebut dalam menimbulkan kematian langsung pada manusia tingkat tinggi. Toksisitas dinyatakan dalam LD_{50} yaitu dosis yang mematikan 50% yang dihitung dalam mg/kg. Namun, antara LD_{50} *oral* dan LD_{50} *dermal* dibedakan. LD_{50} *oral* merupakan kematian yang terjadi bila termakan dan LD_{50} *dermal* merupakan kematian karena keracunan lewat kulit.

Parameter lain yang juga digunakan untuk menilai daya racun pestisida adalah LC_{50} untuk toksisitas konsentrasi pestisida. Parameter ini berarti konsentrasi yang mematikan yaitu 50%.

Tabel 2.1 Klasifikasi tingkat bahaya pestisida menurut WHO

	Kelas bahaya	LD ₅₀ untuk tikus (mg/kg berat badan)			
		Melalui mulut (<i>oral</i>)		Melalui kulit (<i>dermal</i>)	
		Padat	Cair	Padat	Cair
IA	Sangat berbahaya	<5	<20	<10	<40
IB	Berbahaya	5-50	20-200	10-100	40-400
II	Cukup berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III	Agak berbahaya	>500	>2000	>1000	>4000

Sumber: Djojosumarto, 2000

5. Dampak Pestisida Terhadap Kesehatan

Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya misalnya keracunan. Pestisida yang digunakan secara berlebihan atau tidak tepat akan menimbulkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, seperti meninggalkan residu pada tanaman dan tanah. Jika residu pestisida pada tanaman tersebut termakan oleh manusia dapat terakumulasi dalam tanah sehingga mempengaruhi organisme di dalamnya (Andesgur, 2020).

Penggunaan pestisida yang berlebih menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Salah satu dampak penggunaan pestisida yang berlebih ialah timbulnya resistensi OPT terhadap pestisida yang memaksa petani harus mengeluarkan

pengendalian lebih tinggi. Kondisi ini secara ekonomi akan menimbulkan beban bagi masyarakat karena biaya produksi semakin tinggi menyebabkan meningkatnya harga jual yang akan membebani konsumen (Hudayya & Jayanti, 2012).

D. Hubungan Paparan Pestisida dengan Gout Arthritis

Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa konsentrasi serum dari beberapa *Persistent Organic Pollutants* (POPs) di antara kelas *Organizing Committee* (OC) pestisida, *Polychlorinated dibenzodioxins* (PCDD), dan *Polychlorinated Biphenyls* (PCB) mirip dioksin berhubungan positif dengan risiko *gout arthritis* pada populasi umum. Selain itu, semua asosiasi ini tampak menguat di antara subjek tanpa *metabolic equivalent of task* (MetS) menunjukkan kemungkinan peran utama POPs dalam patogenesis *gout arthritis* terlepas dari *metabolic equivalent of task* (MetS). Selama beberapa dekade terakhir, banyak studi epidemiologi telah menunjukkan hubungan antara *gout arthritis*.

Beberapa mekanisme yang menghubungkan *gout arthritis* dan MetS telah disarankan. Pertama, resistensi insulin dapat memainkan peran penting karena resistensi insulin dapat menyebabkan penurunan ekskresi asam urat. Dengan demikian perbaikan resistensi insulin baik dengan diet rendah energi atau agen sensitisasi insulin ditemukan untuk menurunkan kadar asam urat serum. Kedua, karena peningkatan asam urat memprediksi risiko MetS di masa depan dalam studi *cohort* prospektif, kemungkinan bahwa *hyperuricemia* itu sendiri dapat terlibat langsung dalam patogenesis MetS.

Ada bukti substansial tentang hubungan antara POPs dan MetS. Studi cross-sectional dan prospektif telah menunjukkan hubungan yang

kuat antara latar belakang paparan POPs dan semua komponen sindrom metabolik pada populasi umum. Selain itu, penelitian pada hewan melaporkan bahwa paparan POPs campuran melalui minyak ikan yang terkontaminasi menyebabkan aksi insulin sistemik yang sangat terganggu dan mendorong perkembangan obesitas perut, dislipidemia, dan steatosis hati. Karena temuan saat ini adalah bahwa paparan latar belakang POPs dikaitkan dengan konsentrasi UA bahkan tanpa adanya MetS, temuan *cross-sectional* kami konsisten dengan hipotesis kami bahwa paparan latar belakang POPs adalah penyebab umum hiperurisemia dan MetS. Karena POPs sering hadir dalam populasi umum sebagai campuran bahan kimia lipofilik dan bahan kimia dalam campuran tersebut cenderung berkorelasi tinggi, POPs dapat dikaitkan dengan kondisi termasuk hiperurisemia dan sindrom metabolik, terkait dengan berbagai penyakit di Amerika Serikat, meskipun asosiasi dengan POP tertentu dapat bervariasi (Lee et al., 2013).

E. Integrasi Keislaman

Islam merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk aktif mencari rezeki dan karunia Allah di muka bumi dan memberikan manfaat bagi manusia bahkan bagi makhluk lainnya. Sumber daya alam ini yang menjadi penopang hidup manusia di bumi dengan memanfaatkannya. Berkaitan dengan hal ini, maka Allah SWT berfirman dalam QS Al-Mu'minun 23 : 19-21

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِ

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya :

“Maka Kami timbulkan di dalamnya kebun-kebun untuk kamu, dari kurma dan anggur-anggur. Dan untuk kamu pula buah-buahan bermacam-macam banyaknya, dan dari padanyalah kamu makan. Dan pohon kayu yang keluar dari bukit Thursina, tumbuh dengan minyak dan bumbu campuran untuk orang-orang makan. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak adalah sesuatu yang patut kamu ambil ibarat; Kami beri minum kamu daripada apa yang keluar dari dalam perutnya dan ada pula yang manfaatnya banyak sekali untuk kamu, daripadanya pula kamu semua makan”

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, menyatakan bahwa kami jadikan air itu tersimpan di bumi, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur serta kebun-kebun yang lain; di sana, yakni dalam kebun-kebun tersebut, kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, dan menjadi salah satu jenis makanan yang baik dan menyehatkan. Atas rahmat kami pula kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh pertama kali dari gunung sinai dengan berbagai manfaatnya; buah yang menghasilkan minyak dan menjadi bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Allāh mengingatkan akan kesempurnaan kekuasaan-Nya dalam menciptakan segala perkara denganberbeda dan variatif dari bahan yang satu, yaitu air yang diturunkan dari langit. Air hujan dapat mengeluarkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Berkaitan dengan hal ini, maka Allah SWT berfirman dalam QS Al-An'am 6 : 6

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِدُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.


Tafsir Kementerian Agama Saudi Arabia, mengungkapkan apakah tidak mengetahui orang-orang yang mengingkari keesaan Allah dan keberkahan Nya untuk diibadahi dan juga mendustakan RasulNya, Muhammad, sesuatu yang telah menimpa umat-umat yang telah mendustakan (para Rasul) sebelumnya, berupa kebinasaan dan kehancuran. Padahal sebelumnya kami telah memberikan kekuasaan besar di muka bumi dengan kekuasaan yang tidak diberikan kepada kalian wahai orang-orang kafir, dan kami melimpahkan kenikmatan bagi mereka dengan menurunkan banyak hujan dan mengalirnya aliran sungai-sungai dari bawah tempat tinggal mereka. Sebagai istidraj dan penanguhan siksa. Maka mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan itu dan mendustakan para rasul. Akibatnya, kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka dan kami adakan generasi-generasi manusia berikutnya yang menggantikan mereka untuk mengurus pengelolaan bumi?

Dari ayat-ayat yang disebutkan dapat dipahami bahwa islam memberi perhatian khusus terhadap agrikultur. Sisi lain yang menarik dari penutup ayat yang terletak pada akhiran yang menyebutkan ayat pertama dengan, tidakkah kalian bersyukur, ayat kedua ditutup dengan, tidakkah kalian berpikir, dan ayat ketiga diakhiri, tidakkah kalian beriman. Hal ini

menunjukkan bahwasanya Allah yang telah menyediakan irigasi alami berupa air hujan dan dalam pertanian bahwa hanya kuasa Allah lah yang menumbuhkan segala jenis tanaman. Karenanya kehidupan ini berlangsung, lalu terjalinlah rantai makanan pada makhluk hidup. Proses ini perlu dipikirkan oleh manusia, maka lahirlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuannya agar keyakinan manusia semakin kuat akan kuasa Allah yang tak terhingga. Di antara tanaman yang tumbuh di bumi, ada yang tumbuh dengan sendirinya, dan ada juga yang butuh campur tangan manusia untuk menanam dan merawat baru bisa dinikmati hasilnya, hal ini disebut pertanian (Mahzumi & Hamid, 2019).

Dampak penggunaan Pestisida yang berlebihan dan tidak memenuhi syarat yaitu pertama, penggunaan pestisida yang berlebihan mampu merusak lingkungan disebabkan bahan kimia sebagai zat yang terkandung dalam pestisida. Lingkungan akan tercemar oleh zat kimia yang terkandung. Pencemaran pestisida pada unsur air dan tanah ini akan mengganggu ekosistem. Dan pencemaran inipun akan kembali lagi pada manusia. Kedua, pestisida berlebih akan mengakumulasi bahan penumpukan bahan kimia pada hasil pertanian. Ketiga, Pestisida menyebabkan keracunan. Tingkat keracunan ini tidak hanya akan terjadi pada binatang sekitar area pertanian. Melainkan, terjadi juga pada manusia dan hewan ternak lainnya. Oleh sebab itu, penggunaan pestisida harus lebih diperhatikan takaran dan tingkat efisiensinya. Hal ini sesuai juga dengan tuntunan islam dalam etika-etika sesama makhluk, hingga pada binatang pun. Sehingga, diharapkan walaupun mengendalikan hama pengganggu tanaman, akan tetapi perlu diwaspadai tentang dampak-dampak pada lingkungan dan hewan yang lainnya.


F. Kerangka Teori



Bagan 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Habibi et al, 2022

G. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

 : Variabel Independen
 : Variabel Dependen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasi analitik dengan pendekatan *cross sectional study*. *Cross sectional* merupakan suatu penelitian yang mengumpulkan data sesuai kondisi atau situasi saat penelitian secara bersamaan dalam satu waktu, sehingga pengumpulan data cukup dilakukan pada waktu penelitian tanpa harus melihat kejadian yang telah lalu ataupun yang akan datang Siswanto, et al., (2018). *Cross Sectional* bertujuan untuk mengetahui hubungan paparan pestisida terhadap *gout arthritis* berdasarkan masa kerja, lama kerja, cara penyemprotan, *personal hygiene*, dan penggunaan APD pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2023 di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Kanreapia berprofesi sebagai petani dan menjadi salah satu daerah dengan mata pencaharian sebagai petani terbesar di Sulawesi Selatan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada daerah tersebut untuk melihat hubungan paparan pestisida yang dapat menyebabkan *gout arthritis* pada petani sayur.

C. Populasi dan Sampel

Adapun jumlah petani di Desa Kanreapia berjumlah 216 orang petani, sehingga diperoleh jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 216 orang petani yang ada di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sutrisno et al., 2022).

Kriteria Inklusi :

1. Petani yang aktif menggunakan pestisida
2. Bersedia menjadi responden
3. Petani yang bekerja di Desa Kanreapia

Kriteria Eksklusi :

1. Menderita penyakit berat

Dalam penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Apabila populasi telah diketahui maka teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus Slovin, rumus tersebut sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d² = Presisi (5%)

$$n = \frac{N}{1 + Nd^2}$$

$$n = \frac{216}{1 + 216 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{216}{1 + 216(0,0025)}$$

$$n = \frac{216}{1,65} = 131$$

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus Slovin adalah 131 sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan menurut sumbernya ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan melalui wawancara, observasi, pemberian kuesioner dan pengukuran menggunakan alat ukur *Easy Touch* GCU. Setelah itu data yang diperoleh pada penelitian tersebut dikelola menggunakan aplikasi SPSS.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dan mengumpulkan data profil yang diperoleh dari petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau seperangkat alat yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial masyarakat Sofiyana et al., (2022). Dalam penelitian ini instrumen penelitian

yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang akan dijawab oleh responden.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner untuk mengetahui tingkat *gout arthritis* yaitu: masa kerja, lama kerja, cara penyemprotan, *personal hygiene* dan penggunaan APD dan data karakteristik terdiri dari 3 butir pertanyaan yaitu, nama, usia, riwayat penyakit *gout arthritis*.

F. Instrumen Pengumpulan Data

1. Uji kadar *Gout Arthritis*

a. Alat dan bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur kadar *gout arthritis* pada petani sayur adalah *Easy Touch GCU*. Adapun bahan yang digunakan yaitu lancet, kapas, alkohol, stick Uric Acid, darah kapiler.

b. Pengambilan Sampel

- 1) Dibersihkan salah satu ujung jari yang akan diambil menggunakan kapas alkohol 70% tunggu sampai kering, di pegang salah satu bagian ujung jari yang akan ditusuk dan di tekan supaya berkurang rasa nyeri.
- 2) Tusuk salah satu ujung jari dengan cepat dan ditekan ujung jari dengan perlahan untuk mendapatkan cukup darah.
- 3) Lalu di buang tetesan darah yang pertama keluar dengan kapas kering, dan tetesan selanjutnya di pakai untuk pemeriksaan.
- 4) Mengambil 1 strip, masukan pada alat pengukur dan secara otomatis alat akan hidup layar akan menampilkan nomor kode strip.

- 5) Lalu yakinkan nomor kode sama dengan pembungkus strip.
- 6) Kemudian akan dilihat gambaran tetesan darah, dan teteskan darah sampel pada zona reaksi pada strip test.
- 7) Dalam hitungan 30 detik layar akan menampilkan hasil pemeriksaan kadar asam urat.

2. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan Data

Semua fakta yang diperoleh termasuk data primer dan data sekunder, diselesaikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Menata Data (*Editing*)

Sebelum pengolahan data perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu, dengan memverifikasi kelengkapan dan konsistensi kuesioner, verifikasi ini dapat dilakukan saat pengumpulan data di tempat.

b. Mengkode Data (*Coding*)

Coding adalah suatu kegiatan yang memberikan kode-kode untuk tanggapan terhadap kuesioner yang ada untuk mempengaruhi proses pengolahan yang terkomputerisasi.

c. Memasukkan Data (*Entry*)

Setelah dilakukan *coding* lalu diolah dalam program komputer.

d. Membersihkan Data (*Cleaning*)

Memeriksa data yang telah dimasukkan agar menciptakan data yang sesuai.

2. Analisis Data

Keterangan yang didapatkan diolah dan menyatakan dalam bentuk tabel dan disertakan dengan penjelasan variabel yang merupakan faktor yang dapat menyebabkan kapasitas paru pada petani menggunakan program SPSS.

a. Analisis Univariat

Univariat berfungsi untuk memperoleh gambaran secara deskriptif yang meliputi distribusi frekuensi dari variabel dependen yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan uji *chi-square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = < 0,05$. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai $p \leq 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan tidak bermakna apabila nilai $p \geq 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

3. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah sebagai suatu seperangkat aturan dan prinsip-prinsip etik yang disepakati bersama menyangkut hubungan antara peneliti di satu sisi dan semua yang terlibat dalam penelitian atau partisipan penelitian di sisi yang lain. Masalah etika yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah sebagai berikut (Siswanto, et al., 2018) :

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden), *Informed consent* dilakukan dengan melalui instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang disebarkan secara langsung serta menjelaskan kepada responden tujuan yang dilakukan pada penelitian ini. Jika subjek tidak mengisi kuesioner peneliti tidak boleh memaksa subjek dengan tindakan lainnya agar tetap menghormati hak yang dimiliki responden.
2. *Anonymity* (Tanpa Nama), dengan menjaga kerahasiaan responden pada kuesioner, responden tidak disebutkan namanya karena peneliti hanya meminta memasukkan kode atau inisial dari nama responden, seperti (N) sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan responden.
3. *Confidentiality* (Kerahasiaan), Peneliti harus memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dengan hanya menunjukkan data yang didokumentasikan sebagai hasil studi. Ketika hasil diberikan, data yang tidak diperlukan oleh peneliti tidak disertakan, sehingga kuesioner yang digunakan, untuk melihat fenomena kecemasan, pada saat selesai mempresentasikan hasil penelitian dihilangkan.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “kanre” dan “api” yang artinya “terbakar” dan “api” Menurut cerita leluhur orang tua, nama tersebut mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama KANREAPIA sampai sekarang. Menjadi desa persiapan pada tahun 1985 dan definitif menjadi Desa Kanreapia pada Tahun 1990.

Wilayah Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geologis berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan selain itu, kondisi alam Desa Kanreapia yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta cuaca yang dingin. Oleh karena itu, Desa Kanreapia sangat cocok sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobby outbound serta menjadikan Desa Kanreapia sebagai tempat beristirahat atau tempat untuk memulihkan kesehatan.

Desa kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 600-1050 dpl (diatas permukaan laut) dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam pertahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata pertahun adalah 30 s/d 50 °C. Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa (Pemerintah Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao, 2023).

1. Demografi / Batas Desa

Disebelah utara : berbatasan dengan desa Tonasa

Di Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba

Disebelah Barat : berbatasan dengan kecamatan Tinggimoncong

Disebelah Timur : berbatasan dengan Bolaromang

2. Jarak

Jarak dari ibu kota Kecamatan 14 Km

Jarak dari ibu kota Kabupaten 84 Km

Jarak dari ibu kota Provinsi 94 Km

3. Luas Wilayah Desa Dalam tata Guna Lahan

Luas Wilayah Desa Kanreapia 17.75 Km Persegi terdiri dari:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Kanreapia

No	Wilayah	%
1	Persawahan	153,0ha(8,6%)
2	Lahan perusahaan/HGU	120,0ha(6,8%)
3	Badan Jalan	43,6ha(0,8%)
4	Perumahan,Kantor dan Kebun	1304,2ha(73,5%)
5	Pasar dan Terminal	1,5ha(0,1%)
6	Bukit,Hutan,Rakyat dan Tegalan	135,0ha(7,6%)
7	Sungai,Sempadan dan Pengendali	1,7ha(0,1%)
8	Pekuburan Muslim	3,5ha(0,2%)
9	Lapangan Olahraga	2,5ha(0,1%)
Jumlah		1.775,0ha (100%)

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao

Secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa tanaman hortikultura maupun tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan (Penggemukan Sapi). Wilayah desa kanreapia terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu.

Tabel 4.2 Wilayah Desa Kanreapia

No	Nama Dusun	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	Bontona	2	4
2	Bontolebang	3	8
3	Kanreapia	2	4
4	Halahalaya	2	6
5	Balang Lohe	2	4
6	Parang Boddong	3	6
7	Silanggaya	2	4
Jumlah		16	36

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a) Usia

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Usia	Frekuensi	Persentasi (%)
12-25	15	11,5
26-45	49	37,4
46-65	67	51,1
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan usia pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 terdapat responden sebagian besar responden berusia 46-65 tahun dengan jumlah 67 orang (51,1%) dan sebagian kecil responden berusia 12-25 tahun dengan jumlah 15 orang (11,5%). Petani termuda adalah 19 tahun dan yang tertua 65 tahun. Rata-rata umur sebesar 44 tahun dan nilai median dari 131 petani sebesar 47 dengan standar deviasi 12,18.

b) Hasil Pemeriksaan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Kadar <i>Gout Arthritis</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Normal	59	45
Normal	72	55
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan hasil pemeriksaan Kadar *Gout Arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagian kecil responden dengan jumlah 59 orang (45%) memiliki hasil pemeriksaan Kadar *Gout Arthritis* tidak normal dan sebagian besar responden dengan jumlah 72 orang (55%) memiliki hasil pemeriksaan Kadar *Gout Arthritis* normal.

c) Riwayat Penyakit Gout Arthritis

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Riwayat Penyakit *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Riwayat Penyakit <i>Gout Arthritis</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Ada	101	77,1
Ada	30	22,9
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan riwayat penyakit *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak ada riwayat dengan jumlah 101 orang (77,1%) dan sebagian kecil responden ada riwayat dengan jumlah 30 orang (22,9%).

2. Analisis Univariat

a) Lama Kerja

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Berisiko	119	90,8
Tidak Berisiko	12	9,2
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan lama kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden berisiko dengan jumlah 119 orang (90,8%) dan sebagian kecil responden tidak berisiko dengan jumlah 12 orang (9,2%). Lama kerja petani berkisar 3 sampai 8 jam/hari. Rata-rata lama kerja sebesar 7 jam/hari dan nilai median dari 131 petani sebesar 8 dengan standar deviasi 1,31.

b) Masa Kerja

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Lama	125	95,4
Baru	6	4,6
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan masa kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja lama dengan jumlah 125 orang (95,4%) dan sebagian kecil responden memiliki masa kerja baru dengan jumlah 6 orang (4,6%). Masa kerja

petani terbaru adalah 2 tahun dan terlama 55 tahun. Rata-rata masa kerja sebesar 8 tahun dan nilai median dari 131 petani sebesar 30 dengan standar deviasi 13,66.

c) **Cara Penyemprotan**

Tabel 4.8 Distribusi Responden Berdasarkan Cara Penyemprotan Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Cara Penyemprotan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Memenuhi Syarat	115	87,8
Memenuhi Syarat	16	12,2
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan cara penyemprotan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak memenuhi syarat dengan jumlah 115 orang (84%) dan sebagian kecil responden memenuhi syarat dengan jumlah 16 orang (16%).

d) Penggunaan Alat Pelindung Diri

Tabel 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Penggunaan Alat Pelindung Diri	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Lengkap	57	43,5
Lengkap	74	56,5
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan penggunaan APD pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian kecil responden tidak memakai lengkap dengan jumlah 57 orang (43,5%) dan sebagian besar responden memakai lengkap dengan jumlah 74 orang (56,5%).

e) *Personal Hygiene*

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan *Personal Hygiene* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

<i>Personal Hygiene</i>	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak Memenuhi	90	68,7
Memenuhi	41	31,3
Total	131	100

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan *personal hygiene* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023 didapatkan bahwa sebagian besar responden tidak memenuhi syarat dengan jumlah 90 orang (68,7%) dan sebagian kecil responden memenuhi syarat dengan jumlah 41 orang (31,3%).

3. Analisis Bivariat

a) Analisis Lama Kerja dan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.11 Hubungan Antara Lama Kerja dengan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Lama Kerja	Kadar <i>Gout Arthritis</i>				Total		P-value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Normal	54	45,4	65	54,6	119	100	1,000
Normal	5	41,7	7	58,3	12	100	
Total	59	45	72	55	131	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa kadar *gout arthritis* tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang bekerja > 5 jam/hari sebanyak 54 orang (45,4 %) dan kadar *gout arthritis* normal banyak ditemukan juga pada petani yang bekerja > 5 jam/hari sebanyak 65 orang (54,6%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh *p-value* 1,000 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

b) Analisis Masa Kerja dan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.12 Hubungan Antara Masa Kerja dengan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Masa Kerja	Kadar <i>Gout Arthritis</i>				Total		P-value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Lama	59	47,2	66	52,8	125	100	0,032
Baru	0	0	6	100	6	100	
Total	59	45	72	55	131	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa kadar *gout arthritis* tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang bekerja > 5 tahun sebanyak 59 orang (47,2 %) dan kadar *gout arthritis* normal banyak ditemukan juga pada petani yang bekerja > 5 tahun sebanyak 66 orang (52,8%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh *p-value* 0,032 ($p = < 0,05$) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur

pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

c) Analisis Cara Penyemprotan dan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.13 Hubungan Antara Cara Penyemprotan dengan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Cara Penyemprotan	Kadar <i>Gout Arthritis</i>				Total		P-value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Memenuhi	56	48,7	59	51,3	110	100	0,047
Memenuhi	3	18,8	13	81,2	21	100	
Total	59	45	72	55	131	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa kadar *gout arthritis* tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang tidak memenuhi syarat sebanyak 56 orang (48,7 %) dan kadar *gout arthritis* normal banyak ditemukan juga pada petani yang tidak memenuhi syarat sebanyak 59 orang (51,3%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh p-value 0,047 ($p = < 0,05$) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

d) Analisis Penggunaan Alat Pelindung Diri dan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.14 Hubungan Antara Penggunaan Alat Pelindung Diri dengan Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

Penggunaan Alat Pelindung Diri	Kadar <i>Gout Arthritis</i>				Total		P-value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Lengkap	24	42,1	33	57,9	57	100	0,678
Lengkap	35	47,3	39	52,7	74	100	
Total	59	45	72	55	131	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa kadar *gout arthritis* tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang menggunakan lengkap alat pelindung diri sebanyak 35 orang (47,3%) dan kadar *gout arthritis* normal banyak ditemukan juga pada petani yang menggunakan lengkap alat pelindung diri sebanyak 39 orang (52,7%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh p-value 0,678 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

e) Analisis *Personal Hygiene* dan Kadar *Gout Arthritis*

Tabel 4.15 Hubungan Antara *Personal Hygiene* dengan Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2023

<i>Personal Hygiene</i>	Kadar <i>Gout Arthritis</i>				Total		P-value
	Tidak Normal		Normal		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Memenuhi	44	48,9	46	51,1	90	100	0,261
Memenuhi	15	36,6	26	63,4	41	100	
Total	59	45	72	55	131	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa kadar *gout arthritis* tidak normal paling banyak ditemukan pada petani yang tidak memenuhi syarat sebanyak 44 orang (48,9%) dan kadar *gout arthritis* normal banyak ditemukan juga pada petani yang tidak memenuhi syarat sebanyak 46 orang (51,1%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh p-value 0,261 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *personal hygiene* dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

C. Pembahasan

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan karakteristik responden diketahui bahwa kategori usia pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tahun 2023 sebagian besar responden berusia 46-65 tahun dengan presentase (51,1%). Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati diukur sejak lahir hingga saat ini (Depkes, 2013). Peningkatan kadar *gout arthritis* tidak hanya dipengaruhi oleh usia, melainkan beragam jenis faktor lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan lainnya. Tidak ada batasan minimal seseorang untuk menjadi petani, namun pada kenyataannya di Desa Kanreapia batasan minimal seseorang menjadi petani saat masa remaja dan sudah cukup kuat untuk bekerja sebagai petani.

Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia didapatkan sebagian besar responden yang tidak memiliki riwayat *gout arthritis* yaitu 101 responden dengan persentase (77,1%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian peningkatan kadar *gout arthritis* tidak semata-mata berhubungan dengan riwayat penyakit *gout arthritis* seseorang, artinya penyakit *gout arthritis* bukan merupakan penyakit bawaan karena terdapat responden yang tinggi kadar *gout arthritis*-nya namun tidak memiliki riwayat *gout arthritis*.

b. Hubungan Lama Kerja dan Kadar *Gout Arthritis*

Waktu bekerja petani adalah waktu yang dialokasikan untuk kegiatan berusahatani. Kegiatan ini meliputi pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Untuk perhitungannya waktu petani adalah seluruh aktivitas kerja yang dilakukan oleh petani selama satu musim tanam berdasarkan potensi tenaga kerja yang dimilikinya. Sedangkan waktu kerja potensial yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan usahatani diasumsikan sebagai waktu luang (Mahludin et al, 2019).

Tinggi frekuensi (n) penggunaan pestisida dipengaruhi oleh lama masa tanam. Penggunaan pestisida memiliki dampak terhadap keracunan akut petani. Hal tersebut terjadi apabila semakin lama petani menyemprot secara terus menerus maka dapat mengakibatkan kadarnya semakin masuk ke dalam tubuh. Paparan yang terus berulang dapat menyebabkan zat beracun menumpuk di dalam tubuh, sehingga mengakibatkan melebihi ambang batas keracunan dan menyebabkan paparan pestisida (Istianah & Yuniastuti, 2017).

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh *p-value* 1,000 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama kerja dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Lama bertani dan jumlah jam kerja dapat mempengaruhi jumlah pestisida yang masuk dalam tubuh petani. Semakin lama masa bertani dan jam

kerja per hari maka semakin berisiko terpapar pestisida dan kadar cholinesterase dalam darah semakin rendah. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, (2019) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan kadar *gout arthritis* dengan *p-value* 0,838. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti, (2018) yang menyatakan tidak ada hubungan antara lama kerja per hari dengan kadar asam urat dengan *p-value* 0,526. Berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan bahwa kebiasaan petani dalam melakukan penyemprotan hanya di jam-jam tertentu seperti di pagi dan sore hari. Kegiatan di lahan juga beraneka ragam dan tidak selalu terpapar pestisida.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Yuniastuti, (2018) hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-square (p-value)* = 0,044) bahwa ada hubungan antara lama setiap penyemprotan dengan kejadian keracunan. Artinya semakin lama responden melakukan penyemprotan semakin menurun kadar *cholinesterase* dalam darah responden.

Dalam penelitian ini masih terdapat petani yang kadar *gout arthritis* nya tinggi sementara tidak ada pengaruh lama kerja yang terjadi. Dari 12 petani yang tidak ada pengaruh lama kerjanya, terdapat 5 petani mengalami *gout arthritis* dan sebagian petani kadar *gout arthritis* nya normal sebanyak 7 orang. Sedangkan pada petani yang bekerja di atas 5 jam/hari terdapat 54 orang yang kadar *gout arthritis* nya tinggi dan sebanyak 65 orang kadar *gout arthritis* nya normal. Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam urat tidak hanya dipengaruhi oleh lama kerja, melainkan beragam jenis faktor

lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kegiatan pertanian yang dilakukan petani tidak seterusnya melakukan penyemprotan selama 5 jam/hari. Sebagian besar petani menyediakan tempat untuk beristirahat di kebun, oleh karena itu, petani tidak selamanya terpapar pestisida karena sebagian waktunya digunakan untuk beristirahat. Biasanya petani mulai berangkat ke kebun pada jam 06.00 WITA dan apabila petani tidak membawa makanan mereka akan kembali pulang pada jam 11.00 WITA. Petani akan kembali ke kebun pada jam 13.00 WITA sampai jam 17.00 WITA.

c. Hubungan Masa Kerja dan Kadar *Gout Arthritis*

Masa kerja merupakan lama waktu yang dilewati responden aktif pada saat bekerja sebagai petani penyemprot pestisida hingga pada waktu penelitian dilakukan dalam satuan tahun. Semakin lama waktu yang dihabiskan seseorang dalam bekerja maka semakin besar paparan bahaya yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja tersebut Istianah & Yuniastuti, (2017). Pada penelitian yang dilakukan peneliti, petani melakukan penyemprotan dari awal menjadi seorang petani sehingga dilakukannya penelitian, sebagian besar petani di Desa Kanreapia menghabiskan waktunya dengan bertani untuk mencari rezeki baik itu untuk dijual maupun untuk dikonsumsi secara pribadi.

Pada penelitian ini didapatkan hasil uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh nilai *p-value* 0,032 ($p = < 0,05$) ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada

petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Osang et al, (2015) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan kadar *gout arthritis* pada petani pengguna pestisida di Desa Pangian Tengah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istianah & Yuniastuti, (2017) bahwa dari hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* ($p\text{-value} = 0,049$) didapatkan bahwa ada hubungan antara masa kerja sebagai petani penyemprot dengan kejadian keracunan pada petani. Berbeda dengan penelitian oleh Amanda, (2019) yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap peningkatan asam urat pada petani penyemprot di kecamatan ngablak, kabupaten magelang jawa tengah dengan nilai $p\text{-value}$ 0,297.

(Roddy, 2010) menjelaskan bahwa semakin lama petani menjadi penyemprot, kontak dengan pestisida pun akan semakin tinggi zat kimia dari pestisida yang akan masuk dan terakumulasikan pada tubuh petani serta risiko keracunan pestisida pun akan semakin tinggi, serta semakin lama masa kerja seorang petani maka semakin rendah kadar asam urat petani.

Dalam penelitian ini dari 125 petani yang bekerja lebih dari 5 tahun terdapat 59 petani memiliki kadar *gout arthritis* tinggi dan sebanyak 66 petani memiliki kadar *gout arthritis* normal. Sedangkan dari 6 petani yang bekerja kurang dari 5 tahun memiliki kadar *gout arthritis* yang normal. Hal ini dapat terjadi karena masa kerja pada petani dapat memberikan dampak sesuai

dengan waktu yang telah dijalani sebagai petani. Dimana, semakin lamanya masa kerja seorang petani dapat menyebabkan peningkatan kadar *gout arthritis*. Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lamanya petani bekerja sebagai petani sampai waktu penelitian dilakukan. melihat kondisi petani yang ada di Desa Kanreapia, sebagian besar petani melakukan penyemprotan pestisida sejak awal menjadi petani dan mempekerjakan orang lain atau dibantu oleh pihak keluarga sehingga semakin banyak petani terpapar pestisida.

Bertani merupakan pekerjaan yang sangat menghabiskan tenaga, sebab bertani dilakukan mulai pagi hingga sore hari dibawah paparan sinar matahari dan merupakan pekerja yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat di Desa Kanreapia. Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju akhirat. Karena itu, bekerja bukan semata-mata mencari penghidupan dunia. Cara kerja kita akan menentukan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak. Maka, setiap langkah kerja kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash/20:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

“dan carilah (pahala) negeri akhiran dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia menyatakan bahwa dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal, tanpa berlebihan, dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka.

Ayat ini mengingatkan bahwa berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk meraih kesuksesan dunia dengan cara yang dibenarkan Allah swt. Namun, hal tersebut jangan sampai membuatnya melupakan tujuan manusia sesungguhnya di dunia, yaitu beribadah kepada-Nya. Maka dari itu, segala hal yang didapatkan di dunia senantiasa diorientasikan untuk kepentingan akhirat.

d. Hubungan Cara Penyemprotan dan Kadar Gout Arthritis

Penyemprotan adalah metode yang paling banyak dipakai oleh para petani. Diperkirakan, 75% penggunaan pestisida dilakukan dengan cara disemprotkan, baik penyemprotan dari darat maupun penyemprotan dari udara. Dalam penyemprotan, larutan pestisida dipecah oleh *nozzle* atau

atomizer yang ada dalam alat penyemprot menjadi butiran semprot atau *droplet* (Djojsumarto, 2000).

Penyemprotan juga merupakan salah satu penyebab adanya paparan pestisida dalam tubuh petani. Kegiatan menyemprot terhadap arah angin merupakan tindakan petani saat menyemprot tanaman yang memakai pestisida dengan arah angin yang bertiup. Penyemprotan yang baik jika petani mengikuti arah angin saat melakukan penyemprotan, bagi petani yang melawan arah angin akan membuat paparan pestisida yang lebih banyak sehingga akan mudah mendapatkan keracunan apalagi jika tanaman yang disemprot tinggi. Penggunaan pestisida akan berdampak pada kesehatan petani apabila pada saat melakukan penyemprotan tidak memperhatikan arah angin dan melakukan penyemprotan sambil makan dan minum (Erwin et al, 2019).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh nilai *p-value* 0,047 ($p < 0,05$), ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Sejalan dengan penelitian Kholilah et al, (2017) berdasarkan uji statistik diperoleh nilai *p-value* = 0,075 ($p > 0,05$) artinya tidak ada hubungan antara cara penyemprotan dengan gangguan kesehatan tubuh petani hortikultura di desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. Cara penyemprotan tidak berhubungan dengan peningkatan kadar *gout*

arthritis pada penelitian ini karena berdasarkan hasil observasi sebagian besar petani melakukan penyemprotan sesuai dengan kondisi lahan kebun yang dimiliki, sehingga cara penyemprotan yang dilakukan oleh petani tidak menentu dan kondisi suhu lingkungan pada saat melakukan penyemprotan masih relatif aman serta tanaman yang disemprot adalah sayuran dan tidak terlalu tinggi sehingga paparan pestisida dapat diminimalisir dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan petani yang melakukan penyemprotan yang bisa memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh petani akibat paparan pestisida yang digunakan saat penyemprotan.

Dalam penelitian ini dari 16 petani yang melakukan penyemprotan sesuai dengan ketentuan yang benar terdapat 3 petani yang kadar *gout arthritis* nya tinggi dan 13 orang kadar *gout arthritis* nya normal. Sedangkan dari 115 petani yang tidak melakukan penyemprotan dengan benar terdapat 56 petani yang kadar *gout arthritis* nya tidak normal dan sebanyak 59 petani yang kadar *gout arthritis* nya normal. Berdasarkan hasil wawancara pada seorang petani bahwa kebanyakan petani melakukan penyemprotan sesuai dengan kondisi lahan kebun yang dimiliki, sehingga cara penyemprotan yang dilakukan oleh petani tidak menentu. Petani yang melakukan penyemprotan dengan sesuai lahan kebun dan tidak memperhatikan arah angin dapat membahayakan petani. Hal tersebut dikarenakan pestisida yang disemprotkan dengan berlawanan arah dapat mengenai tubuh petani sehingga petani dapat mengalami keracunan serta gangguan pada tubuh akibat paparan pestisida yang digunakan saat penyemprotan.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Amin, (2022) bahwa didapatkan distribusi petani yang memenuhi syarat pada cara penyemprotan dominan memiliki keracunan normal dan ringan masing masing dengan jumlah 14 responden. Sedangkan petani yang Tidak memenuhi syarat pada cara penyemprotan sebagian besar memiliki keracunan sedang dengan Jumlah 6 responden dengan nilai *p-value* 0,000 ($P < 0,005$) berarti ada hubungan bermakna antara keracunan dan cara penyemprotan. Hasil pengujian statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang tidak memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan akan mempunyai risiko terjadinya keracunan pestisida dibanding dengan petani yang menyemprot mengikuti arah angin.

Penyemprotan yang tidak memperhatikan arah angin menyebabkan cairan semprot pestisida mengenai tubuh pekerja sehingga akan lebih mudah terjadi keracunan terlebih jika tanaman yang disemprot memiliki bentuk yang tinggi. Penyemprotan yang tidak mempertimbangkan arah angin juga akan mengakibatkan pencemaran lahan pertanian akibat akumulasi bahan aktif dari pestisida. Pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sebagian besar petani mengetahui cara penyemprotan seperti mengikuti arah mata angin pada saat melakukan penyemprotan oleh karena itu dominan petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa memiliki kadar *cholinesterase* yang tinggi atau keracunan yang normal.

e. Hubungan Penggunaan APD dan Kadar *Gout Arthritis*

Alat pelindung diri adalah peralatan yang dipakai saat beraktivitas untuk meminimalkan terjadinya cedera dan mencegah penyakit akibat paparan bahaya di tempat kerja. APD tidak mereduksi tingkat keberbahayaan ataupun meniadakan bahaya, tetapi hal tersebut dapat menurunkan tingkat keparahan apabila seseorang terpapar bahaya. Maka dari itu APD sangat penting bagi petani untuk melindungi kesehatan dari paparan pestisida di lingkungan kerja serta menjaga peningkatan kadar *gout arthritis* agar tetap normal dan tidak terkontaminasi dengan paparan penyemprotan pestisida yang dilakukan. Penggunaan alat pelindung diri merupakan salah satu upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja (Latifah et al, 2019).

Setelah dilakukan uji statistik dengan *chi-square*, diperoleh nilai *p-value* 0,678 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan APD dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, (2019) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan terhadap kadar asam urat petani penyemprot, hal ini ditunjukkan dengan *p-value* yang didapatkan dari hasil analisis sebesar 0,394. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratner et al, (2014) yang menyatakan tidak ada hubungan antara faktor pemakaian APD dengan kadar asam urat. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Budiono et al, (2020) yang

menyebutkan bahwa alat pelindung diri tidak dapat secara sempurna melindungi tubuh, tetapi dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Sehingga banyaknya faktor yang mempengaruhi kadar asam urat.

Pada penelitian ini dari 74 petani yang menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan yang benar, terdapat 35 petani yang kadar *gout arthritis*-nya tinggi dan sebanyak 39 petani yang kadar *gout arthritis*-nya normal. Sedangkan dari 57 petani yang tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan ketentuan yang benar, terdapat 24 petani yang kadar *gout arthritis*-nya tinggi dan sebanyak 33 petani yang kadar *gout arthritis*-nya normal. Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam urat tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan alat pelindung diri, melainkan beragam jenis faktor lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara pada seorang petani bahwa ketika menggunakan APD pada saat melakukan penyemprotan pestisida, akan kesulitan beraktivitas, sehingga lebih memilih tidak menggunakan APD lengkap saat melakukan penyemprotan pestisida.

f. Hubungan Personal Hygiene dan Kadar *Gout Arthritis*

Personal hygiene merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis. *Personal hygiene* merupakan kegiatan atau tindakan membersihkan seluruh anggota tubuh yang bertujuan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang. *Personal hygiene* yang diamati pada penelitian ini adalah kebiasaan mencuci tangan, tidak langsung makan dan minum setelah

penyemprotan, membersihkan pakaian dan alat kerja, membersihkan diri setelah penyemprotan (Ulva, 2019).

Hasil uji statistik pada penelitian ini dengan *chi-square*, diperoleh *p-value* 0,261 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *personal hygiene* dan peningkatan kadar *gout arthritis* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Penelitian ini berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nayla, (2020) bahwa hasil uji statistik dengan uji fisher didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,673 artinya tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dan *personal hygiene*. Dikemukakan bahwa tinggi pengetahuan *hygiene* belum tentu semakin baik dalam prakteknya dalam *hygiene*.

Berbanding terbalik dengan penelitian oleh Amin, (2022) bahwa Hasil uji statistik pada penelitian ini didapatkan *p-value* 0,000 ($P = < 0,05$) hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara *personal hygiene* pada saat sebelum dan sesudah penyemprotan dengan keracunan Pestisida, yang berarti semakin baik petani menerapkan *personal hygiene* nya maka semakin kurang resiko terpapar keracunan Pestisida. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dilla, (2021) berdasarkan hasil uji statistik dengan *chi-square* diperoleh nilai *p-value* 0,001 dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara *personal hygiene* dengan keluhan kesehatan.

Kebersihan pribadi dapat diartikan sebagai praktik yang berkontribusi untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit, terutama

melalui kebersihan individu. Kebersihan yang baik merupakan penghalang utama untuk banyak penyakit menular, termasuk penyakit feses-oral dan yang meningkatkan kesejahteraan kesehatan. *Personal hygiene* sangat penting untuk petani untuk memberikan kesadaran terkait kebersihan pribadi (Satish et al., 2020).

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah Thaharah, kesucian dan kebersihan. Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohhani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badannya. Dalam kajian ini, Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya :

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.”

Tafsir Al-Muyassar/ Kementerian Agama Saudi Arabia mengungkapkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak mendirikan sholat, sedangkan kalian dalam keadaan tidak dalam suci, maka

basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku (siku adalah pemisah antara lengan bawah dan lengan atas), dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki (yaitu tulang yang menonjol pada pertemuan antara tulang betis dan tulang telapak kaki). Dan apabila kalian terkena hadas besar, maka bersucilah dengan cara mandi darinya sebelum mengerjakan sholat. Dan apabila kalian sedang sakit atau dalam perjalanan jauh saat sehat, atau salah seorang diantara kalian membuang hajatnya atau sehabis mencampuri istrinya, kemudian kalian tidak menjumpai air, maka tepuklah kedua telapak tangan kalian ke permukaan tanah dan usaplah muka dan tangan kalian dengannya. Bahkan sebaliknya, dia membolehkan tayamum demi melonggarkan kali dan sebagai rahmat bagi kalian, sebab dia menjadikannya sebagai pengganti air untuk bersuci. Maka keringanan untuk bertayamum termasuk kesempurnaan nikmat-nikmat yang menuntut sikap bersyukur kepada Dzat yang memberikannya, dengan cara taat kepadanya dan dalam perkara yang perintahkan dan dalam perkara yang dia karang.

Ayat diatas mengajarkan agar manusia menjaga kebersihan antara lain, dengan mandi. Semakin sering mandi akan semakin baik untuk kebersihan, menghilangkan daki/kotoran dari badan ibarat pembersihan dosa. Selain menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit, istirahat juga perlu dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi dan fit. Allah telah menciptakan pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak bermakna. Pergantian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam hari setelah lelah

berusaha. Hal ini kembali membuktikan bahwa islam sangat memperhatikan masalah kesehatan.

Diantara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang. Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang menyesali oleh waktu. Waktu ibarat pedang bermata 2, jika digunakan untuk kebaikan maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari.

Dalam penelitian ini terdapat 41 petani yang memperhatikan kebersihannya dengan baik, namun masih terdapat 15 petani yang kadar *gout arthritis*-nya tinggi dan sebanyak 26 petani yang kadar *gout arthritis*-nya normal. Sedangkan dari 90 petani yang tidak memperhatikan kebersihannya dengan baik, namun masih terdapat 44 petani yang kadar *gout arthritis*-nya tinggi dan sebanyak 46 petani yang kadar *gout arthritis*-nya normal. Perbedaan antara studi dapat terjadi karena kadar asam urat tidak hanya dipengaruhi oleh *personal hygiene*, melainkan beragam jenis faktor lainnya, seperti pola hidup, stress, penyakit bawaan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara pada seorang petani beranggapan bahwa pekerjaan lebih utama dibandingkan kesehatan. Padahal menjaga kebersihan merupakan pondasi

bagi tubuh kita agar terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Selain itu pengaruh faktor kontekstual dan mekanisme struktural yang menghasilkan posisi sosial ekonomi individu, maka dari itu tidak boleh meremehkan dalam perbaikan kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Tindakan melawan ketidaksetaraan sosial dapat berdampak potensial pada mekanisme biologis yang mempengaruhi kesehatan. Meskipun ketidaksetaraan ini dapat diselesaikan dalam lingkungan keluarga, hal itu dapat diperbaiki dengan mempromosikan praktik keluarga yang dirancang untuk meningkatkan kebiasaan kebersihan pribadi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan personal hygiene baik tidak memiliki hubungan dengan peningkatan kadar *gout arthritis*. Maka perlu diberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan bagi kesehatan dan juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran/pemahaman tentang penyakit yang ditimbulkan akibat kurangnya menerapkan kebersihan.

D. Kelemahan Penelitian

1. Keterbatasan referensi mengenai penelitian yang dilakukan maupun riset sebelumnya sehingga mempengaruhi pembahasan pada penelitian ini yang dapat memiliki banyak kelemahan.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel yang disebutkan pada penelitian ini sehingga membatasi variabel yang diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

E. Kesimpulan

1. Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan *p-value* 1,000
2. Ada hubungan antara masa kerja dan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan *p-value* 0,032
3. Ada hubungan antara cara penyemprotan dan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan *p-value* 0,047
4. Tidak ada hubungan antara penggunaan APD dengan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan *p-value* 0,678
5. Tidak ada hubungan antara personal hygiene dengan peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dengan *p-value* 0,261

F. Saran

1. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat menyebabkan keracunan pestisida seperti kebersihan diri setelah melakukan penyemprotan, penggunaan APD, cara penyemprotan agar terhindar dari bahaya paparan pestisida yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar *gout arthritis*.
2. Bagi Dinas Kesehatan di lingkup wilayah Desa Kanreapia agar memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terutama petani penyemprot pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa terkait bahaya pestisida terhadap peningkatan kadar *gout arthritis*.
3. Bagi Dinas Pertanian di lingkup wilayah Desa Kanreapia agar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kelompok tani, terkhusus yang melakukan penyemprotan pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dan menjadikan bahan referensi, serta mengkaji lebih dalam keterkaitan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Tasya, D.A., (2021). Hubungan Personal Hygiene Dengan Keluhan Kesehatan Kulit Pada Petugas Gali Parit Kecamatan Medan Timur.
- Amin, N. R. (2022). Determinan keracunan Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- Andesgur, I. (2020). Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida. *Jurnal Bestuur*, 8(2), 129–138.
- Apriliani, R., Romdhona, N., Fauziah, M., Studi, P., Masyarakat, K., Masyarakat, F. K., & Jakarta, U. M. (2022). Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Dermatitis Kontak Iritan Pada Pemulung Di TPA Bantargebang. 2(2), 221–234.
- Baruwadi H. Mahludin, dkk (2019). *Alokasi Waktu Kerja*; Cetakan I. UNG Press Gorontalo
- BPS, Gowa. (2017). *Pertanian dan Pertambangan*.
- Chittrakul, J., Sapbamrer, R., & Sirikul, W. (2022). Paparan Pestisida dan Risiko Rheumatoid Arthritis.
- Departemen, Agama. RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya* .
- Djojosumarto. (2000). *Teknik Aplikasi Pestisida Pertanian*. Yogyakarta : Kanisius.
- Dwiyanti, F.L., Darundiati, Y.H., & Dewanti, N.A. (2018). Hubungan Masa Kerja, Lama Kerja, Lama Penyemprotan Dan Frekuensi Penyemprotan Terhadap Kadar Kolinesterase Dalam Darah Pada Petani Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang.
- Erwin, Maher Denny, H., & Setyaningsih, Y. (2019). Edukasi Petani tentang Penggunaan Pestisida Secara Aman dan Sehat di Bima, Indonesia. *Jurnal Sains Terapan*, 5(2), 92–100.
- Fajriani, G. N., Aeni, S. R. N., & Sriwiguna, (2019). Penggunaan Apd Saat Penyemprotan Pestisida Dan Kadar Kolinesterase Dalam Darah Petani Desa Pasirhalang. *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.32382/mak.v10i2.1229>
- FAO. (2018). *Pengguna Pestisida di Dunia*.

- Fauzi, M. (2018). Hubungan aktivitas fisik dengan kadar asam urat di padukuhan bedog trihanggo gamping sleman yogyakarta.
- Firdayanti, Susanti, M. A. S. (2019). Program studi Farmasi , Politeknik Bina Husada Kendari Jl . Sorumba No . 17 Kendari Sulawesi Tenggara , Kode Pos 93117 Email : firdayanti.damiru88@gmail.com Judul Hiperurisemia adalah suatu keadaan yang menggambarkan kadar asam urat dalam tubuh meni. Medika Udayana, 8(12), 2597–8012. <https://ojs.unud.ac.id>
- Fithri, Kamilia. N. (2020). Hygiene dan Sanitasi Pada Penjamah Makanan Di Kantin Universitas Unggul. *Jurnal INOHIM*, Volume 4 Nomor 2.
- Habibi, H., Bukhari, A., & Naiem, M. F. (2022). Symptoms of Pesticide Intoxication Among Vegetable Farmers in Gowa Regency , Indonesia. 14(6), 172–182. <https://doi.org/10.24252/al>
- Hayati, R., Kasman, & Jannah, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat Pelindung Diri Pada Petani Pengguna Pestisida. 8(April), 11–17.
- Hudayya, A., & Jayanti, H. (2012). Pengelompokan Pestisida Berdasarkan Cara Kerjanya (Mode of Action).
- Istianah, & Yuniastuti, A. (2017). Hubungan Masa Kerja , Lama Menyemprot , Jenis Pestisida , Penggunaan APD dan Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pada Petani di Brebes Abstrak. 2(2), 117–123.
- Jaliana, & Suhadi. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asam Urat Pada Usia 20-44 Tahun Di Rsud Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. *Clinical Microbiology and Infection*, 27(3), 472.e7-472.e10.
- Kementerian Agama Saudi Arabia 2020. Tafsir <https://tafsirweb.com/5911-surat-al-muminun-ayat-19-21.html> (diakses 29 Desember 2021)
- Kementerian Agama RI, (2020). Tafsir <https://tafsirweb.com/2130-surat-al-anam-ayat-6.html> (diakses 29 Desember 2021)
- Kementerian Kesehatan, (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Kadar Asam Urat.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (1986). Permenaker No.3 Tentang Syarat-syarat Keselamatan dan kesehatan di tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida.
- Lita Nasution. Buku Ajar Pestisida dan Teknik Aplikasi.
- Lee, Y. M., Bae, S. G., Lee, S. H., Jacobs, D. R., & Lee, D. H. (2013). Persistent

organic pollutants and hyperuricemia in the U.S. general population. *Atherosclerosis*, 230(1), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2013.06.012>

Lestari, W. Y., Nuroini, F., & Mukaromah, A. H. (2021). Gambaran Kadar Asam Urat Pada Petani Di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, 3, 1556–1563.

Lucki, Fitriasya et.al, 2018. Hubungan Masa Kerja, Lama Kerja, Lama Penyemprotan, dan Frekuensi Penyemprotan Terhadap Kadar Kolinesterase dalam Darah Pada Petani di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat. Volume 6*, 132

Mahzumi, F., & Hamid, A. A. (2019). Pertanian dalam Islam. 1–3.

Nurhidayati, Latifah. (2021). Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium Farmasi; Cetakan I Universitas Islam Indonesia.

Oktaviani, N., Avianty, I., & Mawati, E. D. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Mahasiswa Pria Di Universitas Pakuan Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. *Promotor*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.32832/pro.v2i1.1788>

Osang, A.R., 2016. Hubungan Antara Masa Kerja Dan Arah Angin Dengan Kadar Kolinesterase Darah Pada Petani Padi Pengguna Pestisida Di Desa Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Pharmacon* 5.

Pamungkas, Oktofa. (2016). Bahaya Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia. *Vol.XIV*, 29

Prabaningrum, L., & Moekasan, T. K. (2011). Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu untuk Mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan Utama pada Budidaya Paprika. 21(3), 245–253.

Prasiwi, W., & Darnoto, S. (2017). Hubungan Antara Usia Dan Masa Kerja Dengan Kapasitas Fungsi Paru Pada Supeltas Surakarta. 68–71.

Pratiwi, A.D. (2020). Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat di Kabupaten Muna. *Prosiding Nasional Covid-19*, 52-57.

Purnomo, A. S., Alkas, T. R., & Ersam, T. (2019). Biodegradasi Pestisida Organoklorin Oleh Jamur.

Putri, Edwina, KA. (2019) Hubungan Antara Paparan Pestisida Dengan Peningkatan Kadar Asam Urat Pada Petani Penyemprot Di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

- Riskesdas. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Vol. 110, Issue 9). <http://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/lpb/article/view/3658>
- Ratner, M.H., Farb, D.H., Ozer, J., Feldman, R.G., Durso, R., 2014. *Younger age at onset of sporadic Parkinson's disease among subjects occupationally exposed to metals and pesticides. Interdisciplinary Toxicology* 7, 123–133. <https://doi.org/10.2478/intox-2014-0017>
- Roddy, E., Doherty, M., 2010. *Gout. Epidemiology of gout. Arthritis Research & Therapy* 12, 223. <https://doi.org/10.1186/ar3199>
- Samosir, K., Setiani, O., Nurjazuli, N. (2017). Hubungan Paparan Pestisida Dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh Petani Hortikultura Di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 16(2), 63-69.
- Satish Kumar, B., Reddy, M. A., Paul, P., Das, L., JC, D., Kurian, B. P., Ghosh, S., & BN, R. (2020). Importance of understanding the need of personal hygiene : A comprehensive review. November.
- Sharma, A., Kumar, V., Shahzad, B., Tanveer, M., Preet, G., Sidhu, S., Handa, N., Kohli, S. K., & Yadav, P. (2019). Worldwide pesticide usage and its impacts on ecosystem. *SN Applied Sciences*, 1(11), 1–16. <https://doi.org/10.1007/s42452-019-1485-1>
- Siahaan, S. (2020). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Keracunan Pestisida Pada Petani Sayur dan Palawija di Desa Selat Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1079. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1099>
- Siswanto & Suyanto, (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran (A. Bimantara & H. R. Nugraha (Eds.); Pertama). Bursa Ilmu.
- Soerосо & Algristian (2011). Asam Urat.
- Sofiyana, M. S., Sukhoiri, Aswan, N., Munthe, B., W, L. A., Jannah, R., Juhara, S., SK, T., Laga, E. A., Sinaga, J. An. B., SUParman, Ac. R., Suaidah, I., Fitrisari, N., & Herman. (n.d.). Metodologi penelitian pendidikan.
- Sutrisno, Tannady, H., Wahyuningsih, E. S., Supriatna, D., & Hadayanti, D. (2022). Automotive City Car Products Analisis Peran Gaya Hidup Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian. 3(October), 4139–4145.
- Syarifah, A. (2018). Hubungan Pengetahuan Dan Budaya Dengan Kadar Asam Urat Pada Lansia Anita. *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 8(2).

Ulva, F., Riziyana, N. P; & Rahmi, A. (2019). Hubungan Personal Hygiene Dengan Gejala Keracunan Pestisida Pada Petani Penyemprot Pestisida Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2019. *Proseding Sains Tkese Semnas MIPKes UMRi 1*, 65-69.

WHO. (2018). *Monitoring Health For The SDGs*.

Wulandari, A. (2018). Hubungan Personal Hygiene Dan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Skabies Pada Santri Di Pesantren Ulumul Qur'an Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. *Global Health Science*, 3(4), 322-328.

Yulianto, Hadi, W., & Nurcahyo, R. J. (2020). Hygiene, Sanitasi dan K3.

Yuniastuti, A. (2018). Hubungan Masa Kerja, Lama Menyemprot, Jenis Pestisida, Penggunaan APD dan Pengelolaan Pestisida Dengan Kejadian Keracunan Pada Petani Di Brebs. *public health perspective journal*, 2(2), 117-123.



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36
Samata-Gowa

KUESIONER

**HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN
KADAR *GOUT ARTHRITIS* PADA PETANI SAYUR DI DESA
KANREAPIA KEC. TOMBOLO PAO KAB. GOWA**

Nomor :

Tanggal :

Bersama ini saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner. Informasi yang bapak/ibu berikan digunakan untuk melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Hubungan Paparan Pestisida Terhadap Peningkatan Kadar *Gout Arthritis* Pada Petani Sayur Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa**“, untuk itu diharapkan bapak/ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan / pernyataan (kuesioner) berikut:

1. Identitas Responden

Nama	:	
Umur (tahun)	:	
Lama kerja	:	Jam/hari
Masa kerja	:	Tahun
Riwayat penyakit <i>gout arthritis</i>	:	
Kadar <i>gout arthritis</i>	:	mg/dL

2. Kuesioner Cara Penyemprotan

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda melakukan arah penyemprotan searah dengan arah angin?		
2.	Apakah anda melakukan penyemprotan sambil makan dan minum?		
3.	Apakah anda menghentikan penyemprotan jika terasa mual?		

3. Kuesioner Penggunaan APD

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda menggunakan penutup kepala saat bekerja?		
2.	Saya memakai penutup kepala saat melakukan penyemprotan pestisida untuk melindungi kepala dari paparan pestisida dan panas matahari!		
3.	Apakah anda menggunakan masker saat bekerja?		
4.	Saya menggunakan masker berbahan kain / scuba!		
5.	Saya memakai masker saat melakukan penyemprotan pestisida dari awal hingga akhir penyemprotan!		
6.	Apakah anda menggunakan kacamata saat bekerja?		
7.	Saya hanya menggunakan kacamata seadanya!		
8.	Apakah anda menggunakan sarung tangan saat bekerja?		
9.	Saya menggunakan sarung tangan berbahan karet/silikon!		
10.	Apakah anda menggunakan wearpack saat bekerja?		
11.	Saya hanya menggunakan pakaian kaos lengan panjang		

12.	Apakah anda menggunakan sepatu boot saat bekerja?		
-----	---	--	--

4. Kuesioner Personal *Hygiene*

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda selalu mencuci tangan pada saat selesai bekerja?		
2.	Jika iya, apakah anda mencuci tangan menggunakan sabun ?		
3.	Saya hanya cuci tangan menggunakan air mengalir!		
4.	Saat bekerja, jika saya lapar langsung makan!		
5.	Setelah pulang bekerja, saya haus dan langsung minum tanpa cuci tangan!		
6.	Apakah setelah pulang bekerja, anda mengganti pakain?		
7.	Apakah anda mencuci pakaian setelah pulang bekerja?		
8.	Saya merendam pakaian setelah pulang bekerja, dan mencuci keesokan harinya!		
9.	Apakah anda bergegas mandi setelah bekerja?		
10.	Jika iya, apakah anda menggunakan sampo?		
11.	Saya mencuci sepatu boot 1x seminggu!		

Lampiran 2

DOKUMENTASI





Pemeriksaan Kadar Asam Urat



Penyemprotan Pestisida



Wawancara

Lampiran 3

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.386/KEPK/FKIK/III/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama
Principal Investigator

: Sri Wahyuni Ningsih

Nama Institusi
Name of the Institution

: UIN Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

"Hubungan paparan pestisida terhadap peningkatan kadar gout arthritis pada petani sayur di desa kanreapia kecamatan tombolo pao kabupaten gowa"

"The relationship between exposure to pesticides and increased levels of gout arthritis in vegetable farmers in Kanreapia Village, Buttano Pao District, Gowa Regency"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu: 1) Nilai Sosial, 2) Manfaat, 3) Pemeraan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024.

This declaration of ethics applies during the period March 16th, 2023 until March 16th, 2024



March 16th, 2023
Professor and Chairperson,

[Signature]

Syatriah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 13668/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2933/Un.06/LP2M/PP.00.9/3/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: SRI WAHYUNI NINGSIH
Nomor Pokok	: 70200119040
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN KADAR GOUT ARTHRITIS PADA PETANI SAYUR DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 April s/d 30 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN


Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Website: dpmpstp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503/368/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023
Lampiran :
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Kanreapia Kec. Tombolo Pao Kab.
Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 13668/S.01/PTSP/2023 tanggal \$(izin_tgl_permohonan) tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SRI WAHYUNI NINGSIH**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bera / 22 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Pokok : 7302036212010002
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Lingkungan Tokambang/Graha Lestari Makassar

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembara di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN KADAR GOUT ARTHRITIS PADA PETANI SAYUR DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMOLO PAO KABUPATEN GOWA"

Selama : 1 April 2023 s/d 30 Juni 2023
Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. **Penelitian** tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. **BUPATI GOWA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS.S.Sos,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua IPPM IAIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI/591/DPM-PTSP/PENELITIAN/III/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicanik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicanik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.



Lampiran 6


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLO PAO
DESA KANREAPIA
Jalan Solle Baco No.12 Kanreapia Kode Pos 92174

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/02/KR/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Syukri, S.Sos
Jabatan	: Sekretaris Desa Kanreapia
Alamat	: Dusun Halahalaya Desa Kanreapia

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama	: SRI WAHYUNI NINGSIH
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanah Beru, 22 Desember 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nomor Pokok	: 7302036212010002
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Lingkungan Tokambang/Graha Lestari Makassar

Benar telah mengadakan *Penelitian/Pengumpulan Data* di Desa Kanreapia kecamatan Tombolopao dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

"HUBUNGAN PAPARAN PESTISIDA TERHADAP PENINGKATAN KADAR GOUT ARTHRITIS PADA PETANI SAYUR DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA"

Waktu Penelitian	: 01 April 2023 – 30 Juni 2023
Tempat Penelitian	: Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kanreapia, 26 Mei 2023
An. Kepala Desa
Sekretaris

Syukri, S.Sos
Nip. 19760413 200906 1 001



Lampiran

MASTER TABEL

Nama	Umur	Lama Kerja	Masa Kerja	Riwayat Penyakit Gout Arthritis	Kadar Gout Arthritis	Cara Penyemprotan	Penggunaan APD	Personal Hygiene
R	2	2	1	1	2	1	1	1
H	2	1	1	1	2	1	2	1
A	1	1	1	1	2	2	1	2
AR	2	1	1	1	2	1	1	1
B	2	1	1	1	2	1	2	2
S	3	1	1	1	1	1	1	1
S	2	1	1	1	2	1	2	1
R	2	1	1	1	1	2	1	1
B	2	1	1	2	1	1	2	2
R	2	2	1	1	1	1	2	2
S	2	1	1	2	1	1	1	1

T	3	1	1	1	2	1	1	1
I	1	1	2	1	2	1	1	2
S	3	1	1	1	2	1	2	1
MN	2	1	1	1	2	1	2	2
S	3	1	1	1	2	1	2	2
A	1	1	1	1	2	1	2	1
R	2	1	1	1	2	1	1	2
R	1	1	2	1	2	2	1	1
MA	3	1	1	1	2	1	1	1
S	2	1	1	1	2	1	2	1
H	1	1	2	1	2	1	2	1
A	2	1	1	1	2	1	1	2
A	1	1	1	1	1	1	2	1
E	2	1	1	1	1	1	1	2
AD	2	1	1	1	2	1	1	2

IR	1	1	2	1	2	1	1	1
J	3	1	1	1	1	1	1	1
S	2	1	1	1	2	1	1	1
S	1	1	1	1	2	2	1	1
R	1	1	1	1	2	1	1	1
S	3	1	1	1	2	1	2	1
J	3	1	1	1	2	2	2	1
H	2	1	1	1	2	1	1	1
A	2	1	1	1	2	1	1	2
S	2	1	1	1	2	1	1	1
S	2	1	1	1	2	2	1	1
J	2	1	1	1	1	1	2	2
S	2	1	1	1	2	1	1	2
A	2	1	1	1	1	1	1	2
R	3	1	1	1	1	2	2	1

M	3	1	1	2	1	1	2	1
S	1	1	1	1	2	1	2	2
U	3	1	1	1	2	2	2	2
S	2	1	1	1	2	1	1	1
B	3	1	1	1	2	1	1	1
H	3	1	1	1	1	1	2	1
I	2	1	1	1	2	2	1	2
JB	2	1	1	2	1	1	2	2
A	1	1	1	1	1	2	2	2
M	3	1	1	1	2	1	2	1
N	2	2	1	1	2	1	2	1
F	3	2	1	1	2	2	1	1
T	2	1	1	1	2	2	1	1
S	2	1	1	1	1	1	2	1
H	2	1	1	1	2	1	1	2

H	1	1	1	1	1	1	2	1
H	1	1	1	1	1	1	2	1
I	2	1	1	1	2	1	1	1
R	3	2	1	1	1	1	1	1
PA	3	1	1	1	2	1	1	2
A	2	1	1	1	1	1	2	1
S	3	1	1	2	1	1	2	1
AH	3	1	1	1	2	1	2	1
K	2	1	1	1	2	1	2	2
S	2	1	1	1	2	1	2	1
W	3	1	1	1	2	1	1	2
A	3	1	1	1	2	1	1	2
M	2	1	1	1	2	1	1	1
T	3	1	1	1	2	1	2	1
J	2	2	1	2	1	1	2	1

D	3	1	1	1	2	1	2	2
A	3	2	1	1	2	1	2	2
J	3	2	1	1	2	1	2	1
P	2	2	1	1	2	2	1	1
S	3	1	1	1	2	2	2	2
A	2	1	1	1	2	1	2	1
B	3	1	1	1	2	1	2	1
A	3	1	1	1	2	2	2	2
R	2	1	1	1	2	2	2	2
R	2	1	1	1	2	1	2	2
L	3	1	1	1	2	1	2	1
I	1	1	2	1	2	1	2	1
D	3	1	1	1	2	1	2	1
B	2	1	1	1	2	1	2	1
R	2	1	1	1	2	1	2	1

Dg.J	3	1	1	2	2	1	2	2
Y	3	1	1	1	1	1	2	1
S	2	1	1	1	1	1	2	1
H.H	3	1	1	2	2	1	2	1
S	2	1	1	1	2	1	2	1
I	1	1	2	1	2	1	2	1
J	2	1	1	1	2	1	2	2
N	2	1	1	1	1	1	2	2
R	2	1	1	2	1	1	2	1
H	3	1	1	1	1	1	1	2
A	3	1	1	1	1	1	2	2
H	2	1	1	1	1	1	2	1
H	3	1	1	1	1	1	2	1
H	2	1	1	1	1	1	2	2
AR	3	1	1	2	1	1	2	2

B	3	1	1	2	1	1	1	1
J	3	1	1	2	1	1	1	1
H. S	3	1	1	2	1	1	1	1
H	3	1	1	1	1	1	1	1
S	3	1	1	2	1	1	1	1
D	3	1	1	2	1	1	2	2
R	3	1	1	2	1	1	2	1
K	3	1	1	2	1	1	1	1
J	3	1	1	2	1	1	1	1
I	3	1	1	1	1	1	2	2
M	3	1	1	1	2	1	2	1
D	3	2	1	1	2	1	1	1
C	3	1	1	1	1	1	2	1
B	3	1	1	2	1	1	2	1
I	3	1	1	2	1	1	2	1

L	3	1	1	2	1	1	2	1
MY	3	1	1	2	1	1	2	2
S	3	1	1	2	1	1	1	1
N	3	1	1	1	1	1	1	1
N	3	1	1	2	1	1	2	1
P	3	1	1	2	1	1	2	1
H	3	1	1	2	1	1	2	1
K	3	2	1	1	1	1	1	1
S	3	2	1	2	1	1	1	1
S	3	1	1	1	1	1	1	1
I	3	1	1	1	2	1	1	1
MI	3	1	1	1	1	1	1	1
H	3	1	1	2	1	1	1	1
D	3	1	1	1	1	1	1	1
M	3	1	1	2	1	1	1	1

Keterangan :

Kadar Gout Arthritis	1 = Tidak Normal 2 = Normal
Usia	1 = Usia Remaja 12-25 Tahun 2 = Usia Dewasa 26-45 Tahun 3 = Usia Lansia 46-65 Tahun
Riwayat Penyakit Gout Arthritis	1 = Tidak Ada Riwayat 2 = Ada Riwayat
Lama Kerja	1 = Berisiko 2 = Tidak Berisiko
Masa Kerja	1 = Lama 2 = Baru
Cara Penyemprotan	1 = Tidak Memenuhi Syarat 2 = Memenuhi Syarat
Penggunaan APD	1 = Tidak Lengkap 2 = Lengkap
Personal Hygiene	1 = Tidak Memenuhi Syarat 2 = Memenuhi Syarat

Output SPSS

1. Hasil Univariat

Statistics

		Umur	LK	MK
N	Valid	131	131	131
	Missing	0	0	0
Mean		43,62	7,35	27,61
Median		47,00	8,00	30,00
Mode		55	8	40
Std. Deviation		12,184	1,312	13,663
Minimum		19	3	2
Maximum		65	8	55

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12-25	15	11,5	11,5	11,5
	26-45	49	37,4	37,4	48,9
	46-65	67	51,1	51,1	100,0
	Total	131	100,0	100,0	

Riwayat Penyakit Gout Arthritis

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada	101	77,1	77,1	77,1
	Ada	30	22,9	22,9	100,0
	Total	131	100,0	100,0	

Kadar Gout Arthritis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Normal	59	45,0	45,0	45,0
Valid Normal	72	55,0	55,0	100,0
Total	131	100,0	100,0	

Lama Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Normal	119	90,8	90,8	90,8
Valid Normal	12	9,2	9,2	100,0
Total	131	100,0	100,0	

Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Lama	125	95,4	95,4	95,4
Valid Baru	6	4,6	4,6	100,0
Total	131	100,0	100,0	

Cara Penyemprotan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Memenuhi	115	87,8	87,8	87,8
Valid Memenuhi	16	12,2	12,2	100,0
Total	131	100,0	100,0	

Alat Pelindung Diri

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Lengkap	57	43,5	43,5	43,5
Valid Lengkap	74	56,5	56,5	100,0
Total	131	100,0	100,0	

Personal Hygiene

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Memenuhi	90	68,7	68,7	68,7
Valid Memenuhi	41	31,3	31,3	100,0
Total	131	100,0	100,0	

2. Hasil Bivariat

Lama Kerja * Kadar Gout Arthritis

Crosstab

		Kadar Gout Arthritis		Total
		Tidak Normal	Normal	
Lama Kerja	Tidak Normal	Count 54	65	119
		% within Lama Kerja 45,4%	54,6%	100,0%
Normal	Count	5	7	12
		% within Lama Kerja 41,7%	58,3%	100,0%
Total	Count	59	72	131
		% within Lama Kerja 45,0%	55,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,061 ^a	1	,805		
Continuity Correction ^b	,000	1	1,000		
Likelihood Ratio	,061	1	,805		
Fisher's Exact Test				1,000	,526
Linear-by-Linear Association	,060	1	,806		
N of Valid Cases	131				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,40.

b. Computed only for a 2x2 table

Masa Kerja * Kadar Gout Arthritis

Crosstab

		Kadar Gout Arthritis		Total	
		Tidak Normal	Normal		
Masa Kerja	Lama	Count	59	66	125
		% within Masa Kerja	47,2%	52,8%	100,0%
Masa Kerja	Baru	Count	0	6	6
		% within Masa Kerja	0,0%	100,0%	100,0%
Total		Count	59	72	131
		% within Masa Kerja	45,0%	55,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,153 ^a	1	,023	,032	,025
Continuity Correction ^b	3,422	1	,064		
Likelihood Ratio	7,418	1	,006		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5,113	1	,024		
N of Valid Cases	131				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,70.

b. Computed only for a 2x2 table

Cara Penyemprotan * Kadar Gout Arthritis

Crosstab

			Kadar Gout Arthritis		Total
			Tidak Normal	Normal	
Cara Penyemprotan	Tidak Memenuhi	Count	56	59	115
		% within Cara Penyemprotan	48,7%	51,3%	100,0%
	Memenuhi	Count	3	13	16
		% within Cara Penyemprotan	18,8%	81,2%	100,0%
Total		Count	59	72	131
		% within Cara Penyemprotan	45,0%	55,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5,088 ^a	1	,024		
Continuity Correction ^b	3,950	1	,047		
Likelihood Ratio	5,524	1	,019		
Fisher's Exact Test				,031	,021
Linear-by-Linear Association	5,049	1	,025		
N of Valid Cases	131				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,21.

b. Computed only for a 2x2 table

Alat Pelindung Diri * Kadar Gout Arthritis

Crosstab

			Kadar Gout Arthritis		Total
			Tidak Normal	Normal	
Alat Pelindung Diri	Tidak Lengkap	Count	24	33	57
		% within Alat Pelindung Diri	42,1%	57,9%	100,0%
	Lengkap	Count	35	39	74
		% within Alat Pelindung Diri	47,3%	52,7%	100,0%
Total	Count	59	72	131	
	% within Alat Pelindung Diri	45,0%	55,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,351 ^a	1	,554		
Continuity Correction ^b	,172	1	,678		
Likelihood Ratio	,351	1	,553		
Fisher's Exact Test				,598	,339
Linear-by-Linear Association	,348	1	,555		
N of Valid Cases	131				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25,67.

b. Computed only for a 2x2 table

Personal Hygiene * Kadar Gout Arthritis

Crosstab


			Kadar Gout Arthritis		Total
			Tidak Normal	Normal	
Personal Hygiene	Tidak Memenuhi	Count	44	46	90
		% within Personal Hygiene	48,9%	51,1%	100,0%
	Memenuhi	Count	15	26	41
		% within Personal Hygiene	36,6%	63,4%	100,0%
Total	Count	59	72	131	
	% within Personal Hygiene	45,0%	55,0%	100,0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1,723 ^a	1	,189		
Continuity Correction ^b	1,261	1	,261		
Likelihood Ratio	1,740	1	,187		
Fisher's Exact Test				,256	,131
Linear-by-Linear Association	1,709	1	,191		
N of Valid Cases	131				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,47.

b. Computed only for a 2x2 table



RIWAYAT HIDUP PENELITI



Sri Wahyuni Ningsih lahir di Tanah Lemo, 22 Desember 2001 merupakan putri tunggal dari 4 bersaudara. Putri dari pasangan Syamsir dan Irmawanti. Penulis ini dibesarkan di lingkungan yang cukup sederhana. Memulai pendidikannya di TKA Al-Ikhwan pada usia 5 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 165 Bira Keke Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 34 Bulukumba Kabupaten Bulukumba pada tahun 2013 dan untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 3 Bulukumba Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016. Pada tahun 2019, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang strata satu. Peneliti memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR