

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN KISTA OVARIUM
DENGAN NYERI KRONIS MENGGUNAKAN INTERVENSI
HIPNOSIS 5 JARI DAN TERAPI MUSIK ALAM**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ners
Pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan Uin Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DARTI D.,S.KEP
NIM: 70900122045

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS ANGKATAN XXII
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darti D., S.Kep
NIM : 70900122045
Tempat/Tgl.Lahir : Tombolo, 24 Desember 2001
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tugas akhir ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 20 Desember 2023

Penyusun,



Darti D., S.Kep

NIM:70300122045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Darti D., S.Kep NIM: 70900122045, mahasiswa program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam”, memandang bahwa Tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Gowa, 4 September 2023

Pembimbing I



Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes

Pembimbing II



Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam", yang disusun oleh Darti D., S.Kep NIM: 70900122045, mahasiswa program studi profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan hari Selasa, Tanggal 19 September 2023 M, bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 20 Desember 2023 M.
7 Jumadil Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes (.....)

Sekretaris : Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes (.....)

Munaqisy I : Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Munaqisy II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes (.....)

Pembimbing II: Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar,



Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes
NIM: 19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang tidak terukur jumlahnya, nikmat umur, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir profesi Ners berjudul “analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam”. Salam yang semoga tidak pernah lupa kita sampaikan pada Baginda Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat meraih gelar profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua, Bapak Dahlan dan Ibu Nurlaeni terkhusus juga untuk saudara-saudara saya atas segala bantuan, doa-doa baik, supportnya kepada saya dan segala hal baik yang menghantarkan penulis sampai pada tahap ini, juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan penuh kesabaran pada mahasiswanya yang sangat fakir ilmu dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr.dr. Dewi Setiawati, Sp.,Og.,M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pimpinan fakultas sejawaran, serta Staf Akademik yang telah membantu administrasi penulis.
3. Dr Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes selaku Ketua Program Studi Profesi Ners dan Eny Sutria, S.Kep.,Ns.,M.Kep, selaku Sekretaris Program Studi Profesi Ners beserta staf dan dosen pengajar yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
4. Dr Hasnah, S.Sit.,S.Kep.Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dan Nurul Fadhilah Gani, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku pembimbing II atas segala

bimbingan, arahan dan bantuannya sehingga penulis mampu merampungkan tugas akhir ini.

5. Dr. Arbianingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku penguji I dan Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji II karena telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tugas akhir ini.
6. Kepala Ruangan Pinang Bawah terkhusus Bidan di ruangan gangguan sistem reproduksi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pemberian asuhan keperawatan.
7. Kepada teman-teman saya semuanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Bahwa kesalahan tersebut murni dari penulis sebagai manusia dan segala hal positif serta yang bermanfaat dalam tulisan ini datangnya dari Allah SWT. Penulis sangat berkenan menerima kritik dan saran untuk melengkapi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil, bahwa tulisan-tulisan ini akan menebarkan suara-suara kebermanfaatan yang akan terus memenuhi kepala kaum-kaum intelektual.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Gowa, 12 Juli 2023

Penulis

DARTI D.,S.KEP

NIM. 70900122045

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Konsep Medis <i>Neoplasma Ovarium Kistik</i>	6
2.2 Konsep Hipnosis 5 Jari.....	11
2.3 Konsep Terapi Musik Alam	12
2.4 Konsep Keperawatan <i>Neoplasma Ovarium Kistik</i>	14
2.5 <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Desain Penelitian	33
3.2 Subjek Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Instrumen Penelitian.....	33
3.5 Prosedur Pengambilan Data	34
3.6 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	34
3.8 Etika Penelitian.....	35
BAB IV LAPORAN KASUS	36
4.1 Pengkajian	36

4.2	Diagnosis Keperawatan	49
4.3	Intervensi	52
4.4	Implementasi	55
4.5	Evaluasi	55
BAB V	PEMBAHASAN	67
5.1	Analisis Pengkajian Keperawatan	67
5.2	Analisis Diagnosis Keperawatan	69
5.3	Analisis Intervensi Keperawatan	70
5.4	Analisis Implementasi Keperawatan	72
5.5	Analisis Evaluasi Keperawatan	75
5.6	Analisis Intervensi <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	77
5.7	Keterbatasan Penelitian	81
BAB VI	PENUTUP	82
6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran-saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	Lampiran 1: Pathway	87
	Lampiran 2: Informed Consent	88
	Lampiran 3: Standar Operasional Prosedur Hipnosis 5 Jari	89
	Lampiran 4: Standar Operasional Prosedur Terapi Musik Alam	90
	Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup	92



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Artikel Utama Dan Pendukung.....	32
Tabel 4.1 Hasil Laboratorium	44
Tabel 4.2 Terapi Obat	45
Tabel 4.3 Klasifikasi Data.....	45
Tabel 4.4 Analisa Data	46
Tabel 4.5 Prioritas Diagnosis Keperawatan	48
Tabel 4.6 Diagnosis Keperawatan.....	49
Tabel 4.7 Intervensi Keperawatan.....	52
Tabel 4.8 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Darti D., S.Kep

NIM : 70900122045

Judul : Analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam

Pendahuluan: Kesehatan reproduksi saat ini telah menjadi fokus pemerintah dalam bidang kesehatan, melihat fenomena ditemukannya pergeseran usia wanita dengan masalah kesehatan reproduksi seperti kista ovarium. Kista ovarium menjadi masalah kesehatan reproduksi kedua terbanyak yang dialami oleh wanita, dimana usia wanita dengan kista ovarium sebelumnya berada di rentang usia 20->45 tahun menjadi 5-18 tahun. WHO mengungkapkan terdapat 14.896 kasus dengan ovarium dengan jumlah kematian mencapai 9.581. Di Indonesia tahun 2018 dilaporkan sebanyak 13.310 perempuan mengalami kista ovarium dengan angka kematian 7.842 orang. **Tujuan:** Studi kasus ini bertujuan penelitian untuk menganalisis asuhan keperawatan kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. **Metode:** Metode penelitian bersifat deskriptif berupa studi kasus. Subyek penelitian ini adalah pasien penyakit kista ovarium dengan keluhan nyeri yang berjumlah satu orang. **Hasil:** Hasil penelitian didapatkan penurunan skala nyeri hari pertama pre test 4, post test 3 dan evaluasi akhir 3. Hari kedua pre test 4, post test 2 dan evaluasi akhir 3. Hari ketiga pre test 3, post test 0 dan evaluasi akhir 2. Intervensi dilakukan 1x/hari selama 3 hari, durasi hipnosis 5 jari 10 menit dan terapi musik alam 5 menit. **Kesimpulan:** Hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dapat digunakan untuk menurunkan skala nyeri pasien kista ovarium.

Kata kunci: kista ovarium, nyeri kronis, hipnosis 5 jari, terapi musik alam



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan reproduksi saat ini telah menjadi fokus pemerintah dalam bidang kesehatan, melihat fenomena yang terjadi ditemukannya pergeseran usia wanita dengan masalah kesehatan reproduksi seperti kista ovarium. Menurut (*Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2022*) Kista ovarium menjadi masalah kesehatan reproduksi kedua terbanyak yang dialami oleh wanita, dimana usia wanita dengan kista ovarium sebelumnya berada di rentang usia 20->45 tahun (kategori remaja akhir hingga dewasa akhir), namun riset yang dilakukan (Wahid, 2022) menunjukkan insidensi kista ovarium terjadi pada anak-anak hingga remaja awal yakni 17% lesi kista didiagnosis dalam 4 tahun pertama kehidupan, 28% lesi didiagnosis pada usia 5-9 tahun dan 55% lesi didiagnosis pada usia 10-18 tahun dengan puncak kejadian pada remaja tahun pertama kehidupan atau sekitar masa menarche.

World Health Organization (WHO, 2020b) mengungkapkan terdapat 14.896 kasus dengan jumlah kematian 9.581. Menurut kategorinya, jenis kista yang paling banyak ditemukan ialah serface epitel stromal tumors dengan 67 pausen (79,8 %) (Bray et al., 2018). Menurut Globocan pada tahun 2018, sekitar 295.414 wanita di seluruh dunia didiagnosis menderita kista ovarium dan 4,4% kematian (Khoiria et al., 2020). Di Amerika Serikat tahun 2023, kista ovarium didiagnosis pada lebih dari 21.000 wanita setiap tahunnya, menyebabkan 14.600 kematian (Apostol & Mobeen, 2023).

Di Indonesia menurut (Kemenkes RI, 2015) kista ovarium mencapai 23.400 orang (37,2%) dan meninggal 13.900 orang (Tidore & Rahakbauw, 2022). Menurut data survey demografi kesehatan indonesia (SDKI, 2017) sebanyak 13.310 perempuan mengalami kista ovarium dengan kematian 3,8% (7.842 orang meninggal) (Khoiria et al., 2020). Insiden kista ovarium pada anak-anak juga cukup bervariasi: 17% lesi didiagnosis dalam 4 tahun pertama kehidupan; 28% lesi didiagnosis pada usia 5-9 tahun, dan 55% lesi didiagnosis pada usia 10-18 tahun. Pada anak-anak dan remaja biasanya

muncul pada periode neonatal, dengan puncak kejadian pada tahun pertama kehidupan, atau sekitar masa menarche. Tinjauan retrospektif terhadap 203 kasus kista ovarium pada anak perempuan di bawah usia 18 tahun menunjukkan bahwa 12% merupakan kasus darurat dan 88% merupakan rujukan rutin (Wahid, 2022).

Kista ovarium sering disebut sebagai silent killer karena banyak wanita yang terlambat mengetahui tentang kista padahal kista dapat diraba dari luar atau membesar. Kista ovarium merupakan kantong berisi cairan yang secara abnormal ditemukan di ovarium (Dewi et al., 2022). Kista ovarium jarang sekali memunculkan tanda torsi, ruptur, atau perdarahan. Ada yang menghubungkan kista ovarium dengan gangguan menstruasi (perpanjangan interval antermenstruasi atau pemendekan siklus) hingga kista ovarium digolongkan sebagai penyakit yang banyak menyebabkan kematian. Kematian yang tinggi tersebut disebabkan karena kista ovarium ini awalnya bersifat asimtomatik (penyakit yang penderitanya tidak merasakan gejala awal) dan baru menimbulkan keluhan apabila sudah terjadi metastasis (penyebaran kanker pada organ lain) sehingga mencapai stadium lanjut pada 60-70% pasien (WHO, 2020a).

Gejala yang paling umum ditemui pada pasien dengan kista ovarium adalah nyeri pelvik, dyspareunia dan kadang-kadang perdarahan abnormal uterus dan kembung dengan sebanyak 30% pasien mengalami nyeri. Gejala yang dapat ditemukan dengan stadium awal kista ovarium yakni gangguan haid, jika sudah menekan rektum atau mungkin terjadi konstipasi atau sering berkemih, dapat terjadi peregangan atau penekanan daerah panggul yang menyebabkan nyeri spontan dan sakit diperut dan nyeri saat bersenggama. Gejala untuk stadium lanjut yakni asites, penyebaran ke omentum (lemak perut) serta organ di dalam rongga perut, perut membuncit, kembung, mual, gangguan nafsu makan, gangguan buang air besar dan kecil, sesak nafas akibat penumpukan cairan di rongga dada (Prawirohardjo, 2016) dalam (Heddy et al., 2023); (Ratih et al., 2022).

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti ketika dinas selama 1

minggu di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar menemukan total kasus kista ovarium di ruangan pinang bawah GSR (gangguan sistem reproduksi) adalah 4 kasus. Dari hasil studi pendahuluan tersebut ditemukan keluhan terbanyak adalah nyeri.

Uraian di atas didukung oleh riset yang dilakukan (Puspita et al., 2021) bahwasanya kista ovarium pada umumnya tidak bergejala tetapi gejala seperti nyeri ataupun gangguan siklus menstruasi dapat terjadi akibat pecahnya dinding kista, penekanan pada organ sekitar, maupun mengarah pada keganasan. Didukung oleh riset (Khoiria et al., 2020) mengungkapkan bahwasanya kista ovarium bisa berubah menjadi ganas/kanker, dapat mengalami torsi atau puntiran sehingga menimbulkan nyeri, pendarahan, infeksi dan kematian.

Penelitian ini berfokus pada pemberian terapi non farmakologis yakni intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam pada pasien dengan kista ovarium. Manfaat hipnosis 5 jari dan terapi musik alam menurut (Wahyudi et al., 2019), (Nuryati, 2020) dapat menurunkan nyeri, memberikan efek rileksasi, otot-otot tidak tegang, memperbaiki pola tidur, menstabilkan tekanan darah, denyut nadi, jantung, memperbaiki pola nafas.

Intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dilakukan 1x/hari selama 3 hari. Pengukuran skala nyeri dilakukan sebelum dan setelah intervensi dan evaluasi akhir setelah dinas, sehingga total pengukuran nyeri sebanyak 9x. Durasi hipnosis 5 jari selama 10 menit dan terapi musik alam selama 5 menit, sehingga total durasi intervensi ± 15 menit. Pemberian intervensi dilakukan saat jam istirahat yakni direntang jam 11.00-13.00 wita untuk memastikan kondisi ruangan pasien dalam keadaan tenang.

Sesuai penelitian (Halim & Khayati, 2020), (Sukmawati et al., 2021), (Budiarti & Nora, 2021) menjelaskan bahwasanya hipnosis 5 jari dapat diberikan selama $\pm 5-20$ menit setiap pertemuan, durasi pemberian intervensi sangat bergantung pada peneliti dalam menyampaikan instruksinya. Penelitian (Khodriyati et al., 2018), (Sesrianty & Wulandari, 2018) menjelaskan terapi musik alam dilakukan selama 10-15 menit, namun jika

tidak memiliki cukup waktu maka terapi ini dapat dilakukan 5-10 menit, karena sudah membantu pikiran pasien beristirahat. Penelitian Boothby and Robbin menyatakan pemberian terapi musik berdurasi panjang membuat pasien merasa bosan. Sehingga peneliti memodifikasi durasi intervensi agar pasien tidak merasa bosan.

Berdasarkan masalah yang ditemukan penulis menerapkan upaya non farmakologis berupa intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dalam risetnya yang berjudul “analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti mengangkat masalah penelitian yaitu analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Melakukan analisis asuhan keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Menganalisis pengkajian keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam?
- b. Menganalisis diagnosis keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam?
- c. Menganalisis intervensi keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam?

- d. Menganalisis implementasi keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam?
- e. Menganalisis evaluasi keperawatan pasien kista ovarium dengan nyeri kronis menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Untuk pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa, sebagai rujukan pengembangan *evidence-based nursing* dalam pelayanan pemberian asuhan keperawatan

1.4.2 Untuk pelayanan kesehatan

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menerapkan intervensi keperawatan berbasis non farmakologis yang mudah dilakukan perawat, bidan serta pasien secara mandiri dalam mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien

1.4.3 Untuk masyarakat

- a. Masyarakat dapat melakukan dan menerapkan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam secara mandiri dalam bidang kesehatan wanita
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dalam mengurangi nyeri kronis yang dirasakan

1.4.4 Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ide penelitian dengan menggunakan indikator atau variabel yang berbeda untuk tetap menjaga keaslian penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Medis *Neoplasma Ovarium Kistik*

2.1.1 Definisi

Kista ovarium adalah kantung yang membesar, yang tumbuh di dalam indung telur. Pembesaran ovarium bisa bersifat fungsional, berupa kistik dan dapat bersifat neoplastic maupun non neoplastic. Kista ini dapat berisi material cairan atau setengah cair dan dapat pula berisi bagian yang padat (Akbar et al., 2020).

Ovarium memiliki kompleksitas pada embriologi, histologi, steroidogenesis dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi neoplasma. Olehnya neoplasma ovarium menunjukkan variasi yang luas pada struktur dan perilakunya (Akbar et al., 2020).

2.1.2 Etiologi

Pasien dengan terapi gonadotropin atau penggunaan agen-agen stimulan lain seperti dalam pengobatan infertilitas dapat menyebabkan sindroma hiperstimulasi. Kondisi lain seperti penggunaan tamoxifen, kehamilan, hipotiroid, merokok, dan ligase tuba juga menjadi faktor risiko kista ovarium (Suryoadji et al., 2022). Faktor resiko terjadinya kista ovarium adalah riwayat kista ovarium sebelumnya, siklus menstruasi yang tidak teratur, meningkatnya distribusi lemak tubuh bagian atas, menstruasi dini, tingkat kesuburan, hipotiroid atau hormon yang tidak seimbang, terapi tamosifen pada kanker mamma (Ratih et al., 2022). Berikut diduga beberapa hal yang menyebabkan kista ovarium antara lain:

a. Disfungsi Hipotalamus-Hipofisis

Luteinizing Hormone (LH) dan Folicle Stimulating Hormone (FSH) yang dihasilkan kompleks hipotalamus-hipofisis yang berfungsi untuk meluruhnya korpus luteum ketika ovum tidak dibuahi bermasalah. Akibatnya pematangan folikel dominan yang tidak pas akan menginduksi kista. Selain

itu akibat perkembangan folikel imatur akan memicu dihasilkannya estradiol yang merupakan pemicu kista ovarium

b. Disfungsi Ovarium atau Folikel

Masih berhubungan dengan kompleks hipotalamus-hipofisis, perubahan ekspresi reseptor LH bisa menyebabkan anovulasi folikel. Pada saat keseimbangan hormon LH dan FSH yang tepat, akan membuat fase ovulasi dan pre-ovulasi folikel. Reseptor FSH dan LH di sel granulosa di kista akan menurun jika dibandingkan dengan folikel normal

c. Predisposisi Kista Folikel Ovarium

Disfungsi tingkat folikel dapat mengganggu kompleks hipotalamus-hipofisis akan mengubah ekspresi reseptor LH yang menginduksi anovulasi folikel. Selain itu reseptor estradiol juga mempengaruhi pembentukan kista. Selain perubahan reseptor dan isi estradiol. Perubahan dalam steroideogenesis oleh folikel dominan mungkin terlibat dalam degenarsi kista. Akibat kombinasi ketiga hal itu akan menghasilkan esterogen aktif dan meningkatkan konsentrasi estradiol.

2.1.3 Klasifikasi dan Patofisiologi

Terdapat dua klasifikasi kista ovarium dan masing-masing memiliki patofisiologinya tersendiri. Klasifikasi tersebut adalah neoplasma ovarium dan kista ovarium fungsional:

a. Kista Ovarium Fungsional

1) Kista Folikuler

Kista folikuler berawal dari folikel yang gagal pecah saat terjadinya ovulasi terutama pada fase folikuler. Jika terjadi kelebihan FSH atau kekurangan LH pada fase puncak LH, ovum dapat tidak dilepas saat proses ovulasi (Suryoadji et al., 2022).

2) Kista Lutein

Pada kista korpus luteum, terjadi kegagalan degradasi

pada korpus luteum. Kista lutein memiliki 2 jenis, kista granulosa dan kista teka. Kista granulosa merupakan perbesaran nonneoplastik dari ovarium disebabkan oleh luteinisasi dinding sel granulosa pasca ovulasi. Setelah ovulasi terjadi, akan terbentuk korpus hemorrahikum akibat terbentuknya vaskularisasi baru dan terkumpulnya darah di tengah. Adanya resorpsi darah di ruangan ini menyebabkan terbentuknya kista korpus luteum. Sebaliknya, hingga saat ini belum ditemukan mekanisme terbentuknya kista teka secara pasti. Umumnya kista teka ditemukan bersamaan dengan PCOS, mola hidatidosa, dan korio karsinoma (Suryoadji et al., 2022).

b. Kista Neoplasma

Kista neoplasma merupakan akibat adanya pertumbuhan yang abnormal pada daerah ovarium. Pertumbuhan ini dapat bersifat ganas ataupun jinak. Beberapa jenis kista jinak diantaranya adalah kistadenoma serosum, kista dermoid, dan kista musinosum (Suryoadji et al., 2022).

2.1.4 Manifestasi Klinis

Secara klinis, kebanyakan wanita dengan kista ovarium tidak menimbulkan gejala dalam waktu yang lama. Gejala umumnya sangat bervariasi dan tidak spesifik (Ratih et al., 2022):

a. Stadium awal gejalanya

- 1) Gangguan haid
- 2) Jika sudah menekan rektum atau VU mungkin terjadi konstipasi atau sering berkemih
- 3) Dapat terjadi peregangan atau penekanan daerah panggul yang menyebabkan nyeri spontan dan sakit diperut
- 4) Nyeri saat bersenggama

b. Stadium lanjut

- 1) Asites

- 2) Penyebaran ke omentum (lemak perut) serta organ di dalam rongga perut
- 3) Perut membuncit, kembung, mual, dan gangguan nafsu makan
- 4) Gangguan buang air besar dan kecil
- 5) Sesak nafas akibat penumpukan cairan di rongga dada

2.1.5 Pemeriksaan Penunjang

a. Ultrasonografi (USG)

Alat peraba (transducer) digunakan untuk memastikan keberadaan kista, membantu mengenali lokasinya dan menentukan apakah isi kista cairan atau padat. Kista berisi cairan cenderung lebih jinak, kista berisi material padat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari gambaran USG dapat terlihat (Ratih et al., 2022):

- 1) Akan terlihat sebagai struktur kistik yang bulat (kadangkadang oval) dan terlihat sangat echolucent dengan dinding yang tipis/tegas/licin, dan di tepi belakang kista nampak bayangan echo yang lebih putih dari dinding depannya
- 2) Kista ini dapat bersifat unilokuler (tidak berseptasi) atau multilokuler (berseptasi)
- 3) Kadang-kadang terlihat bintikbintik echo yang halus-halus (internal echoes) di dalam kista yang berasal dari elemen darah di dalam kista

b. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dapat berguna sebagai skrining maupun diagnosis apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas. Berikut pemeriksaan yang umum dilakukan untuk mendiagnosis kista ovarium (Ratih et al., 2022):

- 1) Pemeriksaan Beta-HCG Pemeriksaan ini digunakan untuk skrining awal apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Pemeriksaan ini dapat menyingkirkan kemungkinan kehamilan ektopik
- 2) Pemeriksaan Darah Lengkap Untuk sebuah penyakit

keganasan, dapat diperkirakan melalui LED. Parameter lain, seperti leukosit, HB, HT juga dapat membantu pemeriksa menilai keadaan pasien

- 3) Urinalisis Urinalisis penting untuk mencari apakah ada kemungkinan lain, baik batu saluran kemih, atau infeksi dan untuk menyingkirkan diagnosis banding
- 4) Pemeriksaan Tumor Marker Tumor marker spesifik pada keganasan ovarium adalah CA125. CEA juga dapat diperiksa, namun CEA kurang spesifik karena marker ini juga mewakili keganasan kolorektal, uterus dan ovarium

c. Pemeriksaan Patologi Anatomi

Pemeriksaan untuk memastikan tingkat keganasan dari tumor ovarium. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan bersama dengan proses operasi, kemudian sampel difiksasi dan diperiksa dibawah mikroskop (Ratih et al., 2022).

2.1.6 Komplikasi

Pada sebagian besar kasus, kista ovarium bersifat jinak dan asimptomatik sehingga tidak memerlukan penanganan lebih lanjut. Namun pada kasus-kasus tertentu, kista ovarium dapat menimbulkan komplikasi seperti torsi, ruptur, dan perdarahan (Savitri et al., 2020).

2.1.7 Penanganan

Penentuan terapi didasarkan pada ukuran kista, tingkat keganasan, dan gejala yang ditimbulkan. Metode observasi dapat dilakukan pada kista yang ditemukan pada perempuan prepubertas dan wanita yang berada dalam masa reproduksi ataupun pada kista yang asimptomatik. Sebaliknya, wanita postmenopause memiliki risiko yang lebih tinggi untuk berkembang menjadi keganasan. Terdapat kriteria seorang wanita postmenopause dengan kista ovarium simpel yang hanya memerlukan observasi ketat saja seperti: (1) kista unilokular ber dinding tipis yang didapatkan dari hasil USG; (2) kista dengan diameter <5 cm; (3) tidak ada pembesaran kista pada periode observasi; (4) kadar CA125 serum

yang normal. Kista yang berdiameter sampai dengan 10 cm masih dapat dilakukan observasi, jika lebih besar maka dapat dipertimbangkan untuk pembedahan (Suryoadji et al., 2022).

Pembedahan dapat dilakukan apabila kista berukuran cukup besar sehingga menimbulkan gejala ataupun pada kecurigaan keganasan. Terapi pembedahan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode minimal invasif seperti laparoskopi serta pembedahan terbuka seperti laparotomi. Pada kista yang berukuran kecil dan jinak dapat dilakukan cystectomy dan oophorectomy secara laparoskopik. Pada cystectomy hanya dilakukan pengangkatan kista tanpa mengangkat seluruh ovarium. Dengan metode ini fertilitas tetap dapat dipertahankan. Metode ini umumnya dilakukan untuk lesi yang berukuran kecil dan pasien masih dalam usia reproduktif dan masih ingin untuk hamil. Sedangkan untuk lesi yang lebih besar lebih dianjurkan untuk dilakukan oophorectomy yaitu metode dengan mengangkat seluruh ovarium karena pada kista yang berukuran lebih besar lebih rendah untuk terjadi ruptur pada saat dilakukan enukleasi. Selain itu pada kista yang lebih besar juga akan semakin sulit untuk dilakukan rekonstruksi anatomi ovarium serta adanya risiko keganasan yang lebih tinggi. Pada wanita postmenopause, oophorectomy lebih dianjurkan karena risiko keganasan kelompok tersebut lebih tinggi dan juga keuntungannya lebih besar dibandingkan dengan risikonya (Suryoadji et al., 2022).

2.2 Konsep Hipnosis 5 Jari

2.2.1 Definisi

Hipnosis 5 jari merupakan salah satu jenis terapi self hipnosis untuk memfokuskan pikiran dengan membawanya ke gelombang alpha/theta yang akan mengakibatkan kondisi rileksasi pada klien sehingga akan berdampak pada kondisi tubuh yang stabil untuk menurunkan nyeri (Hasnah, 2020). Dalam penelitian (Sukmawati et al., 2021) dijelaskan bahwa jenis terapi yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri adalah hipnosis lima jari.

British Medical Association dalam (Sukmawati et al., 2021) menyatakan bahwa hipnosis layaknya obat anastesi dalam bentuk self hipnotik yang efeknya adalah menimbulkan rasa rileks, meregangkan otot-otot, mengurangi cemas dan stress.

2.2.2 Manfaat

Manfaat utama terapi ini adalah memberikan efek rileksasi sehingga dapat bermanfaat untuk mengurangi nyeri. Terapi hipnosis dilakukan untuk memberikan ketenangan, rasa aman dan nyaman. Terapi ini ketika dilakukan akan merangsang sistem di otak yaitu pengaktivasi retikularis yang akan menyebabkan adanya respon saraf otonom. Keadaan demikian memberikan dampak positif pada tekanan darah, denyut nadi dan pola nafas yang akan menjadi stabil, serta kondisi emosional dan mental akan menjadi stabil pula (Wahyudi et al., 2019).

2.3 Konsep Terapi Musik Alam

2.3.1 Definisi

Musik alam dapat diartikan sebagai nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut (Rahmawati, 2020).

Musik alam merupakan suatu terapi non farmakologi tanpa menggunakan obat-obatan yang dapat menstimulus otak dalam mengontrol emosional seseorang dengan alunan musik bertema suara alam dengan tekanan suara diatur ke 50 dB. Contoh musik suara alam seperti suara air terjun, suara angin, kicauan burung dan hujan (Nuryati, 2020).

2.3.2 Manfaat

Terapi musik alam mempengaruhi tekanan darah, nadi, respirasi dan mood seseorang. Dengan pemberian musik sebagai alternatif maka diharapkan pasien dapat mencapai keadaan relaks dan keadaan emosional menjadi stabil dan menurunkan nyeri (Nuryati, 2020).

2.3.3 Jenis-Jenis

Menurut Irawaty (2012) dalam (Nuryati, 2020) ada beberapa jenis musik yang sering dipergunakan untuk terapi musik antara lain:

a. Musik Jazz

Musik jazz adalah perpaduan instrumen yang menggunakan gitar, trombon, piano dan saksofon sebagai musiknya

b. Musik Tradisional

Musik tradisional adalah musik yang berasal dari berbagai daerah.

c. Musik Klasik (Instrumental)

Musik klasik (instrumental) merupakan perpaduan instrumen yang menggunakan biola, violin, piano dan cello sebagai musiknya.

d. Musik dari alam

Musik alam adalah musik yang dihasilkan oleh lingkungan alam sekitar.

2.3.4 Mekanisme Kerja

Musik dan suara menyentuh manusia dengan cara merambat melalui udara sebagai penghantar, baik secara perambatan ritmik, melodik dan dinamik. Namun kemampuan manusia untuk mendengarkan sangat terbatas, telinga normal hanya dapat mendengar bunyi yang memiliki frekuensi antar 20 Hz sampai 20.000 Hz, dan semakin lanjut usia seseorang kemampuan pendengaran akan semakin berkurang (Djohan, 2006) dalam (Nuryati, 2020).

Terapi vibrasi pada musik banyak dipergunakan untuk mempengaruhi perubahan fisiologis, menurunkan tingkat nyeri, kecemasan, menurunkan tekanan darah, detak jantung, ketegangan otot, ACTH (hormon stress), dan mengurangi rasa mual. Perubahan fisiologis ini terjadi karena aktivitas dua sistem neuroendokrin yang dikendalikan oleh hipotalamus yaitu sistem simpatis dan sistem korteks adrenal. Hipotalamus mengaktifkan cabang simpatis dan sistem otonom, menghantarkan impuls saraf ke nukleus-nukleus di batang otak

yang mengendalikan fungsi sistem saraf otonom, sehingga cabang simpatis saraf otonom bereaksi langsung pada otot polos dan organ internal yang menghasilkan beberapa perubahan tubuh seperti peningkatan denyut jantung dan peningkatan tekanan darah, sistem simpatis juga menstimulasi medulla adrenal untuk melepaskan hormon epinefrin (adrenalin) dan norepinefrin ke dalam pembuluh darah, sehingga berdampak meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, dan norepinefrin secara tidak langsung mempengaruhi kelenjar hipofise untuk melepaskan gula dari hati, sementara ACTH (adrenal corticotropin hormon) menstimulasi kortek adrenal yang menyebabkan pelepasan hormon (terutama kortisol) yang meregulasi kadar glukosa dan mineral tertentu (Primadita, 2011) dalam (Nuryati, 2020).

2.4 Konsep Keperawatan *Neoplasma Ovarium Kistik*

2.4.1 Pengkajian

a. Anamnesis

1) Identitas pasien meliputi nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, tempat lahir, asal suku bangsa, nama orang tua, dan pekerjaan orang tua. Keganasan kista ovarium sering dijumpai pada usia sebelum menarche atau di atas 45 tahun.

2) Riwayat Kesehatan

a) Keluhan Utama

Biasanya mengalami perdarahan abnormal atau menorhagia pada wanita usia subur atau wanita di atas usia 50 tahun/menopause untuk stadium awal. Pada stadium lanjut akan mengalami pembesaran massa yang disertai asites

b) Riwayat kesehatan sekarang

Gejala kembung, nyeri pada abdomen atau pelvis, kesulitan makan atau merasa cepat kenyang dan gejala perkemihan kemungkinan menetap. Pada stadium lanjut

sering berkemih, konstipasi, ketidaknyamanan pelvis, distensi abdomen, penurunan berat badan dan nyeri pada abdomen.

c) Riwayat kesehatan dahulu

Riwayat kesehatan dahulu pernah memiliki kanker kolon, kanker payudara dan kanker endometrium

d) Riwayat kesehatan keluarga

Riwayat kesehatan keluarga yang pernah mengalami kanker payudara dan kista ovarium yang beresiko 50%

e) Riwayat haid/status ginekologi

Biasanya akan mengalami nyeri hebat pada saat menstruasi dan terjadi gangguan siklus menstruasi (Hutahaean, 2009).

f) Riwayat obstetri

Biasanya wanita yang tidak memiliki anak karena ketidakseimbangan sistem hormonal dan wanita yang melahirkan anak pertama di usia >35 tahun (Padila, 2015).

g) Data keluarga berencana

Biasanya wanita tersebut tidak menggunakan kontrasepsi oral sementara karena kontrasepsi oral bisa menurunkan risiko ke kista ovarium yang ganas (Reeder, dkk. 2013).

h) Data psikologis

Biasanya wanita setelah mengetahui penyakitnya akan merasa cemas, putus asa, menarik diri dan gangguan seksualitas (Reeder, dkk. 2013).

i) Data aktivitas/istirahat

Pasien biasanya mengalami gejala kelelahan dan terganggu aktivitas dan istirahat karenamengalami nyeri

j) Data sirkulasi

Pasien biasanya akan mengalami tekanan darah tinggi karena cemas.

k) Data eliminasi

Pasien biasanya akan terganggu BAK akibat pembesaran massa yang menekan pelvis.

l) Data makanan/cairan

Biasanya pasien tidak mengalami gangguan dalam nutrisi tetapi kalau dibiarkan maka akan mengalami pembesaran lingkaran abdomen sehingga akan mengalami gangguan gastrointestinal.

m) Data nyeri/kenyamanan

Pasien biasanya mengalami nyeri karena penekanan pada pelvis.

3) Pemeriksaan fisik

a) Kesadaran

Kesadaran pasien tergantung kepada keadaan pasien, biasanya pasien sadar, tekanan darah meningkat dan nadi meningkat dan pernafasan dyspnea.

b) Kepala dan rambut

Tidak ada gangguan yaitu simetris, tidak ada benjolan, tidak ada hematoma dan rambut tidak rontok.

c) Telinga

Simetris kiri dan kanan, tidak ada gangguan pendengaran dan tidak ada lesi.

d) Wajah

Pada mata konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, reflek pupil +/+, pada hidung tidak ada pernapasan cuping hidung, pada mulut dan gigi mukosa tidak pucat dan tidak ada sariawan.

e) Leher

Tidak ada pembengkakan vena jugularis dan pembesaran kelenjar tiroid.

f) Thoraks

Tidak ada pergerakan otot diafragma, gerakan dada simetris.

g) Paru-paru

Inspeksi: Pernapasan dyspnea, tidak ada tarikan dinding dada.

Palpasi: Fremitus kiri dan kanan sama.

Perkusi: Suara ketok sonor, suara tambahan tidak ada.

Auskultasi: Vesikuler.

h) Jantung

Pada pasien kista ovarium biasanya tidak ada mengalami masalah pada saat pemeriksaan di jantung

Inspeksi: Umumnya pada saat inspeksi, Ictus cordis tidak terlihat.

Palpasi: Pada pemeriksaan palpasi Ictus cordis teraba.

Perkusi Pekak.

Auskultasi: Bunyi jantung S1 dan S2 normal. Bunyi jantung S1 adalah penutupan bersamaan katup mitral dan trikuspidalis. Bunyi jantung S2 adalah penutupan katup aorta dan pulmonalis secara bersamaan.

i) Payudara/mamae

Simetris kiri dan kanan, aerola mammae hiperpigmentasi, papila mammae menonjol, dan tidak ada pembengkakan.

j) Abdomen

Inspeksi: Pada stadium awal kista ovarium, belum adanya perbesaran massa, sedangkan pada stadium lanjut kista ovarium, akan terlihat adanya asites dan perbesaran massa di abdomen

Palpasi: Pada stadium awal kista ovarium, belum adanya perbesaran massa, sedangkan pada stadium lanjut kanker ovarium, di raba akan terasa seperti karet atau batu

massa di abdomen

Perkusi: Hasilnya suara hipertympani karena adanya massa atau asites yang telah bermetastase ke organ lain

Auskultasi: Bising usus normal yaitu 5- 30 kali/menit

k) Genitalia

Pada beberapa kasus akan mengalami perdarahan abnormal akibat hiperplasia dan hormon siklus menstruasi yang terganggu. Pada stadium lanjut akan dijumpai tidak ada haid lagi.

l) Ekstremitas

Tidak ada edema, tidak ada luka dan CRT kembali < 2 detik. Pada stadium lanjut akan ditandai dengan kaki edema.

2.4.2 Diagnosa Keperawatan

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan diagnosa medis *neoplasma ovarium kistik* yakni:

1. Ansietas

a. Definisi

Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

b. Penyebab

Penyebab dari ansietas yaitu krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis maturasional, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap kematian, kekhawatiran mengalami kegagalan, disfungsi sistem keluarga, hubungan orang tua-anak tidak memuaskan, faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir), penyalahgunaan zat, terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan dan

lain-lain), dan kurang terpapar informasi.

c. Gejala dan tanda mayor

Subjektif:

- 1) Merasa bingung
- 2) Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi
- 3) Sulit berkonsentrasi

Objektif:

- 1) Tampak gelisah
- 2) Tampak tegang
- 3) Sulit tidur

d. Gejala dan tanda minor

Subjektif:

- 1) Mengeluh pusing
- 2) Anoreksia
- 3) Palpitasi
- 4) Merasa tidak berdaya

Objektif

- 1) Frekuensi napas meningkat
- 2) Frekuensi nadi meningkat
- 3) Tekanan darah meningkat
- 4) Diaforesis
- 5) Tremor
- 6) Muka tampak pucat
- 7) Suara bergetar
- 8) Kontak mata buruk
- 9) Sering berkemih
- 10) Berorientasi pada masa lalu

e. Kondisi klinis terkait

- 1) Penyakit kronis progresif (mis kanker penyakit autoimun)
- 2) Penyakit akut
- 3) Hospitalisasi

- 4) Rencana operasi
- 5) Kondisi diagnosis penyakit belum jelas
- 6) Penyakit neurologis 7 Tahap tumbuh kembang

2. Nyeri kronis

a. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

b. Penyebab

- 1) Kondisi muskulokeletal kronis
- 2) Kerusakan sistem saraf
- 3) Penekanan saraf
- 4) Infiltrasi tumor
- 5) Ketidakseimbangan neurotransmitter neuromodulator, dan reseptor
- 6) Gangguan imunitas (mis neuropati terkait HIV, virus varicella zoster)
- 7) Gangguan fungsi metabolic
- 8) Riwayat posisi kerja statis
- 9) Peningkatan indeks massa tubuh
- 10) Kondisi pasca trauma
- 11) Tekanan emosional
- 12) Riwayat pembedahan (mis fisik, psikologis dan seksual)
- 13) Riwayat penyalahgunaan obat/zat

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif:

- 1) Mengeluh nyeri
- 2) Merasa depresi

Objektif:

- 1) Tampak meringis

- 2) Gelisah
- 3) Tidak mampu menuntaskan aktivitas
- d. Gejala dan Tanda Minor
 - Subjektif: Merasa takut mengalami cedera berulang
 - Objektif:
 - 1) Bersikap protektif (mis posisi menghindari nyeri)
 - 2) Waspada
 - 3) Pola tidur berubah
 - 4) Anoreksia
 - 5) Fokus menyempit
 - 6) Berfokus pada diri sendiri
 - e. Kondisi Klinis Terkait
 - 1) Kondisi kronis (arthritis rheumatoid)
 - 2) Infeksi
 - 3) Cedera medulla spinalis
 - 4) Kondisi pasca trauma
 - 5) Tumor
3. Risiko infeksi
 - a. Definisi

Berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik
 - b. Faktor Risiko
 - 1) Penyakit kronis (mis. diabetes melitus)
 - 2) Efek prosedur infasif
 - 3) Malnutrisi
 - 4) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan
 - 5) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
 - a) Gangguan peristaltik
 - b) Kerusakan integritas kulit
 - c) Perubahan sekresi pH
 - d) Penurunan kerja siliaris

- e) Ketuban pecah lama
 - f) Ketuban pecah sebelum waktunya
 - g) Merokok
 - h) Statis cairan tubuh
- 6) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
- a) Penurunan hemoglobin
 - b) Imunosupresi
 - c) Leukopenia
 - d) Supresi respon inflamasi
 - e) Vaksinasi tidak adekuat

c. Kondisi Klinik Terkait

- 1) AIDS
- 2) Luka bakar
- 3) Penyakit paru obstruksi kronis (PPOK)
- 4) Diabetes melitus
- 5) Tindakan invasif
- 6) Kondisi penggunaan teraoid steroid
- 7) Penyalahgunaan obat
- 8) Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW)
- 9) Kanker
- 10) Gagal ginjal
- 11) Imunosupresi
- 12) *Lymphedema*
- 13) Leukositopenia
- 14) Gangguan fungsi hati

4. Defisit nutrisi

a. Definisi

Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme

b. Penyebab

- 1) Ketidakmampuan menelan makanan

- 2) Ketidakmampuan mencerna makanan
- 3) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
- 4) Peningkatan kebutuhan metabolisme
- 5) Faktor ekonomi (mis, finansial tidak mencukupi)
- 6) Faktor psikologis (mis, stres, keengganan untuk makan)

c. Gejala dan Tanda Mayor

Objektif: Berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal

d. Gejala dan Tanda Minor

Subjektif:

- 1) Cepat kenyang setelah makan
- 2) Kram/nyeri abdomen
- 3) Nafsu makan menurun

Objektif:

- 1) Bising usus hiperaktif
- 2) Otot pengunyah lemah
- 3) Otot menelan lemah
- 4) Membran mukosa pucat
- 5) Sariawan
- 6) Serum albumin turun
- 7) Rambut rontok berlebihan

e. Kondisi Klinis Terkait

- 1) Stroke
- 2) Parkinson
- 3) Mobius syndrome
- 4) Cerebral palsy
- 5) Cleft lip
- 6) Cleft palate
- 7) Amyotrophic lateral sclerosis
- 8) Kerusakan neuromuskular

- 9) Luka bakar
- 10) Kanker
- 11) Infeksi
- 12) AIDS
- 13) Penyakit Crohn's
- 14) Enterokolitis
- 15) Fibrosis kistik

2.4.3 Rencana Keperawatan

Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) intervensi keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis *neoplasma ovarium kistik* yakni:

1. Ansietas

Intervensi keperawatan: Reduksi Ansietas

Observasi

- a. Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (mis. Kondisi, waktu, stressor)
- b. Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
- c. Monitor tanda ansietas (verbal dan non verbal)

Rasional:

- 1) Untuk mengetahui penyebab timbulnya cemas pada klien
- 2) Untuk mengetahui seberapa mampu klien memutuskan tindakan yang akan diberikan padanya
- 3) Untuk melihat respon kecemasan klien

Terapeutik

- a. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
- b. Temani pasien untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
- c. Pahami situasi yang membuat ansietas
- d. Dengarkan dengan penuh perhatian
- e. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
- f. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan

g. Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang

Rasional:

- 1) Menumbuhkan kepercayaan klien dapat memudahkan proses komunikasi
- 2) Agar klien tidak merasa sendiri
- 3) Untuk mendukung situasi pasien
- 4) Berbagi cerita dapat menurunkan kecemasan
- 5) Agar klien bisa bercerita dengan nyaman
- 6) Untuk membantu klien mengatasi kecemasan yang di hadapi
- 7) Untuk mempersiapkan hal yang akan dilakukan kedepannya

Edukasi

- a. Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
- b. Informasikan secara factual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
- c. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien, jika perlu
- d. Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
- e. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
- f. Latih kegiatan pengalihan, untuk mengurangi ketegangan
- g. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
- h. Latih teknik relaksasi

Rasional:

- 1) Untuk memberikan informasi terkait kondisi klien
- 2) Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan
- 3) Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi

- 4) Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan
- 5) Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan
- 6) Untuk memudahkan klien melakukan intervensi
- 7) untuk menurunkan kecemasan pasien
- 8) Menurunkan kecemasan yang dirasakan pasien

Kolaborasi: Kolaborasi pemberian obat anti anxietas, jika perlu

Rasional: Mendukung penurunan tingkat kecemasan

2. Nyeri kronis

Intervensi Keperawatan: Manajemen Nyeri

Observasi:

- a. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
- b. Identifikasi skala nyeri
- c. Identifikasi respon nyeri non verbal
- d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- f. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri
- g. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- h. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- i. Monitor efek samping penggunaan analgetik

Rasional:

- 1) Untuk mengetahui tingkat nyeri
- 2) Untuk mengetahui seberapa berat nyeri
- 3) Untuk mengetahui respon non verbal
- 4) Untuk mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan nyeri
- 5) Untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
- 6) Untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap respon nyeri

- 7) Untuk mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup
- 8) Untuk mengetahui keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan
- 9) Untuk mengetahui efek samping penggunaan analgetik

Terapeutik:

- a. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri
- b. Fasilitasi istirahat dan tidur
- c. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- d. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Rasional:

- 1) Untuk meredakan nyeri
- 2) Untuk memberi rasa nyaman
- 3) Untuk mengetahui lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis: suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)
- 4) Untuk mengetahui jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri

Edukasi:

- a. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri
- b. Jelaskan strategi meredakan nyeri
- c. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri
- d. Anjurkan menggunakan analgesik secara tepat
- e. Ajarkan Teknik farmakologis untuk mengurangi nyeri

Rasional:

- 1) Agar klien dapat mengetahui penyebab dan pemicu nyeri yang ia alami
- 2) Agar klien mampu meredakan secara mandiri
- 3) Agar pasien bisa memantau nyeri secara mandiri
- 4) Agar pasien bisa menggunakan analgesik secara tepat
- 5) Agar pasien mengetahui teknik farmakologis untuk

mengurangi nyeri

Kolaborasi: Kolaborasi pemberian analgetik

Rasional: Untuk mengurangi nyeri

3. Risiko infeksi

Intervensi: Pencegahan Infeksi

Observasi: Monitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik

Rasional: Untuk mengetahui tanda dan gejala infeksi local dan sistemik

Terapeutik: Pertahankan tehnik aseptik pada pasien yang beresiko tinggi

Rasional: Klien dapat melakukan atau menerapkan tehnik aseptik jika klien memiliki penyakit yang beresiko tinggi

Edukasi:

- a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi
- b. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi
- c. Anjurkan meningkatkan asupan cairan

Rasional:

- 1) Agar klien mampu mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi
- 2) Agar klien mampu meningkatkan asupan nutrisinya
- 3) Agar klien mampu meningkatkan asupan cairannya

Kolaborasi: Anjurkan pemberian imunisasi, jika perlu

Rasional: Bisa di berikan kepada bayi dan anak jika perlu agar tidak terkena infeksi lagi

4. Defisit nutrisi

Intervensi Keperawatan: Manajemen nutrisi

Observasi:

- a. Identifikasi status nutrisi
- b. Identifikasi makanan yang disukai
- c. Monitor asupan makanan

Rasional:

- 1) Mengetahui status nutrisi
- 2) Meningkatkan nafsu makan
- 3) Mengetahui asupan makanan

Terapeutik:

- a. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai
- b. Berikan suplemen makanan, jika perlu

Rasional:

- 1) Meningkatkan nafsu makan
- 2) Meningkatkan nafsu makan

Edukasi: Anjurkan posisi duduk, jika perlu

Rasional: Posisi yang baik untuk makan

Kolaborasi: Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan (mis:

Pereda nyeri, antiemetik), jika perlu

Rasional: Untuk mengatasi kesulitan saat makan

2.4.4 Implementasi Keperawatan

a. Validasi Rencana Keperawatan

Tujuan validasi data adalah menekan serendah mungkin terjadinya kesalahpahaman atau salah persepsi. Karena adanya potensi manusia berbuat salah dalam proses penilaian.

b. Dokumentasi Rencana Keperawatan

Agar rencana perawatan dapat berarti bagi semua pihak, maka harus mempunyai landasan kuat dan bermanfaat secara optimal. Perawat hendaknya mengadakan pertemuan dengan tim kesehatan lain untuk membahas data, masalah, tujuan serta rencana tindakan.

c. Tindakan Keperawatan

Meskipun perawat sudah mengembangkan suatu rencana keperawatan yang maksimal, kadang timbul situasi yang bertentangan dengan tindakan yang direncanakan, maka kemampuan perawat diuji untuk memodifikasi alat maupun situasi

2.4.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi terdiri atas evaluasi struktur, proses dan hasil. Evaluasi struktur berisi tentang faktor lingkungan, kesediaan perlengkapan, fasilitas fisik, rasio perawat-klien, administrasi serta kompetensi perawat dalam area yang diinginkan. Evaluasi proses berfokus pada jenis informasi yang didapat pada saat wawancara dan pemeriksaan fisik, validasi dari perumusan diagnosis keperawatan, dan kemampuan tehnikal perawat. Evaluasi hasil berfokus pada respons dan fungsi klien. Respons perilaku klien merupakan pengaruh dari intervensi keperawatan dan akan terlihat pada pencapaian tujuan dan kriteria hasil. Evaluasi hasil terdiri atas evaluasi subjektif, objektif, analisis dan planning (SOAP).

2.5 Evidence Based Practice In Nursing

2.5.1 Pengertian

Hipnosis lima jari adalah teknik relaksasi dengan membayangkan memakai 5 jari. Musik alam merupakan nada/suara mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama menggunakan alat bunyi.

2.5.2 Tujuan

Mengurangi skala nyeri, memberikan relaksasi dan melancarkan peredaran darah.

2.5.3 Indikasi

Pasien yang mengalami nyeri

2.5.4 Kontraindikasi

Pasien yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan kejiwaan dan pasien yang mengalami kecemasan berat

2.5.5 Prosedur pemberian

- a. Memberi salam atau menyapa klien
- b. Memperkenalkan diri
- c. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan
- d. Menanyakan kesiapan klien
- e. Mencuci tangan sebelum tindakan

- f. Membaca Basmalah
- g. Anjurkan klien untuk mengatur posisi se nyaman mungkin
- h. Lakukan intervensi hipnosis 5 jari dengan durasi 10 menit
- i. Instruksikan klien melakukan relaksasi napas dalam terlebih dahulu dengan menutup mata
- j. Bayangkan bahwa anda dalam keadaan sehat (sambil menyentuh ibu jari dan jari telunjuk)
- k. Rasakan keadaan sehat anda pada saat ini dan nikmatilah keadaan sehat anda
- l. Bayangkan orang-orang yang anda cintai berada di samping anda (sambil menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari)
- m. Nikmati kebahagiaan yang anda rasakan, ucapkan dalam hati “betapa bahagianya saya saat ini”
- n. Bayangkan bahwa orang yang anda cintai tersebut memberikan pujian yang paling indah untuk anda (sambil menyentuhkan ujung jari manis ke ibu jari)
- o. Rasakan betapa bahagianya anda, menikmati kebahagiaan itu sambil tersenyum. Katakan lagi dalam hati “betapa bahagianya saya saat ini”
- p. Bayangkan tempat yang paling indah (sambil menyentuhkan ujung jari kelingking dengan ujung ibu jari)
- q. Rasakan betapa bahagianya anda saat ini dan ucapkan kembali dalam hati sambil tersenyum “saya semakin bahagia.. saya sangat bahagia”
- r. Berikan waktu jeda lalu bunyikan musik alam menggunakan handphone dan meletakkannya didekat pasien
- s. Lakukan terapi musik alam pada klien selama 5 menit dengan volume 50%
- t. Instruksikan klien untuk membuka mata secara perlahan-lahan
- u. Lakukan relaksasi nafas dalam kemudian lakukan pengukuran skala nyeri

- v. Melakukan evaluasi perasaan klien
- w. Dokumentasikan hasil dari intervensi dan menyampaikan rencana tindakan lanjut

2.5.6 Kriteria evaluasi

Skala nyeri pasien, respon pasien dan komunikasi selama intervensi dilakukan.

2.5.7 Artikel utama dan pendukung

Tabel 2.1 Artikel Utama Dan Pendukung

No	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
1.	Ni Made Nopita Sari Dan Ni Made Risna Sumawati	2017	Penerapan Self Hypnosis Pada Ny “Sw” Umur 40 Tahun Dengan Kista Ovarium (Penatalaksanaan Pada Gangguan Reproduksi Dengan Kista Ovarium Di Ruang Dara Rsud Wangaya)	Caring
2.	Erwina Dwi Fitrianingrum, Rohmayanti, Reni Mareta	2018	Hipnosis 5 Jari Berpengaruh Pada Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea	Jurnal Menara Medika
3.	Alamsah Rusdi Halim, Nikmatul Khayati	2020	Pengaruh Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks	Ners Muda
4.	Rista Dian Anggraini	2019	Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I	Jurnal Kesehatan Midwiners lion
5.	V.A Irmayanti Harahap	2018	Pengaruh Terapi Musik Mozart Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Haid Pada Mahasiswi Tingkat 1 Stikes Prima Jambi Tahun 2016	Scientia Journal

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut (Hidayat, 2021) studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang sifatnya timbal balik atau saling berinteraksi dan memperoleh gambaran realitas secara lengkap.

3.2 Subjek Penelitian

Subyek dalam studi kasus ini adalah pasien dengan kista ovarium yang mengalami nyeri.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus studi kasus ini yaitu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan diagnosa medis *neoplasma ovarium kistik* dengan menggunakan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. Intervensi dilakukan 1x/hari selama 3 hari. Pengukuran skala nyeri dilakukan sebelum dan setelah intervensi dan saat evaluasi akhir setelah dinas, sehingga total pengukuran nyeri dilakukan 9 kali. Durasi hipnosis 5 jari 10 menit dan dilanjutkan terapi musik alam 5 menit, diberikan diwaktu istirahat jam 11.00-13.00 wita.

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan adalah format asuhan keperawatan dan pengukuran tingkat nyeri metode NRS (*numeric rating scale*). Tingkatan NRS yakni tidak ada nyeri (0), nyeri ringan (1-3), nyeri sedang (4-6), nyeri berat (7-10) (Marsidi, 2021). Instrument format asuhan keperawatan GSR memiliki beberapa bagian yakni:

3.4.1 Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah utama, pengkajian seksualitas, makanan dan cairan, eliminasi, aktivitas/istirahat, hygiene, sirkulasi, nyeri/ketidakhnyamanan, pernapasan, interaksi sosial, integritas ego, neurosensoris, keamanan, penyuluhan dan pembelajaran, pemeriksaan diagnostik, terapi dan pengobatan. Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang ditemukan dari pasien

3.4.2 Format analisa data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah

3.4.3 Format diagnosis keperawatan

3.4.4 Format rencana asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan SIKI, dan rasional

3.4.5 Format implementasi dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosis keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi

3.5 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

3.5.1 Menentukan subyek penelitian yang disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi

3.5.2 Melakukan penelusuran data pasien dengan pengecekan buku rekam medis pasien

3.5.3 Melakukan observasi kondisi pasien

3.5.4 Melakukan wawancara bersama pasien dan keluarga pasien

3.5.5 Melakukan pemeriksaan fisik pasien

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruangan Pinang bawah GSR RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 3-5 Juli 2023.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisa data untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan

pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan mengevaluasi respon pasien sesuai SOAP setelah tindakan.

3.8 Etika Penelitian

3.8.1 *Non Maleficence* dan *Beneficence*

a. Nilai Ilmiah

Pada penelitian ini tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam penelitian ini, karena intervensi dilakukan oleh pasien secara mandiri sambil didampingi oleh peneliti.

b. Manfaat

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat secara langsung yaitu akan menjadi nyaman dan tenang, dan akan memperoleh manfaat jangka panjang karena telah mengetahui cara dalam menangani nyeri.

3.8.2 *Respect For Person*

a. Informed Consent/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP)

Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum dilaksanakan penelitian. Responden memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden.

b. Rahasia (*Privacy*)

Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden.

c. *Justice*

Responden diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan antara satu responden dengan responden lainnya.

BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian

I. Data umum klien

Inisial: Nn A

Usia: 42 tahun

Jenis kelamin: Perempuan

Pekerjaan: Petani

Pendidikan terakhir: SMA

Agama: Islam

Alamat: Luwu utara

Status perkawinan: Belum menikah

Tgl masuk RS: 12 Juni 2023, jam 23.05 wita

Tgl pengkajian: 3 Juli 2023

Tindakan medis: Rencana tindakan operasi Debulking

II. Masalah utama

Keluhan utama: nyeri perut bawah

Riwayat keluhan utama

1. Mulai timbulnya: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang, pasien mengatakan nyerinya hilang timbul
2. Keluhan lain: pasien mengatakan nafsu makannya menurun, keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur
3. Usaha klien untuk mengatasinya: tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul, keluarga mengatakan pasien hanya berusaha mengikuti pengobatan dan perawatan demi kesembuhannya

III. Pengkajian Fisik

Seksualitas

Subyektif:

1. Usia menarche 14 tahun

2. Siklus haid 1x/30 hari
3. Durasi haid 7 hari
 - Dismenorea Polimenorea Oligenorea
 - Menometroragie Amenorea
4. Metode kontrasepsi terakhir: tidak menggunakan alat kontrasepsi
5. Status obstetri: G: 0 P: 0 A: 0
6. Riwayat persalinan: tidak pernah melakukan proses persalinan

Obyektif:

PAP smear: tindakan PAP Smear tidak pernah dilakukan

Makanan dan Cairan

Subyektif:

1. Masukan oral 4 jam terakhir: keluarga mengatakan pasien mengonsumsi makanan yang disediakan berupa nasi, sayur, ikan dan buah apel
2. Mual /muntah makan: pasien tidak mual dan muntah
3. Frekuensi makan: keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/hari, sekarang pasien hanya makan 1-2x/hari
4. Hilang nafsu makan: pasien mengatakan nafsu makannya menurun
5. Masalah mengunyah: pasien mengatakan perutnya terasa penuh
6. Pola: keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring
7. Konsumsi cairan:

$$\begin{aligned}
 \text{Balance cairan} &= \text{cairan masuk} - (\text{cairan keluar} + \text{IWL}) \\
 &= 2500 \text{ cc} - (1500 + 1200 + 437,7) \\
 &= 1087,7 \text{ cc/24 jam}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Cairan masuk: obat-obatan (ceftriaxone, curcuma, vitamin c, infus nacl, zinc, vitamin b kompleks, ekstra kapsul ikan gabus), makanan pokok (nasi, ikan, sayur dan buah) dan makanan pendamping berupa buah seperti apel dan pisang sebagai cemilan

Cairan keluar: penggunaan drain 1500 cc/24 jam berwarna hijau,

BAB, BAK dan IWL 437,7 cc

Obyektif:

1. BB sebelum sakit: 40 kg, BB saat ini: 25 kg, TB: 150 cm, Lila: 16 cm
2. IMT: 11,11 kg/m² (kurus)
3. Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir
4. Membran mukosa mulut: pucat
5. Kebutuhan cairan: 1800 cc/24 jam

Lainnya: tampak lemas, diet tinggi protein konsistensi lunak ditambah formula susu rendah natrium. Energi 1600 kkal, Lemak 48 gr, Ha <2000 mg, Protein 72 gr, Karbohidrat 220 gr

Eliminasi

Subyektif:

1. Frekuensi defekasi: keluarga mengatakan pasien BAB 1x/2 hari
2. Penggunaan laksatif: tidak ada
3. Waktu defekasi terakhir: keluarga mengatakan waktu terakhir BAB kemarin yakni minggu 2 Juli 2023
4. Nyeri/rasa terbakar/sulit berkemih: tidak ada kesulitan berkemih
5. Riwayat penyakit ginjal dan penyakit kandung kemih: tidak ada
6. Penggunaan Diuretik: tidak ada

Obyektif:

1. Pemasangan kateter: penggunaan kateter urine sejak Rabu 28 Juni 2023
2. Bising usus: sulit dilakukan pemeriksaan
3. Karakter urine: urine berwarna kuning
4. Frekuensi berkemih: +-1200 cc/24 jam
5. Konsistensi feces: konsistensi BAB lunak
6. Warna Feces: BAB berwarna kuning kecokelatan
7. Palpasi Kandung kemih (teraba/tidak teraba): tidak teraba

Aktivitas/istirahat

Subyektif:

1. Tidur malam (jam): keluarga mengatakan pasien biasanya tidur jam

setengah 9 malam

2. Tidur siang (jam): keluarga mengatakan pasien biasanya tidur jam 12 siang

Lainnya: Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur

Obyektif:

1. GCS: GCS 15 CM, E4M5V6
2. Muscle Stretch refleks: refleks normal
3. Rentang pergerakan sendi (ROM): gerakan terbatas akibat asites
4. Derajat kekuatan otot: $\frac{5}{5} \mid \frac{5}{5}$
5. Kuku (warna): merah
6. Membran Mukosa: membran mukosa pucat
7. Konjungtiva: konjungtiva pucat
8. Sklera: tidak ikterik

Hygiene

Subyektif:

1. Kebersihan rambut (frekuensi): tampak bersih, keluarga mengatakan pasien terkadang dicuci rambutnya
2. Kebersihan badan: bersih, keluarga mengatakan pasien dilap untuk membersihkan badannya
3. Kebersihan gigi/mulut: keluarga mengatakan pasien kadang mau membersihkannya kadang juga tidak, disesuaikan kondisi pasien

Objektif:

1. Cara berpakaian: pasien tampak memakai pakaian dibantu keluarga dan kadang hanya memakai sarung
2. Kondisi kulit kepala: bersih

Sirkulasi

Subyektif

1. Riwayat penyakit jantung: tidak ada
2. Riwayat demam reumatik: tidak ada

Obyektif:

1. Tekanan darah: TD 142/91 mmHg
2. Nadi: N 84x/m
3. Distensi vena jugularis (ada/tidak ada): tidak ada
4. Bunyi jantung: suara jantung pertama (S1), suara jantung kedua (S2)
5. Irama (teratur/tidak teratur): teratur
6. Suhu (hangat/akral dingin): akral hangat, S 36,5°C
7. CRT: <3 detik
8. Varises (ada/tidak ada): tidak ada

Nyeri/ketidaknyamanan

Subyektif:

1. Lokasi: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang
2. Intensitas (skala 0-10): skala nyeri 4 NRS (sedang)
3. Intensitas: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk
4. Durasi: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul
5. Faktor pencetus: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak
6. Cara mengatasi: tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul

Objektif:

- ✓ Tampak meringis
- ✓ Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul
- Fokus menyempit

Pernafasan

Subyektif:

- Dispnea: ada riwayat sesak dan sesak saat banyak beraktivitas
- Batuk/sputum: tidak ada batuk
- Rronkhitis/asma/tuberculosis/emfisema/pneumonia: tidak ada
- Perokok: tidak pernah
- Penggunaan alat bantu pernafasan (O2) L/menit: ada riwayat penggunaan O2 nasal kanul 3 lpm

Obyektif:

1. Frekuensi: P 18x/m
2. Irama :
 - ✓ Eupnoe □ Tachipnoe □ Kusmaul
 - Bradipnoe □ Apnoe □ Biots
 - Hiperventilasi □ Cheynestokes
3. Bunyi nafas:
 - ✓ Vesikuler □ Bronchovesikuler □ Bronchial

Interaksi sosial

Subyektif

1. Satus pernikahan: belum menikah Lama pernikahan: -
2. Tinggal serumah dengan: keluarga mengatakan pasien tinggal dengan saudaranya

Obyektif

Komunikasi verbal/nonverbal dengan orang terdekat: baik

Integritas ego

Subyektif

1. Perencanaan kehamilan: tidak ada
2. Perasaan klien/keluarga tentang penyakit: keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini
3. Status hubungan: hubungan dengan keluarga terjalin baik
4. Masalah keuangan: tidak ada
5. Cara mengatasi stres: tidak ada

Obyektif

1. Status emosional (cemas, apatis, dll): pasien tampak cemas
2. Respon fisiologis yang teramati: tampak kebingungan
3. Muncul perasaan: keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal, jarang melakukan kontak mata dengan petugas
4. Tingkat ansietas: tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang)

Neurosensori

Subyektif

1. Pusing (ada/tidak ada): pasien mengatakan pusing
2. Kesemutan/kebas/kelembaban (lokasi): tidak ada

Keamanan

Subyektif:

1. Alergi/sensitivitas: tidak ada
2. Penyakit masa kanak-kanak: tidak ada
3. Riwayat imunisasi: lengkap
4. Riwayat kecelakaan: tidak ada
5. Fraktur dislokasi: tidak ada
6. Lainnya: Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu

Obyektif

1. Integritas kulit: turgor kulit menurun
2. Cara berjalan: pasien tidak dapat berjalan akibat asites

Penyuluhan/pembelajaran

Subyektif

1. Bahasa dominan: bahasa Indonesia
2. Sumber pendidikan tentang penyakit: informasi penyakit dari petugas kesehatan
3. Edukasi yang dibutuhkan:
 - a. Edukasi nutrisi
Makanan yang baik dikonsumsi oleh pasien seperti pir, apel, jeruk, pisang, ikan, tahu dan kacang-kacangan. Selain itu informasi program diet tinggi protein dan diet formula susu rendah natrium juga sangat dibutuhkan oleh pasien dan keluarga
 - b. Edukasi psikologis
Memperhatikan psikologis keluarga karena kondisi pasien.

Pemeriksaan diagnostik:

1. USG Abdomen. Tanggal pemeriksaan: 3/4/2023


Hasil: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy

2. Pemeriksaan ADT (Apus darah tepi). Tanggal pemeriksaan: 15/5/2023

Hasil: anemia, neutrofilia dan trombositosis reaktif


3. MSCT Abdomen. Tanggal pemeriksaan: 4/5/2023

Hasil: multiple kista



4. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang. Tanggal pemeriksaan: 22/5/2023

Hasil: peningkatan aktivitas trombopoiesis



5. Foto thoraks. Tanggal pemeriksaan: 26/6/2023

Hasil: efusi pleura dextra



6. Hasil laboratorium

Tanggal	Test	Hasil	Nilai Normal
26/6/2023		Hasil Tidak Normal	
	Albumin	2,1	3.8-5.1 gr/dl
	HGB	11,9	12.0-16.0 gr/dL
	PLT	418	150-400 mcL
	RDW CV	24,2	10.0-15.0 %
	PDW	7,7	10.0-18.0 fL
	Neutrofil	81,3	52.0-75.0 %
	Lymph	9,1	20.0-40.0 %
	Mono	8,6	2.00-8.00 %
EO	0,8	1.00-3.00 %	

LED 1	45	P <20 mm
INR	1,11	0.8-1.1
GOT	112	5-40 L
GPT	77	7-56 L
Hasil normal		
Natrium	140	135-145 mcL
Kalium	3,8	3.7-5.2 mmol/L
Klorida	106	96-106 mmol/L
WBC	9,5	4.00-10.0 mcL
RBC	4,49	4.00-6.00 mcL
HCT	37	37.0-48.0 %
MCV	83	80.0-97.0 fL
MCH	27	26.5-33.5 pg
MCHC	32	31.5-35.0 gr/L
RDW SD	52,2	37.0-54.0 fL
MPV	8,3	6.50-11.0 fL
PCT	0,35	0.15-0.50 %
Baso	0,2	0.00-0.10 %
PT	11,5	10-13 dtk
APTT	25,9	25-35 dtk
Ureum	25	15-38 mg/dl
GDS	131	<200 mg/dL
Kreatin	0,44	0.7-1.4 mg/dl

Tabel 4.1 Hasil Laboratorium

7. Terapi obat

No	Nama Obat	Dosis dan Rute	Fungsi
1.	Ceftriaxone	1 gr/12 jam/IV	Membantu membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh
2.	Curcuma	400 mg/24 jam/oral	Meningkatkan nafsu makan, menjaga daya tahan tubuh, memelihara fungsi hati
3.	Vitamin C	500 mg/24 jam/oral	Meningkatkan daya tahan tubuh, memperkuat jaringan tubuh, mempercepat pemulihan saat sakit
4.	Infus NaCl	200 mg/8 jam/oral	Mengembalikan keseimbangan elektrolit pada kondisi dehidrasi
5.	Zinc	20 mg/24 jam/oral	Membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mengatasi defisiensi zinc
6.	Vitamin B kompleks	2 tab/8 jam/oral	Menjaga fungsi dan perkembangan sel tubuh, mengubah karbohidrat makanan jadi

			energi
7.	Ekstra kapsul ikan gabus	2 cap/8 jam/oral	Mempercepat penyembuhan luka, membantu memenuhi kebutuhan albumin dalam tubuh

Tabel 4.2 Terapi Obat

KLASIFIKASI DATA

Data Objektif	Data Subjektif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak kebingungan 2. Pasien tampak cemas 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Jarang melakukan kontak mata dengan petugas 5. Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir 6. BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus) 7. Tampak lemas 8. Konjungtiva pucat 9. Membran mukosa pucat 10. Turgor kulit menurun 11. Skala nyeri 4 NRS (sedang) 12. Tampak meringis 13. Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul 14. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis 15. USG abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy 16. Pemeriksaan ADT: anemia, neutrofilia dan trobositosis reaktif 17. MSCT abdomen: multiple kista 18. Penggunaan drain 1500 cc/24 jam 19. Tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang) 20. Albumin 2,1 21. PLT 418 22. PDW 7,7 23. Neutrofil 81,3 24. Lymph 9,1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur 2. Keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal 3. Keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini 4. Pasien mengatakan nafsu makannya menurun 5. Pasien mengatakan perutnya terasa penuh 6. Keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h 7. Keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring 8. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu 9. Pasien mengatakan pusing 10. P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul

Tabel 4.3 Klasifikasi Data

ANALISA DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul <ol style="list-style-type: none"> 2. Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala nyeri 4 NRS (sedang) 2. Tampak meringis 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul 	<p>Pembesaran ovarium ↓ Penekanan organ sekitar ovarium ↓ Penekanan saraf ↓ Nyeri perut bawah ↓ Merangsang nosiseptor ↓ Nyeri dipersepsikan ke hipotalamus ↓ Nyeri kronis</p>	Nyeri kronis
2.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal 2. Keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini 3. Pasien mengatakan pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak kebingungan 2. Pasien tampak cemas 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Jarang melakukan kontak mata dengan petugas 5. Tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang) 	<p>Kurang informasi ↓ Khawatir mengalami kegagalan ↓ Krisis situasional ↓ Ansietas</p>	Ansietas

<p>3.</p>	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan nafsu makannya menurun 2. Pasien mengatakan perutnya terasa penuh 3. Keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h 4. Keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring 5. Pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus) 2. Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir 3. Tampak lemas 4. Konjungtiva pucat 5. Membran mukosa pucat 6. Turgor kulit menurun 7. Albumin 2,1 	<p>Pembesaran ovarium ↓ Penekanan organ sekitar ovarium ↓ Perut terasa penuh dan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi ↓ Intake tidak adekuat ↓ Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir ↓ Defisit nutrisi</p>	<p>Defisit nutrisi</p>
<p>4.</p>	<p>Faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis 2. USG abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy 3. Pemeriksaan ADT: anemia, neutrofilia dan trombositosis reaktif 4. MSCT abdomen: multiple kista 5. Penggunaan drain 1500 cc/24 jam 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu 7. PLT 418 	<p>Pembesaran ovarium ↓ Asites grade 3 malignancy ↓ Peningkatan produksi trombosit ↓ Peningkatan neutrofil dan limfosit ↓ Risiko infeksi</p>	<p>Risiko infeksi</p>

8. PDW 7,7		
9. Neutrofil 81,3		
10. Lymph 9,1		

Tabel 4.4 Analisa Data

PRIORITAS DIAGNOSIS KEPERAWATAN

No	Prioritas Diagnosis Keperawatan
1.	<p>Nyeri kronis b/d infiltrasi tumor d/d (D.0078)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul <ol style="list-style-type: none"> Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skala nyeri 4 NRS (sedang) Tampak meringis TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul
2.	<p>Defisit nutrisi b/d ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien d/d (D.0019)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan nafsu makannya menurun Pasien mengatakan perutnya terasa penuh Keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h Keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring Pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus) Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir Tampak lemas Konjungtiva pucat Membran mukosa pucat Turgor kulit menurun Albumin 2,1
3.	<p>Ansietas b/d kekhawatiran mengalami kegagalan d/d (D.0080)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil

	<p>laboratorium tidak normal</p> <p>2. Keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini</p> <p>3. Pasien mengatakan pusing</p> <p>DO:</p> <p>1. Tampak kebingungan</p> <p>2. Pasien tampak cemas</p> <p>3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C</p> <p>4. Jarang melakukan kontak mata dengan petugas</p> <p>5. Tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang)</p>
4.	<p>Risiko infeksi b/d penyakit kronis d/d (D.0142)</p> <p>Faktor risiko:</p> <p>1. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis</p> <p>2. USG abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy</p> <p>3. Pemeriksaan ADT: anemia, neutrofilia dan trobositosis reaktif</p> <p>4. MSCT abdomen: multiple kista</p> <p>5. Penggunaan drain 1500 cc/24 jam</p> <p>6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu</p> <p>7. PLT 418</p> <p>8. PDW 7,7</p> <p>9. Neutrofil 81,3</p> <p>10. Lymph 9,1</p>

Tabel 4.5 Prioritas Diagnosis Keperawatan

4.2 Diagnosis Keperawatan

Nama / umur : Nn A/42 tahun

Ruang / kamar : GSR (Pinang 2)/Kamar 3

No	Diagnosis keperawatan	Tanggal ditemukan	Tanggal Teratasi
1.	<p>Nyeri kronis b/d infiltrasi tumor d/d (D.0078)</p> <p>DS:</p> <p>1. P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang</p> <p>T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul</p> <p>2. Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur</p>	03 Juli 2023	Teratasi

	<p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala nyeri 4 NRS (sedang) 2. Tampak meringis 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul 		
2.	<p>Defisit nutrisi b/d ketidakmampuan mengabsorbsi nutrien d/d (D.0019)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan nafsu makannya menurun 2. Pasien mengatakan perutnya terasa penuh 3. Keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h 4. Keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring 5. Pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus) 2. Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir 3. Tampak lemas 4. Konjungtiva pucat 5. Membran mukosa pucat 6. Turgor kulit menurun 7. Albumin 2,1 	03 Juli 2023	Belum teratasi
3.	<p>Ansietas b/d kekhawatiran mengalami kegagalan d/d (D.0080)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal 2. Keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini 3. Pasien mengatakan pusing 	03 Juli 2023	Teratasi

	<p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak kebingungan 2. Pasien tampak cemas 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Jarang melakukan kontak mata dengan petugas 5. Tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang) 		
4.	<p>Risiko infeksi b/d penyakit kronis d/d (D.0142)</p> <p>Faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis 2. USG abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy 3. Pemeriksaan ADT: anemia, neutrofilia dan trobositosis reaktif 4. MSCT abdomen: multiple kista 5. Penggunaan drain 1500 cc/24 jam 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu 7. PLT 418 8. PDW 7,7 9. Neutrofil 81,3 10. Lymph 9,1 	03 Juli 2023	Teratasi

Tabel 4.6 Diagnosis Keperawatan

4.3 Intervensi

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		Rasional
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	
1.	<p>Nyeri kronis b/d infiltrasi tumor d/d (D.0078)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: Pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul <ol style="list-style-type: none"> Keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skala nyeri 4 NRS (sedang) Tampak meringis TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C Tampak mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam maka tingkat nyeri (L.08066) menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluhan nyeri menurun 5 Meringis menurun 5 Kesulitan tidur menurun 5 Tekanan darah membaik 5 	<p>Manajemen nyeri (I.08238)</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Terapeutik:</p> <p>Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam</p> <p>Edukasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Ajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi:</p> <p>Pemberian analgetik, jika perlu</p>	<p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Untuk mengetahui faktor yang memperberat dan memperingan nyeri <p>Terapeutik:</p> <p>Agar nyeri pasien bisa berkurang</p> <p>Edukasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui penyebab, periode, dan pemicu nyeri Untuk memandirikan pasien dan keluarga dalam mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi:</p> <p>Untuk mengurangi rasa nyeri pasien</p>
2.	<p>Defisit nutrisi b/d ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi d/d (D.0019)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan nafsu makannya 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam maka status</p>	<p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi status nutrisi Monitor asupan makanan 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui status nutrisi Untuk menambah nafsu makan dan mencegah penurunan berat

<p>menurun</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pasien mengatakan perutnya terasa penuh 3. Keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h 4. Keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring 5. Pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus) 2. Penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir 3. Tampak lemas 4. Konjungtiva pucat 5. Membran mukosa pucat 6. Turgor kulit menurun 7. Albumin 2,1 	<p>nutrisi (L.03030)</p> <p>membalik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat 5 2. Serum albumin meningkat 5 3. Perasaan cepat kenyang menurun 5 4. Nyeri abdomen menurun 5 5. Berat badan membaik 5 6. Indeks masa tubuh (IMT) membaik 5 7. Frekuensi makan membaik 5 8. Nafsu makan membaik 5 9. Membran mukosa membaik 5 	<p>Terapeutik</p> <p>Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi</p> <p>Edukasi</p> <p>Ajarkan diet yang diprogramkan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu</p>	<p>badan</p> <p>Terapeutik</p> <p>Agar pasien tidak mengalami konstipasi</p> <p>Edukasi</p> <p>Agar pasien dan keluarga mengetahui diet yang akan dijalankan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>Untuk mengetahui jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan</p>
---	--	---	--

3.	<p>Ansietas b/d kekhawatiran mengalami kegagalan d/d (D.0080)</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal 2. Keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini 3. Pasien mengatakan pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak kebingungan 2. Pasien tampak cemas 3. TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C 4. Jarang melakukan kontak mata dengan petugas 5. Tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang) 	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 maka tingkat ansietas (L.09093) menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbalisasi kebingungan menurun 5 2. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun 5 3. Keluhan pusing menurun 5 4. Tekanan darah menurun 5 	<p>Terapi Hipnosis (I.09320)</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi riwayat masalah yang dialami 2. Identifikasi tujuan teknik hipnosis <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ciptakan hubungan saling percaya 2. Duduk dengan nyaman, setengah menghadap pasien, jika perlu 3. Gunakan bahasa yang mudah dipahami 4. Berikan umpan balik positif setelah setiap sesi <p>Edukasi:</p> <p>Anjurkan menarik nafas dalam sebelum terapi hipnosis 5 jari agar rileks lalu di lanjutkan dengan terapi musik alam</p>	<p>Observasi:</p> <p>Agar pasien dan keluarga memahami tujuan hipnosis</p> <p>Terapeutik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar proses terapi mudah dilakukan 2. Agar pasien nyaman melakukan terapi 3. Agar pasien mudah mengerti 4. Agar pasien termotivasi untuk terus melakukan terapi <p>Edukasi:</p> <p>Agar pasien lebih rileks dalam melakukan terapi hipnosis</p>
4.	<p>Risiko infeksi b/d penyakit kronis d/d (D.0142)</p> <p>Faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis 2. USG abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy 3. Pemeriksaan ADT: anemia, neutrofilia 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam maka tingkat infeksi (L.14137) menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nafsu makan meningkat 5 2. Nyeri menurun 5 	<p>Pencegahan Infeksi (I.14539)</p> <p>Observasi</p> <p>Monitor tanda dan gejala infeksi</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan perawatan kulit pada area terinfeksi 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 3. Pertahankan aseptik pada pasien 	<p>Observasi</p> <p>Untuk mengetahui tanda dan gejala terkena infeksi</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merawat kulit agar tidak infeksi 2. Untuk memutuskan pemindahan mikroorganisme 3. Untuk mengurangi

<p>dan trobositosis reaktif</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. MSCT abdomen: multiple kista 5. Penggunaan drain 1500 cc/24 jam 6. Keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu 7. PLT 418 8. PDW 7,7 10. Neutrofil 81,3 11. Lymph 9,1 	<p>berisiko tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Batasi jumlah pengunjung <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan cara memeriksa kondisi infeksi 3. Ajarkan etika batuk 	<p>kemungkinan penyebaran dari mikroorganisme</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui tanda dan gejala terkena infeksi 2. Agar pasien mengetahui cara memeriksa luka yang infeksi 3. Agar pasien mengetahui cara batuk yang benar
--	---	--

Tabel 4.7 Intervensi Keperawatan

4.4 Implementasi dan Evaluasi

Inisial klien : Nn A Ruangan : GSR/Pinang 2 Dx.Medis : Neoplasma Kista Ovarium

No	Diagnosa Keperawatan	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Evaluasi
1.	Nyeri kronis b/d infiltrasi tumor (D.0078)	Selasa, 04 Juli 2023 08.20	<p>Manajemen nyeri (I.08238)</p> <p>Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri <p>Hasil:</p> <p>P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak</p> <p>Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk</p> <p>R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah</p> <p>S: skala nyeri 3 NRS (ringan)</p>	<p>S: pasien mengatakan nyerinya masih muncul tapi sudah berkurang, lokasi nyeri dan penyebab nyerinya masih sama</p> <p>O: skala nyeri post test 3 NRS (ringan), tampak tidak meringis, TD 126/94, N 100x/m, P 20x/m, S 36,4°C. Evaluasi akhir dinas skala nyeri 3 NRS (sedang)</p> <p>A: masalah nyeri kronis belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi manajemen nyeri dengan hipnosis 5 jari dan terapi musik</p>

		<p>08.30 T: pasien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil: faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi yang nyaman dan setelah dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam nyerinya berkurang</p> <p>08.40 Terapeutik: Memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam Hasil: tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 4 NRS (sedang), skala nyeri post test 3 NRS (ringan), TD 126/94, N 100x/m, P 20x/m, S 36,4°C</p> <p>08.50 Edukasi: 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil: pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul</p> <p>09.00 2. Mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam Hasil: pasien dan keluarga mulai belajar memahami cara baru untuk mengurangi nyeri</p> <p>09.10 Kolaborasi: Memberikan analgetik Hasil: Ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis</p>	alam
	Rabu, 05 Juli 2023	Manajemen nyeri (I.08238) Observasi:	S: pasien mengatakan kadang masih nyeri namun lebih baik dari sebelumnya
	08.20	1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri	O: skala nyeri post test 2 NRS (ringan), tampak tidak meringis, TD 119/93, N

			<p>Hasil: P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah S: skala nyeri 2 NRS (ringan) T: pasien mengatakan nyerinya jarang sekali muncul</p>	<p>85x/m, P 18x/m, S 36,7°C. Evaluasi akhir dinas skala nyeri 3 NRS (ringan) A: masalah nyeri kronis belum teratasi P: lanjutkan intervensi manajemen nyeri dengan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam</p>
		08.30	<p>2. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil: faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi nyaman dan dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam</p>	
		08.40	<p>Terapeutik: Memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi nyeri Hasil: tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 4 NRS (sedang), skala nyeri post test 2 NRS (ringan), TD 119/93, N 85x/m, P 18x/m, S 36,7°C</p>	
		08.50	<p>Edukasi: 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil: pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul</p>	
		09.00	<p>2. Mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi rasa nyeri Hasil: pasien dan keluarga mengetahui teknik hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi nyeri</p>	
		09.10	<p>Kolaborasi: Memberikan analgetik</p>	

		Hasil: Ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis	
Kamis, 06 Juli 2023 08.20	Manajemen nyeri (I.08238) Observasi: 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil: P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah S: skala nyeri 0 NRS (tidak ada nyeri) T: pasien mengatakan nyerinya bahkan tidak pernah muncul dalam beberapa hari	S: pasien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul O: skala nyeri post test 0 NRS (tidak ada nyeri), tampak tidak meringis, TD 120/90, N 96x/m, P 18x/m, S 36,5°C, Evaluasi akhir dinas skala nyeri 2 NRS (ringan) A: masalah nyeri kronis teratasi P: hentikan intervensi manajemen nyeri dengan penerapan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam	
08.30	2. Mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Hasil: faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi nyaman dan dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam		
08.40	Terapeutik: Memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi nyeri Hasil: tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 3 NRS (ringan), skala nyeri post test 0 NRS (tidak ada nyeri), TD 120/90, N 96x/m, P 18x/m, S 36,5°C		
08.50	Edukasi: 1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil: pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul		

		09.00	2. Mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam Hasil: pasien dan keluarga mengetahui teknik hipnosis 5 jari dan terapi musik alam	
		09.10	Kolaborasi: Memberikan analgetik Hasil: Ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis	
2.	Defisit nutrisi b/d ketidakmampuan mengabsorpsi nutrient (D.0019)	Selasa, 04 Juli 2023	Manajemen Nutrisi (I.03119) Observasi	S: pasien mengatakan masih tidak nafsu makan, pasien mengatakan terasa masih kenyang O: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m ² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, tampak lemas, membran mukosa pucat, turgor kulit menurun, albumin 2,1 A: masalah defisit nutrisi belum teratasi P: lanjutkan intervensi manajemen nutrisi dengan pemantauan diet pasien
		08.20	1. Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m ² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, tampak lemas, membran mukosa pucat, turgor kulit menurun, albumin 2,1	
		08.30	2. Memonitor asupan makanan Hasil: pasien mengatakan nafsu makannya menurun, pasien mengatakan perutnya terasa penuh, keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h, keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring	
		08.40	Terapeutik Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil: pasien mengkonsumsi apel dan pisang, tidak ada tanda-tanda konstipasi	
		08.50	Edukasi Mengajarkan diet yang diprogramkan Hasil: diet tinggi protein konsistensi lunak+formula susu rendah natrium	
		09.00	Kolaborasi	

		<p>Berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan</p> <p>Hasil: energi 1600 kkal, protein 72 gr, lemak 48 gr, karbohidrat 220 gr, Ha <2000 mg</p>	
Rabu, 05 Juli 2023	<p>08.20</p> <p>08.30</p> <p>08.40</p> <p>08.50</p> <p>09.00</p>	<p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, turgor kulit menurun, albumin 2,1</p> <p>2. Memonitor asupan makanan Hasil: pasien mengatakan nafsu makannya menurun, pasien mengatakan perutnya terasa penuh, keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h, keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring</p> <p>Terapeutik Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil: pasien mengonsumsi apel dan pisang sebagai makanan tambahan, tidak ada tanda-tanda konstipasi</p> <p>Edukasi Mengajarkan diet yang diprogramkan Hasil: diet tinggi protein konsistensi lunak+formula susu rendah natrium, memantau diet yang diprogramkan</p> <p>Kolaborasi Berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan Hasil: energi 1600 kkal, protein 72 gr, lemak 48 gr, karbohidrat 220 gr, Ha <2000 mg</p>	<p>S: pasien mengatakan masih tidak nafsu makan, pasien mengatakan terasa masih kenyang</p> <p>O: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, turgor kulit menurun, albumin 2,1</p> <p>A: masalah defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi manajemen nutrisi dengan pemantauan diet pasien</p>

		<p>Kamis, 06 Juli 2023 08.20</p> <p>08.30</p> <p>08.40</p> <p>08.50</p> <p>09.00</p>	<p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi status nutrisi Hasil: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, turgor kulit menurun, albumin 2,1</p> <p>2. Memonitor asupan makanan Hasil: pasien mengatakan nafsu makannya menurun, pasien mengatakan perutnya terasa penuh, keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h, keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring</p> <p>Terapeutik Memberikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi Hasil: pasien mengkonsumsi apel dan pisang sebagai makanan tambahan, tidak ada tanda-tanda konstipasi</p> <p>Edukasi Mengajarkan diet yang diprogramkan Hasil: diet tinggi protein konsistensi lunak+formula susu rendah natrium, memantau diet yang diprogramkan</p> <p>Kolaborasi Berkolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan Hasil: energi 1600 kkal, protein 72 gr, lemak 48 gr, karbohidrat 220 gr, Ha <2000 mg</p>	<p>S: pasien mengatakan masih tidak nafsu makan, pasien mengatakan terasa masih kenyang</p> <p>O: BB sebelum sakit 40 kg, BB saat ini 25 kg, TB 150 cm, Lila 16 cm, IMT 11,11 kg/m² (kurus), penurunan BB 15 kg dalam 6 bulan terakhir, turgor kulit menurun, albumin 2,1</p> <p>A: masalah defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P: lanjutkan intervensi manajemen nutrisi dengan pemantauan diet pasien</p>
3.	<p>Ansietas b/d kekhawatiran mengalami kegagalan (D.0080)</p>	<p>Selasa, 04 Juli 2023 08.20</p>	<p>Terapi Hipnosis (I.09320)</p> <p>Observasi:</p> <p>1. Mengidentifikasi riwayat masalah yang dialami Hasil: tingkat ansietas 12 HRSA (kecemasan ringan)</p>	<p>S: pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya karena tindakan belum bisa dilakukan</p> <p>O: pasien sudah tidak kebingungan lagi,</p>

		<p>08.30 2. Mengidentifikasi tujuan teknik hipnosis Hasil: pasien dan keluarga mengetahui tujuan hipnosis 5 jari Terapeutik:</p> <p>08.40 1. Menciptakan hubungan saling percaya Hasil: pasien sudah tidak kebingungan lagi, tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas</p> <p>08.50 2. Mendudukan pasien dengan nyaman, setengah menghadap pasien Hasil: pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas</p> <p>09.00 3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami Hasil: pasien mengerti apa yang disampaikan selama terapi</p> <p>09.10 4. Memberikan umpan balik positif setelah setiap sesi Hasil: pasien sudah perlahan mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien mengatakan masih khawatir dengan kondisinya</p> <p>09.15 Edukasi: Menganjurkan menarik nafas dalam sebelum terapi hipnosis 5 jari di lanjutkan terapi musik alam Hasil: pasien mengatakan lebih rileks, tidak ada keluhan pusing maupun tanda kecemasan tidak ada</p>	<p>tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas, tidak ada keluhan pusing, tingkat ansietas 12 HRSA (kecemasan ringan) A: masalah ansietas belum teratasi P: lanjutkan intervensi terapi hipnosis dilanjutkan terapi musik alam</p>
	<p>Rabu, 05 Juli 2023</p> <p>08.20</p> <p>08.30</p>	<p>Terapi Hipnosis (I.09320) Observasi:</p> <p>1. Mengidentifikasi riwayat masalah yang dialami Hasil: tingkat ansietas 8 HRSA (kecemasan ringan)</p> <p>2. Mengidentifikasi tujuan teknik hipnosis Hasil: pasien dan keluarga mengetahui tujuan hipnosis 5 jari Terapeutik:</p>	<p>S: pasien dan keluarga mengetahui tujuan hipnosis 5 jari, pasien sudah perlahan mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien mengatakan akan berusaha untuk tidak khawatir dengan kondisinya O: pasien sudah tidak kebingungan lagi, tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah</p>

		08.40	1. Menciptakan hubungan saling percaya Hasil: pasien sudah tidak kebingungan lagi, tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas	melakukan kontak mata dengan petugas, tidak ada keluhan pusing, tingkat ansietas 8 HRSA (kecemasan ringan) A: masalah ansietas belum teratasi P: lanjutkan intervensi terapi hipnosis 5 jari dilanjutkan terapi musik alam
		08.50	2. Mendudukan pasien dengan nyaman, setengah menghadap pasien Hasil: pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas	
		09.00	3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami Hasil: pasien mengerti apa yang disampaikan selama terapi	
		09.10	4. Memberikan umpan balik positif setelah setiap sesi Hasil: pasien sudah perlahan mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien mengatakan akan berusaha untuk tidak khawatir dengan kondisinya	
		09.15	Edukasi: Menganjurkan menarik nafas dalam sebelum terapi hipnosis 5 jari dilanjutkan terapi musik alam Hasil: pasien mengatakan lebih rileks, tidak ada keluhan pusing maupun tanda kecemasan tidak ada	
	Kamis, 06 Juli 2023		Terapi Hipnosis (I.09320) Observasi:	S: pasien dan keluarga mengetahui tujuan hipnosis 5 jari, pasien sudah perlahan mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien mengatakan tidak khawatir lagi dengan kondisinya O: pasien sudah tidak kebingungan lagi, tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas, tidak ada keluhan pusing, tingkat ansietas 3 HRSA (tidak ada kecemasan)
		08.20	1. Mengidentifikasi riwayat masalah yang dialami Hasil: tingkat ansietas 3 HRSA (tidak ada kecemasan)	
		08.30	2. Mengidentifikasi tujuan teknik hipnosis Hasil: pasien dan keluarga mengetahui tujuan hipnosis 5 jari	
			Terapeutik:	
		08.40	1. Menciptakan hubungan saling percaya Hasil: pasien sudah tidak kebingungan lagi, tidak ada tanda kecemasan, pasien sudah melakukan kontak mata dengan	

		08.50	petugas 2. Mendudukkan pasien dengan nyaman, setengah menghadap pasien Hasil: pasien sudah melakukan kontak mata dengan petugas	A: masalah ansietas belum teratasi P: lanjutkan intervensi terapi hipnosis 5 jari dilanjutkan terapi musik alam
		09.00	3. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami Hasil: pasien mengerti apa yang disampaikan selama terapi	
		09.10	4. Memberikan umpan balik positif setelah setiap sesi Hasil: pasien sudah perlahan mengetahui penyakit yang dideritanya, pasien mengatakan tidak khawatir lagi dengan kondisinya	
		09.15	Edukasi: Menganjurkan menarik nafas dalam sebelum terapi hipnosis 5 jari dilanjutkan terapi musik alam Hasil: pasien mengatakan lebih rileks, tidak ada keluhan pusing maupun tanda kecemasan tidak ada	
4.	Risiko infeksi b/d penyakit kronis (D.0142)	Selasa, 04 Juli 2023	Pencegahan Infeksi (I.14539)	S: klien dan keluarga mengatakan tidak pernah merasakan panas ataupun melihat ada kemerahan ditubuhnya, keluarga masih jarang melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien O: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas A: risiko infeksi belum teratasi P: lanjutkan intervensi pencegahan infeksi dengan penerapan cuci tangan yang benar dan penerapan 5 momen
		08.20	Observasi Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas	
		08.30	Terapeutik 1. Memberikan perawatan kulit pada area terinfeksi Hasil: tidak ditemukan adanya tanda terinfeksi pada tubuh pasien	
		08.40	2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: tidak ada tanda infeksi, petugas kesehatan selalu menerapkan 5 momen namun keluarga masih jarang melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan pasien	

		08.50	3. Membatasi jumlah pengunjung Hasil: pengunjung hanya 1-2 orang saja Edukasi	
		09.00	1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil: pasien dan keluarga memahami tanda dan gejala infeksi	
		09.10	2. Mengajarkan etika batuk Hasil: pasien memahami etika batuk yang benar	
	Rabu, 05 Juli 2023	08.20	Pencegahan Infeksi (I.14539) Observasi Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas	S: klien dan keluarga mengatakan tidak pernah merasakan panas ataupun melihat ada kemerahan ditubuhnya, keluarga mengatakan kadang lupa melakukannya tapi sudah ingat langkah mencuci tangan yang benar
		08.30	Terapeutik 1. Memberikan perawatan kulit pada area terinfeksi Hasil: tidak ditemukan adanya tanda terinfeksi pada tubuh pasien	O: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas
		08.40	2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: tidak ada tanda infeksi, petugas kesehatan selalu menerapkan 5 momen, keluarga mengatakan kadang lupa melakukannya tapi sudah ingat langkah mencuci tangan yang benar	A: risiko infeksi belum teratasi P: lanjutkan intervensi pencegahan infeksi dengan penerapan cuci tangan yang benar dan penerapan 5 momen
		08.50	3. Membatasi jumlah pengunjung Hasil: pengunjung hanya 1-2 orang saja Edukasi	
		09.00	1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil: pasien dan keluarga memahami tanda dan gejala infeksi	
		09.10	2. Mengajarkan etika batuk Hasil: pasien memahami etika batuk yang benar	

		<p>Kamis, 06 Juli 2023</p> <p>08.20 Pencegahan Infeksi (I.14539) Observasi Memonitor tanda dan gejala infeksi Hasil: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas</p> <p>08.30 Terapeutik 1. Memberikan perawatan kulit pada area terinfeksi Hasil: tidak ditemukan adanya tanda terinfeksi pada tubuh pasien</p> <p>08.40 2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien Hasil: tidak ada tanda infeksi, petugas kesehatan selalu menerapkan 5 momen, keluarga sudah menerapkan langkah mencuci tangan yang benar</p> <p>08.50 3. Membatasi jumlah pengunjung Hasil: pengunjung hanya 1-2 orang saja</p> <p>09.00 Edukasi 1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil: pasien dan keluarga memahami tanda dan gejala infeksi</p> <p>09.10 2. Mengajarkan etika batuk Hasil: pasien memahami etika batuk yang benar</p>	<p>S: klien dan keluarga mengatakan tidak pernah merasakan panas ataupun melihat ada kemerahan ditubuhnya, keluarga sudah menerapkan langkah mencuci tangan yang benar</p> <p>O: tidak ada tanda dan gejala infeksi ditemukan seperti kemerahan maupun panas</p> <p>A: risiko infeksi teratasi</p> <p>P: hentikan intervensi pencegahan infeksi dengan penerapan cuci tangan yang benar dan penerapan 5 momen</p>
--	--	--	---

Tabel 4.8 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan dilakukan hari Senin, 03 Juli 2023 di ruangan pinang 2 (GSR) RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar. Didapatkan pasien Nn A usia 42 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMA, status perkawinan belum menikah. Pasien masuk menggunakan brankar, pasien mengeluh nyeri perut bawah dan tampak perut membesar. Pengkajian seksualitas ditemukan usia pertama kali haid 14 tahun, siklus 1x/30 hari, durasi 7 hari amenorea, pasien tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dan status obstetri G0P0A0.

Pengkajian kebutuhan makanan dan cairan pasien, didapatkan keluarga mengatakan pasien mengonsumsi makanan yang disediakan dan buah apel, keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/hari, sekarang pasien hanya makan 1-2x/hari, pasien mengatakan nafsu makannya menurun, pasien mengatakan perutnya terasa penuh, keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring, balance cairan 1087,7 cc/24 jam, penggunaan drain 1500 cc/24 jam berwarna hijau, bb sebelum sakit 40 kg, bb saat ini 25 kg, tb 150 cm, lila 16 cm, imt 11,11 kg/m² (kurus), penurunan bb 15 kg dalam 6 bulan terakhir, turgor kulit menurun, membran mukosa pucat, kebutuhan cairan 1800 cc/24 jam, tampak lemas, diet tinggi protein konsistensi lunak ditambah susu rendah natrium, energi 1600 kkal, Lemak 48 gr, Ha <2000 mg, Protein 72 gr, Karbohidrat 220 gr.

Pengkajian kebutuhan eliminasi meliputi keluarga mengatakan pasien BAB 1x/2 hari, keluarga mengatakan waktu terakhir BAB kemarin yakni minggu 2 Juli 2023, tidak ada kesulitan berkemih, penggunaan kateter urine sejak Rabu 28 Juni 2023, bising usus sulit dilakukan pemeriksaan, karakteristik urine berwarna kuning dengan frekuensi +-1200 cc/24 jam, konsistensi BAB lunak, BAB berwarna kuning kecokelatan.

Pengkajian kebutuhan aktivitas/istirahat keluarga mengatakan pasien biasanya tidur jam setengah 9 malam, keluarga mengatakan pasien biasanya

tidur jam 12 siang, keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur, GCS 15 CM, E4M5V6, gerakan terbatas akibat asites derajat kekuatan otot 5 dan 5 ekstremitas atas dan 5 dan 5 ekstremitas bawah, kuku berwarna merah, membran mukosa pucat, konjungtiva pucat.

Pengkajian hygiene meliputi kebersihan rambut tampak bersih, keluarga mengatakan pasien terkadang dicuci rambutnya, kebersihan badan bersih, keluarga mengatakan pasien dilap untuk membersihkan badannya, kebersihan gigi/mulut keluarga mengatakan pasien kadang mau membersihkannya kadang juga tidak, disesuaikan kondisi pasien, pasien tampak memakai pakaian dibantu keluarga dan kadang hanya memakai sarung, kondisi kulit kepala bersih. Pengkajian sirkulasi dengan data TD 142/91 mmHg, N 84x/m, tidak ada distensi vena jugularis, suara jantung pertama (S1) dan suara jantung kedua (S2), irama teratur, akral hangat, S 36,5°C, CRT <3 detik,

Hasil pengkajian nyeri dengan metode PQRST didapatkan P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang, S: skala nyeri 4 NRS (sedang), T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul. Didapatkan pula data pasien tampak meringis dan selalu mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul. Pengkajian pernafasan ditemukan ada riwayat sesak dan sesak saat banyak beraktivitas, tidak ada batuk, ada riwayat penggunaan O2 nasal kanul 3 lpm, P 18x/m, irama nafas eupnoe, bunyi nafas vesikuler.

Pengkajian interaksi sosial dengan data pasien belum menikah, keluarga mengatakan pasien tinggal dengan saudaranya. Hasil pengkajian integritas ego didapatkan keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal, keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini, setiap kali ditanyakan terkait kondisinya pasien tampak kebingungan, pasien juga tampak cemas, jarang melakukan kontak mata dengan petugas, mengeluh pusing, tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang).

5.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Masalah keperawatan pasien Nn A yakni nyeri kronis, defisit nutrisi, ansietas dan risiko infeksi. Diagnosis pertama nyeri kronis, P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, R: pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang, S: skala nyeri 4 NRS (sedang), T: pasien mengatakan nyerinya hilang timbul, keluarga mengatakan pasien sesekali sulit tidur, tampak meringis, selalu mencari posisi nyaman saat nyerinya muncul, TD 142/91 mmHg, N 84x/m, P 18x/m, S 36,5°C.

Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) nyeri kronis merupakan pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

Diagnosis kedua defisit nutrisi, pasien mengatakan nafsu makannya menurun, pasien mengatakan perutnya terasa penuh, keluarga mengatakan dulu pasien makan 2-3x/h, sekarang pasien hanya makan 1-2x/h, keluarga mengatakan porsi makan pasien hanya setengah piring, pasien mengatakan nyerinya dibagian perut bawah tembus belakang dan keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu, bb sebelum sakit 40 kg, bb saat ini 25 kg, tb 150 cm, lila 16 cm, imt 11,11 kg/m² (kurus), penurunan bb 15 kg dalam 6 bulan terakhir, tampak lemas, konjungtiva pucat, membran mukosa pucat, turgor kulit menurun dan Albumin 2,1.

Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) defisit nutrisi merupakan asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

Diagnosis ketiga ansietas, keluarga mengatakan pasien khawatir karena operasi belum bisa dilakukan karena hasil laboratorium tidak normal, keluarga mengatakan awalnya kaget karena tidak tau apapun soal penyakit ini, pasien mengatakan pusing, tampak kebingungan, pasien tampak cemas, td 142/91 mmhg, n 84x/m, p 18x/m, s 36,5°C, jarang melakukan kontak mata

dengan petugas, tingkat ansietas 17 HRSA (kecemasan sedang).

Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) ansietas merupakan kondisi emosi dan pengalaman subyektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi bahaya yang memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

Diagnosis keempat risiko infeksi, pemeriksaan aspirasi sumsum tulang: peningkatan aktivitas trombopoiesis, usg abdomen: massa kompleks adnexa bilateral dan asites grade 3 malignancy, pemeriksaan adt: anemia, neutrofilia dan trobositosis reaktif, msct abdomen: multiple kista, penggunaan drain 1500 cc/24 jam, keluarga mengatakan perut pasien membesar sejak 5 bulan yang lalu, PLT 418, PDW 7,7, Neutrofil 81,3, Lymph 9,1.

Sesuai dengan teori di buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) risiko infeksi merupakan kondisi dimana seseorang berisiko mengalami peningkatan terserang organisme patogenik.

5.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan masalah defisit nutrisi menggunakan manajemen nutrisi a) observasi: identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan. b) terapeutik: berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. c) edukasi: ajarkan diet yang diprogramkan. d) kolaborasi: kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu.

Risiko infeksi menggunakan intervensi pencegahan infeksi a) observasi: monitor tanda dan gejala infeksi. b) terapeutik: berikan perawatan kulit pada area terinfeksi, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien, pertahankan aseptik pada pasien berisiko tinggi, batasi jumlah pengunjung. c) edukasi: jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara memeriksa kondisi infeksi, ajarkan etika batuk.

Ansietas menggunakan intervensi terapi hipnosis 5 jari a) observasi: identifikasi riwayat masalah yang dialami, identifikasi tujuan teknik hipnosis. b) terapeutik: ciptakan hubungan saling percaya, duduk dengan nyaman, setengah menghadap pasien, jika perlu, gunakan bahasa yang mudah

dipahami, berikan umpan balik positif setelah setiap sesi. c) edukasi: anjurkan menarik nafas dalam sebelum terapi hipnosis 5 jari agar rileks lalu di lanjutkan dengan terapi musik alam.

Nyeri kronis menggunakan manajemen nyeri sebagai intervensinya a) observasi: identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. b) terapeutik: berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi nyeri dengan menggunakan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. c) edukasi: jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, ajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi rasa nyeri. d) kolaborasi: pemberian analgetik, jika perlu.

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Fenomena ini dapat berbeda dalam intensitas (ringan, sedang, berat), kualitas (tumpul, seperti terbakar, tajam), durasi (transien, intermiten, persisten), dan penyebaran (superfisial atau dalam, terlokalisir atau difus) (Bahrudin, 2017).

Penelitian (Putri, 2014) menjelaskan tingginya angka kejadian kista ovarium akan berisiko mempengaruhi fertilitas. Wanita dengan kista ovarium mulai menunjukkan berbagai macam manifestasi klinis saat telah memasuki kondisi yang lebih lanjut seperti nyeri abdomen, nyeri saat menarche, hingga gangguan menstruasi. Terbentuknya kista ovarium dipengaruhi oleh faktor risiko seperti, usia reproduktif, riwayat keluarga, nullipara, dan terapi hormone (Dewi et al., 2022).

Asumsi peneliti didasarkan penjelasan di atas bahwasanya pasien dengan penyakit kista ovarium pasti akan merasakan nyeri, baik sebelum operasi dan setelah operasi. Sehingga sangat diperlukan adanya satu bentuk penatalaksanaan yang bisa mengurangi nyeri yang dirasakan pasien. Disini peneliti menerapkan intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengatasi nyeri pasien sebagai bagian dari terapi non farmakologis.

Kondisi ini telah diuraikan dalam Al-Qur'an Asy-Syura/42:30 yang

berbunyi:

تُ أَيِّدِيكُمْ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَ

Terjemahnya:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)” (Kemenag RI, 2020).

Makna ayat di atas ialah, bahwasanya musibah yang menimpa umat manusia di muka bumi kapan dan dimanapun terjadinya, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidak hati-hatianmu. Musibah yang dialami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahanmu karena Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu. seandainya pemaafan itu tidak dilakukan-Nya, pastilah kamu semua binasa bahkan tidak akan ada satu binatang melataupun di pentas bumi ini (Shihab, 2012).

Seperti yang telah dijelaskan (Ratih et al., 2022) dalam penelitiannya bahwasanya faktor resiko terjadinya kista ovarium adalah siklus menstruasi yang tidak teratur, meningkatnya distribusi lemak tubuh bagian atas, menstruasi dini dan hormon yang tidak seimbang. Hal-hal tersebut akar permasalahannya adalah karena pola hidup yang tidak sehat. Contohnya perilaku makan makanan tinggi gula seperti kue manis, makanan tinggi lemak jenuh contohnya makanan cepat saji, daging merah berlemak, produk susu tinggi lemak, makanan olahan seperti sosis, nugget dan lainnya. Kebiasaan buruk inilah yang menjadi pemicu munculnya kista ovarium.

5.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan manajemen nyeri hari pertama Selasa 4 Juli 2023 jam 08.20 wita meliputi a) observasi: mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasilnya P: pasien

mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah, S: skala nyeri 3 NRS (ringan), T: pasien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri hasilnya faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi nyaman dan setelah dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. b) terapeutik: memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 4 NRS (sedang), skala nyeri post test 3 NRS (ringan), TD 126/94, N 100x/m, P 20x/m, S 36,4°C. c) edukasi: menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri hasilnya pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul, mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya pasien dan keluarga mulai belajar memahami cara baru untuk mengurangi nyeri. d) kolaborasi: memberikan analgetik hasilnya memberikan ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis.

Implementasi keperawatan manajemen nyeri hari kedua rabu, 05 Juli 2023 jam 08.20 wita meliputi a) observasi: mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasilnya P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah, S: skala nyeri 2 NRS (ringan), T: pasien mengatakan nyerinya jarang sekali muncul, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri hasilnya faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi nyaman dan setelah dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. b) terapeutik: memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 4 NRS (sedang), skala nyeri post test 2 NRS (ringan), TD 119/93, N 85x/m, P 18x/m, S 36,7°C. c) edukasi: menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri hasilnya pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul,

mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya pasien dan keluarga mengetahui teknik hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi nyeri. d) kolaborasi: memberikan analgetik hasilnya pemberian ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis.

Implementasi keperawatan manajemen nyeri hari ketiga Kamis, 06 Juli 2023 jam 08.20 wita meliputi a) observasi: mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri hasilnya P: pasien mengatakan nyerinya muncul ketika banyak bergerak, Q: pasien mengatakan nyerinya seperti ditusuk, R: pasien mengatakan nyerinya sekarang hanya dibagian perut bawah, S: skala nyeri 0 NRS (tidak ada nyeri), T: pasien mengatakan nyerinya bahkan tidak pernah muncul dalam beberapa hari, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri hasilnya faktor yang memperberat nyeri ketika pasien banyak bergerak, faktor yang memperingan nyeri adalah posisi nyaman dan setelah dilakukan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. b) terapeutik: memberikan teknik nonfarmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya tampak tidak meringis, skala nyeri pre test 3 NRS (ringan), skala nyeri post test 0 NRS (tidak ada nyeri), TD 120/90, N 96x/m, P 18x/m, S 36,5°C. c) edukasi: menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri hasilnya pasien dan keluarga mengetahui penyebab nyeri dan kapan nyeri muncul, mengajarkan teknik non farmakologis hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hasilnya pasien dan keluarga mengetahui teknik hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengurangi nyeri. d) kolaborasi: memberikan analgetik hasilnya pemberian ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV, tampak tidak meringis.

Sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwasanya kista ovarium pada umumnya bersifat asimtomatik tetapi gejala seperti nyeri ataupun gangguan siklus menstruasi dapat terjadi akibat pecahnya dinding kista, penekanan pada organ sekitar, maupun mengarah pada keganasan (Dewi et al., 2022).

Setelah dilakukan hipnosis 5 jari didapatkan penurunan skala nyeri pasien kista ovarium. Sejalan dengan penelitian (Fitrianingrum et al., 2018) yakni terdapat pengaruh hipnosis 5 jari pada penurunan nyeri pasien *post*

sectio caesarea. Oleh karena itu, metode ini dapat diterapkan untuk mengurangi nyeri pasien kista ovarium.

Sesuai dengan teori relaksasi bahwasanya kelompok yang diberikan terapi musik mengalami relaksasi pada tubuhnya. Kondisi relaksasi (istirahat) yang sempurna itu, seluruh sel dalam tubuh akan mengalami reproduksi, penyembuhan alami berlangsung, produksi hormon tubuh diseimbangkan dan pikiran mengalami penyegaran (Anggraini, 2020).

Sejalan dengan penelitian (Anggraini, 2020) mengatakan terdapat perbedaan nyeri yang dirasakan ibu bersalin yang diberikan musik klasik dengan yang tidak diberikan. Terapi musik alam dapat diberikan pada pasien dengan keluhan nyeri baik nyeri bersalin maupun nyeri kista ovarium. Musik bekerja pada sistem saraf otonom yaitu bagian sistem saraf yang bertanggung jawab mengontrol tekanan darah, denyut jantung dan fungsi otak, yang mengontrol perasaan dan emosi. Kedua sistem tersebut bereaksi sensitif terhadap musik. Saat merasa sakit, kita menjadi takut, frustrasi dan marah yang membuat kita menegangkan otot-otot tubuh, hasilnya rasa sakit menjadi semakin parah. Mendengarkan musik secara teratur membantu tubuh rileks secara fisik dan mental, sehingga membantu menyembuhkan dan mencegah rasa sakit.

Asumsi peneliti mengungkapkan bahwasanya masalah nyeri merupakan sebuah bentuk respon tubuh yang dapat mengganggu kenyamanan pasien, sehingga adanya hipnosis 5 jari dan terapi musik alam sebagai penatalaksanaan non farmakologis yang sangat mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya menjadi nilai tambah. Kombinasi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam digunakan karena memiliki manfaat yang dapat menurunkan skala nyeri.

5.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Hasil evaluasi pada hari pertama, Selasa 4 Juli 2023 didapatkan hasil pasien mengatakan nyerinya masih muncul tapi sudah berkurang, lokasi nyeri dan penyebab nyerinya masih sama, skala nyeri post test 3 NRS (ringan), tampak tidak meringis, TD 126/94, N 100x/m, P 20x/m, S 36,4°C. Evaluasi

akhir dinas skala nyeri 3 NRS (sedang), masalah nyeri kronis belum teratasi dan intervensi manajemen nyeri hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dilanjutkan.

Hari kedua, rabu 5 Juli 2023 didapatkan hasil pasien mengatakan kadang masih nyeri namun lebih baik dari sebelumnya, skala nyeri post test 2 NRS (ringan), tampak tidak meringis, TD 119/93, N 85x/m, P 18x/m, S 36,7°C. Evaluasi akhir dinas skala nyeri 3 NRS (ringan), masalah nyeri kronis belum teratasi, intervensi manajemen nyeri hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dilanjutkan.

Hari ketiga, Kamis 6 Juli 2023 didapatkan hasil pasien mengatakan nyerinya sudah jarang muncul, skala nyeri post test 0 NRS (tidak ada nyeri), tampak tidak meringis, TD 120/90, N 96x/m, P 18x/m, S 36,5°C, Evaluasi akhir dinas skala nyeri 2 NRS (ringan), masalah nyeri kronis teratasi dan intervensi manajemen nyeri dengan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dihentikan.

Teori gate control menurut Perry & Potter (2005) menjelaskan bahwasanya hipnosis 5 jari ini dapat mengatasi nyeri, impuls nyeri dapat diatur atau dihambat oleh mekanisme pertahanan disepanjang sistem saraf pusat. Teori ini mengatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan tertutup. Upaya menutup pertahanan tersebut merupakan dasar teori menghilangkan nyeri. Suatu keseimbangan aktivitas dari neuron sensoris dan serabut kontrol desenden (Fitrianingrum et al., 2018).


Penelitian (Sari & Sumawati, 2017), (Halim & Khayati, 2020) menjelaskan *self* hipnosis yang telah diberikan kepada pasien kista ovarium dengan masalah nyeri, pasien mengatakan merasa rileks dan tenang. Setelah dievaluasi kembali, pasien mengatakan sudah tidak ada keluhan nyeri dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah secara mandiri. Pasien mengalami penurunan skala nyeri dengan rata-rata 1 poin setelah dilakukan hipnoterapi lima jari. Hal ini terjadi karena hipnoterapi lima jari dapat mempengaruhi sistem limbik dan saraf otonom, menciptakan suasana rileks, aman dan

menyenangkan sehingga merangsang pusat rasa ganjaran dan pelepasan substrat kimia gamma amino butyric acid (GABA), enkephalin, dan β endorphin, yang mengeliminasi neurotransmitter rasa nyeri.

Sejalan dengan riset (Harahap, 2018) menunjukkan setelah diberikan terapi musik mozart, tingkat nyeri dalam kategori berat berkurang menjadi 1 (6,7%) dan responden yang memiliki tingkat nyeri dalam kategori sedang meningkat menjadi 14 (93,3%) dan ada pengaruh yang signifikan terhadap nyeri sebelum dan setelah diberikan terapi musik Mozart.

5.6 Analisis Intervensi *Evidence Based Practice In Nursing*

Intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam dilakukan sebanyak 1x/hari selama 3 hari berturut-turut dimulai tanggal 4-6 Juli 2023 di ruangan Pinang 2. Pengukuran skala nyeri dilakukan sebelum dan setelah intervensi dan saat evaluasi akhir setelah dinas, sehingga total pengukuran nyeri dilakukan sebanyak 9 kali selama dinas. Durasi intervensi hipnosis 5 jari selama 10 menit dan dilanjutkan terapi musik alam selama 5 menit, sehingga total durasi intervensi ± 15 menit. Pemberian intervensi dilakukan saat jam istirahat yakni direntang jam 11.00-13.00 wita untuk memastikan kondisi ruangan pasien dalam keadaan tenang.



Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan didapatkan penurunan skala nyeri pasien kista ovarium dimana hari pertama implementasi didapatkan hasil pengukuran skala nyeri pre test 4, post test 3 dan evaluasi

akhir 3. Hari kedua pre test 4, post test 2 dan evaluasi akhir 3. Hari ketiga pre test 3, post test 0 dan evaluasi akhir 2.

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan adanya penurunan skala nyeri pasien kista ovarium setelah diberikan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam. Intervensi ini efektif dalam menurunkan skala nyeri pasien kista ovarium tapi hanya bersifat sementara, karena setelah dilakukan evaluasi di akhir dinas skala nyeri pasien kembali meningkat. Hal tersebut terjadi karena hipnosis 5 jari dan terapi musik alam hanya berfokus pada penyembuhan melalui pikiran bukan pada lokasi asal nyeri. Kondisi rileks yang dihasilkan intervensi ini hanya berlangsung sementara sehingga penurunan skala nyeri menggunakan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam juga berlangsung sementara, karena metode intervensinya bukan pada lokasi asal nyeri.

Didukung oleh riset (Hasnah, 2020) bahwasanya hipnosis 5 jari memfokuskan pikiran dengan membawanya ke gelombang alpha/theta yang akan mengakibatkan kondisi rileksasi pada klien. Hipnosis 5 jari juga dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk mengaktifkan kekuatan pikiran yang rileks melalui komunikasi batin yang melibatkan indra seperti penciuman, penglihatan dan pendengaran.

Penelitian (Sari & Sumawati, 2017), (Halim & Khayati, 2020) menjelaskan *self* hipnosis yang telah diberikan kepada pasien kista ovarium dengan masalah nyeri, pasien mengatakan merasa rileks dan tenang. Setelah dievaluasi kembali, pasien mengatakan sudah tidak ada keluhan nyeri dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah secara mandiri. Pasien mengalami penurunan skala nyeri dengan rata-rata 1 poin setelah dilakukan hipnoterapi lima jari.

Musik alam adalah suatu terapi yang menggunakan metode alunan melodi, ritme, dan harmonisasi suara dengan tepat. Terapi ini diterima oleh organ pendengaran kita yang kemudian disalurkan ke bagian tengah otak yang disebut sistem limbik yang mengatur emosi (Rahmawati, 2020).

Penelitian (Sesrianty & Wulandari, 2018) menjelaskan intensitas nyeri responden sebelum terapi musik klasik (alunan piano) skala nyeri 6 sedang,

sesudah pemberian intervensi adalah tingkat nyeri 4 sedang, ada perbedaan rata-rata intensitas nyeri responden sebelum dan sesudah pemberian terapi musik klasik (alunan piano). Sehingga disimpulkan ada pengaruh pemberian terapi musik klasik (alunan piano) terhadap intensitas nyeri.

Manfaat hipnosis 5 jari dan terapi musik alam yaitu suara yang dihasilkan menstimulasi hipotalamus sebagai pusat pengaturan berbagai mekanisme tubuh, sehingga akan mempengaruhi tekanan darah, nadi, respirasi dan mood seseorang. Suara atau bunyi sebagai alternatif diharapkan pasien dapat mencapai keadaan relaks dan keadaan emosional menjadi stabil, selain menurunkan menstabilkan emosional. Musik alam juga mempengaruhi sistem saraf parasimpatis yang meregangkan tubuh dan memperlambat denyut jantung, serta memberikan efek rileks pada organ-organ tubuh dan juga menurunkan nyeri dan kecemasan (Nuryati, 2020).

Hipnosis 5 jari dan terapi musik alam merupakan terapi non farmakologi tanpa menggunakan obat-obatan yang dapat menstimulus otak dalam mengontrol emosional seseorang dengan menggunakan suara. Contoh musik suara alam seperti suara air terjun, suara angin, kicauan burung dan hujan. Suara alam sangat dekat dengan kehidupan setiap orang sehari-hari dan manusia memiliki daya tarik bawaan dengan alam, sehingga interaksinya dengan alam memiliki efek terapeutik terhadap manusia itu sendiri yang mendengarkannya (Nuryati, 2020).

Asumsi peneliti menjelaskan bahwasanya kombinasi kedua intervensi non farmakologis yakni hipnosis 5 jari dan terapi musik alam terbukti mampu menurunkan skala nyeri pasien kista ovarium. Namun perlu diperhatikan bahwa penurunan skala nyeri dengan intervensi ini hanya bersifat sementara, sehingga untuk hasil maksimal perlu dilakukan sesering mungkin.

Setiap muslim meyakini bahwa al-qur`an diturunkan Allah swt untuk memberi hidayah kepada setiap manusia, pedoman hidup manusia dan menyembuhkan berbagai penyakit hati yang menjangkiti manusia bagi mereka yang diberi hidayah oleh Allah 'azza wa jalla dan dirahmati-Nya. Seperti yang terdapat di dalam firman-Nya

نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ وَا
إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari al-Qur`an suatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-Qur`an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.” (QS Al-Isra: 82) (Kemenag RI, 2020).

Dalam firman Allah SWT tersebut telah dijelaskan begitu jelas, bahwa al-Qur`an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang harus digaris bawahi yaitu kalimat “bagi orang-orang yang beriman”. Maksudnya disini kita harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa al-Qur`an dapat menyembuhkan penyakit baik itu jasmani maupun rohani (Firdaus, 2018).

Syaikhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma`ad mengatakan: “Al-Qur`an adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Dan tidaklah setiap orang diberi keahlian dan taufiq untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seorang yang sakit konsisten berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh, dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya” (Firdaus, 2018).


Ayat di atas menegaskan bahwasanya semua penyakit ada obatnya dan Allah menurunkan Al-Qur`an sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam yang medianya bukan al-qur`an namun dapat menjadi alternatif mengurangi nyeri pasien kista ovarium, apalagi metode penyembuhan dengan menggunakan al-qur`an sebagai medianya.

Sejalan penelitian (Hasnah et al., 2022) yang membuktikan bahwasanya terapi murottal al-qur`an membantu menurunkan nyeri pada pasien post

operasi kista ovarium pada hari pertama post operasi skala nyeri pasien 4 (sedang) dan sampai hari ke-3 skala nyeri pasien menurun ke skala 1 (ringan). Pemberian intervensi non-farmakologis yaitu terapi murottal dapat menurunkan nyeri dan meringis pasien menurun.

5.7 Keterbatasan Penelitian

Masih kurangnya referensi terkait efektifitas hipnosis 5 jari dan terapi musik alam terhadap nyeri pasien kista ovarium. Durasi intervensi hipnosis 5 jari dan terapi musik alam seharusnya diberikan lebih lama untuk melihat efek yang lebih baik.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- 6.1.1 Pengkajian yang dilakukan pada Nn A berusia 42 tahun dengan status obstetriknya GOPOA0, pasien mengeluh nyeri perut bawah dan tampak perutnya membesar sejak 5 bulan yang lalu, skala nyeri 4 NRS (sedang)
- 6.1.2 Diagnosis keperawatan yang didapatkan setelah pengkajian pada pasien kista ovarium yakni nyeri kronis, defisit nutrisi, ansietas dan risiko infeksi
- 6.1.3 Intervensi keperawatan yang menjadi fokus dalam riset ini yakni hipnosis 5 jari dan terapi musik alam untuk mengatasi masalah nyeri kronis pasien
- 6.1.4 Implementasi keperawatan didapatkan penurunan skala nyeri pasien kista ovarium hari pertama skala nyeri pre test 4, post test 3 dan evaluasi akhir 3. Hari kedua pre test 4, post test 2 dan evaluasi akhir 3. Hari ketiga pre test 3, post test 0 dan evaluasi akhir 2.
- 6.1.5 Evaluasi keperawatan yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut didapatkan masalah keperawatan defisit nutrisi belum teratasi, nyeri kronis, ansietas dan risiko infeksi teratasi.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Mahasiswa

Sebelum melakukan pengimplementasian hipnosis 5 jari dan terapi musik alam, sebaiknya terlebih dahulu memperhatikan keadaan pasien serta kondisi lingkungan sekitar, peneliti harus memastikan ketenangan pasien dan lingkungan agar tidak ada suara bising yang mengganggu pelaksanaan intervensi

6.2.2 Bagi Perawat

Diharapkan hipnosis 5 jari dan terapi musik alam bisa diterapkan di rumah sakit kepada pasien dengan masalah nyeri terkhusus untuk pasien dengan kista ovarium sebagai penatalaksanaan non farmakologis

6.2.3 Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan riset ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan tambahan dalam pengelolaan asuhan keperawatan intervensi non farmakologis dalam institusi pendidikan

6.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Setelah penelitian ini dilakukan ditemukan bahwasanya semakin sering intervensi ini diberikan, maka semakin efektif pula untuk menurunkan nyeri pasien, sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan intervensi ini sesering mungkin untuk melihat hasil yang lebih efektif



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. A., Tjokroprawiro, B. A., & Hendarto, H. (2020). *Ginekologi Praktis Komprehensif*. Airlangga University Press.
- Anggraini, R. D. (2020). Pengaruh Terapi Musik Klasik Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I. *Jurnal Kesehatan Midwinerslion*, 5(1), 106–115.
- Apostol, R., & Mobeen, A. (2023). *Ovarian Cyst*. Statpearls Publishing.
- Bahrudin, M. (2017). *Patofisiologi Nyeri (Pain)*. 13(1), 7–13.
- Bray, F., Ferlay, J., & Soerjomataram, I. (2018). *Global Cancer Statistics 2018 : Globocan Estimates Of Incidence And Mortality Worldwide For 36 Cancers In 185 Countries*. 394–424. <https://doi.org/10.3322/caac.21492>
- Budiarti, I. Sri, & Nora, R. (2021). Teknik Hipnotis Lima Jari Pada Pasien Lansia Yang Menderita Ansietas Dengan Penyakit Kronis. *Jurnal Salingka Abdim*, 1(2), 69–73.
- Center For Disease Control And Prevention (Cdc). (2022). *Pcos (Polycystic Ovary Syndrome) And Diabetes*. 30 Desember 2022. <https://www.cdc.gov/diabetes/basics/pcos.html>
- Dewi, P. I. S. L., Surya, I. G. N. H. W., Darmayasa, I. M., & Putra, I. G. M. (2022). Karakteristik Pasien Kista Ovarium Di Rsup Sanglah Denpasar Periode Januari 2019 - Desember 2019. *Jurnal Medika Udayana*, 11(1), 72–77.
- Firdaus, R. M. (2018). *Menghilangkan Gelisah, Takut Dan Stress Melalui Alqur'an*. 16 Januari 2018.
- Fitrianingrum, E. D., Rohmayanti, & Mareta, R. (2018). Hipnosis 5 Jari Berpengaruh Pada Penurunan Nyeri Post Sectio Caesarea. *Jurnal Menara Medika*, 1(1), 1–12.
- Halim, A. R., & Khayati, N. (2020). Pengaruh Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks. *Ners Muda*, 1(3), 1–6.
- Harahap, V. . I. (2018). Pengaruh Terapi Musik Mozart Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Haid Pada Mahasiswi Tingkat 1 Stikes Prima Jambi Tahun 2016. *Scientia Journal*, 7(01), 142–146.
- Hasnah. (2020). *Modul Intervensi Keperawatan Pencegahan Pre Eklampsia Pada Ibu Hamil* (Rasdiyanah, N. F. Gani, Nurhidayah, N. K. Khotimah, Rasmawati, Ilhamsyah, & A. Adhiwijaya (Eds.); I. Alauddin University Press.
- Hasnah, Muthahharah, Roswati, A. R., & Gani, N. F. (2022). Therapeutic Intervention Of Murottal Al- Qur ' An In Ovarian Cyst Patients With Acute Postoperative Pain Problems. *Jurnal Kesehatan*, 15(1), 65–70. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v15i1.29231>
- Hidayat, A. A. (2021). *Studi Kasus Keperawatan; Pendekatan Kualitatif* (1st Ed.). Health Books Publishing.
- Katuuk, M. E. (2017). Pengaruh Terapi Musik Instrumental Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pada Pasien Pre Operasi Fraktur Di Rumkit Tk.Iii R.W.Monginsidi Teling Dan Rsu Gmim Bethesda Tomohon. *E-Journal Keperawatan (E_Kp)*, 5(Nomer 1).
- Kemenag Ri. (2020). *Al-Quran Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*.

- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri.
- Kemenkes Ri. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*. Kementerian Kesehatan Ri.
- Khodriyati, N. S., Dewi, A., & Khoiriyati, A. (2018). Efektifitas Kombinasi Terapi Musik Dan Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Kateterisasi Jantung. *Jurnal Kesehatan Karya Husada*, 6(1), 50–65.
- Khoiria, N., Indriati, D. W., Sundari, A. S., & Diyantoro. (2020). Prevalence And Associated Factors Of Ovarian Malignancy : A Cross-Sectional Based Study In Surabaya. *Mal J Med Health Sci*, 16(8), 29–34.
- Marsidi, S. R. (2021). Identifikasi Tingkat Stres, Kecemasan, Dan Depresi Mahasiswa Dalam Persiapan Menghadapi Uji Kompetensi Exit Exam. *Journal Of Vocational Health Studies*, 05, 87–93. <https://doi.org/10.20473/Jvhs.V5.I2.2021.87-93>
- Nuryati, S. (2020). *Pengaruh Intervensi Musik Terhadap Kecemasan Pada Pasien Pre Operasi Sectio Caesaria Di Ruang Instalasi Bedah Sentral Rsud Sultan Imanuddin Tahun 2020*. Stikes Borneo Cendekia Medika Bangkalan Bun.
- Puspita, A., Munir, M. A., Faris, A., Program, M. P., & Infection, D. (2021). *Case Report : Treatment Of Ovarian Cysts With Total Hysterectomy And Bilateral Salpingooferectomy*. 3(2), 149–153.
- Rahmawati, A. (2020). *Pengaruh Terapi Musik Nature Sound Terhadap Kualitas Tidur Lansia Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Stikes Bakti Husada Mulia Madiun.
- Ratih, N. D., Suwartono, H., & Sabir, M. (2022). Kista Ovarium Neoplasma Dengan Prolaps Rahim: Laporan Kasus Neoplasma Ovarian Cyst With Uterin Prolapse: Case Report. *Jurnal Medical Profession (Medpro)*, 4(2), 159–167.
- Sari, N. M. N., & Sumawati, N. M. R. (2017). Penerapan Self Hypnosis Pada Ny “Sw” Umur 40 Tahun Dengan Kista Ovarium (Penatalaksanaan Pada Gangguan Reproduksi Dengan Kista Ovarium Di Ruang Dara Rsud Wangaya). *Caring*, 1(2), 1–7.
- Savitri, P. R. S. S., Budiana, I. N. G., & Mahayasa, P. D. (2020). Karakteristik Penderita Kista Ovarium Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Periode 1 Januari Sampai 30 Juni 2018. *Jurnal Medika Udayana*, 9(3), 82–86.
- Sdki. (2017). *Laporan Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Sesrianty, V., & Wulandari, S. (2018). Terapi Musik Klasik (Alunan Piano) Menurunkan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Operasi. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E*, 1(1), 2622–2256. <https://jurnal.upertis.ac.id/index.php/pskp/article/download/59/48/>
- Sukmawati, W., Made Ari Dwi Jayanti, D., & Putu Arwidiana, D. (2021). Pengaruh Hypnosis 5 Jari Terhadap Penurunan Tingkat Stress Pada Keluarga Pasien Skizofrenia Di Wilayah Kerja Puskesmas Ii Denpasar Timur. *Jurnal Nursing Update*, 2(2), 42–50.
- Suryoadji, K. A., Ridwan, A. S., Fauzi, A., & Kusuma, F. (2022). Diagnosis Dan


- Tatalaksana Pada Kista Ovarium : A Literature Review. *Jurnal Khazanah*, 14(1), 38–48.
- Tidore, M., & Rahakbauw, G. Z. (2022). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Kista Ovarium Dalam Mengatasi Masalah Kecemasan Di Ruang Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon. *Global Health Science*, 7(4), 202–206.
- Tim Pokja Sdki Dpp Ppni. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia; Definisi Dan Indikator Diagnostik*. Dpp Ppni.
- Tim Pokja Siki Dpp Ppni. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Wahid, T. O. (2022). Rare Case: Ovarian Cysts In Child. *Jurnal Ilmu Kedokteran (Journal Of Medical Science)*, 16(1), 49. <https://doi.org/10.26891/jik.v16i1.2022.49-51>
- Wahyudi, B., Hidayati, L., & Bakar, A. (2019). Pengaruh Hypnosis Auditori Lima Jari Terhadap Tanda-Tanda Vital Pada Pasien Fraktur Ekstremitas. *Jurnal Keperawatan Medikal Bedah Dan Kritis*, 8(1), 14–22.
- Who. (2020a). *Indonesia Source Globocan 2020 International Agency For Research On Cancer*. Globocan.
- Who. (2020b). *World Health Statistic 2020*. World Health Organization.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pathway

Kista Ovarium Pre Operasi



Lampiran 2: Informed Consent

SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN

Untuk dilakukan tindakan medis yang ada hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh saya sendiri, istri, ayah, ibu, anak saya, dengan

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Alamat :

Yang tujuan, sifat dan perlunya tindakan medis tersebut di atas, serta risiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh mahasiswa dan telah saya mengerti sepenuhnya.

Dengan pernyataan/persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar,
Mahasiswa Pasien/Keluarga

() ()

Lampiran 3: Standar Operasional Prosedur Hipnosis 5 Jari

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR HIPNOSIS 5 JARI
Prosedur Kerja	Materi
Pengertian	Hipnosis lima jari adalah salah satu teknik relaksasi dengan metode pembayangan atau imajinasi yang menggunakan 5 jari sebagai alat bantu.
Tujuan	Untuk mengurangi nyeri yang dirasakan pasien
Indikasi	Pasien yang mengalami nyeri
Kontraindikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dengan kecemasan berat 2. Klien dengan gangguan jiwa 3. Klien dengan gangguan pendengaran
Persiapan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak waktu, topik dan tempat dengan klien 2. Pasien diberi penjelasan tentang hal-hal yang akan dilakukan 3. Jaga privasi pasien 4. Posisi pasien diatur sesuai kebutuhan
Persiapan alat	Modifikasi lingkungan senyaman mungkin bagi klien termasuk pengontrolan suasana ruangan agar jauh terhindar dari kebisingan saat mempraktekkan teknik relaksasi lima jari
Cara kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi salam atau menyapa klien 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan 4. Menanyakan kesiapan klien 5. Mencuci tangan sebelum tindakan 6. Membaca Basmalah 7. Anjurkan klien untuk mengatur posisi se nyaman mungkin 8. Lakukan intervensi hipnosis 5 jari dengan durasi 10 menit 9. Instruksikan klien melakukan relaksasi napas dalam terlebih dahulu dengan menutup mata 10. Bayangkan bahwa anda dalam keadaan sehat (sambil menyentuh ibu jari dan jari telunjuk) 11. Rasakan keadaan sehat anda pada saat ini dan nikmatilah keadaan sehat anda 12. Bayangkan orang-orang yang anda cintai berada di samping anda (sambil menyentuhkan ujung jari tengah dengan ujung ibu jari) 13. Nikmati kebahagiaan yang anda rasakan, ucapkan dalam hati “betapa bahagianya saya saat ini” 14. Bayangkan bahwa orang yang anda cintai tersebut memberikan pujian yang paling indah untuk anda (sambil menyentuhkan ujung jari manis ke ibu jari) 15. Rasakan betapa bahagianya anda, menikmati kebahagiaan itu sambil tersenyum. Katakan lagi dalam hati “betapa

	<p>bahagiaanya saya saat ini”</p> <p>16. Bayangkan tempat yang paling indah (sambil menyentuhkan ujung jari kelingking dengan ujung ibu jari)</p> <p>17. Rasakan betapa bahagiaanya anda saat ini dan ucapkan kembali dalam hati sambil tersenyum “saya semakin bahagia.. saya sangat bahagia”</p> <p>18. Berikan waktu jeda untuk beristirahat dan terus menikmati kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan tersebut</p> <p>19. Kini anda benar-benar telah menikmati suasana rileks, nyaman, tenang dan penuh kebahagiaan. Saatnya anda bangun dalam kondisi yang sangat segar. Saya akan menghitung maju dari 1-3. Pada hitungan ketiga, anda akan terbangun dalam kondisi yang sangat segar, lebih segar dari sebelumnya. Satu.. dua.. lebih segar dari sebelumnya.. tiga.. bangun dan buka mata anda</p> <p>20. Lakukan relaksasi nafas dalam kemudian lakukan pengukuran skala nyeri</p> <p>21. Evaluasi perasaan klien</p> <p>22. Dokumentasikan hasil dari intervensi dan menyampaikan rencana tindakan lanjut</p>
Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan komunikasi yang terapeutik 2. Bekerja dengan hati-hati, sopan dan asertif 3. Tidak ragu dan tidak tergesa-gesa 4. Perhatikan respon klien

Lampiran 4: Standar Operasional Prosedur Terapi musik alam

 <p>ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TERAPI MUSIK ALAM</p>
Prosedur Kerja	Materi
Pengertian	Musik alam merupakan nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi tersebut
Tujuan	Menurunkan tingkat nyeri
Indikasi	Pasien yang mengalami nyeri
Kontraindikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dengan kecemasan berat 2. Klien dengan gangguan jiwa 3. Klien dengan gangguan pendengaran
Persiapan pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak waktu, topik dan tempat dengan klien 2. Pasien diberi penjelasan tentang hal-hal yang akan dilakukan 3. Jaga privasi pasien 4. Posisi pasien diatur sesuai kebutuhan
Persiapan alat	Menggunakan speaker/handphone dan modifikasi lingkungan

	senyaman mungkin bagi klien termasuk pengontrolan suasana ruangan agar jauh terhindar dari kebisingan saat mempraktekkan terapi musik alam
Cara kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi salam atau menyapa klien 2. Memperkenalkan diri 3. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan 4. Menanyakan kesiapan klien 5. Mencuci tangan sebelum tindakan 6. Membaca basmalah 7. Anjurkan klien untuk mengatur posisi se nyaman mungkin 8. Instruksikan klien untuk memejamkan mata dan menyuruh klien untuk membayangkan berada di suatu tempat yang damai 9. Membunyikan musik alam menggunakan handphone dan meletakkannya didekat pasien 10. Lakukan terapi musik alam pada klien selama 5 menit dengan volume 50% 11. Instruksikan klien untuk membuka mata secara perlahan-lahan 12. Melakukan pengukuran skala nyeri 13. Melakukan evaluasi perasaan klien 14. Dokumentasikan hasil dari intervensi dan menyampaikan rencana tindakan lanjut
Hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan komunikasi yang terapeutik 2. Bekerja dengan hati-hati, sopan dan asertif 3. Tidak ragu dan tidak tergesa-gesa 4. Perhatikan respon klien

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup



Nama saya Darti D., S.Kep lahir di tombolo, 24 Desember 2001. Asal sekolah SMAN 10 Jeneponto. Nama orang tua Bapak Dahlan dan Ibu Nurlaeni. Riwayat pendidikan SD 53 Bontoramba, SMPN 1 Maero, SMAN 10 Jeneponto dan S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Pernah bekerja sebagai CS di @gadisturateabookstore. Pengalaman sebagai koordinator departemen penelitian dan pengembangan UKM RITMA UINAM tahun 2021, staff departemen pengembangan organisasi dan SDM HIMABIM tahun 2020 dan peserta *Maritime Leadership Camp* (MLC) oleh The Floating School tahun 2023

Penghargaan :

1. Juara 3 Lomba Debat Sayebina UIN Suska Riau 2021 dan Juara 3 Lomba Debat Insight UNHAS 2019
2. Juara Harapan 1 Debat Nasional WIGPIM 2021 dan Juara 1 Lomba Debat ANC UINAM 2020
3. Juara 2 Lomba Debat Macro UNM 2019
4. Kontributor Penulis Buku “Tak Apa, Pergi Saja”, penulis buku “Titik Terendah Saat Patah”, penulis buku “Perasaan Tidak Sebercanda Itu”
5. Narasumber dalam Kegiatan Sekolah Advokasi oleh ILS tahun 2021
6. Narasumber dalam Kegiatan Research Class Step One oleh IPSS tahun 2021
7. Narasumber dalam Kegiatan Workshop KTI oleh PK HPMM KOM UNM tahun 2021
8. Narasumber dalam Kegiatan KABARIN oleh HMJ Keperawatan tahun 2022
9. Narasumber dalam Kegiatan Kelas Debat oleh HIMABIP tahun 2022
10. Speaker dalam konferensi internasional dengan tema “*Advance Technology in Health and Medicine in Improving Quality of Life*” oleh *Alauddin Health and Medical International Conference (ALHAMDIC)* tahun 2022
11. Penulis artikel “*Five-Finger Hypnosis and Murottal Therapy to Prevent Preeclampsia in Pregnant Women*” dalam jurnal *Al-Sihah: Public Health Science Journal* tahun 2023