

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *CHRONIC KIDNEY DISEASE* DENGAN TIRAH BARING LAMA MENGGUNAKAN INTERVENSI PEMBERIAN MINYAK ZAITUN PADA MASALAH RESIKO LUKA TEKAN DI RUANG ICU RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR



ALAUDDIN

MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2023

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *CHRONIC*
KIDNEY DISEASE DENGAN TIRAH BARING LAMA MENGGUNAKAN
INTERVENSI PEMBERIAN MINYAK ZAITUN PADA MASALAH
RESIKO LUKA TEKAN DI RUANG ICU RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ners Program Studi
Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN

Oleh:

MUH. REZA IRSANDI PUTRA B

NIM: 70900122016

ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Reza Irsandi Putra B, S.Kep
NIM : 70900122016
Tempat/Tgl.Lahir : Makassar, 05 Januari 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Chronic Kidney Disiase Dengan Tirah Baring Lama Menggunakan Intervensi Pemberian Minyak Zaitun Pada Masalah Resiko Luka Tekan Di Ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juni 2023

Penyusun,

Muh. Reza Irsandi Putra B, S.Kep


NIM:70300122016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Tugas Akhir Ners Saudara(i) Muh. Reza Irsandi Putra B S.Kep, NIM : 70900122016, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Chronic Kidney Disease* Dengan Tirah Baring Lama Menggunakan Intervensi Pemberian Minyak Zaitun Dengan Masalah Resiko Luka Tekan Di Ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar". Memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 06 Juli 2023

Pembimbing I



Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep

Pembimbing II



IlhamSyah, S.Kep.,Ns.,M.Kes



PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Chronic Kidney Disease* Dengan Tirah Baring Lama Menggunakan Intervensi Pemberian Minyak Zaitun Dengan Masalah Resiko Luka Tekan Di Ruang ICU RSUP. Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Muh. Reza Irsandi Putra B, S.Kep, NIM: 70900122016, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Selasa 27 Juni 2023, bertepatan dengan 27 Dzulkaidah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, Juni 2023 M
Zulqaida 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr.dr. Syafirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes
Sekretaris : Dr. Patima S.Kep.,Ns.,M.Kep
Munaqisy I : Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Munaqisy II : Dr. Muhaemin, S.Ag.,M.Th.I.,M,Ed
Pembimbing I : Eva Yustilawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep
Pembimbing II : Ilhamsyah, S.Kep.,Ns.,M.Kep

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr.dr. Syafirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 00

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat Rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir profesi ners dengan judul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Chronic Kidney Disiase* Dengan Tirah Baring Lama Menggunakan Intervensi Pemberian Minyak Zaitun Pada Masalah Resiko Luka Tekan Di Ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga sahabatnya dari para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan tugas akhir ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada Program Profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023

Dengan terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua Orang Tua saya tercinta. Bakhtiar S.Pd dan Hasni Sahibe atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, meraih gelar Ners. Ucapan terimakasih yang tulus saya haturkan kepada pembimbing, yang senantiasa mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp. A, M. Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kes selaku ketua jurusan dan Hj. Sysnawati, S.Kep., Ns.,M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak kenal lelah memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah dengan sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan tugas akhir, motivasi yang membangun sehingga penulis bisa ketahap ini.
5. Ardian Adhiwijaya, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan Dr. Muhaemin, S.Ag., M.Th.I., M.Ed selaku penguji II yang sabar dan ihklas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya Ners Angkatan XXI yang telah bahu membahu saling memberikan semangat selama 1 tahun proses ini dan memberikan penulis motivasi dan pemikiran positif.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, 23 Juni 2023

Muh. Reza Irsandi Putra B

70900122016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Konsep Medis.....	8
2. Etiologi	8
3. Klasifikasi.....	9
4. Patofisiologi.....	10
5. Manifestasi Klinis	11
6. Penatalaksanaan	12
7. Pemeriksaan Penunjang.....	13
B. Konsep Asuhan Keperawatan.....	14
2. Diagnosis Keperawatan.....	15
3. Intervensi Keperawatan.....	17
4. Implementasi	22
5. Evaluasi	22
6. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan.....	22
C. Evidence Based Practice in Nursing.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Tujuan	24
3. Indikasi.....	24
4. Kontraindikasi.....	24
5. Prosedur Pemberian	24

6. Kriteria Evaluasi	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Rancangan Studi Kasus	26
B. Subyek studi kasus	26
C. Fokus Studi Kasus	26
D. Instrumen Studi Kasus	26
E. Prosedur Pengambilan Data	26
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus	27
G. Analisis Data dan Penyajian Data	27
H. Etika Studi Kasus	27
BAB IV LAPORAN KASUS	29
A. Pengkajian Keperawatan	29
COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING ASSESMENT	30
BARTHEL INDEKS	45
BAB V PEMBAHASAN	64
A. Analisis Asuhan Keperawatan	64
1. Analisis Pengkajian Keperawatan	64
2. Analisis Diagnosis Keperawatan	65
3. Analisis intervensi keperawatan	67
4. Analisis implementasi keperawatan	69
5. Analisis evaluasi keperawatan	71
B. Analisis Intervensi EBPN	71
C. Keterbatasan	75
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran Jurnal Utama	81
Lampiran Dokumentasi Implementasi	82

ABSTRAK

Nama : Muh. Reza Irsandi Putra. B
NIM : 70900122016
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Chronic Kidney Disease* Dengan Tirah Baring Lama Menggunakan Intervensi Pemberian Minyak Zaitun Pada Masalah Resiko Luka Tekan Di Ruang ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Latar Belakang : Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal kronik yaitu gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia (sampah nitrogen lain dalam darah). Gagal ginjal kronik juga merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun. **Tujuan** penulisan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan intervensi miring kiri kanan dan pemberian minyak zaitun/*virgin oil* di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar **Metode** yang digunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. **Hasil** analisis data menunjukkan asuhan keperawatan pada pasien Tn. W dengan kasus *Chronic Kidney Disease* (CKD) dengan masalah resiko luka tekan yang diberikan intervensi menggunakan *virgin oil*/ minyak zaitun selama 3 hari intervensi. Intervensi ini diberikan 1 kali sehari dengan cara memberikan *virgin oil*/minya zaitun pada pinggang pasien dengan hasil pemantauan **Kesimpulan** Berdasarkan pengkajian yang didapatkan pasien atas nama Tn. W dengan diagnosis *Chronic Kidney Disease* (CKD) usia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki pasien gagal napas pada saat setelah post operasi. Diagnosis keperawatan yang di dapatkan pada kasus ini yaitu Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan, Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus-kapiler, Resiko luka tekan berhubungan dengan penurunan mobilitas, Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal asidosis metabolic.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, *Chronic Kidney Disease* (CKD), resiko luka tekan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Chronic Kidney Disease (CKD) atau gagal ginjal kronik yaitu gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga menyebabkan uremia (sampah nitrogen lain dalam darah). Gagal ginjal kronik juga merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun (Haryono & Hardjono, 2013). Gagal ginjal kronik juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang tidak menular tetapi meningkat setiap tahunnya (Mellia & Nefi, 2020).

Mobilitas atau aktivitas yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan atau pergerakan secara bebas (Boangmanalu, 2016). Kebutuhan aktivitas adalah salah satu tanda kesehatan di mana seseorang mampu melakukan aktivitas seperti berdiri, berjalan, maupun bekerja. Faktor yang mempengaruhi aktivitas pergerakan dikarenakan kondisi seseorang tidak mampu melakukan pergerakan secara mandiri oleh adanya gangguan fungsi motorik (Nababan & Giawa, 2019). Manfaat aktifitas fisik bagi kesehatan menurut WHO yaitu: mencegah kardiorespirasi (penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi), kesehatan metabolik (mencegah diabetes dan obesitas), kesehatan muskuloskeletal, mencegah jatuh pada lansia dan mencegah depresi (Rahayu, 2016). Menurut data WHO, prevalensi penyakit gagal ginjal kronik memiliki angka yang cukup tinggi setiap tahunnya. Data amerika serikat tahun 2015 memperkirakan angka permasalahan *chronic kidney disease* mencapai hingga 19,2 juta (11%) dari seluruh populasi dewasa dan juga diperkirakan sudah pada tahap stadium akhir (Ni, 2019).

Tingginya kasus gagal ginjal kronik berpotensi tinggi menimbulkan kematian karena gagal ginjal tidak dapat ditanggulangi dan ditambah dengan serangan jantung, stroke dan sesak napas. Kemudian juga penderita *chronic kidney disease* tidak menjaga pola makannya yang disebabkan karena mengkonsumsi sari manis dan pewarna dalam minuman. Oleh karena itu dilakukan penanganan secara intensive agar masalah tidak menjadi besar dan kemudian terjadi komplikasi (Oktaviani, 2017).

Latihan fisik penting untuk dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Latihan fisik yang dilakukan pada penderita *chronic kidney disease* berguna untuk meningkatkan aliran darah dan

memperbesar jumlah kapiler sehingga meningkatkan perpindahan urea dan toksin dari jaringan ke vaskuler kemudian dialirkan ke mesin dializer atau mesin hemodialisis. Latihan fisik yang dilakukan selama hemodialisis dapat meningkatkan dialysis efficacy yaitu mengurangi efek racun dari uremik sindrom yang dapat mengakibatkan komplikasi pada pasien GJK. Pasien yang melakukan latihan fisik selama hemodialisis memungkinkan untuk lebih sedikit mengalami komplikasi. Aliran darah melalui jaringan meningkat saat dilakukan latihan fisik, menggunakan otot-otot tungkai bawah memungkinkan kapiler untuk membuka lebih banyak sehingga memberikan luas permukaan yang lebih besar untuk pertukaran zat dari jaringan ke darah. Latihan yang dilakukan merangsang pertumbuhan pembuluh darah yang kecil (kapiler) dalam otot. Hal ini membantu tubuh untuk efisien menghantar oksigen ke otot, dapat memperbaiki sirkulasi secara menyeluruh dan menurunkan tekanan darah serta mengeluarkan hasil sampah metabolik yang mengiritasi seperti asam laktat dari dalam otot. (Rahmawati & Mokodompit, 2019).

Ulkus tekan adalah kematian sel atau cedera Lokal pada kulit, jaringan di bawahnya, atau keduanya. Luka tekan diakibatkan oleh sirkulasi darah jaringan yang tidak mencukupi karena tekanan atau tekanan dengan gesekan, gaya geser, atau keduanya, dan biasanya berkembang di kulit, menutupi tulang yang menonjol. (Sönmez & Güneş, 2020). Saat ini, ulkus tekan adalah salah satu dari 5 penyebab umum cedera pasien di dunia dan masalah keselamatan pasien yang dapat dicegah diketahui. Ulkus tekanan terjadi sebagian besar di antara orang tua dan pasien imobilitas dengan defisit akut dan neurologis (Miraj et al., 2020).

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan luka tekan, terutama periode tekanan yang parah dan berkepanjangan mengurangi atau menghentikan suplai darah, menyebabkan iskemia jaringan, dan akhirnya kematian sel. Selain itu, faktor faktor seperti kerapuhan, gesekan, dan kelembapan memengaruhi kemampuan jaringan untuk menahan tekanan. Faktor-faktor seperti kemampuan mendasari struktur kulit seperti pembuluh darah dan kolagen juga terpengaruh (Shakibamehr et al., 2019).

Zaitun adalah tanaman obat yang telah menarik perhatian banyak peneliti karena banyak khasiat obatnya. Dalam pengobatan tradisional, ramuan ini digunakan sebagai obat antihipertensi, analgesik, antiaterosklerotik, pencahar, potensiasi, dan antipiretik. Minyak ini terdiri dari 98% trigliserida, termasuk dominan monounsaturated oleic acid yang terbukti penting untuk perawatan kulit dan dapat

mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan luka (Meliza, Ritarwa & Sitohang, 2020).

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk melindungi kulit dan mencegah luka tekan adalah pemijatan. Pijat saat ini adalah salah satu metode terapi di dunia yang didedikasikan untuk banyak studi klinis (Pathak & Dutta, 2021). Penggunaan topikal minyak zaitun efektif untuk mengurangi proktitis radiasi akut dan nyeri, perdarahan dan gatal yang disebabkan oleh wasir dan fisura anus. Penggunaan minyak zaitun topikal setiap hari telah dilaporkan sebagai cara yang efektif dan mengurangi risiko dermatitis di antara mereka. (Karimi et al., 2020).

Zaitun adalah tanaman obat lain yang karakteristik terapeutiknya yang beragam telah menarik minat banyak peneliti. Ramuan ini digunakan sebagai obat antihipertensi, analgesik, antiaterosklerotik, pencahar, potensiasi, dan antipiretik dalam pengobatan tradisional. Ekstrak daun zaitun juga terbukti memiliki efek antibakteri dan antijamur. Dalam diet Mediterania, minyak zaitun adalah sumber utama lemak, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker dan penyakit jantung. Sunburn, psoriasis, dan infeksi kulit semuanya dapat diobati dengan minyak zaitun.

Intervensi ini dapat diintegrasikan dengan salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam sehingga bisa menjaga kesehatan diri yakni dengan istirahat yang cukup dan beraktivitas. Firman-Nya dalam Surah Al-Furqan ayat 47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَاً وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ أَشْرًا
"*Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.*" (QS. Al-Furqan ayat 47).

Quraish Shihahb menafsirkan ayat ini sebagai berikut : Di antara bukti-bukti keesaan Tuhan, Dia menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai penutup. Semua makhluk larut dalam kegelapan yang menyelimutinya, seperti baju yang menyelimuti pemakainya. Dia membuat manusia bisa tidur untuk beristirahat memulihkan tenaga setelah kelelahan. Dengan datangnya siang, Dia membuat manusia bangun dan berusaha mencari penghidupan dan rezeki.

Selain itu, salah satu tindakan penatalaksanaan untuk mencegah dekubitus pada pasien immobilisasi adalah dengan pemberian virgin minyak zaitun. Virgin minyak zaitun mengandung 74.4%-77.5% asam oleat, palmitic acid 11.5%-12.1 dan linoleic acid 8.9%-9.4%. Asam oleat dalam virgin minyak zaitun memiliki daya penyerapan

tinggi dan dapat melindungi elastisitas kulit dari kerusakan. Virgin minyak zaitun juga memiliki kandungan asam lemak baik yang bermanfaat untuk memelihara kelembapan, kelenturan, serta kehalusan kulit. Menurut penelitian (Lupiañez-Perez et al., 2015) penggunaan virgin minyak zaitun topikal tidak ada perbedaan yang signifikan dengan penggunaan Hyperoxygenated Fatty Acid (HOFA) untuk mencegah terjadinya luka tekan pada pasien immobilisasi (Supriyanti et al., 2019).

Zaitun membawa arti tempat tumbuhnya zaitun yakni di gunung Thusina yang terletak di gurun Sinai Mesir, sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Mu‘minun ayat 20:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلَّذِينَ

(Kami tumbuhkan) pohon (zaitun) yang tumbuh di Bukit Sinai, yang menghasilkan minyak dan lauk-pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan.

Selanjutnya didalam zaitun terdapat minyak yang berkualitas. Minyak zaitun adalah minyak yang sangat bagus, berbeda dengan minyak dan lemak lain, yang memberikan kesehatan pada manusia. Minyaknya bisa digunakan sebagai bahan bakar lampu, dan juga untuk lauk dan lula. Kayu dan arangnya digunakan sebagai kayu bakar. Tidak ada satu bagian pun dari pohon ini tidak berguna. Bahkan abunya bisa dimanfaatkan untuk mencuci sutera.

Beberapa tanda ini menunjukkan bahwa sungguh minyak zaitun adalah pemberian Allah SWT untuk manusia. Pohon zaitun adalah pohon yang paling dulu, yang penuh berkah dan disebut dalam kitab suci (Al-Quran).³¹ Begitu Allah SWT menyebut zaitun dalam Al-Quran, tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan Allah SWT dari semua itu. Salah satunya adalah keajaiban dan khasiat minyak yang dihasilkan dari tumbuhan zaitun yang cukup melimpah ruah dan sangat multifungsi bagi orang yang ingin berpikir dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah SWT seperti di dalam firman-Nya QS. An-Nahl ayat 11:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien *Chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan intervensi pemberian minyak zaitun di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan intervensi pemberian minyak zaitun di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama.
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama.
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama.
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama.
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan intervensi pemberian minyak zaitun.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan intervensi pemberian minyak zaitun di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien *chronic kidney disease* dengan tirah baring lama menggunakan

intervensi pemberian minyak zaitun pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Definisi

Chronic Kidney Disease (CKD) atau penyakit renal tahap akhir (ESRD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia (retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah) (Nuari & Widayati, 2017).

Chronic Kidney Disease adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif, dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Selanjutnya, gagal ginjal adalah suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang irreversible, pada suatu derajat memerlukan terapi pengganti ginjal yang tetap, berupa dialisis atau transplantasi ginjal (Suwitra, 2014).

Chronic Kidney Disease adalah suatu spektrum proses-proses patofisiologi yang berbeda-beda serta berkaitan dengan kelainan fungsi ginjal dan penurunan progresif laju filtrasi glomerulus (LFG) (Jameson & Loscalzo, 2017).

Dari definisi diatas yang dapat disimpulkan bahwa *Chronic Kidney Disease* merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversible dimana kemampuan tubuh gagal mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan dan elektrolit, pada suatu derajat diperlukan terapi pengganti ginjal berupa dialisis.

2. Etiologi

Chronic Kidney Diseases seringkali menjadi penyakit komplikasi dari penyakit lainnya sehingga merupakan penyakit sekunder (secondary illness). Penyebab yang sering adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Selain itu ada beberapa penyebab lainnya, yaitu:

1. Glomerulonefritis
2. Pyelonefritis kronis, tuberculosis
3. Polikistik ginjal

4. Renal nephrosclerosis
5. Nephrolithiasis
6. Systemic lupus erythematosus
7. Aminoglikosida

Menurut IRR (Indonesian Renal Registry) pada tahun 2017 ini proporsi etiologi *chronic kidney disease*, urutan pertama ditempati oleh hipertensi sebanyak 36% dan nefropati diabetik atau diabetik kidney diseases menempati urutan kedua.

Penyebab	Jumlah
Hipertensi	10482
Diabetes mellitus	4394
Penyakit kardiovaskuler	1424
Penyakit serebrovaskuler	365
Penyakit saluran pencernaan	374
Penyakit saluran kencing	617
Tuberkulosis	184
Hepatitis B	366
Hepatitis C	679
Keganasan	123
Lain-lain	1240

3. Klasifikasi

Klasifikasi *Chronic Kidney Disease* didasarkan atas dua hal yaitu, atas dasar derajat (stage) penyakit dan atas dasar diagnosis etiologi. Klasifikasi atas dasar derajat penyakit dibuat atas dasar LFG yang dihitung dengan menggunakan rumus Cockcroft-Gault sebagai berikut:

$$(140 - \text{umur}) \times \text{berat badan}$$

$$\text{LFG (ml/mnt/1,73m}^2\text{)} = \frac{\text{—————}}{72 \times \text{kreatinin plasma (mg/dl)}}$$

*) pada perempuan dikalikan 0,85

Derajat	Penjelasan	LFG (ml/mn/1,73m ²)
1	Kerusakan ginjal dengan LFG normal Atau ↑	>90
2	Kerusakan ginjal dengan LFG ↑ringan [^]	60-89
3	kerusakan ginjal dengan LFG ↑sedang	30-59
4	Kerusakan ginjal dengan LFG ↑ berat	15-29
5	Gagal ginjal	<15 atau dialisi

(Sumber : Guyton dan Hall, 2010)

4. Patofisiologi

1. Penurunan GFR

Penurunan GFR dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan klirens kreatini. Akibat dari penurunan GFR, maka klirens kreatinin akan menurun, kreatinin akan meningkat, dan nitrogen urea darah (BUN) juga akan meningkat (Nurarif & Kusuma, 2015).

2. Gangguan klirens renal

Banyak masalah muncul pada ginjal sebagai akibat dari penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi, menyebabkan penurunan klirens (substansi darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal).

3. Retensi cairan dan natrium

Ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonstrasi atau mengencerkan urin secara normal. Terjadi penahanan cairan dan natrium, sehingga meningkatkan resiko terjadinya edema, gagal jantung kongestif dan hipertensi.

4. Anemia

Anemia terjadi sebagai akibat dari produksi eritroprotein yang tidak adekuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi, dan kecenderungan untuk terjadi pendarahan akibat status uremik pasien, terutama dari saluran GI.

5. Ketidakseimbangan kalsium dan fosfat

Kadar serum kalsium dan fosfat tubuh memiliki hubungan yang saling timbal balik, jika salah satunya meningkat yang lain akan turun. Dengan menurunnya GFR maka terjadi peningkatan kadar fosfat serum dan sebaliknya penurunan kadar kalsium. Penurunan kadar kalsium ini akan memicu sekresi parathormon, namun dalam kondisi gagal ginjal, tubuh tidak berespon terhadap peningkatan sekresi

parathormon, akibatnya kalsium di dalam tulang menurun menyebabkan perubahan pada tulang dan penyakit tulang.

6. Penyakit tulang uremik (osteodistrofi)

Terjadi perubahan kompleks kalsium fosfat dan keseimbangan parathormon.

5. Manifestasi Klinis

Tanda dan gejala klinis pada gagal ginjal kronik dikarenakan gangguan yang bersifat sistemik. Ginjal sebagai organ koordinasi dalam peran sirkulasi memiliki fungsi yang banyak. Sehingga kerusakan kronis secara fisiologis ginjal akan mengakibatkan gangguan keseimbangan sirkulasi dan vasomotor. Berikut ini adalah tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh gagal ginjal kronis (Pranata & Prabowo, 2014):

1. Ginjal dan gastrointestinal

Sebagai akibat dari hiponatremi maka timbul hipotensi, mulut kering, penurunan turgor kulit, kelemahan, fatigue, dan mual. Kemudian terjadi penurunan kesadaran dan nyeri kepala yang hebat. Dampak dari peningkatan kalium adalah peningkatan iritabilitas otot dan akhirnya otot mengalami kelemahan. Kelebihan cairan yang tidak terkompensasi akan mengakibatkan asidosis metabolik. Tanda paling khas adalah penurunan urine output dengan sedimentasi yang tinggi.

2. Kardiovaskuler

Biasanya terjadi hipertensi, aritmia, kardiomyopati, uremic pericarditis, effusi perikardial (kemungkinan bisa terjadi tamponade jantung), gagal jantung, edema periorbital dan edema perifer.

3. Respiratori sistem

Biasanya terjadi edema pulmonal, nyeri pleura, friction rub dan efusi pleura, crackles, sputum yang kental, uremic pleuritis dan uremic lung dan sesak nafas.

4. Gastrointestinal

Biasanya menunjukkan adanya inflamasi dan ulserasi pada mukosa gastrointestinal karena stomatitis, ulserasi dan perdarahan gusi, dan kemungkinan juga disertai parotitis, esofagitis, gastritis, ulseratif duodenal, lesi pada usus halus/usus besar, colitis, dan pankreatitis. Kejadian sekunder biasanya mengikuti seperti anoreksi, mual, dan vomiting.

5. Integumen

Kulit pucat, kekuning-kuningan, kecokelatan, kering dan ada scalp. Selain itu, biasanya juga menunjukkan adanya purpura, ekimosis, petechiae, dan timbunan urea pada kulit.

6. Neurologis

Biasanya ditunjukkan dengan adanya neuropathy perifer, nyeri, gatal pada lengan dan kaki. Selain itu, juga adanya kram pada otot dan refleks kedutan, daya memori menurun, apatis, rasa kantuk meningkat, iritabilitas, pusing, koma, dan kejang. Dari hasil EEG menunjukkan adanya perubahan metabolik encephalopathy.

7. Endokrin

Bisa terjadi infertilitas dan penurunan libido, amenorrhea dan gangguan siklus menstruasi pada wanita, impoten, penurunan seksresi sperma, peningkatan sekresi aldosteron, dan kerusakan metabolisme karbohidrat.

8. Hepatopoiteic

Terjadi anemia, penurunan waktu hidup sel darah merah, trombositopenia (dampak dari dialisis), dan kerusakan platelet. Biasanya masalah yang serius pada sistem hematologi ditunjukkan dengan adanya pendarahan (purpura, ekimosis, dan petechiae).

9. Muskuloskeletal

Nyeri pada sendi tulang, demineralisasi tulang, fraktur pathologis, dan klasifikasi (otak, mata, gusi, sendi, miokard).

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan keperawatan pada pasien *chronic kidney disiasse* dibagi tiga yaitu (Muttaqin & Sari, 2011):

1. Konservatif

- a. Dilakukan pemeriksaan lab darah dan urin
- b. Observasi balance cairan
- c. Observasi adanya edema
- d. Batasi cairan yang masuk

2. Dialisis

a. Peritoneal dialysis

Biasanya dilakukan pada kasus-kasus emergensi. Sedangkan dialysis yang bisa dilakukan dimana saja yang tidak bersifat akut adalah CPAD (Continues Ambulatory Peritoneal Dialysis).

b. Hemodialisis

Yaitu dialysis yang dilakukan melalui tindakan invasif vena dengan menggunakan mesin. Pada awalnya hemodilisis dilakukan melalui daerah femoralis namun untuk mempermudah maka dilakukan: AV fistule (menggabungkan vena dan arteri) dan double lumen (langsung pada daerah jantung atau vaskularisasi ke jantung).

3. Operasi

a. Pengambilan batu

b. Transplantasi ginjal

7. Pemeriksaan Penunjang

Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien *chronic kidney disease* yaitu (Haryono & Hardjono, 2013):

1. Urin

a. Volume: biasanya kurang dari 400ml/24 jam atau tidak ada (anuria)

b. Warna: secara abnormal urin keruh, kemungkinan disebabkan oleh pus, bakteri, lemak, fosfat atau urat sedimen kotor, kecoklatan menunjukkan adanya darah, Hb, mioglobin, porifin.

c. Berat jenis: kurang dari 1.005 (menetap pada 1.010 menunjukkan kerusakan ginjal berat).

d. Osmolalitas: kurang dari 350mOsm/kg menunjukkan kerusakan tubular, dan rasio urine/serum sering 1:1.

e. Klirens kreatinin: mungkin agak menurun.

f. Natrium: lebih besar dari 40 mEq/L karena ginjal tidak mampu mereabsorpsi natrium.

g. Protein: derajat tinggi proteinuria (3-4+) secara kuat menunjukkan kerusakan glomerulus bila SDM dan fragmen juga ada.

2. Darah

a. BUN/kreatinin: meningkat, kadar kreatinin 10 mg/dl diduga tahap akhir.

- b. Ht: menurun pada adanya anemia. Hb biasanya kurang dari 7 – 8gr/dl.
 - c. SDM menurun, defisiensi eritropoitin dan GDA: asidosis metabolik, pH kurang dari 7,2.
 - d. Natrium serum: rendah, kalium meningkat, magnesium meningkat, Kalsium menurun dan Protein (albumin) menurun.
3. Osmolaritas serum lebih dari 285 mOsm/kg
 4. Pelogram retrograd: abnormalitas pelvis ginjal dan ureter
 5. Ultrasono ginjal: menentukan ukuran ginjal dan adanya massa, kista, obstruksi pada saluran perkemihan bagian atas
 6. Endoskopi ginjal, nefroskopi: untuk menentukan pelvis ginjal, keluar batu, hematuria dan peningkatan tumor selektif.
 7. Arteriogram ginjal: mengkaji sirkulasi ginjal dan mengidentifikasi ekstrasvaskuler, masa.
 8. EKG: ketidakseimbangan elektrolit dan asam basa

B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian

a. Primer

1) Airway

Adanya sumbatan/ obstruksi jalan napas oleh adanya penumpukan secret akibat kelemahan reflek batuk. Jika obstruksi maka lakukan:

- a) *Chin lift / jaw thrust*
- b) *Suction / hisap*
- c) *Guedel airway*

d) Intubasi trachea dengan leher ditahan (imobilisasi) pada posisi netral

2) Breathing

Menelan yang buruk/batuk/saluran napas terlindungi, mengi dan/atau pernapasan tidak teratur, suara napas terdengar.

3) Circulation

Tekanan darah mungkin normal atau meningkat, hipotensi stadium lanjut, takikardia, bunyi jantung normal stadium awal, aritmia jantung, pucat pada kulit dan selaput lendir, pilek, sianosis stadium lanjut.

4) Disability

Kaji kesadaran dengan cepat jika anda sadar hanya sebagai respons terhadap rasa sakit atau jika anda sama sekali tidak sadar. Tidak disarankan untuk mengukur GCS.

Cara yang paling jelas dan tercepat adalah:

Terbangun: A

Tanggapan suara: V

Respon nyeri: P

Tidak ada jawaban: U

5) Exposure

Lepaskan pakaian dan pelindung tubuh pasien untuk memeriksa cedera. Jika diduga cedera leher atau tulang belakang, maka imobilisasi *in line* harus dikerjakan.

b. Sekunder

Penilaian sekunder meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik. Riwayat dapat menggunakan format AMPLE (*A*lergi, *M*edikasi, *P*ost illness, *L*ast meal, dan *E*vent / *E*nvironment yang berhubungan dengan kejadian). Pemeriksaan fisik dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki dan juga dapat ditambahkan ke tes diagnostic.

2. **Diagnosis Keperawatan**

Berdasarkan (PPNI, 2018) beberapa diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kondisi klinis *Chronic Kidney Disease* yaitu:

- a. Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan
- b. Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus-kapiler
- c. Resiko luka tekan berhubungan dengan penurunan mobilitas
- d. Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal, asidosis metabolic
- e. Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif, ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder



3. Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencana Intervensi	Rasional
1.	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Tampak terpasang tracheostomy tube - Tampak terpasang alat bantu pernapasan, ventilator mode SIMV VC : Fr 10, VT 380, PEEP 8, FIO2 60% - Terdapat sputum - Pasien tampak tidak mampu batuk efektif - HR: 110/menit - RR: 29 x/menit - Hasil AGD pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi sputum menurun kental menjadi encer, dan produksi yang banyak menjadi sedikit b. Dispnea menurun (18-20 x/ ment) c. Frekuensi napas membaik (18-20 x/ ment) d. Ronchi menurun (tidak ada suara tambahan) e. Batuk efektif meningkat (mampu melakukan batuk efektif) 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas tambahan - Monitor sputum - Monitor posisi selang tracheostomy terutama setelah mengubah posisi - Monitor kulit area trakeostomi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat jika perlu 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui bunyi napas - Untuk mengetahui pola napas pasien - Untuk mengetahui adanya bunyi napas tambahan - Untuk mengetahui adanya sputum - Untuk mengetahui posisi tracheostomy - Untuk mengetahui adanya infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction - Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction - Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengencerkan lendir klien agar tidak susah keluar

2.	<p>Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus-kapiler dibuktikan dengan :</p> <p>DS : tidak dapat dikaji</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas dyspnea - Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Hasil AGD : pH : 7.307 PCO₂ : 60.9 HCO₃ : 30.7 BE : 4.2 - RR : 29x/menit - SpO₂ : 98% 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispnea menurun (18-20 x/ ment) - Pola napas membaik (teratur tanpa menggunakan alat bantu penapasan) - PCO₂ membaik (80.00 -100.00) 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas - Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik) - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor adanya produksi sputum - Monitor adanya sumbatan jalan napas - Auskultasi bunyi napas - Monitor SPO₂ <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi <p>Dokumentasikan hasil pemantauan</p>	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui frekuensi, irama dan upaya napas pasien - mengetahui pola napas pasien - untuk mengetahui kemampuan batuk efektif - untuk mengetahui adanya produksi sputum - untuk mengetahui adanya sumbatan jalan napas - mengetahui bunyi napas - untuk mengetahui dan mengontrol SPO₂ pada pasien <p>Terapeutik</p> <p>untuk mengetahui respirasi pada pasien</p>
3.	<p>Resiko luka tekan berhubungan dengan penurunan mobilitas ditandai dengan faktor risiko</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien tampak ada kemerahan pada bagian bokong - Punggung teraba hangat - Klien terpasang ventilator 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Elastisitas meningkat b. Perfusi jaringan meningkat 	<p>Pencegahan Luka Tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa luka tekan menggunakan skala Imis. Norton, skala Barden - Periksa adanya luka tekan sebelumnya - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan 	<p>Pencegahan Luka Tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norton scale merupakan alat penilaian resiko ulkus luka tekan pertama yang dapat dijadikan sebagai alat untuk memantau kejadian luka tekan

	<p>dan hanya terbaring di tempat tidur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bartel index :0 (Kebutuhan total) - Skoring dekubitus :13 (Berisiko) 	<p>c. Suhu kulit membaik</p>	<p>tulang atau titik tekan saat mengubah posisi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam - Buat jadwal perubahan posisi - Jaga seprai tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan - Hindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi - Berikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan C, zat besi dan kalori <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda-tanda kerusakan kulit - Anjurkan melapor jika menemukan tanda-tanda kerusakan kulit - Ajarkan cara merawat kulit 	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat tanda dan gejala decubitus - Suhu kulit yang panas menyebabkan terjadinya luka decubitus - Mengidentifikasi terjadinya luka tekan - Melihat kondisi mobilitas klien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotion dapat melembabkan kulit - Mengubah posisi dapat memperlancar peredaran darah sehingga tidak terjadi luka tekan akibat kekurangan o₂ dan nutrisi - Untuk memantau kondisi klien - Agar tidak menimbulkan terjadinya luka tekan akibat seprai yang lembab - Air hangat dapat membuat kulit menjadi lebih mudah iritasi - Dengan asupan makanan yang cukup dapat
--	--	------------------------------	--	--

				meningkatkan sistem imun dan nutrisi pada jaringan kulit
4	<p>Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal, asidosis metabolik</p> <p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpasang kateter urine - SpO2 : 98% - Hasil Hematologi rutin: <ul style="list-style-type: none"> RBC : 3.14 HGB : 8.4 HCT : 24 Ureum : 58 Kreatinin : 2.98 - Hasil kimia klinik <ul style="list-style-type: none"> pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 - Turgor kulit menurun - Volume urine menurun - Perhitungan BC: $216 - (1.998 + 900) = - 882$ 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Perfusi renal meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah urine meningkat b. Kadar urea nitrogen darah membaik c. Kadar kreatinin plasma membaik d. Keseimbangan asam basa membaik 	<p>Pencegahan Syok Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) - Monitor saturasi oksigen (Oksimetri, AGD) - Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) - Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu 	<p>Pencegahan Syok Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat memantau perubahan status kardiopulmonal pasien - Untuk mengetahui saturasi oksigen dan AGD dalam tubuh pasien - Untuk menghitung balance cairan - Untuk memantau tingkat kesadaran pasien <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan saturasi oksigen <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memenuhi kekurangan darah pada pasien, jika diperlukan
5	<p>Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif, ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder</p>	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x 24 jam, diharapkan Tingkat infeksi menurun dengan</p>	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi

<p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien post op pemasangan DLC - Pasien terpasang alat tracheostomy tube - Pasien terpasang kateter urine - Pasien terpasang NGT - Tampak luka dekubitus - Hasil Hematologi rutin: WBC 4.4 HGB 7.2 HCT 23 	<p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kebersihan badan meningkat b. Kadar sel darah putih membaik 	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batasi jumlah pengunjung - Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien - Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Kolaborasi</p> <p>Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu</p>	<p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi kontaminasi bakteri - Untuk mengurangi kontaminasi silang - Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular
--	---	---	--



4. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan salah satu dari proses keperawatan. Implementasi dilaksanakan jika dari hasil pengkajian telah ditentukan diagnosis keperawatan dan disusun intervensi keperawatan yang akan dilakukan. Tahapan ini dilaksanakan berdasarkan tujuan yang sesuai dengan masalah kesehatan yang didapatkan sehingga dapat membantu proses perawatan pada klien. Oleh karena itu, pelaksanaan implementasi harus spesifik hal ini untuk menangani berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan (Nursalam, 2019).

5. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian paling terakhir dari proses keperawatan. Pelaksanaan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana, berkelanjutan, terarah, dan profesional untuk mengoptimalkan tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah disusun sehingga pasien memperoleh hasil yang maksimal dalam pelayanan kesehatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan, dan memutuskan apakah melanjutkan, mengubah atau menghentikan rencana asuhan.

Pendokumentasian pada tahap evaluasi merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan kondisi pasien setelah pelaksanaan. Evaluasi sedang berlangsung, melibatkan pasien dan profesional kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap kelima dalam rangkaian proses keperawatan untuk mengetahui apakah tujuan intervensi keperawatan yang dilakukan terpenuhi atau diperlukan pendekatan yang berbeda (Nursalam, 2016).

6. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Berdasarkan kasus yang dikelola, khususnya pasien yang mengalami *chronic kidney disease* dengan resiko luka tekan. Oleh karena itu pasien membutuhkan layanan perawatan yang komprehensif dan menyeluruh.

Dalam hal ini permasalahan sesuai dengan teori bertujuan untuk meningkatkan kulit yang mengalami resiko luka tekan dan melindungi pasien. Oleh sebab itu, masalah pada kasus ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Teori Watson (2020) menjelaskan dalam *Theory of Human Care*, adalah bahwasannya hubungan dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk memperkuat dan melindungi pasien sebagai manusia. (human being). Hubungan yang terbentuk harus dipertanggungjawabkan secara profesional.

Keperawatan yang manusiawi menjadi suatu seni, ilmu klinis yang manusiawi yang kemudian menjadi isu penting dalam profesi keperawatan dan dalam proses penyembuhan. Diyakini bahwa perilaku caring dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien serta adanya proses fasilitas dalam promosi kesehatan.

Proses keperawatan terdiri dari komitmen untuk melindungi, meningkatkan, dan memulihkan nilai-nilai kemanusiaan melalui proses pemulihan martabat, keharmonisan batin, dan memfasilitasi penyembuhan. Caring dapat diartikan sebagai memperhatikan dan menghargai orang. Di sisi lain, caring juga dapat diartikan sebagai pendukung orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan membantu mereka kembali ke keadaan semula (Nursalam, 2016).

Keterkaitan antara teori caring dan kasus *chronic kidney disiasse* yang diteliti oleh penulis adalah bahwasannya pasien *chronic kidney disiasse* yang dirawat di ruangan ICU, dalam keadaan penurunan kesadaran dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bahwa mereka termasuk pasien yang benar-benar dalam keadaan penurunan kesadaran dan bergantung sepenuhnya pada perawat (total care). Oleh karena itu, pentingnya teori keperawatan terus diterapkan pada pasien yang dirawat di ruang ICU, agar dapat pemberian perawatan profesional, baik fisik maupun emosional, serta meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan pasien serta mendukungnya dalam hidupnya untuk kembali ke kondisi yang lebih baik.

B. Evidence Based Practice in Nursing

1. Pengertian

Zaitun adalah tanaman obat yang telah menarik perhatian banyak peneliti karena banyak khasiat obatnya. Dalam pengobatan tradisional, ramuan ini digunakan sebagai obat antihipertensi, analgesik, antiaterosklerotik, pencahar, potensiasi, dan antipiretik. Minyak ini terdiri dari 98% trigliserida, termasuk dominan monounsaturated oleic acid yang terbukti penting untuk perawatan kulit dan dapat mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan luka (Meliza et al., 2020).

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan perawat untuk melindungi kulit dan mencegah luka tekan adalah pemijatan. Pijat saat ini adalah salah satu metode terapi di dunia yang didedikasikan untuk banyak studi klinis (Pathak & Dutta, 2021). Penggunaan topikal minyak zaitun efektif untuk mengurangi proktitis radiasi akut dan nyeri, perdarahan dan gatal yang disebabkan oleh wasir dan fisura anus. Penggunaan minyak zaitun topikal setiap hari telah dilaporkan sebagai cara

yang efektif dalam mempromosikan kulit bayi prematur dan telah mengurangi risiko dermatitis di antara mereka (Alipour et al., 2020).

Zaitun adalah tanaman obat lain yang karakteristik terapeutiknya yang beragam telah menarik minat banyak peneliti. Ramuan ini digunakan sebagai obat antihipertensi, analgesik, antiaterosklerotik, pencahar, potensiasi, dan antipiretik dalam pengobatan tradisional. Ekstrak daun zaitun juga terbukti memiliki efek antibakteri dan antijamur. Dalam diet Mediterania, minyak zaitun adalah sumber utama lemak, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker dan penyakit jantung. Sunburn, psoriasis, dan infeksi kulit semuanya dapat diobati dengan minyak zaitun.

Memijat kulit dengan minyak herbal dianggap sebagai salah satu tradisi penting di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan seperti pencegahan infeksi, meningkatkan kondisi kulit, termoregulasi dan sepenuhnya untuk kesehatan pasien. (Poursadra et al., 2019).

2. Tujuan

Tujuan pemberian minyak zaitun dalam keperawatan adalah sebagai upaya yang dilakukan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan untuk mencegah terjadinya dekubitus pada pasien tirah baring lama (Nisak et al, 2019).

3. Indikasi

Adapun kondisi yang diperbolehkan untuk melakukan pemberian minyak zaitun yaitu:

- a. Pasien dengan tirah baring lama
- b. Pasien dengan tekanan darah tinggi
- c. Pasien dengan ketidaksadaran

4. Kontraindikasi

Tidak terdapat kondisi yang membuat pemberian minyak zaitun itu tidak dapat dilakukan.

5. Prosedur Pemberian

Prosedur pemberian dengan menuangkan minyak zaitun di telapak tangan pada bagian belakang badan yang mengalami risiko luka tekan sebanyak 15 ml dua kali sehari selama 10-15 menit.

Pemberian minyak zaitun dengan cara mengusap sekali atau dua kali dapat mengurangi tanda dan gejala ulkus dekubitus. Pemberian minyak zaitun dapat mencegah terjadinya dekubitus karena kandungan senyawa antioksidan, asam

lemak, fenolik, dan vitamin E yang terkandung memiliki peran penting bagi kesehatan manusia dan bermanfaat untuk mencegah iritasi kulit (Mondal et al., 2015; Santiko & Faidah, 2020)

6. Kriteria Evaluasi

Pemberian ekstra virgin minyak zaitun dapat mengurangi tanda dan gejala ulkus dekubitus. Pemberian ekstra virgin minyak zaitun dapat mencegah dekubitus sebesar 77% (Supriyanti et al., 2019).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang mencakup pengkajian yang bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dalam suatu kasus, atau dengan kata lain, studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci. Penelitian pada metode ini, dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis (Nursalam, 2016).

B. Subyek studi kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini ialah individu atau klien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kriteria Inklusi

- a. Pasien dengan diagnosis *Chronic Kidney Disiase*
- b. Jenis kelamin laki-laki
- c. Usia 20-60 tahun
- d. Memiliki riwayat tekanan darah tinggi

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi yaitu pasien yang mengalami penurunan kesadaran.

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini ialah melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien *Chronic Kidney Disease* yang mengalami resiko luka tekan sehingga dilakukan intervensi pemberian minyak zaitun.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan pada studi kasus ini ialah format proses asuhan keperawatan.

E. Prosedur Pengambilan Data

1. Persiapan

Persiapan dengan konsultasi kasus

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi

3. Penyusunan laporan

Langkah terakhir yaitu penyusunan laporan dengan melakukan pengkajian dari data objektif dan subjektif serta wawancara. Kemudian, penegakan diagnosis dan menyusun perencanaan intervensi yang telah dilakukan, implementasi serta evaluasi, dan terakhir dilakukan pendokumentasian dalam bentuk laporan karya tulis ilmiah. Laporan ditulis berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah sesuai panduan karya tulis akhir profesi ners UIN Alauddin Makassar 2023

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di ruangan ICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 20-22 februari 2023

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data dalam studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta yang terdapat dalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subjek studi kasus dilakukan dengan menggunakan lima proses keperawatan, dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisis data untuk merumuskan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan kondisi pasien berdasarkan buku standar diagnosa keperawatan indonesia, untuk selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria luaran yang akan ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia hasil keperawatan. Kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP yang khusus merawat pasien dengan intervensi terapi murottal, penyajian data disajikan dalam bentuk naratif yaitu review dari hasil evaluasi dijelaskan.


H. Etika Studi Kasus

Setiap penelitian kesehatan yang mengikuti sertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik (kaidah dasar moral), yaitu:

1. *respect for persons* (others): secara mendasar bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan mandiri (*self determination*) dan melindungi kelompok *dependent* (tergantung) atau rentan (*vulnerable*), dari penyalahgunaan (*harm* dan *abuse*).
2. *Beneficence & Non Maleficence*: prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko yang minimal, sebagai contoh kalau ada risiko harus

yang wajar (*reasonable*), dengan desain penelitian yang ilmiah, peneliti ada kemampuan melaksanakan dengan baik, diikuti prinsip *do no harm* (tidak merugikan, *non maleficence*).

3. Prinsip etika keadilan (*Justice*): prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai dengan haknya menyangkut keadilan distributif dan pembagian yang seimbang (*equitable*). Jangan sampai terjadi kelompokkelompok yang rentan mendapatkan problem yang tidak adil. Sponsor dan peneliti umumnya tidak bertanggung jawab atas perlakuan yang kurang adil ini. Tidak dibiarkan mengambil keuntungan/kesempatan dari ketidak mampuan, terutama pada negara-negara, atau daerah-daerah dengan penghasilan rendah. Keadilan mensyaratkan bahwa penelitian harus peka terhadap keadaan kesehatan dan kebutuhan subjek yang rentan.



BAB IV

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian Keperawatan

PRIMARY SURVEY			
Nama Pasien : Tn W	Umur : 24 tahun	Jenis kelamin: : L	No. RM : 947442
Nama Keluarga : Ny.J			
Agama : Islam			
Pekerjaan : Wiraswasta			
Alamat Rumah : Barru			
Telp/Hp : 082293012204			
Diagnosa Medis : <i>Chronic Kidney Disease (CKD)</i>			
Tanggal Masuk ICU : 07 Februari 2023			
Datang Tanggal : 07/02/2023	Pukul: 00.40	Asal Ruangan: Lontara 2	
Alat Terpasang : <input checked="" type="checkbox"/> Infus	<input checked="" type="checkbox"/> Kateter	<input checked="" type="checkbox"/> NGT	<input type="checkbox"/> Lainnya, Trakeostomi
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilator	<input checked="" type="checkbox"/> Monitor	<input type="checkbox"/> Transfusi	<input checked="" type="checkbox"/> CVC
KATEGORI MASUK ICU : Kategori 1			
Keluhan Utama : Gagal napas			
Riwayat Penyakit/ Mekanisme Cedera :			
<p>Ibu klien mengatakan, klien sesak selama kurang lebih 2 minggu, sesak dan batuk berdahak yang semakin memberat sehingga memutuskan untuk membawa klien ke RSWS pada tanggal 2 februari 2023 pada jam 21.15 WITA. Klien datang ke IGD kemudian di observasi oleh dokter, dipasangkan oksigen dan cairan infus. Pada pukul 23.22 WITA klien dipindahkan ke Lontara 2, kemudian pada tanggal 6 februari klien dilakukan tindakan pemasangan WSD (Water Sealed Drainage) karena Efusi Pleura Dextra. Setelah menjalani operasi klien dipindahkan ke ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Di tanggal 7 februari 2023 klien mengalami gagal napas on ventilator mekanis sehingga dilakukan tindakan pemasangan CFC (Central Fenuse Kateter) dan di tanggal 15 februari dilakukan tindakan intubasi endotrakeal. Di tanggal 16 februari 2023 klien dilakukan tindakan Trakeostomi.</p>			

Riwayat Kesehatan Keluarga :

Keluarga klien mengatakan bahwa bapak klien memiliki riwayat hipertensi

Orientasi (tempat, waktu, dan orang) :

Tidak dapat dikaji

COMPREHENSIVE ASSESMENT & ON GOING ASSESMENT

Riwayat Kesehatan Lalu :

AMPLE

- A (Allergies) = Klien tidak memiliki riwayat alergi
M (Medications) = Ibu klien mengatakan, klien mengkonsumsi obat hipertensi
P (Past Illness) = Klien memiliki riwayat penyakit hipertensi
L (Last Meal) = Bubur saring dan susu melalui sonde
E (Event Leading) = Efusi Pleura Dextra

AIUEO

- A (Alkohol) : tidak ada
I (Insulin) : tidak ada
U (Uremia) : tidak ada
E (Epilepsi) : tidak ada
O (Over dosis) : tidak ada

Pengkajian B1-B6

B1 (Breathing)


- Bentuk dada: Normochest
- Terdapat sputum di kanul trakeostomi
- RR : 29x/menit
- Pola nafas teratur
- Terpasang OPA (-):tidak

- NPA (+/-): tidak
- *Tracheostomy tube* (+/-): iya
- Penggunaan Otot Bantu Nafas (+/-): tidak
- Pernafasan cuping hidung (+/-): tidak
- Penggunaan Alat Bantu Pernafasan: Ventilator Mode SIMV VC
Fr 10, VT 380, PEEP 8, FIO2 60%
- Suara nafas tambahan : Ada (Ronchi)

Masalah : bersihan jalan napas tidak efektif

B2 (Circulation)

- Tekanan Darah : 158/104mmHg
- CRT : < 3 detik
- Sianosis (+/-): tidak
- Konjuktiva: Tampak anemis
- Kulit tampak pucat
- Hasil Lab
 - Kreatinin : 2.98 (NN 0.7-1.3 mg/dl)
 - Ureum : 58 (NN 14-39 mg/dl)
 - Natrium : 132 (NN 136-145 mmol/l)
 - Kalium : 3.1 (NN 3.5-5.1 mmol/l)
 - HTC : 24 (NN 37.0 -48.0)



Masalah : risiko perfusi renal tidak efektif

B3 (Neurologi)

- Tingkat Kesadaran : Sopor
- GCS: Stupor E1 M4 V1
- Refleks Kornea (+/-): ada/ada
- Refleks Cahaya (+/-): +/+
- Reflek Pupil (+/-): -/-
- Ukuran Pupil (isokor) ukuran (2.5 / 2.5)
- Refleks Motorik (bisep +/+ trisep +/+ patella +/+): sulit dikaji
- Refleks Nervus Kranialis (Jabarkan 12 Nervus Kranialis dengan singkat): sulit dikaji

Masalah : Tidak Ada

B4 (Bladder)

- Edema Vagina/Scrotum (+/-): tidak ada
- Produksi Urine : 15cc/ 24jam (oliguria)
- Warna Urine: kuning pekat
- Bau Urine: amonia
- Sedimen Urine (+/-): - darah (+/-): -
- Distensi Uretra (+/-): -
- Terpasang kateter Urine (+/-): iya Jenis: silicon
- Balance Cairan/24 Jam (Silahkan dilampirkan perhitungan BC) :
Jumlah Input: 216cc/24 jam
Jumlah Output: 1.998cc/24 jam
IWL = 15X60: 900
Perhitungan BC: $216 - (1.998 + 900)$
: + 882

Masalah : Risiko perfusi renal tidak efektif

B5 (Bowel)

- Terpasang NGT (+/-): + :Terpasang
- Kebutuhan Cairan: 250 cc/24 Jam
- Kebutuhan Nutrisi Parenteral/24 Jam : Susu 3x300 ml, bubur saring 2x100 ml
- Retriksi Cairan (+/-): tidak
- Residu lambung banyak 150 cc/24jam
- Bentuk Abdomen (simetris/asimetris): simetris
- Distensi Abdomen (+/-): tidak
- Asites (+/-):-
- Mual (+/-):-
- Muntah (+/-):-
- Peristaltik Usus; 8 x/menit

Masalah : Tidak ada



B6 (Bone)

- Warna Kulit: pucat
- Decubitus (+/-): + : Grade 1
- Edema
- Pergerakan Ekstremitas (aktif/pasif): Pasif
- Kekuatan Otot : Sulit dikaji
- Lesi (+/-): tidak ada
- Fraktur (+/-): Tidak
- Dekubitus (+/-): Ada, pada daerah punggung
- Luka terbuka (+/-): tidak ada
- Luka Post Operasi (+/-): Pasien post op pemasangan tracheostomy tube dan alat DLC

Ukuran : 2 x 2 cm

Area : leher



Keterangan Gambar : Pasien post op pemasangan tracheostomy tube dan alat DLC

Pengkajian Rasa Aman dan Nyaman

- Apakah ada rasa nyeri? Di bagian mana? jelaskan secara rinci: PQRST;
Skala nyeri BPS 3

Pengkajian Nyeri Behavioral Pain Scale (BPS) pada pasien dengan ventilator

Kategori	Penilaian	Skor
Ekspresi wajah	Tenang/rileks	3
	Sebagian diperketat (misalnya penurunan alis)	2
	Sepertinya diperketat seperti penutupan kelopak mata	3
	Meringis	4
Anggota badan sebelah atas	Tidak ada pergerakan	1
	Sebagian ditekek	2
	Sepertinya ditekek dengan fleksi jari-jari	3
	Retraksi pernapasan	4
Kepatuhan dengan ventilasi	Pergerakan yang dapat ditoleransi	1
	Batuk dengan pergerakan	1
	Melawan ventilator	2
	Tidak dapat mengontrol ventilasi	4

- Apakah ada riwayat pembedahan?
 - Ya. Pasien post op pemasangan tracheostomy tube dan alat DLC

Pengkajian Aktivitas, Istirahat dan Tidur

- **AKTIFITAS**

- Apakah klien selalu berolah raga? Jenis OR?
Keluarga klien mengatakan klien sering berolahraga jogging sekali seminggu
- Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktivitas?
Keluarga klien mengatakan waktu sehat klien tidak menggunakan alat bantu dalam beraktivitas

- Berapa lama melakukan kegiatan sehari? Jam berapa mulai kerja?

Keluarga klien mengatakan klien menghabiskan waktu lebih banyak di rumah tetapi juga terkadang keluar bersama temannya

- Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan? Jelaskan secara Rinci.

Selama sakit klien tidak mampu melakukan berbagai aktivitas secara mandiri, pasien hanya berbaring di tempat tidur, pasien tampak tidak mampu merawat dirinya, pasien tampak lemah.

- **ISTIRAHAT**

- Kapan dan berapa lama klien beristirahat?

Ibu klien mengatakan selama berada di ICU klien hanya mampu beristirahat terus

- Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang?

Keluarga klien mengatakan waktu sehat klien sering nonton tv dan bercakap-cakap dengan keluarga serta berkumpul bersama teman-temannya

- Apakah klien menyediakan waktu khusus untuk istirahat?

Keluarga klien mengatakan tidak ada waktu khusus untuk istirahat

- Apakah pengisian waktu luang sesuai hoby?

Keluarga klien mengatakan tidak tahu hoby klien

- Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini?

Saat ini klien hanya bisa berbaring di tempat tidur

- **TIDUR**

- Bagaimana pola tidur klien? (jam, berapa lam, nyenyak/tidak?)

Keluarga klien mengatakan selama di ICU klien hanya banyak tidur dan tidurnya nyenyak

- Apakah kondisi saat ini mengganggu klien?

Sulit dikaji

- Apakah klien terbiasa menggunakan obat penenang sebelum tidur?

Keluarga klien mengatakan klien tidak mengkonsumsi obat tidur

- Kegiatan apa yang dilakukan menjelang tidur?

Keluarga klien mengatakan klien hanya berbaring terus

- Bagaimana kebiasaan tidur?

Keluarga klien mengatakan waktu sehat klien sering begadang akibat nongkrong sama teman-temannya

- Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya?
Keluarga klien mengatakan waktu sehat tidak menentu berapa jam kualitas tidur nyenyak
- Apakah klien sering terjaga saat tidur?
Sulit dikaji
- Pernahkan mengalami gangguan tidur? Jenis nya?
Sulit dikaji
- Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut?
Sulit dikaji

Pengkajian Riwayat Sosial:

- Apakah klien mempunyai teman dekat?
Klien memiliki beberapa teman dekat
- Siapa yang dipercaya klien?
Keluarga
- Apakah klien ikut dalam kegiatan masyarakat?
Keluarga klien mengatakan klien biasa ikut kegiatan masyarakat
- Apakah pekerjaan klien sekarang? Apakah sesuai kemampuan?
Keluarga klien mengatakan bahwa sebelum sakit klien bekerja sebagai karyawan swasta tetapi tidak lama karena klien mudah lelah, selama sakit klien tidak bisa bekerja

Pengkajian Riwayat Psikologi:

- Status Emosi.
 - Apakah klien dapat mengekspresikan perasaannya? Sulit dikaji
 - Bagaimana suasana hati klien? Sulit dikaji
 - Bagaimana perasaan klien saat ini? Sulit dikaji
 - Apa yang dilakukan bila suasana hati sedih, marah, gembira? Sulit dikaji
- Konsep diri:
 - Bagaimana klien memandang dirinya? Sulit dikaji
 - Hal-hal apa yang disukai klien? Sulit dikaji
 - Bagaimana klien memandang diri sendiri? Sulit dikaji
 - Apakah klien mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya? Sulit dikaji
 - Hal-hal apa yang dapat dilakukan klien saat ini? Sulit dikaji

Pengkajian Riwayat Spiritual :

- Apakah klien menganut satu agama?

Keluarga klien mengatakan klien menganut agama islam

- Saat ini apakah klien mengalami gangguan dalam menjalankan ibadah?

Klien sedang sakit dan terpasang banyak alat ditubuhnya serta kesadaran klien menurun sehingga sulit melakukan sholat

- Bagaimana hubungan antara manusia dan Tuhan dalam agama:

Sulit dikaji



Pemeriksaan Tanda Vital

- **TANDA VITAL**

TD : 158/104 mmHg
HR : 110 x/menit
RR : 29x/menit
SUHU : 36.6⁰c
SPO2 : 98 %
PAIN : Skala 3

NYERI (+/-) : Skala 3 BPS

Pemeriksaan Fisik

- **Kepala dan Leher**

✓ Inspeksi : bentuk normal, rambut warna , rambut tidak mudah rontok, terdapat canula trakeostomi

Telinga : bentuk simetris, tidak ada cairan darah dari telinga

Mata : mata simetris, sclera warna merah, conjungtiva tampak anemis, pupil isokor, refleks cahaya ; -/-, refleks pupil -/- , kedua mata tertutup, tidak terdapat lesi pada mata

Hidung : bentuk simetris, tidak ada massa, tidak ada sekret, tidak ada lesi, tidak ada darah

Mulut : mukosa bibir agak kering, terdapat sekret pada mulu, tidak ada tonsilitis, gigik putih

Leher : tidak ada pembengkakan kelenjer dan peningkatan JVP, terpasang tracheostomy

✓ Palpasi : tidak ada nyeri tekan

- **Thoraks**

✓ Inspeksi : bentuk dada normal, pergerakan dada ada, simetris kiri dan kanan, tidak ada massa dan jejas, terdapat double lumen cateter

✓ palpasi : tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi

✓ Perkusi : suara sonor

✓ Auskultasi : ada suara nafas tambahan (ronchi)

- **Pelvis**

✓ Inspeksi : terdapat CVC femoral dextra

✓ Palpasi : tidak ada nyeri tekan

- **Ekstremitas atas/bawah**

✓ Inspeksi :

Atas : klien tampak mampu menggerakkan tangannya karena tersedasi, tampak di restraint agar mencegah terjadinya cidera

Bawah : klien terdapat kontraksi otot pada kakinya namun tidak ada gerakan

✓ Palpasi : **Atas** dan **Bawah** : sulit dikaji

- **Punggung**

✓ Inspeksi : Tampak ada edema

✓ Palpasi : sulit dikaji

- **Genitalia**

✓ Inspeksi : Pasien terpasang kateter urine, tidak ada edema, tidak ada lesi



Pemeriksaan Diagnostik

RONTGEN CT-SCAN USG EKG ENDOSKOPI Lain-lain:

Hasil :

CT Scan:

Foto Thoraks AP :

(20/02/2023)

Kesan

- Terpasang tracheostomy tube dengan tip +/- 3.50 cm diatas carina
- Terpasang NGT dengan tip tidak tervisualisasi
- Terpasang DLC pada hemithorax kanan melalui subclavia kanan dengan ti setinggi CV Th VII kesan pada atrium kanan
- Efusi pleura bilateral terutama kiri
- Pneumonia dextra
- Cardiomegaly disertai edema pulmonum

MSCT Scan Abdomen :

(06/02/2023)

- Tidak tampak gambaran ileus
- Ascites
- Efusi pleura bilateral
- Edema pulmonu



Pemeriksaan Laboratorium

- Hasil kimia klinik

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
PH	7.307	7.35-7.45	
PCO2	60.9	80.0-100.0	mmHg
HCO3	30.7	22-26	mmol/l
BE	4.2	-2 s/d +2	mmol/l

Ket : Asidosis resoiratorik terkompensasi sebagian

- Hasil Pemeriksaan Hematologi

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
HEMATOLOGI Hematologi Rutin			
WBC	11.3	4.00-10.00	10 ³ /uL
RBC	3.14	4.00-16.00	10 ⁶ /uL
HGB	8.4	12.0-16.0	gr/dl

HCT	26	37.0-48.0	%
MCV	94	80.0-97.0	fL
MCH	27	26.5-33.5	pg
MCHC	32	31.5-35.0	gr/dl
PLT	124	150-400	10 ³ /uL
RDW-SD	45.2	37.0-54.0	fL
RDW-CV	15.0	10.0-15.0	
PDW	12.2	10.0-18.0	fL
MPV	10.7	6.50-11.0	fL
P-LCR		13.0-43.0	%
PCT	0.10	0.15-0.50	%
NEUT	85.2	52.0-75.0	%
LYMPH	3.5	20.0-40.0	%
MONO	10.6	2.00-8.00	%
EO	0.3	1.00-3.00	10 ³ /uL
BASO	0.04	0.00-0.10	10 ³ /uL
RET		0.00-0.10	10 ³ /uL
LED I	66	(L < 10, P < 20)	10 ³ /uL
LED II Jam II			mm
Koangulasi			
PT	10.3	10-14	detik
INR		-	
APTT	34.2	22.0-30.0	detik
KIMIA DARAH			
Glukosa			
GDS	71	140	mg/dl
Fungsi Ginjal			
Ureum	58	10-50	mg/dl
Kreatinin	2.98	L 9< 1.3);P (<1.1)	mg/dl
Fungsi Hati			
SGOT	14	<38	U/L
SGPT	5	<41	U/L



No		Skor	Skoring
1	(PERBANDINGAN BB/TB) a. Rata-rata b. >rata-rata c. Obesitas d. <rata-rata	0 1 2 3	0
2	(KONTINENSIA) a. Terpasang keteter b. Kadang-kadang c. Inkontinensia fekal d. Inkontinensia ganda	0 1 2 3	0
3	(JENIS KULIT) a. Sehat b. Tipis c. Kering d. Edema e. Lembab f. Pucat g. Pecah-pecah	0 1 1 1 1 2 3	1
4	(MOBILITAS) a. Penuh b. Gelisah c. Apatis d. Terbatas e. Kaku f. Dengan kursi roda	0 1 2 3 4 5	3
5	(JENIS KELAMIN) a. Laki-laki b. Perempuan	1 2	1
6	(UMUR) a. 14-49 b. 50-64 c. 65-74 d. 75-80 e. <80	1 2 3 4 5	1
7	(NAFSU MAKAN) a. Rata-rata b. Buruk c. NGT d. Anoreksia	0 1 2 3	2
8	(OBAT) Steroid sitotoksik anti inflamasi	4	-

9	(MALNUTRISI JARINGAN) a. terminal b. gagal jantung c. penyakit pd. perifer d. anemia e. merokok	8 5 5 2 1	-
10	MOTORIK/SENSORIK	4-6	5
11	SPINAL	5	-
12	DI ATAS MEJA OPERASI	5	-
	TOTAL	-	13

PENILAIAN SKORING DEKUBITUS

Keterangan:

skor 10-15 beresiko

skor 15-20 beresiko tinggi

skor >20 beresiko sangat tinggi



BARTHEL INDEKS

No	Fungsi	Skor	Keterangan	Nilai skor	
				Sebelum sakit	Saat di RS
1	Mengendalikan rangsangan defekasi	0	Tak terkontrol/tak teratur (perlu bantuan)		0
		1	Kadang-kadang tidak terkontrol		
		2	Mandiri	2	
2	Mengendalikan rangsangan berkemih	0	Tak terkontrol/ pakai kateter		0
		1	Kadang-kadang tidak terkontrol (1x24 jam)		
		2	Mandiri	2	
3	Membersihkan diri (sekamuka, sisir rambut, sikat gigi)	0	Butuh pertolongan orang lain		0
		1	Mandiri	1	
4	Penggunaan jamban, masuk dan keluar	0	Tergantung pertolongan orang lain		0
		1	Perlu pertolongan pada beberapa kegiatan tetapi dapat mengerjakan sendiri kegiatan lain		
		2	Mandiri	2	
5	Makan	0	Tidak mampu		0
		1	Perlu ditolong memotong makanan		
		2	Mandiri	2	
6	Berubah sikap dari berbaring ke duduk	0	Tidak mampu		0
		1	Perlu bantuan orang untuk bisa duduk (2 orang)		
		2	Bantuan minimal 2 orang		
		3	Mandiri	3	
7	Berpindah / berjalan	0	Tidak mampu		0
		1	Bisa (berpindah) dengan kursi		
		2	Berjalan dengan bantuan 1 orang		
		3	Mandiri	3	
8	Memakai baju	0	Tergantung pada orang lain		0
		1	Sebagian dibantu (mis mengancing baju)		
		2	Mandiri	2	
9	Naik turu tangga	0	Tidak mampu		0
		1	Butuh pertolongan		
		2	Mandiri	2	
10	Mandi	0	Tergantung		0
		1	Mandiri	1	
Total skor				20	0

Keterangan:

- 20: Mandiri
- 12-19: Ketergantungan ringan
- 5-8: Ketergantungan berat
- **0-4: Ketergantungan total**



ANALISA DATA

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	DS: Tidak dapat dikaji DO: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Tampak terpasang tracheostomy tube - Tampak terpasang alat bantu pernapasan, ventilator mode SIMV VC : Fr 10, VT 380, PEEP 8, FIO2 60% - Terdapat sputum di canul trakeostomi - Pasien tampak tidak mampu batuk efektif - HR: 110/menit - RR: 29 x/menit - Hasil AGD pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 	Penurunan kesadaran ↓ Refleks menelan terganggu ↓ Hipersekresi mucus ↓ Secret tertahan di saluran nafas ↓ Penumpukan secret/mucus ↓ Bersihan jalan napas tidak efektif	Bersihan jalan napas tidak efektif
2	DS : tidak dapat dikaji DO : <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas dyspnea - Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Hasil AGD : pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 - RR : 29x/menit - SpO2 : 98% 	Terganggunya difusi (pertukaran O ₂ dan CO ₂) ↓ Kerusakan alveolus dan kapiler ↓ Menurunnya suplai O ₂ ↓ Gangguan pertukaran gas	Gangguan pertukaran gas
3	DS : tidak dapat dikaji DO :	Hipertensi ↓	Resiko Luka Tekan

	<ul style="list-style-type: none"> - Klien tampak ada kemerahan pada bagian bokong - Punggung terasa hangat - Klien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Bartel index :0 (Kebutuhan total) - Skoring dekubitus :13 (Berisiko) 	<p style="text-align: center;">Kelemahan otot progresif</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Mobilitas terganggu</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pasien bedrest</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penekanan yang lama pada bagian punggung/bokong</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Suplai nutrisi dan o₂ ke daerah tertekan berkurang</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Resiko luka tekan</p>	
4	<p>DS : tidak dapat dikaji</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oliguria - Hasil Hematologi rutin: <ul style="list-style-type: none"> RBC : 3.14 HGB : 8.4 HCT : 24 Ureum : 58 Kreatinin : 2.98 - Hasil kimia klinik <ul style="list-style-type: none"> pH : 7.307 PCO₂ : 60.9 HCO₃ : 30.7 BE : 4.2 - Turgor kulit menurun - edema - Volume urine menurun - Perhitungan BC: 216 - (1.998 + 900) : + 882 	<p style="text-align: center;">Chronic Kidney Disease</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">O₂ ke ginjal menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kulit tampak kering</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kreatinin 2.98</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Volume urine menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Resiko perfusi renal tidak efektif</p>	<p style="text-align: center;">Risiko perfusi renal tidak efektif</p>



RENCANA INTERVENSI

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Rencana Intervensi	Rasional
1.	<p>Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan dibuktikan dengan</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dikaji <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan: ronchi - Tampak terpasang tracheostomy tube - Tampak terpasang alat bantu pernapasan, ventilator mode SIMV VC : Fr 10, VT 380, PEEP 8, FIO2 60% - Terdapat sputum - Pasien tampak tidak mampu batuk efektif - HR: 110/menit - RR: 29 x/menit - Hasil AGD pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 	<p>Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan bersihan jalan napas meningkat dengan</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi sputum menurun kental menjadi encer, dan produksi yang banyak menjadi sedikit b. Dispnea menurun (18-20 x/ ment) c. Frekuensi napas membaik (18-20 x/ ment) d. Ronchi menurun (tidak ada suara tambahan) e. Batuk efektif meningkat (mampu melakukan batuk efektif) 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Monitor pola napas (frekuensi, kedalaman, usaha napas) - Monitor bunyi napas tambahan - Monitor sputum - Monitor posisi selang tracheostomy terutama setelah mengubah posisi - Monitor kulit area trakeostomi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat jika perlu 	<p>Manajemen Jalan Napas</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui bunyi napas - Untuk mengetahui pola napas pasien - Untuk mengetahui adanya bunyi napas tambahan - Untuk mengetahui adanya sputum - Untuk mengetahui posisi tracheostomy - Untuk mengetahui adanya infeksi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan jalan napas klien dan posisi sebelum melakukan suction - Membantu mengeluarkan lendir menggunakan suction - Menambah oksigen yang masuk ke dalam tubuh <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengencerkan lendir

				klien agar tidak susah keluar
2.	<p>Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus-kapiler dibuktikan dengan :</p> <p>DS : tidak dapat dikaji</p> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas dyspnea - Terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Hasil AGD : pH : 7.307 PCO₂ : 60.9 HCO₃ : 30.7 BE : 4.2 - RR : 29x/menit - SpO₂ : 98% 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dispnea menurun (18-20 x/ ment) - Pola napas membaik (teratur tanpa menggunakan alat bantu penapasan) - PCO₂ membaik (80.00 -100.00) 	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya napas - Monitor pola napas (seperti bradipnea, takipnea,hiperventilasi, kussmaul, cheyne-stokes,biot,ataksik) - Monitor kemampuan batuk efektif - Monitor adanya produksi sputum - Monitor adanya sumbatan jalan napas - Auskultasi bunyi napas - Monitor SPO₂ <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi <p>Dokumentasikan hasil pemantauan</p>	<p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk mengetahui frekuensi, irama dan upaya napas pasien - mengetahui pola napas pasien - untuk mengetahui kemampuan batuk efektif - untuk mengetahui adanya produksi sputum - untuk mengetahui adanya sumbatan jalan napas - mengetahui bunyi napas - untuk mengetahui dan mengontrol SPO₂ pada pasien <p>Terapeutik</p> <p>untuk mengetahui respirasi pada pasien</p>
3.	<p>Resiko luka tekan berhubungan dengan penurunan mobilitas ditandai dengan faktor risiko</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien tampak ada kemerahan pada bagian 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, maka integritas kulit dan jaringan meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <p>d. Elastisitas meningkat</p>	<p>Pencegahan Luka Tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa luka tekan menggunakan skala Imis. Norton, skala Barden - Periksa adanya luka tekan 	<p>Pencegahan Luka Tekan</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norton scale merupakan alat penilaian resiko ulkus luka tekan pertama yang dapat dijadikan sebagai

<p>bokong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punggung teraba hangat - Klien terpasang ventilator dan hanya terbaring di tempat tidur - Bartel index :0 (Kebutuhan total) - Skoring dekubitus :13 (Berisiko) 	<p>e. Perfusi jaringan meningkat</p> <p>f. Suhu kulit membaik</p>	<p>sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi - Monitor mobilitas dan aktivitas individu <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam - Buat jadwal perubahan posisi - Jaga seprai tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan - Hindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi - Berikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan C, zat besi dan kalori <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tanda-tanda kerusakan kulit - Anjurkan melapor jika menemukan tanda-tanda 	<p>alat untuk memantau kejadian luka tekan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melihat tanda dan gejala decubitus - Suhu kulit yang panas menyebabkan terjadinya luka decubitus - Mengidentifikasi terjadinya luka tekan - Melihat kondisi mobilitas klien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotion dapat melembabkan kulit - Mengubah posisi dapat memperlancar peredaran darah sehingga tidak terjadi luka tekan akibat kekurangan o₂ dan nutrisi - Untuk memantau kondisi klien - Agar tidak menimbulkan terjadinya luka tekan akibat seprei yang lembab - Air hangat dapat membuat kulit menjadi lebih mudah iritasi
---	---	---	---

			<p>kerusakan kulit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan cara merawat kulit 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan asupan makanan yang cukup dapat meningkatkan sistem imun dan nutrisi pada jaringan kulit
4	<p>Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal, asidosis metabolik</p> <p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpasang kateter urine - SpO2 : 98% - Hasil Hematologi rutin: RBC : 3.14 HGB : 8.4 HCT : 24 Ureum : 58 Kreatinin : 2.98 - Hasil kimia klinik pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 - Turgor kulit menurun - Volume urine menurun - Perhitungan BC: 216 - (1.998 + 900) = - 882 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan Perfusi renal meningkat dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah urine meningkat Kadar urea nitrogen darah membaik Kadar kreatinin plasma membaik Keseimbangan asam basa membaik 	<p>Pencegahan Syok</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status kardiorpulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) - Monitor saturasi oksigen (Oksimetri, AGD) - Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) - Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu 	<p>Pencegahan Syok</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk dapat memantau perubahan status kardiorpulmonal pasien - Untuk mengetahui saturasi oksigen dan AGD dalam tubuh pasien - Untuk menghitung balance cairan - Untuk memantau tingkat kesadaran pasien <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mempertahankan saturasi oksigen <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memenuhi kekurangan darah pada pasien, jika diperlukan



IMPLEMENTAS DAN EVALUASI KEPERAWATAN

HARI/TANGGAL/JAM	IMPLEMENTASI	EVALUASI	PARAF & NAMA
Selasa, 21 Februari 2023	<p>Diagnosis 1: Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : didapatkan pola napas dispnea - Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak - Memonitor posisi selang tracheostomy terutama setelah mengubah posisi Hasil : posisi tracheostomy masih dalam posisi yang aman - Memonitor kulit area trakeostomi - Hasil : kulit tampak tidak iritasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan semi fowler atau supinasi Hasil : klien dalam posisi supinasi untuk dilakukan suction - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : lendir berhasil di keluarkan dan SPO2 meningkat menjadi 99% - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil : klien terpasang tracheostomy <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi pemberian obat jika perlu Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 	<p>Diagnosis 1 S: Tidak dapat dikaji O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat suara napas tambahan ronchi - Frekuensi pernapasan 22 x/menit - Terdapat sekret - Pasien tidak mampu batuk efektif <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu - Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 	Reza
	<p>Diagnosis 2: Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : dipsnea - Memonitor kemampuan batuk efektif 	<p>Diagnosis 2 S : Tidak dapat dikaji O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas: dispnea 	Reza

	<p>Hasil : klien tidak mampu melakukan batuk efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor adanya produksi sputum Hasil : terdapat sputum dengan produksi banyak - Memonitor adanya sumbatan jalan napas Hasil : klien terpasang tracheostomy - memonitor bunyi napas hasil : bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor SPO2 Hasil SPO2 : 98% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi Hasil : dilakukan setiap jam - Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil : <table border="0"> <tr><td>22.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 98%</td></tr> <tr><td>23.00 : 33x/m</td><td>SPO2 : 96%</td></tr> <tr><td>00.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 99%</td></tr> <tr><td>01.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 97%</td></tr> <tr><td>02.00 : 29x/m</td><td>SPO2 : 97%</td></tr> <tr><td>03.00 : 33x/m</td><td>SPO2 : 98%</td></tr> <tr><td>04.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 98%</td></tr> <tr><td>05.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 98%</td></tr> <tr><td>06.00 : 30x/m</td><td>SPO2 : 98%</td></tr> </table>	22.00 : 30x/m	SPO2 : 98%	23.00 : 33x/m	SPO2 : 96%	00.00 : 30x/m	SPO2 : 99%	01.00 : 30x/m	SPO2 : 97%	02.00 : 29x/m	SPO2 : 97%	03.00 : 33x/m	SPO2 : 98%	04.00 : 30x/m	SPO2 : 98%	05.00 : 30x/m	SPO2 : 98%	06.00 : 30x/m	SPO2 : 98%	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi napas: 33 x/mnt - Bunyi napas: vesikuler, bunyi napas tambahan ronchi - Hasil AGD pH: 7.464 PO2: 128.2 PCO2: 32.1 HCO3: 27.2 BE: 3.3` <p>Interpretasi: alkalosis respiratorik dan metabolic A: Gangguan pertukaran gas P : Intervensi dilanjutkan</p>	
22.00 : 30x/m	SPO2 : 98%																				
23.00 : 33x/m	SPO2 : 96%																				
00.00 : 30x/m	SPO2 : 99%																				
01.00 : 30x/m	SPO2 : 97%																				
02.00 : 29x/m	SPO2 : 97%																				
03.00 : 33x/m	SPO2 : 98%																				
04.00 : 30x/m	SPO2 : 98%																				
05.00 : 30x/m	SPO2 : 98%																				
06.00 : 30x/m	SPO2 : 98%																				
	<p>Diagnosis 3 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa luka tekan menggunakan skala Imis, Norton, Skala Barden) Hasil: Hasil skor 13 (10-15) berisiko terjadinya ulkus dekubitus - Memeriksa adanya luka tekan sebelumnya Hasil: Klien tidak memiliki luka tekan sebelumnya - Memonitor suhu kulit yang tertekan Hasil: Suhu kulit tertekan teraba hangat - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi Hasil: Pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu 	<p>Diagnosis 3</p> <p>S : Tidak dapat dikaji O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan kulit kering - Klien hanya bias terbaring ditempat tidur - Suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A : Masalah risiko luka tekan belum teratasi P : Lanjutkan Intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi 	<p>Reza</p>																		

	<p>Hasil: Klien hanya terbaring di tempat tidur</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantal penyerap air Hasil: Setiap habis di mandikan, klien diberikan handbody dan minyak zaitun pada seluruh tubuhnya - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam Hasil: Klien di ubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore - Membuat jadwal perubahan posisi Hasil: Perubahan posisi setiap pagi dan sore hari - Menjaga seprei tetap kering, bersih dan tidak ada kerutan atau lipatan Hasil: Klien ganti seprei setiap hari apabila selesai di mandikan dan seprei dalam keadaan basah - Menghindari menggunakan air hangat dan sabun keras saat mandi Hasil: Klien dimandikan menggunakan air dingin - Memberikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan C, zat besi dan kalori Hasil: Klien setiap harinya diberikan makanan bubur saring dan susu setiap 3 kali sehari serta diberikan obat vit B complex 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrier seperti lotion atau bantal penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	
	<p>Diagnosis 4 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) Hasil: Nadi 110 x /menit teraba kuat, Pernapasan 29 x/menit, TD: 158/104 mmHg - Memonitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) Input: 216 cc/24 jam, Output: 1.998 cc/24 jam, CRT <2 detik - Memonitor tingkat kesadaran Hasil: Kesadaran tersedasi <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% 	<p>Diagnosis 4</p> <p>S : Tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpasang kateter urine - Hemodialisa 2 jam - Hasil hematologi rutin RBC : 3.14 HGB : 8.4 HCT : 24 - Hasil faal ginjal Ureum : 58 Kreatinin : 2.98 	Reza

	<p>Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat tracheostomy tube</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil AGD pH : 7.307 PCO2 : 60.9 HCO3 : 30.7 BE : 4.2 A : Masalah Risiko perfusi renal tidak efektif P : Intervensi dilanjutkan - Monitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) - Monitor saturasi oksigen (Oksimetri, AGD) - Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) - Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% - Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu 	
<p>Rabu, 22 Februari 2023</p>	<p>Diagnosis 1 : Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : didapatkan pola napas dispnea - Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak - Memonitor posisi selang tracheostomy terutama setelah mengubah posisi Hasil : posisi tracheostomy masih dalam posisi yang aman - Memonitor kulit area trakeostomi Hasil : kulit tampak tidak iritasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan semi fowler atau supinasi 	<p>Diagnosis 1 S: Tidak dapat dikaji O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suara nafas tambahan ronchi - Frekuensi pernapasan 22 x/menit - Terdapat sekret - Pasien tidak mampu batuk <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu - Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 	<p>Reza</p>

	<p>Hasil : klien dalam posisi supinasi untuk dilakukan suction</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : lendir berhasil di keluarkan dan SPO2 meningkat menjadi 99% - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil : klien terpasang tracheostomy <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi pemberian obat jika perlu Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 		
	<p>Diagnosis 2 : Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : dispnea - Memonitor kemampuan batuk efektif Hasil : klien tidak mampu melakukan batuk efektif - Memonitor adanya produksi sputum Hasil : terdapat sputum dengan produksi banyak - Memonitor adanya sumbatan jalan napas Hasil : klien terpasang tracheostomy - memonitor bunyi napas hasil : bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor SPO2 Hasil SPO2 : 99% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi Hasil : dilakukan setiap jam - Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil : 22.00 : 34x/m SPO2 : 97% 23.00 : 30x/m SPO2 : 98% 00.00 : 30x/m SPO2 : 99% 01.00 : 33x/m SPO2 : 97% 02.00 : 34x/m SPO2 : 97% 03.00 : 33x/m SPO2 : 98% 	<p>Diagnosis 2 S : Tidak dapat di kaji O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas: dispnea - Frekuensi napas: 33 x/mnt - Bunyi napas: vesikuler, bunyi napas tambahan ronchi - Hasil AGD pH: 7.464 PO2: 128.2 PCO2: 32.1 HCO3: 27.2 BE: 3.3 <p>Interpretasi: alkalosis respiratorik dan metabolic A : Gangguan pertukaran gas P : Intervensi dilanjutkan</p>	<p>Reza</p>

<p>04.00 : 33x/m SPO2 : 98% 05.00 : 30x/m SPO2 : 98% 06.00 : 30x/m SPO2 : 99%</p>		
<p>Diagnosis 3 : Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa luka tekan menggunakan skala Imis, Norton, Skala Barden) Hasil: Hasil skor masih 13 (10-15) yang dimana berisiko terjadinya ulkus decubitus. - Memonitor suhu kulit yang tertekan Hasil: Suhu kulit tertekan teraba hangat - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atas titik tekan saat mengubah posisi Hasil: Pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu Hasil: Klien hanya terbaring di tempat tidur <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air Hasil: Setiap habis dimandikan klien diberikan handbody dan minyak zaitun pada seluruh tubuhnya - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam Hasil: Klien dibuuh posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore 	<p>Diagnosis 3 S : - O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan kulit kering - Klien hanya dapat terbaring di tempat tidur - Suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A: Masalah risiko luka tekan belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrierseperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	<p>Reza</p>
<p>Diagnosis 4 : Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) Hasil: Nadi 108 x /menit teraba kuat, Pernapasan 25 x/menit, TD: 142/82 mmHg - Memonitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) Input: 320 cc/24 jam, Output: 2039 cc/24 jam, CRT <2 detik - Memonitor tingkat kesadaran Hasil: Kesadaran tersedasi 	<p>Diagnosis 4 S: Tidak dapat dikaji O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan umum lemah - Jumlah Blance cairan Input: 320 Output: 2039 = -819 cc, turgor kulit elastis, CRT >2 detik <p>A: Masalah Perfusi renal tidak efektif P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) - Monitor saturasi oksigen (Oksimetri, AGD) - Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor 	<p>Reza</p>

	<p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 99% Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat tracheostomy 	<p>kulit, CRT)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% - Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu 	
Jum'at, 24 Februari 2023	<p>Diagnosis 1 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : didapatkan pola napas dispnea - Memonitor bunyi napas tambahan Hasil : terdapat bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor sputum Hasil : terdapat sputum dengan jumlah banyak - Memonitor posisi selang tracheostomy terutama setelah mengubah posisi Hasil : posisi tracheostomy masih dalam posisi yang aman - Memonitor kulit area trakeostomi - Hasil : kulit tampak tidak iritasi <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memposisikan semi fowler atau supinasi Hasil : klien dalam posisi supinasi untuk dilakukan suction - Melakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik Hasil : lendir berhasil di keluarkan dan SPO2 meningkat menjadi 99% - Memberikan oksigen, jika perlu Hasil : klien terpasang tracheostomy <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkolaborasi pemberian obat jika perlu Hasil: Setelah 1 jam pemberian nebu, dahak pasien jadi encer 	<p>Diagnosa 1</p> <p>S: Tidak dapat dikaji</p> <p>O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suara napas Ronchi - Frekuensi pernapasan 20 x/menit - Terdapat secret - Pasien tidak mampu batuk <p>A: Masalah Bersihan jalan napas tidak efektif</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor bunyi napas - Posisikan semi fowler atau supinasi - Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik - Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal - Berikan oksigen, jika perlu - Kolaborasi pemberian resfar untuk mengencerkan dahak 	Reza
	<p>Diagnosis 2 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pola napas Hasil : dispnea 	<p>Diagnosis 2</p> <p>S : Tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pola napas: dispnea 	Reza

	<ul style="list-style-type: none"> - Memonitor kemampuan batuk efektif Hasil : klien tidak mampu melakukan batuk efektif - Memonitor adanya produksi sputum Hasil : terdapat sputum dengan produksi banyak - Memonitor adanya sumbatan jalan napas Hasil : klien terpasang tracheostomy - memonitor bunyi napas hasil : bunyi napas tambahan (ronchi) - Memonitor SPO2 Hasil SPO2 : 98% <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi Hasil : dilakukan setiap jam - Mendokumentasikan hasil pemantauan Hasil : 07.00 : 30x/m SPO2 : 97% 08.00 : 30x/m SPO2 : 98% 09.00 : 30x/m SPO2 : 99% 10.00 : 33x/m SPO2 : 98% 11.00 : 34x/m SPO2 : 98% 12.00 : 33x/m SPO2 : 98% 13.00 : 33x/m SPO2 : 98% 14.00 : 30x/m SPO2 : 99% 	<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi napas: 33 x/mnt - Bunyi napas: vesikuler, bunyi napas tambahan ronchi - Hasil AGD pH: 7.464 PO2: 128.2 PCO2: 32.1 HCO3: 27.2 BE: 3.3` Interpretasi: alkalosis respiratorik dan metabolic A: Gangguan pertukaran gas P: Intervensi dilanjutkan 	
	<p>Diagnosis 3 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa luka tekan menggunakan skala Imis, Norton, Skala Barden) Hasil: Hasil skor 13 (10-15) yang dimana penilaian skor tetap masih sama dan masih dalam tahap berisiko terjadinya ulkus dekubitus - Memonitor suhu kulit yang tertekan Hasil: Suhu kulit yang tertekan teraba hangat - Memonitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi Hasil: Pada saat mengubah posisi kondisi kulit yang tertekan tampak baik - Memonitor mobilitas dan aktivitas individu 	<p>Diagnosis 3</p> <p>S : Tidak dapat dikaji O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan kulit lumayan lembab - Klien hanya berbaring di tempat tidur - Suhu kulit pada daerah tertekan teraba hangat <p>A: Masalah risiko luka tekan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor suhu kulit yang tertekan - Monitor kulit di atas tonjolan tulang atau titik tekan saat mengubah posisi 	Reza

	<p>Hasil: Klien hanya terbaring di tempat tidur</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air <p>Hasil: Setiap selesai dimandikan, klien diberikan handbody dan minyak zaitun di seluruh tubuhnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam <p>Hasil: Klien di ubah posisinya MIKA MIKI setiap pagi dan sore hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor mobilitas dan aktivitas individu - Gunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air - Ubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam 	
	<p>Diagnosis 4 :</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) <p>Hasil: Nadi 112 x /menit teraba kuat, Pernapasan 30 x/menit, TD: 152/90 mmHg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) <p>Input: 221, Output: 1813, CRT <2 detik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor tingkat kesadaran <p>Hasil: Kesadaran tersedasi</p> <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen 99% <p>Hasil: Pasien tampak bernapas dengan bantuan alat tracheostomy</p>	<p>Diagnosis 4</p> <p>S : Tidak dapat dikaji</p> <p>O :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hemodialisis 2 jam - Keadaan umum lemah - Perhitungan BC: Intake 221- Aoutput 1813 (IWL 900)=-692 cc <p>A: Masalah Perfusi renal tidak efektif</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitor status kardiopulmonal (Frekuensi dan kekuatan nadi, frekuensi napas, TD) - Monitor saturasi oksigen (Oksimetri, AGD) - Monitor status cairan (masukan dan haluaran, turgor kulit, CRT) - Monitor tingkat kesadaran dan respon pupil - Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen >94% - Kolaborasi pemberian transfusi darah, jika perlu 	<p>Reza</p>

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan pada Tn. W berumur 24 tahun, pasien dibawa ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan masuk diruangan ICU dengan keluhan utama gagal napas, dan mendapatkan kategori 1 untuk masuk ICU. Tn. W sebelumnya mengidap *Chronic Kidney Disease* (CKD), mulai dirawat di RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 7 februari 2023. Ibu pasien mengatakan bahwa, sebelumnya Tn. W telah merasakan sesak napas dan batuk berdahak yang setiap harinya semakin memberat. Sehingga keluarga memutuskan untuk membawa pasien ke RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo pada tanggal 2 Februari 2023. Sebelumnya, Tn. W sudah pernah dirawat di rumah sakit di Barru kemudian dirujuk di RSUP dr. Wahidin sudirohusodo Makassar, dan sekarang berada diruang ICU selama hari. Pengkajian di lakukan diruang ICU pada tanggal

Pada kasus ini, *Chronic Kidney Disease* (CKD) yang dialami pasien disebabkan akibat komplikasi dari penyakit Hipertensi, diabetes melitus serta efusi pleura dextra yang telah pasien alami sejak setahun yang lalu. Saat ini pasien telah dipasang kanul trakeostomi, dengan pernapasan 22x/menit, tanpa penggunaan alat bantu napas dengan pernapasan ventilator mode SIMV VC Fr 10, VT 380, PEEP 8, FIO2 60%, dan didapatkan suara tambahan ronchi.

Sejalan dengan penelitian El SavadoR dalam (Prihatiningtias & Arifianto, 2017) mendapatkan bahwa terjadi peningkatan prevalensi faktor resiko penyakit ginjal: diabetes mellitus 10.3% ; hipertensi 16,9% ; riwayat keluarga dengan penyakit ginjal kronik 21,6% ; obesitas 22.4%; sindroma metabolik 26.3% dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan Riwayat penyakit pasien, yang telah mengidap hipertensi dan diabetes melitus dua tahun yang lalu. Hasil penelitian dari (Prihatiningtias & Arifianto, 2017) bahwa paling banyak yaitu 71,7% responden mengalami hipertensi. Selain diabetes, hipertensi juga menjadi penyebab penyakit ginjal terbanyak. Hipertensi adalah tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolic ≥ 90 mmHg yang ditandai dengan sering pusing saat periksa ke dokter klinik, puskesmas, atau layanan kesehatan lainnya. Banyaknya

responden yang mengalami hipertensi disebabkan pola makan mereka yang suka dan sering makan makanan asin-asin, factor keturunan, kebiasaan makanan yang diawetkan, stress, dan gangguan metabolisme lemak dan karbohidrat.

Penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada pasien penyakit ginjal kronik (PGK) adalah penyakit kardiovaskuler. Faktor utama penyebab kejadian kardiovaskuler pada pasien PGK adalah hipertensi. Penyebab tersering kedua pada gagal ginjal kronis adalah diabetes melitus (23%). Penanganan PGK dapat dilakukan dengan metode Hemodialisa atau cuci darah. Hemodialisis adalah proses pembersihan darah dengan mengumpulkan limbah. Pada penderita gagal ginjal kronik, hemodialisis dapat mencegah kematian (JP3).

Penyakit ginjal kronis secara umum pada stadium awal tidak ditemukan gejala yang khas, tetapi penyakit ginjal kronis stadium awal dapat dideteksi dengan peningkatan serum kreatinin dan proteinuria. Sehingga, ginjal akan terus menerus mengalami penurunan dan akan menyebabkan beberapa masalah, seperti terjadinya peningkatan tekanan darah akibat kelebihan cairan dan produksi dari hormone vasoaktif yang diekresikan oleh ginjal melalui system Renin-Angiotensin-Aldosterone-System (RAAS), yang dapat menyebabkan penderita mengalami hipertensi atau penyakit gagal jantung kongestif. Gejala lain yang timbul yaitu terjadi asidosis metabolic yang disebabkan oleh stimulasi ddari fosfat dan urea. Asidosis juga dapat disebabkan oleh penurunan kemampuan produksi ammonia pada sel-sel ginjal. *overload* volume cairan yang disebabkan oleh retensi natrium dan cairan pada ginjal yang menyebabkan edema ringan hingga berat yang mengancam nyawa, seperti edema paru. Pada pasien Ny. T telah terjadi efusi pleura dextra dan terjadi edema anasarka (611).

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respons manusia terhadap gangguan kesehatan atau proses kehidupan, atau kerentangan respons dari seorang individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Diagnosis keperawatan biasanya berisi dua bagian yaitu deskriptor atau pengubah, fokus diagnosis, atau konsep kunci dari diagnosis (Herdman & Kamitsuru, 2015).

Dalam kasus Tn. W, diangkat beberapa diagnosis diantaranya pertama bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan

dibuktikan dengan adanya suara napas tambahan: ronchi pada kedua lapang paru pasien, terpasang alat bantu napas yaitu tracheostomy tube dan ventilator, pasien juga tampak tak bisa batuk secara mandiri dan efektif, sehingga banyak terdapat sputum. Dari hasil pemeriksaan penunjang pasien juga menunjukkan hasil analisis gas darah dengan interpretasi “ASIDOSIS METABOLIK?” bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan memiliki definisi yaitu Ketidak mampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Gejala dan tanda mayor yang dapat ditemukan yaitu data objektif batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebih/obstruksi dijalan nafas, mengi, wheezing, dan/atau ronkhi kering. Sedangkan gejala dan tanda minor yang dapat ditemukan yaitu data subjektif dispnea, sulit bicara, ortopnea. dan pada data objektif dapat ditemukan yaitu gelisah, sianosis, bunyi nafas menurun, frekuensi nafas berubah, dan pola nafas berubah. Bersihan jalan nafas tidak efektif diakibatkan karena adanya infeksi pada saluran pernafasan bagian bawah sehingga mengakibatkan peroduksi sputum meningkat dan mengakibatkan konsolidasi cairan sputum dijalan nafas. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Smeltzer & Bare, 2013) bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif karena adanya reaksi inflamasi yang dapat terjadi di alveoli, menghasilkan eksudat yang dapat mengganggu jalan nafas. Menurut penulis diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan pada pasien, gejala dan tanda mayor yang didapatkan sudah memenuhi validasi untuk menegaskan diagnosis sesuai dengan buku Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI) yaitu 80% hingga 100% data mayor. Pada diagnosis pertama ini berhubungan dengan efusi pleura yang diidap Tn. W yaitu suatu keadaan dimana terjadinya penumpukan cairan melebihi normal didalam rongga pleura diantaranya pleura parientalis dan pleura visceralis. Akumulasi cairan yang melebihi volume normal dapat menimbulkan gangguan jika cairan yang diproduksi oleh pleura parientalis dan visceralis tidak mampu diserap oleh pembuluh limfe dan pembuluh darah mikropleura visceral atau sebaliknya yaitu produksi cairan melebihi kemampuan penyerapan. Pada pemeriksaan darah lengkap pasien ditemukan adanya leukositosis (WBC 11,3) dengan sel yang dominan yaitu neutrophil, hal ini menunjukkan terjadinya infesi yang disebabkan oleh bakteri.

Diagnosis kedua diangkat adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus kapiler yang dibuktikan dengan terjadi penurunan kesadaran pada Tn. W yang kemudian dibantu dengan alat bantu pernapasan. Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigen dan/atau eliminasi karbondioksida pada membrane alveolus-kapiler (PPNI, 2018). Didalam buku SDKI, telah ditentukan batasan karakteristik dengan tanda mayor pada masalah gangguan pertukaran gas yaitu pasien mengalami dyspnea, PCO₂ meningkat/menurun, PO₂ menurun, takikardia, pH arteri meningkat/ menurun dan adanya bunyi nafas tambahan. Sedangkan untuk gejala dan tanda minornya yaitu klien biasanya merasakan pusing, sianosis, diaphoresis, gelisah, terdapat nafas cuping hidung, pola nafas abnormal dan kesadaran menurun. Reaksi radang pada pneumonia dapat menimbulkan secret, yang jika dibiarkan akan semakin menumpuk di bronkus yang mengakibatkan aliran bronkus menjadi sempit dan pasien akan mudah mengalami sesak napas (Nurarif & Kusuma, 2015).

Diagnosis ketiga yang diangkat yaitu resiko luka tekan dengan faktor resiko yaitu tampak terdapat kemerahan pada bagian bokong, punggung pasien teraba hangat, dengan bartel index: 0 (kebutuhan total), skoring dekubitus 13 (bersiko).

Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal, asidosis metabolik diangkat sebagai diagnosis keempat dengan faktor risiko terpasang kateter urine, Hasil Hematologi rutin: RBC: 3.14, HGB: 8.4, HCT: 24, Ureum : 58, Kreatinin : 2.98, dengan hasil kimia klinik pH : 7.307, PCO₂ : 60.9, HCO₃ : 30.7, BE : 4.2, turgor kulit pasien menurun, volume urine pasien menurun dengan balance urine : BC: 216 - (1.998 + 900) = - 882

3. Analisis intervensi keperawatan

Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan kepada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran (outcome) yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Intervensi keperawatan atau perencanaan merupakan keputusan awal yang memberi arah bagi tujuan yang ingin dicapai, hal yang akan dilakukan, termasuk bagaimana, kapan dan siapa yang akan melakukan tindakan keperawatan. Perencanaan keperawatan merupakan tahapan ketiga dalam membuat askep, gunanya untuk Menyusun intervensi/perencanaan yang akan diberikan kepada pasien selama masa rawat dan

dilakukan setelah semua data terkumpul dan telah dianalisa dan di susun berdasarkan prioritas masalah. Pada tahapan intervensi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien agar dapat menyelesaikan masalah dengan efisien. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan kepada klien meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Menurut asumsi peneliti bahwa penerapan intervensi harus berlandaskan pedoman kita yaitu buku standar intervensi keperawatan dan didukung oleh evidence based yang terupdate dan telah teruji manfaatnya, oleh karena itu peneliti telah menyusun beberapa intervensi yang akan di terapkan pada diagnosis tersebut. Dalam penyusunan intervensi ditentukan berdasarkan kebutuhan pasien dengan observasi, terapeutik, dan kolaborasi.

Berdasarkan diagnosis yang telah dipaparkan dipoin sebelumnya, intervensi yang dapat dilakukan pada Tn. W untuk mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak efektif yaitu manajemen jalan napas dengan mengobservasi bunyi napas, pola napas, monitor bunyi napas tambahan, monitor posisi selang tracheostomy. Pasien juga diberikan tindakan terapeutik dengan posisikan pasien semi fowler, lakukan penghisapan lender 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Dilakukan juga intervensi kolaborasi untuk pemberian obat pada pasien. Menurut (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018) intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif secara umum adalah pemberian fisioterapi dada. Setelah dilakukan intervensi dilakukan pemantauan. Menurut (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018) tujuan pemberian asuhan keperawatan diharapkan masalah bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil produksi sputum menurun, frekuensi napas pasien membaik, ronchi (suara napas tambahan) menurun, dan batuk efektif meningkat.

Pada masalah kedua pada Tn. W yaitu gangguan pertukaran gas akan diberikan intervensi dengan observasi dan terapeutik yang diberikan dengan monitor frekuensi, irama, dan kedalaman napas pasien serta memonitor sumbatan jalan napas pasien, salah satu intervensi lainnya yaitu manajemen ventilasi mekanik. Dengan kriteria hasil berdasarkan SLKI (2018) yaitu diharapkan masalah pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil PCO₂, PO₂, dan pH arteri membaik.

Untuk masalah ketiga yaitu resiko luka dengan, diberikan intervensi dengan observasi, terapeutik dan edukasi berupa periksa rutin luka tekan pasien menggunakan skala barden, ubah posisi pasien 1-2 jam dengan mengoleskan

minyak zaitun, jaga seprai pasien tetap kering dan bersih (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Dalam pemberian intervensi tersebut, diharapkan integritas kulit dan jaringan pasien meningkat dengan kriteria hasil: elastilitas meningkat, perfusi jaringan meningkat, suhu kulit membaik (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018). Luka tekan adalah luka akibat posisi penderita yang tidak berubah-ubah dalam jangka waktu lebih dari 6 jam ditandai dengan eritema pada kulit dibagian tubuh yang mengalami tekanan. Pencegahan ulkus tekan adalah prioritas perawatan pada klien dan tidak dibatasi pada klien dengan restriks imobilisasi (JP1). Pemberian minyak zaitun memberikan pengaruh untuk pencegahan luka tekan pada pasien yang berisiko berdasarkan Skala Braden di RSUD Pirngadi Medan mayoritas 15-18 (Resiko rendah/ ringan) yaitu sebanyak 6 orang (40,0%).

Masalah keempat yaitu risiko perfusi renal tidak efektif dilakukan intervensi berupa pencegahan syok yang di lakukan dengan observasi status kardiopulmonal, moniroe status cairan, dan monitor tingkat kesadaran dan respon pupil, diberikan juga intervensi kolaborasi berupa pemberian transfuse darah jika diperlukan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Dengan kriteria hasil diharapkan perfusi renal meningkat dengan jumlah urine meningkat, kadar urea nitrogen darah membaik, kadar kreatinin plasma membaik, dan keseimbangan asam basa membaik (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018).

4. Analisis implementasi keperawatan

Implementasi / pelaksanaan keperawatan adalah realisasi tindakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Kegiatan dalam pelaksanaan meliputi pengumpulan data berkelanjutan, mengobservasi respon pasien selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru. Implementasi keperawatan merupakan seragakaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat guna membantu pasien mengalami masalah status kesehatan yang dihadapi dengan mengacu pada kriteria hasil yang telah dibuat sebelumnya (implementasi kep). Pelaksaaan tindakan keperawatan pada Tn. W dilakukan selama 4 hari pada tanggal 21 februari 2023-24 februari 2023 diruang ICU RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan kondisi pasien dan mengacu pada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat tersebut, tindakan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang telah ditemukan diantaranya bersihan jalan

napas tidak efektif dengan melakukan fisioterapi dada, yaitu dengan mengidentifikasi indikasi dilakukan fisioterapi dada, memonitor status pernapasan, memonitor bunyi napas tambahan, memonitor sputum, memosisikan pasien dengan posisi semi fowler dan melakukan penghisapan lender kurang dari 15 detik. Dalam melakukan fisioterapi dada, pasien diberikan posisi sesuai dengan area paru yang mengalami penumpukan sputum, dengan menggunakan dua bantal sebagai penahan untuk pengaturan posisi, kemudian melakukan perkusi dengan posisi ditelapak tangan rata bersamaan ekspirasi melalui mulut, melakukan fisioterapi dada setidaknya 2 jam setelah pasien makan.

Tindakan keperawatan untuk masalah pertukaran gas adalah dengan melakukan manajemen ventilasi mekanik, dengan memeriksa indikasi ventilasi mekanik, memonitor efek ventilator terhadap status oksigen, dan mengatur posisi kepala pasien agar mencegah aspirasi dan mereposisi pasien setiap 2 jam sekali, dan rutin melakukan pembersihan mulut dan lendir, serta kolaborasi penggunaan PS/PEEP untuk meminimalkan hipoventilasi dibutuhkan. Tindakan keperawatan untuk masalah selanjutnya adalah resiko luka tekan dengan intervensi utama pencegahan luka tekan dengan memeriksa luka tekan menggunakan skala decubitus sehingga didapatkan skala pada Tn. W yaitu 13 (10-15) yang dimana beresiko terjadinya dekubitus, memeriksa adanya luka tekan sebelum, memonitor suhu kulit yang tertekan, memonitor mobilitas klien dan aktivitas individu, menggunakan barrier seperti lotion atau bantalan penyerap air, mengubah posisi dengan hati-hati setiap 1-2 jam kemudian mengolesi minyak zaitun pada tubuh pasien, memberikan asupan makanan yang cukup terutama protein, vitamin B dan C, zat besi, dan kalori yang cukup. Pemberian minyak zaitun pada pasien dengan resiko dekubitus dilakukan karena extra virgin oil merupakan minyak zaitu berkualitas terbaik atau grade A yang mengandung berbagai vitamin (Seperti vitamin A,B,C,D, dan vitamin E). minyak zaitun tersebut mengandung asam lemak yang dapat memberikan kelembapan dan kehalusan kulit (JP1). Tindakan selanjutnya diberikan pada diagnosis ke-empat yaitu risiko perfusi renal dengan intervensi utama pencegahan syok dengan memonitor status kardiopulmonal berupa frekuensi, memonitor tanda dan gejala infeksi local dan sistemik, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan pasien dan melakukan perawatan luka dan obat-obatan.


5. Analisis evaluasi keperawatan

Evaluasi pada kasus Tn. W dilakukan selama 4 hari ditanggal 21 februari 2023- 24 februari 2024 proses evaluasi tersebut dilakukan setelah tahapan pengimplementasian, waktu pelaksanaan implementasi pada Tn. W dilaksanakan di penghujung waktu dinas atau mendekati operan jaga. Untuk evaluasi di tanggal 21 februari 2023 pasien telah diberikan fisioterapi dada untuk mengatasi masalah bersihan jalan napas tidak efektif, diperoleh hasil objektif tampak sputum masih banyak, masih terdengar suara napas tambahan, frekuensi napas pasien mulai membaik dengan frekuensi 22x/menit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masalah tersebut belum teratasi, sehingga perlu intervensi lanjutan. Masalah kedua telah dilakukan pemberian manajemen ventilasi mekanik untuk masalah gangguan pertukaran gas, diperoleh data objektif dengan pola napas pasien dispneu, frekuensi napas: 33x/menit, terdapat bunyi napas tambahan, dan hasil AGD pH: 7.464, PO₂: 128.2, PCO₂: 32.1, HCO₃: 27.2, BE: 3.3` Interpretasi: alkalosis respiratorik dan metabolic, berdasarkan data tersebut masalah pada Tn. W belum dapat teratasi sehingga diperlukan intervensi lanjutan.

Masalah ketiga yaitu telah diberikan olesan minyak zaitun dan perubahan posisi miring kiri dan kanan per-2 jam kepada Tn. W ditemukan dari subjektifnya tidak dapat dikaji, objektif ditemukan keadaan kulit pasien tampak kering, klien hanya bisa berbaring ditempat tidur, dan suhu kulit pada daerah tubuh pasien teraba hangat, masalah risiko luka tekan pada Tn. W belum teratasi dan memerlukan intervensi lanjutan. Masalah keempat telah dilakukan pemasangan tracheostomy tube pada pasien untuk mempertahankan saturasi oksigen, setelah di evaluasi pasien masalah kelima, pasien telah dilakukan pengimplementasian sesuai dengan perencanaan, dan tidak ditemukan tanda-tanda infeksi sistemik maupun tanda gejala infeksi local, suhu pasien 36,5 C.


B. Analisis Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien Tn. W dengan kasus *Chronic Kidney Disiase* (CKD) dengan masalah Resiko luka tekan yang diberikan intervensi menggunakan pemberian minyak zaitun selama 3 hari intervensi. Intervensi ini diberikan 1 kali sehari dengan cara memberikan minyak zaitun pada pinggang pasien dengan hasil pemantauan terjabarkan pada pengukuran resiko decubitus dengan menggunakan skala decubitus:




	Penilaian skor
Sebelum dilakukan intervensi H1	13
Sesudah dilakukan intervensi H1	13

Berdasarkan diagram diatas, presentase penilaian skor decubitus sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu masih di penilaian skor 13 yang dimana tidak ada peningkatan di hari pertama.



	Penilaian skor
Sebelum dilakukan intervensi H1	13
Sesudah dilakukan intervensi H1	11

Berdasarkan diagram diatas, presentase penilaian skor decubitus sebelum dan sesudah dilakukan intervensi yaitu terjadi penurunan sebesar 0,15% di hari kedua



	Penilaian skor
Sebelum dilakukan intervensi H1	11
Sesudah dilakukan intervensi H1	11

Berdasarkan diagram diatas, presentase penilaian skor decubitus sebelum dan sesudah dilakukan intervensi pada hari ketiga yaitu tidak ada perubahan dan masih dalam penilaian skor 11.

Dari hasil analisis diatas, klien mengalami perubahan pada status resiko luka tekan yang dimana awal pemberian intervensi pemberian minyak zaitun terdapat nilai skor 13 dalam artian beresiko terjadinya decubitus. Setelah diberikan intervensi pemberian minyak zaitun selama 3 hari, terjadi penurunan di hari kedua yang dimana nilai skor 13 menjadi skor 11. Terjadinya penurunan nilai skor decubitus karena minyak zaitun memiliki kandungan antibakteri dan dapat melembabkan kulit. Sehingga minyak zaitun direkomendasikan untuk diterapkan pada ranah keperawatan agar pasien tirah baring lama dapat terhindar dari terjadinya decubitus. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan terjadinya decubitus pada klien membaik dan salah satu indikator terhadap

penilaian penurunan skor decubitus yaitu kemerahan pada bagian pinggang klien itu membaik secara perlahan.

Akan tetapi, dalam kasus ini tidak terjadi perubahan yang signifikan mengenai penurunan resiko luka tekan karena klien dalam kondisi tersedasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pemberian minyak zaitun mampu mencegah terjadinya luka tekan, karena terbukti bahwa sebelum diberi minyak zaitun (hari pertama intervensi) tidak terjadi luka tekan dan sampai pada hari kelima rawatan tetap tidak terjadi luka tekan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian baluran minyak zaitun pada punggung dan sakrum pada pagi dan sore hari selama 5 hari berturut-turut efektif untuk mencegah terjadinya luka tekan.

Selaras dengan penelitian Hawaibam (2016), yang menjelaskan efektivitas minyak zaitun dalam mencegah ulkus dekubitus melalui regenerasi kulit, meningkatkan hidrasi, elastisitas, dan kekuatannya. Minyak zaitun juga dapat mengurangi kerusakan kulit dengan melindungi area kulit yang mengalami gesekan atau tekanan jangka panjang, pada pasien yang terbatas pada kursi roda atau terbaring di tempat tidur.

Dalam kaitannya intervensi pemberian minyak zaitun dengan integrasi keislaman bahwasanya klien yang mengalami tirah baring lama akan sangat berisiko terjadinya luka decubitus yang bias merusak kulit tubuh. Kita perlu berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari segala penyakit.

Intervensi ini dapat diintegrasikan dengan salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam sehingga bisa menjaga kesehatan diri yakni dengan istirahat yang cukup dan beraktivitas. Firman-Nya dalam Surah Al-Furqan ayat 47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

"Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha." (QS. Al-Furqan ayat 47).

Quraish Shihahb menafsirkan ayat ini sebagai berikut : Di antara bukti-bukti keesaan Tuhan, Dia menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai penutup. Semua makhluk larut dalam kegelapan yang menyelimutinya, seperti baju yang menyelimuti pemakainya. Dia membuat manusia bisa tidur untuk beristirahat memulihkan tenaga setelah kelelahan. Dengan datangnya siang, Dia membuat manusia bangun dan berusaha mencari penghidupan dan rezeki.

Selanjutnya didalam zaitun terdapat minyak yang berkualitas. Minyak zaitun adalah minyak yang sangat bagus, berbeda dengan minyak dan lemak lain yang

memberikan kesehatan pada manusia. Minyaknya bisa digunakan sebagai bahan bakar lampu, dan juga untuk lauk dan lula. Kayu dan arangnya digunakan sebagai kayu bakar. Tidak ada satu bagian pun dari pohon ini tidak berguna. Bahkan abunya bisa dimanfaatkan untuk mencuci sutera.

Beberapa tanda ini menunjukkan bahwa sungguh minyak zaitun adalah pemberian Allah SWT untuk manusia. Pohon zaitun adalah pohon yang paling dulu, yang penuh berkah dan disebut dalam kitab suci (Al-Quran).³¹ Begitu Allah SWT menyebut zaitun dalam Al-Quran, tentu ada sesuatu yang ingin disampaikan Allah SWT dari semua itu. Salah satunya adalah keajaiban dan khasiat minyak yang dihasilkan dari tumbuhan zaitun yang cukup melimpah ruah dan sangat multifungsi bagi orang yang ingin berpikir dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah SWT seperti di dalam firman-Nya QS. An-Nahl ayat 11:

يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الرَّزْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dengan (air hujan) itu Dia menumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam studi kasus ini yaitu kurangnya interaksi langsung dengan pasien karena kondisi pasien dalam keadaan teresdasi sehingga kami tidak mengetahui respon langsung yang dirasakan pasien setelah dilakukan intervensi. Adapun keterbatasan lain dari studi kasus ini yaitu hanya dilakukan pada satu pasien dan sebaiknya intervensi ini dilakukan dari awal pasien masuk diruangan sampai dengan pasien keluar untuk melihat efektivitas dari pemberian intervensi ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengkajian yang didapatkan pasien atas nama Tn. W dengan diagnosis *Chronic Kidney Disiase* (CKD) usia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki pasien gagal napas pada saat setelah post operasi. Ibu klien mengatakan, klien sesak selama kurang lebih 2 minggu, sesak dan batuk berdahak yang semakin memberat sehingga memutuskan untuk membawa klien ke RSWS pada tanggal 2 februari 2023 pada jam 21.15 WITA. Klien datang ke IGD kemudian di observasi oleh dokter, dipasangkan oksigen dan cairan infus. Pada pukul 23.22 WITA klien dipindahkan ke Lontara 2, kemudian pada tanggal 6 februari klien dilakukan tindakan pemasangan WSD (Water Sealed Drainage) karena Efusi Pleura Dextra. Setelah menjalani operasi klien dipindahkan ke ICU untuk mendapatkan perawatan intensif. Di tanggal 7 februari 2023 klien mengalami gagal napas on ventilator mekanis sehingga dilakukan tindakan pemasangan CFC (Central Fenuse Kateter) dan di tanggal 15 februari dilakukan tindakan intubasi endotrakeal. Di tanggal 16 februari 2023 klien dilakukan tindakan Trakeostomi.
2. Diagnosis keperawatan yang di dapatkan pada kasus ini yaitu Bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan adanya jalan napas buatan, Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membrane alveolus-kapiler, Resiko luka tekan berhubungan dengan penurunan mobilitas, Risiko perfusi renal tidak efektif dibuktikan dengan disfungsi ginjal asidosis metabolic, Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif, ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder.
3. Intervensi keperawatan pada kasus ini yaitu pada Bersihan jalan napas tidak efektif diberikan manajemen jalan napas, pada gangguan pertukaran gas diberikan pemantauan respirasi, pada resiko luka tekan diberikan pencegahan luka tekan, pada resiko perfusi renal tidak efektif diberikan pencegahan syok, dan pada resiko infeksi diberikan pencegahan infeksi.
4. Implementasi keperawatan dilakukan selama 3 hari, yaitu pada hari selasa 21 februari 2023. Pemberian intervensi minyak zaitun.
5. Evaluasi Keperawatan dilakukan pada setiap akhir dinas dan dari kelima diagnosis yang diangkat belum ada yang teratasi sehingga intervensi dilanjutkan. Pada saat pemberian intervensi minyak zaitun terjadi peningkatan dari nilai skor 9 ke nilai sko 10 di hari ketiga.

B. Saran

1. Bagi profesi keperawatan karya akhir ini bias dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologis pada pasien *Chronic Kidney Disiase* (CKD).
2. Bagi institusi pendidikan penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien *Chronic Kidney Disiase* (CKD). Perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan kasus lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Alimansur, M., & Santoso, P. (2019). Faktor Resiko Dekubitus Pada Pasien Stroke. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1). <https://doi.org/10.32831/jik.v8i1.259>
- Alipour, J., Mehdipour, Y., & Karimi, A. (2020). Epidemiology and outcome analysis of 3030 burn patients with an icd-10 approach. *Annals of Burns and Fire Disasters*, 33(1).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Sulawesi Tenggara*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2020). *Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB). <https://doi.org/10.32831/jik.v8i1.259> Desember 2013
- Boangmanalu, E. S. (2016). *Asuhan Keperawatan pada Ny.S dengan Gangguan Kebutuhan Mobilitas di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Haryanti, Aini, F., & Purwaningsih, P. (2013). Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Stres Kerja Perawat Di Instalasi Gawat Darurat Rsud Kabupaten Semarang. *Jurnal Manajemen Keperawatan*, 1(1). <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JMK/article/view/949>
- Haryono, R., & Hardjono, D. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah: Sistem Perkemihan* (1st ed.). Rapha Publishing.
- Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (2015). *Diagnosis Keperawatan Definisi & Klasifikasi 2015-2017* (10th ed.). EGC.
- Jameson, J. L., & Loscalzo, J. (2017). Harrison's Nephrology and Acid-Base Disorders. In *Practical Nephrology*.
- Kementerian Agama RI. (2020). Qur'an Kemenag. Diambil dari <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Pengendalian Penyakit*. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lupiañez-Perez, I., Uttumchandani, S. K., Morilla-Herrera, J. C., Martin-Santos, F. J., Fernandez-Gallego, M. C., Navarro-Moya, F. J., Lupiañez-Perez, Y., Contreras-Fernandez, E., & Morales-Asencio, J. M. (2015). Topical olive oil is not inferior to hyperoxygenated fatty acids to prevent pressure ulcers in high-risk immobilised patients in home care. Results of a multicentre randomised triple-blind controlled non-inferiority trial. *PLoS ONE*, 10(4). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0122238>
- Meliza, S. C., Ritarwa, K., & Sitohang, N. A. (2020). The Prevention of Ulcers Decubitus with Mobilization and The Usage of Olive Oil on Stroke Patients. *Elkawnie*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/ekw.v6i2.6925>
- Mellia, I. S., & Nefi, L. (2020). *Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Pada Pasien Chronic Kidney Disease (CKD) dalam pemenuhan kebutuhan Aktivitas dan Istirahat*.
- Mondal, M., Yeasmin, T., Karim, R., Siddiqui, M. N., Nabi, S. R., Sayed, M., & Siddiky, M. (2015). Effect of dietary supplementation of turmeric (*Curcuma longa*) powder on the growth performance and carcass traits of broiler chicks. *SAARC Journal of Agriculture*,

13(1). <https://doi.org/10.3329/sja.v13i1.24191>

- Muhammad, Najmuddin. (2012). *Mukjizat Makanan Dan Minuman Kesukaan Rasulullah*. Jogja
- Muttaqin, & Sari. (2011). *Asuhan Keperawatan Gangguan Sistem Perkemihan*. Salemba Medika.
- Nababan, T., & Giawa, E. (2019). Pengaruh ROM Pada Pasien Stroke Iskemik terhadap Peningkatan Kekuatan Otot di RSUD Royal Prima Medan tahun 2018. *Jurnal Keperawatan Priority*, 2(1), 1–8.
- Ni, M. A. K. (2019). *Asuhan Keperawatan Medikal Bedah Komprehensif Pada Tn. A Dengan Chronic Kidney Disease (CKD) Di Ruang Komodo RSUD PROF. DR. W.Z JOHANES Kupang* (pp. 1–9).
- Nuari, N. A., & Widayati, D. (2017). Gangguan Pada Sistem Perkemihan & Penatalaksanaan keperawatan Dengan Pendekatan SDKI 2016 NIC-NOC & Spider Web Design. In *Maret*.
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa dan Nanda NIC NOC* (1st ed.). Mediaction.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis* (4th ed.). Salemba Medika.
- Oktaviani, M. L. (2017). *Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Chronic Kidney Disease (CKD) Di Irna Non Bedah Penyakit Dalam Wanita RSUP Dr. M. DJAMIL Padang*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang.
- Poursadra, E., Anvari-Tafti, M., Dehghani, A., Eghbali-Babadi, M., & Rafiei, Z. (2019). Comparing the Effect of Henna Oil and Olive Oil on Pressure Ulcer Grade One in Intensive Care Units Patients. *Advanced Biomedical Research*, 8(1). https://doi.org/10.4103/abr.abr_207_19
- PPNI. (2018). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (2nd ed.). Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- Pranata, A. E., & Prabowo, E. (2014). *Asuhan Keperawatan Sistem Perkemihan Edisi 1 Buku Ajar*. Nuha Medika.
- Prihatiningtias, K. J., & Arifianto, A. (2017). Faktor-Faktor Risiko Terjadinya Penyakit Ginjal Kronik. *Jurnal NERS Widya Husada*, 4(2).
- Rahayu, I. T. (2016). *Pengaruh Jogging Pagi hari dan Malam Hari terhadap Kadar Asam Laktat pada Mahasiswa Ikor FIK UNNES*. Universitas Negeri Semarang.
- Rahmawati, H. F., & Mokodompit, N. A. (2019). Penerapan Latihan Range Of Motion (Rom) Pada Pasien Dengan Gagal Ginjal Kronik Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas. *Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32382/jmk.v10i2.1299>
- Santiko, S., & Faidah, N. (2020). Pengaruh Massage Efflurage Dengan Virgin Coconut Oil (Vco) Terhadap Pencegahan Dekubitus Pada Pasien Bedrest Di Ruang Instalasi Rawat Intensive (Irin) Rs Mardi Rahayu Kudus. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 9(2). <https://doi.org/10.31596/jcu.v9i2.600>
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner &*

Suddarth (8th ed.). EGC.

Supriyanti, E., Pudjonarko, D., Johan, A., Sujianto, U., Tugasworo, D., Magister, M., Konsentrasi, K., Dewasa, K., Kedokteran, D. F., Diponegoro, U., Divisi, D., Kedokteran, F., Rsup, D., Semarang, K., Prof, J., Soedarto, H., Tembalang, S. H., Semarang, K., & Tengah, J. (2019). Perbedaan efek extra virgin olive oil (EVOO) dan virgin coconut oil (VCO) terhadap kejadian luka tekan grade I pada pasien stroke di RSUD KRMT wongsonegoro semarang. *Seminar Nasional Akper Widya Husada Semarang, April*.

Suwitra, K. (2014). *Penyakit Ginjal Kronik* (4th ed.). Interna Publishing.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)* (1st ed.). Persatuan Perawat Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI)* (1st ed.). Persatuan Perawat Indonesia.

M. Quraish Shihab. (2001). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati



**PENGARUH PEMBERIAN MINYAK ZAITUN DAN PENGATURAN POSISI MIRING 30
DERAJAT TERHADAP KEJADIAN DEKUBITUS PADA PASIEN STROKE : STUDI
EKSPERIMEN**

**THE EFFECT OF OLIVE OIL ADMINISTRATION AND 30 DEGREE TILT POSITION ON THE
EVENT OF DECUBITUS IN STROKE PATIENTS : EXPERIMENT STUDY**

¹Atik Aryani, ²Widiyono, ³Fajar Alam Putra
^{1,2,3} Prodi Keperawatan, Universitas Sahid Surakarta
¹Email corresponding author: aryani.atik13@gmail.com

ABSTRAK

Faktor risiko seseorang terkena dekubitus salah satunya adalah penyakit stroke. Prevalensi munculnya dekubitus adalah sebesar 67% pada pasien rawat inap jangka pendek, dan 92% pada pasien perawatan jangka panjang. Luka tekan meningkatkan mortalitas dan lama hari perawatan. Intervensi Keperawatan yang terpenting dalam menjaga integritas kulit adalah menjaga hidrasi kulit dalam batas wajar dengan pemberian pelembab salah satunya dengan minyak zaitun dan pengaturan posisi miring 30 derajat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian minyak zaitun dan pengaturan posisi miring 30 derajat terhadap kejadian dekubitus pasien stroke. Metode penelitian menggunakan desain one-group pretest-posttest design. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling sebanyak 30 responden. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi pressure ulcer data collecting form. Intervensi yang diberikan adalah pemberian minyak zaitun sekali sehari selama 7 hari dan pengaturan posisi miring 30 derajat. Analisis data yang digunakan adalah uji Wilcoxon. Hasil penelitian didapatkan ada perbedaan yang signifikan rerata dekubitus sebelum dan setelah diberikan intervensi dengan p-value = 0,001 ($p < 0,05$). Kesimpulan dalam penelitian ini ada pengaruh yang signifikan pemberian minyak zaitun dan pemberian posisi 30 derajat terhadap kejadian dekubitus pada pasien stroke. Peneliti menyarankan penggunaan minyak zaitun secara topikal dapat diterapkan untuk mencegah luka tekan dan pengaturan posisi miring 30 derajat pada pasien terbaring di tempat tidur di rumah sakit.

Kata Kunci: Dekubitus, Minyak Zaitun, Pasien Stroke, Posisi Miring 30 Derajat

ABSTRACT

One of the risk factors for developing pressure sores is stroke. The prevalence of pressure sores was 67% in short-term hospitalized patients, and 92% in long-term care patients. Pressure sores increase mortality and length of hospital stay. The most important nursing intervention in maintaining skin integrity is maintaining skin hydration within reasonable limits by providing moisturizers, one of which is olive oil and tilting position 30 degrees. The purpose of this study was to determine the effect of giving olive oil and setting a 30-degree tilt to the incidence of pressure sores in stroke patients. The research method used one-group pretest-posttest design. The sampling technique was using purposive sampling as many as 30 respondents. The measuring instrument used is a pressure ulcer observation sheet data collecting form. The intervention given was the administration of olive oil once a day for 7 days and the tilting position was 30 degrees. Analysis of the data used is the Wilcoxon test. The results showed that there was a significant difference in the mean pressure before and after the intervention with p-value = 0,001 ($p < 0,05$). The conclusion in this study is that there is a significant effect of giving olive oil and giving a 30 degree position to the incidence of pressure sores in stroke patients. Researchers suggest that topical use of olive oil can be applied to prevent pressure sores and adjust the 30-degree tilt position in hospital bedridden patients.

Keywords: Decubitus, Olive Oil, Stroke Patients, 30 Degree Tilt Position

Lampiran Dokumentasi Implementasi

