

**DETERMINAN KEJADIAN DEKOMPRESI PADA PENYELAM DI
PULAU KAMBUNO KECAMATAN PULAU SEMBILAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUTHAHARA QALBI SUQRI

NIM: 70200119046

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muthahara Qalbi Suqri
NIM : 70200119046
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai/ 11 Juli 2001
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Sawerigading No. 32, Sinjai
Judul : Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Januari 2024

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Muthahara Qalbi Suqri
NIM: 70200119046

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023*" yang disusun oleh Muthahara Qalbi Suqri, NIM: 70200119046, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat.

Gowa, 18 September 2023
3 Rabiul Awal 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr Syatirah, Sp. A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Emmi Bujawati, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Susmihara, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Syarfaini, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ranti Ekasari, SKM., M.KM	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan asma Allah Swt yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, segenap rasa nikmat tiada tara hanya milik Allah Swt yang telah menganugerahkan segala rahmat, hidayah, nikmat dan inayah-Nya bagi kita semua, serta shalawat dan salam yang tercurahkan senantiasa untuk Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam*.

Berkat limpahan dan rahmat-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul "Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023". Dalam rangka melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Segala bentuk kekurangan dalam penulisan skripsi ini merupakan keterbatasan penulis selaku insan dan hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Swt. Namun demikian dari segenap kerendahan hati, penulis menghadirkan skripsi ini yang merupakan bentuk ikhtiar dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dengan tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis dalam mengatasi segala kendala dan halangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua tercinta Ayahanda Andi Suhartono dan Ibunda Qariati yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dalam

membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita, kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua. Kepada Saudara(i) Muhammad Yahya Suqri, Muhammad Yasin Suqri, A. Abu Qalam Suqri, Ma'wa Nurul Qalbi Suqri, A. Aisyah Huzaimah Qalbi Suqri, Andi Khalilullah Suqri, Andi Munawwarah Qalbi Suqri dan Sofia Mardhotillah yang menjadi penyemangat sehingga penulis mampu menjalani proses. Kepada tanteku Andi Nurhaedah dan Andi Syamsidar yang selalu memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materil sehingga penulis mampu menyelesaikan studi.

Penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA,Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes, selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Syarfaini, SKM., M.Kes, selaku Dosen Pembimbing I dan Ranti Ekasari, SKM., M.KM selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Emmi Bujawati, SKM., M.Kes selaku penguji akademik dan Dr. Susmihara, M.,Pd selaku penguji integrasi keislaman yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan kritik terhadap skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Kepala Desa Pulau Harapan dan para stafnya yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian.

8. Kepada para responden yang telah bersedia memberikan informasi dalam penelitian.

9. Sahabat-sahabat penulis, Apoy, fadya, lilis, ulfa, wana, dan mamei yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu sejak awal perkuliahan hingga akhir menyelesaikan skripsi.

10. Teman-teman GRAMOST 2019 terkhusus Kesmas A 2019 dan K3 2019 terima kasih untuk bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi kesan baik dalam proses penulisan skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah SWT.


semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Samata-Gowa, Agustus 2023

Penulis

Muthahara Qalbi Suqri

NIM: 70200119046



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Hipotesis Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	10
G. Kajian Pustaka.....	14
H. Perbedaan Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tentang Penyelaman.....	21
B. Tinjauan Tentang Dekompresi.....	36
C. Tinjauan Tentang Lama Menyelam	47
D. Tinjauan Tentang Penggunaan APD.....	49
E. Tinjauan Tentang Kedalaman Menyelam	51
F. Tinjauan Tentang Pengetahuan Menyelam.....	53
G. Tinjauan Tentang Alkohol.....	55
H. Tinjauan Tentang Status Gizi.....	58
I. Kerangka Teori.....	60
J. Kerangka Konsep.....	61
BAB II.....	62
A. Jenis Penelitian.....	62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	63
D. Pengumpulan Data	64


E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Hasil Penelitian	69
C. Pembahasan.....	83
D. Keterbatasan Penelitian	102
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	109
KUESIONER PENELITIAN.....	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka Terkait Determinan Kejadian Dekompresi Pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	14
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	70
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Identitas pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	71
Tabel 4. 4 Distribusi Responden Berdasarkan Penyakit Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	72
Tabel 4. 5 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penyelaman Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	72
Tabel 4. 6 Distribusi Responden Berdasarkan Standarisasi APD Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	73
Tabel 4. 7 Distribusi Responden Berdasarkan Kedalaman Menyelam Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	74
Tabel 4. 8 Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	74
Tabel 4. 9 Distribusi Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	75
Tabel 4. 10 Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	76
Tabel 4. 11 Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Merokok Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	76
Tabel 4. 12 Hubungan Lama Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	77
Tabel 4. 13 Hubungan Standarisasi APD dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	78
Tabel 4. 14 Hubungan Kedalaman Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	79

Tabel 4. 15 Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.....	80pp
Tabel 4. 16 Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.....	81
Tabel 4. 17 Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Ilustrasi decompression sickness dan emboli gas arteri	39
Gambar 2. 2 Kerangka Teori Penyakit Dekompresi	60
Gambar 2. 3 Kerangka Konsep	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	
Lampiran 3 Etik Penelitian.....	
Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	
Lampiran 5 Informed Consent.....	
Lampiran 6 Master Tabel.....	
Lampiran 7 Analisis Univariat.....	
Lampiran 8 Analisis Bivariat.....	
Lampiran 9 Dokumentasi.....	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Muthahara Qalbi Suqri

NIM : 70200119046

**Judul : Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau
Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai tahun
2023**

Kegiatan penyelaman tradisional, yang dilakukan dengan segala keterbatasan perlengkapan dan informasi tentang penyelaman, dapat menyebabkan dampak negatif bagi kondisi fisik penyelam dan membawa risiko kesehatan yang serius, termasuk nyeri, kelumpuhan, cacat, bahkan kematian. Masalah yang sering dihadapi oleh penyelam tradisional adalah masalah hiperbarik, dengan kecelakaan yang disebabkan oleh penyelaman meliputi *decompression sickness* (DCS) atau penyakit dekompresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional study*. Penelitian ini dilakukan di Pulau Kambuno dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang.

Hasil penelitian diperoleh : adanya hubungan yang signifikan antara lama menyelam dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara kedalaman menyelam dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara standarisasi APD dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan menyelam dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang tidak signifikan antara konsumsi alkohol dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang tidak signifikan antara status gizi dengan penyakit dekompresi.

Kata Kunci : *Kejadian Dekompresi, Penyelam tradisional, Pulau Kambuno*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, orang-orang yang tinggal di wilayah pantai memiliki tradisi yang sejalan dengan lingkungan sekitar, memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan sumber daya alam di daerah pesisir. Industri kelautan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan kekayaan laut. Kegiatan eksplorasi sumber daya laut melibatkan aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh para nelayan, pemanfaatan laut sebagai metode transportasi, dan penjelajahan kekayaan di dasar laut seperti pengambilan minyak dan gas bumi melalui penggunaan *scuba diving*. Satu dari banyak pekerjaan yang sering ditemui di komunitas pesisir adalah pekerjaan penyelaman secara tradisional (Chabibah & Prasetya, 2021).

Di Indonesia, mayoritas penyelam tradisional masih mengandalkan teknik dan perlengkapan yang sangat sederhana dan mengikuti tradisi (Duke et al., 2017). Mereka biasanya meneruskan pekerjaan mereka dari satu generasi ke generasi berikutnya tanpa memiliki pengetahuan medis menyelam yang memadai. Keterampilan dalam menyelam diperoleh secara otodidak melalui pengamatan dan peniruan terhadap para penyelam yang memiliki lebih banyak pengalaman atau senioritas (Widyastuti et al., 2019). Penyelam tradisional melakukan penyelaman menggunakan dua metode, yakni menggunakan scuba atau menggunakan udara yang disuplai melalui kompresor. Istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada teknik penyelaman tradisional ini adalah "nelayan kompresor." Jenis penyelam

tradisional ini meliputi mereka yang menangkap ikan, lobster, teripang, abalon, kerang, mutiara, dan berbagai jenis ikan atau hewan laut bernilai komersial lainnya (Koesdianasari, 2019).

Kegiatan penyelaman tradisional, yang dilakukan dengan segala keterbatasan perlengkapan dan informasi tentang penyelaman, dapat menyebabkan dampak negatif bagi kondisi fisik penyelam dan membawa risiko kesehatan yang serius, termasuk nyeri, kelumpuhan, cacat, bahkan kematian. Risiko yang dihadapi bukan hanya berasal dari tindakan pengalamannya sendiri, tetapi juga risiko dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di bawah air, metode penyelaman yang diterapkan, dan kesehatan mental serta fisik penyelam. Penyelam tradisional kerap menghadapi masalah, seperti isu hiperbarik, di mana kecelakaan penyelaman bisa mengakibatkan kondisi seperti *decompression sickness* (DCS) atau gangguan dekompresi (Chabibah & Prasetya, 2021).

Decompression sickness merupakan keadaan medis yang terjadi karena gas yang awalnya terlarut dalam darah atau jaringan tiba-tiba keluar dan mengembang akibat penurunan tekanan di lingkungan sekitarnya. Berdasarkan Hukum Henry, konsentrasi gas yang larut dalam cairan pada suhu tertentu akan meningkat sejalan dengan kenaikan tekanan parsial gas di atas cairan tersebut. Oleh karena itu, saat seseorang melakukan penyelaman, tekanan parsial nitrogen yang mereka hirup terus meningkat, menyebabkan peningkatan jumlah nitrogen gas yang terlarut dalam darah dan jaringan mereka. Darah yang mengandung nitrogen yang berlebihan kemudian didistribusikan ke jaringan berdasarkan aliran darah ke

masing-masing jaringan dan afinitas nitrogen terhadap jaringan tersebut (Hisnindarsyah et al., 2018).

Terdapat beberapa elemen risiko yang mempengaruhi munculnya *decompression sickness*, termasuk faktor-faktor lingkungan seperti suhu perairan laut dan kedalaman penyelaman. Selain itu, terdapat faktor yang terkait dengan individu (host), seperti usia, lamanya waktu menyelam, frekuensi menyelam, jenis alat yang digunakan selama penyelaman, pengalaman bekerja sebagai penyelam dalam jangka waktu tertentu, catatan medis mengenai riwayat asma, kebiasaan merokok, masalah berat badan, dan konsumsi minuman alkohol. Semua faktor ini dapat berperan dalam meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami penyakit dekompresi (Chabibah & Prasetya, 2021).

Berdasarkan laporan dari *The National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH), angka kematian di kalangan nelayan di Amerika Serikat tergolong tinggi. Dalam rentang waktu 2000 hingga 2015, terjadi rata-rata 42 kematian setiap tahun di kalangan nelayan (dengan angka 117 kematian per 100.000 pekerja), dibandingkan dengan rata-rata 5.247 kematian (4 per 100.000 pekerja) di seluruh sektor pekerjaan di Amerika Serikat (*The National Institute for Occupational Safety and Health*, 2019). Berdasarkan informasi dari FAO (*Food and Agriculture Organization of the United States*), diperkirakan ada sekitar 24.000 kematian nelayan setiap tahun akibat kecelakaan kerja saat melaksanakan aktivitas penangkapan ikan (Ningsih & Febriyanto, 2021).

Angka kejadian penyakit dekompresi di Amerika Serikat untuk tipe II (berat) diperkirakan sekitar 2,28 kasus per 10.000 penyelam, sementara untuk tipe

I (ringan) tidak ada data yang tersedia karena banyak dari mereka tidak mencari perawatan medis. Di wilayah Kepulauan Hawaii dan pulau-pulau di seluruh kawasan Asia Pasifik, insiden penyakit dekompresi terkait dengan penyelaman memiliki kisaran antara 1 hingga 35 kasus per 1000 penyelaman.

Data survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan dalam rentang waktu 2008 hingga 2012 di Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, mengindikasikan bahwa dari 145 nelayan yang menjadi responden, sebagian diantaranya mengalami penyakit yang disebabkan oleh penyelaman. Beberapa kondisi kesehatan yang terkait meliputi masalah barotrauma pada telinga, dekompresi, serta penyakit yang timbul akibat paparan lingkungan dalam air. Hasil survei yang sama juga menunjukkan bahwa sekitar 69,1% kasus penyelam mengalami kelainan dekompresi. Kelainan ini terjadi karena kurangnya kadar gas nitrogen dalam tubuh yang diakibatkan oleh perubahan tekanan selama penyelaman di bawah permukaan laut (Embuai et al., 2020).

Kementerian Kesehatan juga telah melakukan riset yang melibatkan 251 penyelam sebagai responden dari 9 provinsi. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa beberapa keluhan yang sering dirasakan oleh para responden meliputi berbagai gejala, di antaranya 21,2% mengalami sensasi pusing atau sakit kepala, 12,6% merasa terlalu lelah, 12,5% mengalami penurunan pendengaran, 10,8% mengalami nyeri pada persendian, 10,2% mengalami perdarahan hidung, 9,7% merasakan sakit pada bagian dada atau kesulitan bernafas, 6,4% mengalami gangguan penglihatan, 6,0% mengalami perubahan pada kulit, 5,6% mengalami

gigitan binatang, 3,2% mengalami kehilangan kemampuan bergerak, dan 1,7% mengalami kehilangan kesadaran (Wijaya et al., 2021).

Menurut informasi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Kambuno merupakan salah satu dari sembilan pulau yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Pulau ini memiliki luas sekitar 0,17 kilometer persegi dan memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut sekitar 1 meter. Keseluruhan wilayah permukiman mencakup luas sekitar 0,21 kilometer persegi. Dalam hal topografi, pulau ini terdiri dari 75% daratan dan 25% wilayah berbukit. Mata pencaharian utama penduduk Pulau Kambuno adalah nelayan. Selain menjadi nelayan, sebagian penduduk Pulau Kambuno Sinjai merupakan petani rumput laut dan penyelam.

Di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan tradisi penyelaman tradisional masih ada. Berdasarkan informasi dari Puskesmas Pulau Sembilan, selama periode 2018 hingga 2022, tercatat 15 kasus kasus hiperbarik yang dialami oleh penyelam tradisional di Kambuno, dan terdapat 2 kasus yang berakhir dengan kematian. Jumlah kasus yang cukup tinggi ini mengindikasikan bahwa masalah hiperbarik, termasuk penyakit dekompresi, masih menjadi perhatian serius di Kambuno.

Ketidakhahaman nelayan mengenai prinsip-prinsip keselamatan dalam penyelaman (*safety dive*), potensi risiko terkait penyelaman, metode memberikan pertolongan saat kecelakaan penyelaman, serta beredarnya mitos-mitos yang tidak akurat telah menyebabkan angka kecelakaan penyelaman yang tinggi di Pulau Kambuno. Selain informasi yang diperoleh dari Puskesmas, ada dugaan kuat bahwa

masih terdapat banyak kasus kecelakaan penyelaman yang tidak dilaporkan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja Determinan Kejadian Dekompresi Pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan lama penyelaman dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023
- b. Untuk mengetahui hubungan penggunaan APD dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023
- c. Untuk mengetahui hubungan kedalaman menyelam dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

- d. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023
- e. Untuk mengetahui hubungan konsumsi alkohol dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023
- f. Untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian dekompresi di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi penting bagi peneliti lain yang ingin menyelidiki isu serupa.

2. Manfaat Bagi Insitusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi penting bagi lembaga setempat seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan Puskesmas Pulau Sembilan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang relevan dalam usaha mencegah penyakit dekompresi pada penyelam nelayan. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi yang berharga serta sumber data tambahan bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pengembangan literatur dan penelitian lebih mendalam.

3. Manfaat Bagi Penyelam

Penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyakit dekomresi pada penyelam nelayan. Dengan begitu, diharapkan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai terhadap kondisi penyakit tersebut.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Menciptakan pengalaman yang berharga bagi peneliti, sekaligus melengkapi pengalaman akademis dan pengetahuan dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu kesehatan yang dimiliki.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini merupakan hipotesis sementara atas hasil penelitian yang dibuktikan dengan penggunaan analisa yang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0)

a. Lama penyelaman bukan merupakan determinan kejadian dekomresi

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

b. Penggunaan APD bukan merupakan determinan kejadian dekomresi

pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

- c. Kedalaman menyelam bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
 - d. Pengetahuan bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
 - e. Konsumsi alkohol bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
 - f. Status Gizi bukan merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
2. Hipotesis Alternatif (Ha)
- a. Lama penyelaman merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai Tahun 2023.
 - b. Penggunaan APD merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai Tahun 2023.
 - c. Kedalaman menyelam merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai Tahun 2023.

- d. Pengetahuan merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai Tahun 2023.
- e. Konsumsi alkohol merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau kambuno Kecamatan Pulau Sembilan kabupaten Sinjai Tahun 2023.
- f. Status gizi merupakan determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

F. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kejadian Penyakit Dekompresi

Penyakit dekompresi adalah situasi yang muncul karena fluktuasi tekanan saat melakukan penyelaman, dengan gejala ringan seperti rasa sakit pada persendian, gatal-gatal, bercak darah pada kulit, serta sensasi kesemutan. Sementara itu, gejala yang lebih berat termasuk pecahnya pembuluh darah, kehilangan kemampuan bergerak (lumpuh), dan gangguan pendengaran (Takalelumang et al., 2018).

Kriteria Objektif

- a. Menderita: Penyelam yang merasakan gejala penyakit dekompresi baik gejala ringan maupun berat
- b. Tidak menderita: Penyelam yang tidak merasakan gejala

2. Lama Penyelaman

Dalam penelitian ini, lama menyelam merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh nelayan dalam satu kali penyelaman, mulai dari saat mereka menyelam di bawah permukaan air laut hingga kembali naik ke permukaan lagi (Wijaya et al., 2021).

Kriteria Objektif

- a. Lama: Jika penyelam melakukan penyelaman selama > 60 menit
- b. Tidak lama: Jika penyelam melakukan penyelaman selama ≤ 60 menit

3. Standarisasi APD

Pada penelitian ini, Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan adalah alat yang sesuai dengan standar SNI penyelaman, yaitu scuba. APD ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk masker, *weight belt*, *regulator*, *buoyancy compensation device* (BCD), *fins*, dan tabung udara.

Kriteria Objektif

- a. Berstandar: Jika penyelam menggunakan alat pelindung diri yakni scuba
- b. Tidak berstandar: Jika penyelam menggunakan alat kompresor.

4. Kedalaman Menyelam

Kedalaman menyelam dalam penelitian ini mengacu pada jarak atau rentang penyelaman yang dilakukan oleh nelayan, mulai dari permukaan air laut hingga mencapai tingkat kedalaman yang telah ditetapkan, di mana mereka akan melakukan aktivitas selama penyelaman (Wijaya et al., 2021).

Penentuan kedalaman menyelam dilakukan dengan menggunakan Garmin echo 300, sebuah alat pengukur kedalaman yang digunakan dalam penyelaman, di mana ukuran depa digunakan sebagai satuan (1 depa setara dengan 1,8 meter).

Kriteria Objektif

- a. Dalam: Jika penyelam melakukan penyelaman dengan kedalaman \geq 10 m
- b. Dangkal: Jika penyelam melakukan penyelaman dengan kedalaman $<$ 10 m

5. Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi atau pengetahuan yang dipahami oleh seseorang dalam konteks proses pembelajaran. Ketika melakukan penyelaman, seorang penyelam harus memiliki pengetahuan tentang prosedur penyelaman dan penerapan teknik menyelam (equalisasi).

Kriteria Objektif

- a. Baik: Jika 56 -100% jawaban yang tepat dari keseluruhan jawaban pertanyaan.
- b. Kurang: Jika $<$ 56% jawaban yang tepat dari keseluruhan jawaban pertanyaan.

6. Mengonsumsi Alkohol

Alkohol dalam penelitian ini mengacu pada jenis minuman yang mengandung etanol yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan destilasi bahan pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat. Proses tersebut

dapat dilakukan dengan atau tanpa perlakuan khusus, penambahan bahan tambahan, serta menggabungkan konsentrat dengan minuman beralkohol atau melalui proses pengenceran minuman yang mengandung etanol (Rahmawati et al., 2019).

Kriteria Objektif

- a. Konsumsi: Jika mengonsumsi alkohol sehari sebelum melakukan penyelaman
- b. Tidak konsumsi: Jika tidak mengonsumsi sehari sebelum melakukan penyelaman

7. Status Gizi

Status gizi (*nutritional status*) adalah kondisi yang terjadi akibat keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi oleh tubuh (Candra, 2020). Penilaian status gizi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan pengukuran antropometri dengan melihat indeks BB/TB² (Kemenkes RI, 2019).

Kriteria Objektif

- c. Normal: Jika Indeks Massa Tubuh (IMT) penyelam 18,5 – 25,0
- d. Tidak normal: Jika Indeks Massa Tubuh (IMT) penyelam < 18,5 dan > 25,0

G. Kajian Pustaka

Tabel 1. 1
Kajian Pustaka Terkait Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di
Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2018	Dian Rezki Wijaya, Andi Zulkifli, Abdullah Sukri Palutturi (Wijaya et al., 2018)	Faktor Risiko Masa Kerja dan Waktu Istirahat Terhadap Kejadian Penyakit Dekompresi pada Penyelam di Pulau Barrang Lompo	Masa kerja, cara naik ke permukaan dan waktu istirahat.	<i>Observasional analitik</i> dengan menggunakan rancangan <i>Case Control Study</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor risiko yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap insiden penyakit dekompresi pada nelayan penyelam. Faktor-faktor tersebut adalah lama bekerja dan metode naik ke permukaan. Sementara itu, tidak terdapat hubungan statistik yang signifikan antara waktu istirahat dan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam.
2.	2019	Sri Rahayu Widyastuti, Soeharyo Hadisaputro, Munasik (Widyastuti et al., 2019)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kualitas Hidup Penyelam Tradisional Penderita Penyakit Dekompresi	Variabel dependen adalah kualitas hidup penyelam tradisional penderita penyakit dekompresi. Variabel independen adalah usia, obesitas, anemia, merokok, konsumsi	Jenis penelitian adalah penelitian <i>mix methode</i> desain studi kasus kontrol.	Variabel yang terkonfirmasi memberikan dampak pada kualitas hidup para penyelam tradisional yang menderita penyakit dekompresi memiliki riwayat penyakit komorbid hipertensi, melakukan penyelaman dengan kedalaman ≥ 30 meter mengalami hilang kesadaran selama menyelam, melakukan penyelaman

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				alkohol, kedalaman menyelam, lama menyelam, frekuensi menyelam, riwayat hilang kesadaran, penyakit hipertensi, diabetes mellitus, riwayat penyakit komorbid jantung, dan riwayat penyakit komorbid sesak nafas.		dengan durasi ≥ 2 jam, menderita anemia, serta memiliki riwayat penyakit dekompresi lebih dari 1 kali
3.	2019	Muhaimin Saranani, Rudi Hartono, Aluddin (Saranani et al., 2019)	Faktor yang berhubungan dengan kejadian <i>decompression sickness</i> pada aktivitas penyelaman menggunakan kompressor.	Kedalaman menyelam, lama menyelam	deskriptif analitik dengan rancangan <i>cross sectional study</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara kedalaman menyelam dengan kejadian <i>decompression sickness</i> dan hubungan lama menyelam dengan kejadian <i>decompression sickness</i> .

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	2020	Yowan Embuai, Hanifa Maher Denny, Yuliani Setyaningsih (Embuai et al., 2020)	Analisis Faktor Individu, Pekerjaan dan Perilaku K3 pada Kejadian Penyakit Dekompresi pada Nelayan Penyelam Tradisional di Ambon	Masa Kerja, Kedalaman menyelam, lama menyelam, frekuensi menyelam, kecepatan naik ke permukaan dan perilaku K3 (konsumsi air putih, penggunaan APD, perilaku merokok dan alkohol)	Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian <i>case-control</i>	Adanya hubungan yang signifikan antara kedalaman menyelam, lama menyelam, frekuensi menyelam, penggunaan APD dengan penyakit dekompresi, adanya hubungan yang tidak signifikan antara masa kerja, kecepatan naik ke permukaan, perilaku K3 konsumsi air putih, perilaku K3 konsumsi rokok, perilaku K3 konsumsi alkohol dengan penyakit dekompresi.
5.	2020	Muliadi Rais, Syamsiar S Russeng, Muhammad Syafar, Atjo Wahyu (Rais et al., 2020)	<i>The Effect of Characteristics on the Potential Event Individual of Decompression in Traditional Divers in the Bajo Village, Boalemo Regency</i>	Usia, Masa Kerja, Indeks Massa Tubuh.	Survei analitik dengan desain <i>cross sectional</i>	Ada pengaruh yang signifikan antara usia dan masa kerja terhadap potensi kejadian dekompresi dengan nilai <i>mann-whitney</i> $U = 260$ $p = 0,000$ ($<0,05$). dan nilai <i>mann-whitney</i> $U = 173$ $p = 0,000$ ($<0,05$) sedangkan indeks massa tubuh tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kejadian dekompresi pada penyelam tradisional di Desa Bajo Kabupaten Boalemo dengan nilai <i>mann-whitney</i> $U = 445,5$ $p = 0,116$ ($> 0,05$)

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	2021	Yuliana B, Nur Ulmy Mahmud, Sumiaty (B et al., 2021)	Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Tradisional di Pulau Barrang Lompo	Lama menyelam, kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, cara naik ke permukaan, dan masa kerja	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa durasi penyelaman yang tidak sesuai standar ditemukan pada 81 responden (68,6%). Selain itu, terdapat 66 responden (55,9%) yang melakukan penyelaman pada kedalaman yang tidak aman. Sebanyak 102 responden (86,4%) melaporkan melakukan penyelaman lebih dari dua kali dalam sehari. Selain itu, 112 responden (94,9%) menggunakan metode naik ke permukaan dengan berhenti pada kedalaman tertentu secara perlahan. Terakhir, 89 responden (75,4%) memiliki masa kerja yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan penyelaman.
7.	2021	Dian Rezki Wijaya, Ranti Ekasari, Lilis Widiastuty, Zil Fadhilah Arranury,	Faktor Risiko Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Di Pulau Barrang Lompo	Kedalaman menyelam, frekuensi menyelam, lama menyelam	Metode Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan <i>Case Control Study</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedalaman menyelam (OR=2,641; CI 95%=1,285-5,428), frekuensi menyelam (OR=4,067; CI 95%=1,939-8,531) dan lama menyelam (OR=3,872; CI 95%=1,657-9,052) merupakan faktor risiko kejadian

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Tri Addya Karini				penyakit dekompresi pada nelayan penyelam di Pulau Barrang Lompo
8.	2021	Maritje Fransina Papilaya, Jonathan Kelabora (Papilaya & Kelabora, 2021)	Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Timbulnya Penyakit Dekompresi pada Nelayan Tradisional di Desa Tamedan	Pengetahuan, sikap dan penyakit dekompresi	Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian <i>Cross Sectional</i>	Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang penting antara pengetahuan responden dan penyakit dekompresi, dengan nilai signifikansi dari uji statistik adalah 0.015, yang lebih kecil dari nilai batas signifikansi yaitu 0.005. Sementara itu, tidak terdapat korelasi antara sikap responden dan penyakit dekompresi, dengan nilai signifikansi dari uji statistik sebesar 0.290.
9.	2022	Mansur Sididi, Rahman (Sididi & Rahman, 2022)	Faktor Determinan Kejadian Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Tradisional	Lama menyelam, kedalaman menyelam, dan riwayat penyakit jantung	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan <i>cross sectional</i> .	Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh lama menyelam (p -value = 0,244) dan kedalaman menyelam (p -value = 0,138) dan ada pengaruh riwayat penyakit jantung penyerta (p -value = 0,011) terhadap kejadian dekompresi pada nelayan penyelam tradisional di Pulau Barrang Lompo. Tidak ada pengaruh lama menyelam dan kedalaman menyelam serta ada pengaruh riwayat penyakit jantung penyerta terhadap kejadian dekompresi

No.	Tahun	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
						pada nelayan penyelam tradisional di Pulau Barrang Lompo.
10.	2022	Chanon Kongkamol, Piyada Kongkamol, Chutima Phanlamai, Pornchai Sathirapanya & Chutarat Sathirapanya (Kongkamol et al., 2023)	<i>Role of health locus of control in preventing occupational decompression sickness among deep-sea fisherman divers</i>	Indeks massa tubuh (BMI), alkohol konsumsi, kedalaman penyelaman, durasi waktu di laut/ penyelaman, tingkat keyakinan pada HLC dan praktik penyelaman		Indeks massa tubuh (BMI), alkohol konsumsi, kedalaman penyelaman, durasi waktu di laut/penyelaman, tingkat keyakinan pada HLC dan praktik penyelaman reguler secara signifikan terkait dengan DCS ($p < 0,05$). Sedangkan tingkat kepercayaan pada EHLC memiliki korelasi terbalik yang signifikan sedang dengan tingkat pengetahuan penyelaman yang aman dan praktik penyelaman yang teratur ($p < 0,001$).

H. Perbedaan Penelitian

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara studi ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada elemen yang di observasi dan tempat pelaksanaan riset. Penelitian sebelumnya sebagian besar dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo, Makassar. Sementara studi ini merupakan upaya pertama yang dilakukan di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Selain itu, aspek tambahan dalam penelitian ini adalah inklusi variabel baru seperti status gizi dan analisisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyelaman

1. Defenisi Penyelaman

Menyelam adalah aktivitas fisik yang dilakukan oleh manusia di dalam air, baik dengan atau tanpa bantuan peralatan, dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Saat terlibat dalam kegiatan menyelam, tubuh manusia berada di lingkungan bawah permukaan air, yang memiliki tekanan yang lebih besar daripada tekanan udara di atas permukaan. Tekanan ini terus meningkat sejalan dengan peningkatan kedalaman penyelaman. Pada permukaan laut, tekanan atmosfer adalah 1 atm (760 mm Hg atau 14,7 psi atau 100 kPa), dan tekanan ini akan meningkat sebesar 1 atm secara konsisten setiap 10 meter (33 kaki) dalam kedalaman air laut (Arbanto et al., 2018).

Pada mulanya, aktivitas penyelaman dilakukan dengan metode yang sangat primitif, yaitu dengan memanfaatkan batu yang memiliki berat. Setelah proses penyelaman selesai, tali yang terikat pada batu akan ditarik untuk mengangkat penyelam kembali ke atas permukaan air. Dalam proses ini, ada seseorang pembantu yang membantu menarik penyelam ke atas. Inilah yang kemudian diakui sebagai penyelaman tradisional, di mana nelayan yang melakukan penangkapan ikan melalui penyelaman dikenal sebagai penyelam tradisional atau penyelam menggunakan kompresor. Allah Swt berfirman dalam QS An-Nahl/16: 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ
فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

” Dan Dia-lah, Allah Swt yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur “ (Kementerian Agama RI).

Dialah yang menundukan lautan untuk melayani kepentingan kalian . kalian dapat menangkap ikan- ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Selain itu kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, wahai orang-orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah Swt menundukan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukan untuk melayani kepentingan kalian (Shihab, 2023).

Allah Swt telah menundukkan lautan, memungkinkan perahu dapat melintas dan manusia dapat menyelam guna memanfaatkannya sebagai sumber rezeki. Namun, Allah Swt juga menitipkan pesan agar manusia tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatannya. Apabila seseorang menyelam tanpa memperhatikan keselamatan, hal tersebut dapat menimbulkan penyakit dan risiko akibat penyelaman.

2. Macam-Macam Jenis Penyelaman

a. Penyelaman Scuba

Scuba diving merupakan aktivitas di dalam air yang melibatkan penggunaan perangkat bernafas mandiri di bawah permukaan air, yang dikenal sebagai *Self Contained Underwater Breathing Apparatus* (SCUBA). Jacques Cousteau adalah perancang pertama dari alat ini. Dalam sistem SCUBA, udara yang ditekan tinggi dimasukkan ke dalam tangki udara, lalu tekanannya dikurangi, disaring, dan diperkecil sehingga bisa dihirup seperti proses pernapasan di atas permukaan air. Aktivitas menyelam dengan *scuba course* merupakan kegiatan yang populer di kalangan penyelam *deep diving*. Keterampilan yang diperoleh dari *scuba course* dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. *Scuba diving course* dapat digunakan dalam konteks tugas-tugas tempur dan operasi kemanusiaan, seperti operasi Pencarian dan Penyelamatan (*Search and Rescue, SAR*). Jenis penyelaman ini umumnya dilakukan oleh instansi militer.

b. Penyelaman Komersial

Penyelaman komersial ialah bentuk aktivitas menyelam yang dijalankan oleh penyelam berpengalaman, dengan tujuan untuk melaksanakan berbagai tugas di bawah permukaan air, seperti konstruksi di wilayah laut, pengambilan sumber daya di perairan lepas pantai, pemulihan kapal yang tenggelam, serta beraneka ragam aktivitas lainnya. Agar dapat mengambil bagian dalam pelatihan kursus penyelaman *deep diving* ini,

calon peserta diharuskan mendaftar di institusi khusus yang memberikan latihan kepada calon penyelam komersial.

c. Penyelaman Ilmiah

Penyelaman Ilmiah merupakan jenis penyelaman yang dilakukan dengan maksud untuk mendukung perkembangan pengetahuan dalam lingkungan bawah air, termasuk penelitian, kajian biologi laut, geologi, ilmu kedokteran hiperbarik, arkeologi, dan bidang ilmu kelautan lainnya. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ekosistem laut dan peristiwa yang terjadi di bawah permukaan air.

d. Penyelaman Olahraga

Penyelaman olah raga atau rekreasi (*sport/recreation diving*) adalah jenis kursus penyelaman dengan penggunaan peralatan scuba ini menjadi sangat populer, karena selain berperan sebagai aktivitas olahraga, juga berfungsi sebagai cara rekreasi dan perjalanan wisata di lingkungan bawah air (Koesdianasari, 2019).

3. Prosedur Penyelaman

a. Perencanaan kegiatan menyelam

- 1) Menetapkan jadwal waktu dan lokasi penyelaman
- 2) Mengidentifikasi kedalaman yang akan dicapai dalam penyelaman
- 3) Menentukan durasi waktu di dasar laut (*bottom time*)
- 4) Mengatur anggota yang akan membantu di permukaan (*tender*)

b. Pemeriksaan peralatan penyelaman

c. Memeriksa dan memastikan keamanan lokasi penyelaman

- d. Melaksanakan penyelaman sesuai rencana
 - 1) Turun ke dalam air dengan menjaga keseimbangan tekanan (ekualisasi).
 - 2) Melakukan tugas yang telah direncanakan pada kedalaman yang sesuai
 - 3) Kembali ke permukaan sesuai prosedur dekompresi
- e. Melakukan penyelaman berulang secara berurutan memiliki risiko yang signifikan. Jika diperlukan, disarankan untuk mempertimbangkan interval waktu antara penyelaman pertama dan berikutnya, serta memperhatikan lamanya waktu penyelaman dengan merujuk pada tabel penyelaman berulang.

4. Alat selam dan kegunaannya

Alat selam dibedakan berdasarkan kegunaannya menurut (Lucrezi et al., 2018):

- a. Masker (*Face Mask*)

Fungsi dari masker ini adalah agar menghindari masuknya air ke dalam hidung dan mata, serta memberikan perlindungan dari bahan-bahan yang mengganggu dan berpotensi menyebabkan iritasi atau inflamasi. Tidak hanya itu, masker juga memungkinkan penglihatan yang jelas di bawah air. Disarankan untuk memilih masker yang memiliki kaca *tempered*, sementara disarankan menghindari masker yang terbuat dari bahan plastik.

- b. Snorkel

Snorkel adalah perangkat utama untuk bertahan yang digunakan oleh penyelam renang permukaan dan penyelam selam. Dengan snorkel, kita dapat menikmati pemandangan di bawah laut dengan cara berenang sambil memiringkan wajah ke

dalam air, tanpa perlu mengangkat kepala untuk bernapas. *Snorkel* membantu kita berenang menuju lokasi penyelaman tanpa perlu menggantungkan diri pada pasokan udara dari tangki penyelaman.

c. Sabuk pemberat

Umumnya, penyelam menggunakan beberapa beban tambahan untuk menjaga keseimbangan sesuai dengan keperluan. Beban tersebut umumnya terbuat dari timah atau logam lainnya. Sabuk beban dirancang agar bisa dibuka dengan mudah, sehingga dalam situasi darurat, penyelam dapat dengan cepat melepaskan sabuk beban hanya dengan satu tangan, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan setiap kali mengenakan sabuk tersebut.

d. Peralatan apung atau "*Buoyance control device*" (BCD)

Bouyance Vest atau perangkat apung merupakan komponen yang sangat penting bagi seorang penyelam. Fungsi alat ini dapat dikelompokkan menjadi empat tujuan utama, yaitu:

- a) Untuk menghasilkan daya apung positif (*positive buoyancy*) saat bergerak di atas permukaan air.
- b) Untuk memberikan keberhasilan melayang, atau sebagai penopang bagi seorang penyelam yang menghadapi situasi darurat.
- c) Untuk menciptakan kondisi keseimbangan melayang yang netral (*Neutral Buoyancy*) yang dapat diatur dengan baik di dalam air ketika daya apung

dari pakaian selam (*wet suit*) atau tas koleksi (*collecting bag*) mengalami penurunan.

d) Untuk mengembangkan keterampilan dalam memberikan pertolongan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

e. Tabung selam (*Aqualung*)

Sebuah wadah atau tabung udara yang dirancang untuk menyimpan udara yang telah dikompres dengan aman. Tabung-tabung ini biasanya terbuat dari bahan baja atau paduan aluminium dan tersedia dalam berbagai ukuran. Biasanya, peralatan penyelaman yang digunakan adalah "*open circuit scuba*" di mana udara pernapasan dikeluarkan langsung ke dalam air. Terdapat pula varian peralatan selam seperti "*semi closed circuit scuba*" dan "*closed circuit scuba*." Dalam "*closed circuit scuba*," udara yang dikeluarkan (CO_2) tidak dibuang ke lingkungan, melainkan melalui proses kimia tertentu diubah kembali menjadi oksigen (O_2) dan digunakan kembali untuk proses pernapasan. Ini mengakibatkan tidak adanya gelembung udara yang terlihat saat keluar. "*Closed circuit scuba*" umumnya dipakai oleh personel militer dalam misi intelijen dan dalam fotografi bawah air yang profesional. Aktivitas penyelaman menggunakan "*closed circuit scuba*" dibatasi pada kedalaman maksimal 10 meter dan paling banyak 14 meter ($\text{PO}_2 = 2,4 \text{ ATA}$) untuk mencegah risiko keracunan oksigen, karena sistem ini menggunakan oksigen murni. Biasanya, risiko keracunan oksigen muncul saat $\text{PO}_2 = 2 \text{ ATA}$.

f. *Back pack*

Backpack merupakan perangkat yang digunakan untuk menyangga scuba agar tetap nyaman saat digunakan di punggung penyelam. Terdapat pula jenis "*backpack*" yang dapat dipasang secara langsung pada BCD (*Buoyancy Control Device*).

g. *Regulator*

Regulator merupakan perangkat yang mengatur aliran udara dari tangki (*Aqualung*) ke penyelam, sehingga keluaran udara disesuaikan sesuai dengan keperluan.

h. *Pressure gauge*

Pressure gauge adalah alat untuk mengukur tekanan udara di dalam perangkat penyelam, sehingga informasi tentang berapa banyak atmosfer/PSI udara yang terkandung dalam tabung dapat diketahui.

i. *Depth gauge*

Depth gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman, sehingga dapat diketahui seberapa dalam penyelaman yang dilakukan. Hal ini bermanfaat bagi penyelam dalam menghitung waktu dekompresi yang diperlukan.

j. Pisau selam

Pisau selam tidak difungsikan sebagai senjata oleh penyelam, melainkan merupakan alat yang sangat penting untuk aktivitas seperti memotong tali, menggali, atau menghilangkan sisa-sisa jaring nelayan yang dapat mengganggu penyelam. Janganlah memegang pisau saat berenang, sebaiknya letakkan pisau kembali ke

sarungnya dan pasang di salah satu kaki di bawah lutut untuk menjaga keselamatan.

Terdapat beragam pilihan ukuran dan bentuk pisau selam yang tersedia.

k. *Fins* (sirip renang)

Sirip renang dirancang untuk memberikan daya dorong pada kaki dan merupakan perangkat yang dapat meningkatkan efisiensi renang kita hingga sepuluh kali lipat. Namun, perlu diperhatikan bahwa sirip renang tidak dirancang untuk meningkatkan kecepatan renang. Terdapat dua jenis sirip renang, yaitu "*open heel*" dan "*foot pocket*".

l. Baju selam

Terdapat dua jenis pakaian selam, yaitu "*wet suit*" dan "*dry suit*". Pakaian selam ini memiliki peran penting dalam menjaga tubuh dari suhu dingin air, sehingga membantu mencegah terlalu banyaknya hilangnya panas tubuh. Selain itu, pakaian selam juga berperan sebagai perlindungan terhadap gigitan hewan berbisa dan beracun, serta dapat melindungi kulit dari sentuhan dengan batu karang atau objek tajam lainnya.

m. Jam selam (*diving watch*)

Jam selam berperan dalam mengukur durasi penyelaman untuk menghindari terjadinya dekompresi.

Di samping peralatan yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat berbagai perlengkapan lain seperti kompas penyelaman, senter, sarung tangan, sepatu khusus untuk melindungi dari karang, bendera penyelam, tas untuk peralatan, pelampung dan tali, buku catatan (*log book*), dan tabel dekompresi.

5. Penyakit akibat penyelaman

Kegiatan penyelaman selalu melibatkan potensi risiko, baik dari perubahan tekanan, suhu air, maupun faktor-faktor lain yang ada di lingkungan bawah air. Beberapa kondisi kesehatan yang bisa terjadi akibat penyelaman diuraikan di bawah ini (Zheng et al., 2018) :

a. Barotrauma

Barotrauma adalah efek yang timbul akibat perubahan tekanan yang drastis, yang dapat mengakibatkan kontraksi yang kuat dan merusak jaringan tubuh. Ini terjadi karena tubuh tidak mampu mengatur tekanan udara atau gas yang terperangkap di dalam rongga udara dalam tubuh penyelam, sehingga tidak sejalan dengan tekanan absolut yang dialami oleh penyelam. Barotrauma terjadi ketika penyelam turun ke permukaan (tekanan meningkat, volume udara berkurang) atau ketika penyelam naik ke permukaan (tekanan menurun, volume udara bertambah sesuai Hukum Boyle).

Gejala umum dari barotrauma mencakup perasaan sakit yang sering kali diikuti oleh pendarahan dari rongga udara yang terkena dampak barotrauma, pendarahan ini sering kali luput dari perhatian penyelam. Nyeri pada telinga juga menjadi indikasi sensitif bahwa penyesuaian tubuh terhadap perubahan tekanan belum berjalan dengan optimal.

1) Barotrauma Sinus

Di tengkorak manusia terdapat ruang-ruang udara (sinus) yang biasanya memiliki saluran yang menghubungkan dengan tenggorokan. Kendala dalam

menyeimbangkan tekanan udara di dalam sinus dapat mengakibatkan pendarahan dan sensasi nyeri pada sinus yang terdampak.

2) Barotrauma masker

Situasi ini biasanya terjadi saat penyelam tengah melakukan penyelaman turun dan tidak melepaskan udara dari dalam masker. Saat daya regangan pada masker mencapai titik maksimal, usaha untuk menyeimbangkan tekanan udara dalam masker bisa mengakibatkan jaringan lunak di wajah terhisap ke dalam masker. Akibatnya, kemungkinan akan timbul pembengkakan dan perubahan warna (perdarahan) pada bagian putih mata dan kelopak mata, bersamaan dengan sensasi rasa sakit atau tekanan pada kulit wajah yang bersentuhan dengan masker.

3) Barotrauma gigi

Barotrauma pada gigi terjadi saat ada lubang pada gigi (karies), yang menghasilkan sensasi sakit pada gigi (terutama ketika melakukan penyelaman) dan dapat menyebabkan pendarahan.

4) Barotrauma paru-paru

Pada kedalaman tertentu, paru-paru penyelam berisi udara yang terkompresi di bawah tekanan yang sebanding dengan tekanan absolut di kedalaman tersebut. Jika penyelam tiba-tiba naik dengan cepat ke permukaan (*Emergency Swimming Ascent Blow Up*) tanpa mengendalikan dan melepaskan napas atau udara, ketika mencapai permukaan, udara dalam paru-paru akan membesar dengan cepat tanpa dinding dada yang seimbang, yang dapat menyebabkan paru-paru pecah.

5) Barotrauma usus

Kejadian ini umumnya dialami oleh penyelam yang masih pemula. Hal ini disebabkan karena mereka seringkali secara tidak sengaja menelan udara saat melakukan ekualisasi tekanan atau bernapas melalui regulator. Ketika naik ke permukaan, udara yang tertelan dengan tekanan tinggi tadi akan mengembang dan bisa menyebabkan rasa kembung, nyeri perut, atau bahkan mual. Penyebab lain yang dapat mengakibatkan situasi tersebut adalah minum minuman berkarbonasi sebelum melakukan penyelaman.

b. Keracunan

1) Keracunan gas pernapasan

Umumnya, insiden semacam ini terjadi pada para penyelam ketika mereka berada di kedalaman laut, baik itu di dasar laut maupun saat mereka sedang berenang menuju kedalaman. Seiring dengan meningkatnya kedalaman penyelaman, tekanan parsial gas pernapasan yang masuk ke dalam jaringan tubuh juga akan semakin meningkat. Pada individu yang lebih sensitif, paparan tekanan parsial gas yang tinggi dapat mengakibatkan keracunan gas. Maka dari itu, dalam penyelaman di kedalaman laut yang lebih besar, sering kali digunakan kombinasi gas seperti Nitrox (Nitrogen-Oksigen), Heliox (Helium-Oksigen), dan bahkan terdapat pula campuran tiga jenis gas, yakni Helium-Nitrogen-Oksigen.

2) Keracunan Nitrogen (*Nitrogen Narcosis*)

Tingkat keracunan nitrogen dapat timbul saat mencapai kedalaman 30 meter atau lebih ($PN_2 = 3,2 \text{ ATA}$), dengan gejala yang menyerupai dampak mabuk akibat

alkohol. Lebih lanjut, setiap kenaikan kedalaman sebesar 10 meter, gejala keracunan akan mengalami peningkatan yang lebih parah.

Batas konsentrasi PN₂ yang menyebabkan Nitrogen Narcosis bervariasi antara penyelam, tergantung pada kondisi fisik mereka sebelum melakukan penyelaman. Faktor-faktor seperti suhu air laut yang dingin, aktivitas fisik yang berat dalam air, rasa cemas, kurangnya pengalaman, tingkat oksigen yang rendah, dan tingkat karbondioksida yang tinggi dalam udara pernapasan dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan nitrogen.

3) Keracunan Oksigen (*Oxygen Toxicity*)

Keracunan ini umumnya terjadi saat penyelam berada dalam penyelaman yang dalam (90 meter dengan campuran udara normal) atau pada kedalaman 10 meter jika penyelam menggunakan oksigen murni. Tanda-tanda gejalanya meliputi mual atau muntah, pusing, gangguan penglihatan atau pendengaran, perasaan bingung, kejang ringan pada otot-otot wajah dan bibir, serta hilangnya ingatan setelah kejang.

4) Keracunan Karbondioksida (CO₂)

Jika udara segar yang memasuki kompresor (saat mengisi tabung) terkontaminasi oleh gas CO₂ dari mesin atau pabrik, akibatnya penyelam dapat mengalami keracunan. Gejala yang muncul termasuk kesulitan bernapas (napas pendek, cepat, dalam, dan berat), denyutan di area dahi, sensasi kepala ringan, kejang-kejang, penglihatan yang menurun, dan dalam kasus yang parah, jantung dan pernapasan dapat berhenti, yang pada akhirnya bisa berujung pada kematian.

5) Keracunan Karbonmonoksida (CO)

Akibat dari proses pembakaran yang tidak optimal dalam mesin kompresor, udara yang digunakan dalam scuba dapat terkontaminasi oleh gas karbon monoksida (CO), atau udara atmosfer juga dapat tercemar oleh gas CO dari mesin-mesin lain atau pabrik/industri. Sebagai hasilnya, udara yang dikompresikan ke dalam scuba dapat mengandung tingkat yang tinggi gas CO. Jika terjadi hal ini, dapat berdampak buruk bagi penyelam, seperti timbulnya sakit kepala, napas yang pendek, gangguan mental, mual, kehilangan kemampuan bergerak, kehilangan kesadaran, dan bahkan berpotensi berujung pada kematian.

c. Berbagai bahaya lain

Selain kondisi kesehatan yang telah disebutkan, ada pula beberapa situasi yang dapat dihadapi oleh penyelam dari berbagai jenis penyelaman. Contohnya, risiko serangan oleh binatang laut yang berbahaya, baik yang memiliki bisa maupun yang mengandung racun. Ada binatang laut yang mengigit, namun ada juga yang menyengat. Luka yang diakibatkan oleh gigitan binatang laut saat penyelaman bisa mengakibatkan perdarahan yang parah dan berpotensi berujung pada kematian.

Tenggelam merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh semua individu yang terlibat dalam aktivitas air, dan hal ini sering kali mengakibatkan kematian karena air masuk ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, untuk semua calon penyelam dan penyelam yang sudah berpengalaman, penting untuk memiliki kemampuan berenang, dan sangat disarankan bagi semua penyelam untuk menggunakan rompi apung yang

dilengkapi dengan tabung CO₂ atau yang terhubung dengan perangkat scuba, sehingga dapat dengan cepat mengembang dalam situasi darurat.

6. Konsep Equalisasi

Teknik equalisasi melibatkan tindakan membuka ujung saluran *Eustachio*, memungkinkan udara masuk ke dalam rongga telinga dengan tujuan untuk menyeimbangkan tekanan udara eksternal saat sedang dalam proses menyelam (Farida et al., 2020). Teknik equalisasi terdiri dari:

- a. Metode Tounbee, menutup hidung dan menelan saat melakukan penyelaman untuk mengimbangi tekanan lingkungan
- b. Metode Frenzel, menutup hidung dan mengatur posisi tenggorokan sedemikian rupa sehingga saat mengucapkan huruf “k” lidah akan menekan palatum dan membuka tuba Eustachian.
- c. Teknik Lowry, menutup hidung, meniup, dan menelan secara bersamaan.
- d. Teknik Edmonds, menutup hidung, meniup, dan menekan rahang secara bersamaan. Ini menyebabkan otot rahang menegang dan mendorongnya ke depan.
- e. Metode Valsavah, menutup hidung dan mulut lalu meniup pipi dengan tekanan ekspirasi paksa. Ini meningkatkan tekanan dalam ruang udara dan memungkinkan udara masuk ke kedua tabung Eustachian, mendorong rongga telinga tengah dan membrane timpani menjadi menonjol.

Penerapan metode equalisasi secara efektif sangat bermanfaat bagi penyelam tradisional untuk menyeimbangkan tekanan antara lingkungan luar dan dalam tubuh,

sehingga membantu mencegah terjadinya barotrauma. Penyelam tradisional yang ingin menjalankan penyelaman dengan aman sebaiknya memperhatikan pedoman-pedoman berikut ini:

- a. Perhatikan suara “plop” atau “klik” saat melakukan equalisasi, jika penyelam bias mendengar suara tersebut dari kedua telinga, maka tindakan equalisasi berhasil dilakukan.
- b. Sebelum melakukan penyelaman, disarankan bagi penyelam untuk mengimbangi tekanan beberapa menit dengan menguyah permen atau menggerakkan rahang.
- c. Saat mencapai kedalaman lebih dari 10 meter, segera lakukan equalisasi untuk mencegah terjadinya barotrauma.
- d. Melakukan equalisasi secara rutin selama menyelam dapat mempertahankan tekanan positif kecil di telinga tengah.
- e. Sebaiknya hentikan equalisasi jika timbul sensasi nyeri atau rasa tidak nyaman pada telinga atau hidung.
- f. Disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol dan merokok sebelum melakukan penyelaman (Farida et al., 2020).

B. Tinjauan Tentang Dekompresi

1. Defenisi Penyakit Dekompresi

Dekompresi adalah suatu kondisi medis yang diakibatkan oleh pelepasan dan ekspansi gelembung-gas ketika gas-gas tersebut keluar dari larutan dalam darah atau

jaringan akibat perubahan tekanan di sekitarnya. Keadaan ini timbul saat terjadi penurunan tekanan secara mendadak setelah penyelaman. Tingkat keparahan dekompresi terkait dengan jumlah gelembung yang terbentuk; apabila jumlahnya sedikit, gejalanya cenderung ringan. Namun, jika terbentuk gelembung dalam jumlah besar, hal ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem organ ganda bahkan berujung pada kematian.

Dekompresi terjadi saat penyelam berada dalam air dalam penyelaman, yang mengakibatkan peningkatan tekanan di sekitar mereka. Pada saat ini, jumlah udara yang dihirup oleh penyelam (terdiri dari oksigen dan nitrogen) meningkat dari kondisi normal. Peningkatan kandungan oksigen dalam pernapasan ini memiliki efek positif pada metabolisme tubuh. Namun, gas nitrogen yang juga dihirup oleh tubuh tidak terpakai dan akhirnya mengumpul di dalam tubuh penyelam sesuai proporsi yang ada (Lemaitare, 2018). Nitrogen yang telah terakumulasi dalam tubuh akan dilepaskan dalam bentuk gelembung udara, sebagai hasil dari penurunan atau perubahan tekanan yang tiba-tiba terjadi. Ketika tekanan secara drastis menurun, kelarutan gas tidak lagi terjaga dengan cukup, sehingga menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung udara ini. Gelembung-gelembung tersebut berpotensi menyebabkan emboli, yang dapat menyumbat aliran darah dan sistem saraf dalam tubuh manusia (Nura FLA, 2017). Dampak paling serius dari sindrom dekompresi adalah kemampuan tubuh penyelam menjadi lumpuh, yang bisa mengakibatkan penurunan produktivitas secara signifikan, masalah kesehatan yang serius, cacat seumur hidup, dan bahkan kematian (Ardiansyah et al., 2021).


2. Patofisiologi Penyakit Dekompresi

Beberapa prinsip fisika membantu menjelaskan patofisiologi dari sindrom dekompresi. Hukum Boyle menjelaskan bahwa volume dan tekanan memiliki hubungan terbalik. Volume gas akan berkurang setengahnya ketika tekanan absolut meningkat dua kali lipat. Berdasarkan hukum Boyle, perubahan volume relatif dari 2 hingga 3 atmosfer absolut (ATA), setara dengan 33 hingga 66 fsw (*feet of sea water*, kaki di bawah permukaan laut), lebih besar dibandingkan dengan perubahan tekanan dari 1 hingga 2 ATA (tekanan permukaan hingga 33 fsw), sehingga perubahan volume cenderung lebih signifikan mendekati permukaan.

Hukum Henry menyatakan bahwa tekanan parsial gas pada suhu konstan mempengaruhi kelarutan gas dalam jaringan. Ketika tekanan lingkungan meningkat, konsentrasi kelarutan gas dalam darah dan jaringan juga meningkat. Selain tekanan parsial, solubilitas juga turut menentukan kelarutan gas.

Penyakit dekompresi dimulai dengan pembentukan dan peningkatan jumlah gelembung gas (supersaturasi) di dalam dan di luar pembuluh darah, ketika tekanan gas terlarut seperti oksigen, karbondioksida, nitrogen, dan helium, bersama dengan uap air, melebihi tekanan absolut lokal. Gerakan tiba-tiba ke tekanan yang lebih rendah menyebabkan tingkat pembentukan gas inert tidak seimbang dengan laju penghapusan gas tersebut. Proses transfer gas ke dalam jaringan adalah dinamis, memerlukan waktu untuk mencapai keseimbangan antara jaringan dan tekanan parsial gas di sekitarnya. Konsentrasi gas di dalam jaringan mencapai keseimbangannya dalam beberapa periode waktu pada setiap tekanan parsial yang dihadapi dalam lingkungan.

Supersaturasi gas inert juga bisa terjadi saat naik ke ketinggian (*altitude*), misalnya saat naik pesawat yang meningkatkan ketinggian di dalam atmosfer. Pembentukan gelembung gas dalam situasi ini berasal dari gas terlarut yang sudah ada ketika berada di permukaan laut. Kondisi ini dikenal sebagai altitude decompression sickness. Beberapa penelitian terbaru menduga bahwa mikropartikel dalam darah mungkin juga memainkan peran dalam membentuk nidus untuk pembentukan gelembung gas dalam darah.



Gambar 2. 1 Ilustrasi *decompression sickness* dan emboli gas arteri

Tidak seperti penyakit dekompresi, emboli gas arteri terjadi akibat gas pada kapiler paru-paru meregang dan pecah, sehingga menyebabkan gas di alveoli masuk ke dalam sirkulasi arteri dan membentuk emboli dalam jaringan (seperti yang ditunjukkan dalam gambar 1). Emboli gas arteri dapat timbul saat penyelam naik ke permukaan (*ascent*), terutama ketika kapasitas paru-paru mendekati kapasitas paru-paru total, misalnya saat menahan napas. Kecepatan naik yang melebihi 30 kaki per menit

meningkatkan risiko terjadinya barotrauma. Peningkatan tekanan intrapulmonal yang menghasilkan gradien transpulmonal sekitar 95 hingga 110 cm H₂O dapat merusak dinding alveoli.

Gas yang dilepaskan ke dalam ruang interstisial paru-paru dapat memasuki mediastinum dan menyebabkan emfisema mediastinum. Jika gas masuk ke dalam rongga pleura, ini bisa menyebabkan pneumotoraks. Gas interstisial yang terkumpul sepanjang esofagus juga bisa menyebabkan pneumoperitoneum. Terjadi emfisema subkutan pada leher ketika gas masuk melalui mediastinum dan menyebar ke jaringan servikal.

Dalam konteks menyelam, ada juga kondisi lain yang mungkin terjadi, seperti narkosis nitrogen. Menghirup udara pada tekanan yang melebihi 4 ATA dapat menginduksi narkosis nitrogen. Tekanan parsial nitrogen yang tinggi dapat mengakibatkan gangguan neurologis yang termanifestasi sebagai gangguan kognitif, koordinasi motorik yang menurun, gangguan emosional, dan bahkan gangguan kesadaran. Kekuatan narkosis yang dihasilkan oleh gas inert ditentukan oleh kelarutannya dalam lemak.

Paru-paru memainkan peran penting dalam melindungi organ-organ lain dari efek patofisiologi penyakit dekompresi dengan cara menyaring gelembung-gelembung gas yang terbentuk di dalam atau melalui paru-paru. Meskipun demikian, filtrasi ini dapat terjadi dalam situasi tertentu. Adanya jalur pintasan, seperti kebocoran pada septum atrium atau foramen ovale paten, bersama dengan kondisi hipoksia yang dapat

membuka anastomosis intrapulmonal, dapat memungkinkan gelembung-gelembung gas dalam sirkulasi vena masuk ke dalam sirkulasi arteri (Rai et al., 2019).

3. Faktor Risiko Penyakit Dekompresi

Kemunculan penyakit dekompresi pada setiap individu sulit diprediksi, tetapi beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diidentifikasi. Faktor predisposisi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu faktor lingkungan dan faktor individual. Faktor lingkungan yang diketahui meningkatkan risiko penyakit dekompresi meliputi rasio reduksi tekanan yang tinggi, paparan berulang dalam rentang waktu yang singkat, kecepatan naik yang tinggi (*ascent rate*), serta kegiatan menyelam yang dilakukan sebelum penerbangan dalam waktu yang singkat.

Beberapa faktor individual yang dapat meningkatkan risiko penyakit dekompresi adalah adanya kelainan pada septum atrium yang mengakibatkan aliran dari kiri ke kanan (*left-to-right shunt*). Selain itu, beberapa faktor lain juga telah diidentifikasi yang mungkin memiliki peran dalam meningkatkan risiko penyakit dekompresi, seperti: kekurangan cairan tubuh (dehidrasi), adanya foramen ovale paten, usia, riwayat cedera sebelumnya, suhu lingkungan, struktur tubuh (terutama dengan persentase lemak tubuh yang tinggi), dan konsumsi alkohol (Rai et al., 2019).

4. Klasifikasi Penyakit Dekompresi

Klasifikasi yang sering digunakan untuk penyakit dekompresi adalah klasifikasi Golding. Klasifikasi ini mengelompokkan penyakit dekompresi menjadi dua jenis:

a. Tipe I atau tipe minor dari penyakit dekompresi mengacu pada kasus dengan gejala konstitusional yang ringan dan terbatas pada kulit, sistem muskuloskeletal, atau sistem limfatik. Gejala tipe I termasuk nyeri pada sendi (muskuloskeletal), serta gejala yang melibatkan kulit (*cutaneous*), seperti pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening. Nyeri sendi merupakan gejala yang paling umum muncul pada penyakit dekompresi, dengan intensitas nyeri bervariasi dari ringan hingga sangat parah. Area tubuh yang paling sering terkena nyeri meliputi bahu, siku, pergelangan tangan, tangan, lutut, dan pergelangan kaki.

Karakteristik nyeri tipe I berkembang secara perlahan dan jika tidak diperhatikan, sulit untuk diidentifikasi lokasinya. Nyeri dapat terjadi pada sendi atau otot, dan intensitasnya dapat meningkat seiring waktu. Nyeri ini sering digambarkan sebagai sensasi tumpul dan mendalam. Ciri khas dari tipe I adalah sifat nyerinya yang terlokalisasi pada area tertentu. Gejala yang umum terjadi pada kulit meliputi rasa gatal dan mungkin disertai ruam. Kulit juga mungkin tampak lebih tebal dengan gatal yang berangsur-angsur menjadi kemerahan (U.S Navy, 2008 dalam Syamila, 2017).

b. Tipe II atau tipe mayor adalah bentuk *decompression sickness* yang memiliki dampak yang lebih menyeluruh pada sistem tubuh seperti sistem saraf pusat, sistem kardiovaskular, atau sistem pernapasan. Prognosis untuk *decompression sickness* tipe II umumnya lebih serius. Selain klasifikasi yang disebutkan oleh Golding, ada juga pembagian lain berdasarkan gejala yang muncul, seperti bends (nyeri pada tulang dan sendi), chokes (masalah kardiopulmonal), dan *staggers* (masalah pada sistem saraf) (Rai et al., 2019).

5. Manifestasi Klinis Penyakit Dekompresi

Variasi yang signifikan dalam gejala dan tanda *decompression sickness* membuat diagnosisnya menjadi cukup menantang. Diagnosis biasanya didasarkan pada gejala klinis yang muncul, dengan memperhatikan riwayat penyelaman dan pemeriksaan fisik yang teliti. Pada individu yang mengalami gejala setelah melakukan penyelaman atau terpapar ketinggian, proses diagnosis dapat menjadi lebih terarah. Setiap gejala yang muncul segera setelah dekompresi harus dipertimbangkan sebagai kemungkinan *decompression sickness*.

Gejala *decompression sickness* lebih umum terjadi pada sistem muskuloskeletal dan sistem saraf. Gejala pada paru-paru atau yang sering disebut "*choke*" bisa mencakup sensasi tidak nyaman dan terbakar di area dada saat bernafas, batuk yang tidak menghasilkan dahak dan bisa menjadi paroksismal, serta kesulitan bernapas yang parah. Gejala ini terjadi pada sekitar 2% dari total kasus *decompression sickness* dan dapat memiliki konsekuensi fatal. Gejala tersebut biasanya muncul sekitar 12 jam setelah paparan dan dapat berlangsung selama 12 hingga 48 jam.

Gejala umum atau konstitusional pada *decompression sickness* sering berupa sakit kepala dan perasaan tidak enak badan. Gejala yang terjadi pada sistem muskuloskeletal biasanya melibatkan sendi besar seperti siku, bahu, dan panggul. Rasa sakit bisa berkisar dari ringan hingga parah dan memiliki karakteristik tajam atau tumpul. Gerakan sendi, baik yang aktif maupun pasif, dapat memicu rasa sakit. Mengubah posisi sendi menjadi lebih nyaman dengan membungkuknya mungkin dapat meredakan rasa sakit. Pada kulit, gejala yang sering terjadi adalah rasa gatal, terutama

di daerah telinga, wajah, leher, lengan, dan bagian atas tubuh. Tidak jarang pula muncul sensasi seolah-olah ada serangga yang merayap di permukaan kulit, dan terkadang kulit dapat menjadi bercak merah atau memiliki tampilan seperti marmer, terutama di sekitar bahu, dada, dan perut.

Edema pitting bisa timbul dan diasosiasikan dengan gangguan pada sistem drainase limfatik. Tanda dan gejala *decompression sickness* pada sistem saraf dapat melibatkan baik otak maupun saraf tulang belakang. Pada otak, tanda dan gejala dapat mencakup sensasi kesemutan, kehilangan ingatan, gangguan penglihatan, perubahan suasana hati dan perilaku yang sulit dijelaskan, gangguan kesadaran, dan kejang. Pada saraf tulang belakang, tanda dan gejalanya mungkin berupa kelemahan atau kelumpuhan yang mulai dari kaki dan menjalar ke bagian tubuh yang lebih tinggi, kesulitan mengendalikan buang air kecil dan besar, serta perasaan tertekan di daerah perut dan/atau dada. Pada sistem audiovestibular, terutama pada telinga dalam, manifestasi klinis dari *decompression sickness* sering meliputi hilangnya keseimbangan, rasa pusing, mual dan muntah, serta penurunan fungsi pendengaran.

Tanda dan gejala yang mirip dengan *decompression sickness* pada paru adalah edema paru imersi. Kondisi ini sulit dibedakan karena memiliki keluhan serupa, seperti batuk dan kesulitan bernapas, sehingga edema paru imersi sering kali menjadi salah satu kemungkinan diagnosis selain *decompression sickness* pada paru. Namun, terdapat perbedaan dalam munculnya keluhan antara kedua kondisi tersebut. Edema paru imersi terjadi segera setelah penyelam mulai berada dalam air dan saat masih berada dalam

kedalaman. Sebaliknya, *decompression sickness* muncul saat penyelam naik ke permukaan atau setelah penyelaman dilakukan (Rai et al., 2019).

6. Pekerja yang Berisiko Menderita Penyakit Dekompresi

- a. Individu yang melakukan penyelaman menggunakan kompresor konvensional termasuk di antaranya para penyelam yang terlibat dalam penangkapan mutiara, eksplorasi biota laut, penyelam yang bekerja dalam penangkapan ikan moroami, serta pekerja yang memasang bubu di dalam air.
- b. Para penyelam yang menggunakan human kompresor (*profesional*) meliputi mereka yang terlibat dalam pemasangan pipa atau kabel di bawah air, personel militer yang melakukan penyelaman, serta pekerja yang beroperasi dalam kamar hiperbarik.
- c. Penyelaman kering biasanya dilakukan oleh pekerja di sektor tambang batubara dan pekerja yang terlibat dalam konstruksi terowongan bawah tanah dengan tekanan udara yang tinggi (Kemenkes, 2012).

7. Tatalaksana Penyakit Dekompresi

Penanganan *decompression sickness* melibatkan prosedur rekompresi menggunakan oksigen murni dalam lingkungan hiperbarik dengan tujuan mengurangi risiko kerusakan organ yang permanen. Tingkat keparahan penyakit dan lamanya waktu hingga rekompresi yang efektif akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Terapi oksigen hiperbarik dapat diulangi, meskipun belum ada batasan pasti mengenai jumlah kali pemberian terapi. Terapi dengan menggunakan campuran nitrogen-oksigen

(nitrox) atau helium-oksigen (heliox) mungkin digunakan untuk kasus penyelaman pada kedalaman lebih dari 60 kaki (2,8 ATA).

Jika gejala tidak membaik setelah terapi rekompresi pada kedalaman 60 kaki, disarankan untuk melakukan rekompresi hingga kedalaman 165 fsw (6 ATA). Sebelum menjalani terapi rekompresi, disarankan untuk memberikan oksigen murni pada tekanan 1 ATA sebagai langkah persiapan. Memberikan oksigen sebagai tindakan pertama telah terbukti memberikan manfaat, terutama saat berada dalam situasi yang jauh dari fasilitas perawatan hiperbarik. Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa waktu rata-rata pemberian oksigen sebagai pertolongan pertama adalah 4 jam setelah penyelam naik ke permukaan dan 2,2 jam setelah munculnya gejala *decompression sickness*.

Saat ini, tidak disarankan lagi untuk memposisikan penderita *decompression sickness* dalam posisi Tredelenburg. Posisi ini sebelumnya digunakan untuk mencegah emboli pada pembuluh darah otak, tetapi justru dapat meningkatkan tekanan intrakranial dan berpotensi menyebabkan kerusakan pada sawar darah otak. Pemberian cairan memiliki peranan penting terutama pada kasus yang berat. Penggunaan jalur intravena bisa dipertimbangkan, meskipun informasi klinis mengenai jenis dan volume cairan yang tepat masih terbatas. Penting untuk menghindari cairan yang mengandung glukosa dan larutan hipotonik karena dapat meningkatkan risiko edema intraselular. Harap dihindari pemberian cairan yang terlalu agresif guna mencegah beban berlebih pada paru-paru. Pada kasus yang lebih ringan, pemberian cairan melalui mulut bisa

dipertimbangkan. Parameter seperti *urine* spesifik dan hematokrit dapat membantu dalam memantau pemberian terapi cairan.

Terapi pendukung seperti obat anti mual dan obat penghilang rasa sakit dapat diberikan untuk meredakan gejala dan memberikan kenyamanan. Penggunaan obat antiplatelet direkomendasikan, meskipun data uji klinis mengenai efektivitasnya masih terbatas. Penelitian oleh Bennett dan rekannya menunjukkan adanya hubungan antara penggunaan obat anti-inflamasi non-steroid dengan pengurangan frekuensi terapi rekompresi, tetapi tidak memberikan dampak positif pada hasil akhir keseluruhan (Rai et al., 2019).

C. Tinjauan Tentang Lama Menyelam

Lamanya waktu penyelaman memiliki efek terhadap proses pelepasan dan penyerapan nitrogen dalam jaringan tubuh dengan kecepatan yang berbeda. Penyelaman yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau dilakukan secara tergesa-gesa dapat mengakibatkan penumpukan nitrogen yang signifikan di jaringan tubuh yang responsif terhadap perubahan tekanan. Penelitian yang dilakukan oleh Mansur Sididi & Rahman (2022) mengindikasikan bahwa individu yang melakukan penyelaman dalam waktu yang lebih lama memiliki risiko lebih tinggi mengalami *decompression sickness*, sekitar 47,1%. Faktor ini terjadi karena semakin lama seseorang melakukan penyelaman, semakin sering mereka harus menyesuaikan tekanan tubuh, yang berpotensi meningkatkan kemungkinan kegagalan dalam menyeimbangkan tekanan dan akhirnya memicu *decompression sickness*.

Di sisi lain, individu yang melakukan penyelaman dengan durasi lebih singkat dan tidak mengalami *decompression sickness* mencapai 52,9%. Hal ini karena mereka telah mengikuti tabel waktu standar yang sesuai dengan kemampuan penyelaman dalam air. Terdapat pula kelompok individu dengan durasi penyelaman yang lebih pendek, di mana tingkat kejadian *decompression sickness* mencapai 33,3%. Faktor ini dapat disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknik penyelaman dan penggunaan kompresor, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap kejadian *decompression sickness* (Sididi & Rahman, 2022).

Lama penyelaman memiliki pengaruh terhadap mekanisme absorpsi dan pelepasan nitrogen dalam jaringan tubuh, yang merespons dengan kecepatan berbeda. Penyelaman yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama menyebabkan akumulasi nitrogen yang signifikan dalam tubuh, dan ini dapat berkontribusi pada kemunculan *decompression sickness*. Semakin lama penyelaman dilakukan, semakin banyak nitrogen yang terakumulasi dalam tubuh, dan hal ini dapat menghasilkan gejala seperti kelemahan saat melakukan aktivitas di bawah air, sensasi pusing, serta kram pada beberapa bagian tubuh.

Dalam artikel "*Decompression Sickness*," Alfred A. Bove menjelaskan bahwa menghabiskan waktu yang lebih lama dalam penyelaman di lingkungan dengan tekanan yang signifikan dan potensi besar dapat menjadi faktor risiko terhadap masalah penyelaman, terutama dalam konteks dekompresi. Durasi penyelaman akan memengaruhi tekanan yang diterima oleh penyelam sesuai dengan kedalamannya.

Semakin lama penyelaman dilakukan, semakin besar tekanan yang akan dirasakan oleh penyelam (Embuai et al., 2020).

Durasi penyelaman yang lebih lama oleh penyelam kompresor ini sebagian besar disebabkan oleh upaya mereka dalam mencari teripang dan udang di kedalaman laut. Menariknya, meskipun teripang adalah biota laut yang cenderung merayap di dasar laut pada kedalaman antara 20 hingga 60 meter, tingkat penyelaman yang dilakukan tetap tinggi. Temuan ini konsisten dengan studi oleh Saraswati (2018) yang mengenai faktor risiko gejala penyakit dekompresi pada nelayan yang mencari ikan hias Laut di Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara durasi penyelaman dan munculnya gejala penyakit dekompresi pada nelayan yang menggunakan kompresor. Hasil ini berbeda dengan temuan dari penelitian Embuai et al., (2019) durasi penyelaman memengaruhi proses penyerapan dan pelepasan gas nitrogen dalam jaringan tubuh. Semakin banyak nitrogen yang diakumulasi oleh tubuh, maka semakin meningkat risiko seseorang mengalami penyakit dekompresi (Sididi & Rahman, 2022).

D. Tinjauan Tentang Penggunaan APD

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan faktor krusial bagi penyelam sebelum mereka memulai penyelaman. Pekerjaan sebagai nelayan penyelam memperlihatkan tingkat risiko yang signifikan. Para nelayan penyelam sering terlibat dalam berbagai bentuk penyelaman, seperti menggunakan kompresor untuk pasokan udara, penyelaman dengan menahan napas, serta berbagai bentuk penyelaman *scuba diving* (Luecke, 2022).

Penyelam tradisional adalah sekelompok nelayan yang sebagian besar mencari nafkah di laut. Namun, untuk penyelam tradisional di berbagai wilayah pesisir, beberapa menggunakan alat bantu seperti kompresor dalam penyelaman, sementara yang lain melakukannya tanpa peralatan khusus. Akibat dari aktivitas penyelaman ini, dampak yang paling serius adalah penyakit dekompresi dan penurunan kapasitas vital paru. Dalam setiap penyelaman, penting untuk menggunakan peralatan selam yang memenuhi standar keselamatan. Meskipun ada penyelaman yang dilakukan dengan alat yang sudah terstandar, ada juga kasus di mana penyelam tradisional melakukan penyelaman tanpa menggunakan peralatan khusus (Embuai et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parasetiyo (2015) mengindikasikan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan insiden penyakit dekompresi pada penyelam tradisional di Pulau Laelae, Kota Makassar. Hasil uji statistik menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,002, mengkonfirmasi adanya hubungan yang kuat antara kedua faktor tersebut (Azis et al., 2021).

Dalam Islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah Saw, Dalam Firman Allah Swt Keselamatan dalam bekerja disinggung dalam QS Al-Baqarah/2: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah SWT, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena

sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.“ (Kementerian Agama RI).

Dalam tafsir Quraish Shihab, dijelaskan sebagaimana berjihad bisa dilakukan dengan pengorbanan jiwa, ia juga dapat disalurkan lewat pengorbanan harta. Maka infakkanlah harta kalian untuk menyiapkan peperangan. Ketahuilah, memerangi mereka itu merupakan perang di jalan Allah Swt. Janganlah kalian berpangku tangan dan dermakanlah harta kalian untuk peperangan itu. Sebab, dengan berpangku tangan dan kikir mendermakan harta, berarti kalian rela dikusai dan dihina musuh. Itu sama artinya kalian menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Maka lakukanlah kewajiban kalian seserius dan sebaik mungkin. Sesungguhnya Allah Swt menyukai hamba-Nya yang melakukan suatu pekerjaan secara optimal (Shihab, 2023).

Salah satu cara Allah Swt melindungi umat Muslim adalah dengan menghilangkan faktor-faktor berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang tidak mengambil tindakan yang membawa risiko kecelakaan atau kebinasaan dengan mengabaikan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tidak menggunakan alat pelindung diri. Tindakan semacam itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang merugikan dan membahayakan diri sendiri, dan hal ini sejalan dengan tindakan yang membawa diri ke arah kehancuran.

E. Tinjauan Tentang Kedalaman Menyelam

Kedalaman penyelaman akan menyebabkan peningkatan tekanan yang semakin besar, yang pada gilirannya memiliki dampak yang lebih signifikan pada kesehatan penyelam. Saat tubuh manusia terkena tekanan air di kedalaman, tubuh akan mencoba

menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut. Namun, jika tubuh tidak dapat menyesuaikan diri dengan tekanan tersebut, maka dapat terjadi kondisi yang disebut "squeeze" atau trauma. *Squeeze* atau trauma ini biasanya terjadi pada penyelaman dengan kedalaman lebih dari 7 meter, dan risiko dekompresi dapat muncul pada kedalaman 12,5 meter. Selain itu, semakin dalam penyelaman, suhu air juga semakin dingin, yang dapat menyebabkan penyelam kehilangan panas tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan lain seperti kesemutan, kram, dan sejenisnya.

Kedalaman penyelaman hingga 10 meter dikaitkan dengan tingkat kejadian dekompresi sebanyak 0,55 kali. Faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap risiko dekompresi adalah penurunan suhu air laut (OR=2.1). Semakin rendah suhu air laut, risiko dekompresi pada penyelam meningkat sebanyak 2.1 kali. Secara alami, tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatasi zat beracun secara mandiri. Begitu juga ketika tubuh kita mengalami peningkatan nitrogen dalam jumlah normal, tubuh mampu mengaturnya dengan cepat melalui proses pernapasan. Selama kita tidak melakukan penyelaman terlalu lama atau terlalu dalam, serta naik ke permukaan dengan perlahan setelah menyelam, kadar nitrogen ini tidak menjadi masalah yang signifikan (Ardiansyah et al., 2021).

Penyelaman pada kedalaman yang melebihi 30 meter menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan dan keselamatan penyelam. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan penyelaman dengan mematuhi persyaratan tertentu dan menggunakan peralatan selam yang sesuai standar, seperti peralatan selam SCUBA. Di beberapa wilayah pesisir Indonesia, terdapat banyak penyelam tradisional yang

mencari hasil laut dan masih mengandalkan kompresor sebagai alat bantu penyelaman, bahkan sebagai pengganti peralatan selam SCUBA. Salah satu dampak nyata dari aktivitas penyelaman ini adalah munculnya penyakit dekompresi dan penurunan kapasitas vital paru pada penyelam (Wabula et al., 2019).

F. Tinjauan Tentang Pengetahuan Menyelim

Pekerjaan sebagai penyelam menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi terhadap bahaya-bahaya potensial. Peningkatan tingkat produktivitas dalam pekerjaan ini mengacu pada penerapan standar penyelaman yang aman dan sesuai. Pengetahuan yang dimiliki oleh penyelam tradisional mengenai risiko bahaya dalam lingkungan bertekanan tinggi dapat mempengaruhi sejauh mana mereka mematuhi standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan dalam penyelaman. Pentingnya mematuhi peraturan keselamatan kerja menjadi semakin jelas karena melanggar aturan dapat berdampak serius, bahkan mencakup risiko cacat permanen sepanjang hidup. Sementara itu, penyelam tradisional biasanya memperoleh keterampilan penyelaman secara turun-temurun tanpa pemahaman yang memadai mengenai kesehatan dan keselamatan dalam melakukan penyelaman (Mallapiang et al., 2023).

Aktivitas menyelim dapat dibandingkan dengan melompat dari pesawat terbang menggunakan payung, karena keduanya memiliki tingkat bahaya yang signifikan. Terutama jika dilakukan secara ceroboh tanpa memperhatikan aspek stamina, kesiapan mental dan fisik yang memadai, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang mendalam. Pengetahuan akademis tentang penyelaman menjadi landasan teoritis yang esensial bagi setiap penyelam. Dengan pemahaman ini,

penyelam dapat memahami prinsip-prinsip dasar, seperti penggunaan alat penyelam, batasan kemampuan fisik manusia dalam merespon dampak aktivitas menyelam, penerapan konsep fisika dalam penyelaman, kondisi dan lingkungan penyelaman, dan faktor-faktor lainnya. Semua ini akan membantu penyelam menjadi lebih kompeten dan mampu melakukan penyelaman dengan aman serta rasa percaya diri yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati (2018) menemukan bahwa nelayan yang memiliki pemahaman yang baik tentang penyelaman memiliki tingkat risiko yang lebih rendah terhadap penyakit dekompresi dibandingkan dengan nelayan yang memiliki pengetahuan yang kurang mendalam tentang hal tersebut (Saraswati, 2018).

Allah Swt Berfirman dalam QS Saad/38: 29

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

"Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran," (Kementerian Agama RI).

Dalam tafsir Al-Mukhtashar, Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang Kami turunkan kepadamu wahai Nabi berisi banyak manfaat dan kebaikan, supaya manusia merenungkan ayat-ayatnya dan memikirkan makna-maknanya, dan supaya orang-orang yang memiliki akal sehat dan cerdas mengambil pelajaran darinya (Al-Mukhtashar, 2023a).

"Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya." hikmah diturunkannya Al-Qur'an yakni agar manusia mempelajari, memahami kemudian mengamalkannya

dengan sebaik-baiknya. Suatu pekerjaan harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan sebagai pedoman agar kiranya tidak keliru.

G. Tinjauan Tentang Alkohol

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan mengonsumsi alkohol dan kejadian penyakit dekompresi. Hasil uji statistik menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0.093, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.050. Meskipun demikian, ditemukan bahwa *odd ratio* untuk perilaku K3 (alkohol) adalah 3.095, menunjukkan adanya kecenderungan risiko terhadap penyakit dekompresi. Penting untuk diingat bahwa konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang dan dengan kadar yang tinggi dapat menimbulkan berbagai gangguan pada sistem saraf seseorang.

Orang yang secara berlebihan mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu lama dapat mengalami penurunan fungsi kognitif, perubahan emosi yang tidak stabil, penurunan kemampuan persepsi, dan bahkan risiko terkena amnesia. Konsumsi alkohol menjadi sangat berbahaya bagi individu yang melakukan penyelaman, karena aktivitas ini memerlukan konsentrasi tinggi dan kemampuan untuk menilai situasi dengan cepat, terutama dalam situasi darurat yang mungkin muncul selama penyelaman untuk memastikan keselamatan.

Dengan demikian, meskipun hubungan langsung antara konsumsi alkohol dan penyakit dekompresi tidak secara signifikan terbukti dalam penelitian ini, tetapi masih ada risiko dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan penyelam (Embuai et al., 2020).

Pendekatan komprehensif dalam pandangan Islam terhadap kesehatan dan kesejahteraan umatnya mengakibatkan segala hal yang memiliki potensi bahaya atau bahkan sebagian besar berbahaya dianggap sebagai hal yang dilarang. Sejalan dengan ini, Islam memiliki sikap tegas terhadap penggunaan alkohol, melarang konsumsinya dalam segala jumlah, baik itu sedikit maupun besar. Tidak dapat disangkal bahwa alkohol memiliki aspek berbahaya dan memberikan dampak negatif terhadap kondisi mental dan fisik seseorang. Kandungan alkohol dapat menyebabkan kebingungan pikiran dan juga berperan dalam timbulnya berbagai jenis penyakit.

Allah Swt berfirman dalam QS Al-Maaida/5 : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Kementerian Agama RI).

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, sesungguhnya khamar, yaitu segala yang memabukkan dan menutup kesadaran akal, dan maisir, yaitu perjudian, yang mencakup seluruh jenis pertaruhan dan lainnya, yang di dalam prakteknya terdapat taruhan dari kedua belah pihak dan menghalangi dari mengingat Allah Swt, dan anshab, yaitu batu yang dahulu kaum musyrikin melakukan penyembelihan di sisinya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, dan semua ditegakkan untuk diibadahi demi mendekatkan diri kepadanya,

dan azlam, yaitu anak panah yang dahulu orang-orang kafir mengundi nasib mereka denganya, sebelum bergerak untuk melakukan sesuatu atau mengurungkan niat darinya; sesungguhnya semua itu merupakan perbuatan dosa dan tipu daya yang dibuat indah oleh setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surga (Muyassar, 2023).

Salah satu larangan yang diatur oleh Allah Swt adalah mengonsumsi minuman keras (khamar), yang pada hakikatnya adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat memabukkan dan mereduksi kesadaran akal. Praktik meminum minuman beralkohol pada dasarnya sangat merugikan kesehatan. Penggunaan alkohol dalam jumlah berlebihan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan berpikir dan mengganggu perilaku seseorang. Bahkan, jika konsumsi alkohol terlalu berlebihan, dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, serangan kejang, atau bahkan kematian.

Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan masalah serius lainnya, seperti tukak lambung, kerusakan organ hati, dan berbagai komplikasi yang berhubungan dengan gangguan mental berat. Oleh karena itu, bagi manusia yang menginginkan keselamatan dan keberuntungan, disarankan untuk menghindari konsumsi alkohol. Individu yang memiliki ketakwaan kepada Allah Swt diyakini akan menjaga dirinya dari melakukan segala larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sehingga mereka akan berada dalam kondisi yang aman dari perilaku yang dilarang tersebut.

H. Tinjauan Tentang Status Gizi

Ada sejumlah faktor tambahan yang juga bisa mempengaruhi risiko terjadinya penyakit dekompresi pada individu mana pun. Beberapa faktor mungkin berperan dalam skala kecil, sedangkan yang lain memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan, meskipun belum sepenuhnya dipahami. Kondisi gizi seseorang, sebagai contoh, memiliki peran yang penting dalam kesehatan keseluruhan dan juga dalam kebugaran fisik individu. Walaupun penelitian mengenai hubungan antara nutrisi dan penyelaman masih terbatas, kemungkinan besar faktor ini juga berpengaruh terhadap keamanan dekompresi.

Sebagai contoh, ada studi yang menyelidiki kaitan antara kadar kolesterol dan pembentukan gelembung gas yang terjadi akibat dekompresi. Teknik ultrasonografi Doppler digunakan dalam penelitian tersebut untuk mengelompokkan 30 subjek menjadi kelompok "rentan terhadap pembentukan gelembung" atau "kurang rentan terhadap pembentukan gelembung". Salah satu hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa secara umum, rata-rata subjek yang lebih rentan terhadap pembentukan gelembung gas memiliki tingkat kolesterol total dalam darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan subjek yang lebih tahan terhadap pembentukan gelembung (Webb et al., 1988). Namun, diperlukan lebih banyak penelitian untuk menggali lebih lanjut mengenai hal ini dan juga dalam banyak bidang lainnya.

Ajaran Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam domain kesehatan, seperti ilmu gizi. Islam memberikan panduan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, bermanfaat, dan menghindari berlebihan.

Prinsip ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang memberikan pedoman mengenai pola makan dan minum. Allah Swt Berfirman dalam Qs Al-A'raaf/7:31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ


Terjemahnya:

“Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Kementerian Agama RI).

Makan dan minumlah dari barang yang baik-baik yang di karuniakan Allah Swt kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebih dalam makanan dan minuman dan hal lainnya (Al-Muyassar, 2023).

Terkadang, makan secara berlebihan dan tanpa kendali mungkin terasa memuaskan. Namun, kenyataannya tubuh tidak merespons demikian. Mengonsumsi makanan secara berlebihan malah dapat menimbulkan berbagai masalah. Dari perspektif kesehatan, efek dari makan berlebihan dapat mencakup masalah seperti perut kembung, diare, obesitas, peningkatan kolesterol, dan gangguan tidur. Lebih lanjut, dalam pandangan Islam, perilaku berlebihan dalam hal apapun dianggap sebagai tindakan tercela dan dilarang.


I. Kerangka Teori



Gambar 2. 2 Kerangka Teori Penyakit Dekompresi


Sumber : dimodifikasi dari Mahdi et.al (1999) dalam Sukmajaya (2010), Syamila (2017), Gerth,2007.

J. Kerangka Konsep



Gambar 2. 3 Kerangka Konsep

Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan *cross-sectional study*, yakni pendekatan yang menganalisis korelasi dan hubungan antara faktor risiko dengan dampak atau efeknya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara variabel independen dan dependen yang dievaluasi secara bersamaan pada titik waktu tertentu (Vionalita, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menginvestigasi variabel independen (durasi penyelaman, kedalaman penyelaman, penggunaan APD, pengetahuan, konsumsi alkohol, dan status gizi) secara bersamaan dengan variabel dependen (penyakit dekompresi).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Kambuno, yang terletak di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan analisis laporan kasus dari Puskesmas Pulau Sembilan, yang mengindikasikan tingginya insiden penyakit dekompresi yang dialami oleh nelayan penyelam selama lima tahun terakhir.

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang determinan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai akan dilakukan pada bulan Mei 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa populasi merujuk pada wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, yang peneliti tentukan untuk tujuan studi dan untuk mendapatkan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh nelayan yang berjumlah 786 individu yang tinggal di Pulau Kambuno pada tahun 2023.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah sebagian dari total jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi. Ukuran sampel merupakan metode untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menentukan jumlah responden minimal adalah menggunakan rumus *Lemeshow* dengan tingkat kepercayaan 95%.

$$n = \frac{Z^2 - \frac{\alpha}{2} \times p(1 - p) \times N}{d^2 (N - 1) + Z^2 1 - \frac{\alpha}{2} \times p(1 - p)}$$

$$n = \frac{(1,960)^2 \times 0,27 \times 0,73 \times 786}{(0,1)^2 (786 - 1) + (1,960)^2 \times 0,27 \times 0,73}$$

$$n = 69,1$$

$$n = 70$$

Keterangan:

n : jumlah sampel

N: jumlah populasi (786)

p: estimasi proporsi (0,27)

$Z^2 1 - \alpha/2$: Z score pada tingkat kepercayaan 95%

d : presisi (0.1)

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terlibat dalam penelitian dengan menggunakan kuesioner (Adnyana, 2021). Adapun kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diadopsi dari karya Riri Apriani (2020). Kuesioner ini dirancang dalam bentuk pilihan ganda dengan lima pertanyaan. Selain itu, untuk mendapatkan data mengenai status gizi, peneliti melakukan pengukuran tinggi badan menggunakan stadiometer dan berat badan dengan timbangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah dipersiapkan oleh entitas tertentu, seperti institusi atau lembaga terkait, dalam hal ini kantor Desa Pulau Harapan. Informasi ini telah disusun dalam format digital atau fisik (Adnyana, 2021).

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah:

1. Teknik Pengolahan

Proses pengolahan data dimulai dengan data primer yang telah terkumpul, yang kemudian dilakukan uji statistik. Untuk melakukan pengujian, analisis, serta interpretasi data, terdapat serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti. Pengolahan data melibatkan rangkaian tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Mengedit data)

Editing adalah tahap dimana peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data. Proses ini mencakup pengecekan integritas dan keberadaan jawaban, kejelasan tulisan, serta akurasi dalam perhitungan skor.

b. *Coding* (Pemberian data)

Pada langkah ini, peneliti melakukan konversi data yang awalnya dalam bentuk teks atau kata-kata menjadi bentuk angka atau bilangan secara manual. Penyusunan kode yang akurat sangat penting untuk memasukkan data dengan tepat dan membedakan informasi berdasarkan karakter tertentu. Hal ini terutama diterapkan pada kuesioner yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai prosedur penyelaman.

1) Benar = 1

2) Salah = 0

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Benar soal}}{\text{Jumlah soal}} \times 100\%$$

Kategori tingkat pengetahuan :

a) Baik (56 – 100%) = 5

b) Kurang (< 56%) = 1

c. *Entry* (Memasukan data)

Setelah data terkumpul dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah memasukkan data tersebut ke dalam perangkat lunak SPSS untuk melakukan proses analisis.

d. *Cleaning* (Membersihkan data)

Pada langkah ini, data yang telah dimasukkan ke dalam program diperiksa kembali untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dan data siap untuk dilakukan analisis.

e. Penyajian data

Hasil pengolahan data akan dipresentasikan dalam bentuk penjelasan naratif serta disajikan dalam bentuk tabel.

2. Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan perangkat statistik, dengan melalui rangkaian tahap sebagai berikut:

a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang permasalahan penelitian. Proses ini melibatkan deskripsi rinci dari setiap variabel yang terlibat dalam penelitian, yaitu melalui penilaian distribusi frekuensi dan presentase dari masing-masing variabel independen seperti lama penyelaman, kedalaman penyelaman, penggunaan APD, pengetahuan, konsumsi alkohol, dan status gizi. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap variabel dependen yaitu penyakit dekompresi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilaksanakan untuk menguji adanya korelasi yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji ini menggunakan metode *Chi-square* dengan standar signifikansi pada tingkat *p-value* (0,05). Jika hasil perhitungan menunjukkan nilai $p < (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0)

ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara kedua variabel tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sinjai tergolong sebagai wilayah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berlokasi di Sinjai Utara, dengan jarak sekitar 220 km dari Kota Makassar. Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki luas mencapai 819,96 km² dan populasi sekitar 259.478 penduduk menurut sensus penduduk tahun 2020. Secara geografis, kabupaten ini meliputi daerah pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 2.871 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, Sinjai Barat, Tellu Limpoe, Pulau Sembilan, dan Bulupoddo.

Kecamatan Pulau Sembilan di Kabupaten Sinjai merupakan wilayah yang terisolasi dari daratan utama Sinjai dan terdiri dari sekelompok kepulauan. Terdapat empat desa di Kecamatan Pulau Sembilan Sinjai, yaitu Desa Buhung Pitue, Pulau Harapan, Padaelo, dan Pulau Persatuan. Nama kecamatan ini merujuk pada sembilan pulau yang membentuk wilayahnya, yaitu Pulau Burungloe, Kambuno, Liang-liang, Batanglampe, Kodingare, Larea-rea, Kanalo 1, Kanalo 2, dan Katindoang. Keunikan dari Kecamatan Pulau Sembilan adalah statusnya sebagai satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sinjai yang terdiri dari kepulauan. Meskipun merupakan kecamatan terkecil

dalam hal wilayah, Pulau Sembilan memiliki andil wilayah sekitar 1% dari total luas Kabupaten Sinjai, yang mencapai 819,96 km² (Desa Pulau Harapan, 2023).

Desa Pulau Harapan di Kecamatan Pulau Sembilan merupakan suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Terletak di sebelah timur pantai Sinjai Utara, dekat dengan pelabuhan Larea-rea. Desa Pulau Harapan memiliki populasi sekitar 3500 penduduk yang tersebar di dalam empat dusun, yaitu Dusun Kambuno Barat, Dusun Kambuno Timur, Dusun Kambuno Selatan, dan Dusun Liang-liang (Desa Pulau Harapan, 2023).

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini akan dijelaskan lebih rinci. Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran keseluruhan tentang karakteristik para responden.

a. Analisis Data Numerik

1) Umur

Tabel 4.1

**Distribusi Data Numerik Usia Penyelam di Pulau Kambuno
Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023**

Variabel	Min	Max	Median	Mean ± SD
Umur	21 tahun	64 tahun	41.71	41.00 ± 9.75

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dari 70 penyelam menunjukkan umur pekerja termuda adalah 21 tahun dan yang tertua sebesar 64 tahun. Rata-rata umur

sebesar 41 tahun dan nilai median dari 70 penyelam sebesar 41 dengan standar deviasi 9.75.

2) Masa Kerja

Tabel 4. 2
Distribusi Data Numerik Masa Kerja Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Variabel	Min	Max	Median	Mean \pm SD
Masa Kerja	3 tahun	40 tahun	17.64	15.00 \pm 9.90

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4. 2 menunjukkan masa kerja penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan, berkisar 1 sampai 40. Masa kerja rata-rata dari 70 penyelam adalah 15 tahun dengan nilai median 17 tahun dan standar deviasi 9.90.

b. Analisis Data Kategorik

1) Pendidikan

Tabel 4. 3
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Sekolah	6	8,6
Tamat SD	56	80
Tamat SMP	5	7,1
Tamat SMA	3	4,3
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan pendidikan penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, sebagian besar responden berpendidikan SD sebanyak 56 responden (80%), dan sebagian kecil berpendidikan SMA sebanyak 3 responden (4,3%).

2) Identitas Penyelaman

Tabel 4. 4
Distribusi Responden Berdasarkan Identitas Penyelaman Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Identitas Penyelaman	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ikan	6	8,6
Teripang	54	77,1
Gurita	10	14,3
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan identitas penyelaman penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, jenis penyelaman ikan sebanyak 6 responden (8,6%), penyelaman teripang sebanyak 54 responden (77,1%), dan jenis penyelaman gurita sebanyak 10 responden (14,3%).

3) Penyakit Dekompresi

Tabel 4. 5
Distribusi Responden Berdasarkan Gejala Penyakit Dekompresi
Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Penyakit Dekompresi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Menderita	15	21,4
Tidak Menderita	55	78,6
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan penyakit dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, responden yang menderita dekompresi sebanyak 15 responden (21,4 %) sedangkan yang tidak menderita sebanyak 55 responden (78,6%).

4) Lama Penyelaman

Tabel 4. 6
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Penyelaman Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Lama Penyelaman	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lama	12	17,1
Tidak Lama	58	82,9
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan lama penyelaman penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelaman dengan kategori lama berjumlah 12 responden (17,1%), sedangkan kategori tidak lama berjumlah 58 responden (82,9%).

5) Standarisasi APD

Tabel 4. 7
Distribusi Responden Berdasarkan Standarisasi APD Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Standarisasi APD	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Berstandar	50	71,4
Berstandar	20	28,6
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan standarisasi APD Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, yang menggunakan APD tidak berstandar sebanyak 50 responden (71,4%), dan yang berstandar sebanyak 20 responden (28,6%).

6) Kedalaman Menyelam

Tabel 4. 8
Distribusi Responden Berdasarkan Kedalaman Menyelam
Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Kedalaman Menyelam	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Dalam	55	78,6
Dangkal	15	21,4
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan kedalaman menyelam penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, kategori dalam sebanyak 55 responden (78,6%), dan kategori dangkal sebanyak 15 responden (21,4%).

7) Pengetahuan

Tabel 4. 9
Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Pengetahuan Penyelam	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	48	68,6
Kurang	22	32,4
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi berdasarkan pengetahuan penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang pengetahuannya kategori baik sebanyak 48 responden (68,6%), dan yang kategori kurang sebanyak 22 responden (32,4%).

8) Konsumsi Alkohol

Tabel 4. 10
Distribusi Responden Berdasarkan Konsumsi Alkohol Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Konsumsi Alkohol	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Konsumsi	8	11,4
Tidak Konsumsi	62	88,6
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi konsumsi alkohol penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang mengkonsumsi alkohol sebanyak 8 responden (11,4%), dan yang tidak konsumsi sebanyak 62 responden (88,6%).

9) Status Gizi

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Status Gizi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Normal	29	41,4
Normal	41	58,6
Total	70	1000

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi status gizi penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, Penyelam yang memiliki status gizi tidak normal sebanyak 29 responden (41,4%) dan yang normal sebanyak 41 responden (58,6 %).

10) Merokok

Tabel 4.12
Distribusi Responden Berdasarkan Perilaku Merokok Penyelam
di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Perilaku Merokok	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Merokok	45	64,3
Tidak Merokok	25	35,7
Total	70	100

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 70 responden, distribusi frekuensi perilaku merokok penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, penyelam yang merokok sebanyak 45 responden (64,3%) dan yang tidak merokok sebanyak 25 responden (35,7%) .

2. Analisis Bivariat

a. Analisis Lama Menyelam dengan Dekompresi

Tabel 4.13
Hubungan Lama Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Lama Menyelam	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Lama	7	58,3	5	41,7	12	100	0,002
Tidak Lama	8	13,8	50	86,2	58	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan dari 12 sampel yang lama menyelam terdapat 5 (41,7%) yang tidak menderita dekompresi dan 7 (58,3%) sampel yang menderita dekompresi. Sedangkan 58 sampel yang tidak lama menyelam terdapat 50 (86,2%) yang tidak menderita dekompresi dan 8 (13,8%) sampel yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square*, diperoleh *p-value* 0,002 ($p < 0,05$) menggunakan nilai *Fisher's Exact Test* karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 2.57. Hal ini menyatakan ada hubungan yang signifikan antara lama menyelam dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

b. Analisis Standarisasi APD dengan Dekompresi

Tabel 4.14
Hubungan Standarisasi APD dengan Kejadian Dekompresi pada
Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan
Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Standarisasi APD	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Tidak Berstandar	15	30	35	70	50	100	0,004
Berstandar	0	0	20	100	20	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan dari 50 sampel penyelam yang APDnya tidak berstandar sebanyak 35 (70%) yang tidak menderita dekompresi dan 15 (30%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 20 sampel penyelam yang APDnya berstandar sebanyak 20 (100%) yang tidak menderita dekompresi dan 0 (0%) yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square*, diperoleh *p-value* 0.004 ($p < 0,05$) menggunakan nilai *Fisher's Exact Test* karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 4.29. Hal ini menyatakan ada hubungan yang signifikan antara standarisasi APD dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

C. Analisis Kedalaman Menyelam dengan Dekompresi

Tabel 4.15
Hubungan Kedalaman Menyelam dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Kedalaman Menyelam	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Dalam	15	27,3	40	72,7	55	100	0,029
Dangkal	0	0	15	100	15	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan dari 55 sampel yang kedalaman menyelamnya dalam sebanyak 40 (72,7%) yang tidak menderita dekompresi dan 15 (27,3%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 15 sampel yang kedalaman menyelamnya dangkal sebanyak 15 (100%) yang tidak menderita dekompresi dan 0 (0%) sampel yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square*, diperoleh *p-value* 0,029 ($p < 0,05$) menggunakan nilai *Fisher's Exact Test* karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 3.21. Hal ini menyatakan ada hubungan yang signifikan antara kedalaman menyelam dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

D. Analisis Pengetahuan dengan Dekompresi

Tabel 4.16
Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Pengetahuan	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Kurang	10	10,3	12	54,5	22	100	0,003
Baik	5	45,5	43	89,6	48	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan dari 22 sampel yang pengetahuannya kurang terdapat 12 (54,5%) yang tidak menderita dekompresi dan 10 (45,5%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 48 sampel yang pengetahuannya berkategori baik terdapat 43 (89,6%) tidak menderita dekompresi dan 5 (10,3%) yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square* didapatkan *p-value* 0,003 ($p < 0,05$) menggunakan nilai *Fisher's Exact Test* karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 4.71. Hal ini menyatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

E. Analisis Konsumsi Alkohol dengan Dekompresi

Tabel 4.17
Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Konsumsi Alkohol	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Konsumsi	4	50	4	50	8	100	0,058
Tidak Konsumsi	11	17,7	51	82,3	62	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan dari 8 sampel yang mengonsumsi alkohol terdapat 4 (50,0%) yang tidak menderita dekompresi dan 4 (50,0%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 62 sampel yang tidak mengonsumsi alkohol terdapat 51 (82,3%) yang tidak menderita dekompresi dan 11 (17,7%) yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square* didapatkan *p-value* 0,058 ($p > 0,05$) menggunakan nilai *Fisher's Exact Test* karena terdapat 1 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 1.71. Hal ini menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

F. Analisis Status Gizi dengan Dekompresi

Tabel 4.18
Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

Status Gizi	Kejadian Dekompresi						<i>P value</i>
	Menderita		Tidak Menderita		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Tidak Normal	8	27,6	21	72,4	29	100	0,447
Normal	7	17,1	34	82,9	41	100	
Total	15	21,4	55	78,6	70	100	

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan dari 29 sampel yang status gizinya tidak normal terdapat 21 (72,4%) yang tidak menderita dekompresi dan 8 (27,6%) yang menderita dekompresi. Sedangkan dari 41 sampel yang status gizinya normal terdapat 34 (82,9%) yang tidak menderita dekompresi dan 7 (17,1%) yang menderita dekompresi.

Setelah dilakukan uji *Chi Square* didapatkan *p-value* 0,447 ($p > 0,05$) menggunakan nilai *Continuity Correction* karena terdapat 0 sel, atau jumlah harapan kurang dari 5 sedangkan jumlah harapan minimum sebesar 6.21. Hal ini menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai.

C. Pembahasan

1. Hubungan Lama Menyelam dengan Kejadian Dekompresi

Dalam penelitian ini, ditemukan hasil statistik dengan nilai p sebesar 0,002 ($p < 0,05$). Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lama penyelaman dan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, pada tahun 2023. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharja & Ikhsan (2023), diperoleh nilai p sebesar 0,003 yang mengindikasikan adanya hubungan antara durasi penyelaman dan gejala penyakit dekompresi pada nelayan yang melakukan penyelaman untuk tujuan menangkap ikan, dengan signifikansi $p < 0,05$. Selain itu, penelitian oleh Embuai et al. (2020) juga menunjukkan temuan serupa, yakni adanya hubungan signifikan antara durasi penyelaman dan kejadian dekompresi, dengan nilai p sebesar 0,000.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Tafui et al., (2021) menghasilkan nilai p sebesar 0,002 ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa durasi penyelaman

memiliki hubungan yang signifikan dengan kejadian penyakit akibat kerja pada nelayan pencari teripang. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saranani et al., (2019), diperoleh nilai p sebesar 0,001, mengindikasikan adanya hubungan antara durasi penyelaman dan *decompression sickness* dalam konteks aktivitas penyelaman menggunakan kompresor di Desa Leppe.

Namun, hasil dari penelitian ini *kontrast* dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sididi & Rahman (2022), di mana ditemukan nilai p sebesar 0,326. Angka probabilitas ini melebihi nilai $\alpha > 0,05$, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lamanya penyelaman dengan kejadian dekompresi pada nelayan penyelam tradisional di Pulau Barrang Lompo, Kota Makassar.

Lama penyelaman memengaruhi proses penyerapan dan pelepasan gas nitrogen dalam jaringan tubuh, baik yang berespon cepat maupun lambat. Temuan dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara durasi penyelaman dan insiden kecelakaan kerja serta penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Penyelaman singkat namun dalam cenderung meningkatkan konsentrasi nitrogen pada jaringan yang berespon cepat. Sebaliknya, penyelaman pada kedalaman relatif dangkal (di bawah 10 meter) namun dalam jangka waktu yang lama akan menghasilkan distribusi nitrogen yang merata antara jaringan yang berespon cepat dan lambat dalam tubuh. Meskipun begitu, jaringan darah, yang termasuk dalam kategori yang merespon

cepat, memiliki kemampuan lebih baik dalam menghilangkan nitrogen melalui paru-paru. Penumpukan nitrogen yang signifikan dapat berkontribusi terhadap timbulnya penyakit dekomresi (Tafui et al., 2021).

Pengaruh durasi atau lamanya waktu penyelaman terhadap insiden gangguan kesehatan pada penyelam ditentukan oleh berbagai faktor penyebab kondisi kesehatan yang tidak baik pada mereka, yang timbul karena perubahan tekanan udara yang signifikan. Waktu penyelaman yang berlangsung lama akan memengaruhi mekanisme penyerapan dan pelepasan gas dalam jaringan tubuh serta peredaran darah, terutama gas nitrogen. Perubahan dalam komposisi gas ini berpotensi untuk memicu perkembangan penyakit dekomresi (Tafui et al., 2021).

Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa responden yang terlibat dalam penyelaman menggunakan kompresor cenderung membatasi durasi penyelaman hingga maksimal 2 jam. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyelaman dengan kompresor ban yang memiliki durasi tidak terukur dapat meningkatkan risiko terkena *decompression sickness*. Kondisi ini dapat mengakibatkan gejala seperti halusinasi dan sensasi mirip mabuk pada para penyelam. Apabila tahap ini berlanjut, dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran. Penumpukan nitrogen yang berlebihan dalam tubuh dapat mengganggu pasokan oksigen ke otak, sehingga menyebabkan penyelam mengalami gejala seperti mabuk dan halusinasi.

Hingga saat ini, pedoman waktu bagi penyelam yang menggunakan kompresor lebih sering berkaitan dengan pencapaian target tangkapan. Durasi penyelaman bukanlah faktor utama yang diutamakan oleh nelayan dalam melaksanakan aktivitas penyelaman. Para nelayan akan terus melakukan penyelaman selama mereka merasa mampu untuk mencari ikan pada kedalaman tertentu, hingga mereka berhasil mencapai target tangkapan yang diinginkan. Namun, penggunaan kompresor tambal ban memiliki risiko yang signifikan karena kompresor tersebut tidak memiliki filter penyaring udara, dan menggunakan oli sintetis dari minyak bumi sebagai pelumas. Penggunaan kompresor tambal ban dalam penyelaman tidak membatasi waktu bagi nelayan, karena pasokan udara terus diberikan dari permukaan air. Hal ini pada akhirnya dapat berpotensi mengakibatkan risiko dekompresi yang akut bagi nelayan (Takalelumang et al., 2018).

Responden yang melakukan penyelaman dalam waktu singkat namun mengalami dekompresi kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar. Beberapa penyelam mengemukakan bahwa mereka telah terbiasa menjalani penyelaman dengan menggunakan alat yang tersedia, seperti masker selam atau alat bantu nafas seperti kompresor. Temuan ini mengindikasikan bahwa para penyelam tradisional mungkin kurang memprioritaskan dampak dan risiko keselamatan selama penyelaman. Mereka telah terbiasa dengan pola

penyelaman yang sudah mereka lakukan dan mungkin merasa bahwa faktor keselamatan dan kesehatan tidak begitu signifikan bagi mereka.

Allah Swt Berfirman dalam QS Al- Israa/17 : 26 27

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya :

“dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (Kementerian Agama RI)

Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan, mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta, padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya (Al- Mukhtashar, 2023).

Dalam kutipan tersebut, ajaran Allah Swt mengingatkan manusia untuk menghindari perilaku yang berlebihan, karena tindakan berlebihan dianggap merugikan. Hal ini relevan dengan konteks penyelaman, di mana penyelam yang menggunakan kompresor sering kali melebihi batas yang seharusnya diikuti dalam penyelaman yang aman. Akibatnya, banyak dari mereka akhirnya mengalami masalah kesehatan terkait penyelaman karena melewati batas yang disarankan.

2. Hubungan Standarisasi APD dengan Kejadian Dekompresi

Dari analisis statistik pada penelitian ini, ditemukan nilai *p-value* sebesar 0,004 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara standarisasi APD (Alat Pelindung Diri) dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai pada tahun 2023. Hasil ini sejalan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Embuai et al. (2020), di mana perilaku penggunaan APD memiliki kaitan dengan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam tradisional di Ambon. Pada penelitian tersebut, persentase nelayan yang menggunakan APD dan mengalami penyakit dekompresi dalam kelompok kasus mencapai 95,70%, sementara dalam kelompok kasus lain yang tidak menggunakan APD mencapai 92,00%, dengan nilai *p-value* sebesar 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku penggunaan APD dan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam tradisional di Ambon.

Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yossy Mashitoh & Zakkiy Fasya (2022), ditemukan *p-value* sebesar 0,007 yang lebih kecil dari nilai α (0,05). Hasil ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dan Risiko Barotrauma Telinga pada nelayan tradisional di Kampung Cumpat. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Harisa et al. (2023), dimana ditemukan nilai $p = 0,040$ ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat pengaruh antara penggunaan alat bantu pernapasan dengan pengetahuan dan praktik nelayan sebagai upaya pencegahan dekompresi.

Kompresor memiliki fungsi sebagai alat bantu pernapasan saat berada di dalam air, dimana alat ini terkoneksi dengan selang berwarna kuning dengan panjang sekitar 50-75 meter. Salah satu ujung dari selang tersebut terhubung ke saluran udara pada kompresor ban, sedangkan ujung lainnya dilengkapi dengan regulator yang memungkinkan nelayan untuk mengambil napas dari udara melalui mulut. Pada satu kompresor, bisa terpasang hingga 4 selang yang diikatkan ke tubuh penyelam, biasanya di sekitar pinggang. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah regulator terlepas dari mulut penyelam akibat aliran air yang kuat. Namun, ikatan yang erat ini dapat menghambat aliran udara, mengakibatkan udara yang dihirup oleh penyelam sebagian besar berasal dari gelembung air yang keluar dari selang yang terhambat tersebut.

Dalam keadaan darurat seperti kompresor tiba-tiba mati atau kehabisan bahan bakar, seorang operator di atas perahu harus segera menarik selang dan penyelam ke permukaan air. Dalam situasi semacam ini, sering kali terjadi insiden dekompresi dan kecelakaan penyelaman karena penyelam tidak memiliki peluang untuk melakukan *decompression stop*. *Decompression stop* adalah istilah dalam penyelaman yang mengacu pada tindakan berhenti sejenak pada kedalaman tertentu saat naik ke permukaan air untuk memungkinkan pelepasan gas-gas terlarut dari tubuh penyelam (Rahman et al., 2020).

Dalam penelitian ini, semua responden yang menggunakan kompresor pernah mengalami insiden kecelakaan. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa penggunaan kompresor memiliki kecenderungan untuk berdampak pada terjadinya kecelakaan. Responden yang menggunakan kompresor cenderung melakukan penyelaman dengan durasi lebih lama dan kedalaman lebih dalam untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan tampak lebih besar dibandingkan dengan responden yang melakukan penyelaman tanpa menggunakan kompresor.

3. Hubungan Kedalaman Menyelam dengan Kejadian Dekompresi

Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh hasil uji statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,029 ($p < 0,05$) hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara kedalaman penyelaman dan kejadian dekomposisi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maharja & Ikhsan (2023), yang juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara kedalaman penyelaman dan dekomposisi pada penyelam ikan, dengan nilai *p-value* sebesar 0,016 ($p < 0,05$). Hal serupa juga terlihat dalam penelitian oleh Duke et al. (2017), yang mendapatkan nilai *p-value* sebesar 0,043 ($p < 0,05$), menunjukkan bahwa variabel kedalaman menyelam memiliki pengaruh terhadap nilai statistik, sehingga hipotesis terbukti. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedalaman penyelaman merupakan faktor risiko yang

berkontribusi terhadap terjadinya dekompresi, dengan nilai Odds Ratio (OR) sebesar 6,622 dan interval kepercayaan 95% antara 1,125 hingga 16,854.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mayoritas nelayan penyelam melakukan penyelaman yang berisiko tinggi yaitu > 10 meter dan mengalami gejala dekompresi. Dalamnya tingkat penyelaman yang dilakukan oleh penyelam kompressor ini lebih dikarenakan semakin dalamnya tempat tinggal teripang dan gurita yang dicari oleh penyelam, padahal kalau dilihat dari tingkat kedalaman teripang adalah biota laut yang merayap di dasar laut pada kedalaman antara 20 hingga 60 meter. Terjadinya gejala dekompresi bagi penyelam yang melakukan penyelaman >10 meter karena semakin dalam penyelam melakukan penyelaman maka tubuh akan menerima tekanan yang lebih tinggi sehingga tekanan tersebut akan terdistribusi ke sebagian atau seluruh organ tubuh. Setiap penambahan 10 meter terjadi kenaikan 1 atm. Nelayan penyelam yang menyelam jauh ke dalam akan mendapatkan tekanan atmosfer yang lebih tinggi. Semakin dalam penyelaman, semakin besar kemungkinan nelayan penyelam menderita penyakit dekompresi. Selain itu, suhu air semakin ke dalam, maka akan semakin dingin sehingga nelayan penyelaman akan kehilangan panas tubuh yang berakibat pada terjadinya kram, kesemutan, halusinasi, hingga hilang kesadaran. Terdapat pengaruh pada kesehatan penyelam seperti trauma/*squeese* bila terus mendapatkan tekanan yang besar akibat kedalaman menyelam (Maharja & Ikhsan, 2023).

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Saranani et al., (2019) Hasil penelitian yang dilakukan pada penyelam yang menggunakan kompresor di Desa Leppe Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe membuktikan teori dan didukung penelitian terdahulu mengenai kejadian *decompression sickness* bahwa terdapat hubungan kedalaman menyelam dengan kejadian *decompression sicknes* hal ini terjadi karena penyelam yang melakukan aktifitas penyelaman tanpa menentukan batas maksimum kedalaman menyelam akan mengakibatkan risiko kejadian *Decompression Sickness*.

Responden yang melakukan penyelaman pada kedalaman kurang dari 10 meter namun mengalami dekompresi mungkin mengalami hal tersebut karena adanya faktor-faktor lain yang berperan, seperti pengetahuan yang kurang tentang teknik equalisasi atau penyamaan tekanan. Penyelam yang telah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun dalam penyelaman tradisional sudah memiliki kebiasaan dan keterbiasaan dalam menghadapi lingkungan bawah air. Di sisi lain, penyelam yang baru atau memiliki pengalaman menyelam yang terbatas mungkin akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, mereka mungkin tidak terlatih atau tidak terbiasa melakukan teknik equalisasi, karena mereka mungkin tidak merasakan gangguan pada tubuh mereka saat mereka tidak melakukan teknik equalisasi selama penyelaman.

Allah Swt Berfirman dalam QS An-Nur/24 : 40

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا
فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ٤٠

Terjemahnya :

“ Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang tindih-bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun.” (Kementerian Agama RI)

Atau amalan mereka seperti kegelapan di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, di atas ombak itu ada ombak lagi, di atasnya lagi ada awan yang menghalangi dari petunjuk bintang-bintang; kegelapan yang berlapis-lapis. Apabila ia mengeluarkan tangannya dalam kondisi gelap ini, ia tidak dapat melihatnya lantaran gelapnya. Demikianlah perumpamaan orang kafir yang berada dalam kegelapan; kejahilan, kebingungan, dan hatinya terkunci. Siapa yang tiada diberi petunjuk dan ilmu tentang kitab-Nya oleh Allah maka ia tidak akan mempunyai petunjuk yang bisa menunjukinya, dan tidak pula mempunyai kitab yang menerangi jalannya (Al- Mukhtashar, 2023b).

Pada kedalaman lebih dari 20-30 meter, manusia tidak akan mampu menyelam tanpa alat bantu. Karena pada kedalaman 30 meter, tekanan udara bisa mencapai empat kali lipat tekanan udara di permukaan bumi. Pada titik ini, nitrogen masuk ke dalam darah penyelam dan memengaruhi fungsi otaknya,

menyebabkan kehilangan kontrol terhadap gerakannya. Ini mengakibatkan penyakit yang dikenal sebagai penyakit penyelam atau dekompresi.

4. Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Dekompresi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,003 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ira et al., (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan nelayan tentang penyakit dekompresi di Dusun Tanah Goyang RT06, dengan nilai $p = 0,020$ yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan nelayan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian penyakit dekompresi.

Pengetahuan terbentuk sebagai hasil dari berbagai faktor yang memengaruhi pembentukan perilaku. Menurut teori yang dikemukakan oleh Notoadmodjo (2010), faktor-faktor yang memainkan peran dalam membentuk pengetahuan termasuk tingkat pendidikan, informasi yang diterima, aspek budaya, dan pengalaman pribadi. Tingkat pendidikan juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan pengetahuan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan dasar (SD) dengan proporsi sebanyak 56 (80%) dari total responden. Tingkat pendidikan

ini memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir yang dapat menerima informasi baru dengan terbuka.

Sebelum melakukan penyelaman, para penyelam perlu memiliki pemahaman tentang durasi dan kedalaman penyelaman serta melakukan latihan yang memadai. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan akibat penyelaman, seperti masalah pendengaran dan dekompresi. Pengaturan perubahan kedalaman penyelaman yang lambat dan terkendali, ditambah dengan kemampuan mengendalikan daya apung dengan baik, dapat mengurangi risiko terjadinya efek buruk seperti barotrauma paru yang dapat memengaruhi pendengaran. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang teknik penyelaman, dampak negatif yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga penyelaman menjadi lebih aman (Rahman et al., 2020).

Penyelam tradisional adalah individu yang memperoleh keterampilan menyelam secara informal dari lingkungan sekitar, seperti keluarga atau rekan. Mereka tidak mendapatkan pelatihan formal untuk teknik penyelaman yang efektif dan cenderung menggunakan peralatan sederhana dalam kegiatannya. Menurut temuan dari studi yang dilakukan oleh Dharmawirawan dan Modjo (2012) di Kepulauan Seribu, rendahnya tingkat pengetahuan nelayan yang menggunakan kompresor mengenai praktik penyelaman yang aman menjadi salah satu aspek yang dikenali sebagai faktor potensial dalam mengidentifikasi bahaya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Keterbatasan pengetahuan ini

dapat berkontribusi terhadap terjadinya gangguan dan penyakit yang mungkin muncul akibat penyelaman yang kurang tepat dilakukan (Rahman et al., 2020).

Responden yang memiliki pengetahuan tentang penyelaman yang baik tetapi mengalami dekompresi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti tradisi yang mana responden dalam menyikapi permasalahan kesehatan yang dialaminya merupakan hal yang biasa, sehingga mereka hanya menggunakan pengobatan tradisional dengan menggunakan daun-daun sampai keadaannya kritis baru mencari tenaga kesehatan, selain itu karena faktor ekonomi dimana pendapatan mereka didapatkan dari hasil melaut.

Allah Swt Berfirman dalam QS Taa-Haa/ 20 : 114

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝ ١١٤

Terjemahnya :

“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Kementerian Agama RI)

Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sesungguhnya daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik (dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap Al-Qur'an) sewaktu kamu membacanya (sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu) sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikannya (dan katakanlah, "Ya Rabbku! Tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan") tentang Al-Qur'an, sehingga setiap kali diturunkan

kepadanya Al-Qur'an, makin bertambah ilmu pengetahuannya (Jalalain, 2023).

Surat Thaha menjelaskan bahwa Allah telah mengisyaratkan kepada manusia untuk memohon ilmu pengetahuan kepada-Nya. Namun tentunya ilmu pengetahuan tersebut tak datang secara langsung melainkan harus diusahakan diantaranya dengan cara banyak membaca buku, mempraktikkan serta mempelajari sesuatu dari pengalaman yang pernah dijalani. Pengetahuan sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia, sebab dengan pengetahuan manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk serta dapat membantu dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu pengetahuan, seseorang dapat menjadi lebih mampu menentukan arah dan tujuan hidupnya. Selain itu, ilmu juga pengetahuan dapat mengangkat derajat seseorang.

5. Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Kejadian Dekompresi

Hasil analisis statistik dalam penelitian ini menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,058 ($p > 0,05$), yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Namun, perlu dicatat bahwa ditemukan nilai *odd ratio* (OR) perilaku konsumsi alkohol sebesar 4.636, hal ini menunjukkan penyelam yang mengonsumsi alkohol berisiko 4,6 kali mengalami gejala penyakit dekompresi dibandingkan penyelam yang tidak mengonsumsi alkohol. Temuan ini sejalan dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad et al., (2023) yang mendapatkan nilai OR sebesar 2.381 dengan interval kepercayaan 95% antara 0.611 hingga 9.281. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini nilai *lower limit* (LL) < 1 dan *upper limit* (UL) > 1 , yang mengindikasikan bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi alkohol dan kejadian penyakit dekompresi pada nelayan penyelam. Namun, terdapat kecenderungan dua kali lipat untuk berisiko terkena penyakit dekompresi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Embuai et al. (2020), yang juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa konsumsi alkohol dengan kejadian penyakit dekompresi. Dalam penelitian tersebut, ditemukan nilai *p-value* sebesar 0,093 ($> 0,05$), yang mengindikasikan ketidaksignifikan hubungan antara konsumsi alkohol dan kejadian penyakit dekompresi. Meskipun demikian, ditemukan angka *odd ratio* (OR) untuk perilaku K3 (alkohol) sebesar 3,095, yang menunjukkan adanya kecenderungan untuk berisiko terkena penyakit dekompresi.

Mengonsumsi alkohol dalam jangka waktu yang panjang dan dengan kadar yang tinggi dapat mengakibatkan berbagai gangguan pada sistem saraf seseorang seperti mengalami penurunan fungsi intelektual, fluktuasi emosi yang tidak stabil, penurunan kemampuan persepsi, dan bahkan bisa mencapai tingkat amnesia. Penting untuk diingat bahwa mengonsumsi minuman

beralkohol dapat memiliki dampak berbahaya terutama bagi individu yang akan melakukan penyelaman. Aktivitas penyelaman memerlukan konsentrasi dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat demi menjaga keselamatan saat berisiko melakukan penyelaman.

Responden yang tidak mengonsumsi alkohol namun mengalami dekompresi mungkin menghadapi faktor lain yang mempengaruhi, seperti melakukan kenaikan ke permukaan dengan cepat tanpa melaksanakan langkah *safety stop* atau *deco stop* selama 2-5 menit pada kedalaman 10 meter terakhir. Pemberhentian ini bertujuan untuk memungkinkan tubuh beradaptasi sehingga gelembung gas yang sebelumnya terbentuk dalam sirkulasi dapat difusi keluar dari tubuh, dan akhirnya penyelam dapat naik ke permukaan secara perlahan dan aman.

6. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Dekompresi

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,447 ($p > 0,05$), yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Meskipun demikian, ditemukan *odd ratio* untuk status gizi sebesar 1.850, hal ini menunjukkan penyelam yang status gizinya tidak normal berisiko 1,8 kali mengalami gejala penyakit dekompresi dibandingkan penyelam yang status gizinya normal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rais et al., (2020), di mana hasil uji *Mann-Whitney* menunjukkan angka 445,5 dengan nilai $p = 0,116 (> 0,05)$,

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari indeks massa tubuh terhadap potensi terjadinya dekompresi pada penyelam tradisional di Desa Bajo, Kabupaten Boalemo.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang bertentangan dengan teori bahwa gas nitrogen cenderung lebih mudah larut dalam lemak daripada air dalam jaringan tubuh. Ini mengimplikasikan bahwa jika persentasi lemak dalam jaringan atau organ tubuh lebih besar daripada air, maka risiko dekompresi akan meningkat. Mitchell (2005) menjelaskan bahwa nitrogen memiliki tingkat kelarutan dalam lemak yang lima kali lebih tinggi dibandingkan dalam air. Selanjutnya, keadaan kegemukan atau *fat dives* juga dapat berdampak pada ruang ventilasi paru-paru. Hal ini disebabkan selama proses kontraksi dan pembukaan diafragma, terutama pada pernapasan perut, ventilasi ruang tidak optimal karena penghalang yang diakibatkan oleh akumulasi lemak dalam tubuh. Dampak dari ini adalah penurunan dramatis dalam kapasitas vital paru-paru (Rais et al., 2020).

Orang yang memiliki indeks massa tubuh (IMT) antara 25 hingga 27 masuk dalam kategori kelebihan berat badan, sementara mereka yang memiliki IMT lebih dari 27 masuk dalam kategori obesitas. Kelebihan berat badan atau obesitas menunjukkan akumulasi lemak dalam jaringan tubuh yang melebihi batas normal. Kemungkinan penyebab hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori adalah karena jumlah responden yang terbatas dan mayoritas dari mereka memiliki IMT dalam kisaran normal. Akibatnya, analisis bivariat antara

kejadian dekompresi dan IMT tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selain itu, faktor lain yang mungkin mempengaruhi kurangnya pengaruh IMT terhadap potensi kejadian penyakit dekompresi adalah karena pengukuran IMT dilakukan pada saat ini, sedangkan sebagian responden mungkin telah mengalami gejala dekompresi beberapa tahun yang lalu. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis pada beberapa responden, yang mungkin memengaruhi hubungan antara IMT dan dekompresi.

Responden yang memiliki status gizi normal tetapi mengalami dekompresi dapat disebabkan oleh faktor lain seperti umur, umur sangat berpengaruh terhadap aktifitas menyelam karena mempunyai hubungan dengan kesehatan penyelam. Dalam melakukan aktifitas menyelam tidak ada batasan umur yang menjadi penentuan jika seseorang ingin melakukan aktifitas menyelam. Namun rata-rata umur yang ideal yang disarankan untuk melakukan aktifitas menyelam yaitu 16-35 tahun. Umur yang lebih muda memiliki risiko yang lebih besar dikarenakan sebelum mencapai usia tertentu, struktur paru-paru belum mencukupi untuk terpapar tekanan tinggi yang terjadi saat menyelam. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah alveoli dalam paru-paru yang mencapai 12 kali lipat dari saat lahir hingga usia 8 tahun. Dengan jumlah alveoli yang lebih sedikit, kapasitas paru-paru menjadi lebih rendah, sehingga menyebabkan efisiensi pernapasan yang kurang optimal dan begitu pula umur yang sudah menua.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kasus yang terbatas disebabkan tidak lengkapnya data di puskesmas, menyebabkan peneliti mengalami kesulitan dalam mencari responden.
2. Terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin tidak dipahami oleh responden, yang dapat menyebabkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu, peneliti perlu menjelaskan isi kuesioner dengan bertanya langsung kepada responden untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.
3. Data dikumpulkan secara retrospektif, yang dapat menimbulkan risiko bias informasi karena responden mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat informasi masa lalu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara lama menyelam dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
2. Terdapat hubungan antara standarisasi APD dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
3. Terdapat hubungan antara kedalaman menyelam dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
4. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.
5. Tidak terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

6. Tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian dekompresi pada penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023.

B. Saran

1. Bagi Responden

Diharapkan lebih memperhatikan faktor risiko kerja yang dapat terjadi kapan saja dan bukan hanya melihat pekerjaan dari tingginya keuntungan yang dapat diperoleh, serta hendaknya memeriksakan kesehatan secara berkala.

2. Bagi Dinas Kesehatan / Puskesmas

Diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang regulasi management K3 pada penyelaman serta mengadakan kegiatan *screening* kesehatan secara rutin dan mengadakan pengadaan alat penyelaman yang terstandar bagi penyelam tradisional.


DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. D. M. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif* (Issue August). Airlangga University.
- Al- Mukhtashar. (2023a). *No Title*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/8515-surat-shad-ayat-29.html>
- Al- Mukhtashar. (2023b). *tafsir QS An-Nur Ayat 40*. <https://tafsirweb.com/6168-surat-an-nur-ayat-40.html>
- Al- Mukhtashar. (2023c). *Tafsir surah Al-Israa Ayat 26-27*. <https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-26-27.html>
- Al-Muyassar. (2023). *Tafsir Surat Al- A'raf Ayat 31*. TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html>
- Arbanto, B., Putra, K. P., & Al Ardha, M. A. (2018). Perbedaan tingkat keberhasilan 3 metode ekualisasi pada penyelam terlatih di lingkungan air tawar. *Jurnal Keolahragaan*, 6(2), 193–199. <https://doi.org/10.21831/jk.v6i2.21560>
- Ardiansyah, L. O., Zoahira, W. O. A., & Nawawi, N. (2021). Pemberian Edukasi Kesehatan pada Nelayan Penyelam tentang Penyakit Dekompresi (decompression sickness) Di Desa Leppe Kecamatan Soropia. *Jurnal Pengabdian Saintek Mandala Waluya*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.54883/jpsmw.v1i2.171>
- Azis, W. S., Febriyanto, C., & Kresna. (2021). *Hubungan Lama Waktu Menyelam dengan Kualitas Hidup Nelayan di Pulau Derawan*. 2(2), 1093.
- B, Y., Mahmud, N. U., & Sumiaty. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Dekompresi pada Nelayan Penyelam Tradisional di Pulau Barrang Lompo. *Window of Public Health Journal*, 2(2), 1031–1039. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i2.276>
- Candra, A. (2020). *Pemeriksaan Status Gizi*. Fakultas kedokteran, Universitas Diponegora Semarang.
- Chabibah, N., & Prasetya, T. A. (2021). *ORIGINAL ARTICLE Skrining Kesehatan Sebagai Upaya Deteksi Dini Dekompresi Sickness Pada Penyelam Tradisional di Situbondo*. 1–7.
- Desa Pulau Harapan. (2023). *Desa Pulau Harapan*. <http://pulauharapan.desa.id/>
- Embuai, Y., Denny, H. M., & Yuliani, S. (2020). *DOI: http://dx.doi.org/10.33846/sf11102 Analisis Faktor Individu, Pekerjaan dan Perilaku K3 pada Kejadian Penyakit Dekompresi pada Nelayan Penyelam Tradisional di Ambon Yowan Embuai*. 11(45), 6–12.

- Farida, I., Arini, D., & Astuti, N. M. (2020). Aplikasi Teknik Equalisasi Untuk Mencegah Barotrauma Pada Penyelam Tradisional. *GEMASSIKA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 155. <https://doi.org/10.30787/gemassika.v4i2.545>
- Hisnindarsyah, H., Usemahu, S. N., & Mainase, J. (2018). Respon Pasien Dengan Decompression Sickness Tipe I Terhadap Pemberian Terapi Oksigen Hiperbarik Di Rsal Dr.F.X Suhardjo Tahun 2016. *Molucca Medica*, 11, 28–34. <https://doi.org/10.30598/molmed.2018.v11.i2.28>
- Jalalain. (2023). *Tafsir Surah Taa- Haa Ayat 114*. <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-20-taha/ayat-114>
- Kemendes RI. (2019). *Tabel Batas Ambang Indeks Massa Tubuh*.
- Koesdianasari, E. S. (2019). Hubungan Antara Pengetahuan Menyelam Dengan Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bawah Air Di Perusahaan Konstruksi Bawah Laut. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 7(3), 348. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.348-356>
- Kongkamol, C., Kongkamol, P., Phanlamai, C., & Sathirapanya, C. (2023). *Role of health locus of control in preventing occupational decompression sickness among deep-sea fisherman divers*. <https://doi.org/10.1080/21642850.2022.2156345>
- Lucrezi, S., Egi, S. M., Pieri, M., Burman, F., Ozyigit, T., Cialoni, D., Thomas, G., Marroni, A., & Saayman, M. (2018). Safety priorities and underestimations in recreational scuba diving operations: A European study supporting the implementation of new risk management programmes. *Frontiers in Psychology*, 9(MAR), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00383>
- Maharja, R., & Ikhsan, N. (2023). *Factors Associated With Symptoms Of Decompressed*. 7(2), 176–184.
- Mallapiang, F., Syarfaini, & Aeni, S. (2023). *Trust and Occupational Safety Behavior Related to Decompressive Diseases on Bajo Ethnic Divers Diversity : Disease Preventive of Research Integrity*. 3(2), 69–78. <https://doi.org/10.24252/diversity.v3i2.35981>
- Muyassar, A.-. (2023). *Tafsir Surah Al- Ma'idah Ayat 90*. Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>
- Ningsih, S., & Febriyanto, K. (2021). *Hubungan Pengetahuan dengan Kejadian Kecelakaan Kerja pada Penyelam Tradisional di Pulau Derawan*. 2(3), 1892–1899.
- Papilaya, M. F., & Kelabora, J. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Masyarakat terhadap Timbulnya Penyakit Dekompresi pada Nelayan Tradisional di Desa

- Tamedan. *Global Health Science*, 6(4), 2622–1055.
<http://jurnal.csdforum.com/index.php/ghs>
- Rahman, Z., Kurniawati, D., & Apriani, R. (2020). Hubungan Pengetahuan dengan Gangguan Pendengaran Akibat Penyemaman Pada Penyelam Tradisional di Kampus Bugis: Case Report. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Stikes Hang Tuah Surabaya*, 15(2), 172–185. <https://doi.org/10.30643/jiksht.v15i2.114>
- Rahmawati, R., Anshar, M., Azis, N. N., & Rifada, A. A. Y. (2019). Penetapan Kadar Alkohol Pada Minas (Minuman Khas Sinjai) Yang Diperjualbelikan Di Kota Sinjai. *Jurnal Medika*, 4(2), 18–23. <https://doi.org/10.53861/jmed.v4i2.169>
- Rai, I. N., Artana, I. B., & Candrawati, N. W. (2019). *Symposium “ Occupational Lung Disease : what you need to know. ”*
- Rais, M., Russeng, S. S., Syafar, M., & Wahyu, A. (2020). The Effect of Individual Characteristics on the Potential Event of Decompression in Traditional Divers in the Bajo Village , Boalemo Regency. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(4), 217–228.
- Saranani, M., Hartono, R., & Alaudin. (2019). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Decompression Sickness. *Keperawatan*, 03(02), 30–35.
- Saraswati, D. A. (2018). *Faktor Risiko Gejala Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Pencari Ikan Hias Laut Di Kabupaten Banyuwangi.*
- Shihab, Q. (2023a). *Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 195.* TafsirQ.Com. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-195>
- Shihab, Q. (2023b). *Tafsir Surah An-Nahl Ayat 14.* TafsirQ.Com. <https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-14#tafsir-quraish-shihab>
- Sididi, M., & Rahman. (2022). *Jurnal Keperawatan*. 14, 491–498.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Tafui, M. A., Roga, A. U., & Hinga, I. A. T. (2021). Media Kesehatan Masyarakat Teripang Di Kelurahan Namosain Kota Kupang Media Kesehatan Masyarakat. *Media Kesehatan Masyarakat*, 3(3), 322–330.
- Takalelumang, M. L. W., Walembuntu, M., & Gobel, I. (2018). *Tradisional Di Kampung Simueng Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017.* 89–96.
- Vionalita, G. (2020). Modul Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Universitas Esa Unggul.*
- Wabula, L. R., Kusnanto, K., & Purwanto, B. (2019). Persepsi Risiko Keselamatan dan Kesehatan Menyelam pada Penyelam Tradisional dengan Kelompok di

- Provinsi Maluku: Studi Kualitatif. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 10(3), 184. <https://doi.org/10.33846/sf10305>
- Widyastuti, S. R., Hadisaputro, S., & Munasik, M. (2019). Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Hidup Penyelam Tradisional Penderita Penyakit Dekompresi. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.14710/jekkk.v4i1.4429>
- Wijaya, D. R., Abdullah, A. Z., Palutturi, S., Masyarakat, F. K., & Masyarakat, F. K. (2018). Risk Factors Working Life and Break Time To Decompression Sickness in Fisherman in Barrang Lompo Island. *Jkmm*, 1(3), 318–327. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jkmmunhas/article/download/8823/4571>
- Wijaya, D. R., Ekasari, R., Widiatuty, L., Arranury, Z. F., & Karini, T. A. (2021). Faktor Risiko Penyakit Dekompresi Pada Nelayan Penyelam Di Pulau Barrang Lompo. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.32382/medkes.v16i1.2005>



L

A

M

P

I

R

A

N

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

KUESIONER PENELITIAN

DETERMINAN KEJADIAN DEKOMPRESI PADA PENYELAM

DI PULAU KAMBUNO KECAMATAN PULAU SEMBILAN

KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

No. Kuesioner :

Tanggal Wawancara :

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

A. Karakteristik Responden		
A1	Kabupaten	
A2	Kecamatan	
A3	Kelurahan/ RW	
A4	Nama	
A5	Umur Tahun
A6	Pendidikan Terakhir	1. Tidak sekolah 2. Tidak tamat SD 3. Tamat SD 4. Tamat SMP 5. Tamat SMA 6. Diploma / sarjana
A7	Masa Kerja Tahun
A8	Identitas Penyelaman	
B. Kejadian Dekompresi		
B1	Apakah anda menderita penyakit dekompresi ?	a. Ya b. Tidak
B2	Jika tidak, apakah anda merasakan beberapa gejala berikut?	a. Nyeri Sendi b. Gatal – gatal c. Bercak darah pada kulit d. Kesemutan

		e. Lumpuh
C. Lama Penyelaman		
C1	Berapa lama rata-rata waktu yang anda gunakan untuk melakukan penyelaman dalam satu kali menyelam ? Menit
D. Penggunaan APD		
D1	Apakah anda menggunakan APD yang sesuai SNI ketika menyelam? (scuba)	a. Ya b. Tidak
D2	Jika tidak, alat pelindung apa yang anda gunakan ketika melakukan penyelaman?	
E. Kedalaman Menyelam		
E1	Berapa rata-rata kedalaman yang sering anda capai setiap melakukan penyelaman ? Meter
F. Pengetahuan		
F1	Salah satu persiapan bagi seorang penyelam adalah ?	a. Menggunakan pakaian yang pas dan tidak ada kerutannya b. Menggunakan pakaian yang baru dan ada kerutannya c. Menggunakan pakaian yang longgar d. Menggunakan pakaian yang tidak pas dan ada kerutannya
F2	Perubahan tekanan saat menyelam akan berakibat terutama pada sakitnya gendang telinga, untuk itu penyelam harus melakukan penyesuaian melalui?	a. Naik ke permukaan dulu b. Menyamakan tekanan/ Teknik equalisasi c. Tetap di kedalaman d. Peregangan Telinga

F3	Jika anda mengalami kehabisan udara pada saat menyelam dan anda tidak dapat melihat keadaan sekitar, maka anda harus?	<ul style="list-style-type: none"> a. Meluncur naik ke permukaan b. Naik ke permukaan sambil menahan napas c. Naik ke permukaan secara terkontrol d. Mencari tempat yang bias melihat keadaan di sekitar dengan jelas
F4	Jika penyelam yang sedang berada di kedalaman dan merasa tidak mampu berfikir dengan baik dan tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat maka ini adalah gejala?	<ul style="list-style-type: none"> a. Keracunan zat kimia b. Keracunan air c. Keracunan oksigen d. Keracunan makanan
F5	Cara yang baik untuk equalisasi (menyamakan tekanan) saat menyelam adalah ?	<ul style="list-style-type: none"> a. Bernafas terus menerus pada saat naik b. Tetap bernafas secara bertahap c. Pijit hidung dan tutup mulut d. Pijit hidung dan tutup mulut kemudian hembuskan melalui hidung secara wajar
G. Konsumsi Alkohol		
G1	Apakah anda mengonsumsi alkohol sebelum melakukan penyelaman?	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak
G2	Jenis minuman apa yang biasa anda konsumsi?	
G3	Seberapa banyak alkohol yang biasa anda konsumsi? Liter
H. Status Gizi		
H1	Berapakah ukuran berat badan anda? Kg
H2	Berapakah ukuran tinggi anda?Cm

I. Perilaku Merokok	
I1	Apakah anda merokok sebelum melakukan penyelaman? a. Ya b. Tidak
I2	Berapa banyak rokok yang anda konsumsi sebelum melakukan penyelaman?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 16869/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3729/Un.06/LP2M/PP.00.9/5/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUTHAHARA QALBI SUQRI
Nomor Pokok	: 70200119046
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" DETERMINAN KEJADIAN DEKOMPRESI PADA PENYELAM DI PULAU KAMBUNO
KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Mei s/d 17 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pendidikan Raya No. 111L, Kelurahan (Balegga) Kabupaten Sinjai Talpon : (0482) 21000 Faks : (0482) 24250 Kode Pos : 90612 Kabupaten Sinjai

Nomor : 01365/16/01/DPM-PTSPN/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan Kab. Sinjai

Di
 Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 16969/S.01/PTSP/2023, Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Penelitian .
 Bahwa Mahasiswa/Peneliti yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUTHAHARA QALBI SUQRI
 Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai/11 Juli 2001
 Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 NIM : 70200119046
 Program Studi : KESEHATAN MASYARAKAT
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sawerigading, Kel./Desa Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah/Instansi Saudara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, Dengan Judul : DETERMINAN KEJADIAN DEKOMPRESI PADA PENYELAM DI PULAU KAMBUNO KECAMATAN PULAU SEMBILAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023.

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Mei s/d 17 Juni 2023
 Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan yang bersangkutan harus melaporkan diri kepada instansi tersebut di atas;
 2. Kegiatan tidak boleh menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata kepentingan pengumpulan data;
 3. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan mengindahkan adat istiadat setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada instansi tersebut di atas; dan
 5. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil Laporan kepada Bupati Sinjai Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
 Pada tanggal : 22 Mei 2023

a.n. **BUPATI SINJAI**
 KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP., M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc
 NIP : 197011301990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sinjai (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati UIN Alauddin Makassar
3. Camat Pulau Sembilan Kab. Sinjai
4. Yang bersangkutan (Muthahara Qalbi Suqri)
5. Arsip

M A K A S S A R

Lampiran 3 Etik Penelitian

HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.422/KEPK/FKIK/V/2023

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muthahara Qalbi Suqri
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023"

"Determinants of Decompression Events in Divers on Kambuno Island, Pulau Sembilan District, Sinjai Regency in 2023"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfilment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.

This declaration of ethics applies during the period May 29th, 2023 until May 29th, 2024.

May 29th, 2023
Chairperson,
M.Kes



Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN PULAU SEMBILAN
DESA PULAU HARAPAN
Alamat Pulau Kambuno Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan KP 92614

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN
Nomor : 02/DPH/KPS/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, menerangkan bahwa:

Nama : **MUTAHHARAH QALBI SUQRI**
Tempat Tgl/Lahir : Sinjai, 11-07-2001
Nim : 70200119046
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Insitusi : UIN Alauddin Makassar
No.Telpon : 085242897244

Bahwa yang tersebut Namanya diatas telah melakukan penelitian di Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Selama 15 (Lima belas) Hari untuk mendapatkan data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul **"Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai"**.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pulau Harapan 29 Mei 2023
An. Kepala Desa Pulau Harapan

P. H. G. S. Pi

M A K A S S A R

Lampiran 5 Informed Consent



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. Telp. 0411-841879, Fax. 0411-8281400

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (INFORMED CONCENT)

Kepada Yth,
Calon Responden
Di,-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Muthahara Qalbi Suqri , NIM 70200119046 mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “ **Determinan Kejadian Dekompresi pada Penyelam di Pulau Kambuno Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai Tahun 2023** ” untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM).

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Maka dengan ini saya secara suka rela dan tanpa paksaan menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.

Sinjai , 2023
Responden

()

M A K A S S A R

Lampiran 6 Master Tabel

1	Dusun	Nama	Umur	Pendidikan	Tenaga	Identitas	Peny Mas	B1	B2	B3	C1	KATE D1	KATE D2	E1	KATEG F1	F2	F3	F4	F5	TOT KAT	G1	G2	G3	H1	H2	IMT	KA I1	KA I2
2	Kambuno	AR	41 tahun	2 Tamat SD	2 Ikan	1	10	1	5 tahu	0	120 me	1 Tidak	1 kompre 70 me	1	1	1	0	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	59 Kg	160 Cm	23,9	2 Tida	2 Tidak
3	Kambuno	MY	54 tahun	Tamat SD	2 Teripang	2	10	2	0	1	30 men	2 ya	2 Scuba 7 mete	2	0	1	0	1	1	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	69 Kg	170 Cm	23,9	2 Tida	2 Tidak
4	Kambuno	SR	42 tahun	2 Tamat SM	3 Gurita	3	24	2	0	2	60 men	2 Tidak	1 kompre 30 me	1	1	1	0	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	65 Kg	170 Cm	22,5	2 Ya	1 1 bungkus
5	Kambuno	SB	45 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	32	2	0	4	30 men	2 Tidak	1 kompre 5 mete	2	0	1	1	0	1	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	54 Kg	160 Cm	21	2 Ya	1 1 bungkus
6	Kambuno	MT	40 tahun	2 Tamat SD	2 Gurita	3	24	2	0	1	30 men	2 Tidak	1 kompre 9 mete	2	0	1	0	1	1	60	2 Ya	1 Bir	2 slot	50 Kg	160 Cm	19,5	2 Ya	1 1 bungkus
7	Kambuno	JT	37 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	10	1	3 tahu	0	30 men	2 tidak	1 kompre 30 me	1	0	0	0	1	1	40	1 Tida	2 Tidal	Tidak	58 Kg	165 Cm	21,3	2 Ya	1 1 bungkus
8	Kambuno	AR	51 tahun	3 Tamat SD	2 Teripang	2	28	2	0	1	30 men	2 ya	2 Scuba 30 me	1	0	1	0	1	1	60	2 Ya	1 Bir	2 slot	63 Kg	172 Cm	21,3	2 Ya	1 2 bungkus
9	Kambuno	HY	45 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	25	2	0	1	15 men	2 Tidak	1 kompre 17 me	1	0	0	0	1	0	20	1 Ya	1 Bir	2 slot	64 Kg	168 Cm	22,6	2 Ya	1 2 bungkus
10	Kambuno	MJ	59 tahun	3 Tamat SD	2 Gurita	3	30	2	0	4	30 men	2 Tidak	1 Tanpa : 3 mete	2	1	1	1	1	0	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	43 Kg	153 Cm	18,3	1 Tida	2 Tidak
11	Kambuno	SM	33 tahun	1 Tamat SD	2 Ikan	1	10	2	0	1	60 men	2 Tidak	1 kompre 30 me	1	1	0	1	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	59 Kg	160 Cm	23,9	2 Ya	1 1 bungkus
12	Kambuno	HM	26 tahun	1 Tamat SM	3 Teripang	2	4	2	0	1	60 men	2 Ya	2 Scuba 30 me	1	0	1	1	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	60 Kg	179 Cm	18,7	2 Ya	1 1 bungkus
13	Kambuno	SD	42 tahun	2 Tamat SD	2 Gurita	3	24	2	0	1	60 men	2 Ya	2 Scuba 40 me	1	1	0	1	0	0	40	1 Tida	2 Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2 Ya	1 1 bungkus
14	Kambuno	DA	41 tahun	2 Tamat SD	2 Gurita	3	30	2	0	4	60 men	2 Tidak	1 kompre 8 mete	2	0	1	1	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	62 Kg	183 Cm	18,5	2 Tida	2 Tidak
15	Kambuno	HS	55 tahun	3 Tamat SD	2 Gurita	3	40	2	0	1	60 men	2 Tidak	1 kompre 30 me	1	0	1	1	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	60 Kg	175 Cm	19,5	2 Ya	1 1 bungkus
16	Kambuno	AK	48 tahun	2 Tamat SM	3 Ikan	1	30	2	0	1	60 men	2 Ya	2 Scuba 30 me	1	1	1	0	1	0	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	50 Kg	180 Cm	15,4	1 Ya	1 1 bungkus
17	Kambuno	FI	47 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	30	2	0	2	60 men	2 Tidak	1 kompre 5 mete	2	1	1	1	1	0	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	55 Kg	178 Cm	17,3	1 Tida	2 Tidak
18	Kambuno	LN	32 tahun	1 Tamat SD	2 Gurita	3	7	2	0	1	120 me	1 Tidak	1 kompre 20 me	1	1	0	1	1	0	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	59 Kg	175 Cm	19,2	2 Tida	2 Tidak
19	Kambuno	MA	41 tahun	2 Tamat SM	3 Gurita	3	20	2	0	1	60 men	2 Ya	2 Scuba 25 me	1	1	1	1	1	1	##	2 Tida	2 Tidal	Tidak	61 Kg	180 Cm	18,8	2 Tida	2 Tidak
20	Kambuno	IL	58 tahun	3 Tamat SD	2 Gurita	3	15	2	0	1	20 men	2 Tidak	1 Tanpa : 5 mete	2	0	0	1	1	1	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2 Ya	1 1 bungkus
21	Kambuno	AD	41 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	10	2	0	1	60 men	2 Ya	2 Scuba 35 me	1	1	1	1	1	1	##	2 Tida	2 Tidal	Tidak	43 Kg	153 Cm	18,3	1 Tida	2 Tidak
22	Kambuno	IK	46 tahun	2 Tamat SM	3 Teripang	2	7	2	0	4	120 me	1 Tidak	1 kompre 20 me	1	1	1	1	1	0	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	55 Kg	161 Cm	21,2	2 Ya	1 1 bungkus
23	Kambuno	MA	36 tahun	2 Tamat SD	2 Teripang	2	10	2	0	1	30 men	2 Tidak	1 kompre 9 mete	2	0	1	1	1	0	60	2 Tida	2 Tidal	Tidak	58 Kg	174 Cm	19,1	2 Ya	1 1 bungkus
24	Kambuno	SH	29 tahun	1 Tamat SD	2 Teripang	2	10	2	0	1	20 men	2 Ya	2 Scuba 40 me	1	0	1	1	1	1	80	2 Tida	2 Tidal	Tidak	57 Kg	169 Cm	19,9	2 Tida	2 Tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
25	Kambuno	KM	41 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	30	2	0	1	60 men	2	Tidak	1	kompre 15 me	1	1	1	1	1	1	##	2	Tida	2	Tidal	Tidak	43 Kg	164 Cm	15,9	1	Ya	1	3 bungkus		
26	Kambuno	SL	38 tahun	2	Tidak Tam	1	Teripang	2	30	2	0	1	60 men	2	Tidak	1	kompre 7 mete	2	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	57 Kg	170 Cm	18,3	1	Ya	1	1 bungkus		
27	Kambuno	SI	28 tahun	1	Tamat SM	4	Teripang	2	10	2	0	4	60 men	2	Ya	2	Scuba 20 me	1	1	1	1	1	1	##	2	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	169 Cm	17,8	1	Tida	2	Tidak		
28	Kambuno	SP	41 tahun	2	Tidak Sekc	1	Teripang	2	30	2	0	4	30 men	2	Ya	2	Scuba 30 me	1	0	0	0	1	0	20	1	Tida	2	Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2	Ya	1	1 bungkus		
29	Kambuno	NR	21 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	1	60 men	2	Tidak	1	kompre 21 me	1	1	1	0	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	53 Kg	179 Cm	16,5	1	Ya	1	1 bungkus		
30	Kambuno	IN	35 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	8	2	0	1	15 men	2	Tidak	1	kompre 20 me	1	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	66 Kg	165 Cm	24,2	2	Tida	2	Tidak		
31	Kambuno	IM	48 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	30	2	0	1	27 men	2	Tidak	1	kompre 32 me	1	1	1	1	1	0	80	2	Tida	2	Tidal	Tidak	46 Kg	174 Cm	15,1	1	Ya	1	1 bungkus		
32	Kambuno	ZR	47 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	29	2	0	4	60 men	2	Ya	2	Scuba 35 me	1	0	0	1	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	166 Cm	18,5	2	Ya	1	1 bungkus		
33	Kambuno	AB	34 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	20	2	0	1	15 men	2	Tidak	1	kompre 20 me	1	1	1	1	1	1	##	2	Tida	2	Tidal	Tidak	44 Kg	165 Cm	16,1	1	Ya	1	2 batang		
34	Kambuno	SF	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	5	2	0	1	120 me	1	Ya	2	Scuba 30 me	1	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	53 Kg	154 Cm	22,3	2	Tida	2	Tidak		
35	Kambuno	NS	47 tahun	2	Tamat SD	2	Ikan	1	30	2	0	1	30 men	2	Tidak	1	Tanpa : 7 met	2	0	0	1	1	1	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	63 Kg	184 Cm	18,6	2	Ya	1	1 bungkus		
36	Kambuno	HN	32 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	5	2	0	4	60 men	2	Tidak	1	kompre 20 me	1	0	0	1	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	61 Kg	182 Cm	18,4	1	Tida	2	Tidak		
37	Kambuno	AI	40 tahun	2	Tamat SD	2	Gurita	3	10	2	0	1	60 men	2	Ya	2	Scuba 30 me	1	0	0	0	1	0	20	1	Tida	2	Tidal	Tidak	42 Kg	168 Cm	14,8	1	Ya	1	1 bungkus		
38	Kambuno	AH	27 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	1	30 men	2	Tidak	1	kompre 15 me	1	0	1	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	46 Kg	190 Cm	12,7	1	Ya	1	1 bungkus		
39	Kambuno	SR	41 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	2	0	1	30 men	2	Tidak	1	kompre 15 me	1	0	1	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	72 Kg	182 Cm	21,7	2	Ya	1	1 bungkus		
40	Kambuno	HR	41 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	2	0	1	120 me	1	Ya	2	Scuba 40 me	1	1	0	1	1	1	80	2	Tida	2	Tidal	Tidak	64 Kg	179 Cm	19,9	2	Ya	1	1 bungkus		
41	Kambuno	AM	31 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	7	2	0	4	60 men	2	Tidak	1	kompre 20 me	1	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	56 Kg	172 Cm	18,9	2	Ya	1	1 bungkus		
42	Kambuno	AH	32 tahun	1	Tamat SD	2	Ikan	1	10	2	0	4	120 me	1	Tidak	1	kompre 10 me	1	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	164 Cm	18,9	2	Ya	1	1 bungkus		
43	Kambuno	JN	31 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	10	1	3 tahu	0	80 men	1	Tidak	1	kompre 30 me	1	0	0	0	1	1	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	181 cm	15,5	1	Tida	2	Tidak		
44	Kambuno	SB	50 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	1	5 tahu	0	90 men	1	Tidak	1	kompre 30 me	1	0	1	0	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	176 Cm	16,4	1	Tida	2	Tidak		
45	Kambuno	AM	49 tahun	2	Tidak Tam	1	Teripang	2	20	1	5 tahu	0	75 men	1	Tidak	1	kompre 28 me	1	0	0	0	0	0	0	1	Tida	2	Tidal	Tidak	Tidak di	14,8	1	Tida	2	Tidak			
46	Kambuno	TH	50 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	1	2,5 ta	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 25 me	1	0	0	0	1	0	20	1	Tida	2	Tidal	Tidak	60 Kg	164 Cm	22,3	2	Tida	2	Tidak		
47	Kambuno	HL	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	30	2	0	4	20 men	2	Tidak	1	kompre 20 me	1	0	1	0	1	1	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	42 Kg	168 Cm	14,8	1	Ya	1	1 bungkus		
48	Kambuno	BS	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	1	60 men	2	Ya	2	Scuba 30 me	1	1	0	0	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	56 Kg	165 Cm	20,5	2	Tida	2	Tidak		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AC	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	
48	Kambuno	BS	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	1	60 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	1	0	0	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	56 Kg	165 Cm	20,5	2	Tida	2	Tidak		
49	Kambuno	IF	27 tahun	1	Tamat SM	4	Teripang	2	10	2	0	1	30 men	2	Tidak	1	kompre 7 mete	2	1	1	1	1	1	##	2	Tida	2	Tidal	Tidak	51 Kg	176 Cm	16,4	1	Ya	1	1	bungkus		
50	Kambuno	ZD	57 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	30	2	0	1	30 men	2	Tidak	1	kompre 9 mete	2	0	1	0	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	38 Kg	162 Cm	14,4	1	Ya	1	1	bungkus		
51	Kambuno	JN	64 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	30	1	5 tahu	0	90 men	1	Tidak	1	kompre 30 mete	1	1	0	0	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	42 Kg	154 Cm	17,7	1	Tida	2	Tidak			
52	Kambuno	TB	60 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	30	2	0	2	10 men	2	Tidak	1	kompre 9 mete	2	0	0	1	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	40 Kg	153 Cm	17	1	Ya	1	1	bungkus		
53	Kambuno	AS	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	25	2	0	4	60 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	0	1	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	57 Kg	157 Cm	23,1	2	Tida	1	Tidak		
54	Kambuno	MF	34 tahun	1	Tidak Tam	1	Teripang	2	10	2	0	2	60 men	2	Tidak	1	kompre 7 mete	2	0	1	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2	Ya	1	2	bungkus		
55	Kambuno	AD	22 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	5	2	0	2	30 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	0	1	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	38 Kg	159 Cm	15,1	1	Ya	1	1	bungkus	
56	Kambuno	MN	57 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	5	2	0	1	20 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	0	0	1	1	1	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	65 Kg	176 Cm	20,9	2	Tida	2	Tidak		
57	Kambuno	YI	38 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	10	1	3 tahu	0	90 men	1	Tidak	1	kompre 40 mete	1	0	1	1	1	0	60	2	Ya	1	Bir	2	slot	67 Kg	171 Cm	22,9	2	Ya	1	1	bungkus	
58	Kambuno	ML	38 tahun	2	Tidak Tam	1	Teripang	2	13	1	4 tahu	0	120 me	1	Tidak	1	kompre 30 mete	1	0	0	0	1	0	20	1	Ya	1	Angg	1	Slot	57 Kg	178 Cm	17,9	1	Ya	1	1	bungkus	
59	Kambuno	RF	48 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	2	0	2	40 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	0	1	1	1	1	80	2	Ya	1	Bir	2	slot	48 Kg	172 Cm	16,2	1	Ya	1	6	batang
60	Kambuno	AD	40 tahun	2	Tidak Tam	1	Teripang	2	30	2	0	4	60 men	2	Tidak	1	kompre 20 mete	1	0	1	1	1	1	80	2	Tida	2	Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2	Ya	1	3	batang		
61	Kambuno	AZ	45 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	20	1	5 tahu	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 30 mete	1	0	0	0	0	0	0	1	Tida	2	Tidal	Tidak	55 Kg	178 Cm	17,3	1	Ya	1	1	batang		
62	Kambuno	SR	41 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	4	30 men	2	Tidak	1	kompre 30 mete	1	0	1	1	1	1	80	2	Tida	2	Tidal	Tidak	63 Kg	178 Cm	19,8	2	Tida	2	Tidak			
63	Kambuno	YA	51 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	3	2	0	1	60 men	2	Tidak	1	kompre 50 mete	1	0	0	1	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	71 Kg	172 Cm	23,9	2	Ya	1	6	batang		
64	Kambuno	KN	48 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	15	1	2,5 ta	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 30 mete	1	1	1	1	1	1	##	2	Tida	2	Tidal	Tidak	66 Kg	177 Cm	21	2	Tida	2	Tidak			
65	Kambuno	AU	50 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	15	1	5 tahu	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 30 mete	1	0	0	0	1	0	20	1	Tida	2	Tidal	Tidak	55 Kg	160 Cm	21,4	2	Ya	1	1	bungkus		
66	Kambuno	SY	34 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	10	2	0	1	60 men	2	Tidak	1	Tanpa	10 me	1	0	0	1	1	0	40	1	Tida	2	Tidal	Tidak	48 Kg	169 Cm	16,8	1	Ya	1	2	batang	
67	Kambuno	HK	21 tahun	1	Tamat SD	2	ikan	1	5	2	0	4	60 men	2	Tidak	1	kompre 9 mete	2	1	1	1	0	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	53 Kg	177 Cm	16,9	1	Ya	1	1	bungkus		
68	Kambuno	SR	41 tahun	2	Tamat SD	2	Teripang	2	10	1	3 tahu	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 24 mete	1	1	1	0	1	1	80	2	Ya	1	Angg	2	slot	47 Kg	167 Cm	16,8	1	Tida	2	Tidak		
69	Kambuno	IK	41 tahun	2	Tamat SM	4	Teripang	2	10	1	5 tahu	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 30 mete	1	1	0	0	1	0	40	1	Ya	1	Angg	1	Slot	84 Kg	186 Cm	24,2	2	Ya	1	1	bungkus	
70	Kambuno	SG	59 tahun	3	Tamat SD	2	Teripang	2	40	2	0	4	60 men	2	Ya	2	Scuba	30 me	1	0	0	0	1	0	20	1	Tida	2	Tidal	Tidak	59 Kg	172 Cm	19,9	2	Tida	2	Tidak		
71	Kambuno	WA	31 tahun	1	Tamat SD	2	Teripang	2	15	1	5 tahu	0	60 men	2	Tidak	1	kompre 20 mete	1	1	0	1	1	0	60	2	Tida	2	Tidal	Tidak	47 Kg	175 Cm	15,3	1	Ya	1	1	bungkus		

Lampiran 7 Analisis Univariat

Statistics

		Umur	Masa Kerja
N	Valid	70	70
	Missing	0	0
Mean		41.71	17.64
Median		41.00	15.00
Std. Deviation		9.758	9.904
Minimum		21	3
Maximum		64	40
Percentiles	25	34.00	10.00
	50	41.00	15.00
	75	48.00	29.25

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	6	8.6	8.6	8.6
	TAMAT SD	56	80.0	80.0	88.6
	TAMAT SMP	5	7.1	7.1	95.7
	TAMAT SMA	3	4.3	4.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Identitas Penyelaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IKAN	6	8.6	8.6	8.6
	TERIPANG	54	77.1	77.1	85.7

	GURITA	10	14.3	14.3	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Penyakit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Menderita	15	21.4	21.4	21.4
	Tidak Menderita	55	78.6	78.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Lama Penyelaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Lama	12	17.1	17.1	17.1
	Tidak Lama	58	82.9	82.9	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Standarisasi APD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Berstandar	50	71.4	71.4	71.4
	Berstandar	20	28.6	28.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Kedalaman Menyelam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Dalam	55	78.6	78.6	78.6
	Dangkal	15	21.4	21.4	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	22	31.4	31.4	31.4
	Baik	48	68.6	68.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Konsumsi Alkohol

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Konsumsi	8	11.4	11.4	11.4
	Tidak Konsumsi	62	88.6	88.6	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Status Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Normal	29	41.4	41.4	41.4

Normal	41	58.6	58.6	100.0
Total	70	100.0	100.0	

Merokok

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Merokok	45	64.3	64.3	64.3
	Tidak Merokok	25	35.7	35.7	100.0
	Total	70	100.0	100.0	

Lampiran 8 Analisis Bivariat

Lama Menyelam * penyakit Crosstabulation

			Penyakit		
			Menderita	Tidak Menderita	Total
LM	Lama	Count	7	5	12
		Expected Count	2.6	9.4	12.0
		% within LM	58.3%	41.7%	100.0%
		% of Total	10.0%	7.1%	17.1%
	Tidak Lama	Count	8	50	58
		Expected Count	12.4	45.6	58.0
		% within LM	13.8%	86.2%	100.0%
		% of Total	11.4%	71.4%	82.9%
Total	Count	15	55	70	
	Expected Count	15.0	55.0	70.0	
	% within LM	21.4%	78.6%	100.0%	
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- side d)
Pearson Chi-Square	11.715 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	9.219	1	.002		

Likelihood Ratio	9.903	1	.002		
Fisher's Exact Test				.002	.002
Linear-by-Linear Association	11.548	1	.001		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.57.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for LM (Lama / Tidak Lama)	8.750	2.226	34.399
For cohort penyakit = menderit	4.229	1.897	9.428
For cohort penyakit = tidak menderit	.483	.246	.951
N of Valid Cases	70		

Standarisasi APD * penyakit Crosstabulation

StandarAPD	Tidak berstandar	Count	Penyakit		Total
			Menderit	Tidak Menderit	
		15	35	50	
		Expected Count	10.7	39.3	50.0
		% within StandarAPD	30.0%	70.0%	100.0%
		% of Total	21.4%	50.0%	71.4%
	Berstandar	Count	0	20	20
		Expected Count	4.3	15.7	20.0
		% within StandarAPD	0.0%	100.0%	100.0%

	% of Total	0.0%	28.6%	28.6%
Total	Count	15	55	70
	Expected Count	15.0	55.0	70.0
	% within StandarAPD	21.4%	78.6%	100.0%
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	7.636 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	5.958	1	.015		
Likelihood Ratio	11.655	1	.001		
Fisher's Exact Test				.004	.003
Linear-by-Linear Association	7.527	1	.006		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.29.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort penyakit = tidak menderit	.700	.584	.839
N of Valid Cases	70		



Kedalaman Menyelam * penyakit Crosstabulation

			Penyakit		Total
			Menderita	Tidak Menderita	
KM	Dalam	Count	15	40	55
		Expected Count	11.8	43.2	55.0
		% within KM	27.3%	72.7%	100.0%
		% of Total	21.4%	57.1%	78.6%
	Dangkal	Count	0	15	15
		Expected Count	3.2	11.8	15.0
		% within KM	0.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	0.0%	21.4%	21.4%
Total	Count	15	55	70	
	Expected Count	15.0	55.0	70.0	
	% within KM	21.4%	78.6%	100.0%	
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.207 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	3.713	1	.054		
Likelihood Ratio	8.286	1	.004		
Fisher's Exact Test				.029	.016

Linear-by-Linear Association	5.132	1	.023	
N of Valid Cases	70			

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.21.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort penyakit = tidak menderita	.727	.619	.855
N of Valid Cases	70		

Pengetahuan * penyakit Crosstabulation

		Penyakit		Total	
		Menderita	Tidak Menderita		
Pengetahuan	Kurang	Count	10	12	22
		Expected Count	4.7	17.3	22.0
		% within Pengetahuan	45.5%	54.5%	100.0%
		% of Total	14.3%	17.1%	31.4%
	Baik	Count	5	43	48
		Expected Count	10.3	37.7	48.0
		% within Pengetahuan	10.4%	89.6%	100.0%
		% of Total	7.1%	61.4%	68.6%
Total	Count	15	55	70	
	Expected Count	15.0	55.0	70.0	
	% within Pengetahuan	21.4%	78.6%	100.0%	

% of Total	21.4%	78.6%	100.0%
------------	-------	-------	--------

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	11.000 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	9.017	1	.003		
Likelihood Ratio	10.347	1	.001		
Fisher's Exact Test				.003	.002
Linear-by-Linear Association	10.843	1	.001		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.71.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pengetahuan (Kurang / baik)	7.167	2.054	25.008
For cohort penyakit = menderita	4.364	1.692	11.255
For cohort penyakit = tidak menderita	.609	.411	.902
N of Valid Cases	70		

Konsumsi Alkohol * penyakit Crosstabulation

		Count	Penyakit		Total
			Menderita	Tidak Menderita	
KA	komsumsi	4	4	8	

	Expected Count	1.7	6.3	8.0
	% within KA	50.0%	50.0%	100.0%
	% of Total	5.7%	5.7%	11.4%
Tidak konsumsi	Count	11	51	62
	Expected Count	13.3	48.7	62.0
	% within KA	17.7%	82.3%	100.0%
	% of Total	15.7%	72.9%	88.6%
Total	Count	15	55	70
	Expected Count	15.0	55.0	70.0
	% within KA	21.4%	78.6%	100.0%
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.379 ^a	1	.036		
Continuity Correction ^b	2.673	1	.102		
Likelihood Ratio	3.686	1	.055		
Fisher's Exact Test				.058	.058
Linear-by-Linear Association	4.317	1	.038		
N of Valid Cases	70				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.71.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for KA (komsumsi / Tidak komsumsi)	4.636	1.003	21.442
For cohort penyakit = menderita	2.818	1.174	6.768
For cohort penyakit = tidak menderita	.608	.301	1.227
N of Valid Cases	70		

Status Gizi * penyakit Crosstabulation

			Penyakit		Total
			Menderita	Tidak Menderita	
SG	Tidak normal	Count	8	21	29
		Expected Count	6.2	22.8	29.0
		% within SG	27.6%	72.4%	100.0%
		% of Total	11.4%	30.0%	41.4%
	Normal	Count	7	34	41
		Expected Count	8.8	32.2	41.0
		% within SG	17.1%	82.9%	100.0%
		% of Total	10.0%	48.6%	58.6%
Total	Count	15	55	70	
	Expected Count	15.0	55.0	70.0	
	% within SG	21.4%	78.6%	100.0%	
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1.115 ^a	1	.291		
Continuity Correction ^b	.578	1	.447		
Likelihood Ratio	1.101	1	.294		
Fisher's Exact Test				.378	.223
Linear-by-Linear Association	1.099	1	.294		
N of Valid Cases	70				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.21.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for SG (Tidak normal / Normal)	1.850	.585	5.850
For cohort penyakit = menderit	1.616	.660	3.958
For cohort penyakit = tidak menderit	.873	.671	1.137
N of Valid Cases	70		

Merokok * penyakit Crosstabulation

			Penyakit		Total
			Menderit	Tidak Menderit	
Merokok	merokok	Count	7	38	45

	Expected Count	9.6	35.4	45.0
	% within Merokok	15.6%	84.4%	100.0%
	% of Total	10.0%	54.3%	64.3%
tidak merokok	Count	8	17	25
	Expected Count	5.4	19.6	25.0
	% within Merokok	32.0%	68.0%	100.0%
	% of Total	11.4%	24.3%	35.7%
Total	Count	15	55	70
	Expected Count	15.0	55.0	70.0
	% within Merokok	21.4%	78.6%	100.0%
	% of Total	21.4%	78.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.581 ^a	1	.108		
Continuity Correction ^b	1.697	1	.193		
Likelihood Ratio	2.497	1	.114		
Fisher's Exact Test				.134	.098
Linear-by-Linear Association	2.544	1	.111		
N of Valid Cases	70				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.36.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 9 Dokumentasi



Pengisian Kuesioner



Melakukan Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan



Garmin (Alat Pengukur Kedalaman) dan Kompresor

Lampiran 10 Riwayat Hidup Peneliti

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama Lengkap : Muthahara Qalbi Suqri
Nama Panggilan : Qalbi
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 11 Juli 2001
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Orangtua
 Ayah : A. Suhartono
 Ibu : Qariati
Anak Ke : Empat
Alamat : Jl. Sawerigading No. 32, Sinjai
Email : muthaharaqalbisuqri@gmail.com
Riwayat pendidikan : 1. SDN No. 103 Bontompare (2007-2013)
 : 2. MTs. Muhammadiyah Balangnipa (2013-2016)
 : 3. MAN 2 Sinjai (2016-2019)
 : 4. UIN Alauddin Makassar (2019-2023)
Pengalaman Organisasi : HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2021-2022