

**UJI AKTIVITAS ANTIMALARIA EKSTRAK DAUN ANAK DARA (*Croton
oblongus* Burm F.) TERHADAP *Plasmodium falciparum***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH:

SITI KIRANI RAMADHANI SOFYAN

NIM: 70100119041

**JURUSAN FARMASI
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Kirani Ramadhani Sofyan
NIM : 70100119041
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 03 Desember 2000
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 93, Kota Makassar.
Alamat : Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara
(*Croton Oblongus* Burm F.) Terhadap *Plasmodium falciparum*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa,

Peneliti

Siti Kirani Ramadhani Sofyan

NIM: 70100119041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm. F terhadap *Plasmodium Falciparum*” yang disusun oleh **Siti Kirani Ramadhani Sofyan, NIM: 70100119041**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 23 Oktober 2023 M** yang bertepatan dengan **08 Rabiul Akhir 1445 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 Oktober 2023
08 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin.	(.....)
Penguji I	: apt. Indah, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. ST. Nasriah, M.Sos.I	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Dewi Setiawati, Sp. OG., M.Kes.
19810621 200604 2 005

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penulis, diantaranya keimanan dan Kesehatan serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penulis menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penulis mendapatkan limpahan Rahmat dari Allah Swt.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) Terhadap *Plasmodium falciparum*” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Farmasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua yang terhormat dan tersayang yang telah berkontribusi dalam beberapa hal untuk penyusunan skripsi ini. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Sofyan dan Ibu Dewi yang selalu mendoakan dan menunjukkan semangat yang luar biasa kepada penulis serta dukungan moril dan materil.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang penulis hormati sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Bapak Andi Aderus, Lc., M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Muhammad Khalifa Mustamin, M.Pd, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Muhammad Amry, Lc., M.Ag, selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Dewi Setiawati Muchsin, Sp. OG., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Bapak apt. Muh Rusdi, S.Si, M.Si, selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Ibu apt. Khaerani, S.Farm, M.Farm,kiln, selaku Sekretaris Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
9. Ibu apt Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan, serta meluangkan waktu dan pikirannya demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu apt. Khaerani, S.Farm., M.Farm.Klin., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan, serta meluangkan waktu dan pikirannya demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu apt. Indah, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing Akademik dan Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini serta memberikan arahan dan motivasi dalam proses perkuliahan dan penelitian

12. Ibu Dr. ST. Nasriah, M.Sos.I., selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen, Laboran dan Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
14. Teman-teman INTERFERON19 yang tak henti-hentinya memberi semangat serta senantiasa saling mendukung dan merangkul, terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Uraian Tanaman Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm F)	9
B. Ekstraksi.....	11
C. Malaria	19
D. <i>Plasmodium falciparum</i>	29
E. Tinjauan Islam.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sampel.....	41
D. Alat Dan Bahan	41
E. Cara Kerja	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Daun Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm f).....	11
Gambar 2. Diagram Ekstraksi Cair-Cair	12
Gambar 3. Metode Perkolasi.....	15
Gambar 4. Seperangkat Alat Refluks.....	16
Gambar 5. Metode Sokletasi.....	17
Gambar 6. Metode <i>Microwave assisted-extraction</i>	19
Gambar 7. Nyamuk Anopheles Memompa Darah.....	20
Gambar 8. Siklus Penularan Malaria.....	22
Gambar 9. Siklus Hidup Plasmodium	32
Gambar 10. Larva Nyamuk <i>Anopheles</i> sp	33
Gambar 11. Siklus Hidup Nyamuk <i>Anopheles</i> sp	34
Gambar 12. Nyamuk Anopheles Betina Menghisap Darah	36
Gambar 13. Pengambilan Sampel	73
Gambar 14. Disortasi Kering	73
Gambar 15. Pengeringan Sampel	74
Gambar 16. Maserasi	74
Gambar 17. Penyaringan Ekstrak	75
Gambar 18 Penguapan ekstrak dengan rotary evaporator	75
Gambar 19. Hasil Ekstrak.....	76
Gambar 20. Penimbangan Ekstrak	76
Gambar 21. Uji Fitokimia	77
Gambar 22. uji tanin	77
Gambar 23. uji terpenoid	78
Gambar 24. uji flavonoid	78
Gambar 25. uji alkaloid	79
Gambar 26. uji fenolik	79
Gambar 27. uji steroid	80
Gambar 28. uji saponin	80

Gambar 29. pengeringan ekstrak dengan *freeze dryer* 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengobatan lini pertama malaria falsiparum menurut berat badan dengan DHP dan Primakuin	25
Tabel 2. Pengobatan lini pertama malaria vivaks menurut berat badan dengan DHP dan Primakuin	26
Tabel 3. Pengobatan lini kedua untuk malaria falsiparum (dengan obat kombinasi kina dan doksisklin)	27
Tabel 4. dosis doksisklin	27
Tabel 5. Pengobatan lini kedua untuk malaria falsiparum (dengan obat kombinasi kina dengan tetrasiklin)	28
Tabel 6. Dosis tetrasiklin	28
Tabel 7. Hasil Ekstraksi daun Anak Dara	48
Tabel 8. Hasil Skrining Fitokimia	48
Tabel 9. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Daun Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm F)	49
Tabel 10. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Klorokuin terhadap Plasmodium falciparum	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Kerja	61
Lampiran 2 Perhitungan Rendamen Ekstrak Daun Anak Dara	67
Lampiran 3. Perhitungan konsentrasi bahan uji	68
Lampiran 4 Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Daun Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm F)	69
Lampiran 5 Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Klorokuin (Kontrol positif).....	70
Lampiran 6 Hasil Probit Analysis Daun Anak Dara (<i>Croton oblongus</i> Burm F) terhadap <i>Plasmodium falciparum</i>	71
Lampiran 7 Hasil Probit Analysis Klorokuin terhadap <i>Plasmodium falciparum</i>	72
Lampiran 8 Dokumentasi	73



ABSTRAK

Nama : Siti Kirani Ramadhani Sofyan

Nim : 70100119041

Judul : “Uji Aktivitas Anti Malaria Ekstrak Daun Anak Dara
(*Croton oblongus* Burm F) Terhadap *Plasmodium falciparum*”

Resistensi terhadap beberapa obat antimalaria masih menjadi masalah dalam menangani kasus penyakit malaria. Sehingga penemuan obat antimalaria yang baru serta berasal dari bahan alam menjadi salah satu prioritas utama untuk menangani malaria. Tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) telah dimanfaatkan secara empiris dan ilmiah sebagai antioksidan dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai obat alternatif malaria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) sebagai antimalaria dengan menggunakan metode uji in vitro pada parasit *Plasmodium falciparum* strain 3D7 dengan seri konsentrasi 100; 10; 1; 0,1 dan 0,01 µg/ml. Kontrol positif yang digunakan yaitu klorokuin dan kontrol negatif larutan DMSO. Ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki nilai hambatan rata-rata berturut-turut sebesar 68,96%; 30,44; 19,80; 9,70% dan 1,87% dan diperoleh nilai IC₅₀ sebesar 27,62 µg/ml sehingga antimalaria ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki aktivitas sebagai antimalaria yang masuk dalam kategori aktif.

Kata kunci: Resistensi, Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F), Antimalaria,
Plasmodium falciparum

ABSTRACT

Name : Siti Kirani Ramadhani Sofyan
Nim : 70100119041
Title : "Anti-Malarial Activity Test of Anak Dara Leaf Extract
(*Croton oblongus* Burm F) Against *Plasmodium falciparum*"

Resistance to several antimalarial drugs is still a problem in dealing with malaria cases. Therefore, the discovery of new antimalarial drugs derived from natural ingredients has become one of the main priorities to treat malaria. Anak Dara plant (*Croton oblongus* Burm F) has been used empirically and scientifically as an antioxidant and has the potential to be developed as an alternative medicine for malaria. This study aims to determine the activity of anak dara (*Croton oblongus* Burm F) leaf extract as an antimalarial using the in vitro test method on *Plasmodium falciparum* strain 3D7 parasites with a concentration series of 100; 10; 1; 0.1 and 0.01 µg/ml. The positive control used was chloroquine and negative control was DMSO solution. The anak dara leaf extract (*Croton oblongus* Burm F) has an average inhibition value of 68.96%; 30.44; 19.80; 9.70% and 1.87% respectively and obtained an IC₅₀ value of 27.62 µg/ml so that the antimalarial anak dara leaf extract (*Croton oblongus* Burm F) has activity as an antimalarial that falls into the active category.

Keywords: Resistance, Anak dara leaf (*Croton oblongus* Burm F), Antimalarial,

Plasmodium falciparum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Malaria adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia. Pada tahun 2016 Indonesia menjadi salah satu Negara dengan endemis malaria. Penyakit ini disebabkan oleh empat spesies protozoa genus *Plasmodium* yaitu *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Parasit malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina dan menginfeksi sel darah merah penderitanya. (Rachmawati *et al.*, 2021).

World Health Organization (WHO) menunjukkan melalui *World Malaria Report* (2018) bahwa terdapat 219 juta kasus malaria di seluruh dunia pada tahun 2017. Asia Tenggara menduduki posisi tertinggi kedua di dunia dengan jumlah kasus malaria 5% dari total kasus malaria dunia. Data WHO 2018 juga mengatakan bahwa kasus malaria di Asia Tenggara 50% disebabkan oleh *Plasmodium falciparum*. Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi malaria yang dihitung dari hasil pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) adalah 0,6%. Sebagian besar data yang dikumpulkan menunjukkan terdapat penurunan kasus malaria sejak diberlakukan *Global Technical Strategy* (GTS) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh WHO pada tahun 2016. Akan tetapi, pencapaian tersebut masih terlampau jauh dari target GTS dan SDGs. Hambatan terbesar yang dihadapi dunia dalam rangka *Global Malaria Control* (GMC) adalah penyebaran kasus resistensi parasit terhadap obat antimalaria yang ada. *Artemisinin-based combination therapies* (ACTs) adalah salah satu jenis

pengobatan malaria yang efektif dalam mengurangi jumlah kasus malaria. Namun, saat ini telah ditemukan kasus resistensi parasit malaria terhadap artemisinin. (Mery *et al.*, 2020). Di Indonesia sendiri penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan di beberapa wilayah, terutama pada kawasan timur Indonesia. Jumlah kasus malaria di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 304.607 kasus, jumlah ini cukup menurun jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2009, yaitu sebesar 418.439. Sehingga, berdasarkan jumlah kasus tersebut diketahui angka kasus kesakitan malaria, yang dinyatakan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) sebesar 1,1 kasus per 1000 penduduk.

Salah satu faktor utama penyebab meningkatnya infeksi malaria adalah timbulnya resisten terhadap obat antimalaria yang tersedia. Permasalahan resistensi terhadap obat antimalaria semakin lama semakin bertambah. Pada tahun 1973 telah ditemukan pertama kali kasus resistensi *Plasmodium falciparum* terhadap klorokuin di Kalimantan Timur. Sejak itu, kasus resistensi parasit ini dilaporkan semakin meluas. Pada tahun 1990 dilaporkan terjadi resistensi parasit *Plasmodium falciparum* terhadap klorokuin dari seluruh provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data diatas, saat ini banyak kasus resistensi obat terhadap *Plasmodium falciparum*. *Plasmodium falciparum* merupakan parasit malaria yang paling pathogen dan penyebab utama kematian yang merenggut 0,5 juta nyawa setiap tahunnya (Maier *et al.*, 2019). Keadaan seperti ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit malaria. Sehingga perlu penelitian lebih lanjut untuk pengobatan alternatif penyakit malaria (Depkes RI, 2008).

Selama beberapa dekade, tumbuhan obat telah berperan penting dalam pengobatan malaria dengan ditemukannya dua obat utama, seperti Kina dan Artemisinin yang digunakan di seluruh dunia. Dengan demikian, tanaman obat berarti memiliki potensi besar untuk menyediakan zat antimalaria baru. Diperkirakan juga bahwa 80% populasi di negara berkembang bergantung pada tanaman obat untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan mereka (Kweyamba *et al.*, 2019)

Tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.) secara empiris digunakan oleh masyarakat Sinjai untuk pengobatan. Namun, untuk bisa memastikan bahwa tumbuhan ini benar berkhasiat dalam pengobatan perlu penelitian lebih lanjut dan perlu penguasaan ilmu.

Anggota genus *Croton* dan berbagai bagian tanaman telah digunakan secara tradisional untuk mengobati penyakit menular seperti campak dan demam tifoid di Kenya dan melawan malaria di Ethiopia (Obey *et al.*, 2018) Genus *Croton* juga diketahui menghasilkan berbagai senyawa termasuk terpenoid, alkaloid dan flavonoid, beberapa di antaranya telah terbukti memiliki aktivitas anti kanker, anti inflamasi, anti maag, anti malaria dan antioksidan (Roba, 2022).

Uji aktivitas antioksidan anak dara (*Croton oblongus* Burm F) sudah pernah dilakukan oleh Awaluddin, dkk pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan setiap metode terhadap kemampuan aktivitas antioksidan klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.). Penentuan dilakukan dengan menggunakan 3 metode yaitu metode DPPH, FRAP, dan CUPRAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) memiliki aktivitas antioksidan dengan IC_{50} untuk metode DPPH yaitu 91,96 $\mu\text{g/ml}$, untuk metode FRAP IC_{50} ekstrak

metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) sebesar 419,3 $\mu\text{g/ml}$ dan untuk metode CUPRAC ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F.) memiliki aktivitas antioksidan dengan IC_{50} 130,9 $\mu\text{g/ml}$.

Penelitian lainnya yang menggunakan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm.F) sebagai sampel dilakukan oleh Haeria dkk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar total fenolat, flavonoid, dan karotenoid ekstrak metanol pada korteks anak dara (*Croton oblongus* Burm F) Ekstraksi kandungan kimia anak dara (*Croton oblongus* Burm F) dilakukan dengan metode maserasi menggunakan metanol hingga filtrat jernih. Hasil yang diperoleh dengan konsentrasi total fenolik 5,47%, flavonoid total 1,92%, dan total karotenoid 0,044%. Senyawa flavonoid merupakan metabolit sekunder yang tersebar luas pada tumbuhan, dan aktivitas antimalaria dari golongan senyawa ini telah banyak dilaporkan (Saxena *et al.*, 2003).

Dalam mengekstrak sampel penelitian ini pelarut yang digunakan adalah etanol 70%. Alasan pemilihan pelarut etanol 70% adalah karena etanol dapat menarik lebih banyak senyawa aktif dibandingkan pelarut organik lainnya Etanol memiliki titik didih yang rendah yaitu 79°C , sehingga membutuhkan panas yang lebih sedikit untuk memekatkannya. Selain itu, etanol merupakan satu-satunya jenis pelarut yang aman atau tidak beracun untuk dikonsumsi karena tingkat toksisitasnya yang rendah dibandingkan pelarut lainnya (Hasanah & Novian, 2020).

Berdasarkan gambaran di atas maka penelitian uji aktivitas antimalaria dianggap perlu untuk menambah informasi tentang khasiat tumbuhan anak dara.

B. Rumusan Masalah

Apakah ekstrak daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki aktivitas sebagai Antimalaria pada *Plasmodium falciparum*?

C. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah-istilah kata dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Antimalaria adalah suatu obat yang digunakan untuk mencegah, mengendalikan atau menyembuhkan penyakit malaria.
- b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai.
- c. Daun Anak Dara adalah daun dari tumbuhan dengan nama latin *Croton oblongus* Burm F yang berasal dari daerah Sinjai dan digunakan sebagai sampel dalam penelitian
- d. *Plasmodium falciparum* adalah jenis parasit malaria yang paling sering menjadi malaria berat menyebabkan kematian.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium untuk uji Antimalaria ekstrak etanol 70% daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) pada *Plasmodium falciparum*.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya dimana hal ini bertujuan untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, lalu dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Menurut penelitian yang dilakukan R. Samuel dkk pada tahun 2022 yang berjudul “Aktivitas Antimalaria In-vitro Tanaman *Thelgate (Aristolochia Bracteolata Lam)* yang diisolasi dari Juba, Sudan Selatan” Studi ini bertujuan untuk menguji aktivitas antimalaria *Aristolochia bracteolata lam* terhadap *Plasmodium falciparum* secara in vitro. Hasil dari penelitian ini menyatakan semua ekstrak tumbuhan yang diuji dengan menggunakan petroleum eter dan ekstrak air tradisional memiliki aktivitas antiplasmodik dan menunjukkan konsentrasi penghambatan tertinggi terhadap kultur in vitro *P. falciparum* dengan $IC_{50} < 0,5 \mu\text{g/ml}$ (Samuel *et al.*, 2022). Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pengujian antimalaria secara *in vitro*.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mukhriani dkk pada tahun 2015 yang berjudul Fraksinasi Senyawa Antimikroba Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) melaporkan bahwa tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) dari Kabupaten Sinjai telah banyak digunakan secara empiris sebagai produk kosmetik dan obat tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan kimia dan aktivitas antibakteri ekstrak daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) terhadap beberapa mikroorganisme. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% menghambat pertumbuhan bakteri. Pengujian potensi fraksi teraktif pada konsentrasi 1500 ppm, 1000 ppm dan 500 ppm, diperoleh hasil berturut-turut *E. coli*, 0,81 cm dan 0,72 cm, *Bacillus subtilis*, 0,90 cm dan 0,85 cm, *Streptococcus mutans*, 0,75 cm dan 0,71 cm, dan diperoleh untuk kolera. 0,74 cm dan 71 cm,

Tidak ada penghambatan diamati pada konsentrasi 500 ppm, hasil menunjukkan bahwa fraksi obat golongan A mengandung senyawa flavonoid. Persamaan dengan penelitian diatas adalah sampel yang sama dengan uji yang berbeda. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan tambahan informasi mengenai daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F)

3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Astuti *et al.*, 2019) yang berjudul Uji Aktivitas Antimalaria In Vitro Dari Ekstrak Etanol Batang Tanaman Ashitaba (*Angelica Keiskei*) melaporkan bahwa Infeksi penyakit malaria sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan yang parah dan cukup kompleks di dunia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol batang Ashitaba sebagai antimalarial pada parasite *Plasmodium falciparum* strain 3D7 dengan konsentrasi 100, 10, 1, 0,1 dan 0,01 µg/ml. Hasilnya menunjukkan bahwa Tanaman Ashitaba (*Angelica Keiskei*) positif mengandung senyawa flavonoid dan kalkon. Ekstrak tanaman ini menunjukkan rata-rata nilai penghambatan sebesar 67,75%, 46,61%, 32,56%, 19,60%, dan 7,56%. Hasil uji aktivitas antimalaria ekstrak daun tanaman Ashitaba (*Angelica Keiskei*) diperoleh nilai IC₅₀ 11,07 µg/ml dan masuk dalam kategori yang baik. Persamaan dengan penelitian diatas adalah metode pengujian yang sama dengan sampel berbeda. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pengujian antimalaria secara *in vitro*.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Obey dkk pada tahun 2018, yang berjudul Antimalarial Activity of *Croton macrotachyus* Stem

Bark Extracts against *Plasmodium Bergei in vivo* mengungkapkan bahwa ekstrak kulit batang *Croton macrotachyus* berbagai pelarut (etil asetat, metanol, dan isobutanol) memiliki aktivitas antiplasmodial yang signifikan terhadap *Plasmodium berghei*. Ekstrak yang menggunakan pelarut etil asetat adalah yang paling menjanjikan untuk pengembangan obat lebih lanjut (Obey *et al.*, 2018). Persamaan dari penelitian diatas adalah sampel tanaman yang berasal dari Genus yang sama juga pengujian yang sama namun menggunakan parasit yang berbeda pada pengujiannya. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman serta tambahan informasi mengenai genus dari tumbuhan yang sama dalam pengujian antimalaria.

5. Pada penelitian yang dilakukan Haeria dkk, yang berjudul Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) melaporkan bahwa ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F) secara kualitatif positif mengandung fenolik, flavonoid, dan karotenoid (Haeria *et al.*, 2014). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Ekstrak metanol klika anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki kadar fenolik total sebesar 5,47%, kadar flavonoid total sebesar 1,92%, dan kadar karotenoid total sebesar 0,044%. Persamaan dengan penelitian diatas adalah sampel yang diambil dari tumbuhan yang sama namun pengujian yang berbeda. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan informasi tambahan untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F).

Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang meneliti mengenai uji aktivitas antimalaria ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) terhadap parasit *Plasmodium falciparum* sehingga dengan kajian diatas dilakukan penelitian ini.

F. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki aktivitas sebagai antimalaria pada *Plasmodium falciparum*.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai referensi dan tambahan pengetahuan pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan uji aktivitas antimalaria pada Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F).

2. Secara Praktis

Sebagai tambahan wawasan bagi peneliti terkait uji aktivitas antimalaria pada tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) dengan menggunakan kultur *Plasmodium falciparum*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

1. Klasifikasi

- Regnum : *Plantae*
Divisi : *Spermatophyta*
Subdivisi : *Angiospermae*
Class : *Dicotyledonae*
Subclass : *Sympetalae*
Ordo : *Euphorbiales*
Famili : *Euphorbiaceae*
Genus : *Croton*
Spesies : *Croton oblongus* Burm (Caroline & Tindale, 1993).

2. Nama lokal

Memiliki nama ilmiah *Croton oblongus* Burm F tumbuhan ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Simalakian, Cereken, Roengkok, Semoeki, Kowe, dan Anak Dara (Dalimartha, 2006).

3. Anatomi dan Morfologi

Tumbuhan Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) adalah semak setinggi 1-2 m. Batang tegak, bulat, berbulu dan berwarna hijau, bunga berseling dan lonjong. Bentuk tepi daun bergerigi dengan ujung yang tajam. Panjang daun sekitar 3-5 cm, lebar daun sekitar 1-4 cm. Bentuk batangnya silindris, panjang 2-3 cm, bentuk tulangnya menyirip dan berwarna hijau. Bunga tanaman berbentuk bulir, terletak pada kelopak bunga yang membulat di ujung batang, memiliki banyak benang sari

dengan mahkota berbentuk corong. Buah tanaman berbentuk bulat, berdiameter sekitar 0,5 cm dan berwarna hijau. (Awainah, 2016)



Gambar 1. Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

4. Habitat

Tumbuhan ini tersebar di berbagai tempat, terkadang di rawa-rawa dan di hutan dengan ketinggian 700 m. Sebagian besar terdapat di lereng dan pegunungan. Sebagian besar juga ditemukan di tanah berpasir, tanah liat dan tanah berkapur (Awainah, 2016).

5. Manfaat

Jenis tanaman ini biasanya digunakan untuk antiaging penghilang bau badan, meredakan kram saat menstruasi dan mengobati kanker (Pudhom & B Sommit, 2011).

B. Ekstraksi


1. Pengertian Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan aktif tumbuhan atau metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, terpen, saponin, steroid, dan glikosida dari bahan lainnya dengan menggunakan pelarut yang

sesuai dan prosedur ekstraksi yang sesuai standar (Abubakar R & Haque, 2020).

2. Tipe Ekstrak

a. Ekstraksi Cair-Cair



Gambar 2. Diagram Ekstraksi Cair-Cair (Patel *et al.*, 2019)

Ekstraksi Cair-Cair juga dikenal sebagai Ekstraksi Pelarut yang mengacu pada perlakuan di mana komponen-komponen campuran cairan dipisahkan dengan pelarut cair yang tidak larut yang sesuai dan secara istimewa melarutkan satu atau lebih komponen. Dalam jenis ekstraksi ini, pemisahan komponen larutan bergantung pada distribusi komponen yang tidak merata antara dua cairan yang tidak bercampur. Dalam ekstraksi cair, zat terlarut adalah satu fase dan pelarut yang digunakan untuk ekstraksi adalah fase lain. Dalam ekstraksi pelarut, kedua cairan yaitu zat terlarut dan pelarut membentuk campuran homogen dan dipisahkan dengan salah satu dari dua cairan secara istimewa (Patel *et al.*, 2019)

b. Ekstraksi Fase Padat

Ekstraksi Fase Padat adalah Metode Persiapan sampel yang digunakan untuk isolasi, pengayaan dan pemurnian komponen dari larutan berair tergantung pada sifat fisik dan kimianya. Tipe ekstraksi

ini melibatkan kontak sampel berair dengan fase padat atau bahan penyerap, di mana senyawa teradsorpsi pada permukaan fase padat sebelum elusi. Jumlah ekstrak dapat diabaikan dibandingkan dengan jumlah analisis dalam sampel. Ekstraksi Fase Padat banyak digunakan di Laboratorium Analitik (Patel *et al.*, 2019).

c. Ekstraksi Padat Cair

Ekstraksi Padat-Cair berarti penghilangan konstituen dari campuran padatan dengan membawa bahan padat ke dalam kontak dengan pelarut cair yang melarutkan konstituen khusus ini. Ekstraksi ini dapat digunakan untuk produksi larutan pekat dari bahan padat yang berharga, atau untuk membebaskan padatan yang tidak larut dari bahan yang dapat larut yang terkontaminasi. Contoh sehari-hari dari Ekstraksi padat cair adalah membuat kopi. Dalam hal ini konstituen yang dapat larut, yaitu kopi bubuk dipisahkan dari ampas yang tidak dapat larut dengan larutan dalam air (Patel *et al.*, 2019).

3. Metode Ekstraksi

a. Ekstraksi Cara Dingin

Pada metode ini tidak ada proses pemanasan selama ekstraksi berlangsung. Tujuannya agar senyawa tidak rusak saat pemanasan berlangsung. Jenis ekstraksi dingin adalah maserasi dan perkolasi (Sudarwati & Fernanda, 2019).


1. Maserasi

Maserasi adalah metode filtrasi sederhana. Maserasi terdiri dari perendaman sejumlah bahan baku tanaman obat dalam tangki maserasi dengan pelarut pada suhu kamar selama tiga hari dengan pengadukan secara berkala. Ekstrak yang dihasilkan dituangkan

dari tangki. Bahan tanaman ditekan. Tangki maserasi harus terbuat dari porselen, kaca, keramik, logam kaleng, baja tahan karat, dll. Bahan-bahan ini tidak boleh berinteraksi dengan pelarut dan zat yang diekstraksi. Ukuran dan bentuk tangki tergantung pada jumlah dan sifat pelarut dan bahan baku tanaman obat. Ini adalah metode yang paling sederhana. Maserasi paling sering digunakan untuk menghasilkan metabolit sekunder dari bahan tanaman obat segar atau termolabil. Pengadukan, tangki berputar atau pelarut yang bersirkulasi digunakan untuk meningkatkan ekstraksi (Farooq *et al.*, 2022).

2. Perkolasi

Perkolasi adalah proses mengekstraksi Simplisia dengan perlahan-lahan melewati pelarut yang sesuai melalui Simplisia dalam perkolator. Perkolasi dimaksudkan untuk menarik bahan aktif yang cukup dan umumnya dilakukan pada bahan tahan panas atau tidak tahan panas. Cairan filter dilewatkan melalui bubuk dari atas ke bawah, dan cairan filter melarutkan zat aktif dalam sel yang lewat sampai saturasi tercapai. Gerakan ke bawah disebabkan oleh gaya gravitasinya sendiri dan gaya cairan di atasnya, dikurangi gaya kapiler yang cenderung melawan. Gaya yang terlibat dalam perembesan termasuk gravitasi, viskositas, kelarutan, tegangan permukaan, difusi, adhesi, gaya kapiler, dan geser (Sudarwati & Fernanda, 2019)



Gambar 3 Metode perkolasi (Peng *et al.*, 2017)

b. Ekstraksi Cara Panas

Metode ini pasti melibatkan panas dalam prosesnya. Adanya panas secara otomatis mempercepat proses penyaringan dibandingkan dengan metode dingin dan injeksi. Metode ekstraksi panas dijelaskan secara singkat di bawah ini

1. Reflux


Salah satu metode sintesis senyawa anorganik adalah metode refluks. Metode ini digunakan ketika pelarut yang mudah menguap digunakan dalam sintesis. Jika pemanasan normal dilakukan dalam keadaan ini, pelarut akan menguap sebelum reaksi selesai. Prinsip proses refluks adalah pelarut yang mudah menguap yang digunakan menguap pada suhu tinggi, tetapi didinginkan oleh kondensor, sehingga pelarut yang menguap mengembun di dalam kondensor dan kembali ke bejana reaksi, meninggalkan pelarut selama reaksi. Aliran gas N₂ menjaga uap air dan gas oksigen keluar dari senyawa organologam, terutama untuk sintesis senyawa anorganik, karena bersifat reaktif.



Gambar 4. Seperangkat Alat Refluks (Supaya, 2019)

2. Soklet

Sokletasi adalah metode pemisahan semua komponen dengan cara menyaring komponen yang terkandung dalam padatan secara berulang-ulang dengan pelarut tertentu. Sokletasi digunakan dengan pelarut organik tertentu. Pelarut dikembalikan secara periodik ke dalam labu yang berisi senyawa yang akan diisolasi dengan cara memanaskannya sehingga uap yang dihasilkan setelah pendinginan terus menerus membasahi sampel. Pelarut yang membawa senyawa kimia ke dalam labu destilasi diuapkan menggunakan rotary evaporator sehingga pelarut dapat dikeluarkan kembali. Jika campuran organik bertemu dengan padatan dalam bentuk cair atau padat, campuran tersebut dapat diekstraksi dengan pelarut yang diinginkan.



Gambar 5. Metode Sokletasi (Patel *et al.*, 2019)

3. Infusa


Infusa adalah metode ekstraksi yang menggunakan air sebagai pelarut. Selama proses injeksi, suhu pelarut air harus mencapai 90°C dalam waktu 15 menit. Rasio berat bahan terhadap air adalah 1:10. Jadi jika berat bahan 100 gram maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Metode yang biasa dilakukan adalah memanaskan bahan bubuk dalam panci berisi air secukupnya hingga 90°C selama 15 menit dengan sesekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel dan tuangkan air panas ke atas residu untuk membuat jumlah yang diinginkan. Jika bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah pendinginan (Sudarwati & Fernanda, 2019).

4. *Microwave assisted-extraction*

Microwave assisted-extraction adalah salah satu prosedur ekstraksi lanjutan dalam persiapan tanaman obat. Teknik ini menggunakan mekanisme rotasi dipol dan transfer ionik dengan perpindahan ion bermuatan yang ada dalam pelarut dan bahan obat. Metode ini cocok untuk ekstraksi flavonoid. Ini melibatkan

penerapan radiasi elektromagnetik pada frekuensi antara 300 MHz dan 300 GHz dan panjang gelombang antara 1 cm dan 1 m. Gelombang mikro yang diterapkan pada frekuensi 2450 Hz menghasilkan energi antara 600 dan 700 W. Teknik ini menggunakan radiasi gelombang mikro untuk membombardir suatu objek, yang dapat menyerap energi elektromagnetik dan mengubahnya menjadi panas. Selanjutnya, panas yang dihasilkan memfasilitasi pergerakan pelarut ke dalam matriks obat. Ketika pelarut polar digunakan, rotasi dipol dan migrasi ion terjadi, meningkatkan penetrasi pelarut, dan membantu proses ekstraksi. Namun, ketika pelarut nonpolar digunakan, radiasi gelombang mikro yang dilepaskan hanya akan menghasilkan panas yang kecil; oleh karena itu, metode ini tidak mendukung penggunaan pelarut nonpolar (Farooq *et al.*, 2022).

Untuk ekstraksi ini, bahan tanaman kering digunakan, bahan tersebut mengandung sedikit kelembaban. Kadar air ini akan dipanaskan karena insiden gelombang mikro dan tekanan di dalamnya meningkat. Tekanan diberikan pada dinding sel tanaman dan menyebabkan pembengkakan sel. Peningkatan lebih lanjut tekanan menyebabkan pecahnya sel, karena itu komponen dalam sel tercuci dengan pelarut. Jika matriks tanaman dengan pelarut, efisiensi pemanasan meningkat. (Patel *et al.*, 2019).



Gambar 6. Metode *Microwave assisted-extraction* (Kusuma & Mahfud, 2016)

C. Malaria

a. Pengertian Malaria

Menurut Prabowo (2004) malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit (protozoa) genus *Plasmodium* Sp, yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* sp. Istilah malaria berasal dari dua kata Italia, mal (buruk) dan area (udara) atau udara buruk, karena dahulu banyak terdapat di daerah berawa yang mengeluarkan bau tak sedap. Menurut WHO tahun 2023, Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebarkan ke manusia oleh beberapa jenis nyamuk. Penyakit ini banyak ditemukan di negara-negara tropis. Infeksi ini disebabkan oleh parasit dan tidak menyebar dari orang ke orang. Gejalanya bisa ringan atau mengancam jiwa. Gejala ringan adalah demam, menggigil, dan sakit kepala. Gejala yang parah termasuk kelelahan, kebingungan, kejang, dan kesulitan bernapas.



Gambar 7. Nyamuk Anopheles Memompa Darah (CDC, 2016)

b. Etiologi Malaria

Menurut Prabowo (2004) malaria disebabkan oleh parasit malaria (atau protozoa darah yang termasuk dalam genus *Plasmodium* Sp) yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Pada manusia, *Plasmodium* Sp menginfeksi eritrosit (sel darah merah) dan bereproduksi secara aseksual di jaringan hati dan sel darah merah. Reproduksi seksual terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles sp. betina (Sudoyo *et al.*, 2009)

Terdapat empat spesies *Plasmodium* sp yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia yaitu *Plasmodium vivax*, *Plasmodium falcifarum*, *Plasmodium malariae* dan *Plasmodium ovale*. Setiap spesies *Plasmodium* sp menyebabkan infeksi malaria yang berbeda. *Plasmodium vivax* menyebabkan malaria vivax/tertian, *Plasmodium falcifarum* menyebabkan falcifarum/ malaria tropis, *Plasmodium malariae* menyebabkan malaria/quartana malaria dan *Plasmodium ovale* menyebabkan malaria ovale (Prabowo, 2008)

Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh infeksi sel darah merah oleh parasit protozoa dari genus *Plasmodium* yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Empat spesies *Plasmodium* (*P. falcifarum*, *P. vivax*, *P. malariae*, dan *P. ovale*) yang paling sering menginfeksi manusia.

P. falciparum dan *P. vivax* adalah spesies yang paling banyak ditemukan dan *P. falciparum* adalah spesies yang paling berbahaya. Spesies kelima, *P. knowlesi* (spesies *Plasmodium* yang terutama menginfeksi primata non-manusia) semakin banyak dilaporkan pada manusia yang mendiami daerah hutan di beberapa negara di Asia Tenggara dan wilayah Pasifik Barat, dan khususnya di pulau Kalimantan (WHO, 2022).

c. Gejala Malaria

Gejala malaria berupa demam tergantung pada jenis malaria. Sifat demam akut (paroksismal), didahului fase dingin (tremor), diikuti demam tinggi dan keringat berlebih. Gejala klasik ini biasanya terjadi pada pasien non-imun (berasal dari daerah non-endemis). Selain gejala klasik tersebut, terdapat gejala lain seperti sakit kepala, mual, muntah, diare, nyeri otot. Gejala ini biasanya terjadi pada orang yang tinggal di daerah endemik (imun) (Kemenkes, 2017). Sedangkan menurut (WHO, 2017) Malaria adalah penyakit demam akut. Pada orang yang tidak kebal, gejala-gejala muncul tujuh hari atau lebih (biasanya 10-15 hari) setelah gigitan nyamuk infektif. Gejala pertama - demam, sakit kepala, menggigil dan muntah - mungkin ringan dan sulit dikenali sebagai malaria. Jika tidak diobati dalam waktu 24 jam, malaria *Plasmodium falciparum* dapat berkembang menjadi penyakit yang parah yang sering menyebabkan kematian. Anak-anak dengan malaria berat sering mengalami satu atau lebih dari gejala-gejala berikut ini: anemia berat, gangguan pernapasan yang berhubungan dengan asidosis metabolik, atau malaria otak. Pada orang dewasa, keterlibatan multi-organ juga sering terjadi. Di daerah endemis malaria, seseorang dapat mengembangkan kekebalan parsial, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi tanpa gejala.



Gambar 8. Siklus Penularan Malaria (Ministry of health and medical services, 2021)

d. Patogenesis Malaria

Patogenesis malaria dihasilkan dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Patogenesis menekankan peningkatan permeabilitas vaskular daripada koagulasi intravaskular. Karena skizogoni merusak sel darah merah, anemia terjadi. Tingkat keparahan anemia tidak sebanding dengan parasitemia, menunjukkan adanya kelainan pada eritrosit non-parasit. Hal ini diduga karena adanya toksin malaria yang menyebabkan sel darah merah melemah dan menyebabkan sebagian sel darah merah pecah. limpa untuk mengusir parasit. Faktor lain penyebab anemia bisa karena terbentuknya antibodi terhadap sel darah merah. Limpa mengalami pembesaran dan pigmentasi maternal, sehingga mudah pecah. Banyak parasit ditemukan di limpa dalam makrofag dan fagositosis berulang sel darah merah yang terinfeksi dan tidak terinfeksi. Malaria kronis menyebabkan hiperplasia retikulosit dengan peningkatan makrofag. Pada malaria berat, mekanisme patogenesis berhubungan

dengan invasi merozoit ke eritrosit, mengubah eritrosit yang mengandung parasit. Struktur seluler dan struktur biomolekuler untuk menopang kehidupan parasit. Perubahan ini melibatkan mekanisme termasuk transportasi membran sel, *sitoadherensi*, *sekuestrasi* dan *resetting* (Fitriany & Sabiq, 2018)

e. Pengobatan Malaria

Saat ini, pengobatan yang direkomendasikan untuk malaria adalah pemberian ACT. Pemberian kombinasi ini untuk meningkatkan efikasi dan mencegah resistensi. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan ACT oral. Malaria berat diobati dengan injeksi Artesunat diikuti dengan ACT oral. Selain itu, primakuin diberikan sebagai gametosida dan hipnosida (Kemenkes, 2017).

Obat antimalaria yang digunakan untuk pengobatan dan pencegahan malaria diklasifikasikan dalam kelompok heterogenik. Obat ini biasanya dibagi berdasarkan struktur kimia atau sumber obat. Kebanyakan dari mereka berasal dari obat tradisional dan tanaman. Setelah identifikasi prinsip aktif, modifikasi kimia diperkenalkan untuk meningkatkan aktivitas dan memperbaiki indeks selektivitas. Mereka hadir di modus erent dan berbagai mekanisme aksi, yang sering masih belum dijelaskan, terhadap parasit malaria. Selanjutnya, karena kompleksitas molekul-molekul ini, aktivitas samping tambahan telah dilaporkan. Untuk alasan ini, obat antimalaria telah dipelajari, diusulkan, dan kadang-kadang digunakan untuk pengobatan patologi lain, seperti kanker, penyakit autoimun, dan penyakit menular nonmalaria. Selain itu, tumpang tindih geografis antara malaria dan penyakit terkait virus telah menyebabkan pertimbangan kemungkinan penggunaan obat antimalaria

sebagai obat antivirus baru. Akhirnya, kurangnya obat antivirus dan vaksin baru untuk melawan banyak infeksi virus telah memperkuat minat terhadap potensi aktivitas antivirus dari obat antimalarial (Alessandro *et al.*, 2020).

Pengobatan malaria di Indonesia menggunakan derivat berbasis artemisinin dengan golongan aminokuinolin, yaitu fixed dose combination (FDC) yang terdiri atas dihydroartemisinin dan piperakuin, dikenal dengan DHP. Satu tablet FDC mengandung 40 mg dihydroartemisinin dan 320 mg piperakuin. Obat ini diberikan per-oral satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut perhari sebagai berikut : Dihydroartemisinin dosis 2-4 mg/kgBB; Piperakuin dosis 16-32 mg/kgBB. Khusus pada anak yang berat badannya kurang dari 25 kg dosis dihydroartemisinin adalah 2,5-4 mg/kg BB/hari dan 20 mg/kgBB piperakuin, sekali sehari selama 3 hari. Dosis DHP pada bayi yang berat badannya kurang dari 5 kg untuk malaria tanpa komplikasi mendapat dosis yang sama dengan bayi dengan berat badan 5 kg (Kemenkes, 2019).

1. Pengobatan Malaria tanpa komplikasi

a. Pengobatan malaria falsiparum dan malaria vivaks

Pengobatan malaria falsiparum dan malaria vivaks saat ini menggunakan obat golongan ACT ditambah primakuin.

Saat ini ACT yang dipakai di Indonesia adalah DHP (dihydroartemisinin-piperakuin). Dosis obat DHP diberikan sama untuk malaria falsiparum dan malaria vivaks. Obat primakuin untuk malaria falsiparum hanya diberikan pada hari pertama saja, sedangkan malaria vivaks selama 14 hari.

Dosis primakuin adalah 0,25 mg/kgBB. Pengobatan malaria

knowlesi sama seperti malaria falciparum yaitu dengan ACT selama 3 hari dan pemberian primakuin pada hari pertama. Lini pertama pengobatan malaria falsiparum dan malaria vivaks adalah seperti yang tertera di bawah ini :

1) Lini pertama

DHP + Primakuin

Tabel 1. Pengobatan lini pertama malaria falsiparum menurut berat badan dengan DHP dan Primakuin (Kemenkes, 2019)

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan								
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-40 kg	>40-60 kg	>60-80 kg	≥80 kg
		0-1 bulan	2-6 bulan	6-11 bulan	1-4 tahun	5-9 tahun	10-14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
1-3	DHP	1/3	½	½	1	1 ^{1/2}	2	3	4	5
1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	1	1	1

Tabel 2. Pengobatan lini pertama malaria vivaks menurut berat badan dengan DHP dan Primakuin (Kemenkes, 2019)

Har i	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan								
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-40 kg	>40-60 kg	>60-80 kg	≥80 kg
		0-1 bulan	2-6 bulan	6-11 bulan	1-4 tahun	5-9 tahun	10-14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
1-3	DHP	1/3	½	½	1	1 ^{1/2}	2	3	4	5
1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	1	1	1

Dosis DHP diberikan berdasarkan berat badan. Apabila penimbangan berat badan tidak dapat dilakukan maka pemberian obat dapat berdasarkan kelompok umur. Apabila ada ketidaksesuaian antara umur dan berat badan (pada tabel pengobatan), maka dosis yang

dipakai adalah berdasarkan berat badan. Primakuin sebagai terapi radikal untuk vivaks dan ovale dapat mulai diberikan sejak usia 6 bulan. Primakuin sebagai terapi radikal untuk vivaks dan ovale dapat mulai diberikan sejak usia 6 bulan dan orang tua harus diminta untuk memonitor warna urin. Jika warna urin menjadi hitam, primakuin harus segera dihentikan dan bayi / anak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Paling ideal adalah jika bayi dan anak dapat diketahui kadar dan aktivitas enzim G6PD nya. Pertimbangan pemberian primakuin adalah berdasarkan kerugian dan manfaat pemberian terapi tersebut (antara relaps berulang dan menjadi anemia dan kemungkinan hemolisis pada pasien defisiensi enzim G6PD) (Kemenkes, 2019).

2) Lini kedua untuk malaria falsiparum

Kina + doksisklin + primakuin Atau Kina + tetrasiklin + primakuin

Pengobatan lini kedua malaria falsiparum diberikan jika pengobatan lini pertama gagal, dimana ditemukan gejala klinis menetap atau memburuk atau timbul kembali, yang disertai dengan parasit stadium aseksual tidak berkurang atau timbul kembali (Kemenkes, 2019)

Tabel 3. Pengobatan lini kedua untuk malaria falsiparum (dengan obat kombinasi kina dan doksisklin) (Kemenkes, 2019)

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan									
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-33 kg	>33-40 kg	>40-45 kg	>45-60 kg	>60 kg
		0-1 bulan	2-6 bulan	6-11 bulan	1-4 tahun	5-9 tahun	10-14 tahun	10-14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
Hari 1-7	Kina	Sesuai BB	3 x ½	3 x ½	3 x 1	3 x 1 ½	3 x 1 ½	3 x 2	3 x 2 ½	3 x 2 ½	3 x 3
1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	¾	1	1	1

Tabel 4. Dosis doksisklin (Kemenkes, 2019).

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok berat badan				
		>19 kg	>19-29 kg	>29-44 kg	>44-59 kg	>59 kg
		>8 tahun	≥8 tahun	10-14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
Hari 1-7	Doksisklin	-	2 x 25 mg	2 x 50 mg	2 x 75 mg	2 x 100 mg

Tabel 5. Pengobatan lini kedua untuk malaria falsiparum (dengan obat kombinasi kina dengan tetrasiklin) (Kemenkes, 2019).

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut berat badan									
		≤5 kg	>5-6 kg	>6-10 kg	>10-17 kg	>17-30 kg	>30-33 kg	>33-40 kg	>40-45 kg	>45-60 kg	>60 kg
		0-1 bulan	2-6 bulan	6-11 bulan	1-4 tahun	5-9 tahun	10-14 tahun	10-14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
Hari 1-7	Kina	Sesuai BB	3 x ½	3 x ½	3 x 1	3 x 1 ½	3 x 1 ½	3 x 2	3 x 2 ½	3 x 2 ½	3 x 3
1	Primakuin	-	-	¼	¼	½	¾	¾	1	1	1

Tabel 6. Dosis tetrasiklin (Kemenkes, 2019).

Hari	Jenis obat	Jumlah tablet perhari menurut kelompok berat badan				
		>8 tahun	8 - 14 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun	≥15 tahun
Hari 1-7	Tetrasisklin	-	4 x 125 mg	4 x 125 mg	4 x 250 mg	4 x 250 mg

Keterangan :

- a) Dosis Tetrasiklin 4 mg/kgBB/kali diberikan 4x sehari. Tidak diberikan pada anak umur <8 tahun
- b) Dosis klindamisin pada anak
- c) Dosis anak-anak 10 mg/kg BB/kali diberikan 2 x sehari. Dosis maksimum 1 hari 300 mg
- d) Per kapsul klindamisin basa ~150 mg dan 300 mg

2. Kemoprofilaksis

Kemoprofilaksis malaria bagi yang bepergian ke daerah risiko tinggi malaria (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT) diberikan kapsul doksisiklin 1 x 100 mg /hari. Obat doksisiklin mulai diminum 1 hari sebelum bepergian, selama ada di daerah risiko sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah tersebut. Kemoprofilaksis pada anak <8 tahun tidak ada sehingga sebaiknya dilakukan tindakan pencegahan secara personal seperti penggunaan pakaian lengan panjang, lotion anti nyamuk, kelambu dan lain-lain (Kemenkes, 2019).

3. Pengobatan malaria pada ibu hamil

Pengobatan malaria untuk ibu hamil di semua trimester juga menggunakan DHP, primakuin tidak diberikan karena ada risiko toksisitas pada janin. Untuk pengobatan lini kedua, menggunakan kina dan klindamisin sesuai berat badan Ibu hamil sebagai kelompok yang berisiko tinggi sehingga dilakukan penapisan / skrining dengan menggunakan mikroskop atau RDT sedini mungkin. Selanjutnya dianjurkan menggunakan kelambu berinsektisida. Pemberian tablet besi tetap diteruskan (Kemenkes, 2019).

4. Pengobatan malaria komplikasi

Tata laksana kasus malaria berat pada prinsipnya meliputi :

- a. Pemberian obat anti malaria
- b. Penanganan komplikasi
- c. Terapi suportif
- d. Pengobatan simptomatik (Kemenkes, 2019).

Obat malaria pilihan untuk malaria komplikasi adalah :

Lini pertama : artesunat injeksi atau artemether injeksi. Artesunat injeksi untuk penggunaan di RS atau puskesmas perawatan. Artemether injeksi untuk penggunaan di lapangan atau puskesmas yang tidak menyediakan artesunat injeksi.

Lini kedua : kina perinfus / drip.

D. *Plasmodium falciparum*

a. Klasifikasi Plasmodium

Sub-ordo haemosporina terdiri dari tiga famili, yaitu Plasmodiidae, Haemoproteidae dan Leucocytozoonidae. Macrogametocyt dan microgametocyst berkembang terpisah. Bentuk zygot adalah motil disebut ookinet, sedangkan sporozoit berada dalam dinding spora. Protozoa ini adalah heteroxenous, dimana merozoit diproduksi di dalam hospes vertebrata dan sporozoit berkembang dalam hospes invertebrata, dan merupakan suatu protozoa darah yang klasifikasinya:

Filum : *Apicomplexa*

Kelas : *Sporozoa*

Subkelas : *Cocidiidae*

Ordo : *Eucocidiidae*

Sub ordo : *Haemasporidiidae*

Famili : *Plasmodiidae*
 Genus : *Plasmodium*
 Spesies : *Plasmodium falciparum*
Plasmodium vivax
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale


b. Siklus hidup *Plasmodium Sp*

Siklus parasit malaria mencakup dua inang, manusia dan nyamuk Anopheles betina. Pertama, nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi sporozoit menggigit manusia dan melepaskan sporozoit ke dalam aliran darah. Dalam waktu 45 menit, akan menuju ke hati, menginfeksi sel hati dan berkembang menjadi skizon hati yang jika pecah akan melepaskan 10.000 – 30.000 merozoit ke sirkulasi darah (Harijanto, 2011).

Plasmodium vivax dan *Plasmodium ovale* memiliki stadium hipnozoit yang bisa tinggal di hati selama berminggu-minggu atau bertahun-tahun dan masuk ke aliran darah. Setelah replikasi awal ini di hati (skizogoni ekso-eritrositik), parasit malaria menyerang sel darah merah dan mengalami perkawinan aseksual di dalamnya (pembelahan eritrosit). Merozoit yang menginfeksi eritrosit berubah menjadi trofozoit stadium cincin dan berkembang menjadi skizon. Saat pecah, skizon melepaskan merozoit yang menginfeksi sel darah merah lainnya. Beberapa parasit berdiferensiasi menjadi tahap eritroid/gametosit seksual (CDC, 2016)

Tahapan gametosit adalah jantan (mikrogametosit) dan betina. Perkawinan parasit nyamuk, di mana nyamuk Anopheles menelan (makrogametosit) dalam darah selama makan, dikenal sebagai siklus

sporulasi. Mikrogamet yang menyerang makrogamet menghasilkan zigot di perut nyamuk. Telur yang telah dibuahi menjadi motil dan memanjang (ookinetes) dan menembus dinding usus tengah nyamuk, di mana ia berkembang menjadi ookista. Ookista dewasa melepaskan sporozoit, yang bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk yang siap menginfeksi manusia (CDC, 2016)



Gambar 9. Siklus Hidup Plasmodium (CDC, 2016).

c. Nyamuk *Anopheles* sp

1) Klasifikasi nyamuk *Anopheles* sp.

Kingdom : *Animalia*

Filum : *Arthropoda*

Kelas : *Insecta*

Ordo : *Diptera*

Famili : *Culicidae*

Sub Famili : *Anophelini*

Genus : *Anopheles*

Spesies : *Anopheles* sp. (Borror *et al.*, 1992)


2) Morfologi Nyamuk Anopheles sp. adalah sebagai berikut :

Larva Anopheles mengapung sejajar dengan permukaan air tempat berkembang biaknya. Telur yang baru menetas berwarna putih tetapi setelah 1-2 jam berubah menjadi hitam. Telur menetas menjadi larva yang ditandai dengan tidak adanya saluran udara (siphon), sebagian ruas perut terdapat bulu-bulu berbentuk kipas, dan sebagian ruas perut terdapat pelat tergal. Selama istirahat, jentik nyamuk Anopheles berbaring sejajar dengan permukaan air dan berenang bebas di dalam air. Pupa memiliki tabung pernapasan yang disebut siphon, lebar dan pendek, digunakan untuk mengambil oksigen dari udara. Tahap dewasa Anopheles jantan dan betina mempunyai bagian yang hampir sama mengingat panjangnya belalai, hanya nyamuk jantan yang mempunyai telapak tangan. Bagian atasnya berbentuk gada, disebut sementara berbentuk gada. Pada nyamuk betina, segmennya lebih kecil. Bagian belakang perut sedikit tajam dan tepi sayap ditutupi sisik (Borror *et al.*, 1992).



Gambar 10. Larva Nyamuk Anopheles sp. (Borror *et al.*, 1992)

3) Siklus hidup nyamuk *Anopheles* sp.



Gambar 11. Siklus Hidup Nyamuk *Anopheles* sp (CDC, 2016)

Berikut penjelasan mengenai siklus hidup nyamuk *Anopheles* sp .:

a. Telur

Nyamuk *Anopheles*, nyamuk penyebar malaria ini suka bertelur di daerah rawa-rawa atau di dekat tepi anak sungai yang dangkal. Nyamuk betina dewasa bertelur satu per satu langsung di atas air. Telur-telur tersebut kemudian akan mengambang di permukaan air. Seekor nyamuk betina dewasa dapat bertelur sebanyak 50-200 butir dalam satu waktu dan telur dari nyamuk ini tidak tahan terhadap kekeringan (CDC, 2016).

b. Larva

Larva nyamuk *Anopheles* sp hidup di dalam air. Mereka akan menetas dari telur nyamuk. Larva *Anopheles* bernapas dengan menggunakan organ khusus (disebut spirakel) yang terletak di perutnya. Larva akan berganti kulit (molt) sebanyak empat kali selama tahap ini dan akan menjadi pupa. Lama hidup

dari larva ini adalah selama 7 hari, dan hidup dengan memakan alga, bakteri, mikroorganisme lain yang terdapat dipermukaan. (CDC, 2016)

c. Pupa

Pupa nyamuk *Anopheles* sp hidup di dalam air. Pupa ini tidak memiliki bagian mulut eksternal, sehingga mereka tidak akan makan selama tahap ini. Pupa seringkali naik ke permukaan air untuk bernafas. Pupa akan bernafas dengan menggunakan alat respirasi berbentuk terompet. Setelah beberapa hari, Nyamuk dewasa akan keluar dari pupa dan terbang (CDC, 2016).

d. Nyamuk Dewasa

Nyamuk *Anopheles* betina dewasa menggigit manusia dan hewan, biasanya pada sore atau malam hari. Nyamuk betina akan membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Nyamuk *Anopheles* betina dewasa lebih suka mengisap darah manusia atau hewan, seperti sapi. Beberapa nyamuk jantan *Anopheles* terbang dalam kawanan besar, biasanya pada waktu senja, dan nyamuk betina terbang dalam kawanan tersebut untuk kawin. Setelah menghisap darah, nyamuk betina akan beristirahat selama beberapa hari sementara darahnya dicerna dan telur-telurnya berkembang. Setelah telur berkembang, nyamuk betina kembali meletakkannya di sumber air. Nyamuk *Anopheles* umumnya tidak terbang lebih dari 1,2 mil (2 km) dari habitat larvanya. Nyamuk *Anopheles* ini tertarik pada tempat yang gelap dan terlindung untuk beristirahat di siang hari (CDC, 2016)



Gambar 12. Nyamuk Anopheles Betina Menghisap Darah (CDC, 2016)

E. Tinjauan Islam Tentang Manfaat Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Allah swt menciptakan alam semesta dengan proses yang sangat sistematis. Tahap demi tahap, ukuran demi ukuran, senantiasa dapat kita jumpai dalam setiap sistem di alam semesta. Kita lihat bagaimana keagungan, kesempurnaan dan keMahakuasaan Illahi dalam proses penciptaan alam semesta yang tiada tara. Alam semesta berawal dari kesatuan yang padu, lalu dikembangkan dengan “kekuatan” serta “energi” yang maha dahsyat. Di dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Anbiya/21: 30

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا[ۗ] وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya, dahulu menyatu, kemudian Kami memisahkan keduanya dan Kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka, tidakkah mereka beriman?”(Kemenag, 2019)

Langit yang pada awalnya adalah sesuatu yang menyatu dan tidak dapat menurunkan hujan. Bumi juga merupakan sesuatu yang menyatu dan tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Hingga atas izin Allah swt, langit dan

bumi yang tadinya merupakan kesatuan , mulai terpisah dan berdiri sendiri. Dari sanalah tercipta semua materi, ruang dan waktu dalam ukuran yang menakjubkan. Dari fenomena tersebut bermunculanlah berbagai tanaman hijau yang indah dan sangat bermanfaat.

Al-Qur'an bukanlah kitab sains. Tetapi ia memberikan prinsip-prinsip sains yang selalu dikaitkannya dengan metafisik dan spiritual. Allah tidak menjelaskan secara detail tentang segala sesuatu di dalam Al-Qur'an, tetapi Allah memberikan gambaran besar, pemantik dan juga petunjuk agar manusia menggunakan akal mereka. Seperti penggambaran tentang permulaan alam semesta dalam Q.S. al-Anbiya" [21]: 30. Allah swt, dalam wahyu yang di turunkan-Nya tidak membuat pernyataan yang saintifik, tetapi menunjukkan tanda-tanda (ayat-ayat) berupa fenomena alam dan ciptaan. Jika dipahami secara benar akan mengantarkan kepada kebenaran tertinggi, yaitu Allah swt.

Banyak jenis tumbuhan yang dapat bertahan hidup di bumi ini dengan adanya air hujan, ada tumbuhan yang tergolong tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya, dan tumbuhan tingkat tinggi yakni tumbuhan yang bisa dibedakan akar, batang dan daunnya secara jelas. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah dan bijinya.

Tercantum dalam QS. Al-Syu'ara/26:7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”(Kemenag, 2019)

Penafsiran ayat diatas Oleh Muhammad Quraish Shihab: Adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah di bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Mahaesa dan Mahakuasa

Oleh tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh Menafsirkan ayat tersebut: Apakah mereka mendustakan padahal mereka belum melihat kepada bumi di mana Kami menumbuhkan padanya segala bentuk tanaman yang indah lagi berguna, di mana tidak ada yang mampu menumbuhkannya kecuali Rabb semesta alam?

Tafsir Wajiz : Allah kemudian mengajak mereka untuk belajar dari alam seluruh, agar mereka tahu bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Dan apakah mereka yaitu orang musyrik itu, tidak memperhatikan apa yang mereka lihat di hamparan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membawa banyak sekali kemanfaatan bagi manusia. Bukankah itu pertanda atas kekuasaan Allah, dan anugerah-Nya yang tak terhingga kepada manusia? (Kemenag, 2019).

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat dipilah dan digunakan sebagai obat dari berbagai penyakit, dan ini merupakan

anugerah dari Allah swt yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sesuai perintah yang tertulis dalam Firman-Nya.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa spesies Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) secara empiris digunakan oleh masyarakat kabupaten sinjai sebagai kosmetik seperti masker wajah, sebagai bedak dingin yang dipercaya memiliki khasiat untuk mengencangkan kulit. Daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) juga dipercaya dapat mengobati penyakit seperti nyeri haid, kanker rahim, dan penghilang bau badan.

Pada dasarnya semua penyakit datangnya dari Allah, maka yang bisa menyembuhkan juga Allah swt. Kesembuhan juga hanya milik Allah. Namun, untuk mencapai kesembuhan tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka pada saat yang sama Allah juga mendatangkan obatnya. Pengobatan sangat dianjurkan dalam islam karena berbagai alasan, termasuk untuk menjaga jiwa dan raga, sementara salah satu tujuan syari'at islam ditegakkan adalah untuk memelihara jiwa dan raga. Dalam hal ini Hadist yang menjadi alasan dianjurkannya seseorang untuk berobat yaitu :

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَ دَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya :

"Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan

meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'" (HR.Tirmidzi 2038, dan disahihkan oleh al-Albani dalam Sunan Ibnu Majah 3436)

Hadist ini menyiratkan bahwa manusia diperintahkan untuk berobat demi kesembuhan, tetapi umat Islam dilarang berobat dengan segala sesuatu yang haram. Hadist ini juga menjelaskan bahwa hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu tua dan kematian (Razali, 2021). Berobat selain sebagai ikhtiar, juga bagian dari tawakkal. Bagi orang sakit, ikhtiar adalah berobat dengan sungguh agar sembuh. Sedangkan tawakkal adalah menyerahkan kesembuhannya kepada Allah swt setelah berobat dengan benar kepada ahlinya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Malaria, Institute of Tropical Disease Center (ITDC), Universitas Airlangga, Surabaya.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2023- Juli 2023.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan eksperimental dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Malaria, Institute of Tropical Disease Center (ITDC), Universitas Airlangga, Surabaya.

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) yang diperoleh dari kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu mikropipet, erlenmeyer, gelas ukur, vial, botol kaca, cawan porselin, toples, *rotary evaporator*, batang pengaduk, kertas saring, kain kasa,

timbangan analitik, cawan petri, *laminar air flow* (LAF), hot plate, *water bath*, inkubator, autoklaf, eksikator (*Candle-jar*), gelas kimia 500 ml, membran filter 0,22 μm , pipet, lempeng sumur mikro (*microplate*), botol medium steril, sentrifuse, tabung reaksi, mesin *freeze dryer*.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu etanol 70% daun tanaman Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) yang diperoleh dari Kabupaten Sinjai, dimetilsulfoksida (*DMSO*), Asam Hidroklorida (*HCl*) pekat, Amyl alcohol, serbuk Magnesium, Asam asetat anhidrat, gelatin 10%, FeCl_3 5%, larutan giemsa 10%, alumunium foil, parasit yang digunakan adalah *Plasmodium falciparum strain* 3D7 yang diperoleh dari Laboratorium Malaria, ITDC Universitas Airlangga, Surabaya.

E. Cara Kerja

1. Preparasi Simplisia Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya kemudian dicuci dengan air mengalir. Sampel dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam lemari pengering dengan suhu 40°C kemudian dilanjutkan dengan disortasi kering dan remukkan hingga menjadi serbuk simplisia, disimpan pada suhu kamar untuk pengolahan selanjutnya

2. Ekstraksi Sampel Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia Sampel Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) yaitu dengan cara maserasi. Sampel Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) yang telah dikeringkan kemudian dimasukkan dalam wadah maserasi dan dimaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 x 24 jam pada suhu kamar. Ekstrak kemudian

sesekali diaduk. Filtrat etanol 70% yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan *Rotary evaporator* dengan suhu 50°C (Margaretta *et al.*, 2011).

3. Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Skrining fitokimia dilakukan untuk mendeteksi mentabolit sekunder yang ada dalam ekstrak menurut metode (Farnsworth, 1966)

a. Uji Fenolik

Ambil lapisan air 1-2 tetes, teteskan pada plat tetes lalu tambahkan pereaksi FeCl_3 , terbentuknya warna biru menandakan adanya kandungan fenolik (Farnsworth, 1966).

b. Uji Flavonoid

Sebanyak 1 gram sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi lalu ditambahkan 20 mL aquades dan dipanaskan sekama 15 menit. Hasil filtrate kemudian ditambahkan 100 mg serbuk Mg, 1 mL HCl pekat, dan 5 mL amyl alcohol lalu di kocok. Ekstrak mengandung flavonoid jika terbentuk warna orange, merah, atau kuning (Farnsworth, 1966)

c. Uji Saponin

Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 20 mi. Aquades kemudian dipanaskan selama 15 menit, didinginkan dan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Jika terbentuk buih yang banyak selama tidak kurang dari 10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N menunjukkan adanya saponin (Farnsworth, 1966)

d. Uji Alkaloid

Sebanyak 2 g sampel ditambahkan 10 mL asam klorida (HCl) 2N, dipanaskan diatas penangas air selama 2 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes alkaloid. Kemudian ditambahkan 5 mL ammonia 25% dan 20 ml. CHCl₃ Dimasukan I mL filtrat kedalam 2 tabung reaksi, tabung I ditambahkan Alkaloid positif jika teriadi endapan putih-kuning, kemudian tabung 2 ditambahkan pereaksi Dragendorff, Alkaloid positif jika endapan orange (Farnsworth, 1966).

e. Uji Terpenoid dan Steroid

Sebanyak 1 gram sampel ditambahkan 20 mL asam asetat anhidrat kemudian di filtrate sampai menguap lalu diresidu dan ditambahkan Liebermann-Burchard. Reaksi positif ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi hijau kebiruan untuk steroid (Farnsworth, 1966). 5 ml Larutan ekstrak dalam kloroform ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat, bila pada batas antara kedua fase terbentuk warna merah kecoklatan menandakan adanya terpenoid (Farnsworth, 1966).

4. Uji Antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Plasmodium falciparum strain 3D7 yang peka terhadap klorokuin digunakan dan dibiakkan dengan menggunakan metode Trager dan Jensen (Pandey *et al.*, 1999) Konsentrasi seri ekstrak yang diuji untuk aktivitas antimalaria adalah 100; 10; 1,0; 0,1; dan 0,01 µg/mL. Pengujian dilakukan dalam pelat sumur 96. Lalu ditambahkan parasit dengan parasitemia ±1%. Lalu kemudian ditempatkan dalam *chamber* dan inkubator CO₂ pada suhu 37 ° C selama 48 jam. Ekstrak dan parasit yang telah diinkubasi kemudian dikumpulkan dan digunakan untuk membuat apusan tipis pada kaca objek,

difiksasi dan diwarnai dengan Giemsa 10%. Jumlah parasit kemudian diamati di bawah mikroskop dan dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif (Marangoh *et al.*, 2021). Kontrol negatif dalam penelitian ini adalah larutan DMSO sedangkan Kontrol positif dalam penelitian ini adalah klorokuin. Selanjutnya yaitu menentukan persentase penghambatan pertumbuhan parasit untuk menghitung Nilai IC₅₀. Nilai IC₅₀ dihitung menggunakan Analisis Probit (Marangoh *et al.*, 2021).

a. Preparasi sampel uji Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Sebanyak 1 mg sampel ekstrak etanol 70% daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm f) dalam 100 μ L DMSO (larutan stok, konsentrasi 10.000 μ g/mL). Larutan stok kemudian diencerkan secara berurutan hingga konsentrasi akhir 100; 10; 1; 0,1; 0,01 μ g/ml.

b. Preparasi parasit *Plasmodium falciparum*

Parasit yang digunakan dalam pengujian ini disinkronkan (stadium cincin) dengan parasitemia $\pm 1\%$.

c. Prosedur uji antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Sebanyak 2 μ l larutan uji diambil dan dimasukkan dalam tiap sumuran (*microwell* 96), lalu ditambahkan 198 μ l parasit (tiap konsentrasi dibuat *duplo*). Pelat sumuran uji selanjutnya dimasukkan dalam *chamber* dan diberikan campuran gas (O₂ 5%, CO₂ 5% dan N₂ 90%) untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan parasit *Plasmodium falciparum*. *Chamber* yang berisi sumuran uji diinkubasi selama 48 jam pada suhu 37°C. Kultur kemudian dipanen dan dibuat sediaan apusan darah tipis dengan pewarnaan giemsa 20%.

Hapusan darah yang sudah dibuat, diperiksa, dengan pembesaran lensa obyektif 1000x, lalu dihitung jumlah eritrosit yang terinfeksi (parasitemia), dengan cara dihitung jumlah eritrosit yang terinfeksi (parasitemia) setiap 1000 eritrosit normal di bawah mikroskop. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan persen pertumbuhan dan persen penghambatan.

d. Analisis data

Hapusan darah yang sudah dibuat, dihitung dengan cara menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi setiap 1000 eritrosit normal di bawah mikroskop. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan Persen pertumbuhan dan Persen penghambatan. Persen pertumbuhan didapatkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \% \text{ Parasitemia-D0}$$

Keterangan :

D0 = % pertumbuhan pada jam ke-0

Rumus untuk perhitungan % penghambatan adalah sebagai berikut :

$$\text{Persen penghambatan} = 100\% - ((X_u/X_k) \times 100\%)$$

Keterangan :

X_u = % pertumbuhan pada larutan uji

X_k = % pertumbuhan pada kontrol negatif

Berdasarkan data persen penghambatan dilakukan analisis statistik dengan analisis probit program SPSS versi 20 untuk mengetahui nilai

IC₅₀ atau konsentrasi bahan uji yang dapat menghambat pertumbuhan parasit sebanyak 50%.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Penelitian ini menggunakan 660 gram simplisia daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang diekstraksi dengan metode maserasi dan menggunakan larutan penyari etanol 70% sebanyak 1300 mL, sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 72 gram.

Tabel 7. Hasil Ekstraksi daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Jenis Ekstrak	Berat Simplisia (gram)	Berat Ekstrak (gram)	Rendamen (%)
Ekstrak Kental	660 gram	72 gram	10,90 %

2. Skrining Fitokimia

Skrining Fitokimia merupakan metode awal untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam sampel yang akan diuji.

Tabel 8. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 70% Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Pengujian	Pereaksi	Hasil	Keterangan
Alkaloid	Mayer Dragendroff	-	Tidak ada
Fenolik	FeCl ₃ 5%	+	Ada
Flavonoid	Serbuk Mg ⁺ HCl Peekat Amyl Alcohol	+	Ada
Saponin	Asam Klorida 2N	+	Ada

Pengujian	Pereaksi	Hasil	Keterangan
Tanin	FeCl ₃ 5% + Gelatin 10%	+	Ada
Steroid	Asam Asetat anhidrat	+	Ada
Terpenoid	Asam Sulfat Pekat	+	Ada

3. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F) terhadap *Plasmodium falciparum*

Tabel 9. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

Konsentrasi (µg/ml)	R	Parasitemia (%)		Pertumbuhan (%)	Hambatan (%)	Hambatan rata-rata (%)
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	0.80	8.25	7.45	-	
	2	0.80	8.30	7.50	-	
100	1	0.80	3.09	2.29	69.26	68.96
	2	0.80	3.15	2.35	68.67	
10	1	0.80	5.97	5.17	30.60	30.44
	2	0.80	6.03	5.23	30.27	
1	1	0.80	6.81	6.01	19.33	19.80
	2	0.80	6.78	5.98	20.27	
0,1	1	0.80	7.56	6.76	9.26	9.70
	2	0.80	7.54	6.74	10.13	
0,01	1	0.80	8.10	7.30	2.01	1.87
	2	0.80	8.17	7.37	1.73	

4. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Klorokuin terhadap *Plasmodium falciparum*

Tabel 10. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Klorokuin terhadap *Plasmodium falciparum*

Konsentrasi (µg/ml)	R	Parasitemia (%)		Pertumbuhan (%)	Hambatan (%)	Hambatan rata-rata (%)
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	1.16	5.96	4.80	-	
	2	1.16	5.95	4.79	-	
100	1	1.16	1.65	0.49	89.79	91.03
	2	1.16	1.53	0.37	92.28	
10	1	1.16	2.07	0.91	81.04	81.54
	2	1.16	2.02	0.86	82.05	
1	1	1.16	2.68	1.52	68.33	68.09
	2	1.16	2.70	1.54	67.85	
0,1	1	1.16	3.26	2.10	56.25	56.41
	2	1.16	3.24	2.08	56.58	
0,01	1	1.16	3.96	2.80	41.67	41.92
	2	1.16	3.93	2.77	42.17	

B. Pembahasan

Malaria adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa genus *Plasmodium* melalui gigitan nyamuk *anopheles* betina dan sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk di Indonesia.. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas antimalaria pada ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) terhadap parasit *Plasmodium falciparum* secara *in vitro*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simplisia daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang diperoleh dari Kecamatan Borong, Kabupaten Sinjai.

Serbuk simplisia daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%.

Maserasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ekstrak tanpa adanya potensi kerusakan senyawa yang ada pada suatu tanaman, selain itu metode ini juga mudah dilakukan serta sederhana. Ekstraksi dilakukan dengan tujuan untuk menarik serta memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda dalam berbagai komponen kimia yang ada pada tumbuhan dan tanaman. Ekstrak kental selanjutnya di uji kandungan senyawanya melalui skrining fitokimia dan ekstrak kental kemudian dikeringkan dengan metode *freeze dryer* untuk pengujian aktivitas antimalaria.

Hasil dari skrining fitokimia didapatkan bahwa ekstrak daun Anak dara (*Croton oblongus* Burm F) positif mengandung flavonoid, fenolik, saponin, tanin, steroid, dan terpenoid. Sedangkan senyawa alkaloid tidak terdeteksi pada tumbuhan anak dara (*Croton oblongus* Burm F). Uji fitokimia ini dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder yang ada pada suatu tanaman (Muharrami *et al.*, 2020)

Pada uji aktivitas antimalaria secara *in vitro*, metode pembiakan parasit dilakukan menurut metode Trager dan Jensen yaitu menggunakan *candle jar* untuk meminimalkan gas O₂ sebab parasit tumbuh optimal pada sedikit gas O₂ rendah dan 5% CO₂ (Jensen, 2002). Metode *in vitro* ini digunakan karena memiliki keuntungan yaitu hanya memerlukan sejumlah kecil darah kapiler dan melibatkan proses *in vitro* yang disederhanakan (Maji, 2018).

Ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang akan diuji terlebih dahulu dilarutkan dengan DMSO dan dimasukkan ke dalam *microwell* 96 lalu ditambahkan 198µL (tiap konsentrasi dibuat *duplo*). Penggunaan DMSO dimaksudkan karena selain sebagai pelarut DMSO

merupakan senyawa kimia yang memiliki toksisitas rendah (Rahmi & Hilda Putri, 2020). Pada sumuran yang berisi larutan uji dan parasit selanjutnya dimasukkan dalam *chamber* dan diberikan campuran gas (O₂ 5%, CO₂ 5% dan N₂ 90%). *Chamber* yang berisi sumuran uji diinkubasi selama 48 jam. Inkubasi 48 jam dipilih karena aktivitas laktat dehidrogenase maksimum dicapai saat kultur plasmodium diinkubasi selama 48 jam, yaitu saat stadium trofozoit dan skizon lebih dominan berkembang pada suhu 37°C (Syarif *et al.*, 2021). Setelah inkubasi selesai, lalu dibuat hapusan darah tipis, dengan pewarnaan menggunakan Giemsa 20%. Hapusan darah yang sudah dibuat, diperiksa dengan pembesaran lensa obyektif 1000x, kemudian dihitung eritrosit yang terinfeksi (parasitemia), dengan cara menghitung jumlah eritrosit yang terinfeksi (parasitemia) setiap 1000 eritrosit normal di bawah mikroskop.

Berdasarkan hasil pengolahan data, seperti yang tercantum pada tabel 9 persen penghambatan menunjukkan bahwa konsentrasi bahan uji berbanding lurus dengan persen penghambatannya terhadap parasit. Semakin besar konsentrasi bahan uji maka semakin tinggi persen penghambatannya. Suspensi parasit yang diberi ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) mengalami penurunan persen penghambatan seiring dengan menurunnya konsentrasi bahan uji. Pada konsentrasi 100 µg/ml didapatkan % hambatan rata rata sebesar 68.96 %, untuk konsentrasi 10 µg/ml sebesar 30.44 %, konsentrasi 1 µg/ml sebesar 19.80%, konsentrasi 0.1 µg/ml sebesar 9.70 %, dan untuk konsentrasi 0.01 µg/ml % penghambatannya sebesar 1.87 %.

Pada penelitian ini juga digunakan kontrol positif yaitu klorokuin sebagai pembanding. Hal ini dikarenakan, klorokuin telah terbukti efektif

dalam menghambat pertumbuhan *Plasmodium falciparum* parasit penyebab malaria (Fenska, 2019). Hasil yang didapatkan dari tabel 10 pada penggunaan klorokuin sebagai pembanding juga menunjukkan penurunan persen penghambatan seiring dengan menurunnya konsentrasi klorokuin. Pada konsentrasi 100 µg/ml didapatkan % hambatan rata rata sebesar 91.03 %, untuk konsenrasi 10 µg/ml sebesar 81.54 %, konsentrasi 1 µg/ml sebesar 68.09 %, konsentrasi 0.1 µg/ml sebesar 56.41 %, dan untuk konsentrasi 0.01 µg/ml % penghambatannya sebesar 42.46 %. Dari data yang didapatkan obat klorokuin masih lebih baik dibandingkan dengan ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F). akan tetapi penggunaan tanaman berbahan dasar herbal dalam hal ini memiliki keuntungan yaitu memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan obat obat sintetis bila tepat dosis dan tepat penggunaannya serta dapat mengatasi permasalahan saat ini mengenai resistensi obat. Dengan demikian ekstrak etanol daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengobatan malaria (Singh *et al.*, 2023).

Hasil persentase penghambatan dianalisa dengan metode log-probit untuk mendapatkan nilai IC_{50} . IC_{50} adalah konsentrasi bahan uji yang dapat menghambat pertumbuhan parasit sebanyak 50%. Semakin kecil nilai IC_{50} yang didapatkan maka semakin besar efektifitas penghambatan bahan uji terhadap pertumbuhan parasit. Berdasarkan (Chinchilla *et al.*, 2012) aktivitas antimalaria suatu ekstrak dinyatakan sangat aktif bila $IC_{50} < 5\mu\text{g/mL}$; aktif bila $IC_{50} > 5-50\mu\text{g/mL}$; kurang aktif bila $IC_{50} 50-100\mu\text{g/mL}$; dan tidak aktif bila memiliki $IC_{50} > 100\mu\text{g/mL}$.

Dari hasil analisis probit, didapatkan IC_{50} pada ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) sebesar 27.625 $\mu\text{g/mL}$. Menurut Chinchilla et al., 2012 hasil tersebut masuk dalam kategori aktif. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki aktivitas antimalaria. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anisa pada tahun 2022 yang melakukan pengujian “Efektivitas Ekstrak Etanol Akar Bajakah Merah (*Spatholobus littoralis hassk*) sebagai Antimalaria secara *In Vitro* terhadap *Plasmodium falciparum*” dari hasil penelitiannya diketahui bahwa nilai IC_{50} dari ekstrak etanol bajakah merah (*Spatholobus littoralis hassk*) sebesar 14.877 $\mu\text{g/mL}$ yang juga termasuk dalam kategori aktif. Dimana kategori aktif dalam penelitian ini berada pada rentan apabila $IC_{50} > 5-50 \mu\text{g/ml}$ (Anisa et al., 2022). Pada perbandingan yaitu klorokuin didapatkan IC_{50} sebesar 0.38 $\mu\text{g/mL}$ dimana pada nilai ini, klorokuin masuk dalam kategori sangat aktif. Sehingga nilai penghambatan parasit pada klorokuin masih lebih baik dibandingkan dengan penghambatan ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F).

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan parasit *Plasmodium falciparum* yang masuk dalam kategori aktif dengan dugaan senyawa yang terdapat pada ekstrak adalah senyawa golongan flavonoid, tanin dan steroid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tanaman. Struktur khas flavonoid menunjukkan bioaktivitas. Banyak flavonoid alami yang memiliki aktivitas antimalaria (Herlina et al., 2019) Pada penelitian “Flavonoids from stem bark of akway (*Drymis beccariana* Gibbs) and their antimalarial properties” yang dilakukan oleh Herlina dkk, pada tahun 2019

menunjukkan bahwa flavonoid dari fraksi kulit batang (*Drymis beccariana*) memiliki aktivitas antimalaria dengan IC_{50} 0.002 dan masuk dalam kategori sangat aktif.

. Menurut, Hayati pada tahun 2016 tanaman Anting-anting (*Acalypha indica L*) menunjukkan aktivitas antimalaria dimana ekstrak etil asetat tumbuhan ini mampu menghambat pertumbuhan parasit sebesar 90.74 % dan setelah uji fitokimia didapatkan bahwa senyawa aktif yang terkandung dalam anting-anting (*Acalypha indica L*) yaitu tanin dan steroid (Jawa La & Kurnianta, 2019). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan dimana daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) melalui skrining fitokimia menunjukkan bahwa mengandung senyawa tanin dan steroid sehingga mampu menghambat pertumbuhan *Plasmodium falciparum*. Penelitian ini juga didukung oleh Hermanto pada tahun 2016 dimana tumbuhan *Tridax Procumbens L* memiliki nilai konsentrasi penghambatan (IC_{50}) sebesar 3 $\mu\text{g/ml}$ dan senyawa aktif yang terkandung dalam *Tridax Procumbens L* adalah saponin, flavonoid, steroid dan terpenoid (Jawa La & Kurnianta, 2019).

Namun hasil penelitian ini masih terbatas karena pengujian hanya dilakukan pada tingkat ekstrak. Untuk mengetahui efektivitas daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) lebih dalam, perlu dilakukan pengujian pada tingkat fraksi atau isolasi. Sebagaimana dalam hal ini ialah usaha meneliti daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) yang memiliki manfaat dalam mengobati penyakit malaria. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al- Qur'an senantiasa mengandung prinsip sains yang dapat dikembangkan dan dapat dibuktikan hubungannya dengan metafisik dan spiritual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F) memiliki efektivitas sebagai antimalaria terhadap *Plasmodium falciparum* dengan nilai IC₅₀ sebesar 27.625 µg/mL yang termasuk dalam kategori aktif.

B. Saran

Perlu penelitian lebih lanjut tentang uji untuk mendapatkan senyawa aktif antimalaria yang terdapat pada ekstrak daun anak dara (*Croton oblongus* Burm F)



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar R, A., & Haque, M. (2020). *Preparation Of Medicinal Plants: Basic Extraction And Fractionation Procedures For Experimental Purposes*. 12(1), 1–10.
- Alessandro, S. D., Scaccabarozzi, D., Signorini, L., Perego, F., Ilboudo, D. P., Ferrante, P., & Delbue, S. (2020). *The Use Of Antimalarial Drugs Against Viral Infection*. 1–26.
- Anisa, S., Wydiamala, E., & Hayatie, L. (2022). Efektivitas Ekstrak Etanol Akar Bajakah Merah (*Spatholobus Littoralis Hassk*) Sebagai Antimalaria Secara In Vitro Terhadap Plasmodium Falciparum. *Homeostasis*, 5(1), 151. <https://doi.org/10.20527/Ht.V5i1.5214>
- Astuti, Y., Wahid, A. R., & Wardani, A. K. (2019). *Uji Aktivitas Antimalaria In Vitro Dari Ekstrak Etanol Batang Tanaman Ashitaba (Angelica Keiskei)*.
- Awainah, N. (2016). *Standarisasi Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton Oblongus Burm F.)*. April.
- Borrer, D. J., Browijoyo, M. J., Johnson, N. F., Sutiyono, P., & Triplehom, C. A. (1992). *Pengenalan Pelajaran Serangga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Caroline, R., & Tindale, M. (1993). *Flora Of The Sidney Region Reed*.
- Cdc. (2016). *Cdc Center For Global Health - Malaria Surveillance*.
- Chinchilla, M., Velerio, I., Sanchez, R., Mora, V., Bagnarello, V., Martinez, L., Gonzales, A., Vanegas, J. C., & Apestegui, A. (2012). In Vitro Antimalarial Activity Of Extracts Of Some Plants From A Biological Reserve In Costa Rica. In *Rev Biol Trop* (Vol. 60, Pp. 881–891). <https://doi.org/10.15517/Rbt.V60i2.4024>
- Dalimartha, S. (2006). *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 4*. Puspa Swara.
- Direktorat Jenderal Pengendalian Kasus Malaria Di Indonesia Depkes, R. (2008). *Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria Di Indonesia* (D. J. P. K. M. Di Indonesia (Ed.)).
- Farnsworth, N. R. (1966). Biological And Phytochemical Screening Of Plants. *Pharmaceutical Sciences*, 55(3), 225–276.
- Farooq, S., Shah, M. A., & Manickavasagan, A. (2022). *Plant Exctracts : Applications In The Food Industry*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-822475-5.00005-3>
- Fenska, M. (2019). Sintesis, Karakteristik, Dan Uji Bioaktivitas Antimalaria Senyawa Trifeniltimah (Iv) 3-Aminobenzoat Dan Trifeniltimah (Iv) 4-Aminobenzoat Terhadap Parasit Plasmodium Falciparum Secara In Vito. *Jurnal Forum Nuklir (Jfn)*, 8(1).
- Fitriany, J., & Sabiq, A. (2018). Malaria. *Jurnal Averrous*, 4 No. 2.
- Haeria, Ningsih, S., & Riaji, A. D. (2014). *Penentuan Kadar Total Fenolik, Flavonoid, Dan Karotenoid Ekstrak Metanol Klika Anak Dara (Croton*

- Oblongus Burm.F.*). 2(4), 149–153.
- Harijanto, P. (2011). *Epidemiologi Malaria Di Indonesia*. Kementerian Kesehatan Ri.
- Hasanah, N., & Novian, D. R. (2020). *Analisis Ekstrak Etanol Buah Labu Kuning (Cucurbita)*. 9(1), 54–59.
- Herlina, T., Rudiana, T., Julaeha, E., & Parubak, A. S. (2019). Flavonoids From Stem Bark Of Akway (*Drymis Beccariana* Gibbs) And Theirs Antimalarial Properties. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1280(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1280/2/022010>
- Jawa La, E. O., & Kurnianta, P. D. M. (2019). Review Article Tradisional Di Indonesia Sebagai Alternatif Pengobatan Malaria. *Acta Holistica Pharmacia*, 1(1), 33–43.
- Jensen, J. B. (2002). *In Vitro Culture Of Plasmodium Parasites - Methods Molecular Medicine* (Vol. 72).
- Kemenag. (2019). *Al - Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.
- Kemenkes. (2017). *Buku Saku Penatalaksanaan Kasus Malaria*.
- Kemenkes. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria Dengan* (Pp. 1–53).
- Kusuma, H. S., & Mahfud, M. (2016). Preliminary Study: Kinetics Of Oil Extraction From Sandalwood By Microwave-Assisted Hydrodistillation. *Iop Conference Series: Materials Science And Engineering*, 128(1), 62–69. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/128/1/012009>
- Kweyamba, P. A., Zofou, D., Efang, N., Assob, J. N., & Kitau, J. (2019). In Vitro And In Vivo Studies On Anti-Malarial Activity Of *Commiphora Africana* And *Dichrostachys Cinerea* Used By The Maasai In Arusha Region , Tanzania. *Kweyamba Et Al. Malar J* (2019) 18:119, 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12936-019-2752-8>
- Maier, A. G., Matuschewski, K., Zhang, M., & Rug, M. (2019). *Plasmodium Falciparum*. *Trends In Parasitology*, 35(6), 481–482. <https://doi.org/10.1016/j.pt.2018.11.010>
- Maji, A. K. (2018). *Drug Seseptibility Testing Methods Of Antimalarial Agents*. 8(2), 70–76. <https://doi.org/10.4103/2229-5070.248695>
- Marangoh, N., Suciati, & Ekasari, W. (2021). In Vitro Antimalarial Activity And Toxicity Of *Helianthus Annus L.* Leaf Extract Against *Plasmodium Falciparum*. *Biological Chemistry*, 8 (3)(1), 51–58.
- Margaretta, S., Handayani, S. D., Indraswati, N., & Hindarso, H. (2011). Ekstraksi Senyawa Phenolic *Pandanus Amaryllifolius*. In *Ekstraksi Senyawa Phenolic Pandanus Amaryllifolius Roxb. Sebagai Antioksidan Alami* (Pp. 21–30). Widya Teknik.
- Mery, B., Maruzy, A., Rk, R. N., & Brotojoyo, E. (2020). Aktivitas Antimalaria Daun Gempol (*Nuclea Orientalis (L .) L*) Terhadap *Plasmodium Falciparum*. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30 No. 2 J, 135–146. <https://doi.org/10.22435/MPK.V30i2.3044>

- Ministry Of Health And Medical Services, S. Islands. (2021). *Malaria Prevention And Control*. May.
- Muharrami, L. K., Munawaroh, F., Ersam, T., & Santoso, M. (2020). Phytochemical Screening Of Ethanolic Extract: A Preliminary Test On Five Medicinal Plants On Bangkalan. *Jurnal Pena Sains*, 7(2), 96–102. <https://doi.org/10.21107/jps.v7i2.8722>
- Obey, J. K., Ngeiywa, M. M., Kiprono, P., Omar, S., Wright, A. Von, Kauhanen, J., & Tikkanen-Kaukanen, C. (2018). Antimalarial Activity Of Croton Macrostachyus Stem Bark Extracts Against Plasmodium Berghei In Vivo. *Journal Of Pathogens*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/2393854>
- Pandey, A. V, Tekwani, B. L., Singh, R. L., & Chauhan, V. S. (1999). Artemisinin, And Endoperoxide Antimalarial, Disrupts The Hemoglobin Catabolism And Heme Detoxification Systems In Malarial Parasite. *Journal Of Biological Chemistry*, 274(27), 19383–19388.
- Patel, K., Panchal, N., & Ingle, D. P. (2019). Review Of Extraction Techniques. *International Journal Of Advanced Research In Chemical Science*, 6(3), 6–21.
- Peng, H., Sun, X., Wei, W., & Fang, X. (2017). *Polymer Materials For Energy And Electronic Applications*. 107–149.
- Prabowo, A. (2008). *Malaria : Mencegah Dan Mengatasinya*. Jakarta Puspa Swara.
- Pudhom, K., & B Sommit, D. (2011). *Phytochemistry Letters - Clerodane Diterpenoids And A Trisubstituted Furan From Croton Oblongifolius*. <https://doi.org/10.1016/j.phytol.2011.02.004>
- Rachmawati, B., Suci, N., Edward, Retnoningrum, D., & Ariosta. (2021). *Buku Panduan Skrining Malaria Di Unit Transfusi Darah*.
- Rahmi, M., & Hilda Putri, D. (2020). The Antimicrobial Activity Of Dmso As A Natural Extract Solvent Aktivitas Antimikroba Dmso Sebagai Pelarut Ekstrak Alami. *Serambi Biologi*, 5(2), 56–58.
- Razali, M. F. (2021). *Penggunaan Manusia Sebagai Relawan Dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alquran, Hadis Dan Kaedah Fiqih Mutiara*. 4(1), 64–75.
- Roba, K. (2022). *Evaluating Croton Macrostachyus : Honey , Nectar , And Pollen Antimicrobial Activities Against Escherichia Coli , Shigella Boydii , Staphylococcus Aureus , And Bacillus Subtilis*. 1–15.
- Samuel, R., Muna, K., Sulaiman, M., & Ochola, L. (2022). *In-Vitro Antimalarial Activity Of Thelgate (Aristolochia Bracteolata Lam) Plant Isolated From Juba, South*. 2(2), 1–7.
- Saxena, S., Pant N, & Dc, J. (2003). Antimalarial Agents From Plant Sources. In *Cur Sci* 84(9) (Pp. 1314–1329).
- Singh, N., Chatterjee, A., Chanu, W. K., Vaishalli, P. M., Singh, C. B., & Nagaraj, V. A. (2023). Antimalarial Activity Of Toona Ciliata Mj Roem Aqueous Methanolic Leaf Extract And Its Antioxidant And Phytochemical Properties. *Journal Of Traditional And Complementary Medicine*. <https://doi.org/10.1016/j.jtcme.2023.05.004>

- Sudarwati, T. P. L., & Fernanda, M. . H. F. (2019). *Aplikasi Pemanfaatan Daun Pepaya (Carica Papaya) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Aedes Aegypti* (N. R. Hariyati (Ed.); 1st Ed.).
- Sudoyo, A. W., Setyohadi, B., Alwi, I., K, M. S., & Setiati, S. (2009). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid Iii Edisi V*. Interna Publishing.
- Supaya, S. S. (2019). Refdes Kombinasi Alat Refluks Dan Distilasi, Upaya Efisiensi Proses Refluks Dan Distilasi Untuk Praktikum Kimia Organik. *Indonesian Journal Of Laboratory*, 1(4), 41. <https://doi.org/10.22146/ijl.V1i4.52716>
- Syarif, R. A., Wahyuningsih, M. S. H., Mustofa, M., & Ngatidjan, N. (2021). Penurunan Laktat Dehidrogenase Plasmodium Falciparum Strain D10 Pada Pemberian Fraksi Tithonia Diversifolia (Hemsley). *Majalah Farmaseutik*, 17(1), 116. <https://doi.org/10.22146/Farmaseutik.V17i1.57817>
- Wardani, A. K., Wahid, A. R., & Astuti, Y. (2020). Uji Aktivitas Antimalaria In Vitro Dari Ekstrak Etanol Batang Tanaman Ashitaba (Angelica Keiskei [Miq.] Koidz). *Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 18(2), 202–206. <http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/815>
- Who. (2017). *World Malaria Report*.
- Who. (2022). *Guidelines For Malaria*.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja

A. Skema Kerja Secara Umum




B. Preparasi Sampel




C. Pembuatan ekstrak Etanol daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

F)




D. Uji Fitokimia

- Uji Alkaloid



- Uji Flavonoid



- **Uji Saponin**

Disiapkan 1 ml larutan uji dalam tabung reaksi dan ditambahkan 9 ml aquadest

Dikocok tabung reaksi secara vertikal dan didiamkan selama 10 detik

Busa setinggi 1-10 cm yang terbentuk selama tidak kurang dari 10 detik menandakan adanya saponin dan busa tidak hilang dengan penambahan 1 tetes HCl 2N

- **Uji Tanin**

Disiapkan 1 g sampel di didihkan selama 15 menit dalam 20mL aquadest tabung reaksi dan

Didinginkan & disaring

Filtrat ditambahkan 2 tetes pereaksi FeCl 5%

Hasil positif mengandung tanin ditandai dengan warna biru

- Uji steroid

1 gr sampel ditambahkan 20 ml asam asetat anhidrat ditambahkan pereaksi Lieberman-Burchard

Reaksi positif ditandai dengan adanya warna hijau kebiruan

- Uji Terpenoid

Disiapkan 5 ml larutan uji dalam tabung reaksi dan ditambahkan 3 ml asam sulfat pekat


Hasil positif mengandung terpenoid jika terbentuk warna merah kecoklatan

- Uji Fenolik

Disiapkan 1 ml larutan uji dalam tabung reaksi dan ditambahkan FeCl_3

Hasil positif mengandung fenolik jika terbentuk biru kehitaman

E. Uji Aktivitas Antimalaria secara *In vitro*



Lampiran 2. Perhitungan Rendamen Ekstrak Daun Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F)

$$\% \text{ rendamen} = \frac{\text{bobot ekstrak}}{\text{bobot simplisia}} \times 100\%$$

$$= \frac{72 \text{ gram}}{660 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 10,90 \%$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3. Perhitungan konsentrasi bahan uji

1. Untuk konsentrasi 100 µg/ml

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} = 100 \mu\text{g/ml} \times V2$$

$$(10.000 \mu\text{g/ml})/100 = V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} = V2$$

2. Untuk konsentrasi 10 µg/ml

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} = 10 \mu\text{g/ml} \times V2$$

$$(10.000 \mu\text{g/ml})/10 = V2$$

$$1000 \mu\text{g/ml} = V2$$

3. Untuk konsentrasi 1 µg/ml

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} \times 100 \text{ ml} = 1 \mu\text{g/ml} \times V2$$

$$(10.000 \mu\text{g/ml})/1 = V2$$

$$10.000 \mu\text{g/ml} = V2$$

4. Untuk konsentrasi 0.1 µg/ml

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} \times 100 \mu\text{g/ml} = 0.1 \times V2$$

$$(10.000 \mu\text{g/ml})/0.1 = V2$$

$$100.000 \mu\text{g/ml} = V2$$

5. Untuk konsentrasi 0.1 µg/ml

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

$$100 \mu\text{g/ml} \times 100 \mu\text{g/ml} = 0.01 \times V2$$

$$(10.000 \mu\text{g/ml})/0.01 = V2$$

$$1.000.000 \mu\text{g/ml} = V2$$

Lampiran 4. Hasil Uji Aktivitas Antimalaria Daun Anak Dara (Croton oblongus


Burm F)

Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)	R	% Parasitemia		% Pertumbuhan	% Hambatan	% Hambatan rata-rata
		0 jam	48 jam			
Kontrol (-)	1	0.80	8.25	7.45	-	
	2	0.80	8.30	7.50	-	
100	1	0.80	3.09	2.29	69.26	68.96
	2	0.80	3.15	2.35	68.67	
10	1	0.80	5.97	5.17	30.60	30.44
	2	0.80	6.03	5.23	30.27	
1	1	0.80	6.81	6.01	19.33	19.80
	2	0.80	6.78	5.98	20.27	
0,1	1	0.80	7.56	6.76	9.26	9.70
	2	0.80	7.54	6.74	10.13	
0,01	1	0.80	8.10	7.30	2.01	1.87
	2	0.80	8.17	7.37	1.73	


Lampiran 5. Uji Aktivitas Antimalaria Klorokuin (Kontrol positif)

Konsentrasi ($\mu\text{g/ml}$)	R	% Parasitemia		% Pertumbuhan	% Hambatan	% Hambatan rata-rata
		0 jam	48 jam			
100	1	1.16	1.65	0.49	89.79	91.03
	2	1.16	1.53	0.37	92.28	
10	1	1.16	2.07	0.91	81.04	81.54
	2	1.16	2.02	0.86	82.05	
1	1	1.16	2.68	1.52	68.33	68.09
	2	1.16	2.70	1.54	67.85	
0,1	1	1.16	3.26	2.10	56.25	56.41
	2	1.16	3.24	2.08	56.58	
0,01	1	1.16	3.96	2.80	41.76	42.46

Lampiran 6. Hasil Probit Analisis Daun Anak Dara (Croton oblongus Burm F) terhadap Plasmodium falciparum



Lampiran 7. Hasil Probit Analisis Klorokuin terhadap Plasmodium falciparum



Lampiran 8. Dokumentasi



Gambar 13. Pengambilan Sampel



Gambar 14. Disortasi Kering



Gambar 15. Pengeringan Sampel




Gambar 16. Maserasi



Gambar 17. Penyaringan Ekstrak



Gambar 18. . Penguapan ekstrak dengan *rotary evaporator*



Gambar 19. Hasil Ekstrak




Gambar 20. Penimbangan Ekstrak



Gambar 21. .Uji Fitokimia



Gambar 22. .Uji Tanin



Gambar 23. Uji Terpenoid



Gambar 24. Uji Flavonoid



Gambar 25. Uji Alkaloid



Gambar 26. Uji Fenolik



Gambar 27. Uji Steroid



Gambar 28. Uji Saponin



Gambar 29. Pengeringan Ekstrak dengan *Freeze Dryer*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti Kirani Ramadhani Sofyan atau dikenal dengan panggilan Kirani, merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ia lahir di Makassar pada tanggal 03 Desember 2000. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Muh. Sofyan, S.H., M.H. dan ibu Dewi A. Mahmud S.T., M.AP. penulis memulai pendidikannya di TKIT Al-Insyirah Makassar pada umur 5 sampai dengan 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 10 Pangsid Sidrap pada usia 7 tahun. Pada umur 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan di SMP Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar dan menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Sidrap pada usia 16 tahun. Pada tahun 2019 penulis memasuki jenjang Perguruan Tinggi di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pengalaman Organisasi Penulis yaitu aktif dalam organisasi intra kampus yaitu Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2020-2021 hingga 2021-2022.

Penulis merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT serta limpahan doa yang ikhlas juga kerja keras orang tua dan keluarga besar dan teman teman karena berkat doa dan dukungan yang diberikan sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Penulis akan selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang sekitar terkhusus pada orang tua. Akhir kata penulis menyampaikan “*Education is power*”