

**INTERVENSI *HEAD UP 15-30* DERAJAT TERHADAP
PERFUSI SEREBRAL PADA PASIEN *TRAUMATIC
BRAIN INJURY*: STUDI KASUS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ners Pada Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh:

LA ODE AGUSTINO SAPUTRA, S.Kep

NIM.70900120011

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : La Ode Agustino Saputra, S.Kep
NIM : 70900120011
Tempat/Tgl Lahir : Mabolu, 28 Agustus 1996
Jurusan/Prodi : Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Subulussalam, Desa Romangloe, Gowa
Judul : Intervensi *Head Up* 15-30 Derajat
Terhadap Perfusi Serebral Pada Pasien *Traumatic Brain Injury*: Studi Kasus

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 07 Juli 2021

Penyusun

La Ode Agustino Saputra, S.Kep
70900120011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) La Ode Agustino Saputra, S.Kep NIM: 70900120011, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi *Head Up 15-30* Derajat Terhadap Perfusi Serebral Pada Pasien *Traumatic Brain Injury: Studi Kasus*”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 07 Juli 2021


Dr.Ns. Anwar Hafid, S.Kep., M.Kes
Pembimbing 1


Ns. A
M.Kep., Sp., Kep. MB
Pembimbing 2

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi *Head Up 15-30* Derajat Terhadap Perfusion Serebral Pada Pasien *Traumatic Brain Injury*: Studi Kasus” yang disusun oleh La Ode Agustino Saputra, S.Kep NIM : 70900120011, Mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan di pertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari kamis dan tanggal 15 juli 2021 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 15 Juli 2021
05 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patima S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Patima S.Kep.,Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Aisyah Arsyad, M.A	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad J, S.Kep., Ns., M.Kep, Sp. KMB	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP.198007012006042002

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah Taala karena atas berkah limpahan karunia, rahmat, dan rida-Nya kita masih diizinkan untuk dapat menghela nafas sampai detik ini. Salam dan salawat tak pernah kita luput untuk selalu dikirimkan kepada Rasulullah sebagai manusia pilihan Allah untuk membawakan risalah-Nya dan memberikan peringatan kepada manusia melalui Al-Qur'an dan Sunah. Kita tidak lupa pula kirimkan salam dan salawat kepada keluarga dan sahabat Rasulullah dan kita selalu bermunajat kepada Allah agar kita semua sebagai umat Islam selalu diberikan hidayah, keistiqomahan di atas Al-Qur'an dan Sunah.

Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran penulis ucapkan sebab dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Intervensi *Head Up 15-30* Derajat Terhadap Perfusi Serebral pada Pasien *Traumatic Brain Injury*: Studi Kasus. Penulis sadar bahwa masih banyak keterbatasan penulis dari segi pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun tulisan ini. Penulis mempersembahkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Taala, sebab atas kekuatan yang telah diberikan-Nya, maka penulis dapat menggoreskan tinta dalam karya tulis ini. Tentunya, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, yakni La Ode Marisi dan Wa Ode Ndoisa yang selalu memberi dukungan, doa-doa yang tak pernah berhenti untuk dipanjatkan kepada Allah Taala.

Penulis tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhanis, MA, Ph.D, selaku rektor UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya yang tercinta.

2. Ibu Dr. Dr. Syatirah Jalaludin, M.Kes., Sp., A, selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, para wakil dekan fakultas, staf akademik dan seluruh jajarannya.
3. Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M. Kes, selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar dan sekaligus menjadi Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan sabar dan tulus. Motivasi, arahan, dan saran tak pernah luput diberikan.
4. Ahmad Jamaluddin, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp., Kep., MB, WOC (ETN), selaku Pembimbing II yang telah mendedikasikan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Dr.Patimah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan selama berjalannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
6. Bapak Prof. Dr. Muhtar Luthfi, M.Ag., selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan dan arahnya demi kebaikan penulis, agar menjadi salah satu karya yang bermanfaat bagi orang lain di kemudian hari.
7. Ibu dr. Azizah Nurdin, S.Ked, M.Sc., Sp. OG sebagai Pembimbing Akademik selama enam semester dan Ibu Hj. Nur Al Marwah Asrul, S.Si., M.Kes, serta Mutthaharah, S.Kep., Ns., M.Kep sebagai pembimbing akademik penulis sampai sekarang yang telah memberikan banyak dorongan dan motivasi untuk selalu berkarya.
8. Seluruh tim dosen Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar, yang telah bersedia untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sabar dan tulus dalam rangka penyelesaian karya tulis ini.
9. Kakak-kakakku yang tercinta, Wa Ode Darlia, La Ode Zainal, Wa Ode Hasnah, La Ode Parisa, Wa Ode Asmaul Husna, yang selalu memberikan

motivasi yang tak terhingga serta telah menjadi washilah dari Allah Taala dalam membiayai selama bangku perkuliahan. Terima kasih tak terhingga yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, menjadi *support system* bagi penulis dalam menghadapi perjuangan menuntut ilmu dan menempuh pendidikan di tanah perantauan. Tak luput penulis ucapkan terima kasih kepada kedua adik, yakni La Ode Jumadil Lima Syah dan La Ode Mursalin. *I love you all very much.*

10. Bapak Andi Ari Makkarumpa selaku pemilik kedai kopi Ruang Ngemil Samata, Muhammad Husril, Muhammad Idul Awal, dan Muhammad Fadillah yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil selama penyusunan karya ini.
11. Teman-teman satu angkatan di Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar Tahun 2016 (EP16LOTIS) atas kebersamaannya selama ini dalam menempuh bangku perkuliahan.
12. Seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi dan pelajaran hidup bagi penulis selama menjalani pendidikan di tanah perantauan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik hati, lisan, maupun tindakan. Penulis menyadari bahwa untuk menyempurnakan karya tulis ini tidaklah mudah dikarenakan masih banyak kekurangan di dalamnya. Akhirnya, penulis berharap apa yang telah disajikan dalam karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan kesehatan. Semoga semua apa yang telah penulis usahakan diberkahi dan bernilai ibadah di sisi Allah Taala. Terima kasih. *Jazaakumullahu khairon.*

Gowa, 03 Juni 2021


La Ode Agustino Saputra



DAFTAR ISI

Sampul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	132-18
A. Latar Belakang Masalah.....	132
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.....	17
D. Manfaat	18
BAB II TINJAUAN TEORI	20-41
A. Konsep Teori.....	20
B. Konsep Keperawatan	27
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan	38
D. <i>Evidence Based Nursing</i>	39
BAB III LAPORAN KASUS	42-77
A. Pengkajian.....	42

B. Analisis Data	58
C. Diagnosis Keperawatan.....	58
D. Intervensi Keperawatan.....	59
E. Implementasi Keperawatan.....	64
F. Evaluasi.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	78-84
A. Analisis Kasus.....	78
B. Analisis Intervensi.....	79
C. Alternatif Pemecahan Masalah.....	82
BAB V PENUTUP.....	85-87
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Intevensi keperawatan secara teoritis.....	36
Tabel 3.1 Obat-obatan yang diresepkan.....	51
Tabel 3.2 Hasil pemeriksaan penunjang.....	53
Tabel 3.3 Klasifikasi data.....	55
Tabel 3.4 Analisis data.....	58
Tabel 3.5 Intevensi kasus.....	64
Tabel 3.6 Implementasi dan evaluasi kasus.....	78
Tabel 4.1 Hasil implementasi selama perawatan.....	81



ABSTRAK

Nama : La Ode Agustino Saputra
NIM : 70900120011
Judul : **Intervensi *Head Up 15-30* Derajat terhadap Perfusi Serebral pada Pasien *Traumatic Brain Injury*: Studi Kasus**

Latar Belakang: cedera kepala atau *traumatic brain injury* (TBI) merupakan suatu gangguan yang bersifat traumatik pada fungsi otak baik disertai dengan pendarahan maupun tanpa perdarahan dalam jaringan otak. Kejadian trauma kepala diperkirakan mencapai 500.000 kasus tiap tahunnya dengan angka kematian lebih dari 10% pasien meninggal sebelum tiba di rumah sakit dan lebih dari 100.000 pasien mengalami berbagai kecacatan. Fenomena yang ditemukan selama di lapangan bahwa pasien cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas yang dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, mengalami gangguan perfusi serebral, penurunan kesadaran dan beberapa pasien mengalami nyeri kepala sebagai dampak dari ketidakefektifan perfusi serebral. Penanganan utama pada pasien cedera kepala adalah peningkatan status O₂ dan memposisikan pasien dengan *head up 15-30*⁰. **Metode:** metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kasus dengan melakukan proses keperawatan dimulai dari pengkajian sampai evaluasi pada kasus *traumatic brain injury* di ruangan *Intensive Care Unit* (ICU) rumah sakit Labuang Baji Makassar. **Hasil:** Diagnosis keperawatan yang ditemukan ialah risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, risiko defisit nutrisi, dan risiko infeksi. **Pembahasan:** intervensi *head up 15-30*⁰ dapat melancarkan perfusi serebral dan menurunkan tekanan intrakranial melalui beberapa mekanisme, yakni menurunkan tekanan darah, perubahan ventilasi, meningkatkan aliran vena melalui vena jugularis yang tak berkatup, sehingga menurunkan volume darah vena sentral yang menurunkan tekanan intrakranial. Perpindahan CSS dari kompartemen intrakranial ke rongga subarachnoid spinal dapat menurunkan tekanan intrakranial dan memperbaiki perfusi serebral. **Kesimpulan:** intervensi *head up 15-30*⁰ efektif untuk mengatasi masalah risiko perfusi serebral tidak efektif.

Keywords:

Intervensi *Head Up 15-30* Derajat, Perfusi Serebral, Pasien *Traumatic Brain Injury*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cedera kepala atau *traumatic brain injury* (TBI) merupakan suatu gangguan yang bersifat traumatik pada fungsi otak baik disertai dengan pendarahan maupun tanpa perdarahan dalam jaringan otak tanpa adanya proses terputusnya kontinuitas otak (Satyanegara, 2010: 12). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa salah satu efek yang dirasakan oleh pasien yang mengalami cedera kepala di dunia adalah kecacatan permanen ataupun disabilitas dengan persentase sekitar 40-50%.

Kejadian trauma kepala menjadi salah satu permasalahan kesehatan secara global, dikarenakan menjadi salah satu penyebab kematian, kecacatan, dan keterbelakangan mental. Kedaruratan neurologik yang beragam biasanya muncul pada cedera kepala tersebut. Penyebabnya ialah dikarenakan otak menjadi menjadi pusat kendali pada tubuh seorang individu, yang akan mempengaruhi seluruh aktivitas kehidupan manusia. Dengan demikian, kerusakan pada otak akan mengganggu sistem tubuh lainnya sampai dengan kematian (Kumar dan Cotrand, 2013).

Prevalensi angka kejadian cedera otak traumatika seperti di negara Amerika Serikat, akibat terjatuh sebesar 35,2 %, kecelakaa kendaraan bermotor sebesar 34,1%, perkelahian sebesar 10% dan penyebab lain tanpa diketahui sebesar 21% (Lumbantoruan & Nazmudin, 2015: 13). Prevalensi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1, 7 juta penduduk per tahunnya dengan angka kematian kurang lebih 50.000 orang per tahunnya, dan sekitar 5 juta orang mengalami disabilitas akibat trauma kepala. Angka kejadian trauma kepala pada laki-laki dua kali lebih sering terjadi dibanding pada anak

perempuan disebabkan anak laki-laki sering mengendarai motor (Lumbantoruan & Nazmudin, 2015: 13).

Data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) pada tahun 2013, menyatakan bahwa cedera kepala sering dijumpai di lapangan. Kejadian trauma kepala diperkirakan mencapai 500.000 kasus tiap tahunnya dengan angka kematian lebih dari 10% pasien meninggal sebelum tiba di rumah sakit dan lebih dari 100.000 pasien mengalami berbagai kecacatan akibat cedera kepala yang dialami (Kemenkes, 2013). Kematian yang disebabkan oleh cedera kepala akibat kecelakaan, diperkirakan meningkat 83% di negara berkembang sampai pada tahun 2020. Kasus ini menjadi kasus yang paling berisiko menyebabkan kematian dan kecacatan permanen pada pasien (Salim, 2015).

Data empiris yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung pada saat praktek klinik departemen keperawatan gawat darurat yang dilakukan di ruangan *Intensive Care Unit (ICU)* Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, maka diperoleh data primer berupa terdapat 10 pasien mengalami cedera kepala akibat kecelakaan selama sepekan praktikum. Fenomena yang penulis temukan selama di lapangan, menyatakan bahwa pasien cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas yang dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Labuang Baji Makassar, mengalami gangguan perfusi serebral, penurunan kesadaran dan beberapa pasien mengalami nyeri kepala sebagai dampak dari ketidakefektifan perfusi serebral. Salah satu yang menjadi faktor penyebab penurunan kesadaran tersebut ialah gangguan pada sentral otak dan batang otak.

Pasien yang menjadi objek penelitian dari peneliti, setelah dilakukan proses keperawatan berupa pengkajian, maka respon pasien terhadap penyakit

ini ialah tidak sadarkan diri, mengalami masalah pada tanda-tanda vital, yakni dalam kesan tidak normal bahkan kualitasnya menurun, dan tentunya mengalami gangguan perfusi serebral dan masalah GCS di bawah normal. Asuhan keperawatan terus dilakukan selama 5 hari perawatan di ruang ICU sampai diperoleh hasil yang signifikan dari pemberian intervensi yang diprogramkan.

Kerusakan yang terjadi pada otak akibat cedera kepala, penyebabnya dapat meliputi kejadian jatuh yang tidak disengaja, kecelakaan lalu lintas, benturan benda tajam atau tumpul, benturan dari adanya objek yang bergerak, serta benturan kepala pada benda statis (Manurung, 2018). Kerusakan yang diakibatkan oleh cedera kepala dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial (TIK) akibat terjadinya edema serebri ataupun perdarahan yang terjadi pada jaringan otak. Salah satu tanda dari terjadinya peningkatan TIK ialah terjadinya keluhan berupa nyeri kepala yang dialami oleh pasien post trauma. Nyeri kepala tersebut terjadi karena adanya peregangan pada struktur intrakranial yang peka terhadap nyeri, serta adanya proses perfusi otak yang inadkuat, yang berujung pada metabolisme aerob ke anaerob (Harun & Nurhidayat, 2014).

Perfusi otak yang inefektif akibat cedera kepala disebabkan oleh kekuatan benturan, tempat benturan, dan faktor-faktor kepala itu sendiri. Serangan anoksemik-iskemik yang fokal atau total, gangguan traumatik, peradangan, kelainan metabolik, perdarahan atau neoplasma, dapat menyebabkan edema dan menurunkan perfusi serebral otak yang berujung kepada gangguan neurologik, dan kerusakan otak yang dapat menetap (Soemarmo, 2018).

Gangguan akibat cedera kepala menimbulkan masalah berupa ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. Kejadian ini ditandai dengan adanya penurunan sirkulasi jaringan otak, akibat situasi O_2 dalam otak dan nilai GCS yang menurun. Keadaan ini mengakibatkan disorientasi pada pasien dengan cedera kepala. Ketidakefektifan perfusi yang tidak ditangani dengan segera akan mengakibatkan peningkatan tekanan intrakranial. Penanganan utama pada pasien cedera kepala, menurut penelitian-penelitian sebelumnya yang berbasis *Evidence Based Nursing* (EBN) adalah peningkatan status O_2 , pemenuhan nutrisi dan memposisikan pasien dengan *head up* $15-30^\circ$ (Soemarmo, 2018).

Posisi *head up* sebesar $15-30^\circ$ ialah cara mereposisikan kepala pasien lebih tinggi sebesar $15-30^\circ$ dari tempat tidur dengan posisi tubuh sejajar dan kaki lurus atau tidak menekuk. Posisi ini bertujuan untuk menurunkan tekanan intrakranial pada pasien yang mengalami cedera kepala. Posisi ini pula dapat meningkatkan aliran oksigen ke otak. Penelitian yang dipublikasikan oleh Aditya, dkk (2018) menyebutkan bahwa posisi elevasi kepala tersebut dapat meningkatkan aliran sirkulasi serebral dan memaksimalkan aliran oksigen ke jaringan otak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh March, dkk (2014) menyebutkan bahwa pemberian posisi *head up* $15-30^\circ$ pada pasien cedera kepala memiliki tujuan untuk memberikan efek positif dalam peningkatan oksigenasi dan sirkulasi serebral yang mengarah pada tingkat kesadaran pasien. Suplai oksigen yang terpenuhi dapat meningkatkan rasa nyaman dan rileks sehingga mampu meningkatkan kesadaran yang diukur dengan peningkatan GCS akibat penurunan perfusi jaringan serebral yang tidak efektif.

Posisi ini bekerja dengan memperbaiki drainase vena, perfusi serebral dan menurunkan tekanan intrakranial. Elevasi tersebut menurunkan tekanan intrakranial melalui beberapa mekanisme, di antaranya ialah menurunkan tekanan darah, perubahan kompliansi dada, perubahan pada ventilasi pernafasan, meningkatkan aliran vena melalui vena jugularis yang tak berkatup, sehingga menurunkan volume darah sentral yang menurunkan TIK. Perpindahan cairan serebrospinal (CSS) dari kompartemen intrakranial ke rongga subarachnoid spinal dapat menurunkan TIK (Safar, dkk, 2018).

Teori *caring* yang dikemukakan oleh Jean Watson, menyebutkan bahwa *caring* merupakan suatu proses pendekatan mengenai cara dan proses berpikir, berperilaku dan berperasaan kepada orang lain (Watson, 2011). Pasien yang mengalami cedera kepala yang dirawat di ruangan ICU, berada dalam keadaan tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, serta termasuk ke dalam pasien dengan tingkat ketergantungan penuh kepada perawat (*total care*). Hal ini menyebabkan pentingnya teori *caring* untuk diaplikasikan kepada pasien ICU sebagai bentuk pemberian asuhan keperawatan professional baik secara fisik, emosional, maupun dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien. Pemberian *caring* ini dilakukan dalam semua tahapan proses keperawatan, dimulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi selama pasien dirawat.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakefektifan perfusi serebral adalah pemberian posisi *head up* 15-30 derajat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ginting, Sitepu, dan Ariana (2019) menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan aliran serebral ke otak dan peningkatan oksigenasi sehingga dapat pula menurunkan nyeri dan TIK pada pasien cedera kepala. Intervensi

ini pada akhirnya diharapkan pasien dapat segera pulih dan sembuh atas izin dan kehendak Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surah Asy-Syu'ara: 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku (Kemenag, 2017)

Tafsir Al-Misbah menyatakan sakit merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Namun demikian, dalam hal penyembuhan bahwa Yang melakukannya adalah Allah Ta'ala. Perlu dicatat bahwa penyembuhan, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim, bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadits Rasulullah yang memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah (Shihab, 2009).

Tafsir pada: *“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku”* (Kemenag, 2017), disandarkan penyakit kepada dirinya (Nabi Ibrahim), sekalipun hal itu merupakan qadar, qadha, dan ciptaan Allah. Akan tetapi, ia sandarkan hal itu kepada dirinya sebagai sikap beradab. Makna hal itu berarti, jika aku sakit, maka tidak ada seorang pun yang kuasa menyembuhkan selain Allah sesuai takdir-Nya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Harun, et al., 2017). Dalam tafsir Al-Muyassar menyebutkan: dan apabila suatu penyakit menimpaku (Nabi Ibrahim), maka Dia-lah Yang menyembuhkanku dan menyetatkanku darinya (Basyir, 2016).

Keterkaitan dalil ini adalah apapun penyakit yang menyerang seorang individu, maka yang hanya bisa mengangkat penyakit tersebut adalah Allah. Oleh karena itu, pasien, tenaga kesehatan, dan keluarga

harus selalu meyakini dan mencari sebab bahwasannya untuk kesembuhan dari penyakit, semuanya adalah berasal dari Allah.

Berdasarkan dari berbagai data yang telah dipaparkan, permasalahan yang terkait, dan penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan studi kasus efektivitas intervensi *head up* 15-30⁰ terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury*.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya prevalensi pasien yang mengalami *traumatic brain injury* atau cedera kepala, terkait dengan efek yang merugikan akibat trauma tersebut, diikuti peningkatan kasus dari tahun ke tahun, menjadi perhatian penting yang membutuhkan penanganan segera dan tepat dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan mortalitas kasus. Oleh karena itu, studi kasus mengenai intervensi *head up* 15 – 30⁰ terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury* dan perbaikan sirkulasi serebral, serta dapat menjadi solusi selama berdasarkan *evidenced based nursing* bagi pasien yang menjalani perawatan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah efektivitas intervensi *head up* 15 – 30⁰ terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury*.?”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas *head up* 15 – 30⁰ terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury*.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya gambaran hasil pengkajian pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury*.

- b. Diketuainya diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury*.
- c. Diketuainya gambaran setelah pemberian intervensi *head up 15 – 30⁰* terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury*.
- d. Diketuainya implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury*.
- e. Diketuainya evaluasi keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury*.
- f. Diketuainya hasil analisis intervensi *head up 15-30⁰* pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dalam tugas akhir ners ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya terkait intervensi *head up 15 – 30⁰* terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. Di samping itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai bahan referensi penunjang dan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan pada ranah konsep dan intervensi yang bisa diberikan pada penelitian selanjutnya yang bisa diterapkan pada pasien gawat darurat yang mengalami cedera kepala.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber informasi bagi institusi pendidikan dan mahasiswa yang berkaitan dengan pemberian intervensi *head up 15 – 30⁰* terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury* dalam bidang keperawatan gawat darurat.

2. Manfaat Aplikatif

Penelitian tugas akhir ners ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi perawat yang ada di pelayanan klinis, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat ketika akan memberikan intervensi pencegahan terjadinya risiko yang dapat menimpa pasien dengan *traumatic brain injury*, sehingga prevalensi morbiditas dan mortalitas dapat menurun.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori *Traumatic Brain Injury*

1. Definisi

Traumatic brain injury merupakan gangguan fungsi otak ataupun patologi pada otak yang disebabkan oleh kekuatan (*force*) eksternal yang dapat terjadi di mana saja termasuk lalu lintas, rumah, tempat kerja, selama berolahraga, ataupun di medan perang (Manley dan Mass, 2013).

Traumatic Brain Injury (TBI) adalah cedera otak akut akibat energi mekanik terhadap kepala dari kekuatan eksternal. Identifikasi klinis TBI meliputi satu atau lebih kriteria berikut: bingung atau disorientasi, kehilangan kesadaran, amnesia pasca trauma, atau abnormalitas neurologi lain (tanda fokal neurologis, kejang, lesi intrakranial).

2. Etiologi

Etiologi dari trauma kepala dikategorikan menjadi cedera primer, yakni suatu cedera yang diakibatkan akibat benturan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian cedera sekunder yaitu cedera yang diakibatkan oleh cedera saraf melalui akson yang terjadi secara meluas, hipertensi intrakranial, hipoksia, hipotensi sistemik atau hiperkapnea yang merupakan rangkaian dari proses patologis sebagai tahapan lanjutan dari cedera kepala primer (Smeltzer dan Bare, 2015).

3. Klasifikasi

a. Klasifikasi berdasarkan GCS

Klasifikasi Derajat Keparahan TBI berdasarkan *Glasgow Coma Scale* (GCS) Berdasarkan derajat keparahannya dapat dibagi

menjadi : Ringan dengan GCS 13-15, durasi amnesia pasca trauma <24 jam. Sedang dengan GCS 9-12, durasi amnesia pasca trauma 1-6 hari, dan Berat dengan GCS 3-8, durasi amnesia pasca trauma 7 hari atau lebih (Young dan Mcnaught, 2011).

b. Klasifikasi patoanatomik

Menunjukkan lokasi atau ciri-ciri anatomis yang mengalami abnormalitas. Fungsi klasifikasi ini adalah untuk terapi yang tepat sasaran. Kebanyakan pasien dengan trauma yang parah akan memiliki lebih dari satu jenis perlukaan bila pasien diklasifikasikan menggunakan metode ini. Penilaian dilakukan dimulai dari bagian luar kepala hingga ke dalam untuk melihat tipe perlukaan yang terjadi dimulai dari laserasi dan kontusio kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan subaraknoid, kontusio dan laserasi otak, perdarahan intraparenkimal, perdarahan intraventrikular, dan kerusakan fokal maupun difus dari akson. Masing-masing dari entitas tersebut dapat dideskripsikan lebih jauh lagi meliputi seberapa luas kerusakan yang terjadi, lokasi, dan distribusinya (Saatman, dkk, 2008)

c. Klasifikasi berdasarkan mekanisme fisik

Cedera kepala dapat diklasifikasikan berdasarkan pada apakah kepala menabrak secara langsung suatu objek (*contact or "impact" loading*) ataupun otak yang bergerak di dalam tulang tengkorak (*noncontact or "inertial" loading*) dan akhirnya menimbulkan cedera. Arah dan kekerasan pada kedua tipe perlukaan tersebut dapat menentukan tipe dan keparahan suatu trauma.

Klasifikasi berdasarkan mekanisme fisik ini memiliki manfaat yang besar dalam mencegah terjadinya cedera kepala (Saatman, dkk, 2010).

4. Tipe - tipe *Traumatic Brain Injury*

- a. *Concussion*. yaitu cedera minor terhadap otak, penurunan kesadaran dengan durasi yang sangat singkat pasca trauma kepala.
- b. *Fraktur depressed* tulang kepala, terjadi ketika bagian tulang kepala yang patah atau retak menekan ke dalam jaringan otak.
- c. Fraktur *penetrating* tulang kepala, terjadi apabila terdapat benda yang menembus tulang kepala (contoh: peluru) menyebabkan cedera lokal dan terpisah pada jaringan otak.
- d. *Contusion*, memar pada otak akibat fraktur tulang kepala. Kontusio dapat berupa regio jaringan otak yang mengalami pembengkakan dan bercampur darah yang berasal dari pembuluh darah yang rusak. Hal ini juga dapat disebabkan oleh guncangan pada otak ke depan dan belakang (*contrecoup injury*) yang sering terjadi saat kecelakaan lalu lintas.
- e. *Diffuse axonal injury* atau shearing, melibatkan kerusakan pada sel saraf dan hilangnya hubungan antar neuron. Sehingga mampu menyebabkan kerusakan seluruh komunikasi antar neuron di otak.
- f. Hematoma, kerusakan pembuluh darah pada kepala. Tipe-tipe hematoma yaitu Epidural hematoma (EDH), perdarahan di antara tulang kepala dan dura. Subdural hematoma (SDH), perdarahan di antara dura dan membran araknoid, dan Intracerebral hematoma (ICH), perdarahan di dalam otak (Becker dkk., 2012).

5. Patofisiologi

a. Cedera Otak Primer

Secara umum, cedera otak primer menunjuk kepada kejadian yang tak terhindarkan dan disertai kerusakan parenkim yang terjadi sesaat setelah terjadi trauma (Saatman, dkk, 2008 dan Werner dan Engelhard, 2010). Cedera ini dapat berasal dari berbagai bentuk kekuatan seperti akselerasi, rotasi, kompresi, dan distensi sebagai akibat dari proses akselerasi dan deselerasi. Kekuatan-kekuatan ini menyebabkan tekanan pada tulang tengkorak yang dapat mempengaruhi neuron, glia, dan pembuluh darah dan selanjutnya menyebabkan kerusakan fokal, multifokal maupun difus pada otak. Cedera otak dapat melibatkan parenkim otak dan / atau pembuluh darah otak. Cedera pada parenkim dapat berupa kontusio, laserasi, ataupun *diffuse axonal injury* (DAI), sedangkan cedera pada pembuluh darah otak dapat berupa perdarahan epidural, subdural, subaraknoid, dan intraserebral yang dapat dilihat pada CT-scan (Indharty, 2012).

b. Cedera otak sekunder

Menunjuk kepada keadaan dimana kerusakan pada otak dapat dihindari setelah setelah proses trauma. Beberapa contoh gangguan sekunder ini adalah hipoksia, hipertensi, hiperkarbi, hiponatremi, dan kejang (Saatman, dkk, 2008). Menurut Indharty (2012), cedera otak sekunder merupakan lanjutan dari cedera otak primer. Hal ini dapat terjadi akibat adanya reaksi peradangan, biokimia, pengaruh neurotransmitter, gangguan autoregulasi, neuro-apoptosis, dan inokulasi bakteri. Faktor intrakranial (lokal) yang

mempengaruhi cedera otak sekunder adalah adanya hematoma intrakranial, iskemik otak akibat penurunan perfusi ke jaringan di otak, herniasi, penurunan tekanan arterial otak, tekanan intrakranial yang meningkat, demam, vasospasm, infeksi, dan kejang. Sebaliknya, faktor ekstrakranial (sistemik) yang mempengaruhi cedera otak sekunder dikenal dengan istilah “*nine deadly H's*” meliputi hipoksemia, hipotensi, hiperkapnia, hipokapnia, hipertermi, hiperglikemi dan hipoglikemi, hiponatremi, hipoproteinemia, serta hemostasis (Indharty, 2012).

6. Manifestasi Klinik

Gejala akut pada cedera otak traumatik yang lebih berat bermacam-macam namun pada umumnya cedera berat disertai penurunan kesadaran bahkan hingga koma. Menurut *American Congress of Rehabilitation Medicine* (ACRM), cedera otak traumatik ringan (*mild traumatic brain injury*) adalah pasien dengan gangguan fungsi fisiologis otak yang diakibatkan trauma dengan manifestasi minimal satu dari berikut ini :

- a. Penurunan kesadaran kurang dari 30 menit
- b. Hilang memori terhadap kejadian segera sebelum atau sesudah kejadian (*post traumatic amnesia*) kurang dari 24 jam
- c. Perubahan status mental saat kejadian (disorientasi atau kebingungan)
- d. Defisit neurologis fokal transien atau non transien
- e. Skor GCS 13-15 setelah 30 menit (Roozenbeek, 2013).

Setelah mengalami cedera otak traumatik, 30-80% pasien mengalami gejala setelah gegar otak (*post concussive*). Pada umumnya

membaik dalam beberapa jam hingga beberapa hari, sebagian lainnya dapat berminggu-minggu. Manifestasi klinis pada cedera otak traumatik ringan (*mild TBI*) terdiri dari kombinasi gejala fisik dan gejala neuropsikiatrik, antara lain:

- a. Gejala fisik berupa nyeri kepala, pusing, mual, *fatigue*, gangguan tidur, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau kejang bila terjadi kerusakan pada lobus temporal atau frontal, yang harus dibedakan dari epilepsi
- b. Gejala neuropsikiatrik yang terdiri dari gangguan kognitif, perilaku, dan gangguan lainnya.
- c. Gangguan kognitif, dapat berupa gangguan pemusatan perhatian, gangguan memori dan gangguan fungsi eksekutif. Gangguan pemusatan perhatian dapat berakibat pasien kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Luasnya gangguan kognitif berkorelasi dengan keparahan cedera.
- d. Gejala perilaku yaitu berhubungan dengan kepribadian pasien, antara lain iritabilitas, gangguan mood, agresi, impulsif, perilaku egois.
- e. Gejala lainnya yang berhubungan adalah depresi, gangguan cemas, dan *post traumatic stress disorder* (Lozano, 2015).

7. Pemeriksaan Penunjang

Pemberian pelayanan keperawatan terutama intervensi maka perlu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan baik secara medis ataupun kolaborasi antara lain :

1. Pemeriksaan laboratorium darah
 - a. Pemeriksaan kadar elektrolit, pada pasien koma sering ditemui hiponatremia akibat gangguan pengaturan hormon diuretik. Kadar

magnesium juga dapat menurun pada fase akut akibat proses eksitotoksik

- b. Pemeriksaan faktor koagulasi (aPTT, PT, trombosit), pasien orang tua mungkin sedang dalam pengobatan dengan antikoagulan. Pemeriksaan ini juga bermanfaat untuk menilai risiko perdarahan intrakrania
 - c. Kadar alkohol dalam darah, untuk menyingkirkan penyebab penurunan kesadaran atau disorientasi
2. Pemeriksaan Radiologi

CT-Scan kepala berperan penting dalam pencitraan cedera kepala. Namun pada pasien cedera otak traumatik ringan, kelainan pada CT-Scan yang spesifik tidak sering ditemukan. Kelainan pada gambaran CT-Scan lebih sering ditemukan pada cedera otak traumatik yang lebih berat. Oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan indikasi dilakukannya CT-Scan. Indikasi harus CT-Scan segera (Stippler, 2015):

- a. Tanda-tanda fraktur pada tulang tengkorak (basis kranii, depresi, atau fraktur terbuka)
- b. Kelainan pada pemeriksaan neurologis
- c. Serangan kejang
- d. Muntah lebih dari 1 kali
- e. Mekanisme trauma risiko tinggi (terlempar dari kendaraan, pejalan kaki ditabrak oleh kendaraan)
- f. Penurunan skor GCS atau skor GCS persisten kurang dari 15

Sedangkan indikasi pertimbangan perlu dilakukan CT-Scan (Stippler 2015):

- a. Usia lebih dari 60 tahun
- b. Amnesia anterograd persisten
- c. Amnesia retrograd lebih dari 30 menit

- d. Koagulopati
- e. Terjatuh lebih dari 1 meter
- f. Hilang kesadaran lebih dari 30 menit
- g. Faktor sosial (tidak dapat dianamnesis untuk riwayat yang jelas)

8. Penatalaksanaan

a. Penatalaksanaan Farmakologi

- 1) Pemberian analgetik untuk menurunkan derajat nyeri kepala akibat kecelakaan.
- 2) Pemberian antibiotik untuk mencegah terjadinya syok akibat bacteremia setelah pasien dirujuk di rumah sakit.
- 3) Penatalaksanaan pemberian cairan berupa ringer laktat untuk resusitasi pasien .
- 4) Pemberian transfusi darah jika Hb kurang dari 10g/dL.

b. Penatalaksanaan Nonfarmakologi

- 1) Pasien diberikan posisi *head up* 15-30⁰ untuk membantu menurunkan tekanan intrakranial dan memperbaiki sirkulasi serebral.
- 2) Memastikan jalan nafas pasien aman, berikan oksigen 100% yang cukup untuk menurunkan TIK.
- 3) Menghindari gerakan yang banyak dalam memanipulasi gerakan leher sebelum cedera servikal dapat disingkirkan dari kecurigaan (Pusbankes, 2018).

B. Konsep Keperawatan

Pemberian asuhan keperawatan merupakan proses terapeutik yang melibatkan hubungan kerjasama dengan klien, keluarga atau masyarakat untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Perawat memerlukan metode ilmiah dalam melakukan proses terapeutik tersebut yaitu proses keperawatan. Proses keperawatan dipakai untuk membantu perawat dalam melakukan praktek keperawatan secara sistematis dalam mengatasi masalah keperawatan yang ada,

dimana komponennya saling mempengaruhi satu sama lain yaitu : pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi dan evaluasi yang membentuk suatu mata rantai (Nursalam, 2017):

1. Pengkajian

a. *Primary Survey* (ABCDE)

1) *Airway*

- a) *Look* (lihat) apakah penderita mengalami agitasi atau kesadarannya menurun. Agitasi memberi kesan adanya hipoksia, dan penurunan kesadaran memberi kesan adanya hiperkarbia. Sianosis menunjukkan hipoksemia yang disebabkan oleh kurangnya oksigenasi dan dapat dilihat dengan melihat pada kuku-kuku dan kulit sekitar mulut. Lihat adanya retraksi dan penggunaan otot-otot napas tambahan yang apabila ada, merupakan bukti tambahan adanya gangguan airway. Airway (jalan napas) yaitu membersihkan jalan napas dengan memperhatikan kontrol servikal, pasang servikal kollar untuk immobilisasi servikal sampai terbukti tidak ada cedera servikal, bersihkan jalan napas dari segala sumbatan, benda asing, darah dari fraktur maksilofasial, gigi yang patah dan lain-lain. Lakukan intubasi (*orotracheal tube*) jika apnea, GCS (*Glasgow Coma Scale*) < 8, pertimbangan juga untuk GCS 9 dan 10 jika saturasi oksigen tidak mencapai 90%.
- b) *Listen* (dengar) adanya suara-suara abnormal. Pernapasan yang berbunyi (suara napas tambahan) adalah pernapasan yang tersumbat.

- c) *Feel* (raba)
- 2) *Breathing*. Tanda-tanda objektif-ventilasi yang tidak adekuat
- a) *Look* (lihat) naik turunnya dada yang simetris dan pergerakan dinding dada yang adekuat. Asimetris menunjukkan pembelatan (*splinting*) atau *flail chest* dan tiap pernapasan yang dilakukan dengan susah (*labored breathing*) sebaiknya harus dianggap sebagai ancaman terhadap oksigenasi penderita dan harus segera di evaluasi. Evaluasi tersebut meliputi inspeksi terhadap bentuk dan pergerakan dada, palpasi terhadap kelainan dinding dada yang mungkin mengganggu ventilasi, perkusi untuk menentukan adanya darah atau udara ke dalam paru.
 - b) *Listen* (dengar) adanya pergerakan udara pada kedua sisi dada. Penurunan atau tidak terdengarnya suara napas pada satu atau hemitoraks merupakan tanda akan adanya cedera dada. Hati-hati terhadap adanya laju pernapasan yang cepat-takipneu mungkin menunjukkan kekurangan oksigen.
 - c) Gunakan *pulse oxymeter*. Alat ini mampu memberikan informasi tentang saturasi oksigen dan perfusi perifer penderita, tetapi tidak memastikan adanya ventilasi yang adekuat
- 3) *Circulation* dengan kontrol perdarahan
- a) Respon awal tubuh terhadap perdarahan adalah takikardi untuk mempertahankan *cardiac output* walaupun stroke volum menurun.
 - b) Selanjutnya akan diikuti oleh penurunan tekanan nadi (tekanan sistolik-tekanan diastolik).
 - c) Jika aliran darah ke organ vital sudah dapat dipertahankan lagi, maka timbullah hipotensi.

- d) Perdarahan yang tampak dari luar harus segera dihentikan dengan balut tekan pada daerah tersebut
- e) Ingat, khusus untuk otorrhagia yang tidak membeku, jangan sumpal MAE (Meatus Akustikus Eksternus) dengan kapas atau kain kasa, biarkan cairan atau darah mengalir keluar, karena hal ini membantu mengurangi TTIK (Tekanan Tinggi Intra Kranial)
- f) Semua cairan yang diberikan harus dihangatkan untuk menghindari terjadinya koagulopati dan gangguan irama jantung.

4) *Disability*

- a) GCS setelah resusitasi
- b) Bentuk ukuran dan reflek cahaya pupil
- c) Nilai kuat motorik kiri dan kanan apakah ada paresis atau tidak

5) *Exposure* dengan menghindari hipotermia. Semua pakaian yang menutupi tubuh penderita harus dilepas agar tidak ada cedera terlewatkan selama pemeriksaan. Pemeriksaan bagian punggung harus dilakukan secara log-rolling dengan harus menghindari terjadinya hipotermi (*America College of Surgeons ; ATLS*).

b. Secondary Survey

1) Kepala dan leher

Kepala. Inspeksi (kesimetrisan muka dan tengkorak, warna dan distribusi rambut kulit kepala), palpasi (keadaan rambut, tengkorak, kulit kepala, massa, pembengkakan, nyeri tekan, fontanela (pada bayi). Leher. Inspeksi (bentuk kulit (warna, pembengkakan, jaringan parut, massa), tiroid), palpasi (kelenjar limfe, kelenjar tiroid, trakea), mobilitas leher.

2) Dada dan paru

Inspeksi. Dada diinspeksi terutama mengenai postur, bentuk dan kesimetrisan ekspansi serta keadaan kulit. Inspeksi dada dikerjakan

baik pada saat dada bergerak atau pada saat diem, terutama sewaktu dilakukan pengamatan pergerakan pernapasan. Pengamatan dada saat bergerak dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi, sifat dan ritme/irama pernapasan.

Palpasi. Dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan, massa, peradangan, kesimetrisan ekspansi, dan tactil vremitus (vibrasi yang dapat teraba yang dihantarkan melalui sistem bronkopulmonal selama seseorang berbicara).

Perkusi. Perhatikan adanya hipersonor atau "dull" yang menunjukkan udara (pneumotorak) atau cairan (hemotorak) yang terdapat pada rongga pleura. Auskultasi. Berguna untuk mengkaji aliran udara melalui batang trakeobronkeal dan untuk mengetahui adanya sumbatan aliran udara. Auskultasi juga berguna untuk mengkaji kondisi paru-paru dan rongga pleura.

3) Kardiovaskuler

Inspeksi dan palpasi. Area jantung diinspeksi dan palpasi secara simultan untuk mengetahui adanya ketidaknormalan denyutan atau dorongan (*heaves*). Palpasi dilakukan secara sistematis mengikuti struktur anatomi jantung mulai area aorta, area pulmonal, area trikuspidalis, area apikal dan area epigastrik.

Perkusi. Dilakukan untuk mengetahui ukuran dan bentuk jantung. Akan tetapi dengan adanya foto rontgen, maka perkusi pada area jantung jarang dilakukan karena gambaran jantung dapat dilihat pada hasil foto torak anteroposterior.

4) Ekstermitas

Beberapa keadaan dapat menimbulkan iskemik pada ekstremitas bersangkutan, antara lain :

- a) Cedera pembuluh darah.
- b) Fraktur di sekitar sendi lutut dan sendi siku.
- c) *Crush injury*.
- d) Sindroma kompartemen.
- e) Dislokasi sendi panggul.

Keadaan iskemik ini akan ditandai dengan :

- a) Pulsasi arteri tidak teraba.
- b) Pucat (*pallor*).
- c) Dingin (*coolness*).
- d) Hilangnya fungsi sensorik dan motorik.
- e) Kadang-kadang disertai hematoma, "bruit dan thrill".

Fiksasi fraktur khususnya pada penderita dengan cedera kepala sedapat mungkin dilaksanakan secepatnya. Sebab fiksasi yang tertunda dapat meningkatkan resiko ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrom) sampai 5 kali lipat. Fiksasi dini pada fraktur tulang panjang yang menyertai cedera kepala dapat menurunkan insidensi ARDS.

2. Diagnosis Keperawatan

Beberapa diagnosis yang mungkin muncul dari kasus *traumatic brain injury* yakni (SDKI, 2017):

- a. Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan edema serebral akibat cedera kepala
- b. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai
- c. Risiko infeksi

3. Intervensi (Rencana Asuhan Keperawatan)

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan edema serebral akibat cedera kepala	Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan perfusi serebral meningkat. Kriteria Hasil : 1. Tingkat Kesadaran cukup meningkat 2. Tekanan intrakranial cukup menurun 3. Tekanan darah sistolik dan diastolik cukup	Pengaturan Posisi Observasi: a. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi b. Monitor alat traksi agar selalu tepat Terapeutik: a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik b. Atur posisi yang meningkatkan drainase c. Tinggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30° d. Berikan bantal yang tepat pada leher	Observasi a. Untuk mengetahui kecepatan aliran oksigen b. Untuk menjaga kestabilan traksi Terapeutik a. Untuk menjaga kenyamanan pasien b. Untuk mengurangi TIK c. Melancarkan perfusi serebral ke otak d. Menstabilkan posisi

		<p>membalik</p> <p>4. Tekanan nadi cukup membaik</p>	<p>Edukasi</p> <p>a. Ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p>	<p>Edukasi</p> <p>a. Untuk menjaga drainase tetap stabil dan mencegah komplikasi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Untuk menurunkan TIK dan mempercepat proses pemulihan dan memengaruhi kesadaran pasien</p>
2	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan agen pencedera fisik</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik membaik</p> <p>Kriteria Hasil :</p> <p>1. Pergerakan ekstremitas cukup</p>	<p>Pembedaian (Skin Traksi)</p> <p>Observasi:</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan pembedaian</p> <p>b. Monitor bagian distal area cedera</p> <p>c. Identifikasi material bidai yang sesuai</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Tutup area fraktur dengan balutan</p>	<p>Observasi</p> <p>a. Untuk mengefektifkan tindakan bidai</p> <p>b. Untuk menjaga pulsasi, aliran kapiler</p> <p>c. Memberikan rasa nyaman</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Untuk mereposisi tulang</p>

		<p>membaik</p> <p>2. Gerakan tidak terkoordinasi cukup menurun</p>	<p>b. Minimalkan pergerakan pada area fraktur</p> <p>c. Berikan bantalan pada bidai</p> <p>d. Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian</p> <p>b. Ajarkan membatasi gerak pada area cedera</p>	<p>b. Mencegah pergeseran tulang</p> <p>c. Memberikan kenyamanan</p> <p>d. Mencegah perpindahan tulang yang telah direposisi</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Mengedukasi keluarga untuk pereposisian tulang</p> <p>b. Mengurangi nyeri dan mencegah sindrom kompartemen</p>
3	Risiko infeksi	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun.</p> <p>Kriteria hasil:</p> <p>1. Demam menurun</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Identifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme patogenik</p> <p>b. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Batasi jumlah pengunjung</p>	<p>Observasi</p> <p>a. Untuk melihat dan membantu menurunkan risiko terserang organisme patogenik</p> <p>b. Untuk mengetahui jika terjadi tanda dan gejala infeksi</p>

		<p>2. Kemerahan membaik</p> <p>3. Bengkak membaik</p> <p>4. Nyeri menurun</p>	<p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar</p>	<p>Terapeutik</p> <p>a. Memberikan ketenangan agar pasien beristirahat dan mengurangi kebisingan</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Memberikan informasi kepada pasien dan terhadap tanda dan gejala infeksi</p> <p>b. Untuk mengurangi terjadinya infeksi silang</p>
--	--	---	--	---

Tabel 2.1 Intervensi keperawatan secara teoritis

4. Implementasi

Implementasi keperawatan ialah proses pelaksanaan dari rencana atau intervensi keperawatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan ini dimulai setelah rencana intervensi disusun dan menjadi tujuan pada *nursing order* untuk membantu pasien dalam mencapai tujuan proses keperawatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, implementasi sebagai manifestasi pelaksanaan intervensi yang spesifik, dilakukan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan (Nursalam, 2017).

5. Evaluasi

Evaluasi adalah fase kelima dan fase terakhir proses keperawatan. Dalam konteks ini, evaluasi adalah aktivitas yang direncanakan, berkelanjutan, dan terarah ketika pasien dan profesional kesehatan menentukan kemajuan pasien menuju pencapaian tujuan/hasil, dan keefektifan rencana asuhan keperawatan. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan pada rencana keperawatan yang telah ditetapkan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan, dan mengambil keputusan apakah rencana keperawatan diteruskan, modifikasi atau dihentikan.

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses

keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Watson (2011) menjelaskan dalam *Theory of Human Care*, bahwasannya *caring* sebagai hubungan dan transaksi yang terbentuk antara pemberi dan penerima asuhan yang bertujuan untuk meningkatkan dan melindungi klien sebagai manusia (*human being*). Hubungan yang terbentuk ini wajib dipertanggungjawabkan secara professional. *Human caring* menjadi suatu seni, kemanusiaan, ilmu klinik, yang kemudian menjadi suatu hal yang penting dalam profesi keperawatan dan dalam proses penyembuhan. Perilaku *caring* tersebut diyakini mampu meningkatkan kesehatan pasien dan kesehateraanannya serta terdapat pula proses fasilitasi dalam rangka promosi kesehatan.

Proses realisasi *caring* terdiri atas komitmen dalam melindungi, meningkatkan dalam melindungi, meningkatkan dan memulihkan nilai humanitas dengan proses pengembalian martabat, keselarasan batin dan memfasilitasi penyembuhan. *Caring* dapat diartikan sebagai pemberian perhatian, penghargaan kepada manusia. Di sisi lain, *caring* dapat pula diartikan sebagai pemberian bantuan kepada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (Nursalam, 2017).

Teori *caring* yang dikemukakan oleh Jean Watson, menyebutkan bahwa *caring* merupakan suatu proses pendekatan mengenai cara dan proses berpikir, berperilaku dan berperasaan kepada orang lain. *Caring* memiliki tujuan untuk memberikan asuhan keperawatan fisik, memperhatikan sisi emosional, dan meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien (Watson, 2011).

Keterkaitan antara teori *caring* dan kasus cedera kepala yang diteliti oleh penulis ialah bahwasannya pasien yang mengalami cedera kepala yang dirawat di ruangan ICU, berada dalam keadaan koma dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya, serta termasuk ke dalam pasien dengan tingkat ketergantungan penuh kepada perawat (*total care*). Hal ini menyebabkan pentingnya teori *caring* untuk terus diaplikasikan kepada pasien ICU sebagai bentuk pemberian asuhan keperawatan profesional, baik secara fisik, emosional, maupun dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman pasien.

D. Evidence Based Nursing (EBN)

1. Pengertian *Head Up* 15-30⁰

Posisi *head up* 15-30⁰ ialah posisi yang diberikan pada pasien dengan cara menaikkan kepala dari tempat tidur dengan sudut perkiraan sebesar 15-30⁰ dan posisi tubuh dalam keadaan sejajar (Arif dan Atika, 2019).

2. Tujuan

- a. Meningkatkan sirkulasi dan perfusi serebral
- b. Meningkatkan sirkulasi oksigen ke jaringan otak
- c. Mengurangi nyeri akibat cedera kepala
- d. Menurunkan tekanan intrakranial pada pasien pasca cedera kepala
- e. Mempengaruhi tingkat kesadaran pasien cedera kepala (Arif dan Atika, 2019).

3. Indikasi

- a. Pasien yang mengalami cedera kepala ringan sampai berat
- b. Pasien pasca kraniotomi
- c. Pasien yang mengalami stroke hemoragik dan nonhemoragik (Arif dan Atika, 2019).

4. Kontraindikasi

- a. Pasien yang memiliki risiko aspirasi
- b. Pasien yang memiliki cedera servikal
- c. Pasien dengan MAP hipotensi < 70
- d. Pasien yang mengalami Takikardia > 150
- e. Pasien dengan stroke sirkulasi bagian posterior (*Health and Senior Service, 2021*).

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Prosedur kerja pengaturan posisi *head up* $15-30^0$ adalah sebagai berikut:

- a. Meletakkan posisi pasien dalam keadaan terlentang
- b. Mengatur posisi kepala lebih tinggi dan tubuh dalam keadaan datar
- c. Kaki dalam keadaan lurus dan tidak fleksi
- d. Mengatur ketinggian tempat tidur bagian atas setinggi $15-30^0$ (Arif dan Atika, 2019).

6. Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi pengaturan posisi *head up* $15-30^0$ adalah sebagai berikut:

- a. GCS dan kesadaran pasien meningkat
- b. Nadi dalam rentang normal
- c. Pernafasan membaik dan tidak ada masalah pernafasan yang muncul
- d. Saturasi oksigen 98-100%
- e. Nyeri kepala menurun (Arif dan Atika, 2019).

Pemberian intervensi *head up* $15-30^0$ merupakan salah satu intervensi keperawatan dan penatalaksanaan terapi nonfarmakologi untuk membantu mengatasi masalah akibat cedera kepala. Intervensi ini

merupakan salah satu usaha pengobatan yang dilakukan oleh perawat dalam rangka ikhtiar kepada Allah Ta'ala. Dalam hadits shahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rosulullah bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan seizin Allah ‘Azza wa Jalla”.

Syaikh Shafiyyurahman bin ‘Abdullah Al Mubarakfuri rahimahullah berkata ketika memaparkan mengenai hadits tersebut, maka dalam hadits ini terdapat dorongan untuk berobat dan mengambil sebab dan bahwasan yang demikian itu termasuk dari takdir Allah. Bahkan ia termasuk menuntut takdir-Nya jika ada keyakinan akan sembuh dengan izin Allah. Yakni seperti menolak lapar melalui makan dan haus melalui minum (Shafiyyurahma, 2019).

BAB III

LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

1. Identitas Klien

- a. Nama inisial klien : Tn. F
- b. Umur : 19 tahun
- c. Alamat : Parangloe
- d. Pekerjaan : Wiraswasta
- e. Agama : Islam
- f. Tanggal masuk RS : 05 April 2021 / pukul 21.00 WITA
- g. Nomor Rekam Medis : 391662
- h. Diagnosa Medis : *Traumatic Brain Injury*

2. Pengkajian Umum

- a. Keluhan utama klien masuk ICU : keluarga pasien mengatakan pasien mengalami post operasi kraniotomi akibat kecelakaan dan belum sadarkan diri.
- b. Riwayat penyakit sekarang : keluarga pasien mengatakan sebelum masuk ICU, pasien mengeluh sakit kepala, mual, dan sakit pada paha kanan akibat patah tulang dan sempat tidak sadarkan diri.
- c. Riwayat penyakit dahulu : keluarga pasien mengatakan pasien pernah mengalami operasi pengangkatan tumor pada tangan kanan saat SMP.

- d. Apakah klien pernah dirawat di rumah sakit: ibu pasien mengatakan bahwa pasien pernah dirawat di rumah sakit sebelumnya untuk pengangkatan tumor.
- e. Riwayat sosial : ibu pasien mengatakan bahwa pasien memiliki banyak teman dalam pergaulannya.
- f. Apakah klien merokok : Ya, ibu pasien mengatakan bahwa pasien merokok sekitar setengah bungkus dalam sehari.
- g. Riwayat penyakit keluarga : ibu pasien mengatakan bahwa ia mengalami DM dan mengonsumsi Metformin. Ayah pasien tidak memiliki riwayat penyakit yang serius.

3. Pengkajian 13 Domain NANDA

1. *Health promotion* : ibu pasien mengatakan jika pasien sakit, ia segera melapor ke orang tua untuk dibawa ke puskesmas.
2. Nutrisi : ketika sebelum sakit, ibu pasien mengatakan bahwa kadang pasien malas makan di rumah, tetapi diberi uang jajan untuk makan di luar. Saat sakit, ibu pasien mengatakan pasien diberi makan lewat selang. Pasien nampak diberi nutrisi melalui selang NGT dan cairan infus, disebabkan pasien tidak sadarkan diri.
3. Eliminasi : saat sebelum sakit, ibu pasien mengatakan BAB dan BAK pasien baik tanpa ada masalah. Saat sakit, pasien nampak terpasang popok kateter urin semenjak Senin, 05 April 2021, jam 12.00 WITA terpantau urin sebesar 500 cc.

4. Istirahat-tidur : sebelum saat, ibu pasien mengatakan tidur pasien sekitar 6-8 jam. Saat sakit, pasien belum bangun semenjak selesai operasi dengan EDH.
5. Persepsi/kognisi : tidak bisa dikaji, karena pasien tidak sadarkan diri.
6. Resepsi diri : tidak dapat dikaji.
7. Hubungan peran : ibu pasien mengatakan, pasien dekat dengan keluarga termasuk ibu yang paling dekat.
8. Seksualitas : tidak dapat dikaji
9. Koping : tidak dapat dikaji
10. Prinsip hidup : tidak dapat dikaji
11. Perlindungan : pasien nampak menggunakan bantal pada bagian kepala dan guling di bagian kiri bed dengan pengaman bed yang digunakan dan memakai selimut
12. Kenyamanan : pasien diberikan bed dan kondisi lingkungan nampak nyaman bagi pasien.
13. Pertumbuhan dan perkembangan : tidak ada kenaikan BB selama perawatan 4 hari di ICU.

4. Pemeriksaan Fisik Khusus

a. Airway

Airway terdengar bebas dan dilakukan suction apabila terdengar bunyi gurgling. Tidak nampak ada kejang.

b. Breathing

- a) Spontan : Tidak
- b) Takipnea (Nafas cepat) : Tidak
- c) Wheezing (mengi) : Tidak
- d) Apnea(henti nafas sementara) : Tidak
- e) Dispnea (susah nafas) : Ya, klien tidak bisa bernapas dengan spontan karena menggunakan ventilator untuk bernapas.
- f) Lain-lain : terukur pernafasan sebesar 15x/i pada tanggal 05 April 2021 pukul 12.00 WITA.

c. Circulation

- a) Nadi : tidak teratur, nadi pasien sebanyak 138x/i, cepat dan lemah.
- b) Kulit : nampak pucat dan teraba dingin.
- c) Perdarahan : Ya, terjadi perdarahan di kepala sebelum post op dan setelah post op terdapat drainase pada kepala dengan cairan sekitar 100 cc.
- d) Turgor : elastis
- e) CRT : < 2 detik

d. Disability

- a) GCS : E 1V1M1 (pasien koma) pada hari 1, 2, dan 3
- b) Kesadaran : pasien nampak koma
- c) Pupil : isokor (normal)
- d) Reflek cahaya : (+/-)

e) Motorik : hemiplegi (kelemahan)

f) Kekuatan otot : lemah

5. Pemeriksaan Fisik Umum (Kepala Dan Leher)

a. Bagian kepala atas

1) Hematom/post trauma : Ada, sebelum operasi

2) Tipe rambut : lurus dan sekarang nampak botak

3) Warna rambut : hitam

4) Alopesia : tidak nampak ada alopesia

b. Mata

1) Pupil isokor (diameter kedua pupil sama) : Tidak, mata kanan
edema akibat trauma kecelakaan

2) Sklera ikterik (kekuningan) : tidak ada

3) Conjunctiva anemis (pucat) : (+/+)

c. Telinga

1) Serumen : tidak

2) Terpasang alat bantu dengar : tidak

d. Malar / Pipi

1) Acne (jerawat) : tidak

e. Hidung

1) Nafas cuping hidung : tidak ada

2) Pilek : tidak ada

3) Terpasang alat bantu nafas : ya, terpasang
ventilator dengan pemberian oksigen 100%

4) Tipe : dewasa ukuran pemberian:10 L/menit.

f. Bibir dan Mulut

- 1) Sianosis : tidak ada
- 2) Sariawan : tidak ada
- 3) Gigi palsu : tidak ada
- 4) Mukosa bibir : nampak lembab
- 5) Gangguan gigi dan gusi : tidak ada.

g. Leher

- 1) Pembesaran kelenjar tiroid (gondok) : tidak ada
- 2) Limfonodi (kelenjar limfe) : teraba
- 3) Nadi karotis : teraba lemah

6. Pemeriksaan Fisik Umum (Thoraks)

a. Pre-kordium (lapisan luar dinding dada yang melindungi organ jantung)

- 1) Inspeksi : tidak nampak ada ictus kordis, tidak ada luka parut.
- 2) Palpasi : ictus cordis teraba pada ICS 4-5
- 3) Auskultasi : bunyi jantung terdengar, S1 dan S2
- 4) Perkusi : terdengar redup.

b. Pulmonal

- 1) Inspeksi
 - a) Retraksi (normalnya tidak ada): tidak ada retraksi
 - b) Simetris kanan dan kiri : Ya, simetris

c) Ekspansi dada kanan dan kiri sama : Ya

2) Palpasi

a) Krepitasi (suara retakan tulang) : tidak ada

b) Vocal fremitus kanan kiri sama : ya

3) Perkusi

a) Sonor (normal) : Ya

4) Auskultasi

a) Vesikuler (normal) : Ya

7. Pemeriksaan Fisik Umum (Abdomen)

a. Inspeksi

1) Datar : abdomen nampak datar

2) Bekas operasi : ada di bagian tangan

b. Auskultasi

1) Peristaltik : kesan ada, sekitar 10x/menit

c. Palpasi

1) Massa : tidak ada teraba massa

2) Turgor kulit : elastis

3) Nyeri tekan di lapang abdomen : tidak ada

d. Perkusi

1) Timpani : kesan positif

8. Pemeriksaan Fisik Umum (Ekstremitas)

a. Superior (atas):

1) Edema : terdapat edema pada kaki kanan

- 2) Infus
 - a) Terpasang : di lengan sinistra
 - b) Jenis infus : RL
 - c) Faktor tetesan : 20 tetes/menit
 - d) Nyeri di area tusukan infus : tidak ada
- 3) Nadi radialis (pergelangan tangan): 138x/menit
- 4) Palmar (telapak tangan) : nampak pucat dan dingin
- 5) Kekuatan otot : 3,3
- 6) CRT (*capillary refill time*) : < 2 detik.
- 7) Refleks fisiologis biseps/triseps : (+/+)
- 8) Deformitas (kelainan bentuk) : tidak ada
- 9) Fraktur : tidak ada

b. Inferior (bawah)

- 1) Edema : ada pada femur kanan akibat fraktur. Keluarga pasien mengatakan pasien terpasang bebat pada paha sudah 2 hari. Pasien nampak terpasang skin traksi.
- 2) Akral (bagian kaki paling bawah) : dingin
- 3) Kekuatan otot : 1,3
- 4) Refleks patela : (+/+)
- 5) Refleks patologis : (+/+)

9. Pengkajian Nutrisi

Hari/tanggal : Senin, 05 April 2021/pukul 12:00 WITA

a. A (Antropometri)

- 1) BB : 56 Kg
- 2) TB : 159 cm
- 3) IMT : 22,1 (Normal)

b. B (*Biochemical*)

Pasien anemia berdasarkan pemeriksaan darah tanggal 05 April 2021 dan HGB: 8,5 g/dL.

c. C (*Clinical*)

- 1) Rambut : Hitam, distribusi teratur
- 2) Turgor kulit : elastis
- 3) Mukosa bibir : nampak lembab
- 4) Conjunctiva : nampak anemis

d. D (*Diet*)

- 1) Makanan : Susu 100 cc setiap 1 kali pemberian dan diberikan 3 sehari

e. E (*Energy*)

Klien tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya berbaring di tempat tidur

f. F (*Factor*)

Keluarga pasien mengatakan klien mengalami kecelakaan kendaraan lalu lintas akibat ditabrak dan sekarang dirawat akibat post operasi TBI.

10. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan darah : 122/75 mmHg
- b. Suhu : 26.8 °C

c. Nadi : 138 x/i

d. Pernapasan : 15 x/i

11. Obat-obatan yang Digunakan

Nama obat	Jadwal Pemberian	Dosis	Jenis Pemberian
Ranitidin	12 jam	500 mg	IV
Manitol	8 jam	150 cc	IV
As. Tranexamat	12 jam	500 mg	IV
Paracetamol	12 jam	1 gr	IV
Cefotaxime	12 jam	1 gr	IV
Infus RL/KAEN 3B	24 jam	1500	IV
Fentanil	12 jam	25 mcg	IV
Thiopental	1 jam	12,5 cc	Suppositoria

Tabel 3.1 Obat-obatan yang diresepkan

Pemeriksaan Penunjang

1. Hasil pemeriksaan laboratorium

a. Darah rutin

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			
WBC	29.3	4.0-10.0	$10^3/uL$
LYM	8.9	0.6-3.5	$10^3/uL$
MON	6.6	0.1-0.9	$10^3/uL$
NEUT	84.5	50-80	%
*LYM	2.6	1.0-5.0	$10^3/uL$
*MON	1.9	0.1-1.0	$10^3/uL$
*NEUT	24.8	2-8	$10^3/uL$
RBC	4.54	3.50-5.50	$10^6/uL$
HGB	14.39	11.0-17.9	g/dL
HCT	40.4	40-50	%
MCV	89.0	80.0-96.0	fL
MCH	31.5	23.2-38.7	pg
MCHC	35.4	32-37	g/dL
RDW	43.5	10-16	fL
PLT	315	150-400	$10^3/uL$
MPV	8.2	7.0-11.0	fl
PDW	9.1	10.0-18.0	fl
P-LCR	12.9	11.9-66.9	%

Tabel 3.2 Hasil pemeriksaan penunjang

2. Pemeriksaan Foto Femur

- a. Fraktur 1/3 proximal femur dextra dengan *displaced*
- b. Fragmen distal fraktur ke lateral
- c. Mineralisasi tulang baik
- d. Celah sendi baik
- e. Jaringan lunak sekitar swelling

Kesan : fraktur 1/3 proximal femur dextra

3. Pemeriksaan kepala CT Scan

Kesan : Epidural hematoma



KLASIFIKASI DATA

Data Subjektif	Data Objektif
1. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak sadarkan diri	1. Pasien nampak koma
2. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa makan akibat belum sadarkan diri	2. GCS: E1V1M1
3. Keluarga pasien mengatakan pasien terpasang kateter	3. Pasien nampak hemiplegi, kekuatan otot: 3,3,1,3
4. Keluarga pasien mengatakan pasien belum bisa bergerak	4. Pasien nampak lemah
5. Keluarga pasien mengatakan pasien terpasang bebat pada paha sudah 2 hari.	5. Terpasang infus RL 20 tpm
6. Keluarga pasien mengatakan sebelum masuk di ICU, pasien mengeluh sakit kepala	6. Nampak terpasang kateter dengan volume urin 500 cc
	7. Pasien nampak terpasang skin traksi
	8. Pasien nampak diberi makan melalui selang NGT
	9. Terpasang drainase post op pada kepala pasien dengan volume sekitar 100 cc

Tabel 3.3 Klasifikasi data

ANALISIS DATA

No	Data	Etiologi	Masalah
1	DS: 1. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak sadarkan diri 2. Keluarga pasien mengatakan sebelum masuk di ICU, pasien mengeluh sakit kepala DO: 1. Pasien nampak koma 2. GCS: E1V1M1 3. Pasien nampak lemah	Agen pencedera fisik ↓ Kerusakan sawar otak ↓ Perdarahan ↓ Peningkatan TIK ↓ gangguan sirkulasi ke otak ↓ Risiko perfusi serebral tidak efektif	Risiko perfusi serebral tidak efektif
2	DS: 1. Keluarga pasien mengatakan pasien belum bisa bergerak 2. Keluarga pasien	Agen pencedera fisik ↓ Tulang tidak dapat menekan tekanan dari luar ↓	Gangguan mobilitas fisik

	<p>mengatakan pasien terpasang bebat pada paha sudah 2 hari</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak terpasang skin traksi 2. Pasien nampak hemiplegi, kekuatan otot: 3,3,1,3 	<p>terjadi kerusakan pada kompartabilitas tulang</p> <p>↓</p> <p>fraktur</p> <p>↓</p> <p>keterbatasan pergerakan</p> <p>↓</p> <p>Gangguan mobilitas fisik</p>	
3	<p>DS:</p> <p>a) Keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa makan akibat belum sadarkan diri</p> <p>DO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien nampak diberi makan melalui selang NGT 2. Terpasang infus RL 20 tpm 	<p>penurunan kesadaran</p> <p>↓</p> <p>gangguan sistem saraf vagus</p> <p>↓</p> <p>ketidakmampuan menelan</p> <p>↓</p> <p>Risiko defisit nutrisi</p>	<p>Risiko Defisit Nutrisi</p>
4	DS:	<p>Faktor resiko</p> <p>↓</p>	Risiko Infeksi

	<p>1. Keluarga pasien mengatakan pasien terpasang kateter</p> <p>DO:</p> <p>1. Nampak terpasang kateter dengan volume urin 500 cc</p> <p>2. Terpasang drainase post op pada kepala pasien dengan volume sekitar 100 cc</p>	<p>Tindakan medis</p> <p>↓</p> <p>Terjadi trauma pada jaringan</p> <p>↓</p> <p>Terputusnya kontinuitas jaringan</p> <p>↓</p> <p>Adanya luka post op</p> <p>↓</p> <p>Luka basah</p> <p>↓</p> <p>Pertahanan tubuh primer tidak adekuat</p> <p>↓</p> <p>Peningkatan leukosit</p> <p>↓</p> <p>Resiko infeksi</p>	
--	--	--	--

Tabel 3.4 Analisis data

DIAGNOSIS KEPERAWATAN

1. Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan edema serebral akibat cedera kepala ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien tidak sadarkan diri, pasien nampak koma dan GCS: E1V1M1.
2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien belum bisa bergerak, pasien nampak terpasang skin traksi, nampak hemiplegi, kekuatan otot: 3,3,1,3.
3. Risiko defisit nutrisi ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien tidak bisa makan akibat belum sadarkan diri dan pasien nampak diberi makan melalui selang NGT.
4. Risiko infeksi ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien terpasang kateter, pasien nampak terpasang kateter dengan volume urin 500 cc, terpasang drainase post op pada kepala pasien dengan volume sekitar 100 cc.



INTERVENSI KEPERAWATAN

Inisial Klien : Tn. F

No. Rm : 391662

Umur Klien : 19 tahun

Dx. Medis : *traumatic brain injury*

No	Diagnosa Keperawatan	Tujuan & Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Risiko perfusi serebral tidak efektif berhubungan dengan edema serebral akibat cedera kepala ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien tidak sadarkan diri, pasien nampak koma dan GCS:</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan perfusi serebral meningkat.</p> <p>Kriteria Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kesadaran cukup meningkat 2. Tekanan intrakranial cukup menurun 3. Tekanan darah 	<p>Pengaturan Posisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi b. Monitor alat traksi agar selalu tepat <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik b. Atur posisi yang meningkatkan drainase c. Tinggikan tempat tidur bagian 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui kecepatan aliran oksigen b. Untuk menjaga kestabilan traksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk menjaga nyaman pasien b. Untuk mengurangi TIK c. Melancarkan perfusi serebral ke otak d. Menstabilkan posisi

	E1V1M1.	<p>sistolik dan diastolik cukup membaik</p> <p>4. Tekanan nadi cukup membaik</p>	<p>kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>d. Berikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p>	<p>Edukasi</p> <p>a. Untuk menjaga drainase tetap stabil dan mencegah komplikasi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Untuk menurunkan TIK dan mempercepat proses pemulihan dan memengaruhi kesadaran pasien</p>
2	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan agen pencedera fisik ditandai dengan</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan mobilitas fisik membaik</p> <p>Kriteria Hasil :</p>	<p>Pembedaian (Skin Traksi)</p> <p>Observasi</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan pembedaian</p> <p>b. Monitor bagian distal area cedera</p> <p>c. Identifikasi material bidai yang sesuai</p>	<p>Observasi</p> <p>a. Untuk mengefektifkan tindakan bidai</p> <p>b. Untuk menjaga pulsasi, aliran kapiler</p> <p>c. Memberikan rasa nyaman</p>

	<p>keluarga pasien mengatakan pasien belum bisa bergerak, pasien nampak terpasang skin traksi, nampak hemiplegi, kekuatan otot: 3,3,1,3.</p>	<p>3. Pergerakan ekstremitas cukup membaik 4. Gerakan tidak terkoordinasi cukup menurun</p>	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Tutup area fraktur dengan balutan Minimalkan pergerakan pada area fraktur Berikan bantalan pada bidai Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian Ajarkan membatasi gerak pada area cedera 	<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mereposisi tulang Mencegah pergeseran tulang Memberikan kenyamanan Mencegah perpindahan tulang yang telah direposisi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengedukasi keluarga untuk pereposisian tulang Mengurangi nyeri dan mencegah sindrom kompartemen
3	<p>Risiko defisit nutrisi ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan status nutrisi membaik Kriteria Hasil :</p>	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi status nutrisi Monitor asupan makanan 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengetahui kebutuhan nutrisi pasien Memenuhi kebutuhan

	<p>tidak bisa makan akibat belum sadarkan diri dan pasien nampak diberi makan melalui selang NGT.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porsi makanan yang dihabiskan 2. Frekuensi makan cukup membaik 3. Membran mukosa cukup membaik 	<p>c. Monitor hasil lab</p> <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berikan makanan kaya akan kalori dan protein b. Berikan nutrisi melalui NGT <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anjurkan posisi semifowler b. Ajarkan keluarga diet yang diprogramkan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk kalori dan nutrisi yang dibutuhkan 	<p>pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Melihat kadar glukosa pasien <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan kalori dan protein harian b. Bila pasien tidak bisa menelan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ekspansi dada dan perfusi serebral dan memudahkan masuknya makanan b. Mengedukasi keluarga akan kebutuhan gizi <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memogramkan kebutuhan diet pasien
--	---	---	---	---

4	<p>Risiko infeksi ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien terpasang kateter, pasien nampak terpasang kateter dengan volume urin 500 cc, terpasang drainase post op pada kepala pasien dengan volume sekitar 100 cc.</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam glukosa derajat infeksi menurun.</p> <p>Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Demam menurun 6. Kemerahan membaik 7. Bengkak membaik 8. Nyeri menurun 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme patogenik b. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Batasi jumlah pengunjung <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk melihat dan membantu menurunkan risiko terserang organisme patogenik b. Untuk mengetahui jika terjadi tanda dan gejala infeksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan ketenangan agar pasien beristirahat dan mengurangi kebisingan <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi kepada pasien dan terhadap tanda dan gejala infeksi b. Untuk mengurangi terjadinya infeksi silang
---	---	---	---	--

Tabel 3.5 Intervensi kasus

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEPERAWATAN

Inisial Klien : Tn. F

No. Rm : 391662

Umur Klien : 19 tahun

Dx. Medis : *traumatic brain injury*

No	No. Diagnosis	Hari, Tgl/ Jam	Implementasi	Evaluasi	Nama Jelas
1	1	Senin, 05 April 2021 12.00 WITA	<p>Pengaturan Posisi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>Hasil: saturasi oksigen nampak 100% sebelum dan sesudah perubahan posisi.</p> <p>b. Memonitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Hasil: alat traksi terpasang dengan baik dan tepat</p>	<p>Senin, 05 April 2021, pukul 15.00 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan belum ada perubahan kesadaran pada pasien</p> <p>O:</p> <p>c. Pasien nampak masih koma</p> <p>d. GCS: E1V1M1</p> <p>e. TTV: TD: 122/75 mmHg, N: 140x/i, T: 36,9⁰ C, P: 15x/i, SpO2: 100%.</p> <p>f. Tekanan darah dalam batas normal</p> <p>g. Takikardi</p> <p>A: Masalah risiko perfusi serebral tidak efektif belum teratasi</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode</p>

	<p>12.00 WITA</p> <p>12.10 WITA</p> <p>12.30 WITA</p>	<p>Terapeutik</p> <p>c. Menempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>Hasil: pasien berada pada kasur yang terapeutik dengan pengaman bed</p> <p>d. Mengatur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>Hasil: pasien diposisikan semi fowler untuk melancarkan aliran drainase post operasi.</p> <p>c. Meninggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>Hasil: pasien diberikan intervensi <i>head up</i> 15-30⁰</p> <p>d. Memberikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Hasil: pasien diberikan bantalan pada leher dan untuk kenyamanan</p>	<p>P: Lanjutkan intervensi pengaturan posisi</p> <p>Observasi:</p> <p>c. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>d. Monitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Terapeutik:</p> <p>a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>c. Atur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>d. Tinggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>e. Berikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan</p>	<p>Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino</p>
--	---	---	--	--

		12.35 WITA	<p>Edukasi</p> <p>a. Mengajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Hasil: keluarga mengerti cara perubahan posisi yang baik</p>	posisi	Saputra
		12.40 WITA	<p>Kolaborasi</p> <p>e. Mengkolaborasikan pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p> <p>Hasil: pasien diberikan Manitol, cairan KAEN 3B 20 tpm, Ethanyl 500 mg/10 mL/IV, thiopental sodium 1 gr/ IV dengan kecepatan 10.00 mL/jam melalui <i>srynge pump</i></p>	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p>	
2	2	Senin, 05 April	<p>Pembidaian (Skin Traksi)</p> <p>Observasi</p>	<p>Senin, 05 April 2021, pukul 15.30 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan tidak ada</p>	La Ode

	<p>2021 13.00 WITA</p>	<p>a. Mengidentifikasi kebutuhan pembidaian Hasil: pembidaian dilakukan untuk mencegah pergeseran tulang</p> <p>b. Memonitor bagian distal area cedera Hasil: tidak ada tanda sindrom kompartemen</p> <p>c. Mengidentifikasi material bidai yang sesuai Hasil: pembidaian menggunakan material berupa perban elastis</p>	<p>pergerakan pada bagian kaki yang patah</p> <p>O:</p> <p>c. Nampak tidak ada sindrom kompartemen d. Pasien nampak terpasang skin traksi dengan beban 3 kg e. TTV: TD: 122/75 mmHg, N: 140x/i, T: 36,9⁰ C, P: 15x/i, SpO2: 100%.</p> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi skin traksi</p> <p>Pembidaian (Skin Traksi)</p> <p>Observasi:</p> <p>a. Identifikasi kebutuhan pembidaian b. Monitor bagian distal area cedera c. Identifikasi material bidai yang sesuai</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Menutup area fraktur dengan balutan Hasil: area fraktur nampak tertutup dengan balutan elastis</p> <p>b. Meminimalkan pergerakan pada area fraktur</p>	<p>Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
--	--------------------------------	--	--	---

	13.10 WITA	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>c. Memberikan bantalan pada bidai</p> <p>Hasil: bantalan yang diberikan berupa gips</p> <p>d. Menempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p>	<p>b. Minimalkan pergerakan pada area fraktur</p> <p>c. Berikan bantalan pada bidai</p> <p>d. Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian</p> <p>b. Ajarkan membatasi gerak pada area cedera</p>	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>Hasil: bantalan yang diberikan berupa gips</p> <p>Hasil: botol minuman seberat 3 kg nampak digantungkan pada traksi</p> <p>Hasil: keluarga nampak setuju dan mengerti tujuan pembidaian</p> <p>Hasil: pasien tidak banyak pergerakan karean masih dalam keadaan koma</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
	13.30 WITA	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>c. Memberikan bantalan pada bidai</p> <p>Hasil: bantalan yang diberikan berupa gips</p> <p>d. Menempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p>	<p>b. Minimalkan pergerakan pada area fraktur</p> <p>c. Berikan bantalan pada bidai</p> <p>d. Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian</p> <p>b. Ajarkan membatasi gerak pada area cedera</p>	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>Hasil: botol minuman seberat 3 kg nampak digantungkan pada traksi</p> <p>Hasil: keluarga nampak setuju dan mengerti tujuan pembidaian</p> <p>Hasil: pasien tidak banyak pergerakan karean masih dalam keadaan koma</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
	13.35 WITA	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>c. Memberikan bantalan pada bidai</p> <p>Hasil: bantalan yang diberikan berupa gips</p> <p>d. Menempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p>	<p>b. Minimalkan pergerakan pada area fraktur</p> <p>c. Berikan bantalan pada bidai</p> <p>d. Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian</p> <p>b. Ajarkan membatasi gerak pada area cedera</p>	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>Hasil: botol minuman seberat 3 kg nampak digantungkan pada traksi</p> <p>Hasil: keluarga nampak setuju dan mengerti tujuan pembidaian</p> <p>Hasil: pasien tidak banyak pergerakan karean masih dalam keadaan koma</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
	13.40 WITA	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>c. Memberikan bantalan pada bidai</p> <p>Hasil: bantalan yang diberikan berupa gips</p> <p>d. Menempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p>	<p>b. Minimalkan pergerakan pada area fraktur</p> <p>c. Berikan bantalan pada bidai</p> <p>d. Tempatkan botol sebagai beban pada ujung bidai</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tujuan dan langkah pembidaian</p> <p>b. Ajarkan membatasi gerak pada area cedera</p>	<p>Hasil: tampak pergerakan yang minimal pada area traksi</p> <p>Hasil: botol minuman seberat 3 kg nampak digantungkan pada traksi</p> <p>Hasil: keluarga nampak setuju dan mengerti tujuan pembidaian</p> <p>Hasil: pasien tidak banyak pergerakan karean masih dalam keadaan koma</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>

3	3	Rabu, 07 April 2021 21.00 WITA 21.05 WITA 21.10 WITA 21.30 WITA 21.35 WITA	<p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Mengidentifikasi status nutris</p> <p> Hasil: IMT: 22,1 (normal)</p> <p>b. Monitor asupan makanan</p> <p> Hasil: pasien diberikan diet susu tinggi kalori dan protein melalui NGT sebanyak 3x1 hari</p> <p>c. Monitor hasil lab</p> <p> Hasil: GDS: 123 mg/dL (kesan normal)</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Memberikan makanan kaya akan kalori dan protein</p> <p> Hasil: pasien diberikan diet susu untuk memenuhi nutrisi selama koma</p> <p>b. Memberikan nutrisi melalui NGT</p> <p> Hasil: pasien memperoleh asupan nutrisi melalui NGT</p>	<p>Kamis, 08 April 2021, pukul 08.00 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan pasien diberi makan melalui selang</p> <p>O: Pasien nampak diberikan susu melalui selang NGT sesuai jadwal, pagi ini pada pukul 06.00 WITA, frekuensi makan teratur, dan mukosa nampak membaik.</p> <p>A: Masalah risiko defisit nutrisi teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi pengaturan posisi</p> <p>Manajemen Nutrisi</p> <p>Observasi</p> <p>b. Identifikasi status nutrisi</p> <p>c. Monitor asupan makanan</p> <p>d. Monitor hasil lab</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Berikan makanan kaya akan kalori dan protein</p> <p>b. Berikan nutrisi melalui NGT</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
---	---	--	--	--	--

		21.40 WITA	<p>Edukasi</p> <p>a. Menganjurkan posisi semifowler</p> <p>Hasil: pasien berada dalam posisi semifowler</p>	<p>Edukasi</p> <p>a. Anjurkan posisi semifowler</p> <p>b. Ajarkan keluarga diet yang diprogramkan</p>	La Ode Agustino Saputra
		21.50 WITA	<p>b. Mengajarkan keluarga diet yang diprogramkan</p> <p>Hasil: keluarga sudah mulai mengetahui waktu pemberian makana bagi pasien selama 3x1 sehari</p>	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasikan dengan ahli gizi untuk kalori dan nutrisi yang dibutuhkan</p>	La Ode Agustino Saputra
		22.00 WITA	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Mengolaborasikan dengan ahli gizi untuk kalori dan nutrisi yang dibutuhkan</p> <p>Hasil: pasien diatur dietnya oleh ahli gizi</p>		
4	1	Rabu, 07 April 2021	<p>Pengaturan Posisi</p> <p>Observasi</p> <p>a. Memonitor status oksigenasi</p>	<p>Kamis, 08 April 2021, pukul 08.30 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan pasien belum sadarkan diri</p>	La Ode Agustino

	22.10 WITA	<p>sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>Hasil: saturasi oksigen nampak 100% sebelum dan sesudah perubahan posisi.</p> <p>b. Memonitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Hasil: alat traksi terpasang dengan baik dan tepat</p>	<p>O: Pasien nampak masih koma, nampak lemah, GCS: E1V1M1. TTV: TD: 106/62 mmHg, N: 102x/i, T: 37,9⁰ C, P: 11x/i, SpO2: 100%.</p> <p>A: Masalah risiko perfusi serebral tidak efektif belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi pengaturan posisi</p> <p>Observasi:</p> <p>a. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>b. Monitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Terapeutik:</p> <p>a. Menempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>Hasil: pasien berada pada kasur yang terapeutik dengan pengaman bed</p> <p>b. Mengatur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>Hasil: pasien diposisikan semi fowler untuk melancarkan aliran drainase post operasi.</p>	<p>O: Pasien nampak masih koma, nampak lemah, GCS: E1V1M1. TTV: TD: 106/62 mmHg, N: 102x/i, T: 37,9⁰ C, P: 11x/i, SpO2: 100%.</p> <p>A: Masalah risiko perfusi serebral tidak efektif belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi pengaturan posisi</p> <p>Observasi:</p> <p>a. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>b. Monitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Terapeutik:</p> <p>a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>b. Atur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>c. Tinggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>d. Berikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Edukasi</p>	<p>Saputra</p> <p>La Ode Agustino</p> <p>Saputra</p> <p>La Ode Agustino</p> <p>Saputra</p> <p>La Ode</p>
	22.20 WITA	<p>Terapeutik</p> <p>a. Menempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>Hasil: pasien berada pada kasur yang terapeutik dengan pengaman bed</p>	<p>b. Mengatur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>Hasil: pasien diposisikan semi fowler untuk melancarkan aliran drainase post operasi.</p>	<p>b. Monitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Terapeutik:</p> <p>a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>b. Atur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>c. Tinggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>d. Berikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Edukasi</p>	<p>Saputra</p> <p>La Ode Agustino</p> <p>Saputra</p> <p>La Ode</p>
	22.30 WITA	<p>Hasil: pasien diposisikan semi fowler untuk melancarkan aliran drainase post operasi.</p>			<p>Saputra</p> <p>La Ode</p>

	22.32 WITA	<p>c. Meninggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>Hasil: pasien diberikan intervensi <i>head up</i> 15-30⁰</p>	<p>a. Ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p>	Agustino Saputra
	22.35 WITA	<p>d. Memberikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Hasil: pasien diberikan bantalan pada leher dan untuk kenyamanan</p>	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p>	La Ode Agustino Saputra
	22.40 WITA	<p>Edukasi</p> <p>a. Mengajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Hasil: keluarga mengerti cara perubahan posisi yang baik</p>		
	22. 45 WITA	<p>Kolaborasi</p> <p>a. Mengolaborasikan pemberian premedikasi sebelum melakukan</p>		

			<p>perubahan posisi</p> <p>Hasil: pasien diberikan ceftriaxone terjadwal pukul 24.00 WITA/IV, asam tranexamat terjadwal pukul 04.00 WITA/IV dan Paracetamol terjadwal pukul 24.00 WITA/IV dan 06.00 WITA/IV</p>		
5	4	<p>Kamis, 08 April 2021 22.00 WITA</p> <p>22.10 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <p>c. Mengidentifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme patogenik</p> <p>Hasil : luka post op bagian kepala akibat kraniotomi rentan untuk mengalami risiko infeksi dan selang kateter yang terpasang pada uretra pasien juga rentan untuk infeksi</p> <p>d. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p>	<p>Jumat, 09 April 2021, pukul 08.00 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan tidak ada tanda-tanda infeksi</p> <p>O: tampak tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada edema.</p> <p>A: Masalah risiko infeksi teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi pengaturan posisi</p> <p>Pencegahan Infeksi Observasi</p> <p>c. Identifikasi dan menurunkan risiko</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p> <p>La Ode</p>


			<p>Hasil : sejauh pengamatan, pasien belum ada gejala dan tanda infeksi</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Membatasi jumlah pengunjung</p> <p>Hasil: pengunjung sangat dibatasi untuk masuk ke ruangan ICU, hanya 1 orang yang boleh menjaga</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>Hasil: keluarga mengerti bagaimana apabila terjadi infeksi</p> <p>b. Mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar</p> <p>Hasil: keluarga pasien mengerti dan selalu mencuci tangan dengan handrub apabila masuk ke ruangan ICU</p>	<p>terserang organisme patogenik</p> <p>d. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>Terapeutik</p> <p>a. Batasi jumlah pengunjung</p> <p>Edukasi</p> <p>a. Jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>b. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar</p>	<p>Agustino Saputra</p> <p>La Ode Agustino Saputra</p>
6	1	Kamis, 08 April	<p>Pengaturan Posisi</p> <p>Observasi</p>	<p>Jumat, 09 April 2021, pukul 08.00 WITA</p> <p>S: Keluarga pasien mengatakan pasien telah</p>	<p>La Ode</p>

	2021 22.00 WITA	<p>a. Memonitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>Hasil: saturasi oksigen nampak 100% sebelum dan sesudah perubahan posisi.</p>	<p>sadar</p> <p>O: Pasien nampak sudah sadar, GCS: E4V4M5, TTV: TD: 105/61 mmHg, N: 67x/i, T: 36,5⁰ C, P: 20x/i, SpO2: 100%, nadi membaik, tekanan darah kesan normal, dan pernafasan dalam kesan normal.</p>	<p>Agustino Saputra</p>
	22.07 WITA	<p>b. Memonitor alat traksi agar selalu tepat</p> <p>Hasil: alat traksi terpasang dengan baik dan tepat</p>	<p>A: Masalah risiko perfusi serebral tidak efektif teratasi</p> <p>P: Pertahankan intervensi pengaturan posisi</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p>
	22.10 WITA	<p>Terapeutik</p> <p>a. Menempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>Hasil: pasien berada pada kasur yang terapeutik dengan pengaman bed</p>	<p>Observasi:</p> <p>a. Monitor status oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi</p> <p>b. Monitor alat traksi agar selalu tepat</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p>
	22.30 WITA	<p>b. Mengatur posisi yang meningkatkan drainase</p> <p>Hasil: pasien diposisikan semi</p>	<p>Terapeutik</p> <p>a. Tempatkan pada matras atau tempat tidur yang terapeutik</p> <p>b. Atur posisi yang meningkatkan</p>	

		22.35 WITA	<p>fowler untuk melancarkan aliran drainase post operasi.</p> <p>c. Meninggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>Hasil: pasien diberikan intervensi <i>head up</i> 15-30⁰</p>	<p>drainase</p> <p>c. Tinggikan tempat tidur bagian kepala sekitar 15-30⁰</p> <p>d. Berikan bantal yang tepat pada leher</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p>
		22.40 WITA	<p>d. Memberikan bantal yang tepat pada leher</p> <p>Hasil: pasien diberikan bantalan pada leher dan untuk kenyamanan</p>	<p>Edukasi</p> <p>b. Ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Kolaborasi</p> <p>a. Kolaborasi pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi</p>	<p>La Ode Agustino Saputra</p>
		23.00 WITA	<p>Edukasi</p> <p>a. Mengajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi</p> <p>Hasil: keluarga mengerti cara perubahan posisi yang baik</p>		
		23.10	Kolaborasi		

		WITA	a. Mengolaborasikan pemberian premedikasi sebelum melakukan perubahan posisi Hasil: pasien diberikan Manitol/IV		
--	--	------	--	--	--

Tabel 3.6 Implementasi dan evaluasi kasus



BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Pasien atas nama Tn.F, berusia 19 tahun, mengalami *traumatic brain injury* disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor. Pasien sebelumnya ialah pasien rujukan dari rumah sakit Syekh Yusuf, dan dirawat beberapa jam sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit Labuang Baji Makassar. Pasien mempunyai riwayat pernah dirawat di rumah sakit akibat operasi pengangkatan tumor di tangan saat pasien masih duduk di SMP. Pasien memiliki riwayat merokok.

Kasus *traumatic brain injury*, secara teori yang menjadi penyebab terbesar ialah kecelakaan lalu lintas. Hal ini didukung dengan pernyataan dari penelitian yang dipublikasikan oleh Riyadina (2016) yang menyatakan bahwa penyebab trauma kepala ialah akibat kecelakaan lalu lintas. Sejalan dengan hal tersebut, Salim (2015) juga menyatakan bahwa trauma kepala sangat banyak ditemukan di negara berkembang secara khusus yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas, dan sangat berisiko untuk menimbulkan kecacatan permanen sampai berakhir pada kematian. Trauma kepala tersebut biasanya diakibatkan oleh pengendara kendaraan bermotor tidak mengenakan pengaman atau helm yang merupakan salah satu kesalahan pengendara. Kondisi ini telah disampaikan dalam Al-Qur'an As-Syu'ara: 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

“Dan setiap apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu)”.

Proses pengkajian yang dilakukan pada pasien, maka diperoleh bahwa tanda dan gejala utama yang nampak pada pasien ialah gangguan perfusi serebral ditandai dengan ditandai dengan keluarga pasien mengatakan pasien tidak sadarkan diri, pasien nampak koma dan GCS: E1V1M1, hasil CT Scan sebelum dirawat di ruangan ICU menunjukkan adanya EDH pada kepala sehingga ditindaklanjuti dengan penatalaksanaan kraniotomi. Gangguan perfusi serebral ialah proses penurunan kadar oksigen akibat dari kegagalan dalam memelihara jaringan di tingkat kapiler (Saputro, 2010). Risiko perfusi jaringan otak tidak efektif ialah risiko gangguan otak yang berakibat pada penurunan sirkulasi otak yang mempengaruhi Tekanan Intrakranial (TIK), kesadaran dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, gejala lain yang menyertai adalah adanya aliran darah arteri yang mengalami perlambatan, reduksi mekanis dari aliran arteri atau vena, kerusakan proses transportasi oksigen yang melewati kapiler atau alveolar (Herdman, 2014).

Diagnosis utama yang muncul pada kasus ini adalah risiko gangguan perfusi serebra tidak efektif. Masalah ini ditemukan pada hari pertama sampai hari keempat saat pasien dirawat di ruangan ICU rumah sakit Labuang Baji Makassar. Risiko gangguan perfusi serebral tidak efektif ialah suatu kondisi di mana pasien mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Faktor risiko dan kondisi tekini sendiri ialah cedera kepala. Kondisi aktual pasien ialah masih dalam kondisi koma (Pertami, Sulistyawati, 2019).

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama atau intervensi yang dilakukan pada diagnosis keperawatan risiko perfusi serebral tidak efektif ialah pengaturan posisi. Studi yang dilakukan oleh Pertami, Sulastyawati, dan Anami (2017) menyatakan bahwasannya posisi *head up* 15-30⁰ memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perfusi serebral, perubahan tekanan intrakranial, khususnya tingkat kesadaran, dan tekanan arteri rata-rata pada pasien dengan cedera kepala. Tindakan *head up* 15-30⁰ ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan sirkulasi oksigen di jaringan otak, sehingga akan mencegah terjadinya hipoksia, kemudian berpengaruh pada kestabilan tekanan intrakranial dalam batasan yang normal. Selanjutnya, posisi ini dinyatakan lebih efektif untuk mempertahankan tingkat kesadaran karena sangat sesuai dengan posisi anatomis manusia yang kemudian memengaruhi kondisi hemodinamik pasien yang mengalami cedera kepala (Battica, 2010).

Pada kasus yang ditangani oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa pasien memiliki beberapa tanda dan gejala akan adanya gangguan perfusi serebral yang mempengaruhi kesadaran pasien, seperti pasien tidak sadarkan diri, nadi teraba cepat, tekanan darah tidak stabil pada hari 1-4 selama perawatan di ruangan ICU.

Implementasi	Tanda-Tanda Vital						
	Evaluasi pukul	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Pernafasan	SpO2	GCS
Hari ke-1	15.00 WITA	122/75 mmHg	140x/i	26,9 ⁰ C	15x/i	100%	E1V1M1
Hari ke-3	08.30 WITA	106/62 mmHg	102x/i	37,9 ⁰ C	11x/i	100%	E1V1M1
Hari ke-5	08.00 WITA	105/61 mmHg	67x/i	36,5 ⁰ C	20x/i	100%	E4V4M5

Tabel 4.1 Hasil implementasi selama perawatan

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa setelah dilakukan implementasi *head up*, maka diperoleh TTV yang nampak berupa, TD: 122/75 mmHg, N: 140x/i, T: 26,9⁰ C, P: 15x/i, SpO2: 100% pada evaluasi setelah melakukan implementasi tindakan keperawatan pasien di hari pertama perawatan, di pukul 15.00 WITA. Berselang ke hari ketiga perawatan, maka proses implementasi yang dilanjutkan untuk pemberian *head up* 15-30⁰, diperoleh evaluasi pada pukul 08.30 WITA bahwasannya GCS: E1V1M1. TTV: TD: 106/62 mmHg, N: 102x/i, T: 37,9⁰ C, P: 11x/i, SpO2: 100%. Pada hari kelima perawatan diperoleh hasil evaluasi pada pukul 08.00 WITA, GCS: E4V4M5, TTV: TD: 105/61 mmHg, N: 67x/i, T: 36,5⁰ C, P: 20x/i, SpO2: 100%, nadi membaik, tekanan darah kesan normal, dan pernafasan dalam kesan normal. Hal ini menandakan bahwa *head up* 15-30⁰ efektif untuk mengatasi masalah risiko perfusi serebral tidak efektif.

Studi lain yang sejalan dengan pernyataan mengenai efektifitas posisi *head up* 15-30⁰ ini adalah didukung oleh penelitian yang telah dipublikasikan oleh March, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pemberian posisi *head up* pada pasien yang mengalami cedera kepala bertujuan untuk memberikan perbaikan sirkulasi oksigen ke jaringan otak. Dengan adanya suplai oksigen yang tercukupi, maka akan meningkatkan rasa nyaman pasien dan mencegah terjadinya ketidakefektifan perfusi jaringan serebral. *Head up* 15-30⁰ akan memberikan pengaruh pada perfusi jaringan serebral dengan cara memperbaiki drainase vena, perfusi serebral dan menurunkan tekanan intrakranial.

Elevasi kepala *head up* 15-30⁰ dapat melancarkan perfusi serebral dan menurunkan tekanan intrakranial melalui beberapa mekanisme, yakni menurunkan tekanan darah, perubahan ventilasi, meningkatkan aliran vena melalui vena jugularis yang tak berkatup, sehingga menurunkan volume darah vena sentral yang menurunkan tekanan intrakranial. Perpindahan CSS dari kompartemen intrakranial ke rongga subarachnoid spinal dapat menurunkan tekanan intrakranial dan memperbaiki perfusi serebral (Safar, dkk, 2018). Hal ini didukung pula oleh penelitian (Ginting, Sitepu, 2019) yang menyebutkan bahwa pemberian *head up* 15-30⁰ dapat meningkatkan aliran vena melalui vena jugular tak berkatup sehingga aliran perfusi serebral dan oksigen dapat secara adekuat sampai ke otak dan berdampak pada kesadaran pasien cedera kepala dari yang ringan sampai berat.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Beberapa intervensi yang dilakukan selain implementasi utama pemberian *head up* 15-30⁰ ialah pemberian oksigen dengan konsentrasi tinggi dan pengaturan diet yang seimbang. Pemberian oksigen 100% dalam jangka pendek untuk tujuan resusitasi otak dapat dilakukan. Pasien dengan cedera kepala membutuhkan oksigen untuk meningkatkan kesadaran. Penurunan kesadaran disebabkan oleh gangguan sentral otak dan batang otak. Otak merupakan organ yang amat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Otak masih mampu untuk menoleransi kekurangan oksigen berlangsung dari 5 menit, lebih dari 5 menit dapat terjadi kerusakan otak secara permanen. Oksigen sesuai dengan kebutuhan target saturasi >92% (Ginting, Sitepu, 2019).

Penatalaksanaan pemberian oksigen pada pasien cedera kepala menggunakan *rebreathing mask* dan *simple mask* yang diberikan dengan volume 8-10 liter/menit dengan saturasi 95-100% (Pertami, Sulistyawati, 2019). Indikasi pemberian oksigen juga ini disebabkan oleh hipoksia. Pemberian oksigen ialah teknik yang paling sering dilakukan medis untuk keberlangsungan hidup pasien (Ginting, Sitepu, 2019). Kombinasi antara pemberian *head up* 15-30⁰ dan oksigenasi pada pasien cedera kepala mampu meningkatkan aliran vena jugularis sehingga oksigen dapat adekuat sampai ke otak dan berdampak pada peningkatan kesadaran dan peningkatan perfusi serebral. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Oktavianus (2014) yang menyatakan bahwa penanganan cedera kepala harus dilakukam dengan benar dan tepat, dengan cara pemberian oksigen yang adekuat dan *head up* 15-30⁰. Hal ini sesuai dengan kenyataan pada kasus, bahwa pasien Tn. F

yang dirawat di ruangan ICU, diberikan intervensi *head up* 15-30⁰ dan oksigenasi dengan saturasi oksigen 100%.

Adapun untuk pengaturan diet gizi yang seimbang, maka pasien dengan cedera kepala, harus diberikan diet tinggi kalori dan tinggi protein dan asupan vitamin serta mineral yang mencukupi kebutuhan demi kesembuhan dan kebugaran kembali pasien (Ginting, Sitepu, 2019). Namun, hal tersebut harus teratur dan tidak boleh berlebihan. Konsep dalam pengaturan pola makan dan pemilihan makanan yang diatur dalam dalam Al-Qur'an ialah makanan yang halal lagi baik.

Allah berfirman dalam Suroh Al-Baqoroh: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu (Kemenag, 2017).

Dalam hal pemberian nikmat, Allah menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala hal yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan Allah juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan setan, dalam tindakan-tindakannya yang menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahirah, saibah, dan washilah, dan lain-lainnya yang ditanamkan setan kepada mereka pada masa Jahiliyah (Harun, et al., 2017).

Keterkaitan dalil dengan penelitian ini ialah seorang individu dalam pemenuhan kebutuhan makan dan minum, maka hendaknya memilih makanan yang baik dan tidak membahayakan bagi tubuh, khususnya. Makanan yang baik lagi halal artinya makanan yang dari segi zatnya adalah halal, tidak mengandung najis, serta tidak membahayakan.

Intervensi yang diberikan pada pasien cedera kepala bertujuan pula untuk memberikan manfaat dan menolak mudharat. Lebih lanjut, pengertian tersebut dipahami bahwa al-maqasid dan al-mashlahah. Kemashlahatan bemuara pada pencapaian sebuah nilai manfaat (kebaikan) dan penolakan kepada segala bentuk kemudharatan (Arsyad, 2020).

Evaluasi dari berbagai implementasi dan dua implementasi unggulan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil bahwa pasien mengalami perbaikan TTV selama perawatan 5 hari dengan pemberian *head up* 15-30⁰ dan oksigenasi dengan saturasi 100%. Rencana tindak lanjut pada keluarga untuk mengatur perawatan saat perawat tidak di tempat ialah keluarga tetap memberikan *head up* 15-30⁰ saat perawatan berlanjut, selama pasien terpasang drainase kepala dan mempertahankan diet seimbang pasien dengan cara mulai memberikan intake secara oral dengan arahan dari gizi. Di samping itu, rencana tindak lanjut dari Tn.F ialah kolaborasi pelaksanaan operasi ORIF (*Open Reduction Internal Fixation*) untuk mengatasi masalah gangguan imobilitas fisik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi *head up* 15-30⁰ terhadap perfusi serebral pada pasien *Traumatic Brain Injury*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Gambaran hasil pengkajian pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury* ialah pasien mengalami gangguan kesadaran (koma), GCS: E1M1V1, gangguan perfusi serebral, dan fraktur pada ekstremitas kanan.
2. Diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury* ialah risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, risiko defisit nutrisi dan risiko infeksi.
3. Gambaran setelah pemberian intervensi *head up* 15 – 30⁰ terhadap kesadaran pada pasien *traumatic brain injury* ialah pasien mengalami perbaikan perfusi serebral yang ditandai dengan peningkatan kesadaran.
4. Implementasi keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury* ialah pengaturan posisi, skin traksi, manajemen nutrisi dan pencegahan infeksi.
5. Evaluasi keperawatan pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury* ialah masalah risiko perfusi jaringan serebral tidak efektif teratasi, gangguan mobilitas fisik belum teratasi, risiko defisit nutrisi teratasi dan risiko infeksi teratasi.
6. Hasil analisis intervensi *head up* 15-30⁰ pada pasien yang mengalami *traumatic brain injury* ialah pasien mengalami perubahan dan perbaikan pada perfusi serebral karena pemberian intervensi *head up* 15-30⁰, yang efektif dalam meningkatkan kesadaran pasien selama perawatan.

B. Saran

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan mengenai intervensi *head up 15-30⁰* terhadap perfusi serebral pada pasien *Traumatic Brain Injury*, terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam mengembangkan hasil penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Penelitian dan Institusi Pendidikan

Melalui hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi peneliti di kemudian hari dapat lebih mengkaji mengenai frekuensi dan durasi yang paling tepat dalam memberikan intervensi ini. Peneliti diharapkan dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai khazanah untuk memperkaya informasi dan mendukung teori dan fakta berdasarkan *evidence based practice* yang telah tertera di dalamnya.

Selain itu, hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman, serta dapat memberikan deskripsi ataupun gambaran bagi institusi pendidikan tentang efektivitas intervensi *head up 15-30⁰* terhadap perfusi serebral pada pasien *traumatic brain injury*.

2. Bagi Pelayanan Keperawatan

Melalui hasil penelitian ini, maka diharapkan pelayanan keperawatan dapat memanfaatkan intervensi *head up 15-30⁰* terhadap perfusi serebral pada pasien *traumatic brain injury* dalam mengaplikasikan asuhan keperawatan kepada pasien.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat yang mendapatkan masalah cedera kepala, maka diharapkan dapat segera memberikan intervensi *head up 15-30⁰*

terhadap perfusi serebral dalam memberikan tindakan dan inisiasi dini demi pencegahan kerusakan lebih lanjut pada pasien dengan cedera kepala.



KEPUSTAKAAN

- Aisyah Arsyad. (2020). *Fikih Gender Berbasis Maqasid As-Syariah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Arif Hendra Kusuma, A. D. A. (2019). Pengaruh Posisi Head Up 30 Derajat Terhadap Nyeri Kepala Pada Pasien Cedera Kepala Ringan. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 10(2), 417–422.
- Basyir, et al. (2016). *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Darul Haq.
- Cotrand, K. and. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Ginting, Sitepu, G. (2019). Pengaruh Pemberian Oksigen dan Elevasi Kepala 30 Derajat Terhadap Tingkat Kesadaran pada Pasien Cedera Kepala Sedang. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (JKF)*, 2(2).
- Harun, et al. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Harun Rosjidi, & Nurhidayat. (2014). *Buku Ajar Peningkatan Tekanan Intrakranial & Gangguan Peredaran Darah Otak*.
- Health and Senior Service. (2021). What are contraindications to HOB elevation to 30 degrees or greater?
- Kemenag. (2017). *Al-Qur'an Hafalan Mudah: Terjemahan dan Tajwid Warna*. Jakarta: Kementerian Agama republik Indonesia.
- Kemenkes. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Retrieved from https://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/materi_rakorpop_2018/Hasil_Riskesdas_2018.pdf. Diakses tanggal 17 November 2019
- Lumbantoruan & Nazmudin. (2015). *BTCLS dan Disaster Management*. Tangerang Selatan: Medhatama Restyan.
- Nursalam. (2017). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pertami, Sulistyawati, A. (2019). Effect Of 30° Head-Up Position On Intracranial Pressure Change In Patients With Head Injury In Surgical Ward Of General Hospital Of Dr. R. Soedarsono Pasuruan. *Public Health of Indone*, 3(3).
- Pusbanks, T. (2018). *Penatalaksanaan Penyakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Safar, dkk. (n.d.). *Brain Monitoring and Homeostatis in Comatse, 111 Patients*. New York: In H.Ed Critical Care Medicine.
- Salim. (2015). *Sistem Penilaian Trauma*. Jakarta: Cermin Dunia Kedokteran.

- Satyanegara. (2010). *Ilmu Bedah Saraf*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shafiyurahma. (2019). *Minnatul Mun'im syarh Shahih Muslim*.
- Smeltzer dan Bare. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal-Bedah Brunner &Suddarth. Vol. 2*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Soemarmo. (2018). *Neurologi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Watson. (2011). *Nursing Theory*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.





LAMPIRAN 1

PATHWAY



Resiko infeksi

LAMPIRAN 2
JURNAL RUJUKAN



Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

File Edit View Sign Window Help

Home Tools Panduan Penulisan ... @1 artikel.pdf @3 artikel.pdf @2 artikel.pdf Sign In

Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF) • p-ISSN 2425-0630
Vol. 2 No. 2 (September 2019) - April 2020
<https://ejournal.uin-makassar.ac.id/2019/ajka/2019>
Received: 11 October 2018 - Accepted: 23 April 2019 - Published: 30 April 2019

PENGARUH PEMBERIAN OKSIGEN DAN ELEVASI KEPALA 30° TERHADAP TINGKAT KESADARAN PADA PASIEN CEDERA KEPALA SEDANG

Luci Riani Br. Ginting¹, Kusit Sitepu², Renni Ariana Ginting³

INSTITUT KESEHATAN MEDIISTRA LUBUK PAKAM
JALAN SUDIRMAN NOMOR 38 LUBUK PAKAM.
e-mail: ksitepu3@gmail.com
DOI : <https://doi.org/10.35451/jkf.v2i2.319>

Abstract
Head injury is directly or indirectly mechanical injuries that resulted wound in the scalp, skull fracture, tear the lining of the brain, and brain damage, and neurological disorders. The basic method for brain protection of head injury patients are freeing the airway and giving adequate oxygenation. Giving oxygen and heady elevation 30° of head are the appropriate action for the moderate head injury classification to launch the cerebral oxygen perfusion and to increase consciousness level. The purpose of this research were to determine the GCS before and after giving oxygenation with and position 30° of head and to analyze the effect of giving oxygen and heady elevation 30° of head to change the levels of consciousness of moderate head injury patients. This research was an Quasi-Experimental study with 10 respondents. The test were used Paired Sample T-Test. The results showed that there was an effect of giving oxygat and heady elevation 30° of head toward to change the level of consciousness of moderate head injury patients. GCS average value before was 10.30 and GCS average after 12.90 value was with p value was 0.0004. Then it can be concluded that the hypothesis is accepted that there is an effect of giving oxygen and head elevation of 30° to the level of awareness in patients with moderate head injury at Grandmed Lubuk Pakam Hospital in 2019.

Search Measure

Export PDF

Adobe Export PDF

Convert PDF Files to Word or Excel Online

Select PDF File

@3 artikel.pdf

Convert to

Microsoft Word (*.docx)

Document Language

English (U.S.) Change

Convert

Convert and edit PDFs with Acrobat Pro DC

Start Free Trial



LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE



NAMA : LA ODE AGUSTINO SAPUTRA

Lahir di Mabolu, 28 Agustus 1996, penulis merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara dari pasangan Bapak La Ode Marisi dan Ibu Wa Ode Ndoisa. Penulis akrab di panggil **Ino**.

1. Identitas
 - a. Nama Lengkap : La Ode Agustino Saputra
 - b. Tempat, Tanggal lahir : Mabolu, 28 Agustus 1996
 - c. Alamat lengkap : Jalan Ma'had Subulussalam, No. 17, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
 - d. Nomor Handphone : 081937341029
 - e. Alamat Email : laodeagustinosaputra@gmail.com
 - f. Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
 - g. IPK Terakhir : 4.00
 - h. Motto hidup : Jadilah orang yang berguna bagi orang lain.
2. Riwayat Pendidikan
 - a. 2016-2020 : Strata 1 Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar
 - b. 2013-2016 : SMA Negeri 1 Lohia
 - c. 2010-2013 : SMP Negeri 10 Raha
 - d. 2004-2010 : SD Negeri 14 Lohia
3. Penghargaan
 - a. 2020
 - 1) Lulusan Terbaik I Tingkat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Wisuda Ke-87 Periode 2020
 - 2) Lulusan Terbaik I Tingkat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UINAM pada Wisuda Ke-87 Periode 2020
 - 3) Lulusan Terbaik I Tingkat Program Studi Ilmu Keperawatan UINAM pada Wisuda Ke-87 Periode 2020
 - 4) Tim Terbaik pada Kegiatan Simulasi Bantuan Hidup Dasar Tingkat Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar
 - b. 2019
 - 1) Apresiasi sebagai Penerima Anugerah Literasi dalam Kegiatan Festival dan Anugerah Literasi Al-A'la UIN Alauddin Makassar


- c. 2018
- 1) Medali Emas (Juara 1) dalam Debat Bahasa Inggris pada Pekan Olahraga, Riset, dan Ornamen Seni Se-Indonesia Timur (POROS INTIM) untuk seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia Timur
 - 2) Pemenang Utama dalam Kompetisi Senam Cuci Tangan Sehat (*Hand Hygiene Team Competition*) Tingkat Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar
 - 3) Apresiasi sebagai Tim Medis pada kegiatan Kejuaraan *International Black Panther* Karate Indonesia Rektor UIN Cup II yang diselenggarakan oleh UKM IBPKI Unit UIN Alauddin Makassar
- d. 2017
- 1) Medali Perunggu pada Ajang Lomba Debat Bahasa Inggris yang diadakan oleh *Character Building Program* UIN Alauddin Makassar
 - 2) Juara 2 pada Ajang *National Nursing Debate Competition* yang diadakan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga
 - 4) Semifinalis (*Breaking 8*) pada Ajang *National Pare-Pare Debate Open Championship*
- e. 2016
- 1) Peserta Terbaik dalam *Character Building of Nursing* yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar
 - 2) Apresiasi sebagai *The Best New Comer* pada Ajang AlDeBA Award yang diadakan oleh *Alauddin Debate Association*
 - 3) Lulusan terbaik pada Penamatan Siswa SMA Negeri 1 Loghia
- f. 2015
- 1) Delegasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan *Social Youth Camp* yang didakan oleh Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta
 - 2) Delegasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Ajang Parlemen Remaja 2015 yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia
- g. 2014
- 1) Medali Perunggu (Juara 3) pada Ajang Lomba Debat Bahasa Inggris English Expo se-Indonesia Timur yang didakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo
 - 2) Juara 2 pada Ajang *National School Debating Championship* (NSDC) Tingkat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
 - 3) Juara 1 pada Ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota/Kabupaten Muna Bidang Biologi
- h. 2013
- 1) Juara 3 Juara pada Ajang *National School Debating Championship* (NSDC) Tingkat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
 - 2) Juara 1 dalam Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMA Negeri 1 Loghia
 - 3) Juara 1 dalam Lomba Penulisan Berita Tingkat SMA Negeri 1 Lohia
 - 4) Lulusan Terbaik pada Penamatan Siswa SMP Negeri 10 Raha
4. Pengalaman Organisasi


- a. Organisasi intra/ekstra kampus
 - 1) 2021
 - a) Co-Founder Organisasi Generasi Maju Indonesia (Gemasia)
 - b) Penasihat pada Forum Kajian As-Sunnah UINAM
 - 2) 2020
 - a) Sekretaris pada Forum Kajian As-Sunnah UINAM
 - b) Kepala Divisi Pengawasan pada Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
 - c) Sekretaris *Study Club Of Nursing* (SCLERA) UIN Alauddin Makassar
 - 3) 2019
 - a) Bendahara pada Forum Kajian As-Sunnah UINAM
 - 4) 2018
 - a) Staff Divisi Penelitian dan Pengembangan Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar
 - b) Staff Departemen Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI)
 - c) Menteri Divisi Debat Bahasa Inggris Alauddin Debate Association
- b. Aksi Sosial
 - 1) 2020
 - a) Tim Kesehatan pada Posyandu dan Poslansia KKN Angkatan 62 Desa Argomulyo, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
 - b) Tim Tanggap Darurat COVID-19 di Desa Argomulyo, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
 - 2) 2019
 - a) Tim Kesehatan pada Dauroh Masyaikh Nasional yang diadakan di Pondok Pesantren As-Sunnah Makassar
 - 3) 2018
 - a) Tim Kesehatan pada Kegiatan Sunatan Massal, Pemeriksaan Kesehatan, dan Bantuan Hidup Dasar yang diadakan oleh Mahasiswa KKN UINAM di Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
 - b) Tim Kesehatan dan Pembicara pada Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengabdian Masyarakat yang diadakan oleh HMJ Keperawatan UINAM
 - 4) 2017
 - a) Tim Kesehatan dan Pembicara pada Kegiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) “Indonesia Bersih”, Pengabdian Masyarakat yang diadakan oleh Generasi Bisa Indonesia atau GENBI atau Penerima Beasiswa Bank Indonesia di Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan
 - b) Pembicara pada Bulan Kesehatan dan Literasi Anak pada Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan
- c. Kepanitiaan
 - 1) 2021

- a) Panitia pelaksana Webinar Nasional oleh Generasi Maju Indonesia yang bertema “Kupas Tuntas Strategi Menaikkan Skor TOEFL”
- 2) 2020
 - a) Panitia pelaksana Kajian Rutin Forum Kajian As-Sunnah UINAM di Pusat Kesehatan dan Integrasi Keislaman, Mushola Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
 - b) Panitia pelaksana Kajian Rutin Rumah Dakwah Sunnah, Masjid Al-Fattah
 - c) Panitia pelaksana Webinar Nasional *Study Club of Nursing* UIN Alauddin Makassar yang bertema “ *Literature Review VS Systematic Review*”
- 3) 2019
 - a) Panitia pelaksana kegiatan Amaliah Ramadhan Masjid Al-Ikhlash, BTN Saumata Indah, Gowa
 - b) Panitia Pelaksana kegiatan Pengenalan Budaya dan Akademik Kemahasiswaan Tingkat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- 4) 2018
 - a) Panitia Pelaksana kegiatan Nursing Camp ILMIKI Wilayah VI
 - b) Panitia pelaksana *Research and Competition of Alauddin (RECOFA)* yang diadakan oleh UKM Riset, Keilmuan dan Pengabdian Masyarakat UIN Alauddin Makassar
5. Publikasi Ilmiah
 - a. 2018-*Comparison of the Effectiveness Of Therapy Abdominal Strecthing Exercise and Watermelon Against Dysmenorrhea, Diponegoro University Paper Conference*
 - b. 2016-*The Relation Islamic Education (Recitating Qur'an and Islamic Preaching) at School with the Students Behavioural in Daily Life, Ministry of Religion Affair, Islamic Education Department Paper Competition.*
6. Penguasaan Bahasa
 - a) Bahasa Indonesia
 - b) Bahasa Inggris
 - c) Bahasa Arab
 - d) Bahasa Daerah Muna

DOKUMENTASI SELAMA PENELITIAN









391662
Muh. Fathan 17 Thn 21-1748
04.04.2021
22:20:37

El: 1470

SKRIPSI LAODE AGUSTINUS

LIBRARITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX
23% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	6%
2	www.alomedika.com Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	sinta.unud.ac.id Internet Source	2%
6	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	2%
7	ejr.stikesmuhkudus.ac.id Internet Source	1%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
9	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Student Paper	1%
11	id.123dok.com Internet Source	1%
12	idoc.pub Internet Source	1%
13	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1%

Exclude system: Off
Exclude bibliography: On
Exclude matches: = 1%