

**HUBUNGAN PEKERJAAN DAN JARAK KELAHIRAN DENGAN PASIEN  
PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER DI RSIA ANANDA MAKASSAR  
TAHUN 2021**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR RESKI ANNISA A**

NIM: 70600119030

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Reski Annisa A  
NIM : 70600119030  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 08 Oktober 2001  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Cluster Balla Insinyur Pallantikang  
Judul : Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran  
Dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di  
RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Februari 2023

Penyusun




Nur Reski Annisa A

## PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Nur Reski Annisa A, NIM: 70600119030, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: "Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Tahun 2021", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Makassar, 6 Februari 2023

Pembimbing 1



Dr. dr. Najamuddin, M.Kes

Pembimbing 2



dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp. KFR

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021**” yang disusun oleh Nur Reski Annisa A, NIM 70600119030, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Februari 2023, bertepatan dengan 25 Rajab 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 17 Februari 2023

26 Rajab 1444 H

### DEWAN PENGUJI

**Ketua : Dr.dr.Syatirah., Sp.A., M.Kes**

(.....)

**Sekretaris : Dr.dr.Rosdianah., M.Kes**

(.....)

**Pembimbing I : Dr. dr. Najamuddin, M.Kes**

(.....)

**Pembimbing II: dr. Rahadi Arie Hartoko,Sp.KFR**

(.....)


**Penguji I : dr. Sari Ifdiana Jalal, M.Kes., Sp.OG**

(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd**

(.....)

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
**Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan limpahan syukur kehadirat Allah Swt atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Tahun 2021”. Salawat serta salam tiada henti dicurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah mengantarkan dunia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan adanya tantangan dan hambatan yang dilalui. Semua hal itu dapat dilalui tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak yang senantiasa memberikan motivasi secara terus-menerus. Kedua orang tua penulis Abd Azis dan Musdalifah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi agar tidak bermalas-malasan, dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas oleh bantuan, bimbingan dari Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- A. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan.
- B. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi

Tihardimanto, MARS, SP.JP. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

C. Dr. dr. H. Najamuddin, M.Kes., MARS., DPDK dan dr. Rahadi Arie Hartoko, Sp. KFR selaku dosen pembimbing penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajar dan membimbing penulis.

D. dr. Sari Ifdiana Jalal, M.Kes., Sp. OG dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku dosen penguji penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menguji dan memberi saran kepada penulis.

E. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. Serta seluruh staf jurusan Program Studi Pendidikan Dokter yang telah memberikan bantuan kepada penulis

F. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.

G. Kepada seluruh pegawai rekam medik RSIA Ananda Makassar.

H. Kawan seperjuangan RJ yang selalu menemani dalam suka maupun duka.

I. Teman-teman Integrin yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan lebih baik.

J. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.


Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Makassar, 6 Februari 2023

Penyusun

Nur Reski Annisa A  
NIM: 70600119030



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Hipotesis .....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Pekerjaan .....	13
B. Jarak Kelahiran .....	15
C. Perdarahan Postpartum .....	16
D. Hubungan Pekerjaan dengan Perdarahan Postpartum .....	24
E. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Perdarahan Postpartum.....	25
F. Integrasi Keislaman .....	26
G. Kerangka Teori .....	29
H. Kerangka Konsep .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	31
A. Desain Penelitian .....	31



B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Variabel Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel.....	32
E. Teknik Pengambilan Sampel .....	35
F. Teknik Pengolahan/Analisis Data.....	35
G. Instrumen Penelitian .....	36
H. Metode Pengumpulan Data .....	37
I. Etika Penelitian.....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Hasil Penelitian.....	39
B. Pembahasan .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>54</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	6
Tabel 1.2. Kajian Pustaka .....	8
Tabel 1.3. Beban Kerja Berdasarkan Proporsi Waktu Kerja.....	14
Tabel 4.1 Distribusi Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 .....	40
Tabel 4.2 Hubungan Pekerjaan dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 .....	42
Tabel 4.3 Hubungan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.....	43
Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik Variabel Independen yang Paling Memengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.....	44

## DAFTAR SKEMA

Gambar 1. Kerangka Teori .....	30
Gambar 2. Kerangka Konsep .....	31
Gambar 3. Metode Pengumpulan Data .....	38



## ABSTRAK

Nama: Nur Reski Annisa A

Nim : 70600119030

Judul : Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Tahun 2021

---

Perdarahan postpartum adalah perdarahan  $> 500$  cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau  $> 1.000$  ml setelah persalinan abdominal. Berdasarkan waktu terjadinya, perdarahan postpartum primer terjadi dalam 24 jam pertama postpartum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dan jarak kelahiran dengan perdarahan postpartum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan *case control*. Sampel dalam penelitian berjumlah 174 orang terdiri dari ibu bersalin yang terdiagnosis perdarahan postpartum primer sebagai sampel kasus sebanyak 84 orang dan yang tidak terdiagnosis sebagai sampel kontrol sebanyak 84 orang. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari rekam medis RSIA Ananda pada tahun 2021. Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer lebih berisiko terjadi pada ibu yang bekerja dan jarak persalinan berisiko yakni  $< 2$  tahun atau  $> 5$  tahun. Hasil analisis bivariat didapatkan hubungan antara pekerjaan (nilai  $p: 0,000$ ) dan jarak persalinan (nilai  $p: 0,000$ ) dengan kejadian perdarahan postpartum primer. Ibu yang bekerja berisiko 6 kali untuk mengalami perdarahan postpartum primer ( $OR= 5,833$ ) sedangkan ibu yang jarak persalinan  $< 2$  tahun atau  $> 5$  tahun memiliki risiko 4 kali ( $OR=3,719$ ). Hasil analisis multivariat diperoleh pekerjaan lebih berisiko ( nilai  $p:0,000$ ) dengan nilai  $OR 6,178$ .

**Kata Kunci :** Pekerjaan, Jarak Kelahiran, Perdarahan Postpartum Primer

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Ibu merupakan sosok yang penting dan memiliki kontribusi yang besar dalam tatanan suatu keluarga. Keberadaan ibu sangat penting guna mendidik dan merawat anak-anaknya. Cerminan dari keluarga yang bahagia dan sehat ditentukan oleh peran ibu yang sangat besar didalamnya. Maka dari itu, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera sangat penting memperhatikan keadaan ibu terlebih dahulu. Dalam upaya pengelolaan kesehatan, ibu dan anak haruslah mendapatkan perhatian khusus dan menjadi prioritas utama (Minister of Health Republic of Indonesia, 2020).

Dalam menentukan baik dan buruknya suatu pelayanan dapat menggunakan angka kematian ibu (AKI) sebagai salah satu indikatornya. Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental dan Angka kematian dalam ruang lingkup tersebut diukur setiap 100.000 kelahiran hidup (Susiana, 2019).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO pada tahun 2017, telah terjadi penurunan kasus kematian ibu dan anak, dimana kematian ibu menurun sebesar 44% antara tahun 1990- 2015 dan kematian neonatal yang meurun 49% antara tahun 1990- 2017. Kendati demikian, setiap tahun lebih

dari 300.000 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan serta persalinan (Respati *et al.*, 2019).

Jumlah kematian ibu di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 4.627 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 4.221 kematian. Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 disebabkan oleh perdarahan sebanyak 1.330 kasus, hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.110 kasus, dan gangguan sistem peredaran darah sebanyak 230 kasus. Pada tahun 2020 angka kematian ibu dan anak di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 95 kasus dengan penyebab tertinggi ialah perdarahan dengan jumlah kasus 44 disusul hipertensi dalam kehamilan sebanyak 30 kasus (Minister of Health Republic of Indonesia, 2020). Di kota Makassar sendiri, angka kematian ibu mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sebanyak 5 kematian ibu (19,86%) dari 25.181 kelahiran hidup (Minister of Health Republic of Indonesia, 2020).

Perdarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian maternal di seluruh dunia dengan insiden sebesar 5% -10% dari seluruh persalinan (Simanjuntak, 2020). Penyebab perdarahan postpartum antara lain, atonia uteri (50- 60%), sisa plasenta (23-24%), retensio plasenta (16-17%), lacerasi jalan lahir (4-5%), kelainan darah (0,5-0,8%) (Maesaroh dan Iwana, 2018).

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum yaitu atonia uteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, rest

plasenta, jenis persalinan, usia, paritas, jarak kehamilan, anemia, riwayat perdarahan, oksitosin drip, induksi persalinan, penghasilan keluarga, pendidikan dan pekerjaan. Jika diklasifikasikan maka yang menjadi faktor penyebab langsung adalah atonia uteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, dan rest plasenta, sedangkan penyebab tidak langsung adalah jenis persalinan, usia, paritas, jarak kehamilan, anemia, riwayat perdarahan, oksitosin drip, induksi persalinan, penghasilan keluarga, pendidikan dan pekerjaan (Nurkhalizah *et al.*, 2021).

Pengaturan jarak persalinan adalah upaya untuk menetapkan atau memberi batasan sela antara persalinan yang lalu dan persalinan yang akan datang. Pengaturan jarak kehamilan yang direalisasikan melalui program keluarga berencana ternyata tidak terealisasi secara sempurna karena pada kenyataannya masih banyak ibu-ibu muda memiliki jarak kehamilan terlalu dekat.

Data di Indonesia menunjukkan 36% kelahiran memiliki jarak kelahiran kurang dari 2 tahun. Wanita yang melahirkan dengan jarak kurang dari 2 tahun akan mengalami peningkatan risiko terjadinya perdarahan postpartum bahkan dapat berakibat kematian saat melahirkan. Proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan jumlah anak 1-3 dan jika dilihat menurut jarak kelahirannya ternyata jarak kurang dari 2 tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak (Maesaroh dan Iwana, 2018).

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa menjaga jarak kehamilan sangatlah penting agar terhindar dari risiko yang membahayakan ibu maupun janin. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Luqman/31: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّأهُ ۖ فِي عَمَرَيْنِ ۖ إِنَّ اشْكُرَّ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu”

Faktor lain yang berpotensi mengakibatkan perdarahan postpartum ialah pekerjaan. Hal ini dikarenakan ibu hamil yang bekerja cenderung cepat lelah sebab aktivitas fisiknya meningkat karena memiliki tambahan pekerjaan/kegiatan di luar rumah. Beratnya pekerjaan ibu selama kehamilan dapat menimbulkan terjadinya perdarahan pasca persalinan karena kurangnya waktu beristirahat bagi ibu. Tak hanya itu, pekerjaan dan aktivitas berlebih juga berdampak terhadap kurangnya waktu luang yang dimiliki sehingga memungkinkan ibu tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara menyeluruh (Pitriani, 2017).

Dari data di atas dapat diketahui bahwa perdarahan masih menjadi penyebab utama kematian ibu dan menjadi masalah yang cukup serius dalam pengelolaan kesehatan. Maka dari itu, perlu upaya pencegahan sedini mungkin melalui identifikasi dan peningkatan pengetahuan akan faktor risiko perdarahan postpartum. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik



untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran dengan pasien perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar tahun 2021 ?

### **C. Hipotesis**

#### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak terdapat hubungan antara pekerjaan dan jarak kelahiran dengan pasien perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar tahun 2021.

#### 2. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Terdapat hubungan antara pekerjaan dan jarak kelahiran dengan pasien perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar tahun 2021.

### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### 1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variabel Independen					

1.	Pekerjaan	Status kegiatan atau pekerjaan ibu hamil sehari-hari sehingga mendapatkan penghasilan.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	Kriteria Objektif a) Berisiko rendah : tidak bekerja b) Berisiko tinggi: bekerja	Ordinal
2.	Jarak kelahiran	Jarak kelahiran adalah suatu interval kelahiran anak sebelumnya dengan kelahiran anak sekarang.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	Kriteria objektif a) Berisiko tinggi: (<2 tahun dan > 5 tahun) b) Berisiko rendah: ( 2-5 tahun)	Ordinal
Variabel Dependen					

2.	Perdarahan postpartum	Perdarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan abdominal.	Melihat data rekam medis pasien kemudian disesuaikan dengan kriteria objektif.	Perdarahan postpartum primer ialah perdarahan yang terjadi < 24 jam setelah persalinan	nominal
----	-----------------------	---	--	--	---------

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Menghubungkan antara pekerjaan dan jarak kelahiran dengan metode melihat data rekam medis pasien yang mengalami perdarahan postpartum primer.

## E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2. Kajian Pustaka

No	Peneliti an/tahun	Judul	Metode	Jumlah sampel	Instrumen penelitan	Hasil

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

1.	Tangah u Rahma wati, Sumiati ,Artika Dewie/ 2020.	Jarak Persalinan Berhubungan Dengan Perdarahan Postpartum di RSUD Undata Palu Tahun 2017- 2018.	Mengguna kan desain kasus kontrol dan sampel diambil secara <i>systematic random sampling.</i>	37 sampel kontrol dan 37 sampel kasus.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu.	Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai p-nya adalah <0,001 yang artinya terdapat hubungan antara jarak persalinan dengan perdarahan postpartum di RSUD Undata Palu.
2	Iwana Patica Inta dan Siti Maesar oh/201 8.	Hubungan Riwayat Anemia dan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek.	Analitik dengan pendekata n <i>cross sectional.</i>	<i>systematik random sampling</i> berjumlah 285 responden.	Data sekunder yang diambil melalui rekam medis ibu	Setelah dilakukan analisis bivariat ditemukan hubungan riwayat anemia dengan kejadian perdarahan postpartum ( $p = 0,0011 <$ $0,05$ ) dan hubungan jarak kelahiran dengan perdarahan postpartum ( $p = 0,005 <$ $0,05$ ).

3	Fitriani Rini/20 17.	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Perdarahan Post Partum di Ruang Camar II RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2016.	Penelitian analitik kuantitatif, dengan desain penelitian <i>case control</i> .	Sampel pada penelitian ini adalah 72 ibu yang bersalin dengan perdarahan postpartum sebagai kasus 72 orang ibu bersalin dengan tidak perdarahan postpartum sebagai kontrol. Perbandingan kasus dan kontrol adalah 1:1.	Data sekunder yang diambil dari rekam medis ibu.	Terdapat hubungan antara faktor pekerjaan dengan kejadian perdarahan post partum pada ibu bersalin di ruangan Camar II RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau tahun 2015 dengan nilai $p = 0,000$ ( $p < 0,05$ ).
---	----------------------------	--	---	--	--	---

Untuk mengetahui hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran pada pasien perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.

4	Yuniarti Fitri/2018.	<i>Description Of Risk Factors That Caused Hemorrhagy Post Partum The Mother After Birth In General hospital of pare</i>	Deskriptif dengan menggunakan variabel tunggal yaitu faktor risiko penyebab perdarahan post partum di RSUD Pare Kediri.	menggunakan total sampling (sampling jenuh) dengan responden sebanyak 29 responden.	Data sekunder yang diambil dari rekam medis ibu.	Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa sebagian besar perdarahan post partum disebabkan oleh anemia sebanyak 69%, partus lama 59% dan sebagian kecil disebabkan oleh usia ibu sebanyak 31%, riwayat dengan penyakit penyerta sebanyak 17%, jarak kelahiran 17%, riwayat <i>sectio caesarea</i> sebanyak 7% dan <i>grande multipara</i> sebanyak 7%
---	----------------------	--	---	---	--	--

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui distribusi jarak kelahiran pada ibu bersalin di RSIA Ananda Makassar.
- b. Untuk mengetahui distribusi pekerjaan pada ibu bersalin di RSIA Ananda Makassar.
- c. Untuk mengetahui frekuensi kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.

- d. Untuk mengetahui hubungan ibu yang bekerja dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.
- e. Untuk mengetahui hubungan ibu yang tidak bekerja dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.
- f. Untuk mengetahui hubungan jarak kelahiran risiko rendah dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.
- g. Untuk mengetahui hubungan jarak kelahiran risiko tinggi dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar.

#### ***G. Manfaat Penelitian***

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan menerapkan ilmu yang telah didapatkan di bidang kesehatan terutama mengenai pekerjaan dan jarak kelahiran pada ibu bersalin dengan kejadian perdarahan postpartum primer.

b. Bagi pengetahuan


Dapat dijadikan salah satu bahan acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan baik ibu dan anak.

c. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan atau pengetahuan masyarakat tentang hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran dengan kejadian perdarahan postpartum yang berdampak pada perencanaan kehamilan ibu.

d. Bagi Instansi

- 1) Memberikan hasil data tambahan di bidang kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran dengan kejadian perdarahan postpartum primer.
- 2) Menambah referensi bacaan terkait ibu dan anak, sehingga dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pekerjaan

#### 1. Definisi

Pekerjaan adalah status kegiatan atau pekerjaan ibu hamil sehari-hari sehingga mendapatkan penghasilan. (Hidayah et al., 2018). Pekerjaan fisik dikaitkan dengan peranan seorang ibu yang mempunyai pekerjaan lain di luar pekerjaan rumah tangga sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga (Pitriani, 2017).

Di Indonesia pengaturan waktu kerja terhadap ibu hamil sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Pasal 76 Ayat 2. Wanita hamil yang bekerja memiliki waktu kerja yang sama dengan pekerja lainnya, sesuai Undang No. 13 tahun 2003, Pasal 77 ayat 1, yaitu 7 waktu kerja dalam 1 hari atau 40 waktu kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 waktu kerja dalam 1 hari atau 40 waktu kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu (Muzakir et al., 2021).

#### 2. Klasifikasi

Tabel 1.3. Beban Kerja Berdasarkan Proporsi Waktu Kerja (Kemenkes RI,2020)

Kelompok aktivitas	Jenis Kegiatan	Faktor Aktivitas	Contoh aktivitas
Ringan -Laki-Laki	75% dari waktu yang digunakan	1,58 1,45	Aktivitas kantor tanpa olahraga, aktivitas fisik yang tidak

-Perempuan	adalah untuk duduk atau berdiri dan 25% untuk kegiatan berdiri dan berpindah ( <i>moving</i> )		menguras tenaga,duduk memotong kedua ujung batang rokok (perempuan),berdiri di depan mesin memasukkan seng ke dalam mesin pembuat tutup kaleng (laki-laki)
Sedang -Laki-Laki -Perempuan	25% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau berdiri dan 75% untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya	1,67 1,55	Bekerja naik turun tangga,olahraga ringan,pekerjaan rumah tangga,berdiri mengisikan batang korek api (perempuan),mengambil kotak berisi pentul dan korek api dan berjalan memindahkannya ke sekitar mesin (laki-laki)
Berat -Laki-Laki -Perempuan	40% dari waktu yang digunakan adalah untuk duduk atau berdiri dan 60% untuk kegiatan kerja khusus dalam bidang pekerjaannya	1,88 1,75	Pekerjaan lapangan,kuli bangunan,driver,ngeprek/memecah batu (perempuan),berdiri mengangkat balok kayu dan memasukkannya ke dalam mesin (laki-laki)

## ***B. Jarak Kelahiran***

### ***1. Definisi***

Jarak persalinan ialah jarak dalam hitungan bulan ataupun tahun antara kelahiran anak yang satu dengan anak yang sebelumnya. Setelah melahirkan anak pertama, selanjutnya perlu mempertimbangkan jarak persalinan untuk mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. Jarak kelahiran yang terlalu dekat dikaitkan dengan risiko pada kehamilan dikarenakan kondisi ibu yang belum pulih dan pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi belum optimal, namun sudah harus memenuhi kebutuhan nutrisi janin yang dikandung (Nuraeni dan Wianti, 2018).

### ***2. Klasifikasi***

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyatakan tubuh ibu akan dapat melewati proses persalinan kembali setelah minimal 24 bulan dari persalinan sebelumnya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menetapkan batasan jarak persalinan minimal 2 tahun dengan jarak optimal adalah 3 tahun. Berbagai penelitian lain juga mendukung untuk memberi jarak persalinan > 2 tahun guna meminimalisir risiko morbiditas dan mortalitas pada ibu (Dewie et al., 2020).

Berdasarkan risiko, jarak kelahiran dapat diklasifikasikan menjadi risiko tinggi dan risiko rendah. Adapun yang berisiko tinggi ialah jarak persalinan pendek (< 2 tahun) dan jarak persalinan panjang (> 5 tahun). Sedangkan jarak kelahiran dengan risiko rendah berada pada interval 2-5 tahun.

## **C. Perdarahan Postpartum**

### **1. Definisi**

Perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 cc yang terjadi setelah bayi lahir pervaginam atau lebih dari 1.000 ml setelah persalinan abdominal (Budiman. Mayasari, 2017). Kondisi dalam persalinan menyebabkan kesulitan untuk menentukan jumlah perdarahan yang terjadi, maka batasan jumlah perdarahan disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal apabila telah menyebabkan perubahan tanda vital antara lain pasien mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, hiperpnea, tekanan darah sistolik  $<90$  mmHg, denyut nadi  $>100$  x/menit, kadar Hb  $<8$  g/Dl (Prawirohardjo,2014)

Berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi perdarahan postpartum primer (*primary post partum haemorrhage*) yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama postpartum, sedangkan sekunder (*secondary post partum haemorrhage*) merupakan perdarahan yang terjadi setelah periode 24 jam sampai 6 minggu postpartum (Simanjuntak, 2020).

### **2. Epidemiologi**

Berdasarkan analisis WHO, 27,1% penyebab kematian maternal terutama disebabkan karena perdarahan serta lebih dari 2/3 nya merupakan kematian akibat perdarahan postpartum. Kematian akibat perdarahan postpartum rata-rata tinggi terjadi di negara-negara dengan *human development indeks* (HDI) rendah atau sedang (Yuliati et al., 2018).

### 3. *Etiologi dan Faktor Risiko Perdarahan Postpartum*

Penyebab perdarahan postpartum dapat dibagi menjadi 4 T yaitu *tone* (tonus: atonia uteri), *tissue* (jaringan: retensio plasenta dan sisa plasenta), trauma (laserasi: laserasi perineum, vagina, serviks dan uterus) dan trombin (koagulopati: gangguan pembekuan darah). Adapun faktor predisposisi perdarahan post partum secara umum yaitu paritas, interval persalinan, status gizi, riwayat persalinan dulu, anemia, kelelahan dan kelemahan otot rahim, pertolongan persalinan dengan tindakan serta *over* distensi pada kehamilan (Aida Fitria, Jitasari Sibero, 2020).

### 4. *Patomekanisme*

Terjadinya perdarahan postpartum memiliki banyak etiologi sehingga patomekanismenya disesuaikan dengan etiologi yang ada. Berikut ini adalah patomekanisme terjadinya perdarahan postpartum berdasarkan etiologinya:

#### a. Atonia Uteri

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. (Lestari et al., 2020). Uterus mendapat pasokan darah dari dua arteri uteri dan dua arteri ovari yang mengalirkan darah antara 500 hingga 900 mL per menit. Setelah persalinan selesai, terjadi peningkatan kadar oksitosin dan prostaglandin F<sub>2</sub>-alpha yang menyebabkan adanya kontraksi uterus dan vasokonstriksi. Kontraksi tonus otot uterus menjadi

mekanisme primer pasca persalinan dan apabila terjadi gangguan pada otot miometrium dalam berkontraksi akan berujung pada terjadinya *postpartum hemorrhage* (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

b. Retensio Plasenta dan Rest Plasenta

Retensio plasenta adalah plasenta belum lepas 30 menit setelah kelahiran bayi. Plasenta yang sukar dilepaskan walaupun telah dilakukan manajemen aktif kala 3 dikarenakan adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus. Dikatakan plasenta akreta bila implantasi menembus desidua basalis dan *nitabuch layer*, plasenta inkreta apabila plasenta sampai menembus miometrium dan plasenta perkreta bila vilikorialis sampa menembus perimetrium (Hardiana, 2019).

Rest plasenta adalah tertinggalnya sebagian plasenta atau selaput yang mengandung pembuluh darah dan berdampak pada kontraksi uterus yang terhambat, akibatnya otot – otot rahim tidak bisa menjepit pembuluh darah yang berada pada uterus secara maksimal sehingga berujung pada perdarahan postpartum (Puteri, 2021).

c. Robekan Jalan Lahir

Robekan jalan lahir terjadi pada sebagian besar kasus persalinan pertama dan tidak jarang juga dijumpai pada persalinan selanjutnya. Pasien primipara sering kali mengalami peristiwa "kepala keluar

pintu" disebabkan oleh perineum yang mengalami ketegangan sehingga terjadi robekan. Luka-luka yang ditimbulkan biasanya ringan tetapi kadang-kadang terjadi juga luka yang luas dan berbahaya. Laserasi pada ruptur perineum dapat mengakibatkan perdarahan, pada laserasi derajat I dan II kasus perdarahan mayor jarang ditemui, namun pada laserasi ke III dan IV sering menyebabkan perdarahan postpartum (Damayanti dan Wati, 2021).

d. Gangguan Pembekuan Darah

Gangguan faktor koagulasi tidak terlalu memengaruhi perdarahan. Namun, hal ini dapat berbahaya ketika terjadi deposisi fibrin dan bekuan darah pada pembuluh darah pada saat beberapa jam hingga beberapa hari pasca persalinan. Trombositopenia terjadi akibat dari penyakit yang sebelumnya diderita oleh ibu seperti *idiopathic thrombocytopenic purpura*, akibat dari sindrom HELLP (*Hemolysis, Elevated Liver Enzym, and Low Platelet count*), *disseminated intravascular coagulation* (DIC), dan sepsis. Hal tersebut telah teridentifikasi sebelumnya namun kadang juga tidak teridentifikasi. Kondisi lain seperti *familial hypofibrinogenemia* dan *von Willebrand disease* juga patut dipertimbangkan (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

## 5. Gejala Klinis

Perdarahan postpartum merupakan pendarahan pervaginam berat yang cepat yang dapat menyebabkan tanda dan gejala syok hipovolemik.

Kehilangan darah biasanya terlihat di introitus, dan ini terutama berlaku jika plasenta telah dilahirkan. Jika plasenta tetap in situ, maka sejumlah besar darah dapat dipertahankan dalam uterus di belakang plasenta yang terpisah sebagian, di membran, atau keduanya. Bahkan setelah melahirkan plasenta, darah dapat terkumpul dalam uterus atonik. Karenanya, ukuran dan tonus uterus harus dipantau di seluruh kala tiga dan kala empat, setelah persalinan plasenta. Hal ini dilakukan dengan meraba fundus uteri secara lembut (Sarma,2017)

## **6. Diagnosa**

Adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan guna menegakkan diagnose perdarahan postpartum ialah:

- a. Palpasi uterus: bagaimana kontraksi uterus dan tinggi fundus uteri
- b. Memeriksa plasenta dan ketuban apakah lengkap atau tidak.
- c. Lakukan eksplorasi cavum uteri untuk mencari: Sisa plasenta atau selaput ketuban, robekan rahim, plasenta suksenturiata.
- d. Inspekulo: untuk melihat robekan pada serviks, vagina, dan varises yang pecah.
- e. Pemeriksaan laboratorium: periksa darah yaitu Hb, COT (*Clot Observation Test*), dll (Sarma,2017).

## **7. Tatalaksana**

Tujuan dari manajemen *postpartum haemorrhage* adalah menjaga homeostasis tubuh dengan menangani etiologi dari perdarahan ataupun terapi



dari komponen koagulopati. Tatalaksana ini terdiri dari empat tahapan yang disetiap tahapannya diklasifikasikan berdasarkan kondisi pasien, tatalaksana umum atau operatif, serta pemilihan medika mantosa yang berbeda (Julietta dan Widiastuti Giri, 2021).

a. Manajemen Tahap Satu

Bertujuan dalam deteksi, monitoring, dan identifikasi dari penyebab perdarahan dan langsung memanggil konsultan obstetris serta menginformasikan kondisi kepada dokter anastesi. Dilakukan dalam kurun waktu <30 menit. Setelah diagnosa *postpartum haemorrhage* ditegakkan, diberikan dua akses cairan intravena dan diambil sampel darah untuk mencari kecocokan terhadap darah yang akan diberikan. Selanjutnya dilakukan penambahan volume intravena dan pemasangan kateter foley. *Postpartum haemorrhage* dengan perdarahan minor tanpa adanya tanda klinis syok diberikan terapi cairan intravena menggunakan 14 gauge cannula, diberikan *venpuncture* darurat sebanyak 20 mL, cek *blood count*, dan faktor koagulasi. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital setiap 15 menit sekali. Sedangkan tatalaksana awal pada *postpartum haemorrhage* mayor dan ditemukan tanda syok serta perdarahan yang persisten, diberikan oksigen 15 liter/menit. Selanjutnya dilakukan pengecekan sirkulasi menggunakan dua 14 gauge cannula perifer. Kemudian diberikan *venepuncture* 20 mL langsung sebanyak 4 unit, darah

lengkap, faktor koagulasi seperti fibrinogen, dan fungsi dasar ginjal dan hati. Pemantauan tanda-tanda vital disertai pemasangan *electrocardiogram*, dan *automated blood pressure recording* (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

b. Manajemen Tahap Dua

Sebagai bentuk antisipasi dan terapi kemungkinan koagulopati yang dilakukan dalam kurun waktu 30 menit. Penatalaksanaan ini dilakukan pada pasien yang mengalami perdarahan berat namun memiliki hemodinamik yang stabil. Sedangkan pasien dalam kondisi hemodinamik yang tidak stabil, segera diberikan tatalaksana tahap tiga. Apabila ditemukan retensio plasenta, dilakukan pengangkatan plasenta secara manual ataupun kuretase rahim. Pengobatan ini berfokus pada atoni uterina, koagulopati, temperatur, dan stabilitas hemodinamik. Mengatasi atoni uteri pada partus dengan pemberian prostaglandin E2 analog yaitu sulprostone. Pemberian sulprostone harus didahului pemberian oksitosin pada manajemen tahap satu. Dosis dari sulprostone adalah 1500  $\mu\text{g}$  dalam 24 jam dan dosis awal sebanyak 500 $\mu\text{g}$  diberikan dalam 60 menit pertama. Perlu diperhatikan bahwa pemberian sulprostone memberikan efek samping berupa menggigil, mual dan muntah, demam, dan peningkatan resistensi perifer (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

c. Manajemen Tahap Tiga

Tujuan utama dari manajemen tahap tiga adalah untuk menghentikan perdarahan untuk sementara dan menjaga kestabilan hemodinamik dari pasien. Tidak hanya dengan obat-obatan, namun kompresi uterus secara manual dapat dilakukan guna mengatasi perdarahan. Manuver Crede menggunakan satu tangan dengan menggenggam fundus uteri. Kompresi bimanual dilakukan dengan satu tangan ditempatkan secara intravaginal tepat di belakang serviks dan tangan lainnya diletakkan di perut pasien tepatnya pada fundus untuk “menjepit” rahim. Teknik lain untuk menghentikan *postpartum haemorrhage* untuk sementara adalah tamponade uteri. Tamponade dilakukan dengan menggunakan kasa ataupun tamponade balloon (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

d. Manajemen Tahap Empat

Dilakukan pada pasien dengan kegagalan manajemen tahap tiga. Pasien dengan perdarahan yang persisten serta kondisi hemodinamik yang tidak stabil, hipotermia, koagulopati, dan asidosis. Kondisi pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil kemungkinan besar memerlukan operasi namun para ahli obstetri berpendapat bahwa dilakukannya operasi histerektomi harus dikaji dengan baik karena sangat berisiko (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

## **8. Pencegahan**

Untuk upaya pencegahan, dapat dilakukan manajemen aktif kala tiga. Manajemen aktif kala tiga sendiri secara garis besar terbagi menjadi beberapa proses yaitu: pemberian uterotonika, melakukan peregangan tali pusat terkendali, atau massase uterus setelah lahir (Julieta dan Widiastuti Giri, 2021).

### **D. Hubungan Pekerjaan dengan Perdarahan Postpartum**

Pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kehamilan risiko tinggi karena waktu yang dimiliki oleh ibu hamil akan dialokasikan pekerjaan sehingga waktu istirahat akan terbatas. Hal tersebut tentu membuat ibu lebih mudah lelah dan berdampak ke kondisi fisik maupun mental ibu (Fitrianingsih et al., 2019).

Aktivitas yang dilakukan secara berlebihan seperti mengangkat beban berat memicu menimbulkan kontraksi rahim (his) ataupun perdarahan pervaginam. Kekuatan his semakin lama meningkat diikuti oleh pengeluaran lendir darah. Perdarahan yang nampak bersumber dari pembuluh darah yang pecah pada kanalis servikalis saat terjadi perdarahan serviks (Alfisyar, 2020). Selain itu, ibu yang bekerja memiliki aktivitas fisik dan psikis lebih berat dibandingkan ibu yang tidak bekerja dan hal ini yang dapat memicu terjadinya atonia uteri (Kumalasari dan Widiastuti, 2022)

### ***E. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Perdarahan Postpartum***

Data di Indonesia menunjukkan 36% kelahiran memiliki jarak kelahiran kurang 2 tahun. Wanita yang melahirkan dengan jarak kurang 2 tahun memicu peningkatan risiko terjadinya perdarahan postpartum bahkan kematian saat melahirkan. (Maesaroh dan Iwana, 2018).

Berbagai penelitian mendukung untuk memberi jarak persalinan > 2 tahun guna menekan risiko morbiditas dan mortalitas pada ibu. Dikatakan jarak persalinan pendek (< 2 tahun) adalah waktu yang berisiko dikarenakan kondisi organ reproduksi ibu terutama rahim belum pulih pulih seutuhnya. Penelitian yang lain mengatakan bahwa rahim dapat pulih enam bulan pasca persalinan, tetapi fungsinya belum maksimal. Rahim yang belum siap untuk menerima kehamilan akan mengalami penurunan fungsi terutama dalam penyediaan makanan untuk ibu dan calon bayi. Hal tersebut berujung pada kasus abortus, prematur pada bayi, komplikasi kehamilan, bahkan perdarahan pada saat persalinan. Penelitian yang dilakukan di Boyolali menemukan bahwa ibu dengan jarak persalinan < 2 tahun berisiko tinggi mengalami perdarahan postpartum, bahkan mengakibatkan proporsi kematian yang lebih banyak. Jika organ reproduksi belum siap untuk menghadapi kehamilan ditambah usia ibu yang meningkat sehingga kekuatan ibu untuk mengedan melemah, begitupun dengan kontraksi uterus yang tidak maksimal dapat mengakibatkan perdarahan. Selain jarak persalinan yang pendek (< 2 tahun), Selain jarak persalinan yang pendek, wanita yang memiliki jarak persalinan panjang (> 5 tahun) berisiko lebih besar untuk mengalami perdarahan

postpartum. Tak hanya perdarahan postpartum, jarak persalinan yang panjang juga dapat menyebabkan risiko morbiditas ibu yang tinggi, bahkan dalam beberapa studi dikatakan bahwa jarak persalinan yang panjang memiliki lebih banyak efek samping dibandingkan dengan jarak persalinan yang pendek. Efek tersebut ialah preeklampsia dan demam intrapartum (Dewie et al., 2020).

#### **F. Integrasi Keislaman**

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai variabel pada kejadian perdarahan postpartum, diantaranya :

##### 1. Jarak Kelahiran

Allah SWT berfirman dalam Q.S Luqman/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”

Merujuk dari tafsir al-mishbah karangan M. Quraisy Shihab terdapat beberapa kosa kata penting yang memerlukan penjelasan yakni *Wahn* berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud disini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat ini mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, artinya kelemahan itu telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya.

*Wa fīshaluhu fī ‘āmain* artinya dan menyapihannya di dalam dua tahun. Mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuhkan kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima.

Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa bayi sesudah berumur dua tahun terhitung sejak lahir, barulah ibu melepaskan susuannya. Hal ini didukung oleh pendapat para ahli kesehatan yang menganjurkan agar seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun. ASI merupakan makanan pertama, bersifat alamiah, mengandung gizi yang berguna bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu harus diberikan sesering mungkin hingga bayi berusia dua tahun. Pemberiaan ASI juga dapat menjadi salah satu kontrasepsi alami dalam hal pengaturan jarak kehamilan (Leu Baktirar,2021).

Berkenaan dengan ayat diatas,penulis setuju dengan adanya waktu penyapihan yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dikarenakan proses tersebut memberikan dampak positif tak hanya bagi bayi tetapi juga untuk ibu. Pemberian ASI dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi dalam upaya untuk mengatur jarak kehamilan (Suhaedah,2013).

## 2. Pekerjaan

Allah SWT berfirman dalam Q.S At- Talaq/65:6

وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانظُرْنَ ۚ  
أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ

Terjemahnya:

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”


Merujuk dari buku tafsir ayat-ayat ekonomi al-qur'an karya Azhari Akmal Taringan, diperoleh poin penting yang ingin dikemukakan dari ayat ini adalah kata *ajr (ujur)* merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi orang yang memperkerjakan seseorang. Sampai-sampai, untuk seorang ibu yang telah di thalaq suaminya berhak menerima upah susuan –walau terhadap anaknya sendiri- dari suaminya. Demikian juga kalau suaminya menyewa ibu susuan lain, menjadi kewajibannya untuk menyiapkan upah yang layak (Taringan, 2012).

Menurut Ibnu Qudamah, para ahli ilmu telah bersepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah atas istrinya, bila sudah baligh, kecuali jika istrinya berbuat nusyuz. Pada umumnya laki-laki sebagai pemimpin, mengayomi, melindungi, bertanggung jawab atas sebagian besar perempuan. Karena Allah SWT telah memberikan anugerah kelebihan atas pada umumnya laki-laki atas pada umumnya perempuan. Salah satu kewajiban suami adalah menjadi tulang punggung untuk keluarganya atau bisa juga disebut laki-laki sebagai penjamin ekonomi keluarga. Kewajiban memberikan nafkah, bahwa semua ulama mazhab menyepakati tentang wajibnya pemberian nafkah kepada istri setelah adanya akad dalam sebuah perkawinan,<sup>3</sup> yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan (Nurfadilah Ahmad, 2019).

Berkenaan dengan ayat diatas, penulis setuju dengan adanya pemberian nafkah dari suami yang telah dijelaskan oleh para fuqaha dikarenakan nafkah tersebut penting bagi pemenuhan kebutuhan ibu maupun anak.




### G. Kerangka Teori




Gambar 1. Kerangka Teori

### H. Kerangka Konsep



Keterangan :



: Variabel independen




: Variabel yang tidak diteliti



: Variabel dependen



: Hubungan yang diteliti



: Hubungan yang tidak diteliti

Gambar 2. Kerangka Konsep

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Desain Penelitian***

Desain penelitian *case control* merupakan suatu penelitian analitik yang mempelajari sebab – sebab kejadian atau peristiwa secara retrospektif. Dalam bidang kesehatan suatu kejadian penyakit diidentifikasi saat ini kemudian paparan atau penyebabnya diidentifikasi pada waktu yang lalu. Kelompok kasus adalah ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer dan tercatat dalam rekam medik RSIA Ananda Makassar. Sedangkan kelompok kontrol adalah ibu bersalin yang tidak mengalami perdarahan postpartum primer dan tercatat dalam rekam medik RSIA Ananda Makassar.

### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi Penelitian ini dilakukan di RSIA Ananda Makassar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2022.

### ***C. Variabel Penelitian***

#### **1. Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kejadian perdarahan postpartum primer.

#### **2. Variabel Independen**

Variabel Independen dalam penelitian ini ialah pekerjaan dan jarak kelahiran.

#### ***D. Populasi dan Sampel***

##### 1. Populasi

###### a. Populasi Kasus

Populasi kasus pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

###### b. Populasi Kontrol

Populasi kontrol pada penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin yang tidak mengalami perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021.

##### 2. Sampel

###### a. Sampel Kontrol

Sampel kontrol dalam penelitian ini yaitu ibu bersalin yang tidak mengalami perdarahan postpartum primer dan tercatat dalam rekam medik RSIA Ananda Kota Makassar Tahun 2021 dengan ketentuan memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut:

###### 1) Kriteria Inklusi

- a) Ibu bersalin yang tidak terdiagnosa perdarahan postpartum di RSIA Ananda Kota Makassar Tahun 2021.

- b) Informasi dalam rekam medik jelas dan dapat dibaca (data yang mendukung penelitian ini ialah nomor rekam medik, identitas, status gravida, dan riwayat kehamilan sebelumnya).

## 2) Kriteria Ekslusi

- a) Ibu dengan persalinan primigravida

## b. Sampel Kasus

Sampel kasus dalam penelitian ini yaitu ibu bersalin yang mengalami perdarahan postpartum dan tercatat dalam rekam medik RSIA Ananda Kota Makassar Tahun 2021 dengan ketentuan memenuhi kriteria inklusi dan kriteria ekslusi sebagai berikut:

### 1) Kriteria Inklusi

- a) Ibu bersalin yang terdiagnosa perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Kota Makassar Tahun 2021.

- b) Informasi dalam rekam medik jelas dan dapat dibaca (data yang mendukung penelitian ini ialah nomor rekam medik, identitas, status gravida, dan riwayat kehamilan sebelumnya).

- c) Ibu bersalin multigravida.

### 2) Kriteria Ekslusi

- a) Ibu dengan persalinan primigravida.
- b) Ibu bersalin yang memiliki riwayat anemia.

- c) Ibu bersalin yang memiliki riwayat infeksi.
- d) Ibu bersalin yang makrosomia.
- e) Ibu yang mengalami gemelli.
- f) Ibu dengan diagnosa perdarahan postpartum sekunder

Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus besar sampel menurut *Isaac dan Michael*:

$$S = \frac{\lambda^2 NP(1-P)}{d^2 (N-1) + \lambda^2 P(1-P)}$$

Keterangan :

S = Jumlah sampel

$\lambda^2$  = Chi kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Menggunakan derajat kebebasan 1 dengan taraf kesalahan 5%, chi kuadrat = 3,841.

N = Jumlah populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang salah (0,5)

d = Peluang rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bias (0,05)

Pada penelitian ini, jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai berikut :

$$S = \frac{3,841 \times 113 \times 0,5 \times 0,5}{0,0025 \times 112 + 3,841 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$s = \frac{108,508}{1,24025}$$

$$s = 87,09$$

$s = 87,09$  dibulatkan menjadi 87 sampel

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel, maka ditentukan jumlah sampel kasus dan kontrol yaitu dengan perbandingan 1:1. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 174 sampel.

#### **E. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini baik dari sampel kasus dan sampel kontrol dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

#### **F. Teknik Pengolahan/Analisis Data**

##### 1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terdiri dari langkah, yaitu:

##### a. *Editing*

*Editing* atau penyuntingan data adalah tahapan dimana data yang sudah dikumpulkan disunting kelengkapannya.

##### b. *Coding*

*Coding* adalah membuat lembaran kode yang terdiri dari tabel dibuat sesuai dengan data yang diambil dari alat ukur yang digunakan.

c. *Transferring*

*Transferring* yaitu kegiatan memindahkan data ke master tabel.

d. Tabulatin

Tabulasi data adalah membuat penyajian data, sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisis data

Pada tahap ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik SPSS yang meliputi analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat.

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi, frekuensi, dan proporsi dari variabel dependen serta variabel independen.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji Odds Ratio yang bertujuan untuk membandingkan antara kasus dan kontrol terhadap faktor risiko.

c. Analisis Multivariat


Analisis multivariat bertujuan untuk mengetahui variabel independen yang lebih erat kaitannya dengan variabel dependen dengan uji statistik yang digunakan merupakan regresi logistik berganda. Variabel independen dengan nilai OR terbesar yang akan ditetapkan sebagai faktor risiko paling dominan.

**G. Instrumen Penelitian**



Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pihak lain secara tidak langsung. Data ini merupakan data rekam medik mengenai pekerjaan dan jarak persalinan pada pasien multipara Tahun 2021 di RSIA Ananda, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

#### ***H. Metode Pengumpulan Data***



Gambar 3. Metode Pengumpulan Data

### ***I. Etika Penelitian***

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar yang terletak di Jl. Andi Djemma No. 58, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menganalisis hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran dengan pasien perdarahan postpartum primer tahun 2021. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data kemudian data dianalisis sebagai berikut :

##### **1. Analisis Univariat**

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dari variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu 174 yang terdiri dari 87 sampel pada kelompok kasus dan 87 sampel pada kelompok kontrol.

Tabel 4.1 Distribusi Pekerjaan dan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	
	n	%
<b>Pekerjaan</b>		
a. Risiko tinggi (Bekerja):	<b>78</b>	<b>45,8</b>
• PNS/guru/dosen/NAKES/honoror	30	17,2
• Karyawan	40	23
• Wiraswasta	20	11,5
b. Risiko rendah (Tidak Bekerja/IRT)	<b>84</b>	<b>48,3</b>
<b>Jarak Kelahiran</b>		
a. Risiko tinggi	<b>75</b>	<b>43,1</b>
• <2 tahun	5	2,9
• >5 tahun	70	40,2
b. Risiko rendah (2-5 tahun)	<b>99</b>	<b>56,9</b>
<b>Diagnosa</b>		
a. Perdarahan Post Partum Primer	<b>87</b>	<b>50</b>
• Atonia Uteri	16	9,2
• Ruptur perineum	69	39,7
• Rest plasenta	1	0,6
• Retensio plasenta	1	0,6
b. APN	<b>87</b>	<b>50</b>
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>100</b>

(Sumber: SPSS 23, 2023)

Tabel 4.1 menjelaskan bahwa jumlah sampel yaitu 174 yang terdiri dari 87 sampel kasus dan 87 sampel kontrol. Adapun penyebab perdarahan postpartum primer terdiri dari atonia uteri berjumlah 16 orang (9,2%), ruptur perineum berjumlah 69 orang (39,7%), rest plasenta berjumlah 1 orang (0,6%) dan retensio plasenta berjumlah 1 orang (0,6%). Adapun variabel independen yakni ibu bersalin yang bekerja sebanyak 78 orang (45,8%) dengan distribusi jenis

pekerjaan yakni PNS/Guru/Dosen/Nakes/Honorer berjumlah 30 orang (17,2%), karyawan berjumlah 40 orang (23%) dan Wiraswasta 20 orang (11,5%) sedangkan berisiko rendah (tidak bekerja) sebanyak 84 orang (48,3%). Ibu dengan jarak kelahiran yang berisiko tinggi yaitu 75 orang (43,1%) dengan jarak < 2 tahun berjumlah 5 orang (2,9%) dan jarak > 5 tahun berjumlah 70 orang (40,2%) serta berisiko rendah (2-5 tahun) 99 orang (56,9%).

## 2. Analisis Bivariat

### a. Hubungan Pekerjaan dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer

Tabel 4.2 Hubungan Pekerjaan dengan Pasien Perdarahan Postpartum

Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Pekerjaan	Kasus		Kontrol		Total		P-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko tinggi	63	72,4	27	31,0	90	51,7	0,000	5,833	3,034	11,216
Risiko rendah	24	27,6	60	69	84	48,3				
Total	87	100,0	87	100,0	174	100,0				

(Sumber: SPSS 23, 2023)

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa ibu yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yang berjumlah 63 orang (72,4%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 27 orang (31%).

Dari hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 5,833 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 3,034 dan *Upper limit* (UL) sebesar

11,216. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu yang bekerja memiliki risiko 5,833 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja/IRT.

a. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer

Tabel 4.3 Hubungan Jarak Kelahiran dengan Pasien Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Jarak Kelahiran	Kasus		Kontrol		Total		p-value	OR	CI 95%	
	n	%	n	%	n	%			Lower	Upper
Risiko tinggi	51	58,6	24	27,6	75	56,9	0,000	3,719	1,971	7,016
Risiko rendah	36	41,4	63	72,4	99	43,1				
Total	87	100,0	87	100,0	174	100,0				

(Sumber: SPSS 23, 2023)

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa ibu yang berisiko tinggi lebih banyak terjadi pada kelompok kasus yakni berjumlah 51 orang (58,6%) dibandingkan dengan kelompok kontrol yang berjumlah 24 orang (27,6%). Dari hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,719 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,971 dan *Upper limit* (UL) sebesar 7,016. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu yang memiliki jarak kelahiran berisiko tinggi memiliki risiko 3,719 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan ibu dengan risiko

jarak kelahiran rendah. Nilai  $p$   $0,000 < 0,05$  menunjukkan terdapat hubungan antara jarak kelahiran dengan kejadian perdarahan postpartum primer.

### 3. Analisis Multivariat

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda Logistik Variabel Independen yang Paling Memengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum Primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021

Variabel	Nilai p-value	OR	CI 95%
Jarak kehamilan	0,000	4,008	1,978-8,120
Pekerjaan	0,000	6,178	3,076-12,412

(Sumber: SPSS 23, 2023)

Tabel 4.4 menjelaskan hasil uji multivariat dengan menggunakan uji regresi berganda logistik. Variabel yang diikutkan adalah variabel dengan nilai  $p < 0,25$ . Adapun hasil analisis multivariat didapatkan pekerjaan paling berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer dengan nilai  $p = 0,000$  serta nilai OR 6,178 (CI 95% = 3,076 – 12,412).

## B. Pembahasan

### 1. Hubungan Pekerjaan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer

Dari hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 5,833 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 3,034 dan *Upper limit* (UL) sebesar 11,216. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu yang bekerja berisiko tinggi

memiliki risiko 5,833 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja/IRT. Hal ini berarti pekerjaan memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pitriani pada tahun 2017 di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau dengan jumlah sampel 144 yang terdiri dari 72 sampel kasus dan 72 sampel kontrol yang menyatakan bahwa pekerjaan memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum dengan nilai  $OR=7,600$  ( $CI\ 95\% = 3,587-16,101$ ) dengan nilai  $p=0,000$ . Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Tangahu tahun 2018 di RSUD Undata Palu dengan jumlah sampel 74 yang terdiri dari 37 sampel kasus dan 37 sampel kontrol yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer dengan hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% memiliki nilai  $p = 1,000$ .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pekerjaan memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena ibu yang bekerja memiliki aktivitas tambahan yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan juga janin semasa dalam kandungan. Aktivitas berlebih dan tuntutan pekerjaan pada ibu hamil dapat mengakibatkan kurangnya waktu istirahat yang cukup, stress dan nutrisi yang tidak adekuat sehingga berdampak negatif bagi kesehatan ibu dan janinnya.



## 2. Hubungan Jarak Kelahiran dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer

Hasil analisis diperoleh *Odds Ratio* (OR) sebesar 3,719 pada CI 95% dengan *lower limit* (LL) sebesar 1,971 dan *Upper limit* (UL) sebesar 7,016. Jadi dapat disimpulkan bahwa ibu yang memiliki jarak kelahiran berisiko tinggi memiliki risiko 3,719 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer dibandingkan dengan ibu dengan risiko jarak kelahiran rendah. Nilai Lower limit dan Upper limit dengan tingkat kepercayaan 95% (CI 95% = 1,971-7,016) dengan  $p < 0,000 < 0,05$  sehingga nilai 3,719 dianggap memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Tangahu pada tahun 2018 di RSUD Undata Palu dengan jumlah sampel 74 yang terdiri dari 37 sampel kasus dan 37 sampel kontrol yang menyatakan bahwa jarak kelahiran memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer dengan hasil uji chi square dengan tingkat kepercayaan 95% memiliki nilai  $p < 0,001$ . Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh K Irene Martha pada Tahun 2018 di Rumah Sakit yang ada di kabupaten Temanggung dengan jumlah sampel 110 yang terdiri dari 55 sampel kasus dan 55 sampel kontrol yang menyatakan bahwa jarak kelahiran memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer dengan nilai  $OR=2,67$  (CI 95% = 1,14-6,26,  $p=0,022$ ).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jarak kelahiran memiliki hubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer. Menurut peneliti, hal ini disebabkan karena jarak kehamilan yang terlalu dekat berisiko terhadap keadaan ibu dan janin.

Uterus akan pulih kembali 6 bulan setelah melahirkan namun fungsinya belum bekerja secara maksimal dan persalinan yang berturut-turut dalam jangka waktu yang singkat akan mengakibatkan kontraksi uterus menjadi kurang baik yang berdampak pada peningkatan risiko terhadap komplikasi kehamilan salah satunya ialah perdarahan postpartum. Jarak persalinan yang panjang juga dapat menyebabkan risiko morbiditas ibu yang tinggi, bahkan dalam beberapa studi dikatakan bahwa jarak persalinan yang panjang memiliki lebih banyak efek samping dibandingkan dengan jarak persalinan yang pendek. Diantaranya adalah preeklampsia, perdarahan dan demam intrapartum (Dewie, 2020).

### 3. Hasil Analisis Uji Multivariat

Uji multivariat menggunakan uji regresi logistik berganda dimana kedua variabel diikutkan karena memiliki nilai  $p < 0,25$ . Adapun hasilnya ialah pekerjaan paling berhubungan dengan kejadian perdarahan postpartum primer dengan nilai  $p=0,000$  serta nilai OR 6,178 (CI 95% = 3,076 – 12,412).

Pekerjaan terkait pada status sosial ekonomi dan aktifitas fisik ibu hamil. Dengan keterbatasan status sosial ekonomi akan berpengaruh terhadap keterbatasan dalam mendapatkan pelayanan antenatal yang adekuat, pemenuhan gizi, sementara itu ibu hamil yang bekerja cenderung cepat lelah sebab aktifitas fisiknya meningkat karena memiliki tambahan pekerjaan/kegiatan di luar rumah. Pekerjaan fisik banyak dihubungkan dengan peranan seorang ibu yang mempunyai pekerjaan tambahan di luar pekerjaan rumah tangga dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Beratnya pekerjaan ibu selama kehamilan dapat menimbulkan terjadinya perdarahan pasca persalinan karena kurangnya waktu beristirahat bagi ibu.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yaitu hubungan pekerjaan dan jarak kelahiran dengan pasien perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Ibu yang bekerja memiliki risiko 5,833 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja/IRT.
2. Ibu yang memiliki jarak kelahiran berisiko tinggi memiliki risiko 3,719 kali mengalami kejadian perdarahan postpartum primer di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021 dibandingkan dengan ibu dengan risiko jarak kelahiran rendah.

#### **B. Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu menambahkan variasi variabel sehingga didapatkan gambaran secara keseluruhan agar data dapat dimanfaatkan oleh instansi kesehatan dalam merencanakan penyusunan strategi dalam menurunkan angka kejadian perdarahan postpartum primer.
2. Bagi petugas kesehatan agar melakukan pencatatan dan pelaporan yang lengkap sehingga memudahkan peneliti untuk meneliti suatu kasus.

3. Bagi masyarakat terkhusus ibu hamil menyiapkan diri dan melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap kejadian perdarahan postpartum primer.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aida Fitria, dan Jitasari Sibero, R. M. S, "Determinant Factor Of Mother With Postpartum hemorrhage At Madani Clinic Of Subulussalam City Period 2018-2019," *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika* 3,no. 2 (2020):h 1-11
- Alfisyar, F. "Hubungan Perdarahan Post Partum Dengan Anemia Pada Kehamilan Di Rsud Kota Mataram Febi", *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan* 6, no.2 (2020) :h 254-259
- Budiman dan Mayasari, D,"Perdarahan Post Partum Dini e . c Retensio Plasenta Early Post Partum Haemorrhage e . c Retensio Plasenta",*J Medula Unila* 7,no.3 (2017) :h 6-10
- Damayanti, D. S., dan Wati, D. F,"Hubungan Perineum Massage, Paritas, Dan Berat Badan Bayi Baru Lahir Dengan Kejadian Rupture Perineum",*Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (Jukmas)* 5, no.1(2021) :h 52-60
- Dewie, A, dkk,"Jarak Persalinan Berhubungan Dengan Perdarahan Postpartum Di RSUD Undata Palu Tahun 2017-2018", *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan* 16, no.2 (2020) :h 111-118
- Dr. dr. Sarma, Lumbanraja. *Kegawat daruratan Obstetri*. Medan: USU press. 2017
- Fitrianingsih, dkk,"Hubungan Antara Pengetahuan, Pendapatan dan Pekerjaan Ibu Dengan Kehamilan Risiko Tinggi di Puskesmas Kecamatan Denpasar Basar Tahun 2018",*Jurnal Ilmiah Kebidanan* 7, no.2 (2019):h 99-108
- Hardiana,"Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Retensio Plasenta Di Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2019",*Scientia Journal* 8, no.1(2019) :h 169-174
- Hidayah, P dkk,"Hubungan Tingkat Risiko Kehamilan dengan Kejadian Komplikasi Persalinan di RSUD Panembahan Senopati Bantul",*Jurnal Kesehatan Vokasional* 3, no.1 (2018) :h 35-43

- Julieta, N. P. N., dan Widiastuti Giri, M. K "Postpartum Hemorrhage: Kegawatdaruratan dalam Persalinan Ibu Hamil", *Ganesha Medicine* 1, no.1(2021) :h 48-65
- Kumalasari, R., dan Widiastuti, F. "Risiko Atonia Uteri Terhadap Perdarahan Post Partum pada Ibu Bersalin", *Jurnal Publikasi Kebidanan* 13,no.1(2022) :h 1-11
- K Irene Martha,dkk. "Beberapa Faktor Kejadian Perdarahan Postpartum Ibu Bersalin yang Dirawat Di Rumah Sakit",*Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas* 3 no.1 (2018): h 7-17
- Lestari,dkk, "Faktor Risiko Kejadian Atonia Uteri", *Pedimaternal Nursing Journal* 5,no.2 (2020) :h 189-196
- Ieu Baktiar." Dampak Peyapihan Menurut Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologi Anak Masa Kini",*Jurnal Kependidikan dan Keislaman* 10 no. 2 (2021): h 128-148
- Maesaroh, S., dan Iwana, I. P, "Hubungan Riwayat Anemia Dan Jarak Kelahiran Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek,*Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram* 3, no.1 (2018) :h 21-25
- Marsofely,dkk. "Faktor Risiko Hemorrhage Pasca Post Partum", *Jurnal Media Kesehatan* 11 no. 1(2018): 12-19
- Minister of Health Republic of Indonesia. *Indonesia Health Profile 2020*. In Jakarta. (2020)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, (2012)
- Muzakir, dkk. "Analisis Faktor Risiko Kelelahan Pekerjaan dan Non-Pekerjaan pada Ibu Hamil", *Jurnal Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan* 2, no.1 (2021) :h 46-54
- Nuraeni, R., dan Wianti, A, "Hubungan antara Umur, Paritas, dan Interval Persalinan

pada Kejadian Perdarahan Postpartum akibat Atonia Uteri Di RSUD Majalengka Tahun 2017", *J. Keperawatan Dan Kesehatan Medisina Akper Ypib Majalengka* 4, no.2 (2018) :h 1-11

Nurkhalizah, S dkk, "Penyebab Perdarahan Ibu Postpartum", *Nusantara Hasana Journal* 1, no.1(2021) :h 34-39

Nurfadilah Ahmad,dkk. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad",*Mahkamah*, 4 no.1 (2019): h 107-119

Prawirohardjo, S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta K PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2010

Pitriani, R,"Factors Related to Post Partum Hemorrhage Event in Camar II Room RSUD Arifin Achmad Riau Province 2016",*Menara Ilmu* 9, no. 74 (2017) :h 173-177

Puteri, M. D,"Karakteristik Penyebab Perdarahan Post Partum Primer Pada Ibu Bersalin" *Jurnal Kajian Ilmiah Kesehatan Dan Teknologi* 3,no.1 (2021) :h 30-36

Raynaldi,dkk." Analisis Faktor Kejadian Perdarahan Post Partum Di RSUD DR. Doris Sylvanus Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah", *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 9 no.2 (2018):h 352-365

Respati, S. H,dkk, "Analisis Faktor Determinan Kematian Ibu di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia", *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 6, no.2 (2019) :h 52-59

Simanjuntak, L,"Perdarahan Postpartum (Perdarahan Paskasalin)",*Jurnal Visi Eksakta* 1, no.1 (2020) :h 1-10

Susiana, S.,"Angka Kematian Ibu : Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganannya", *Bidang Kesejahteraan Sosial* 9, no. 24 (2019) :h 13-18

Yuliati, A dkk,"Beberapa Faktor Kejadian Perdarahan Postpartum Ibu Bersalin Yang Dirawat Di Rumah Sakit", *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas* 3 no.1. (2018)



:h 8-17

Wahid I,dkk. “Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Pada Ibu Bersalin di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin”, *Dinamika Kesehatan Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 10 no.2. (2019): h 546-560



## LAMPIRAN

### A. Lampiran I

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.328/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Nur Reski Annisa A  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan Pekerjaan Dan Jarak Kelahiran Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Primer Di Rsia Ananda Makassar Tahun 2021"**

\*\*\*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards. 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023.

*This declaration of ethics applies during the period October 6th, 2022 until October 6th, 2023.*

October 6th, 2022  
Chairperson,  
Drs. Dedy D. Syahrah, Sp.A., M.Kes



## B. Lampiran II



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>10203/S.01/PTSP/2022</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <u><b>Izin penelitian</b></u>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 328 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 27 September 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NUR RESKI ANNISA A</b>
Nomor Pokok	: 70600119030
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN PEKERJAAN DAN JARAK KELAHIRAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM PRIMER DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2021 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Oktober s/d 30 November 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 30 September 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

### C. Lampiran III

#### Frequencies

		Jenis_Pekerjaan
N	Valid	174
	Missing	0
Mean		3.02
Std. Deviation		1.190

#### Frequency Table

##### Gravida

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Vali multigravida	174	100.0	100.0	100.0

UNIVERSITAS ALAUDDIN Makassar  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

**Jenis\_Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS/guru/dokter/perawat/honororer	30	17.2	17.2	17.2
Karyawan	40	23.0	23.0	40.2
Wiraswasta	20	11.5	11.5	51.7
IRT	84	48.3	48.3	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**Pekerjaan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Risiko tinggi (Bekerja)	90	51.7	51.7	51.7
Risiko rendah (IRT)	84	48.3	48.3	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**Jenis\_Pekerjaan\_Kasus**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Vali PNS/guru/dokter/perawat/ honoror	21	24.1	24.1	24.1
Karyawan	19	21.8	21.8	46.0
Wiraswasta	7	8.0	8.0	54.0
IRT	40	46.0	46.0	100.0
Total	87	100.0	100.0	

### Jenis\_Pekerjaan\_Kontrol

	Frequen c y	Percent	Valid Perc ent	Cumulativ e Per cent t
Vali PNS/guru/dokter/perawat/ honoror	7	8.0	8.0	8.0
Karyawan	18	20.7	20.7	28.7
Wiraswasta	6	6.9	6.9	35.6
IRT	56	64.4	64.4	100.0
Total	87	100.0	100.0	

### Jarak\_Kehamilan\_

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Perce nt
Vali <2 tahun	5	2.9	2.9	2.9
2-5 tahun	99	56.9	56.9	59.8

>5 tahun	70	40.2	40.2	100.0
Total	174	100.0	100.0	

### Jarak\_Kehamilan\_Kasus

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <2 tahun	4	4.6	4.6	4.6
2-5 tahun	37	42.5	42.5	47.1
>5 tahun	46	52.9	52.9	100.0
Total	87	100.0	100.0	

### Jarak\_Kehamilan\_Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <2 tahun	1	1.1	1.1	1.1
2-5 tahun	65	74.7	74.7	75.9
>5 tahun	21	24.1	24.1	100.0
Total	87	100.0	100.0	

### Diagnosis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PPH	87	50.0	50.0	50.0
APN	87	50.0	50.0	100.0
Total	174	100.0	100.0	

**Diagnosis\_PPH**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Atonia Uteri	16	9.2	18.4	18.4
Ruptur perineum	69	39.7	79.3	97.7
Rest plasenta	1	.6	1.1	98.9
Retensio plasenta	1	.6	1.1	100.0
Total	87	50.0	100.0	
Missing System	87	50.0		
Total	174	100.0		

**Crosstabs**

**Jarak\_Kehamilan \* Diagnosis**

**Crosstab**

Count

	Diagnosis		Total
	PPH	APN	



Jarak_Kemihalaan	Risiko Tinggi (<2 tahun dan > 5 tahun)	51	24	75
	Risiko Rendah (2-5 tahun)	36	63	99
Total		87	87	174

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.084 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	15.842	1	.000		
Likelihood Ratio	17.399	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	16.985	1	.000		
N of Valid Cases	174				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37.50.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jarak_Kehamilan (Risiko Tinggi (<2 tahun dan >5 tahun) / Risiko Rendah (2-5 tahun))	3.719	1.971	7.016
For cohort Diagnosis = PPH	1.870	1.381	2.533
For cohort Diagnosis = APN	.503	.350	.722
N of Valid Cases	174		

M A K A S S A R

### Jenis\_Pekerjaan \* Diagnosis

#### Case Processing Summary

	Cases		
	Valid	Missing	Total

**Pekerjaan \* Diagnosis Crosstabulation**

Count				N	Percent	
		Diagnosis		Total	174	100.0%
		PPH	APN			
Pekerjaan	Risiko tinggi (Bekerja)	63	27	90		
	Risiko rendah (IRT)	24	60	84		
Total		87	87	174		

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymptotic Signifi- cance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi- Square	29.829 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	28.194	1	.000		
Likelihood Ratio	30.750	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Associatio n	29.657	1	.000		
N of Valid Cases	174				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 42.00.

b. Computed only for a 2x2 table

### Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Pekerjaan (Risiko tinggi (Bekerja) / Risiko rendah (IRT))	5.833	3.034	11.216
For cohort Diagnosis = PPH	2.450	1.702	3.526
For cohort Diagnosis = APN	.420	.298	.592
N of Valid Cases	174		

### Logistic Regression

#### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>	N	Percent
Selected Included in C Analysis	174	100.0
a s Missing Cases	0	.0
e s Total	174	100.0
Unselected Cases	0	.0

Total	174	100.0
-------	-----	-------

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable  
Encoding**

Original Value	Internal Value
PPH	0
APN	1

**Block 0: Beginning Block**

**Classification Table<sup>a,b</sup>**

Observed	Predicted		
	Diagnosis		Percentage Correct
	PPH	APN	
Step 0 Diagnosis PPH	0	87	.0
APN	0	87	100.0
Overall Percentage			50.0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step Constant	.000	.152	.000	1	1.000	1.000

### Variables not in the Equation

	Score	df	Sig.
Step 0 Variables Jarak_Kehamilan	17.084	1	.000
Pekerjaan	29.829	1	.000
Overall Statistics	42.911	2	.000

**Block 1: Method = Backward Stepwise (Likelihood Ratio)**

### Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	46.726	2	.000
Block	46.726	2	.000
Model	46.726	2	.000

### Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	194.489 <sup>a</sup>	.236	.314

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	.336	2	.845

### Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

	Diagnosis = PPH		Diagnosis = APN		Total
	Observed	Expected	Observed	Expected	
S 1	37	36.195	6	6.805	43
2	26	26.805	21	20.195	47
3	14	14.805	18	17.195	32
4	10	9.195	42	42.805	52

### Classification Table<sup>a</sup>

Observed	Predicted		
	Diagnosis		Percentage Correct
	PPH	APN	
S Diagnosis PPH	63	24	72.4
APN	27	60	69.0
Overall Percentage			70.7

a. The cut value is .500

### Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)		
Jarak_Kehamilan	1.388	.360	14.847	1	.000	4.008		
Pekerjaan	1.821	.356	26.191	1	.000	6.178		
Constant	-4.881	.860	32.202	1	.000	.008		

### Variables in the Equation

		95% C.I. for EXP(B)	
		Lower	Upper
Step 1 <sup>a</sup>	Jarak_Kehamilan	1.978	8.120
	Pekerjaan	3.076	12.410
	Constant		

a. Variable(s) entered on step 1: Jarak\_Kehamilan, Pekerjaan.

### Correlation Matrix

	Constant	Jarak_Kehamilan	Pekerjaan
SConstant	1.000	-.774	-.731
Jarak_Kehamilan	-.774	1.000	.183



Pekerjaan	-.731	.183	1.000
-----------	-------	------	-------

**Model if Term Removed**

Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
SJarak_Kehamilan	-105.232	15.976	1	.000
Pekerjaan	-111.908	29.327	1	.000



**D. Lampiran V (Dokumentasi Penelitian)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

1. Nama : Nur Reski Annisa A
2. NIM : 70600119030
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Takalar/08 Oktober 2001
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Cluster Balla Insinyur, Kab Gowa
8. Orang Tua :
  - a. Ayah : Abd Azis
  - b. Ibu : Musdalifah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN No.23 Centre Takalar
2. SMP : SMPN 1 Takalar
3. SMA : SMAN 1 Takalar
4. Tahun 2019 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Dokter.