

HUBUNGAN ANEMIA DENGAN KEJADIAN ABORTUS PADA IBU

HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2021-2022



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kedokteran
pada Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NURFAUZIAH AZZAHRAH

NIM: 70600119008

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurfauziah Azzahrah
NIM : 70600119008
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 09 Juli 2001
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Mannuruki II Lorong 4a
Judul : Hubungan Anemia dengan Kejadian
Abortus pada Ibu Hamil di RSIA
Ananda Makassar Tahun 2021-2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Maret 2023

Penyusun



Nurfauziah Azzahrah

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Pembimbing penulisan skripsi Nurfauziah Azzahrah, NIM: 70600119008, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: “Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 2 Maret 2023

Pembimbing 1



Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes

Pembimbing 2



dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp. PK

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022*" yang disusun oleh Nurfauziah Azzahrah, NIM: 70600119008, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, bertepatan dengan 4 Sya'ban 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Pendidikan Dokter.

Makassar, 2 Maret 2023

9 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. dr. Rosdianah., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. Rosdianah., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK	(.....)
Penguji I	: dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M.A	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW sebagai *Rahmatan Lil'alam* beserta para sahabat Nabi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Burhanuddin Bohari dan ibunda Purniawaty. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan hormat atas dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D dan seluruh jajarannya atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyelesaian penelitian ini.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.


3. dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto M.Kes., MARS., Sp. JP selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. dr. Rosdianah, M.Kes selaku pembimbing I dan dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. dr. Azizah Nurdin, Sp. OG., M.Kes selaku penguji I dan Prof. Dr. Abd. Rahim Yunus, M.A selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu membimbing penulis baik dalam bentuk arahan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Teman-teman PA yang selalu menemani, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta memberikan banyak masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal ini.
7. Teman-teman RH yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat melalui semua tantangan dengan baik.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari segala pihak. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian proposal ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 13 Februari 2023



Nurfauziah Azzahrah
NIM : 70600119008


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian.....	11
G. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Anemia pada kehamilan	14
1. Definisi Anemia pada Ibu Hamil.....	14
2. Epidemiologi Anemia pada Ibu Hamil	15
3. Etiologi Anemia pada Ibu Hamil.....	15
4. Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil.....	16
5. Klasifikasi Anemia pada Ibu Hamil	20
6. Patomekanisme Anemia pada Ibu Hamil	21
7. Gejala Anemia	22
8. Penegakan Diagnosis Anemia pada Ibu Hamil	23
9. Tatalaksana Anemia pada Ibu Hamil.....	24

10. Komplikasi Anemia pada Ibu Hamil	25
11. Prognosis Anemia pada Ibu Hamil	25
12. Pandangan Islam mengenai Anemia.....	25
B. Abortus	27
1. Definisi Abortus	27
2. Epidemiologi Abortus	27
3. Etiologi Abortus	28
4. Faktor Risiko Abortus	30
5. Patomekanisme Abortus.....	34
6. Klasifikasi abortus	35
7. Penegakan Diagnosis Abortus	42
8. Tatalaksana Abortus	44
9. Komplikasi Abortus.....	47
10. Prognosis Abortus.....	48
11. Pandangan Islam mengenai Abortus	48
12. Kerangka Teori	51
13. Kerangka Konsep	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
C. Populasi dan Sampel.....	53
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Instrumen Penelitian	56
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
G. Alur Penelitian	58
H. Etika Penelitian	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan.....	64
D. Keterbatasan Penelitian.....	66


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	6
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik sosiodemografi pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022	61
Tabel 4.3 Hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022	63




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Abortus iminens	36
Gambar 2.2 Abortus insipiens	37
Gambar 2.3 Abortus inkomplit	38
Gambar 2.4 Abortus komplit	39
Gambar 2.5 <i>Missed abortion</i>	40




DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	51
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	52
Bagan 3.1 Alur Penelitian	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil SPSS	74
Lampiran 2 : Etik Penelitian	78
Lampiran 3 : Izin Penelitian	79
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	80
Lampiran 5 : Dokumentasi	81



ABSTRAK

Nama : Nurfauziah Azzahrah
NIM : 70600119008
Judul : Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di
RSIA Ananda Makassar

Abortus adalah kondisi kehamilan yang berakhir ketika usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau janin belum dapat hidup diluar kandungan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2021-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik observasional pendekatan *case control study*. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* terbagi atas 102 sampel kasus dan 102 sampel kontrol. Data terdiri diperoleh dari rekam medik RSIA Ananda Makassar tahun 2021-2022. Anemia sebagai variabel independen dan abortus sebagai variabel dependen. Data dianalisa dengan uji univariat serta uji bivariat dengan uji *chi-square*. Hasil penelitian diperoleh nilai *p-value* 0,004 ($p < 0,05$) dan nilai OR 3,312 . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah anemia berhubungan secara signifikan dengan kejadian abortus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.

Kata kunci: *Anemia, Abortus*



ABSTRACT

Name : Nurfauziah Azzahrah
NIM : 70600119008
Title : Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di
RSIA Ananda Makassar

Abortion is a condition of pregnancy that ends when the gestational age is less than 20 weeks or the fetus has not been able to live outside the womb. The purpose of this study was to determine the relationship between anemia and the incidence of abortion in pregnant women at the Ananda Mother and Child Hospital Makassar in 2021-2022. This type of research is analytic observational research with a case control study approach. The sampling method used purposive sampling was divided into 102 case samples and 102 control samples. The data consists of medical records at RSIA Ananda Makassar for 2021-2022. Anemia as the independent variable and abortion as the dependent variable. Data were analyzed by univariate test and bivariate test by chi-square test. The research results obtained a p-value of 0.004 ($p < 0.05$) and an OR value of 3.312. The conclusion in this study is that anemia is significantly related to the incidence of abortion at RSIA Ananda Makassar in 2021-2022.

Keywords: Anemia, Abortion



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017 di dunia adalah 810 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2019). AKI di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara dan keempat di Wilayah Asia Pasifik (Fairuz & Suhair, 2019). AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (Melani, 2019).

Jumlah kematian ibu di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020 mencapai 4.627 kematian, meningkat pada tahun 2021 sebesar 7.389 kematian. Di Indonesia, menurut data pada tahun 2020, penyebab AKI terbanyak adalah perdarahan yang mencapai 1.320 kasus, hipertensi 1.110 kasus serta infeksi 207 kasus. Peningkatan risiko AKI juga dapat disebabkan kondisi anemia pada ibu hamil (Kemenkes RI, 2021).

Angka kematian ibu di Sulawesi Selatan berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia 2021 memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 80 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian sebesar 133 kematian dan pada tahun 2021 adalah 135 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian mencapai 195 kematian (Kemenkes RI, 2021).

Anemia menjadi masalah dunia, dialami pada 41,8% ibu hamil. Anemia pada ibu hamil merupakan kondisi seseorang dengan kadar hemoglobin yang rendah, dapat bermanifestasi klinis berupa lemas, pucat, pusing serta takikardi atau jantung berdebar kencang (Fajrin F.I, 2020).

Prevalensi anemia di Indonesia, pada ibu hamil berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 tercatat sekitar 48,9% kasus anemia pada ibu hamil, lebih banyak terjadi pada ibu hamil umur 15-24 tahun dengan presentase 84,6% (Kemenkes RI, 2020). Data Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2017 mencapai 7,29%. Kasus terbanyak pada Puskesmas Sudiang Raya mencapai 30,5% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 29,1% kasus anemia pada ibu hamil (Syarfaini et al., 2019). Ibu hamil dikategorikan anemia apabila kehamilan trimester pertama dan ketiga kadar Hb ibu <11 g/dl dan trimester kedua < 10,5 g/dl (Nurdin *et al.*, 2020).

Ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berkurang maka hal ini akan menyebabkan kemampuan darah untuk mengikat dan membawa oksigen berkurang serta zat nutrisi yang dibawa oleh eritrosit (sel darah merah) juga berkurang. Ibu hamil yang mengalami anemia paling sering diakibatkan karena kurangnya asupan zat besi, hal ini dapat menyebabkan asupan zat besi pada janin juga akan berkurang utamanya pada trimester awal. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya abortus pada ibu hamil (Akbar & Medan, 2019).

Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perlunya manusia memperhatikan makanan yang ia konsumsi, hal ini dijelaskan dalam Q.S Abasa/80:24 yaitu :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤

Terjemahnya :

“ Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”

Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 15, ayat ini menegaskan bahwa manusia belum menyelesaikan tugasnya, kini diuraikan anugerah Allah kepada manusia dalam hidup ini yang berupa pangan, sekaligus \mengisyaratkan bahwa itu merupakan dorongan untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna, maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya memerhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya., kemudian Kami belah bumi, yakni merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, lalu Kami tumbuhkan padanya, yakni di bumi itu, biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran dan juga pohon zaitun serta pohon kurma, dan kebun-kebun yang lebat, serta buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu (Shihab, 2017).

Abortus merupakan kondisi terjadinya pengeluaran hasil konsepsi atau berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

Abortus terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau sebelum janin memiliki berat 500 gram (Prawirohardjo,2020).

Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021, jumlah kematian ibu menurut penyebabnya didapatkan data bahwa perdarahan menjadi penyebab pertama kematian ibu dengan total kasus 1.320 (Kemenkes RI, 2021). Perdarahan merupakan salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan. Perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan muda berkaitan dengan kejadian abortus serta dapat menyebabkan anemia, syok hingga kematian. Angka kejadian abortus di dunia mencapai 35 per 1000 wanita dengan usia 15-44 tahun (Wulandari *et al*, 2022).

Faktor risiko penyebab terjadinya abortus salah satunya adalah anemia, anemia yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi besi. Zat besi memiliki peran pada proses hematopoiesis dalam tubuh yaitu sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan dalam sintesis Hb di dalam eritrosit. Ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi besi akan menyebabkan asupan zat besi pada janin berkurang hingga akhirnya akan meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil yang <20 minggu (Akbar & Medan, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas diketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih terus meningkat tiap tahunnya dengan penyebab terbanyak adalah perdarahan. Wilayah Sulawesi Selatan utamanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar didapatkan kasus abortus tahun 2021-2022 sebanyak 138 kasus dan kasus anemia pada

ibu hamil sebanyak 137 kasus. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022?

C. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar .

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Anemia pada Ibu Hamil	Anemia pada ibu hamil merupakan suatu kondisi ibu hamil dengan kadar hemoglobin yang menurun kurang dari 11 g/dl (Fatimah & Kania, 2019). Gejala yang dapat dirasakan yaitu lemas, mudah lelah,	Data rekam medis pasien	1. Anemia: kadar Hb < 11 g/dl. 2. Tidak anemia: kadar Hb ≥ 11 g/dl.	Nominal

		kaki terasa dingin, mata berkunang-kunang, kuku sendok dan sulit menelan (Bakta, 2017).			
Variabel Dependen					
2.	Abortus	Abortus merupakan ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan <20 minggu atau berat lahir <500 (Prawirohardjo, 2020).	Data rekam medis pasien	1. Mengalami abortus 2. Tidak mengalami abortus	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan membahas hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil dengan melihat data rekam

medik pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar tahun 2021.

E. Kajian Pustaka

1. Jayani Indah (2017) dengan judul “ *Tingkat Anemia Berhubungan dengan Kejadian Abortus pada Ibu Hamil*”. Desain penelitian pada penelitian ini adalah analitik korelasional dengan pendekatan *crosssectional*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode *survey* dengan menggunakan data primer. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 77 ibu hamil dengan teknik *simple random sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu lembar pengumpulan data, uji validitas menggunakan *construct validity*. Hasil penelitian didapatkan bahwa ibu hamil yang mengalami anemia berat dapat mengakibatkan abortus pada sebanyak 25 orang (59,5%), dengan hasil analisa data menggunakan uji *spearman rank* didapatkan nilai $p\text{-value} = 0,00 < \alpha = 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode pengambilan data yaitu *survey* dengan menggunakan data primer, berbeda dengan data yang saya gunakan yaitu data sekunder. Analisa data pada penelitian ini menggunakan *spearman rank* berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan.
2. Astuty Puji, Aris Budiarti (2021) dengan judul “ *Hubungan Usia Ibu Hamil dan Kadar Haemoglobin Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus*

di Wilayah Kerja PMB Endah Retno Pratiwi, S.ST Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 ibu hamil. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisisioner dalam hal ini menggunakan data primer. Analisis data menggunakan tabulasi silang serta menggunakan model regresi linier. Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara usia ibu hamil (X1) dengan kejadian abortus (Y) dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ yaitu $12,953 > 2,042$. Variabel kadar hemoglobin (X2) dengan kejadian abortus (Y) sebesar 0,902, maka kesimpulannya usia ibu hamil dan kadar Hb mempengaruhi kejadian abortus sebesar 9,8%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu *accidental sampling* berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu menggunakan *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 30 sampel berbeda dengan sampel pada penelitian yang akan saya lakukan.

3. Sivia A, et al (2022) dengan judul “*Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Abortus di Wilayah Kerja PKM Burnai Mulya*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengambilan sampel menggunakan *random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 98 responden. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu

checklist dengan analisa uji *Chi Square*. Hasil penelitian menggunakan uji *Chi Square* variabel anemia yaitu *p-value* $0,000 < \alpha = 0,05$ artinya ada hubungan antara anemia dengan abortus, hasil uji status gizi yaitu *p-value* $0,025 < \alpha = 0,05$ artinya terdapat hubungan antara status gizi dengan abortus dan variabel riwayat abortus yaitu *p-value* $0,002 < \alpha = 0,05$ artinya terdapat hubungan antara riwayat abortus dengan kejadian abortus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *cross sectional* sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, saya menggunakan pendekatan *case control*. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *random sampling* sedangkan pada penelitian saya menggunakan *purposive sampling*.

4. Kamila Nurul Auliya (2021) dengan judul “*Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus di Puskesmas Tanjung Karang Mataram*”. Penelitian ini menggunakan metode analitik observational dengan pendekatan waktu *crosssectional*. Teknik pengambilan sampel yaitu *sistematik random sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 ibu hamil. Instrumen penelitian menggunakan data primer dan dari buku KIA ibu atau buku registrasi bidan (data sekunder). Hasil yang didapatkan melalui uji *Chi Square* didapatkan hasil *p value* 0,017 ($p < 0,05$), artinya terdapat hubungan yang bermakna antara anemia dalam kehamilan dengan kejadian abortus di PKM Tanjung

Karang Tahun 2019. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *cross sectional* sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan, saya menggunakan pendekatan *case control*. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *random sampling* sedangkan pada penelitian saya menggunakan *purposive sampling*.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2021-2022.

2. Tujuan Khusus :

- a. Mengetahui angka kejadian anemia pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
- b. Mengetahui angka kejadian abortus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
- c. Mengetahui distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik sosiodemografi pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
- d. Mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian, pendidikan dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bidang kesehatan utamanya mengenai anemia pada ibu hamil dengan kejadian abortus.

2. Manfaat Bagi Pengetahuan

Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat utamanya pada ibu hamil dan keluarganya tentang anemia meliputi apa itu anemia, penyebab, faktor risiko anemia, cara mendeteksi anemia, gejala yang dapat timbul dan bagaimana cara mencegah anemia. Ibu hamil juga dapat lebih memahami tentang abortus meliputi apa itu abortus, penyebab dan faktor risiko abortus, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut agar ibu hamil dapat lebih memperhatikan kondisinya selama hamil.

4. Manfaat Bagi Instansi

Menambah referensi bacaan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak khususnya mengenai hubungan anemia dengan kejadian abortus, sehingga dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anemia pada kehamilan

1. Definisi Anemia pada Ibu Hamil

Anemia merupakan keadaan berkurangnya jumlah sel darah merah sehat dalam tubuh seseorang. Secara global kasus anemia sering disebabkan karena berkurangnya asupan zat besi atau kondisi ini disebut anemia defisiensi besi. Kondisi asupan zat besi yang kurang akan menyebabkan produksi eritrosit tidak cukup hingga akhirnya menyebabkan anemia defisiensi besi (Febriani & Sijid, 2021).

Anemia adalah kondisi menurunnya kadar eritrosit dalam darah atau hemoglobin (Hb) kurang dari normal. Laki-laki dan perempuan memiliki kadar hemoglobin (Hb) yang berbeda, seorang laki-laki disebut anemia jika Hb kurang dari 13,5 gr% dan perempuan kurang dari 12,0 gr% (Yuniarti & Zakiah, 2021).

Anemia pada ibu hamil merupakan keadaan ibu hamil dengan kadar hemoglobin (Hb) kurang dari normal yaitu <11 g/dl. Anemia pada ibu hamil sering terjadi pada ibu hamil trimester 2 dan trimester 3. Ibu yang mengalami anemia pada masa kehamilannya akan memberikan dampak buruk pada janin (Fatimah & Kania, 2019).

2. Epidemiologi Anemia pada Ibu Hamil

WHO memperkirakan 1,62 miliar orang di dunia mengalami anemia dan 56,4 juta diantaranya adalah ibu hamil, dimana prevalensi tertinggi pada Asia Tenggara dibandingkan dengan negara lain (Rahayu *et al.*, 2020). Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia, berdasarkan Riskesdas tahun 2018 tercatat sekitar 48,9% kasus anemia pada ibu hamil. Kasus tersering pada ibu hamil umur 15-24 tahun dengan presentase 84,6% (Kemenkes RI, 2020). Data Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat prevalensi anemia pada ibu hamil tahun 2017 mencapai 7,29%, dengan kasus terbanyak pada puskesmas sudiang raya mencapai 30,5% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 29,1% kasus anemia pada ibu hamil (Syarfaini *et al.*, 2019).

3. Etiologi Anemia pada Ibu Hamil

Anemia paling sering disebabkan karena kurangnya asupan zat-zat nutrisi, absorpsi yang tidak baik, peningkatan zat gizi yang hilang, kebutuhan berlebihan. Anemia dalam kehamilan paling sering disebabkan oleh defisiensi zat besi mencapai 75% kasus dan juga sering disebabkan oleh anemia megaloblastik karena defisiensi asam folat dan vitamin B12. Penyebab lain dari anemia namun jarang didapatkan adalah anemia karena proses inflamasi, hemoglobinopati, zat kimia serta keganasan (Prawirohardjo, 2020).

Anemia juga dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu adanya gangguan dalam proses pembentukan eritrosit atau sel darah merah oleh sumsum

tulang, banyaknya darah yang keluar dari tubuh (hemoragi) misalnya dalam proses persalinan, dan jika terjadi hemolisis atau sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh hancur sebelum waktunya (Bakta, 2017).

4. Faktor Risiko Anemia pada Ibu Hamil

a. Asupan zink kurang

Zink merupakan suatu mineral yang memiliki peran dalam proses pembelahan sel serta pertumbuhan jaringan dari janin. Zink juga berperan dalam sintesis hemoglobin dan menstimulasi eritropoiesis. Asupan zink yang kurang pada ibu hamil akan meningkatkan risiko anemia hingga 1,66 kali lebih berisiko dari ibu hamil yang asupan zinknya cukup selama kehamilan (Syarfaini et al., 2019).

b. Asupan Fe

Fe atau zat besi merupakan suatu mineral yang penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Zat besi ini banyak terkandung dalam makanan, contohnya hati, sayuran hijau, daging merah dan kuning telur (Syarfaini et al., 2019).

Kebutuhan atau volume darah ibu hamil akan meningkat saat dalam masa kehamilan dan juga dibutuhkan untuk perkembangan janin, sehingga jika asupan Fe ibu hamil berkurang maka ibu hamil tersebut 3,22 kali lebih berisiko mengalami anemia dari ibu hamil dengan asupan Fe yang cukup (Syarfaini et al., 2019).

c. Riwayat seksio sesarea (SC)

Prosedur seksio sesarea terdapat risiko jangka pendek yang dapat terjadi seperti perdarahan. Tindakan operasi cesar menyebabkan jumlah darah yang keluar dua kali lipat lebih banyak daripada persalinan yang dilakukan secara normal, hal ini lah yang kemudian menyebabkan ibu hamil dengan riwayat SC lebih berisiko mengalami anemia hingga 1,88 kali daripada ibu hamil dengan persalinan normal (Syarfaini et al., 2019).

d. Jarak kehamilan

Seorang ibu disarankan menjaga jarak kehamilannya dimana setelah melahirkan seorang ibu membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk mengembalikan fungsi normal tubuh misalnya agar luka bekas persalinan dapat sembuh dengan baik dan mempersiapkan diri untuk kehamilan dan persalinan berikutnya (Syarfaini et al., 2019) . Setelah kehamilan pertama tubuh ibu juga membutuhkan waktu yang cukup agar cadangan nutrisi dapat terkumpul kembali (Alamsyah, W, 2020).

Jarak kehamilan pada ibu hamil yang pendek atau kurang dari 2 tahun lebih berisiko 2,78 kali mengalami anemia daripada kehamilan lebih dari 2 tahun (Syarfaini et al., 2019).

e. Pendidikan

Ibu hamil dengan pendidikan yang rendah lebih berisiko 3,00 kali mengalami anemia dari ibu hamil dengan pendidikan yang baik, karena ibu hamil yang kurang memahami tentang anemia, kurang informasi bagaimana tanda dan gejala anemia dan penangannya, serta kurang

memahami tentang makanan yang mengandung banyak nutrisi utamanya yang kaya akan zat besi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor risiko anemia pada ibu hamil (Syarfaini et al., 2019).

f. Pola makan

Pola makan yang tidak teratur dapat membuat zat gizi yang masuk dalam tubuh tidak seimbang sehingga kemudian berdampak pada ibu hamil yaitu menyebabkan ibu menjadi kekurangan gizi, sehingga hal ini akan menyebabkan kadar hemoglobin pada ibu hamil berkurang dan akhirnya terjadi anemia pada ibu hamil (Alamsyah,2020).

g. Usia

Alat reproduksi seorang perempuan berkaitan dengan usianya. Semakin muda usia maka perkembangan sistem reproduksinya masih belum optimal. Seseorang yang hamil pada usia kurang dari 20 tahun juga memiliki emosi yang belum stabil sehingga mudah mengalami stress yang dapat menyebabkan menurunnya perhatian untuk memenuhi asupan zat gizi selama hamil sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia. Usia yang terlalu tua untuk hamil (>35 tahun) ini berkaitan dengan penurunan daya tahan tubuh pada usia ini sehingga lebih rentan mengalami berbagai penyakit, untuk itu ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia (Deswati et al., 2019).

h. Jumlah paritas

Jumlah paritas lebih dari 3 kali pada ibu hamil meningkatkan risiko ibu mengalami anemia maternal (Kusumawardani et al., 2018). Semakin tinggi jumlah paritas maka hal ini akan semakin meningkatkan risiko komplikasi saat hamil dan bersalin misalnya akan menyebabkan peningkatan risiko kematian janin dalam kandungan dan perdarahan baik sebelum atau setelah melahirkan. Riwayat banyaknya pengeluaran darah ini meningkatkan risiko terjadinya anemia pada kehamilan berikutnya (Sjahrani & Faridah, 2019).

i. Sosial budaya

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifayolistia et al didapatkan hasil bahwa sosial budaya berhubungan dengan anemia pada ibu hamil, hal ini berkaitan dengan mitos atau pantangan. Misalnya pantangan bahwa ibu hamil tidak boleh mengonsumsi ikan karena akan menyebabkan saat lahir, pada mata bayi akan ditemukan banyak secret, padahal ikan mengandung banyak nutrisi yang baik untuk ibu dan janin. Budaya seperti inilah yang dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil (Tampubolon et al., 2021).

j. Faktor layanan kesehatan *Antenatal Care* (ANC)

Antenatal Care (ANC) merupakan pemeriksaan kehamilan rutin yang dilakukan oleh ibu hamil dengan minimal pemeriksaan ANC selama hamil adalah 4 kali. Layanan kesehatan ini berfungsi untuk menilai bagaimana keadaan umum ibu, psikologis, dan pemeriksaan laboratorium ibu dalam

hal ini salah satunya adalah pemeriksaan hemoglobin untuk deteksi awal anemia pada ibu hamil. Petugas kesehatan juga akan memberikan informasi terkait asupan nutrisi untuk pemenuhan nutrisi selama kehamilan yang berfungsi salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya anemia (Tampubolon et al., 2021). Ibu hamil yang tidak rutin dalam melakukan pemeriksaan ANC akan menimbulkan masalah dalam kehamilan atau persalinannya. Masalah yang dapat timbul ini salah satunya adalah anemia (Nurdin *et al.*, 2020).

5. Klasifikasi Anemia pada Ibu Hamil

a. Anemia defisiensi besi

Anemia yang kasusnya paling sering ditemukan adalah anemia defisiensi besi. Anemia ini disebabkan karena kurangnya asupan zat besi pada ibu selama kehamilannya. Ibu yang sedang dalam masa kehamilan akan kehilangan zat besi karena akan terjadi pengalihan zat besi dari ibu ke janin, untuk itu WHO menganjurkan agar ibu hamil diberikan 60 mg besi selama 6 bulan dan pada penelitian lain menyarankan agar pemberian zat besi dosis 100 mg tiap hari selama 16 minggu atau lebih (Prawirohardjo, 2020).

b. Anemia megaloblastik

Kebutuhan asam folat ibu hamil akan meningkat mencapai lima hingga sepuluh kali lipat karena akan terjadi pengalihan asam folat dari ibu ke janin. Konsumsi asam folat yang kurang atau defisiensi asam folat akan menyebabkan anemia megaloblastik pada kehamilan. Anemia

megaloblastik juga dapat disebabkan karena defisiensi vitamin B12 (kobalamin) (Prawirohardjo, 2020).

c. Anemia aplastik

Aplasia yang terjadi selama hamil dapat mengalami kekambuhan di kehamilan selanjutnya, untuk memperbaiki fungsi sumsum tulang akibat anemia ini maka dapat dilakukan terminasi kehamilan dan persalinan namun penyakit ini dapat menjadi lebih buruk setelah melakukan persalinan (Prawirohardjo, 2020).

d. Anemia penyakit sel sabit

Anemia ini dikenal dengan sebutan *sickle cell anemia* kondisi penurunan sel darah merah yang sehat. Masa kehamilan masih beresiko bagi ibu dengan *sickle cell anemia* sehingga jika didapatkan kasus anemia ini maka pasien harus dipantau secara intens. (Prawirohardjo, 2020).

6. Patomekanisme Anemia pada Ibu Hamil

Kebutuhan oksigen pada ibu hamil lebih tinggi dari pada yang tidak hamil sehingga hal ini akan menyebabkan produksi eritropoietin mengalami peningkatan, bersamaan dengan itu volume plasma juga akan meningkat lebih besar dari pada peningkatan sel darah merah hingga akhirnya hal ini menyebabkan kadar hemoglobin (Hb) menurun karena terjadi hemodilusi (pengenceran) (Prawirohardjo, 2020).

Hemodilusi akan menyebabkan kadar hemoglobin darah berkurang sehingga memberikan dampak pada transportasi oksigen ke tubuh

mengalami penurunan sehingga menyebabkan anemia defisiensi zat besi (Fauzianty & Sulistyaningsih, 2022).

7. Gejala Anemia

Gejala pada pasien anemia diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Gejala umum (*Anemic syndrome*)

Gejala umum anemia akan muncul saat kadar hemoglobin (Hb) berkurang atau dibawah normal dalam hal ini jika penurunan kadar Hb mencapai <7 g/dl. Gejala umum anemia ini muncul karena merupakan mekanisme kompensasi tubuh akibat daya angkut oksigen berkurang dan terjadinya anoksia pada organ target. *Anemic syndrome* terdiri dari, lemas, mudah lelah, telinga terasa berdenging (*tinnitus*), kaki terasa dingin, mata berkunang-kunang dan dyspnea (Bakta, 2017).

b. Gejala khas sesuai dengan jenis-jenis anemia

- 1). Anemia defisiensi besi : atrofi papil lidah, kuku sendok (*koilonychia*) dan sulit menelan (disfagia).
- 2). Anemia megaloblastik : adanya gangguan saraf pada kasus kekurangan vitamin B12 dan radang lidah (glossitis).
- 3). Anemia hemolitik : kulit atau sklera mata berwarna kuning (ikterus), perbesaran hepar dan splenomegali.
- 4). Anemia aplastik : adanya tanda-tanda infeksi dan adanya perdarahan (Bakta, 2017).

c. Gejala penyakit yang mendasari

Gejala yang muncul ini tergantung dari apa yang menyebabkan anemia tersebut, contohnya gejala karena infeksi cacing tambang yaitu bengkak parotis dan nyeri perut (Bakta, 2017).

8. Penegakan Diagnosis Anemia pada Ibu Hamil

Penegakan diagnosis pasien yang pertama dilakukan oleh dokter adalah melakukan anamnesis. Anamnesis akan dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan pada pasien, adapun pertanyaan yang dapat diberikan misalnya menanyakan keluhan pasien untuk mengetahui apa alasan pasien datang untuk melakukan pemeriksaan. Memberikan pertanyaan terkait keluhan utama pasien sampai dapat ditentukan kemungkinan diagnosis pasien, adapun gejala umum yang dapat ditemukan pada pasien anemia adalah lemas, mudah lelah, mata berkunang-kunang, dyspnea. Namun untuk menegakkan diagnosis pasti anemia maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (Ratmawati et al., 2019).

Pemeriksaan fisik pada pasien anemia yang dapat ditemukan adalah konjungtiva, mukosa mulut, telapak tangan nampak pucat (Bakta, 2017).

Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah:

- a. *Screening test* : pengukuran kadar hemoglobin (Hb), hapusan darah tepi dan indeks eritrosit.
- b. Pemeriksaan darah seri anemia : trombosit, leukosit dan laju endap darah.

- c. Pemeriksaan sumsum tulang, pemeriksaan ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana sistem hematopoiesis pasien dan digunakan dalam mendiagnosis anemia megaloblastik dan aplastik (Bakta, 2017).
- d. Pemeriksaan khusus sesuai indikasi
 - 1). Anemia defisiensi besi : TIBC (*total iron binding capacity*).
 - 2). Anemia megaloblastik : serum vitamin B12, serum folat.
 - 3). Anemia hemolitik : serum bilirubin dan tes Coomb.
 - 4). Anemia aplastik : biopsi sumsum tulang (Bakta, 2017).

9. Tatalaksana Anemia pada Ibu Hamil

Pemberian obat pada kasus anemia diberikan jika didapatkan hasil Hb < 11 g/dl diberikan tablet Fe 2 tablet per hari selama 90 hari sedangkan jika ditemukan kadar Hb < 10 g/dl maka tablet Fe diberikan sebanyak 3 tablet per hari selama 90 hari kehamilan. Berdasarkan aturan program KIA menganjurkan ibu hamil diberikan tablet Fe (Fe sulfat 320 mg dan 0,5 mg asam folat) selama 90 hari. Jumlah ini mencukupi tambahan zat besi pada ibu hamil sebanyak 1000 mg (Deswati et al., 2019).

Pemberian donor darah pada pasien diberikan pada kasus anemia pasca perdarahan akut dengan gangguan hemodinamik atau anemia berat. Pada kasus anemia yang bersifat kronik biasanya akan terjadi peningkatan volume darah untuk itu pemberian transfusi ini menggunakan tetesan pelan (Bakta, 2017).

Ibu hamil dengan diagnosis anemia defisiensi asam folat maka dapat diberikan folat 1-5 mg per hari oral. Pada masa kehamilan disarankan agar

ibu hamil mendapatkan minimal 400 mg folat tiap harinya. Meskipun jarang namun pada ibu yang terdiagnosis anemia aplastik maka terapinya adalah dilakukan terminasi kehamilan elektif, imunosupresi, terapi suportif atau bahkan setelah persalinan dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang. Ibu hamil yang terdiagnosis anemia penyakit sel sabit harus dilakukan pemantauan secara rutin selama kehamilan dan untuk pemberian donor darah profilaktik pada beberapa pasien memberikan hasil yang baik (Prawirohardjo, 2020).

10. Komplikasi Anemia pada Ibu Hamil

Komplikasi yang dapat terjadi pada ibu hamil yang mengalami anemia adalah terjadinya perdarahan pasca bersalin, kelahiran prematur, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), dan adanya gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan pada janin (Purba & Haslin, 2022).

11. Prognosis Anemia pada Ibu Hamil

Prognosis anemia pada ibu hamil ini ditentukan berdasarkan kecepatan diagnosis dan tatalaksana yang tepat. Jika hal ini terpenuhi maka prognosis anemia pada ibu hamil dapat lebih baik (Sasono et al., 2021).

12. Pandangan Islam mengenai Anemia

Anemia dalam kehamilan salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan nutrisi pada ibu hamil. Hal ini berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi ibu selama kehamilan, terdapat ayat dalam al-quran yang

menjelaskan terkait perlunya manusia memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Hal ini dijelaskan dalam Q.S *al- Baqarah/2:168*, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah/2:168)

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat tersebut menjelaskan tentang suatu perintah bagi umat manusia agar senantiasa mengonsumsi makanan yang halal lagi baik. Dan makanlah makanan yang halal, yakni bukan yang haram lagi baik, bergizi, dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu, yang kamu beriman kepadanya adalah mu'minin yaitu orang-orang yang mantap keimanannya (Shihab, 2017).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menjelaskan dirinya sebagai *razzaq* atau maha pemberi rezeki. Oleh sebab itu Allah serukan kepada makhluknya untuk menikmati makanan yang baik dalam hidupnya serta menjauhi seluruh makanan yang tidak baik, karena orang yang mengonsumsi makanan yang tidak baik sama saja dengan mengikuti langkah syetan. Makanlah sesuatu yang halal lagi baik, makanan yang halal tentunya merupakan makanan yang baik dalam hal ini berarti sehat. Ibu hamil yang mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dapat menurunkan risiko terjadinya anemia. Misalnya dengan mengonsumsi

susu, keju, sayuran, daging merah, telur, hati yang telah dimasak dengan baik (Tarigan, 2017).

B. Abortus

1. Definisi Abortus

Abortus merupakan kondisi berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau sebelum janin memiliki berat 500 gram (Prawirohardjo, 2020). Definisi lain dijelaskan bahwa abortus merupakan suatu ancaman pada kehamilan atau keluarnya hasil konsepsi sebelum janin hidup diluar kandungan, dengan batasan tertentu yaitu usia kehamilan belum mencapai usia 20 minggu (Aprianto *et al*,2022).

Abortus adalah salah satu masalah yang dapat meningkatkan angka kematian ibu. Abortus didefinisikan sebagai suatu keadaan kehamilan berakhir sebelum janin berada diluar kandungan dan usia kehamilan < 20 minggu dan berat janin belum mencapai 500 gram (Asniar *et al*, 2022).

2. Epidemiologi Abortus

Menurut *World Health Organization* (WHO), abortus menjadi penyebab kematian ibu dengan prevalensi mencapai 15-50% (Aprianto *et al*,2022). Menurut Kementerian Kesehatan RI 2021, jumlah kematian ibu menurut penyebabnya didapatkan data bahwa perdarahan menjadi penyebab pertama kematian ibu dengan total kasus 1.320 (Kemenkes RI, 2021).

Wilayah Sulawesi Selatan utamanya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar didapatkan kasus abortus tahun 2021 sebanyak 138 kasus (Rekam Medik RSIA Ananda 2021). Kasus abortus terus meningkat seiring dengan penambahan usia. Prevalensi pada perempuan usia 20 tahun sebanyak 12% dan pada usia lebih dari 45 tahun sebanyak 50% (Fairuz & Suhair, 2019).

3. Etiologi Abortus

Abortus dapat disebabkan oleh berbagai hal yaitu kelainan pertumbuhan pada hasil konsepsi seperti abnormalitas kromosom, tempat nidasi kurang baik, dan efek dari luar seperti adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), toksoplasmosis, atau adanya gangguan pada organ genital serta adanya kelainan pada plasenta (Purwaningrum & Fibriana, 2017).

Penyebab terbanyak abortus pada ibu hamil yaitu :

a. Genetik

Abortus umumnya disebabkan karena adanya kelainan kariotip embrio. Kehamilan trimester pertama sebanyak 50% merupakan kelainan sitogenik berupa aneuploidi akibat kejadian sporadis (Prawirohardjo, 2020). Kehamilan trimester pertama anomali kromosom yang paling sering ditemukan adalah *trisomy autosom* yang timbul akibat dari *nondisjunction meiosis*. Trisomi yang paling banyak ditemukan adalah *trisomy autosom* 13,16,18,21 dan 22 (Cunningham *et al.*, 2017). Kelainan sitogenik pada kasus abortus sebanyak 20-25% disebabkan oleh Sindroma

Turner dan pada fetus yang mengalami Sindroma Down (trisomi 21) pada umumnya masih bisa bertahan (Prawirohardjo, 2020).

Kelainan lainnya berhubungan dengan abnormalitas fertilisasi misalnya tetraploidi dan triploidi. Insiden tetraploidi terjadi pada 8% kasus abortus karena adanya kelainan kromosom pada fase awal sebelum terjadinya proses pembelahan (Prawirohardjo, 2020). Janin dengan *tetraploidi* paling sering mengalami abortus pada awal gestasi dan jarang dapat lahir hidup (Cunningham *et al.*, 2017).

b. Kelainan anatomik

Kelainan bentuk pada uterus terjadi pada 1/200 hingga 1/600 perempuan, defek pada uterus dapat menyebabkan komplikasi obstetrik misalnya abortus berulang, prematuritas dan malpresentasi janin. Septum uterus merupakan penyebab terbanyak pada kasus abortus akibat dari defek uterus mencapai 40-80% dan uterus bikornis, uterus didelfis atau uterus unikornis mencapai 10-30%, selain itu abortus berulang juga dapat disebabkan karena adanya mioma uteri dengan insidensi mencapai 10-30% (Prawirohardjo, 2020).

c. Lingkungan

Paparan zat dari luar berupa obat, bahan kimia atau radiasi pada ibu hamil umumnya dapat menyebabkan abortus, diperkirakan mencapai 1-10%. Misalnya paparan tembakau, rokok yang mengandung banyak toksik seperti nikotin yang dapat menghambat sirkulasi uteroplasenta, hal ini

kemudian dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan janin hingga akhirnya terjadi abortus (Prawirohardjo, 2020).

4. Faktor Risiko Abortus

a. Umur

Faktor risiko umur berkaitan dengan kematangan secara fisik, psikologis dan sosial seorang ibu, karena usia ibu sangat mempengaruhi bagaimana kehamilan dan kesiapan seorang ibu dalam menerima kehamilannya. Usia yang diperkirakan aman untuk kehamilan adalah usia 20 hingga 35 tahun. Ibu hamil dengan usia <20 tahun belum siap menjadi seorang ibu sehingga hal ini memungkinkan ibu lebih mudah mengalami stress. Seiring dengan meningkatnya usia ibu maka akan berdampak pada kehamilannya misalnya semakin meningkat usia seorang perempuan maka fungsi ovariumnya akan semakin menurun misalnya dari segi kualitasnya yang kemudian mengakibatkan abnormalitas kromosom dan akhirnya hasil konsepsi sulit untuk berkembang (Putri, 2018).

b. Paritas

Paritas merupakan banyaknya anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, Jumlah paritas yang aman adalah paritas 2 sampai 3 (multipara) dan paritas yang berisiko adalah paritas 1 (primipara) dan >3 (grande multipara), maka semakin banyak jumlah paritas akan meningkatkan risiko terjadinya abortus (Prawirohardjo, 2020).

Jumlah paritas dapat memberikan pengaruh pada fungsi organ reproduksi. Perempuan yang terlalu sering melahirkan akan menyebabkan

kerja dinding rahim menurun yang akan memberikan dampak negatif pada janin, dimana asupan nutrisi dan oksigen dari ibu ke hasil konsepsi akan berkurang sehingga menyebabkan lepasnya sebagian atau keseluruhan hasil konsepsi. Semakin tinggi paritas seorang ibu maka risiko mengalami masalah pada kehamilan dan persalinannya semakin meningkat dalam hal ini contohnya dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus (Aprianto *et al.*, 2022).

c. Pekerjaan

Seorang perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah atau beraktifitas berlebihan akan meningkatkan risiko terjadinya abortus, karena hal ini dapat menyebabkan ibu hamil kelelahan karena terus bekerja sehingga kurang beristirahat yang berujung pada kesehatan ibu yang akan menurun hingga dapat menyebabkan abortus. Selain itu perempuan yang bekerja memiliki beban pikiran berlebih sehingga mudah stress dan kelelahan sehingga transfer nutrisi pada janin akan berkurang dan kehamilan menjadi lebih berisiko (Aprianto *et al.*, 2022).

Ibu hamil yang mengalami stress akibat pekerjaan atau hal lainnya akan menyebabkan hormon kortisol dalam tubuh meningkat sehingga hormon ini akan masuk ke plasenta dan memberikan dampak buruk pada janin. Hormon kortisol ini kemudian akan mengaktifkan HPA (Hipotalamus, Hipofisis, Adrenal) ibu dan janin, hingga janin dapat mengalami stress karena peningkatan CRH (*corticotrophin releasing hormone*) dalam plasma ibu, janin dan cairan amnion. CRH kemudian

akan merangsang adrenal pada janin untuk segera membentuk steroid, CRH juga akan menyebabkan pengeluaran androgen meningkat melalui pelepasan *Pituitary Adrenocorticotropin* (ACTH). Androgen pada plasenta kemudian berubah menjadi estrogen, produksi estrogen yang terus meningkat ini akan menyebabkan kadar progesteron menurun sehingga kemudian menyebabkan kontraksi di miometrium dan masa tenang uterus berakhir dan akan terjadi perdarahan desidua basalis, kontraksi uterus hingga akhirnya menyebabkan terjadinya pelepasan hasil konsepsi (Silitonga et al., 2017).

d. Riwayat Abortus

Ibu yang memiliki riwayat abortus sebelumnya maka ada kemungkinan bahwa terdapat masalah pada organ reproduksinya sehingga hal ini memungkinkan terjadinya abortus berulang. Ibu dengan riwayat abortus juga berkemungkinan mengalami masalah pada pembuluh darah plasentanya sehingga hal ini akan memperberat kondisi ibu, untuk itu ibu dengan riwayat abortus sebaiknya menjaga kesehatannya dan mempersiapkan kehamilan berikutnya dengan baik (Asniar et al., 2022).

Tindakan yang dilakukan pada ibu yang mengalami abortus spontan adalah dapat dilakukan kuretase hingga histerektomi. Tindakan ini dapat menyebabkan komplikasi berupa perubahan permeabilitas otot dinding rahim yang akan mempengaruhi fungsi desidua basalis saat menerima implantasi embrio untuk kehamilan selanjutnya, hal ini lah yang

menyebabkan peningkatan risiko ibu hamil dengan riwayat abortus mengalami abortus kembali (Lisa & Harisna, 2017).

e. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun akan meningkatkan risiko terjadinya abortus pada ibu hamil, karena pada kehamilan kurang dari 2 tahun, ibu sangat berkemungkinan mengalami kekurangan gizi, saat nutrisi ibu mengalami penurunan yang signifikan tentunya hal ini akan memberikan dampak buruk pada kehamilan ibu. Pada jarak kehamilan kurang dari 2 tahun ibu mungkin masih menyusui anak sebelumnya dan terdapat pengaruh oksitosin, dimana oksitosin akan membuat rahim ibu berkontraksi sebelum waktunya sehingga dapat menyebabkan perdarahan hingga ancaman abortus (Aprianto *et al.*, 2022).

f. Anemia

Ibu hamil yang memiliki kadar Hb <11 g/dl terdiagnosis anemia pada kehamilan. Kadar hb yang rendah pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus, utamanya pada kasus anemia defisiensi zat besi yang merupakan anemia yang paling sering dialami oleh ibu hamil. Kekurangan zat besi dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus, dimana zat besi ini berperan dalam proses hematopoiesis. Kadar Hb dalam darah yang menurun dapat menyebabkan kadar oksigen dalam darah berkurang, jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan jaringan nekrosis hingga akhirnya hasil konsepsi tidak dapat bertahan lama di dalam uterus (Zakira & Gatut., 2021).

g. Infeksi

Infeksi merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan abortus pada ibu hamil. Organisme yang sering menjadi penyebabnya adalah *Chlamydia*, *Ureaplasma*, *Mycoplasma*, *Cytomegalovirus*, *Listeria monocytogenes* dan *Toxoplasma gondii*. Seorang perempuan dalam masa kehamilannya akan terjadi perubahan anatomi, reaksi imunologis menurun, perubahan fisiologis pada perempuan yang hamil akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi salah satunya infeksi oleh *Chlamydia trachomatis* (Octarina *et al.*, 2018).

Chlamydia trachomatis merupakan bakteri intraseluler dengan cara penularannya yaitu melalui hubungan seksual, biasanya wanita yang mengalami infeksi ini tidak mengalami gejala sehingga biasanya pasien tidak menyadari bahwa saat ini ia sedang terinfeksi bakteri ini. Ibu hamil yang terinfeksi *C. trachomatis* dapat terinfeksi baik secara intrauterin atau ekstrauterin. Infeksi intrauterin ini yang kemudian dapat meningkatkan risiko terjadinya abortus dimana bakteri akan menginfeksi janin secara langsung hingga memicu respon inflamasi hingga menyebabkan plasenta mengalami kerusakan (Octarina *et al.*, 2018).

5. Patomekanisme Abortus

Kelainan pertumbuhan pada hasil konsepsi, kelainan pada plasenta atau faktor dari ibu nya menjadi hal yang dapat menyebabkan terjadinya abortus. Segera setelah kematian janin maka abortus akan terjadi bersamaan dengan terjadinya perdarahan dalam desidua basalis,

selanjutnya pada daerah implantasinya akan terjadi perubahan, infiltrasi sel-sel peradangan akut hingga akhirnya hasil konsepsi akan terlepas baik sebagian hasil konsepsi atau keseluruhan hasil konsepsi. Kemudian uterus akan menganggap hasil konsepsi itu sebagai benda asing dan uterus akan berkontraksi untuk segera mengeluarkan isinya hingga kemudian terjadi perdarahan (Purwaningrum & Fibriana, 2017).

Kehamilan < 8 minggu vili korialisnya masih belum menembus desidua basalis sehingga dapat terjadi pengeluaran hasil konsepsi secara utuh, sedangkan pada kehamilan 8 hingga 14 minggu vili korialis telah menembus desidua basalis lebih dalam sehingga plasenta tidak dapat terlepas secara sempurna hingga dapat menyebabkan banyak perdarahan (Purwaningrum & Fibriana, 2017).


6. Klasifikasi abortus

Klasifikasi abortus berdasarkan kejadiannya dikelompokkan menjadi abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan yaitu abortus yang berlangsung tanpa adanya tindakan, yang terbagi menjadi abortus imminens, insipiens, komplit, inkomplit, *missed abortion*, habitualis, dan infeksius. Sedangkan abortus provokatus yaitu abortus yang terjadi karena adanya suatu tindakan yang disengaja, abortus ini terbagi menjadi abortus provokatus medisinalis dan kriminalis (Prawirohardjo, 2020).

a. Abortus spontan

1) Abortus iminens

Abortus iminens merupakan suatu ancaman terjadinya abortus yang ditandai dengan adanya perdarahan pervaginam, ostium uteri tertutup dan tidak ada pengeluaran hasil konsepsi. Pasien biasanya datang dengan keluhan adanya perdarahan dari jalan lahir dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu disertai rasa nyeri sedikit pada perut atau tidak ada nyeri hanya terdapat perdarahan pervaginam. Ostium uteri masih tertutup, uterus masih sesuai usia kehamilan dan tes urin masih positif hamil (Prawirohardjo,2020).



Gambar 2.1 Abortus Iminens
(Kemenkes, 2020)

2) Abortus insipiens

Abortus insipiens merupakan perdarahan yang ditandai adanya peningkatan dilatasi pada serviks uterus namun hasil konsepsi masih terdapat dalam uterus (Purwaningrum & Fibriana,

2017). Pasien dengan abortus insipiens biasanya akan datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir yang banyaknya sesuai dengan luas pembukaan serviks uterus dan usia kehamilannya, keluhan ini disertai adanya kontraksi yang sering dan kuat sehingga menyebabkan pasien merasa mulas. Tes urin masih positif dan besar uterus biasanya masih sesuai usia kehamilan (Prawirohardjo, 2020).




Gambar 2.2 Abortus insipiens
(Kemenkes, 2020)

3) Abortus inkomplit

Abortus inkomplit merupakan perdarahan dimana terjadi pengeluaran hasil konsepsi namun masih terdapat sebagian sisa hasil konsepsi didalam uterus (Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien abortus inkomplit terdiagnosis jika didapatkan sebagian hasil konsepsi telah keluar namun masih ada bagian yang

tertinggal didalam uterus biasanya jaringan yang tertinggal adalah plasenta (Prawirohardjo, 2020).

Ostium uteri biasanya terbuka dan teraba jaringan atau ada jaringan yang menonjol keluar pada ostium uteri eksternum. Pasien dengan abortus inkomplit dapat mengalami anemia hingga syok hemoragik sebelum sisa jaringan lainnya dikeluarkan karena perdarahan dalam jumlah banyak dan terus menerus (Prawirohardjo, 2020).




Gambar 2.3 Abortus inkomplit
(Kemenkes, 2020)

4) Abortus komplit

Abortus komplit merupakan perdarahan pervaginam dimana hasil konsepsinya sudah dikeluarkan secara keseluruhan tanpa ada yang tertinggal dalam uterus (Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien yang terdiagnosis abortus komplit memiliki tanda seluruh hasil konsepsinya telah keluar, ostium

uteri telah tertutup, uterus telah mengecil tidak sesuai lagi dengan usia kehamilannya yang dimana karena hal ini lah jumlah perdarahan pada abortus komplit hanya sedikit (Prawirohardjo,2020).




Gambar 2.4 Abortus komplit (Kemenkes, 2020)

5) *Missed abortion*

Missed abortion merupakan keadaan dimana janin telah mati dalam uterus sebelum kehamilan mencapai 20 minggu namun janin mati tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih (Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien yang mengalami *missed abortion* biasanya tidak memiliki keluhan, abortus ini terdeteksi saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan rutin atau ibu merasa bahwa kehamilannya tidak seperti yang dia harapkan. Misalnya pada kehamilan lebih dari 14 minggu hingga 20 minggu

ibu merasa bahwa kehamilannya tidak membesar namun mengecil
(Prawirohardjo, 2020).



Gambar 2.4 *Missed abortion*
(Kemenkes, 2020)

b. Abortus provokatus

1) Abortus medisinalis

Abortus medisinalis adalah abortus yang dilakukan karena adanya indikasi medis atau jika kehamilan dilanjutkan maka akan membahayakan nyawa ibu sehingga aborsi harus segera dilakukan (Sylvana, Firmansyah, Wijaya, & S,2021).

2) Abortus kriminalis

Abortus kriminalis adalah abortus yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis dan melanggar hukum (Sylvana, Firmansyah, Wijaya, & S,2021).

c. Abortus habitualis

Abortus habitualis merupakan abortus yang terjadi sebanyak tiga kali berturut-turut atau bahkan lebih (Purwaningrum & Fibriana, 2017). Pasien dengan riwayat abortus habitualis biasanya mudah untuk hamil kembali namun kehamilannya tetap akan berujung pada abortus kembali (Prawirohardjo, 2020).

Penyebab abortus habitualis yang sering didapatkan adalah inkompetensia serviks dimana uterus serviks tidak mampu untuk tertutup, ostium akan terus membuka (inkompeten) tanpa adanya kontraksi uterus hingga akhirnya akan terjadi pengeluaran hasil konsepsi. Inkompetensia serviks biasanya disebabkan karena tindakan yang dilakukan pada kehamilan sebelumnya misalnya seperti tindakan membuka serviks berlebihan atau robekan serviks berlebihan. Jadi diagnosis abortus habitualis jika terjadi abortus berulang sebanyak 3 kali atau lebih berturut-turut (Prawirohardjo, 2020).

d. Abortus infeksius

Abortus infeksius merupakan abortus yang disertai dengan adanya infeksi pada organ genitalianya. Abortus ini biasanya merupakan komplikasi dari tindakan abortus yang dilakukan misalnya karena alat yang digunakan kurang steril (Prawirohardjo, 2020).

Pasien dengan abortus infeksius ini biasanya akan ditemukan gejala demam tinggi, perdarahan pervaginam berbau, tampak lelah, takikardi, nyeri tekan uterus dan uterus nampak membesar (Prawirohardjo, 2020).

7. Penegakan Diagnosis Abortus

a. Abortus iminens

Anamnesis pasien abortus iminens adalah pasien datang dengan keluhan perdarahan pervaginam dalam jumlah sedikit dan tidak ada nyeri perut atau nyeri perut ringan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri tertutup dan besar uterus sesuai usia kehamilan. Pada pemeriksaan urin kehamilan masih positif (Prawirohardjo, 2020).

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG dapat dilakukan secara transabdominal atau transvaginal. Pada pemeriksaan USG akan nampak bahwa hasil konsepsi masih utuh serta ditemukan tanda-tanda kehidupan janin seperti denyut jantung janin dan adanya gerakan janin (Prawirohardjo, 2020).

b. Abortus insipiens

Anamnesis pasien abortus insipiens biasanya pasien akan datang dengan keluhan keluarnya darah dari jalan lahir disertai nyeri dan terasa mulas. Pemeriksaan fisik didapatkan besar uterus masih sesuai usia kehamilan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri terbuka, hasil konsepsi masih berada dalam uterus (Prawirohardjo, 2020).

Pemeriksaan urin masih positif dan pemeriksaan USG masih terdapat tanda kehidupan janin misalnya masih ditemukan denyut jantung janin namun mulai tidak normal, gerak janin, dan perlu diperhatikan apakah terdapat pelepasan plasenta dari dinding rahim atau tidak (Prawirohardjo, 2020).

c. Abortus inkomplit

Anamnesis pasien datang dengan keluhan perdarahan yang biasanya terjadi dalam jumlah yang banyak, ada nyeri pada perut, dapat terjadi syok jika pasien tidak segera ditangani. Pemeriksaan fisik didapatkan besar uterus telah lebih kecil dari usia kehamilannya saat ini. Pemeriksaan dalam didapatkan hasil ostium uteri telah terbuka dan teraba sisa hasil konsepsi. Pemeriksaan USG dapat dilakukan jika ragu dengan hasil temuan klinis yang didapatkan (Prawirohardjo, 2020).

d. Abortus komplit

Anamnesis pasien abortus komplit pasien datang dengan keluhan perdarahan namun biasanya hanya sedikit dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Pemeriksaan fisik didapatkan besar uterus kecil masa kehamilan. Pemeriksaan dalam didapatkan ostium uteri menutup. Pemeriksaan urin biasanya masih positif sampai 7 hingga 10 hari setelah abortus. Pemeriksaan USG biasanya tidak perlu dilakukan karena temuan klinis sudah bisa ditegakkan diagnosis abortus komplit (Prawirohardjo, 2020).

e. *Missed abortion*

Anamnesis pada pasien biasanya mengeluhkan terjadi perdarahan atau tidak ada perdarahan, biasanya pasien hanya mengeluhkan bahwa usia kehamilannya semakin bertambah namun perutnya justru mengecil tidak sesuai dengan pertambahan usia kehamilannya. Pemeriksaan obstetrik didapatkan fundus lebih kecil dari usia kehamilan, tidak ada bunyi jantung

janin. Pada pemeriksaan USG akan didapatkan hasil kantong gestasi mengecil dengan bentuk yang tidak teratur disertai fetus yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan (Prawirohardjo, 2020).

f. Abortus habitualis

Anamnesis pasien abortus habitualis akan didapatkan bahwa pasien ada riwayat abortus sebelumnya sebanyak 3 kali berturut-turut atau bahkan lebih. Penyebab abortus ini biasanya disebabkan oleh inkompetensi serviks, untuk itu pemeriksaan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah pemeriksaan dalam untuk menilai diameter kanalis servikalis yang dimana diamatannya dapat lebih dari 8 mm (Prawirohardjo, 2020).

g. Abortus infeksius

Anamnesis akan didapatkan bahwa pasien ada riwayat perdarahan, atau adanya usaha untuk melakukan abortus dengan menggunakan barang-barang yang tidak steril dan ditemukan tanda-tanda infeksi seperti demam tinggi, lelah, dan perdarahan pervaginam yang berbau dan nyeri tekan pada uterus serta pemeriksaan dalam ditemukan ostium uteri terbuka (Prawirohardjo, 2020).

8. Tatalaksana Abortus

a. Abortus iminens

Pasien dengan abortus iminens kehamilannya masih bisa dipertahankan, pasien dapat diarahkan untuk melakukan tirah baring hingga perdarahan berhenti, agar uterus tidak berkontraksi maka dapat dilakukan pemberian spasmolitik atau pemberian tambahan hormon

progesteron. Pasien boleh pulang jika perdarahan telah berhenti namun perlu diberikan edukasi pada pasien bahwa jangan melakukan hubungan seksual selama 2 minggu (Prawirohardjo, 2020).

b. Abortus insipiens

Tatalaksana untuk pasien abortus insipiens langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan keadaan umum pasien dan perhatikan perubahan hemodinamik yang terjadi lalu dilakukan pengeluaran hasil konsepsi setelah itu kuretase bila perdarahan dalam jumlah yang banyak (Prawirohardjo, 2020).

Ibu dengan usia kehamilan >12 minggu untuk melakukan tindakan evakuasi dan kuretase harus hati-hati karena biasanya pada usia ini uterus telah seperti telur angsa atau bahkan lebih. Evakuasi dapat dilakukan dengan cara digital lalu berikan uterotonika saat dilakukan kuretase, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya dinding uterus berporforasi. Setelah tindakan, perbaiki keadaan umum pasien dan berikan antibiotik profilaksis (Prawirohardjo, 2020).

c. Abortus inkomplit

Pasien diagnosis abortus inkomplit yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki keadaan umum pasien sambil menyiapkan untuk dilakukan kuretase. Terjadinya perdarahan yang hebat maka harus segera dilakukan evakuasi sisa jaringan agar uterus dapat berkontraksi dan perdarahan berhenti. Selanjutnya dilakukan kuretase dengan tindakan yang disarankan yaitu dengan karet vakum menggunakan kanula dari plastik.

Setelah tindakan dilakukan, selanjutnya dilakukan pemberian uterotonika baik secara parenteral atau oral dan juga berikan antibiotik (Prawirohardjo, 2020).

d. Abortus komplit

Pasien abortus komplit tidak memerlukan penanganan atau pengobatan khusus. Pasien tidak perlu diberikan uterotonika karena keseluruhan hasil konsepsi telah keluar dan perdarahan biasanya akan segera berhenti setelah hasil konsepsi keluar dan akan berhenti total dalam 10 hari (Prawirohardjo, 2020).

e. *Missed abortion*

Tatalaksana untuk pasien *missed abortion* harus dibicarakan dengan baik pada pasien dan keluarganya karena harus segera dilakukan tindakan operasi dan kuretasi namun tindakan ini dapat menyebabkan komplikasi seperti perdarahan atau hasil evakuasi kurang bersih jika hanya satu kali tindakan. Bukan hanya itu terkait pendekatan psikologis pada pasien juga harus diperhatikan, biasanya pasien akan gelisah setelah mengetahui bahwa janinnya telah mati (Prawirohardjo, 2020).

Pasien dengan *missed abortion* juga biasanya diberikan misoprostol sublingual 400 mg diulangi 2 kali dengan jarak 6 jam. Penggunaan obat ini akan menyebabkan hasil konsepsi keluar atau ostium serviks terbuka sehingga dapat dilakukan evakuasi dan kuretase (Prawirohardjo, 2020).

Jika usia kehamilan < 12 minggu maka dapat dilakukan tindakan evakuasi secara langsung dengan dilatasi dan kuretase sedangkan jika usia

kehamilan 12-20 minggu dengan serviks uterus yang masih kaku maka sebaiknya dilakukan tindakan induksi sebelum mengeluarkan janin (Prawirohardjo, 2020).

f. Abortus habitualis

Penanganan pada pasien abortus habitualis tergantung dari penyebab abortusnya. Jika disebabkan oleh inkompetensia serviks maka dapat dilakukan operasi dengan cara *shirodkar* atau *McDonald*. Operasi ini dilakukan dengan cara melingkari kanalis servikalis pasien dengan mersiline atau benang dari sutera lalu disimpul dan dapat dibuka jika usia kehamilan telah aterm atau siap untuk dilahirkan (Prawirohardjo, 2020).

g. Abortus infeksius

Tatalaksana yang pertama dapat diberikan pada pasien adalah memperhatikan keadaan umum pasien lalu lakukan pemberian penisilin 4 x 1,2 juta unit/ ampisilin 4 x 1 gram + gentamisin 2 x 8 mg dan metrodinazol 2 x 1 gram. Pemberian antibiotik selanjutnya harus disesuaikan dengan hasil kultur pasien, jika dalam waktu 2 hari pemberian antibiotik tidak memberikan respon positif maka antibiotik harus diganti ke antibiotik yang lebih sesuai (Prawirohardjo, 2020).

9. Komplikasi Abortus

Komplikasi yang dapat terjadi pada abortus adalah perdarahan, syok, perforasi, infeksi dan dapat terjadi abnormalitas dari pembekuan darah pada *missed abortion* (Purwaningrum & Fibriana, 2017).

10. Prognosis Abortus

Prognosis abortus tergantung dari kecepatan dan ketepatan diagnosisnya, mencari etiologi dan jenis abortus yang terjadi untuk dilakukan penanganan sesuai jenis abortusnya. Jika hal ini tercapai dengan cepat dan tepat maka prognosis dapat baik (Prawirohardjo, 2020).

11. Pandangan Islam mengenai Abortus

Abortus dalam hukum Islam terdapat pada beberapa ayat al-quran. Sebenarnya dalam islam, abortus merupakan hal yang dilarang jika abortus dilakukan tanpa adanya uzur misal hanya untuk menghindari aib atau karena masalah ekonomi. Namun pada keadaan tertentu misalnya pada keadaan darurat yang dapat mengancam nyawa ibu atau janinnya maka melakukan abortus diperbolehkan (Fatmawati, 2016). Hal ini dijelaskan dalam Q.S *al-Isra*/17:33, yaitu :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۝ ٣٣

Terjemahnya :

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S. *al-Isra*/17:33)

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat diatas menyatakan bahwa dan janganlah kamu membunuh jiwa, baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri, yang diharamkan Allah melainkan dengan haq, yakni kecuali dalam kondisi yang dibenarkan agama. Dan barang siapa dibunuh secara

zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, yakni ahli warisnya untuk menuntut “qishah” atau ganti rugi kepada keluarga si pembunuh melalui hakim yang berwenang, tetapi janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli waris yang terbunuh itu melampaui batas dalam membunuh, yakni menuntut membunuh apalagi melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Sesungguhnya ia, yakni yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu. Ini di dunia, dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna(Shihab, 2017).

Abortus terbagi menjadi abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan merupakan abortus yang terjadi secara alamiah sedangkan abortus provokatus merupakan abortus yang terjadi karena disengaja yang terdiri dari abortus medisinalis dan abortus kriminalis. Ayat yang menjelaskan bahwa aborsi yang terjadi tanpa disengaja atau abortus ini disebut sebagai abortus spontan maka hal tersebut tidak akan dikenakan hukuman. Hal ini dijelaskan dalam Q.S *al-Tagabun/64:11*, yaitu :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :


“ Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S *al-Tagabun/64:11*)

Hal ini menjelaskan bahwa segala musibah yang menimpa manusia merupakan kehendak dari Allah SWT, dan tidak akan diberikan cobaan pada suatu hambanya jika ia tidak mampu melewati cobaan tersebut (Fatmawati, 2016).

Menurut Tafsir Al Misbah, ayat diatas menyatakan tidak menimpa seseorang satu musibah pun berkaitan urusan dunia atau agama kecuali atas izin Allah melalui sistem yang telah ditetapkan dan selalu di bawah kontrol dan pengawasan-Nya. Dan siapa yang beriman kepada Allah, dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izin-Nya niscaya dia akan memberi petunjuk hatinya sehingga dari saat ke saat ia akan semakin percaya serta tabah dan rela atas musibah yang menimpanya sambil mencari sebab-sebabnya dan semakin meningkat pula amal baiknya (Shihab, 2017).

Menurut pandangan ulama yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi menyatakan bahwa abortus diperbolehkan jika terdapat uzur didalamnya. Uzur yang beliau maksud misalnya ASI ibu yang kering saat kehamilan mulai terlihat dan pada waktu yang bersamaan ayah tidak dapat membiayai anaknya untuk mendapatkan ASI dari wanita lain jika anak lahir nanti. Dengan demikian abortus dalam pandangan islam dapat dilakukan hanya dalam kondisi tertentu yang jika kehamilan terus dilanjutkan maka dapat membahayakan hingga menyebabkan kematian pada ibu dan janinnya, abortus ini biasa disebut sebagai abortus provokatus medisinalis (Fatmawati, 2016).

D. Kerangka Konsep



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan :

 : Variabel yang diteliti

 : Variabel yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik observasional melalui pendekatan *case control study* yang menghubungkan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar 2021-2022.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada 26 Desember 2022 – 09 Februari 2023.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek yang digunakan dalam penelitian. Populasi kasus pada penelitian ini adalah semua pasien ibu hamil yang mengalami abortus sebanyak 138 ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022. Populasi kontrol pada penelitian ini adalah keseluruhan ibu hamil yang memeriksakan diri ke RSIA Ananda Makassar tahun 2021-2022 sebanyak 13.964.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari seluruh objek yang digunakan dalam penelitian dan mewakili keseluruhan populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang mengalami abortus dengan data rekam medik sesuai kriteria inklusi dan eksklusi di RSIA Ananda Makassar. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Kriteria inklusi :

- 1) Ibu hamil dengan usia kehamilan <20 minggu
- 2) Ibu hamil dengan diagnosis abortus
- 3) Ibu hamil yang memiliki data rekam medik yang jelas dan lengkap sesuai kebutuhan peneliti

Kriteria eksklusi :

- 1) Ibu hamil yang mengalami abortus provokatus
- 2) Ibu hamil dengan riwayat infeksi dalam kehamilan
- 3) Ibu hamil dengan usia <20 tahun dan >35 tahun
- 4) Ibu hamil dengan riwayat abortus sebelumnya
- 5) Ibu hamil dengan riwayat paritas >3

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan :

s : jumlah sampel

λ^2 : berdasarkan tabel *chi square* dengan satu derajat kebebasan (dk) dan taraf kesalahan = 5% didapatkan chi kuadrat = 3,841 (dalam tabel chi kuadrat)

N : jumlah populasi

P : peluang benar (0,5)

Q : peluang salah (0,5)

d : perbedaan bias (0,05)

Jadi, dalam penelitian ini didapatkan ukuran sampel sebagai berikut :

$$\begin{aligned} s &= \frac{3,841 \cdot 138 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2 (138 - 1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ &= \frac{132,51}{0,0025 (137) + 0,96025} \\ &= \frac{132,51}{0,3425 + 0,96025} \\ &= \frac{132,51}{1,30275} \\ &= 101,71 \end{aligned}$$

s = 101,71 dibulatkan menjadi 102

Berdasarkan hasil perhitungan ukuran sampel dengan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* maka untuk sampel kasus didapatkan hasil sebanyak 102 sampel. Penelitian ini menggunakan perbandingan case : control (1:1) sehingga didapatkan sampel kontrol sebanyak 102 sampel. Maka total seluruh sampel pada penelitian ini adalah 204 sampel

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui data rekam medik pasien di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2021-2022.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data rekam medik pasien yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan diambil dari bagian Rekam Medik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda Makassar Tahun 2021 sampai 2022.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan merupakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Analisis data pada penelitian ini menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap dependen.


1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis data secara deskriptif setiap variabel dengan membuat tabel distribusi frekuensi, membuat nilai rata-rata, dan nilai tengah untuk data kontinyu. Analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel yang diteliti.


2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis data untuk menilai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Menggunakan teknik analisis uji *Chi Square* dan *Odd Ratio (OR)*. Analisis bivariat dalam penelitian ini

untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan abortus.



G. Alur Penelitian



Bagan 3.1. Alur Penelitian

H. Etika Penelitian

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Respect for the person

Menghormati harkat dan martabat setiap manusia yang memiliki kebebasan dalam memilih dan bertanggung jawab dengan keputusannya sendiri.

2. Justice

Objek pada penelitian ini berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan manfaat yang adil, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan keuntungan dari masyarakat.

3. Beneficence dan nonmaleficence

Memiliki kewajiban untuk berperilaku baik, membantu orang lain dan tidak merugikan orang lain.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Penelitian dilaksanakan pada 26 Desember 2022 – 9 Februari 2023 di RSIA Ananda Makassar. Rumah Sakit ini telah beroperasi sejak 28 Oktober 1995 dengan status swasta. Rumah Sakit ini didirikan dengan niat dan upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam hal ini pelayanan asuhan kebidanan, asuhan keperawatan dan layanan kesehatan lainnya yang beroperasi 1 x 24 jam selama 7 hari dalam seminggu. RSIA Ananda Makassar berlokasi di Jl. Andi Djemma No. 58 Makassar, lokasi Rumah Sakit sangat strategis dan mudah dijangkau serta dikelilingi oleh sarana penunjang seperti toko kebutuhan bayi dan anak serta rumah makan yang memenuhi syarat kesehatan.

Visi dan misi dari RSIA Ananda Makassar adalah sebagai berikut :

1. Visi RSIA Ananda Makassar

Menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak terbaik di Kota Makassar dengan mengutamakan mutu dalam pelayanan pada masyarakat.

2. Misi RSIA Ananda Makassar

- a. Melayani dengan senyum
- b. Simpatik dan hati yang tulus
- c. Mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*)
- d. Memberikan pelayanan yang bermutu dengan SDM Profesional

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan analisis data untuk mengetahui distribusi frekuensi dan persentase dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, terdiri dari 102 sampel kasus dan 102 sampel kontrol sehingga total sampel sebanyak 204 sampel dengan rasio 1:1. Adapun distribusi sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022

Karakteristik	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Usia		
20-25 tahun	37	18,1
26-30 tahun	97	47,5
31-35 tahun	70	34,3
Paritas		
Primipara (paritas 1)	141	69,1
Multipara (paritas 2-3)	63	30,9
Usia Kehamilan		
<12 minggu	108	52,9
≥12 minggu	96	47,1
Anemia		
Anemia (Hb <11 g/dl)	37	18,1
Tidak anemia (Hb ≥ 11 g/dl)	167	81,9
Abortus		
Abortus	102	50,0
Tidak Abortus	102	50,0

Sumber : Data Sekunder, 2021-2022

Pada tabel 4.1 distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik sosiodemografi pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar tahun 2021-2022. Hasil penelitian untuk sosiodemografi berdasarkan usia ibu hamil yaitu usia 20-25 tahun sebanyak 37 orang (18,1%), usia 26-30 tahun sebanyak 97 orang (47,5%), usia 31-35 tahun sebanyak 70 orang (34,3%). Berdasarkan paritas yaitu ibu dengan paritas 1 (primipara) sebanyak 141 orang (69,1%) dan ibu hamil dengan paritas 2-3 (multipara) sebanyak 63 orang (30,9%). Berdasarkan usia kehamilan yaitu usia kehamilan <12 minggu sebanyak 108 sampel (52,9%) dan ≥ 12 minggu sebanyak 96 sampel (47,1%). Berdasarkan kejadian anemia yaitu sebagian besar ibu hamil tidak mengalami anemia dengan jumlah 167 orang (81,9%) dan ibu hamil yang mengalami anemia berjumlah 37 orang (18,1%). Berdasarkan kejadian abortus yaitu sebanyak 102 orang (50,0%) dan ibu hamil yang tidak mengalami abortus sebanyak 102 orang (50,0%).

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil dengan menggunakan uji *chi-square*.

Tabel 4.2 Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022

Anemia	Kejadian Abortus				Total <i>n</i>	%	<i>p</i> - <i>value</i>	<i>OR</i>	CI 95%
	Kasus		Kontrol						
	<i>N</i>	%	<i>N</i>	%					
Anemia (Hb <11 g/dl)	27	26,5	10	9,8	37	18,1	0,004	3,312	1.508- 7,276
Tidak Anemia (Hb ≥ 11 g/dl)	75	73,5	92	90,2	167	81,9			
Total	102	100	102	100	204	100			

Sumber : Data Sekunder , 2021-2022

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 37 ibu hamil yang mengalami anemia, sebanyak 27 ibu (26,5%) yang mengalami abortus dan sebanyak 10 ibu (9,8%) yang tidak mengalami abortus. Sedangkan dari 167 ibu hamil yang tidak anemia, sebanyak 75 ibu (73,5%) yang mengalami abortus dan sebanyak 92 ibu (90,2%) yang tidak mengalami abortus.

Analisis hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil dilakukan menggunakan uji *Chi Square* dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,004 ($p < 0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil. Nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 3,312 dengan CI 95% (1,508–7,276) menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 3,312 kali lebih besar untuk mengalami abortus dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.

C. Pembahasan

Pada penelitiagn ini didapatkan nilai *p-value* sebesar 0,004 ($p < 0,05$) yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022. Nilai *Odd Ratio* (OR) sebesar 3,312 dengan CI 95% (1,508–7,276) menunjukkan bahwa ibu dengan anemia memiliki risiko 3,312 kali lebih besar untuk mengalami abortus dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia di RSIA Ananda Makassar 2021-2022. Berdasarkan uji tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sivia A et al (2022) dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden, hasil penelitian didapatkan *p value* 0,000 ($<0,05$) artinya terdapat hubungan antara anemia dengan abortus di Wilayah Kerja PKM Burnai Mulya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kamila (2021) dengan jumlah sampel 93 ibu hamil, hasil penelitian didapatkan *p value* 0,017 ($< 0,05$) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara anemia dalam kehamilan dengan kejadian abortus di PKM Tanjung Karang. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami et al (2022) dengan jumlah sampel 41 orang, hasil penelitian didapatkan *p value* 0,009 ($< 0,05$) dan OR 5,82 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian abortus dan ibu yang mengalami anemia memiliki risiko 5,82 kali untuk mengalami abortus dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia di RSUD Sukadana Provinsi Lampung. Penelitian lainnya oleh Nurhikmah dan Yudiarsi (2020) dengan jumlah

sampel sebanyak 87 orang, hasil penelitian didapatkan *p value* 0,000 ($< 0,05$) yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian abortus di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Berdasarkan teori yang terdapat pada *Obstetric William*, bahwa anemia memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan janin semasa kehamilan. Salah satu jenis anemia yang berpengaruh ialah anemia aplastik yang dapat memicu timbulnya komplikasi kehamilan salah satunya ialah abortus melalui gangguan pada aliran darah dan kecukupan nutrisi dari ibu ke bayi melalui plasenta. Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Sarwono bahwa anemia paling sering disebabkan oleh defisiensi zat-zat nutrisi, dengan penyebab tersering adalah defisiensi zat besi, lalu defisiensi asam folat dan vitamin B12 (anemia megaloblastik) (Cunningham, *et al.*, 2019; Prawirohardjo, 2020).

Selama kehamilan darah tidak hanya digunakan untuk tubuh namun darah juga akan dialirkan kepada anak sehingga kebutuhan nutrisi tentunya akan meningkat, misalnya kebutuhan zat besi pada ibu hamil. Zat besi memiliki peran pada proses hematopoiesis dalam tubuh yaitu sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan dalam sintesis Hb dalam eritrosit jadi saat tubuh kekurangan zat besi maka hal ini akan mempengaruhi proses hematopoiesis hingga akhirnya menyebabkan kadar Hb menurun (Nurdin *et al.*, 2020). Defisiensi zat besi juga dapat menyebabkan stress oksidatif, hal ini dapat merusak perkembangan plasenta hingga dapat berakhir dengan kejadian abortus (Lopez, *et al.*, 2021).


Ibu hamil dengan anemia akan mempengaruhi nutrisi yang diterima oleh janinnya, saat kadar Hb dalam darah <11 g/dl maka kemampuan darah untuk mengikat dan membawa oksigen serta nutrisi yang dibawa oleh eritrosit (sel darah merah) ke seluruh organ termasuk ke plasenta dan janin akan berkurang, jika hal ini terjadi terus menerus maka akan menyebabkan jaringan nekrosis yang diawali dengan terjadinya perdarahan pada desidua basalis hingga akhirnya seluruh atau sebagian hasil konsepsi terlepas, kondisi ini kemudian disebut dengan abortus (Zakira & Hardianto, 2021; Wulandari, *et al*, 2022).

D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan di RSIA Ananda Makassar untuk mengetahui hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil tahun 2021-2022, dalam prosesnya masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan data rekam medik dan terdapat beberapa rekam medik yang tidak lengkap sehingga dianggap sebagai *missing case* dan data pada rekam medik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian ini.
2. Banyaknya rekam medik yang memenuhi kriteria eksklusi sehingga diharuskan untuk mencari rekam medik lebih banyak lagi agar minimal sampel yang memenuhi kriteria inklusi dapat terpenuhi.
3. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya anemia sedangkan berdasarkan hasil penelitian terdapat ibu hamil yang tidak

anemia tapi mengalami abortus, hal ini membuktikan bahwa terdapat faktor risiko lain yang tidak diteliti yang mungkin dapat menyebabkan kejadian abortus.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang hubungan anemia dengan kejadian abortus pada ibu hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 37 (18,1%) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
2. Jumlah ibu hamil yang mengalami abortus sebanyak 102 (50,0%) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
3. Pada penelitian ini ibu hamil memiliki karakteristik yaitu sebagian besar terdiri atas kelompok ibu hamil dengan usia 26-30 tahun, kelompok ibu hamil dengan usia kehamilan <12 minggu, dan kelompok ibu hamil dengan paritas primipara (paritas 1) di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara anemia dengan kejadian abortus di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022 dengan nilai *p-value* = 0,004.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Membuat program-program rumah sakit yang dapat menurunkan angka kejadian abortus dan anemia dengan memberikan edukasi atau penyuluhan pada ibu hamil untuk mencegah risiko kejadian abortus.

2. Bagi Peneliti

Disarankan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor risiko anemia dengan mengklasifikasikan anemia ringan, sedang dan berat serta variabel lain agar didapatkan ruang lingkup studi yang lebih luas terkait faktor risiko lainnya yang dapat menyebabkan kejadian abortus.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan terkhusus pada ibu hamil yang berisiko agar mampu mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian abortus sehingga ibu hamil beserta keluarganya dapat melakukan pencegahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Medan, U. (2019). Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis. *Jurnal Biomedik*, 11(3), 182–191. Tersedia pada : <https://doi.org/10.35790/jbm.11.3.2019.26660>
- Al-Qur'an Kemenag online: *Qur'an Dan Terjemahan*
- Alamsyah, W. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit Anemia pada Ibu Hamil Usia Kehamilan 1-3 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Bontamarannu Kabupaten Gowa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 41-48. Tersedia pada : <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.48>
- Asniar., Setiawati, D., Trisnawaty, (2022). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Abortu. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan- Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 21(2), 207-218. Tersedia pada : <https://jurnal.fk.uisu.ac.id/index.php/ibnusina/article/view/226>
- Aprianto, I., Nulanda, M., Wahyu S., Mappaware, N., Julyani, S. (2022). Karakteristik Faktor Resiko Kejadian Abortus di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. *Fakumi Medical Journal : Jurnal Mahasiswa Kedokteran*, 2(7), 503-510.
- Bakta, I. M. (2017). Pendekatan Diagnosis dan Terapi Terhadap Penderita Anemia. *Bali Health Journal*, 1(1), 36–48.
- Cunningham *et al.* (2019). Obstetri Williams, in EGC.
- Deswati, D. A., Suliska, N., & Maryam, S. (2019). Pola Pengobatan Anemia Pada Ibu Hamil di Salah Satu Rumah Sakit Ibu dan Anak. *Jurnal Family Edu*, 5(1), 13–21.
- Erlita, E., & Waluyadi, W. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provokatus Criminalis Di Kota Cirebon. *Hukum Responsif*, 9(1), 29–36. <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5039>
- Fairuz, & Suhair, H. D. (2019). Penyuluhan tentang abortus dan resiko perdarahan dalam kehamilan di wilayah kerja puskesmas sungai duren kabupaten muaro jambi. *Medic*, 2(1), 9–12.
- Fatimah, S., & Kania, N. D. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Anemia Dengan Risiko Kejadian Bblr. *Journal of Midwifery and Public Health*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25157/jmph.v1i1.1998>
- Fatmawati. (2016). Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik). *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(1), 151–163.

<https://media.neliti.com/media/publications/285765-aborsi-dalam-perspektif-hukum-islam-melu-1a99d924.pdf>

- Fauzianty, A., & Sulistyarningsih, S. (2022). Implementasi Tatalaksana Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil: Scoping Review. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 7(2), 94. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.69318>
- Febriani, A. Y. U., & Sijid, S. T. A. (2021). *Review : Anemia Defisiensi Besi*. November, 137–142.
- Fajrin, F. (2020). Kepatuhan Konsumsi Zat Besi (Fe) Terhadap Anemia Pada Ibu Hamil. *Window of Health : Jurnal Kesehatan*, 3(4), 336–342.
- Kusumawardani, F., Prabowo, A. Y., & Rodiani. (2018). Hubungan Anemia Maternal dengan Depresi Postpartum Fernanda. *Jurnal Majority*, 7(2), 267–272.
- Kemendes RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemendes RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lisa, U. F., & Harisna, D. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Abortus pada Ibu Hamil di Ruang Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah dr . Zainoel Abidin Pemerintah Aceh Tahun 2017 Factors Affecting Abortus ' s Event in Pregnant Woman in The Hospital Room General Regional dr . Zainoel Abidin The Government of Aceh Year 2017*. 3(2), 243–253.
- Lopez, A. D., Ribot, B., Basora, J., & Arija, V. (2021). High and Low Haemoglobin Levels in Early Pregnancy Are Associated to a Higher Risk of Miscarriage: A Population-Based Cohort Study. *Journal Nutrients*, 1-12.
- Nurdin, A., M, Y. I., & Palancoi, N.A. (2020). Hubungan Tingkat Kepatuhan ANC dengan Kejadian Anemia, Makrosomia, dan Gemeli pada Kasus Pendarahan Postpartum. *UMI Medical Journal* 5(2), 56-62.
- Octarina, W. N., Putra, A. E., & Antonius, P. A. (2018). HUBUNGAN INFEKSI Chlamydia trachomatis DENGAN KEJADIAN ABORTUS SPONTAN DI RSUD DR. RASIDIN DAN RSIA SITI HAWA PADANG. *Jurnal KesehatanAndalas*,7(Supplement3),15. <https://doi.org/10.25077/jka.v7i0.863>
- Purba, A., & Haslin, S. (2022). Skrining Anemia Sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil Di Praktik Mandiri Bidan Tanjung Delitua. *JUKESHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 63–68. <https://doi.org/10.51771/jukeshum.v2i1.202>

- Prawirohardjo, S. (2020). Ilmu Kebidanan (Edisi empat). Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Purwaningrum, E. D., & Fibriana, A. I. (2017). Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan. *Public Health Research and Development*, 1(3), 84–94. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Putri, L. M. (2018). Faktor Risiko Utama Maternal Penyebab Abortus Di Puskesmas Kecamatan Iv Koto Kabupaten Agam. *Jurnal Endurance*, 3(2), 383. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i2.3144>
- Ratmawati, L. A., Riwayati, C., & Utaringsih, D. (2019). Pemeriksaan Kehamilan Pada Ibu Hamil Di Politeknik Banjarnegara. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(1). <https://doi.org/10.31596/jpk.v2i1.22>
- Rahayu, S., Nurdin, A., & Rahim, R. (2020). The Relationship of Anemia in Pregnant Women with Anthropometry and Apgar Score for Newborn in Dr. Tadjuddin Chalid Hospital, Makassar. *Green Medical Journal*, 3(1), 13-22.
- Sasono, H. A., Husna, I., Zulfian, Z., & Mulyani, W. (2021). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Beberapa Wilayah Indonesia. *Jurnal Medika Malahayati*, 5(1), 59–66. <https://doi.org/10.33024/jmm.v5i1.3891>
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & S, M. A. (2021). Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Medika Hutama*, 2(2), 509-517
- Silitonga, J. M., Sitorus, R. J., & Yeni. (2017). Faktor-faktor penyebab kejadian abortus spontan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 100–108. <http://www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm>
- Sjahrani, T., & Faridah, V. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia. *Jurnal Kebidanan*, 5(2), 106–115. <http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kebidanan/article/viewFile/1253/pdf>
- Syarfaini, Alam, S., Aeni, S., Habibi, & Noviani, N. A. (2019). Faktor Risiko Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Sudiang Raya Kota Makassar. *Al-Sihah: Public Health Science Journal*, 11(2), 143–155. <http://103.55.216.56/index.php/Al-Sihah/article/view/11923/7755>
- Shihab, M.Q. (2017). *Tafsir Al Misbah Jilid 15*. Lentera Hati.
- Sari, Y. N., Herfanda, E., & Putri, I. M. (2022). Gambaran Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan Pada Ibu Hamil Di Rsud Panembahan Senopati

- Bantul Tahun 2017-2018. *Jurnal Sehat Mandiri, Volume 17 No 1*, 135-145.
- Sulastrri, K, A. S., & Nugraha, O. D. (2022). Pencegahan Anemia Ibu Hamil Dengan “NUMIL”. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian Vol.2 No.2* , 295-300.
- Tampubolon, R., Lasamahu, J. F., & Panuntun, B. (2021). Identifikasi Faktor-Faktor Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(4), 489–505. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i4.432>
- Wulandari, T., Sitti, S., Sari, J. I. (2022). Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "N" dengan Abortus Inkomplit di RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Tahun 2019. *Jurnal Widwifery*, 4(1), 7-18.
- Widhihastuti, A. D., & Putri, I. M. (2020). Determinan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus. *University Research Colloquium* , 233-238.
- WHO. (2019). *Maternal Mortality*. Tersedia pada : <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Yuniarti, & Zakiah. (2021). Anemia pada remaja putri di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2253–2262.
- Zakira, S., Hardianto G. (2021). Risk Factors Associated with Spontaneous Abortion in Dr. Soetomo General Hospital Surabaya: a Case-control Study. *Jurnal Widwifery*, 7(1), 65-80.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil SPSS

Frequency Table

		Paritas			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	primipara	141	69,1	69,1	69,1
	multipara	63	30,9	30,9	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-25	37	18,1	18,1	18,1
	26-30	97	47,5	47,5	65,7
	31-35	70	34,3	34,3	100,0
	Total	204	100	100	

		Usia Kehamilan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 12 minggu	108	52,9	52,9	52,9
	≥ 12 minggu	96	47,1	47,1	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

		Anemia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	37	18.1	18.1	18.1
	Tidak	167	81.9	81.9	100.0
	Total	204	100.0	100.0	

		Abortus			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Kasus	102	50.0	50.0	50.0
	Kontrol	102	50.0	50.0	100.0
	Total	204	100.0	100.0	

		Statistics		
		Kadar Hb	Anemia	Abortus
Valid		204	204	204
Missing		0	0	0
Mean		12.0471	1.82	1.50
Median		12.3000	2.00	1.50
Std. Deviation		1.46622	.386	.501
Minimum		5.90	1	1
Maximum		15.20	2	2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

		Abortus		Total	
		Kasus	Kontrol		
Anemia	Ya	Count	27	10	37
		Expected Count	18.5	18.5	37.0
		% within Anemia	73.0%	27.0%	100.0%
		% within Abortus	26.5%	9.8%	18.1%
		% of Total	13.2%	4.9%	18.1%
	Tidak	Count	75	92	167
		Expected Count	83.5	83.5	167.0
		% within Anemia	44.9%	55.1%	100.0%
		% within Abortus	73.5%	90.2%	81.9%
		% of Total	36.8%	45.1%	81.9%
Total		Count	102	102	204
		Expected Count	102.0	102.0	204.0
		% within Anemia	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Abortus	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

		Value	Df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson	Chi-Square	9.541 ^a		.002		
Continuity	Correction ^b	8.452		.004		
Likelihood Ratio		9.845		.002		
Fisher's Exact Test					.003	.002

Linear-by-Linear Association	9.495		.002	
N of Valid Cases	204			

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Anemia (Ya / Tidak)	3.312	1.508	7.276
For cohort Abortus Kasus =	1.625	1.255	2.104
For cohort Abortus Kontrol =	.491	.284	.848
N of Valid Cases	204		

Lampiran 2 : Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.355/KEPK/FKIK/XII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Nurfauziah Azzahrah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Spontan pada Ibu Hamil di RSIA Ananda
Makassar 1 Januari – 30 Desember Tahun 2021"**

*"Relationship between Anemia and Spontaneous Abortion in Pregnant Women at RSIA Ananda Makassar
1 January – 30 December 2021"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023.

This declaration of ethics applies during the period December 9th, 2022 until December 9th, 2023.

Prof. Dr. H. Nurfauziah Azzahrah, Sp.A., M.Kes
Chairperson,
November 18th, 2022



Lampiran 3: Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Teip. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12957/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSIA Ananda Makassar
Perihal	: <u>izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 1190 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 05 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: NURFAUZIAH AZZAHRAH
Nomor Pokok	: 70600119008
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN ANEMIA DENGAN KEJADIAN ABORTUS SPONTAN PADA IBU HAMIL DI RSIA ANANDA MAKASSAR 1 JANUARI – 30 DESEMBER TAHUN 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Desember 2022 s/d 25 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
	Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Rumah Sakit Ibu dan Anak ANANDA

Jl. Andi Djemma No. 57, Makassar – Indonesia
Telp. +62411 – 874596, Fax : +62411 – 853694
Email : sekretariat@anandahospital.com | Website : www.anandahospital.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 050/RSIA-A/II/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qalbia Muhammad Nur, SKM., MARS
Jabatan : Sekretaris Direktur

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurfauziah Azzahrah
Asal Institusi : FK – UIN ALAUDDIN
Judul : **“*Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Spontan pada Ibu Hamil di RSIA Ananda Makassar Tahun 2021-2022*”**

Adalah benar telah melakukan penelitian di RSIA ANANDA Makassar pada tanggal 26 Desember 2022 – 09 Februari 2023

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Februari 2023
Sekretaris Direktur

Qalbia Muhammad Nur, SKM., MARS

Lampiran 5: Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Nurfauziah Azzahrah
2. NIM : 70600119008
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 9 Juli 2001
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Mannuruki II Lorong 4a
8. Orang Tua
 - a. Ayah : Burhanuddin Bohari
 - b. Ibu : Purniawaty

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 060 Pekkabata
2. SMP : SMPN 3 Polewali
3. SMA : SMAN 3 Polewali
4. Tahun 2019 melanjutkan Studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Dokter