

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL  
DAUN TOBO-TOBO (*Ficus septica* Burm) TERHADAP  
BAKTERI ULKUS DIABETIK**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Oleh:

**NURFITRAH SYAMSUDDIN**

**70100117027**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfitriah Syamsuddin

NIM : 70100117027

Tempat/Tanggal Lahir : Balang, 18 Desember 1999

Jurusan : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Desa Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan

Judul : “Uji Aktivitas Ekstrak Daun Tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa dia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, Januari 2023

Penulis



Nurfitriah Syamsuddin  
NIM. 70100117027

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik” yang disusun oleh Nurfitriah Syamsuddin, NIM. 70100117027, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari/ tanggal Senin, 03 April 2023 M yang bertepatan dengan 12 Ramadhan 1444 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 03 April 2023 M  
12 Ramadhan 1444 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A, M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Afrisusnawati Rani, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Drs. H/Moh. Kurdi, M.Hi.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai Rahmatan lil'alam dan menyebarkan dakwah Islam sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Salam serta shalawat juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Dalam perjalanan menyelesaikan studi selama ini penulis tidak memungkiri adanya dukungan-dukungan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta kepada ayahanda Almarhum Bapak Syamsuddin Matte dan Ibunda Suriati yang telah mendoakan, memberikan seluruh kasih dan sayang serta pengorbanan dan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis. Serta kepada saudara terkasih kakak Adnan Syam, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta para Wakil Rektor.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. M. Faris Satrianegara S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
7. Ibu apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
8. Ibu apt. Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
9. Ibu apt. Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak Drs. H. Muh Kurdi, M.Hi. selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukan dalam bidang ilmu Agama Islam di skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah

memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

12. Teman-teman KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 yang tidak henti-hentinya saling menyemangati dan merangkul selama penyusunan skripsi
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan Farmasi dan masyarakat, serta bernilai ibadah di sisi Allah swt.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Gowa, Januari 2023

Penulis



Nurfitriah Syamsuddin  
NIM. 70100117027

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	3
D. Kajian Pustaka .....	3
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Tobo-tobo ( <i>Ficus Septica</i> Burm) .....	7
B. Diabetes dan Ulkus Diabetik .....	8
C. Bakteri Ulkus Diabetik .....	16
D. Ekstraksi .....	22
E. Tinjauan Islami .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian dan Waktu .....	27
C. Instrumen Penelitian .....	27
D. Prosedur Kerja .....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	34

A.	Hasil Penelitian .....	34
B.	Pembahasan .....	37
BAB V PENUTUP.....		46
A.	Kesimpulan .....	46
B.	Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....		47
LAMPIRAN .....		51
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		81





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Diameter Zona Hambat .....	31
Tabel 2. Hasil Ekstraksi dan Identifikasi Senyawa Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) .....	34
Tabel 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .....	34
Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Providencia stuartii</i> .....	35
Tabel 5. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Citrobacter freundii</i> .....	35
Tabel 6. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Pseudomonas luteola</i> .....	36
Tabel 7. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Burkholderia cepacia</i> .....	36
Tabel 8. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Acinetobacter baumannii</i> .....	37
Tabel 9. Hasil Uji Aktivitas Antibakakteri Ekstrak Etanol Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) Terhadap Bakteri <i>Proteus merabilis</i> .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tobo-Tobo.....	7
Gambar 2. Algoritma Diabetes Melitus .....	9
Gambar 3. Sampel daun tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm) .....	61
Gambar 4. Ekstraksi daun tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm).....	62
Gambar 5. Skrining Fitokimia .....	63
Gambar 6. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba .....	64
Gambar 7. Pembuatan deret konsentrasi ekstrak.....	65
Gambar 8. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba .....	66
Gambar 9. Hasil pengujian aktivitas daya hambat .....	67



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian .....	52
Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel .....	53
Lampiran 3. Skema Kerja Sterilisasi .....	54
Lampiran 4. Skema Kerja Skrining Fitokimia .....	55
Lampiran 5. Skema Kerja Pembuatan Medium NA .....	57
Lampiran 6. Skema Kerja Pembuatan Medium <i>Mac Conkey</i> .....	58
Lampiran 7. Skema Kerja Peremajaan Bakteri.....	59
Lampiran 8. Skema Kerja Pembuatan Suspensi Bakteri.....	60
Lampiran 9. Skema Kerja Pengujian Aktivitas Daya Hambat.....	61
Lampiran 10. Gambar Pengamatan.....	62
Lampiran 11. Uji two-way ANOVA.....	75
Lampiran 11. Surat Izin Penelitian.....	78



## ABSTRAK

Nama : Nurfitriah Syamsuddin  
NIM : 70100117027  
Jurusan : Farmasi  
Judul Penelitian : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik

---

Daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) yang pemanfaatannya telah digunakan secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Kandungan yang terdapat dalam daun tersebut terdiri dari senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin yang merupakan senyawa yang bersifat antibakteri sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap bakteri ulkus diabetik yakni *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*. Jenis penelitian ini adalah eksperimental kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol, pengujian bakteri menggunakan metode difusi agar pada medium NA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid dan tanin. Pada uji aktivitas antibakteri pada masing-masing ekstrak dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% diperoleh bahwa ekstrak etanol daun tobo-tobo pada konsentrasi 100% memberikan efektivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri dengan nilai diameter rata-rata: *Pseudomonas aeruginosa* 12,8 mm (kuat), *Providencia stuartii* 9,33 mm (sedang), *Citrobacter freundii* 11,83 mm (kuat), *Pseudomonas luteola* 11 mm (kuat), *Burkholderia cepacia* 10,16 mm (kuat), *Acinetobacter baumannii* 9,5 mm (sedang), *Proteus merabilis* 6,5 mm (sedang).

**Kata kunci:** Daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm), Bakteri ulkus diabetik, antibakteri

## ABSTRACT

Name : Nurfitriah Syamsuddin  
Student Registration Number : 70100117027  
Departement : Pharmacy  
Research Title : Antibacterial Activity Test of Tobo-Tobo Leaf Extract (*Ficus septica* Burm) Against Diabetic Ulcer Bacteria

---

Tobo-tobo leaves (*Ficus septica* Burm) which have been widely used by people in Indonesia where the ingredients contained in these leaves consist of alkaloid compounds, saponins, flavonoids, and tannins which are compounds that are antibacterial so they have the potential to be developed as plants. drug. This study aims to determine the antibacterial activity of the ethanol extract of tobo-tobo leaves against diabetic ulcer bacteria namely *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*. This type of research is a quantitative experimental method used, namely extraction by maceration method using ethanol solvent, bacterial testing using the agar diffusion method on NA medium. The results showed that the ethanol extract of tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) leaves contained alkaloids, saponins, flavonoids and tannins. In the antibacterial activity test on each extract with a concentration of 20%, 40%, 60%, 80% and 100% it was found that the ethanol extract of tobo-tobo leaves at a concentration of 100% gave the greatest antibacterial effect on bacterial growth with an average diameter value flat. average: *Pseudomonas aeruginosa* 12.8 mm (strong), *Providencia stuartii* 9.33 mm (medium), *Citrobacter freundii* 11.83 mm (strong), *Pseudomonas luteola* 11 mm (strong), *Burkholderia cepacian* 10.16 mm (strong), *Acinetobacter baumannii* 9.5 mm (moderate), *Proteus merabilis* 6.5 mm (moderate).

**Keywords:** Tobo-tobo leaves (*Ficus septica* Burm), diabetic ulcer bacteria, antibacterial

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, yang terdiri dari tumbuhan tropis. Di wilayah Indonesia terdapat sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.000 di antaranya diduga berkhasiat obat. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Barat, juga memiliki beberapa jenis tanaman obat yang dapat digunakan dalam pengobatan berbagai jenis penyakit. Penyakit yang dapat disembuhkan antara lain diabetes melitus, hipertensi, diare, tetanus, anemia, dan lain-lain (Mu’Nisa et al., 2018).

Tanaman obat memiliki khasiat yang berbeda-beda. Khasiat tanaman obat sangat bergantung pada komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya komponen bioaktif tersebut, tanaman obat mampu menetralkan penyebab suatu penyakit seperti daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) yang pemanfaatannya telah digunakan secara luas oleh masyarakat di Indonesia (Mu’Nisa et al., 2018).

Menurut pengalaman empiris mengkonsumsi daun tobo-tobo dapat menurunkan glukosa darah dengan merebus air daun tersebut. Kandungan yang terdapat dalam daun tersebut terdiri dari senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenol. Senyawa tersebut merupakan sumber biofarmaka yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat (Dewi, 2020).

Daun tobo-tobo memiliki manfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri, menyembuhkan penyakit kulit seperti bisul, obat sakit radang usus buntu, mengobati gigitan ular berbisa dan sebagai obat sesak napas (Wahyuni et al., 2021).

Ulkus diabetikum merupakan luka kronik yang biasa terjadi pada daerah

di bawah pergelangan kaki yang diakibatkan oleh proses neuropati perifer, penyakit arteri perifer atau keduanya (Sukmana et al., 2020) dan dapat menyebar hingga jaringan di bawah epidermis, tendon, otot, tulang, dan sendi yang disebabkan tingginya kadar glukosa darah. Komplikasi ulkus diabetik sering dialami penderita diabetes melitus sebagai faktor utama amputasi dan kematian pada penderita diabetes (Nufus et al., 2021).

Bakteri yang terdapat dalam ulkus diabetik berupa gabungan antara bakteri aerob dan anaerob. Bakteri terbanyak yang teridentifikasi pada luka kaki diabetes yang mengalami infeksi dari gram positif adalah *Staphylococcus Aureus* dan dari gram negatif yakni bakteri *Pseudomonas Aeruginosa*. Namun terdapat beragam bakteri lain yang juga ditemukan, seperti *Basil subtilis*, *Streptococcus sp*, *Proteus sp*, dan *Enterobacter sp* (Fradianto, 2022). Menurut penelitian (Fitria et al., 2017) bakteri terbanyak dalam luka kaki diabetes selain *S. Aureus* dan *Pseudomonas sp* adalah *Proteus*, *Enterococcus*, dan *E. coli*. Infeksi pada luka sering terjadi di fase kronik.

Daun tobo-tobo yang memiliki manfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Bacillus subtilis* dan *Escherichia coli* secara invitro. Dari hasil pengujian autobiografi, dilaporkan bahwa ekstrak daun tobo-tobo yang larut dalam metanol dapat menghambat pertumbuhan bakteri (Utami, 2008).

Berdasarkan penjelasan, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai "Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus Septica* Burm) terhadap ulkus diabetes" untuk mengetahui apakah ekstrak daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)?
2. Jenis bakteri apa saja pada ulkus diabetik?
3. Apakah ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik?

## **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Definisi Operasional**

- a. Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri yang merugikan
- b. Ekstrak adalah pemisahan suatu senyawa yang di peroleh dengan mengestraksi bahan mentah secara kimiawi.
- c. Daun tobo-tobo adalah tumbuhan yang berasal dari keluarga *Moraceae* yang memiliki nama ilmiah yaitu *Ficus septica* Burm yang termasuk kerabat beringin, anggota familia *Moraceae* yang ditemukan di hutan semak atau tempat yang meliar.
- d. Ulkus diabetik adalah luka yang terbuka yang terjadi pada penderita Diabetes mellitus di sebabkan oleh infeksi yang sering mempersulit penyembuhan akibat berkurangnya sirkulasi arteri.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian uji kualitatif dengan uji aktivitas antibakteri ekstrak daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik.



#### D. Kajian Pustaka

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Bawondes et al., 2021) dengan judul “*Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Awar-Awar Ficus septica Burm. terhadap Bakteri Staphylococcus aureus*” dengan mengekstraksi buah awar-awar dengan pelarut etanol, selanjutnya hasil ekstraksi dilakukan skrining fitokimia, dan hasil menunjukkan bahwa kandungan senyawa yang terkandung dalam Buah *Ficus septica Burm.* yaitu senyawa alkaloid, tanin, flavonoid, saponin dan fenolik. Setelah itu dilakukan uji antibakteri dengan larutan uji ekstrak etanol buah awar-awar dengan berbagai konsentrasi (25, 50, 75, 100, 125, 175 mg/mL). Aquadest sebagai kontrol negatif dan larutan ciprofloxacin 50µg/50µl sebagai kontrol positif, masing-masing diteteskan pada sumur yang berbeda lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 1×24 jam. Hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol buah awar-awar terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri *S.aureus* dengan konsentrasi 175mg/mL menunjukkan adanya aktivitas antibakteri yang kuat dengan nilai zona hambat 19,8 mm.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Khusnuryani & Fuad, 2015) dengan judul “*Antibacterial Activity Of Awar-Awar Leaves (Ficus septica Burm) Against Staphylococcus aureus ATCC 29523 And Eschericia coli ATCC 35218*” Penelitian ini dilakukan untuk mengamati aktivitas ekstrak etanol daun Awar-awar (*Ficus septica Burm f*) sebagai antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 29523 dan *Escherichia coli* ATCC 35218 berdasarkan pembentukan zona bening dan analisis kebocoran sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun awar awar memiliki aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* ATCC 29523 dan *E. coli* ATCC

35218. Berdasarkan diameter zona bening, aktivitas antibakteri tergolong sedang. Analisis kebocoran sel menggunakan spektrofotometer pada  $\lambda$  260 nm dan 280 nm tidak menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun awar-awar dapat menyebabkan kebocoran sel pada *S. aureus* ATCC 29523 dan *E. coli* ATCC 35218.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sukadana, 2010) dengan judul “Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid Dari Kulit Akar Awar-Awar (*Ficus Septica* Burm F)” dilakukan isolasi senyawa antibakteri dari kulit akar Awar-awar (*Ficus septica* Burm f.). Sebanyak 120,0 g ekstrak kental metanol diperoleh dari maserasi 3,9 kg serbuk kering kulit akar Awar-awar. Sekitar 60,0 g ekstrak ini dilarutkan dalam asam klorida 2 N kemudian dipartisi dengan kloroform. Ekstraksi ekstrak asam menggunakan kloroform menghasilkan 0,82 g ekstrak kental kloroform yang positif mengandung flavonoid. Selanjutnya pemisahan ekstrak ini menggunakan teknik kromatografi kolom menghasilkan 8 fraksi yaitu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 dan F8 yang mempunyai profil yang berbeda. Hasil uji flavonoid dari kedelapan fraksi menunjukkan fraksi F2, F5, dan F6 positif mengandung senyawa flavonoid. Permurnian fraksi F2 dengan cara melarutkannya kedalam n-heksana diperoleh 2 fraksi yaitu fraksi F2.1 dengan berat 0,13 g dan fraksi F2.2 sebanyak 0,01 g. Spektroskopi inframerah dan ultra violet-visible digunakan untuk mengidentifikasi fraksi F2.1 (isolat). Berdasarkan spektra inframerah menunjukkan isolat mempunyai gugus-gugus dengan ikatan  $-OH$ ,  $C=O$ ,  $C=C$  dan  $C-H$  aromatik serta ikatan  $C-H$  alifatik. Sedangkan dari spektra ultra violet-visible menunjukkan 2 pita serapan pada panjang gelombang 328,6 nm (pita I) dan 281,5 nm (pita II) yang mengindikasikan isolat termasuk

flavonoid golongan flavanon atau dihidroflavonol. Dengan menggunakan pereaksi geser isolate flavonoid termasuk golongan flavanon dengan kemungkinan substituen gugus hidroksi terletak pada atom C-2', C-5' atau C-6' dan C-8, gugus metil atau glikosilasi pada atom C-5 dan C-7. Isolat flavanon menunjukkan aktif antibakteri terhadap *Vibrio cholera* dan *Eschericia coli*.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)
2. Mengetahui jenis bakteri apa saja pada ulkus diabetik
3. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri ulkus diabetik

#### **F. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan sebagai upaya dalam pengembangan ilmu dibidang kesehatan mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang kesehatan dan pada penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya menambah informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Tobo-Tobo (Ficus septica Burm)*



##### 1. Klasifikasi

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Subkelas	: Monochlamidae
Ordo	: Euphorbiales
Famili	: Euphorbiaceae
Genus	: Ficus
Species	: <i>Ficus septica</i> Burm

(Simanjuntak, 2018)

##### 2. Nama Daerah

Awar-awar (Sulawesi barat), tobo-tobo (Sulawesi selatan), kiciyat (sunda), barabar (madura), dan dausalo (bugis).

(Simanjuntak, 2018)

### 3. Morfologi

*Ficus septica* merupakan jenis perdu atau pohon kecil, tinggi antara 100–150 cm. Kulit batang berwarna abu-abu putih. Buah semu di ketiak daun yang luruh, bentuk buah membulat gepeng, warna buah hijau muda atau hijau keabu-abuan. Habitat hutan primer, hutan sekunder dan semak belukar (Simanjuntak, 2018).

### 4. Kandungan

Kandungan kimia yang terdapat pada daun, buah, dan akar adalah saponin dan flavonoid, disamping itu buahnya mengandung alkaloid dan tanin, sedangkan akarnya mengandung senyawa fenol. Khusus pada daun tobo-tobo memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin (Simanjuntak, 2018).

### 5. Manfaat

Manfaat tobo-tobo dapat mengobati diabetes melitus, meningkatkan sistem imun, memiliki efek anti kanker pada berbagai jenis sel (Dewi, 2020). Mengobati bisul, luka, borok, dan penawar racun binatang berbisa (Gardjito et al., 2021).

## **B. Diabetes Melitus dan Ulkus Diabetik**

Diabetes melitus tipe 2 didefinisikan adanya resistensi insulin dan disfungsi sel- $\beta$ . Diabetes melitus tipe 2 ditandai dengan kombinasi beberapa derajat resistensi insulin dengan relatif kurangnya sekresi insulin yang tidak cukup untuk menormalkan kadar glukosa plasma, dengan hilangnya sel- $\beta$  secara progresif dari waktu ke waktu (Dipiro et al., 2017).

Ketika salah satu dari tiga pilihan pengujian untuk hasil glikemik melebihi nilai ambang batas, diabetes mellitus didiagnosis. Jika kadar yang menyimpang ditemukan, diagnosis harus dibuat keesokan harinya kecuali ada tanda-tanda hiperglikemia yang jelas, seperti polidipsia, poliuria, atau polifagia. Baik  $A_{1c}$ , glukosa plasma puasa (FPG), atau OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) adalah tes yang tepat untuk mendeteksi diabetes melitus (Dipiro et al., 2017).

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2019 dari PERKENI, parameter yang menjadi sasaran kendali glukosa darah adalah nilai HbA1c <7% secara individual. Adapun pertimbangan pemilihan terapi pada pasien diabetes melitus sangat bervariasi bergantung pada nilai HbA1c awal. Strategi pengobatan yang dapat dijalankan dalam terapi diabetes melitus dapat dilakukan secara monoterapi maupun kombinasi beberapa agen terapi, baik oral maupun injeksi serta insulin tergantung pada kondisi klinis masing-masing pasien. Beberapa faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan dokter dalam memilihkan regimen terapi pada setiap pasien antara lain biaya, ketersediaan, efektivitas, manfaat kardioresenal, efek terhadap berat badan, efek samping, dan pilihan pasien (Perkeni, 2021).



Gambar 2. Algoritma Diabetes Melitus

Ulkus kaki diabetik (DFU) didefinisikan sebagai ulkus yang mengenai kaki pasien diabetes yang berhubungan dengan neuropati perifer dan/atau penyakit arteri. Ini adalah komplikasi diabetes yang kronis dan menghancurkan. Hanya dua pertiga dari ulkus kaki yang sembuh, sedangkan sisanya akan tetap aktif. Dalam 6-18 bulan setelah evaluasi awal, 5-24% kasus DFU akan berakhir dengan amputasi ekstremitas (Wijaya et al., 2019).

Ada berbagai faktor risiko untuk perkembangan ulkus kaki pada pasien diabetes. Faktor yang paling penting adalah neuropati perifer, deformitas kaki, trauma ringan, dan penyakit arteri perifer. Hingga 66% pasien diabetes mengalami neuropati pada ekstremitas bawah. Hal ini disebabkan oleh paparan hiperglikemia kronis. Polineuropati sensorimotor adalah neuropati yang paling umum pada diabetes. Neuropati sensorik dikaitkan dengan kurangnya sensasi cedera; sehingga kaki menjadi rentan terhadap cedera mekanis atau tekanan atau termal. Tegangan geser berulang pada suatu area adalah penyebab umum DFU. Neuropati motorik memicu atrofi pada otot kaki dan kaki intrinsik. Tubuh menjadi tidak mampu mengoordinasikan gerakan dan anatomi kaki secara bertahap berubah, memulai pembentukan deformitas kaki. Deformitas kaki, keterbatasan mobilitas sendi, dan kurangnya sensasi menyebabkan beban biomekanik abnormal pada beberapa area kaki. Kulit pada daerah tersebut menebal (pembentukan kalus), mengalami perdarahan subkutan, dan akhirnya mulai mengalami ulserasi. Seiring waktu, pasien diabetes dapat mengembangkan disfungsi otonom di ekstremitas bawah. Ini mempengaruhi sudomotor dan menyebabkan kulit kaki kering. Kulit kering rentan pecah-pecah dan ulserasi. Penyakit arteri perifer (PAD) menyebabkan transfer oksigen dan nutrisi yang tidak memadai ke area luka dan meningkatkan risiko luka menjadi kronis dan juga terinfeksi (Wijaya et al., 2019).

Infeksi ulkus diabetikum biasanya diobati dengan pemberian antibiotik. Terapi antibiotik empiris dipilih berdasarkan kondisi klinis pasien, hasil pewarnaan Gram, dan pola bakteri yang sering diisolasi dan sensitif terhadap antibiotik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bakteri Gram-positif paling sensitif terhadap Imipenem dan Linezolid. Juga, antibiotik yang paling efektif untuk isolat Gram-negatif adalah Amikasin, Imipenem, dan Meropenem. Berbagai penelitian telah melaporkan tingginya prevalensi Multidrug-Resistant Organisms

(MDROs) pada infeksi ulkus diabetikum (Yani et al., 2021). Pedoman infeksi ulkus diabetikum (Lipsky et al., 2019)

1. Mendiagnosis infeksi kaki diabetik jaringan lunak secara klinis, berdasarkan adanya tanda dan gejala peradangan lokal atau sistemik.
2. Nilai tingkat keparahan infeksi kaki diabetik dengan menggunakan *Infectious Diseases Society of America/International Working Group* pada skema klasifikasi kaki diabetik.

Derajat Infeksi	Gambaran Klinis
Derajat 1 (tidak terinfeksi)	Tidak ada gejala sistemik atau lokal atau tanda-tanda infeksi
Derajat 2 (ringan)	Lesi superfisial, dengan minimal 2 dari kriteria berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teraba hangat di sekitar luka</li> <li>b. Eritema &gt; 0,5- 2 cm</li> <li>c. Nyeri lokal</li> <li>d. Indurasi/ bengkak lokal</li> <li>e. Sekret purulen</li> </ol> Penyebab inflamasi lain harus disingkirkan
Derajat 3 (sedang)	Eritema > 2 cm serta satu dari temuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Infeksi yang menyerang jaringan di bawah kulit/ subkutan</li> </ol> Tidak ada respons inflamasi sistemik
Derajat 4 (berat)	Minimal dua dari respons sistemik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Temperatur &gt; 39°C atau &lt; 36°C</li> <li>b. Frekuensi nafas &gt; 90x/ menit</li> <li>c. PaCO<sub>2</sub> &lt; 32 mmHg</li> <li>d. Leukosit &gt; 12.000 atau &lt; 4000 U/L</li> <li>e. Limfosit imatur &gt; 10%</li> </ol>

3. Pertimbangkan rawat inap semua orang dengan diabetes dan infeksi kaki parah, dan mereka dengan infeksi sedang yang kompleks atau terkait dengan morbiditas kunci yang relevan.
4. Pada orang dengan diabetes dan kemungkinan infeksi kaki yang pemeriksaan klinisnya samar-samar atau tidak dapat diinterpretasikan, pertimbangkan untuk memesan biomarker serum inflamasi, seperti protein C reactive, tingkat sedimentasi eritrosit dan mungkin prokalsitonin, sebagai tindakan tambahan



untuk menegakkan diagnosis.

5. Pada orang dengan diabetes dan dugaan osteomielitis kaki, direkomendasikan penggunaan kombinasi tes probe-ke-tulang, tingkat sedimentasi eritrosit (atau protein C-reaktif dan/atau prokalsitonin), dan sinar-X biasa sebagai pemeriksaan awal. studi untuk mendiagnosis osteomielitis.
6. Pada orang dengan diabetes dan dugaan osteomielitis kaki, di mana membuat diagnosis definitif atau menentukan patogen penyebab diperlukan untuk memilih pengobatan, kumpulkan sampel tulang (perkutan atau pembedahan) untuk membiakkan mikroorganisme tulang yang relevan secara klinis dan untuk histopatologi.
7. Kumpulkan spesimen yang sesuai untuk kultur pada hampir semua luka yang terinfeksi secara klinis untuk menentukan patogen penyebab.
8. Untuk infeksi kaki diabetik jaringan lunak, dapatkan sampel untuk biakan dengan mengumpulkan spesimen jaringan secara aseptik (dengan kuretase atau biopsi) dari ulkus.
9. Rawat seseorang dengan infeksi kaki diabetik dengan agen antibiotik yang telah terbukti efektif dalam uji coba terkontrol acak yang dipublikasikan dan sesuai untuk masing-masing pasien. Beberapa agen yang perlu dipertimbangkan meliputi: penisilin, sefalosporin, karbapenem, metronidazol (dikombinasikan dengan antibiotik lain), klindamisin, linezolid, daptomycin, fluoroquinolones, atau vankomisin, tetapi bukan tigesiklin.
10. Pilih agen antibiotik untuk mengobati infeksi kaki diabetik berdasarkan: patogen penyebab yang mungkin atau terbukti dan kerentanan antibiotiknya; keparahan klinis infeksi; menerbitkan bukti kemanjuran agen untuk infeksi

kaki diabetik; risiko efek samping, termasuk kerusakan tambahan pada flora komensal; kemungkinan interaksi obat; ketersediaan agen; dan, biaya keuangan.

11. Berikan terapi antibiotik awalnya dengan rute parenteral untuk setiap pasien dengan infeksi kaki diabetik yang parah. Beralih ke terapi oral jika pasien membaik secara klinis, tidak memiliki kontraindikasi terhadap terapi oral dan jika tersedia agen oral yang sesuai.
12. Obati pasien dengan infeksi kaki diabetik ringan, dan sebagian besar dengan infeksi kaki diabetik sedang, dengan terapi antibiotik oral, baik saat datang atau saat jelas membaik dengan terapi intravena awal.
13. Berikan terapi antibiotik kepada pasien dengan infeksi kulit atau jaringan lunak kaki diabetik selama 1 sampai 2 minggu.
14. Pertimbangkan untuk melanjutkan pengobatan, mungkin hingga 3-4 minggu, jika infeksi membaik tetapi ekstensif, sembuh lebih lambat dari yang diharapkan, atau jika pasien memiliki penyakit arteri perifer berat.
15. Jika bukti infeksi belum teratasi setelah 4 minggu terapi yang tampaknya tepat, evaluasi ulang pasien dan pertimbangkan kembali perlunya studi diagnostik lebih lanjut.
16. Jangan mengobati ulkus kaki yang tidak terinfeksi secara klinis dengan terapi antibiotik sistemik atau lokal dengan tujuan mengurangi risiko infeksi atau mempercepat penyembuhan ulkus.
17. Non-ahli bedah harus segera berkonsultasi dengan spesialis bedah dalam kasus infeksi parah, atau infeksi sedang yang dipersulit oleh gangren luas, infeksi nekrotikan, tanda-tanda yang menunjukkan abses dalam (di bawah fasia) atau sindrom kompartemen, atau iskemia ekstremitas bawah yang parah.

18. Pada pasien dengan diabetes dan osteomielitis kaki depan yang tidak rumit, yang tidak ada indikasi lain untuk perawatan bedah, pertimbangkan untuk mengobati dengan terapi antibiotik tanpa reseksi tulang secara bedah.
19. Pada pasien dengan diabetes dan osteomielitis kaki depan tanpa komplikasi, yang tidak ada indikasi lain untuk perawatan bedah, pertimbangkan untuk mengobati dengan terapi antibiotik tanpa reseksi tulang secara bedah.
20. Obati osteomielitis kaki diabetik dengan terapi antibiotik tidak lebih dari 6 minggu. Jika infeksi tidak membaik secara klinis dalam 2-4 minggu pertama, pertimbangkan kembali perlunya mengumpulkan spesimen tulang untuk kultur, melakukan reseksi bedah, atau memilih rejimen antibiotik alternatif.
21. Obati osteomielitis kaki diabetik dengan terapi antibiotik selama beberapa hari saja jika tidak ada infeksi jaringan lunak dan semua tulang yang terinfeksi telah diangkat melalui pembedahan.

#### Rejimen antibiotik empiris untuk infeksi kaki diabetik

Tingkat keparahan infeksi	Faktor tambahan	Patogen biasa	Rejimen empiris potensial
Ringan	Tidak ada fitur yang rumit	gram positif	Penisilin semisintetik; sefalosporin generasi 1.
	Alergi atau intoleransi $\beta$ -laktam	gram positif	Clindamycin; Fluoroquinolone dengan aktivitas yang baik terhadap cocci Gram positif aerobik (misalnya, levofloxacin atau moxifloxacin); antipseudomonal fluoroquinolone, misalnya ciprofloxacin; trimethoprim/ sulfamethoxazole; makrolida; doxycycline.
	Paparan antibiotik baru-baru ini	gram positif + gram negatif	Penghambat $\beta$ -laktamase 1 (amoxicillin/ clavulanate, ampicillin/ sulbactam); trimethoprim/ sulfamethoxazole; Fluoroquinolone dengan aktivitas

			yang baik terhadap cocci Gram positif aerobik (misalnya, levofloxacin atau moxifloxacin); antipseudomonal fluoroquinolone, misalnya ciprofloxacin.
	Risiko tinggi untuk MRSA ( <i>methicillin-resistant Staphylococcus aureus</i> )	MRSA	Linezolid; trimethoprim/sulfamethoxazole; makrolida; doxycycline.
Sedang atau berat	Tidak ada fitur yang rumit	gram positif ± gram negatif	Penghambat β-laktamase 1 (amoxicillin/clavulanate, ampicillin/sulbactam); sefalosporin generasi 2 atau 3.
	Antibiotik terbaru	gram positif ± gram negatif	Penghambat β-laktamase 2 (ticarcillin/clavulanate, piperacillin/tazobactam); sefalosporin generasi 3; karbapenem golongan 1 (ertapenem).
	Ulkus maserasi atau iklim hangat	gram negatif termasuk Pseudomonas	Penghambat β-laktamase 2 (ticarcillin/clavulanate, piperacillin/tazobactam); Penisilin semisintetik + ceftazidim; Penisilin semisintetik + ciprofloxacin; golongan 2 karbapenem (imipenem, doripenem, meropenem).
	Ekstremitas iskemik/ nekrosis/ pembentukan gas	gram positif ± gram negatif ± anaerob	Penghambat β-laktamase 1 atau 2; karbapenem golongan 1 atau 2; sefalosporin generasi 2 atau 3 + clindamycin atau metronidazole.
	faktor risiko MRSA		Pertimbangkan untuk menambahkan, atau menggantinya dengan, glikopeptida; linezolid; daptomycin; trimethoprim/sulfamethoxazole; doxycycline.
	Faktor risiko resisten gram negatif	organisme penghasil β-laktamase spektrum luas	Karbapenem; Fluroquinolone; aminoglikosida dan kolistin

### **C. Bakteri Ulkus Diabetik**

#### *1. Pseudomonas aeruginosa*

*Pseudomonas aeruginosa* adalah bakteri berbentuk batang heterotrofik, motil, Gram-negatif dengan panjang sekitar 1–5  $\mu\text{m}$  dan lebar 0,5–1,0  $\mu\text{m}$ . Ini adalah aerob fakultatif yang tumbuh melalui respirasi aerobik dan respirasi anaerobik dengan nitrat sebagai akseptor elektron terminal (Diggle SP & Whiteley M, 2020).

Sebagian besar infeksi dengan spesies *Pseudomonas* terjadi pada inang yang terganggu. Patogenisitas organisme ini didasarkan pada kemampuannya untuk menghasilkan berbagai toksin dan protease serta kemampuannya untuk melawan fagositosis. *Pseudomonas aeruginosa* umumnya kebal terhadap antibiotik, dan karenanya merupakan patogen yang berbahaya dan ditakuti. Satu-satunya agen antibiotik yang secara teratur sensitif terhadap strain adalah sefalosporin, karbenisilin, kolistin, gentamisin, polimiksin, kuinolon, dan streptomisin. *Pseudomonas aeruginosa* adalah salah satu mikroorganisme terpenting yang menyebabkan masalah klinis akibat resistensi yang tinggi terhadap agen antimikroba. *Pseudomonas aeruginosa* dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang parah pada penderita diabetes dan tidak boleh diabaikan karena tidak signifikan pada ulkus kaki diabetik. Selain itu, tidak boleh dianggap sebagai kontaminan atau flora normal, dan harus jelas dianggap sebagai patogen, karena dapat menyebabkan sepsis dan amputasi (Sivanmaliappan & Sevanan, 2011).

Adapun taksonomi dari *Pseudomonas aeruginosa* yakni (Diggle SP & Whiteley M, 2020):

Kerajaan	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Pseudomonadales

Famili : Pseudomonadaceae  
 Genus : Pseudomonas  
 Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

## 2. *Providencia stuartii*

*Providencia stuartii* adalah bakteri gram negatif dengan morfologi batang lurus dan biasanya berukuran 0,6-0,8 mikrometer dengan ukuran 1,5-2,5 mikrometer (Wie, 2015).

*Providencia stuartii* memiliki selubung sel. Selubung sel ini terdiri dari dinding sel peptidoglikan tipis yang terletak di antara membran sel sitoplasma dan membran luar. Membran luar mengandung lipopolisakarida yang terdiri dari: lipid A, polisakarida inti, dan antigen O di bagian luarnya. sebaran dan fosfolipid di sebaran bagian dalam antara membran luar dan sitoplasma, yang dikenal sebagai ruang periplasma. Di dalam ruang periplasma terdapat matriks seperti gel yang disebut periplasma. Karena merupakan bakteri gram negatif, lapisan-S langsung menempel pada membran luar daripada ke peptidoglikan. Protein yang dikenal sebagai porin juga ada. pada membran luar yang bertindak sebagai saluran dan memungkinkan ion dan molekul kecil melalui membran. *Providencia stuartii* bergerak dengan flagela peritrichous (El Khatib et al., 2017).

Adapun taksonomi dari *Providencia stuartii* yakni (Wie, 2015):

Kerajaan : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Enterobacteriales  
 Famili : Enterobacteriaceae  
 Genus : *Providencia*  
 Spesies : *Providencia stuartii*

### 3. *Citrobacter freundii*

*Citrobacter freundii* adalah spesies bakteri Gram-negatif anaerob fakultatif dari famili Enterobacteriaceae yang saat ini terdiri dari 13 spesies yang dikenal. Bakteri ini memiliki bentuk batang dengan panjang khas 1–5  $\mu\text{m}$ . Sebagian besar sel *Citrobacter freundii* memiliki beberapa flagela yang digunakan untuk bergerak, meskipun beberapa taksa non-motil tidak. *Citrobacter freundii* adalah mikroorganisme yang hidup di tanah, tetapi juga dapat ditemukan di air, kotoran, makanan, dan saluran usus hewan dan manusia (Choudhuri et al., 2021).

Adapun taksonomi dari *Citrobacter freundii* yakni (Adeolu et al., 2016):

Kerajaan : Bacteria  
 Filum : Pseudomonadota  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Enterobacteriales  
 Famili : Enterobacteriaceae  
 Genus : *Citrobacter*  
 Spesies : *Citrobacter freundii*

### 4. *Pseudomonas luteola*

*Pseudomonas luteola* adalah Gram-negatif, aerob motil. Motilitasnya dibuat oleh flagela multitrichous. Mereka tumbuh sebagai batang berukuran 0,8  $\mu\text{m}$  hingga 2,5  $\mu\text{m}$ . Koloni menghasilkan pigmen kuning-oranye. Suhu optimal untuk pertumbuhannya adalah 30 °C. *Pseudomonas luteola* Tumbuh paling baik pada agar infus jantung yang dilengkapi dengan 5% darah kuda. *Pseudomonas luteola* juga bisa tumbuh di TSA, Nutrient Agar, Mac Conkey atau CASA Agar (Chihab et al., 2016).

Adapun taksonomi dari *Pseudomonas luteola* yakni:

Kerajaan : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Pseudomonadales  
 Famili : Pseudomonadaceae  
 Genus : Pseudomonas  
 Spesies : *Pseudomonas luteola*

*Pseudomonas luteola* memiliki signifikansi klinis karena terlibat dalam berbagai infeksi yang mengancam jiwa seperti: endokarditis, peritonitis, meningitis, septikemia, dan abses otak. Selain itu, juga telah didiagnosis sebagai faktor penyebab infeksi kurang umum seperti: endophthalmitis, botryomycosis mediastinum dan osteomyelitis. Di Karibia dan khususnya di Grenada, diabetes biasanya menjadi penyebab utama amputasi tungkai bawah. *Pseudomonas* juga diketahui menyebabkan gangren yang mengakibatkan amputasi (Roberts et al., 2018).

#### 5. *Burkholderia cepacia*

*Burkholderia cepacia* adalah spesies bakteri gram-negatif yang lumrah ditemui di lingkungan. Bakteri ini dapat membentuk biofilm, kebal terhadap banyak jenis antibiotik dan dapat mengakibatkan penyakit pada tumbuhan (Csávas et al., 2017).

Bakteri ini merupakan patogen oportunistik, dan infeksi pada manusia sering terjadi pada pasien yang mengidap fibrosis sistik dan penyakit granuloma kronis; infeksi bakteri ini sering kali bersifat mematikan. Pada pasien yang mengalami fibrosis sistik, bakteri ini dapat menyebabkan "sindrom cepacia" dengan gejala berupa demam, bronkopneumonia yang tak terkendali, kehilangan berat badan, atau bahkan kematian (Csávas et al., 2017).

Adapun taksonomi dari *Burkholderia cepacia* yakni (Csávas et al., 2017):

Kerajaan : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria



Kelas : Betaproteobacteria  
 Ordo : Burkholderiales  
 Famili : Burkholderiaceae  
 Genus : Burkholderia  
 Spesies : *Burkholderia cepacian*

#### 6. *Acinetobacter baumannii*

*Acinetobacter baumannii* adalah bakteri Gram-negatif yang biasanya pendek, hampir bulat, berbentuk batang (coccobacillus). Bakteri dari genus ini tidak memiliki flagela, struktur seperti cambuk yang banyak digunakan bakteri untuk bergerak, tetapi menunjukkan motilitas berkedut atau berkerumun (Ming-Feng Lin & Chung-Yu Lan, 2014).

Telah dikemukakan bahwa kulit manusia dapat menjadi sumber infeksi berat, seperti bakteremia. Saluran pernapasan, darah, cairan pleura, saluran kemih, luka bedah, kulit, dan mata dapat menjadi tempat infeksi atau kolonisasi. *Acinetobacter baumannii* secara khusus menargetkan jaringan lembab seperti selaput lendir atau area kulit yang terbuka, baik karena kecelakaan atau cedera (Ming-Feng Lin & Chung-Yu Lan, 2014).

Adapun taksonomi dari *Acinetobacter baumannii* yakni (Ming-Feng Lin & Chung-Yu Lan, 2014):

Kerajaan : Bacteria  
 Filum : Proteobacteria  
 Kelas : Gammaproteobacteria  
 Ordo : Pseudomonadales  
 Famili : Moraxellaceae  
 Genus : *Acinetobacter*  
 Spesies : *Acinetobacter baumannii*

### 7. *Proteus merabilis*

*Proteus merabilis* memiliki morfologi bacillus dan merupakan bakteri gram negatif. *Proteus merabilis* dapat ditemukan sebagai mikroba yang hidup bebas di tanah dan air (Chi-Yu Chen et al., 2012).

Bakteri berbentuk batang ini memiliki kemampuan menghasilkan urease dalam kadar tinggi, yang menghidrolisis urea menjadi amoniak (NH<sub>3</sub>), sehingga membuat urine menjadi lebih basa. Jika tidak ditangani, peningkatan alkalinitas dapat menyebabkan pembentukan kristal struvite, kalsium karbonat, dan/atau apatit, yang dapat menyebabkan batu ginjal. Bakteri dapat ditemukan di seluruh batu, dan bakteri yang bersembunyi di batu ginjal ini dapat memulai kembali infeksi setelah pengobatan antibiotik. Begitu batu terbentuk, lama kelamaan bisa tumbuh cukup besar sehingga menyebabkan obstruksi dan gagal ginjal. Spesies *Proteus* juga dapat menyebabkan infeksi luka, sepsis, dan pneumonia, kebanyakan pada pasien rawat inap (Chi-Yu Chen et al., 2012).

Adapun taksonomi dari *Proteus merabilis* yakni (Chi-Yu Chen et al., 2012):

Kerajaan	: Bacteria
Filum	: Pseudomonadota
Kelas	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Enterobacteriales
Famili	: Enterobacteriaceae
Genus	: <i>Proteus</i>
Spesies	: <i>Proteus merabilis</i>

#### **D. Ekstraksi**

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga

memenuhi baku yang telah ditetapkan. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan dengan cara destilasi dengan pengurangan tekanan, agar bahan utama obat sesedikit mungkin terkena panas. Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia, yang mengandung etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. Jika tidak dinyatakan lain pada masing-masing monografi, tiap ml ekstrak mengandung bahan aktif dari 1 g simplisia yang memenuhi syarat (Kemenkes RI, 2014).

Ekstraksi adalah pemisahan bagian tumbuhan yang berkhasiat obat dengan menggunakan pelarut selektif melalui prosedur standar. Tujuan dari semua ekstraksi adalah untuk memisahkan metabolit tanaman yang larut, meninggalkan jejak seluler yang tidak larut (residu). Ekstrak kasar awal menggunakan metode ini mengandung campuran kompleks dari banyak metabolit tanaman, seperti alkaloid, glikosida, fenolat, terpenoid dan flavonoid. Beberapa ekstrak yang diperoleh awalnya mungkin siap untuk digunakan sebagai agen obat dalam bentuk tincture dan ekstrak cair tetapi beberapa perlu diproses lebih lanjut (Azwanida, 2015).

Proses ekstraksi untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut (Mukhriani, 2014):

1. Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan.
2. Pemilihan pelarut
3. Pelarut polar: air, etanol, methanol, dan sebagainya.
4. Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.
5. Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya.

Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap

baik pada suhu rendah maupun pada suhu mendidih (78<sup>0</sup>C), mudah terbakar, serta larut dalam air, dan semua pelarut organik (Kemenkes RI, 2014).

### E. Tinjauan Islami

Allah swt. telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidup. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:29

□ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu” (Kemenag RI, 2019).

Allah swt. bukan hanya menghidupkan kamu di dunia, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan di dunia, *Dia-lah Allah swt. yang menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi* semua sehingga semua yang kamu butuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kamu terhampar, dan itu adalah bukti kemahakuasaan-Nya. Yang kuasa melakukan itu pasti kuasa untuk menghidupkan yang mati (Shihab, 2002).

*Kemudian Dia berkehendak menuju ke langit.* Kata *kemudian* dalam ayat ini bukan dalam arti selang masa, tetapi dalam arti peringkat, yakni peringkat sesuatu yang disebut sesudahnya yaitu langit dan apa yang ditampungnya lebih agung, lebih besar, indah dan misterius daripada bumi. Maka Dia, yakni Allah *menyempurnakan mereka* yakni menjadikan *tujuh langit* dan menetapkan hukum-hukum yang mengatur perjalanannya masing-masing, serta menyiapkan sarana yang sesuai bagi yang berada disana, apa dan atau siapapun. Itu semua diciptakan-Nya dalam keadaan sempurna dan teliti. Dan itu semua mudah bagi-Nya karena *Dia Maha Mengetahui segala sesuatu* (Shihab, 2002).

Firman-Nya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu* dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya (Shihab, 2002).

Allah swt. menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat yang sangat besar. Allah swt. berfirman dalam QS Thaha/20:53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

*“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”* (Kemenag RI, 2019).

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah SWT, *Yang telah menjadikan bagi kamu, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan Dia, Tuhan itu juga, Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan yang mudah kamu tempuh, dan menurunkan dari langit air, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantara hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu* (Shihab, 2002).

Dalam Q.S. An-Naba'/78:14-16 disebutkan juga bahwa:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

*“(14) Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras (15) agar Kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-tanaman, (16) dan kebun-kebun yang rindang”* (Kemenag, 2019).

Ayat tersebut menyatakan, Allah swt. berfirman: *Kami telah menurunkan dari awan yang telah terkumpul padanya uap-uap dari laut air yang tercurah deras, supaya Kami mengeluarkan yakni tumbuhan dengannya yakni dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat* antara lain untuk menjadi bahan pangan manusia dan hewan (Shihab, 2002).

Berdasarkan kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah swt. menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia baik dari sebagai pangan maupun ilmu pengetahuan dan obat-obatan.

Dalam Islam sejak masa Rasulullah saw. sudah ada berbagai penyakit. Sakit adalah merupakan salah satu ujian dari Allah swt. kepada makhluk-Nya dan Allah swt. telah menciptakan obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

*"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari no. 5246)*

Hadist ini menjadi gambaran pentingnya berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit dan obatnya. Hadist ini menetapkan sebab akibat dan bahwa pengobatan tidak menafikkan tawakkal bagi siapa yang berkeyakinan bahwa kesembuhan itu hanya dengan izin Allah dan takdir-Nya (Al Asqalani & Al Hafizh, 2016).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini kuantitatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif eksperimental yang bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa daun tanaman tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) dan aktivitas terhadap bakteri ulkus diabetik *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus mirabilis*.

#### **B. Lokasi Penelitian dan Waktu**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrobiologi RSP Universitas Hasanuddin.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Oktober-Desember 2022

#### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang, antara lain:

##### **1. Alat Penelitian**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah autoklaf, bunsen, blender, corong (*Pyrex*<sup>®</sup>), cawan petri, Erlenmeyer (*Pyrex*) 100 ml, Spektor, gelas kimia (*IwakiPyrex*<sup>®</sup>), incubator, jarum ose, kurs porselin, labu tentukur (*IwakiPyrex*<sup>®</sup>), *micro pipet*, oven, pinset, pH meter, *rotary vacuum evaporator* (*Heidolph*<sup>®</sup>), timbangan analitik, tabung reaksi.

## 2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah aquadest, aluminium foil, bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*, ekstrak Daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm), HCl pekat, ceftriaxone, kertas cakram (*Paper disc*), kertas saring, pelarut etanol, label, serbuk Mg, NaCl, FeCl<sub>3</sub>, serbet, dan tissue.

### D. Prosedur Kerja

#### 1. Penyiapan Sampel

Sampel daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) diperoleh di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pada pukul 10.00 WITA. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol. Sebelum sampel dilakukan penyarian atau maserasi, terlebih dahulu daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah atau pengotor lainnya yang melekat pada daun. Setelah proses pencucian, sampel dirajang kecil-kecil kemudian daun dianginkan di dalam ruangan yang terlindung oleh cahaya matahari langsung karena dapat merusak kandungan kimia yang terkandung dalam daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm). Daun tobo-tobo yang sudah kering berbentuk bubuk, kemudian daun pedada dimasukkan kedalam wadah tertutup. Ditambahkan dengan pelarut etanol, lalu dikocok kemudian direndam dan ditutup dengan aluminium foil. Proses ekstraksi dilakukan secara maserasi selama 3x24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dan didapatkan filtratnya. Filtrat yang didapat kemudian diuapkan pelarutnya dengan *rotary evaporator* pada suhu 5°C hingga didapat ekstrak kental yang bebas dari pelarut. Ekstrak daun tobo-tobo yang



dihasilkan akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Setelah itu, ekstrak yang dihasilkan dihitung % rendemen ekstraknya:

$$\% \text{ Rendemen Ekstrak: } \frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Berat Bobot Simplisia}} \times 100\%$$

## 2. Sterilisasi Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian aktivitas antibakteri ini disterilkan terlebih dahulu. Sebelum alat-alat dimasukkan ke dalam autoklaf terlebih dahulu dengan kertas perkamen atau kertas hvs. Alat-alat gelas dan media disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15-20 menit, sedangkan jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara karet disterilkan dengan direndam dengan alcohol 70% dan jarum ose disterilkan dengan pijarkan menggunakan nyala bunsen. Alat-alat kaca non presisi seperti tabung reaksi, beaker gelas dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Cawan petri dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas dan disterilkan dengan oven pada suhu 180°C selama 2 jam. *Laminar air flow* disterilkan dengan lampu UV selama 15 menit dan disemprotkan dengan alcohol 70%. Sterilisasi *laminar* ini dilakukan sebelum dan sesudah bekerja didalamnya (Nasir & Agustien, 2019).

## 3. Skrining Fitokimia

### a. Uji flavonoid

Ekstrak ditimbang sebanyak 0,5 gram ditambahkan dengan 2-3 mL air panas dan sedikit serbuk Mg ditambahkan kedalam ekstrak. Kemudian ditambahkan 4-5 tetes HCL pekat. Jika menunjukkan warna merah, kuning atau jingga maka ekstrak positif mengandung flavonoid.

### b. Uji saponin

Ditimbang 0,5 gram ekstrak, lalu ditambahkan dengan air panas sebanyak 3 mL kemudian dikocok kuat-kuat. Jika terdapat busa busa didiamkan selama 10

menit. Kemudian ditambahkan 1-3 tetes HCl 1% jika busa tetap bertahan maka positif mengandung saponin.

c. Uji tanin

Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambahkan 3 ml air hangat. Ditetaskan dengan FeCl<sub>3</sub> 1%, jika terjadi perubahan warna kehijauan menjadi kehitaman maka positif mengandung tanin.

d. Uji Alkaloid

Sebanyak 3 mL ditambahkan 5 mL HCl 2 M diaduk dan kemudian didinginkan pada temperatur ruangan. Setelah dingin, kemudian pada sampel ditambahkan 0,5 g NaCl lalu diaduk dan disaring. Filtrat yang diperoleh ditambahkan HCl 2 M sebanyak 3 tetes, ditambah pereaksi Mayer, Apabila terbentuk endapan putih pada penambahan pereaksi Mayer, maka identifikasi menunjukkan adanya alkaloid (Sulistyarini et al., 2020).

#### 4. Pembuatan Media *Nutrient Agar*

a. Komposisi :

Ekstrak Beef 5,0 gram

Pepton 10,0 gram

Agar 15,0 gram

Air suling hingga 1000 ml

b. Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121<sup>0</sup> C selama 15 menit (LRH Dima & Astuty Lolo, 2016).

## 5. Pembuatan Media Mac Conkey

Pembuatan media *Mac Conkey* dilakukan dengan menimbang sebanyak 50 gram kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquadest lalu dipanaskan sambil diaduk sampai homogen. Kemudian media disterilkan dalam *autoclave* selama 15 menit dengan suhu 121<sup>0</sup>C dan tekanan 2 atm (Makalew et al., 2016).

## 6. Peremajaan Bakteri

Peremajaan bakteri menggunakan media *Mac Conkey*, peremajaan bakteri uji. Bakteri diambil satu ose menggunakan ose steril selanjutnya digoreskan pada permukaan media *Mac Conkey* dengan cara silang (zig-zag) dan diinkubasi selama 24 jampada suhu 37<sup>0</sup>C (Makalew et al., 2016).

## 7. Pembuatan Suspensi Bakteri

Bakteri uji (*Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*) masing-masing diambil dengan jarum ose dan disuspensikan dengan cara dimasukkan ke dalam tabung berisi masing-masing 5 ml larutan NaCl fisiologis steril 0,9%. Suspensi yang terbentuk disetarakan dengan standar McFarland No. 0,5 (Kurniawan et al., 2019)

## 8. Pembuatan Larutan Uji

Konsentrasi ekstrak etanol Daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) ditentukan berdasarkan uji pendahuluan yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% (g/ml). larutan sampel dibuat dengan cara menimbang ekstrak kental Daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) masing-masing 0,2 g, 0,4 g, 0,6 g, 0,8 g, dan 1 g kemudian tiap konsentrasi diencerkan dengan pelarut aquadest hingga volumenya 1 ml. Kontrol positif menggunakan antibiotik ceftriaxone, kontrol negatif menggunakan aquadest (LRH Dima & Astuty Lolo, 2016).

## 9. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi, dengan menggunakan kertas cakram berdiameter 6 mm. Disiapkan medium *Nutrient Agar* yang telah disterilkan dimasukkan kedalam cawan petri steril masing-masing sebanyak 10 mL dan dicampur dengan 0,2  $\mu$ l suspensi bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril dan didibiarkan memadat pada suhu kamar. Selanjutnya kertas cakram yang telah ditetesi sebanyak 20  $\mu$ l dengan masing-masing konsentrasi sampel yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% (g/ml) serta kontrol positif dengan antibiotik ceftriaxone dan kontrol negatif aquadest lalu dibiarkan hingga meresap kedalam kertas cakram. Diletakkan diatas permukaan medium secara aseptik dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan yang lain lebih kurang 3 cm dan jarak dari pinggir cawan petri 2 cm. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam, lalu diamati zona hambat yang terbentuk yang ditandai dengan adanya zona bening diukur menggunakan jangka sorong (Winastri et al., 2020).

Tabel 1. Diameter Zona Hambat

Diameter	Kekuatan daya hambat
$\leq 5$ mm	Lemah
6-10 mm	Sedang
11-20 mm	Kuat
$\geq 21$ mm	Sangat Kuat

## 10. Uji *Two-way* ANOVA

*Two-way* ANOVA (klasifikasi dua faktor) adalah pengujian hipotesis komparatif (perbandingan) untuk k sampel (lebih dari dua sampel) dengan mengukur atau mengelompokkan data berdasarkan dua faktor berpengaruh yang

disusun dalam baris dan kolom (Siregar, 2017). Penentuan aktivitas antibakteri ekstrak tobo-tobo ditentukan berdasarkan analisis statistik. Metode analisis statistik yang digunakan adalah *twoway* ANOVA

- a. Buka Aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*)
- b. Dimasukkan data penelitian
- c. Klik *analyze* → *General Linear Model* → *Univariate*
- d. Masukkan daya hambat pada *dependent variable*
- e. Masukkan jenis bakteri dan konsentrasi pada *fixed factor*
- f. Klik tombol *options* → centang “*descriptive*” dan “*homogeneity of variance test*” → klik *continue* → klik *OK*



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Ekstraksi dan Identifikasi Golongan Senyawa Daun Tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)

Setelah dilakukan ekstraksi daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) sebanyak 846 gram dengan metode maserasi menggunakan cairan penyari etanol 70% diperoleh ekstrak etanol kental. Maka diperoleh berat ekstrak seperti pada tabel:

Tabel 2. Hasil ekstraksi dan identifikasi golongan senyawa daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)

Hasil Ekstraksi Daun Tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm)	
Jenis Ekstrak	Ekstrak etanol
Berat Sampel	1,6 kg
Berat yang Diekstraksi	846 g
Bobot Ekstrak	138,9 g
% Rendamen	16,41%
Hasil Identifikasi Golongan Senyawa daun tobo-tobo ( <i>Ficus septica</i> Burm)	
Flavonoid	(+) Merah
Alkaloid	(+) Endapan Putih
Saponin	(+) Berbusa
Tanin	(+) Kehitaman

##### 2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan sampel ekstrak etanol daun tobo-tobo. Hasil uji aktivitas dengan ekstrak etanol daun tobo-tobo dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Kekuatan daya hambat
		Cawan Petri 1	Cawan Petri 2	Cawan Petri 3		
1	20%	8	8	-	5,3	Sedang
2	40%	9	8,5	7	8,16	Sedang
3	60%	11	8,5	8	9,16	Sedang
4	80%	13	9	11	11	Kuat
5	100%	15	10,5	13	12,8	Kuat
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	39	25	45	36,3	Sangat kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Providencia stuartii*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	7	7	7	7	Sedang
2	40%	8	7,5	7	7,5	Sedang
3	60%	8,5	8	7,5	8	Sedang
4	80%	9	9	8	8,66	Sedang
5	100%	9,5	9,5	9	9,33	Sedang
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	23	25	22	23,33	Sangat kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

Tabel 5. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Citrobacter freundii*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	8	7	6	7	Sedang
2	40%	10	7,5	6,5	8	Sedang
3	60%	10,5	8	7	8,5	Sedang
4	80%	11	8	9	9,33	Sedang

5	100%	13	13	9,5	11,83	Kuat
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	24	23	25	24	Sangat Kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

Tabel 6. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Pseudomonas luteola*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata (mm)	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	8	6	-	4,66	Lemah
2	40%	9	7	-	5,33	Sedang
3	60%	9,5	7,5	7	8	Sedang
4	80%	10,5	10	7,5	9,3	Sedang
5	100%	11	11	11	11	Kuat
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	16	19	20	18,33	Kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

Tabel 7. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Burkholderia cepacia*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	6	-	7	4,33	Lemah
2	40%	6,5	-	7	4,5	Lemah
3	60%	8	6	8	7,33	Sedang
4	80%	8,5	7	9	8,16	Sedang
5	100%	10	11	9,5	10,16	Kuat
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	24	23	21	16,33	Kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-



Tabel 8. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	6	9	6	7	Sedang
2	40%	6,5	9,5	7	7,66	Sedang
3	60%	8	10	7,5	8,5	Sedang
4	80%	8,5	10	8,5	9	Sedang
5	100%	9	10,5	9	9,5	Sedang
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	11	13	12	12	Kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

Tabel 9. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) terhadap bakteri *Proteus mirabilis*

No	Konsentrasi	Diameter Zona Hambat (mm)			Rata-rata	Kekuatan daya hambat
		Cawan petri 1	Cawan petri 2	Cawan petri 3		
1	20%	9	7	-	5,33	Sedang
2	40%	9,4	8	-	5,8	Sedang
3	60%	10	8	-	6	Sedang
4	80%	11	8	-	6,33	Sedang
5	100%	11,5	8	-	6,5	Sedang
6	Kontrol positif (Ceftriaxone)	13	10	10	11	Kuat
7	Kontrol negatif (Aquadest)	-	-	-	-	-

## B. Pembahasan

Tanaman obat memiliki khasiat yang berbeda-beda. Khasiat tanaman obat sangat bergantung pada komponen bioaktif yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya komponen bioaktif tersebut, tanaman obat mampu menetralsir penyebab suatu penyakit seperti daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) yang pemanfaatannya telah digunakan secara luas oleh masyarakat di indonesia (Mu'Nisa et al., 2018).

Tumbuhan mengandung beberapa senyawa kimia aktif yang berpotensi membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Tobo-tobo (*Ficus septica* Burm F) merupakan salah satu tanaman potensial yang dapat digunakan untuk pengobatan. Tumbuhan ini dapat ditemukan di Jawa, Madura, dan Sulawesi (Khusnuryani & Fuad, 2015).

Tobo-tobo mengandung beberapa senyawa kimia seperti saponin, flavonoid, dan tanin, juga alkaloid seperti tilosrebrin (hauptalkaloid), tiloforin, septisin, dan antofin. Daun dan akarnya mengandung stigmasterol dan  $\beta$ -sitosterol. Akar juga mengandung sterol dan polifenol (Khusnuryani & Fuad, 2015).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak etanol daun tobo-tobo untuk menghambat pertumbuhan bakteri ulkus diabetik yakni *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*. Tanaman tobo-tobo telah di ambil kemudian di sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran dan memisahkan bagian-bagian yang tidak diperlukan yakni memisahkan daun dari batang tobo-tobo karena pada penelitian ini hanya menggunakan daun tobo-tobo. Kemudian di cuci dengan air mengalir, pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada daun tobo-tobo.

Setelah proses pencucian daun tobo-tobo kemudian dilakukan perajangan untuk mempermudah proses pengeringan dan di keringkan dengan cara diangin-anginkan di dalam ruangan yang terlindungi dari paparan sinar matahari langsung hingga kadar air yang terkandung dalam sampel berkurang agar proses enzimatik dapat di hentikan karena dapat merusak zat aktif. Selain itu dapat juga mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Daun tobo-tobo yang telah kering

kemudian di sortasi kering untuk memisahkan kotoran yang masih terdapat pada daun tobo-tobo. Kemudian dibuat serbuk kasar untuk memperluas permukaan dengan cara di blender, sehingga pada saat proses ekstraksi kontak antara pelarut dengan sampel lebih efektif dan senyawa dapat terekstraksi dengan optimal.

Dilakukan proses ekstraksi dengan metode yang yang digunakan adalah maserasi karena maserasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang di ambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya pemanasan. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar sel dan di dalam sel (Badaring et al., 2020).

Sebanyak 846 gram simplisia daun tobo-tobo di maserasi dengan etanol selama 3 x 24 jam. Proses maserasi hanya dilakukan sebanyak 1 kali dan kemudian di pekatkan dengan menggunakan *Vaccum Rotary Evaporator* dan diuapkan sehingga diperoleh ekstrak kental. Pada tabel 3. Menunjukkan hasil ekstraksi pada daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) dengan persen rendamen sebesar 16,41%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 3, ekstrak etanol daun tobo-tobo terbukti mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin dan alkaloid. Hasil yang diperoleh sama seperti pada penelitian sebelumnya yang menggunakan pelarut etanol yang dilakukan oleh (Dewi, 2020). Saponin berperan sebagai

antibakteri dengan mekanisme merusak permeabilitas dinding sel sehingga dapat menimbulkan kematian sel (Anggraini et al., 2019).

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri dan mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Selain itu, alkaloid juga menghambat pembentukan sintesis protein sehingga dapat mengganggu metabolisme bakteri (Anggraini et al., 2019).

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri yaitu dengan menghambat fungsi membran sel dan metabolisme energi bakteri. Saat menghambat fungsi membran sel, flavonoid membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler yang dapat merusak membran sel bakteri, lalu diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler bakteri tersebut (Sapara & Waworuntu, 2016).

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri yaitu dengan cara menyebabkan sel menjadi lisis. Hal ini terjadi karena tanin memiliki target pada dinding polipeptida dinding sel bakteri sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna dan kemudian sel bakteri akan mati. Tanin juga memiliki kemampuan untuk menginaktifkan enzim bakteri serta mengganggu jalannya protein pada lapisan dalam sel (Sapara & Waworuntu, 2016).

Pada uji aktivitas antibakteri metode yang digunakan adalah difusi cakram. Hasil daya uji antibakteri didasarkan pada pengukuran Diameter Daerah Hambat (DDH) atau zona bening yang terbentuk disekitarnya bakteri yang digunakan, sebelumnya dilakukan peremajaan terlebih dahulu untuk meregenerasi bakteri agar yang diperoleh bakteri yang muda dan tidak terkontaminasi. Media agar yang digunakan untuk peremajaan bakteri adalah *Mac Conkey Agar* (MCA) dan media pengujian adalah *Nutrient Agar* (NA). Peremajaan bakteri dilakukan dengan

menanam bakteri pada media *Mac Conkey Agar* (MCA) kemudian diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator pada suhu 37°C. Inkubasi dilakukan dengan tujuan untuk mengkondisikan lingkungan pada suhu optimum perkembangan bakteri sehingga bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pembuatan konsentrasi larutan uji dengan 5 konsentrasi yaitu 20%, 40%,60%,80%,100%. Perbedaan konsentrasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas ekstrak menghambat pertumbuhan bakteri. Dimana di buat terlebih dahulu larutan stok 100% dan kemudian diencerkan menjadi 20%,40%,60%,80%. Pembuatan larutan stok dengan menimbang 50 mg ekstrak kemudian dilarutkan dengan air steril sebanyak 50 ml.

Aquadest digunakan sebagai kontrol negatif karena merupakan senyawa netral yang tidak berefek terhadap pertumbuhan bakteri. Antibiotik ceftriaxone digunakan sebagai kontrol positif karena ceftriaxone merupakan sefalosporin semisintetik generasi ketiga yang memiliki spektrum aktivitas yang luas terhadap bakteri gram-positif dan gram negatif. Antibiotik ceftriaxone digunakan sebagai kontrol positif karena ceftriaxone merupakan sefalosporin semisintetik generasi ketiga yang memiliki spektrum aktivitas yang luas terhadap bakteri gram-positif dan gram negatif. Aktivitas ceftriaxone lebih besar daripada sefalosporin generasi pertama dan generasi kedua terhadap bakteri gram negatif (Richards et al., 2017).

Alasan pemilihan bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis* dimana pada penelitian yang dilakukan oleh (Novelni, 2019) yang menjelaskan bahwa jenis bakteri pada pasien ulkus diabetikum yaitu gram negatif 70% dan gram positif 30%. dijelaskan juga dalam penelitian (Salim, 2020) ditemukan 84 isolat bakteri dari 70 data sampel kultur yang berhasil dikultur dari bakteri, 63 isolat atau sekitar 75% dari seluruh isolat

bakteri adalah gram negatif dan 21 isolat bakteri lainnya adalah gram positif atau sekitar 25% dari seluruh isolat. Penelitian yang dilakukan (Apridamayanti et al., 2016) ditemukan bahwa bakteri gram negatif seperti *Pseudomonas aeruginosa* merupakan salah satu bakteri yang memiliki presentasi tertinggi pada penderita ulkus diabetikum, hal ini juga diperkuat oleh penelitian (Manisha, 2012) bahwa bakteri gram negatif patogen terbanyak pada ulkus diabetik adalah *Pseudomonas aeruginosa* (30,57%).

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan difusi cakram yang dimana menggunakan piper disk dengan medium *Nutrient Agar* metode ini dilakukan untuk mengetahui besarnya diameter hambatan yang terbentuk pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freudii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*, setelah masa inkubasi 24 jam, larutan ekstrak etanol daun tobo-tobo akan berdifusi ke medium agar untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang ditandai adanya zona hambat bening yang terdapat di sekeliling piper disk. Zona hambat yang terbentuk inilah yang akan diukur daya hambatnya.

Di ambil 10 ml medium *Nutrient Agar* lalu di tuang ke cawan petri di biarkan memadat. Dibuat suspensi bakteri dengan cara satu ose bakteri yang telah diremajakan di masukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi larutan 0,45% hingga diperoleh kekeruhan sama dengan standar kekeruhan larutan *Mc Farland*, yang kemudian digores pada medium *Nutrient Agar* menggunakan *cotton swab steril* dan piper disk yang telah dijenuhkan dengan sampel pada konsentrasi 20%,40%,60%,80% dengan kontrol positif antibiotik ceftriaxone dan kontrol negatif menggunakan aquadest kemudian diletakkan dalam medium. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, lalu diamati luas zona hambat/ bening yang terbentuk.

Hasil pengamatan tabel 4 menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*. Aktivitas daya hambat terlihat pada semua konsentrasi. Konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (5,3 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* (12,8 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.

Hasil pengamatan tabel 5 menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap bakteri *Providencia stuartii*. Konsentrasi 20% rata-rata daya hambat terendah (7 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Providencia stuartii* (9,33 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Providencia stuartii*.

Hasil pengamatan tabel 6 menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap bakteri *Citrobacter freundii*. Konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (7 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Citrobacter freundii* (11,83 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Citrobacter freundii*.

Hasil pengamatan tabel 7 menunjukkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap bakteri *Pseudomonas luteola*. Aktivitas daya hambat pada konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (4,66 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Pseudomonas luteola* (11 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Pseudomonas luteola*.

Hasil pengamatan tabel 8 menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri *Burkholderia cepacia*. Aktivitas daya hambat pada konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (4,33 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Burkholderia cepacia* (10,16 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Burkholderia cepacia*.

Hasil pengamatan tabel 9 menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii*. Aktivitas daya hambat pada konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (7 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii* (9,5 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Acinetobacter baumannii*.

Hasil pengamatan tabel 10 menunjukkan adanya zona hambat terhadap bakteri *Proteus merabilis*. Aktivitas daya hambat pada konsentrasi 20% memiliki rata-rata daya hambat terendah (5,33 mm) dan konsentrasi 100% memiliki rata-rata daya hambat tertinggi terhadap bakteri *Proteus merabilis* (6,5 mm). Hal ini menunjukkan semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo maka semakin besar pula aktivitas daya hambat terhadap bakteri *Proteus merabilis*.

Berdasarkan penelitian oleh (Bawondes et al., 2021) mengenai Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Awar-Awar (*Ficus septica Burm*) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*” dengan mengekstraksi buah awar-awar dengan pelarut etanol, terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*” menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol yang diberikan, maka semakin besar pula diameter zona hambat yang terbentuk di sekeliling sumur. Penelitian



yang dilakukan oleh (Sukadana, 2010) terdapat isolat flavonoid yang berhasil diisolasi dari awar-awar (*Ficus septica* Burm) adalah golongan flavanon dengan gugus hidroksi bebas kemungkinan terikat pada atom C-2', C-5' atau C-6' dan C-8, gugus metil atau glikosilasi pada atom C-5 dan C-7, serta memiliki gugus OH, C=O, C=C dan C-H aromatik, serta C-H alifatik. Isolat flavanon mempunyai aktivitas sebagai antibakteri terhadap *Vibrio cholera* dan *Escherichia coli*.

Berdasarkan penelitian oleh (Khusnuryani & Fuad, 2015) mengamati aktivitas ekstrak etanol daun Awar-awar (*Ficus septica* Burm) sebagai antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* ATCC 29523 dan *Escherichia coli* ATCC 35218 berdasarkan pembentukan zona bening dan analisis kebocoran sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun awar-awar memiliki aktivitas antibakteri terhadap *S. aureus* ATCC 29523 dan *E. coli* ATCC 35218. Berdasarkan diameter zona bening, aktivitas antibakteri tergolong sedang. Analisis kebocoran sel menggunakan spektrofotometer pada  $\lambda$  260 nm dan 280 nm tidak menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun awar-awar dapat menyebabkan kebocoran sel pada *S. aureus* ATCC 29523 dan *E. coli* ATCC 35218.

Penentuan aktivitas antibakteri ekstrak tobo-tobo ditentukan berdasarkan analisis statistik. Metode analisis statistik yang digunakan adalah *two-way* ANOVA yang bertujuan membandingkan rata-rata antar kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor dimana prosedur pengujiannya yaitu membandingkan rata-rata konsentrasi ekstrak etanol daun tobo-tobo terhadap daya hambat bakteri *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*. Hasil analisis statistik uji *two-way* ANOVA ( $p < 0,05$ ) menunjukkan terdapat perbedaan tingkat daya hambat berdasarkan jenis bakteri. Berdasarkan konsentrasi, hasil analisis statistik uji *two-way* ANOVA ( $p < 0,05$ )

menunjukkan terdapat perbedaan tingkat daya hambat berdasarkan konsentrasi. Diperoleh hasil analisis statistik uji *two-way* ANOVA ( $p > 0,05$ ) menunjukkan tidak ada interaksi jenis bakteri dan konsentrasi dalam mempengaruhi tingkat daya hambat.



## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) memiliki aktivitas sebagai agen antibakteri terhadap bakteri ulkus diabetik *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis* yaitu dengan adanya zona bening yang terbentuk. Ekstrak etanol daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) pada konsentrasi 100% yang memberikan aktivitas antibakteri paling besar terhadap pertumbuhan bakteri ulkus diabetik *Pseudomonas aeruginosa*, *Providencia stuartii*, *Citrobacter freundii*, *Pseudomonas luteola*, *Burkholderia cepacia*, *Acinetobacter baumannii*, *Proteus merabilis*.

#### **B. Saran**

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap simplisia daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm) menggunakan jenis pelarut yang berbeda

### DAFTAR PUSTAKA

- Adeolu, M., Alnajar, S., Naushad, S., & Gupta, R. S. (2016). Genome-based phylogeny and taxonomy of the “Enterobacteriales”: proposal for Enterobacterales ord. nov. divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 5575–5599. <https://doi.org/10.1099/ijsem.0.001485>
- Al Asqalani, I. H., & Al Hafizh, A. I. (2016). *FATHUL BAARI Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 28* (28th ed.). Pustaka Azzam.
- Anggraini, W., Choirun Nisa, S., Ramadhani, R. DA, & Ma, B. (2019). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Buah Blewah (*Cucumis melo* L. var. *cantalupensis*) terhadap pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*. *PHARMACEUTICAL JOURNAL OF INDONESIA*, 5(1), 61–66.
- Apridamayanti, P., Meilinasary, K. A., & Sari, R. (2016). *Antibiotic Sensitivity in Pseudomonas aeruginosa of Diabetic Patient's Foot Ulcer*.
- Azwanida, N. (2015). *A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. Medicinal & Aromatic Plants*. 4(3). <https://doi.org/10.4172/2167-0412.1000196>
- Badaring, D. R., Puspitha, S., Sari, M., Nurhabiba, S., Wulan, W., Anugrah, S., Lembang, R., & Biologi, J. (2020). Uji Ekstrak Daun Maja (*Aegle marmelos* L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus* *INDONESIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL SCIENCES (IJFS). Indonesian Journal of Fundamental Sciences*, 6(1).
- Bawondes, J. N., Maarisit, W., Ginting, A., & Kanter, J. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Awar-Awar *Ficus septica* Burm.F Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *Jurnal Biofarmasetikal Tropis*, 2021(1), 21–29.
- Chi-Yu Chen, Yen-Hsu Chen, Po-Liang Lu, Wei-Ru Lin, Tun-Chieh Chen, & Chun-Yu Lin. (2012). *Proteus mirabilis* urinary tract infection and bacteremia: risk factors, clinical presentation, and outcomes. *Journal of Microbiology, Immunology, and Infection*, 45(3).
- Chihab, W., Alaoui, A. S., & Amar, M. (2016). *Chryseomonas luteola* Identified as the Source of Serious Infections in a Moroccan University Hospital. *Journal of Clinical Microbiology*, 42(4), 1837–1839. <https://doi.org/10.1128/JCM.42.4.1837-1839.2004>
- Choudhuri, I., Khanraa, K., Maity, P., Patraa, A., Maity, G. N., Pati, B. R., & Nage, A. (2021). Structure and biological properties of exopolysaccharide isolated from *Citrobacter freundii*. *International Journal of Biological*

*Macromolecules*, 168, 537–549.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.12.063>

Csávás, M., Malinovská, L., Perret, F., Gyurkó, M., Illyés, Z. T., Wimmerová, M., & Borbás, A. (2017). Tri- and tetravalent mannoclusters cross-link and aggregate BC2L-A lectin from *Burkholderia cenocepacia*. *Carbohydr Res*, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2016.11.008>

Dewi, N. P. (2020). Uji Kualitatif dan kuantitatif metabolit sekunder ekstrak etanol daun awar-awar (*Ficus septica* Burm.f) dengan metode spektrofotometer UV-VIS. *Acta Holist. Pharm*, 2(1), 16–24.

Diggle SP, & Whiteley M. (2020). Microbe Profile: *Pseudomonas Aeruginosa*: Opportunistic Pathogen and Lab Rat. *Microbiology*.  
<https://doi.org/10.1099/mic.0.000860>

Dipiro, J., Talbert, R., Yee, G., Matzke, G., & Wells, B. (2017). *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach* (Tenth Edition). McGraw-Hill Education.

El Khatib, M., Tran, Q. T., Nasrallah, C., Lopes, J., Bolla, J. M., Vivaudou, M., Pagès, J. M., & Colletier, J. P. (2017). *Providencia stuartii* form biofilms and floating communities of cells that display high resistance to environmental insults. *PLoS ONE*, 12(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174213>

Fitria, E., Nur, A., Marissa, N., & Ramadhan, N. (2017). Karakteristik Ulkus Diabetikum pada Penderita Diabetes Mellitus di RSUD dr. Zainal Abidin dan RSUD Meuraxa Banda Aceh. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(3).  
<https://doi.org/10.22435/bpk.v45i3.6818.153-160>

Fradianto, I. (2022). Identifikasi Bakteri Pada Luka Kaki Diabetes Yang Mengalami Infeksi: Kajian Literatur Identification Of Bacteria In Infected Diabetic Foot Ulcer: Literature Review Literature Review. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(1), 35.  
<https://doi.org/10.53345/bimiki.v10i1.235>

Gardjito, M., Harmayani, E., & Suharjono, K. I. (2021). *Jamu Pusaka Penjaga Kesehatan Bangsa, Asli Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Kemenag. (2019). *Qur'an Kemenag*.

Kemenag RI. (2019). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>

Kemenkes RI. (2014). *Farmakope Indonesia Edisi V (V)*.

Khusnuryani, A., & Fuad, Z. (2015). *Antibacterial Activity Of Awar-Awar Leaves (Ficus septica Burm) Against Staphylococcus aureus ATCC 29523 And Eschericia coli ATCC 35218*.

Kurniawan, E., Dyah Jekti, D. S., & Zulkifli, L. (2019). Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Batang Bidara Laut (*Strychnos ligustrina*) Terhadap Bakteri

Patogen. *Jurnal Biologi Tropis*, 19(1), 61–69.  
<https://doi.org/10.29303/jbt.v19i1.1040>

Lipsky, B. A., Senneville, E., Abbas, Z. G., Aragón-Sánchez, J., Diggle, M., Embil, J. M., Kono, S., Lavery, L. A., Malone, M., Van Asten, S. A., Urbančič-Rovan, V., & Peters, E. J. G. (2019). *IWGDF Guideline on the diagnosis and treatment of foot infection in persons with diabetes*. [www.iwgdfguidelines.org](http://www.iwgdfguidelines.org)

LRH Dima, L., & Astuty Lolo, W. (2016). Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor (*Moringa Oleifera* L.) Terhadap Bakteri *Escherichia coli* Dan *Staphylococcus aureus*. In *PHARMACONJurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT* (Vol. 5, Issue 2).

Makalew, M. A. J., Nangoy, E., & Wowor, P. M. (2016). Uji Efek Antibakteri Air Perasan Daging Buah Nanas (*Ananas Comosus* (L) Merr) Terhadap Bakteri *Klebsiella pneumoniae*. In *Jurnal e-Biomedik (eBm)* (Vol. 4, Issue 1).

Ming-Feng Lin, & Chung-Yu Lan. (2014). Antimicrobial resistance in *Acinetobacter baumannii*. *World Journal of Clinical Cases*, 2(12).  
<https://doi.org/10.12998/wjcc.v2.i12.787>

Mu'Nisa, A., Syamsia, Rachmawaty, & Muflihunna, A. (2018). Bioactive compound and Antioxidant Activity Analysis of Some Medicinal Plants of Province of Western Sulawesi. *Journal of Physics: Conference Series*, 1028(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/012023>

Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, Dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan*, 7(2).

Nasir, N., & Agustien, A. (2019). Antagonis *Pseudomonas fluorescens* indogenous terhadap *Ralstonia solanacearum* pada Tanaman Tomat (*Lycopersicon esculentum*). *JURNAL METAMORFOSA*, 6(1), 119–122.  
<https://doi.org/10.24843/metamorfosa.v06.i01.p19>

Novelni, R. (2019). Identifikasi dan Uji Resistensi Bakteri pada Pasien Ulkus Diabetikum di Bangsal Interne RSUP Dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 8(2), 67–74.  
<https://doi.org/10.51887/jpfi.v8i2.550>

Nufus, I., Qomariyah, N., & Purnama, E. R. (2021). *Aktivitas Antidiabetik Ekstrak Daun Sawo Manila Terhadap Kadar Gula Darah dan Penyembuhan Ulkus Mencit Diabetes*. 10, 319–328.  
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio/index319>

Perkeni. (2021). *Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021*.

Richards, D. M., Heel, R. C., Brogden, R. N., Speight, T. M., Avery, G. S., &


- Lacey, R. W. (2017). Ceftriaxone A Review of its Antibacterial Activity, Pharmacological Properties and Therapeutic Use. In *Drugs* (Vol. 27).
- Roberts, W., Roessler, C., Francis, P. J., Noel, D., & Loukas, M. (2018). Post-surgical Gangrene with *Pseudomonas luteola* Resulting in Limb Amputation. *Journal of Medical Science*, 10(10). <https://doi.org/10.7759/cureus.3441>
- Sapara, T. U., & Waworuntu, O. (2016). Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.) Terhadap Pertumbuhan *Porphyromonas gingivalis*. In *PHARMACONJurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT* (Vol. 5, Issue 4).
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*.
- Simanjuntak, H. A. (2018). Pemanfaatan Tumbuhan Obat Diabetes Mellitus Di Masyarakat Etnis Simalungun Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. *BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan, Industri, Kesehatan)*, 5(1), 59. <https://doi.org/10.31289/biolink.v5i1.1663>
- Siregar, S. (2017). *Statistika Terapan Untuk Perguruan Tinggi*. Prenada Media.
- Sivanmaliappan, T. S., & Sevanan, M. (2011). Antimicrobial Susceptibility Patterns of *Pseudomonas aeruginosa* from Diabetes Patients with Foot Ulcers. *International Journal Microbiology*. <https://doi.org/10.1155/2011/605195>
- Sukadana. (2010). *Aktivitas Antibakteri Senyawa Flavonoid Dari Kulit Akar Awar-Awar (Ficus septica Burm F)*.
- Sulistyarni, I., Diah, A. S., & Wicaksono, T. A. (2020). *Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Batang Buah Naga Skrining Fitokimia Senyawa Metabolit Sekunder Batang Buah Naga (Hylocereus polyrhizus)*.
- Utami, P. (2008). *Buku Pintar tanaman obat*. Agromedia. [https://www.google.co.id/books/edition/Buku\\_Pintar\\_Tanaman\\_Obat/iO0ldwKoXvQC?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+awar+awar&pg=PA15&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Pintar_Tanaman_Obat/iO0ldwKoXvQC?hl=id&gbpv=1&dq=tanaman+awar+awar&pg=PA15&printsec=frontcover)
- Wahyuni, D., Baderan, & Utina, R. (2021). *Biodiversitas Flora Dan Fauna Pantai Biluhu Timur (Suatu Tinjauan Ekologi-Lingkungan Pantai)*. Deepublish.
- Wie, S. (2015). Clinical significance of *Providencia* bacteremia or bacteriuria. *The Korean Journal Of Internal Medicine*, 30(2), 167–169.
- Wijaya, L., Budiyanto, A., Astuti, I., & Mustofa, . (2019). Pathogenesis, evaluation, and recent management of diabetic foot ulcer. *Journal of the Medical Sciences (Berkala Ilmu Kedokteran)*, 51(1), 82–97. <https://doi.org/10.19106/jmedsci005101201910>

Winastri, N. L. A., Muliastri, H., & Hidayati, E. (2020). Aktivitas Antibakteri Air Perasan dan Rebusan Daun Calincing (*Oxalis corniculata* L.) Terhadap *Streptococcus Mutan*. *Ilmu-Ilmu Hayati*, 19(2).


Yani, M. R., Pratiwi, D. I. N., Rahmiati, R., Muthmainah, N., & Yasmina, A. (2021). Antibiotics Susceptibility Pattern in Diabetic Ulcer Patients. *Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, 27(2), 205–211. <https://doi.org/10.24293/ijcpml.v27i2.1652>





**LAMPIRAN*****Lampiran 1. Alur Penelitian***


*Lampiran 2. Skema Kerja Penyiapan Sampel*




*Lampiran 3. Skema Kerja Sterilisasi*




*Lampiran 4. Skema Kerja Skrining Fitokimia*





*Lampiran 5. Skema Kerja Pembuatan Medium NA (Nutrient Agar)*



*Lampiran 6. Skema Kerja Pembuatan Medium Mac Conkey*




*Lampiran 7. Skema Kerja Peremajaan Bakteri*






*Lampiran 8. Skema Kerja Pembuatan Suspensi Bakteri*



*Lampiran 9. Pengujian Aktivitas Daya Hambat*



*Lampiran 10. Gambar Pengamatan*




Gambar 2. Sampel Tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)

Keterangan: a. Daun Tobo-Tobo (*Ficus septica* Burm), Sortasi basah daun tobo-tobo (*Ficus septica* Burm), c. Pengeringan sampel daun tobo-tobo, d. Penimbangan sampel kering daun tobo-tobo.



Gambar 3. Ekstraksi sampel tobo-tobo (*Ficus septica* Burm)

Keterangan: a. Maserasi sampel daun tobo-tobo menggunakan pelarut etanol, b. Penyaringan sampel, c. Proses penguapan filtrat menggunakan rotary evaporator, d. Hasil rotary evaporator diuapkan Kembali, e. Ekstrak kental daun tobo-tobo.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Gambar 4. Skrining Fitokimia

- Keterangan :
- a. Hasil uji saponin ekstrak etanol daun tobo-tobo
  - b. Hasil uji alkaloid ekstrak etanol daun tobo-tobo
  - c. Hasil uji flavonoid ekstrak etanol daun tobo-tobo
  - f. Hasil uji tanin ekstrak etanol daun tobo-tobo



Gambar 5. Penyiapan alat dan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba

Keterangan: a. Sterilisasi alat, b. *Nutrient agar*, c. *Penimbangan Nutrient agar*, d. Piper disk blank, e. Piper disk antibiotic ceftriaxone.



Gambar 6. Penyiapan bahan untuk pengujian aktivitas antimikroba




Keterangan: a. NaCl 0,9 %, b. Suspensi Bakteri, c. Pembuatan medium *Nutrient agar*, d. Penimbangan ekstrak daun tobo-tobo, e. Pembuatan konsentrasi ekstrak daun tobo-tobo .









Gambar 7. Pengerjaan pengujian aktivitas antimikroba




- Keterangan:
- a. Peremajaan bakteri uji
  - b. Diinokulasikan bakteri di atas nutrient agar menggunakan cotton swab steril
  - c. Dijenuhkan kertas cakram larutan uji
  - d. Diletakkan piper disk yang telah dijenuhkan di atas medium









No.	Hasil pengujian aktivitas daya hambat	Keterangan
1	 <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
2	 <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
3	 <p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>




4	 <p><i>Providencia stuartii</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
5	 <p><i>Providencia stuartii</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
6	 <p><i>Providencia stuartii</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

7	 <p><i>Citrobacter freundii</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
8	 <p><i>Citrobacter freundii</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
9	 <p><i>Citrobacter freundii</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

<p>10</p>	 <p><i>Pseudomonas luteola</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
<p>11</p>	 <p><i>Pseudomonas luteola</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
<p>12</p>	 <p><i>Pseudomonas luteola</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

13	 <p style="text-align: center;"><i>Burkholderia cepacia</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
14	 <p style="text-align: center;"><i>Burkholderia cepacia</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
15	 <p style="text-align: center;"><i>Burkholderia cepacia</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

16	 <p style="text-align: center;"><i>Acinetobacter baumannii</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
17	 <p style="text-align: center;"><i>Acinetobacter baumannii</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
18	 <p style="text-align: center;"><i>Acinetobacter baumannii</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

19	 <p style="text-align: center;"><i>Proteus mirabilis</i> percobaan 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
20	 <p style="text-align: center;"><i>Proteus mirabilis</i> percobaan 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>
21	 <p style="text-align: center;"><i>Proteus mirabilis</i> percobaan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontrol positif</li> <li>b. Kontrol negatif</li> <li>c. Konsentrasi 20%</li> <li>d. Konsentrasi 40%</li> <li>e. Konsentrasi 60%</li> <li>f. Konsentrasi 80%</li> <li>g. Konsentrasi 100%</li> </ul>

### Lampiran 11 Two-way ANOVA

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Standardized Residual for Daya_Hambat	,090	95	,054	,980	95	,163
a. Lilliefors Significance Correction						

Descriptive Statistics				
Dependent Variable: Daya_Hambat				
Bakteri	Konsentrasi	Mean	Std. Deviation	N
Pseudomonas aeruginosa	20%	8,0000	,00000	2
	40%	8,1667	1,04083	3
	60%	9,1667	1,60728	3
	80%	11,0000	2,00000	3
	100%	12,8333	2,25462	3
	Total	9,9643	2,36533	14
Providencia stuartii	20%	7,0000	,00000	3
	40%	7,5000	,50000	3
	60%	8,0000	,50000	3
	80%	8,6667	,57735	3
	100%	9,3333	,28868	3
	Total	8,1000	,92967	15
Citrobacter freundii	20%	7,0000	1,00000	3
	40%	8,0000	1,80278	3
	60%	8,5000	1,80278	3
	80%	9,3333	1,52753	3
	100%	11,8333	2,02073	3
	Total	8,9333	2,20281	15
Pseudomonas luteola	20%	7,0000	1,41421	2
	40%	8,0000	1,41421	2
	60%	8,0000	1,32288	3
	80%	9,3333	1,60728	3
	100%	11,0000	,00000	3
	Total	8,8462	1,77229	13



Burkholderia cepacia	20%	6,5000	,70711	2
	40%	6,7500	,35355	2
	60%	7,3333	1,15470	3
	80%	8,1667	1,04083	3
	100%	10,1667	,76376	3
	Total	7,9615	1,57403	13
Acinetobacter baumannii	20%	7,0000	1,73205	3
	40%	7,6667	1,60728	3
	60%	8,5000	1,32288	3
	80%	9,0000	,86603	3
	100%	9,5000	,86603	3
	Total	8,3333	1,45978	15
Proteus Mirabilis	20%	8,0000	1,41421	2
	40%	8,7000	,98995	2
	60%	9,0000	1,41421	2
	80%	9,5000	2,12132	2
	100%	9,7500	2,47487	2
	Total	8,9900	1,46852	10
Total	20%	7,1765	1,01460	17
	40%	7,8278	1,14214	18
	60%	8,3250	1,26984	20
	80%	9,2750	1,46427	20
	100%	10,6750	1,74171	20
	Total	8,7200	1,81076	95

### Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Daya\_Hambat

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	200,482 <sup>a</sup>	34	5,897	3,284	,000
Intercept	6894,768	1	6894,768	3840,027	,000
Bakteri	36,889	6	6,148	3,424	,006
Konsentrasi	131,253	4	32,813	18,275	,000
Bakteri * Konsentrasi	21,282	24	,887	,494	,971
Error	107,730	60	1,796		
Total	7531,860	95			
Corrected Total	308,212	94			

a. R Squared = .650 (Adjusted R Squared = .452)

## Lampiran 12 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
 Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879  
 email : [lp2m@uin-alauddin.ac.id](mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id) website [lp2m.uin-alauddin.ac.id](http://lp2m.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B- 675 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan**  
 di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurfitriah syamsuddin  
 NIM : 70100117027  
 Semester/T.A. : XI (Sebelas) T.A. 2022-2023  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Farmasi  
 Alamat : Jalan H.M Yasin Limpo  
 No. HP. : 085289368386

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN TOBO-TOBO (Ficus septica Burm) TERHADAP BAKTERI ULKUS DIABETIK.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** dan tanggal **25 Oktober - 25 November.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kekasannya diucapkan terima kasih

Semala, 25 Oktober 2022  
  
 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.  
 NIP.196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal

Keterangan: Surat Izin Penelitian di Laboratorium FKIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 84 1879  
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 941 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.  
**Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**  
**C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan**  
 di  
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Nurfitriah Syamsuddin  
 NIM : 70100117027  
 Semester/T.A. : XI (Sebelas) T.A. 2022-2023  
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Jurusan/Prodi : Farmasi  
 Alamat : Jln. H.M.Yasin Limpo  
 No. HP. : 085289368386

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Tobo-Tobo (Ficus septica Burm) Terhadap Bakteri Ulkus Diabetik.**


Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar** dari tanggal **15 november-30 Desember**.

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



arsip - mahasiswa yang bersangkutan  
 - pertinggal

Keterangan: Surat Izin Penelitian di RSUP Unhas



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>12402/S.01/PTSP/2022</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Direktur RSPTN Universitas Hasanuddin Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 941 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 16 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NURFITRAH SYAMSUDDIN</b>	
Nomor Pokok	: 70100117027	
Program Studi	: Farmasi	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa	

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN TOBO-TOBO (Ficus septica Burm)  
 TERHADAP BAKTERI ULKUS DIABETIK "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 November s/d 23 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan sebagai acuan dan sebagai pertanggungjawabannya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 23 November 2022

**ALA UDDIN**  
**MAKASSAR**  
 A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal*.

Keterangan: Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sul-Sel


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
RUMAH SAKIT UNHAS**  
 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245  
 Website: www.rs.unhas.ac.id Email: info@rs.unhas.ac.id Telp: (0411) 591331 Fax: (0411) 591332

---

Nomor : 12189/JN4.24.1.1/PT.01.05/2022 16 Desember 2022  
 Hal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :  
 Nama : Nurfitriah syamsuddin  
 NIM : 70100117027  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar  
 Kode Penelitian : 221207\_2

Telah menyelesaikan penelitian di Rumah Sakit Unhas.  
 Terhitung pada tanggal : 14 Desember 2022  
 Dengan Sampel : Data Primer : Pemeriksaan Kultur

Dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :  
**"Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Toho toho (ficus septica burm) Terhadap Bakteri  
Ulkus Diabetik"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
 dipergunakan seperlunya.

Manajer Pendidikan dan Penelitian,  
  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**  
 dr. Aslim Taslim, Sp. Onk. Rad, M. Kes  
 NIP. 498304252012121003

Keterangan: Surat Keterangan Selesai Meneliti

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurfitriah Syamsuddin, lahir di Balang, 18 Desember 1999 dan merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara dari pasangan Syamsuddin Matte dan Suriati. Ketika berumur 6 tahun, ia memulai pendidikan di SDN 130 Bontomarannu. Kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Galesong Selatan di tahun 2011. Selepas lulus dari SMP di tahun 2014 kemudian dia melanjutkan sekolah lagi ke SMAN 3 Takalar. Setelah lulus dari SMA di tahun 2017 dia melanjutkan pendidikannya mengambil Jurusan Farmasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

