

**UJI EFEK PENYEMBUHAN EKSTRAK ETANOL RIMPANG LEMPUYANG
GAJAH (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) TERHADAP TUKAK LAMBUNG
MENCIT (*Mus musculus*) DENGAN PENGINDUKSI ASPIRIN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RAFIUNINGTYAS DWI CAHYANI

NIM : 70100117023

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafiuningtyas Dwi Cahyani
NIM : 70100117023
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 08 November 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Pinang Raya, Desa Rappoa, Kabupaten Bantaeng
Judul : “Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang
Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)
Terhadap Tukak Lambung Mencit (*Mus musculus*)
Dengan Penginduksi Aspirin”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa dia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Gowa, 8 Februari 2023

Penulis

Rafiuningtyas Dwi Cahyani
NIM. 70100117023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) Terhadap Tukak Lambung Mencit (*Mus musculus*) Dengan Penginduksi Aspirin” yang disusun oleh Rafiuningtyas Dwi Cahyani, NIM. 70100117023, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari/ tanggal Senin, 19 Juni 2023 M yang bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1444 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.


Gowa, 19 Juni 2023 M

30 Dzulqa'dah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S. Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M.A	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini yang berjudul **“Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) Terhadap Tukak Lambung Mencit (*Mus musculus*) Dengan Penginduksi Aspirin”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi di jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus sebagai Rahmatan lil' alamin dan menyebarkan dakwah Islam sehingga sampai saat ini kita dapat merasakan nikmat Islam. Salam serta shalawat juga tercurahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau.

Dalam perjalanan menyelesaikan studi selama ini penulis tidak memungkiri adanya dukungan-dukungan dari banyak pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta kepada ayahanda M. Alwi dan Ibunda Eviandri Sapta Putri yang telah mendoakan, memberikan seluruh kasih dan sayang serta pengorbanan dan dukungan yang sangat luar biasa bagi penulis. Serta kepada semua orang terdekatku, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan bantuan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Faris Satrianegara S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
11. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.
12. Bapak apt. Muh. Rusdi, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis mulai dari penyusunan proposal, penelitian hingga skripsi.

13. Ibu Dr. apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
14. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M.A., selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan masukan dalam bidang ilmu Agama Islam di skripsi ini.
15. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada penulis, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
16. Teman-teman KOVALEN Farmasi Angkatan 2017 yang tidak henti-hentinya saling menyemangati dan merangkul selama penyusunan skripsi
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun besar harapan kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi bidang keilmuan Farmasi dan masyarakat, serta bernilai ibadah di sisi Allah swt.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 8 Februari 2023


Penulis

Rafiuningtyas Dwi Cahyani
NIM. 70100117023

DAFTAR ISI


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Anatomi Fisiologi Lambung	7
B. Tukak Lambung	9
C. Tanaman Lempuyang Gajah	12
D. Uraian Hewan Coba	15
E. Ekstraksi.....	16
F. Aspirin.....	19
G. Tinjauan Islami	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Waktu Penelitian	27
D. Populasi dan Sampel	27

E.	Metode Pengumpulan Data.....	28
F.	Instrumen Penelitian	28
G.	Prosedur Kerja.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..		32
A.	Hasil Penelitian	32
B.	Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP.....		38
A.	Kesimpulan	38
B.	Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA		39
LAMPIRAN.....		41
RIWAYAT HIDUP PENULIS		81



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Fisiologis mencit	15
Tabel 3.1. Metode skor tukak lambung pada mencit (<i>Mus musculus</i>).....	30
Tabel 4.1. Data hasil jumlah tukak lambung dan skor tukak lambung pada mencit (<i>Mus musculus</i>).....	32
Tabel 4.2. Data hasil rerata skor tukak lambung pada mencit (<i>Mus musculus</i>)	33
Tabel 4.3. Hasil uji mann whitney efek penyembuhan ekstrak daun lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith) terhadap skor tukak lambung pada mencit jantan (<i>Mus musculus</i>).....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagian dalam lambung.....	7
Gambar 2.2. Rimpang Lempuyang Gajah.....	13
Gambar 2.3. Metabolisme asam arakidonat setelah pelepasannya dari fosfolipid membran. Panah patah menunjukkan efek penghambatan. (ASA, aspirin; HPETE, asam hidroperoksieikosatetraenoat; NSAID, obat antiinflamasi nonsteroid; PG, prostaglandin.)	21
Gambar 2.4. Distribusi jaringan dan aksi isoenzim siklooksigenase (COX). Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) nonselektif termasuk aspirin (ASA) menghambat COX-1 dan COX-2 dalam berbagai tingkat; Inhibitor COX-2 hanya menghambat COX-2. Panah patah menunjukkan efek penghambatan.	22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah	41
Lampiran 2. Pengujian Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah	42
Lampiran 3. Perhitungan Dosis Aspirin.....	43
Lampiran 4. Perhitungan Dosis Ranitidin.....	45
Lampiran 5. Perhitungan Dosis Konversi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith).....	47
Lampiran 6. Uji Tukak Lambung.....	48
Lampiran 7. Analisis Data <i>Kruskal-Wallis</i>	71
Lampiran 8. Analisis Data <i>Mann Whitney</i>	72
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian.....	78



ABSTRAK

Nama : Rafiuningtyas Dwi Cahyani
NIM : 70100117023
Jurusan : Farmasi
Judul Penelitian : Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) Terhadap Tukak Lambung Mencit (*Mus musculus*) Dengan Penginduksi Aspirin

Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) merupakan salah satu spesies dari *Zingiber* yang telah lama digunakan diberbagai etnis di Indonesia maupun etnis lainnya sebagai obat tradisional maupun sebagai bahan jamu. Flavonoid yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dapat berpotensi memiliki efek penyembuhan tukak lambung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penyembuhan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terhadap tukak lambung dan mengetahui dosis efektifnya. Jenis penelitian ini adalah eksperimental kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%, lalu dilakukan pengujian efek penyembuhan tukak lambung menggunakan mencit jantan (*Mus musculus*) dan diamati secara mikroskopik. Data skor tukak lambung kemudian dianalisis dengan uji statistic non-parametrik *Kruskal Wallis* dilanjutkan dengan uji *Mann Whitney* untuk menunjukkan perbandingan antar kelompok mencit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung mencit jantan pada kelompok uji dengan dosis 300 mg.

Kata kunci : Rimpang Lempuyang Gajah, Tukak Lambung, aspirin

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Rafiuningtyas Dwi Cahyani
Student Registration Number : 70100117023
Departement : Pharmacy
Research Title : Test of Healing Effects of Ethanol Extract of Lempuyang Gajah Rhizome (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) Against Gastric Ulcer in Mice (*Mus musculus*) With Aspirin Induction

Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) is one of the species of *Zingiber* that has long been used in various ethnic groups in Indonesia and other ethnic groups as traditional medicine and as herbal ingredients. Flavonoids contained in the rhizome of Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) can potentially have a stomach ulcer healing effect. This study aims to determine the healing effect of ethanol extract of rhizome Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) against peptic ulcer and knowing the effective dosage. This type of research is quantitative experimental with the method used is extraction by maceration method using 70% ethanol solvent, then tested the healing effect of gastric ulcers using mice (*Mus musculus*) and observed microscopically. Ulcer score data were then analyzed by *Kruskal Wallis* non-parametric statistical test followed by *Mann Whitney* test to show the comparison between groups of mice. The results showed that the extract of rhizome Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) has a healing effect on gastric ulcers in male mice in the test group at a dose of 300 mg.

Keywords : Lempuyang Gajah rhizome, gastric ulcer, aspirin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi utama lambung, organ sistem pencernaan berbentuk kantong, adalah menyimpan makanan dan mengatur berapa banyak makanan yang masuk ke duodenum sekaligus. Lapisan mukosa, submukosa, muskularis, subserosa, dan serosa merupakan lapisan yang menyusun lambung. Agar perut dapat menjalankan fungsi fisiologisnya untuk mencerna makanan, faktor agresif dan defensif secara konstan berusaha menyeimbangkan satu sama lain. Mukosa, submukosa, dan kadang-kadang bahkan lapisan otot saluran pencernaan dirugikan saat keseimbangan ini terganggu. Dikenal sebagai tukak lambung, kondisi ini. Makanan, tembakau, alkohol, dan zat lain semuanya bisa menjadi faktor penyebab (Nuari et al., 2019).

Tukak lambung merupakan penyakit gastrointestinal umum yang mempengaruhi sejumlah orang diseluruh dunia. Ketidakseimbangan antara mekanisme pertahanan mukosa dan berbagai faktor ofensif endogen dan eksogen adalah etiologi penyakit. Pilihan utama untuk mengobati tukak adalah melalui penggunaan obat-obatan sintetis. Di sisi lain, penggunaan obat sintetik juga dapat menimbulkan efek samping dan berdampak buruk bagi tubuh, seperti resiko tinggi kerusakan saraf dan komplikasi lainnya. Akibatnya, banyak orang mencari pilihan lain, termasuk pengobatan herbal untuk pengobatan tukak lambung (Bunwijit et al., 2017).

Berbagai macam jenis tumbuhan diidentifikasi dan dipelajari untuk kemudian di racik menjadi ramuan obat yang sesuai untuk suatu penyakit. Allah SWT. dengan kebesaran dan kekuasaanNya telah memberikan akal pikiran kepada umat manusia untuk terus berkembang dan mempelajari hal-hal baru di muka bumi ini. Allah SWT. juga memberikan kekayaan alam yang melimpah bagi umat manusia diantaranya yaitu berbagai tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan yang kiranya dapat diteliti dan dikembangkan kandungan yang terdapat pada tumbuhan tersebut guna dapat memberikan khasiat sebagai obat.

Sebagian besar penduduk di Indonesia masih lebih memilih menggunakan tumbuhan secara empiris untuk mengobati berbagai penyakit (Nasution et al., n.d.). Disamping karena toksisitasnya yang rendah, banyak ekstrak tumbuhan dan senyawa yang berasal dari tumbuhan ditemukan memiliki efek gastroprotektif dan memiliki potensi penggunaan sebagai pengganti obat sintetik (Bunwijit et al., 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui karakteristik farmakologis ekstrak tanaman karena pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional merupakan pengetahuan yang bermanfaat yang masih bergantung pada bukti empiris.

Spesies *Zingiber* yang sering dipakai dalam pengobatan salah satunya adalah *Zingiber zerumbet* (L.) Smith, juga dikenal sebagai lempuyang gajah. Banyak suku bangsa di Indonesia, begitu pula suku bangsa lainnya, telah lama memanfaatkan *Zingiber zerumbet* (L.) Smith sebagai obat tradisional dan sebagai bahan obat herbal. Dibandingkan dengan lempuyang lainnya, Lempuyang Gajah lebih sering dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. *Zingiber zerumbet* (L.) Smith digunakan sebagai obat karena memiliki sifat antipiretik, antiinflamasi, anti tukak lambung, analgesik, dan anti mikroba (Silalahi, 2018).

Menggunakan konteks tersebut sebagai titik awal, saya kemudian melakukan penelitian “Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) Terhadap Tukak Lambung Mencit (*Mus musculus*) Dengan Penginduksi Aspirin” terdiri dari berbagai dosis ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung?
2. Berapa dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap tukak lambung?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Ekstrak merupakan bahan atau sediaan yang didapatkan dari hasil ekstraksi bagian tertentu tanaman obat.
- b. Mencit merupakan hewan percobaan yang digunakan dalam pengujian efek penyembuhan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terhadap tukak lambung.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menentukan pengaruh dari pemberian ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terhadap kerusakan histologik lambung mencit (*Mus musculus*).

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Doni Anshar Nuari dkk tahun 2019 dengan judul “Aktivitas Antitukak Lambung Ekstrak Etanol Daun Gedi (*Abelmoschus manihot* (L) medik) Terhadap Tikus Jantan Galur Wistar” dengan melakukan penginduksian aspirin, kesimpulannya Dosis 500 mg ekstrak daun gedi etanol 96% (*Abelmoschus manihot* (L) medic) mempunyai rasio proteksi 81% dan efek anti tukak. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian ekstrak pada 6 kelompok hewan coba dengan membandingkan beberapa varian dosis ekstrak tanaman daun gedi yang mampu mengobati tukak lambung pada tikus jantan.

Pada tahun 2015, Nur Syafaatur Rahmaniyah dari Universitas Negeri Jember melakukan penelitian “Uji Efek Penyembuhan Ulkus dari Perasan Daging Buah Mangga Podang Urang (*Mangifera indica* L.) Pada Lambung Tikus yang Diinduksi Aspirin”. Menurut penelitian ini, tukak pada lambung setelah diinduksi aspirin pada tikus (*Rattus novergicus*) dapat diobati dengan sari buah mangga podang (*Mangifera indica* L.).

Pada tahun 2016, Syamsu Rijal, dkk, melakukan penelitian “*Evaluation of Anti-ulcerogenic Activity in Oil Extract of Jintan Hitam (Nigella sativa) Against Ethanol Induced Gastric Ulcer in Mice (Mus musculus)*” dengan menginduksikan etanol selama waktu yang ditentukan. Etanol yang menyebabkan kerusakan lambung. Kerusakan yang terjadi, sebagai akibat terputusnya integritas mukosa lambung. Mencit kemudian diberikak ekstrak dari minyak jintan hitam (*Nigella sativa*) sebagai obat. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak minyak jintan hitam menunjukkan efek penyembuhan dan penurunan indeks tukak lambung.

Pada tahun 2017, Jurawat Bunwijit, dkk, melakukan penelitian “*Gastroprotective Effect of Hydroalcoholic Extract of Ocimum africanum leaves*”.

Pada penelitian ini, tikus diinduksikan larutan asam/alkohol yang mengandung asam klorida (1,7%), etanol (60%) dalam air yang digunakan untuk menginduksi kerusakan lambung tikus yang ditandai dengan gangguan pada mukosa lambung, menyebabkan pendarahan dan pengelupasan kulit sel epitel. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak daun *Ocimum africanum* mampu mencegah tukak lambung serta menurunkan peradangan.

Pada tahun 2020, Elsa Trinovita dan Fatmaria, melakukan penelitian “*Evaluation of Gastroprotective Activity of Cemot Leaves (Passiflora foetida L.) Extracted by Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) Against Etanol-Induced Gastric Lesions in Rats*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun cemot (*Passiflora foetida*) yang mengandung senyawa antioksidan mampu bekerja sebagai gastroprotektif dengan melindungi lambung tikus yang telah diinduksi etanol ditandai dengan penurunan pembentukan lesi lambung.

Pada tahun 2020, Maulida shofiatun dan Ririn Lispita Wulandari, melakukan penelitian mengenai, “*Efek Gastroprotektif Ekstrak Etanol Buah Labu Kuning (Cucurbita moschata (Duch.) Poir) Pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Aspirin*”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan flavonoid pada tanaman mampu mengikat radikal bebas sekaligus antioksidan sehingga memberikan efek gastroprotektif pada hewan coba tikus yang diinduksi aspirin dan mengalami tukak lambung.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efek penyembuhan ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terhadap tukak lambung.

- b. Untuk mengetahui dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap tukak lambung.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu dapat memberi informasi baru tentang pemanfaatan bahan alam untuk alternatif pengobatan tukak lambung khususnya yang berasal dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith).




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anatomi Fisiologi Lambung

Lambung bagian dari sistem pencernaan adalah tempat segala sesuatunya benar-benar di cerna. Bukaan kardial menghubungkan lambung ke kerongkongan, sedangkan lubang pilorus menghubungkannya ke duodenum. (Pearce, 2016).



Gambar 2.1. Bagian dalam lambung (Tamam, 2016)

Menurut (Pearce, 2016) terdapat empat lapisan lambung, diantaranya:

1. Lapisan serosa merupakan lapisan peritoneal bagian luar.
2. Lapisan yang memiliki otot terdiri dari tiga lapis, (a) serabut longitudinal, (b) serabut sirkuler, dan (c) serabut oblik.
3. Saluran limfe dan jaringan areolar yang terdiri dari pembuluh darah merupakan bagian dari lapisan submucosa.

4. Lapisan yang tebal, terletak dibagian dalam, yang memiliki banyak kerutan yang akan tidak terlihat ketika lambung mengembang akibat dari banyaknya makanan yang masuk, merupakan lapisan mukosa.

Organ lambung cukuplah besar dan dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dimulai dari bagian yang berbatasan dengan otot sphincter LES bagian ujung atas lambung, diantaranya:

- a. Fundus merupakan puncak dari lambung yang terletak di sisi bagian paling atas.
- b. Cardia terletak berdekatan dengan pintu sphincter LES lambung pada sisi kanan.
- c. Korpus (Body) merupakan tempat penyimpanan makanan sementara dan bagian paling besar dari lambung, terletak pada bagian tengah badan lambung.
- d. Pylorus terletak berdekatan dengan pintu sphincter pyloric pada sisi bawah kanan lambung, memiliki bentuk yang mengecil menuju usus kecil duodenum.

(Kuntoadi, 2019)

Perut menerima makanan dari kerongkongan melewati orifisium kardiak serta bertindak sebagai reservoir sementara, sementara kontraksi otot mencampurkan makanan dengan cairan lambung. Gelombang peristaltik mulai tinggi di fundus, berjalan berulang kali, tiga kali dalam setiap menitnya dan merambat perlahan ke pylorus (Pearce, 2016). Lambung memecah makanan secara mekanis akibat kontraksi otot lambung dan secara kimiawi sebagai akibat produksi getah lambung, sejenis getah atau cairan.

Getah lambung, cairan pencernaan yang penting, disekresikan oleh kelenjar di lapisan mukosa lambung. Cairan yang bersifat asam, bening atau tidak memiliki

warna, serta mengandung asam klorida (HCl) 0,4 persen merupakan karakteristik dari getah tersebut. HCl berfungsi sebagai antibakteri dan disinfektan, mengasamkan semua makanan dan menciptakan lingkungan yang sesuai untuk pemecahan makanan kaya protein. (Pearce, 2016).

Kandungan dari getah lambung diantaranya:

- a. Sebanyak 99,4 persen terdiri dari air (H₂O).
- b. Asam lambung yang banyak dikenal oleh orang merupakan asam hidroklorida (HCl). Memiliki banyak fungsi yaitu sebagai zat anti mikroba sehingga mampu membunuh bakteri atau bahkan kuman yang ikut masuk kedalam pencernaan saat makan dan minum,
- c. Enzim pepsin yang memiliki fungsi sebagai pemecah protein,
- d. Enzim musin yang memiliki fungsi sebagai pelicin makanan, dan
- e. Enzim renin yang memiliki fungsi sebagai mengubah kaseinogen susu hingga menjadi kasein.

(Kuntoadi, 2019)

B. Tukak Lambung

Tukak lambung merupakan kondisi dimana kontinuitas pada mukosa lambung yang luasnya hingga didaerah bawah bagian epitel terputus. Tukak lambung merupakan kerusakan yang terjadi dari lapisan mukus sampai mucus berotot, berbentuk bulat atau bulat telur dengan diameter > 5 mm, sebagai akibat terputusnya integritas mukosa lambung (Rijal, 2016).

Ketidakseimbangan antara iritan epitel lambung dan mekanisme pertahanan mukosa lambung inilah yang menyebabkan tukak lambung. Karena efek berbahaya endogen dan eksogen, epitel lambung terus-menerus teriritasi. Asam lambung, enzim pepsin, dan garam-garam empedu adalah contoh agen perusak endogen,

sedangkan bakteri, obat-obatan, dan asupan alkohol adalah contoh perusak eksogen. (Rahmaniyah, 2015).

Ulkus peptikum merupakan kondisi umum yang terdiri dari kerusakan yang jelas pada mukosa gastrointestinal, biasanya lambung atau duodenum. Ulkus duodenum jarang ganas tetapi ulkus lambung lebih sering dikaitkan dengan keganasan. Etiologi penyakit ulkus peptikum mungkin multifaktorial tetapi bakteri *Helicobacter pylori* memainkan peran penting. Kelainan mekanisme pertahanan mukosa yang normal, dan, dalam kasus tukak lambung, refluks isi duodenum ke dalam lambung atau pengosongan lambung yang tertunda mungkin juga terlibat. Faktor lain termasuk stres emosional, merokok, alkohol, dan obat seperti *Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs* (NSAID) ataupun kortikosteroid (Sweetman, 2009).

Istilah ulkus peptikum mengacu pada semua ulkus yang ada pada daerah yang mukosanya terendam dalam asam hidroklorat dan pepsin cairan lambung (yaitu lambung dan duodenum bagian atas). Obat-obatan yang efektif pada terapi ulkus peptikum adalah yang menurunkan sekresi asam lambung (tengah kiri dan kanan) atau yang meningkatkan resistensi mukosa terhadap serangan asam pepsin (kiri bawah) (Neal, 2006).

Sekresi asam dari *sel parietal* diturunkan oleh antagonis histamine H₂ (kanan) atau oleh inhibitor pompa proton (kanan) yang dapat menghasilkan kondisi tidak asam melalui penghambatan pompa yang mentranspor ion H⁺ keluar dari sel parietal. Inhibitor pompa proton sangat efektif dalam menunjang penyembuhan ulkus. Ranitidin cepat diabsorpsi secara oral. Obat tersebut memblokir kerja histamine pada sel parietal dan mengurangi sekresi asam. Ranitidin mengurangi nyeri akibat ulkus peptikum dan meningkatkan kecepatan penyembuhan ulkus (Neal, 2006).

Penyakit ulkus peptikum biasanya muncul sebagai nyeri dispepsia, kadang-kadang berhubungan dengan mual, muntah, anoreksia, mulas, atau kembung. Infeksi *H. pylori* dan penggunaan NSAID adalah faktor risiko paling umum untuk PUD (*Peptic Ulcer Disease*). Faktor yang kurang umum termasuk ZES dengan hipersekresi asam juga dapat terlibat. Gangguan pada pertahanan mukosa normal dan mekanisme penyembuhan memungkinkan asam dan pepsin mencapai epitel lambung. Ulkus lambung jinak, erosi, dan gastritis dapat terjadi di mana saja di dalam perut, meskipun antrum serta kurvatura minor mewakili lokasi yang paling umum. Ulkus duodenum biasanya terjadi pada bagian pertama duodenum (duodenal bulb) (Dipiro, 2020).

Infeksi *H. pylori* dapat menyebabkan gastritis akut dan kronis pada individu yang terinfeksi dan berhubungan dengan beberapa komplikasi GI. PUD, limfoma jaringan limfoid terkait mukosa (MALT), dan kanker lambung semuanya telah dikaitkan dengan infeksi *H. pylori*. NSAID resep dan nonresep, banyak digunakan di Amerika Serikat, dan telah dikaitkan dengan PUD. Ada banyak bukti yang menghubungkan penggunaan NSAID kronis (termasuk aspirin dosis rendah) dengan cedera saluran cerna bagian atas, PUD, gastritis, dan erosi superfisial. Pada individu yang rentan, NSAID menyebabkan kerusakan mukosa superfisial yang terdiri dari petechiae (perdarahan intramukosa) dalam beberapa menit setelah konsumsi, dan berkembang menjadi erosi dengan penggunaan terus menerus (Dipiro, 2020).

Obat-obat antagonis reseptor H₂, Antasida, obat-obat analog prostaglandin, obat kelas inhibitor pompa proton, obat pelindung mukosa lambung, dan obat antimuskarik adalah pilihan pengobatan yang dapat diberikan untuk tukak lambung. Ada berbagai sumber hayati yang biasa dipakai untuk mengobati masalah tukak lambung selain alternatif terapi farmakologis ini, untuk membantu

mengurangi bahkan menyembuhkan keparahan tukak yang berkembang pada pasien penderita tukak lambung. Bawang putih, daun kemangi, daun jambu biji, bunga tanaman mangga, dan pare di antara sumber hayati lainnya, adalah beberapa contoh sumber yang memiliki kemampuan untuk mengobati sakit maag (Rahmaniyah, 2015). Aktivitas antioksidan yang terkandung dalam tanaman merupakan salah satu faktor pertahanan paling penting yang terlibat dalam efek anti tukak lambung (Trinovita & Fatmaria, 2020).

Untuk non-farmakologi, modifikasi gaya hidup, termasuk pengurangan stres dan berhenti merokok, harus diterapkan pada pasien dengan PUD. Tidak ada diet khusus yang direkomendasikan untuk pasien dengan PUD saat ini atau riwayat; namun, pasien diharuskan untuk menghindari berbagai makanan dan minuman (misalnya, alkohol, kafein, dan makanan pedas) yang dapat menyebabkan dispepsia atau segala yang dapat memperparah gejala maag (Dipiro, 2020).

C. Tanaman Lempuyang Gajah

1. Karakteristik Tanaman Lempuyang Gajah

Lempuyang memiliki batang tegak dengan tinggi antara satu hingga dua meter. Rimpang tebal atau batang bawah yang tumbuh tepat di bawah permukaan tanah memunculkan daun dan perbungaan berbentuk biji pinus. Sel epidermis pada daun abaksial *Zingiber zerumbet* (L.) Smith memiliki kepadatan lebih dari 175 buah per satuan lapang pandang, 10 ikatan pembuluh pada urat daun primer, dan banyak kristal silika pada jaringan bunga karang (Silalahi, 2018).

Ligule cukup pendek, lengkap, dan lebar, berukuran panjang hanya 1,5–2,5 cm dibandingkan dengan panjang tangkai daun yang 6 cm. Lempuyang gajah memiliki rimpang yang lebih besar dari pada *Zingiber* yang lainnya. *Zingiber*

zerumbet (L.) Smith memiliki variasi morfologi rimpang yang sangat besar (Silalahi, 2018).

2. Klasifikasi Tanaman Lempuyang Gajah

Taksonomi tanaman lempuyang gajah menurut Lianah (2019) dapat diklasifikasikan yaitu:

- Divisio : Spermatophyta
- Sub division : Angiospermae
- Class : Monocotyledonae
- Ordo : Zingiberales
- Famili : Zingiberaceae
- Genus : Zingiber
- Spesies : *Zingiber zerumbet* (L.) Smith

3. Kandungan dan Khasiat Tanaman Lempuyang Gajah

Bagian yang bermanfaat dari lempuyang gajah adalah daun, bunga, batang, dan rimpang. Khusus bagian rimpang lempuyang gajah memiliki zat kimia yang bermanfaat bagi kesehatan (Savitri, 2016). Sebagian besar keluarga zingiberaceae menyimpan metabolit sekundernya pada bagian rhizomanya, khususnya minyak atsiri. Bagian utama dari *Zingiber zerumbet* (L.) Smith yang biasanya dimanfaatkan sebagai obat adalah daun dan rhizomanya (Silalahi, 2018).



Gambar 2.2. Rimpang Lempuyang Gajah (Lianah, 2019)

Di Indonesia penggunaan rhizoma *Zingiber zerumbet* (L.) Smith sebagai alternatif untuk mengobati diare, gangguan lambung, disentri, dan mengurangi rasa sakit, sedangkan di Brunei, rhizoma digunakan untuk mandi pasca melahirkan serta untuk daunnya dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan rematik, dan sakit persendian (Silalahi, 2018).

Temuan bioessay pada rimpang *Zingiber zerumbet* (L.) Smith menunjukkan bahwa ia memiliki sifat anti-inflamasi. Banyak mediator, termasuk prostaglandin, leukotrien, histamin, oksida nitrat, sitokin, bradikinin, dan serotonin, dapat menyebabkan peradangan. Tindakan mediator termasuk prostaglandin, leukotrien, histamin, oksida nitrat, sitokin, bradikinin, dan serotonin merupakan senyawa atau agen yang memiliki sifat anti-inflamasi (Silalahi, 2018).

Dengan mencegah pembentukan neutrofil dan sitokin dalam sistem pencernaan dan ekspresi protein, antioksidan mendorong terjadinya perbaikan pada jaringan dengan memicu pelepasan berbagai macam faktor-faktor pertumbuhan, flavonoid diketahui beroperasi sebagai zat gastroprotektif melalui mekanisme aksi anti-inflamasi (Pertiwi & Saputra, 2019). Mukosa gastrointestinal dapat dilindungi dari terjadinya lesi yang disebabkan beberapa model ulserogenik berkat flavonoid. Selain itu, flavonoid dapat sebagai antihistamin, yang memungkinkannya bekerja dalam penurunan kadar histamin, menurunkan sekresi asam lambung, serta dapat menghentikan pelepasan histamin dari sel mast lambung. Senyawa aktif memiliki fungsi sitoprotektif untuk mukosa lambung melalui beberapa cara, termasuk dengan meningkatkan produksi mukus, mengikat radikal bebas dan antioksidan, dan bertindak sebagai antisekretori (Shofiatun & Wulandari, 2021).

D. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Mencit

Menurut Nugroho (2018), mencit diklasifikasikan yaitu:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub filum	: Vertebrata
Class	: Mamalia
Sub class	: Theria
Ordo	: Rodentia
Sub ordo	: Myomorpha
Family	: Muridae
Sub family	: Murinae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Karakteristik Mencit (*Mus musculus*)

Mencit adalah hewan yang aktif ketika senja hingga malam hari, sehingga dikategorikan dalam hewan *crepuscular* (Nugroho, 2018). Fisiologis dari mencit diantaranya:

Tabel 2.1. Fisiologis mencit (Rejeki et al., 2018)

Kriteria	Nilai
Berat Dewasa	20-40 g (Jantan) 25-45 g (Betina)
Berat Lahir	2-4 g
Masa Hidup	1-3 Tahun
Mulai Dikawinkan	Umur 8 Minggu
Suhu Tubuh	95-102,5 ⁰ F
Denyut Jantung	320-840 bpm
Respirasi	84-280
Maturitas Seksual	28-49 hari
Target Suhu Lingkungan	88-79 ⁰ F (17,78-26,11 ⁰ C)

Target Kelembapan Lingkungan	30-70%
Gestasi	19-21 hari
Minum	6-7 ml/hari

Untuk satu kandang mencit berisi lima sampai tujuh ekor mencit, kandang yang mempunyai ukuran 40 x 30 x 18 (cm) dapat digunakan di laboratorium. 1 jantan dan 4 betina membentuk pembagian jenis kelamin. Kandang dapat dibuat dari kaca seperti akuarium atau dari plastik, aluminium, atau baja tahan karat. Aturan dasarnya adalah kandang harus kuat, mudah dibersihkan, steril, dan sulit dikerat oleh mencit (Nugroho, 2018).

Seekor mencit perlu makan sekitar 10% (pakan kering) dari berat tubuhnya setiap hari dalam bentuk makanan. Satu ekor mencit yang telah dewasa dapat mengkonsumsi 3-5 gram setiap hari. Mencit yang menyusui atau hamil membutuhkan makanan tambahan. Seekor mencit harus mengonsumsi sekitar 15 hingga 30 ml cairan per hari (Nugroho, 2018).

E. Ekstraksi

Bahan aktif dalam simplisia diekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai untuk menghasilkan ekstrak. Pelarut kemudian sepenuhnya atau hampir seluruhnya diuapkan, meninggalkan sebagian massa atau serbuk yang kemudian diproses untuk memenuhi kriteria tertentu. Sebagian besar ekstrak dibuat dengan cara dipekatkan bahan obat untuk mengekstrak bagian penyusunnya. Semua perkolat biasanya dipekatkan dengan distilasi di bawah tekanan rendah, agar sesedikit mungkin bahan utama obat terkena panas. Istilah "ekstrak cair" mengacu pada sediaan berbentuk cair pada simplisia yang mengandung etanol baik memiliki fungsi pengawet, pelarut, bahkan keduanya. Setiap ml ekstrak mengandung 1 g komponen aktif, kecuali ditentukan lain dalam monografi spesifik (Kemenkes, 2014).

Ekstraksi merupakan suatu proses dalam memisahkan komponen tumbuhan obat dengan menggunakan suatu pelarut yang sesuai dan tata cara yang berlaku. Ekstraksi bertujuan sebagai pemisahan metabolit tanaman yang larut dari residu, yang merupakan sisa-sisa seluler yang tidak larut. Dengan menggunakan prosedur ini, campuran berbagai metabolit tumbuhan, termasuk glikosida, alkaloid, terpenoid, fenolik dan flavonoid. Dimasukkan dalam ekstrak kasar awal. Sementara beberapa zat yang diekstraksi dapat langsung digunakan sebagai tincture dan ekstrak cair, tapi beberapa memerlukan pemrosesan tambahan (Azwanida, 2015).

Prosedur ekstraksi bahan-bahan yang berasal dari bagian tanaman diantaranya:

1. Dikelompokkan bagian-bagian tanaman (daun, batang, dll), dikeringkan serta diserbukkan bagian-bagian tanaman.
2. Memilih jenis pelarut
3. Pelarut yang bersifat polar diantaranya air, methanol, etanol, dan lain-lain.
4. Pelarut yang bersifat semipolar diantaranya diklorometan, etil asetat, dan lain-lain.
5. Pelarut yang bersifat nonpolar diantaranya n-heksan, kloroform, petroleum eter, dan lain-lain.

(Mukhriani, 2014)

Zat yang mudah menguap, etanol berwarna bening (tidak memiliki warna), memiliki aroma khas, dan meninggalkan rasa panas di lidah. Etanol larut dalam air dan semua pelarut organik serta mudah terbakar (Kemenkes, 2014).

Beberapa macam metode ekstraksi diantaranya:

1. Maserasi

Maserasi telah diadopsi dan telah banyak digunakan dalam meneliti tanaman obat (Azwanida, 2015). Teknik yang paling banyak digunakan adalah maserasi.

Untuk prosedur ini, serbuk tanaman dan pelarut yang cocok digabungkan dan dibiarkan pada suhu kamar dalam wadah tertutup rapat. Saat konsentrasi dalam sel dan konsentrasi senyawa dalam pelarut tumbuhan setimbang, maka proses ekstraksi kemudian dihentikan. Setelah ekstraksi, filtrasi digunakan untuk pemisahan pelarut dari sampel. Kelemahan utama metode ini karena memerlukan waktu yang lama, banyak pelarut yang digunakan, dan kemungkinan kehilangan sebagian bahan kimia. Namun demikian, teknik maserasi dapat mencegah rusaknya senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

2. Perkolasi

Metode ini melibatkan membasahi sampel berbentuk serbuk sedikit demi sedikit didalam perkolator, yang merupakan wadah dengan bentuk silinder dengan keran dibagian bawahnya. Serbuk sampel ditambahkan pelarut dibagian atas, yang kemudian biarkan menetes secara bertahap ke bagian bawah. Manfaat dari prosedur ini adalah pelarut baru selalu diterapkan pada sampel. Kelemahannya adalah akan sulit bagi pelarut untuk menjangkau setiap bagian sampel dalam perkolator jika tidak homogen. Selain itu, prosedur ini memakan waktu lama dan menggunakan banyak pelarut (Mukhriani, 2014).

3. Soxhlet

Untuk menerapkan metode ini, klonsong yang berada di atas labu dan dibawah kondensor harus mengandung sampel berbentuk serbuk dalam selubung selulosa (kertas saring dapat digunakan). Labu diisi dengan pelarut yang sesuai, dan suhu dalam penangas dinaikkan diatas suhu refluks. Kelebihan metode ini proses ekstraksinya kontinyu, tiap sampel diekstraksi hanya digunakan pelarut baru yang dihasilkan dari kondensasi, menggunakan sedikit pelarut dan sedikit waktu. Karena bahan yang diekstraksi terus-menerus mendidih, hal itu dapat menyebabkan degradasi senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

4. Reflux dan Destilasi Uap

Pelarut dan sampel ditempatkan dalam labu yang terpasang pada kondensor pada prosedur refluks. Sampai titik didih, pelarut dipanaskan. Uap kembali ke labu setelah mengembun (Mukhriani, 2014).

Teknik serupa, seperti distilasi uap, sering digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri, yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan kimia yang mudah menguap. Uap yang terkondensasi dan distilat ditampung dalam wadah yang menempel pada kondensor selama pemanasan (dipisahkan menjadi 2 bagian yang tidak bercampur satu sama lain). Kedua prosedur ini memiliki kelemahan yaitu dapat menghancurkan zat yang termolabil (Mukhriani, 2014).

F. Aspirin

Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) adalah kelas asam organik dengan tindakan analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik yang secara kimiawi tidak berhubungan satu sama lain. Karena NSAID adalah penghambat enzim siklooksigenase, mereka mencegah asam arakidonat digunakan untuk membuat prostaglandin dan tromboksan. Cyclooxygenase (COX) ada dalam dua bentuk: COX-1, merupakan bentuk konstitutif dari enzim, sedangkan COX-2, merupakan bentuk yang dihasilkan sebagai respons terhadap peradangan. Oleh karena itu, manfaat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik NSAID diasumsikan setidaknya sebagian disebabkan oleh penghambatan COX-2, tetapi beberapa efek toksiknya, terutama pada sistem pencernaan, kemungkinan besar disebabkan oleh penghambatan COX-1 (Sweetman, 2009).


Efek samping yang paling umum dari NSAID umumnya gangguan gastrointestinal, seperti ketidaknyamanan gastrointestinal, mual, dan diare; ini biasanya ringan dan reversibel tetapi pada beberapa pasien ulserasi peptikum dan

perdarahan gastrointestinal yang parah dapat terjadi. Secara umum disepakati bahwa penghambatan siklooksigenase-1 (COX-1) memainkan peran penting dalam efek gastrointestinal dari NSAID; penghambatan selektif COX-2 meningkatkan toleransi gastrointestinal (Sweetman, 2009).

NSAID (*Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs*), termasuk aspirin, menyebabkan terjadinya kerusakan mukosa pada lambung dengan mekanisme lokal dan sistemik, tetapi penghambatan sistemik sintesis PG (Prostaglandin) mukosa endogen diyakini sebagai mekanisme utama. Onset cedera diprakarsai dari sifat asam dari banyak NSAID sementara penghambatan sistemik PG pelindung membatasi kemampuan mukosa untuk bertahan melawan cedera dan dengan demikian memainkan peran utama dalam pengembangan tukak lambung. NSAID asam (misalnya, aspirin) memiliki sifat iritasi topikal dan mereka menurunkan hidrofobisitas lapisan gel mukosa di mukosa lambung. Kebanyakan NSAID nonaspirin memiliki efek iritasi topikal, tetapi aspirin adalah yang paling merusak. Salisilat, pil aspirin berlapis enterik, sediaan parenteral atau rektal, dan prodrug NSAID semuanya terkait dengan cedera mukosa lambung yang tidak terlalu parah, tetapi karena mereka menekan PG endogen secara sistemik, mereka juga dapat menyebabkan tukak dan masalah GI lainnya (Dipiro, 2020).

NSAID menghambat COX, enzim pembatas laju dalam transformasi asam arakidonat menjadi PG. Sebagian besar jaringan tubuh, seperti lambung, ginjal, usus, dan trombosit, mengandung COX-1; COX-2 biasanya tidak dapat dideteksi pada sebagian besar jaringan jika keadaan normal secara fisiologis, tetapi dapat muncul dengan sendirinya selama peradangan akut dan radang sendi. PG pelindung yang dibuat oleh COX-1 mengontrol sistem fisiologis seperti fungsi ginjal, homeostasis trombosit, dan integritas mukosa GI. PG yang berhubungan dengan peradangan, demam, dan nyeri diproduksi oleh COX-2, yang diaktifkan (tidak


diatur) oleh rangsangan peradangan seperti sitokin. Sementara efek anti-inflamasi NSAID sebagian besar merupakan konsekuensi dari penghambatan COX-2, efek samping negatifnya (seperti kerusakan GI atau ginjal) terutama disebabkan oleh penghambatan COX-1 (Dipiro,2020).



Gambar 2.3. Metabolisme asam arakidonat setelah pelepasannya dari fosfolipid membran. Panah patah menunjukkan efek penghambatan. (ASA, aspirin; HPETE, asam hidroperoksieikosatetraenoat; NSAID, obat antiinflamasi nonsteroid; PG, prostaglandin.) (Dipiro, 2020).

Rasio penghambatan COX-1-ke-COX-2 menentukan toksisitas GI relatif dari NSAID tertentu. NSAID nonselektif, termasuk aspirin, menghambat baik COX-1 dan COX-2 pada tingkat yang bervariasi dan berhubungan dengan peningkatan kecenderungan untuk menyebabkan tukak lambung. Sebaliknya, inhibitor COX-2

selektif lebih suka menghambat COX-2 in vitro yang menghasilkan penurunan risiko ulkus dan komplikasi GI terkait (Dipiro, 2020).



Gambar 2.4. Distribusi jaringan dan aksi isoenzim siklooksigenase (COX).

Obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) nonselektif termasuk aspirin (ASA) menghambat COX-1 dan COX-2 dalam berbagai tingkat; Inhibitor COX-2 hanya menghambat COX-2. Panah patah menunjukkan efek penghambatan (Dipiro, 2020).

Karena aspirin adalah NSAID salisilat, ia memiliki banyak karakteristik yang sama dengan NSAID tanpa aspirin. Aspirin dan salisilat lainnya berfungsi sebagai penghambat enzim siklooksigenase, akibatnya langsung terjadi penghambatan pada pembuatan prostaglandin dan tromboksan dari asam arakidonat. Mereka juga memiliki sifat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Salisilat non-asetat tidak mencegah agregasi trombosit; aspirin tidak. Gejala gastrointestinal dapat diminimalkan dengan memberikan aspirin dengan makanan (Sweetman, 2009).

Penambahan aspirin pada inhibitor COX-2 selektif mengurangi manfaat penyembuhan ulkus dan meningkatkan risiko ulkus. Aspirin dan NSAID non-aspirin menghambat COX-1 trombosit secara ireversibel, mengakibatkan penurunan agregasi trombosit dan waktu perdarahan yang berkepanjangan, sehingga meningkatkan potensi untuk perdarahan saluran cerna atas dan bawah (Dipiro, 2020).

Asam salisilat merupakan turunan yang memiliki sifat analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik. Aspirin adalah salah satu NSAID yang paling ulcerogenic, atau yang dapat merusak mukosa lambung atau mengakibatkan tukak lambung. Dibandingkan dengan obat antiradang lainnya, aspirin memiliki efek paling ampuh untuk mengatasi iritasi lambung (Shofiatun & Wulandari, 2021).

Selain bersifat asam, efek samping aspirin juga menghambat pembentukan prostaglandin. Dengan meningkatkan sekresi mukus dan bikarbonat untuk melindungi mukosa saluran cerna, prostaglandin (PGE2 dan PGI2) yang diproduksi oleh mukosa lambung bekerja secara sitoprotektif. Oleh karena itu, penekanan prostaglandin akan mengurangi kemampuan protektif mukosa lambung, terutama terhadap asam (Iskendarso Sigit & Andaja Soemardji, 2012).

Aspirin (asam asetilsalisilat) adalah NSAID yang paling bertahan lama dan merupakan analgesic efektif, dengan durasi kerja sekitar 4 jam. Aspirin diabsorpsi dengan baik secara oral. pH asam dalam lambung menjaga fraksi besar aspirin tidak terionisasi sehingga menunjang absorpsi dalam lambung, karena aspirin merupakan asam lemah ($pK_a = 3,5$), meskipun banyak aspirin diabsorpsi melalui area permukaan yang luas dari usus kecil bagian atas. Efek samping sering terjadi, sebagian karena pemberian obat dosis tinggi dalam waktu yang panjang dan sebagian karena penggunaan pada pasien lanjut usia yang lebih rentan terhadap efek samping (Neal, 2006).

Dalam lambung, COX-1 menghasilkan prostaglandin (PGE_2 dan PGI_2) yang menstimulasi mucus dan sekresi bikarbonat dan menyebabkan vasodilatasi, suatu aksi yang menjaga mukosa lambung. Aspirin menghambat COX-1 dan karena ini mengurangi efek sitoprotektif prostaglandin, obat ini sering menyebabkan efek samping yang serius pada gastrointestinal atas, termasuk pendarahan dan ulserasi (Neal, 2006).

G. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan

Berbagai jenis makhluk, termasuk tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitar manusia, diciptakan oleh Allah SWT. Tumbuhan merupakan anugerah dari Allah SWT yang memiliki berbagai manfaat.

Allah SWT berfirman dalam QS. Thaha/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّاكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
أَنْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَّى ٥٣

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementerian Agama, 2021).

Ayat di atas berbunyi, “Dia, yaitu Allah SWT, Yang telah menjadikan untukmu, hai Fir'aun dan seluruh manusia, bumi sebagai bentangan dan menjadikan untukmu di bumi jalan yang mudah untuk kamu ikuti, dan Dia, Tuhan. Juga, telah menurunkan air dari langit, yaitu hujan, agar tercipta sungai dan danau, lalu melalui hujan itu tumbuh-tumbuhan yang berbagai jenisnya Kami tumbuhkan.” Allah hanya membuat itu untuk kamu dan hewan peliharaan kamu. (Shihab, 2002).

Dalam Q.S. An-Naba’/78:14-16 disebutkan juga bahwa:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً نَجَّاجًا ١٤ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ١٥ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١٦

Terjemahnya:

(14) Kami menurunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan deras (15) agar Kami menumbuhkan dengannya biji-bijian, tanam-tanaman, (16) dan kebun-kebun yang rindang (Kementerian Agama, 2021).

Menurut ayat tersebut, Allah berfirman: Kami telah menurunkan dari kumpulan awan di dalamnya uap dari lautan air yang mengalir turun, agar Kami keluarkan apa yang tumbuh dengannya, khususnya dengan butiran air itu dan tumbuhan serta kebun yang rindang menjadikannya makanan bagi manusia dan hewan (Shihab, 2002).

Tumbuhan yang subur memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu jenis tanah tempat tumbuh. Apabila tanah tempat tumbuh memiliki kondisi yang baik, memiliki sumber air yang cukup akan menghasilkan tumbuhan yang subur yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan bahkan untuk ilmu pengetahuan.

Selain itu, pemanfaatan tanaman juga dapat menjadi salah satu alternatif pengobatan yang dapat digunakan oleh kalangan masyarakat, berbagai kandungan dari tanaman telah banyak dibuktikan sebagai pengobatan yang telah memberikan berbagai macam indikasi sesuai dengan penyakit yang ada. Nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah SWT. menjadikan semakin berkembangnya obat yang digunakan untuk pengobatan berbagai jenis penyakit.

Dari dua ayat sebelumnya telah jelas bahwa Allah SWT menciptakan berbagai jenis tumbuhan untuk digunakan manusia sebagai pangan, ilmu pengetahuan, serta obat-obatan.

Dalam Islam sejak masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sudah ada berbagai penyakit. Salah satu ujian Allah SWT terhadap ciptaan-Nya adalah sakit, dan Dia telah membuat obat untuk yang berfungsi sebagai pengobatan jenis-jenis penyakit. Diriwayatkan dalam Hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukhari)

Imam Bukhari meriwayatkan hadist ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah. Hadist ini mengajarkan akan penting untuk ikhtiar dalam mencari kesembuhan. Hadist ini bersifat umum mencakup setiap penyakit dan obatnya. Hadits ini mengilustrasikan sebab dan akibat dan menunjukkan bahwa menerima perawatan medis tidak mengurangi keimanan orang-orang yang berpikir bahwa hanya kehendak dan takdir Allah yang dapat membawa kesembuhan (Al Asqalani & Al Hafizh, 2016).

Proses penyembuhan penyakit tentu tidak hanya sekedar mengonsumsi obat, pada hadis di atas dijelaskan bahwa dengan izin Allah SWT, penyakitnya akan sembuh. Oleh karena itu, ketika menderita suatu penyakit tetaplah berprasangka baik kepada Allah dengan terus mengingat-Nya dan berdoa kepada-Nya agar diberikan kesembuhan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia, Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi, serta Laboratorium Mikrobiologi, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan metode ekperimental laboratorik.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan April 2022 hingga bulan Januari 2023.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith).

2. Sampel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith).

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Observasi eksperimental digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan diantaranya bejana maserasi, blender, cawan porselin, deck glass, erlenmeyer (IwakiPyrex®), gelas kimia (IwakiPyrex®), gunting anatomis, jarum, kandang mencit, kanula, meja lilin, mikroskop, objek glass, pinset, pisau bedah, rotary vacuum evaporator (Heidolph®), scalpel, timbangan analitik (KERN®).

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan diantaranya aspirin, aquadest, etanol 70%, kapas, kloroform, makanan hewan uji, mencit (*Mus musculus*), Na CMC, ranitidin, rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith).

G. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah

a. Pengambilan sampel

Sampel yang diambil adalah rimpang siap panen pada musim kering dan keadaan rimpang yang berukuran besar dan tua.

b. Pengolahan sampel

Rimpang lempuyang gajah yang digunakan dalam penelitian bersumber dari Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang telah didapatkan, disortir basah, dibersihkan, diiris, lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan.

Selain itu, rimpang yang telah kering disortir sebelum dijadikan serbuk dan disiapkan untuk ekstraksi.

c. Ekstraksi sampel

Wadah maserasi diisi hingga 500 gram serbuk rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith), kemudian dituang ekstrak etanol 70% hingga seluruh sampel tertutup. Aduk sesekali, biarkan selama 24 jam dalam wadah tertutup terhindar dari cahaya. Lalu disaring ke dalam wadah setelah 24 jam, dan filtratnya kemudian dimaserasi sekali lagi dengan pelarut etanol 70% baru. Proses ini dilakukan 3 x 24 jam. Hasil ekstraksi yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator, diikuti dengan pembebasan etanol (Nuari et al., 2019).

2. Pengujian Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah

Pengujian efek penyembuhan tukak peptik ekstrak etanol Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dengan masing-masing dosis, menggunakan hewan percobaan mencit (*Mus musculus*). Jumlah hewan uji sebanyak 15 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing 3 ekor. Setelah itu, setiap kelompok menerima perlakuan yaitu:

- a. Kelompok I : Kontrol negatif, mencit diberi Na CMC 1%
- b. Kelompok II : Kontrol positif, mencit diberi ranitidin 150 mg
- c. Kelompok III : Uji dosis 150 mg
- d. Kelompok IV : Uji dosis 300 mg
- e. Kelompok V : Uji dosis 600 mg

Bahan uji diantaranya ekstrak rimpang lempuyang gajah, ranitidin, dan aspirin disuspensikan kedalam 0,5 ml larutan Na CMC 0,5%. Mencit dipuasakan selama 36 jam. Seluruh kelompok diberikan penginduksi berupa aspirin dengan

dosis 500 mg 1 jam sebelum diberikan sediaan uji. Kanula digunakan memberikan obat secara oral (p.o). Setelah empat jam, mencit dikorbankan, perutnya dibedah, dan jumlah tukak kemudian dihitung menggunakan metode skoring untuk menentukan adanya tukak (Dk & Jayanthi, 2018).

3. Pengamatan Mikroskopik

Lesi yang berkembang di mukosa lambung dan diidentifikasi dengan teknik skoring memerlukan pemeriksaan mikroskopis, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Metode skor tukak lambung pada mencit (*Mus musculus*) (Iskendiarsio Sigit & Andaja Soemardji, 2012)

Keadaan Lambung	Skor
Normal (tidak ada tukak)	1
Timbul kemerahan	1,5
Timbul bintik pendarahan	2
Ada tukak terhitung sejumlah 1-3	3
Ada tukak terhitung sejumlah 4-6	4
Ada tukak terhitung sejumlah 7-9	5
Ada tukak terhitung sejumlah >9 atau perforasi	6

4. Analisis Data

Hasil uji tukak lambung secara mikroskopik ditentukan dengan metode skor. Data skor tukak lambung lalu dianalisis menggunakan uji statistic non-parametrik *Kruskal Wallis* untuk melihat perbandingan skor tukak lambung. Dasar keputusan uji *Kruskal Wallis* jika nilai sig. (*significance*) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hipotesis penelitian H_0 berarti tidak ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok dan H_1 berarti

ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok. Jika H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka analisis data dilanjutkan dengan uji *Mann Whitney* untuk melihat perbedaan antar kelompok perlakuan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Jumlah Tukak Lambung dan Skor Tukak Lambung

Tabel 4.1. Data hasil jumlah tukak lambung dan skor tukak lambung pada mencit

(*Mus musculus*)

Kelompok Perlakuan	Mencit	Jumlah Tukak Lambung	Skor Tukak Lambung
K1	I	10	6
	II	12	6
	III	7	5
K2	I	-	1
	II	-	1
	III	1	3
K3	I	7	5
	II	7	5
	III	4	4
K4	I	3	3
	II	2	3
	III	3	3
K5	I	2	3
	II	-	1
	III	2	3

Keterangan :

K1 : Kontrol negatif (-)

K2 : Kontrol positif (+)

K3 : Uji dosis 150 mg

K4 : Uji dosis 300 mg

K5 : Uji dosis 600 mg

2. Rerata Skor Tukak Lambung

Tabel 4.2. Data hasil rerata skor ulkus pada mencit (*Mus musculus*)

Kelompok Perlakuan	Modus Skor tukak lambung Pada Mencit			Rata-rata
	I	II	III	
K1	6	6	5	5,67
K2	1	1	3	1,67
K3	5	5	4	4,67
K4	3	3	3	3
K5	3	1	3	2,34

3. Uji Mann Whitney

Tabel 4.3. Hasil uji mann whitney efek penyembuhan ekstrak daun lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terhadap skor tukak lambung pada mencit jantan (*Mus musculus*)

Kelompok Perlakuan	Signifikan	Keterangan
K1 vs K2	0,043	Berbeda bermakna
K1 vs K3	0,099	Berbeda tidak bermakna
K1 vs K4	0,034	Berbeda bermakna
K1 vs K5	0,043	Berbeda bermakna
K2 vs K3	0,043	Berbeda bermakna
K2 vs K4	0,114	Berbeda tidak bermakna
K2 vs K5	0,456	Berbeda tidak bermakna
K3 vs K4	0,034	Berbeda bermakna
K3 vs K5	0,043	Berbeda bermakna
K4 vs K5	0,317	Berbeda tidak bermakna

Keterangan :

K1 : Kontrol negatif (-)

K2 : Kontrol positif (+)

K3 : Uji dosis 150 mg

K4 : Uji dosis 300 mg

K5 : Uji dosis 600 mg

B. Pembahasan

Di Indonesia penggunaan rhizoma *Zingiber zerumbet* (L.) Smith sebagai alternatif untuk mengobati diare, gangguan lambung, disentri, dan mengurangi rasa sakit, sedangkan di Brunei, rhizoma digunakan untuk mandi pasca melahirkan serta untuk daunnya dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan rematik, dan sakit persendian (Silalahi, 2018).

Tukak lambung merupakan kondisi dimana kontinuitas pada mukosa lambung yang luasnya hingga didaerah bawah bagian epitel terputus (Rijal, 2016). Etiologi penyakit ulkus peptikum mungkin multifaktorial tetapi bakteri *Helicobacter pylori* memainkan peran penting. Kelainan mekanisme pertahanan mukosa yang normal, dan, dalam kasus tukak lambung, refluks isi duodenum ke dalam lambung atau pengosongan lambung yang tertunda mungkin juga terlibat. Faktor lain termasuk stres emosional, merokok, alkohol, dan obat seperti *Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs* (NSAID) ataupun kortikosteroid (Sweetman, 2009).

Pembuatan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ekstrak tersebut kemudian diujikan pada hewan uji.

Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit jantan yang terbagi dalam 5 kelompok. Kelompok 1 sebagai kontrol negatif, kelompok 2 sebagai kontrol positif, kelompok 3 untuk uji dosis 150 mg, kelompok 4 untuk uji dosis 300 mg, dan kelompok 5 untuk uji dosis 600 mg. Tiap kelompok masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit jantan.

Proses adaptasi terhadap hewan uji harus dilakukan selama seminggu sebelum mengukur efek dari penyembuhan tukak lambung. Tujuan dari proses adaptasi pada hewan uji adalah agar mereka terbiasa berada di lingkungan

percobaan dan agar mereka tidak mengalami stres yang dapat merusak hasil dari pengamatan.

Setelah satu minggu diadaptasikan, untuk melakukan pengujian, mencit dipuasakan selama 36 jam sebelum diinduksikan aspirin. Aspirin adalah NSAID salisilat. Efek samping yang paling umum dari NSAID umumnya gangguan gastrointestinal, seperti ketidaknyamanan gastrointestinal, mual, dan diare; ini biasanya ringan dan reversibel tetapi pada beberapa pasien ulserasi peptikum dan perdarahan gastrointestinal yang parah dapat terjadi. Secara umum disepakati bahwa penghambatan siklooksigenase-1 (COX-1) memainkan peran penting dalam efek gastrointestinal dari NSAID; penghambatan selektif COX-2 meningkatkan toleransi gastrointestinal (Sweetman, 2009).

Setelah hewan uji dipuasakan, lalu diinduksikan aspirin untuk memberikan efek luka pada lambung. Setelah satu jam tiap kelompok mencit diberikan perlakuan berbeda. Kelompok 1 hanya diberikan NaCMC 0,5%, kelompok 2 diberikan ranitidin 150 mg, kelompok 3 diberikan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dengan dosis 150 mg, kelompok 4 diberikan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dengan dosis 300 mg, dan kelompok 5 diberikan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dengan dosis 600 mg. Setelah 4 jam, mencit lalu dikorbankan dengan melakukan pembedahan lambung. Kemudian dilanjutkan dengan skoring adanya tukak lambung dan pendarahan menurut penilaian (Dk & Jayanthi, 2018), sehingga diperoleh data skor tukak lambung.

Berdasarkan skor rata-rata tukak lambung, kelompok 1 sebagai kontrol negatif dan kelompok 3 untuk uji dosis 150 mg menunjukkan skor tinggi yaitu 5,67 dan 4,67. Untuk kelompok 2 sebagai kontrol positif dan kelompok 4 untuk uji dosis

300 mg, serta kelompok 5 untuk uji dosis 600 mg menunjukkan skor rendah yaitu 1,67; 3; dan 2,34.

Data skor tukak lambung kemudian dianalisis dengan uji statistic non-parametrik *Kruskal Wallis*. Hipotesis penelitian H_0 berarti tidak ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. H_1 berarti ada perbedaan skor yang bermakna antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dasar keputusan uji *Kruskal Wallis* jika nilai sig. (*significance*) $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jika nilai sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Setelah data skor tukak lambung diuji, diperoleh hasil nilai sig. (p) 0,016. Artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Selanjutnya dilakukan uji *Mann Whitney* menunjukkan bahwa perbandingan antara kontrol negatif (K1) dibandingkan dengan kontrol positif (K2), K1 dibandingkan dengan K4 (Uji dosis 300 mg), K1 dibandingkan dengan K5 (Uji dosis 600 mg), K2 dibandingkan dengan K3 (Uji dosis 150 mg), K3 dibandingkan dengan K4, dan K3 dibandingkan dengan K5, terdapat perbedaan bermakna. Hal ini ditandai dengan nilai $p < 0,05$. Perbedaan yang bermakna dalam hal ini menunjukkan bahwa kelompok 1 sebagai kontrol negatif tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tukak lambung. K1 dibandingkan K3, tidak terdapat perbedaan bermakna dengan nilai $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki efek yang sebanding, artinya K3 kurang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan tukak lambung dibandingkan K2, K4, dan K5.

Hasil uji *Mann Whitney* menunjukkan bahwa perbandingan antara K2 sebagai kontrol positif dibandingkan dengan K4, K2 dibandingkan dengan K5, dan K4 dibandingkan dengan K5, tidak terdapat perbedaan bermakna dengan nilai $p > 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki efek yang dapat sebanding dengan efek ranitidin dalam mengobati tukak lambung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi dosis 300 mg dan dosis 600 mg mencit pada ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dapat berperan sebagai penyembuhan tukak lambung.

Rimpang lempuyang gajah diduga mengandung flavonoid dan saponin yang dapat bekerja sebagai gastroprotektif. Flavonoid bekerja sebagai zat gastroprotektif terdiri dari kemampuannya dalam peningkatan kandungan prostaglandin pada mukosa lambung, kemampuan dalam pengurangan sekresi histamin sel mast dengan penghambatan aktivitas enzim histidin dekarboksilase, dan kemampuan untuk menangkal radikal bebas, yang memainkan peran penting dalam perkembangan tukak lambung dan erosi saluran cerna. Cara kerja saponin sebagai gastroprotektan adalah dengan memicu komponen pelindung pada membran mukosa lambung (Rahmaniyah, 2015).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) mempunyai efek penyembuhan terhadap tukak lambung.
2. Dosis efektif ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang memiliki efek penyembuhan terhadap tukak lambung adalah dosis 300 mg.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan pada simplisia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) menggunakan jenis-jenis pelarut yang berbeda.
2. Perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk variasi dosis atau dengan kontrol pembanding berbeda dengan penelitian ini.
3. Perlu dilakukannya penelitian terbaru pada jenis tanaman yang mempunyai potensi untuk dipergunakan sebagai alternatif penyembuhan tukak lambung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, I. H., & Al Hafizh, A. I. (2016). Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 28 (28th ed.). Pustaka Azzam.
- Azwanida. (2015). A Review on the Extraction Methods Use in Medicinal Plants, Principle, Strength and Limitation. *Medicinal & Aromatic Plants*, 04(03), 3–8. <https://doi.org/10.4172/2167-0412.1000196>
- Bunwijit, J., Sripanidkulchai, B., Pannangrong, W., Junlatat, J., & Sripanidkulchai, K. (2017). Gastroprotective effect of hydroalcoholic extract of *Ocimum africanum* leaves. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, 39(4), 539–547. <https://doi.org/10.14456/sjst-psu.2017.59>
- Dipiro, Joseph T., dkk. (2020). *11th Edition Pharmacotherapy*. United States : Mc Graw Hill.
- Dirjen POM. (2014). *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Dk, M., & Jayanthi, M. (2018). *In-Vivo Models Used for Pre-Clinical Evaluation of Anti- Ulcer Activity*. 3(2).
- Iskendarso Sigit, J., & Andaja Soemardji, A. (2012). Efektivitas preventif omeprazol terhadap efek samping tukak lambung antiinflamasi non steroid (asetosal) pada tikus galur wistar betina. *Acta Pharmaceutica Indonesia*, 37(2), 48–53. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/545677>
- Kemenag. (2021). *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kuntoadi, Gama Bagus. (2019). *Anatomi Fisiologi*. Bandung: Pantera Publishing.
- Lianah. (2019). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal of Pharmacy*, VII(2), 361.
- Nasution, A., Chikmawati, T., Walujo, E. B., & Zuhud, E. A. (n.d.). Pemanfaatan Tumbuhan Obat Secara Empiris Pada Suku Mandailing Di Taman Nasional Batang Gadis Sumatera Utara.pdf.
- Nuari, D. A., Yuniar, C. T., & Salsabila, S. (2019). Anti Peptic Ulcer Activity of *Abelmoschus manihot* (L) medical In Rats. *Jurnal Ilmiah Farmako Bahari*, 10(1), 17–22.
- Nugroho, Rudy Agung. (2018). *Mengenal Mencit Sebagai Hewan Laboratorium*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Pearce, Evelyn C. (2016). *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.


- Pertiwi, R., & Saputra, H. M. (2019). Pengaruh Perasan Umbi Bengkuang (*Pachyrhizus erosus L.*) terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Mencit (*Mus musculus L.*) dengan Model Tukak Lambung. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 5(2), 56. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v5i22018.56-61>
- Rahmaniyah, N. S. (2015). Uji Efek Penyembuhan Ulkus Dari Perasan Daging Buah Mangga Podang Urang (*Mangifera indica L.*) Pada Lambung Tikus Yang Diinduksi Aspirin Ulcer Healing Effect Test Of Podang Urang Mango Fruit Filtare (*Mangifera indica L.*) On Aspirin Induced Gastric Ulce. *Jurnal Wiyata*, 181–187.
- Rejeki, P. S., Putri, E. A. C., & Prasetya, R. E. (2018). *Ovariectomi Pada Tikus dan Mencit*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga.
- Rijal, S. (2016). Evaluation of Anti-ulcerogenic Activity in Oil Extract of Jintan Hitam (<i>Nigella sativa</i>) Against Ethanol Induced Gastric Ulcer in Mice (<i>Mus musculus</i>). *American Journal of Clinical and Experimental Medicine*, 4(6), 179. <https://doi.org/10.11648/j.ajcem.20160406.14>
- Savitri, Astrid. (2016). *Tanaman Ajaib! Basmi Penyakit dengan TOGA (Tanaman Obat Keluarga)*. Depok: Bibit Publisher.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al Misbah Volume 8*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al Misbah Volume 15*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shofiatun, M., & Wulandari, R. L. (2021). Efek Gastroprotektif Ekstrak Etanol Buah Labu Kuning (*Cucurbita moschata* (Duch.) Poir) Pada Tikus Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Aspirin. ... *Ilmu Farmasi Dan ...*, 17(2), 79–86.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith.). *Jurnal EduMatSains*, 2(2), 147–160.
- Sweetman, S. C. (2009). Martindale 36th Edition. *Pharmaceutical Press*, 172(19), 333. <https://doi.org/10.1093/nq/172.19.333-a>
- Tamam, Mh Badrut. (2016). Anatomi dan Fisiologi Sistem Organ Pencernaan Pada Manusia. *Diakses pada 8 Februari 2023, dari https://generasibiologi.com*.
- Trinovita, E., & Fatmaria, F. (2020). Evaluation of Gastroprotective Activity of Cemot Leaves (*Passiflora foetida L.*) Extracted by Ultrasonic Assisted Extraction (UAE) Against Ethanol-Induced Gastric Lesions in Rats. *Majalah Obat Tradisional*, 25(2), 108. <https://doi.org/10.22146/mot.53691>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah



Lampiran 2. Pengujian Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah



Lampiran 3. Perhitungan Dosis Aspirin

1. Dosis aspirin yang digunakan = 500 mg/KgBB Tikus
2. Bobot mencit = 20 gram
3. Dosis untuk tikus bobot 200 g = $\frac{500 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 200 \text{ g}$
= 100 mg
4. Faktor konversi mencit 20 g = 0,14
5. Dosis untuk mencit bobot 20 g = Dosis tikus (200 g) x faktor konversi
= 100 mg x 0,14
= 14 mg
6. Menurut Farmakope Edisi III, penetapan kadar tablet memerlukan 20 tablet, maka diambil 20 tablet aspirin kemudian digerus dan ditimbang berat totalnya.
Total berat 20 tablet aspirin
= (0,135 + 0,136 + 0,115 + 0,132 + 0,126 + 0,131 + 0,117 + 0,128 + 0,130 + 0,141 +
0,132 + 0,119 + 0,135 + 0,140 + 0,127 + 0,130 + 0,142 + 0,136 + 0,137 + 0,134)g
= 2,623 g
= 2623 mg
7. Berat bahan aktif aspirin dalam 20 tablet aspirin adalah
= 100 mg/tab x 20 tab
= 2000 mg
8. Maka serbuk aspirin yang digunakan = $\frac{14 \text{ mg}}{2000 \text{ mg}} \times 2623 \text{ mg} = 18,36 \text{ mg}$
9. Pembuatan larutan stok aspirin
 - a. Untuk 1 mencit 20 g
Ditimbang serbuk tablet aspirin sebanyak 18,36 mg kemudian disuspensikan dengan 0,5 ml NaCMC 0,5%.
 - b. Untuk larutan stok 20 mencit 20 g
Serbuk tablet aspirin = 18,36 mg x 20 = 367,2 mg.
NaCMC 0,5% = 0,5 ml x 20 = 10 ml.
Ditimbang serbuk tablet aspirin sebanyak 367,2 mg kemudian disuspensikan dengan 10 ml NaCMC 0,5%.
10. Volume pemberian larutan aspirin pada mencit
 - a. Mencit (24 g) = $\frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$
= $\frac{24 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$
= 0,6 ml
Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 24 g yaitu 0,6 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{b. Mencit (25 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{25 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,625 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 25 g yaitu 0,625 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{c. Mencit (26 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{26 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,65 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 26 g yaitu 0,625 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{d. Mencit (27 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{27 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,675 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 27 g yaitu 0,625 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{e. Mencit (28 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{28 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,7 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 28 g yaitu 0,7 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{f. Mencit (29 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{29 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,725 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 29 g yaitu 0,725 ml.

$$\begin{aligned}
 \text{g. Mencit (30 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= \frac{30 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\
 &= 0,75 \text{ ml}
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan aspirin pada mencit bobot 32 g yaitu 0,8 ml.

Lampiran 4. Perhitungan Dosis Ranitidin

1. Dosis lazim untuk manusia = 150 mg
2. Faktor konversi untuk mencit 20 g = 0,0026
3. Konversi dosis = dosis lazim x faktor konversi
= 150 mg x 0,0026
= 0,39 mg
4. Menurut Farmakope Edisi III, penetapan kadar tablet memerlukan 20 tablet, maka diambil 20 tablet ranitidin kemudian digerus dan ditimbang berat totalnya.
Total berat 20 tablet ranitidin
= (0,298 + 0,302 + 0,295 + 0,295 + 0,302 + 0,295 + 0,296 + 0,297 + 0,300 + 0,296 + 0,296 + 0,297 + 0,292 + 0,293 + 0,291 + 0,301 + 0,300 + 0,302 + 0,301 + 0,297)g
= 5,946 g
= 5946 mg
5. Berat bahan aktif ranitidin dalam 20 tablet ranitidine adalah
= 150 mg/tab x 20 tab
= 3000 mg
6. Maka serbuk ranitidin yang digunakan = $\frac{0,39 \text{ mg}}{3000 \text{ mg}} \times 5946 \text{ mg} = 0,77 \text{ mg}$
7. Pembuatan larutan stok ranitidin
 - a. Untuk 1 mencit 20 g
Ditimbang serbuk tablet ranitidin sebanyak 0,77 mg kemudian disuspensikan dengan 0,5 ml NaCMC 0,5%.
 - b. Untuk larutan stok 10 mencit 20 g
Serbuk tablet ranitidin = 0,77 mg x 10 = 7,7 mg.
NaCMC 0,5% = 0,5 ml x 10 = 5 ml.
Ditimbang serbuk tablet ranitidin sebanyak 7,7 mg kemudian disuspensikan dengan 5 ml NaCMC 0,5%.
8. Volume pemberian larutan ranitidin pada mencit
 - a. Mencit (25 g)
$$= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$$
$$= \frac{25 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$$
$$= 0,625 \text{ ml}$$
Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 25 g yaitu 0,625 ml.
 - b. Mencit (26 g)
$$= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$$
$$= \frac{26 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}}$$
$$= 0,65 \text{ ml}$$

Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 26 g yaitu 0,625 ml.

$$\begin{aligned} \text{c. Mencit (29 g)} &= \frac{\text{Bobot mencit} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\ &= \frac{29 \text{ g} \times 0,5 \text{ ml}}{20 \text{ g}} \\ &= 0,725 \text{ ml} \end{aligned}$$

Jadi jumlah pemberian larutan ranitidin pada mencit bobot 29 g yaitu 0,725 ml.



**Lampiran 5. Perhitungan Dosis Konversi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah
(*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)**

1. Dosis 150 mg

- a. Dosis ekstrak yang digunakan = 150 mg
- b. Bobot mencit = 20 gram
- c. Dosis untuk mencit bobot 20 g = $\frac{150 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$
= 3 mg

2. Dosis 300 mg


- a. Dosis ekstrak yang digunakan = 300 mg
- b. Bobot mencit = 20 gram
- c. Dosis untuk mencit bobot 20 g = $\frac{300 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$
= 6 mg

3. Dosis 600 mg

- a. Dosis ekstrak yang digunakan = 600 mg
- b. Bobot mencit = 20 gram
- c. Dosis untuk mencit bobot 20 g = $\frac{600 \text{ mg}}{1000 \text{ g}} \times 20 \text{ g}$
= 12 mg





Lampiran 6. Uji Tukak Lambung



Gambar 1. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan C perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam

lambung mencit sisi B dan C perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.





Gambar 2. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan perbesaran 4x10; (g) (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (l) (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)




(j)




(k)




(l)





Gambar 3. Hasil uji tukak lambung kelompok 1 (kontrol negatif) pada mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (o) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.






Gambar 4. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10 pada sisi lainnya.






Gambar 5. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit kedua.


(a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10 pada sisi lainnya.



Gambar 6. Hasil uji tukak lambung kelompok 2 (kontrol positif) pada mencit ketiga.


(a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit perbesaran 10x10 pada sisi lainnya.






Gambar 7. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) (e) (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (n) (o) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.






Gambar 8. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan perbesaran 4x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (l) (m) (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.



(a)




(b)



(c)



(d)




(e)




(f)



(g)



(h)




(i)




(j)



(k)



(l)



Gambar 9. Hasil uji tukak lambung kelompok 3 (dosis ekstrak 150 mg) pada mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) (e) (f) (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B dan perbesaran 4x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (k) (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (n) (o) (p) (q) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.




(a)




(b)



(c)



(d)



(e)




(f)




(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)

Gambar 10. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.




(a)



(b)





(c)



Gambar 11. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (h) Hasil

mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.





Gambar 12. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 300 mg) pada mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (j) (k) (l) (m) (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)




(g)



(h)



(i)




(j)




(k)




(l)




Gambar 13. Hasil uji tukak lambung kelompok 5 (dosis ekstrak 600 mg) pada mencit pertama. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 10x10; (m) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (n) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.






Gambar 14. Hasil uji tukak lambung kelompok 5 (dosis ekstrak 600 mg) pada mencit kedua. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (g) Hasil mikroskop

bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.





Gambar 15. Hasil uji tukak lambung kelompok 4 (dosis ekstrak 600 mg) pada mencit ketiga. (a) Lambung mencit tampak dari luar; (b) Bagian dalam lambung mencit; (c) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 4x10; (d) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi A perbesaran 10x10; (e) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 4x10; (f) (g) (h) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi B perbesaran 10x10; (i) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 4x10; (j) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10; (k) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi D perbesaran 4x10; (l) Hasil mikroskop bagian dalam lambung mencit sisi C perbesaran 10x10.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Lampiran 7. Analisis Data Kruskal-Wallis

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Kelompok	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Skor	Kelompok 1	,385	3	.	,750	3	,000
	Kelompok 2	,385	3	.	,750	3	,000
	Kelompok 3	,385	3	.	,750	3	,000
	Kelompok 4	.	3	.	.	3	.
	Kelompok 5	,385	3	.	,750	3	,000

a. Lilliefors Significance Correction

Kruskal-Wallis Test

		Ranks	
	Kelompok	N	Mean Rank
Skor	Kelompok 1	3	13,67
	Kelompok 2	3	3,50
	Kelompok 3	3	11,33
	Kelompok 4	3	6,50
	Kelompok 5	3	5,00
	Total	15	

Test Statistics^{a,b}

Skor	
Kruskal-Wallis H	12,164
df	4
Asymp. Sig.	,016

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Kelompok

Lampiran 8. Analisis Data Mann Whitney

1. Kelompok 1 dengan Kelompok 2

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 1		3	5,00	15,00
	Kelompok 2		3	2,00	6,00
	Total		6		

Test Statistics ^a		Skor
Mann-Whitney U		,000
Wilcoxon W		6,000
Z		-2,023
Asymp. Sig. (2-tailed)		,043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]		,100 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

2. Kelompok 1 dengan Kelompok 3

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 1		3	4,67	14,00
	Kelompok 3		3	2,33	7,00
	Total		6		

Test Statistics ^a		Skor
Mann-Whitney U		1,000
Wilcoxon W		7,000
Z		-1,650
Asymp. Sig. (2-tailed)		,099
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]		,200 ^b

- a. Grouping Variable: Kelompok
b. Not corrected for ties.

3. Kelompok 1 dengan Kelompok 4

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 1		3	5,00	15,00
	Kelompok 4		3	2,00	6,00
	Total		6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	6,000
Z	-2,121
Asymp. Sig. (2-tailed)	,034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

- a. Grouping Variable: Kelompok
b. Not corrected for ties.

4. Kelompok 1 dengan Kelompok 5

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 1		3	5,00	15,00
	Kelompok 5		3	2,00	6,00
	Total		6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	6,000
Z	-2,023
Asymp. Sig. (2-tailed)	,043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

5. Kelompok 2 dengan Kelompok 3

Mann-Whitney Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 2	3	2,00	6,00
	Kelompok 3	3	5,00	15,00
	Total	6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	6,000
Z	-2,023
Asymp. Sig. (2-tailed)	,043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

6. Kelompok 2 dengan Kelompok 4

Mann-Whitney Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 2	3	2,50	7,50

Kelompok 4	3	4,50	13,50
Total	6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	1,500
Wilcoxon W	7,500
Z	-1,581
Asymp. Sig. (2-tailed)	,114
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,200 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

7. Kelompok 2 dengan Kelompok 5

Mann-Whitney Test

		Ranks		
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 2	3	3,00	9,00
	Kelompok 5	3	4,00	12,00
	Total	6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	3,000
Wilcoxon W	9,000
Z	-,745
Asymp. Sig. (2-tailed)	,456
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,700 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

8. Kelompok 3 dengan Kelompok 4

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 3		3	5,00	15,00
	Kelompok 4		3	2,00	6,00
	Total		6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	6,000
Z	-2,121
Asymp. Sig. (2-tailed)	,034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

9. Kelompok 3 dengan Kelompok 5

Mann-Whitney Test

		Ranks			
		Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor	Kelompok 3		3	5,00	15,00
	Kelompok 5		3	2,00	6,00
	Total		6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	,000
Wilcoxon W	6,000
Z	-2,023
Asymp. Sig. (2-tailed)	,043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,100 ^b

- a. Grouping Variable: Kelompok
- b. Not corrected for ties.

10. Kelompok 4 dengan Kelompok 5

Mann-Whitney Test


		Ranks		
Skor	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
	Kelompok 4	3	4,00	12,00
	Kelompok 5	3	3,00	9,00
	Total	6		

Test Statistics^a

	Skor
Mann-Whitney U	3,000
Wilcoxon W	9,000
Z	-1,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	,317
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,700 ^b


- a. Grouping Variable: Kelompok
- b. Not corrected for ties.

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Penyiapan ekstrak lempuyang gajah untuk pengujian tukak lambung

- Keterangan :
- a. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 150 mg
 - b. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 300 mg
 - c. Penimbangan ekstrak lempuyang dosis 600 mg
 - d. Ekstrak lempuyang dosis 150 mg disuspensikan dalam NaCMC 0,5%
 - e. Ekstrak lempuyang dosis 300 mg disuspensikan dalam NaCMC 0,5%
 - f. Ekstrak lempuyang dosis 600 mg disuspensikan dalam NaCMC 0,5%




Gambar 2. Menginduksi secara peroral menggunakan kanula

Keterangan : a. Mencit ditimbang sebelum diinduksi

b. Menginduksi mencit sesuai dengan volume pemberian obat/sediaan





Gambar 3. Proses pembedahan mencit

Keterangan : a. Setelah dibius mencit diletakkan dimeja bedah
b. Membuat sayatan dari perut bawah mencit
c. Membedah dengan memperlihatkan keseluruhan organ mencit
d. Lambung mencit dibelah untuk melakukan pengamatan.



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. A.097/KEPK/FKIK/XI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rafuningtyas Dwi Cahyani
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet) Terhadap Tukak Lambung Mencit (Mus musculus) Dengan Penginduksi Aspirin"

Test of Healing Effects of Ethanol Extract of Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet) Rhizome Extract Against Gastritis In Mice (Mus musculus) With Aspirin Induction

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 2 nov 2022 sampai dengan tanggal 2 Nov 2023

This declaration of ethics applies during the period November 2, 2022 until November 2, 2023

November 2, 2022
Professor and Chairperson.


DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411) 841879
 email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 606 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan
 di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Rafiuningtyas Dwi Cahyani
 NIM : 70100117023
 Semester/T.A. : XI (Sebelas)/T.A. 2022-2023
 Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Jurusan/Prodi : Farmasi
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo
 No. HP. : 089657441222

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Dengan judul skripsi: **Uji Efek Penyembuhan Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet) Terhadap Tukak Lambung Mencit (Mus musculus) Dengan Penginduksi Aspirin.**

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** dari tanggal **Oktober 2022 - Desember 2022.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 17 Oktober 2022

Rektu

 Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
 NIP. 196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
 - pertinggal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rafiuningtyas Dwi Cahyani, lahir di Makassar, 8 November 1999 dan merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan M. Alwi dan Eviandri Sapta Putri. Ketika berumur 6 tahun, ia masuk sekolah SD di SD Inpress BTN.IKIP I Makassar lalu saat kelas 5 karena satu hal pindah ke SDN 41 Rappoa Kabupaten Bantaeng. Kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Bantaeng di tahun 2011. Selepas lulus dari SMP di tahun 2014 kemudian dia melanjutkan sekolah lagi ke SMAN 1 Bantaeng. Setelah lulus dari SMA di tahun 2017 dia melanjutkan pendidikannya mengambil Jurusan Farmasi di Universitas Islam Negri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR