

**EFEKTIFITAS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *ACUTE  
DECOMPENSATED HEART FAILURE* DENGAN GANGGUAN  
PEMENUHAN KEBUTUHAN NYERI DAN KENYAMANAN  
MENGUNAKAN INTERVENSI DISTRAKSI VISUAL**



**Tugas Akhir Ners**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh :

**RAHMAT RASYID SIAGIAN**

**NIM : 70900122017**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

**EFEKTIFITAS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN *ACUTE  
DECOMPENSATED HEART FAILURE* DENGAN GANGGUAN  
PEMENUHAN KEBUTUHAN NYERI DAN KENYAMANAN  
MENGUNAKAN INTERVENSI DISTRAKSI VISUAL**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**RAHMAT RASYID SIAGIAN**

**NIM : 70900122017**

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rasyid Siagian  
NIM : 70900122017  
Tempat / Tgl. Lahir : Sapirok, 15 Maret 1999  
Jurusan / Prodi / Konsentrasi : Profesi Ners, Jurusan Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata, Gowa  
Judul : Efektifitas Asuhan Keperawatan Pada  
Pasien *Acute Decompensated Heart Failure*  
Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan  
Nyeri Dan Kenyamanan Menggunakan  
Intervensi Distraksi Visual

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 05 Juni 2023

Penyusun,

Rahmat Rasyid Siagian


NIM : 70900122017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Tugas Akhir Ners Saudara (i) Rahmat Rasyid Siagian, S.Kep, NIM : 70900122017, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus Tugas Akhir Ners yang berjudul “Efektifitas Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure* Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri Dan Kenyamanan Menggunakan Intervensi Distraksi Visual”. Memandang bahwa Tugas Akhir Ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 20 Juni 2023

**Menyetujui,**



Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep

Pembimbing I



Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep

Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul “Efektifitas Asuhan Keperawatan pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure* Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri dan Kenyamanan Menggunakan Intervensi Distraksi Visual”, yang disusun oleh Rahmat Rasyid Siagian, S.Kep., NIM: 70900122017, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2023 M bertepatan dengan 1 Zulhijah 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 20 Juni 2023 M  
1 Zulhijah 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris: Hj. Sysnawati, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp. Kep.J	(.....)
Munaqisy I: Dr. Risnah, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)
Munaqisy II: Dr. H. Muhammad Irham S.Th.I.,M.Th.i	(.....)
Pembimbing I : Musdalifah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	(.....)
Pembimbing II: Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP. 198007012006042002

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ners dengan judul “Efektifitas Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure* Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri Dan Kenyamanan Menggunakan Intervensi Distraksi Visual”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya.

Adapun tujuan dari penyusunan Tugas Akhir Ners ini yakni untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian pendidikan program Profesi Ners, Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2023.

Dengan terselesaikannya penulisan Tugas akhir Ners ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut serta berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan hormat dan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Bapak Samsul Bahri Siagian dan Ibu Rostina Siregar atas kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang begitu besar, sehingga penulis dapat berada sampai pada tahap ini. Serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep selaku ketua jurusan Profesi Ners, Wahdaniah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing Akademik penulis, beserta staf dan dosen pengajar yang tidak kenal lelah dalam memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir Ners.
4. Musdalifah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing I dan Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing penulis dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna bagi penulisan Tugas Akhir Ners, motivasi yang sangat membangun sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
5. Dr. Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I selaku penguji II yang begitu sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membagikan ilmunya kepada kami selaku Mahasiswa (i) Profesi Ners.
7. Kepada keluarga besar yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu dan kepada rekan Mahasiswa (i) Program Studi Profesi Ners, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan serta doa yang sangat berlimpah.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ataupun kesalahan baik lisan maupun tulisan selama penulis menempuh pendidikan di kampus peradaban yang tercinta ini. Penulis menyadari bahwa untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun, guna meningkatkan ilmu. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Gowa, 05 Juni 2023

Rahmat Rasyid Siagian  
NIM : 70900122017

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN SAMPUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus .....	4
D. Manfaat .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Konsep Medis.....	6
B. Konsep Asuhan Keperawatan .....	17
C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN).....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
A. Rancangan Studi Kasus.....	36
B. Subyek Studi Kasus .....	36
C. Fokus Studi Kasus.....	37
D. Instrumen Studi Kasus .....	37
E. Prosedur Pengambilan Data .....	39
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus .....	39
G. Analisis Data dan Penyajian Data .....	40
H. Etika Studi Kasus .....	40
BAB IV LAPORAN KASUS .....	42

A.	Pengkajian Keperawatan .....	42
B.	Diagnosis Keperawatan .....	57
C.	Intervensi Keperawatan .....	59
D.	Implementasi Keperawatan .....	62
E.	Evaluasi Keperawatan .....	69
BAB V PEMBAHASAN .....		77
A.	Analisa Asuhan Keperawatan .....	77
B.	Analisa Intervensi EBPN .....	90
C.	Keterbatasan .....	92
BAB VI PENUTUP .....		93
A.	Kesimpulan .....	93
B.	Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....		95
LAMPIRAN .....		100




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teori Intervensi Keperawatan .....	25
Tabel 2.7 SOP Distraksi Video .....	31
Tabel 2.8 Artikel Utama dan Pendukung .....	34
Tabel 4.1 Pengkajian Keperawatan .....	42
Tabel 4.2 Klasifikasi Data .....	53
Tabel 4.3 Kategorisasi Data .....	53
Tabel 4.4 Analisis Data .....	55
Tabel 4.5 Perumusan Prioritas Masalah Keperawatan.....	57
Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan .....	59
Tabel 4.7 Implementasi Keperawatan .....	62
Tabel 4.8 Evaluasi Keperawatan .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual pada Teori Kenyamanan .....	19
Gambar 3.1 Pengkategorian NRS .....	38



## ABSTRAK

Nama : Rahmat Rasyid Siagian  
NIM : 70900122017  
Judul : Efektifitas Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure* Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri Dan Kenyamanan Menggunakan Intervensi Distraksi Visual

**Latar Belakang :** Beberapa kondisi kerusakan jantung dapat menyebabkan adanya keluhan nyeri, jika tidak segera diatasi hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari. Salah satu terapi non-farmakologi pada penderita gagal jantung yaitu terapi distraksi video dalam menurunkan adanya gejala nyeri. Distraksi adalah proses mengalihkan perhatian pasien ke hal yang lain sehingga dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri. **Tujuan :** Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video di ruang HCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. **Metode :** Metode yang digunakan yaitu *case study* dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara pada keluarga pasien, melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian keperawatan. Pemberian intervensi distraksi video diberikan selama 1 kali dalam 3 hari pengimplementasian. **Hasil :** Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan pemberian distraksi video terjadi penurunan tingkat intensitas nyeri pada pasien, dihari pertama tingkat nyeri pasien berdasarkan *numeric rating scale* mengalami nyeri sedang dengan angka 4. Evaluasi hari kedua pasien mengalami nyeri ringan dengan angka 3. Adapun evaluasi hari ketiga nyeri berkurang dengan angka 2. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil studi kasus pada Tn. N dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi non farmakologis yaitu distraksi video efektif dalam menurunkan tingkat intensitas nyeri. Bentuk pendekatan yang baik dan tepat sangat membantu keberhasilan perawat terutama pada pasien yang mengalami nyeri akut, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan nyeri seperti terapi distraksi visual.

**Kata Kunci :** *Acute Decompensated Heart Failure*, Distraksi Video, Nyeri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## **ABSTRACT**

*Name* : Rahmat Rasyid Siagian  
*NIM* : 70900122017  
*Title* : *Effectiveness of Nursing Care in Acute Decompensated Heart Failure Patients with Disorders of Fulfilling Pain and Comfort Needs Using Visual Distraction Intervention*

---

**Background** : Several conditions of heart damage can cause complaints of pain, if not treated immediately this can interfere with comfort and daily activities. One of the non-pharmacological therapies for heart failure patients is video distraction therapy in reducing pain symptoms. Distraction is a process of diverting the patient's attention to something else so that it can reduce awareness of pain, and even increase tolerance of pain. **Purpose** : To analyze nursing care in ADHF patients with impaired pain and comfort fulfillment using video distraction interventions in the HCU room of Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital, Makassar City. **Method** : The method used is a case study with data collection techniques through interviews with the patient's family, observation, physical examination, and nursing documentation. Video distraction intervention was given 1 time in 3 days of implementation. **Results** : After implementing and evaluating nursing by providing video distraction, there was a decrease in the level of pain intensity in patients, on the first day the patient's pain level based on the numeric rating scale experienced moderate pain with a number 4. Evaluation on the second day the patient experienced mild pain with a number 3. As for the evaluation on the third day of pain reduced by 2. **Conclusion** : Based on the results of the case study on Mr. It can be concluded that giving non-pharmacological therapy, namely video distraction, is effective in reducing the level of pain intensity. The form of a good and appropriate approach is very helpful for the success of nurses, especially in patients who experience acute pain, so there is a need for activities that can reduce pain such as visual distraction therapy.

**Keywords** : Acute Decompensated Heart Failure, Video Distraction, Pain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyakit Jantung adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Ada banyak macam penyakit jantung, namun pada beberapa kasus ditemukan adanya penyakit kegagalan pada sistem kardiovaskuler. Kegagalan sistem kardiovaskuler atau yang umumnya dikenal dengan istilah gagal jantung adalah kondisi medis dimana jantung tidak dapat memompa cukup darah ke seluruh tubuh sehingga jaringan tubuh membutuhkan oksigen dan nutrisi tidak terpenuhi dengan baik (Mahananto & Djunaidy, 2017).

Data yang diterbitkan oleh WHO tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 17,3 miliar orang di dunia meninggal karena penyakit kardiovaskular dan diperkirakan akan mencapai 23,3 miliar penderita yang meninggal pada tahun 2020. Jenis Penyakit kardiovaskular yang paling sering terjadi adalah gagal jantung. Salah satu bentuk gagal jantung yaitu gagal jantung akut dekomensata (*Acute Decomoensated Heart Failure*, ADHF). ADHF dapat disebabkan oleh infark miokard. Infark miokard merupakan perkembangan cepat dari nekrosis otot jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen (Ainanur & Halimuddin, 2023).

Gagal jantung dekomensasi akut (ADHF) terus meningkat prevalensinya dan berhubungan dengan mortalitas dan morbiditas substansial termasuk rawat inap yang sering. The American Heart Association memperkirakan bahwa lebih dari delapan juta orang Amerika akan mengalami gagal jantung pada tahun 2030 (Teerlink et al., 2015).

Hasil riset kesehatan dasar Kementerian kesehatan, data menunjukkan prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia yaitu sebesar 1,5% dari total penduduk. Data riskesdas 2018 mengungkapkan tiga provinsi dengan prevalensi penyakit jantung tertinggi

yaitu Provinsi Kalimantan Utara 2,2%, Daerah Istimewa Yogyakarta 2%, dan Gorontalo 2%. Selain itu 8 provinsi lain juga memiliki prevalensi lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional, salah satunya Provinsi Kalimantan Timur yaitu 1,8% (Kemenkes RI, 2018).

Masalah keperawatan yang sering muncul pada penderita Acute Decompensated Heart Failure (ADHF) diantaranya adalah nyeri dada, resiko penurunan curah jantung, gangguan pertukaran gas dan ketidakefektifan pola napas. Gejala utama yang sering muncul yaitu sesak nafas, batuk, mudah lelah, disfungsi ventrikel, dan kegelisahan yang diakibatkan oleh gangguan oksigenisasi. Gejala lain yang muncul yaitu dispnea, ortopnea, dispnea nocturnal paroksimal (DNP), obstructive sleep apnea, dan edema pulmonal (Sari, 2019).

Terapi yang dilakukan kepada pasien gagal jantung dilakukan agar penderita merasa lebih nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik, dan bisa memperbaiki kualitas hidup serta meningkatkan harapan hidupnya. Pendekatannya dilakukan melalui tiga segi, yaitu mengobati penyakit penyebab gagal jantung, menghilangkan faktor-faktor yang bisa memperburuk gagal jantung, dan mengobati gagal jantung. Terapi bagi penderita gagal jantung berupa terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Tujuan dari adanya terapi yakni untuk meredakan gejala, memperlambat perburukan penyakit, dan memperbaiki harapan. (Nurkhalis & Adista, 2020).

Beberapa kondisi kerusakan jantung dapat menyebabkan adanya keluhan nyeri dada, jika tidak segera diatasi hal ini dapat mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari. Salah satu terapi non-farmakologi pada penderita gagal jantung yaitu terapi distraksi video dalam menurunkan adanya gejala nyeri. Distraksi video adalah mengalihkan perhatian pasien ke hal yang lain sehingga dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri (Utami, 2016). Stimulus yang menyenangkan dari luar juga dapat merangsang sekresi endorphin, sehingga stimulus nyeri yang dirasakan

oleh pasien menjadi berkurang. Peredaan nyeri secara umum berhubungan langsung dengan partisipasi aktif individu, banyaknya modalitas sensori digunakan dan minat individu dalam stimulus, oleh karena itu stimulus otak akan lebih efektif dalam menurunkan nyeri. Sedangkan tujuan penggunaan teknik distraksi video dalam intervensi keperawatan adalah untuk pengalihan atau menjauhkan perhatian pasien terhadap sesuatu yang sedang di hadapi, misalnya rasa nyeri. Sedangkan manfaat penggunaan teknik ini pasien merasa lebih nyaman, santai dan merasa berada pada suatu yang lebih menyenangkan (Djamil et al., 2019).

Penerapan distraksi video mampu menurunkan tingkat nyeri pada pasien. hal ini sejalan dengan penelitian Ismoyowati et al. (2021), yang menyatakan bahwa distraksi video efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien dengan CHF (*p-value* 0,000). Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Rahayu & Darmawan (2020), bahwa dengan pemberian teknik distraksi pemutaran video cukup efektif untuk menurunkan rasa nyeri. Selain itu Djamil et al. (2019), dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa terapi distraksi video berpengaruh secara signifikan terhadap nyeri ringan pasien dengan CHF.

Metode non-farmakologis dapat digunakan dalam penanganan nyeri. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak akibat penggunaan obat-obatan secara berlebih. Dengan adanya terapi non-farmakologis diharapkan mampu memberikan penanganan yang efektif dan efisien dalam mengatasi nyeri. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video di ruang HCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Akhir ini adalah “Bagaimana analisis asuhan

keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video di ruang HCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar?”

### **C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus**

#### **1. Tujuan Umum**

Menganalisis asuhan keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video di ruang HCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui pengkajian keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.
- b. Mengetahui diagnosis keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.
- c. Mengetahui intervensi keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.
- d. Mengetahui implementasi keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.
- e. Mengetahui evaluasi keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.
- f. Mengetahui pengaruh distraksi visual pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan.


### **D. Manfaat**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya karya tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video di ruang HCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

## 2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBP (Eviden Based Practice in Nursing) dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien ADHF dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nyeri dan kenyamanan menggunakan intervensi distraksi video pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Medis

##### 1. Konsep Medis *Acute Decompensated Heart Failure* (ADHF)

###### a. Defenisi

*Acute Decompensated Heart Failure* (ADHF) adalah sindrom klinis dengan tanda-tanda atau gejala gagal jantung yang memburuk yang membutuhkan rawat inap dalam waktu yang lama dimana ADHF ini dipandang sebagai eksaserbasi kronis *Heart Failure* (HF) (Yuliati & Munte, 2022).

ADHF (*Acute Decompensated Heart Failure*) yaitu penyakit gagal jantung akut dimana proses terjadinya serangan yang begitu cepat dari gejala yang dialami oleh abnormalnya fungsi jantung, kondisi ini yang bisa mengancam kehidupan dan harus ditangani dengan segera, dan biasanya berujung pada hospitalisasi (Miranda et al., 2022).

*Acute Decompensated Heart Failure* (ADHF) merupakan sindrom klinis dari memburuknya gejala gagal jantung yang disebabkan oleh *infark miokard* yang dapat berkembang cepat dari nekrosis otot jantung yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dan seseorang ini membutuhkan perawatan intensif maupun rawat inap ataupun perawatan medis lainnya (Ainanur & Halimuddin, 2023).

###### b. Etiologi

ADHF dapat disebabkan oleh kondisi *Coronary Artery Disease* (CAD) seperti infark miokard akut yang meluas sehingga tekanan atrikum kiri meningkat dan dapat terjadinya gejala gagal jantung (*American Health Association, 2015*) dalam (Miranda et al., 2022).

Dalam Ainanur & Halimuddin (2023), faktor-faktor yang dapat menyebabkan dekompensasi akut pada pasien gagal jantung antara lain:

- 1) Diet yang tidak teratur
- 2) Putus obat atau reduksi dosis yang tidak tepat untuk terapi gagal jantung
- 3) Iskemia miokard/infark
- 4) Aritmia (takikardi/bradikardia)
- 5) Infeksi
- 6) Inisiasi terapi yang akan memperburuk gejala-gejala dari gagal jantung
- 7) Konsumsi alkohol
- 8) Kehamilan
- 9) Hipertensi yang semakin parah
- 10) Insufisiensi valvular (kelainan bentuk katub jantung)

**c. Patofisiologi**

Terjadinya ADHF atau gagal jantung diawali dengan adanya kerusakan pada jantung atau miokardium yang menyebabkan turunnya curah jantung, jika curah jantung tidak cukup memenuhi kebutuhan metabolisme, maka jantung akan memberikan respon mekanisme kompensasi untuk mempertahankan fungsi jantung agar tetap dapat memompa darah secara adekuat, bila mekanisme tersebut telah digunakan secara maksimal dan curah jantung normal tetap tidak terpenuhi, maka setelah itu akan timbul gejala gagal jantung (Nurkhalis & Adista, 2020).

Menurut Sumantra (2020), kelainan fungsi otot jantung disebabkan oleh *aterosklerosis coroner*, hipertensi arterial dan penyakit otot degeneratif atau inflamasi. *Aterosklerosis coroner* mengakibatkan disfungsi miokardium karena terganggunya aliran darah ke otot jantung. Terjadinya hipoksia dan asidosis (akibat penumpukan asam laktat). Infark miokardium biasanya

mendahului terjadinya gagal jantung. Hipertensi sistemik/pulmonal (peningkatan afterload) meningkatkan beban kerja jantung dan pada gilirannya mengakibatkan hipertrofi serabut otot jantung. Efek tersebut (hipertrofi miokard) dapat dianggap sebagai mekanisme kompensasi karena akan meningkatkan kontraktilitas jantung. Hipertrofi otot jantung menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan normal, dan akibatnya terjadinya gagal jantung.

#### **d. Manifestasi Klinis**

Tanda Klinis utama yang bisa dilihat dari munculnya ADHF adalah gejala kongesti yang diakibatkan volume sirkulasi yang berlebihan dimana kunci utama dari evaluasi awal gagal jantung akut adalah penilaian yang cermat dan manajemen status volume pasien (Sumantra, 2020).

Sementara dalam Miranda et al. (2022), gejala kongesti yang terdapat pada pasien ADHF berhubungan dengan peningkatan tekanan Ventrikel kiri atau kanan, *dyspnea*, *orthopnea*, *paroxysmal nocturnal dyspnea*, rasa tidak nyaman di perut, mual dan muntah juga dapat terjadi pada pasien ADHF.

Pasien yang mengalami gagal jantung, toleransi terhadap latihan fisik akan semakin menurun dan gejala gagal jantung akan muncul lebih awal dengan aktivitas yang ringan, gejala awalnya yang dapat terjadi yakni *Dyspnea* (mudah lelah) dan adanya retensi cairan (Nurkhalis & Adista, 2020).

#### **e. Penatalaksanaan**

Penatalaksanaan pada perawatan pasien ADHF dapat meliputi tirah baring, oksigenasi, pengaturan diet serta terapi farmakologi dimana perawatan intensif atau ICCU bermanfaat untuk mengobati gejala, memulihkan oksigenasi, membatasi kerusakan jantung dan ginjal, memperbaiki hemodinamik dan perfusi organ, meminimalkan lama perawatan intensif dan mencegah tromboemboli (penggumpalan darah di vena)

(Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, 2020) dalam (Miranda et al., 2022).

Dalam Nurkhalis & Adista (2020), terapi yang dapat diberikan kepada pasien dengan gagal jantung berupa terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis, tujuannya untuk meredakan gejala, memperlambat perburukan penyakit, dan memperbaiki harapan. Terapi non-farmakologis diberikan manajemen perawatan mandiri yang bertujuan menjaga stabilitas fisik, menghindari perilaku yang dapat memperburuk kondisi dan mendeteksi gejala awal perburukan gagal jantung. Manajemen perawatan diri berupa ketaatan berobat, pemantauan berat badan, pembatasan asupan nutrisi dan latihan fisik. Sedangkan terapi farmakologis bertujuan untuk mengatasi gejala akibat gagal jantung, contohnya kongesti dan respon kompensasi. Salah satu mekanisme respon kompensasi digambarkan dengan model neurohormonal, adanya aktivasi neurohormonal akibat norepinefrin, angiotensin II, aldosterone, vasopressin serta beberapa jenis sitokin yang dapat memperburuk gagal jantung. Selain untuk mengurangi gejala, terapi farmakologis juga digunakan untuk memperlambat perburukan kondisi jantung dan mengatasi terjadinya kejadian akut akibat respon kompensasi jantung.

**f. Pemeriksaan Penunjang**

Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien dengan kasus gagal jantung kongestif dalam Sumantra (2020), di antaranya sebagai berikut:

- 1) Elektrokardiogram : hiperatropi atrial atau ventrikuler, penyimpangan aksis, iskemia, disaritmia, takikardia, ibrilasi atrial.
- 2) Uji stress : merupakan pemeriksaan non-invasif yang bertujuan untuk menntukana kemungkinan iskemia atau infeksi yang terjadi sebelumnya.

- 3) Ekokardiografi
  - a) Ekokardiografi model M (berguna untuk mengevaluasi volume balik dan kelainan regional, model M paling sering dipakai dan ditanyakan bersama EKG)
  - b) Ekokardiografi dua dimensi (CT scan)
  - c) Ekokardiografi dopler (memberikan pencitraan dan pendekatan transesofageal terhadap jantung)
- 4) Katerisasi jantung : tekanan abnormal merupakan indikasi dan membantu membedakan gagal jantung kanan dan kiri dan stenosis katub atau insufisiensi.
- 5) Radiografi dada : dapat menunjukkan pembesaran jantung. Bayangan mencerminkan dilatasi atau hipertropi bilik, atau perubahan dalam pembuluh darah abnormal.
- 6) Elektrolit yang terkait (Natrium, Kalium) : mungkin berubah karena perpindahan cairan/penurunan fungsi ginjal terapi diuretic
- 7) Oksimetri : saturasi oksigen (SaO<sub>2</sub>) mungkin rendah terutama jika gagal jantung kongestif akut menjadi kronis
- 8) Analisa gas darah: gagal ventrikel kiri ditandai dengan alkalosis respiratory ringan (dini) atau hipoksemia dengan peningkatan PCO<sub>2</sub> (akhir)
- 9) Blood ureum nitrogen (BUN) dan kreatinin : peningkatan BUN menunjukkan penurunan fungsi ginjal. Kenaikan baik BUN dan kreatinin merupakan indikasi
- 10) Pemeriksaan tiroid : peningkatan aktifitas tiroid menunjukkan hiperaktifitas tiroid sebagai pencetus gagal jantung

**g. Komplikasi**

Pasien yang mengalami ADHF harus segera mungkin melakukan pencegahan dini mungkin untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut, berbagai komplikasi dari penyakit ADHF antara lain edema trombolitik, efusi pericardial, tamponade

jantung, dyspnea, orthopnea, tachypnea, batuk-batuk dengan sputum berbusa dan keadaan sangat berat akan terjadi syok kardiogenik (Tazkirah et al., 2023).

## **2. Konsep Dasar Nyeri Akut**

### **a. Defenisi**

Nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang timbul karena adanya kerusakan suatu ancaman pada jaringan, baik actual maupun potensial dan nyeri juga sebagai salah satu respon yang muncul pada pasien post operasi yang dapat menimbulkan stress, sehingga sistem kardiovaskuler merespon nyeri dengan mengaktifkan sistem saraf simpatik, sehingga menghasilkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, dan kebutuhan oksigen (Haq et al., 2019).

Nyeri akut adalah nyeri yang sering kali dihubungkan dengan cedera atau timbulnya penyakit sehingga kebanyakan orang menganggap nyeri sebagai bagian dari cedera atau proses penyakit (Swarjana, 2022).

Menurut PPNI (2016) dalam Yuliana et al. (2022), Nyeri Akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

Nyeri pasca operasi termasuk kedalam nyeri akut yaitu nyeri yang terjadi dalam periode waktu yang singkat, biasanya 6 bulan atau kurang, dan biasanya bersifat intermitten (sesekali) dan tidak konsisten yang berasal dari cara normal sistem saraf memproses trauma pada kulit, otot, dan organ visceral, istilah lainnya yaitu nyeri nosiseptif (Hidayatulloh et al., 2020).

### **b. Etiologi**

Penyebab nyeri terkhusus nyeri pembedahan atau nyeri pasca operasi adalah multifactorial, yaitu prosedur pembedahan

menyebabkan cedera pada jaringan, cedar pembedahan terseut memicu berbagai respon dalam matriks nyeri, mulai dari sensitifitas jalur nyeri perifer dan sentral hingga perasaan takut, cemas, dan frustrasi (Yuliana et al., 2022).

**c. Klasifikasi**

Nyeri bisa dilihat dari segi durasi nyeri, tingkat keparahan dan intensitas nyeri, model transisi, lokasi nyeri, dan kausatif dari penyebab nyeri itu sendiri (Potter & Perry, 2010). Nyeri Akut dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Nyeri somatik, jika organ yang terkena adalah organ soma seperti kulit, otot, sendi, tulang, atau ligament karena disini mengandung kaya akan nosiseptor. Nosiseptor ini menjadi sensitive terhadap inflamasi, yang akan terjadi jika terluka atau keseleo. Selain itu, nyeri juga bisa terjadi akibat iskemik, seperti pada kram otot. Hal ini yang termasuk nyeri nosiseptif. Gejala nyeri somatic umumnya tajam dan lokalisasinya jelas, sehingga dapat ditunjuk. Jika kita menyentuh atau menggerakkan bagian yang cedera maka nyerinya akan bertambah berat (Potter & Perry, 2010).
- 2) Nyeri visceral, jika yang terkena adalah organ-organ visceral atau organ dalam yang meliputi rongga toraks (paru dan jantung), serta rongga abdomen (usus,limpa, hati, dan ginjal), rongga pelvis (ovarium, kantung kemih dan kandungaan). Berbeda dengan organ somatic, yang nyeri kalau diinsisi, digunting atau dibakar, organ somatic justru tidak. Organ visceral akan terasa sakit kalau mengalami inflamasi, iskemik atau teregang. Selain itu nyeri visceral umumnya terasa tumpul, lokalisasinya tidak jelas disertai dengan rasa mual-muntah bahkan sering terjadi nyeri yang dirasakan pada kulit (Potter & Perry, 2010).

#### d. Mekanisme Nyeri

Antara suatu rangsangan sampai dirasakannya sebagai persepsi nyeri terdapat 5 proses elektrofisiologik yang jelas, dimulai dengan proses transduksi, konduksi, modulasi, transisi dan persepsi. Kelesuruhan proses ini disebut nosisepsi (*nociception*) dalam Potter & Perry (2010), dimana mekanismes nyeri akut melalui proses nosisepsis adalah sebagai berikut :

- 1) Transduksi adalah proses dimana suatu stimulus yang kuat diubah menjadi aktivitas listrik yang biasa disebut potensial aksi. Dalam hal nyeri akut yang disebabkan oleh adanya kerusakan jaringan akan melepaskan mediator kimia, seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, substansi P, dan histamine. Zat-zat kimia inilah yang mengsensitasi dan mengaktivasi nosiseptor menghasilkan sesuatu potensial aksi (impuls listrik). Perubahan zat-zat kimia menjadi impuls listrik inilah yang disebut proses transduksi.
- 2) Konduksi adalah proses perambatan dan amplifikasi dari potensial aksi atau impuls listrik tersebut dari nosiseptor sampai pada kornu posterior medulla spinalis pada tulang belakang.
- 3) Modulasi adalah proses inhibisi terhadap impuls listrik yang masuk ke dalam kornu posterior, yang terjadi secara spontan yang kekuatannya berbeda-beda setiap orang, (dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kepercayaan atau budaya). Kekuatan modulasi inilah yang membedakan persepsi nyeri orang per orang terhadap suatu stimulus yang sama.
- 4) Transmisi adalah proses perpindahan impuls listrik dari neuron pertama ke neuron kedua terjadi dikornu posterior medulla spinalis, dari mana ia naik melalui traktus spinolamikus ke thalamus dan otak tengah. Akhirnya, dari thalamus, impuls mengirim pesan nosiseptif ke korteks somatosensoris, dan sistem limbik.

5) Persepsi adalah proses yang sangat kompleks yang sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Namun, yang dapat disimpulkan disini bahwa persepsi nyeri merupakan pengalaman sadar dari penggabungan antara aktivitas sensori di korteks somatosensoris dengan aktivitas emosional dari sistem limbic, yang akhirnya dirasakan sebagai persepsi nyeri berupa *“unpleasant sensory and emotional experience”*.

#### **e. Penanganan Nyeri**

Manajemen nyeri dalam Wati & Ernawati (2020), merupakan prosedur penatalaksanaan untuk penanganan nyeri, terdapat dua manajemen dalam penanganan nyeri yaitu secara farmakologi maupun non farmakologi. Tindakan farmakologis biasanya diberikan dengan pemberian analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri yang sangat hebat yang berlangsung selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Analgesik ini dibagi menjadi 3 golongan yaitu non opioid (asetaminofen dan NSAIDs), opioid (jenis narkotik), dan koanalgesik atau adjuvants. Sedangkan pada terapi non farmakologis digunakan sebagai pendamping obat untuk mempersingkat episode nyeri yang berlangsung relatif singkat, dapat dilakukan dengan cara relaksasi, teknik pernafasan nafas dalam, distraksi, hipnoterapi, hypnotherapy, terapi musik atau video, massage, akupunktur, dan berbagai macam teknik relaksasi lainnya.

### **3. Konsep Teori Distraksi Visual**

#### **a. Defenisi**

Distraksi adalah pengalihan perhatian ke hal yang lain sehingga dapat menurunkan kewaspadaan yang lain sehingga dapat menurunkan kewaspadaan terhadap nyeri, bahkan meningkatkan toleransi terhadap nyeri Prasetyo (2010) dalam (Sri Utami, 2019).

Distraksi merupakan teknik memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain pada nyeri dan merupakan mekanisme yang

bertanggung jawab terhadap tehnik kognitif efektif lainnya, dimana distraksi dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol desenden, yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli nyeri yang di transmisikan ke otak (Sri Utami, 2019). Distraksi adalah cara mengalihkan perhatian klien dari rasa nyeri yang dia alami (Vianti & Ari, 2018).

Masalah kesehatan tidak hanya ditandai dengan keberadaan penyakit, tetapi gangguan kesehatan yang ditandai dengan adanya perasaan terganggu fisik, mental dan spiritualnya. Berbagai macam permasalahan yang dialami manusia terkait penyakit yang selalu hadir dan tidak akan pernah lepas dalam kehidupan. Dalam menangani penyakit fisik, tentu saja diperlukan peralatan dan pertolongan medis. Salah satu cara dalam menangani penyakit yaitu terapi farmakologis dan non farmakologis. Terapi non farmakologis yang bisa dilakukan dalam menangani penyakit secara fisik yaitu dengan cara distraksi. Distraksi merupakan salah satu cara pengobatan dengan cara mengalihkan rasa sakit. Rasulullah SAW adalah orang pertama dalam sejarah yang menyerukan penelitian ilmiah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya hadis Rasulullah yang meletakkan dasar-dasar penting mengenai berbagai ilmu pengobatan modern (Tafsir Al-Mishbah, 2021). Rasulullah SAW bersabda :

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Terjemahnya :

” Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pula yang menurunkan obatnya.” (HR. Al-Bukhari)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' : 82 juga disebutkan :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ  
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

*”Dan kami turunkan dalam alquran ayat-ayat yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim selain kerugian”.* (QS: Al-Isra’ : 82)

Selain itu, dalam Al-Qur’an Surah Yunus : 100 juga disebutkan :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا  
يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

*“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpahkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya”.* (QS. Yunus : 100)

Hadist dan penggalan ayat diatas menegaskan adanya obat bagi setiap penyakit, yang berarti ketika seseorang mempunyai penyakit pasti ada obatnya. Selain itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang mencarinya dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya. Ayat diatas juga berkaitan dengan distraksi yang diberikan kepada pasien, dimana distraksi yang diberikan bertujuan sebagai penawar atau pengalihan dari rasa sakit yang dialami.

#### **b. Manfaat**

Manfaat penggunaan distraksi yaitu agar seseorang yang menerima tehnik ini merasa lebih nyaman, santai, dan merasa berada pada situasi yang lebih menyenangkan Widyastuti, 2010 dalam (Sri Utami, 2019).

Adapun tujuan penggunaan tehnik distraksi dalam intervensi keperawatan adalah untuk mengalihkan atau menjauhkan perhatian klien terhadap sesuatu yang sedang dihadapi, misalnya nyeri (Safari & Azhar, 2019).

### **c. Mekanisme Distraksi Visual Dalam Menurunkan Nyeri**

Teknik distraksi dengan mengalihkan fokus klien terhadap visual atau film yang disukai oleh klien dapat menjadi strategi yang sangat mungkin dilakukan dalam mekanisme teknik kognitif afektif lainnya. Distraksi dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem control desenden, yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli nyeri yang ditransmisikan ke otak. Mekanisme distraksi ini dapat dijelaskan dengan adanya endorphen dan enkefalin dalam tubuh yang merupakan substansi yang berfungsi sebagai inhibitor terhadap transmisi nyeri. Endorphen dan enkefalin, substansi seperti morfin yang diproduksi oleh tubuh adalah contoh dari substansi yang menghambat transmisi impuls nyeri. Apabila tubuh mengeluarkan substansi-substansi ini, satu efeknya adalah pereda nyeri (Sri Utami, 2019).

## **B. Konsep Asuhan Keperawatan**


### **1. Konsep Teori Keperawatan Yang Terkait**

Bebas dari rasa nyeri merupakan hak setiap individu. Nyeri pada pasien pasca pembedahan apabila tidak segera ditangani akan berpengaruh pada perubahan hemodinamik, terdapat gangguan aliran darah, faktor koagulasi, fibrinolisis, terjadi ketidakseimbangan cairan elektrolit serta meningkatnya kebutuhan sistem respirasi dan sistem kardiovaskuler akibat peningkatan hormon katabolik (Hockenberry & Wilson, 2009). Respon terhadap nyeri juga dapat menyebabkan pasien frustrasi, menghindari kontak sosial, menangis, menjerit, atau memukul sehingga tidak kooperatif dengan tindakan keperawatan, menurunnya minat terhadap aktivitas dan pemenuhan kebutuhan seperti makan, bermain dan kebersihan diri (Smeltzer & Bare, 2002; Hockenberry & Wilson, 2009).

Berbagai masalah pasien yang ditimbulkan akibat pasca operasi menyebabkan gangguan rasa nyaman nyeri yang perlu diatasi. Rasa

nyaman merupakan bagian perawatan yang penting untuk diperhatikan. Kenyamanan merupakan nilai dasar yang menjadikan tujuan keperawatan pada setiap waktu. Pendekatan teori comfort yang dikembangkan oleh Kolcaba menawarkan kenyamanan sebagai bagian terdepan dalam proses keperawatan (Ilmiasih et al., 2015). Kenyamanan yang dimaksud adalah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit hingga sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat kepada klien (Risnah & Irwan, 2021). Kolcaba memandang bahwa kenyamanan holistik adalah kenyamanan yang menyeluruh meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, lingkungan dan psikososial. Tingkat kenyamanan terbagi menjadi tiga yaitu *relief* dimana pasien memerlukan kebutuhan kenyamanan yang spesifik, *ease* yaitu terbebas dari rasa ketidaknyamanan atau meningkatkan rasa nyaman, dan *transcendence* yaitu mampu mentoleransi atau dapat beradaptasi dengan ketidaknyamanan (Kolcaba & Dimarco, 2005; Tomey & Alligood, 2006) dalam (Ilmiasih et al., 2015).

Kenyamanan adalah pengalaman yang diterima oleh seseorang dari suatu intervensi. Hal ini merupakan pengalaman langsung dan menyeluruh ketika kebutuhan fisik, psikospiritual, sosial, dan lingkungan terpenuhi (Peterson & Bredow, 2008). Konsep teori kenyamanan meliputi kebutuhan kenyamanan, intervensi kenyamanan, variabel intervensi, peningkatan kenyamanan, perilaku pencari kesehatan, dan integritas institusional. Menurut Kolcaba & Marco (2005), hal tersebut dapat digambarkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual pada Teori Kenyamanan**

Seluruh konsep tersebut terkait dengan klien dan keluarga. Teori kenyamanan terdiri atas tiga tipe, yaitu (1) *relief*: kondisi resipien yang membutuhkan penanganan spesifik dan segera, (2) *ease*: kondisi tenteram atau kepuasan hati dari klien yang terjadi karena hilangnya ketidaknyamanan fisik yang dirasakan pada semua kebutuhan, (3) *transcendence*: keadaan dimana seseorang individu mampu mengatasi masalah dari ketidaknyamanan yang terjadi. Kolcaba memandang bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar seorang individu yang bersifat holistik (Utami, 2016).

## 2. Pengkajian Keperawatan

### a. Identitas

#### 1) Identitas pasien :

Nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku/bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit (MRS), nomor register, dan diagnosis medik.

#### 2) Identitas penanggung jawab

Meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta status hubungan pasien.

### b. Keluhan utama

#### 1) Sesak saat bekerja, dyspnea nocturnal paroksimal, ortopnea

- 2) Lelah, pusing
  - 3) Nyeri dada
  - 4) Edema ekstremitas bawah
  - 5) Nafsu makan menurun, mual, distensi abdomen
  - 6) Urine menurun
- c. Riwayat penyakit sekarang
- Pengkajian yang mendukung keluhan utama dengan memberikan pertanyaan tentang kronologi keluhan utama. Pengkajian yang didapat dengan gejala-gejala kongesti vaskuler pulmonal, yakni munculnya dispnea, ortopnea, batuk, dan edema pulmonal akut. Tanyakan juga gejala-gejala lain yang mengganggu pasien.
- d. Riwayat penyakit dahulu
- Untuk mengetahui gejala penyakit dahulu tanyakan kepada pasien apakah pasien sebelumnya menderita nyeri dada khas infark miokardium, hipertensi, DM, atau hiperlipidemia. Tanyakan juga obat-obatan yang biasanya diminum oleh pasien pada masa lalu, yang mungkin masih relevan. Tanyakan juga alergi yang dimiliki pasien.
- e. Riwayat penyakit keluarga
- Apakah ada keluarga pasien yang menderita penyakit jantung, dan penyakit keturunan lain seperti DM, Hipertensi.
- f. Pengkajian data
- 1) Aktivitas dan istirahat : adanya kelelahan, insomnia, letargi, kurang istirahat, sakit dada, dispnea pada saat istirahat atau saat beraktifitas.
  - 2) Sirkulasi : riwayat hipertensi, anemia, syok septik, asites, disaritmia, fibrilasi atrial, kontraksi ventrikel premature, peningkatan JVP, sianosis, pucat.
  - 3) Respirasi : dispnea pada waktu aktifitas, takipnea, riwayat penyakit paru.
  - 4) Pola makan dan cairan : hilang nafsu makan, mual dan muntah

- 5) Eliminasi : penurunan volume urine, urine yang pekat, nokturia, diare atau konstipasi
  - 6) Neurologi : pusing, penurunan kesadaran, disorientasi.
  - 7) Interaksi social : aktifitas social berkurang
  - 8) Rasa aman : perubahan status mental, gangguan pada kulit/dermatitis
- g. Pemeriksaan fisik
- 1) Keadaan umum : kesadaran dan keadaan emosi, kenyamanan, distress, sikap dan tingkah laku pasien.
  - 2) Tanda-tanda vital :
    - 1) Tekanan darah  
Nilai normalnya :  
Nilai rata-rata sistolik : 110-140 mmHg  
Nilai rata-rata diastolik : 80-90 mmHg
    - 2) Nadi  
Nilai normalnya : frekuensi : 60-100 x/menit (bradikardi atau takikardi)
    - 3) Pernapasan  
nilai normalnya : frekuensi 16-20 x/menit  
pada pasien respirasi meningkat, dyspnea pada saat istirahat/aktivitas
    - 4) Suhu badan  
Metabolism menurun : suhu menurun
  - 3) Head to toe examination :
    - 1) Kepala : bentuk dan keimetrisan
    - 2) Mata : konjungtiva : anemis, ikterik atau tidak?
    - 3) Mulut : apakah ada tanda infeksi?
    - 4) Telinga : kotor atau tidak, ada serumen atau tidak, kesimetrisan
    - 5) Muka : ekspresi, pucat
    - 6) Leher : apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan limfe

- 7) Dada : gerakan dada, deformitas
  - 8) Abdomen : terdapat asites, hati teraba dibawah arus kosta kanan
  - 9) Ekstremitas : lengan tangan : reflex, warna dan tekstur kulit, edema, clubbing, bandingkan asteri radialis kiri dan kanan
  - 10) Pemeriksaan khusus jantung:
    - Inspeksi : vena leher dengan JVP meningkat, letak ictus cordis (normal : ICS ke 5)
    - Palpasi : PMI bergeser kekiri, inferior Karen dilatasi atau hepertrofi ventrikel
    - Perkusi : batas jantung normal pada orang dewasa
      - Kanan atas : SIC II linea para sternalis dextra
      - Kanan bawah : SIC IV linea para sternalis dextra
      - Kiri atas : SIC II linea para sternalis sinistra
      - Kiri bawah : SIC IV linea medio clavicularis sinistra
    - Auskultasi : bunyi jantung I dan II
      - Bj I : terjadi karena getaran menutupnya katup atrioventrikular, yang terjadi pada saat kontraksi isimetris dari bilik pada permulaan systole
      - BJ II : terjadi akibat getaran menutupnya katup aorta dan arteri pulmonalis pada dinding toraks. Ini terjadi kira-kira pada permulaan diastole.
- (BJ II normal selalu lebih lemah daripada BJ I)

#### h. Pemeriksaan penunjang

- 1) Foto thorax dapat mengungkapkan adanya pembesaran jantung, edema atau efusi pleura yang menegaskan diagnosis CHF
- 2) EKG dapat engungkapkan adanya takikardi, hipertrofi bilik jantung dan iskemi (jika disebabkan AMI)
- 3) Pemeriksaa laboratorium : Hiponatremia, hyperkalemia pada tahap lanjut dari gagal jantung, blood urea nitrogen (BUN) dan

kreatinin meningkat, peningkatan bilirubin dan enzim hati  
(Ramadhani, 2020)

### 3. **Diagnosis Keperawatan**

#### a. Pola nafas tidak efektif (D.0005)

Defenisi : inspirasi dan ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi  
adekuat

Penyebab : hambatan upaya nafas (mis: nyeri saat bernafas)

Batasan karakteristik :

Kriteria mayor :

- 1) Subjektif : Dispnea
- 2) Objektif : penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal

Kriteri minor :

- 3) Subjektif : ortepnea
- 4) Objektif : pernafasan pursed, pernapasan cuping hidung, diameter thoraks anterior-posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi dan inspirasi menurun, ekskresi dada berubah.

Kondisi klinis terkait ; Trauma Thorax

#### b. Penurunan curah jantung (D.0008)

Defenisi : ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk  
memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh

Penyebab : perubahan preload, perubahan afterload dan perubahan  
kontraktilitas

Batasan karakteristik :

Kriteria mayor :

- 1) Subjektif : lelah
- 2) Objektif : edema, distensi vena jugularis, central venous pressure (CVP) meningkat atau menurun

Kriteria minor

- 1) Subjektif : -

2) Objektif : murmur jantung, berat badan bertambah, pulmonary artery wedge pressure (PAWP) menurun

Kondisi klinis terkait : Gagal Jantung Kongestif

c. Nyeri akut (D.0077)

Defenisi : pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan

Penyebab : agen pencedera fisiologis (mis: iskemia)

Batasan karakteristik :

Kriteria mayor :

- 1) Subjektif : mengeluh nyeri
- 2) Objektif : tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur

Kriteri minor :

- 1) Subjektif : -
- 2) Objektif : tekanan darah meningkat, pola nafas berubah, nafsu makan berubah, proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaphoresis

Kondisi klinis terkait : Cedera Traumatis

d. Intoleransi aktivitas (D.0056)

Defenisi : ketidak cukupan energy untuk melakukan aktivitas sehari-hari

Penyebab : kelemahan

Batasan karakteristik :

Kriteria mayor :

- 1) Subjektif : mengeluh lelah
- 2) Objektif : frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat

Kriteria minor :

- 1) Subjektif : dyspnea saat/setelah beraktifitas, merasa tidak nyaman setelah beraktifitas, merasa lemah
- 2) Objektif : tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat, gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktifitas, gambaran EKG menunjukkan iskemia, sianosis

Kondisi klinis terkait : Gagal Jantung Kongestif

e. Resiko Gangguan Integritas Kulit (D.0139)

Defenisi : beresiko mengalami kerusakan kulit (dermis dan epidermis) atau jaringan (membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan ligamen)

Faktor resiko : kekurangan/kelebihan cairan, kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integritas jaringan

Kondisi klinis terkait : Gagal Jantung Kongestif .

#### 4. Intervensi Keperawatan

Perencanaan atau intervensi keperawatan adalah semua tindakan asuhan keperawatan terhadap klien. Tindakan ini merupakan intervensi yang diprakarsai oleh perawat, dokter atau intervensi kolaboratif (Wijaya, 2016).

Intervensi keperawatan merupakan segala bentuk treatment yang dikerjakan oleh perawat berdasarkan pada pengetahuan maupun penilaian klinis untuk mencapai tujuan luaran yang diharapkan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2018). Diagnosis berdasarkan SIKI adalah :

<b>Dx. Keperawatan</b>	<b>Tujuan dan Kriteria Hasil</b>	<b>Intervensi</b>
1. Pola Nafas Tidak Efektif b.d hambatan upaya nafas (mis. Nyeri saat bernafas)	Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pola nafas membaik.  Kriteria hasil : (pola nafas L.01004) 1. Frekuensi nafas dalam	(Manajemen jalan nafas I.01011) - Monitor pola nafas (frekuensi, kedalaman, usaha nafas) - Monitor bunyi nafas tambahan (mis: gagling, mengi, wheezing,

	<p>rentang normal</p> <p>2. Tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan</p> <p>3. Pasien tidak menunjukkan tanda dipsnea</p>	<p>ronkhi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor sputum (jumlah, warna, aroma)</li> <li>- Posisikan semi fowler atau fowler</li> <li>- Ajarkan tehnik batuk efektif</li> <li>- Kolaborasi pemberian bronkodilato, ekspetoran, mukolitik, <i>jika perlu.</i></li> </ul>
<p>2. Nyeri Akut b.d agen pencedera fisiologis (Mis: Iskemia)</p>	<p>Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan tingkat nyeri menurun .</p> <p>Kriteria hasil : Tingkat Nyeri (L.08066)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan nyeri berkurang dari skala 7 menjadi 2</li> <li>2. Pasien menunjukkan ekspresi tenang</li> <li>3. Pasien dapat beristirahat dengan nyaman</li> </ol>	<p>(Manajemen Nyeri I.08238)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, intensitas nyeri</li> <li>- Identifikasi skala nyeri</li> <li>- Identifikasi faktor yang memperberat dan meperringan nyeri</li> <li>- Berikan tehnik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>- kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri</li> <li>- anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>- ajarkan tehnik non farmakologis untuk mengurangi nyeri</li> <li>- kolaborasi pemberian analgetik</li> </ul>
<p>3. Perfusi perifer tidak efektif b.d penurunan aliran arteri dan vena</p>	<p>Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan perfusi perifer meningkat.</p> <p>Kriteria hasil : perfusi perifer (L.02011)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nadi perifer teraba kuat</li> <li>2. Akral teraba hangat</li> <li>3. Warna kulit tidak pucat</li> </ol>	<p>(Perawatan Sirkulasi I.02079)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa sirkulasi perifer (mis: nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu)</li> <li>- Identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi</li> <li>- Lakukan hidrasi</li> <li>- Anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah, antikoagulan, dan penurun kolestrol, jika</li> </ul>

		<p>perlu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur</li> <li>- Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan</li> </ul>
4. Intoleransi aktifitas b.d kelemahan	<p>Tujuan : setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan toleransi aktifitas meningkat.</p> <p>Kriteria hasil : Toleransi aktifitas (L.05047)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan melakukan aktifitas sehari-hari meningkat</li> <li>2. Pasien mampu berpindah dengan atau tanpa bantuan</li> <li>3. Pasien mengatakan dyspnea saat dan setelah beraktifitas</li> </ol>	<p>(Manajemen energi I.050178)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor kelelahan fisik dan emosional</li> <li>- Monitor pola dan jam tidur</li> <li>- Sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus (mis: cahaya, suara, kunjungan)</li> <li>- Berikan aktifitas distraksi yang menenangkan</li> <li>- Anjurkan tirah baring</li> <li>- Anjurkan melakukan aktifitas secara bertahap</li> <li>- Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makan</li> </ul>
5. Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan memcerna makanan, faktor psikologis (mis: stress, keengganan untuk makan)	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan status nutrisi membaik.</p> <p>Kriteria hasil : (status nutrisi L.03030)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Porsi makan yang dihabiskan meningkat</li> <li>2. Perasaan cepat kenyang menurun</li> <li>3. Nafsu makan membaik</li> </ol>	<p>(Manajemen Gangguan Makan I.03111)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitor asupan dan keluarnya makanan dan cairan serta kebutuhan kalori</li> <li>- Timbang berat badan secara rutin</li> <li>- Anjurkan membuat catatan harian tentang perasaan dan situasi pemicu pengeluaran makanan (mis: pengeluaran yang disengaja, muntah, aktivitas berlebih)</li> <li>- Kolaborasi dengan ahli gizi tentang target berat badan, kebutuhan kalori</li> </ul>

		dan pilihan makanan
6. Resiko gangguan integritas kulit d.d kelebihan volume cairan	<p>Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat.</p> <p>Kriteria hasil: (integritas kulit dan jaringan L.14125)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resiko kerusakan integritas kulit meningkat</li> <li>2. Tidak ada tanda kemerahan</li> <li>3. Tidak ada keluhan nyeri pada daerah edema</li> </ol>	<p>(Edukasi Edema I.12370)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi</li> <li>- Persiapan materi dan media edukasi (mis: formulir balance cairan)</li> <li>- Berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya</li> <li>- Jelaskan tentang defenisi, tanda, dan gejala edema</li> <li>- Jelaskan cara penanganan dan pencegahan edema</li> <li>- Instruksikan pasien dan keluarga untuk menjelaskan kembali defenisi, penyebab, gejala dan tanda, penanganan dan pencegahan edema.</li> </ul>

**Tabel 2.1 Teori Intervensi Keperawatan**

### 5. Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan ataupun implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan (Wijaya, 2016).

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu pasien dari masalah status kesehatan yang dihadapi mengenai status kesehatan pasien yang baik dengan menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Proses pelaksanaan Implementasi berpusat pada kebutuhan pasien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebutuhan pasien, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan perawat, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan komunikasi (Wijaya, 2016).

## 6. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya (Wijaya, 2016).

Evaluasi keperawatan adalah membandingkan efek / hasil dari pengimplementasian tindakan keperawatan dengan norma atau kriteria tujuan yang sudah ditentukan, langkah akhir dari segala proses keperawatan, menilai tujuan dalam rencana perawatan tercapai atau tidak, menilai efektifitas intervensi keperawatan atau strategi asuhan keperawatan, menentukan efektif/tidaknya tindakan keperawatan dan perkembangan pasien terhadap masalah kesehatan (Jaya et al., 2019).

Menurut Setiadi (2012) dalam (Ramadhani, 2020), tahap evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya, dimana tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk melihat kemampuan dari pasien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria pada tahap perencanaan. Terdapat 2 jenis evaluasi :

### a. Evaluasi Formatif (Proses)

Evaluasi formatif berfokus pada aktifitas proses keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Evaluasi ini dilakukan segera setelah perawat mengimplementasikan rencana keperawatan guna menilai keaktifan tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini meliputi 4 komponen yang dikenal dengan istilah SOPA, yakni subjektif (data keluhan pasien), objektif (data hasil pemeriksaan), analisis data (perbandingan data dengan teori), dan perencanaan.

### b. Evaluasi Sumatif (Hasil)

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah semua aktifitas proses keperawatan selesai dilakukan. Evaluasi sumatif ini bertujuan menilai dan memonitor kualitas asuhan keperawatan yang telah diberikan. Metode yang dapat digunakan pada evaluasi jenis ini adalah melakukan wawancara pada akhir pelayanan, menanyakan respon pasien dan keluarga terkait pelayanan keperawatan, mengadakan pertemuan pada akhir layanan. Ada tiga kemungkinan hasil evaluasi dalam pencapaian tujuan keperawatan, yaitu :

- 1) Tujuan tercapai/masalah teratasi
- 2) Tujuan tercapai sebagian/masalah teratasi sebagian
- 3) Tujuan tidak tercapai/masalah belum teratasi

### ***C. Evidence Based Practice in Nursing (EBPN)***

#### **1. Pengertian**

Distraksi adalah metode atau teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi nyeri dengan mengalihkan perhatian pasien dari nyeri. Salah satu teknik distraksi yang dapat dilakukan pada pasien dalam penatalaksanaan nyeri adalah menonton video/film (Rahayu & Darmawan, 2020).

Distraksi sebagai strategi pengalihan nyeri yang memfokuskan perhatian ke klien menuju stimulus yang lain daripada terhadap rasa nyeri dan emosi negatif. Teknik distraksi dapat mengatasi nyeri berdasarkan teori bahwa aktivasi retikuler menghambat stimulus nyeri, jika seseorang menerima input sensori yang berlebihan dapat menyebabkan terhambatnya impuls nyeri ke otak (nyeri berkurang atau tidak dirasakan oleh pasien). Peredaran nyeri secara umum berhubungan langsung dengan partisipasi aktif pasien, banyaknya modalitas sensor yang digunakan dan minat pasien dalam stimulasi. Oleh karena itu, stimulasi penglihatan, pendengaran dan sentuhan mungkin akan lebih efektif dalam menurunkan nyeri dibandingkan stimulus. Distraksi yang dipilih adalah menonton video (audio visual)

hal ini dipilih karena pada video / film terdapat unsur gambar, warna, dan cerita sehingga pasien menyukai menonton video / film. Ketika pasien lebih fokus pada kegiatan menonton video / film, hal tersebut membuat impuls nyeri akibat adanya cedera tidak mengalir melalui tulang belakang, pesan tidak mencapai otak sehingga pasien tidak merasakan nyeri (Wandini & Resandi, 2020).

## 2. Tujuan

Menurut Ekawati (2017), tujuan distraksi video sebagai berikut :

- a. Pengalihan atau menjauhkan perhatian pasien terhadap sesuatu yang sedang dihadapi
- b. Pasien merasa lebih nyaman, santai, dan merasa berada pada situasi yang lebih menyenangkan
- c. Mengurangi nyeri dan kecemasan akibat kondisi yang dihadapi

## 3. Indikasi

Menurut Ekawati (2017), indikasi pemberian distraksi video dengan kriteria:

- a. Pasien yang mengalami nyeri akut
- b. Skala nyeri pasien berada pada rentang ringan sampai sedang
- c. Cukup kooperatif
- d. Keadaan umum cukup baik

## 4. Kontraindikasi

Adapun kontraindikasi diberikanya terapi mewarnai menurut Ekawati (2017), yaitu :

- a. Pasien dengan kondisi kritis atau tidak sadar
- b. Pasien yang terganggu kejiwaannya

## 5. Prosedur Pemberian dan Rasional

Standar operasional prosedur distraksi visua menurut Wilanda (2020), sebagai berikut:

Prosedur Pemberian	Rasional
Tahap Pra Interaksi 1. Melakukan kontrak waktu	1. Kontrak waktu dapat menciptakan rasa percaya pasien terhadap perawat

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengecek kesiapan pasien (tidak mengantuk, kondisi yang memungkinkan)</li> <li>3. Menyiapkan alat</li> <li>4. Melakukan hand hygiene</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengetahui kesiapan pasien sebelum pemberian terapi</li> <li>3. Agar alat yang dibutuhkan segera tersedia sebelum terapi dilaksanakan seperti handphone</li> <li>4. Untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah penyebaran infeksi bakteri atau virus sebelum bertemu dengan pasien</li> </ol>
<p>Tahap Orientasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan salam terapeutik dan menyapa nama pasien</li> <li>2. Memvalidasi keadaan pasien</li> <li>3. Kaji skala nyeri pasien sebelum dilakukan intervensi</li> <li>4. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan</li> <li>5. Menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien sebelum kegiatan dilakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salam terapeutik merupakan kalimat pembuka untuk memulai suatu percakapan sehingga terjalin rasa nyaman dan percaya</li> <li>2. Untuk mengetahui keadaan pasien sebelum diberikan terapi</li> <li>3. Untuk mengetahui skala nyeri pasien sebelum pemberian distraksi video</li> <li>4. Agar pasien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur pemberian terapi</li> <li>5. Meminta persetujuan pasien dan keluarga sebelum terapi dimulai</li> </ol>
<p>Tahap Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaca basmalah</li> <li>2. Memberi petunjuk pada pasien mengenai beberapa cara distraksi (salah satunya menonton video / film)</li> <li>3. Putar video yang dipilih oleh pasien yang akan ditampilkan pada handphone</li> <li>4. Mempersilahkan pasien untuk memusatkan perhatiannya atau fokus terhadap video yang diputarkan</li> <li>5. Video yang diputar berdurasi 5-10 menit</li> <li>6. Memotivasi keterlibatan pasien dan keluarga</li> <li>7. Mengobservasi respon, emosi, hubungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memulai aktivitas agar dilancarkan hendaklah mengucapkan basmalah</li> <li>2. Agar pasien dapat mengetahui beberapa cara distraksi terutama distraksi video</li> <li>3. Sebagai langkah awal proses distraksi</li> <li>4. Mendukung agar pasien dapat lebih fokus pada video yang diputarkan serta rasa nyeri yang dirasakan dapat teralihkan</li> <li>5. Video diputarkan dengan durasi tertentu agar pasien tidak jenuh serta lebih efektif</li> <li>6. Agar keluarga dapat terlibat dalam perawatan pasien</li> <li>7. Untuk melihat adanya perubahan respon, emosi, hubungan interpersonal, serta psikomotorik pasien selama terapi</li> <li>8. Untuk mengetahui perasaan</li> </ol>

<p>interpersonal, psikomotor pasien saat distraksi video</p> <p>8. Menanyakan perasaan pasien setelah diberi distraksi video</p> <p>9. Menanyakan perasaan dan pendapat keluarga tentang distraksi yang diberikan</p>	<p>pasien setelah dilakukan distraksi video</p> <p>9. Untuk mengetahui perasaan dan tanggapan keluarga mengenai terapi distraksi video yang diberikan</p>
<p>Tahap Terminasi</p> <p>1. Melakukan evaluasi respon pasien</p> <p>2. Mengkaji skala nyeri pasien setelah diberikan intervensi</p> <p>3. Membereskan dan mengembalikan alat ke tempat semula</p> <p>4. Melakukan hand hygiene</p> <p>5. Mencatat jenis terapi dan kesimpulan hasil terapi</p> <p>6. Mendoakan pasien</p> <p>7. Kontrak waktu selanjutnya dan berpamitan</p>	<p>1. Untuk menilai adanya perubahan sebelum dan setelah pemberian terapi distraksi video</p> <p>2. Untuk mengetahui skala nyeri pasien setelah diberikan intervensi</p> <p>3. Membereskan alat dan bahan yang telah digunakan selama pemberian terapi</p> <p>4. Untuk menjaga kebersihan diri</p> <p>5. Mendokumentasikan segala tindakan yang telah dilaksanakan</p> <p>6. Agar pasien lekas diberi kesembuhan dengan senantiasa mendoakan</p> <p>7. Kontrak waktu dapat membantu persetujuan untuk pertemuan selanjutnya, berpamitan merupakan akhir fase yang harus dilakukan untuk menyudahi percakapan</p>

**Tabel 2.2 SOP Distraksi Video**

## 6. Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi pemberian terapi distraksi video menurut (Mertajaya, 2018), sebagai berikut:

- a. Pasien mengemukakan perasaannya setelah intervensi dan dapat menyebutkan teknik distraksi nyeri.
- b. Pasien dapat melakukan kembali teknik distraksi yang telah diberikan.
- c. Pasien lebih nyaman, santai, dan merasa berada pada situasi yang lebih menyenangkan

Adapun menurut SLKI (2018), setelah diberikan intervensi distraksi video diharapkan pasien mampu melakukan atau mengontrol nyeri dengan mandiri dengan kriteria hasil :

- a. Nyeri menurun
- b. Meringis menurun
- c. Kemampuan meningkatkan aktivitas meningkat

#### 7. Artikel Utama dan Pendukung

No.	Artikel	Penulis	Tahun	Judul	Sumber
1	Utama	Achmad Djamil, Dewi Yuliana, Mia Arini	2019	Distraksi Menonton Efektif Menurunkan Nyeri Ringan Pasien <i>Congestive Heart Failure</i> (CHF)	Jurnal Kesehatan, Vol. 10, No. 3, Sinta 4
2	Pendukung	Tri Wahyuni Ismoyowati, Imelda Sri Desisi Teku, Jen Christin Banik, Rincke Anitya Oryza Sativa	2021	Manajemen Nyeri Untuk <i>Congestive Heart Failure</i>	Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes, Vol. 12, No. 1, Sinta 3
3	Pendukung	Hemma Siti Rahayu, Della Darmawan	2020	Pemberian Teknik Distraksi Pemutaran Video Kartun Untuk Menurunkan Nyeri Pada Anak Post Operasi	(JIKO) Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi, Vol. 4, No. 1, Sinta 4
4	Pendukung	Syafrina Arbaani	2021	Efektivitas Penerapan	Jurnal JKFT:

		Djuria, La Ode Abdul Rahman		Teknologi Virtual Reality Terhadap Manajemen Nyeri dan Ansietas Pada Pasien Kanker : Literatur Review	Universitas Muhammad iyah Tangerang, Vol. 6, No. 1, Sinta 4
5	Pendukung	Riska Wandini, Riyan Resandi	2020	Pemberian Tehnik Distraksi Menonton Kartun Animasi Untuk Menurunkan Tingkat Nyeri Prosedur Invasif Pada Anak	Holistik Jurnal Kesehatan, Vol. 14, No. 3, Sinta 4

**Tabel 2.3 Artikel Utama dan Pendukung**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Rancangan Studi Kasus

Studi kasus merupakan suatu teknik mempelajari seseorang atau individu secara mendalam untuk membantu memperoleh penyesuaian diri yang lebih baik (Jamila et al., 2020). Menurut Hidayat (2019), studi kasus (*case study*) adalah suatu bagian dari metodologi penelitian yang dalam pembahasannya peneliti dituntut agar lebih cermat, mendalam, serta teliti untuk mengungkapkan suatu kasus ataupun peristiwa, baik itu bersifat perorangan atau berkelompok.

Pada penulisan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah melakukan 'Studi Kasus' dimana dalam penyajiannya dilakukan secara mendalam untuk melihat suatu keadaan atau kondisi pasien dengan cara menyeluruh dan tersistematis. Pengumpulan data diawali dengan *informed consent*, lalu memulai proses wawancara kepada keluarga pasien dan pasien, kemudian melakukan observasi, pemeriksaan fisik, serta pendokumentasian. Setelah data terkumpul kemudian melakukan analisis data dan memberikan intervensi berdasarkan EBPN (*Eviden Based Practice in Nursing*) yaitu Distraksi Visual, dimana implementasi dilakukan satu kali sehari selama tiga hari pemberian. Terakhir dilakukan evaluasi berdasarkan EBPN sebelum dan sesudah pemberian intervensi distraksi visual pada pasien yang mengalami nyeri akut.

#### B. Subyek Studi Kasus

Dalam studi kasus ini, subyek yang digunakan ialah bersifat individu atau pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

##### 1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2008).

Adapun kriteria inklusi pada studi kasus ini sebagai berikut:

- a. Pasien yang bersedia menjadi subyek studi kasus
- b. Pasien yang mengalami masalah keperawatan nyeri akut

## 2. Kriteria Ekslusi

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008). Sedangkan menurut Adiputra et al. (2021), kriteria ekslusi merupakan kriteria dari subjek penelitian yang tidak boleh ada dan jika subjek mempunyai kriteria ekslusi maka subjek harus dikeluarkan dari penelitian. Adapun kriteria ekslusi pada studi kasus ini sebagai berikut:


- a. Pasien yang pulang sebelum tiga hari pemberian intervensi
- b. Pasien yang sama sekali tidak kooperatif

## C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus pada karya tugas akhir ini yaitu melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami nyeri akut menggunakan intervensi distraksi visual.

## D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh, mengukur dan menganalisis data dari subjek atau sampel yang berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti (H. Kurniawan, 2021). Menurut Sugiyono (2014), instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam studi kasus ini instrumen yang digunakan adalah pengukuran tingkat nyeri NRS (*Numeric Rating Scale*) untuk mengukur tingkat nyeri pada pasien. NRS (*Numeric Rating Scale*) merupakan alat pengukuran nyeri dengan nilai 0 sampai dengan 10 dimana nilai 0 yang berarti tidak merasakan nyeri dan nilai 10 yang berarti nyeri dirasakan sangat ekstrim (Labibah, 2022). Adapun pengkategorian NRS sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Pengkategorian NRS**

Keterangan :

- 1-3 : Nyeri ringan, mulai terasa dan masih dapat ditahan, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari.
- 4-6 : Nyeri sedang, terasa mengganggu dengan usaha yang cukup kuat untuk menahannya, dapat mengganggu kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari menjadi terganggu dan lebih lambat seperti biasanya.
- 7-10 : Nyeri berat, sangat terasa mengganggu / tidak tertahankan sehingga meringis, menjerit bahkan berteriak. Sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Adapun instrumen pendukung lainnya yaitu handphone dan panduan wawancara. Menurut Redhono et al. (2012), secara umum pedoman wawancara dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup secara tepat. Mulailah dengan pertanyaan terbuka terlebih dahulu, baru diikuti dengan pertanyaan tertutup.
2. Gunakan pertanyaan yang ringkas dan mudah dipahami. Hindari menggunakan istilah-istilah medis yang tidak dipahami pasien.
3. Kaji lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, dan intensitas nyeri.
4. Identifikasi skala nyeri serta faktor yang memperberat dan meringankan nyeri.
5. Memberi kesempatan pada pasien untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya (dengan kata – kata pasien sendiri).

6. Dengarkan dengan penuh perhatian. Berilah kesempatan pada pasien untuk menyelesaikan ceritanya, dan jangan menginterupsi.
7. Berilah kesempatan pada pasien untuk memberikan respons baik secara verbal maupun nonverbal.
8. Mengenali isyarat verbal dan non verbal yang ditunjukkan oleh pasien.
9. Mengklarifikasi pernyataan pasien yang kurang jelas, atau yang membutuhkan suatu keterangan tambahan.

#### **E. Prosedur Pengambilan Data**

1. Tahap persiapan
  - a. Mahasiswa (i) mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti dan mengajukan intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) kepada dosen yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing.
  - b. Mahasiswa (i) melakukan koordinasi dengan kepala ruangan HCU CVCU RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar untuk menjelaskan prosedur studi kasus yang akan dilakukan.
  - c. Mahasiswa (i) menjelaskan kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan dilakukan.
  - d. Mahasiswa (i) menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan distraksi video.
2. Pengumpulan data  
Pengumpulan data diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.
3. Penyusunan laporan  
Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

#### **F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus**

Studi kasus ini telah dilakukan di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar tepatnya di ruang HCU dan studi kasus ini telah dilakukan pada bulan November 2022.

### **G. Analisis Data dan Penyajian Data**

Analisis data adalah serangkaian kegiatan untuk meninjau, mengelompokkan, mensistematisasikan, menafsirkan, dan memvalidasi data sehingga suatu fenomena memiliki nilai sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data disebut juga sebagai pengolahan data dan interpretasi data (Siyoto & Sodik, 2015). Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan gambaran hasil studi kasus yang dirumuskan dalam tujuan penulisan dan untuk menarik kesimpulan studi kasus secara umum yang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang relevan (Notoatmodjo, 2012).

Analisis data dilakukan sejak peneliti turun praktek kelapangan, mulai dari awal pengumpulan data hingga semua data terkumpul. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta melalui pengkajian keperawatan, membandingkan dengan teori yang ada dan dituangkan melalui opini pembahasan. Teknik yang digunakan yaitu dengan menarasikan jawaban yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian akan diinterpretasikan oleh peneliti untuk memberikan intervensi terkait masalah yang ditemukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyajian data dimana data yang disajikan dalam bentuk uraian naratif serta sintesis kemudian dikemukakan dalam memberikan interpretasi hasil.

### **H. Etika Studi Kasus**

Dalam melakukan studi kasus, seorang peneliti harus berpedoman pada Kode Etik yang merupakan pedoman etik yang berlaku dalam setiap kegiatan studi kasus yang melibatkan peneliti, pihak-pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan menerima dampak dari hasil studi kasus (Notoatmodjo, 2012). Prinsip-prinsip etika dalam melakukan studi kasus ini digunakan untuk melindungi subyek atau pasien dari berbagai kekhawatiran dan implikasi yang muncul selama kegiatan studi kasus. Menurut Nursalam (2016), prinsip etika dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak

subjek, dan prinsip keadilan. Dalam studi kasus ini, peneliti menyoroti bahwa ada beberapa etik yang perlu difokuskan yaitu:

1. *Beneficience* (Manfaat) dan *Non Maleficence* (Tidak Merugikan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dan pihak yang disurvei pada khususnya. Manfaat yang diharapkan dari studi kasus ini antara lain hasil studi kasus dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh distraksi visual terhadap tingkat intensitas nyeri dan menjadi masukan serta sumber informasi bagi rumah sakit khususnya di bidang keperawatan dan pelayanan, mengurangi angka nyeri akut di berbagai fasilitas kesehatan. Dalam studi kasus ini, peneliti memiliki kewajiban untuk tidak membahayakan subyek penelitian. Subyek dapat memilih untuk berpartisipasi dalam studi kasus tanpa risiko yang merugikan. Studi kasus ini berupaya untuk menghindari kerugian fisik, psikologis, sosial dan ekonomi pada subyek.

2. *Anomity* (Tanpa Nama) dan *Confidentiality* (Kerahasiaan)

*Anomity* adalah ukuran kerahasiaan, peneliti tidak akan memberikan nama subyek, sehingga subyek hanya akan dituliskan inisialnya pada laporan studi kasus ini. Peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan subyek. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh peneliti tidak akan dibagikan kepada orang lain dan hanya akan digunakan untuk kepentingan karya tugas akhir. Seperti dalam penelitian ini, hanya beberapa huruf pertama dari nama yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan subyek penelitian.

3. *Justice* (Adil)

Prinsip keadilan yang ditekankan dalam studi kasus ini adalah peneliti menjamin perlakuan dan manfaat yang sama bagi semua elemen atau subjek penelitian. Dalam hal ini juga peneliti tidak akan melakukan diskriminasi terhadap subjek baik dari segi gender, agama, etnis, dan sebagainya.

## BAB IV

### LAPORAN KASUS

#### A. Pengkajian

##### 1. IDENTITAS KLIEN

Nama Klien (Inisial) : Tn. N  
Umur : 46 tahun  
Diagnosis Medis : ADHF (*Acute Decompensated Heart Failure*)  
Tanggal Pengkajian : Senin, 14 November 2022

##### 2. PENGKAJIAN

REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN	PENGKAJIAN AWAL
<b>A. IDENTITAS</b> Nama : Tn. N Umur : 46 tahun Pendidikan : SMA Pekerjaan : Karyawan Pemda Suku : Paccerakkang Daya Agama : Islam Status Perkawinan : Sudah Menikah Alamat : Duampanua, Pinrang Sumber Informasi : Keluarga Pasien	Ruang rawat : CVCU No. rekam medik : 994974 Tgl/jam masuk : 10 November 2022 Tgl/jam Pengambilan data : 14 November 2022 Diagnosis masuk : ADHF ( <i>Acute Decompensated Heart Failure</i> ) Cara masuk : ( )Berjalan ( )Kursi roda ( <input checked="" type="checkbox"/> )Brankar Kiriman dari poliklinik : - Pindahan dari : RSUD Daya Perawat/tim yang bertanggung jawab : Ns. Syamsiah
<b>B. RIWAYAT KESEHATAN</b> Keluhan utama : Nyeri Keluhan saat ini : Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat kerja pada hari kamis minggu lalu, pasien menolak dibawa ke rumah sakit, kemudian pasien beristirahat dirumahnya dan membeli obat di klinik. Besoknya pasien merasakan sesak lagi dan pasien dibawa ke RSUD Daya kemudian dirujuk ke RSW. Pasien mengeluh nyeri di kaki sebelah kiri post-operas Debridement, saat ini pasien dapat duduk dengan sandaran 60° ( <input checked="" type="checkbox"/> )tidak pernah opname ( ) pernah opname dengan sakit - di RS : - Pernah mendapat pengobatan: ( ) ya ( <input checked="" type="checkbox"/> )tidak : yaitu : - BB sebelum sakit : 87 kg Pernah operasi: ( <input checked="" type="checkbox"/> )pasca operasi ( <input checked="" type="checkbox"/> )tidak Hari ke : 2 Masalah keperawatan :	

<b>C. KEADAAN UMUM</b>	
Kesadaran: (✓)CM ( )somnia ( )apatis ( )sopor ( )semi koma ( )koma Pasien mengerti tentang penyakitnya : (✓)ya ( )tidak Pasca operasi: Iya	
<b>D. KEBUTUHAN DASAR</b>	
<b>NYERI</b>	
Suhu : 36,7 °C (✓)gelisah (✓)nyeri ( )skala nyeri : 4 Gambaran nyeri: nyeri tertusuk-tusuk Lokasi nyeri : nyeri dibagian kaki sebelah kiri Frekwensi : hilang timbul Durasi : - Respon emosional: pasien nampak mengerang dan menutup matanya ketika merasakan nyeri Penyempitan fokus: kesadaran pasien masih baik Cara mengatasi nyeri: menonton video di Hp pasien Lain-lain : -	
Masalah keperawatan : <b>Nyeri Akut</b>	
<b>NUTRISI</b>	<b>KEBERSIHAN PERORANGAN</b>
TB : 160 Cm BB : 85 kg Kebiasaan makan : 3x/hari (Teratur/ <del>tidak teratur</del> ) Keluhan saat ini : - ( ) tidak nafsu makan ( ) mual ( ) muntah ( ) suka/sakit menelan ( ) sakit gigi ( ) stomatitis ( ) nyeri ulu hati/ salah cernah, yang berhubungan dengan: - Disembuhkan dengan : - Pembesaran tiroid : tidak ada Hernia/massa : tidak ada Holisosis : - Kondisi gigi/gusi : bersih Penampilan lidah : bersih Bising usus : - (✓) terpasang infus Dimulai tgl : 19 November 2022 Jenis cairan : Nacl 0,9% Dipasang di : tangan sebelah kiri	Kebiasaan mandi : selama di rawat, pasien di mandikan oleh perawat dengan cara di lap menggunakan kain yang sudah dibasahi setiap pagi Cuci rambut : selama di dirawat, rambut pasien hanya di lap menggunakan kain basah oleh perawat maupun keluarga pasien Kebiasaan gosok gigi : selama di rawat, kebiasaan gosok gigi pasien digantikan oleh perawat Kebersihan badan : (✓) bersih ( ) kotor Keadaan rambut : (✓) bersih ( ) kotor Keadaan kulit kepala : (✓) bersih ( ) kotor Keadaan kuku : ( ) pendek (✓) panjang ( ) bersih (✓) kotor Keadaan vulva/perineal : ( ) bersih ( ) kotor Keluhan saat ini : - ( ) eritema ( ) luka ( ) gatal-gatal Integrasi kulit: ( ) jaringan parut

<p>Porsi makan yang dihabiskan : pasien menghabiskan makanan yang disediakan petugas</p> <p>Makanan yang disukai : Makanan yang dipanggang</p> <p>Diet : pasien tidak diet</p> <p>Lain-lain : -</p>	<p>( ) kemerahan</p> <p>( ) laserasi</p> <p>( ) userasi</p> <p>( ) ekimosis</p> <p>( ) lepuh</p> <p>( ) drainase</p> <p>Luka bakar : tidak terdapat luka bakar (derajat/persen): -</p> <p>Keadaan luka : terdapat luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien</p> <p>Lain-lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien</li> <li>- pasien mengatakan terdapat bintik-bintik merah dikakinya, pasien merasakan gatal, kemudian pasien sering menggaruknya</li> <li>- pasien mengatakan semenjak di rumah sakit, bintik-bintik merah di kakinya semakin parah</li> </ul>
<p>Masalah keperawatan : -</p>	<p>Masalah keperawatan : <b>Gangguan Integritas Kulit/Jaringan</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>CAIRAN</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>AKTIVITAS DAN LATIHAN</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan minum : 1 L/hari</li> <li>- Jenis : air botol mineral</li> <li>- Turgor kulit : ( ) kering ( ) tidak elastic</li> <li>- Punggung kuku : -</li> <li>- Warna : kecoklatan</li> <li>- Pengisian kapiler: -</li> <li>- Mata cekung : (√) tidak ( ) ya</li> <li>- Konjungtiva : normal</li> <li>- Sklera : normal</li> <li>- Edema : (√) tidak ( ) ya</li> <li>- Distensi vena jugularis :</li> <li>- Spider neavi : ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Minum perNGT : tidak</li> <li>- Terpasang NGT : tidak</li> <li>- Terpasang infuse : ( ) tidak (√) ya</li> </ul> <p>Lain-lain: pasien terpasang cairan Narium Clorida 0,9% 500 cc/24 jam</p>	<p>Aktivitas waktu luang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> </ul> <p>Aktivitas/hoby : Memancing</p> <p>Kesulitan bergerak : (√) tidak ( ) ya</p> <p>Kekuatan otot : <math display="block">\begin{array}{r} 5 \\ 2 \end{array} \bigg  \begin{array}{r} 5 \\ 5 \end{array}</math></p> <p>Tonus otot : lemah pada ekstremitas kanan bawah</p> <p>Postur : normal</p> <p>Tremor : pasien tidak tremor</p> <p>Rentang bergerak : -</p> <p>Keluhan saat ini : tidak ada</p> <p>Gerakan terbatas : ( ) ya (√) tidak</p> <p>( ) nyeri otot ( ) kaku otot ( ) lemah otot</p> <p>( ) nyeri sendi ( ) bengkak sendi</p>

	<input type="checkbox"/> inkoordinasi <input type="checkbox"/> parise/paralise      Dibagian : - <input type="checkbox"/> kelelahan <input type="checkbox"/> amputasi <input type="checkbox"/> deformitas - Kelainan bentuk ekstremitas : tidak ada kelainan - Penggunaan alat bantu : <del>gips/traksi/tongkat</del> - Pelaksanaan aktivitas : <input type="checkbox"/> mandiri <input checked="" type="checkbox"/> parsial <input type="checkbox"/> total - Jenis aktifitas yang perlu dibantu : aktifitas perawatan diri dan makan dengan dibantu keluarga pasien - Lain-lain : -
Masalah keperawatan : -	Masalah keperawatan : <b>Gangguan Mobilitas Fisik</b>
<b>ELIMINASI</b>	<b>OKSIGENASI</b>
Kebiasaan BAB : 1 X/hari BAK : 1500 cc/hari, pasien terpasang kateter urine Menggunakan laxsan : <input checked="" type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> ya. Jenis : - Menggunakan diuretic : <input checked="" type="checkbox"/> tidak <input type="checkbox"/> ya. Jenis : - Keluhan BAK Saat ini : - <input type="checkbox"/> Retensi urin <input type="checkbox"/> Inkontinensia urin <input type="checkbox"/> Disuria <input type="checkbox"/> Keseringan <input type="checkbox"/> Urgensi <input type="checkbox"/> Nocturia Peristaltik usus : 15 kali/menit <input type="checkbox"/> Kembung <input type="checkbox"/> Tidak ada peristaltic <input type="checkbox"/> Hiperperistaltik Abdomen : Normal Nyeri Tekan : - Lunak/ <del>keras</del> Massa : Tidak ada massa Ukuran/lingkar Abdomen : - Terpasang kateter urine : <input type="checkbox"/> Tidak <input checked="" type="checkbox"/> Ya dimulai tgl : 19 November 2022 Pengguna alcohol : Klien mengatakan tidak mengkonsumsi alkohol Lain-lain : -	Nadi : 63 X/menit Pernafasan : 20 X/menit TD : 135/96 mmHg Bunyi Nafas : Vesikuler tidak ada ronchi Respirasi : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> Dispnea <input type="checkbox"/> Ronchi <input type="checkbox"/> Stridor <input type="checkbox"/> Wheezing <input type="checkbox"/> Batuk <input type="checkbox"/> Hemoptisis <input type="checkbox"/> Sputum <input type="checkbox"/> Pernafasan Cuping hidung <input type="checkbox"/> Penggunaan otot-otot sensoris Kedalaman : -      Fremitus : - Sputum : <input type="checkbox"/> kental <input type="checkbox"/> encer <input type="checkbox"/> merah <input type="checkbox"/> putih <input type="checkbox"/> hijau <input checked="" type="checkbox"/> kuning Sirkulasi oksigenasi : - <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> Pusing <input type="checkbox"/> Sianosis <input type="checkbox"/> akral dingin <input type="checkbox"/> clubbing finger Dada : <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> retraksi dada <input type="checkbox"/> nyari dada <input type="checkbox"/> berdebar-debar <input type="checkbox"/> defisiensi trackhea <input type="checkbox"/> bunyi jantung Normal (frekwensi : -) <input type="checkbox"/> Mur-mur <input type="checkbox"/> Gallop Oksigen (Tanggal : 19 November 2022) WSD (tanggal : - Canula/Sungkup - 3 Ltr/menit

	<p>Riwayat penyakit : ( ) bronchitis  ( ) Asma  ( ) Tuberkulosis ( ) Empisema ( )  Pneumonia kambuhan ( ) pemanjangan  terhadap udara berbahaya : -  ( ) Perokok Pak/hari : pasien tidak  merokok Lamanya : -  (√) hipertensi ( ) demam rematik ( )  flebitis  ( ) Kesemutan ( ) kebas  Lain-lain :  - Pasien mengatakan merasa sesak  ketika mau berangkat bekerja,  pasien nampak bernapas dibantu  dengan oksigen, bunyi napas  vesikuler tidak ada ronchi, pola  napas cepat dan dalam</p>
Masalah keperawatan : -	Masalah Keperawatan : <b>Pola Nafas Tidak Efektif</b>
<b>TIDUR DAN ISTIRAHAT</b>	<b>PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA</b>
<p>Kebiasaan tidur : (√) Malam (√) Siang  Lama Tidur :  Malam : 2-3 Jam  Siang : 1-2 Jam  Kebiasaan tidur : pasien mengatakan  tidurnya kurang nyenyak semenjak  dia dioperasi, pasien hanya tidur 2-3  jam di malam hari kemudian sering  terbangun  Kebiasaan tidur : (√) Tidak ( ) Ya,  Dipengaruhi oleh faktor : -  Cara mengatasi : -  Lain-lain : -</p>	<p>Refleksi : (√) tidak ( ) kelumpuhan  Penglihatan : (√) tidak ( ) masalah  Pendengaran: (√) tidak ( ) masalah  Penciuman : (√) tidak ( ) masalah  Perabaan : (√) tidak ( ) masalah  Lain-lain : Tidak ada</p>
Masalah keperawatan : -	Masalah keperawatan : -
<b>NEUROSENSORIS</b>	<b>KEAMANAN</b>
<p>Rasa Ingin Pingsan/Pusing :  (√) Tidak ( ) Ya  Stroke (gejala sisa) :  Kejang : (√) Tidak ( ) Ya  Tipe : -  Aura : -  Frekuensi : -  Status postika : -  Cara Mengontrol : -  Status Mental : -</p>	<p><b>Alergi/sensitivitas</b> : pasien  mengatakan tidak ada alergi makanan  Perubahan system imun sebelumnya : -  Penyebab : -  Riwayat penyakit hubungan seksual  (tanggal/tipe) : -  Perilaku resiko tinggi : -  Periksa : -  Transfuse darah/jumlah : Tidak  pernah, kapan : -</p>

<p>Terorientasi/Disorientasi :  Waktu : Baik  Tempat : Baik  Orang : Baik  Kesadaran : ( ) mengantuk ( ) letargi  ( ) stupor  ( ) koma (√) kooperatif ( ) menyerang  ( ) delusi  ( ) halusinasi afek  (gambarkan) : -  Memori :  Saat ini : pasien mampu menceritakan keluhannya saat ini dan bisa menjelaskan bagaimana dia bisa sampai di rawat di rumah sakit saat ini  Yang lalu : pasien mampu mengingat masa lalunya ketika masih muda dan ketika masih sehat  Kacamata : Pasien tidak menggunakan kacamata  Alat bantu dengar : Pasien tidak menggunakan alat bantu dengar  Ukuran/reaksi pupil :ka/ki : Isokor  Facial drop : ( ) tidak ( ) kaku kuduk  ( ) tidak ( ) ya  Genggaman tangan/lepas:ka/ki : lemah  Postur : Baik  Koordinasi: - reflex patella ka/ki: -  Reflex tendon dalam bisep/trisep : -  Kernig sign : ( ) Tidak ( ) Ya  Babinsky : ( ) Tidak ( ) Ya  Chaddock : ( ) Tidak ( ) Ya  Brudinsky : ( ) Tidak ( ) Ya</p>	<p>Gambaran reaksi : -  Riwayat cedera kecelakaan : pasien mengatakan pernah kecelakaan motor tetapi hanya mengalami luka lecet ringan  Fraktur/dislokasi : -  Arthritis/sendai tak stabil : -  Masalah punggung : -  Perubahan pada tahi lalat : -  Pembesaran nodus : Tidak ada pembesaran  Kekuatan umum : Pasien nampak lemah  Cara berjalan : pasien tidak dapat berjalan karena post-op debridement pada kaki kanan pasien  Rom : Aktif pada ekstremitas atas  Hasil kultur, pemeriksaan system imun : -</p>
<b>Masalah keperawatan : -</b>	
<b>SEKSUALITAS</b>	
<p>Aktif melakukan hubungan seksual :  ( ) Tidak ( ) Ya  Penggunaan kondom  Masalah-masalah/kesulitan seksual  Perubahan terakhir dalam frekuensi/minat.  <b>Wanita</b>  Usia menarke : -Thn,  lamanya siklus : - hari  Durasi : -</p>	<p><b>Pria</b>  Rabes Penis : -  Gangguan Prostat : -  Sirkumsisi : ( ) Tidak (√) Ya  Vasektomi : ( ) Tidak ( ) Ya  Melakukan pemeriksaan sendiri : -  Payudara/testis : -  Prostoskopi/pemeriksaan Prostat terakhir : -  <b>Tanda ( Obyektif)</b></p>

Periode menstruasi terakhir : - Menopause : - Rabas vagina : - Perdarahan antar periode : -	Pemeriksaan ; - Payudara/Penis/Testis : - Kulit genetalia/Lest : -
Masalah Keperawatan : -	
<b>KESEIMBANGAN &amp; PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA INTERAKSI SOSIAL</b>	
Lama perkawinan : 8 tahun, hidup dengan : kedua anaknya Masalah-masalah kesehatan/stress : Pasien mengatakan cemas dengan kondisi kesehatannya sekarang Cara mengatasi stress : pasien hanya bercerita dengan keluarganya Orang Pendukung Lain : Istri, anaknya dan keluarga besarnya Peran Dalam Struktur Keluarga : Kepala keluarga Masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit/kondisi : - Psikologis : ( ) Tak ( ) gelisah (√) Takut (√) Sedih ( ) Rendah diri ( ) Hiperaktif ( ) Acuh tak acuh ( ) Marah ( ) Mudah Tersinggung ( ) Merasa Kurang sempurna ( ) Eurofik ( ) Tidak Sabar Keputusan : pasien mengatakan tidak mengalami keputusan selama dirawat Ketidakberdayaan : - Lain-lain : -	Sosiologis : ( ) tidak ( ) menarik diri (√) komunikasi lancar ( ) komunikasi tidak lancar ( ) afasia ( ) isolasi diri ( ) amuk Perubahan bicara : - Adanya laringektomi : - Komunikasi verbal/nonverbal dengan keluarga/orang terdekat lain : komunikasi verbal Spiritual : ( ) Tak (√) Dibantu dalam beribadah ( ) Spiritual distress Kegiatan keagamaan : - Gaya hidup : - Perubahan terakhir : - Lain- lain : -
Masalah keperawatan : -	
<b>PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN</b>	
1. Bahasa dominan (khusus) : Indonesia Ô Buta huruf : Ô Ketidakmampuan belajar khusus : Ô Keterbatasan kognitif Informasi yang telah disampaikan : Ô Pengaturan jam besuk Ô Hak dan kewajiban klien Ô Tim/petugas yang merawat Ô lain-lain :	

2. Masalah yang telah dijelaskan :

Ô Perawatan diri di rumah sakit

Ô Obat-obatan yang diberikan

Ô lain-lain :

Obat yang diresepkan (lingkari dosis yang terakhir)

Obat	Dosis	Rute	Jadwal Pemberian
Ceftriaxone	1x2 gr	IV	Setiap 12 jam
Lasix	2x40 mg	IV	Setiap 12 jam
Omeprazole	40 mg	IV	Setiap 12 jam

Riwayat pengobatan, obat tanpa resep / obat-obatan bebas : -

Obat-obatan jalanan / jamu : -

Pemeriksaan fisik lengkap terakhir :

Factor resiko keluarga (tandai hubungan) : -

Ô Diabetes mellitus

Ô Tuberculosis

Ô Penyakit jantung

Ô Stroke

Ô TD tinggi


Ô Epilepsy

Ô Penyakit ginjal

Ô Kanker

Ô Penyakit jiwa

#### DATA GENOGRAM



Keterangan :



: Laki-Laki



: Perempuan



: Garis Pernikahan



: Meninggal



: Pasien



: Garis Keturunan

G1 : Pasien mengatakan bapaknya sudah meninggal dan ibunya masih hidup, kedua ibu dan bapak dari istrinya juga masih hidup dan tidak ada yang

mengalami penyakit menular dan menurun

G2 : Pasien mengatakan dia anak pertama dari 6 bersaudara dan hanya dia yang mengalami penyakit Syok Sepsis dan DM, istrinya juga mengatakan dia anak ke 2 dari 4 bersaudara dan hanya dia yang mengalami penyakit DM

G3 : Pasien mengatakan memiliki dua anak, yang pertama laki-laki berumur 14 tahun dan yang kedua perempuan berumur 10 tahun, keduanya tidak mengalami penyakit menular dan turunan.


**DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG  
(DIAGNOSTIK & LABORATORIUM)**

- Laboratorium / 16 November 2022

PEMERIKSAAN	Hasil	Nilai Rujukan	Satuan
HEMATOLOGI Hematologi Rutin			
WBC	14.5	4.00 - 10.0	10 <sup>3</sup> /ul
RBC	5.39	4.00 - 6.00	10 <sup>6</sup> /ul
HGB	15.8	12.0 - 16.0	gr/dl
HCT	48	37.0 - 48.0	%
MCV	89	80.0 - 97.0	fL
MCH	29	26.5 - 33.5	pg
MCHC	3	31.5 - 35.0	gr/dl
PLT	231	150 - 400	10 <sup>3</sup> /ul
RDW-SD		37.0 - 54.0	fL
RDW-SV	15.7	10.0 - 15.0	
PDW	10.2	10.0 - 18.0	fL
MPV	9.9	6.50-11.0	fL
Koagulasi			
PT	16.4	10-14	detik
INR	1.58	-	
APTT	41.0	22.0 - 30.0	detik
KIMIA DARAH			
Glukosa			
GDS	109	140	mg/dl
Gula Puasa Strip	138	110	mg/dl

- USG Whole Abdomen
  - Kesan : - Hepatomegaly disertai fatty liver grade 2
  - Organ-organ intraabdominal lainnya dalam batas normal
- Foto Thoraks PA/AP
  - Kesan : - Pneumonia bilateral (dibandingkan foto thorax tgl 14/11/2022, kesan : St.QA)
  - Dilatatio aortae
  - Efusi minimal pleura kiri
- Echocardiogram Report
  - Conclusion :


- a. Normal LV Systolic Function, EF 53% (BIPLANE)
- b. Normal RV Systolic Function, TAPSE 2.0 cm
- c. Normal Cardiac Valves
- d. Normal Cardiac Chambers
- e. Global Normoinetic
- f. Normal LV Diastolic Function
- Pemeriksaan HbA1c : 10
- Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) : 7 mg
- Hasil Pemeriksaan EKG



**Tabel 4.1 Pengkajian Keperawatan**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

## PATOLOGISIOLOGI & PENYIMPANGAN KDM



### KLASIFIKASI DATA

Data Subjektif	Data Objektif
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja</li> <li>- Pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi</li> <li>- P : nyeri timbul saat digerakkan</li> <li>- Q : nyeri tertusuk-tusuk</li> <li>- R : nyeri dibagian kaki sebelah kiri</li> <li>- S : 4</li> <li>- T : hilang timbul</li> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan pola tidurnya kurang nyenyak semenjak operasi, pasien hanya tidur sekitar 1 jam kemudian terbangun lagi</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> <li>- Pasien mengatakan sering terjaga saat tidur</li> <li>- Pasien mengatakan awalnya kakinya mengalami bintik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya</li> <li>- Pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> <li>- Pasien nampak sesekali meringis</li> <li>- Pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring</li> <li>- Tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien</li> <li>- Tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>- TD : 125/85 mmHg</li> <li>- N : 112x/menit</li> <li>- RR : 24x/menit</li> <li>- S : 36,5°C</li> <li>- Pola napas cepat dan dalam</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> <li>- Dilatatio aortae</li> <li>- Efusi minimal pleura kiri</li> <li>- GDS : 109</li> <li>- Pemeriksaan HbA1c : 10</li> <li>- Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) : 7 mg</li> </ul>

Tabel 4.2 Klasifikasi Data

### KATEGORISASI DATA

Kategorisasi dan Sub Kategorisasi		Data Subjektif dan Objektif
Fisiologis	Respirasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja</li> <li>- Pola napas cepat dan dalam</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> <li>- Efusi minimal pleura kiri</li> </ul>
	Sirkulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilatatio aortae</li> <li>- GDS : 109</li> <li>- Pemeriksaan HbA1c : 10</li> <li>- Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) : 7 mg</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>
	Nutrisi dan Cairan	-
	Eliminasi	-
	Aktivitas dan Istirahat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan pola tidurnya kurang nyenyak semenjak operasi, pasien hanya tidur sekitar 1 jam kemudian terbangun lagi</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> <li>- Pasien mengatakan sering terjaga saat tidur</li> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> </ul>
	Neurosensory	-
	Reproduksi dan Seksualitas	-
Psikologis	Nyeri dan Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi</li> <li>- P : nyeri timbul saat digerakkan</li> <li>- Q : nyeri tertusuk-tusuk</li> <li>- R : nyeri dibagian kaki sebelah kiri</li> <li>- S : 4</li> <li>- T : hilang timbul</li> <li>- Pasien nampak sesekali meringis</li> </ul>
	Integritas Ego	-
	Pertumbuhan dan Perkembangan	46 tahun
Perilaku	Kebersihan Diri	- Pasien mengatakan selama di rumah sakit tidak pernah mandi dan tidak pernah gosok gigi
	Penyuluhan dan Pembelajaran	-
Relasional	Interaksi Sosial	-
Lingkungan	Keamanan dan	- Pasien mengatakan awalnya kakinya

	Proteksi	<p>mengalami bintik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah</li> <li>- Pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring</li> <li>- Tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien</li> <li>- Tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien</li> </ul>
--	----------	--

Tabel 4.3 Kategorisasi Data

## ANALISIS DATA

No	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi</li> <li>- P : nyeri timbul saat digerakkan</li> <li>Q : nyeri tertusuk-tusuk</li> <li>R : nyeri dibagian kaki sebelah kiri</li> <li>S : 4</li> <li>T : hilang timbul</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak sesekali meringis</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>	<p>Prosedur Pembedahan (Debridement)</p> <p>↓</p> <p>Terdapat luka hasil insisi di area</p> <p>↓</p> <p>ekstremitas bawah sebelah kanan</p> <p>↓</p> <p>Timbul</p> <p>pendarahan dan jaringan terbuka</p> <p>↓</p> <p>Stimulasi serabut saraf pada area perlukaan</p> <p>↓</p> <p>Merangsang mediator nyeri</p> <p>↓</p> <p>Nyeri Akut</p>	Nyeri Akut
2	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola napas cepat dan dalam</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> </ul>	<p>Pneumonia Bilateral</p> <p>↓</p> <p>Infeksi saluran pernapasan</p>	Pola Nafas Tidak Efektif

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efusi minimal pleura kiri</li> <li>- Dilatatio aortae</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Edema paru</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pengerasan dinding paru</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Suplai O<sub>2</sub> menurun</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hiperpentilasi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Dipsnea</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Retraksi dada/nafas cuping hidung</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pola Napas Tidak Efektif</p>	
3	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Prosedur Pembedahan (Debridement)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Luka insisi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Terjadinya kontinuitas jaringan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Pelepasan zat bradykinin, histamin, dan prostaglandin</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menyampaikan ke hipotalamus</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Nyeri</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Kelemahan fisik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gangguan Mobilitas</p>	Gangguan Mobilitas Fisik
4	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan awalnya</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Kondisi patologis</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Gangguan Integrasi

<p>kakinya mengalami bitnik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bitnik-bintik merah di kakinya semakin parah</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring</li> <li>- Tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien</li> <li>- Tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien</li> <li>- GDS : 109</li> <li>- Pemeriksaan HbA1c : 10</li> <li>- Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) : 7 mg</li> <li>- Tanda - tanda vital TD : 125/85 mmHg N : 112x/menit RR : 24x/menit S : 36,5°C</li> </ul>	<p>Post Operasi Debridement</p> <p>↓</p> <p>Perubahan jaringan sekitar</p> <p>↓</p> <p>Nekrotik</p> <p>↓</p> <p>Terjadi perubahan pigmentasi kulit</p> <p>↓</p> <p>Gangguan Integritas Kulit dan Jaringan</p>	<p>Kulit/Jaringan</p>
---	---	-----------------------

**Tabel 4.4 Analisis Data**

## B. PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH KEPERAWATAN

No.	Diagnosis Keperawatan
1	<p>Nyeri Akut b.d Agen Pencedera Fisik (Prosedur Operasi) d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi</li> <li>- P : nyeri timbul saat digerakkan</li> <li>Q : nyeri tertusuk-tusuk</li> <li>R : nyeri dibagian kaki sebelah kiri</li> <li>S : 4</li> <li>T : hilang timbul</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak sesekali meringis</li> <li>- Tanda – tanda vital TD : 125/85 mmHg N : 112x/menit RR : 24x/menit</li> </ul>

	S : 36,5°C
2	<p>Pola Nafas Tidak Efektif b.d Hambatan Upaya Napas d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola napas cepat dan dalam</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> <li>- Efusi minimal pleura kiri</li> <li>- Dilatatio aortae</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>
3	<p>Gangguan Mobilitas Fisik b.d Nyeri d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>
4	<p>Gangguan Integrasi Kulit/Jaringan b.d Kurang Terpapar Informasi Tentang Upaya Mempertahankan/Melindungi Integritas Jaringan d.d :</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan awalnya kakinya mengalami bintik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya</li> <li>- Pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring</li> <li>- Tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien</li> <li>- Tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien</li> <li>- GDS = 109</li> <li>- Pemeriksaan HbA1c = 10</li> <li>- Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) = 7 mg</li> <li>- Tanda - tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>

**Tabel 4.5 Perumusan Prioritas Masalah Keperawatan**

### C. Intervensi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Tujuan dan Kriteria Hasil	Intervensi	Rasional
1	<p>Nyeri Akut b.d Agen Pencedera Fisik (Prosedur Operasi) d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi</li> <li>- P : kaki sebelah kiri Post-op Syok Sepsis</li> <li>Q : nyeri tertusuk-tusuk</li> <li>R : nyeri dibagian kaki sebelah kiri</li> <li>S : 4</li> <li>T : hilang timbul</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien nampak sesekali meringis</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> <li>TD : 125/85 mmHg</li> <li>N : 112x/menit</li> <li>RR : 24x/menit</li> <li>S : 36,5°C</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan tingkat nyeri menurun dari rentang 3-5, dengan kriteria hasil :</p> <p>1. Keluhan nyeri menurun dari 3-2</p>	<p>Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>b) Identifikasi skala nyeri</li> <li>c) Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi dengan menonton vidio )</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri</li> <li>- Untuk mengetahui skala nyeri</li> <li>- Untuk mengetahui bagaimana efek samping dari analgetic yang di konsumsi</li> <li>- Tehnik untuk mengurasi rasa nyeri pasien dengan cara nonfarmakologis yaitu terapi distraksi dengan menonton vidio</li> <li>- Supaya pasien mengerti penyebab, periode dan pemicu nyeri</li> </ul>

2	<p>Pola Nafas Tidak Efektif b.d Hambatan Upaya Napas d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pola napas cepat dan dalam</li> <li>- Pneumonia bilateral</li> <li>- Efusi minimal pleura kiri</li> <li>- Dilatatio aortae</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> </ul> <p>TD : 125/85 mmHg N : 112x/menit RR : 24x/menit S : 36,5°C</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan Pola Napas membaik dari rentang 3-5, dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi napas membaik dari 3-5</li> <li>2. Dispnea menurun dari 3-5</li> </ol>	<p>Pemantauan Respirasi (I.01014)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Observasi</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Monitor pola napas</li> <li>b) Monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>c) Monitor saturasi oksigen</li> </ol> </li> <li>2) <i>Terapeutik</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumentasi hasil pemantauan</li> </ol> </li> <li>3) <i>Edukasi</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan prosedur pemantauan</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui pola napas pasien</li> <li>- Untuk mengetahui adanya sumbatan jalan napas pasien</li> <li>- Untuk mengetahui saturasi oksigen pasien</li> <li>- Untuk memantau hasil pemantauan</li> <li>- Membantu pasien mengetahui tujuan dan prosedur pemantauan</li> </ul>
3	<p>Gangguan Mobilitas Fisik b.d Nyeri d.d:</p> <p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas</li> <li>- Pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien</li> </ul> <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya</li> <li>- Tanda – tanda vital</li> </ul>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan Mobilitas Fisik meningkat dari rentang 3-5, dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergerakan ekstremitas meningkat dari 3-5</li> <li>2. Rentang gerak</li> </ol>	<p>Dukungan Mobilisasi (I.05173)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Observasi</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>b) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi</li> </ol> </li> <li>2) <i>Terapeutik</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ol> </li> <li>3) <i>Edukasi</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan dan</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>- Untuk mengetahui perkembangan kondisi pasien selama melakukan mobilisasi</li> <li>- Supaya pasien aman ketika melakukan pergerakan dan ada yang bisa memantau</li> <li>- Agar pasien dan keluarganya tau tujuan</li> </ul>

	<p>TD : 125/85 mmHg  N : 112x/menit  RR : 24x/menit  S : 36,5°C</p>	<p>(ROM)  meningkat dari 3-5</p>	<p>prosedur mobilisasi</p>	<p>dari mobilisasi</p>
4	<p>Gangguan Integritas Kulit/Jaringan b.d Kurang Terpapar Informasi Tentang Upaya Mempertahankan / Melindungi Integritas Jaringan d.d:  DS :  - Pasien mengatakan awalnya kakinya mengalami bitnik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya  - Pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah  DO :  - Pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring  - Tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien  - Tampak edema pada sekitar</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan Integritas Kulit dan Jaringan Meningkat dari rentang 3-5 dengan kriteria hasil :  1. kerusakan lapisan kulit menurun dari 3-5</p>	<p>Perawatan Luka (I.14564)  1) <i>Observasi</i>  a) Monitor karakteristik luka (adanya edema, warna kemerahan)  2) <i>Terapeutik</i>  a) Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien  3) <i>Edukasi</i>  a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi  b) Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk mengetahui penyebab gangguan integritas kulit pada pasien</li> <li>- Untuk menjaga agar pasien tidak mengalami keram otot</li> <li>- Untuk melembapkan kulit pasien</li> <li>- Supaya kelembapan kulit pasien terjaga</li> <li>- Supaya asupan nutrisi pasien tetap terjaga selama pasien sakit</li> </ul>

luka post-op debridement pasien - GDS = 109 - Pemeriksaan HbA1c = 10 - Pemeriksaan Procalcitonin (PJT) = 7 mg - Tanda - tanda vital TD : 125/85 mmHg N : 112x/menit RR : 24x/menit S : 36,5°C			
---	--	--	--

**Tabel 4.6 Intervensi Keperawatan**  
(SDKI, 2016)(SLKI, 2018)(SIKI, 2018)

#### D. Implementasi Keperawatan

Inisial klien : Tn. N  
 No. RM : 999431

Ruangan : CVCU  
 Dx. Medis : ADHF (*Acute Decompensated Heart Failure*)

No	DX. Kep	Waktu	Implementasi Tindakan Keperawatan	Nama Jelas
1	Nyeri Akut	14 November 2022 / 15.00 Wita	1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : pasien memahami lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi dan intensitas nyeri 2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri pasien 4 (NRS) sebelum dilakukan distraksi 3. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : pasien tidak mengalami efek samping dari penggunaan analgetik 4. Memberikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>nyeri (terapi distraksi dengan menonton video )          Hasil : pasien diberikan terapi distraksi dengan cara menonton video di youtube, pasien menonton beberapa video memancing ikan sampai rasa nyeri pasien dapat dialihkan</p> <p>5. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri          Hasil : pasien mengerti dengan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p>	
2	Pola Nafas Tidak Efektif	14 November 2022 / 15.10 Wita	<p>1. Memonitor pola napas          Hasil : pola napas pasien belum normal, pola napas pasien cepat dan dalam, saat ini pasien terpasang oksigen 3 liter/menit dengan canul nasal</p> <p>2. Memonitor adanya sumbatan jalan napas          Hasil : tidak terdapat sumbatan pada jalan napas</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen          Hasil : saturasi oksigen dan tanda-tanda vital pasien di pantau</p> <p>4. Mendokumentasi hasil pemantauan          Hasil : dokumentasi hasil pemantauan, TD : 143/102, Nadi : 97x/mnt, Rr : 24x/mnt, suhu : 36,7 °C, Saturasi O<sub>2</sub> 95%</p> <p>5. Menjelaskan tujuan prosedur pemantauan          Hasil : pasien dan keluarga paham dengan tujuan pemantauan</p>	Rahmat Rasyid Siagian
3	Gangguan Mobilitas Fisik	14 November 2022 / 15.15 Wita	<p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya          Hasil : pasien menunjukkan tanda-tanda nyeri setelah dilakukan ROM pada ekstremitas bawahnya</p> <p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan          Hasil : pasien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sebelah kanannya</p> <p>3. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>Hasil : keluarga pasien membantu pasien melakukan ROM pasif pada ekstremitas bawah sebelah kanan pasien</p> <p>4. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : pasien dan keluarga pasien paham mengenai tujuan dan prosedur mobilisasi secara pasif</p>	
4	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	14 November 2022 / 15.20 Wita	<p>1. Memonitor karakteristik luka (adanya edema, warna) Hasil : terdapat edema pada sekitar luka post-operasi pasien dan warna kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien yang di balut elastis perban</p> <p>2. Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Hasil : pasien dijadwalkan untuk mengubah posisinya setiap 2 jam untuk merilexkan otot dan sendi pasien selama tirah baring di tempat tidur</p> <p>3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : pasien dan keluarga pasien dijelaskan mengenai tanda dan gejala infeksi, seperti munculnya nanah, luka terasa nyeri, dan terjadi pembengkakan</p> <p>4. Menganjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein Hasil : pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasien selama sakit</p>	Rahmat Rasyid Siagian
5	Nyeri Akut	15 November 2022 / 14.10 Wita	<p>1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : keluarga pasien memahami lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi dan intensitas nyeri</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri pasien 3 (NRS) sebelum dilakukan distraksi</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>3. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : pasien tidak mengalami efek samping dari penggunaan analgetik</p> <p>4. Memberikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi menonton video) Hasil : pasien diberikan terapi distraksi dengan cara menonton video yang pasien sukai di youtube, pasien menonton video memancing ikan, karena pasien suka memancing ikan ketika pasien masih sehat</p> <p>5. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil : pasien dan keluarga pasien mengerti dengan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p>	
6	Pola Nafas Tidak Efektif	15 November 2022 / 14.15 Wita	<p>1. Memonitor pola napas Hasil : pola napas pasien belum normal, pola napas pasien cepat dan dalam, saat ini pasien terpasang oksigen 3 liter/menit dengan canul nasal</p> <p>2. Memonitor adanya sumbatan jalan napas Hasil : tidak terdapat sumbatan pada jalan napas</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen Hasil : saturasi oksigen dan tanda-tanda vital pasien di pantau</p> <p>4. Mendokumentasi hasil pemantauan Hasil : dokumentasi hasil pemantauan TD : 130/95, Nadi : 90x/mnt, Rr : 24x/mnt, suhu : 36,7°C, Saturasi O2 95%</p> <p>5. Menjelaskan tujuan prosedur pemantuan Hasil : pasien dan keluarga paham dengan tujuan pemantauan</p>	Rahmat Rasyid Siagian
7	Gangguan Mobilitas Fisik	15 November 2022 / 14.20 Wita	<p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : pasien menunjukkan tanda-tanda nyeri setelah dilakukan ROM pada ekstremitas bawahnya</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : pasien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sebelah kanannya</p> <p>3. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga pasien membantu pasien melakukan ROM pasif pada ekstremitas bawah sebelah kanan pasien</p> <p>4. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : keluarga pasien paham mengenai tujuan dan prosedur mobilisasi secara pasif</p>	
8	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	15 November 2022 / 14.25 Wita	<p>1. Memonitor karakteristik luka (adanya edema, warna) Hasil : terdapat edema pada sekitar luka post-operasi pasien dan warna kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien yang di balut elastis perban</p> <p>2. Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Hasil : pasien dijadwalkan untuk mengubah posisinya setiap 2 jam untuk merilexkan otot dan sendi pasien selama tirah baring di tempat tidur</p> <p>3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : pasien dan keluarga pasien dijelaskan mengenai tanda dan gejala infeksi, seperti munculnya nanah, luka terasa nyeri, dan terjadi pembengkakan</p> <p>4. Menganjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein Hasil : pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasien selama sakit</p>	Rahmat Rasyid Siagian
9	Nyeri Akut	16 November	1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas,	Rahmat Rasyid

		2022 / 21.10 Wita	<p>intensitas nyeri Hasil : pasien dan keluarga pasien memahami lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi dan intensitas nyeri yang dialami pasien</p> <p>2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : Skala nyeri 2 (NRS) diberikan distraksi menonton video yang pasien sukai di youtube melalui handphone</p> <p>3. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : pasien tidak mengalami efek samping dari penggunaan analgetik yang diberikan</p> <p>4. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi dengan menonton video ) Hasil : pasien diberikan terapi distraksi dengan cara menonton video yang pasien sukai di youtube, pasien menonton video memancing ikan di sungai, karena pasien suka memancing ketika pasien masih sehat, pasien sangat menikmati saat pasien diberikan distraksi untuk mengalihkan rasa nyeri yang pasien alami</p> <p>5. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri Hasil : pasien dan keluarga pasien mengerti dengan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p>	Siagian
10	Pola Napas Tidak Efektif	16 November 2022 / 21.15 Wita	<p>1. Memonitor pola napas Hasil : pola napas pasien belum normal, pola napas pasien cepat dan dalam, saat ini pasien terpasang oksigen 3 liter/menit dengan canul nasal</p> <p>2. Memonitor adanya sumbatan jalan napas Hasil : tidak terdapat sumbatan pada jalan napas</p> <p>3. Memonitor saturasi oksigen</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>Hasil : saturasi oksigen dan tanda-tanda vital pasien di pantau</p> <p>4. Mendokumentasi hasil pemantauan Hasil : dokumentasi hasil pemantauan TD : 143/102, Nadi : 97x/mnt, Rr : 26x/mnt, suhu : 36,7<sup>0</sup> C, Saturasi O2 98%</p> <p>5. Menjelaskan tujuan prosedur pemantuan Hasil : pasien dan keluarga paham dengan tujuan pemantauan</p>	
11	Gangguan Mobilitas Fisik	16 November 2022 / 21.20 Wita	<p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya Hasil : pasien menunjukkan tanda-tanda nyeri setelah dilakukan ROM pada ekstremitas bawahnya</p> <p>2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan Hasil : pasien hanya mampu menggerakkan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sebelah kanannya</p> <p>3. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan Hasil : keluarga pasien membantu pasien melakukan ROM pasif pada ekstremitas bawah sebelah kanan pasien</p> <p>4. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : keluarga pasien paham mengenai tujuan dan prosedur mobilisasi secara pasif</p>	Rahmat Rasyid Siagian
12	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	16 November 2022 / 21.25 Wita	<p>1. Memonitor karakteristik luka (adanya edema, warna) Hasil : terdapat edema pada sekitar luka post-operasi pasien dan warna kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien yang di balut elastis perban</p> <p>2. Menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien Hasil : pasien dijadwalkan untuk mengubah posisinya setiap 2 jam untuk merilexkan otot dan sendi pasien selama tirah baring di tempat tidur</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>3. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi          Hasil : pasien dan keluarga pasien dijelaskan mengenai tanda dan gejala infeksi, seperti munculnya nanah, luka terasa nyeri, dan terjadi pembengkakan</p> <p>4. Mengajarkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein          Hasil : pasien dianjurkan untuk mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein untuk mempercepat proses penyembuhan luka pasien selama sakit</p>	
--	--	--	--	--

**Tabel 4.7 Implementasi Keperawatan**

### E. Evaluasi Keperawatan

Hari/tanggal	Diagnosis	Waktu	Evaluasi (SOAP/SOAPIER)	Nama Jelas
Senin, 14 November 2022	Nyeri Akut	20.40 Wita	<p>S : pasien mengatakan sering merasakan nyeri di kaki sebelah kiri pasien (post-op debridement), pasien mengatakan nyeri di kakinya sedikit berkurang ketika di berikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube</p> <p>O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien tampak sesekali meringis kesakitan ketika sprengi pasien diganti dan kaki pasien diangkat, skala nyeri pasien 4 (NRS), pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, kondisi pasien masih lemah</p> <p>A : masalah nyeri sedikit teratasi ketika diberikan distraksi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <p>a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Identifikasi skala nyeri</li> <li>c) Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi dengan nonton vidio )</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> </ul>	
Senin, 14 November 2022	Pola Napas Tidak Efektif	20.45 Wita	<p>S : pasien mengatakan sesekali sesak selama di rumah sakit,  O : Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 97x/mnt, Rr : 24x/mnt, suhu : 36,7 °C, Saturasi O<sub>2</sub> 95%  A : Masalah Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi  P : Lanjutkan Intervensi Pemantauan Respirasi (I.01014)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitor pola napas</li> <li>b) Monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>c) Monitor saturasi oksigen</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumentasi hasil pemantauan</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan prosedur pemantuan</li> </ul>	Rahmat Rasyid Siagian
Senin, 14 November 2022	Gangguan Mobilitas Fisik	20.50 Wita	<p>S : mobilitas fisik pasien masih terbatas  O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih belum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement)  A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi  P : Pertahankan Intervensi Dukungan Mobilisasi (I.05173)</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>1) <i>Observasi</i></p> <p>a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</p> <p>b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</p> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <p>a) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <p>a) Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi</p>	
Senin, 14 November 2022	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	20.55 Wita	<p>S : pasien masih mengeluh gatal pada kedua kakinya</p> <p>O : pasien sesekali menggaruk kedua kaki pasien yang mengalami Selulitis, kedua kulit kaki pasien masih banyak terdapat bintik-bintik merah, terjadi edema pada daerah sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien</p> <p>A : masalah Gangguan Integritas Kulit/Jaringan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi Perawatan Luka (I.14564)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <p>a) Monitor karakteristik luka (adanya edema, warna kemerahan)</p> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <p>a) Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien</p> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <p>a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>b) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein</p>	Rahmat Rasyid Siagian
Selasa, 15	Nyeri Akut	20.30 Wita	S : pasien mengatakan sering merasakan nyeri di kaki sebelah	Rahmat Rasyid

November 2022			<p>kiri pasien (post-op debridement), pasien mengatakan nyeri di kakinya sudah mulai berkurang ketika di berikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube</p> <p>O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, skala nyeri pasien berkurang setelah diberikan distraksi menjadi skala 3 (NRS), pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, pasien nampak menikmati distraksi yang diberikan, kondisi pasien masih lemah</p> <p>A : masalah nyeri sedikit teratasi saat diberikan distraksi</p> <p>P : pertahankan Intervensi Manajemen Nyeri (I.08238)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>b) Identifikasi skala nyeri</li> <li>c) Monitor efek samping penggunaan analgetik</li> </ol> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Berikan tehnik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi dengan menonton vidio )</li> </ol> <p>b) <i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</li> </ol>	Siagian
Selasa, 15 November 2022	Pola Nafas Tidak Efektif	20.35 Wita	<p>S : pasien mengatakan masih mengalami sesak</p> <p>O : Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 90x/mnt, Rr : 20x/mnt, suhu : 36,4 °C, Saturasi O<sub>2</sub> 97%</p> <p>A : Masalah Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi Pemantauan Respirasi (I.01014)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitor pola napas</li> <li>b) Monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>c) Monitor saturasi oksigen</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumentasi hasil pemantauan</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan prosedur pemantauan</li> </ul>	
Selasa, 15 November 2022	Gangguan Mobilitas Fisik	20.40 Wita	<p>S : pasien mengatakan belum bisa banyak melakukan pergerakan</p> <p>O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih belum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement)</p> <p>A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : Tetap Pertahankan Intervensi Dukungan Mobilisasi (I.05173)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi</li> </ul>	Rahmat Rasyid Siagian
Selasa, 15 November 2022	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	20.45 Wita	<p>S : pasien masih mengeluh gatal pada kedua kakinya</p> <p>O : pasien sesekali menggaruk kedua kaki pasien yang mengalami Selulitis, kedua kulit kaki pasien masih banyak terdapat bintik-bintik merah, terjadi edema pada daerah</p>	Rahmat Rasyid Siagian

			<p>sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien</p> <p>A : masalah Gangguan Integritas Kulit/Jaringan belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi Perawatan Luka (I.14564)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <p>a) Monitor karakteristik luka (adanya edema, warna kemerahan)</p> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <p>a) Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien</p> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <p>a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi</p> <p>b) Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein</p>	
Kamis, 17 November 2022	Nyeri Akut	07.00 Wita	<p>S : pasien mengatakan sering merasakan nyeri di kaki sebelah kiri pasien (post-op debridement), pasien mengatakan nyeri di kakinya sudah berkurang ketika di berikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, pasien menonton menggunakan handpone pasien</p> <p>O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, skala nyeri pasien 2 (NRS) saat dan setelah diberikannya distraksi vidio menonton orang memancing ikan di youtube, pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube,</p> <p>A : masalah nyeri teratasi setelah pasien diberikan distraksi</p> <p>P : hentikan Intervensi Manajemen Nyeri (I.08238)</p>	Rahmat Rasyid Siagian
Kamis, 17	Pola Napas	07.05 Wita	<p>S : pasien mengatakan masih mengalami sesak</p>	Rahmat Rasyid

November 2022	Tidak Efektif		<p>O : Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 90x/mnt, Rr : 22x/mnt, suhu : 36,2 °C, Saturasi O<sub>2</sub> 90%</p> <p>A : Masalah Pola Napas Tidak Efektif belum teratasi</p> <p>P : Pertahankan Intervensi Pemantauan Respirasi (I.01014)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Monitor pola napas</li> <li>b) Monitor adanya sumbatan jalan napas</li> <li>c) Monitor saturasi oksigen</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumentasi hasil pemantauan</li> </ul> <p>3) <i>Edukasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jelaskan tujuan prosedur pemantuan</li> </ul>	Siagian
Kamis, 17 November 2022	Gangguan Mobilitas Fisik	07.10 Wita	<p>S : pasien mengatakan sudah mulai menggerak-gerakkan ekstremitas atasnya</p> <p>O : pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih blum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement)</p> <p>A : gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P : Tetap Pertahankan Intervensi Dukungan Mobilisasi (I.05173)</p> <p>1) <i>Observasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</li> <li>b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan</li> </ul> <p>2) <i>Terapeutik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</li> </ul>	Rahmat Rasyid Siagian

			3) <i>Edukasi</i> a) Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi	
Kamis, 17 November 2022	Gangguan Integritas Kulit/Jaringan	07.15 Wita	<p>S : pasien masih mengeluhkan gatal pada kedua kakinya  O : pasien masih sesekali menggaruk kedua kakinya yang mengalami Selulitis, kedua kulit kaki pasien masih banyak terdapat bintik-bintik merah, masih terdapat edema pada daerah sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien  A : masalah Gangguan Integritas Kulit/Jaringan belum teratasi  P : Lanjutkan Intervensi Perawatan Luka (I.14564)</p> <p>1) <i>Observasi</i>  a) Monitor karakteristik luka (adanya edema, warna kemerahan)</p> <p>2) <i>Terapeutik</i>  a) Jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien</p> <p>3) <i>Edukasi</i>  a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi  b) Anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein</p>	Rahmat Rasyid Siagian

Tabel 4.8 Evaluasi Keperawatan

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Analisa Asuhan Keperawatan

##### 1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Pada laporan kasus ini, penulis melakukan pengkajian pada pasien di ruang HCU CVCU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Pengkajian keperawatan merupakan suatu proses keperawatan yang dilakukan setelah membina hubungan antara perawat dan pasien. Pengkajian keperawatan merupakan pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dialami pasien mengenai mental sosial dan lingkungannya (Supratti & Ashriady, 2016). Proses pengkajian keperawatan merupakan tahap pertama yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data individu secara komprehensif terkait aspek biologis, psikologis, sosial maupun spiritual (Ulina et al., 2020). Pengkajian dilakukan pada Tn. N, hari Senin, 14 November 2022.

Hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien mengalami ADHF (*Acute Decompensated Heart Failure*) dengan keluhan sesak nafas, pasien nampak lemah, dan tampak edema pada sekitaran luka post-op debridement di bagian kaki kiri pasien. Keluhan yang dirasakan pasien sesuai dengan teori menurut Brunner & Suddarth (2017) dalam Ramadhani (2020), bahwa pada pasien yang mengalami gagal jantung dapat berhubungan dengan ventrikel mana yang mengalami gangguan. Pada gangguan ventrikel kiri akan menimbulkan kongesti pulmonal berupa dyspnea/sesak nafas saat beraktifitas, keletihan sedangkan pada ventrikel kanan edema dan kelemahan. Hal tersebut menunjukkan manifestasi klinis yang dialami oleh pasien sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam teori.

Berdasarkan pada hasil pemeriksaan ditemukan masalah nyeri akut hal ini dipengaruhi oleh adanya edema disekitar luka post-operasi debridement pada kaki pasien dan terdapat juga bintik-bintik merah. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dan nyeri yang membuat pasien akan meringis kesakitan. Berdasarkan teori dalam Kurniawan (2015), disebutkan bahwa pada dasarnya nyeri adalah reaksi fisiologis karena reaksi protektif untuk menghindari stimulus yang membahayakan tubuh. Tetapi bila nyeri tetap berlangsung walaupun stimulus penyebab sudah tidak ada, berarti telah terjadi perubahan patofisiologis yang justru merugikan tubuh. Sebagai contoh, nyeri karena pembedahan, masih tetap dirasakan pada masa pasca bedah ketika pembedahan sudah selesai. Nyeri semacam ini tidak saja menimbulkan perasaan tidak nyaman, tetapi juga reaksi stres, yaitu rangkaian reaksi fisik maupun biologis yang dapat menghambat proses penyembuhan. Nyeri patologis atau nyeri klinik inilah yang membutuhkan terapi untuk penanganannya.

Kemudian berdasarkan pengkajian juga ditemukan masalah pola napas tidak efektif, hal ini sejalan dengan penelitian Yulianti & Munte (2022), yang menyatakan bahwa pasien dengan ADHF akan cenderung mengalami sesak. Adapun manifestasi yang dapat ditimbulkan pada pasien ADHF berdasarkan teori dalam Kemenkes RI (2021), antara lain sesak napas saat istirahat atau beraktivitas, jantung berdebar, batuk, ronkhi paru, efusi pleura, takikardi, dan takipneu. Hal ini membuktikan bahwa apa yang ditemukan pada pasien melalui proses pengkajian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh teori.

Hasil pengkajian juga menunjukkan adanya masalah gangguan mobilitas fisik pada pasien. Berdasarkan penelitian Saksono et al. (2022), gangguan mobilitas fisik dapat terjadi karena adanya penurunan kekuatan otot, kekakuan sendi, gangguan muskuloskeletal, dan nyeri. Hal ini diperkuat oleh teori dalam Narolita (2018), yang menyebutkan tanda dan gejala yang muncul pada pasien dengan

ADHF antara lain mudah lelah, edema ekstremitas bawah, hambatan dalam beraktivitas, hingga terjadi kelemahan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dialami pada pasien sejalan dengan teori yang ada.

Selain itu juga ditemukan masalah gangguan integritas kulit dan jaringan pada pasien, terdapat luka post-operasi debridement pada tungkai bawah, tampak edema, dan bintik kemerahan. Hal ini dikarenakan pada pasien ADHF cenderung akan mengalami edema pada ekstremitas bawah sesuai pada penelitian (Narolita, 2018). Berdasarkan teori yang dijelaskan dalam Sari & Musta'in (2021), bahwa seseorang dengan gangguan integritas kulit dan jaringan akan nampak lima tanda / gejala yaitu kerusakan jaringan dan/atau lapisan kulit, nyeri, perdarahan, kemerahan, dan hematoma. Teori tersebut sesuai dengan beberapa kondisi pasien saat dilakukan pengkajian.

## 2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah keputusan klinis mengenai seseorang, keluarga, atau masyarakat sebagai akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan merupakan penilaian klinis mengenai respon pasien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung aktual ataupun potensial (SDKI, 2016). Diagnosis keperawatan pada kasus Tn. N dari hasil pengkajian dan pemeriksaan fisik terhadap pasien didapatkan 4 masalah keperawatan yang dapat ditegakkan yaitu :

### a. Nyeri Akut b.d Agen Pencedera Fisik (Prosedur Operasi)

Nyeri Akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan (PPNI, 2017). Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiki (prosedur operasi). Berdasarkan buku SDKI (2016), diagnosis Nyeri Akut

dengan gejala/tanda mayor dan minornya yaitu mengeluh nyeri, tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur, tekanan darah meningkat, pola napas berubah, nafsu makan berubah, proses berfikir terganggu, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaphoresis. Pada hasil pengkajian didapatkan pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah dioperasi, P : nyeri timbul saat digerakkan, Q : nyeri tertusuk-tusuk, R: nyeri dibagian kaki rebelah kiri, S : Skala nyeri 4, T : Hilang timbul, pasien nampak sesekali meringis, tanda-tanda vital tekanan darah 135/96 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Nadi 63x/menit, suhu 36,7°C. Nyeri akut yang dialami oleh pasien merupakan suatu akibat dari tindakan operasi yang sudah dilakukan dan pengaruh dari obat anastesi yang hilang. Sejalan dengan penelitian Wati & Ernawati (2020), nyeri yang diakibatkan dari tindakan pembedahan merupakan suatu bifasik terhadap tubuh manusia yang berimplikasi pada pengelolaan nyeri.

b. Pola Nafas Tidak Efektif b.d Hambatan Upaya Napas

Pola nafas tidak efektif merupakan inspirasi/ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat (PPNI, 2017). Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, berdasarkan buku SDKI (2016), diagnosis pola nafas tidak efektif dengan gejala/tanda mayor dan minornya yaitu dyspnea, penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal (mis, takipnea, bradipnea, hiperventilasi, *cheyne-stokes*), ortopnea, pernapasan *pursed-lip*, pernapasan cuping hidung, diameter thoraks anterior-posterior meningkat, ventilasi semenit menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, ekskursi dada berubah. Pada hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja, pola nafas cepat dan dalam, pneumonia bilateral, efusi minimal pleura kiri, dilatation aortae, tekanan darah 135/96 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Nadi

63x/menit, suhu 36,7°C. pola nafas tidak efektif terjadi akibat kehilangan upaya dalam pemenuhan oksigen saat ekspirasi maupun inspirasi. Sesuai dengan penelitian Yulianti & Chanif (2021), pola napas tidak efektif terjadi karena ketidakmampuan jantung memompa darah keseluruh tubuh, sehingga suplai oksigen didalam tubuh tidak adekuat, kadar oksigen di dalam darah mempengaruhi saturasi oksigen, sehingga menyebabkan sesak nafas.

c. Gangguan Mobilitas Fisik b.d Nyeri

Gangguan mobilitas fisik adalah ketebatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri (PPNI, 2017). Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Berdasarkan buku SDKI (2016), diagnosis gangguan mobilitas fisik dengan tanda/gejala mayor dan minornya yaitu mengeluh sulit menggerakkan ekstremitasnya, kekuatan otot menurun, rentang gerak (ROM) menurun, nyeri saat bergerak, enggan melakukan pergerakan, merasa cemas saat bergerak, sendi kaku, gerakan tidak terkoordinasi, gerakan terbatas, fisik lemah. Pada hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan saat ini dia tidak dapat beraktifitas, pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat menggangu, saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya, tanda-tanda vital tekanan darah 135/96 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Nadi 63x/menit, suhu 36,7°C, tonus otot lemah, kekuatan otot 5/5. Gangguan mobilitas fisik terjadi akibat masalah fisiologis post-operasi debridement dan mengakibatkan nyeri sehingga pasien sulit untuk melakukan pergerakan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syokumawena et al. (2022), mobilisasi dini berpengaruh terhadap intensitas nyeri pasien pasca pembedahan ataupun post-operasi dengan general anastesi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Darmawan (2020), juga mengatakan nyeri yang dialami dari proses

pembedahan dapat mengganggu proses penyembuhan dan menghambat aktifitas pasien.

d. Gangguan Integritas Kulit/Jaringan b.d Kurang Terpapar Informasi Tentang Upaya Mempertahankan/Melindungi Integritas Jaringan

Gangguan integritas kulit/jaringan adalah kerusakan kulit (dermis dan epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan ligamen) (PPNI, 2017). Gangguan integritas kulit /jaringan b.d kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integritas jaringan dengan gejala/tanda mayor dan minor kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri, perdarahan, kemerahan, hematoma. Pada hasil pengkajian didapatkan pasien mengatakan awalnya kakinya mengalami bintik-bintik merah, pasien merasa gatal kemudian pasien selalu menggaruknya, pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah, pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring, tampak luka post-op debridement pada tungkai kiri kanan pasien, tampak edema pada sekitar luka post-operasi debridement pasien, GDS 109, pemeriksaan HbA1c 10, pemeriksaan procalcitonin (PJT) 7 mg, tanda-tanda vital tekanan darah 135/96 mmHg, Pernapasan 20x/menit, Nadi 63x/menit, suhu 36,7°C. Gangguan integritas kulit/jaringan yang dialami pasien terjadi karena kurusakan lapisan kulit (dermis dan epidermis) disebabkan karena prosedur pembedahan. Sejalan dengan penelitian Sari & Musta'in (2021), proses terjadinya gangguan integritas kulit/jaringan diakibatkan adanya proses pembedahan atau prosedur operasi pengangkatan jaringan sehingga terjadi pemotongan jaringan atau lapisan kulit (dermis dan epidermis).

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Intervensi yang diberikan kepada Tn.N meliputi observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi. Intervensi yang disusun

berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia oleh PPNI (2018) dengan memilih beberapa intervensi yang sesuai dengan kondisi pasien. Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis nyeri akut adalah manajemen nyeri dengan rencana tindakan keperawatan meliputi observasi : identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, monitor efek samping penggunaan analgetik. Terapeutik : berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (terapi distraksi dengan menonton video). Edukasi : jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri (SIKI, 2018).

Berdasarkan hasil pengkajian untuk diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif dilakukan intervensi keperawatan pemantauan respirasi dengan tindakan observasi : monitor pola nafas, monitor adanya sumbatan jalan napas, monitor saturasi oksigen. Terapeutik : dokumentasi hasil pemantauan. Edukasi : jelaskan tujuan prosedur pemantauan.

Intervensi keperawatan untuk diagnosis gangguan mobilitas fisik diberikan tindakan dukungan mobilisasi meliputi observasi : identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Terapeutik : libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasi : jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi

Intervensi keperawatan terakhir untuk diagnosis gangguan integritas kulit/jaringan diberikan tindakan perawatan luka meliputi observasi : monitor karakteristik luka (adanya edema, warna kemerahan). Terapeutik : jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien. Edukasi : jelaskan tanda dan gejala infeksi dan anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein.

#### 4. Analisis Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan pada Tn. N diberikan selama 3x 24 jam pada tanggal 14 sampai 17 November 2022 dengan melaksanakan

intervensi sesuai dengan kebutuhan pasien yaitu dengan memberikan manajemen nyeri, pemantauan respirasi, dukungan mobilisasi, dan perawatan luka. Implementasi dilaksanakan selama 3x shif dinas di ruang CVCU gedung PJT RSUP Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar.

Masalah nyeri akut yang pasien alami diberikan implementasi berupa tindakan terapi distraksi menonton video sesuai intervensi EBPN yang bertujuan untuk mengalihkan rasa nyeri yang dialami pasien. Berdasarkan penelitian Jacobson & James (2012) dalam Rahayu & Darmawan (2020), penggunaan metode nonfarmakologi untuk mengatasi masalah nyeri lebih mudah dan dapat dilakukan oleh perawat dengan menggunakan teknik distraksi. Salah satu distraksi yang dapat dilakukan dalam penatalaksanaan nyeri yaitu menonton video.

Pada masalah pola nafas tidak efektif, diberikan implementasi pemantauan respirasi sesuai dengan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, mulai dari memonitor pola napas, monitor adanya sumbatan jalan napas, monitor saturasi oksigen, dokumentasi hasil pemantauan dan menjelaskan tujuan dari proses pemantauan.

Pada gangguan mobilitas fisik diberikan implementasi berupa dukungan mobilisasi yang bertujuan untuk meningkatkan aktifitas pergerakan pasien terkhusus pada bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan, dilakukan dengan membantu dan mengarahkan pasien untuk merubah posisi berbaring miring ke kiri dan ke kanan secara bergantian setiap 2 jam, merubah posisi berbaring menjadi posisi duduk. Hal ini dapat mencegah komplikasi pneumonia, atropi otot dan luka tekan yang dapat mengakibatkan dekubitus (Nurshiyam et al., 2020).

Untuk diagnosis terakhir yaitu gangguan integritas kulit/jaringan diberikan implementasi perawatan luka yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar luka post-operasi debridement yang

dialami pasien. Dalam Sari & Musta'in (2021), perawatan luka melibatkan penilaian dan observasi luka dengan hati-hati dan perhatian dengan tindakan pencegahan infeksi dan mengelola faktor yang dapat mempengaruhi penyembuhan luka pasien. Jaringan luka tidak akan menimbulkan kerusakan pada granulasi luka dengan cara melepaskan balutan dengan hati-hati, kemudian membersihkan luka dengan NaCl 0,9% selanjutnya pemasangan balutan sesuai jenis luka.

#### 5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan pada studi kasus ini dilakukan selama 3 hari pada tanggal 14-17 November 2022. Evaluasi keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan pasien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keberhasilan yaitu tahan yang menentukan tercapainya suatu tujuan. Tahap evaluasi keperawatan merupakan tahap mengkaji respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan oleh perawat dengan mengacu pada standar atau kriteria hasil yang telah ditetapkan pada rumusan tujuan. Evaluasi dibagi menjadi dua yaitu, evaluasi proses atau formatif dilakukan setiap selesai melakukan tindakan dan evaluasi hasil atau sumatif dilakukan dengan membandingkan respon klien pada tujuan khusus dan umum yang telah ditentukan (Supratti & Ashriady, 2016).

##### a. Evaluasi Formatif

###### 1) Nyeri Akut

Pada diagnosis nyeri akut yang diawali dengan pengkajian didapatkan bahwa pasien mengalami nyeri karena prosedur operasi debridement pada ekstremitas kanan bawahnya. Setelah implementasi hari pertama, hasil evaluasi menunjukkan pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, kondisi pasien masih lemah, pasien hanya baring dan aktifitas parsial, pasien nampak

meringis kesakitan ketika spreng pasien diganti oleh perawat karena ada pergerakan pada ekstremitas bawahnya yang sudah dioperasi, skala nyeri 4 (NRS). Evaluasi hari kedua pasien mengatakan masih merasakan nyeri di kaki sebelah kanan (Post-op debridement), pasien mengatakan nyeri di kakinya sudah mulai berkurang ketika di berikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, skala nyeri pasien berkurang setelah diberikan distraksi menjadi skala 3 (NRS), pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi menonton video memancing di youtube, pasien nampak menikmati distraksi yang diberikan. Evaluasi hari ketiga, pasien mengatakan nyeri di kakinya sudah berkurang ketika diberikan distraksi menonton video memancing ikan di youtube, pasien menonton menggunakan handphone pasien, skala nyeri 2 (NRS) saat dan setelah diberikan distraksi video orang memancing ikan di youtube, pasien nampak tenang ketika diberikan distraksi.

## 2) Pola Napas Tidak Efektif

Pada diagnosis pola napas tidak efektif diketahui bahwa pasien mengalami keluhan utama sesak napas dan pasien diberikan oksigen via canul nasal sebanyak 4 liter. Pada evaluasi hari pertama pasien mengatakan sesekali sesak saat berada di rumah sakit, Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 97x/mnt, Rr : 24x/mnt, suhu : 36,7 ° C, Saturasi O<sub>2</sub> 95%. Evaluasi hari kedua pasien mengatakan masih mengalami sesak tapi tidak terlalu sering, Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 135/100, Nadi : 95x/mnt, Rr : 24x/mnt, suhu : 36,5°C, Saturasi O<sub>2</sub> 98%. Evaluasi hari ketiga pasien mengatakan sesaknya masih ada tapi sudah mendingan,

Pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, tingkat kesadaran pasien Composmentis E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 90x/mnt, Rr : 22x/mnt, suhu : 36,2°C, Saturasi O<sub>2</sub> 90%

### 3) Gangguan Mobilitas Fisik

Pada diagnosis gangguan mobilitas fisik diketahui bahwa pasien baru melakukan prosedur operasi di bagian tungkai kananya, pasien mengalami nyeri ketika tungkainya digerakkan. Evaluasi hari pertama menunjukkan pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih belum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement), mobilitas fisik pasien masih terbatasi. Evaluasi hari kedua menunjukkan pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih belum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement) karena masih merasakan nyeri ketiak digerakkan, pasien mengatakan belum bisa melakukan banyak pergerakan. Evaluasi hari ketiga menunjukkan pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien sudah bisa melakukannya secara mandiri, pasien masih belum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement), keluhan nyerinya sudah tidak ada.

### 4) Gangguan Integritas Kulit/jaringan

Pada diagnosis terakhir yaitu gangguan integritas kulit/jaringan yang diketahui bahwa pasien mengalami edema dan gatal pada daerah luka post-operasi debridement pada kaki kiri pasien. Evaluasi hari pertama menunjukkan pasien sesekali menggaruk kedua kaki pasien yang mengalami Selulitis, kedua kulit kaki pasien masih banyak terdapat bintik-bintik merah, terjadi edema pada daerah sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi

pasien. Pada evaluasi hari kedua juga belum memiliki perubahan yang berarti, pasien masih mengeluhkan gatal pada kedua kakinya, kedua kakinya masih mengalami selulitis dan masih terdapat bintik-bintik merah. Evaluasi terakhir di hari ketiga juga masih sama, belum memiliki banyak perubahan, pasien nampak masih sering menggaruk kedua kakinya yang mengalami selulitis, masih terdapat edema pada daerah sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien.

b. Evaluasi Sumatif

Implementasi keperawatan yang diberikan pada Tn. N selama tiga kali shift dinas yang dimulai dari tanggal 14-17 November 2022 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun dengan masalah nyeri akut, pola napas tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, dan gangguan integritas kulit/jaringan. Evaluasi dilakukan setiap hari, dalam proses pelaksanaan evaluasi, untuk masalah nyeri akut menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, dimana pada saat pengkajian pasien mengatakan nyeri dibagian bekas post-operasi yang dialami, skala nyerinya 4 (NRS) sebelum dilakukan distraksi. Namun setelah diberikan intervensi, di hari ketiga pasien mengatakan nyerinya sudah berkurang dan pasien cukup menikmati distraksi visual dengan cara menonton video memancing ikan yang diberikan karena pasien juga hobi memancing ketika pasien sehat. Sehingga untuk masalah nyeri akut sudah teratasi, tetapi masih butuh pengontrolan untuk memaksimalkan penyembuhan luka post-operasi debridement di kaki pasien.

Untuk masalah pola napas tidak efektif belum menunjukkan perubahan yang berarti, dimana sebelum diberikan intervensi ditemukan bahwa pasien mengatakan sesak nafas ketika mau berangkat bekerja, pola napas cepat dan dalam, pneumonia

bilateral, efusi minimal pleura kiri, dilatatio aortae. Setelah diberikan intervensi ditemukan hasil bahwa masalah pola napas tidak efektif yang dialami pasien belum tertatasi, karena pasien mengatakan masih mengalami sesak, pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien masih terpasang oksigen 4 liter, E<sub>4</sub>V<sub>5</sub>M<sub>6</sub>, TD : 143/102, Nadi : 90x/mnt, Rr : 20x/mnt, suhu : 36,4<sup>0</sup>C, Saturasi O<sub>2</sub> 97%.

Pada masalah gangguan mobilitas fisik, pasien sedikit menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, dimana sebelum diberikan intervensi ditemukan data, pasien mengatakan saat ini pasien tidak dapat beraktifitas, pasien mengatakan kondisinya saat ini sangat mengganggu pasien, saat ini pasien nampak terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk menggerakkan tubuhnya. Setelah diberikan intervensi diperoleh hasil bahwa gangguan mobilitas fisik pasien sudah teratasi sebagian atau membaik dengan hasil, pasien mengatakan sudah mulai menggerak-gerakkan ekstremitas atasnya, pasien hanya tirah baring dan aktivitas parsial, pasien sesekali melakukan ROM pada ekstremitas atasnya, pasien masih blum bisa menggerakkan tungkai kirinya (post-op debridement).

Sedangkan pada masalah terakhir gangguan integritas kulit/jaringan, pasien masih mengalami gatal-gatal dan edema di sekitar lokasi post-operasi debridemetnya, dimana sebelum diberikan intervensi ditemukan data pasien mengatakan awalnya kakinya mengalami bintik-bintik merah, pasien merasa gatal, kemudian pasien selalu menggaruknya, pasien mengatakan semenjak di rumah sakit bintik-bintik merah di kakinya semakin parah, pasien nampak sering menggaruk kakinya pada saat tirah baring, tampak luka post-op debridement pada tungkai kanan pasien, tampak edema pada sekitar luka post-op debridement pasien, GDS = 109, pemeriksaan HbA1c = 10, pemeriksaan

Procalcitonin (PJT) = 7 mg. setelah diberikan intervensi ditemukan hasil bahwa masalah gangguan integritas kulit/jaringan yang pasien alami belum teratasi dengan hasil akhirnya setelah 3x intervensi, pasien masih mengeluhkan gatal pada kedua kakinya, pasien masih sesekali menggaruk kedua kakinya yang mengalami Selulitis, kedua kulit kaki pasien masih banyak terdapat bintik-bintik merah, masih terdapat edema pada daerah sekitaran post-operasi debridement dan masih tampak kemerahan disekeliling luka post-operasi pasien.

#### **B. Analisis Intervensi EBPN**

Analisis intervensi dengan masalah keperawatan utama yaitu nyeri akut dengan pemberian intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) dengan melakukan intervensi distraksi yang diberikan ketika pasien mengalami nyeri dan setelah pemberian obat analgetik. Penelitian yang dilakukan oleh MacLaren dan Cohen (2005) dalam Rahayu & Darmawan (2020), didapatkan bahwa teknik distraksi dengan menonton bagi pasien yang mengalami nyeri dapat terlihat dari respon perilakunya. Menurut Jacobson dkk (2012) dalam Rahayu & Darmawan (2020), penggunaan metode nonfarmakologi untuk mengatasi masalah nyeri yang lebih mudah dilakukan oleh perawat, salah satunya yang paling banyak dilakukan adalah teknik distraksi.

Penerapan teknik distraksi berupa menonton video dapat merangsang serabut saraf besar dan menyebabkan inhibitory neuron dan projection aktif. Terapi inhibitory neuron mencegah projection neuron mengirimkan sinyal ke otak, sehingga gerbang tertutup dan stimulasi nyeri tidak diterima sampai ke otak. Pasien yang menyukai unsur-unsur yang sering dilakukan ataupun yang membuat perasaannya senang dapat meningkatkan konsentrasinya ketika diberikan distraksi visual mengenai hal tersebut, sehingga rasa nyeri yang dialami akan teralihkan. Pasien yang tidak diberikan distraksi merasakan nyeri lebih tinggi pada luka post-operasi yang dialaminya akan terus-menerus merasakan rangsangan yang

mengganggu, sehingga akan mengaktifkan nesiseptor nyeri. Nesiseptor nyeri akan merangsang ujung saraf eferen untuk mengeluarkan substansi P. substansi P akan mempengaruhi nesiseptor di luar daerah trauma yang akan menimbulkan lingkaran nyeri semakin luas. Implus nyeri akan ditransmisikan ke medulla spinalis kemudian ke otak melalui jalur asendens. Persepsi nyeri yang terjadi di otak akan ditransmisikan ke somatosensorik, sehingga akan terasa nyeri pada area post-operasi (Muhammad et al., 2022).

Setelah dilakukan implementasi dan evaluasi keperawatan dengan pemberian teknik non farmakologi yaitu distraksi visual, terjadi penurunan tingkat nyeri yang dirasakan pasien. Dihari pertama skala nyeri pasien 4 (NRS) sebelum pasien diberikan distraksi, dan setelah diberikan distraksi rasa nyeri pasien sedikit teralihkan karena merasa bahagia ketika diberikan distraksi visual yang dia sukai. Dihari kedua setelah pasien diberikan distraksi, pasien mengalami nyeri ringan dengan skala 3 (NRS). Adapun evaluasi di hari ketiga pasien sudah tidak mengalami nyeri saat dan setelah diberikan distraksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi non farmakologis yaitu terapi distraksi visual efektif dalam menurunkan tingkat nyeri. Teknik distraksi efektif digunakan pada prosedur medis yang menimbulkan nyeri seperti injeksi, pemasangan infus, pengambilan darah maupun prosedur pembedahan (Fatmawati et al., 2019).

Rasa atau sensasi nyeri dihasilkan dari komunikasi antar sel saraf di otak, medulla spinalis, dan tempat lain pada tubuh. Ketika seseorang mengalami luka, jaringan yang rusak mengeluarkan zat kimiawi seperti prostaglandin, kinin, dan ion Kalium yang akan menstimulus reseptor nyeri (nociceptor). Lalu, nociceptor mengirimkan sinyal listrik (impuls) ke medulla spinalis melalui saraf sensoris. Setelah itu, medulla spinalis mengirim impuls ke otak. Ketika impuls mencapai ke otak, otak menganalisis dan memproses impuls tersebut menjadi sensasi nyeri. Dengan merasakan sensasi nyeri, otak akan mengirim impuls yang mengatakan bahwa kita harus menghindari sumber rasa nyeri tersebut,

supaya kerusakan jaringan tidak menjadi lebih parah. Jauh sebelum para ilmuwan menemukan reseptor nyeri pada kulit, ternyata Allah sudah mengungkapkannya dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa ayat 56 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا  
لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

*“Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adzab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisaa : 56)*

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa ada “sesuatu” pada kulit yang membuat kita dapat merasakan nyeri. Seperti yang sudah disebutkan di atas, “sesuatu” itu adalah nociceptor, reseptor nyeri, yaitu ujung saraf bebas yang berada pada setiap jaringan tubuh kecuali otak, yang dapat diaktifkan oleh stimulus panas, mekanis, maupun kimiawi. Maha besar Allah yang telah menyisipkan firman-firmannya dan kebesarannya lewat sel tubuh, kromosom, pembuluh darah, saraf, dan sebagainya.

Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual ataupun potensial. Dengan adanya gangguan rasa nyaman dan nyeri, maka nyeri mengakibatkan kebutuhan dasar yang lain akan terganggu seperti pola aktivitas sehari-hari, nafsu makan dan kebutuhan istirahat dan tidur (Eriyanti & Sholahuddin, 2021).

### C. Keterbatasan

Keterbatasan pada studi kasus ini yaitu desain yang digunakan saat pemberian intervensi tanpa pembandingan dengan pasien maupun pihak lain, sehingga peneliti hanya bisa membandingkan hasil dari pre test dan post test. Di sisi lain studi kasus ini juga tidak melihat sikap perawat dan rumah sakit, kemungkinan dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan distraksi pada pasien yang mengalami gangguan rasa nyaman dan nyeri.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Tn. N, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengkajian keperawatan yang didapatkan pada pasien *acute decompensated heart failure* dengan masalah nyeri akut yaitu pasien merasakan nyeri pada kaki sebelah kirinya yang sudah di operasi, nyeri timbul saat digerakkan, nyeri tertusuk-tusuk, pasien nampak sesekali meringis, dan berdasarkan *Numeric Rating Scale* (NRS) pasien mengalami nyeri sedang dengan intensitas nyeri berada di angka 4.
2. Diagnosis keperawatan utama yang ditemukan pada pasien *acute decompensated heart failure* yang menjalani rawat inap ialah dengan masalah utama nyeri akut.
3. Intervensi keperawatan yang dilakukan pada pasien *acute decompensated heart failure* dengan masalah nyeri akut yaitu dengan pemberian intervensi distraksi video.
4. Implementasi keperawatan yang diberikan pada pasien *acute decompensated heart failure* dengan masalah nyeri akut yaitu selama 3 hari berturut-turut.
5. Hasil evaluasi keperawatan yang dilakukan pada pasien *acute decompensated heart failure* dengan masalah nyeri akut dinyatakan dapat teratasi.
6. Setelah dilakukan pemberian intervensi distraksi visual pada pasien yang mengalami *acute decompensated heart failure* dengan masalah keperawatan nyeri akut didapatkan hasil masalah teratasi dengan hasil pengukuran berdasarkan *numeric rating scale* pasien mengalami nyeri sedang dengan intensitas nyeri berada di angka 4. Namun setelah diberikan intervensi berdasarkan *numeric rating scale* pasien tidak mengalami nyeri atau nyeri berkurang dengan intensitas nyeri berada

di angka 2. Implementasi dilakukan dalam waktu pemberian 3 x 24 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi distraksi visual efektif diberikan kepada pasien yang mengalami nyeri akut dengan intensitas nyeri ringan hingga sedang selama perawatan di rumah sakit.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil studi kasus, ada beberapa saran yang direkomendasikan oleh peneliti yang kiranya dapat menjadi pertimbangan.

### **1. Bagi Perawat Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo**

Bentuk pendekatan yang baik dan tepat sangat membantu keberhasilan perawat terutama pada pasien yang mengalami nyeri akut selama proses perawatan, sehingga perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan intensitas nyeri seperti terapi distraksi visual. Peneliti menyarankan agar melakukan terapi non farmakologis sebagai salah satu program wajib yang dilaksanakan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan nyeri akut ringan hingga sedang.

### **2. Bagi Institusi Keperawatan**

Dengan adanya studi kasus ini diharapkan dapat berguna atau dijadikan bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran untuk kemajuan profesi keperawatan dalam bidang pengetahuan dan teknologi.

### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan peneliti lain dapat menindak lanjuti studi kasus ini agar lebih sempurna dan bermanfaat serta mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai terapi apa saja yang dapat mempengaruhi atau membantu mengatasi nyeri akut pada pasien saat dirawat di rumah sakit. Studi kasus ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan sumber referensi bagi penelitian yang sejenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., Faridi, A., Ramdany, R., Fitriani, R. J., Tania, P. O. A., Rahmiati, B. F., Lusiana, S. A., Susilawaty, A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.
- Ainanur, L., & Halimuddin. (2023). Karakteristik Pasien Acute Decompensated Heart Failure Denovo Di RSUDZA. *Universitas Syiah Kuala Banda Aceh*, 1–6.
- Al-Mishbah. (2021). *Kitab Tafsir Karya Ulama Indonesia Prof. Dr. M. Quraish Shihab*.
- Djamil, A., Yuliana, D., & Arini, M. (2019). Distraksi Menonton Efektif Menurunkan Nyeri Ringan Pasien Congestive Heart Failure (CHF). *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 459–465.
- Ekawati, D. (2017). Pengaruh Distraksi Menonton Animasi Kartun Terhadap Tingkat Stres Hospitalisasi Pada Anak Saat Dilakukan Injeksi Bolus. *Stikes Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Eriyanti, T., & Sholahuddin, I. (2021). Penatalaksanaan Gangguan Rasa Nyaman Nyeri dengan Teknik Relaksasi di Ruang Topas RSUD dr. Slamet Garut. *Jurnal Keperawatan*, 2(2).
- Fatmawati, L., Syaiful, Y., & Ratnawati, D. (2019). Pengaruh Audiovisual Menonton Film Kartun Terhadap Tingkat Kecemasan Saat Prosedur Injeksi Pada Anak prasekolah. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(2), 15–29.
- Haq, R. K., Ismail, S., & Erawati, M. (2019). Studi Eksplorasi Manajemen Nyeri Pada Pasien Post Operasi Dengan Ventilasi Mekanik. *Jurnal Perawatan Indonesia*, 3(3), 191–196.
- Hidayat, T. (2019). *Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian*. 1–13.
- Hidayatulloh, A. I., Limbong, E. O., Ibrahim, K., & Nandang. (2020). Pengalaman Dan Manajemen Nyeri Pasien Pasca Operasi Di Ruang Kemuning V RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 187–204.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2009). *Wongs's essentials of pediatric nursing* (8 th ed). St. Louis: Mosby Elseiver.

- Ilmiasih, R., Nurhaeni, N., & Waluyanti, F. T. (2015). Aplikasi Teori Comfort Kolcaba Dalam Mengatasi Nyeri Pada Anak Pasca Pembedahan Laparatomi Di Ruang BCH RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. *Jurnal Keperawatan*, 6(1), 27–33.
- Ismoyowati, T. W., Teku, I. S. D., Banik, J. C., & Sativa, R. A. O. (2021). Manajemen Nyeri Untuk Congestive Heart Failure. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(1), 107–112.
- Jamila, Hasibuan, F., & Wastuti, S. N. Y. (2020). *Bimbingan dan Konseling Untuk Studi Kasus Siswa Di Sekolah*. UMSU Press.
- Jaya, K., Mien, Rasmiati, K., & Suramadhan. (2019). Gambaran Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Buton Utara. *Jurnal Keperawatan*, 2(3).
- Kemendes RI. (2018). *Hasil Utama Riskesdas 2018*.
- Kemendes RI. (2021). Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Gagal Jantung. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Kurniawan, H. (2021). *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*. Deepublish Publisher, CV Budi Utama.
- Kurniawan, S. N. (2015). *Nyeri Secara Umum : General Pain*. UB Press Universitas Brawijaya Malang.
- Labibah, D. I. (2022). Efektivitas Instrumen Numeric Rating Scale dan Visual Analog Scale Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea : Literature Review. *Universitas Aisyiyah Yogyakarta*.
- Mahananto, F., & Djunaidy, A. (2017). Simple Symbolic Dynamic of Heart Rate Variability Identify Patient With Congestive Heart Failure. *Procedia Computer Science*, 124, 197–204.
- Mertajaya, I. M. (2018). Analisis Intervensi Teknik Distraksi Menonton Kartun Edukasi Terhadap Skala Nyeri Pada Anak Usia Toddler Saat Pengambilan Darah Intravena Di Ruang Cempaka Anak Rumah Sakit Pelni Jakarta. *Jurnal JKFT : Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 3, 46–58.
- Miranda, F., Halimuddin, & Aklima. (2022). *Perawatan Pasien Acute Decompensated Heart Failure di ICCU: Suatu Sudi Kasus*. 1(2), 116–120.
- Muhammad, R. W., Nurhaeni, N., & Wanda, D. (2022). Efektivitas Menonton Vidio Kartun Terhadap Tingkat Nyeri Selama Prosedur Invasif Pada Anak Sekolah. *Jurnal Of Telenursing*, 4(1).

- Narolita, Y. (2018). Asuhan Keperawatan Pada Klien Gagal jantung Kongestif (GJK) Dengan Masalah Hipervolemia. *Insan Cendekia Medika Jombang*.
- Notoatmodjo. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurkhalis, & Adista, R. J. (2020). Manifestasi Klinis dan Tatalaksana Gagal Jantung. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(3), 36–46.
- Nursalam. (2008). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan : Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Salemba Medika.
- Nursalam. (2016). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis Edisi 4. In *Salemba Medika*.
- Nurshiyam, Ardi, M., & Basri, M. (2020). Asuhan Keperawatan Pemenuhan Kebutuhan Mobilitas Fisik Pada Pasien Stroke Non Hemoragik di RSKD Dadi Makassar. *Jurnal Media Keperawatan*, 11(1).
- Peterson, S. J., & Bredow, T. S. (2008). *Middle Range Theories : Application To Nursing Research (2nd ed.)*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
- Potter, & Perry. (2010). *Fundamental Keperawatan*. Salemba Medika.
- Rahayu, H. S., & Darmawan, D. (2020). Pemberian Teknik Distraksi Pemutaran Video Kartun Untuk Menurunkan Nyeri Pada Anak Post Operasi. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi (JIKO)*, 4(1), 1–9.
- Ramadhani, F. N. (2020). Asuhan Keperawatan Pasien Dengan Gagal Jantung Kongestif (CHF) Yang di Rawat di Rumah Sakit. *Universitas Samarinda*.
- Redhono, D., Putranto, W., & Budiastuti, V. I. (2012). *History Taking : Anamnesis*.
- Risnah, & Irwan, M. (2021). Falsafah dan Teori Keperawatan Dalam Integrasi Keilmuan: UPT Perpustakaan UIN Alauddin. In *Alauddin University Press*.
- Safari, G., & Azhar, H. (2019). Pengaruh tehnik Distraksi Film Kartun Terhadap Tingkat Kecemasan Anak Usia 4-6 tahun Pre Sirkumsisi Di Klinik. *Healthy Jurnal, Bandung*, 7(2).
- Saksono, T., Siwi, A. S., & Putranti, D. P. (2022). Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik Pada Pasien Dengan Stroke Iskemik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(77125-7132).

- Sari, D. N. M., & Musta'in, M. (2021). Gambaran Pengelolaan Gangguan Integritas Kulit/jaringan pada Pasien Post Debridement Atas Indikasi Ulkus Dm Pedis Dextra di Desa Lunggae Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Bidang Kesehatan Dan Keperawatan*, 4(2).
- Sari, R. K. (2019). Gambaran Diagnosis Keperawatan Menurut SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia) Di Ruang ICCU (Intensive Coronary Care Unit) RSD dr. Soebandi Jember. *Universitas Jember*.
- SDKI, T. P. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Indikator Diagnostik*. DPP PPNI.
- SIKI, T. P. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia : Definis dan Tindakan Keperawatan*. DPP PPNI.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- SLKI, T. P. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumantra, I. G. (2020). Tantangan Diagnostik dan Pengelolaan Gagal Jantung Akut Dari Subset Hemodinamik Untuk Pengobatan Yang Tepat. *Tarakan Kalimantan Utara, Jurnal Ilmiah Kedokteran*, 3(2), 14–25.
- Supratti, & Ashriady. (2016). Pendokumentasian Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Indonesia. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2(1).
- Swarjana, K. (2022). *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan*. Penerbit Andi.
- Syokumawena, Mediarti, D., & Janiati, N. (2022). Implementasi Keperawatan Pasien Post Operasi Fraktur Ekstremitas Bawah Dengan Masalah Gangguan Mobilitas Fisik. *Jurnal Keperawatan Merdeka*, 2(2).
- Tazkirah, R., Kamal, A., & Safuni, N. (2023). Asuhan Keperawatan pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure (ADHF)*. 7(1), 26–32.
- Teerlink, J. R., Alburikan, K., Marco, M., & Rodgers, J. E. (2015). Acute Decompensated Heart Failure Update. *Bentham Science Publishers*, 11, 53–62.

- Ulina, J. M., Eka, N. G. A., & Yoche, M. M. (2020). Persepsi Perawat Tentang Melengkapi Pengkajian Awal di Satu Rumah Sakit Swasta Indonesia. *Jurnal Nursing Current*, 8(1).
- Utami, K. C. (2016). Integrasi Teori/Model Kenyamanan (Kolcaba) Pada Ruang Perawatan Risiko Tinggi. *Universitas Udayana*.
- Utami, S. (2016). Efektivitas Relaksasi napas Dalam dan Distraksi Dengan Latihan 5 Jari Terhadap Nyeri Post Laparatomi. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 4(1), 61–73.
- Utami, S. (2019). Efektifitas Relaksasi Napas Dalam dan Distraksi Dengan Latihan 5 Jari Terhadap Nyeri Post Laparatomi. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 4(1), 61–73.
- Vianti, R. A., & Ari, S. D. (2018). Penurunan Nyeri Saat Dismenore Dengan Senam Yoga Dan Teknik Distraksi (Musik Klasik Mozart). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 14, 14–27.
- Wandini, R., & Resandi, R. (2020). Pemberian Tehnik Distraksi Menonton Kartun Animasi Untuk Menurunkan Tingkat Nyeri Prosedur Invasif Pada Anak. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 479–485.
- Wati, F., & Ernawati. (2020). Penurunan Skala Nyeri Pasien Post-Op Appendectomy Menggunakan Teknik Relaksasi Genggam Jari. *Jurnal Ners Muda*, 1(3).
- Wijaya. (2016). Pengaruh Burnout Syndrom Terhadap Progres Asuhan Keperawatan (Studi Pada Perawat Rumah Sakit Medika Utama Blitar). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(3).
- Wilanda, R. (2020). Pengaruh Teknik Distraksi Audio Visual Menggunakan Media Virtual Reality Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien Post Operasi Sectio Caesarea Di RSUD Alimuddin Umar Lampung Barat Pada Tahun 2020.
- Yuliana, Silitonga, Y. A. M., & Wahyuni, A. (2022). Manajemen Nyeri Pasca Operasi. *Jurnal Gizi*, 2(2).
- Yulianti, & Chanif. (2021). Penerapan Perubahan Posisi Terhadap Perubahan Hemodinamika pada Asuhan Keperawatan Pasien Congestive Heart Failure. *Jurnal Unimus*, 2(2).
- Yuliati, & Munte, I. V. (2022). Pengaruh Pemakaian Transparent Dressing Terhadap Luka Tekan Pasien Acute Decompensated Heart Failure. *Jurnal Keperawatan Dirgahayu*, 4(1), 45–53.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 1 : Jurnal Rujukan Utama

Jurnal Kesehatan  
Volume 10, Nomor 3, November 2019  
ISSN 2086-7751 (Print), ISSN 2548-5695 (Online)  
<http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK>

### Distraksi Menonton Efektif Menurunkan Nyeri Ringan Pasien *Congestive Heart Failure (CHF)*

Achmad Djamil<sup>1</sup>, Dewi Yuliana<sup>2</sup>, Mia Arini<sup>3</sup>  
Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia  
Email: babedjamil@gmail.com

**Abstract: Distraction Watch Effectively Reduces Patient Minor Pain Congestive Heart Failure (CHF).** Congestive heart failure (CHF) is a pathophysiological condition in the form of abnormalities in the function of the heart so that the heart is unable to pump blood to meet the needs of tissue metabolism or its ability is only present when accompanied by an abnormally elevated diastolic volume. Providing complementary nursing care with the watch distraction method can help reduce mild to moderate pain in patients with congestive heart failure. The research objective was to determine the effect of distraction watching on mild pain in patients with CHF. The study used a Quasi-Experimental design with one group pre-test post-test design approach. A total sample of 60 respondents was divided into 2 groups and selected using non-probability sampling with the consecutive sampling technique. The results showed that distraction watch therapy had a significant effect on mild pain in patients with CHF. Distraction watch therapy significantly influences mild pain in patients with CHF.

**Keywords:** Reduce pain, Watch distraction

**Abstrak: Distraksi Menonton Efektif Menurunkan Nyeri Ringan Pasien Congestive Heart Failure (CHF).** Gagal jantung kongestif (CHF) adalah keadaan patofisiologis yang berupa kelainan fungsi jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan atau kemampuannya hanya ada kalau disertai peninggian volume diastolik secara abnormal. Pemberian asuhan keperawatan komplementer dengan metode distraksi menonton dapat membantu menurunkan nyeri ringan sampai sedang pada pasien gagal jantung kongestif. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh distraksi menonton terhadap nyeri ringan pasien dengan CHF. Penelitian menggunakan desain *Quasi Eksperimental* dengan pendekatan *one group pre-test post-test design*. Total sampel sejumlah 60 responden yang dibagi menjadi 2 kelompok dan dipilih menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *Consecutive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan terapi distraksi menonton berpengaruh secara signifikan terhadap nyeri ringan pasien dengan CHF. Terapi distraksi menonton berpengaruh secara signifikan terhadap nyeri ringan pasien dengan CHF.

**Kata kunci:** Menurunkan nyeri, Distraksi menonton

#### PENDAHULUAN

Gagal jantung adalah masalah kesehatan yang terus berkembang di dunia dengan jumlah penderita lebih dari 20 juta jiwa. Prevalensi gagal jantung sangat meningkat dengan sejalannya pertambahan usia diatas 65 tahun. Menurut *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2016, menyebutkan bahwa 17,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler, yang mewakili 31% kematian di dunia. Di Amerika Serikat penyakit jantung hampir terjadi 550.000 kasus pertahun, sedangkan di negara-negara berkembang di dapatkan kasus sejumlah 400.000 sampai 700.000 per bulan (WHO, 2016).

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung. Berdasarkan data registrasi pasien yang berkunjung ke Poli Jantung Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek pada bulan Desember 2017 terdapat sebanyak 446 pasien berobat di Poliklinik, saat dilakukan anamnesa 75% (335 pasien) yang berobat melalui Poli Jantung menyatakan adanya keluhan nyeri di dada. Sedangkan pasien yang dirawat di Ruang Tulip pada bulan Desember 2017 sebanyak 104 pasien, 76 pasien adalah dengan diagnosa CHF. Dibandingkan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Metro yang merupakan rumah sakit yang memiliki akreditasi yang setara

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf12126>

### Manajemen Nyeri untuk *Congestive Heart Failure*

Tri Wahyuni Ismoyowati

Departemen Sarjana Keperawatan, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta : maya@stikesbethesda.ac.id

Imelda Sri Desisi Teku

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta :  
imeldateku@gmail.com (koresponden)

Jen Christin Banik

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta :  
jhenchristin@gmail.com

Rineke Anitya Oryza Sativa

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, STIKes Bethesda Yakkum Yogyakarta :  
rinekeoryza26@gmail.com

#### ABSTRACT

*Congestive Heart Failure (CHF) is a health problem that continues to grow in the world. CHF is the inability of the heart to pump blood to meet the tissue's needs for oxygen and nutrients, resulting in various clinical symptoms, namely chest pain. This paper is a literature review from several data bases, namely Pubmed (NCBI, NIH & AHA) Google Scholar, Proques, Elsvier. The search for articles was limited from 2010-2020 using the keywords "CHF pain therapy", "Congestive Heart Failure management", "Congestive Heart Failure pain management", "Congestive Heart Failure", "Pain Management Congestive Heart Failure", "Pain Therapy Congestive Heart Failure". The search results obtained are 4 domestic journals and 96 international journals. Based on the results of the analysis, it can be concluded that pain management for patients with CHF obtained several non-pharmacological techniques, namely Watch Distraction Technique, Deep Breath Relaxation Technique, Guided Imaginery Technique, Virtual Reality, Medikation Technique, Murottal Technique, Walking Therapy, Stretching and use of hot and cold media. However, the researchers concluded that Deep Breath Relaxation Techniques and Watch Distraction Technique were more effective in reducing pain in patients with CHF (p-value 0,000). Further research is needed to see the effectiveness of pain management in CHF patients using appropriate methods.*

**Keywords:** congestive heart failure; management; pain

#### ABSTRAK

*Congestive Heart Failure(CHF) merupakan masalah kesehatan yang terus berkembang di dunia. CHF adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam memenuhi kebutuhan jaringan akan oksigen dan nutrisi, akibatnya menimbulkan berbagai gejala klinis yaitu nyeri dada. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur dari beberapa database yaitu Pubmed (NCBI, NIH & AHA) Google Scholar, Proques, Elsvier. Penelusuran artikel dibatasi dari tahun 2010-2020 dengan menggunakan kata kunci "terapi nyeri CHF", "manajemen Congestive Heart Failure", "manajemen nyeri Congestive Heart Failure", "Congestive Heart Failure", "Pain Management Congestive Heart Failure", "Pain Therapy Congestive Heart Failure". Hasil penelusuran yang diperoleh adalah 4 jurnal dalam negeri dan 96 jurnal internasional. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa manajemen nyeri untuk pasien dengan CHF didapatkan beberapa teknik non farmakologis yaitu Teknik Distraksi Menonton, Teknik Relaksasi Napas Dalam, Teknik Guided Imaginery, Virtual Reality, Teknik Meditasi, Teknik Murottal, Walking Therapy, Stretching dan penggunaan media panas dingin. Namun peneliti menyimpulkan bahwa terapi Teknik Relaksasi Napas Dalam dan Distraksi Menonton lebih efektif untuk menurunkan nyeri pada pasien dengan CHF (p-value 0,000). Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat keefektifan manajemen nyeri pada pasien CHF dengan menggunakan metode yang tepat.*

**Kata kunci:** congestive heart failure; manajemen; nyeri

#### PENDAHULUAN

CHF mengakibatkan kegagalan fungsi pulmonal sehingga terjadi penimbunan cairan di alveoli, hal ini menyebabkan jantung tidak dapat berfungsi dengan maksimal dalam memompa darah. Apabila CHF tidak segera di tangani dapat muncul masalah lain diantaranya: Edema paru, Syok Kardiogenik, efusi perkardial dan tamponade jantung.

<sup>(1)</sup> Data yang diperoleh dari *World Health Organization (WHO)* tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 23 juta atau sekitar 54% dari total kematian disebabkan oleh CHF. Benua Asia menduduki tempat tertinggi akibat kematian penyakit jantung dengan jumlah 712,1 ribu jiwa Di Amerika serikat penyakit jantung hampir terjadi 550.000 kasus/tahun, sedangkan dinegara-negara berkembang didapatkan kasus sejumlah 400.000-700.000/bulan. <sup>(2)</sup> Data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi gagal jantung di Indonesia sebanyak 0,3 % dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 1,5%. Klien terbanyak dengan gagal jantung terdapat di Kalimantan Utara yaitu dengan prevalensi sebanyak 2,2% sedangkan Nusa Tenggara Timur prevalensi paling sedikit 0,7%. <sup>(3)</sup>

CHF menimbulkan berbagai gejala klinis diantaranya: dipsnea, ortopnea, pemapasan *Cheyne-Stokes*, *Paroxysmal Nocturnal Dyspnea (PND)*, ansietas, *pitting edema*, berat badan meningkat, dan gejala yang paling sering di jumpai adalah sesak nafas pada malam hari, yang mungkin muncul tiba-tiba dan menyebabkan penderita terbangun. <sup>(4)</sup>

Volume. 4 Nomor. 1

Periode: Januari – Juni 2020; hal. 1-9

p-ISSN : 2580-1112; e-ISSN : 2655-6669

Copyright © 2020

Penulis memiliki hak cipta atas artikel ini

journal homepage: <https://ejournal.akperfatmawati.ac.id>

DOI : 10.46749/jiko.v3i2.34

Jurnal Ilmiah Keperawatan Orthopedi

(JIKO)

Article history:

Received: Desember 12, 19

Revised: September 05, 20

Accepted: September 09, 20

## Pemberian Teknik Distraksi Pemutaran Video Kartun Untuk Menurunkan Nyeri Pada Anak Post Operasi

Hemma Siti Rahayu<sup>1</sup>, Della Darmawan<sup>2</sup>  
Akademi Keperawatan Fatmawati, Jakarta

### Abstrak

Nyeri adalah sensasi ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai penderita yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang nyata, ancaman, dan fantasi luka. Penatalaksanaan nyeri *post* operasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Untuk mengatasi nyeri yang dilakukan dengan farmakologi dilakukan dengan melakukan kolaborasi dalam pemberian analgesik, sedangkan tindakan non farmakologi dapat diberikan teknik distraksi pemutaran video kartun. Pengukuran skala nyeri dilakukan dengan menggunakan lembar observasi FLACC. Tujuan studi kasus ini adalah untuk mengetahui pemberian teknik distraksi pemutaran video kartun dalam menurunkan rasa nyeri pada anak yang mengalami *post* operasi. Metode studi kasus dengan menggunakan metoda deskriptif dengan pendekatan asuhan keperawatan pelaksanaan pemberian teknik distraksi pemutaran video kartun untuk menurunkan rasa nyeri pada anak *post* operasi. Subjek pada studi kasus terdiri dari dua orang anak yang mengalami *post* operasi. Pelaksanaan pemberian teknik distraksi dilakukan selama 10-15 menit dengan pemutaran video kartun. Observasi skala nyeri dilakukan sebelum dan setelah pemutaran video kartun. Hasil studi kasus menunjukkan dengan pemberian teknik distraksi pemutaran video kartun cukup efektif untuk menurunkan rasa nyeri pada anak yang mengalami *post* operasi. Diharapkan perawat dapat optimal dalam menangani respon nyeri yang dirasakan oleh anak *post* operasi salah satunya dengan melakukan pemberian teknik distraksi pemutaran video kartun.

Kata Kunci : Nyeri, *Post* Operasi, Teknik Distraksi Pemutaran Video Kartun

### Abstract

*Pain is a sensation of discomfort that manifested caused by the perception of real life, threats, and fantasy. Post operation most of the time impact to patient discomfort or pain especially to children and which need to manage by pharmacological and non-pharmacological ways. Analgesic is the pharmacology action which need collaboration, while a non pharmacological techniques such as distraction cartoon movie as independent nursing intervention. The purpose of this case study was know provision of audiovisual cartoon movies distraction technique to pain relief in post operation pediatric patient approach to nursing care implementation cartoon video distraction techniques to decrease pain in children post surgery. The subject of this case study examined two post operation children. Implementation: was observe by FLACC pain scale before and after played 10 –*

<sup>1,2</sup> e-mail: hemmasr.akperfatmawati@gmail.com

# EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL REALITY TERHADAP MANAJEMEN NYERI DAN ANSIETAS PADA PASIEN KANKER : LITERATUR REVIEW

Syafrina Arbaani Djuria<sup>1</sup>, La Ode Abdul Rahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Keperawatan Onkologi, Universitas Indonesia, Depok

<sup>2</sup>Dosen Magister Keperawatan, Universitas Indonesia, Depok, [syafrina.arbaani@ui.ac.id](mailto:syafrina.arbaani@ui.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL:

Riwayat Artikel:  
Tanggal di Publikasi: Juni 2021

Kata kunci:  
Ansietas  
Kanker  
Nyeri  
Teknologi Virtual Reality

## ABSTRAK

Nyeri dan ansietas merupakan gejala fisik dan psikologis yang sering dialami oleh pasien kanker. Nyeri dan ansietas berdampak negatif pada pasien kanker. Teknologi Virtual Reality merupakan teknologi distraksi yang dapat menurunkan nyeri dan ansietas. Tujuan dari telaah literatur ini adalah untuk menganalisis keefektifan penggunaan teknologi *Virtual Reality (VR)* terhadap manajemen nyeri dan ansietas pada pasien kanker. Artikel ini merupakan literature review dengan menggunakan beberapa sumber elektronik yaitu *Science Direct, ClinicalKey, PubMed, Scopus, EBSCO, Sage Publication, Wiley Nursing, Cambridge Core dan Google Scholar* terbit dari tahun 2015-2020 dengan beberapa kata kunci. Terdapat 8 artikel full text yang telah dilakukan analisis. Hasil dari 8 artikel yang dianalisis adalah Teknologi *Virtual Reality (VR)* efektif dan efisien dalam manajemen nyeri dan ansietas pada pasien kanker. Penerapan teknologi VR selanjutnya dikombinasikan dengan teknik distraksi non farmakologi yang lain, terapi kognitif perilaku, dan pendidikan terhadap nyeri dan ansietas.

## **Pemberian tehnik distraksi menonton kartun animasi untuk menurunkan tingkat nyeri prosedur invasif pada anak**

**Riska Wandini<sup>1\*</sup>, Riyan Resandi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. \*Email: onienay@yahoo.com

<sup>2</sup>RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Bandar Lampung. Email: ryanresandi36@gmail.com

### **Abstract**

#### **Effectiveness of cartoon distraction on pain perception with children having invasive procedures**

**Background:** Number of children had hospitalized at Dr. A. Dadi Tjokrodipo hospital of Bandar Lampung every year around of 840-900 children, and most of them are having general invasive procedures such as taking blood samples and intravenous infusion

**Purpose:** Knowing effectiveness of cartoon distraction on pain perception in children during taking blood samples.

**Method:** This type of research is quantitative. The research design of the Quasi-Experimental method post only approaches with group control. The sample of 16 children. Data analysis uses univariate and bivariate with t-test.

**Results:** Characteristics of respondents based on age at most are 4-5 years of age as many as 5 respondents (31.3%) and most genders are male as many as 11 respondents (68.8%). The average pain in taking blood in a child before distraction watching a cartoon video with 16 children, with a mean of 7.81 standard deviations of 1.047, after being given intervention with a mean of 3.38 standard deviations of 1,821. The results of statistical tests using the dependent test obtained 2 mean difference values before and after being given distraction therapy watching cartoon videos was 4.43 with a p-value of 0,000 ( $\alpha < 0.05$ ).

**Conclusion:** There was effectiveness of cartoon distraction on pain perception in children during taking blood samples. Suggestions can provide information for the development of nursing about distraction techniques watching animated videos in children who experience pain, to reduce the incidence of stress due to hospitalization in children.

**Keywords:** Cartoon distraction; Pain perception; Taking blood samples; children

**Pendahuluan:** Jumlah anak yang dirawat di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung setiap tahunnya sekitar 840-900 anak, dengan perlakuan pengambilan darah pada anak sebanyak 20 anak per bulan, sedangkan pemasangan infus sebanyak 420 anak pertahun, dengan rata-rata per bulan 35 anak.

**Tujuan:** Diketahui pengaruh terapi distraksi menonton video kartun dengan pengurangan nyeri pada pengambilan darah pada anak.

**Metode:** Jenis penelitian adalah Kuantitatif. Desain penelitian metode Quasi Eksperimental pendekatan one group pretest-posttest design. Sampel sebanyak 16 anak orang. Analisa data menggunakan univariat dan bivariate dengan t-tes.

**Hasil:** Karakteristik responden berdasarkan Usia paling banyak adalah usia 4-5 tahun sebanyak 5 responden (31,3%) dan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 11 responden (68,8%). Rata-rata nyeri pengambilan darah pada anak sebelum dilakukan distraksi menonton video kartun terhadap 16 orang anak, dengan mean 7,81 standar deviasi 1,047, setelah diberikan intervensi dengan mean 3,38 standar deviasi 1,821. Hasil uji statistik menggunakan test-dependen didapat nilai beda 2 mean sebelum dan sesudah diberikan terapi distraksi menonton video kartun adalah 4,43 dengan p-value 0.000 ( $\alpha < 0.05$ ).

**Simpulan:** Terdapat pengaruh terapi distraksi menonton video kartun dengan pengurangan nyeri pada pengambilan darah pada anak. Saran Dapat memberi informasi bagi perkembangan keperawatan tentang teknik distraksi menonton video animasi pada anak yang mengalami nyeri, hingga dapat mengurangi kejadian stress akibat hospitalisasi pada anak.

**Kata Kunci:** Dikstrasi; Menonton video; Nyeri; Pengambilan darah; Anak

## Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Karya Tugas Akhir Ners dengan judul “Efektifitas Asuhan Keperawatan Pada Pasien *Acute Decompensated Heart Failure* Dengan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Nyeri Dan Kenyamanan Menggunakan Intervensi Distraksi Visual” bernama lengkap Rahmat Rasyid Siagian, yang biasa di panggil Rahmat. Lahir di Kelurahan Hutasuhut, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 15 Maret 1999. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara, anak dari Bapak Samsul Bahri Siagian dan Ibu Rostina Siregar. Pernah menempuh pendidikan pertama kali di SD Muhammadiyah Sapiro pada tahun 2005-2011, selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN-1 Sapiro pada tahun 2011-2014, selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMAN-1 Sapiro pada tahun 2014- 2017, selanjutnya penulis pernah menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Bahasa Arab Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017-2018, kemudian karena dorongan dari orang tua dan keluarga maka penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jalur UM-PTKIN pada tahun 2018. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Program Sarjananya pada tahun 2022 dan mendapat gelar S.Kep. Kemudian tidak sampai disitu, penulis bertekad kuat untuk melanjutkan pendidikan pada Profesi Ners UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022. Penulis pernah aktif di beberapa organisasi internal kampus yaitu HMJ Keperawatan, Sanggar Seni Rufaidah dan organisasi eksternal kampus yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Gowa. Penulis memiliki motto hidup “Setiap orang memiliki ujiannya sendiri, tinggal bagaimana dia menjalani dan berproses dengan caranya sendiri”.