

**VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS UNTUK  
ANALISIS KAFEIN PADA KOPI INSTAN**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**RASMI**

**70100119023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmi  
NIM : 70100119023  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kolaka 5 juni 2000  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Villa Mandiri Blok D1/06, Kel.  
Paccinongan, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa  
Judul Penelitian : Validasi Metode Spektrofotometri UV-Vis Untuk  
Analisis Kafein Pada Kopi instan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa, 21 Agustus 2023

Peneliti

Rasmi

NIM 70100119023

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Validasi Metode Spektrofotometri UV-VIS Untuk Analisis Kafein Pada Kopi Instan” yang disusun oleh Rasmi NIM: 70100119023, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Agustus 2023 yang bertepatan 4 shafar 1445 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 21 Agustus 2023

4 Shafar 1445

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr. Syatirah Sp,A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: apt.Surya Ningsi, S,Si.,M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt.Khaerani, S.Farm.,M.Farm.Klin	(.....)
Munaqisy II	: Dr.St. Nasriah, M.Sos.I	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dr.dr.Syatirah Jalaluddin,M.Kes.,Sp.A

NIP.198007012006042002

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai Rahmatan Lil'alam beserta para sahabat. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua orang-orang yang sangat berharga dan berperan penting dalam hidup penulis yakni kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti dalam mendoakan serta memotivasi penulis untuk bisa bertahan dalam melewati tahapan penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih khususnya saudara penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Hj. Syatirah, M.Kes., Sp.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Hj.Gemy Nastity Handayany., S.Si.,M.Si., Apt selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
4. Dr. H. M. Fais Satrianegar, S,KM., MARS selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. apt. Surya Ningsih, S.Si., M.Si. selaku Ketua Prodi Farmasi UIN Alauddin Makassar.
7. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si selaku Sekretaris Prodi Farmasi UIN Alauddin Makassar dan selaku Pembimbing pertama peneliti yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis dalam penulisan serta pengarahan dalam mengoreksi kekurangan pada skripsi ini.
8. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. apt. Khaerani, S,Farm.,M.Farm.klin selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh seluruh kekurangan pada skripsi ini.
10. Dr. St. Nasriah,M.Sos.I selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

11. Bapak dan ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.


Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 21 Agustus 2023

Peneliti,

Rasmi

NIM 70100119023




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK .....	xii
ASBTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional .....	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
E. Kajian Pustaka .....	4
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	8
A. Kopi Instan .....	7

B. Kafein.....	13
C. Standar Nasional Indonesia Kafein .....	14
D. Spektrofotometri Uv-Vis .....	15
E. Validasi Metode Analisis .....	28
F. Tinjauan Islami .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sampel .....	47
D. Alat dan Bahan.....	47
E. Prosedur Kerja.....	48
F. Analisis Hasil.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian .....	54
B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>83</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Struktur Kimia Kafein.....	13
Gambar 2 2 Diagram alat spektrofotometri Uv-Vis (single beam).....	19
Gambar 2 3 Skema Spektrofotometer Uv-vis Double Beam.....	20
Gambar 2 4 Gambaran Spektrum UV-Vis.....	23
Gambar 2 5 Absorbansi Sinar UV-Vis oleh larutan sampel dalam kuvet.....	24
Gambar 2 6 Skema Kerja Spektrofotometri UV-VIS .....	28
Gambar 2 7 Delapan Tahap Metode Analisis .....	31
Gambar 2 8 Parameter Validasi Menurut ICH .....	32
Gambar 4 1 Hasil penentuan regresi linear baku kafein.....	55
Gambar 4 2 Kurva kalibrasi penentuan batas deteksi dan batas kuantitas.....	57



## DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Syarat Mutu Kopi.....	15
Tabel 2 2 Serapan Sinar Uv pada $\lambda_{\max}$ .....	21
Tabel 2 3 Perolehan kembali analit pada beberapa konsentrasi.....	38
Tabel 4 1 Hasil pengukuran panjang gelombang maksimum .....	54
Tabel 4 2 Hasil pengujian linearitas.....	55
Tabel 4 3 Hasil pengujian presisi .....	55
Tabel 4 4 Hasil pengujian akurasi.....	56
Tabel 4 5 Hasil pengujian batas deteksi (LOD) dan batas kuantitas (LOQ).....	56



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Kerja .....	71
Lampiran 2 Gambar Proses Penelitian .....	75
Lampiran 3 Gambar Hasil Pengukuran Secara Spektrofotometri UV-Vis .....	77



## ABSTRAK

**Nama** : RASMI  
**Nim** : 70100119023  
**Judul** : Validasi Metode Analisis Spektrofotometri UV-Vis Untuk Analisis Kafein Pada Kopi Instan.

---

Kopi instan merupakan kopi dalam bentuk cairan yang telah tercampur dengan bahan-bahan lainnya seperti pengawet, pemanis buatan dan pewarna makanan. Banyak metode analisis yang telah digunakan untuk menetapkan kadar kafein pada kopi instan, namun adanya perbedaan bentuk dan komposisi produk menyebabkan perlunya dilakukan pengembangan metode analisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan validasi metode spektrofotometri UV-Vis dalam penentuan kadar kafein. Jenis penelitian adalah eksperimental. Parameter validasi yang digunakan yaitu linearitas, presisi, akurasi, LOD, dan LOQ. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi ( $R^2$ ) 0,99868; RSD 0,50271829; %*Recovery* 99,333%; batas deteksi sebesar 21,395  $\mu\text{g/mL}$ , dan batas kuantitas sebesar 71,361  $\mu\text{g/mL}$ . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode analisis kafein spektrofotometri UV-Vis valid dan dapat digunakan untuk analisis kafein pada kopi instan.

**Kata Kunci:** kafein, Kopi instan, Spektrofotometri UV-Vis, validasi.



## ABSTRACT

**Name** : Rasmi  
**Reg. Number** : 70100119023  
**Title** : **Validation of UV-Vis Spectrophotometric Analysis Method for Caffeine Analysis in Instant Coffee.**

---

*Instant coffee is coffee in liquid form that has been mixed with other ingredients such as preservatives, artificial sweeteners and food coloring. Many analytical methods have been used to determine caffeine content in instant coffee, but the differences in the shape and composition of the product make it necessary to develop analytical methods. The purpose of this study was to validate the UV-Vis spectrophotometric method in determining caffeine content. This type of research is experimental. The validation parameters used are linearity, precision, accuracy, LOD, and LOQ. The results showed that the correlation coefficient ( $R^2$ ) was 0.99868; RSD 0.50271829; %Recovery 99.333%; detection limit of 21.395  $\mu\text{g/mL}$ , and quantity limit of 71.361  $\mu\text{g/mL}$ . Based on the results of the study it can be concluded that the UV-Vis spectrophotometric caffeine analysis method is valid and can be used for the analysis of caffeine in instant coffee.*

**Keywords:** *caffeine, Instant coffee, UV-vis spectrophotometry, validatio*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Kopi menjadi salah satu tumbuhan terdapat kandungan kafein didalamnya yang biasayan ditemui dalam minuman kemasan. Kopi saat ini menjadi minuman favorit setelah air dan teh (Cornelis, 2019). Kini, kopi tak hanya dinikmati oleh kalangan orang tua, melainkan telah menjadi minuman favorit bagi para generasi muda. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya jumlah minuman instan kopi yang beredar di pasaran. Kopi instan umumnya lebih disukai karena harga yang murah serta mudah didapatkan. Kopi memiliki Salah satu kandungan senyawa kafein.

Kopi, teh dan coklat merupakan produk yang mengandung kafein berjenis alkaloid. Jika dikonsumsi, kafein mampu merangsang sistem saraf pusat dan otot jantung dalam tubuh. (Aprilia.,et al, 2018).

Kafein memiliki sifat adiktif dan dapat membantu manusia untuk memberikan dampak yang baik tetapi jika dikonsumsi dalam dosis yang tidak berlebihan yaitu sekitar 400 mg. Efek positif tersebut meliputi peningkatan gairah, kegembiraan, dan kesenangan. Namun, pemakaian kafein terlalu banyak dapat menyebabkan ketergantungan jika dikonsumsi secara teratur dan dalam jumlah banyak (Wilson, 2018). Oleh karena itu, disarankan untuk yang dikonsumsi manusia dengan jumlah kafein yang diizinkan. SNI 01-7152-2006 menyatakan bahwa jumlah kafein yang dapat dikonsumsi setiap hari, baik langsung maupun dicampur, tidak boleh melebihi 50 mg per sajian atau 150 mg per hari.. Dengan mematuhi batas tersebut, kita dapat menikmati manfaat kafein tanpa risiko ketergantungan yang berlebihan. (Usken Fisdiana, 2022)

Spektrofotometri adalah teknik kimia analitik dipergunakan dalam menganalisis suatu komposisi dalam sampel yang dapat secara kuantitatif maupun kualitatif menggunakan interaksi antara materi dan cahaya. Alat yang digunakan dalam spektroskopi disebut spektrofotometer. Cahaya yang digunakan dapat berupa cahaya tampak, sinar UV, dan sinar infra merah, sedangkan bahan yang diuji dapat berupa atom dan molekul, namun elektron valensi lebih berperan.

Validasi metode analitik adalah suatu proses evaluasi parameter termasuk pengujian yang dilakukan dalam laboratorium yang dapat membuktikan bahwa parameter yang kita gunakan sesuai dengan standar (Harmono, 2020). Pada proses ini digunakan sampel yang telah dihitung sebelum dilakukan pengujian, validasi memberikan informasi berharga tentang keakuratan, presisi, linearitas, dan ciri khas lain metode ini untuk menguji metode sampel yang tidak diketahui. Selain itu, validasi juga membantu mengetahui asal usul variasi yang tidak diketahui terduga (Torbeck L.D., 2007:2007:17). Penting untuk melakukan validasi ulang meskipun sebelumnya telah dilakukan validasi yang dapat membuktikan bahwa data sebelumnya sudah sesuai dengan syarat yang ada. Hal ini dikarenakan adanya keraguan yang apabila pada keadaan tertentu hasil pengujian belum tentu sama dengan hasil pengujian yang telah dilakukan, reagen, analisis yang melaksanakan, dan faktor-faktor lain yang mungkin berbeda pada situasi yang berbeda.

Berdasarkan Farmakope Indonesia, metode analisis yang diterapkan pada analisis kadar glibenklamid adalah kromatografi cair kinerja tinggi (Dirjen POM, 1995:410). Beberapa metode untuk analisis diketahui sulit,

memakan waktu, atau memerlukan derivat dari obat. Oleh karena itu, pengembangan metode yang lebih sederhana sangat diperlukan.

Validasi metode analisis metode yang sudah ada tetapi jika ingin digunakan secara rutin perlu dilakukan pengembangan metode. Proses validasi juga diperlukan jika ada perubahan antara kondisi analisis dengan kondisi yang ada saat metode tersebut divalidasi, serta jika terjadi perubahan dari metode standar yang biasa digunakan.

Tujuan dilakukannya adalah Validasi metode analisis ini melibatkan pembuktian melalui hasil pengujian atau penelitian yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan hasil yang diinginkan sesuai dengan persyaratan (Wisudyaningsih, 2015).

Berdasarkan dari penjelasan diatas, penting untuk melakukan validasi metode analisis untuk penetapan kadar kafein dalam kopi instan menggunakan teknik spektrofotometri UV-Vis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa metode analisis tersebut valid, akurat, dan dapat diandalkan secara ilmiah. Dengan validasi yang baik, hasil analisis kafein dalam kopi instan dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar keputusan dengan keyakinan yang kuat.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Berapakah nilai korelasi  $r$  pada regresi linear linearitas pada parameter validasi spektrofotometri UV-Vis?
2. Berapakah nilai relative standard deviation (RSD) presisi parameter validasi spektrofotometri UV-Vis?
3. Berapakah nilai recovery dari akurasi pada parameter validasi spektrofotometri UV-Vis?
4. Berapakah batas deteksi dari limit of detection (LOD) dan limit of quantity (LOQ) parameter validasi spektrofotometri UV-Vis?

### ***C. Definisi Operasional***

Dalam penelitian ini, beberapa istilah digunakan untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran oleh pembaca terhadap kata-kata yang ada dalam judul. Oleh karena itu, berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Spectrophotometry UV-Vis adalah salah satu teknik analisis spektroskopi yang menggunakan sumber radiasi elektromagnetik (REM) pada daerah ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar tampak (380-780 nm) melalui penggunaan instrumen pengukuran spektrofotometer.
2. Validasi metode analisis merupakan upaya untuk menjamin kualitas hasil analisis dengan kuantitatif. Dalam metode analisis ini, validasi dapat dilakukan dalam memverifikasi adanya parameter-parameter yang digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis dengan memadai.
3. Kafein adalah senyawa alkaloid yang penting dan terdapat didalam biji kopi.

### ***D. Ruang Lingkup Penelitian***

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium murni untuk validasi spektrofotometri uv-vis pada analisis kafein kopi instan.

### ***E. Kajian Pustaka***

Dalam tinjauan pustaka, beberapa penelitian sebelumnya telah diulas dengan tujuan untuk mengevaluasi kejelasan arah penelitian, orisinalitas, manfaat, dan posisi penelitian ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini dibandingkan dengan beberapa temuan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

1. Susanti (2020). "Perbandingan Metode Spektrofotometri UV Dan HPLC pada Penetapan Kadar Kafein dalam Kopi". Berikut adalah hasil

validasi metode analisis kafein secara spektrofotometri: 1) Linearitas: Koefisien korelasi (R) sebesar 0,9965, menunjukkan hubungan linier yang kuat antara konsentrasi kafein dengan respons spektrofotometri. 2) Presisi: Deviasi standar relatif (RSD) sebesar 0,899%, menunjukkan tingkat presisi yang tinggi dalam pengukuran kafein. 3) Akurasi: Nilai recovery sebesar 98,46%, menunjukkan tingkat akurasi yang baik dalam metode analisis ini. 4) Limit of Detection (LOD): Nilai LOD sebesar 1,12  $\mu\text{g/ml}$ , menandakan batas deteksi terendah yang dapat diukur dengan metode ini. 5) Limit of Quantification (LOQ): Nilai LOQ sebesar 3,75  $\mu\text{g/ml}$ , menandakan batas kuantifikasi terendah yang dapat diukur dengan metode ini. Hasil validasi ini menunjukkan bahwa metode analisis spektrofotometri untuk kafein adalah valid, akurat, dan sensitif dalam mengukur konsentrasi kafein dalam sampel.

2. Fajriana dan Fajriati (2018). “Analisis kandungan kafein pada kopi arabika (kopi *L arabica*) dengan suhu penyangraian yang bervariasi secara spektroskopi UV”. Hasil validasi metode analisis spektrofotometri Uv-Vis menunjukkan kebenaran dan keakuratan masih pada tingkat yang dapat diterima. Nilai eksak yang didapat adalah 0,201. Akurasi mencapai 121,73%, dengan nilai deviasi standar relatif (RSD) sebesar 0,2033%.
3. Balqis (2020). “Validasi Metode Analisis Kafein Pada Kopi *Latte* Dengan Spektrofotometri UV-Vis”. Berdasarkan penelitian tersebut menjelaskan bahwa Validasi metode analisis untuk mengukur kadar kafein pada kopi latte telah dilakukan dengan mengamati beberapa kriteria validasi, termasuk akurasi, presisi, linearitas, rentang, dan spesifisitas. Hasil pengujian validasi menunjukkan bahwa metode ini memiliki karakteristik linier dengan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,9927 pada rentang

konsentrasi 8-16 ppm. Presisi metode ini juga terbukti tinggi, dengan deviasi standar relatif (RSD) sebesar 0,853%. Selain itu, metode ini menunjukkan akurasi yang baik dengan nilai recovery sebesar 106,263%. Validasi juga membuktikan bahwa metode ini spesifik, karena panjang gelombang maksimum sampel hanya berbeda  $\pm 2$  nm dari panjang gelombang maksimum larutan baku (273 nm). Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis ini dapat dijadikan sebagai alternatif yang memadai untuk analisis kadar kafein pada kopi latte.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penggunaan metode spektrofotometer UV-Vis sangatlah cocok untuk melakukan analisis kafein pada kopi. Dalam prosesnya, metode ini dilakukan dengan menggunakan validasi analisis spektrofotometri UV-Vis yang telah terbukti valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah..

#### ***F. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui nilai recovery dari akurasi parameter validasi spektrofotometri UV-Vis
2. Untuk mengetahui nilai relative standard deviation (RSD) presisi parameter validasi spektrofotometri UV-Vis
3. Untuk mengetahui nilai korelasi  $r$  pada regresi linear linearitas pada parameter validasi spektrofotometri UV-Vis
4. Untuk mengetahui batas deteksi dari limit of detection (LoD) dan limit of quantity (LoQ) parameter validasi spektrofotometri UV-Vis

#### ***G. Manfaat Penelitian***

1. Bagi Institusi Pendidikan (UIN Alauddin Makassar)

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan kepada UIN Alauddin Makassar terkait validasi metode spektrofotometri UV-Vis dalam menganalisis kandungan kafein pada kopi instan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi yang berharga untuk pengembangan ilmu dan penelitian di institusi pendidikan tersebut.

## 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta wawasan tentang metode validasi spektrofotometri UV-Vis dalam menganalisis kandungan kafein pada kopi instan. Mahasiswa dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai teknik analisis yang relevan dalam bidang kimia dan analisis makanan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini atau mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam lingkungan akademik dan industri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Kopi Instan*

Tanaman kopi adalah tanaman yang paling banyak dikenal biasanya dikenal juga dengan *familia rubiaceae gebus coffea*. Tumbuhan kopi adalah jenis tumbuhan dikotil, memiliki biji dua bagian, dan tumbuhan kopi ini biasanya tingginya mencapai 10 meter yang tumbuh dialam bebas. Biasanya tanaman kopi ini tingginya tidak boleh melebihi dari 3 meter hal ini disebabkan agar pohon kopi tetap optimal dan mempermudah pada saat dipanen, ciri-ciri pohon kopi ini memiliki batang terkulai dan daunnya berpasangan. Panjang daun sekitar 15 cm pada jenis *Coffea Arabica* dan lebih panjang pada *Coffea Canephora*. Daun berbentuk oval atau lanset dan berwarna hijau tua dengan kilauan (Clarke dan Macrae, 1985).

Bibit kopi yang dibawa belanda kemalabar,india dan ditanam di kadawung pada tahun 1969. Pada proses penanaman bibit kopi pertama kali, bibit kopi tersebut gagal tumbuh karena adanya bencana alam pada tahun 1969. Belanda melakukan penanaman kembali yang dimana bibit didatangkan langsung dari malabar yang kemudian dikirim ke pulau jawa pada tahun 1706. Pada akhirnya usaha penanaman yang kedua dilakukan belanda berhasil sehingga belanda memperluas perkebunan kopi ke bagian-bagian pulau yang diindonesi (Afliana, 2018). Namun indonesia yang memiliki daerah dataran rendah menyebabkan kopi yang tumbuh terkena penyakit karat. Belakangan, dalam upaya mengatasi masalah ini, Belanda mencoba memperkenalkan kopi lain yang disebut liberika yang harus lebih tahan terhadap karat daun. Namun tak berbeda dengan hasil yang didapat ketika pohon kopi liberika juga ikut rusak akibat penyakit yang disebabkan indonesia berada pada dataran rendah.

Akhirnya setelah mencoba kembali belanda dengan memperkenalkan spesies lain yang dikenal dengan spesies robusta pada tahun 1907. Upaya yang sangat bagus karena tanaman kopi robusta mampu tumbuh dan di wilayah indonesia (Aflana, 2018).

Kopi yang berasal dari indonesia paling banyak disukai dan permintaan dari luar negeri terus meningkat karena memiliki rasa keasaman dan aroma dan cita rasa yang unggul (Afriliana,2018). Kopi yang berasal dari indonesia telah terdaftar sebagai 5 besar penghasil dan eksportir dunia yang dengan urutan ke-4.

Proses pertumbuhan tumbuhan kopi dari perkecambahan sampai berbunga dan berbuah memerlukan waktu sekitar tiga tahun. Bunga pada semua spesies kopi berwarna putih dan memiliki aroma yang harum. Bunga-bunga ini muncul pada ketiak daun. Buah kopi terdiri dari kulit buah terluar (epikarp), daging buah (mesokarp), dan kulit biji yang keras (endokarp). Buah kopi membutuhkan waktu sekitar 12 bulan untuk matang. Biji yang terdapat dalam kopi berjumlah 2 biji yang dibaluti kulit yang sangat keras (Rahardjo, 2017).

Kopi instan salah satu produk olahan dari tanaman yang sangat populer yaitu kopi yang dapat diseduh dengan air dingin maupun panas (A. Gafar, 2018). Sebelum menjadi produk olahan kopi dilalui beberapa proses seperti proses ekstrak kopi dan kemudian dikeringkan hingga dapat dikonsumsi dengan mudah. Salah jenis kopi instan adalah kopi bubuk yang dapat diseduh dengan air panas (Suharaman & A. Gafar, 2017).

Kopi instan dapat diolah dengan jumlah besar maupun dengan jumlah yang kecil. Untuk proses pengolahan kopi instan bubuk dapat dilakukan ekstrak

terlebih dahulu sebelum dikeringkan dengan menambahkan gula kristal dan kopi walaupun dalam pembuatan kopi instan ini dapat merubah ciri khas rasa pada kopi bubuk.(Usken Fisdiana, 2022).

Seiring perkembangannya minuman kopi instan, sama halnya dengan kehidupan manusia, selalu berubah dan berkembang. Dalam perkembangan kopi instan ini sangat berkembang baik itu dalam proses produksinya maupun dalam segi kemasannya, seperti beberapa sejarah perkembangan kopi yang dijelaskan oleh Yuliandri (2015).

a. Gelombang pertama (*First Wave Coffee*)

“Gelombang Pertama” yaitu abad ke-19, era dimulainya, banyak produsen yang berkompetisi dalam membuat produk kopi menarik sehingga dapat dinikmati masyarakat dengan harga terjangkau. Tetapi jika produksi kopi dilakukan dengan jumlah yang banyak membuat rasa kopi kurang enak, menyebabkan kritik dan penolakan dari penikmat kopi. Pada masa ini, muncul beberapa produk sebagai berikut:

a) Vacuum Packaging

pengembangan proses kemasan dengan teknologi vakum pada tahun 1900 yang dilakukan oleh Hill Bros Coffee, R.W. Hills. Proses ini dapat menjaga kualitas kopi sehingga bertahan lebih lama, membuat biji kopi yang lebih segar. Inovasi ini dengan cepat menyebar dari San Francisco ke Chicago, dan kemudian merambah ke New York, sehingga kemasan vacuum packaging menjadi bahan alternatif untuk dikirim ke seluruh penjuru dunia.

## b) Kopi Instan

Kopi instan muncul sebagai inovasi praktis bagi pecinta kopi pada awal abad ke-20. Mengembangkan proses dehidrasi, Satori Kato, seorang keturunan Jepang-Amerika, memperoleh paten untuk pembuatan kopi instan pertama di Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan nama "Coffee Concrete and Process of Making Same." Bahkan tentara Perang Dunia I mulai mengonsumsi kopi instan setiap hari sejak tahun 1917, yang membuatnya sangat praktis untuk disajikan.

Pada tahun 1938, merek Nescafe milik Nestle menjadi merek kopi instan paling inventif dalam sejarah bahkan pada saat perang dunia ke II Amerika Serikat selalu menjadi pemasok kopi. Pada tahun 1970-an, kejayaannya, kopi instan menghasilkan hampir sepertiga dari impor kopi.

## c) Folgers, Maxwell House dan Mr. Coffee

Ketiga merek terkenal tersebut berkontribusi besar pada industri kopi, terutama di Amerika Serikat, dengan gelombang pertama kopi.

## b. Gelombang Kedua (*Second Wave Coffee*)

Setelah "kopi buruk" dibuat pada gelombang pertama, para pecinta kopi ingin kopi yang lebih enak dan ingin tahu dari mana kopi mereka berasal. Ini memicu gelombang kedua ini. Selain itu, orang-orang pada era ini mulai tertarik untuk mengetahui bagaimana memasak kopi dan bagaimana memprosesnya, yang menyebabkan munculnya banyak istilah baru dalam dunia kopi seperti café latte, espresso, cappuccino, dan french press.

Banyaknya kritikan yang terjadi akibat cara meminum kopi membuat banyak orang yang memperluas bisnisnya dengan membuka kedai kopi dan sebuah café pada gelombang kedua. Di gelombang ini, merek besar

seperti Starbucks muncul. Pada tahun 1971, Starbucks awalnya berfokus hanya untuk menjual biji kopi saja daripada minuman kopi seperti sekarang. Namun, meskipun pemilik Starbucks awalnya menolak gagasan ini, Howard Schultz sangat yakin bahwa kopi yang dijual dengan cara diseduh akan laris setelah bergabung sebagai direktur pemasaran. Schultz terus berusaha, membangun jaringan kopi yang sangat luas, dan akhirnya membeli Starbucks senilai 3.8 juta dolar.

Starbucks berkembang pesat dengan memiliki 3000 cabang di seluruh dunia pada saat itu dengan menawarkan menu espresso dan latte yang sangat disukai.


#### c. Gelombang Ketiga (*Third Wave Coffee*)

Pada tahun 2002 dalam artikel dituliskan bahwa gelombang kopi yang ketiga masuk dalam kategori baru. Pada era ini ditandai oleh minat pecinta yang semakin meningkat sehingga menjadi awal mula terjadinya . pada era ini rasa kopi yang kurang baik sehingga mendapatkan respon yang kurang baik pula. Transparansi dalam proses membuat kopi dalam jumlah banyak semakin meningkat, hal ini mempermudah seseorang untuk mengetahui lebih banyak dari asal biji kopi, proses pengolahan, dan cara penyeduhan kopi.

Pada gelombang ini, mulai muncul café kopi yang dimana kopinya dibuat sendiri mulai dari proses awal hingga dapat dikonsumsi dengan baik mencoba berbagai jenis kopi. Istilah seperti acidity, bitterness, sweetness, aroma, single origin, dan manual brewing mulai populer pada saat orang di seluruh dunia memperhatikan aftertaste dari setiap kopi.

## H. Kafein

Kafein, salah satu jenis alkaloid dari kelompok metilxantin, memiliki efek farmakologi untuk merangsang meningnitis dan membuat ketarampilan kerja meningkat. Ini membuat agar tubuh kita menjadi fit sehinggamemiliki lebih banyak energi. Namun, efek samping seperti muncul rasa waswas,jantung berdenyut kencang, insomnia, otot menjadi mudah bergetar, peningkatan produksi urine, hipertensi maka dari itu risiko ketergantungan ringan dapat muncul jika kafein dikonsumsi lebih dari batas yang disarankan (Irawati et al., 2018).



(Gambar 2 1 Struktur Kimia Kafein)

Kafein adalah senyawa alkaloid yang berasal dari xanthine, memiliki nama kimia 1,3,7-trimethylxanthine, dan memiliki rumus molekul C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>. Kafein murni berbentuk kristal heksagonal berwarna putih, tanpa bau, sedikit pahit, dengan titik leleh sekitar 235-238 °C, dan memiliki berat molekul sebesar 194,19 g/mol. Kafein dapat larut dalam kloroform dan sebagian larut dalam air pada suhu kamar (2 g/100 ml). Zat yang terkandung didalam kafein adalah zat psikoaktif yang merupakan salah satu paling banyak dikonsumsi hingga keseluruhan penjuru dunia dan berperan sebagai stimulan sistem saraf pusat pada manusia (Edy Agustian Yazid, 2021).

Kafein, salah satu jenis alkaloid dari kelompok metilxantin, memiliki efek farmakologi untuk merangsang meningnitis dan mepercepat

keterampiliran dalam bekerja. Ini membuat semakin fit dan memiliki lebih banyak energi. Namun, efek samping seperti muncul rasa waswas, jantung berdebut kencang, insomnia, otot menjadi mudah bergetar, peningkatan produksi urine, tekanan darah tinggi, dan risiko ketergantungan dapat muncul jika kafein dikonsumsi lebih dari batas yang disarankan (Irawati et al., 2018).

Berdasarkan Farmakope Indonesia Edisi III, kafein digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat dan kardiotonikum. Dosis maksimum kafein yang dianjurkan adalah 500 mg sekali pakai dan 1,5 gram per hari (Farmakope Indonesia Edisi III, 1979).

#### ***I. Standar Nasional Indonesia Kafein***

Kafein yang terdapat dalam biji kopi memiliki kisaran kadar sekitar 1,5%-2,5% (Tjay & Rahadja, 2007).

Karena adanya campuran bahan lain, kadar kafein dalam kopi yang dijual di pasar dapat berbeda-beda. Untuk mengatasi hal ini, badan standardisasi nasional (BSN) menetapkan standar kadar kafein minimal 2,5% dalam kopi (SNI 01-3542-2004). Proses dekafeinasi digunakan untuk mengurangi jumlah kafein dalam kopi dan menghentikan aktivitas kafein dalam tubuh (Sofiana, 2011).

Persyaratan mutu kafein dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2 1 Syarat Mutu Kopi**

<b>Kriteria Uji</b>	<b>Satuan</b>	<b>Persyaratan</b>
Kafein	%	2,5 %

#### ***J. Spektrofotometri UV-Vis***

Dalam kimia analisis, spektrofotometri adalah teknik yang berdasarkan interaksi antara materi dengan cahaya dalam mengukur komposisi suatu sampel secara kuantitatif maupun kualitatif. Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis adalah ketika cahaya monokromatik melewati suatu media (larutan),

sebagian diserap, dipantulkan, dan dipancarkan. Menurut Yanlinastuti (2016), metode ini memiliki keuntungan karena memberikan metode yang sangat mudah untuk menentukan kuantitas zat yang sangat kecil.

Meskipun manusia tidak dapat melihat panjang gelombang sinar ultraviolet, hewan seperti burung dan reptil dapat melihatnya. Panjang gelombang sinar ultraviolet adalah 190–380 nm, sedangkan panjang gelombang cahaya tampak (visible) adalah 380–780 nm (Suhartati, 2017).

Analisis zat organik dan anorganik lebih mudah dengan spektrofotometri UV-Vis. Untuk mengukur kuantitas zat yang sangat kecil, metode ini memungkinkan penggunaan instrumen yang cepat untuk membaca zat dengan akurasi, dan hasilnya dapat dicetak dengan angka yang tercantum dalam digital atau grafik yang telah diregresi (Wardani, 2021). Sangat akurat dengan tingkat kesalahan 1-3%, sangat cocok dalam me(Rohmah, et al., 2021).

Prinsip spektrofotometri UV-Vis adalah bahwa ketika sumber cahaya monokromatik melewati media atau sampel, dan cahaya lainnya diserap, pantulan, dan transmisi. Pada garis orbit luar, molekul organik aromatik yang memiliki elektron  $\pi$  terkonjugasi dan atom dengan elektron  $n$  mengabsorpsi radiasi ultraviolet dan visible. Ini menyebabkan elektron bergerak tingkat elektron rendah menjadi ke lebih elektron. Beberapa istilah yang digunakan dalam spektrofotometri UV-Vis termasuk auksokrom, kromofor, efek batokromik, efek hiperkromik, dan hipokromik (diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya).

- a. Gugus kromofor, yang biasanya memiliki ikatan rangkap, adalah gugus atom dalam sebuah senyawa yang memiliki kemampuan untuk menyerap panjang gelombang ultraviolet (Sylvia, et al., 2018). Contoh gugus

kromofor termasuk heksana, aseton, benzene, karbondioksida, karbonil, dan gas nitrogen.

- b. Kromofor yang terikat dengan gugus atom tak jenuh disebut dengan auksokrom yang dimana dapat mengubah panjang gelombang dan intensitas cahaya serapan secara maksimal. Beberapa contohnya adalah dari  $\text{OCH}_3$ ,  $\text{-CL}$ ,  $\text{-OH}$ , dan  $\text{NH}_2$  (Retnani, et al., 2010).
- c. Efek batokromik (pergeseran merah) terjadi ketika terjadi panjang gelombang absorpsi ke arah yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh auksokrom yang berikatan dengan kromofor (Suhartati, 2017).
- d. Efek hiperkromik (pergeseran biru) adalah perubahan absorpsi ke panjang gelombang yang lebih pendek. Hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan pelarut atau ketiadaan auksokrom pada kromofor (Suhartati, 2017).
- e. Hipokromik merupakan proses terjadinya transfigurasi translasi ke panjang gelombang ke lebih pendek (Tunnisa et al., 2018).

Analisis spektrofotometri mengukur panjang gelombang dan intensitas cahaya tampak dan sinar Uv yang diabsorpsi oleh sampel. Tindakan ini menggunakan tiga daerah panjang gelombang elektromagnetik: sinar ultraviolet (200–380 nm), sinar tampak (380–700 nm), dan inframerah (700–3000 nm) (30). Bilangan gelombang ( $\nu$ ) adalah satuan per panjang gelombang, dan panjang gelombang ( $\lambda$ ) adalah jarak antara puncak dan lembah gelombang.


Sumber cahaya UV dan visibel digunakan dalam spektrofotometri UV-Vis. Kelebihan dari teknik bisa digunakan dalam sampel apa saja baik sampel yang berwarna ataupun tidak berwarna. Dalam spektrofotometri ini, instrumen yang digunakan disebut spektrofotometer, yang termasuk dalam kategori fotometer dan digunakan untuk mengukur intensitas cahaya.

Proses analisis dengan Spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti berikut:

- a. Dalam analisis kuantitatif, absorbansi yang digunakan dalam menentukan panjang gelombang adalah hasil pengukuran absorbansi maksimum. Fungsi dari konsentrasi yang dibuat untuk melihat panjang gelombang maksimum yang dilihat dari kurva hasil dari pengukuran.
- b. Berbagai konsentrasi dari zat larutan baku yang dibuat digunakan untuk melihat kurva kalibrasi dari hasil pengujian. Kemudian, absorbansi dari berbagai larutan yang dibuat diukur dengan berbagai konsentrasi yang berbeda, dan dari hasil pengukuran dapat dilihat hubungan konsentrasi ( $x$ ) dan absorbansi ( $y$ ). Kurva baku akan berbentuk garis lurus jika hukum Lambert-Beer diterapkan.
- c. Untuk mengurangi kesalahan fotometrik, sampel diperiksa dengan spektrofotometer. Nilai absorbansi yang dibaca sebaiknya berada di antara 0,2 dan 0,6, atau 15% hingga 70% jika dibaca sebagai transmisi.
- d. Konsentrasi sampel dapat dihitung dengan menggunakan metode regresi, yang dimana konsentrasi sampel dapat dilihat dari hasil kurva kalibrasi yang menunjukkan persamaan regresi nilai yang didapatkan dari serapan dan larutan sampel yang dibuat secara berbeda-beda. Minimum, metode ini digunakan dengan rentang lima konsentrasi yang meningkat untuk menghasilkan serapan linier. Dengan demikian, kurva kalibrasi dapat dihasilkan.

### a) Tipe Spektrofotometri

Dalam spektrofotometri UV-Vis, dua jenis instrumen yang paling umum digunakan adalah single-beam dan double-beam. Untuk mengukur panjang gelombang tunggal digunakan single-beam. Salah satu kemudahan yang didapatkan dari jenis single beam ini adalah desain yang lebih sederhana dan harga yang lebih murah atau lebih hemat biaya (Suhartati, 2017).




(Gambar 2.3 Diagram alat spektrofotometri UV-Vis (single beam))

(Suhartati, 2017)

Pada spektrofotometer UV-Vis, monokromator menggunakan lensa prisma dan filter optik untuk mendapatkan sinar polikromatis. Lampu deuterium digunakan untuk sinar ultraviolet (UV), dan lampu wolfram digunakan untuk sinar tampak atau visibel. Sampel disimpan dalam kuvet kuarsa atau gelas yang bervariasi dalam lebarnya.

Pada spektrofotometer UV-Vis, detektor dapat berupa detektor dioda foto, detektor panas, atau detektor foto. Tugas detektor adalah

menangkap cahaya yang telah melewati sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik (Suhartati, 2017). Diagram spektrofotometer UV-Vis (tipe double-beam) dapat dilihat pada Gambar 2.3.



(Gambar 2.3 Skema Spektrofotometer UV-vis *Double Beam*)

(Suhartati, 2017)

Monokromator memecah cahaya polikromatik menjadi panjang gelombang tunggal dalam spektrofotometri UV-Vis dengan menggunakan lensa prisma dan filter optik. Sampel ditempatkan dalam kuvet kuarsa yang bervariasi dalam lebarnya. Ketika cahaya melewati sampel, detektor mengubahnya menjadi arus listrik (Suhartati, 2017).

#### b) Syarat Pengukuran

Suhartati (2017) menjelaskan bahwa dalam spektrofotometri UV-Vis, penggunaan sampel berupa larutan harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, sampel harus larut secara sempurna dalam pelarut yang digunakan. Selain itu, dalam pengukuran sampel harus yang pelarutnya tidak terdapat kandungan ikatan rangkap terkonjugasi dan pelarut tersebut tidak boleh berwarna. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran suatu

sampel adalah terjadinya interaksi antara molekul dengan komponen larutan lainnya. Selain itu, kemurnian sampel harus tinggi untuk memastikan hasil analisis yang akurat.

**Tabel 2.2 Serapan Sinar UV pada  $\lambda_{\max}$**

Pelarut	$\lambda_{\max}$ , nm	Pelarut	$\lambda_{\max}$ , nm
Asetronitril	190	n- heksana	201
Kloroform	240	Metanol	205
Sikloheksana	195	Isooktana	195
1-4 dioksan	215	Air	190
Etanol 95 %	205	Aseton	330
Benzena	285	Piridina	305

(Suhartati, 2017)

Hukum Lambert mengatakan bahwa absorbansi cahaya dalam suatu larutan berbanding lurus dengan ketebalan sel ( $l$ ) yang disinari, sementara Hukum Beer mengatakan bahwa untuk larutan yang sangat encer dan cahaya monokromatik, absorbansi juga berbanding lurus dengan konsentrasi zat dalam larutan ( $c$ ). Kedua hukum ini digabungkan menjadi Hukum Lambert-Beer, yang menyatakan bahwa absorbansi ( $A$ ) cahaya dalam larutan bergantung secara linier pada konsentrasi ( $c$ ) dan ketebalan sel ( $l$ ) yang dapat

$$A = \epsilon \cdot c \cdot l$$

Keterangan :  $A$  = Absorbansi Cahaya

$\epsilon$  = Koefisien ekstinsibilitas molar, konstanta yang bergantung pada sifat kromofor dan panjang gelombang cahaya

$c$  = Konsentrasi zat dalam larutan

$l$  = Ketebalan sel atau lapisan larutan yang disinari


Persamaan ini memungkinkan kita untuk mengukur konsentrasi zat dalam suatu larutan dengan mengukur absorbansi cahaya yang diteruskan melalui larutan tersebut. Semakin tinggi konsentrasi zat dalam larutan, semakin besar absorbansi cahaya yang diukur. Demikian juga, semakin tebal ketebalan sel atau lapisan larutan yang disinari, semakin besar absorbansi yang terjadi.

### c) **Interaksi Sinar UV-Vis dengan Senyawa**

Untuk analisis dengan spektrofotometri UV-Vis, air, etanol, metanol, dan n-heksana adalah zat pendispersi yang sering digunakan. Fakta bahwa pelarut-pelarut ini memiliki sifat transparan terhadap cahaya ultraviolet menjadikannya pilihan pelarut ini. Untuk mendapatkan spektrum UV-Vis yang tepat, pemilihan pelarut yang tepat sangat penting. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan konsentrasi sampel yang digunakan dalam analisis (Suhartati, 2017).

### b) **Spektrum UV-Vis**

Untuk spektrofotometri UV-Vis, sinar tampak yang bersambung dan monokromatis digunakan sebagai sumber cahaya. Spektrum UV-Vis digambarkan dalam dua dimensi, dengan sumbu x menunjukkan panjang gelombang dan sumbu y menunjukkan nilai absorbansi. Energi yang diabsorpsi oleh sampel menyebabkan spektrum UV-Vis biasanya berbentuk pita lebar. Spektrum dalam sampel biasanya dipengaruhi oleh adanya transisi rotasi elektron dan vibrasi elektron ikatan dalam molekul.



(Gambar 2 4 Gambaran Spektrum UV-Vis)

(Suhartati, 2017)

Nilai absorbansi sampel berkorelasi positif dengan panjang gelombang yang diserapnya. Rumus Hukum Lambert-Beer menjelaskan pernyataan ini. Ini menyatakan bahwa absorbansi ( $A$ ) sampel berbanding lurus dengan konsentrasi zat yang diukur ( $c$ ) dan ketebalan sel ( $b$ ) yang digunakan dalam analisis. Hukum ini secara matematis dapat digambarkan sebagai persamaan berikut:

$$A = \log I_0/I = a \cdot b \cdot c = \epsilon \cdot b$$

Keterangan :

$A$  = absorban

$a$  = absorptivitas ( $\text{g}^{-1} \text{cm}^{-1}$ )

$b$  = lebar sel yang dilalui sinar (cm)


$c$  = konsentrasi (mol/L)

$\epsilon$  = ekstingsi molar ( $\text{M}^{-1} \text{cm}^{-1}$ )

$I_0$  = intensitas sinar sebelum melalui sampel

$I$  = intensitas sinar sesudah melalui sampel

Dengan demikian, semakin besar nilai konsentrasi ( $c$ ) dan ketebalan sel ( $b$ ) pada sampel, maka nilai absorbansi ( $A$ ) juga akan semakin tinggi sesuai dengan hukum Lambert-Beer.



(Gambar 2 5 Absorpsi sinar UV-Vis oleh larutan sampel dalam kuvet)

(Sumber: Suhartati 2017)

Keterangan:  $I_0$ =intensitas sinar sebelum melalui sampel

$I$ =intensitas sinar setelah melalui sampel

Larutan sampel yang terletak di dalam kuvet dan mengalami penyerapan sinar UV-Vis ditunjukkan pada gambar di atas. Intensitas sinar sebelum ( $I_0$ ) dan intensitas sinar setelah ( $I$ ) yang melewati sampel dibandingkan dengan satu sama lain untuk menunjukkan seberapa banyak sinar yang diabsorpsi sampel (Alwi, 2017). Nilai ekstingsi molar, yang terkait dengan transisi elektron yang diizinkan atau dilarang, sangat penting untuk menentukan struktur karena dapat dihitung berdasarkan spektrum UV-Vis menggunakan persamaan Lambert-Beer. Kromofor senyawa yang dianalisis akan dihitung berdasarkan nilai ini. Seseorang dapat mengetahui konsentrasi suatu senyawa dalam pelarut dengan menggunakan rumus persamaan Lambert-Beer. (Suhartati, 2017).

a. Bagian-bagian spektrofotometer

Bagian-bagian spektrofotometri memiliki fungsi tertentu. Berikut adalah garis besar bagian-bagian spektrofotometer UV-Vis:

1) Sumber cahaya

Sumber Cahaya: Lampu deuterium untuk sinar ultraviolet (190-350 nm) dan filamen tungsten untuk sinar tampak dan dekat ultraviolet (350-900 nm) digunakan dalam bagian spektrofotometer. Sumber cahaya memancarkan cahaya, yang dapat dideteksi oleh detektor. Ada cermin yang mengarahkan cahaya dari sumber ke monokromator.

- a) Celah monokromator ini merupakan salah satu bagian pertama dan terakhir dari sistem optik yang berfungsi untuk membentuk radiasi monokromatik dan menentukan resolusi panjang gelombang. Untuk menghasilkan sinar monokromatik dari cahaya polikromatik, monokromator digunakan. Untuk menguraikan sinar yang diinginkan, alat seperti grating atau prisma dapat digunakan.
- b) Cahaya yang diteruskan memiliki warna yang sama dengan filter optik hal ini disebabkan karena filter optik ini menyerap warna komplementer.
- c) Prisma dan kisi adalah komponen monokromator yang penting untuk mendispersi radiasi elektromagnetik agar radiasi polikromatik memiliki resolusi yang baik (Khopkar. S, 1990).

2) Sel/Kuvet.

Untuk pengukuran pada daerah cahaya tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah ultraviolet (UV), sel kuarsa harus digunakan. Meskipun kuvet biasanya 10 milimeter tebal, ukuran yang lebih kecil atau lebih besar juga dapat

digunakan. Meskipun sel biasanya berbentuk persegi, bentuk silinder juga dapat digunakan untuk pengukuran UV-Vis (Rohmah A, 2014).

### 3) Detektor

Spektrofotometri menggunakan detektor yang memiliki kepekaan tinggi untuk mendapatkan serapan cahaya dari panjang gelombang yang telah ditentukan. Cermin pada detektor diletakan dengan jarak yang berbeda agar. Hal ini menghasilkan dua berkas cahaya dengan jarak tempuh yang berbeda yang melewati beam splitter dan kemudian disatukan kembali pada detektor. Pola interferensi antara dua berkas cahaya adalah sinyal yang ditangkap detektor. Selanjutnya, sinyal detektor hendak diproses kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik pada layar komputer (Alwi H, 2017).

### 4) Recorder


Perangkat listrik yang disebut recorder dapat menampilkan arus atau sinyal detektor dalam satuan yang relevan, seperti daya serap atau presentasi transmitans pada spektrofotometri UV-Vis (Day R. et al., 2014).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui panjang gelombang yang akan digunakan maka analisis yang harus digunakan adalah analisis kuantitatif. Dalam hal ini perlu dilakukan pembuatan kurva kalibrasi yang dilihat dari hasil absorbansi dengan menggunakan konsentrasi berbeda yang telah dibuat.

2. Untuk menganalisis kurva kalibrasi terlebih dahulu harus dibuat larutan baku yang berbeda. Setelah mengukur absorbansi dengan berbagai jenis konsentrasi yang dibuat tadi maka didapatkan nilai absorbansi, kurva dibuat untuk menunjukkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi. Kurva kalibrasi akan berbentuk garis lurus jika hukum Lambert-Beer dipenuhi (Rohman, 2007: 467).

Skema kerja spektrofotometer UV-VIS sebagai berikut:



(Gambar 2 6 Skema Kerja Spektrofotometri UV-Vis (Mulja, 1995))

#### ***E. Validasi Metode Analisis***

Metode validasi ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengonfirmasi bahwa metode analisis memiliki akurasi, spesifisitas,

reproduktibilitas, dan kestabilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam menganalisis. Proses validasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah benar-benar sesuai atau belum dalam memenuhi persyaratan. Validasi metode bertujuan agar hasil dari pengukuran sudah akurat dan dapat diandalkan. Setiap variabel yang terkait dengan metode analisis harus melewati proses validasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dzurriatul Maghfiroh et al., 2022).

Proses penilaian parameter tertentu yang telah diuji di laboratorium dikenal sebagai analisis metode validasi. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa metode yang digunakan sudah benar-benar akurat dan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penilain selanjutnya (Harmono, 2020).

Harmita (2004: 267) mendefinisikan penilaian tertentu terhadap validasi yang akan digunakan dalam pengukuran yang didasarkan pada hasil percobaan laboratorium, dengan tujuan untuk memastikan benar-benar dapat digunakan dalam penelitian atau pengukuran sampel dan menghasilkan hasil yang sudah sesuai dengan syarat standar digunakan.

Validasi metode analisis adalah proses yang terdiri dari setidaknya empat langkah nyata dan dapat menguji dan mampu membuktikan bahwa penelian untuk penelitian dapat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk penggunaannya. Proses validasi terdiri dari empat langkah, yaitu:


Rohman (2007: 463) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek validasi yang harus dipertimbangkan dalam analisis metode, yaitu:

1. Validasi perangkat lunak juga dikenal sebagai metode analisis yang dimana perangkat lunak yang digunakan untuk analisis metode beroperasi dengan akurat dan memenuhi tujuan yang diinginkan.
2. Selanjutnya ada validasi dengan perangkat keras atau instrumen berfungsi untuk memastikan bahwa perangkat keras atau instrumen yang digunakan dalam analisis metode bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang tepat.
3. Kemudian ada validasi metode yang dapat mengkonfirmasi analisis yang akan digunakan memenuhi kriteria akurasi, spesifikasi, reprodutibilitas, dan ketahanan pada rentang analit yang akan dianalisis.
4. Kesesuaian sistem (system suitability): Aspek ini menilai kelayakan dan kemampuan sistem analisis dalam memberikan hasil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.

Menurut United States Pharmacopeia (USP), validasi metode analisis dilakukan untuk memastikan bahwa metode itu akurat, spesifik, reprodutif, dan dapat digunakan dalam rentang analit tertentu (Rohman, 2014).


Secara sederhana, validasi metode analisis adalah upaya untuk membuktikan bahwa parameter tertentu, yang dilakukan melalui eksperimen di laboratorium, memenuhi persyaratan yang diperlukan agar metode tersebut dapat digunakan secara akurat dan efektif (Rohman, 2014).

ICH menetapkan 8 langkah untuk validasi metode analisis, yaitu:



(Gambar 2 7 Delapan Tahap Metode Analisis Menurut USP (Rohman. A,2007;464))

Menurut ICH (International Conference on Harmonization), ciri-ciri validasi metode dibagi menjadi 9 kategori berikut:



(Gambar 2 8 (Parameter Validasi Menurut ICH (Rohman. A.; 2007))

Untuk memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki kinerja yang memadai dengan menganalisis masalah, bahwa metode tersebut perlu dilakukan metode validasi. Validasi metode diperlukan sebagai upaya untuk

memverifikasi bahwa parameter-parameter kinerja metode tersebut memenuhi standar yang diperlukan (Rohman, 2014).

1. Dalam mengatasi suatu masalah dalam menganalisis perlu dilakukan pengembangan metode baru.
2. Revisi metode yang sebelumnya telah mapan dilakukan dengan mengikuti perkembangan atau mengatasi masalah yang memerlukan penyesuaian pada metode yang sudah mapan tersebut.
3. Validasi metode diperlukan untuk memastikan mutu metode tetap terjamin seiring berjalannya waktu.
4. Validasi metode dilakukan ketika metode yang sama dalam penelitian yang dilakukan dilaboratorium berbeda, proses analisis dengan pengukuran beda dengan yang lainnya bahkan alat yang digunakan pun beda.
5. Validasi metode juga digunakan untuk menunjukkan kesetaraan antara dua cara kerja yang dapat dibandingkan dengan cara kerja sebelumnya dengan cara kerja yang sudah mapan.

Beberapa parameter analisis yang harus diperhatikan dalam validasi metode analisis antara lain:

a. Linearitas

Parameter ini digunakan untuk menganalisis metode yang mengindikasikan sejauh mana respons dari metode terhadap perubahan konsentrasi analit adalah linier. Dalam linearitas, diperiksa apakah berada pada daerah analit sampel dalam garis lurus yang linier. Untuk mengukur linearitas, digunakan persamaan absorbansi yang telah didapatkan melalui hasil analisis sampel dengan konsentrasi yang berbeda.

Penilaian linearitas ini tujuannya untuk pada awal penelitian dapat membangun kurva kalibrasi. Biasanya, paling tidak diperlukan 5 konsentrasi berbeda untuk menguji linearitas. Nilai linearitas dilambangkan dengan huruf R dan nilai yang diinginkan adalah  $\geq 0,999$ .

Linearitas juga dapat diukur menggunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linier  $Y = a + bX$ , dimana a menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Hubungan linier yang ideal tercapai jika nilai  $a=0$  dan  $r=+1$  atau  $-1$ , bergantung pada arah garis.

Nilai koefisien korelasi yang memenuhi persyaratan biasanya adalah  $\geq 0,99970$  (ICH, 1995),  $\geq 97$  (SNI), atau  $\geq 0,9980$  (AOAC) (Rudi Kartika, 2021). Selain itu, menurut Depkes RI (2020), persamaan dikatakan linier jika nilai  $r^2 \geq 0,98$ .

Rentang penerimaan linearitas tergantung pada tujuan pengujian dan kebutuhan analisis. Evaluasi linearitas dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa metode analisis menghasilkan hasil yang linier sehingga dapat digunakan dalam berbagai konsentrasi analit.

b. Presisi

Parameter ini digunakan untuk melihat tingkat kesesuaian atau ketelitian yang dilakukan secara berulang kali tetapi dengan hasil yang sama dari sampel yang sama pada kondisi tertentu (Dzurriatul Maghfiroh., dkk, 2022). Untuk mengukur presisi, umumnya digunakan simpangan baku relatif dari hasil pengujian beberapa sampel yang berbeda secara statistik. Menurut ICH (International Council for

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use), presisi harus dievaluasi pada tiga tingkatan yang berbeda, yaitu:

1. Keterulangan pada tingkatan ini menunjukkan seberapa konsisten hasil pengujian saat dilakukan berulang kali oleh satu analis, dengan alat dan keadaan.
2. Presisi antara (Intermediate Precision): Presisi pada tingkatan ini menunjukkan seberapa konsisten hasil pengujian ketika dilakukan pengujian dengan analisis berbeda, tempat pengujian atau laboratorium berbeda bahkan keadaan yang berbeda.
3. Ketertiruan (Reproducibility): Presisi pada tingkatan ini menunjukkan seberapa konsisten hasil pengujian ketika dilakukan oleh laboratorium yang berbeda dengan peralatan dan kondisi yang berbeda.

Pengukuran presisi ini penting untuk memastikan bahwa pengukuran atau pengujian yang dilakukan menghasilkan hasil yang tetap konsisten dalam metode analisis ini. Tingkat presisi yang baik menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan tingkat akuratan yang bagus dan dapat dilakukan pengujian secara berulang.

Dokumentasi presisi harus mencakup beberapa parameter, termasuk simpangan baku, simpangan baku relatif (RSD) atau koefisien variasi (CV), dan kisaran kepercayaan (Rohman, 2007: 465).

Pada proses ini biasanya parameter yang digunakan ada 2 yaitu parameter keterulangan dan parameter antara. Sedangkan pengujian ketertiruan (reproducibility) sering membandingkan apakah

dengan laboratorium berbeda akan menghasilkan pengujian yang sama.

Hasil pengujian yang dilakukan dikatakan baik jika hasil dari nilai simpangan baku relati sebesar 2% atau kurang dari 2%, biasanya digunakan untuk menunjukkan standar presisi. Namun, standar ini dapat berubah dan elastis tergantung pada konsentrasi analit yang akan diukur dan seberapa banyak jumlah yang akan digunakan dengan kondisi laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien variasi yang dihasilkan cenderung meningkat seiring dengan penurunan kadar analit. Oleh karena itu, parameter presisi harus disesuaikan dengan fitur khusus analisis yang dilakukan.

Presisi dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Hasil analisis adalah  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ , maka simpangan bakunya adalah:

$$SD = \frac{\sqrt{\sum (X - \bar{X})^2}}{n - 1}$$

2. Simpangan baku relatif atau koefisien variasi (KV) adalah:

$$RSD(KV) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100\%$$

Yang mana  $\bar{x}$  merupakan rata – rata data, dan SD adalah standar deviasi serangkaian data.

#### c. Akurasi

Akurasi adalah sebuah parameter dalam metode analisis yang mengukur tingkat bias atau kesalahan sistematis dalam analisis. Untuk menguji akurasi, hasil pengerjaan yang telah tervalidasi dapat dibandingkan dengan hasil yang pengerjaannya telah divalidasi secara

ortogonal atau bahan standar primer. Persentase perolehan kembali (recovery) biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai akurasi.

Akurasi, menurut Harmita (2004), adalah ukuran yang menggambarkan seberapa dekat hasil pengujian yang didapatkan dengan analit yang sebenarnya. Kecermatan (akurasi) pengukuran persentase dari total analit dilihat hasil perolehan kembali setelah dilakukan pengukuran. Pada pengujian ini digunakan sebagai bahan untuk menilai kehati-hatian alat dan analisis untuk menghasilkan pengukuran konsentrasi dengan kadar yang sudah sesuai dengan hasil sebenarnya. Ada dua cara untuk melakukan pengujian akurasi:

- a. Dalam akurasi metode simulasi yang dimana analit yang digunakan adalah bahan murni dari senyawa kimia CRM, atau SRM perbandingan setelah itu masukkan placebo. Selanjutnya, dari hasil pengukuran dilakukan proses penilaian terlebih dahulu sebelum dilihat perbandingan dengan kadar sebelumnya.
- b. Metode kedua dalam akurasi adalah penambahan adisi yang terlebih dahulu sudah dianalisis sebelum ditambahkan penambahan senyawa atau disebut juga dengan penambahan adisi setelah ditambahkan dilakukan analisis kembali. Dilihat apakah terdapat perbandingan setelah penambahan analit dengan hasil yang sebenarnya.

Dilihat dari hasil penelitian terdahulu, hasil pengujian akurasi ditunjukkan dalam bentuk persentase mendapatkan hasil kembali setelah penambahan baku kedalam sampel. Nilai penerimaan kecermatan metode dapat bervariasi tergantung pada standar dan persyaratan yang berlaku.

Jika laboratorium yang melakukan uji belum menentukan batas uji perolehan kembali, tabel yang disediakan oleh Wardani (2012) dapat digunakan sebagai batasan awal.

**Tabel 2 3 Perolehan kembali analit pada beberapa konsentrasi.**

<b>Analit pada matrik sampel (%)</b>	<b>Recovery yang diterima (%)</b>
100	98-102
> 10	98-102
> 1	97-103
> 0,1	95-105
0,01	90-107
0,001	90-107
0,0001 (1 ppm)	80-110
0,00001 (100 ppb)	80-110
0,000001 (10 ppb)	60-115
0,0000001(1 ppb)	40-120

**(Huber L. Validation Of Analytical Methods and Processes  
Germany. 2003:341)**

Perhitungan perolehan kembali dapat juga ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Perolehan Kembali} = \frac{(CF - CA)}{C * A} \times 100\%$$

Keterangan:

CF = Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran

CA = Konsentrasi sampel sebenarnya

C\*A = Konsentrasi analit yang ditambahkan (Harmita. 2004).

d. *Limit of detection* (LoD) dan *limit of quantity* (LoQ)

Dua parameter utama metode analisis adalah batas deteksi (LoD) dan batas kuantifikasi (LoQ).

Dibandingkan dengan blanko (kontrol tanpa analit), batas deteksi adalah hasil pengukuran terendah dari sampel yang diukur dan masih dapat terdeteksi dan menghasilkan respon signifikan. Parameter pengujian batas adalah batas deteksi. Metode penilaian ini digunakan batas deteksi menguji analit dalam sampel dengan berbagai tingkat pengenceran. Kemudian, hasil dihitung dengan mengukur respon blanko, menghitung simpangan baku, dan menggunakan formula tertentu.

Batas kuantifikasi memperhitungkan hubungan antara konsentrasi analit antara hasil pengukuran presisi dan akurasi, dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat batas terendah yang masih dapat terdeteksi dan batas tertinggi. Presisi berkorelasi negatif dengan konsentrasi LoQ. Sebaliknya, jika persyaratan presisi tinggi, konsentrasi LoQ harus lebih tinggi. Garis regresi linier dari kurva kalibrasi dapat digunakan untuk menghitung batas kuantifikasi secara statistik.

Batas deteksi biasanya dinyatakan sebagai mean blanko ditambah 3 kali simpangan baku blanko (rata-rata blanko + 3S). Adapun batas kuantifikasi biasanya dinyatakan sebagai nilai mean blank ditambah 10 kali simpangan baku (mean blank + 10S). Nilai S merupakan simpangan baku sampel kosong.

Dalam rangka memperoleh presisi dan akurasi yang dapat diterima, pengujian LoD dan LoQ sangat penting dalam validasi metode analisis.

$$LOD(\text{Limit of Detection}) = \frac{3 \frac{SY}{x}}{s}$$

$$LOQ(Limit\ Of\ Quantitation) = \frac{10 \frac{Sy}{x}}{s}$$

$$\frac{Sy}{x} = \frac{\sqrt{\sum(y - yI)^2}}{n - 2}$$

Keterangan:

Sy/x = Simpangan Baku Residual

S = Slope

Y = Intensitas yang terbaca

Yi = Intensitas yang sudah dimasukkan ke persamaan

n = Frekuensi penentuan (Harmita, 2004)

#### ***F. Tinjauan Islami Tentang Kandungan Kafein Pada Kopi Instan***

Semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan banyak manfaat. Salah satu anugerah-Nya tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai ramuan atau pengobatan tradisional tanpa banyak efek samping. Tanaman obat memiliki banyak keuntungan, dan jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat, dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit. Salah satu bentuk kebesaran Allah SWT. dengan adanya Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW.

Salah satu pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an adalah tentang alam semesta, seperti manfaat biji-bijian dan tanaman untuk pengobatan. Salah satu contoh adalah kopi yang mengandung zat kafein. Meskipun kafein dapat memberikan manfaat tertentu, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, dapat menyebabkan efek negatif dan berhubungan dengan risiko kesehatan, seperti peningkatan tekanan darah, kolesterol, dan masalah gastritis.

Allah swt. dalam Al-Qur'an, berfirman dalam surah Al-Hujurat/49:06 (ayat tertentu yang tidak dijabarkan) dengan pesan dan petunjuk-Nya yang bermanfaat bagi manusia, termasuk tentang penggunaan tanaman sebagai pengobatan alami. Demikian berita yang disampaikan kandungan dan diyakini terlebih dahulu kebenarannya baru disampaikan kepada orang lain, Q.S. Al-Hujurat ayat 6:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ  
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”*  
(Kementerian Agama RI.2020)

Para ulama berpendapat bahwa ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 6 berkaitan dengan cerita al-Walid Ibn Uqbah Abi Mu'ith, di mana Nabi Muhammad saw. memerintahkan al-Walid untuk mengumpulkan zakat dari Bani al-Musthalaq. Namun, al-Walid ragu dan tidak melakukan perintah tersebut karena takut akan diserang. Sebagai hasil dari ketakutannya, al-Walid memberi informasi palsu kepada Nabi Muhammad bahwa akan ada penyerangan dari Bani al-Musthalaq. Padahal, penyerangan tersebut tidak terjadi, dan zakat tetap terkumpul. Kejadian semacam ini terjadi sering di masyarakat tanpa ada usaha untuk memverifikasi kebenaran informasi.

Dalam tafsir ayat tersebut, tabayyun diartikan sebagai upaya manusia untuk mencari kejelasan mengenai berita atau informasi tertentu dengan seksama dan hati-hati sebelum mengambil kesimpulan. Perintah

untuk melakukan tabayyun merupakan suatu kewajiban dalam kehidupan manusia yang seringkali ditandai oleh prasangka dan praduga terhadap orang lain. Tabayyun sangat relevan bagi umat Muslim ketika akan berjihad, karena dalam situasi tersebut penting untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang pihak yang akan diperangi.

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menyatakan, tabayyun diartikan sebagai proses pemilahan informasi tentang hal-hal yang penting dan dapat dipercaya. Sebagai seorang yang beriman, seseorang tidak dituntut untuk menyelidiki informasi yang tidak relevan atau tidak penting, karena hal itu hanya akan membuang waktu. Sebaliknya, ketika ada informasi penting, tabayyun dapat dilakukan dengan mencari sumber informasi yang jujur dan dapat dipercaya untuk memastikan kebenarannya. Tujuan dari tabayyun adalah untuk menghindari prasangka buruk terhadap individu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ayat di atas, sudah terlihat jelas sekali bahwa, jika kita ingin membagi ataupun menyebarkan suatu pengajaran kepada manusia lain yang nantinya ilmu tersebut akan berguna sampai ke masa yang akan datang, maka hendaklah pengajaran tersebut dapat dipahami dan diteliti terlebih dahulu sampai ke akar - akarnya, agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman. Maka dari itu, sebagai manusia harus berpikir jernih dan teliti setiap menerima pelajaran ataupun berita yang didapat dari manusia lainnya.

Kemudian , Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-A'raf /7: 31

بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya:

*“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Kementria Agama RI.2020)*

Menurut tafsir al-Misbah, perintah makan secukupnya mengisyaratkan agar setiap orang menyesuaikan jumlah makanan dan minumannya sesuai dengan kondisi fisiknya. Memang, tingkat yang dianggap cukup untuk satu orang mungkin melebihi batas bagi orang lain. Pesan Nabi saw juga menyatakan bahwa manusia tidak seharusnya memenuhi perut secara berlebihan. Cukuplah beberapa suap makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jika harus makan lebih banyak, maka sebagian perut harus diberikan untuk bernafas.

Tafsir tersebut menunjukkan bahwa dalam ilmu pengetahuan kontemporer, tubuh hanya mengambil sebagian dari makanan yang masuk, dan sisanya dibuang. Makanan berlebihan dapat mengganggu lambung dan sistem pencernaan lainnya, menyebabkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, ayat ini menyarankan kita untuk makan agar tidak berlebihan agar tetap kuat untuk bekerja.

Kopi dapat dikonsumsi oleh manusia tidak lebih dari 3 gelas dalam sehari bermanfaat bagi kesehatan Anda, tetapi mengonsumsi lebih dari 3 hingga 10 cangkir per hari dapat berdampak buruk. Oleh karena itu, kesimpulan adalah bahwa segala sesuatu harus dimakan dengan secukupnya agar tidak berdampak buruk pada tubuh Anda, terutama kopi. Seperti yang diajarkan Rasulullah saw, yang menganjurkan agar menjaga kesehatan

dengan menghindari konsumsi berlebihan makanan dan minuman. Sebagai mana sabda rasulullah saw.

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ  
 آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقْمَنَ صُلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ  
 لِبَطْنِهِ وَتُلُثُ لِشَرَابِهِ وَتُلُثُ لِنَفْسِهِ

Artinya:

*Dari Al-Miqdām bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya.."* ( HR. Tirmidzi dan Ibnu majah).

Hadits ini menjelaskan bahwa berlebihan makan atau minum bisa membuat seseorang mubazir terhadap makanan ataupun minuman. Diantara mereka, manusia boleh mengkonsumsi kopi setiap hari tetapi dalam 1 hari dalam meminum kopi tidak boleh berlebihan karena dapat, merusak kesehatan.

Dalam ini juga menjelaskan tentang metode-metode analisis parameter kualitas spektrofotometri UV-Vis yang menghasilkan data yang akurat. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam surah al-furqan ayat 2 sebagai berikut: QS Al-Furqon/25;2

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
 ۲ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemahannya:

*"(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat."* (Kementerian Agama RI)

Dalam tafsir Quraish Shihab disebutkan bahwa Allah SWT adalah pemilik kerajaan bumi dan langit. Dia tidak memiliki sekutu dalam kepemilikan, dan dia tidak memiliki anak. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan aturan yang sangat ketat oleh Allah, sehingga setiap makhluk melakukan pekerjaannya sendiri secara teratur dan terorganisir.

Dengan keberagaman kejadian dan perkembangannya, ilmu pengetahuan modern mengakui bahwa setiap makhluk berfungsi sesuai dengan sistem yang sangat teliti dan konsisten. Allah SWT, Zat Yang Maha Kuasa dan Pencipta, adalah satu-satunya yang dapat melakukan hal ini. Dalam hal kejadian, semua makhluk, meskipun berbeda jenis dan bentuknya, terdiri dari kesatuan unsur-unsur yang jumlahnya sangat kurang, yaitu sekitar seratus unsur. Dari jumlah unsur-unsur ini, hanya sekitar sembilan puluh unsur yang telah diidentifikasi hingga saat ini. Sifat alamia, kimia, dan berat atom unsur berkembang. Dimulai dengan unsur nomor satu dengan berat atom tertentu, hidrogen.

Komponen-komponen ini dibentuk dengan sesuai takaran-takaran yang sudah ditetapkan sebelumnya yang menyimpang darinya. Hal yang sama berlaku untuk hewan dan tumbuh-tumbuhan; keduanya memiliki kesamaan yang hampir sama dengan kehidupan manusia yang diawali dengan perkembangan mulai dari hidup ber sel 1 hingga menjadi manusi yang seutuhnya, yang dianggap sempurna. Semua ini dilakukan menurut hukum dan aturan yang konsisten dan teliti yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Karena itu, kita harus memuji Allah dan menghindari bersekutu dengan-Nya.

Ayat al-qur'an diatas, menyatakan dengan "Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-

rapinya” yang dimana dapat diartikan bahwa segala sesuatu hal sudah ditetapkan berdasarkan ukurannya dan ayat tersebut juga mengajarkan tentang ketelitian, oleh karena itu setiap metode pengujian hendaknya dilakukan validasi dan verifikasi agar metode pengujian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan ketelitian.

Sebagaimana yang dilakukan pada penelitian kandungan kafein dalam kopi instan yang akan memberi manfaat bagi manusia bila dikonsumsi secara tidak berlebihan atau sesuai kebutuhannya atau aturan



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksperimen laboratorium untuk menguji metode spektrofotometri Uv-Vis dan penetapan kadar kafein.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium kimia dan farmasetika di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Februari hingga Juni 2023.

#### ***B. Pendekatan Eksperimental***

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan eksperimental yang melibatkan beberapa tahap, termasuk ekstraksi dan validasi spektrofotometri UV-Vis.

#### ***C. Sampel***

Pada penelitian ini digunakan sampel yaitu ekstrak kopi instan.

#### ***D. Alat dan bahan***

##### **1. Alat**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa peralatan laboratorium yang terdiri dari gelas ukur 100 mL, neraca analitik, erlenmeyer 250 mL,

labu ukur 100 mL, 50 mL, 10 mL, pipet volume, corong, corong pisah, kuvet, oven, corong kaca, cawan porselen, dan spektrofotometri UV-Vis.

## 2. Bahan

Dalam penelitian ini, beberapa bahan yang dibutuhkan meliputi kopi instan, baku kafein,  $\text{CaCO}_3$  (kalsium karbonat), kloroform, dan aquades (air suling).

### E. Prosedur Kerja

#### 1. Isolasi Kafein dari kopi instan

Setelah sample 300 mL diambil setelah itu di masukkan kedalam corong pisah, 1 gram  $\text{CaCO}_3$  ditambahkan. Ekstraksi dilakukan tiga kali, dengan penambahan 300 mL kloroform untuk setiap ekstraksi. Setelah itu, lapisan bawah ekstrak dikeluarkan, dan ekstrak tersebut dipanaskan dengan rotavapor untuk menguapkan kloroformnya. Selanjutnya, ekstrak kafein bebas kloroform dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL dan diencerkan dengan aquades hingga mencapai tanda batas dan digabungkan (Elfariyanti, 2020).

#### 2. Pembuatan larutan baku kafein 100 ppm

Untuk menyiapkan larutan kafein standar 100 ppm, 0,1 gram kafein standar dilarutkan dalam 30 ml air suling panas dalam gelas kimia. Kemudian dipindahkan larutan tersebut ke dalam labu takar 100 mL dan encerkan dengan aquades hingga mencapai garis batas, sehingga konsentrasi larutan mencapai 1000 ppm. Kemudian ambil 10 ml larutan 1000 ppm dan masukkan ke dalam labu takar 100 ml, kemudian tambahkan aquades secukupnya hingga tercapai garis batas, didapatkan hasil larutan dengan 100 ppm (Elfariyanti, 2020).

### 3. Penentuan Panjang gelombang serapan maksimum

Siapkan labu ukur 100 mL kemudian pipet 10 mL dari larutan baku dan dimasukkan ke dalam labu ukur dan dicukupkan dengan aquades atau air suling sampai tandai garis. Hingga menghasilkan baku kafein 10 ppm dan diukur serapannya menggunakan panjang gelombang 200-400 nm (A. Ilham Latunra, dkk., 2021).

### 4. Penentuan linearitas

Untuk mengukur linearitas, dibuat dengan 5 konsentrasi larutan kafein standar dengan rentang 8-16 ppm. Langkah ini dilakukan dengan cara mengambil volume yang berbeda dari larutan baku kafein 100 ppm masing-masing 0,8 ml, 1 ml, 1,2 ml, 1,4 ml, dan 1,6 ml dan kemudian mengencerkannya dengan aquades hingga mencapai garis batas pada labu ukur 10 mL. Kemudian diukur absorbansinya dengan pengulangan pengukuran sebanyak 3 kali. (Saputri & Muchtaridi, 2018).

### 5. Penentuan presisi

Dalam penelitian ini, hasil ekstraksi kafein sebanyak 200 mg ditimbang dan masukkan dalam labu ukur berkapasitas 100 mL. setelah itu, standar kafein tersebut dilarutkan dengan aquades hingga mencapai tanda batas pada labu ukur. Selanjutnya, serapan dari larutan ini diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 289 nm. Pengukuran dilakukan pada hari yang sama dengan melakukan 7 kali replikasi untuk memastikan keakuratan dan ketelitian hasil pengukuran (Saputri & Muchtaridi, 2018).

### 6. Penentuan akurasi

Dalam pengujian ini, metode penambahan adisi digunakan

dengan variasi penambahan sebesar 80%, 100%, dan 120%. Sampel ekstrak kopi instan sebanyak 100 mg dimasukkan ke dalam labu ukur berkapasitas 100 ml. Selanjutnya, diambil 10 ml dari sampel tersebut, dan ditambahkan baku kafein masing-masing sebanyak 88 mg, 110 mg, dan 132 mg ke dalam labu ukur berkapasitas 10 ml. Setelah itu, spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengukur kadar kafein menggunakan pelarut air suling dan sebagai referensi. Pengujian diulang sebanyak tiga kali (triplo), dan dilakukan perhitungan hasil pengukuran dapat dihitung dengan rumus persamaan 2 (Elfariyanti, 2020).

#### 7. Penentuan limit of detection (LoD) dan limit of quantity (LoQ)

Pengukuran dilakukan menggunakan variasi konsentrasi larutan baku kerja pada tujuh titik yaitu 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm, dan 18 ppm. Cara yang digunakan adalah dengan memipet larutan baku kafein 100 ppm sebanyak 0,8 ml, 1 ml, 1,2 ml, 1,4 ml, 1,6 ml, dan 1,8 ml ke dalam labu ukur berkapasitas 10 mL, kemudian dicukupkan dengan aquades. Untuk analisis spektrofotometri, batas deteksi dan batas kuantitas dihitung dengan mengukur respon blanko beberapa kali dan menghitung simpangan baku respon blanko (Harmita, 2004).

### ***F. Analisis Hasil***

Data yang dianalisis meliputi validasi metode yang dianalisis meliputi data linearitas, relative standard deviation (RSD), %recovery, limit of detection (LoD) dan limit of quantity (LoQ).

#### 1. Validitas metode

Validitas metode yang dipakai dalam penetapan kadar kafein dalam kopi instan secara spektrofotometri ditentukan dengan mengacu

pada parameter berikut:

a. linearitas

Data linieritas dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil untuk menemukan nilai Slope (kemiringan garis), intersep, dan koefisien korelasinya (Alwi, 2017).

Selanjutnya, hasil tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan kurva linier dengan persamaan  $y = ax + b$ , dan nilai  $r^2$  digunakan sebagai indikator linearitas determinan (Saputri & Muchtaridi, 2018).

b. Presisi (keterulangan)

Data yang diperoleh dari spektrofotometri UV-VIS berdasarkan serapannya berupa data absorbansi, kemudian hasil yang didapatkan diolah menggunakan Microsoft Excel dan dihitung nilai relative standard deviation dengan rumus pada persamaan 1 (Saputri & Muchtaridi, 2018).

1. Hasil analisis adalah  $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ , maka simpangan

bakunya adalah

$$SD = \frac{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2}}{n - 1}$$

2. Simpangan baku relatif atau koefisien variasi (KV) adalah:

$$RSD(KV) = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100\%$$

Apabila % RSD (Relative Standard Deviation) pada metode spektrofotometri UV-Vis untuk penetapan kadar kafein dalam kopi instan kurang dari 2%, maka metode tersebut dianggap memiliki presisi yang baik (Balqis F.A, 2020).

## c. Akurasi

Data hasil pengukuran yang didapatkan dengan panjang gelombang maksimum yang sudah ditetapkan dengan menggunakan pelarut air suling, kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, persentase recovery dihitung dengan menggunakan rumus yang diberikan dalam Persamaan 2 (Elfariyanti., et al, 2020).

$$\% \text{ Perolehan Kembali} = \frac{(CF - CA)}{C * A} \times 100\%$$

Keterangan:

CF = Konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran

CA = Konsentrasi sampel sebenarnya

C\*A = Konsentrasi analit yang ditambahkan (Harmita, 2004).

## d. Limit of detection (LoD) dan limit of quantity (LoQ)

Salah satu penilaian dalam validasi metode analisis adalah LOD dan LOQ yang dimana penilain ini dapat dilihat hasilnya dengan melihat regresi linear pada kurva yang telah diukur. Setelah didapatkan respon analitiknya maka diperoleh blanko dan slope (b) dengan persamaan garis yang didapatkan yaitu  $y=a-bx$ , dan dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LOD(\text{Limit of Detection}) = \frac{3 \frac{Sy}{x}}{s}$$

$$LOQ(\text{Limit Of Quantitation}) = \frac{10 \frac{Sy}{x}}{s}$$

$$\frac{Sy}{x} = \frac{\sqrt{\sum(y - yI)^2}}{n - 2}$$

Keterangan:

$Sy/x$  = Simpangan Baku Residual

$S$  = Slope

$Y$  = Intensitas yang terbaca

$Y_i$  = Intensitas yang sudah dimasukkan ke persamaan

$n$  = Frekuensi penentuan (Harmita, 2004)



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel kopi instan adalah sebagai berikut:

**1. Panjang gelombang maksimum**

Tabel 4.1 Hasil pengukuran panjang Gelombang Maksimum dari larutan baku kafein dalam pelarut akuades.


Panjang gelombang maksimum	Konsentrasi
289 nm	10 ppm

**2. Pengujian linearitas**

Tabel 4.2 Hasil pengujian linearitas pada panjang gelombang 289 dari larutan baku kafein.

Konsentrasi	Absorbansi			
	P1	P2	P3	Rata-rata
8 ppm	0,285	0,284	0,287	0,285
10 ppm	0,428	0,428	0,431	0,429
12 ppm	0,564	0,563	0,561	0,563
14 ppm	0,724	0,728	0,727	0,726
16 ppm	0,849	0,849	0,850	0,849
Slop (b)		0,07125		
Intersep (a)		-0,28460		

Koefisien korelasi ( $r$ )	0,999339782
$R^2$	0,99868



**Gambar 4.1 (Kurva Larutan Baku Linearitas)**

### 3. Pengujian presisi (keterulangan)

Tabel 4.3 Hasil pengujian presisi dari larutan sampel ekstrak kafein.

Replikasi	Absorbansi	Konsentrasi (mg/L)	% kadar
1	0,538	11,545	5,77 %
2	0,540	11,573	5,78 %
3	0,545	11,644	5,82 %
4	0,538	11,545	5,77 %
5	0,537	11,531	5,76 %
6	0,543	11,615	5,80 %
7	0,548	11,686	5,84 %
RATA-RATA		11,591	

SD	0,0583	5,79 %
%RSD	0,50271892	

#### 4. Pengujian akurasi

Tabel 4.4 Hasil pengujian akurasi dari larutan sampel ekstrak kafein dan penambahan baku kafein.

Konsentrasi Sampel	Kafein yang ditambahkan	Konsentrasi	Absorbansi	mean	Konsentrasi akhir	% recovery
11,021 ppm	88 mg	19,837	1,094	1,097	19,386	97,727
			1,087			
			1,109			
11,021 ppm	110 mg	22,042	1,364	1,355	23,017	104,422
			1,353			
			1,349			
11,021 ppm	132 mg	24,246	1,397	1,396	23,538	97,264
			1,392			
			1,398			
Mean % Recovery			99,804			


#### 5. Pengujian batas deteksi (LOD) dan batas kuantitas (LOQ)

Tabel 4 5 Hasil pengujian batas deteksi (LOD) dan batas kuantitas (LOQ) dari larutan baku kafein.

No	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	y'	(y-y')	(y-y') <sup>2</sup>
1	8	0,251	0,700	-0,499	0,202
2	10	0,477	0,825	-0,348	0,121
3	12	0,509	0,949	-0,440	0,194
4	14	0,710	1,074	-0,364	0,131
5	16	0,838	1,199	-0,361	0,130

6	18	0,867	1,323	-0,456	0,208
$\Sigma$					<b>0,987</b>
jumlah $(y-y')^2$					<b>0,1974</b>
SD $(y-y')^2/n-1$					<b>0,4443</b>
LOD					<b>21,395</b> <b><math>\mu\text{g/ml}</math></b>
LOQ					<b>71,316</b> <b><math>\mu\text{g/ml}</math></b>

Berikut kurva kalibrasi untuk menghitung pengujian batas deteksi dan batas kuantitas.



**Gambar 4.2 (Kurva kalibrasi penentuan batas deteksi dan batas kuantitas)**

### **B. Pembahasan**

Pada penelian parameter validasi dinilai berdasarkan percobaan laboratorium dengan tujuan untuk memastikan apakah Parameter ini memenuhi syarat penggunaannya. dikenal sebagai validasi metode analisis. Dalam penelitian ini, metode ini divalidasi yang kemudian akan digunakan

untuk menetapkan kadar kafein kopi instan dengan metode yang digunakan adalah spektrofotometri Uv-Vis.

Jika ingin mendapatkan panjang gelombang serapan maksimum, dilakukan pengukuran absorbansi atau transmitansi berdasarkan larutan atau seri dengan rentang panjang gelombang yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencapai sensitivitas maksimum. Hasil pengukuran panjang gelombang yang baik adalah yang menghasilkan serapan absorbansi maksimum, sehingga penyimpangan kecil dari serapan panjang gelombang dapat mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Namun, apabila serapan panjang gelombang yang didapatkan pada daerah spektrum dengan perubahan absorbansi besar disebabkan karena range panjang gelombang yang terlalu sempit, Karena itu, kesalahan yang signifikan dalam pengukuran absorbansi akan disebabkan oleh deviasi kecil dari panjang gelombang cahaya masuk.

Dalam penelitian ini, hasil yang didapatkan menunjukkan serapan atau panjang gelombang maksimum untuk kafein adalah 289 nm, sedikit berbeda dari standar yang ditentukan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kondisi peralatan dan perbedaan pengguna. Meskipun demikian, pengujian dengan panjang gelombang 289 nm dapat diaplikasikan.

Untuk validasi metode analisis, terdapat berbagai parameter yang dapat dievaluasi, seperti presisi, akurasi, batas deteksi, batas kuantifikasi, spesifisitas, linearitas, kisaran, ketahanan, dan kesesuaian sistem. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian untuk lima parameter yaitu linearitas, presisi, akurasi, batas deteksi, dan batas kuantitas,

Dalam Al-Qur'an al furqon ayat 2 Allah swt. berfirman:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
۲ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Terjemahannya:

*“(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.” (Kementerian Agama RI)*

Bahwa Allah SWT memiliki kerajaan langit dan bumi disebutkan dalam tafsir Quraish Shihab. Dia tidak memiliki sekutu dalam kepemilikan, dan dia tidak memiliki anak. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan aturan yang sangat ketat oleh Allah, sehingga setiap makhluk melakukan pekerjaannya sendiri secara teratur dan terorganisir. Dengan keberagaman kejadian dan perkembangannya, ilmu pengetahuan modern mengakui bahwa setiap makhluk berfungsi sesuai dengan aturan dan harus sangat teliti dan konsisten.

Ayat al-qur'an diatas, dituliskan bahwa “Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya” yang dimana dapat diartikan bahwa segala sesuatu hal sudah ditetapkan berdasarkan ukurannya dan ayat tersebut juga mengajarkan tentang ketelitian, oleh karena itu disetiap metode validasi yang dilakukan hasil pengujian sangatlah diliat ketelitiannya agar dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Hasil pengujian validitas dalam menetapkan kadar kafein dalam kopi instan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dapat dinyatakan dalam beberapa parameter yang telah diuji sebelumnya. Berikut parameter yang digunakan dalam penelitian yaitu:

## 1. Linieritas

Respon yang dapat memberikan antara metode analisis dengan konsentrasi analit disebut juga dengan linieritas. Ini menunjukkan bahwa metode analisis mampu menghasilkan pengujian memadai dan akurat dalam konsentrasi analit dalam sampel. Seri larutan baku dengan setidaknya lima konsentrasi berbeda digunakan untuk menguji linieritas.

Pengujian linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan larutan baku kafein pada berbagai konsentrasi, yaitu 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 14 ppm, dan 16 ppm. Serapan dari larutan baku tersebut diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 289 nm dengan menggunakan blanko aquades. Hasil dari pengujian tersebut direpresentasikan dalam bentuk kurva kalibrasi.

Berdasarkan hasil analisis regresi dengan spektrofotometri UV-Vis, diperoleh persamaan linier  $y=0,07125x-0,24860$ , dengan koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 0,99868 pada rentang konsentrasi 8-16 ppm. Persamaan ini menunjukkan bahwa metode analisis memiliki linieritas yang baik, karena nilai koefisien korelasi ( $r$ ) mendekati 1. Maka dari itu hasil yang didapatkan dari pengukuran linearitas dapat digunakan dalam pengujian analisis kafein.

## 2. Presisi (keterulangan)

Pengujian presisi menunjukkan hasil yang sama meskipun berbeda-beda terhadap suatu contoh homogen. Dalam penelitian ini, presisi diukur dengan menggunakan metode koefisien variansi atau simpangan baku relatif, dengan fokus pada jenis presisi yaitu repeatability (keterulangan).

Hasil yang didapatkan pada pengujian ini dengan menggunakan metode spektrofotometri Uv-Vis dalam sampel kopi instan adalah sebesar 5,79 %. Data dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa persentase kadar rata-rata

kafein adalah 5,79 %. SNI 2983;2014 yang menyatakan bahwa syarat kafein dalam kemasan kopi instan kisaran 2,5 %.

Pengujian hasil presisi menghasilkan nilai RSD (Relative Standard Deviation atau simpangan baku relatif) sebesar 0,50271829. Dalam pengujian analisis validasi secara spektrofotometri UV-Vis untuk penetapan kadar kafein dalam kopi instan, presisi dianggap baik jika nilai %RSD kurang dari 2% (Riyanto, 2014). Oleh karena itu, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan presisi yang baik dan dapat diterima.

Rasulullah saw. memerintahkan umatnya agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Diantaranya, manusia boleh mengkonsumsi kopi setiap harinya namun tidak boleh berlebihan. Sebagai mana sabda rasulullah saw:

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ  
 آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنَ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ  
 لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Artinya:

*Dari Al-Miqdām bin Ma'dikarib berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya.."* ( HR. Tirmidzi dan Ibnu majah).

Perintah Rasulullah untuk makan secukupnya dijelaskan dalam hadis di atas. Dengan kata lain, ketika kita ingin makan dan minum kita hanya perlu makan sepertiganya saja, sepertiganya untuk kita bernafas. Seperti halnya dalam penelitian ini kita tidak boleh mengkonsumsi secara

berlebihan melainkan dalam 1 hari kita hanya boleh mengkonsumsi kopi instan tidak boleh melebihi aturan karena dapat merusak kesehatan.

### 3. Akurasi

Pengukuran akurasi adalah hasil pengukuran yang hasilnya pengukurannya berupa hasil nilai kedekatan terhadap nilai yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, akurasi diukur sebagai persentase perolehan kembali (recovery). Untuk memisahkan senyawa-senyawa lain dalam kopi instan yang dapat memengaruhi hasil pengukuran, kopi instan diekstraksi terlebih dahulu. Penambahan kalsium karbonat dalam proses ekstraksi adalah untuk memutuskan ikatan senyawa lain dengan senyawa yang terikat dengan kafein (Mahendradatta, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode adisi atau penambahan baku sebesar 80%, 100%, dan 120% (Riyanto, 2014). Setelah itu, dilakukan penambahan baku kafein dan hasil absorbansinya diolah menggunakan persamaan regresi linier  $y=0,07125x-0,28460$  untuk mendapatkan persentase recovery.

Pengujian akurasi harus dilakukan minimal 9 kali tetapi dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 80%, 100%, dan 120%. Dalam hasil pengujian nilai akurasi yang didapatkan rata-rata dari percobaan adalah 97,727% untuk penambahan analit sebesar 88 mg, 104,422% untuk penambahan analit sebesar 110 mg, dan 97,264% untuk penambahan analit sebesar 132 mg.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 4.4, rata-rata persentase recovery yang didapatkan adalah 99,804%. Untuk analit dengan 100% recovery, disyaratkan berada dalam rentang 98-102%. Hal ini menunjukkan bahwa validasi metode analisis untuk penambahan baku analit atau persentase recovery yang dihasilkan berada pada batas yang

diinginkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri UV-Vis memiliki akurasi yang baik dalam pengujian kadar kafein pada kopi instan dan memberikan hasil yang akurat.

#### 4. Batas Deteksi dan Batas kuantitas

Konsentrasi terendah analit dalam pengujian dan dapat diukur menggunakan taraf disebut juga dengan batas deteksi. sebaliknya, batas deteksi adalah analit yang masih dapat terdeteksi atau terkecil yg dapat diidentifikasi, meskipun nilai yg tepat tak perlu ditentukan secara kuantitatif. pada metode spektrofotometri UV-Vis, batas kuantitas serta batas deteksi berdasarkan di simpangan respon serta kemiringan (slope) kurva kalibrasi.

Hasil pengujian batas deteksi untuk metode spektrofotometri UV-Vis pada baku kafein menunjukkan nilai LOD sebesar 21,395  $\mu\text{g/ml}$ . Hal ini menunjukkan bahwa jumlah analitik terkecil yang sampelnya menggunakan blanko kemudian direspon dan menghasilkan nilai sebesar 21,395  $\mu\text{g/ml}$ .

Penilaian kuantitas analit yang dimaksud dalam penelitian ini ialah batas kuantitas dari sampel. Hasil pengujian batas kuantitas menunjukkan nilai LOQ sebesar 71,316  $\mu\text{g/mL}$ . Hal ini mengartikan bahwa kuantitas terkecil analit dalam sampel atau dalam hal ini adalah baku kafein sebesar 71,316  $\mu\text{g/mL}$  dapat diukur dengan cermat dan seksama (Harmita, 2004).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### **A. Kesimpulan**

Metode spektrofotometri Uv-Vis dalam validasi metode analisis untuk menetapkan kadar kafein dinyatakan valid. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh nilai parameter validasi untuk metode spektrofotometri menunjukkan hasil yang linier ( $r^2 = 99868$ ), presisi (RSD = 0,50271829), perolehan kembali penambahan analit (*Recovery* = 99,804%), batas deteksi sebesar 21,395  $\mu\text{g/mL}$  dan batas kuantitas sebesar 71,361  $\mu\text{g/mL}$ . Dapat disimpulkan bahwa hasil semua pengujian metode analisis yang telah dilakukan telah memenuhi syarat dan dapat digunakan. Dengan demikian hal ini sesuai dengan hadist rasulullah swa. yang mengandung makna tidak berlebih-lebihan agar manusia itu senantiasa dalam kondisi sehat.

#### **B. Saran**

Disarankan untuk melakukan pengujian parameter-parameter yang tidak diujikan. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap parameter-parameter tersebut, validitas dan akurasi metode analisis dapat lebih komprehensif dan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Gafar, P. A. G. (2018). Proses Penginstanan Aglomerasi Kering dan Pengaruhnya Terhadap Sifat Fisiko Kimia Kopi Bubuk Robusta (*Coffea robusta* Lindl. Ex De Will). *Jurnal Dinamika Penelitian Industri*, 29(2), 163. <https://doi.org/10.28959/jdpi.v29i2.3745>
- Afriliana, A. 2018. *Teknologi Pengolahan Kopi Terkini*. Yogyakarta: Deepublish
- Alwi H. Validasi Metode Analisis Flavonoid Dari Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis. Vol. 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2017.
- Alwi, H. (2017). Validasi Metode Analisis Flavonoid dari Ekstrak Etanol Kasumba Turate (*Carthamus tinctorius* L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis.
- Amirah, *Metode dan Corak Tafsir Musyassar Karya Aidh Al – Qarni*. Skripsi. Semarang. 2015
- Andi Ilham L, Eva Johanes, Besse Mulihardianti, Ophirtus Sumule. 2021. Analisis Kandungan Kafein Kopi (*Coffea Arabica*) Pada Tingkat Kematangan Berbeda Menggunakan Spektrofotometri UV – VIS. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*. Universitas Hasanuddin.
- Anonim, 2000. Parameter standar umum ekstrak tumbuhan obat. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat Tradisional, edisi ke-1, Jakarta, vol. 17, p 68-9
- Aprilia, F. A., Ayuliansari, Y.P, T. Azis, M. Camelina, W., dan Putra, M. (2018). Analisis Kandungan Kafein dalam Kopi Tradisional Gayo dan Kopi Lombok Menggunakan HPLC dan Spektrofotometri UV-Vis. *Biotika*. 16 (2) : 38-39.
- Balqis, F. A. (2022). Validasi Metode Analisis Kafein Pada Kopi Latte Dengan Spektrofotometri UV-Vis. *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*
- Clarke, R. J. Dan R. Macrae. 1985. *Coffee, Volume 1: Chemistry*. London: Elsevier Applied Science
- Cornelis, C. M. (2019). The Impact of Caffeine and Coffee on Human Health. *Nutrients Journal*, 11, 416.
- Dachriyanus. Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi. LPTIK Universitas Andalas. 2004.
- Day R., JR, A.L. U. Analisis Kimia Kuantitatif. Edisi Ke-V. 1986. 1–682 p

- dePaula, J., & Farah, A. (2019). Caffeine consumption through coffee: Content in the beverage, metabolism, health benefits and risks. *Beverages*, 5(2).
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Depkes RI. Jakarta. 1995. Hal. 41
- Dzurriatul Maghfiroh, Eva Monica, Muhammad Hilmi Afthoni. 2022. Pengembangan dan Validasi Metode Spektrofotometri UV-VIS Metode Derivatif Untuk Analisis Kafein Dalam Suplemen. *Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi* Vol. 2 No. 2-FARMASI.
- Edy Agustian Yazid, Abdul Wafi, Agustin Eka Wulandari. 2021. Metode Spektrofotometri untuk Penentuan Kafein dalam Minuman Gunakan Teknik Ekstraksi Pelarut dan Adsorpsi Karbon Aktif. *Jurnal Farmasi Tropis dan Kimia*
- Elfariyanti, Silviana, E., & Santika, M. (2020). Analisis Kandungan Kafein Pada Kopi Seduhan Warung Kopi Di Kota Banda Aceh. *Lantanida Journal*, 8(1), 1–12.
- Ermer J, Editor. *Method Validation in Pharmaceutical Analysis*. WILEY-VCH. Verlag. Weinham. 2005. Available as PDF File.
- Fajriana dan Fajriati (2018). Analisis Kadar Kafein Kopi Arabika (*Coffea arabica* L.) Pada Variasi Temperatur Sangrai Secara Spektrofotometri Ultra Violet. *Analit: Analytical and Environmental Chemistry*
- Harmita. Petunjuk Pelaksanaan Validasi. *Maj Ilmu Kefarmasian*. 2004
- Harmono, H. D. (2020). Validasi Metode Analisis Logam Merkuri (Hg) Terlarut pada Air Permukaan dengan Automatic Mercury Analyzer. *Indonesian Journal of Laboratory*, 2(3), 11–16. <https://doi.org/10.22146/ijl.v2i3.57047>
- Hastuti DS. Kandungan Kafein Pada Kopi dan Pengaruh Terhadap Tubuh. *Kim FIA Inst Teknol Sepuluh Nop*. 2018;(May):1–4.
- Huber L. *Validation of Analytical Methods and Processes*. Marcel Dekker., Inc Germany. 2003. Available as PDF File
- Irawati, D., Styawan, AA., Nurhaini, R. 2018. Penetapan Kadar Kafein Pada Teh Oolong (*Camellia sinensis*) Dengan Metode Titrasi Bebas Air, *Jurnal Urecol*, Klaten.
- Khopkar S. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. 1990.
- Mahendradatta, M. 2007. *Pangan Aman Dan Sehat*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin : Makassar
- Maramis, R. K., Citraningtyas, G., & Wehantouw, F. (2013). Analisis Kafein Dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 2(04), 122–128.

- Mulyati, A. H., Sutanto, & Apriyani, D. (2011). Validasi metode analisis kadar Ambroksol Hidroklorida dalam sediaan tablet cystelis secara kromatografi cair kinerja tinggi. *Ekologia*, 11(2), 36–45.
- Mulyati, A. H., Sutanto, & Apriyani, D. (2011). Validasi metode analisis kadar Ambroksol Hidroklorida dalam sediaan tablet cystelis secara kromatografi cair kinerja tinggi. *Ekologia*, 11(2), 36–45.
- Nadhirah, Alimuddin, & Saleh, C. (2015). Analisis Kandungan Kafein Dalam Kopi Sumatera dan Kopi Flores Dengan Variasi Siklus Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis. *Jurnal Kimia Mulawarman*, 13(1), 28–31.
- Pratiwi, R. A., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). How to Read and Interpret UV-VIS Spectrophotometric Results in Determining the Structure of Chemical Compounds. *Indonesian Journal of Educational Research and Technology*, 2(1), 1–20
- Rahardjo, Pudji. 2017. *Berkebun Kopi*. Jakarta : Penebar Swadaya
- Retnani, N. I. D., Utami, P. I., & Setiawan, Di. (2010). Analisis Kuantitatif Tablet Levofloksasin Merk dan Generik Dalam Plasma Manusia Secara In Vitro Dengan Metode Spektrofotometri Ultraviolet-Visible. *Journal Pharmacy*, 07(01), 119–127.
- Rohmah, S. A. A., Muarifah, A., & Martha, R. D. (2021). Validasi Metode Penetapan Kadar Pengawet Natrium Benzoat pada Sari Kedelai di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(2), 120–127
- Rohman A, Gandjar IG. *Kimia Farmasi Analisis*. Edisi 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2014. p.
- Rudi kartika.(2021). *Verifikasi dan Validasi Metode Uji Kualitas udara*. Universitas mulawarman
- Saputri, F. A., & Muchtaridi, M. (2018). Analytical Method Development and Validation For The Determination of Caffeine In Green Coffee Beans (*Coffea arabica* L.) From Three Districts of West Java, Indonesia by High Performance Liquid Chromatography. *International Journal of Applied Pharmaceutics*, 10(6), 107–111.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam Al Qur'an*. Lentera Hati.
- Sofiana, N. (2011). *Fakta tentang kopi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Sugihartini, N., Fudholi, A., Pramono, S., & Sismindari, S. (2014). Validasi Metode Analisis Penetapan Kadar Epigalokatekin Galat Dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. *Pharmaciana*, 4(2).  
<https://doi.org/10.12928/pharmaciana.v4i2.1567>

- Suharaman, & Gafar, P. A. (2017). Teknologi Dekafeinasi Kopi Robusta. *Dinamika Penelitian Industri*, 28(2), 87–93
- Suhartati, T. (2017). Dasar-dasar Spektrofotometri UV-Vis dan Spektrofotometri Massa Untuk Penentuan Struktur Senyawa organik (Edisi pert).
- Suriani. 1997. Analisis Kandungan Kafein Dalam Kopi Instan Berbagai Merek yang Beredar di Ujung Pandang. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Susanti, Hari., dkk. (2019). Perbandingan Metode Spektrofotometri UV Dan HPLC pada Penetapan Kadar Kafein dalam Kopi. *Majalah Farmasetika*, 4 (Supl 1), 28 –33
- Susanti, H., Araaf, N. P. M., Gunanto, D., & Kusbandari, A. (2019). Perbandingan Metode Spektrofotometri UV Dan HPLC pada Penetapan Kadar Kafein dalam Kopi. *Majalah Farmasetika.*, 4(1), 28–33.
- Sylvia, D., Gantina, A., & Rusdiana, N. (2018). Analisis Sibutramin Hidroklorida Pada Jamu Pelangsing di Kecamatan Curug Dengan Spektrofotometri UV. *Farmagazine*, 5(2), 1–5.
- Tjay, T. H, & Rahadja, K. (2007). Obat-obat penting, khasiat penggunaan dan efek-efek sampingnya (Edisi IV). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Torbeck L.D., Editor. *Pharmaceutical and Medical Device Validation by Experimental Design*. Informa Healthcare. New York. 2007
- Tunnisa, T., Mursiti, S., & Jumaeri. (2018). Isolasi Flavonoid Kulit Buah Durian dan Uji Aktivitasnya sebagai Anti rayap *Coptotermes* sp. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 7(1), 21–27
- Usken Fisdiana, Dyah Nuning Erawati, Titien Fatima, Ramadhan Taufik , Siti Humaida. (2022). Peningkatan Kualitas Pengelolaan Hasil Kopi Robusta Pada Kelompok Tani Sangkuriang Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- Wardani LA. Validasi Metode Analisis dan Penentuan Kadar Vitamin C Pada Minuman Buah Kemasan Dengan Spektrofotometri UV-Visible. Universitas Indonesia; 2012.
- Wardani, A. D. (2021). Validasi Metode dan Penentuan Kadar Alkaloid Total 84 Fraksi Etil Asetat Daun Sirsak (*Annona muricata* L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis Di Desa Kemiri Kabupaten Jember. Universitas dr.Soebandi.
- Wilson, C. (2018). The Clinical Toxicology of Caffeine: A Review and Case Study. *Elsivier (Toxicology Reports)*, 5: 1140-115
- Wisudyarningsih Budipratiwi. 2015. Validasi Metode Spektrofotometri Ofloksasin Dalam LArutan Dapar Fosfat. Fakultas Farmasi. Universitas Jember. *Stomatognathic (J.K.G. Unej)* Vol. 9 No. 2 2012: 77-81


Yuliandri, M. T. 2015. Sejarah “First, Second and Third Wave Coffee”.  
<https://majalah.ottencoffee.co.id/sejarah-first-second-and-third-wave-coffee/> (Diakses tanggal 10 November 2018).



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Prosedur Kerja

#### 1. Kerangka Konsep




## 2. Ekstraksi Sampel


Skema isolasi kafein dari kopi instan




## 3. Pembuatan Larutan Baku Kafein




#### 4. Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum




#### 5. Penentuan Linearitas




#### 6. Penentuan Presisi



### 7. Penentuan Akurasi



### 8. Penentuan *Limit of Detection* (LOD) dan *Limit of Quantition* (LOQ)




### Lampiran 2 Gambar Proses Penelitian

NO	Keterangan	Gambar
1	Sampel kopi instan dimasukkan kedalam gelas kimia dan tambahkan $\text{CaCO}_3$	 <p>(Gambar 5)</p>
2.	Masukkan kedalam corong pisah lalu tambahkan kloroform	 <p>(Gambar 6)</p>
3.	Dilakukan pengocokan secara stabil dan terus menerus.	 <p>(Gambar 7)</p>
4.	Filtrat yang diambil adalah lapisan bawahnya	 <p>(Gambar 8)</p>

5.	Filtrat hasil ekstraksi di rotavapor	 <p>(Gambar 8)</p>
6.	Hasil ekstrak kafein	 <p>(Gambar 9)</p>

### Lampiran 3 Gambar Hasil Pengukuran Secara Spektrofotometri UV-Vis

#### 3. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang



(Gambar 10. Hasil Pengukuran Panjang Gelombang)

#### 4. Hasil Pengukuran Absorban Linearitas

Test Name: [Default]  
Abs  
289.0nm  
ID#  
1 0.285  
2 0.284  
3 0.287  
Page 1, Samples 1 - 3  
Measure Save Measure  
Blank Data

(Gambar 11. Konsentrasi 8 ppm)

Test Name: [Default]

ID#	Abs 289.0nm
1	0.428
2	0.428
3	0.431

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure
------------------	--------------	---------

(Gambar 12. Konsentrasi 10 ppm)

Test Name: [Default]

ID#	Abs 289.0nm
1	0.564
2	0.563
3	0.561

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure
------------------	--------------	---------

(Gambar 13. Konsentrasi 12 ppm)

Test Name: [Default]

ID#	Abs 289.0nm
1	0.724
2	0.728
3	0.727

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure S
------------------	--------------	--------------

(Gambar 14. Konsentrasi 14 ppm)

Test Name: [Default]

ID#	Abs 289.0nm
1	0.849
2	0.849
3	0.850

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure S
------------------	--------------	--------------

(Gambar 15. Konsentrasi 16 ppm)

MAKASSAR

## 5. Hasil Pengukuran Absorban Presisi

Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 289.0nm
1	0.538
2	0.540
3	0.545
4	0.538
5	0.537

Page 1 of 2, Samples 1 - 5  
Press ↑ or ↓ to view data

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
---------------	-----------	----------------

(Gambar 16. Pengukuran Absorban Presisi)

Test Name: \_Default\_


ID#	Abs 289.0nm
6	0.543
7	0.548

Page 2 of 2, Samples 6 - 7  
Press ↑ or ↓ to view data

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
---------------	-----------	----------------

(Gambar 17. Pengukuran Absorban Presisi)

## 6. Hasil Pengukuran Absorban Akurasi




Test Name: (Default)

ID#	Abs
	289.0nm
1	1.094
2	1.087
3	1.109

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure
---------------	-----------	---------

(Gambar 18. Pengukuran Absorban Konsentrasi 19,837 ppm)



Advanced A-xT-C 2:44pm 8May23  
Test Name: \_Default\_

ID#	Abs
	289.0nm
1	1.364
2	1.353
3	1.349

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure
---------------	-----------	---------

(Gambar 19. Pengukuran Absorban Konsentrasi 22,042 ppm)


Test Name: \_Default\_

ID#	Abs 289.0nm
1	1.397
2	1.392
3	1.398

Page 1, Samples 1 - 3

Measure Blank	Save Data	Measure Sample
------------------	--------------	-------------------

(Gambar 20. Pengukuran Absorban Konsentrasi 24,246 ppm)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rasmi, lahir di Kolaka pada Tanggal 5 Juni 2000, anak kedua dari 3 bersaudara. Buah kasih pasangan dari Ayahanda H. Kaharuddin dan Ibunda Hj. Darmi. Penulis memulai Pendidikannya Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 1 Laloeha kolaka Tahun 2008 kemudian pada tahun 2009 penulis pindah sekolah di SD 1 Liku dan selesai Pada Tahun 2013 Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Samaturu dan selesai Pada Tahun 2016, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 Kolaka, penulis mengambil Jurusan IPA dan selesai Pada Tahun 2019. Penulis Kembali melanjutkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Farmasi.

Penulis memiliki prinsip seperti yang pernah dikatakan patrick star hidup akan selalu berakhir dengan indah, bila belum indah maka belum berakhir. Dengan senyum bangga dan pikiran lega penulis pamit undur diri dan bersiap untuk terjun ke dunia yang lebih menantang didepan sana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R