

**HUBUNGAN RIWAYAT PREEKLAMPSIA
IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA NEONATORUM
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG
KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2020-2021**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

REZKY INAYAH ALFATIHAH

NIM: 70600119009

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezky Inayah Alfatihah

NIM : 70600119009

Tempat/Tgl Lahir : Gowa, 24 Maret 2001

Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jl. Nuhung Dg, Bani Limbung

Judul : Hubungan Riwayat Preeklampsia

Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia
Nenonatorum di RSUD Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode
2020-2021.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Februari 2023




Rezky Inayah Alfatihah
NIM : 70600119009

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pembimbing penulisan skripsi Rezky Inayah Alfatihah, NIM: 70600119009, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: “Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jenepono Periode 2020-2021”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 2 Februari 2023

Pembimbing 1



Dr. dr. Rosdiahah, M.Kes

Pembimbing 2



dr. Purnamaniswaty, M.Kes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Periode 2020-2021” yang disusun oleh Rezky Inayah Alfatihah, NIM 70600119009, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Februari 2023, bertepatan dengan 25 Rajab 1444, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 17 Februari 2023

26 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Rizka Anastasia, Sp.A., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada orangtua dan seluruh keluarga, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Bapak dr. Andi Tihadimanto, M.Kes., MARS., Sp.JP. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Dr. dr. Rosdianah, M.Kes. selaku pembimbing I dan dr. Purnamaniswaty., M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Dr. Rizka Anastasia, Sp.A., M.Kes. selaku penguji I dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag. selaku penguji II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
7. Teman-teman sejawat angkatan 2019, Inte9rin yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam keadaan apapun dan memberikan banyak masukan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terlepas dari segala kerja keras serta dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritikan dan saran demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 2 Februari 2023
Penyusun

Rezky Inayah Alfatihah
Nim : 70600119009

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Asfiksia Neonatorum	13
1. Definisi	13
2. Epidemiologi	13
3. faktor Risiko	14
4. Patofisiologi	18
5. Penegakan Diagnosis	19
6. Tatalaksana	21
7. Komplikasi	31

B. Tinjauan Umum Preeklampsia	32
1. Definisi	32
2. Epidemiologi	33
3. Faktor Risiko	33
4. Patofisiologi	35
5. Diagnosis	37
6. Tatalaksana	39
7. Komplikasi	39
C. Integrasi Keislaman	40
D. Kerangka Teori	43
E. Kerangka Konsep	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi dan sampel	45
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Instrumen Penelitian	48
F. Teknik Pengolahan dan Analisa data	48
G. Alur penelitian	50
H. Etika penelitian	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Hasil Penelitian	53
C. Pembahasan	55

D. Keterbatasan Penelitian.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Defenisi Operasional.....	8
Tabel 2. 1 APGAR skor	19
Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis Preeklampsia di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021	53
Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021.....	54
Tabel 4. 3 Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021	54



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1. Alur Resusitasi	30
Bagan 2. 2. Kerangka Teori	43
Bagan 2. 3. Kerangka Konsep.....	44
Bagan 3. 1. Alur Penelitian	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Etik Penelitian	67
Lampiran 2 : Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	69
Lampiran 4 : Dokumentasi.....	70



ABSTRAK

Nama : Rezky Inayah Alfatihah

NIM : 70600119009

Judul : Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian
Asfiksia Neonatorum di Rumah sakit Umum Daerah Lanto Dg.
Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-20201

Angka kematian neonatus (AKN) di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Salah satu penyebab utama kematian neonatus (AKN) adalah kondisi asfiksia neonatorum yang bisa disebabkan oleh faktor maternal yaitu riwayat preeklampsia pada ibu hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang kabupaten Jeneponto periode 2020-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan *case control*. Metode pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling* sebanyak 364 sampel terdiri dari 182 sampel kasus dan 182 sample kontrol yang diperoleh dari data rekam medik. Hasil penelitian berdasarkan analisis bivariat berupa uji *chi square* dengan tingkat kemaknaan sebesar 5% ($\alpha=0,05$) didapatkan nilai p-value 0,000 pada hubungan riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum serta nilai *Odds Ratio* (OR) 22,728. Adapun Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto periode 2020-2021 dimana riwayat preeklampsia ibu hamil 22,728 kali lebih berisiko untuk menyebabkan asfiksia neonatorum.

Kata Kunci : Preeklampsia, Asfiksia Neonatorum

ABSTRACT

Name : Rezky Inayah Alfatihah

NIM : 70600119009

Title : Relationship of Preeclampsia History of Pregnant Women with the Incidence of Neonatal Asphyxia at the Lanto Dg. Pasewang Regional General Hospital Jeneponto Regency for the 2020-2021 Period

Indonesia's neonatal mortality rate (AKN) is still relatively high and has not met the targets set. One of the main causes of neonatal death (AKN) is neonatal asphyxia which can be caused by maternal factors, namely a history of preeclampsia in pregnant women. This study aims to determine the relationship between the history of preeclampsia in pregnant women with the incidence of neonatal asphyxia at Lanto Dg. Pasewang Hospital, Jeneponto regency for the 2020-2021 period. This research is quantitative analytical research with a case-control approach. the sample sampling method is a purposive sampling technique of 364 samples consisting of 182 case samples and 182 control samples obtained from medical record data. The results of the study based on bivariate analysis in the form of a chi-square test with a meaningfulness level of 5% ($\alpha=0.05$) obtained a p-value of 0.000 in the relationship between the history of preeclampsia of pregnant women with the incidence of neonatal asphyxia and the Odds Ratio (OR) value of 22,728. There is a relationship between the history of preeclampsia in pregnant women and the incidence of neonatal asphyxia at the Lanto Dg. Pasewang Regional Hospital of Jeneponto Regency for the 2020-2021 period where the history of preeclampsia of pregnant women is 22,728 times more at risk of causing neonatal asphyxia.

Keywords: *Preeclampsia, neonatal asphyxi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka kematian neonatus (AKN) adalah salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai kesejahteraan masyarakat dan derajat kesehatan berdasarkan *Sustainable Development Goal* (SDGs). Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian neonatus (AKN) kawasan Asia Tenggara berada pada peringkat kedua tertinggi setelah Afrika. Setiap tahun angka kematian neonatus (AKN) mencapai 37% dari semua jumlah kelahiran. Sedangkan, untuk mayoritas dari semua kematian neonatus sekitar 75% terjadi pada minggu pertama kehidupan dan 25% sampai 45% terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan yang terjadi di seluruh dunia (Nufra & Ananda, 2018).

Berdasarkan hasil survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) tahun 2017, terjadi penurunan Angka Kematian Neonatus (AKN) dibandingkan dengan hasil survey yang telah dilakukan pada tahun 2012. Angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2017 mencapai 24 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan, pada tahun 2019 angka kematian neonatus (AKN) di Indonesia mencapai 60.000 kasus dan berada pada peringkat ke tujuh di dunia dan pada tahun 2020 sebesar 20.266 kasus (Lengkong et al., 2020 ; Alfitri et al., 2021).

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Angka Kematian Neonatus (AKN) Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 623 dan 1.362 kematian pada tahun 2021. Berdasarkan dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan Angka kematian Neonatus (AKN) khususnya di Sulawesi Selatan (Kemenkes, 2020 ; Kemenkes, 2021).

Walaupun angka Kematian Neonatus (AKN) secara keseluruhan mengalami penurunan setiap tahunnya, angka tersebut belum memenuhi standar angka kematian neonatal yang ditentukan berdasarkan *Sustainable Development Goal* (SDGs). Saat ini Indonesia memiliki target untuk menurunkan angka kematian neonatus menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (Portiarabella et al., 2021).

Pada tahun 2020 kemenkes RI menyatakan bahwa penyebab kematian neonatus paling banyak disebabkan oleh kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) dengan angka 35,2 %, kemudian kondisi asfiksia dengan angka 27,4%, infeksi 3,4%, kelainan kongenital 11,4%, dan tetanus neonatorum 0,3%. Pada tahun 2021, Angka kematian neonatal yang disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR) mengalami penurunan sebesar 34,5 % sedangkan untuk penyebab asfiksia mengalami peningkatan sebesar 27,8% (Kemenkes, 2020 ; Kemenkes, 2021).

Berdasarkan data dari *world Health Organization* (WHO) sebesar 11% kematian neonatus yang disebabkan oleh asfiksia terjadi setiap tahunnya. Asfiksia merupakan penyebab kematian neonatus kedua

tertinggi yang terjadi di Indonesia dengan angka kejadian di Rumah sakit rujukan provinsi sekitar 41,94 % (Jon Putri et al., 2019).

Asfiksia neonatorum adalah kondisi dimana bayi baru lahir mengalami kegagalan dalam bernapas spontan dan teratur. Kondisi Asfiksia dapat diakibatkan oleh gangguan perfusi uteroplasenter yang terjadi karena adanya kerusakan pada arteri spiralis dan spasme pada pembuluh darah. Selain itu kondisi asfiksia juga dapat diakibatkan karena ketidakmampuan bayi dalam mengembangkan paru segera setelah lahir yang menyebabkan kurangnya kapasitas oksigen yang masuk dalam tubuh (Mandasari, 2020).

Kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dapat berdampak pada kerusakan otak sehingga menyebabkan mortilitas, morbiditas, dan disabilitas sehingga memiliki dampak jangka panjang karena akan menghambat tumbuh kembang pada anak. Asfiksia yang diakibatkan oleh faktor ibu salah satunya dapat terjadi karena adanya riwayat penyakit yang dimiliki oleh ibu seperti preeklampsia dan eklampsia (Ahmed et al., 2021).

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan asfiksia neonatorum, yaitu faktor ibu, faktor persalinan, faktor plasenta dan faktor bayi. Salah satu penyebab asfiksia neonatorum akibat faktor ibu adalah adanya riwayat preeklampsia pada ibu hamil. Preeklampsia merupakan kumpulan gejala atau sindrom yang terjadi pada ibu hamil dengan usia gestasi > 20 minggu yang ditandai dengan tekanan darah sistolik ≥ 140

mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg dan protein dalam urin ≥ 300 mg/24 jam (Purnamasari & Rahmawati, 2021).

Disetiap tahunnya Indonesia memiliki insiden preeklampsia sebesar 128.237 kasus dan menjadi penyebab kedua tertinggi kematian ibu. Pada tahun 2019, sekitar 1.066 kasus kematian ibu disebabkan karena hipertensi dalam kehamilan. Berdasarkan data statistik dari kemenkes RI tahun 2021, penyebab kematian ibu di provinsi Sulawesi Selatan paling banyak disebabkan karena hipertensi dalam kehamilan setelah perdarahan. (Marlina et al., 2021).

Kejadian preeklampsia pada ibu hamil dapat menjadi salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas ibu apabila tidak ditangani secara adekuat karena dapat menimbulkan komplikasi bagi ibu dan janin. Salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada janin yaitu asfiksia neonatorum. Preeklampsia merupakan salah satu penyakit yang dapat terjadi pada masa kehamilan dan akan menjadi penyulit bagi ibu. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kesulitan-kesulitan yang bisa saja dialami oleh seorang wanita hamil, hal ini dijelaskan dalam QS al-ahqaf/46:15 sebagai berikut :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۗ

Terjemahnya :

“Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula).”

Dalam buku tafsir al-Mishbah, melalui ayat ini Allah swt memerintahkan umat manusia untuk senantiasa menghormati,

memuliakan, dan berbuat baik kepada kedua orangtua. Potongan ayat ini menggambarkan bagaimana kesengsaraan dan kesusahpayahan ibu ketika mengandung. Berbagai kesulitan dapat dialami oleh wanita yang sedang mengandung, mulai dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis. Kesusahpayahan yang dialami oleh wanita hamil termasuk di dalamnya adalah kondisi preeklampsia (Shihab, 2012).

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas diketahui bahwa angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatus (AKN) masih belum mengalami penurunan yang signifikan disetiap tahunnya dan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Jeneponto memiliki prevalensi kematian bayi tertinggi di Sulawesi selatan. Berdasarkan data statistik tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan riwayat preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah Apakah terdapat hubungan riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian askfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

Tidak terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Preeklampsia	Preeklampsia adalah hipertensi pada ibu hamil yang terjadi pada usia gestasi > 20 minggu dengan tekanan darah sistolik \geq 140 mmHg dan diastolik \geq 90 mmHg dalam dua kali pengukuran dengan jarak waktu minimal 4 jam	Data rekam medis pasien	a. Ibu hamil preeklampsia bila tekanan darah sistolik \geq 140 mmHg dan diastolik \geq 90 mmHg disertai proteinuria \geq 1 + dipstick	Nominal

		disertai proteinuria 300mg/24 jam atau $\geq 1 +$ dipstick , dan edema.		b. Ibu hamil non preeklampsia bila tekanan darah sistolik <140 mmHg dan diastolik < 90 mmHg dan tidak terdapat proteinuria	
Variabel Dependen					
2.	Asfiksia Neonatorum	Asfiksia neonatorum adalah kondisi kurangnya kadar oksigen dalam tubuh neonatus. Dinilai menggunakan APGAR skor pada menit pertama hingga menit kelima setelah bayi lahir dengan memperhatikan warna kulit, frekuensi denyut jantung, refleks, tonus	Data rekam medis pasien.	a. Bayi asfiksia bila APGAR Skor <7 b. Bayi non asfiksia bila APGAR Skor ≥ 7	Nominal

		otot, dan pernapasan. Penilaian			
--	--	------------------------------------	--	--	--

Tabel 1. 1 Defenisi Operasional

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan riwayat preeklampsia pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medis pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2020-2021.

E. Kajian Pustaka

1. Indrapermana fendy Ketut Gde I, Duarsa Somadina Iswara (2020) dengan judul “ Hubungan derajat keparahan preeklamsia dengan kejadian asfiksia neonatorum di Rumah sakit Umum Negara periode januari 2019 – januari 2020 “. Menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data menggunakan teknik *total sampling*. Besar sampel pada penelitian ini adalah 170 sampel yang dipilih berdasarkan sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang yang berasal dari rekam medik pasien. Hasil dari penelitian ini adalah Anak yang lahir dari ibu dengan derajat preeklamsia berat memiliki prevalensi kejadian asfiksia 2,346 kali lebih tinggi dibandingkan ibu dengan preeklamsia. Hal ini

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara derajat keparahan preeklamsia dengan kejadian asfiksia neonatorum.

2. Yunarsih, Rahayu dwi (2019) dengan judul “Hubungan Pre Eklamsia (PE) deangan kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Pare kabupaten Kediri”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik observasional dengan pendekatan *cross sectional*. Pada penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling* yang kemudian di dapatkan sebesar 62 sampel. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari rekam medik pasien. Dengan menggunakan uji statistik *Spearman Rang* didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan antara preelamsia dengan kejadian Asfiksia neonatorum.
3. Kamila Auliya Nurul, Wathaniah Siti (2021) dengan judul “Analisis Korelasi Pre Eklamsia dalam Kehamilan dengan kejadian asfiksia neonatorum”. Menggunakan jenis penelitian korelasional analitik dengan pendekatan *case control*. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 124 sampel dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *sistematik random sampling*. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari rekam medis pasien. Dengan menggunakan analisa statistik *chi square* didapatkan hasil penelitian yaitu angka kejadian bayi yang mengalami asfiksia pada ibu yang memiliki riwayat preeklamsia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat

preeklampsia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kejadian preeklampsia dengan kejadian asfiksia neonatorum.

4. Mongdong Maria Wilksye Ade Vivian, et al (2021) dengan judul ‘Studi Faktor Risiko Preeklamsi Terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD dr. Sayidin Magetan tahun 2018’. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain *cross sectional*. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi yaitu catatan rekam medik yang lengkap, skor APGAR dan status kesehatan. Proses pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan cara menggunakan data sekunder pada rekam medik pasien. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan kejadian asfiksia neonatorum pada ibu hamil dengan riwayat preeklampsia dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat preeklampsia.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2020-2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Angka Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2020-2021.
- b. Mengetahui hubungan riwayat preeklampsia pada ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2020-2021.
- c. Mengetahui perbandingan besar risiko riwayat preeklampsia ibu hamil terhadap kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto tahun 2020-2021.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan, serta peneliti dapat menerapkan ilmu kesehatan yang sebelumnya telah dipelajari terutama mengenai preeklampsia dan Asfiksia neonatorum.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hubungan riwayat preeklampsia pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum, sehingga masyarakat lebih paham bahwa riwayat preeklampsia pada ibu merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum.

3. Manfaat Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan landasan untuk melakukan penelitian khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak yang membahas terkait hubungan riwayat preeklampsia pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum di fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Asfiksia Neonatorum

1. Definisi

Berdasarkan *world health organization* (WHO) asfiksia didefinisikan sebagai kegagalan dalam bernapas secara spontan dan teratur segera setelah bayi lahir. Menurut American college of obstetric and gynaecology (ACOG) dan American academy of pediatrics (AAP), Asfiksia adalah keadaan dimana terjadi gangguan pada pertukaran gas darah sehingga menyebabkan sedikitnya kadar oksigen dalam darah dan gagal napas karena akumulasi karbon dioksida dalam darah disertai dengan asidosis metabolik. (Kemenkes, 2019).

2. Epidemiologi

Asfiksia merupakan kondisi yang menjadi salah satu penyebab paling banyak kematian neonatus dan berada di peringkat ke 3 dunia dan kedua tertinggi di Indonesia. Sekitar 3% (3,6 juta) dari 120 juta bayi mengalami asfiksia disetiap tahunnya. Menurut World health organization, Angka kematian neonatus yang diakibatkan oleh asfiksia berada di peringkat kedua tertinggi di kawasan Asia tenggara dan peringkat lima tertinggi di ASEAN (Harahap, 2021).

Pada tahun 2017, kasus asfiksia terjadi sekitar 25,2% dan angka kematian yang diakibatkan oleh asfiksia dirumah sakit rujukan Provinsi di Indonesia mencapai angka 41,94%. Berdasarkan data kemenkes RI, angka kematian neonatus yang disebabkan oleh asfiksia mengalami peningkatan

sebesar 5.549 kasus tahun 2020 dan 5.599 kasus pada tahun 2021 (Kemenkes, 2019).

3. faktor Risiko

a. Faktor Antepartum

1) Usia Ibu

Kehamilan dibawah usia 20 tahun dan diatas 35 tahun merupakan umur kehamilan yang berisiko yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan berdampak pada ibu maupun pada bayi. pada dibawah usia 20 tahun organ reproduksi wanita belum sepenuhnya matang dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan akan intake makanan yang bergizi selama kehamilan sehingga akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Kehamilan di usia lebih dari 35 tahun juga merupakan kehamilan berisiko dikarenakan pada usia lebih dari 35 tahun organ reproduksi wanita mengalami penurunan fungsi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti preeklampsia dan hipertensi yang akan menyebabkan komplikasi pada saat persalinan seperti perdarahan dan persalinan terlalu dini (Vina, 2019).

2) Paritas

Paritas adalah salah satu faktor risiko terjadinya asfiksia dikarenakan primipara atau ibu yang belum pernah melahirkan sebelumnya cenderung mengalami kesulitan dikarenakan psikologis yang belum siap dan kekakuan pada otot perineum dan serviks

sehingga berdampak pada lamanya waktu persalinan sehingga menyebabkan bayi mengalami asfiksia (Mandasari, 2020).

Kondisi primipara dengan tingkat stress yang tinggi akibat psikologis yang belum siap menjelang persalinan juga dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kortisol dalam tubuh yang akan mempengaruhi dan berdampak pada aliran darah ke plasenta. Multiparitas dengan kehamilan lebih dari 4 kali juga merupakan faktor risiko asfiksia dikarenakan secara fisik ibu akan mengalami penurunan fungsi pada tubuh untuk menghadapi kehamilan selanjutnya, hal ini akan meningkatkan terjadinya komplikasi persalinan. (Vina, 2019).

3) Preklampsia

Kondisi preklampsia yang dialami ibu hamil akan sangat berdampak pada kondisi janin karena akibat dari adanya disfungsi endotel sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan antara kadar hormone vasokonstriktor (tromboksan, endotelin, angiotensin) dan vasodilator (prostasiklin dan nitritoksida). Keadaan ini menyebabkan vasokonstriksi sehingga akan berdampak pada peningkatan protein plasma pada ginjal yang akan menyebabkan adanya protein dalam urin. Selain itu vasokonstriksi yang diakibatkan oleh terganggunya hormon vasokonstriktor dan vasodilator akan mengakibatkan penurunan suplai darah ke plasenta sehingga akan membuat janin hipoksia dan terjadi gangguan pada pertukaran gas O₂ dan C₀₂ yang

nantinya akan menyebabkan asfiksia pada bayi (Mongdong et al., 2021).

4) Anemia

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (HB) dalam darah < 11 gr/dl pada trimester pertama dan ketiga dan < 10,5 gr/dl pada kehamilan trimester kedua. Kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah selama kehamilan terjadi karena intake nutrisi yang tidak adekuat seperti kekurangan zat besi dan asam folat, perdarahan akibat hemorrhoid dan perdarahan saluran cerna. Anemia kehamilan akan menyebabkan terjadinya gangguan aliran oksigen ke jaringan sehingga menyebabkan hipoksia janin dan asfiksia pada bayi pada saat setelah kelahiran (Astuti & Yunita, 2021 ; Rahayu et al., 2021).

b. Faktor intranatal

1) Jenis Persalinan

Tindakan persalinan dengan menggunakan metode sectio caesarea dan ekstraksi vakum memiliki risiko lebih tinggi menyebabkan asfiksia dibandingkan dengan jenis persalinan spontan karena persalinan dengan section caesarea dapat menstimulasi pengeluaran hormone stress pada ibu sehingga akan berdampak pada kondisi bayi yang menyebabkan pematangan paru-paru bayi yang berisi cairan paru. Bayi yang lahir dengan metode section caesarea memiliki lebih

banyak cairan paru dibandingkan dengan udara didalam paru (Alfitri et al., 2021).

2) Ketuban Pecah Dini (KPD)

Penyebab asfiksia pada kejadian ketuban pecah dini dapat dipengaruhi oleh keadaan oligohidramnion yang akan menyebabkan penyempitan tali pusat oleh karena adanya tekanan sehingga akan menghambat aliran darah yang membawa oksigen ke janin dan gangguan pada pemenuhan oksigen sehingga menyebabkan hipoksia janin (Wulan et al., 2019).

c. Faktor bayi

1) Bayi Prematur

Bayi yang lahir prematur biasanya berhubungan dengan imaturitas pada organ janin dimana sistem pernapasan mengalami defisiensi surfaktan akibat pertumbuhan dan perkembangan paru yang belum matang dan otot-otot pernapasan yang masih lemah sehingga sulit untuk bernapas spontan. Semakin muda usia kehamilan, maka paru-paru akan semakin imatur yang akan berdampak pada kandungan surfaktan yang sedikit. Defisiensi surfaktan pada paru-paru akan berdampak pada kesulitan saat ventilasi. (Muliahari, 2022).

2) Berat Badan lahir rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum dikarenakan fungsi organ bayi yang imatur seperti fungsi alveolus yang belum sempurna,

kurangnya kadar surfaktan dalam paru, penyempitan lumen saluran napas, kolpas dan obstruksi saluran napas, otot-otot pernapasan yang masih lemah sehingga menyebabkan kegagalan dalam bernapas spontan. (Hidayah, 2020).

4. Patofisiologi

Adanya transisi janin dari intrauterin ke ekstrauterin akan menyebabkan beberapa perubahan seperti Alveoli paru janin dalam uterus akan terisi cairan paru. Ketika bayi baru lahir bernapas untuk pertama kalinya maka udara akan memasuki alveoli paru yang kemudian akan diabsorpsi oleh jaringan paru. Selanjutnya, pada saat bayi lagi maka volume udara yang masuk ke alveoli akan terus bertambah banyak. Hal inilah yang akan menyebabkan alveoli berisikan udara yang mengandung oksigen. Aliran darah paru akan meningkat diakibatkan karena ekspansi paru membutuhkan tekanan yang tinggi saat inspirasi dan ekspirasi. Adanya peningkatan pada tekanan alveoli disertai dengan ekspansi paru akan berdampak pada terjadinya penurunan resistensi vaskuler paru dan akan meningkatkan aliran darah paru setelah lahir. Peningkatan aliran darah paru yang kemudian akan menyebabkan hipertensi pulmonal persisten disebabkan karena adanya kegagalan pada saat penurunan resistensi vaskuler hal ini juga disebabkan karena aliran darah paru yang inadkuat dan hipoksia relatif. Ekspansi paru yang tidak adekuat akan menyebabkan kegagalan saat bernapas (Antono, 2018).

Asfiksia neonatorum terjadi ketika bayi kekurangan O₂ karena aliran O₂ plasenta ke janin mengalami gangguan karena gagal beradaptasi di masa transisi. Pada keadaan hipoksia akut, darah akan menuju ke organ vital terlebih dahulu seperti batang otak dan jantung, dibandingkan ke serebrum, pleksus koroid, substansia alba, kelenjar adrenal, kulit, jaringan muskuloskeletal, organ-organ toraks dan abdomen seperti paru, hati ginjal, dan trakturs gastrointestinal. Adanya perubahan aliran darah diakibatkan karena penurunan resistensi pembuluh darah otak ke jantung dan peningkatan resistensi pembuluh darah ke organ perifer (kemenkes,2019)

5. Penegakan Diagnosis

Penilaian asfiksia neonatorum dapat dilakukan dengan menggunakan APGAR skor. Apgar skor merupakan penialian pada bayi baru lahir secara sistematis segera setelah lahir.

Tabel 2. 1 APGAR skor

Tanda	0	1	2
Warna kulit (Appearance)	Biru atau pucat	Tubuh kemerahan, sianosis	Seluruhnya kemerahan
Frekuensi denyut jantung (pulse)	Tidak ada	<100	>100
Tonus otot (Activity)	Tidak ada	Ekstremitas fleksi sedikit	Aktif bergerak
Pernapasan (respiration)	Tidak ada	Menangis lemah, hipoventilasi	Menangis kuat

Sumber : the American Collage Obstetrics & Gynecology (ACOG) (2015).

- a. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan ICD-11 WHO
- 1) Asfiksia neonatorum berat : APGAR skor 0-3 pada menit ke- 5 disertai dengan denyut nadi $<100x$ /menit, pernapasan tidak ada atau megap-megap, warna kulit pucat, tidak ada tonus otot.
 - 2) Asfiksia ringan-sedang : APGAR skor 4-7 pada menit ke- 5 ditandai dengan pernapasan tidak norma dalam 1 menit pertama, denyut jantung $\geq 100x$ /menit, sedikit tonus otot, merespon terhadap rangsangan. (world health Organization, 2021).
- b. Klasifikasi Asfiksia berdasarkan *The American College Obstetrics & gynecology (ACOG) & American Academy of Pediatric (AAP)*
- 1) Pada pemeriksaan darah tali pusat didapatkan Asidosis metabolic atau campuran ($pH < 7.0$)
 - 2) APGAR skro 0-3 pada menit ke-5
 - 3) Adanya manifestasi neorolig, seperti kejang, hipotonia, atau koma (ensefalopati neonatus)
 - 4) Disfungsi multiorgan, seperti gangguan kardiovaskular, gastrointestinal, hematologi, respirasi, dan renal.
- Diagnosis bayi mengalami asfiksia neonatorum dapat ditegakkan apabila memenuhi minimal 1 dari 4 kriteria yang ditemukan pada bayi (Kemenkes, 2019).
- c. Klasifikasi asfiksia neonatorum berdasarkan *Institute of Child health and Human development (NICHD)*

- 1) Pada pemeriksaan darah tali pusat dalam satu jam setelah kelahiran didapatkan pH <7.0 atau defisit basa >16 mmol/L.
- 2) Riwayat episode hipoksik perinatal (deselerasi/bradikardia berat pada janin, prolapse tali pusat, ruptur tali pusat, solusio plasenta, ruptur uteri, perdarahan/trauma fetomaternal, atau *cardiorespiratory arrest*) dan salah satu dari :
 - a) Nilai APGAR skor ≥ 5 pada menit ke- 10
 - b) Bayi masih memerlukan bantuan ventilasi selama ≥ 10 menit jika pH darah tali pusat 7,01 – 7,15 dan defisit basa 10 – 15,9 mmol/L atau pada keadaan pemeriksaan gas darah tidak tersedia (kemenkes, 2019).

6. Tatalaksana

Asfiksia adalah komplikasi pada bayi baru lahir yang dapat dicegah dengan cara memberikan edukasi terkait dengan faktor – faktor risiko dari asfiksia sebagai upaya pencegahan primer. Tatalaksana awal berupa resusitasi dan pasca resusitasi di ruang bersalin dan yang merupakan upaya pencegahan sekunder, memberikan terapi untuk mengatasi hipotermia merupakan pencegahan tersier (Kemenkes, 2019).

a. Tatalaksana di ruang bersalin

Tatalaksana asfiksia berupa resusitasi dilakukan di ruang bersalin. Persiapan yang dilakukan terdiri atas pembentukan tim, persiapan

ruang dan peralatan resusitasi, persiapan pasien, dan persiapan penolong (Kemenkes, 2019).

1) Pembentukan dan persiapan tim

Adapun informasi yang perlu diketahui dalam proses persalinan, antara lain :

- a) Informasi tentang ibu, seperti riwayat kehamilan (kondisi kesehatan dan riwayat obat-obatan), riwayat *antenatal care* dan hasil pemeriksaan USG antenatal, serta risiko infeksi ibu (streptococcus grup B, ISK, dan penyakit infeksi lainnya).
- b) Informasi tentang janin, seperti usia kehamilan, jumlah janin, risiko membutuhkan resusitasi, cairan ketuban terdapat meconium, hasil pemantauan DJJ, serta kemungkinan adanya kelainan kongenital.

Hal terpenting dalam persiapan resusitasi adalah melakukan diskusi dan kerja sama pada setiap anggota tim resusitasi. anggota tim resusitasi sebaiknya berjumlahkan tiga orang penolong terlatih yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan resusitasi dan telah menguasai langkah-langkah dalam resusitasi neonatus. Setiap persalinan dengan risiko yang sangat tinggi harus dihadiri oleh minimal 1 konsultan neonatologi atau dokter spesialis anak. Adapun pembagian tugas dalam tim resusitasi yaitu:

a) Penolong pertama

Penolong pertama mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin dalam melakukan resusitasi neonatus dengan cara memposisikan diri di sisi atas kepala bayi untuk mengontrol jalan napas (*airway*) dan pernapasan (*breathing*). Penolong pertama mempunyai tugas untuk menangkap dan meletakkan bayi di infant warmer, kemudian membersihkan wajah bayi, memasang topi pada bayi, mengeringkan tubuh bayi, kemudian memantau dan melakukan intervensi pada ventilasi bayi (mengevaluasi pengembangan dada, melakukan VTP, memasang *continuous positive airway pressure* (CPAP), dan melakukan intubasi jika diperlukan) (Kemenkes, 2019).

b) Penolong kedua

Bertindak sebagai asisten *circulation* dengan cara memposisikan diri di sisi kiri bayi dan bertugas melakukan pemantauan sirkulasi bayi. penolong kedua juga ikut membantu mengeringkan bayi, mengganti selimut bayi jika basah, memantau denyut jantung bayi menggunakan stetoskop sebelum pemasangan *pulse oxymetri*, mengatur *peak inspiratory pressure* atau tekanan puncak inspirasi (PIP) dan fraksi oksigen (FiO₂), melakukan kompresi dada dan memasang kateter umbilical. Penolong kedua juga bertugas untuk menilai denyut arteri radialis, akral, dan *capillary refill time* bayi untuk menentukan keadaan sirkulasi bayi (Kemenkes, 2019).

c) Penolong ketiga

Penolong ketiga juga memiliki tugas untuk mengatur suhu ruangan hingga mencapai 24°C - 26°C , kemudian memasang *pulse oxymetri* dan sensor suhu agar suhu bayi mencapai suhu normal $36,5^{\circ}\text{C}$ - 37°C , menyalakan stopwatch dan monitor, menyiapkan obat-obatan yang diperlukan dan inkubator transport yang telah dihangatkan, serta memasang infus perifer jika diperlukan (Kemenkes, 2019).

2) Persiapan ruang resusitasi

Ruang resusitasi sebaiknya berada di dekat ruang bersalin atau ruang operasi sehingga memudahkan tim resusitasi dalam memberikan bantuan dengan cepat dan sigap. Ruang resusitasi dipersiapkan dengan suhu ruangan yang hangat untuk mencegah kehilangan panas dari tubuh bayi, kemudian memastikan pencahayaan yang memadai untuk melakukan penilaian terhadap keadaan bayi, dan membutuhkan ruangan yang luas agar memudahkan tim resusitasi saat bekerja (Kemenkes, 2019).

3) Persiapan peralatan resusitasi

- a) Peralatan untuk mengatur suhu bayi berupa infant warmer, handuk untuk mengeringkan tubuh bayi, selimut bayi, topi, dan kantong plastik yang digunakan pada bayi usia < 32 minggu.

- b) Peralatan untuk menolong jalan napas (*airway*) bayi, berupa *suction* (penghisap lendir), kateter *suction*, dan aspirator mekoneum.
- c) Peralatan untuk menolong ventilasi (*breathing*) bayi, berupa balon mengembang sendiri (*BMS/self inflating bag*), balon tidak mengembang sendiri (*BTMS/flow inflating bag*), T-piece resuscitator, sungkup, alat intubasi.
- d) Peralatan untuk menolong sirkulasi (*circulation*) bayi, berupa kateter umbilical tetapi jika fasilitas terbatas bisa menggunakan pipa umbilical/*orogastric tube* (OGT) beserta set umbilical steril dan *three way stopcocks*.
- e) Obat-obatan seperti epinefrin (1:10.000) dan cairan pengganti berupa NaCl 0,9% dan ringer laktat.
- f) Pulse oxymetri, monitor EKG (jika ada), stetoskop, spoit, jarum.

4) Persiapan pasien

Melakukan informed consent terlebih dahulu sebelum memulai tindakan resusitasi dan melakukan antisipasi terkait faktor risiko yang dapat terjadi.

5) Persiapan penolong

Penolong resusitasi harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan memakai alat pelindung diri (APD).

6) Resusitasi

Resusitasi neonatus adalah tindakan yang diawali dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu, lalu mengambil keputusan terkait tindakan resusitasi. Resusitasi dilakukan jika bayi tidak bernapas secara spontan segera setelah lahir. Adapun hal yang harus dievaluasi segera setelah bayi lahir adalah memperhatikan apakah bayi dapat bernapas atau menangis serta menilai tonus otot. Setelah melakukan penilaian awal maka selanjutnya adalah melakukan langkah awal.

Setelah melakukan langkah awal, evaluasi kembali bagaimana usaha bayi dalam bernapas, denyut jantung, dan tonus otot. Langkah awal harus dilakukan dalam 60 detik pertama setelah bayi lahir. Hal yang harus diperhatikan dalam hasil dari evaluasi langkah awal yaitu :

- a) Pernapasan adekuat dan denyut jantung $>100x$ /menit maka bayi dapat menjalani perawatan rutin
- b) Pernapasan belum adekuat dan denyut jantung $<100x$ /menit maka lakukan pemberian bantuan ventilasi (breathing) pada bayi.
- c) Bayi bernapas spontan tetapi saturasi O_2 berdasarkan usia masih dibawah target maka berikan suplementasi O_2 dengan menggunakan balon tidak mengembvng sendiri, *T-piece resuscitator*, atau ujung balon mengembvng sendiri dengan reservoir terbuka

- d) Bayi tidak bernapas spontan kemudian disertai dengan gawat napas maka diperlukan pemberian CPAP dengan tekanan positif akhir ekspirasi secara kontinu.

Indikasi pemberian VTP jika bayi tidak bernapas (apneu), megap-megap, (gasping), atau denyut jantung <100 x/menit ventilasi dinilai efektif jika terlihat pengembangan dada dan abdomen bagian atas setiap pemberian ventilasi, disertai dengan peningkatan denyut jantung >100 x/menit dan perbaikan oksigenasi jaringan. Jika dada tidak mengembang ketika pemberian ventilasi, maka perhatikan kembali apakah tekanan yang diberikan sudah cukup. Kemudian lakukan evaluasi kembali dengan memperhatikan hal berikut :

- a) Perlekatan sungkup
- b) Reposisi jalan napas
- c) Isap mulut dan hidung jika masih ada lendir
- d) Buka mulut bayi kemudian berikan ventilasi dengan cara mengangkat dagu bayi kedepan
- e) Naikkan tekanan secara bertahap kemudian perhatikan gerakan dan suara napas di kedua paru harus simetris.
- f) Alternative jalan napas (intubasi endotrakeal atau LMA) bisa dipertimbangkan.

Jika denyut jantung bayi masih < 60 x/menit setelah diberi VTP yang adekuat selama 30 detik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompresi dada (circulation) untuk mengembalikan perfusi


terutama ke otak, memperbaiki insufisiensi miokardium, dan mencegah hipoksia jaringan. Kompresi dada dengan ventilasi dilakukan dengan rasio 3:1 (Kemenkes, 2019).

Langkah-langkah melakukan kompresi dada yaitu dengan memposisikan jari 1/3 dibawah sternum. Kompresi dada dilakukan dengan teknik ibu jari (*two thumb-encircling hands technique*) kemudian jari jari tangan yang lain melingkari dada dan menyanggah tulang belakang. Setelah itu, lakukan penekanan dengan kedalaman 1/3 diameter anterior dada. Setelah penolong melakukan kompresi dada dan VTP selama 60 detik, maka lakukan evaluasi kembali terkait dengan kondisi bayi. bayi dinyatakan mengalami perbaikan bila terjadi peningkatan denyut jantung, saturasi oksigen dan terlihat bayi bernapas secara spontan (Kemenkes, 2019).

kompresi dada dihentikan apabila denyut jantung bayi >60x/menit tetapi, bila denyut jantung bayi masih <60x/menit setelah dilakukan kompresi dan VTP selama 60 detik maka pertimbangkan untuk pemberian obat-obatan dan cairan pengganti volume. Pemberian obat-obatan dan cairan dapat diberikan melalui jalur vena umbilicus, endotrakeal, atau intraseus. Adapun obat-obatan yang dapat digunakan dalam tindakan resusitasi neonatus (Kemenkes, 2019). :


- a) Epinefrin 1:1000 diberikan melalui jalur intravena atau intraoseus dengan dosis 0,1-0,3 mL/kgBB

- b) Jika terdapat kecurigaan kehilangan darah fetomaternal maka lakukan pemberian cairan berupa darah, albumin, dan kristalois isotonis diberikan selama 5-10 menit dengan dosis 10 ml/kgBB.
- c) Bikarbonat, tetapi bukan terapi rutin yang digunakan dalam tindakan resusitasi neonatus .
- d) Nalokson, diberikan secara intravena atau intramuscular dengan dosis 0,01-0,04 mg/kgBB. Pemberian nalokson tidak disarankan untuk diberikan melalui endotrakea.





ALUR RESUSITASI



Sumber : UKK Neonatologi IDAI (2017)

Bagan 2. 1. Alur Resusitasi

7. Komplikasi Asfiksia Neonatorum

a. Sistem saraf Pusat

Ensefalopati hipoksik iskemik (EHI) merupakan komplikasi yang terjadi pada kasus asfiksia akibat hipoksia otak yang mengganggu sistem saraf pusat sehingga mengakibatkan disfungsi serebrovaskular dan oksigenasi, degenerasi sel-sel neuron, edema serebral dan kemudian akan menyebabkan apoptosis maupun nekrosis (Kemenkes, 2019).

b. Sistem Respirasi

Komplikasi yang dapat terjadi pada sistem respirasi akibat asfiksia adalah peningkatan persisten tekanan pembuluh darah paru, perdarahan paru, disfungsi jantung yang menyebabkan disfungsi paru, kegagalan produksi surfaktan yang akan menyebabkan *Respiratory Distress Syndrome* (RDS) (Kemenkes, 2019).

c. Sistem Kardiovaskular

Disfungsi sistem kardiovaskular terjadi sekitar 29% pada bayi asfiksia ditandai dengan ketergantungan terhadap obat inotropik dan gambaran *Transient Myocardial Ischemia* pada elektrokardiografi. Adapun gangguan sistem kardiovaskular yang dapat terjadi pada bayi asfiksia yaitu *Transient Mitral Regurgitation* (TMR), *Transient Myocardial Ischemia* (TMI), *Transient Tricuspid Regurgitation* (TTR), dan *Persistent Pulmonary Hypertension Of The Newborn* (PPHN).

d. Sistem Urogenital

Hypoxic Ischemic Acute Tubular Necrosis merupakan komplikasi pada sistem urogenital akibat asfiksia. Untuk menyatakan bayi mengalami gagal ginjal, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu, output urin $<0,5$ mL/kg/jam, urea darah >40 mg/dL, kreatinin serum >1 mg/dL, dan didapatkan hematuria atau proteinuria dalam 3 hari pertama kehidupan. (Kemenkes, 2019).

e. Sistem Gastrointestinal

Kejadian Hipoksia pada bayi asfiksia dapat menyebabkan disfungsi sistem hepatic dengan kriteria yaitu, nilai aspartate aminotransferase >100 IU/l atau alanine transferase >100 IU/l pada minggu pertama setelah kelahiran. Selain itu, kejadian asfiksia dapat menyebabkan pengalihan aliran darah dari usus sehingga dapat berakibat terjadi peningkatan risiko enterokolitis nekrotikan (EKN) (Kemenkes, 2019).

B. Tinjauan Umum Preeklampsia

1. Definisi

Preeklampsia merupakan hipertensi yang timbul pada ibu hamil dengan usia gestasi >20 yang disertai dengan proteinuria maupun edema. Preeklampsia merupakan salah jenis dari hipertensi dalam kehamilan yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg disertai dengan proteinuria ≥ 300 mg/24 jam atau $\geq 1+$ dipstick. Sedangkan proteinuria adalah keadaan dimana

terdapat kandungan protein yang berlebihan pada urin (Meliyani et al., 2021; Prawirohardjo, 2020)).

2. Epidemiologi

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2015, angka kejadian preeklampsia tujuh kali lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan Negara maju. Untuk Negara maju angka kejadian preeklampsia berkisar 1,3-6% dan di Negara berkembang sekitar 1,8-18%. Menurut Survey Indikator Kesehatan Nasional Tahun 2016 terdapat 305 per 100.000 kasus kematian ibu akibat preeklampsia di Indonesia (Yulianti & Astari, 2022).

3. Faktor Risiko

a. Riwayat Hipertensi

Ibu yang memiliki riwayat hipertensi memiliki risiko 7,38 kali mengalami preeklampsia ketika hamil (bakti sari utami et al, 2020). Hal ini disebabkan karena riwayat hipertensi akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ penting tubuh disertai dengan keadaan ketika hamil dimana akan terjadi peningkatan berat badan sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih berat dengan timbulnya udem dan proteinuria (Purwanti et al., 2021).

b. Obesitas

Status gizi yang berlebih akan mengakibatkan akumulasi lemak yang berlebih pada tubuh yang akan menghasilkan CRP (protein C-Reaktif) dan sitokin inflamasi (IL 6). CRP merupakan reaktan fase akut yang akan meningkat pada fase awal masa kehamilan, sedangkan IL 6

adalah mediator inflamasi yang diproduksi di jaringan lemak dan berperan dalam stimulator utama dari reaktan fase akut yang akan berdampak pada dinding pembuluh darah dan sistem koagulasi. Peningkatan CPR dan IL 6 akan mengakibatkan terjadinya stress oksidatif yang akan berdampak pada disfungsi endotel. Disfungsi endotel akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan zat-zat gizi yang bertindak sebagai vasodilator dengan vasokonstriktor (endotelin, tromboksin, angiotensin II) yang kemudian akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga akan terjadi hipertensi (Nulanda, 2019).

c. Usia Ibu

Usia ibu hamil <20 tahun dapat meningkatkan risiko terjadinya preeklampsia, hal ini disebabkan karena pada usia muda organ reproduksi belum sepenuhnya berfungsi secara optimal dan memiliki pengaruh terhadap pemenuhan suplai makanan dan nutrisi terhadap janin Hal inilah yang akan menyebabkan peningkatan risiko terjadinya komplikasi dalam kehamilan. (Mustofa et al., 2021)

Perubahan fisiologis seperti vasospasme, aktivasi berlebih pada sistem koagulasi dan gangguan hormonal akan terjadi pada usia > 35 tahun. Semakin bertambahnya usia maka akan menyebabkan peningkatan dari stress oksidatif yang berperan dalam pembentukan senyawa oksidan, yaitu radikal bebas. Peningkatan senyawa oksidan akan menyebabkan kerusakan pada membran sel yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh yang akan berdampak pada pembentukan peroksidase lipid yang

akan merusak membran nucleus dan protein sel endotel. Sehingga akan menyebabkan disfungsi endotel vaskular dan berakibat pada peningkatan tekanan darah pada kondisi preeklampsia (Martadiansyah et al., 2019).

4. Patofisiologi

Sampai saat ini penyebab hipertensi dalam kehamilan masih belum diketahui secara pasti. Tetapi beberapa teori telah menjelaskan tentang mekanisme terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Berdasarkan dari beberapa teori, diketahui bahwa preeklampsia berkembang dalam 2 tahap yaitu ; (1) tahap pertama, terjadi perkembangan plasenta yang abnormal pada awal trimester I, diikuti oleh ; (2) sindrom maternal atau kumpulan dari beberapa gejala yang terjadi pada trimester II dan III.

a. Teori Abnormal Plasenta

Pada kehamilan normal, sitotrofoblas akan bermigrasi ke arteri spiral uterus ibu kemudian membentuk sinus vascular untuk menyediakan nutrisi bagi janin. Sehingga Rahim akan mendapat vaskularisasi dari cabang arteri uterin dan arteri ovarika. Ketika sitotrofoblas gagal untuk bertransformasi maka akan menyebabkan kegagalan dalam proses remodeling arteri spiral sehingga akan mengakibatkan tingginya resistensi arteri spiral dan lapisan otot spiral juga akan tetap dalam keadaan kaku. Kegagalan remodeling arteri spiral akan menyebabkan penurunan kemampuan vasodilatasi pada pembuluh darah, sehingga akan menghalangi perfusi plasenta dan akan mengakibatkan terjadinya hipoksia. Keadaan ini akan mengaktifasi

pelepasan antiangiogenik, sehingga menyebabkan disfungsi sel endotel dan kerusakan multiorgan pada ibu (Rana et al., 2019).

b. Teori Iskemia plasenta dan Pembentukan Radikal

Kegagalan dari remodeling arteri spiral akan berdampak pada plasenta yang akan menyebabkan hipoksia dan iskemia. Keadaan ini akan menyebabkan terjadinya pembentukan oksidan atau radikal bebas yang memiliki efek toksin. Dalam keadaan normal produksi oksidan yang bersifat toksik akan diimbangi oleh produksi antioksidan. Tetapi pada keadaan hipertensi dalam kehamilan, kadar oksigen akan meningkat dan kadar antioksidan akan menurun. Sehingga kadar antioksidan tidak dapat mengimbangi kadar oksidasi yang tinggi dalam tubuh. Ketika kadar oksidan terlalu tinggi dalam tubuh, maka akan menyebabkan kerusakan membran sel endotel sehingga terjadi disfungsi endotel (Phipps et al., 2019)

c. Teori Immunologi

Pada keadaan preeklampsia, terjadi penurunan HLA-G. *Human leukocyte antigen protein G* (HLA-G) berfungsi sebagai modulasi respon imun sehingga respon imun tubuh ibu tidak menolak hasil konsepsi. HLA-G akan melindungi trofoblas janin, sehingga akan mencegah terjadinya lisis oleh sel *Natural Killer* (NK). ketika terjadi kekurangan HLA-G di desidua plasenta, maka akan menyebabkan invasi trofoblas terhambat di dalam desidua sehingga akan mengakibatkan penyempitan pada arteri spiral dan produksi sitokin

yang memudahkan terjadinya inflamasi dan disfungsi endotel. (Prawirohardjo, 2020).

d. Teori Stimulus Inflamasi

Pada kehamilan normal, plasenta akan melepaskan debris trofoblas sebagai sisa apoptosis dan nekrotik trofoblas akibat dari reaksi stress oksidatif. Debris ini akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi inflamasi tetapi dalam batas normal. Pada keadaan preeklampsia, terjadi peningkatan stress oksidatif, sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi debris apoptosis dan nekrotik trofoblas. Keadaan ini akan mengakibatkan reaksi inflamasi yang cukup parah pada ibu sehingga akan menyebabkan aktivasi sel endotel dan sel-sel makrofag atau granulosit. Keadaan ini akan menyebabkan reaksi inflamasi yang dapat menimbulkan gejala-gejala preeklampsia pada ibu dan disfungsi sel endotel (Prawirohardjo, 2020).

5. Diagnosis

Kriteria penegakan diagnosis ditegakkan berdasarkan timbulnya hipertensi disertai dengan proteinuria dan atau edema setelah usia gestasi 20 minggu.

a. Preeklampsia

- 1) Hipertensi : sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg.
- 2) Proteinuria : 300mg/24 jam atau ≥ 1 + dipstick
- 3) Edema lokal

b. Preeklampsia Berat

Diagnosis preeklampsia berat ditegakkan jika diagnosis preeklampsia terpenuhi dan didapatkan salah satu dari gejala klinis dibawah ini:

- 1) Hipertensi : sistolik ≥ 160 mmHg dan diastolik ≥ 110 mmHg. Hasil dari pemeriksaan tekanan darah tidak mengalami perubahan meskipun ibu hamil telah menjalani perawatan di Rumah sakit dan menjalani tirah baring.
- 2) Proteinuria : >5 g/24 jam atau 4 + dalam pemeriksaan kualitatif.
- 3) Oligouria : produksi urin <500 cc/24 jam
- 4) Peningkatan kadar kreatinin plasma
- 5) Gangguan visus dan cerebral : Pandangan kabur, penurunan kesadaran, nyeri kepala dan skotoma .
- 6) Nyeri epigastrium
- 7) Edema paru-paru dan sianosis
- 8) Hemolisis mikroangiopatik
- 9) Trombositopenia : < 100.000 sel/mm³
- 10) Gangguan hepar : kadar alanin dan *aspartate aminotransferase* meningkat
- 11) Terhambatnya pertumbuhan intrauterin
- 12) Sindrom HELLP

6. Tatalaksana

Tujuan utama dari pengobatan preeklampsia adalah mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut seperti kejang, perdarahan ontrakranial, dan gangguan fungsi organ vital. Ibu hamil dengan preeklampsia dapat dirawat secara rawat jalan dan dianjurkan untuk tirah baring. Tirah baring dengan posisi miring akan membantu meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital dan meningkatkan curah jantung, sehingga mengurangi vasospasme pembuluh darah. Peningkatan curah jantung akan meningkatkan aliran darah rahim yang akan menambah oksigenasi plasenta. Selain itu berikan diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam secukupnya (Prawirohardjo, 2020).

7. Komplikasi Preeklampsia

Komplikasi Preeklampsia bisa bermanifestasi sebagai sindrom HELLP, ditandai dengan anemia hemolitik mikroangiopatik, disfungsi hati, dan trombositopenia, dengan atau tanpa proteinuria atau hipertensi berat. Sindrom HELLP sering memiliki onset akut, dengan penurunan kondisi ibu yang sangat cepat. Komplikasi janin termasuk hambatan pertumbuhan, lahir mati, kematian neonatal, dan komplikasi terkait prematuritas sejak persalinan dini (Prawirohardjo, 2020).

C. Integrasi Keislaman

Bayi yang baru lahir memiliki ketahanan tubuh yang lemah sehingga sangat rentan untuk mengalami gangguan pada fungsi tubuhnya, hal ini diakibatkan karena proses adaptasi bayi pada lingkungan diluar janin. Allah swt. berfirman dalam QS ar-Rūm/30: 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya:

“ Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa “

Dalam tafsir Ibnu Kasir, ayat ini dijelaskan bagaimana penciptaan manusia yang diciptakan dimulai dari keadaan lemah. Manusia berasal dari tanah, kemudian terbentuk berupa nutfah (air mani), kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging hingga ditiupkan ruh kedalamnya. Kemudian ia lahir dari rahim ibunya dalam keadaan dha'if dan kecil serta dalam keadaan lemah, lalu mulailah tumbuh dewasa sedikit demi sedikit hingga menjadi orang dewasa yang memiliki kekuatan. Setelah itu ia tumbuh menjadi lemah lagi ketika menjadi tua. Dan dari ayat ini Allah swt. melakukan dan mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya.

Asfiksia merupakan keadaan ketika kurangnya aliran oksigen keseluruh tubuh sehingga terjadi proses sesak untuk memenuhi kebutuhan

oksigen dalam tubuh. Dalam hal ini Allah Swt. menjelaskan tentang bagaimana ketika disempitkan dada seseorang dalam QS al-An,ām/6: 125.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“ Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman “

Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa sebagaimana dalam firman Allah swt yaitu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Swt. diberikan petunjuk, maka Allah swt. melapangkan dadanya memeluk agama Islam dengan memasukkan cahaya berupa iman kedalam hatinya sehingga tidak ada keraguan padanya. Dan adapula yang dikehendaki oleh Allah swt. untuk menetap dalam kesesatannya akibat menolak ajakan iman, sehingga dijadikan sempit dadanya tidak bisa menyimpan kebaikan dan kebenaran didalamnya sehingga sesaklah ia, dan tidak ada sekalipun kebaikan yang mau menghampirinya Keadaan inilah yang diumpamakan seperti sedang mendaki ke langit atau angkasa.

Dalam ayat di atas dijelaskan bagaimana ketika dada seorang manusia disesakkan akibat kesesatan yang ia perbuat. Kesesatan dalam artian adanya pelanggaran yang diperbuat. Jika dikaitkan dengan topik asfiksia maka, ketika ibu yang melakukan pelanggaran seperti memakan makanan

yang tidak dianjurkan ataupun tidak melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilannya untuk menghindari risiko-risiko bahaya dalam kehamilan sehingga menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami asfiksia akibat dari riwayat penyakit ibunya.

Berdasarkan hadist Nabi, terdapat dua prinsip utama kesehatan yaitu, prinsip pencegahan dan prinsip pengobatan. Islam lebih mengutamakan pencegahan daripada pengobatan. Oleh karena itu, islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga kesehatan. (Yunus, 2019). Allah Allah swt. berfirman dalam QS Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ


Terjemahnya :

“ Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. “

Berdasarkan dari tafsir As-Sa'di, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hambanya untuk berinfak kepada orang yang membutuhkan dan berinfak dalam jihad di jalan Allah. Allah melarang untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad atau dengan cara menjerumuskan diri sendiri ke dalam tindakan yang dapat merusak tubuh atau jiwa dan melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya jiwa atau ruh. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan


menghindari faktor risiko yang dapat merugikan ibu ketika hamil agar dapat mencegah terjadinya komplikasi dalam kehamilan.

D. Kerangka Teori






Bagan 2. 2. Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep



Keterangan :

-  : Variabel Independen
-  : Variabel Dependen
-  : Variabel tidak diteliti

Bagan 2. 3. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian analitik observasional yang dilakukan tanpa melakukan intervensi pada subjek penelitian melalui pendekatan *case control study* untuk mengetahui hubungan riwayat preekalmpsia pada ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah sakit Umum daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Oktober – November 2022

C. Populasi dan sampel

Populasi kontrol penelitian ini adalah semua bayi yang lahir pada periode 2020 – 2021 yang tercatat dalam rekam medik di RSUD Lanto. Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 1.532 bayi. Sedangkan populasi kasus penelitian ini adalah bayi yang mengalami asfiksia pada periode 2020-2021 di RSUD Lanto. Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto yaitu sebanyak 344 kasus.

1. Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari kelompok kasus dan kelompok kontrol dengan data rekam medik yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan kriteria eksklusi pada penelitian ini dikelompokkan sesuai populasi yakni sebagai berikut :

a. Sampel kasus

1) Kriteria Inklusi

- a) Semua bayi yang terdiagnosis asfiksia dengan APGAR skor < 7 dan memiliki rekam medik yang lengkap di RSUD Lanto. Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 2020-2021.

2) Kriteria Eksklusi

- a) Bayi yang lahir dengan deformasi kongenital.
- b) Bayi dengan berat badan lahir < 2500 gr.
- c) Bayi prematur

b. Sampel kontrol

1) Kriteria Inklusi

- a) Bayi yang tidak terdiagnosis asfiksia yaitu APGAR skor > 7 dan memiliki rekam medik yang lengkap di RSUD Lanto. Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto 2020-2021.

2) Kriteria Eksklusi

- a) Bayi yang lahir dengan deformasi kongenital.

b) Bayi dengan berat badan lahir <2500 gr.

c) Bayi prematur

Cara Penentuan sampel menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* :

$$\begin{aligned} S &= \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 + (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \\ &= \frac{3,841 \cdot 344 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2(344-1) + 3,841 \cdot 0,5 \cdot 0,5} \\ &= \frac{330,326}{0,8575 + 0,96025} \\ &= \frac{330,326}{1,81775} \\ &= 181,72 \\ S &= 181,72 \text{ dibulatkan menjadi } 182 \end{aligned}$$

Keterangan :

s = Jumlah sampel

λ^2 = Berdasarkan table chi square dengan satu derajat kebebasan (dk) dan taraf kesalahan 5% didapatkan chi kuadrat = 3,841 (dalam table chi kuadrat)

N = Jumlah populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang benar (0,5)

d = 0,05

Dari 344 populasi kasus didapatkan sampel yang akan digunakan sebanyak 182. Dalam penelitian case control ini digunakan perbandingan 1:1 untuk kasus dan kontrol, sehingga total sample keseluruhan adalah 364 yang terdiri dari 182 kasus dan 182 kontrol.

D. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari rekam medik. Peneliti akan mengumpulkan data dari rekam medik pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang periode 2020 – 2021, kemudian akan memilih sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data atau mengukur objek suatu variable penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah studi dokumen (rekam medik) pasien di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa data

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dan mengetahui hasil dari penelitian apakah termasuk dalam hipotesis nol atau hipotesis ha.

1. Analisis Univariat


Analisis univariat merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis tiap variable dari penelitian yang dilakukan, seperti gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan variabel independen.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menilai hubungan atau korelasi antar dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *uji chi square* dengan bantuan software uji statistik dan *Odds Ratio* (OR).



G. Alur penelitian



Bagan 3. 1. Alur Penelitian

H. Etika penelitian

Permohonan persetujuan etik penelitian merupakan suatu prosedur wajib yang harus dilakukan ke komite etik penelitian kesehatan fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun prinsip – prinsip etika penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Respect for the person

Menghormati segala bentuk harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusannya. Serta senantiasa untuk selalu menjaga kerahasiaan data dan identitas yang diperoleh dari rekam medik.

2. Beneficence dan nonmaleficence

Berkewajiban untuk senantiasa membantu dan berbuat baik kepada orang lain serta tidak merugikan siapapun.

3. Justice

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan keuntungan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November – Desember 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang merupakan rumah sakit pusat rujukan di kabupaten Jeneponto yang saat ini masih berstatus Type C. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang dibangun diatas lahan seluas 2,0 Ha dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Kesehatan Dr. Adhyatma, M.P.H. pada tanggal 18 Januari 1990 yang berlokasi di Jl. Ishak Iskandar Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan.

1. Visi Dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto
 - a. Visi Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang
“Menjadi Rumah Sakit SMART”
 - b. Misi Rumah Sakit Umum Lanto Dg Pasewang
 - 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama lingkungan rumah sakit.
 - 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
 - 3) Mengembangkan sarana dan prasarana sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan akreditasi rumah sakit.

- 5) Mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit dan manajemen keuangan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- 6) Meningkatkan kerjasama lintas sector dalam rangka pelayanan kesehatan.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sumber daya manusia.
- 8) Mewujudkan kawasan lingkungan bersih, aman dan nyaman.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Tabel 4. 1 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis Preeklampsia di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021

Variabel	Frekuensi	
	N	%
Riwayat Ibu Preeklampsia		
a. Ibu hamil preeklampsia	101	27,7
b. Ibu hamil non preeklampsia	263	72,3
Total	364	100,0

Sumber : Data Sekunder, 2020-2021

Pada tabel 4.1 diperoleh distribusi karakteristik ibu hamil berdasarkan dari riwayat preeklampsia, sebagian besar ibu hamil tidak memiliki riwayat preeklampsia dengan jumlah 263 orang (72,3%). Sedangkan, ibu hamil yang memiliki riwayat preeklampsia berjumlah 101 orang (27,7%).

Tabel 4. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Diagnosis Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021

Variabel	Frekuensi	
	N	%
Asfiksia Neonatorum		
a. Bayi asfiksia (APGAR Skor < 7)	182	50,0
b. Bayi non asfiksia (APGAR Skor ≥7)	182	50,0
Total	364	100,0

Sumber : Data Sekunder, 2020-2021

Pada tabel 4.2 diperoleh Distribusi karakteristik bayi berdasarkan diagnosis asfiksia yaitu bayi dengan apgar skor <7 berjumlah 182 (50%) dan bayi dengan apgar skor ≥7 berjumlah 182 (50%).

2. Analisis Bivariat

Tabel 4. 3 Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang

Riwayat Preeklampsia	Asfiksia Neonatorum		Non Asfiksia Neonatorum		Total		P-value	OR	CI 95%
	N	%	N	%	N	%			
	Ya	93	25,5	8	2,2	101			
Tidak	89	24,5	174	47,8	263	72,3			
Total	182	50,0	182	50,0	364	100,0			

Uji *Chi Square*. Sumber : Data Sekunder, 2020-2021

Pada tabel 4.3 menunjukkan kejadian asfiksia neonatorum berdasarkan dari riwayat penyakit ibu yaitu preeklampsia dan non preeklampsia. Dari total keseluruhan sampel sebanyak 364 bayi, yang terdiri dari 182 bayi asfiksia neonatorum dimana sebagian besar memiliki ibu dengan riwayat preeklampsia yaitu sebanyak 93 bayi (25,5%) dan 89 bayi (24,5%) dengan ibu non preeklampsia. Sedangkan, dari 182 bayi non asfiksia neonatorum sebagian besar memiliki ibu non preeklampsia yaitu

sebanyak 174 bayi (47,8) dan hanya 8 bayi (2,2%) yang memiliki ibu dengan riwayat preeklampsia.

Analisis hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum dilakukan menggunakan rumus *Chi Square* dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000 ($p < 0,005$) yang menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021. Nilai Odd Ratio (OR) sebesar 22,728 dengan CI 95% nilai lower limit (LL) sebesar 10,566 dan upper limit (UL) sebesar 48,889. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ibu hamil dengan riwayat preeklampsia memiliki risiko 23 kali lebih besar untuk melahirkan bayi asfiksia neonatorum dibandingkan dengan ibu non preeklampsia dengan sekurang-kurangnya risiko sebesar 10,566 kali dan paling besar sebesar 48,889 kali mengalami kejadian asfiksia neonatorum.

C. Pembahasan

Asfiksia neonatorum merupakan keadaan dimana terjadi kegagalan dalam bernapas spontan dan teratur segera setelah bayi lahir. Hal ini disebabkan oleh hipoksia janin intra uteri yang berhubungan dengan faktor - faktor yang timbul pada kehamilan, persalinan dan setelah melahirkan. Banyak faktor penyebab terjadinya asfiksia yaitu faktor ibu, faktor tali pusat dan faktor bayi. Faktor ibu meliputi preeklampsia dan eklampsia, perdarahan abnormal, partus lama atau Kala II memanjang,

demam saat persalinan, infeksi berat, kehamilan postmatur, dan usia ibu. Faktor janin antara lain bayi prematur, kelainan bawaan dan cairan ketuban bercampur mekonium. Faktor tali pusat meliputi adanya lilitan tali pusat, tali pusat pendek, simpul tali pusat, dan prolaps tali pusat. Asfiksia neonatorum merupakan kedaruratan neonatus yang dapat mengakibatkan hipoksia (rendahnya suplai oksigen ke otak dan jaringan) dan kemungkinan kerusakan otak atau kematian jika tidak ditangani dengan benar. (Kumalasari & Rusella, 2022).

Dari banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan asfiksia neonatorum, salah satu faktor risiko yang diteliti dalam penelitian ini adalah riwayat preeklampsia ibu semasa kehamilan. Preeklampsia merupakan penyakit dengan adanya tanda tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang terjadi pada saat kehamilan Berdasarkan hasil penelitian, dari 101 ibu hamil dengan riwayat preeklampsia, sebanyak 93 ibu melahirkan bayi dengan diagnosis asfiksia neonatorum. Sedangkan, hanya 8 ibu dengan riwayat preeklampsia yang melahirkan bayi non asfiksia. Hal ini dikarenakan, timbulnya preeklampsia saat kehamilan dapat memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan ibu dan janin yang menyebabkan spasme pada arteriola spiralis decidua sehingga terdapat penurunan aliran darah ke plasenta yang menyebabkan hipoksia janin (Mongdong et al., 2021).

Berdasarkan teori, Asfiksia neonatorum merupakan komplikasi persalinan yang salah satunya bisa disebabkan oleh adanya riwayat preeklampsia ibu hamil. Tetapi, dari hasil penelitian terdapat 3 ibu hamil yang

memiliki riwayat preeklampsia tetapi justru melahirkan bayi non asfiksia. Hal ini membuktikan bahwa tidak semua ibu hamil dengan riwayat preeklampsia secara pasti melahirkan bayi asfiksia. Terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah bayi lahir dengan komplikasi pada ibu dengan preeklampsia, diantaranya deteksi dini, pencegahan komplikasi, memperbaiki asupan nutrisi pada ibu hamil, kontrol antenatal secara teratur, tenaga kesehatan memberikan penanganan yang lebih cepat dengan identifikasi faktor risiko yang tepat, mencegah efek yang diakibatkan asfiksia neonatorum (Johan dan Sunarsih, 2019).

Pada tabel 4.3 Analisis bivariat dapat dilihat bahwa jumlah ibu non preeklampsia yang melahirkan bayi asfiksia cukup tinggi yaitu sebanyak 89 ibu. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mongdong et al (2021) bahwa ibu yang tidak memiliki riwayat preeklampsia juga memiliki risiko melahirkan bayi dengan kondisi asfiksia walaupun dengan risiko yang lebih kecil. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya afiksia pada neonatorum salah satunya adalah usia ibu. penelitian yang dilakukan Khoiriah Annisa & Pratiwi Tiara (2019) terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian asfiksia pada bayi baru lahir dengan sampel penelitian berjumlah 93 responden. Penelitian ini mengemukakan bahwa usia ibu juga menjadi salah satu faktor risiko yang dapat mengakibatkan asfiksia neonatorum dengan hasil $p\ value = 0,001 < 0,005$ dan hasil analisa Odds Ratio (OR) 8,222 artinya terdapat hubungan yang bermakna antara usia ibu dengan kejadian asfiksia neonatorum dan memiliki peluang 8,222 kali

menyebabkan kejadian asfiksia neonatorum. Hal ini disebabkan ibu berusia di bawah 20 tahun (usia muda) dan ada ibu yang berusia diatas 35 tahun (usia tua), yang mempengaruhi dari kesiapan alat reproduksi dan kemampuan psikologis ibu dalam melahirkan. Untuk usia ibu yang melahirkan lebih dari 35 tahun, maka pada wanita umur tersebut terdapat kecenderungan besar untuk terjadinya pre eklamsi dan hipertensi yang dapat menyebabkan perdarahan dan persalinan terlalu dini. Kehamilan dibawah usia 20 tahun dapat menimbulkan banyak permasalahan karena bisa memengaruhi organ tubuh seperti rahim, yang berisiko melahirkan bayi premature dan berat lahir rendah yang berujung pada komplikasi pada bayi seperti asfiksia neonatorum. (Vina, 2019). Selain dari faktor usia ibu yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab asfiksia neonatorum pada ibu non preeklampsia, pemeriksaan antenatal care (ANC) tidak rutin juga merupakan salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan bayi lahir dengan asfiksia bahkan dengan ibu yang tidak memiliki riwayat preeklampsia semasa kehamilan. Hal ini didukung oleh penelitian Sarker et al (2020) dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang terdiri dari 50 sampel kasus dan 50 sampel kontrol sebanyak. Dari hasil uji *chi Square* di dapatkan nilai *p-value* $0,001 < 0,005$ yang berarti terdapat hubungan antara pemeriksaan antenatal care (ANC) dengan kejadian asfiksia.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan

menggunakan uji statistik *chi square* diperoleh hasil *p value* = 0,000 ($p < 0,005$) dengan hasil *Odds Ratio* (OR) sebesar 22,728. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021 dimana ibu hamil dengan riwayat preeklampsia berisiko 23 kali lebih besar untuk melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu non preeklampsia. Berdasarkan uji tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Riwayat preeklampsia pada ibu hamil dapat menyebabkan asfiksia neonatorum karena peningkatan pemindahan sel tropoblas menjadi meningkat yang mengakibatkan transfer darah melalui pembuluh arteri gagal hingga terjadi iskemia plasenta. Aliran darah yang mengecil yang terjadi pada ibu hamil dengan preeklampsia menyebabkan terjadinya gangguan perfusi uteroplasenter. Akibatnya vasospasme dan kerusakan arteri spiral selama kehamilan dan terjadi gangguan pertukaran O_2 dan CO_2 ketika bayi dilahirkan sehingga terjadi asfiksia pada bayi baru lahir (Kumalasari & Rusella, 2022).

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila Auliya Nurul, Wathaniah Siti (2021) dengan sampel sebanyak 62 kelompok kasus dan 62 kelompok kontrol kemudian didapatkan hasil *p value* = 0,000 yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum. Begitu juga dengan penelitian Mongdong et al (2021) di RSUD Dr. Sayidin Magetan,

Jawa Timur dengan sampel sebanyak 326 orang kemudian didapatkan hasil p value = 0,000 ($p < 0.005$) dan *Odds Ratio* (OR) 3,071 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat preeklampsia pada ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum dan preeklampsia memiliki risiko 3,071 kali lebih besar mengakibatkan bayi asfiksia. Silviani et al (2022) mengemukakan hal yang sama pada penelitiannya dengan sampel kasus sebanyak 103 dan kasus kontrol 103 di RSUD Siti Aisyah Kota Lubuklinggau. Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan preeklampsia dengan kejadian asfiksia pada bayi baru lahir yang secara statistik bermakna dengan p value = 0,000 < 0,005. penelitian yang dilakukan oleh Yunarsih & Rahayu (2019) di Kabupaten Kediri dengan jumlah 62 sampel, juga sependapat dengan peneliti dan mendukung penelitian ini berdasarkan dari hasil uji Chi Square didapatkan p-value 0,000 < 0,005 dengan hasil demikian berarti ada hubungan antara Pre Eklamsia dengan kejadian asfiksia.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medik data yang tidak lengkap dalam berkas rekam medik sehingga dianggap sebagai *missing case* dan tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian.
2. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini hanya preeklampsia, sedangkan berdasarkan hasil penelitian jumlah ibu hamil non preeklampsia yang melahirkan bayi asfiksia cukup tinggi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat faktor risiko lain yang tidak diteliti yang dapat menyebabkan bayi asfiksia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yaitu hubungan riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021, maka diperoleh kesimpulan antara lain :

1. Jumlah bayi yang memiliki apgar skor <7 dan didiagnosis asfiksia di RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021 sebanyak 344 bayi (22,45%) .
2. Terdapat hubungan antara riwayat preeklampsia ibu hamil dengan kejadian asfiksia neonatorum di RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021.
3. Ibu hamil dengan riwayat preeklampsia memiliki risiko 23 kali lebih besar untuk melahirkan bayi asfiksia dibandingkan dengan ibu non preeklampsia.

B. Saran

1. Bagi Rumah Sakit


Membuat program-program yang dapat melakukan antisipasi terhadap kejadian asfiksia dengan melakukan pengawasan secara kontinue khususnya ibu dengan risiko tinggi terhadap kejadian preeklampsia dan antisipasi terhadap kejadian asfiksia.

2. Bagi Peneliti

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan acuan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan mengambil sampel yang berbeda dan metode penelitian yang berbeda di tempat berbeda atau sebagai bahan acuan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan khususnya kepada ibu hamil yang berisiko agar mampu mengetahui faktor-faktor kejadian asfiksia sehingga tindakan pencegahan dini dapat dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, R., Mosa, H., Sultan, M., Helill, S. E., Assefa, B., Abdu, M., Ahmed, U., Abose, S., Nuramo, A., Alemu, A., Demelash, M., & Delil, R. (2021). Prevalence and risk factors associated with birth asphyxia among neonates delivered in Ethiopia: A systematic review and metaanalysis. *PLoS ONE*, *16*(8 August). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255488>
- Alfitri, N. A., Bakhtiar, R., & Ngo, N. F. (2021). Hubungan Umur Kehamilan, Jenis Persalinan, Dan Ketuban Pecah Dini Dengan Derajat Asfiksia Neonatorum Di Rsud Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Periode 2019 - 2020. *Jurnal Kedokteran Mulawarman*, *8*(1), 19. <https://doi.org/10.30872/j.ked.mulawarman.v8i1.6006>
- Antono, S. D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, *6*(2), 188–198.
- Astuti, E. R., & Yunita, H. (2021). Derajat Anemia pada Kehamilan dengan Kejadian Asfiksia Bayi Baru Lahir. *Journal Midwifery Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Gorontalo*, *6*(1), 1. <https://doi.org/10.52365/jm.v6i1.305>
- Florescia, M., Indriyani, D., & Adriani, S. W. (2022). Risiko Kejadian Asfiksia pada Bayi Baru Lahir pada Ibu Hamil dengan Preeklampsia. *14*(1), 103–110. <https://doi.org/10.32528/ijhs.v14i1.7952>
- Harahap, N. (2021). Faktor Faktor yang berhubungan dengan kejadian Asfiksia. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia Indonesian Health Scientific Journal*, *2*(2).
- Hidayah, A. (2020). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD Kota Mobagu. *Jurnal IMJ: Indonesia Midwifery Journal*, *4*(1), 16–21.
- Johan dan Sunarsih. (2019). Hubungan Antara Preeklampsia Dengan Kejadian BBLR Dan Asfiksia Neonatorum Di VK IRD RSUD Dr Soetomo Surabaya. *Kesehatan*, 79–98. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=424747&val=278&title=FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA ANEMIA PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PRINGSEWU LAMPUNG](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=424747&val=278&title=FAKTOR-FAKTOR%20TERJADINYA%20ANEMIA%20PADA%20IBU%20PRIMIGRAVIDA%20DI%20WILAYAH%20KERJA%20PUSKESMAS%20PRINGSEWU%20LAMPUNG)
- Jon Putri, Y. N., Lalandos, J. L., Setiono, K., Sari, A. K., Sincihu, Y., Ruddy, B. T., Kedokteran, F., Katolik, U., Mandala, W., Gilang, Notoatmodjo, H., & Rakhmawatie, M. D. (2019). Analisis Faktor Risiko Pada Ibu Dan Bayi Terhadap Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, *17*(2),

- Kemenkes. (2019). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tata Laksana Asfiksia*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1–9. <https://doi.org/10.377/0033-2909.I26.1.78>
- Kumalasari, I., & Rusella, Z. (2022). Risiko Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Persalinan Kala Ii Memanjang, Air Ketuban Bercampur Mekonium Dan Usia Ibu. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 7(2), 91–97. <https://doi.org/10.51143/jksi.v7i2.325>
- Lengkong, G. T., Langi, F. L. F. G., & Posangi, J. (2020). Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kematian Bayi Di Indonesia. *Jurnal Kesmas*, 9(4), 41–47. <https://doi.org/10.37063/ak.v4i1.514>
- Mandasari, P. (2020). Hubungan Kehamilan Lewat Waktu dan Preeklampsia Berat (PEB) dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Citra Delima: Jurnal Ilmiah STIKES Citra Delima Bangka Belitung*, 4(1), 36–40. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v4i1.98>
- Marlina, Y., Santoso, H., & Sirait, A. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), 383–392.
- Martadiansyah, A., Qalbi, A., & Santoso, B. (2019). Prevalensi Kejadian Preeklampsia dengan Komplikasi dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (Studi Prevalensi Tahun 2015, 2016, 2017). *Sriwijaya Journal of Medicine*, 2(1), 231–241. <https://doi.org/10.32539/sjm.v2i1.53>
- Meliyani, D., Setiawati, D., Gama Wiyata, A., & Nurdin, Azizah, Damis, R. (2021). Analisis Hubungan Preeklampsia-Eklampsia Gravidarum Dengan Kejadian Persalinan Prematur Pada Ibu Bersalin Di RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe Periode Januari-September Tahun 2020. *Jurnal Kedokteran*, 6(2), 167.
- Mongdong, V. A. W. M., Suryadinata, R. V., Boengas, S., & Saroh, S. A. (2021). Studi Faktor Risiko Preeklamsi terhadap Kejadian Asfiksia Neonatorum di RSUD dr. Sayidiman Magetan Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.30742/jikw.v10i1.1015>
- Muliahari, M. S. (2022). Relationship between Premature Birth and Asphyxia in Newborn Babies. *International Journal of Current Science Research and Review*, 05(06), 2152–2154. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v5-i6-45>
- Mustofa, A., Ariningtyas, N. D., Prahasanti, K., & Anas, M. (2021). Hubungan Antara Usia Ibu Hamil dengan Preeklampsia Tipe Lambat di Rumah Sakit

PKU Muhammadiyah Surabaya. *Herb-Medicine Journal*, 4(4), 14.
<https://doi.org/10.30595/hmj.v4i4.9737>

Nufra, Y. A., & Ananda, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Fauziah Bireuen Tahun 2021. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(2), 661–672.
<http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/1579>

Nulanda, M. (2019). Analisis Hubungan Indeks Massa Tubuh terhadap Kejadian Kasus Preeklampsia di Rsia Sitti Khadijah 1 Makassar. *UMI Medical Journal*, 4(1), 76–91. <https://doi.org/10.33096/umj.v4i1.51>

Phipps, E. A., Thadhani, R., Benzinger, T., & Karumanchi, S. A. (2019). Preeclampsia: pathogenesis, novel diagnostics and therapies. *Nature Reviews Nephrology*, 15(5), 275–289. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0119-6>

Portiarabella, P., Wardhana, A. W., & Pratiningrum, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Asfiksia Neonatorum: Suatu Kajian Literatur. *Jurnal Sains Dan Kesehatan*, 3(3), 538–543. <https://doi.org/10.25026/jsk.v3i3.413>

Prawirohardjo, S. (2020). *Ilmu Kebidanan. Edisi 4. Bina Pustaka Prawirohardjo*.

Purnamasari, I. nur, & Rahmawati. (2021). Faktor Risiko Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil. *Ilmiah Obsgin*, 13(December), 1–6.

Purwanti, P., Aisyah, S., & Handayani, S. (2021). Hubungan Riwayat Hipertensi, Kadar Haemoglobin dan Obesitas Dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di RSUD Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 413.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1341>

Rahayu, S., Nurdin, A., & Rahim, R. (2021). The Relationship of Anemia in Pregnant Women with Anthropometry and Apgar Score for Newborns in Dr. Tadjuddin Chalid Hospital, Makassar. *Green Medical Journal*, 3(1), 13–22.
<https://doi.org/10.33096/gmj.v3i1.68>

Rana, S., Lemoine, E., Granger, J., & Karumanchi, S. A. (2019). Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. *Circulation Research*, 124(7), 1094–1112. <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276>

Vina, E. (2019). Hubungan Umur Ibu Dan Paritas Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Pada Bayi Baru Lahir Di Rsud Bangkinang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Al-Insyirah Midwifery: Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)*, 8(2), 73–77.
<https://doi.org/10.35328/kebidanan.v8i2.137>

Wulan, R. C., Kristianingsih, A., Sukarni, & Wulandari, E. T. (2019). Hubungan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Pada Bayi Baru Lahir Di

Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Tahun 2019. *Journal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)*, 2(2), 136–143.

Yulianti, R., & Astari, R. (2022). Literatur Review; gambaran Status Gravida dan Pekerjaai gaya hidup dengan latihan fisik meningkatkan ambilan glukosa dan menurunkan profil lipid. Ekstrak daun sirsak berpotensi menurunkan kadar Malondialdehyde. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efe. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 10–15.

Yunus, P. (2019). Islamic Integration And Health (An Approach to Prophetic Medicine). *Journal of Research and Multidisciplinary*, 2(2), 172–182. <http://journal.alhikam.net/index.php/jrm>



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Etik Penelitian

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No: B.333/KEPK/FKIK/X/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Rezky Inayah Alfatihah
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

"Hubungan Riwayat Preeklampsia Ibu Hamil Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto Periode 2020-2021"

"Relationship of History of Preeclampsia in Pregnant Women with Asphyxia Neonatorum at the Lanto Regional General Hospital Dg. Pasewang Jeneponto Regency 2020-2021."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023.

This declaration of ethics applies during the period October 24th, 2022 until October 24th, 2023.

 October 24th, 2022
Chairperson and Chairperson,

Dr. Syatimah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 2 : Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 12528/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Jeneponto
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 641 /Un.06/LP2M/PP.00.9/9/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: REZKY INAYAH ALFATIAH
Nomor Pokok	: 70600119009
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN RIWAYAT PREEKLAMPSIA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN ASFIKZIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2020-2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 November 2022 s/d 24 Januari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19630424 198903 1 010
---	---

Tembusan Yth

1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD LANTO DG. PASEWANG
Jl. Jauh Ikandar, Kel. Empoang Selatan, Kec. Binamu, Kab. Jenepono, Telp. (0419)21004-21118

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 000/1366/RSUD-LDP/JP/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. ST. PASRIANY, Sp.GK.,M.Kes**
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Nip : 19810215 200502 2 005
Jabatan : Direktur
Unit kerja : UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jenepono

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REZKY INAYAH ALFATIHAH**
Nim : 70600119009
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Dokter
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Yang Bersangkutan benar-benar Telah Melaksanakan Penelitian di UPT RSUD Lanto Dg Pasewang Kab. Jenepono dengan judul : " HUBUNGAN RIWAYAT PREEKLAMPSIA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN ASFIKZIA NEONATORUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO PERIODE 2020-2021 " pada tanggal 28 November s.d 28 Desember 2023.

Demikian Surat keterangan ini dibuat Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Jenepono, 12 Januari 2023


dr. ST. PASRIANY, Sp.GK.,M.Kes
Nip. DG. PAS. 19810215 200502 2 005
Pangkat : Pembina Tingkat I, IV/b

Lampiran 4 : Dokumentasi

